



THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS


LIBRARY

Q. 540.5

CC

v. 971²





56384
240
222

CHEMISCHES ZENTRALBLATT

VOLLSTÄNDIGES REPERTORIUM
FÜR ALLE ZWEIGE DER REINEN UND ANGEWANDTEN CHEMIE

HERAUSGEGEBEN VOM

VORSTAND DER

DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT

VERTRETEN DURCH

PROF. DR. W. MARCKWALD

REDIGIERT VON

DR. MAXIMILIAN PFLÜCKE UND DR. ERNST BEHRLE

97. JAHRGANG

1926. I

ZWEITES QUARTAL. APRIL BIS JUNI

SEITE 2425—3644

VERLAG CHEMIE, G.M.B.H.

LEIPZIG — BERLIN

1926

PRINTED IN GERMANY

8

ZENTRALBLATT FÜR CHEMISCHES

FÜR ALLE ZWEIGE DER REINEN UND ANGEWANDTEN CHEMIE
VERLAGS-ANSTALT DER DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT

VERLAGS-ANSTALT DER DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT
VERSTAND DER
HERAUSGEBER VON

Prof. Dr. W. MARCKWARDT

Dr. MAXIMILIAN ERLICHSON und Dr. ERNST HERRMANN

ST. JAHRE GANGE

1896. I

ZWISCHEN QUARTAL, ANFANG DES JAHRES
HEFT 2125-2134

VERLAGS-ANSTALT DER DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT
LEIPZIG - BERLIN

1896
DRUCKT IN GÖTTINGEN

Chemisches Zentralblatt.

1926 Band I.

Nr. 14.

7. April.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

J. J. van Laar, *Über die Zustandsgleichung fester Stoffe (Metalle) in Zusammenhang mit deren Zusammendrückbarkeit und mit dem Druck- und Temperaturkoeffizient dieser Größe.* (Vgl. S. 1514.) Mathemat.-physikal. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **34**. 1303—20. 1925. Tavel sur Clarens.) K. WOLF.

Hubert Thomas Stanley Britton, *Untersuchung einiger basischer Kupfersalze auf elektrometrischem Wege und vom Standpunkt der Phasenregel.* Die Cu^+ -Konz. bei der Fällung von CuSO_4 -Lsgg. mit NaOH wird durch elektrometr. Titration mit Hilfe der Kette $\text{Cu} \mid 0,01\text{-mol. CuSO}_4, x \text{ NaOH} \mid \text{gesätt. KCl} \mid n. \text{KCl, Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{Hg}$ untersucht; für $x = 0$ ist bei 20° die EK. $= -0,006 \text{ V}$, woraus sich für das Normalpotential $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{++}$ 0,343 V berechnet, in Übereinstimmung mit JELLINEK u. GORDON (Ztschr. f. physik. Ch. **112**. 214; C. **1924**. II. 2731). Der Verlauf der Titrationskurve, Aussehen u. Zus. des Nd. hängen von der Geschwindigkeit des NaOH-Zusatzes ab. Sobald Abscheidung beginnt, wird die Cu-Elektrode, wahrscheinlich infolge Eintritts der Rk. $\text{Cu}^+ + \text{Cu} \rightleftharpoons 2 \text{Cu}^0$ unzuverlässig; sie gibt während der Fällung erheblich kleinere, nach beendeter Fällung erheblich größere Cu^+ -Werte, als sich unter der Annahme ausschließlicher B. von $4 \text{CuO} \cdot \text{SO}_3$ berechnet. Daher ist auch der von JELLINEK u. GORDON (l. c.) unter ähnlichen Bedingungen bestimmte Wert $1,7 \cdot 10^{-13}$ für das Löslichkeitsprod. des $\text{Cu}(\text{OH})_2$ fehlerhaft; aus den Messungen des Vf. ergibt sich, in annähernder Übereinstimmung mit ALLMAND (Journ. Chem. Soc. London **95**. 2151; C. **1910**. I. 728) die Größenordnung 10^{-20} . — Es werden ferner die Gleichgewichte $\text{CuO} - \text{SO}_3 - \text{H}_2\text{O}$ u. $\text{CuO} - \text{HCl} - \text{H}_2\text{O}$ bei 25° u. die Rkk. zwischen $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ bzw. CuBr_2 u. NaOH untersucht. Im System $\text{CuO} - \text{SO}_3 - \text{W.}$ geht die Farbe des Bodenkörpers mit steigendem SO_3 -Gehalt von braunschwarz in blaugrün über; CuO wird erst gel, wenn die feste Phase das Verhältnis $1 \text{ SO}_3 : 4 \text{ CuO}$ erreicht hat, bis dahin enthält die farblose fl. Phase weder Cu^{++} noch SO_4^{--} . Das bas. Sulfat $4 \text{ CuO} \cdot \text{SO}_3 \cdot 4 \text{ H}_2\text{O}$ (vgl. S. 735) ändert beim Kochen seine Farbe nicht, wird aber durch Alkalien in ähnlich gefärbte, stärker bas. Prodd. (Gemische von $4 \text{ CuO} \cdot \text{SO}_3 \cdot 4 \text{ H}_2\text{O}$ mit hydrat. CuO) verwandelt. Andere definierte bas. Sulfate existieren bei 25° nicht. — Der Beginn der Abscheidung von bas. Cu-Chlorid aus CuCl_2 -Lsgg. durch NaOH oder NH_3 u. die Beschaffenheit des Nd. wechselt mit der Mischungsgeschwindigkeit u. der Konz. Im System $\text{CuO} - \text{HCl} - \text{H}_2\text{O}$ enthält die fl. Phase erst CuCl_2 , wenn 0,5 HCl auf 1 CuO kommen, von da ab besteht die feste Phase nur aus dem bas. Chlorid $4 \text{ CuO} \cdot 2 \text{ HCl} \cdot 3 \text{ H}_2\text{O}$, während sie sich vorher aus verschiedenfarbigen Schichten von grünblauem bas. Chlorid u. dunkelbraunem hydrat. CuO zusammensetzt. Das bas. Chlorid u. die Prodd. mit mehr als 0,315 Äquivalenten Cl auf 1 Cu gehen leicht kolloidal in Lsg. — Bei langsamem Zusatz von NaOH zu $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ -Lsgg. ist die Fällung vollständig u. tritt alkal. Rk. ein, wenn 1,5 Äquivalente NaOH auf 1 Cu kommen. Der Nd. hat die Zus. $4 \text{ CuO} \cdot 2 \text{ HNO}_3 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O}$, ist unl in W., schwärzt sich beim Kochen u. wird durch Alkalien viel leichter zersetzt als das bas. Sulfat oder Chlorid. — Aus CuBr_2 -Lsgg. scheidet NaOH hellblaues, amorphes in W. unl. bas. Bromid ab, das CuO u. HBr im Verhältnis 2 : 1 enthält; es wird durch Kochen nicht verändert. Das bas. Nitrat u. Bromid gehen bei der Behandlung mit W. leicht in kolloide Suspensionen über. — Wegen der Ähnlichkeit der Verbh. $4 \text{ CuO} \cdot \text{SO}_3 \cdot 4 \text{ H}_2\text{O}$, $4 \text{ CuO} \cdot 2 \text{ HCl} \cdot 3 \text{ H}_2\text{O}$, $4 \text{ CuO} \cdot 2 \text{ HBr} \cdot (?) \text{H}_2\text{O}$ u. $4 \text{ CuO} \cdot$

$2\text{HNO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ in Zus. u. Aussehen u. wegen ihrer Schwerlöslichkeit sind sie nicht als Doppelsalze im gewöhnlichen Sinne sondern als Komplexverb. des $\text{Cu}(\text{OH})_2$ aufzufassen. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2796—2807. 1925.) KRÜGER.

Hubert Thomas Stanley Britton, *Elektrometrische Untersuchung der Reaktionen zwischen Alkalien und Silbernitratlösungen*. (Vgl. vorst. Ref.) Die Änderung der $[\text{Ag}']$ während der Titration von AgNO_3 -Lsg. mit NaOH wird mit Hilfe der Konzentrationskette $\text{Ag} \mid 0,1\text{-n. AgNO}_3 \mid \text{gesätt. KNO}_3 \mid 0,02\text{-n. AgNO}_3, x \text{ cem } 0,1\text{-n. NaOH} \mid \text{Ag}$ untersucht; für die EK. der Kette $\text{Ag} \mid 0,1\text{-n. AgNO}_3 \mid \text{gesätt. KNO}_3 \mid \text{n. KCl, Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{Hg}$ ergibt sich bei 20° 0,456 Volt. Bei NaOH -Zusatz ist der Nd. anfangs weiß, bräunt sich dann bald u. bleibt bis zu einem beträchtlichen NaOH -Überschuß teilweise kolloidal gel.; Ag_2O scheint AgNO_3 zu adsorbieren u. dadurch peptisiert zu werden. So erklärt sich, daß der 1. Teil der Titrationskurve zu hohe Werte für das Löslichkeitsprod. des AgOH liefert; der spätere Verlauf ergibt $[\text{Ag}'] \cdot [\text{OH}'] = 1,51 \cdot 10^{-8}$, in guter Übereinstimmung mit BÖTTGER (Ztschr. f. physik. Ch. **46**. 521. 1903; C. **1904**. I. 777). Die von JELLINEK u. GORDON (Ztschr. f. physik. Ch. **112**. 207; C. **1924**. II. 2731) aus dem Potential $\text{Ag} \mid \text{Ag}_2\text{O}, x \text{ NaOH}$ gefundenen, niedrigeren Zahlen beruhen auf der Unzuverlässigkeit der Ag -Elektrode in Ggw. von Ag_2O , indem letzteres auf Kosten der Elektrode red. wird; Grund zur Annahme verschiedener Modifikationen des Ag_2O (vgl. RORDAM, Kong. Danske Vidensk. Meddelelser **3**. Nr. 7. 1920; C. **1922**. III. 46) besteht nicht. Die vom Vf. für verschiedene Stadien der Titration berechnete EK. der Kette $\text{Ag} \mid \text{Ag}_2\text{O}, \text{NaOH} \mid \text{H}_2$ beträgt im Mittel 1,167 V, während nach der von NERNST u. WARTENBERG (Ztschr. f. physik. Ch. **56**. 534; C. **1906**. II. 380) angegebenen EK. der Knallgaskette u. der von LEWIS (Journ. Americ. Chem. Soc. **28**. 158; C. **1906**. I. 1404) berechneten EK. der Kette $\text{Ag} \mid \text{Ag}_2\text{O}, \text{NaOH} \mid \text{O}_2$ der Wert 1,180 V zu erwarten wäre; sie ist auch kleiner als die von LUTHER u. PO KORNÝ (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **57**. 290; C. **1908**. I. 1371) gemessene Anfangsspannung, liegt aber zwischen den Werten von RORDAM. Die höchsten Werte werden unmittelbar nach der Fällung des Ag_2O erhalten.

Vf. untersucht ferner mit Hilfe der O-Elektrode die pH bei der Titration von AgNO_3 -Lsg. mit NH_3 . Die pH steigt zunächst schnell bis ca. 9, dann nur noch langsam, Kurvenknickpunkte liegen bei 1 u. 2 Moll. NH_3 auf 1 Ag. Die Abscheidung von AgOH im ersten Teil der Titration ist unvollständig u. bleibt bei Zusatz geringer Mengen HNO_3 ganz aus; feuchtes Ag_2O löst sich leicht in verd. NH_4NO_3 -Lsg., wenn auf 1 Mol. AgOH 1,1—1,2 Moll. NH_4NO_3 kommen, die relativ hohe $[\text{Ag}']$ solcher Lsgg. weist auf die B. stark dissoziierter Monoammino- oder Diamminosilberkomplexe hin. Die Entfernung von Ag' durch Komplexbildung geht auch daraus hervor, daß die $[\text{Ag}']$ bei steigendem Zusatz von NaOH u. NH_3 , trotz der unvollständigen Fällung im letzteren Fall zunächst fast ident. ist. Vf. nimmt an, daß während des Zusatzes der ersten beiden Mole NH_3 folgende Rkk. eintreten: $\text{AgNO}_3 + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{AgOH} + \text{NH}_4\text{NO}_3$ u. $\text{AgNO}_3 + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{NO}_3$; aus seinen Messungen u. den Daten von BRUNI u. LEVI (Gazz. chim. ital. **47**. 259; C. **1918**. I. 1137) ergibt sich, daß bei weitgehender Variierung des Verhältnisses $\text{NH}_3:\text{Ag}$ der Bruch $[\text{Ag}'] \cdot [\text{NH}_3]^2 / [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]$ eine Konstante $K = 2,2 \cdot 10^{-8}$ ist; einen ähnlichen Wert berechnet Vf. aus den Messungen jener Autoren an ammoniakal. AgNO_2 -Lsgg. ($K = 2,5 \cdot 10^{-8}$). Auch BODLÄNDER u. FITTIG (Ztschr. f. physik. Ch. **39**. 597; C. **1902**. I. 556) u. EULER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **36**. 1854. 2878; C. **1903**. II. 932) fanden an ammoniakal. Lsgg. von AgCl_2 bzw. Ag_2O Dissoziationskonstanten des $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ von gleicher Größenordnung. Es ist dies eine weitere Stütze für die B. komplexer $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ -Kationen. Die Base $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$ ist wahrscheinlich viel stärker als NH_3 , so daß das Salz $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{NO}_3$ in Lsg. existenzfähig ist. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2956—70. 1925. London, Imp. Coll. of Science and Techn.) KRÜGER.

John Stanley Carter, *Der Effekt des Aussalzens. Der Einfluß von Elektrolyten auf die Löslichkeit von Jod in Wasser*. Vf. bestimmt die Löslichkeit von J_2 in wss., mit der betreffenden Säure schwach angesäuerten Lsgg. von $NaCl$, $NaNO_3$, Na_2SO_4 , NaH_2PO_4 u. in H_2SO_4 u. HNO_3 . Die Löslichkeit von J_2 in W. bei $p_H = 5$ beträgt bei 25° 1,321 mmol/l. Bei Ggw. von $NaNO_3$, Na_2SO_4 u. $NaCl$ (unter Berücksichtigung der B. von $NaClJ_2$) gilt bis zur Sättigungskonz., bei Ggw. von NaH_2PO_4 bis auf die konzentriertesten Lsgg. der Ausdruck von SETSCHENOW (Ztschr. f. physik. Ch. **4**. 117. [1889]): $s = s_0 e^{-kc}$ (s u. s_0 = Löslichkeit in der Elektrolytlsg. bezw. in W., c = Konz. des Elektrolyten, ausgedrückt durch das Vol. der Lsg.). Die Löslichkeit des J_2 in H_2SO_4 fällt bei steigender Säurekonz., eine einfache mathemat. Beziehung besteht aber nicht. Die Löslichkeit in HNO_3 hat bei 10° ein Maximum bei ca. 25° , ein Minimum bei ca. 50% HNO_3 u. nimmt dann schnell zu; bei 35° steigt sie durchweg mit der Säurekonz. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2861—66. 1925. Leeds, Univ.) KR.

Jean Linard, *Untersuchungen über die Theorie konzentrierter Lösungen*. II. (I. vgl. TIMMERMANS, Bull. Soc. Chim. Belgique **30**. 276; C. **1922**. I. 310). Vf. prüft die Formel von MORTIMER (Journ. Americ. Chem. Soc. **44**. 1416. **45**. 633; C. **1923**. I. 1385. III. 1586) $\log C = (Q \cdot f / R) (1/T - 1/T')$, worin C die Konz., Q die Schmelzwärme der gel. Substanz, R die Gaskonstante, T der F. des reinen Lösungsm., T' der F. der Lsg., f ein von den „inneren Drucken“ des Gelösten u. des Lösungsm., in bestimmter Weise abhängiger Koeffizient ist, an binären Gemischen organ. Substanzen. In einfachen Fällen (keine Additionsverbb. usw.) wird die Formel bestätigt gefunden, wobei aber Vf. für die Q des Anilins 1529—1633 cal/Mol. (statt der experimentell bestimmten 1950—2513 cal/Mol. ansetzt, für die Q des Äthylendibromids 2911—2987 (exp. 2390—2540), des CCl_4 870, des Chlorbenzols 1785, des o-Chlortoluols 2550 cal/Mol. — Es wurden 3 Systeme mit Additionsverbb. untersucht: Nitrobenzol-Anilin (Verb. aus je 1 Mol.), Bzl.- CCl_4 (Verb. aus je 1 Mol.), Nitrobenzol- CCl_4 (Verb. 4:1 u. 2:3 Mol.), dann cyclo-Hexan-Anilin, cyclo-Hexan-Nitrobenzol, Naphthalin-cyclo-Hexan (Eutektikum bei $-5,6^\circ$ u. 5,6 Mol.-% Naphthalin), Nitrobenzol-Bzl. (Eutektikum bei $-24,9^\circ$ u. ca. 51% Nitrobenzol), Bzl.-Anilin (Eutektikum bei $-28,2^\circ$ u. ca. 35% Bzl.), Anilinum-Toluidin, Äthylendibromid- CCl_4 (Eutektikum bei -48° u. 18,4%), Äthylendibromid-Chlorbenzol (Eutektikum bei -55° u. 17% Äthylendibromid), o-Chlortoluol-Chlorbenzol (Eutektikum bei $-70,7^\circ$ u. 59,4% Chlorbenzol), p-Nitrotoluol-cyclo-Hexan (Eutektikum bei $-7,5^\circ$ u. 90% cyclo-Hexan), p-Toluidin-cyclo-Hexan (Eutektikum bei $-6,2^\circ$ u. 10% p-Toluidin), p-Toluidin-Bzl. (Eutektikum bei $-5,2^\circ$ u. 20,2% p-Toluidin) u. p-Nitrotoluol-Bzl. (Eutektikum bei $-8,5^\circ$ u. 23,4% p-Nitrotoluol). (Bull. Soc. Chim. Belgique **34**. 363—98. 1925. Brüssel, Univ. libre.) BIKERMAN.

Wld. Perschke und Tschufarow, *Verteilung eines Gemisches zwischen zwei nichtmischbaren Lösungsmitteln*. Vff. bestätigen durch Unterss. an einigen Systemen den Satz von NERNST, daß bei der Verteilung eines Gemisches mehrerer Stoffe zwischen 2 nichtmischbaren Lösungsmm. jede einzelne Molekülgattung sich so verteilt, als ob die andere nicht zugegen wäre. — Versuchstemp. 15° . Für den Verteilungskoeffizienten von Essigsäure zwischen W. u. Amylalkohol finden Vff. 0,920, für H_2O_2 0,142. Bei Anwendung eines Gemisches von CH_3COOH u. H_2O_2 werden fast die gleichen Werte (0,944 u. 0,130) erhalten. Der Koeffizient von H_2O_2 zwischen W. u. Ä. wird zu 0,043, der von CH_3COOH zu 0,470 bestimmt. Das Gemisch gab 0,044 u. 0,490; die Unterschiede liegen wiederum innerhalb der Grenze der Versuchsfehler. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 121—26. Swerdlowsk, Polytechn. Inst. am Ural.) UL.

F. H. Constable, *Unbewegliche Atomgruppen mit starken spezifischen äußeren Feldern, als Ursache der katalytischen Wirksamkeit*. (Vgl. S. 10.) Die Ursache der katalyt. Wirksamkeit von Cu bei der Zers. von A. in Aldehyd u. Wasserstoff wird untersucht. Elektrolyt. abgeschiedenes Cu, mechan. bearbeitetes Cu u. ferner solches, das durch Red. mit Hydrazinhydrat gewonnen wurde, erwies sich als katalyt. unwirksam bei

Temp. bis zu 370° . Die Prüfung auf die katalyt. Wirksamkeit geschah in diesen, wie in den folgenden Fällen in einfacher Weise durch Überleiten von reinem A.-Dampf über die Cu-Proben, die sich in einem Verbrennungsrohr befanden, u. durch fraktionierte Dest. des erhaltenen Kondensates, u. Prüfung des ersten Anteiles mit p-Nitrophenylhydrazin auf Aldehyd. — Die Gewinnung von *akt. Cu* konnte auf verschiedenen Wegen geschehen; einmal durch rasche Kondensation von Cu-Dampf, oder ferner besser noch durch Überleiten von NH_3 über Cu-Drahtnetz, welches auf 820° erhitzt ist, kommt man zu solchen akt. Modifikationen. U. Mk. erwies sich das Cu als schwammig u. feinst verteilt, jedoch ging dieses unregelmäßige Aussehen bei längerer Benutzung als Katalysator bei $220\text{--}270^{\circ}$ in ein regelmäßiges über; die Wirksamkeit des Cu wurde aber hierdurch in keiner Weise geschwächt. Es zeigte sich allgemein, daß die der Erhitzung in NH_3 -Strom folgende Behandlung ohne Einfluß auf die katalyt. Wirksamkeit ist.

Cu, das durch Red. von Cupri- oder Cuprooxyd mit CO erhalten wurde, war, wenn die Reduktionstemp. 320° betrug u. Red. u. Oxydation mehrmals mit einander abwechselten, von hoher katalyt. Wirksamkeit. Durch therm. Zers. von Cu-Formiat, Acetat, Propionat, Butyrat u. Valerat im CO_2 -Strom wurden gut wirksame Prodd. erhalten, im N_2 -Strome dagegen erhielt Vf. nur wenig wirksame Prodd., weil die als Katalysatorgift wirkenden Fettsäuren nicht völlig entfernt werden konnten. Wenn man die soeben genannten Salze vorsichtig auf der Innenwand eines Rohres antrocknen läßt u. das Rohr dann erhitzt, erhält man Cu-Häute von sehr großer Wirksamkeit. Nicht ganz so akt. war das Cu, daß durch Zers. von Cu-Salzen zwei- u. dreibas. Säuren zu erhalten war. Auf Grund dieser Ergebnisse wird eine theoret. Deutung der Verss. gegeben. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. **110**. 283—301. Cambridge, St. John's Coll.)

HAASE.

Robert S. Livingston und **William C. Bray**, *Die katalytische Zersetzung von Wasserstoffsuperoxyd in einer sauren Chlor-Chloridlösung*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 2069; C. **1925**. II. 1653.) Berichtigung einer Rechnung, die auf das Endergebnis ohne Einfluß ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 405—06. Berkeley [Cal.], Univ.)

JOSEPHY.

J. Hulton Wolfenden, *Kritische Potentiale des Wasserstoffs in Gegenwart von Nickel- und Kupferkatalysatoren*. Vf. benutzt eine ganz ähnliche Versuchsanordnung, wie sie von ANDREWES, DAVIES u. HORTON (S. 2170) beschrieben wurde. Es werden die Messungen der Ionisation von Wasserstoff in Ggw. von Nickel u. Kupfer angegeben; aus dem Vergleich dieser Resultate wird geschlossen, daß an der Katalysatoroberfläche beachtliche Mengen von atomarem Wasserstoff zugegen sind. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **110**. 464—76. N. J. Princeton Univ.)

HAASE.


Cyril Norman Hinshelwood und **Robert Emmett Burk**, *Die Beziehung zwischen homogenen und katalytischen Reaktionen. Die katalytische Zersetzung von Jodwasserstoff an einer Platinoberfläche*. (Vgl. HINSHELWOOD u. PRICHARD, S. 299.) Der Zerfall von HJ an erhitztem Pt-Draht ist unabhängig vom Druck, also ein weiteres Beispiel für Gaszers., die als homogene Rk. bimolekular, als heterogene Rk. monomolekular verlaufen. Der Mechanismus ist wahrscheinlich einfach $\text{HJ} = \text{H} + \text{J}$. H wirkt verzögernd. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2896—2900. 1925. Oxford, Balliol Coll. u. Trinity Coll.)

KRÜGER.


James Younger Macdonald und **Cyril Norman Hinshelwood**, *Bildung und Wachsen von Silberkeimen bei der Zersetzung von Silberoxalat*. Vff. untersuchen die Geschwindigkeit der Zers. von $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$ beim Erhitzen im Vakuum durch Messung des Druckes der entwickelten Gase in bestimmten Zeitintervallen. Der Zerfall erfolgt nach der Gleichung $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 2\text{Ag} + 2\text{CO}_2$; er wird durch Ag-Keime, die sich während der Rk. im Raumgitter des $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$ bilden, katalyt. beschleunigt. Bei $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$, das aus AgNO_3 -Lsg. mit $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ bei Überschuß an AgNO_3 gefällt wird, ist die Zersetzungsgeschwindigkeit $d x/d t$ geringer u. viel gleichmäßiger als bei Prodd., die bei

Überschuß von $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ erhalten worden sind; die Art der adsorbierten Ionen scheint also eine Rolle zu spielen. Im Anfangsstadium gilt der Ausdruck $d x/d t = k(x + x_0)$, (x_0 kleine, die Anfangsgeschwindigkeit bestimmende Konstante), im späteren Verlauf besteht keine einfache Beziehung. Mahlung der Krystalle erhöht die Zersetzungsgeschwindigkeit, aber bringt die Autokatalyse nicht zum Verschwinden. Der Temperaturkoeffizient zwischen 100 u. 150° ist ca. 2,7. O_2 u. Luft verzögern den Zerfall; hieraus, sowie aus dem Einfluß adsorbierter Ionen wird geschlossen, daß die katalyt. wirksamen Ag-Keime zuerst an der Krystalloberfläche entstehen müssen. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2764—71. 1925. Oxford, Balliol Coll. u. Trinity Coll.) KRÜGER.

Don M. Yost, *Katalyse durch Silberion bei der Oxydation von Chromisalzen durch Peroxyschwefelsäure. Die Existenz dreiwertiger Silberverbindungen.* Der Ausdruck „Peroxysäure“ wird zur Unterscheidung von gewöhnlichen Verbb. höherer Wertigkeit, wie Perchlorat, Permanganat etc., für solche Säuren gewählt, die die Peroxydgruppe enthalten. Genau müßte demnach die *Überschwefelsäure*, $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$, *Peroxydischwefelsäure* genannt werden u. die Carosche Säure Peroxymonoschwefelsäure, der Kürze halber nennen Vff. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ *Peroxyschwefelsäure*. — Vff. messen die *Reaktionsgeschwindigkeit* zwischen $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ u. $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ bei Ggw. von Ag-Salzen als Katalysator bei 25 u. 35°. Die Rk.



wurde durch Zusatz einer genügenden Menge Chloridion, das alles Ag als AgCl entfernte, gestoppt, u. $\text{Cr}_2\text{O}_7''$ wurde unter gewissen Bedingungen durch *Vanadylsulfat*, VOSO_4 , quantitativ zu Cr''' reduziert, ohne daß $\text{S}_2\text{O}_8''$ angegriffen wird. Auf diese Weise konnte der Verlauf der Rk. verfolgt werden. Es ergab sich, daß die Rk.-Geschwindigkeit proportional der 1. Potenz der $\text{S}_2\text{O}_8''$ -Konz. u. der Ag-Konz. ist, aber sie ist unabhängig von der Konz. des Cr''' -Ions u. wird auch von der $[\text{H}^+]$ nicht sehr beeinflusst. Diese Befunde deuten darauf hin, daß das Ag-Ion durch B. eines dreiwertigen Ag-Salzes als Zwischenverb. als Katalysatorträger wirkt, u. daß die Rk. in 2 Stufen verläuft:



Die erste dieser beiden Rkk. muß langsam verlaufen u. die Gesamtreaktionsgeschwindigkeit bestimmen, während die zweite sehr schnell stattfinden muß. Die Geschwindigkeitskonstante beträgt bei 25° 0,333, bei 35° 0,765 bezogen auf 1 Min. u. Konz. in Mol. pro 1 Lsg. Daraus ergibt sich der Temp.-Koeffizient der Rk. zu 2,30. — Der Schluß auf das dreiwertige Ag wurde noch bestätigt durch Unters. des schwarzen Nd., der sich beim Mischen von $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ mit einem Ag-Salz bildet. Dieser Nd. ist ein Hydrolysenprod. der Zwischenverb., die in saurer Lsg. die Peroxysulfatrk. katalysiert. Bestst. des Verhältnisses der Oxydationswrkg. zu dem Ag-Gehalt der Verb. einerseits u. des Verhältnisses der Äquivalente des zerstörten Peroxysulfats pro Äquivalent Ag, das als schwarzer Nd. ausfiel, ergaben, daß die Verb. ein Oxyd von dreiwertigem Ag (Ag_3O_3) war, das bas. Sulfat (wahrscheinlich auch mit dreiwertigem Ag) enthielt. Das dreiwertige Ag ist in Form des festen Oxyds u. des Salzes in stark sauren Lsgg. existenzfähig. Der schwarze Nd. wurde in W., konz. HCl, HNO_3 u. HClO_4 suspendiert oder gel. u. erwies sich als sehr kräftiges Oxydationsmittel: Chloride wurden unter Cl_2 -Entw. oxydiert, Chromisalze zu Chromat, Manganosalze zu Permanganat u. MnO_2 u. NH_3 zu N_2 . Die Substanz ist kein Peroxyd vom Wasserstoffperoxydtypus, denn mit Ti-Salzlsgg. gibt sie keine Färbung; sie ähnelt den Oxyden von dreiwertigen Co, Tl u. Au. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 152—64. Pasadena [Cal.], Inst. of Technology.) JOS.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

Irène Curie, *Darstellung und Reinigung des aktiven Niederschlags des Radiums bei langer Exposition.* Vf. gibt zunächst eine zusammenhängende Darstellung der Methoden,

die im Radiuminstitut in Paris zur Messung des langlebigen Nd. des Ra (Ra D, Ra E und Po) üblich sind (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 1463; C. **1923**. III. 1536 u. Frau CURIE, Journ. de Chim. physique **22**. 143; C. **1925**. III. 135). Sodann schildert Vf. eingehend die von ihr ausgeführte Reinigung u. Trennung der einzelnen Körper des langlebigen Nd. Bei Behandlung der zerstoßenen Emanationsröhrchen mit h. verd. Königswasser geht Ra D (isotop mit Pb), Ra E (isotop mit Bi), Po u. Pb ferner etwas Alkali vom Glas u., da sich bei dem Einpressen der Emanation mittels einer Quecksilbersäule in den Röhrchen kleine Hg-Tröpfchen kondensieren, Hg mit seinen Verunreinigungen Cu u. Pb in Lsg. Zur Reinigung des akt. Nd. wird durch Fällung mit NH_3 von Alkali u. Cu getrennt. Die aus der h. salzsauren Lsg. des NH_3 -Nd. mit H_2S gefällten Sulfide werden mit einer Lsg. von Ammonsulfid u. überschüssiger KOH behandelt, wodurch Hg als letzte Verunreinigung in Lsg. geht. Die ungelöst gebliebenen Sulfide werden in Königswasser gel. (Das Filtrat der H_2S -Fällung ist oft noch akt., die Fällung ist dann zu wiederholen.)

Trennung von Ra D, Ra E u. Po: Die Anwendung der Elektrolyse durch elektr. Strom z. B. in salpetersaurer Lsg. mit Goldelektroden führt zu keiner brauchbaren Trennung. Nur das Pb wird bei genügend langer Dauer quantitativ an der Anode abgeschieden. An der Kathode wurde eine Diffusion des Po in das Gold beobachtet. — Eine teilweise Trennung läßt sich durch Krystallisation erzielen. Nach Auflösung der Nitate in schwach angesäuertem W. wird durch Zugabe von reiner HNO_3 das in konz. HNO_3 unl. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ zu möglichst langsamer Krystallisation gebracht. Entfernung der Fl. mittels Pipette u. rasches Waschen durch Dekantieren mit k. reiner HNO_3 . Ergebnis: in der Lsg. $\frac{9}{10}$ Po u. Ra E u. weniger als $\frac{1}{20}$ Ra D. Die Anwesenheit einer geringen Menge Al in der Lsg. begünstigt die Trennung. — Zur besten Trennung führt das Niederschlagen auf Metallen. Radium E kann frei von Ra D, aber mit mittelmäßiger Ausbeute auf Ni in schwach salzsaure Lsg. abgeschieden werden. Polonium schlägt sich auf allen nicht edleren Metallen nieder. Vf. läßt in schwach salpetersaurer Lsg. nach Zufügung eines Tropfens HCl eine dünne Silberfolie über Nacht drehen u. spült dann die Folie ab. Po schlägt sich fast quantitativ ohne Ra D u. Ra E nieder. Die Silberfolie wird in verd. HNO_3 gel., mit großem Überschuß von HCl Silberchlorid gefällt u. nach dem Absitzen die Lsg. abpipettiert. Aus dem AgCl wird durch Digerieren mit w. mäßig konz. Königsw. noch eingeschlossenes Po vollständig herausgel. Bei großen Aktivitätsstärken (über einige tausend elektrost. Einheiten pro qcm des Trägers) tritt bei obigem Verf. B. von schwarzem Silberoxyd auf, das die Abscheidung verhindert u. Adsorption der anderen Körper bewirkt. In diesem Fall wird das Po am besten in essigsaurer Lsg. nach Zufügen einer Spur HCl auf einer genügend großen Silberfolie abgeschieden. Eventuell gebildetes Silberoxyd wird in Chlorid verwandelt u. das Po wie oben herausgel. Auf Ni ist die Abscheidung noch günstiger, die Auflsg. des Po aber schwieriger. Bei geringer Substanzmenge wird zweckmäßig die auf ein sehr kleines Vol. konz. akt. Lsg. mittels einer feinen Pipette auf die Silberfläche getropft u. nach einigen Stdn. ebenfalls mit der Pipette gewaschen. Bei einer Aktivitätsstärke von ca. 1000 elektrost. Einheiten pro qmm, die 10^{-5} g Po pro qcm entspricht, ist die Trägerfläche trotz aller Vorsichtsmaßregeln leicht geschwärzt. Aus einem Vergleich mit Nickelschichten von derselben Größenordnung (erhalten durch kathod. Zerstäubung auf Glas) schließt Vf. auf sichtbare Poloniummengen. (Journ. de Chim. physique **22**. 471—87. 1925. Paris, Radium-Institut.)

ERBACHER.

A. Miethe und H. Stammreich, Über die Destillation von goldhaltigem Quecksilber. Polemik gegen RIESENFELD u. HAASE (vgl. S. 1362). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 359—62. Charlottenburg, Techn. Hochschule.)

JOSEPHY.

R. A. Millikan, Hochfrequenzstrahlen kosmischen Ursprungs. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 48—55. — C. **1926**. I. 1129.)

HANTKE.

W. Mund und **E. Bogaert**, *Über die Veränderung der Benzoldämpfe unter Einwirkung von α -Teilchen*. (Vgl. S. 831.) In einem komplizierten App. (Abb. im Original) wurde die Druckabnahme des Bzl.-Gases bei 100° nach 17 Stdn. langer Einw. von Niton bestimmt. Die zugesetzte Nt-Menge betrug $7,265 \cdot 10^{14}$ Atome, das Vol. des Bzl. 38 cem. Es ergab sich, daß ein α -Teilchen $2,1 \cdot 10^5$ Bzl.-Moll. kondensierte, d. h. so viel, wie es Ionenpaare erzeugt. In der Tat war die kondensierte Menge noch größer (um ca. 5%), als die Druckabnahme zeigte, weil das Bzl. auch gasförmige Prodd. lieferte, die sich bei -78° noch nicht verflüssigen ließen. Das Kondensationsprod. stellte eine zähe, durchsichtige, grünlichgelbe, scharf riechende M. dar. (Bull. Soc. Chim. Belgique **34**. 410—15. 1925. Louvain; Univ.)

BIKERMAN.

R. W. Gurney, *Die Zahl der Teilchen in den β -Strahlen-Spektren von Radium B und Radium C*. Die Arbeit bildet einen experimentellen Beitrag zur Frage nach der Natur der kontinuierlichen β -Strahlenspektren von RaB u. RaC. Während ELLIS (Proc. Cambridge Philos. Soc. **21**. 121; C. 1923. I. 879) annimmt, daß sie primärer Natur sind, die emittierten β -Teilchen also direkt aus dem zerfallenden Kern stammen, vertritt MEITNER (Ztschr. f. Physik **11**. 49; C. 1923. I. 999) die Ansicht, daß die β -Teilchen erst sekundär in der Elektronenhülle des Atoms ausgelöst werden, in Wirklichkeit soll nach dieser Auffassung der kontinuierliche Charakter des magnet. Spektrums nur durch eine zu geringe Auflösung vorgetäuscht sein. Vf. untersucht das magnet. Spektrum von RaB u. RaC quantitativ, indem er für jede Geschwindigkeit die Zahl der emittierten Teilchen in einem hinter einem Spalt befindlichen Faradayzylinder mißt. Weitgehende Abänderungen der Vers.-Bedingungen führen den Vf. zu dem Schluß, daß sowohl RaB wie auch RaC ein echtes kontinuierliches β -Strahlenspektrum emittieren. Das kontinuierliche Spektrum von RaB hat sein Maximum bei 170000 V u. seine obere Grenze bei 650000 V, das von RaC besitzt ein Maximum von 400000 V u. eine obere Grenze von 3150000 Volt. Die Geschwindigkeitsverteilungskurven werden für RaB u. RaC angegeben. Die Zahl der (pro zerfallendes Atom) emittierten Elektronen ist größer als eins. Weiter wird die wirkliche Zahl der Elektronen ermittelt, welche in den einzelnen Linien des Linienspektrums von RaB emittiert werden. Daraus ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit, daß eine Kern- γ -Strahlung in einen β -Strahl verwandelt wird, anstatt direkt als γ -Strahlung emittiert zu werden, das Verhältnis 1:7. Schließlich berechnet der Vf. die Wärmewirkung von RaB + C zu 5,6 Cal pro Stunde u. g. Von diesem Wert fallen 1,3 Cal auf RaB u. 4,3 Cal auf RaC. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **109**. 540—61. 1925.)

STEINER.

Maurice de Broglie und **Jean Thibaud**, *Totalreflexion und Änderung des Brechungsindex der X-Strahlen in der Nähe einer Absorptionsunstetigkeit des Spiegels*. Messungen der Totalreflexion von Röntgenstrahlen (α -Linie der K-Serie von Wo, Mo, Cu) an verschiedenen Spiegeln ergaben für den Brechungsindex n mit der Drude'schen Dispersionstheorie übereinstimmende Werte. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1034—35. 1925.)

BIKERMAN.

Keivin Burns, *Die roten Neonlinien*. Vf. bestimmt durch eine große Anzahl von Messungen die Wellenlängen der roten Ne-Linien. Durch die erzielte Übereinstimmung u. durch Vergleichung mit den Messungen anderer Autoren wird festgestellt, daß man berechtigt ist, λ in Å. noch mit der 4. Dezimale anzugeben. (Journ. Opt. Soc. America **11**. 301—10. 1925.)

KELLERMANN.

Frank R. Weston, *Die Flammenspektren von Kohlenmonoxyd und Wassergas II*. (I. vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A. **109**. 176; C. 1925. II. 2128.) Die früher mitgeteilten Verss. werden mit einer neuen Anordnung wiederholt, die wesentlich lichtstärkere Spektren liefert. Die bisherigen Resultate des Vfs. werden erneut bestätigt. Vf. faßt das Ergebnis seiner beiden Arbeiten dahin zusammen: Bei der Verbrennung von reinem, ungetrocknetem CO in der Flamme verlaufen gleichzeitig

nebeneinander zwei Vorgänge. 1. findet eine direkte Wirkung zwischen CO u. O₂ statt, diese führt zur Ausstrahlung des kontinuierlichen u. Bandenspektrums u. der blauen Flamme. 2. findet eine Rk. zwischen CO u. H₂O statt, die die Emission der Wasserdampflinien zur Folge hat. Bei Zugabe von H₂ zu dem reinen CO wird die 1. Rk. gegenüber der 2. zurückgedrängt. Im Einklang damit steht die Beobachtung, daß die Wasserdampflinien mit steigendem H₂-Zusatz stärker hervortreten, während das kontinuierliche CO-Spektrum zurücktritt. (Proc. Royal Soc. London Serie A **109**. 523—26. 1925.) STEINER.

Ian Sandeman, *Das sekundäre Spektrum des Wasserstoffs bei höheren Drucken*. II. (I. vgl. Proc. Royal Soc. London. Serie A. **108**. 607; C. **1925**. II. 1930.) Um weitere Regelmäßigkeiten im sekundären Spektrum des Wasserstoffs festzustellen, arbeitete der Vf. wieder mit dem Bogenspektrum des Wasserstoffs bei höheren Drucken. Mit Hilfe dieses Spektrums wurde eine P- u. eine R-Serie ausgewählt, die mit RICHARDSON u. TANAKAS 83 Q zu der P-, Q- u. R-Kombination paßten, u. eng in Übereinstimmung mit dem Kombinationsprinzip standen. Diese Bande ist eine von den vier Banden, deren Nulllinien durch die Rydbergsche Formel gegeben sind, wenn man $n = 6, 7, 8, 9$ setzt; aus einigen schwachen Andeutungen heraus glaubt Vf. bereits auch eine Bande erhalten zu haben, bei der $n = 10$ ist. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. **110**. 326—40. St. Andrews, Univ.) HAASE.

F. H. Newman, *Das Spektrum von Kalium bei niedrigen Spannungen*. (Vgl. S. 311.) Mit Hilfe der Elektronenstoßmethode werden bei Spannungen, die unterhalb der Ionisierungsspannung des K liegen, verschiedene Linien des Spektrums angeregt u. in einem Spektrographen beobachtet. Bei 1,9 V tritt nur das 1. Glied der Hauptserie $1s - 1p$, das Dublett λ 7665 u. 7699 Å auf; bei 3,3 V kommt das 2. Glied der Hauptserie $1s - 1p$, λ 4044 u. 4047 Å hinzu, bei 3,9 V erscheint auch das 3. Dublett λ 3447 u. 3448 Å. Bei 3,7 V erscheinen die Dubletts λ 6936, 6965, 6911, 6939 Å, die ebenso wie die anderen Dubletts mit dem benutzten Spektrographen nicht aufgelöst werden konnten; sie gehören der diffusen bzw. scharfen Nebenserie an. Erreicht schließlich die die stoßenden Elektronen beschleunigende Spannung den Wert der Ionisierungsspannung von K, der 4,4 V beträgt, so wird das ganze Spektrum ausgesandt. Die Apparatur wurde auf ca. 245° gehalten, sodaß der K-Dampfdruck im Versuchsraum ungefähr 0,1 mm betrug. Auch schon mit bloßem Auge konnte die Entwicklung des Spektrums mit steigender Spannung beobachtet werden. Bei niedriger Spannung war das Leuchten von rein roter Farbe u. nahm erst bei höheren Voltzahlen die für K charakterist. violette Färbung an. (Philos. Magazine [6] **50**. 796—803. 1925.) STEINER.

F. H. Newman, *Das Spektrum des Rubidiums bei niedrigen Spannungen*. Es wurden unter den gleichen Bedingungen wie bei den Messungen über das Na (vgl. S. 311) die Spannungen bestimmt, bei denen die einzelnen Linien auftreten. Die das metall. Rb enthaltende Röhre wird auf 150° angeheizt u. das Rb einem Elektronenbombardelement ausgesetzt. Das gefundene Potential wurde durch die Best. des theoret. Ionisationspotentials jeweils korrigiert. Es erschienen bei 1,7 V das Dublett λ 7948 u. 7800, hierauf wurde das Potential sofort auf 3,2 V gesteigert, wobei λ 4216 u. 4202 sichtbar wurden, während in dem Zwischenraum bereits λ 15290, 14754, 13667 u. 13237 erschienen waren. Bei 3,6 V trat λ 7758 u. 7619, sowie 7408 u. 7280, u. 3592 u. 3587 auf. Bei 4,2 V war das Spektrum vollkommen. Die Spektrallinien erscheinen also schon, ehe das Ionisationspotential (4,16 V) erreicht ist. (Philos. Magazine [6] **50**. 1276—82. 1925.) ENSZLIN.

W. C. Mc Quarrie, *Notiz über die Spektren von Silicium und Aluminium*. Von dem Spektrum des Si sind zwar zahlreiche Linien bekannt, doch ließen sich bisher die Linien des neutralen Atoms nicht in ein Serienschema einordnen. Vf. erhält das Absorptionsspektrum von Si, da Si-Dampf sich nur schwer erzeugen läßt, mittels

der Methode des Unterwasserfunkens. Bei ihm erscheinen häufig, wie besonders eingehend von E. BLOCH u. L. BLOCH (Journ. de Physique et le Radium [6] **3**. 309; C. 1923. III. 343) gezeigt wurde, die Linien des Elektrodenmetalls umgekehrt, also in Absorption, u. zwar handelt es sich bei diesen Linien stets um die Bogenlinien. Als Elektrodenmaterial benutzt der Vf. eine Legierung von 23% Si u. 77% Al. Vom Si wurde in Absorption beobachtet nur das pp' -Multipllett von λ 2528-516 bis 2506-659 Å, das erste Glied der scharfen Nebenserie 2881-585 Å erschien dagegen in Emission oder allenfalls asymmetr. umgekehrt. Unter besonderen Bedingungen wurden außer den von L. BLOCH u. E. BLOCH angegebenen Linien noch 12 weitere Absorptionslinien aufgefunden, die in einer Tabelle zusammengestellt sind. (Philos. Magazine [6] **50**. 819—21. 1925.)

STEINER.

R. W. Wood, *Feinstruktur, Absorption und Zeemaneffekt der Quecksilberlinie 2536*. Bei der Bedeutung, die der Hg-Linie 2536 in der Atomphysik zukommt, hält es Vf. für wünschenswert, ihre experimentelle Unters. möglichst vollständig zu Ende zu führen. Vf. beschreibt zunächst die benutzten Apparate. Es wurden 3 verschiedene Typen von Hg-Lampen verwendet. Vf. legt besonders Sorgfalt darauf, die Selbstumkehr der Linien zu vermeiden; zu diesem Zweck wird durch einen Magneten die Entladung an die Wand des Lampenrohrs gedrückt, da die Kühlung der Lampe allein nicht ausreicht. Die Feinstruktur wird mit zwei gekreuzten Lummer-Gehrcke-Platten aus Quarz im polarisierten Licht der Linie untersucht. Die Hg-Linie 2536 besteht aus 5 Komponenten, die ungefähr gleiche Intensität u. die folgenden Abstände haben: 0,014; 0,010; 0,011 u. 0,011 Å. Bringt man zwischen Lampe u. Interferenzplatten ein mit Hg-Dampf gefülltes Absorptionsrohr, so erscheinen statt der 5 nunmehr 10 Interferenzpunkte; die Mitte jeder der 5 Komponenten wird also ungefähr im gleichen Betrage absorbiert. Die von dem Resultat des Vf. abweichenden Angaben von NAGAOKA (Japan. Journ. of Physics **2**. 121; C. 1924. II. 1890) über die Feinstruktur finden ihre Erklärung darin, daß bei dem von NAGAOKA benutzten Lampenmodell Selbstumkehr nicht vermieden war, diese führt zu einer Verdoppelung der Interferenzpunkte u., wenn diese breit sind, zu einer teilweisen Verschmelzung von 2 Punkten, die zu verschiedenen Linien gehören. Die Struktur wird dann vollständig entstellt. Durch Zusatz von N₂ von 30 mm Druck zu Hg-Dampf, dessen D. der Temp. von 0° entspricht, wird die Absorption der Linie 2536 ungefähr um das zehnfache verbreitert. Die Unters. der Linie 2536 im Magnetfeld führte zu großen experimentellen Schwierigkeiten. In Emission wird nur die Komponente 1 aufgespalten, während die anderen Komponenten einfach bleiben. In Absorption liegen die Verhältnisse komplizierter. Ihre eingehende Unters. u. Deutung sind einer weiteren Arbeit vorbehalten. (Philos. Magazine [6] **50**. 761—74. 1925.)

STEINER.

R. W. Wood, *Optische Anregung des Quecksilberspektrums mit kontrollierten Bahnübergängen der Elektronen*. Die Arbeit bildet die ausführliche Darstellung einer früheren vorläufigen Mitteilung (Proc. Royal Soc. London, Serie A **106**. 679; C. 1925. I. 1383). Besonders zu erwähnen ist, daß das Licht der die Resonanzstrahlung erregenden Lampe auch durch ein Cl₂-Filter homogen gemacht wurde. Ferner wird der Einfluß eines Magnetfeldes auf die Intensitätsverhältnisse der opt. angeregten Linien eingehender untersucht. Das Anlegen eines Magnetfeldes an die Hg-Lampe verhindert die Selbstumkehr der Linie 2536 u. erhöht damit ihre Absorption im Resonanzgefäß. Die Zahl der Übergänge $1S - 2p_2$ wird also vermehrt. Dies bewirkt nun eine Änderung der Intensitätsverhältnisse der einzelnen Linien in dem opt. angeregten Hg-Dampf. Vf. findet, daß die Intensität von 2356 Å. sich vervierfacht, die der anderen Linien sich verachtfacht; die Intensität von 3650 Å. steigt sogar auf das sechzehnfache. (Philos. Magazine [6] **50**. 774—96. 1925.)

STEINER.

W. Jevons, *Das Bandenspektrum von Zinnmonochlorid unter Darlegung von Isotopieeffekten*. Zu diesen Verss. diente im großen u. ganzen die bereits früher (Proc. Royal Soc. London. Serie A. **106**. 174; C. **1924**. II. 1559) beschriebene Anordnung. Das Spektrum der durch unkondensierte Entladung entstehenden Linien u. Banden wurde mit einem Quarzspektrographen aufgenommen. Es ergab sich, daß es möglich war, die Mehrzahl der Hauptlinien der neuen Zinnchloridbanden in zwei Systeme zu ordnen, die Quantenzahlen der Banden jeden Systems zu bezeichnen, diese mit Bestimmtheit dem *Zinnmonochlorid*, SnCl_2 , zuzuschreiben, den Isotopieeffekt des Chlors u. in wesentlich schwächerem Ausmaße den des Zinns, der viel komplizierter ist, zu erkennen. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. **110**. 365—90. Woolwich, Coll.) HAASE.

Henry G. de Laszlo, *Die Absorptionsspektren und Aktivierungsstufen von Naphthalin und einigen Methylderivaten*. Es werden die Absorptionsspektren des *Naphthalins* u. einiger Methylderiv. untersucht. — Daraus ergibt sich beim Naphthalin, daß man fünf Elektronenzustände des Mol. unterscheiden kann. Diesen verschiedenen Elektronenübergängen entsprechen die Absorption im Ultrarot, im Sichtbaren u. im Ultraviolett, sowie die Emission bei der Kathodenlumineszenz u. Fluoreszenz. Das Naphthalindampfspektrum besteht aus einem Gebiet scharfer Banden mit Feinstruktur (λ 3200—2820 Å) u. aus einem Gebiet kontinuierlicher, strukturloser Banden (λ = 2820 bis 2500 Å). Oberhalb λ = 2820 werden die Banden kontinuierlich u. verschwommen, was einer Veränderung im Mol. entspricht, „Prädissoziationszustand“. Die Intensität der Absorption steigt sehr schnell mit jeder weiteren Anregungsstufe des Mol. In Lsg. sind die Banden im ersten Teil scharf u. schmal, im zweiten breit u. verschwommen. — Die Atomschwingungen im Naphthalinmol. sind durch folgende charakterist. Perioden gegeben: α = 474,4 cm^{-1} , β = 203,4 cm^{-1} , γ = 62,7 cm^{-1} . Die Konstanten α u. β erscheinen wieder in dem ultraroten Absorptionsspektrum, was als Beweis für ihre Richtigkeit gelten kann. Die Hauptfrequenz α beträgt etwa die Hälfte von der des Bzl. — Die Feinstruktur einiger ultravioletter Naphthalindampfbanden kann man in eine Summe dreier Parabeln zerlegen. Das nach der klass. Theorie für symmetr. Kreisel daraus berechnete Trägheitsmoment ist zu klein ($3,45 \cdot 10^{-40}$). Es wird die Hypothese aufgestellt, daß bei solchen Molekeln die Übergänge bei Rotationsanregung mehreren Quanten entsprechen, so daß das Trägheitsmoment ein Vielfaches des obigen Wertes wäre. Es wird auf $96,10^{-40}$ g/qcm geschätzt; daraus wird für das Bragg'sche Naphthalinmodell eine Entfernung der C-Atome voneinander berechnet, die kleiner ist als 1 Å u. kleiner als die von BRAGG angenommene (1,54 Å). Sie ist so klein, daß die äußeren Elektronenbahnen mehrere C-Kerne umkreisen können. — Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den Absorptionsspektren des α - u. β -Methylnaphthalins. Die Spektren der β -Verb. enthalten, wie das des Naphthalins, 2 Teile, von denen der erste stark, der zweite weniger — im Vergleich zu Naphthalin — nach Rot verschoben ist. Für die α -Verb. ist die Verschiebung im ersten Teil schwächer als im zweiten. — Die Hexanlösungsspektren sind gegenüber den Dampfspektren nach Rot verschoben. — Die CH_3 -Gruppe wirkt verschmelzend auf die Struktur des Spektrums. Bei den Dimethylnaphthalinen sind alle Banden des zweiten Teils in eine zusammengefloßen. Beim 2,6- u. 2,7-Dimethylnaphthalin besitzt 2,6 sehr ausgeprägte Banden u. ist darin mit dem p-Xylol vergleichbar. (Ztschr. f. physik. Ch. **118**. 369—414. 1925. Zürich, Univ.)

LASCH.

B. H. Carroll, *Die photochemische Oxydation von Leukobasen*. Die photochem. Oxydation von *leuko-Malachitgrün*, *leuko-Brilliantgrün*, *leuko-Lichtgrün* (Kondensationsprod. von Benzyläthylanilin u. Benzaldehyd) u. *leuko-Furfurolgrün* (Kondensationsprod. von Dimethylanilin u. Furfurol) in Kolloidum ist der Lichtintensität proportional; eine Induktionsperiode tritt nicht auf. Wegen der schnellen Oxydation auch im Dunkeln sind die Leukobasenfilme für photograph. Zwecke nicht geeignet. Zusatz von Säure setzt die Geschwindigkeit der Dunkel- u. der Lichttrk. herab, Zusatz

von Basen, besonders heterocycl. u. aliphat. Amine, z. B. *Chinolin*, erhöht beide in gleichem Maße, Salpetersäureester wie *Hexanitromannit* letztere stärker als erstere. Die Beständigkeit der Leukobasen wächst mit steigendem Mol.-Gew. der an den Amino-N gebundenen Gruppe. Nach dem Trocknen der Filme nimmt die Empfindlichkeit noch eine Zeitlang zu. (Journ. Physical Chem. **30**. 130—33.) KRÜGER.

A. R. Olson und **C. H. Meyers**, *Die Polymerisation und Hydrierung von Äthylen mittels angeregter Quecksilberatome*. Vff. setzen Äthylen u. ein Gemisch von C_2H_4 u. H_2 bei Ggw. von Hg dem Licht einer Quarzquecksilberbogenlampe aus. Bei reinem C_2H_4 trat keine Rk. ein, wenn die Linie 2536 Å im Bogen umgekehrt war, was durch einen Magneten verhindert wurde. Beim Beginn des Vers. nimmt der Druck zu, dann ab. In keinem Falle erreichte der Druck den Wert Null, es tritt also keine vollständige Polymerisation ein. Der Enddruck entspricht ungefähr der Druckzunahme zu Beginn des Vers., die etwa 25% des Anfangsdrucks beträgt. Neben dem irisierenden festen Polymerisationsprod. hatte sich wahrscheinlich C_2H_6 gebildet. Bei der Rk. von C_2H_4 mit H_2 , die ebenfalls nur bei Anwesenheit der Linie 2536 Å stattfand, ist bei allen Drucken der Enddruck gleich dem Anfangsdruck des H_2 . Die Anfangsgeschwindigkeit der Rk. ist proportional der Quadratwurzel aus dem H_2 -Druck. Demnach findet nicht die Rk. $C_2H_4 + H_2 = C_2H_6$ statt, sondern die primäre Rk. ist $Hg^* + H_2 = Hg + 2H + \text{kinet. Energie (* = angeregt)}$. Die Resonanz des Hg-Atoms entspricht 4,9 V, die Dissoziation von H_2 3,1 Volt. Die überschüssige Energie wird zwischen Hg u. H nach dem Momentensatz verteilt. Der atomare H diffundiert aus dem Gebiet, in dem er gebildet wird, u. die Diffusionsgeschwindigkeit bestimmt die Geschwindigkeit der Druckabnahme. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 389—96. Berkeley [Cal.], Univ.) JOS.

W. Krauß, *Einige Beiträge zur Kenntnis des optischen Verhaltens der Tonerdefasern*. Die Doppelbrechung gewachsener Tonerdefasern, die mit Fll. von verschiedenem Brechungsindex n imbibiert werden, hat im weißen Licht bei $n = 1,52—1,54$ ein Minimum; die nach dem Verschwinden der Stäbchendoppelbrechung übrigbleibende Doppelbrechung ist positiv in bezug auf die Wachstumsrichtung der Fasern. Die Restdoppelbrechung ist sehr gering u. nur an dickeren Schichten feststellbar; ihr Vorsprung ist noch ungeklärt, da die Röntgenaufnahme von Fasertonerde auf amorphe Teilchen hinweist. *Wachs, Paraffin, Stearin, Cetylalkohol u. Cholesterin* lassen sich aus ihren Schmelzen, *Cumarin, p-Kresol u. Narcein* durch Krystallisation aus ihren Lsgg. in submk. Krystallen, die durch die Struktur der Tonerdefasern orientiert werden, in die Zwischenräume der Fasern einlagern; Ggw. von Cumarin u. p-Kresol ergibt Erhöhung der Doppelbrechung ohne Änderung des Vorzeichens, die der übrigen Stoffe negative Gesamtdoppelbrechung in bezug auf die Längsrichtung der Tonerdefasern. Die eingelagerten Stoffe ordnen sich demnach mit ihrer Längsrichtung parallel der Wachstumsrichtung der Fasern. Präparate von gewachsener Tonerde + Cetylalkohol, aus denen erstere durch HCl herausgelöst wurde, zeigen positive Doppelbrechung in bezug auf die Längsrichtung. Die Färbungen von Tonerdefasern mit *Kongorot u. Methylenblau* sind dichroit., diejenige mit *Berliner Blau* nicht. Einlagerung von J_2 in die Fasern bewirkt Erhöhung der Doppelbrechung. Beim Behandeln der Präparate von Tonerde + Cetylalkohol bzw. Tonerde + Narcein mit wss. J-Lsg. werden nur die eingelagerten Krystalle gefärbt, ihre opt. Eigenschaften bestimmen den Charakter des auftretenden Dichroismus. Dichroit. Färbungen der Fasern mit *Hg, Ag u. Au* lassen sich nach verschiedenen Methoden herstellen; durch die Färbung mit Ag u. Au findet Herabsetzung der Doppelbrechung statt; der Charakter der durch Hg bewirkten Änderung der Doppelbrechung konnte nicht bestimmt werden. (Kolloidchem. Beihefte **21**. 282—304. Jena, Univ.) KRÜGER.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Heinz Schmidt, *Über die elektrolytische Abscheidung von kohlenstoffhaltigem Eisen aus seinen Komplexverbindungen mit Carbonsäuren*. Die von SONTAG (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 333; C. **1924**. II. 917) ausgeführten Unterss. über die Abscheidung kohlenstoffhaltigen Eisens aus Oxalat, Glykolat u. Succinat werden auch auf Carbonat, Citrat u. Tartrat quantitativ ausgedehnt, für Succinat erweitert u. als neu Formiat u. Acetat in den Bereich der Unterss. gezogen. Die Verss. mit Butyrat mißlingen. Die Bedingungen u. Ergebnisse sind in Tabellen enthalten. Es wurden nur die NH₄-Salze bzw. ihre Komplexe, deren Lsgg. durch Vermischen des Salzes mit der Säure mit Eisensulfat oder -chlorid erhalten werden, in Betracht gezogen. Quantitativ wurde die C-Mitabscheidung folgendermaßen bestimmt: Die komplexen Verbb. wurden der Elektrolyse unterworfen u. in dem auf einer Eisenkathode bekannten C-Gehalts gewonnenen Metall-Nd. durch Verbrennung im O₂-Strom der Gesamtkohlenstoffgehalt bestimmt. Der C im Fe ist hauptsächlich in einer Form vorhanden, die sich durch verd. Säuren unter B. kohlenstoffhaltiger Gase zersetzt. Durch Zersetzungsspannungen konnten keine Red. oder Abscheidung unbekannter Ionen (z. B. ionisierten C) nachgewiesen werden. Es wurden auch keinerlei sonstige Abbauprodd. festgestellt mit Ausnahme der minimalen Red. von Oxalat u. Formiat. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 33—41.)

SITTIG.

S. Glasstone, *Überspannung und Oberflächenkräfte an der Bleikathode*. (Vgl. Trans. Faraday Soc. **19**. 808; C. **1924**. II. 1444.) Vf. untersucht den Einfluß der *Oberflächenspannung* des Elektrolyten auf die *Überspannung* einer Pb-Kathode, indem die Oberflächenspannung durch Zusatz bathoton. Substanzen, wie A., Methylalkohol, Essigsäure, i-Buttersäure, i-Butylalkohol u. i-Amylalkohol, variiert wurde. Drei Typen von Elektrolyten dienten zur Unters. 1. H₂SO₄-Lsgg., die etwa 1 g-Äquivalent pro l enthielten; 2. Pufferlsg., in denen pH von 3—11 variiert wurde, u. 3. NaOH-Lsgg., die 1 g-Äquivalent pro l enthielten. Es wurde gefunden, daß Zusatz von A., Methylalkohol oder Essigsäure zu wss. Lsgg. mit verschiedener [H⁺] nicht nur die Oberflächenspannung sondern auch die Überspannung erniedrigt. Substanzen, welche in W. wenig l. sind u. die Oberflächenspannung erniedrigen, wie i-Buttersäure u. i-Amylalkohol, bewirken anfangs ein Zunehmen der Überspannung der Pb-Kathode, bei Zusatz größerer Mengen tritt dann wieder ein Abfall der Überspannung ein. Zur vollständigen Theorie der Überspannung müssen auch die Oberflächenkräfte, die an der Blasenbildung beteiligt sind, mit herangezogen werden. (Trans. Faraday Soc. **21**. 36—41. 1925. Exeter, Univ. Coll.)

JOSEPHY.

David Stockdale, *Die Allotropie des Zinks*. Tauchen 2 Elektroden desselben Metalles von konstanter Temperaturdifferenz in einen geeigneten Elektrolyten, so erfährt die EK. bei Temperatursteigerung eine plötzliche Änderung, wenn bei einer der beiden Elektroden isotope Umwandlung eintritt. Vf. versucht dieses Prinzip zur Bestätigung des von BINGHAM (Journ. Inst. Metals **24**. 333; C. **1921**. I. 348) gefundenen Umwandlungspunktes des Zn zu verwenden. Die Elektroden befanden sich in den Schenkeln eines elektr. heizbaren U-Rohres, als Elektrolyt diente ein Gemisch von ZnCl₂, Zn-Oxychlorid u. 10% ZnBr₂. Wegen apparativer Schwierigkeiten waren die Messungen nicht besonders zuverlässig, machen aber die Existenz eines Umwandlungspunktes bei ca. 315° wahrscheinlich. (Journ. Americ. Chem. Soc. **127**. 2951—56. 1925. Cambridge, Univ.)

KRÜGER.

Alfred Francis Joseph und Henry Bowen Oakley, *Die Wirkung von Kieselsäure auf Elektrolyte*. II. (I. vgl. JOSEPH u. HANCOCK, Journ. Chem. Soc. London **123**. 2022. 1923; C. **1924**. I. 1646.) Vff. ermitteln in Wasserglaslsgg. mit verschiedenen Zusätzen von HCl bzw. NaOH die [OH⁻] durch pH-Messung u. finden die Na-Silicatkonz. als Differenz aus [Gesamt-Na] u. [NaCl] bzw. [OH⁻]. Wird das durch SiO₂

neutralisierte Na_2O gegen die pH aufgetragen, so entsteht eine Kurve mit einem deutlichen Knick bei $\text{Na}_2\text{O} : \text{SiO}_2 = 2 : 1$; für die 1. Dissoziationskonstante der Kieselsäure ergibt sich ca. 10^{-10} , für die 2. ca. 10^{-12} . Bei Behandlung von SiO_2 mit Lsgg. von NaOH , KOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$ u. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ mit SiO_2 tritt sofort Neutralisation der Base ein, indem zunächst an der SiO_2 -Oberfläche festes Silicat gebildet wird, das dann unter teilweiser Hydrolyse in Lsg. geht; der Umfang der Rk. hängt von der Art u. Konz. der Base, der Menge u. Feinheit des SiO_2 u. der Löslichkeit des betreffenden Silicates ab. Bei NaOH u. KOH ist die B. von festem Silicat sehr gering u. annähernd proportional der SiO_2 -Menge, Ba-Silicat geht dagegen nur zu 50%, Ca-Silicat gar nicht in Lsg. NaCl -Zusatz erhöht die Menge von festem Silicat. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2813—18. 1925. Chartum, Wellcome Tropical Research Lab.) KRÜGER.

James Colvin, *Das Ionenaktivitätsprodukt von Wasser in Glycerin-Wasser-Gemischen*. Die Aktivitäten von H^+ u. OH^- in $1/100$ -n. NaOH -Lsgg. mit verschiedenem Glycerin-gehalt bis 40% werden bei 25° mit Hilfe der EKK. der Ketten $(\text{Pt}) | \text{H}_2, 1/100\text{-n. NaOH, Glycerin} | \text{gesätt. KCl} | \text{n. KCl, Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Hg u. Hg} | \text{HgO, } 1/100\text{-n. NaOH, Glycerin} | \text{gesätt. KCl} | \text{n. KCl, Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Hg}$ bestimmt u. daraus das Ionenaktivitätsprod. von W. in den Gemischen berechnet; für die EK. der Kette $\text{Hg} | \text{HgO, } 1/10\text{-n. KOH} | \text{gesätt. KCl} | \text{n. KCl, Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Hg}$ bei 25° ergibt sich 0,1178 Volt. Mit steigendem Glycerin-gehalt sinkt die Aktivität der OH^- u. wächst die Aktivität der H^+ , Dissoziationskonstante u. Ionenaktivitätsprod. des W. bleiben konstant. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2788—92. 1925. Liverpool, Univ.) KRÜGER.

Herbert S. Harned, *Der Aktivitätskoeffizient von Chlorwasserstoffsäure in konzentrierten Lösungen starker Elektrolyte*. Die EKK. von Zellen vom Typus $\text{H}_2 | \text{HCl} (m_1), \text{MCl} (m_2) | \text{HgCl} | \text{Hg}$ wurden bei konstantem $(m_1 + m_2)$ gemessen. Die Reproduzierbarkeit der Resultate ist abhängig von der Herst. der H-Elektroden. Um genaue u. reproduzierbare Werte zu erhalten, mußte die Elektrode sofort nach dem Platinieren u. Waschen mit dest. W. in die H-Atmosphäre der Zelle gebracht werden. Die Elektrode mußte mit einer dünnen Schicht von Pt-Schwarz bedeckt sein, was durch Elektrolyse einer Lsg. von H_2PtCl_6 (mit 0,5 g Pt in 100 cem Lsg.) in einer Min. mit einer Stromdichte von 0,3 Amp. pro qcm Kathodenoberfläche erzielt wurde. Mit dickeren Schichten Pt-Schwarz wurden weniger gute Resultate erhalten, insofern sind auch die früheren Unterss. des Vf. nicht genau genug (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1808; C. 1921. I. 719. HARNED u. BRUMBAUGH, Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2729; C. 1923. I. 806). Als Elektrolyte dienten KCl , NaCl , LiCl . Die meisten Messungen sind innerhalb $\pm 0,2$ mV genau, bei einigen beträgt die Fehlergrenze $\pm 0,5$ mV, was einem Fehler von 1% beim Aktivitätskoeffizienten entspricht. Die Messungen ergeben, daß sich der log des Aktivitätskoeffizienten von HCl bei konstanter Gesamtkonz. bis zu $m_1 + m_2 = 3$ -mol. linear mit der Säurekonz. ändert. Das besagt, daß in einem Gemisch bei gegebener Gesamtkonz. der log des Aktivitätskoeffizienten eines ein-einwertigen Elektrolyten eine lineare Funktion seiner Konz. ist. Für hohe Konz. ist dieses nur ein Näherungssatz, der für niedrige Konz. genau ist. — Die Ergebnisse des Vf., sowie die von BRÖNSTED u. LA MER in sehr verd. wss. Lsgg. u. die von NOYES u. BAXTER in verd. nicht-wss. Lsgg. u. die Berechnungen von SCATCHARD für konz. Lsgg. in nicht-wss. Lösungsm. liefern eine überraschend genaue Bestätigung der Theorie von DEBYE u. HÜCKEL. Vf. zeigt ferner, wie mit Hilfe dieser Theorie umgekehrt auch die Aktivitätskoeffizienten der Salze aus dem Gemisch berechnet werden können. Die Rechnung wird sowohl an den ein-einwertigen Elektrolyten NaCl , KCl , LiCl als auch an den zwei-einwertigen Salzen BaCl_2 , SrCl_2 u. CaCl_2 u. an HCl im Gemisch mit den Erdalkalichloriden durchgeführt. Rechnung u. Beobachtung (vgl. LUCASSE, Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 743; C. 1925. I. 1293) stimmen ausgezeichnet überein. — Auf Lsgg. von Alkalihydroxyden kann die Theorie von DEBYE u. HÜCKEL allerdings nicht ohne Einführung eines neuen Faktors

angewandt werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 326—42. Philadelphia [Penns.], Univ.) JOSEPHY.

Thomas Kerfoot Brownson und **Frank Maurice Cray**, *Die elektrische Leitfähigkeit von Chlorwasserstoff und Chlorkalium in Wasser und Aceton-Wassergemischen*. Die Leitfähigkeit von HCl u. KCl in Aceton-Wassergemischen mit 5—100% W. bei Verd. von 10 bezw. 50—10000 l pro Mol wird bei 20° u. 25 gemessen u. die Äquivalentleitfähigkeit λ_∞ nach der Methode von WASHBURN (Journ. Americ. Chem. Soc. **40**. 122; C. **1918**. I. 1118) berechnet. Katalyt. Zers. des Acetons durch das Pt-Schwarz der Elektrode findet nicht statt. λ_∞ von HCl ist in Gemischen von hohem Acetongehalt nur wenig verschieden von derjenigen von KCl , sie nimmt bis zu einem Minimum bei 85 Vol.-% Aceton ab u. dann wieder etwas zu. λ_∞ von KCl hat ein Minimum bei 40 Vol.-% W.; bei kleineren Verd. v rückt das Minimum nach höherem Acetongehalten u. fehlt für $v \equiv 100$ ganz. Der Einfluß der Temp. auf den Dissoziationsgrad steigt mit Acetongehalt u. Elektrolytkonz. Das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz gilt nicht, doch sind in den acetonreichen Gemischen die Abweichungen nur gering. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2923—35. 1925. Woolwich, Roy. Arsenal.) KRÜGER.

T. E. Phipps, **W. D. Lansing** und **T. G. Cooke**, *Temperatur-Leitfähigkeitskurven fester Salze. I. Die Halogenide von Natrium*. Die elektr. Leitfähigkeit der festen Na-Halogenide wurde über ein großes Temp.-Intervall gemessen. Die pulverisierten Krystalle wurden unter starkem Druck zu semitransparenten Platten gepreßt. Beim NaCl stimmte die Leitfähigkeit solcher Platten sehr gut mit der von natürlichen Krystallen überein. Für NaCl , NaBr , NaJ u. NaF wird die Temp.-Abhängigkeit der spezif. Leitfähigkeit κ durch Kurven mit $1/T \times 10^5$ als Abscisse u. $\log \kappa$ als Ordinate veranschaulicht. Diese Kurven setzen sich aus Geradenstücken zusammen, die bei verschiedenen Temp.-Punkten ihre Richtung ändern. Es wird angenommen, daß in dem niederen Temp.-Gebiet (zwischen Zimmertemp. u. ca. 400°) nur das Na-Ion den Strom leitet, daß aber bei höheren Tempp. beide Ionen gleichzeitig leiten. Beim NaF mit dem hohen F. bei 992° deutet die Leitfähigkeitskurve darauf hin, daß sich das F-Ion unterhalb 800° nicht an der Stromleitung beteiligt. Beim NaJ u. NaF findet bei Tempp., die noch weit unter dem F. dieser Salze liegen, ein abnormes Anwachsen der Leitfähigkeit statt, was bei NaCl u. NaBr nicht beobachtet wurde. — Vff. stellen eine Beziehung auf zwischen der Richtung der Leitfähigkeitskurve u. der Herauslösearbeit eines Ions aus dem Gitter u. berechnen die Werte für diese Arbeit. Es wurde gefunden, daß diese Arbeit in nahem Zusammenhang steht mit dem natürlichen Quant des Krystalls, das sich aus den spezif. Wärmedaten ergibt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 112—25. Urbana [Ill.], Univ.) JOSEPHY.

Herbert S. Harned und **Frank Evans Swindells**, *Der Aktivitätskoeffizient von Lithiumhydroxyd in Wasser und in wässrigen Lithiumchloridlösungen und die Dissoziation von Wasser in Lithiumchloridlösungen*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 676. 930; C. **1925**. I. 2293. II. 142). Vff. messen die EKK. der Ketten: $\text{H}_2 | \text{LiOH}(m_2) | \text{Li}_x\text{Hg} || \text{LiOH}(m_1) | \text{H}_2$; $\text{H}_2 | \text{LiOH}(m_0), \text{LiCl}(m) | \text{Li}_x\text{Hg} | \text{LiOH}(m_0) | \text{H}_2$; $\text{H}_2 | \text{HCl}(m_0), \text{LiCl}(m) | \text{AgCl} | \text{Ag}$ u. berechnen daraus die Aktivitätskoeffizienten von LiOH in W. u. in wss. LiCl -Lsgg. verschiedener Konz. Die Daten sind tabellar. zusammengestellt. Ein Vergleich der Aktivitätskoeffizientenkurven (Abscisse: Konz.) von LiOH , KOH , NaOH lehrt, daß bei einer gegebenen Konz. die Aktivitätskoeffizienten in der Reihenfolge Li, Na, K zunehmen, während für die Chloride die entgegengesetzte Beziehung gilt. — Die Berechnung des Ionenaktivitätskoeffizienten u. der Ionenkonz. von W. in LiCl -Lsgg. zeigt, daß bei höheren Konz. (oberhalb 0,03 mol.) LiCl eine viel stärkere Dissoziation des W. bewirkt als NaCl u. KCl . Bei einer Konz. von 1,0-mol. LiCl -Lsg. ist die Dissoziation des W. am größten. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 126—35. Philadelphia [Penns.], Univ.) JOSEPHY.

Michiharu Mizutani, *Die Dissoziation der schwachen Elektrolyte in wässrig-alkoholischen Lösungen*. III. u. IV. Mitt. (II. vgl. S. 26.) III. *Die Beziehungen zwischen chemischer Konstitution und Alkoholempfindlichkeit der zweibasischen Säuren in Äthylalkohol*. Es werden die Messungen der im Sinne des Vf. reduzierten Dissoziationskonstanten für wss.-alkoh. Lsgg. auf die zweibas. Säuren ausgedehnt. Das p_H , welches in einer Lsg. von 0,02 Mol/l der betreffenden Säure mit 0,01 Mol NaOH bzw. mit 0,03 Mol NaOH in der wss.-alkoh. Lsg. gemessen wird, wird als erste, bzw. zweite logarithm. Dissoziationskonstante bezeichnet. $K = [H^+][\text{Säure-Ionen}]/[\text{undissoz. Säure}]$. Bei stärkeren Säuren lautet die Formel $K = [H^+][\text{Na-Salz}] + [H^+]/([\text{freie Säure}] - [H^+])$. Es wurden untersucht: *Oxalsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Äpfelsäure, Fumarsäure, Maleinsäure u. o-Phthalsäure*. Das Ergebnis der Messungen war folgendes: Befinden sich beide Carboxylgruppen räumlich weit voneinander, so behalten sie angenähert ihre Selbständigkeit. Die A.-Empfindlichkeit beider Konstanten ist ziemlich dieselbe, u. zwar dieselbe wie die der zugehörigen einbas. Säuren. Je näher beide Carboxylgruppen sich innerhalb des Mol. befinden, um so stärker sind die Abweichungen von dieser Regel, u. zwar wird in diesem Falle die erste Konstante weniger, die zweite stärker A.-empfindlich als für die entsprechenden einbas. Säuren zu erwarten wäre. — Als Ergänzung der vorigen Mitt. werden noch die einbas. Säuren *Glykolsäure u. Chloressigsäure* untersucht. Der Unterschied der beiden ist in demselben Sinne wie der von *Milchsäure u. Propionsäure*. Die A.-Empfindlichkeit wird durch die Hydroxylgruppe bzw. Einführung von Cl nur wenig verringert. Die absol. Größe der Konstante steht in keiner erkennbaren Beziehung zu ihrer A.-Empfindlichkeit. — Zum Vergleich wurden noch *Phenol, Resorcin u. p-Chlorphenol* untersucht. Die Unterschiede in der A.-Empfindlichkeit zwischen Phenol u. Resorcin sind nicht groß. Der Einfluß des Cl ist aber deutlich u. in demselben Sinne wie bei der Essigsäure.

IV. *Die Dissoziation der schwachen Elektrolyte in Methylalkohol*. Die Vers.-Anordnung war dieselbe wie für Äthylalkohol. Von einbas. Säuren wurden untersucht: *Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, i-Valeriansäure, Milchsäure, Glykolsäure, Salicylsäure, Benzoesäure, Monochloressigsäure*. Ferner *Phenol, Resorcin, p-Chlorphenol*. Das allgemeine Resultat ist, daß der Einfluß des Methylalkohols dem Sinne nach gleich ist dem des A., nur kleiner. Ebenso ändert sich der Einfluß der Einführung von OH-Gruppen u. Cl in demselben Sinne, aber geringer als bei A. Nur die Alkoholempfindlichkeit der Phenole ist in A. besonders stark, in Methylalkohol schwach. Von zweibas. Säuren wurden untersucht: *Malonsäure, Bernsteinsäure, o-Phthalsäure, Äpfelsäure, Fumarsäure, Maleinsäure*. Auch hier ist der Einfluß des Methylalkohols überall etwas kleiner als der des A., die Wrkg. aber sehr ähnlich. Es wurden noch folgende Basen untersucht: *NH₃, Methylamin, Dimethylamin, Trimethylamin, Äthylamin, Anilin, Methylanilin, Dimethylanilin, Pyridin u. o-Toluidin*. Wie bei A. ist die Steilheit der Kurven viel geringer als für die Säuren. Bei den alkylierten Aminen u. Anilinen wird der Unterschied der Wrkg. von Methylalkohol u. A. deutlicher mit dem Grad der Alkylierung. — Im allgemeinen ist die Wrkg. des Alkoholgehalts der Lsg. auf verschiedene Säuren gleichförmig. Durch einen bestimmten Alkoholgehalt wird die „reduzierte Dissoziationskonstante“ für alle Säuren um etwa denselben Betrag verkleinert, was besagt, daß der Aktivitätsfaktor der undissoziierten Molekeln stärker verkleinert wird als der der Ionen. Das ist nur eine andere Ausdrucksweise dafür, daß im allgemeinen die freien Säuren in Alkohol leichter l. sind als in W., ihre Alkalisalze aber nicht. Entsprechend ist es für die Basen u. ihre Chlorhydrate der Fall. (Ztschr. f. physik. Ch. **118**: 318—26. 327—41. 1925. Nagoya, Japan, Biochem. Inst. d. Aichi-Medizin. Univ.)

LASCH.

Paul Collet, *Über den konstanten Paramagnetismus der Lösungen*. (Vgl. WEISS u. COLLET, C. r. d. l'Acad. des sciences **178**: 2146; C. **1924**. II. 810). Die temperaturunabhängige (14—50°) paramagnet. Suszeptibilität des gel. $K_2Cr_2O_7$ führt zur

atomaren Suszeptibilität χ von Cr gleich $63,3 \cdot 10^{-6}$. Die letztere fällt mit der χ von Cr in festem $K_2Cr_2O_7$ (12—90°) zusammen. χ von Co in gel. Luteokobaltichlorid ergibt sich zu $14,4 \cdot 10^{-6}$, gleichfalls temperaturunabhängig (14—50°). (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1057—58. 1925.) BIKERMAN.

W. J. de Haas, G. J. Sizoo und H. Kamerlingh Onnes, *Über die magnetische Störung der Supraleitung bei Quecksilber*. II. (I. vgl. S. 1945.) Vff. setzen ihr Verss. fort ausgehend von der Annahme, daß der Charakter der Hysteresisschleife durch den Krystallisationszustand der kleinen Widerstände bestimmt wird. Es wird hierbei die Vorstellung entwickelt, daß infolge der langsamen Abkühlung in der Capillaren Einkrystalldrahtstückchen entstehen, u. daß das Auftreten eines Sprunges die Folge des plötzlichen Supraleitendwerdens eines solchen Krystalles ist. In Zusammenfassung ergibt sich, daß, falls man einen Supraleiter in einem von Anfang an genügend starken Magnetfeld mißt, die Widerstandskurve eines Supraleiters als Funktion der Temp. keine Anomalien zeigt. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **34**. 1321—34. 1925.) K. WOLF.

P. Laffitte, *Experimentelle Untersuchungen über die Explosions- und Stoßwelle*. Zusammenfassung der bereits referierten Arbeiten (C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 1392. **177**. 178. **178**. 1277. 2176. **179**. 1394; C. **1923**. III. 1200. 1381. **1924**. II. 1303. 1557. **1925**. I. 1350) des Vfs. über die Bildung u. Fortpflanzung der Explosions- u. Stoßwelle u. die Spektrographie der Explosionen. (Ann. de Physique [10] **4**. 587 bis 694. 1925.) KAST.

Eugen Ryschkewitsch und Friedrich Merck, *Bestimmung des Schmelzpunktes von Graphitkohlenstoff*. Vff. verbesserten das von FAJANS u. RYSCHKEWITSCH (Naturwissenschaften **12**. 304; Ztschr. f. Elektrochem. **31**. 54. 63; C. **1924**. II. 293. **1925**. II. 387) angewendete Verf. in Anlehnung an die Arbeit von ALTERTHUM, FEHSE u. PIRANI (S. 1513). Es wird als Schmelztemp. $3845^\circ \pm 45$ angegeben. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 42—45.) SITTIG.

W. Swietoslawski, *Bemerkungen zu der Arbeit der Herren W. Jaeger und H. v. Steinwehr: Über die Festsetzung der Verbrennungswärmen von Normalsubstanzen*. JAEGER u. VON STEINWEHR (Ztschr. f. physik. Ch. **114**. 59; C. **1925**. I. 992) wundern sich, daß nur der Wert von DICKINSON für Benzoesäure von der Union „Internationale“ de la Chimie pure et appliquée als Eichwert angenommen ist, während der auf Eichung der P. T. R. basierte von E. FISCHER-WREDE nur um 1‰ von dem neueren abweicht. Vf. bespricht die weiteren, modernen Messungen an Benzoesäure, Naphthalin u. Rohrzucker (SWIETOSLAWSKI u. POPOW, Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **46**. 935; C. **1915**. I. 943; SWIETOSLAWSKI, Journ. Americ. Chem. Soc. **39**. 2595; C. **1918**. II. 597; SWIETOSLAWSKI u. STARCZEWSKA, Bull. Soc. Chim. de France [4] **31**. 654; C. **1925**. I. 187). Die Werte des Vfs. sind mit denen von DICKINSON so gut wie ident., aber anders als die von FISCHER-WREDE. Seine Zahlen stimmen ferner mit denen von VERKADE, COOPS u. HARTMANN (Rec. trav. chim. Pays-Bas **41**. 241; C. **1922**. IV. 187) überein. Daraus geht unzweifelhaft hervor, daß die damalige Eichung der P. T. R. zu einem um 3‰ zu hohen Wert geführt hat, außerdem war die Benzoesäure von FISCHER-WREDE nicht ganz rein und besaß eine um 2‰ zu niedrige Verbrennungswärme; hier heben sich die Fehler bis auf 1‰ heraus, bei Naphthalin u. Rohrzucker bleiben 3‰ Differenz. — Die Eichmethode der P. T. R. war nicht prakt., da die Unbekannte (der Wasserwert der Metallteile) nur $\frac{1}{12}$ des gesamten Wasserwertes ausmachte. Die Messungen sollten mit weniger Wasser, aber dem gleichen Zubehör wiederholt werden. (Journ. de Chim. physique **22**. 583—88. 1925.) W. A. ROTH.

L. I. Dana und H. Kamerlingh Onnes, *Weitere Versuche mit flüssigem Helium BA. Vorläufige Bestimmungen der latenten Verdampfungswärme von flüssigem Helium*. Vff. beschreiben an Hand einer Skizze das benutzte Calorimeter. Die graph. Darst. der Meßergebnisse führt zu einer Kurve, die die Verdampfungswärme

als Funktion der Temp. darstellt u. in der Nähe von 3° K. ein Maximum aufweist, bei niedrigeren Temp. wieder abnimmt. Vff. diskutieren die Arbeit von VER-SCHAFFELT (Archives néerland. sc. exact. et nat. [III. A.] 8. 109; C. 1925. I. 625), dessen Berechnungen für die Verdampfungswärme von He (fest oder fl.) bei $T = 0$ ca. 3,50 Cal. ergaben, während in der Nähe des absol. Nullpunktes die Verdampfungswärme sich mit der Temp. gemäß der Formel: $L = 3,5 + 1,25 T$ ändert. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1335—39. 1925.) K. W.

L. I. Dana und **H. Kamerlingh Onnes**, *Weitere Versuche mit flüssigem Helium BB. Vorläufige Bestimmungen der spezifischen Wärme der Flüssigkeit von flüssigem Helium.* (Vgl. vorst. Ref.) Die angewandte Methode bestand darin, daß durch elektr. Widerstandserhöhung eine bestimmte Wärmemenge einer bestimmten Menge He zugeführt u. die hervorgerufene Temp.-Erhöhung aus der Erhöhung der Dampfspannung abgeleitet wurde. Skizze des Calorimeters im Original. Drei Versuchsreihen zwischen 2,4° u. 4° K. lieferten ziemlich gut übereinstimmende Werte. Zwischen 2,5° u. 4° K. ergibt sich $c_{sat} = 0,222 T$. Vff. setzen für dieses Temperaturgebiet $C_{sat} = C_p$. Es zeigte sich, daß bei He u. H eine ähnliche Entartung stattfindet, u. zwar ist die Entartung als Funktion der reduzierten Temp. für $He > H$. Als Maß für eine Entartung der Fl. wird bei einem einatomigen verflüssigten Gas das prozent. Defizit der spezif. Wärme C_v mit Bezug auf das Gesetz von DULONG u. PETIT betrachtet. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1340—44. 1925.) K. WOLF.

C. H. M. Jenkins, *Die Bestimmung der Dampftensionen des Quecksilbers, Cadmiums und Zinks durch eine modifizierte manometrische Methode.* Die Best. des Dampfdruckes von reinen Metallen oder Legierungen erfolgt in einem elektr. Widerstandssofen. Die zu untersuchende Metallprobe wird in ein V-förmiges, etwa 1,6 cm weites Rohr gefüllt, durch dessen einen verschmolzenen Schenkel ein Thermoelement hindurchgeführt ist. Die Messung erfolgt durch Drehung des V-förmigen Rohres, welches das geschmolzene Metall enthält, u. Erniedrigung des äußeren Druckes bis das Metall in beiden Schenkeln gleich hoch steht. Die Ablesung dieses Druckes ergibt den über der Schmelze befindlichen Druck. 3 Tabellen geben die bei Hg, Cd, Zn erhaltenen Ergebnisse. (Proc. Royal Soc. London. Serie A 110. 456—63. National Physical. Lab.) HAA.

John Smeath Thomas und **William Francis Barker**, *Die Partialdrucke von Wasserdampf und Schwefelsäuredampf über konzentrierten Lösungen von Schwefelsäure bei hohen Temperaturen.* Die Partialdrucke $p_{H_2SO_4}$ u. p_{H_2O} von H_2SO_4 u. Wasser über 89—99%ig. H_2SO_4 bei 180—300° werden nach der dynam. Methode bestimmt. Die in der Literatur angegebenen Werte von $p_{H_2SO_4}$ sind sämtlich zu hoch. Die Abhängigkeit der Partialdrucke von der Temp. kann durch die Rankinesche Gleichung $\log p = \alpha - \beta/\tau - \gamma \cdot \log \tau$ (α , β u. $\gamma =$ Konstante) dargestellt werden; die Abhängigkeit von der Konz. entspricht qualitativ dem Ausdruck von DUHEM-MARGULES $d \log p_{H_2SO_4} / d \log M = d \log p_{H_2O} / d \log (1 - M)$ ($M =$ molarer Anteil an H_2SO_4 in dem fl. Gemisch), die quantitative Übereinstimmung ist, wahrscheinlich wegen Dissoziation des H_2SO_4 -Dampfes, nicht gut. Die $p_{H_2SO_4}$ - u. p_{H_2O} -Isothermen ändern bei 98,2% H_2SO_4 (also etwa bei der Zus. des konstant-sd. Gemisches) die Richtung, die Isotherme des Gesamtdruckes P hat hier ein Minimum. Die durch Extrapolation der P -Kurven auf 760 mm zu erhaltenen Kpp. der Lsgg. stimmen mit den allgemein angenommenen Werten nur überein, wenn vollständige Dissoziation des H_2SO_4 -Dampfes vorausgesetzt wird. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2820—31. 1925. Cape, Town, Univ.) KRÜGER.

F. E. C. Scheffer und **M. Voogd**, *Die Dampfdrucke des Broms.* Es wurden die Dampfdrucke des Broms in 2 Apparaten, von denen der eine bis 3 at u. der andere über 3 at anwendbar war, bestimmt. Die krit. Temp. liegt bei 311° u. 102 at. Der Kp. ergibt sich bei 760 mm zu 58,4° u. der F. zu -7,6° bei 43,1 mm Dampfdruck.

Die molekulare *Verdampfungswärme* wurde bei der Siedetemp. zu 7,27 Cal. bestimmt. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **45**. 214—23. Delft, Techn. Hochschule.) ENSZLIN.

E. R. Rushton und **Farrington Daniels**, *Der Dampfdruck von Arsen trioxyd*. Vff. messen den *Dampfdruck* von festem octaedr. u. fl. As_2O_3 bei hohen Temp. bis zu ca. 500°, um daraus Kenntnis von den verschiedenen allotropen Formen des As_2O_3 zu erlangen. Die Messungen wurden mittels eines Diaphragmas nach GIBSON (vgl. Proc. Royal Soc. London **23**. 1 [1912]) ausgeführt. Für fl. As_2O_3 ergibt sich die Dampfdruckgleichung: $\log P = -(2722/T) + 6,513$, die oberhalb von 315° gilt, sie ist auch bis zu 275° abwärts anwendbar für As_2O_3 , das zuvor von Temp. oberhalb 315° abgekühlt worden ist. Die Dampfdruckgleichung des octaedr. As_2O_3 ist $\log P = -(6670/T) + 13,728$. Die octaedr. Form ist instabil, aber die Umwandlung geht so langsam vor sich, daß die Gleichung für gewöhnliches festes (octaedr.) As_2O_3 bis zu 250° u. darüber gilt, was von dem Maß des Erhitzens abhängt. Beim Erhitzen hat As_2O_3 etwas unter 315° einen unbestimmten Dampfdruck, der von der Umwandlungsgeschwindigkeit in die beständigere monokline Form abhängt. Die beiden allotropen Modifikationen scheinen feste Lsgg. miteinander zu bilden. Bei Abkühlungs- u. Erhitzungskurven konnte mittels Thermoelement in der Krystallmasse keine Umwandlung festgestellt werden, sie vollzieht sich für diese Methode wahrscheinlich zu langsam. — Der *F.* von octaedr. As_2O_3 liegt bei 275°, der von monoklinem ungefähr bei 315°. Nach der Clausius-Clapeyronschen Gleichung werden die *Verdampfungswärmen* zu 31,5 für fl. As_2O_3 , 77,1 für octaedr. u. 71 cal/g für monoklines As_2O_3 berechnet. Daraus ergeben sich die folgenden *Schmelz-* bzw. *Umwandlungswärmen*: octaedr. $\rightarrow$ fl. 45,6; monoklin $\rightarrow$ fl. 39; octaedr. $\rightarrow$ monoklin 6. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 384—89. Madison [Wisc.], Univ.) JOSEPHY.

Fritz Born, *Die Messungen des Dampfdruckes von Kohlenstoff*. Die Arbeit ist eine Zusammenstellung aller bisher vorliegenden Arbeiten u. Meßmethoden des Kohlenstoffdampfdruckes. Die Ergebnisse werden verglichen u. krit. besprochen. Die zahlreichen Literaturstellen siehe im Original. (Ztschr. f. techn. Physik **7**. 24—31.) SITIG.

Hilyard John Eglinton Dobson, *Die Partialdrucke von wässrigem Äthylalkohol*. Vf. bestimmt die Partialdrucke von *W.* u. *A.* in Gemischen bis 90% *A.* bei 25° nach der dynam. Methode. Die Ergebnisse weichen von den Angaben von FOOTE u. SCHOLDS (Journ. Americ. Chem. Soc. **33**. 1309; C. **1911**. II. 1405) z. T. wesentlich ab. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2866—73. 1925. Durham, Univ.) KRÜGER.

Wilfrid Ledbury und **Ethelbert William Blair**, *Die Partialdrucke des Formaldehyddampfes über wässrigen Lösungen von Formaldehyd*. II. (I. vgl. LEDBURY u. BLAIR, Journ. Chem. Soc. London **127**. 26; C. **1925**. I. 2149.) Im Anschluß an die früheren Messungen bei 0 u. 20° werden die Partialdrucke *p* von Formaldehyd über seinen wss. Lsgg. bei 35 u. 45° bestimmt u. der Einfluß von Methylalkohol-Zusatz weiter untersucht. Bei 35° stellen sich die Gleichgewichte $n\text{-CH}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{CH}_2\text{O})_n$ viel schneller ein, als bei tieferen Temp., bei 45° oder bei Ggw. geringer Mengen CH_3OH ($\text{CH}_3\text{OH}/\text{CH}_2\text{O} = 0,13$) prakt. sofort. Wegen zunehmendem Gehalt an Polymerisationsprodd. ist die Differenz zwischen den Partialdrucken in den konzentrierteren Lsgg. bei gegebener Temp. weniger ausgesprochen als in den verdünnteren Lsgg. Die Abhängigkeit von der Temp. wird durch den Ausdruck $\log p = \alpha - B/\tau$ wiedergegeben, worin α je nach der Konz. 9,5—9,9 u. *B* bis zu 40% CH_2O ca. 2905 beträgt. In 15%_{ig}. Lsgg. von Formaldehyd in konz. bzw. in 60%_{ig}. Methylalkohol hat *p* bei 20° den 5- bzw. 3-fachen Wert, als in den entsprechenden wss. Lsgg. Die Erhöhung des CH_2O -Partialdrucks durch geringe CH_3OH -Mengen u. die Tatsache, daß Ggw. von CH_3OH der Abscheidung von Paraformaldehyd in Formalinlsgg. entgegenwirkt, läßt schließen, daß CH_3OH das Gleichgewicht zwischen monomolekularem Formaldehyd u. seinen Polymerisationsprodd. zugunsten des ersteren verschiebt. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2832—39. 1925. Holton Heath, Roy. Naval Cordite Factory.) KRÜGER.

J. H. Perry und **Frank Porter**, *Die Dampfdrucke von festem und flüssigem Cyanwasserstoff*. (Vgl. S. 846.) Vff. messen den Dampfdruck von festem Cyanwasserstoff von $-30,4^{\circ}$ bis zum Tripelpunkt u. von fl. HCN vom Tripelpunkt bis zu $+27,32^{\circ}$. Die Daten sind tabellar. zusammengestellt, aus ihnen ergibt sich für den festen HCN die Dampfdruckgleichung

$$\log_{10} P_{(\text{mm})} = 9,33902 - (1864,8/T),$$

$$\log_{10} P_{(\text{mm})} = 7,744603 - (1453,063/T).$$

Der F. für fl. HCN wird zu $-14,86^{\circ}$ bei einem Dampfdruck von 131,16 mm berechnet. Der n. Kp. ist $+25,65^{\circ}$. Mit Hilfe der Clapeyronschen Gleichung wird die latente Sublimationswärme zu 316,13 cal/g, die latente Schmelzwärme zu 69,29 cal/g u. die latente Verdampfungswärme zu 246,84 cal/g berechnet. Diese Werte werden mit denen von HARA u. SHINOZAKI (Journ. Chem. Ind. [Japan] **26**. 884) verglichen, deren Dampfdruckwerte etwas niedriger als die der Vff. angegeben sind. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 299—302. Washington [D. C.], Bureau of Mines.) JOSEPHY.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

W. Reinders, *Die elektrische Ladung kolloider Teilchen*. Hinweis auf die Differenz zwischen dem kinet. (tangential) u. elektromotor. (transversal) gemessenen Potentialsprünge an der Grenzfläche eines dispersen Teilchens u. des Dispersionsmittels. An Stelle der klass. Vorstellung von HELMHOLTZ muß eine diffuse Ionenschicht nach GOUY u. eine freie Ladung der kolloiden Teilchen angenommen werden. Dabei ergibt sich das Bedürfnis, statt des Potentialsprunges an der Phasengrenze die elektr. Ladung der Teilchen zu ermitteln. Bei Ionen von schweren Metallen wie Ag trifft die Formel von STOKES zu. Bei kolloiden Teilchen wirkt der Hof entgegengesetzt geladener Ionen hemmend auf die Bewegung der Teilchen. Die Berechnung der Ladung aus der Katakphoresegeschwindigkeit nach STOKES liefert dadurch zu niedrige Werte. In der Formel von DEBYE u. HÜCKEL kommt in dem zugefügten Korrektionsglied der Einfluß der Elektrolytkonz. zum Ausdruck. Die Best. der Ladung in einem Falle von SEITEN WINTGENS lieferte für den Korrektionsfaktor nach DEBYE u. HÜCKEL den Wert 30—60. (Chem. Weekblad **23**. 130—34.) GROSZFELD.

A. Gutbier, *Zur Kolloidchemie des Wismuts*. Mitarbeit **Th. Kautter**. (Vgl. S. 848.) Die Schutzwrkg. von Hämoglobin (0,1% Lsg.) bei Darst. von kolloidem Bi durch Red. von $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ -Glycerinlsg. mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ -Lsg. ist wenig befriedigend. Die erhaltenen dunkelbraunen Systeme unterliegen schnell der Reoxydation, auch bei sofort angesetzter Dialyse. Dagegen liefert bei Ggw. von Hämoglobin die Red. mit Formaldehyd u. KOH bei Wasserbadtemp. bessere Ergebnisse. Die erhaltenen Systeme — sie reagieren schwach alkal. — lassen sich nach Dialyse zu schwarzbraunen Endprodukten konzentrieren, welche durch k. W. in den meisten Fällen wieder vollständig aufgenommen u. in sekundäre Systeme von gleichen Eigenschaften übergeführt werden können. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 153—56. Jena, Univ.) UL.

H. R. Kruyt und **P. C. van der Willigen**, *Die Stabilität von Suspensionsen unter Einfluß von Elektrolytgemischen*. (Vgl. S. 32.) Vff. gehen von dem Gedanken aus, daß jeder Elektrolyt, der die Ladung erhöht, den Grenzwert eines zweiten Elektrolyten erhöhen muß, denn je höher die Ladung, um so weiter ist man von dem krit. Potential entfernt u. um so mehr muß von dem zweiten Elektrolyten zugefügt werden, um letzteres zu erreichen. Vff. untersuchten den Grenzwert des As_2S_3 , HgS - u. Se -Sols, unter Anwendung von je zwei Elektrolyten: As_2S_3 [LiCl , MgCl_2], HgS [$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$, MgCl_2 ; $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$, MgCl_2 ; K_2SO_4 , MgCl_2 ; KCl , MgCl_2], Se [$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$, MgCl_2 ; K_2SO_4 , MgCl_2 ; KCl , MgCl_2 ; K -Acetat, MgCl_2]. Die Verss. wurden in der Art ausgeführt, daß zu 10 ccm Sol unter Umschütteln 1 ccm des ersten Elektrolyten zugegeben wurde, hierauf 5 ccm des zweiten Elektrolyten, in wechselnder Konz.; das Gesamtvolumen war immer 16 cm. Die Beurteilung geschah stets nach einer Nacht

Stehen (16 Std.). Es zeigt sich, daß der Zusatz von LiCl beim As_2S_3 -Sol mehr MgCl_2 erfordert als das reine Sol (antagonist. Wrkg.). Dasselbe Ergebnis zeigen die Tabellen für das HgS -Sol: polyvalente Anionen wirken stabilisierend auf das Sol. Die Flockungswerte für das Se -Sol zeigen, daß die antagonist. Wrkg. deutlich bei $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$, schwächer bei K_2SO_4 auftritt u. bei KCl u. K-Acetate fehlt. Während KOH die Ladung des Se -Sols erhöht, wird der Grenzwert von MgCl_2 durch KOH nicht erhöht; dagegen liefert die Kombination KOH u. BaCl_2 den erwarteten Effekt. — Die Ergebnisse der Messung der kataphoret. Geschwindigkeit des HgS -Sols in derselben Verdünnung wie bei den Ausflockungsverss. schließen sich obigen Resultaten an. $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ bewirkt eine starke, KCl eine schwache Erhöhung der Ladung. MgCl_2 erniedrigt sofort die Ladung. Die Messung der kataphoret. Geschwindigkeit des Se -Sols ist wiederum in Übereinstimmung mit obigen Resultaten. — Vff. untersuchten ferner Sole der Edelmetalle: *Au-*, *Pt-* u. *Ag-Sol* zeigen keine antagonist. Wrkg. Gewöhnlich meint man, daß das OH-Ion die Stabilität negativ geladener Sole erhöht, denn nach FREUNDLICH (Ztschr. f. physik. Ch. **44**. 152 [1903]) ist für das Pt-Sol der Grenzwert für NaOH 130 Millimol, während dieser für NaCl nur 2,5 beträgt. Merkwürdigerweise ist für das Au-Sol eine ähnliche Zahl in der Literatur nicht zu finden. Vff. fanden für ein durch elektr. Zerstäubung hergestelltes Au-Sol als Grenzwert (nach 16 Std.) für KCl 26 Millimol, für KOH 20 Millimol. Bei einem analog hergestellten Ag-Sol , das zufälligerweise denselben Grenzwert 26 Millimol für KCl ergab, wurde wiederum für KOH 20 Millimol gefunden. Es zeigt sich außerdem, daß KOH nicht nur ungeeignet ist zwecks Herbeiführung der antagonist. Wrkgg., sondern sensibilisierend sowohl auf MgCl_2 wie auf BaCl_2 wirkt. Jede Annahme, als müsse die Ladung der Edelmetallsole den absorbierten OH-Ionen zugeschrieben werden, ist abzulehnen. Vff. folgern, daß die Doppelschicht bei diesen Solen sich aus Komplexverbb. dieser Metalle aufbaut u. daß ein alkal. Milieu den Bau dieser Doppelschicht sehr nachteilig beeinflußt. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Nat. Afd. **34**. 1240—47. 1925. Utrecht, VAN'T HOFF-Lab.) K. WOLF.

Mary Evelyn Laing, *Instabile Zustände von Natriumbehenatlösungen*. (Vgl. Proc. Royal Soc. London. Serie A. **109**. 28; C. **1925**. II. 2134.) Beim raschen Abkühlen 0,05 bis 0,5-n. Lsgg. von *Na-Behenat* auf Zimmertemp. können nur kurze Zeit beständige, leicht bewegliche, klare Fl. erhalten werden, die beim Erhitzen auf 90° in eine steife isotrope Gallerte übergehen; bei langsamer Abkühlung entsteht die bei Zimmertemp. stabile Form, weißes Gerinsel, das bei 88° zu einer durch einige Flocken milchig getrübbten Fl. schm., die sich bei 90° in 2 klare Schichten teilt; die obere Schicht wird bei 75° wieder fest, die untere erst bei mehrstdg. Stehen bei Zimmertemp. Elektrometr. $\text{OH}'\text{-Best.}$, Messung der Leitfähigkeit u. der Gefrierpunktserniedrigung zeigen, daß die instabilen Lsgg. sehr stark hydrolyt. gespalten sind; sie enthalten wahrscheinlich hauptsächlich undissoziierte, neutrale, kolloide *Na-Behenat*partikeln, die durch saures *Na-Behenat* peptisiert werden; die Instabilität nimmt mit der *Behenatkonz.* zu. Die instabilen 0,2-n. Lsgg. gehen bei 90° in eine klare, isotrope Gallerte über. In den stabilen Lsgg. trägt das Seifengerinsel, vielleicht durch die Ionen der an seiner Oberfläche bestehenden elektr. Doppelschicht, zur Leitfähigkeit bei. *Na-Behenat*lsg. trennt sich bei Zusatz von NaCl in 2 Schichten u. wird erst bei 100° wieder homogen. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2751—55. 1925. Bristol, Univ.) KRÜGER.

Mona Adolf, *Physikalische Chemie der Globuline*. VII. Über das Verhalten von Säure- und Laugenglobulin bei Salzzusatz. (VI. vgl. Kolloidchem. Beihefte **20**. 288; C. **1925**. I. 1956.) In der vorliegenden Mitt. wird der Einfluß von Salzen auf die $\text{H}'\text{-Aktivität}$, die elektr. Leitfähigkeit u. die Wanderungsgeschwindigkeit der Globulinionen in Lsgg. von Säure- u. Laugenglobulin untersucht. Salze vermindern die $\text{H}'\text{-Aktivität}$ C_H von Säureglobulin; an den Beispielen Globulinchlorid + KCl u. Globulinphosphat + KCl wird gezeigt, daß die $\text{C}_\text{H}\text{-Abnahme}$ auch bei Berücksichtigung einer

Veränderung der Aktivität der Säure durch den Salzzusatz bestehen bleibt u. eine Funktion der Salzkonz. ist; sie wird wahrscheinlich durch die Verringerung der Hydrolyse des Säureglobulins infolge B. einer Salz-Säureglobulin-Verb. erklärt. Die Wirksamkeit der Salze fällt in der Reihenfolge $\text{Na-Citrat} > \text{Na}_2\text{SO}_4 > \text{NaCl}$; Na-Citrat beseitigt die saure Rk. fast vollkommen, ohne daß jedoch Globulin ausfällt. Die durch Salze herbeigeführte, mit der Zeit wachsende Leitfähigkeitsverminderung Δ (Summe der Einzelleitfähigkeiten — Leitfähigkeit des Gemisches) von Säureglobulinlsgg. nimmt bei steigender Salzkonz. zu, scheint aber bei Salzüberschuß einem konstanten Endwert zuzustreben; sie kann nur teilweise auf die Abnahme der C_H u. der freien Ladung des Globulins zurückgeführt werden, sondern weist auf eine chem. Rk. (Komplexbildung) zwischen Säureglobulin u. Salz hin. Bei Ggw. äquivalenter Mengen von KCl u. LiCl in Globulinchloridlsgg. ist Δ gleich, woraus geschlossen wird, daß nur Cl' vom positiven Globulinion gebunden wird, während K' bzw. Li' abdissoziiert. Mit steigender Wertigkeit des Salzanions bzw. -kations nimmt Δ zu. KCl bewirkt in Globulinchloridlsgg. Abnahme der freien Cl' -Aktivität, die einem im Salzüberschuß konstanten Minimum zustrebt; bei einer KCl-Konz. von 0,2-n. verschwindet eine Cl' -Menge, die derjenigen der ursprünglichen Globulinchloridlsg. entspricht. Überführungsverss. an Lsgg. von Globulinchlorid mit verschiedenen Zusätzen ergeben, daß Salze die Wanderungsgeschwindigkeit des Globulinions herabsetzen; die Wirksamkeit steigt mit wachsender Wertigkeit des Anions u. mit fallender Wertigkeit des Kations; K_2SO_4 u. Na-Citrat rufen sogar Umladung hervor. Auch bei Ausschluß einer Abnahme der freien Ladung der Globulinionen durch Salzüberschuß oder B. von schlechter l. Säureglobulin ist in Lsgg. von Globulinchlorid u. -phosphat eine Abnahme der Viscosität durch Neutralsalze nachzuweisen.

In Na-Globulinatlsgg. vermindert Salzzusatz die OH' -Aktivität C_{OH} in einem mit der Wertigkeit des Kations steigendem Grade; in einigen Fällen tritt sogar saure Rk. ein. Die C_{OH} -Abnahme läßt sich nicht nur durch Zurückdrängung der Hydrolyse erklären, sondern ist als Beweis für die B. einer komplexen Salz-Na-Globulinatverb. anzusehen, bei der ein beträchtlicher Teil des Salzes ionogen gebunden ist. Infolge B. solcher Komplexe bleibt die Leitfähigkeit von Na-Globulinatlsgg. schon bei kleinen Salzzusätzen hinter der berechneten Summe der Einzelleitfähigkeiten zurück u. zwar um so stärker, je höher die Wertigkeit des Kations ist. Ggw. von Salzen führt ferner Abnahme der Wanderungsgeschwindigkeit, bisweilen sogar Umladung der negativen Globulinionen herbei; die Wirksamkeit steigt mit der Wertigkeit des Kations u. fällt mit zunehmender Wertigkeit des Anions. $[\text{Cl}']$ -Messungen mit der Kalomel-Elektrode in neutralen Na-Globulinatlsgg. mit verschiedenen Zusätzen lassen auf eine unter Cl' -Abspaltung erfolgende komplexe Bindung von Hg_2Cl_2 an negative Globulinionen schließen. (Kolloidchem. Beihefte 21. 241—81. Wien.) KRÜGER.

Neil K. Adam, Robert S. Morrell und Ronald G. W. Norrish, *Vergleich der Methoden zur Messung der Polarität von Oberflächen*. Vff. bestimmen die Polarität der Oberflächen von Glas, Stearinsäure, Paraffin u. verschiedenen Lacken durch Messung des Kontaktwinkels (vgl. ADAM u. JESSOP, Journ. Chem. Soc. London 127. 1863; C. 1925. II. 2239) u. der katalyt. Aktivität für die Rkk. $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2$ u. $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Cl}_2$ (vgl. NORRISH, Journ. Chem. Soc. London 123. 3006. 1923; C. 1924. I. 1764) u. vergleichen die Ergebnisse mit der Neigung der Lacke, in feuchter Luft „Hauch zu bekommen“. Die Messung der Kontaktwinkel muß unmittelbar nach der Immersion in W. erfolgen, da längeres Einweichen zu niedrige Werte gibt. Die Resultate der beiden Methoden entsprechen einander nicht; Stearinsäure hat ein nur wenig größeres Attraktionsvermögen für W. als Paraffin, aber eine bedeutend höhere katalyt. Aktivität; Glas hat geringere katalyt. Aktivität als Stearinsäure aber stärkeres Attraktionsvermögen für W. Wahrscheinlich können bei den Katalyseverss. die reagierenden Molekeln bis zu einer gewissen Tiefe in die Lackschicht eindringen u. auch nach innen

gekehrte polare Gruppen erreichen. Die Größe des Kontaktwinkels gegen W. u. die Neigung zum Anlaufen gehen parallel. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2793—95. 1925.)

KRÜGER.

Otto Blüh, *Untersuchung von Kolloidpartikeln in Wechselfeldern verschiedener Frequenzen*. (Ann. der Physik [4] **78**. 177—94. 1925. — C. **1926**. I. 1373.) LASCH.

Helmuth Mommsen, *Versuche über den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf die Dialyseggeschwindigkeit*. BETHE (Ztschr. f. physik. Ch. **112**. 250; C. **1924**. II. 2639) u. TERADA (Ztschr. f. physik. Ch. **109**. 199; C. **1924**. II. 596) haben für die Diffusion in capillaren Räumen von Membranen eine Formel aufgestellt, die für Nicht-elektrolyte mit der Praxis gut übereinstimmt, von der aber Elektrolyte deutliche Abweichungen zeigen. — Die Ionen werden nämlich in ihrer Durchtrittsgeschwindigkeit durch Änderung des pH-Wertes sehr deutlich beeinflusst, was nicht allein auf eine Durchlässigkeitsänderung der Membran zurückgeführt werden kann, u. zwar aus folgenden Gründen: Beim Durchpressen von reinem W., $\frac{1}{500}$ -n. NaOH oder $\frac{1}{500}$ -n. HCl durch Pergamenthülsen ist ein Unterschied in der Durchtrittsgeschwindigkeit nicht feststellbar. Nichtelektrolyte, wie Harnstoff u. Traubenzucker werden in ihrer Dialyseggeschwindigkeit durch alkal. Milieu nicht beeinflusst. Bei saurer Rk. ist meist eine geringe Steigerung der Dialyseggeschwindigkeit bemerkbar, die aber nicht ins Gewicht fällt. — Bei Elektrolyten beschleunigt eine Steigerung des pH die Dialyse von Anionen, Verminderung des pH die Dialyse von Kationen. — Es ist anzunehmen, daß Ladungsänderungen der Membran, die auf Anelektrolyte keinen oder nur einen geringen Einfluß gewinnen können, Ursache der Erscheinungen bei Elektrolyten sind. (Ztschr. f. physik. Ch. **118**. 347—56. 1925. Frankfurt a. M., Inst. f. animal. Physiol., THEODOR-STERN-Haus.)

LASCH.

Luigi De Caro, *Über Membrangleichgewichte in der Physiologie. I. Gleichgewicht zwischen Lösungen von Gelatinechloriden verschiedener Konzentration*. Wie stellt sich das Membrangleichgewicht ein, wenn sich auf beiden Seiten einer Membran Kolloid-elektrolyte verschiedener Konz. befinden? Theorie u. experimentelle Prüfung führen zu dem Ergebnis, daß ein Gleichgewicht sich einstellt, bei dem die Konz. des nicht-diffusiblen Ions gleich der Differenz der Konz. der beiden nicht diffusiblen Ionen ist. Der höhere osmot. Druck herrscht da, wo auch die höhere Konz. des nicht diffusiblen Ions sich befindet. Membranpotential wächst mit der Größe der Konz.-Differenz der nichtdiffusiblen Ionen. (Arch. d. science biol. **7**. 128—42; Ber. ges. Physiol. **32**. 407. 1925. Neapel, Istit. di fisiol. Ref. KAISER.)

OPPENHEIMER.

Ernest Walter John Mardles, *Quellung und Dispersion einiger kolloider Substanzen in Äther-Alkoholgemischen*. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London **125**. 2244. 1924; C. **1925**. I. 1054.) Der Quellungsgrad von Cellulosenitrat u. -acetat u. Zanzibar-Kopal in Ä.-A. u. in Anisol-Benzylalkohol hat bei bestimmter Zus. des Quellungsmittels ein Maximum; dies liegt für Cellulosenitrat u. Ä.-A. (in Ggw. von etwas W.) bei 50 Vol.-% Ä., für Zanzibar-Kopal u. Ä.-A. bei 30 Vol.-% Ä. Der Quellungsgrad von Cellulosenitrat in Phenol-Anisol u. von vulkanisiertem Kautschuk in Ä.-A. fällt kontinuierlich mit dem Phenol- bzw. dem Ä.-Gehalt. An den Beispielen: Celluloseacetat + Anisol-Benzylalkohol u. Kopal + Ä.-A. wird gezeigt, daß das optimale Quellungsmittel zugleich das beste Lösungsm. ist. Die Viscosität der Sole von Nitrocellulose in Ä.-Ä., Ä.-Benzylmethyläther, Ä.-Anisol hat etwa bei der Zus. des Gemisches mit höchstem Lösungsvermögen ein Minimum, die Differenz zwischen den DD. des Lösungsm. u. des Sols ein Maximum. Die Oberflächenspannung von Ä., A. u. seiner Gemische mit Ä., Benzylmethyläther u. Anisol wird durch zahlreiche kolloide Substanzen — Cellulosenitrat, Drachenblut, Kupferoleat, Tannin, Kauriharz, Nachtblau, Schellack, K-Oleat, u. -Stearat, Mastix — etwas erhöht, Chlorophyll ist wirkungslos. — Das gesteigerte Quellungs- u. Lösungsvermögen von Gemischen erklärt Vf. damit, daß die eine, selbst wenig reaktionsfähige Komponente einerseits als Verdünnungsmittel wirkt u. die

Assoziation der anderen Komponente mit reaktionsfähigen Gruppen herabdrückt, u. daß sie ferner auch, u. zwar offenbar in einfachen molekularen Verhältnissen, in die aus den Molekeln der letzteren u. den Kolloidteilchen gebildeten Komplexe eintritt. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2940—51. 1925. London, Univ.) KRÜGER.

Alexander Gorbatschew, *Ein Nachtrag zur Arbeit „Ein Versuch zur Herleitung der Adsorptionsisothermen“*. Vf. gibt einen Nachtrag zu seiner Arbeit (Ztschr. f. physik. Ch. **117**. 129; C. 1925. II. 2134). Die kinet. Betrachtung des Gleichgewichts zwischen einer gasförmigen Phase u. einer Adsorptionsschicht ergibt die Gleichung:

$$f(x) = \frac{C}{M} \cdot A \quad \text{oder} \quad x = - \frac{C}{M} \frac{dK}{dx}.$$

M ist eine Konstante, C die Gaskonz. in der Gasphase, A die Arbeit, welche 1 Molekel beim Verlassen des Adsorbenten gegen die Adsorptionskräfte leistet, dK/dx die Feldspannungsabnahme bei Adsorption eines Molekels. Aus dieser u. aus der Gleichung von G. SCHMIDT $x = C \cdot M/K$ leitet Vf. die Isotherme von LANGMUIR, von REICHSTEIN, die Isothermen von SCHMIDT u. von FREUNDLICH-BOEDEKER, ferner die Isotherme von WILLIAMS u. die von GIBBS ab. (Ztschr. f. physik. Ch. **118**. 357—60. 1925. Reval.) LASCH.

Nikolai Schilow und **Sophie Pewsner**, *Adhäsionskräfte in Lösungen*. VI. *Experimentelles über die Adsorption aus gemischten Lösungsmitteln*. (V. vgl. S. 1381.) Es wird die Adsorption durch Kohle aus gemischten Lösungsmm. bei folgenden Salzen: CoCl_2 , MnCl_2 , CaCl_2 , KBr , CuCl_2 , KJ , CdJ_2 u. folgenden Säuren: H_2SO_4 , HNO_3 , *Benzoessäure*, *Salicylsäure*, *Oxalsäure*, *Weinsäure*, *Bernsteinsäure* untersucht. Alle Verb. wurden in $1/40$ -n. Lsgg. angewendet, J in $1/10$ -n. Die untersuchten Lösungsmittelgemische waren A.-W., A.-Ä., Toluol-A., Toluol-Ä. — Die Kurven, welche den Zusammenhang zwischen der adsorbierten Menge u. der Zus. des lösenden Gemisches darstellen, verlaufen von Fall zu Fall individuell, erinnern aber deutlich an die von D., DD., Oberflächenspannung, Leitfähigkeit u. andere in gemischten Lösungsmm. Sie liegen entweder zwischen den Werten für die reinen Lösungsmm. oder sie weisen einen Minimumbereich der Zwischenwerte auf, wie die meisten Salze in A.-W.-Gemischen. In Gemischen, welche kein W. enthalten, durchlaufen sämtliche Adsorptionskurven einen Minimumbereich der Zwischenwerte. — Die Adsorption aus gemischten Lösungsmm. ist manchmal sehr schwach im Vergleich zu der aus reinen Lösungsmm. Besonders ist dies bei *Benzoessäure* u. Toluol-A. der Fall. Im allgemeinen sind die Zusammenhänge nur qualitativer Natur u. lassen viele Abweichungen beobachten. Die Adsorptionsvorgänge greifen tief in die molekulare Natur der drei beteiligten Stoffe ein, weshalb ein sehr kompliziertes Bild zu Stande kommt. (Ztschr. f. physik. Ch. **118**. 361—68. 1925. Moskau, Physikal. chem. Lab. d. Russ. Wiss. Chem. Inst.) LASCH.


B. Anorganische Chemie.

A. Kling und **A. Lassieur**, *Über den Wasserstoffexponenten des Wassers*. Das in einer Pt-Apparat dest. oder durch fraktionierte Krystallisation gereinigte W. hat $\text{pH} = 5,8$ (colorimetr. oder potentiometr. nach Zusatz von KCl bestimmt). Obwohl das W. keine CO_2 enthalten konnte, wurde es mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ titriert; die bis zur Erreichung des Neutralpunktes verbrauchte Barytmenge war ca. 5—6-mal größer, als der H_2CO_3 entsprechen dürfte. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1062—64. 1925.) BI.

William D. Harkins und **Francis A. Jenkins**, *Die Trennung des Elementes Chlor in Isotope*. *Die leichte Fraktion*. Den Vff. ist es gelungen, durch eine Reihe systemat. Diffusionsverss. durch die Wände von porösen Porzellanpfefenstielen Chlor vom At.-Gew. 35,418 zu erhalten. Dieser At.-Gew.-Wert ist um 0,039 Einheiten niedriger als der gewöhnliche u. um 0,097 Einheiten niedriger als der bisher bei der

Isotopentrennung höchste gefundene Wert von 35,515 (vgl. HARKINS u. BROEKER, *Nature* **105**. 230; C. **1921**. I. 697). Diese Differenz von fast $\frac{1}{10}$ oder von 1 Teil auf 365 stellt die höchste Differenz dar, die bisher in dem At.-Gew. eines Elementes experimentell erzeugt worden ist. Die At.-Geww. wurden durch Best. des Verhältnisses der Gewichte von reinstem Ag zu sehr reinem AgCl in Quarzflaschen ermittelt, wobei weder Ag noch AgCl von einem Gefäß in ein anderes gebracht zu werden brauchte, sondern alle Wägungen wurden im selben Quarzgefäß ausgeführt. — Die Diffusionsvorr. ist im Original genau beschrieben u. die Wrkg. der einzelnen Diffusionsverss. berechnet, desgleichen ist die Reinigung der zur At.-Gew.-Best. benutzten Substanzen näher angegeben. (*Journ. Americ. Chem. Soc.* **48**. 58—69. Chicago [Ill.], Univ.) JOSEPHY.

Bernhard Neumann und **Frederick Hauck**, *Die Konstitution des Chlorkalks*. Vf. geht zunächst auf die Unterss. mehrerer Forscher über die Zus. des Chlorkalks ein. Alle bisherigen Verss., die Konst. aufzuklären, scheiterten wegen der Verwendung unreiner Ausgangsstoffe, hauptsächlich CO_2 -haltigen Kalks u. CO_2 -haltigen Chlors. Unter Verwendung von ganz reinem Kalkhydrat u. reinem Cl_2 stellt Vf. Chlorkalk her u. untersucht dessen Eigenschaften u. Konst. Er kommt zu folgenden Ergebnissen: Bei langem Stehen des Chlorkalks sinkt zuerst der Gehalt an bleichendem Cl, bleibt dann aber auf 39,0% stehen, wenn die Gefäße verschlossen sind. Bei offenstehenden Proben nimmt der Gehalt an bleichendem Cl dauernd ab. Im Sonnenlicht tritt Umlagerung in CaCl_2 u. $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ ein. Beim Abblasen nicht gebundenen Chlors durch Luft, N_2 oder CO_2 hinterbleibt stets ein Prod. mit 39,0% Cl. Das Verhältnis von chloriertem Kalk zu unchloriertem wird stets wie 3:1 gefunden, der Chlorkalk hat danach die Formel I. Als Wärmetönung für 1 g Chlorkalk werden $101,55 \pm 0,7$ cal, für 1 g Cl



$252,0 \pm 2,0$ cal erhalten. Feuchtes CO_2 , auch schon CaCO_3 im Kalkhydrat, bewirken eine völlige Umwandlung des bleichenden Cl in CaCl_2 . Auch durch Chlorierung unter Druck konnte nicht alles Kalkhydrat chloriert werden. Oberhalb 85° zersetzt sich Chlorkalk lebhaft. Chloriert man unter Luftabschluß bei $65\text{--}70^\circ$, so tritt im Verhältnis 5:1 Chlorid u. Chloratchlor auf. Zum Beweise für die Gültigkeit der von ODLING (Handbuch der Chemie, deutsche Ausgabe I, 59 [1861]) angegebenen Formel $\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl}$ wurde reiner Chlorkalk unter Luftabschluß auf $70\text{--}80^\circ$ erhitzt u. dabei in CaCl_2 u. $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ im Verhältnis 5:1 umgelagert. Dem reinen Chlorkalk kommt Formel II zu. (*Ztschr. f. Elektrochem.* **32**. 18—31.) SITTING.

Ernst Schlumberger, *Studien an technischem Calciumcarbid*. I. Vf. zeigt 17 nach metallograph. Verf. aufgenommene Schlibfbilder von techn. Calciumcarbid mit verschiedenem Gehalt an CaC_2 . Das Strukturbild wird in Beziehung zu dem von RUFF u. FÖRSTER (*Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch.* **131**. 321; C. **1924**. I. 465) aufgenommenen Schmelzdiagramm des Systems $\text{CaO}\text{--}\text{CaC}_2$ (+ Verunreinigungen) diskutiert. Der mkr. Befund führt zur Annahme einer eutekt. Zus. bei $\sim 60\%$ CaC_2 . Messungen des elektr. Widerstandes ergeben am selben Stück nach verschiedenen Richtungen Unterschiede von 100—200%. Die Abhängigkeit des Widerstandes vom CaC_2 -Gehalt zeigt folgendes Bild: Von 94% CaC_2 (spez. Widerstand pro cem-Würfel $\sigma = \sim 450 \Omega$) abwärts steigt der Widerstand stark an u. erreicht bei $65\text{--}70\%$ sein Maximum. ($\sigma = \sim 120,000$), dann folgt rapides Absinken, so daß bei 40% $\sigma = 1 \simeq 4 \Omega$ beträgt. Eine bündige Deutung steht noch aus. Der Temp.-Koeffizient des elektr. Widerstandes ergibt sich aus der Formel: $\log \sigma_t = \log \sigma_0 (1 - 0,0012 t)$. Auch die Azotierbarkeit des Carbides scheint strukturbedingt zu sein. Bei eutekt. Zus. ist die Korngröße am feinsten, die akt. Oberfläche mithin am größten (mittl. $\phi \sim \frac{1}{30}$ mm); damit decken sich die Erfahrungen der Praxis. (*Ztschr. f. angew. Ch.* **39**. 213—20.) HEIMANN.

C. Matignon und J. Cathala, *Einwirkung des Phosgens auf Berylliumoxyd. Darstellung des Berylliumchlorids*. Bei Erhitzung von BeO im COCl_2 -Strom bildet sich BeCl_2 , das mit dem Phosgen entfernt wird, so daß die Gewichtsabnahme des BeO ein Maß der Rk. ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt mit der Temp. (350 bis 1000°) u. der Strömungsgeschwindigkeit von COCl_2 (920—1915 ccm/Std.) zu. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1066—68. 1925.)

BIKERMAN.

M. M. Windsor, *Einige Doppelfluoride von Zirkon*. Vf. stellt Doppelfluoride von Zr u. einigen organ. Basen dar durch Auflösen von ZrO_2 in HF u. Zugabe einer alkoh. Lsg. einer äquivalenten Menge der Base. Die Salze wurden entweder durch Krystallisation erhalten oder durch Aceton ausgefällt. Zur Ermittlung der Zus. wurden bestimmt Zr, F, N der Base oder das Alkaloid aus der opt. Rotation der Salzlsg. u. Krystallwasser. Folgende Zr-Doppelfluoride wurden erhalten: mit *Anilin*, $(\text{An})_2\text{H}_2\text{ZrF}_6$, Würfel, mit *Brucin* $(\text{Bru})_2\text{H}_2\text{ZrF}_6$, Nadeln, mit *Cinchonin* $(\text{Cin})_2\text{H}_2\text{ZrF}_6$, mkr. Würfel, mit *Chinin* $\text{Ch}(\text{ZrF}_4)_2$, mkr. Würfel, mit *Chinidin*, $\text{Chd}(\text{HZrF}_5)_2$, mkr. Würfel, mit *Strychnin* $(\text{Str})_3(\text{HZrF}_5)_2$, lange, flache Platten. Bei der Darst. des Anilinsalzes wurden neben den weißen auch rote Krystalle erhalten, die von einem Doppelfluorid eines Oxydationsprod. des Anilins herrühren müssen. Ein krystallin. Doppelfluorid mit *Cinchonidin* zu erhalten, gelang nicht. Alle Salze waren ll. in h. u. k. W. u. in A., nur das Strychninsalz löst sich in k. W. nur langsam. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 310—12. Lexington [Kent.], Univ.)

JOSEPHY.

Samuel Glasstone und Ernest J. Riggs, *Komplexbildung in Bleinitratlösungen*. II. *Das quaternäre System Kaliumnitrat-Bleinitrat-Bariumnitrat-Wasser*. (I. vgl. GLASSSTONE u. SAUNDERS, Journ. Chem. Soc. London **123**. 2134; C. **1923**. III. 1440.) Es werden die Gleichgewichte $\text{KNO}_3\text{-Ba}(\text{NO}_3)_2\text{-W.}$, $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2\text{-Ba}(\text{NO}_3)_2\text{-W.}$ u. $\text{KNO}_3\text{-Pb}(\text{NO}_3)_2\text{-Ba}(\text{NO}_3)_2\text{-W.}$ bei 25° u. 50° untersucht. In den ternären Systemen kommen außer den einfachen Salzen das Doppelsalz $2\text{KNO}_3\text{-Ba}(\text{NO}_3)_2$ bzw. Mischkrystalle von $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ u. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ als feste Phasen vor; in dem quaternären System scheinen Mischkrystalle von $2\text{KNO}_3\text{-Ba}(\text{NO}_3)_2$ mit einem unter diesen Bedingungen allein nicht beständigen Doppelsalz $2\text{KNO}_3\text{-Pb}(\text{NO}_3)_2$ aufzutreten. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2846—54. 1925. Exeter, Univ.)

KRÜGER.

Hans Reihlen, *Über die cis-trans-Isomerie koordinativ vierwertiger Komplexsalze*. Auf Grund theoret. Unterss. über die Lagerung der Liganden bei koordinativ vierwertigen Schwermetallkomplexen zeigt Vf., daß die von SCHLESINGER (S. 44) entdeckte *Isomerie bei Cu(2-)Verbb.* nur durch Annahme räumlicher u. zwar tetraedr. Lagerung der vier Liganden um das Cu-Atom gedeutet werden kann. Für das Dreiringsystem, wie es bei Äthylen-bis-[α -iminoessigsäure]-Cu vorliegt, mit drei asymmetr. Atomen: N, N u. Cu, gibt es hierbei nur eine spannungsfreie Lage. Es herrschen die gleichen Verhältnisse wie sie auch J. MEISENHEIMER (LIEBIGS Ann. **438**. 217; C. **1924**. II. 2323) für di-en-Sarkosin-Cobalt(3-)Chlorid annimmt. Die Pentamethylen-bis-[α -iminoessigsäure] kann zwei, die Heptamethylen-bis-[α -iminoessigsäure] drei Racemate geben. Dabei wären bei Polymethylenringen, die mehrere spannungsfreie Lagen einnehmen könnten, eigentlich noch mehr Isomere möglich, doch nimmt Vf. an, daß stets eine Lage stark bevorzugt ist. Komplizierter liegen die Verhältnisse bei den von SCHLESINGER untersuchten Säuren vom Typus $\text{COOH}\cdot\text{C}\cdot\text{RR}_1\cdot\text{NH}\cdot(\text{CH}_2)_n\cdot\text{NH}\cdot\text{CRR}_1\cdot\text{COOH}$ (Iminopropion- u. Imino-phenyl-essigsäure), welche vier asymmetr. Atome, je zwei untereinander gleiche N u. C, enthalten. Hier sind keine isomeren Cu-Verbb. gefunden worden — zwanzig wären theoret. möglich —, was Vf. dadurch erklärt, daß die Konfiguration der beiden C-Atome schon vor der Komplexbildung festliegt, u. deshalb instande ist, die Konfiguration der N-Atome mit zu bestimmen. Dadurch würde — wenn die Säure in der Mesoform vorlag, eine —, wenn sie als Racemat vorlag, eine andere racem. Form so bevorzugt, daß keine Iso-


mere entstehen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 71—76. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) ULMANN.

D. Organische Chemie.

C. A. Rojahn und **Jos. Schulten**, *Über die Verwendbarkeit des Lithiums an Stelle von Natrium bei organischen Synthesen*. Das benutzte Li von der Frankfurter Metallbank A.-G. konnte, da eine dünne Schicht von Nitrid u. Amid vor weiteren Angriffen schützt, ohne weiteren Schutz im Exsiccator aufbewahrt werden. Es war bis auf geringe Mengen Ca u. Mg rein, enthielt aber an einigen Stellen harte, schwarze Einschlüsse bis Linsengröße, anscheinend von Amid u. Carbid, die bei Schneiden usw. unter Funken sprühen verbrannten. Es wurden Verss. mit diesem Li u. mit Na vergleichend angestellt bzgl. folgender Rkk.: 1. Verätherung mit A. — 2. Fittigsche KW-stoffsynthese. — 3. Darst. von Säureanhydrid aus Chlorid u. Alkalisalz. — 4. Einführung von Alkyl mittels der Alkaliacetessigester- u. -malonester. — 5. Kondensation mittels der Alkoholate. — 6. Perkinsche Zimtsäuresynthese. — 7. Pinakonsynthese. — 8. Darst. von Orthoameisensäureester. — 9. Ketonsynthesen mit Salzen von Fett- u. aromat. Säuren. — Ferner wurde Verwendung des Li statt Mg in der Grignardschen Rk. ohne Erfolg versucht. Meist wurden mit Li statt Na geringere Ausbeuten erreicht, bessere aber bei Alkylierung des Acetessigesters u. bei Darst. der Ketone (9.) Namentlich näherte sich die Ausbeute an Aceton aus Li-Acetat der theoret. (Vgl. auch KRÖNIG Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 669; C. **1924**. II. 1680.) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 499 bis 501.) SPIEGEL.

H. van de Walle und **A. Henne**, *Die Stereoisomeren des Chlorjodäthylens*. (Bull. Soc. Chim. Belgique **34**. 399—410. 1925. — C. **1926**. I. 870.) BKM.


P. Karrer, *Die Konfiguration des d-Quercits*. Es gelingt nicht, inakt. Inosit u. Quercit mit Aceton oder Benzaldehyd zu kondensieren. Doch kann man für den d-Quercit auf Grund des bekannten Tatsachenmaterials die Konfiguration auf zwei Möglichkeiten einengen. Von den 10 theoret. denkbaren cis-trans-isomeren Formeln scheiden vier s. gebaute aus. Von den übrigen kommen auf Grund des oxydativen Abbaus zu Schleimsäure nur I. u. III. in Frage. Ein Vergleich dieser Formeln mit



der des akt. Inosits (II.) zeigt, daß alle drei in der Konfiguration sämtlicher asymm. C-Atome übereinstimmen. Bei I. u. III. fehlt nur ein OH. d-Quercit entspricht also konfigurativ dem akt. Inosit (Galaktosekonfiguration). Weiter folgt, daß aus dem eingangs mitgeteilten Widerstand gegen Kondensationen keine Schlüsse auf die Stellung der OH-Gruppen gezogen werden dürfen. (Helv. chim. Acta **9**. 116—17. Zürich, Univ.) LINDENBAUM.

F. G. Mann und **W. J. Pope**, β, β', β'' -Triaminotriäthylamin und seine komplexen Metallverbindungen. In Fortsetzung früherer Unterss., die das 1,2,3-Triaminopropan zum Gegenstand hatten (vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie A. **107**. 80—92; C. **1925**. I. 1175) wird in analoger Weise das β, β', β'' -Triaminotriäthylamin, $N(CH_2CH_2NH_2)_3$ auf seine Fähigkeit hin untersucht, mit dreiwertigen Metallen Komplexverb. einzugehen. Von einer Herabsetzung der bas. Eigenschaften des tertiären Aminoradikals kann im Gegensatz zu den Äußerungen RISTENPARTS (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **29**. 2530 [1896]) nicht die Rede sein. In allen Fällen, bei denen Koordi-

nation besteht, verhält sich das Triaminotriäthylamin als ein vierbas. Amin. So konnten von den Vff. dargestellt werden: Salztypen, wie *Dichlortriaminotriäthylaminplatinidichlorid*, $[\text{Cl}_2\text{PtN}(\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{NH}_2)_3]\cdot\text{Cl}_2$ (I) u. *Triaminotriäthylaminplatino-dijodid*, $[\text{PtN}(\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{NH}_2)_3]\cdot\text{J}_2$ (II). — Einfache tertiäre Amine (Triäthylamin) veranlassen im Gegensatz hierzu keine B. von koordinativen Verbb. Die Einführung der drei Aminogruppen scheint ster. auf das tertiäre N-Atom im Sinne einer Begünstigung der koordinativen Neigung zu wirken, wenigstens bei I, während diese Deutung bei II nicht möglich ist. — Zur Darst. von Triaminotriäthylamin wurde vergeblich versucht, das α,α',α'' -*Tricyantrimethylamin* direkt zu reduzieren, wobei nur Zers.-Prodd. erhalten werden konnten. Es wurde daher wieder nach der Methode von RISTENPART gearbeitet u. Verbesserungen erzielt besonders bei der Verseifung des *Triphthalimidotriäthylamins*. Triaminotriäthylamin kann reagieren als Triamin u. als Tetramin. Wird eine konz. Lsg. der Base in verd. HCl in A. gegossen, so entsteht das *Trihydrochlorid*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 3\text{HCl}$, jedoch in konz. HCl bei langsamer Krystallisation das *Tetrahydrochlorid*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 4\text{HCl}\cdot\text{H}_2\text{O}$. In den dargestellten zwei Aurichloriden, Platinichloriden u. Rhodochloriden verhält sich das Amin als drei- u. viersäurige Base. Bei der Koordination mit Metallen jedoch ist es ausschließlich viersäurige Base. Die koordinativen Verbb. mit zwei- u. dreiwertigem Pt stellen neue Typen dar, indem sie die ersten dieser Art mit einem aliph. Tetramin sind. Für das Triaminotriäthylaminplatinodijodid (II) wird die Formulierung III vorgeschlagen; doch sollen zur Klärung der Konst.-Fragen Mol.-Gew.-Bestst. abgewartet werden.



Versuche. Geschmolzenes *Bromäthylphthalimid* wird zu $\frac{2}{3}$ in ein weites Gefäß gefüllt u. durch eine weite Röhre trockenes Ammoniak eingeleitet.

Nach 8 Stdn. wird das Prod. viscos, u. nach dem

Abkühlen wird mit h. A. das pulverisierte Prod. extrahiert, wodurch unverändertes Ausgangsmaterial von dem unl. Rk.-Prod. entfernt wird. *Triphthalimidotriäthylamin* wird aus Eg. umkrystallisiert u. zeigt dann F. 193° (korr.). — Die Verseifung geschieht vorteilhafter durch Kochen mit verd. HCl (1:1) mäßig während 7 Stdn. Man kühlt die klare Lsg. u. trennt von der ausgeschiedenen Phthalsäure; das eingengte Filtrat wird in A. gegossen, wodurch das *Trihydrochlorid*, $\text{C}_6\text{H}_{21}\text{N}_4\text{Cl}_3$, als weißes Pulver ausfällt. Bei langsamer Krystallisation: das *Tetrahydrochlorid*, $\text{C}_6\text{H}_{24}\text{ON}_4\text{Cl}_4$, F. 167 — 169° unter Zers. — *Triaminotriäthylaminidihydrojodidmonohydrochlorid*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 2\text{HJ}\cdot\text{HCl}$, F. oberhalb 300° . — *Tricarbamidotriäthylamin*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}\cdot\text{CO}\cdot\text{NH}_2)_3$, sintert bei 140° u. schm. unter Zers. bei 167 — 168° . — Verss., durch Erhitzen des Triaminotriäthylamintrihydrochlorids über den F. unter Abspaltung von NH_4Cl zu *N-Aminoäthylpiperazin* oder *Triäthylendiamin* zu kommen, waren bis jetzt ohne direkten Erfolg. — *Aurichlorid des Triaminotriäthylamintrihydrochlorids*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 3\text{HCl}\cdot 3\text{AuCl}_3$, orangefarbige Nadeln. — *Aurichlorid des Tetrahydrochlorids*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 4\text{HCl}\cdot 2\text{AuCl}_3$, schwachgelbe Krystalle, F. 187 — 189° unter Zers. — *Triaminotriäthylaminmercurichlorid*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 3\text{HCl}\cdot 5\text{HgCl}_2$, farblose Nadeln, F. 202 — 204° unter Zers. — *Rhodochlorid des Triaminotriäthylamintrihydrochlorids*, $2\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\cdot\text{NH}_2)_3\cdot 6\text{HCl}\cdot 3\text{RhCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$, sintert bei 257° u. schm. zu einer braunen Fl. bei 280° . — *Rhodochlorid des Tetrahydrochlorids*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 4\text{HCl}\cdot 2\text{RhCl}_2$, schwach gelbgraues amorphes Pulver ohne F. bis 300° . — *Rutheniochlorid des Tetrahydrochlorids*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 4\text{HCl}\cdot 2\text{RuCl}_3\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, bronzefarbene Krystalle, F. oberhalb 280° . — *Platinchlorid des Triaminotriäthylamintrihydrochlorids*, $2\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 6\text{HCl}\cdot 3\text{PtCl}_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$, dunkelrote Krystallblätter. — *Platinichlorid des Triaminotriäthylamintrihydrochlorids*, $2(\text{NC}_2\text{H}_4\cdot\text{NH}_2)_3\cdot 6\text{HCl}\cdot 3\text{PtCl}_4\cdot 10\text{H}_2\text{O}$, orangefarbene Nadeln, dunkelt bei 225° , F. 231 — 232° unter Zers. — *Platinichlorid des Tetrahydrochlorids*, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_2)_3\cdot 4\text{HCl}\cdot 2\text{PtCl}_4\cdot 10\text{H}_2\text{O}$, dunkelorange-farbene Krystalle, verlieren W. bei 80° , dunkeln bei 260° u. dann F. 271 bis 273° unter Zers.

Bei den nun aufgeführten metallkoordinierten Derivv. des Triaminotriäthylamins ist die Abkürzung „tren“ benutzt zur Bezeichnung eines Mol. $N(C_2H_5NH_2)_3$. — *Dichlortriaminotriäthylaminplatinidichlorid*, $[Cl_2Pt\ tren]Cl_2$, orangefarbiges Pulver (aus h. W.), dunkelt bei 240° , F. $263\text{--}266^\circ$ unter Zers. — *Dichlortriaminotriäthylaminplatinidijodid*, $[Cl_2Pt\ tren]J_2$, dunkelrote Krystalle, dunkeln bei 225° u. Zers. bei $233\text{--}237^\circ$. — *Dichlortriaminotriäthylaminplatinichlorid*, $[Cl_2Pt\ tren]PtCl_3 \cdot 2H_2O$, orangebraune Krystalle, dunkeln bei 275° , F. $287\text{--}280^\circ$ unter Zers. — *Dichlortriaminotriäthylaminplatiniplatinocyanid*, $[Cl_2Pt\ tren]Pt(CN)_4$, farblose Nadeln, dunkeln bei 225° , oder gelbe Krystalle, F. oberhalb 300° . — *Triaminotriäthylaminplatinoplatochlorid*, $[Pt\ tren]PtCl_4$, amorphes Pulver, sintert bei 265° , F. $270\text{--}275^\circ$. — *Triaminotriäthylaminplatinodijodid*, $[Pt\ tren]J_2$, cremfarbige amorphe Verb., dunkelt bei 260° , F. 267 bis 269° unter Zers. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. **109**. 444—58. 1925.) HORST.

P. Karrer und Harry Salomon, *Über die Glycerinphosphorsäuren aus Lecithin*. Ein histor. Überblick zeigt, daß die Chemie der *Glycerinphosphorsäuren* erneuter Bearbeitung bedarf. — Vff. fanden zunächst ein gutes Verf. zur Trennung von *glycerin- α -phosphorsäurem Ba* (I.) u. *glycerin- β -phosphorsäurem Ba* (II.). Letzteres bildet mit $Ba(NO_3)_2$ ein ausgezeichnet krystallisiertes Doppelsalz der Zus. $2C_3H_7O_6P\ Ba$, $Ba(NO_3)_2$, von dem 100 Teile W. von 18° nur 0,8 Teile aufnehmen. Daß sich dieses Salz von der β -Säure ableitet, folgt daraus, daß die aus ihm frei gemachte Säure, das Ba-Salz u. der *methylierte Dimethylester* (IV.) opt.-inakt. sind, während Derivv. der

- I. $CH_2(OH) \cdot CH(OH) \cdot CH_2(OPO_3Ba)$
- II. $CH_2(OH) \cdot CH(OPO_3Ba) \cdot CH_2(OH)$
- III. $CH_2(OCH_3) \cdot CH(OCH_3) \cdot CH_2[OPO(OCH_3)_2]$
- IV. $CH_2(OCH_3) \cdot CH[OPO(OCH_3)_2] \cdot CH_2(OCH_3)$
- V. $CH_2(OCH_3) \cdot CH(OCH_3) \cdot CH_2(OPO_3Ba)$

anderen Säure, die kein $Ba(NO_3)_2$ -Doppelsalz liefert, opt.-akt. befunden wurden. Damit stimmt überein,^r daß aus Acetonglycerin nach FISCHER u. PFÄHLER (Ber.

Dtsch. Chem. Ges. **53**. 1615; C. **1920**. III. 826) synthetisierte α -Säure zur B. obigen Doppelsalzes nicht befähigt ist, wohl aber synthet. bereitete β -Säure. Die Konst. beider Säuren ist damit unzweifelhaft festgelegt. BAILLY (Ann. de Chimie [9] **6**. 96; C. **1917**. I. 308) hat mit der Verteilung der Formeln das Richtige getroffen. Gleich diesem Autor haben auch Vff. mit ihrem neuen Verf. festgestellt, daß das *glycerinphosphorsäure Na* des Handels überwiegend aus dem Salz der β -Säure besteht. Die Schwerlöslichkeit des Doppelsalzes erlaubt es, die β -Säure in einem Gemisch beider Säuren annähernd quantitativ zu bestimmen. Man löst 1 g rohes Ba-Salz in 10 cem W., fügt 0,8 g $Ba(NO_3)_2$ in 10 cem W. hinzu, saugt nach 12 Stdn. den Nd. ab, wäscht ihn mit 4 cem eisk. W., A., Ä., trocknet, wiegt u. zählt wegen der Löslichkeit des Salzes 0,2 g hinzu. Auf diese Weise konnte festgestellt werden, daß im Ei- u. Gehirnlecithin bedeutende Mengen (80% u. mehr) β -Säure enthalten sind. Außer Lecithin wurden auch eine in A. wl. u. eine darin unl. Phosphatidfraktion aus Eiern („Kephalin“ u. „Sphingomyelin“) untersucht; erstere enthielt mindestens 45%, letztere ca. 70% β -Säure. Auch in pflanzlichen Phosphatiden findet sich die β -Säure; ein aus Erbsenmehl extrahiertes Präparat ergab einen Gehalt von mindestens 30% — Die einander widersprechenden Angaben über die opt. Aktivität von rohem *glycerinphosphorsäurem Ba* lassen den Verdacht aufkommen, daß dieselbe auf Beimengungen anderer Art zurückzuführen sei. Vff. haben sich daher bemüht, ein einheitliches Präparat des α -Salzes (I.) zu isolieren, was erhebliche Schwierigkeiten bereitet, aber mittels des Doppelsalzes der β -Säure u. auf Grund der geringeren Löslichkeit des α -Salzes in h. als in k. W. gelingt. I. hat sich zwar als opt.-inakt. erwiesen, was obigen Verdacht bzgl. Beimengungen bestätigt, aber der aus ihm leicht erhaltliche *methylierte Dimethylester* (III.) ist deutlich opt.-akt., u. zwar stets linksdrehend, gleichgültig, ob er aus Ei- oder pflanzlichen Phosphatiden herrührt. Der höchste beobachtete Wert für die spezif. Drehung betrug $-3,2^\circ$, wahrscheinlich liegt der der ganz reinen

Substanz noch etwas höher. Dagegen besaß das aus rohem Ba-Salz gewonnene Ester-
gemisch eine $2\frac{1}{2}$ - bis 5-mal geringere Drehung, woraus von einer ganz anderen Seite
her folgt, daß die Rohsalze Gemische von I. u. II. sind, in denen II. überwiegt. —
Vers., die Konfiguration der α -Säure durch Abspaltung des Säurerestes aus III. u.
Oxydation des entstandenen Glycerindimethyläthers zum konfiguratив bekannten
Glycerinsäuredimethyläther zu bestimmen, scheiterten an der außerordentlichen
Beständigkeit von III. gegen hydrolysierende Agenzien.

Versuche. Als Ausgangsmaterialien dienten eine große Zahl von Eilecithinen
des Handels, ferner solche nach dem Verf. von ESCHER (S. 411) gewonnene, die wahr-
scheinlich am reinsten sind. Sie werden mit k. 10% ig. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ -Lsg. verseift, Über-
schuß der letzteren mit CO_2 entfernt, Filtrat mit A. gefällt, Nd. mehrmals umgefällt.
Die Mutterlauge hinterläßt beim Eindampfen einen Sirup von glycerinphosphor-
saurem Cholin, aus dessen konz. wss. Lsg. eine alkoh. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ -Lsg. weitere Mengen
des Ba-Salzes niederschlägt. Letzteres ist ein weißes, in W. sl., amorphes Pulver.
Verd. Lsgg. scheiden beim Kochen reines I. aus, aus konz. Lsgg. fällt mehr oder
weniger II. mit aus. — Verb. $2\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_6\text{PBa}$, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. Zur Lsg. des rohen Ba-Salzes
in 5–10 Teilen W. gibt man die halbe Gewichtsmenge $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ in wenig h. W.
Zur Analyse in viel h. W. lösen u. einengen. Krystallin. Krusten. — *Glycerin- β -
phosphorsäure*. Man schüttelt das vorige eine Stde. mit etwas weniger n. H_2SO_4 ,
als zum Ausfällen von $\frac{2}{3}$ des gesamten Ba' notwendig, filtriert, dunstet im Vakuum
über P_2O_5 ein, löst in absol. A. u. dunstet das Filtrat nochmals ein. Sirup, recht
beständig. — *Ba-Salz*, $\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_6\text{PBa} + \text{H}_2\text{O}$ (II.). Säure in A. lösen, mit W. verd.,
 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ bis zur alkal. Rk. zugeben, CO_2 einleiten, Filtrat eindampfen. Sll. in W.,
mit A. Fällung. — *Dimethylester des Glycerin- β -phosphorsäuredimethyläthers*, $\text{C}_7\text{H}_{17}\text{O}_6\text{P}$
(IV.). II. wird mit Na_2CO_3 oder Na_2SO_4 in das Na-Salz, dieses mit AgNO_3 in das
Ag-Salz übergeführt (Fällung durch A. vervollständigen), letzteres in 8 Moll. CH_3J
eingetragen, nach Zusatz von 3 Moll. Ag_2O gekocht. Schwach arom. riechende
Fl., $\text{Kp}_{0.8}$ 126–128°, ll. in A., Ä., wl. in W. — *Glycerin- α -phosphorsaures Ba* (I.).
Man versetzt 10 g rohes Ba-Salz mit ca. 3,4 g $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, saugt nach mehreren Stdn.
ab, engt das Filtrat ein, läßt erkalten, filtriert nochmals, kocht einige Min., saugt
den Nd. h. ab, wäscht mit h. W. u. reinigt das Salz durch 5- bis 6-maliges Lösen in
k. W., Filtrieren u. Kochen. — Einfacher ist die Darst. des *Dimethylesters des Glycerin- α -
phosphorsäuredimethyläthers*, $\text{C}_7\text{H}_{17}\text{O}_6\text{P}$ (III.). Zur konz. wss. Lsg. des rohen Ba-
Salzes gibt man 2 Moll. AgNO_3 u. das gleiche Vol. A. Der hellgelbe Nd. besteht aus
dem Ag-Salz der α -Säure, wenig Ag-Salz der β -Säure u. dem Ba-Doppelsalz der
 β -Säure [infolge des bei der Umsetzung gebildeten $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$] u. wird wie oben methy-
liert. $\text{Kp}_{0.8}$ 124–126°, $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = -2,63^\circ$ bzw. $-3,28^\circ$ (in A.), sonst völlig wie IV.
Ausbeute ca. 10% (berechnet auf das ganze Salzgemisch), also ungefähr dem Gehalt
des Lecithins an α -Säure (15–20%) entsprechend. — Verwandelt man jedoch das
rohe Ba-Salz über das Na-Salz in ein Gemisch der Ag-Salze beider Säuren u. methyliert
dieses, so erhält man ein Estergemisch von $[\alpha]_{\text{D}} = -0,7^\circ$ bzw. $-1,3^\circ$. Bei einem
Gehalt von 80% an β -Verb. würde sich daraus für reines III. $[\alpha]_{\text{D}} = -3,5^\circ$ bis
 -6° berechnen. — Auch in dem aus Erbsenmehl extrahierten Phosphatid konnten
erhebliche Mengen α -Säure in Form des Esters III. nachgewiesen werden; letzterer
zeigte $[\alpha]_{\text{D}} = -2,42^\circ$ (in A.). — *Ba-Salz des Glycerin- α -phosphorsäuredimethyläthers*,
 $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_6\text{PBa} + \text{H}_2\text{O}$ (V.). Wurde bei der Hydrolyse von III. ($[\alpha]_{\text{D}} = -2,63^\circ$) mit
 5% ig. HCl (Rohr, 24 Stdn.) gelegentlich gewonnen. Blättchen aus 50% ig. A., sl.
in h., weniger l. in k. W. $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = +3,11^\circ$ (in W.), berechnet für wasserfreies Salz.
(Helv. chim. Acta 9, 3–23.)

LINDENBAUM.

P. Karrer und P. Benz, Die Spaltung der Glycerin- α -phosphorsäure in optisch
aktive Formen. Aus Acetonglycerin synthetisierte Glycerin- α -phosphorsäure wird in
das Ba-Salz übergeführt. Zur Lsg. von 5 g desselben in k. W. gibt man 6,8 g Chinin-

sulfat in sd. W., kocht u. filtriert. Die beim Erkalten ausfallenden Nadeln von *glycerin- α -phosphorsaurem Chinin*, $(C_{20}H_{24}O_2N_2)_2 \cdot C_3H_9O_6P$, zeigten nach zweimaligem Umkrystallisieren aus W. F. 155°, $[\alpha]_D = -147,5^\circ$ (in A.). Zur Zerlegung wurde das Salz in h. W. gel., $Ba(OH)_2$ -Lsg. bis zur alkal. Rk. zugesetzt, CO_2 eingeleitet, Filtrat nach Extraktion mit Chlf. eingeengt u. das *glycerin- α -phosphorsaure Ba* mit A. gefällt. Es zeigte in 2%ig. wss. Lsg. im 2 dm-Rohr keine Drehung. Daher wurde es nach dem im vorst. Ref. angegebenen Verf. in den *Dimethylester des l-Glycerin- α -phosphorsäuredimethyläthers*, $C_7H_{17}O_6P$, übergeführt. Derselbe zeigte $Kp_{0.4} 110^\circ$, $[\alpha]_D = -1,76^\circ$ (in A.). Die Spaltung war also unvollkommen, da aus Lecithin dargestellter Ester einen Höchstwert von $-3,2^\circ$ ergeben hatte. (Helv. chim. Acta 9. 23—25. Zürich, Univ.)

LINDENBAUM.

G. Weißenberger, F. Schuster und H. Pamer, *Zur Kenntnis organischer Molekülverbindungen. XII. Die Chloressigsäuren und das Pentachloräthan*. (XI. vgl. S. 2303.) Unterss. an den drei Chloressigsäuren zeigten, daß die *Mono-* u. *Dichloressigsäure* mit Aceton, Essigsäuremethyl- u. Äthylester u. Äthyläther Molekülverb. des Typus 1:1 liefern, während *Trichloressigsäure* eine nicht zu interpretierende Kurve gibt. Da die Gruppen $\equiv CCl$ u. $\equiv CCl_2$ kein Restvalenzkraftfeld besitzen, so ist anzunehmen, daß in den zwei ersten Molekülverb. das Carboxyl die Bindungsstelle abgibt u. das Cl lediglich aktivierend wirkt. Im Falle der Trichloressigsäure tritt dann die bereits früher untersuchte Gruppe $\equiv CCl_3$ in Konkurrenz mit dem Carboxyl, was die Resultate verschleiert. Andererseits zeigt Dichloressigsäure in Bzl. eine positive, *Pentachloräthan* dagegen eine negative Kurve, was, da das Carboxyl auf Bzl. nicht anspricht, die obigen Erwägungen stützt. Da CCl_4 keine Molekülverb. liefert, erscheint es wahrscheinlich, daß das Valenzzentrum am C-Atom liegt u. zwar nur, wenn neben 3 Cl-Bindungen eine Bindung nach H oder C gerichtet ist. *Pentachloräthan* gibt in Aceton, Essigsäuremethyl u. -äthylester u. Äthyläther negative Kurven, welche Molekülverb. im Verhältnis 1:1 wahrscheinlich machen. Ferner wurden die Mischungswärmen der genannten Systeme untersucht u. im allgemeinen Übereinstimmung mit den Resultaten der Dampfdruckkurven erhalten, d. h. dem Minimum der Dampfdruckkurve entspricht ein Maximum der Wärmetönung. Die spez. Wärmen wurden für *Pentachloräthan* bei 18—53° zu 0,219 u. für *Essigsäuremethylester* bei 18—42° zu 0,502 gefunden. (Monatshefte f. Chemie 46. 281—89. 1925.)

TAUBE.

G. Weißenberger, F. Schuster und H. Pamer, *Zur Kenntnis organischer Molekülverbindungen. XIII. Studien zur Berechnung von Dampfdruckkurven*. (XII. vgl. vorst. Ref.) Vff. unterziehen das Funktionspaar $p_1 = P_1 (1 - x)^a$; $p_2 = P_2 x^a$ von MARGULES einer Nachprüfung an den binären Systemen der Chloressigsäuren u. dem *Pentachloräthan* (l. c.). Die Gleichungen liefern $\alpha = (\lg p_1 - \lg P_1) / \lg (1 - x)$, doch konnten von 18 Systemen nur 6 in Übereinstimmung mit dieser Formel gebracht werden; in sämtlichen Fällen von Nebenvalenzbetätigung ist $\alpha > 1$. In den übrigen 12 Systemen zeigt α eine Kurve, deren Maximum einem einfachen Molverhältnis entspricht. Da α bei Annäherung an den reinen Stoff einem Grenzwert zustrebt, läßt sich dieser durch graph. Extrapolation für den Molbruch 1 errechnen u. es folgt hieraus:

$$\alpha = a + b (1-x)^m x^n$$

(vgl. Monatshefte f. Chemie 45. 437; C. 1925. II. 1425), wo a den Grenzwert, b eine Konstante u. m u. n die Molzahlen sind. Nach der so erweiterten Formel:

$$p_1 = P_1 (1 - x)^{a+b (1-x)^m x^n}$$

können von 18 Systemen 10 in befriedigende Übereinstimmung mit der Messung gebracht werden. (Monatshefte f. Chemie 46. 291—94. 1925.)

TAUBE.

G. Weißenberger, F. Schuster und J. Lielacher, *Zur Kenntnis organischer Molekülverbindungen. XIV. Die Chlorphenole und das Bromoform*. (XIII. vgl. vorst. Ref.) Unterss. an den Systemen *p-Chlorphenol* in Aceton, Essigsäuremethylester, Methyl-

alkohol u. Bzl. zeigen, daß sich das Chlorphenol qualitativ dem Phenol vollkommen analog verhält, jedoch Molekülverb. vom Typus 1:1 bildet. Die Stärke des Restvalenzkraftfeldes bleibt gegenüber dem Phenol unverändert. Um weitere Aufschlüsse über die Gruppe $-\text{CCl}_3$ zu gewinnen, wurden ferner binäre Systeme mit Bromoform untersucht u. zu diesem Zweck zunächst die van der Waalschen Konstanten zu $a = 12,9$, $b = 0,0731$ u. die spez. Wärme zu $0,124$ bestimmt. In den Systemen *Bromoform-Aceton* u. *Bromoform-Essigsäuremethylester* decken sich die Dampfdruckkurven nach *RAOULT-VAN'THOFF* u. *VAN LAAR* vollkommen, es liegt eine Molekülverb. 1:1 vor. Im Falle des Systems *Bromoform-Äthyläther* liegt die van Laarsche Kurve ein wenig über der *Raoult-van't Hoff*schen, die Differenzkurven ergeben beide eine Molekülverb. 1:1. Die Stärke des Nebenvalenzkraftfeldes ist im Bromoform beträchtlich schwächer als im Chlf. (Monatshefte f. Chemie **46**. 295—300. 1925.) TAUBE.

G. Weißenberger, F. Schuster und J. Lielacher, *Zur Kenntnis organischer Molekülverbindungen*. XV. *Aromatische Amine*. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Das System *Anilin-Aceton* zeigt eine Molekülverb. 1:1 an, die Dampfdruckkurven nach *RAOULT-VAN'THOFF* u. *VAN LAAR* fallen zusammen. Im System *Anilin-Essigsäuremethylester* zeigt die Differenzkurve ein Minimum bei $0,4$, die Kurve der Mischungswärme ein Maximum bei $0,6$. Die Verschiebung wird durch Assoziation der Komponenten hervorgerufen; es liegt eine Molekülverb. 1:1 vor. Das System *Anilin-Methylalkohol* liefert nur nach *VAN LAAR* eine negative Kurve, welche eine Molekülverb. 1:1 anzeigt. Im System *Anilin-Chloroform* fallen die berechneten Kurven mit den experimentell gefundenen zusammen, es liegt somit keine Molekülverb. vor, die Mischungswärme ist dementsprechend unmeßbar klein. Das System *Anilin-Benzol* liefert positive Differenzkurven, was auf Assoziation hindeutet. Die Systeme *Dimethylanilin-Aceton*, *Essigsäuremethylester* u. *Methylalkohol* sind im Gegensatz zu den Kurven des unsubstituierten Amins positiv. Das System *Dimethylanilin-Chloroform* besitzt eine Molekülverb. 1:1, das Maximum der Wärmetönung ist nach $0,6$ verschoben (s. o.). Das System *Dimethylanilin-Benzol* zeigt positive Differenzkurven, Molekülverb. liegen nicht vor. Im allgemeinen verhalten sich die arom. Amine den Phenolen analog, die NH_2 -Gruppe ist bzgl. des Restvalenzkraftfeldes der OH -Gruppe gleichzusetzen, der Ersatz der H-Atome des Amins durch Alkyl entspricht der Verätherung des phenol. Hydroxyls; das Restvalenzkraftfeld der arom. Amine u. ihrer Derivv. ist bedeutend schwächer als das der Phenole. (Monatshefte f. Chemie **46**. 301—07. 1925. Wien, Univ.) TAUBE.

Louis Longchambon, *Über die Weinsäuren*. Es ist Vf. gelungen, die bisher scheinbar noch niemals in absol. reiner Form erhaltene *anti-Weinsäure* völlig rein darzustellen, u. zwar sowohl wasserfrei als mit $1\text{H}_2\text{O}$. Sie verhält sich also nach dieser Richtung wie die Traubensäure. Im Anschluß an diese Verss. konnte auch die *d-Weinsäure* in ein Hydrat übergeführt werden. — *anti-Weinsäurehydrat*, $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6 + \text{H}_2\text{O}$. Man kocht d-Weinsäure in überschüssiger wss. NaOH ca. 3 Stdn., säuert mit HCl an, gibt CaCl_2 zu, zerlegt die Ca-Salze mit H_2SO_4 (1:1 Vol.) u. engt die Fl. ein. Beim Erkalten fällt fast sämtliche Traubensäure aus, nach weiterem Einengen das *anti-Weinsäurehydrat*, das zur Trennung von CaSO_4 noch mehrfach umkrystallisiert wird. Große triklin Tafeln, $a:b:c = 0,6424:1:0,7925$, $\alpha = 90^\circ 16'$, $\beta = 96^\circ 31'$, $\gamma = 75^\circ 46'$, F. oberhalb 120° im Krystallwasser, D. 1,668. — *Wasserfreie anti-Weinsäure*. Durch Krystallisieren aus stark schwefelsaurer Lsg. oder besser aus W. oberhalb 50° . Orthorhomb. Oktaeder, $a:b:c = 0,9467:1:1,2265$, F. $159-160^\circ$, D. 1,737. — *d-Weinsäurehydrat*. Durch Impfen einer gesätt. Lsg. bei 0° oder tiefer mit einem Krystall des Hydrats oder einem solchen von saurem Li-Tartrat. Orthorhomb. Krystalle, $a:b:c = 0,4716:1:0,5304$, D. 1,582, linksdrehend wie die Krystalle der wasserfreien Form. Verliert das H_2O schon bei Zimmertemp. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 473—74.) LINDENBAUM.

A. R. Bowen, H. G. Shatwell und A. W. Nash, *Die thermische Zersetzung der Cellulose unter hydrierenden Bedingungen.* Behandlung der Cellulose (Baumwolle) mit H ohne Katalysatoren: Die Baumwolle wurde in einer H-Atmosphäre 9 Stdn. bis zur Maximaltemp. von 429° erhitzt. Während der Verss. nahm der Druck in dem benutzten Autoklaven um durchschnittlich 3,5 at zu; demnach ist kein H verbraucht worden; oder die aus der Baumwolle entwickelte Gasmenge ist größer als die absorbierte H-Menge. Das Gas bestand aus H (90—99°) mit geringen Beimengungen von CO₂, CO u. CH₄. An fl. Prodd. wurden etwas Leichtöl u. Teer erhalten. — Behandlung der Cellulose mit H in Ggw. von Katalysatoren: Als Katalysatoren wurden Nickeloxalat u. Ferrivanadat verwandt, die auf der Faser gefällt wurden; danach wurde die Cellulose bei 110° getrocknet. Die Maximaltemp. bei der Einw. von H betrug 400 bis 440°. In Ggw. von Nickel wurde fast die gesamte Cellulose in Fl. oder Gase umgewandelt, während der Vanadiumkatalysator geringere Wirksamkeit zeigte. Der mit Ni erhaltene Teer (22,9 g aus 100 g Cellulose) war vollständig in Chlf. l.; D_{15,5} 1,0840; Gehalt an Carbonsäuren: 0, an Phenolen: 2,31%, an Neutralöl: 76,85%. Das Neutralöl bestand nicht aus reinen KW-stoffen, sondern war sauerstoffhaltig (1,2—5,9% O). — Destruktive Dest. von Cellulose: Von den verwandten Katalysatoren (Nickeloxyd, Ferrivanadat u. Vanadinpentoxyd) verursacht NiO die größte Gasentw. u. den größten Koksrückstand. (Journ. Soc. Chem. Ind. **44**. T. 507—11. 526. 1925. Birmingham, Univ.)

ZANDER.

P. Billon, *Über die Reduktion von Oximen mit Natrium und absolutem Alkohol.* Zerlegung der so erhaltenen racemischen Amine in ihre optischen Antipoden mittels d-Weinsäure. Vf. hat Oxime von Ketonen der allgemeinen Formeln Ar·CO·Ar' u. Ar·CO·Alk mit Na u. absol. A. nach dem vor einiger Zeit (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1054; C. **1925**. I. 483) angegebenen Verf. zu rac. Aminen reduziert. Die Ausbeuten betragen 85% u. mehr. — *p-Tolylphenylaminomethan.* Aus den stereoisomeren *p-Tolylphenylketoximen.* Kp₇₆₀ 296°, Kp₁₄ 172°. Wurde auch krystallisiert erhalten. F. 40°. *Hydrochlorid*, F. ca. 250° (Zers.). — *p-Anisylphenylaminomethan.* Aus den stereoisomeren *p-Anisylphenylketoximen.* Kp₃₀ 205°. *Hydrochlorid*, F. 190° (bloc Maquenne). — *1-Phenyl-1-aminoäthan.* Aus Acetophenonoxim. Kp₇₆₀ 183°, Kp₂₂ 84°. *Hydrochlorid*, F. 158°. — *1-Phenyl-1-aminopropan.* Aus Propiophenonoxim. Kp₇₆₀ 206°, Kp₁₆ 88°. *Hydrochlorid*, F. 194°. — *1-Phenyl-1-aminobutan.* Aus Propylphenylketoxim. Kp₇₆₀ 220°, Kp₁₄ 102°. *Hydrochlorid*, F. 265°. — *1-Phenyl-2-methyl-1-aminopropan.* Aus *i*-Propylphenylketoxim. Kp₇₆₀ 213°, Kp₁₄ 95°. *Hydrochlorid*, F. 275°. — Von diesen Aminen ist bisher nur das 1-Phenyl-1-aminoäthan in die opt. Antipoden zerlegt worden (vgl. LOVEN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **29**. 2315 [1896]). Vf. hat auch das 1-Phenyl-1-aminopropan durch fraktionierte Krystallisation des *d-Tartrats*, F. 166°, aus absol. A. zerlegt. *d-Amin*, [α]_D = +9° 30'. *l-Amin*, [α]_D = -10° 30'. *d-Hydrochlorid*, F. 180°. *l-Hydrochlorid*, F. 195°. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 470—73.)

LINDENBAUM.

Franz Hein und W. Eißner, *Über das Tetraphenylchrom (C₆H₅)₄Cr.* VI. Mitt. *Über chromorganische Verbindungen.* (V. vgl. HEIN u. SPAETE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 899; C. **1924**. III. 939.) Von den Organochromverb. haben die Tetraphenylchromsalze besonderes Interesse wegen ihrer B. aus dem Pentaphenylchromhydroxyd, ihrer relativen Beständigkeit u. bzgl. der Wertigkeit des Cr. Nach vielen Verss. gelang es, das der Base (C₆H₅)₄CrOH u. ihren Salzen zugrunde liegende Radikal, das *Tetraphenylchrom*, (C₆H₅)₄Cr, der ersten eigentlichen Organochromverb. durch Elektrolyse des (C₆H₅)₄CrJ in fl. NH₃ mit Hilfe des von SCHLUBACH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**. 2818; C. **1922**. I. 315) empfohlenen App. mit auswechselbarer Kathode darzustellen. Das (C₆H₅)₄Cr scheidet sich als kupferroter, glänzender oder orangeroter, krystallin. Belag auf der Kathode ab, der leicht Diphenyl abspaltet u. im frischen Zustand glatt unter B. von (C₆H₅)₄CrOH in A. in Lsg. geht. Die intensive Farbe des (C₆H₅)₄Cr, ebenso

die des Hydroxyds u. der Salze, zeigt den Chromophor-Charakter des Radikals. Das Cr scheint in der Verb. vierwertig zu sein. Da mangels eines geeigneten Lösungsm. Mol.-Gew.-Bestst. nicht ausgeführt werden konnten, halten die Verff. es für nötig, dem Tetraphenylchrom die Formel $[(C_6H_5)_4Cr]_n$ zu geben, wobei n im Vergleich mit den analogen Pb- u. Sn-Verbb. gleich 2 sein könnte, u. im Hinblick auf die farbigen Hexa-aryldiphenylplumbane (KRAUSE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. 173; C. **1920**. I. 705) glauben sie, daß sich in indifferenten Medien Dissoziationsgleichgewichte mit der monomeren Form einstellen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 362—66. Leipzig, Univ.) BRAUNS.

S. Nametkin und **D. Kursanow**, *Die Dehydratation des Benzylalkohols nach der Xanthogenatmethode*. Bei den bisherigen Verss. zur Dehydratation des Benzylalkohols wurden zu stark wirkende W.-Abspaltungsmittel angewendet u. keine eindeutig definierbaren Rk.-Prodd. erhalten. Vff. versuchten die in anderen Fällen sehr gut bewährte Tschugaeffsche Xanthogenatmethode. Die Zers. des Benzylxanthogensäuremethylesters beim Erhitzen ergab Stilben, wahrscheinlich entstanden durch Zusammenlegung je zweier bei der Rk. frei werdender Radikale $C_6H_5-CH=$. — Benzylxanthogensäuremethylester, $C_9H_{10}OS_2$, aus der Säure mit Methylsulfat, aus A. u. Ä., F. 29° . — Benzylxanthogensäureäthylester, $C_{10}H_{12}OS_2$, wie vorst. Verb. aus Diäthylsulfat, gelbes Öl, Kp.₁₄ $170-171^\circ$. — Benzylxanthogensäureamid, C_8H_9ONS , aus dem Methylester u. alkoh. NH_3 , aus A., F. $61,5-62^\circ$. — Verb. $C_{28}H_{26}S$, als Nebenprod. der Zers. des $C_9H_{10}OS_2$, welches bei 350° nicht überdestillierte, ll. in Chlf., wl. in Bzl. u. Essigester, swl. in A. u. Ä., aus Bzl. als hellgelbe Substanz, F. $184-185^\circ$. (Journ. f. prakt. Ch. [2] **112**. 164—68. Moskau, Univ.) LEHMANN.

S. Nametkin und **Lydia Brüssowa**, *Über die quantitative Bestimmung von ungesättigten Kohlenwasserstoffen in Gegenwart von gesättigten und tricyclischen; zugleich ein Beitrag zur Lösung der Frage nach der Richtung der Dehydratation der Alkohole*. In der von PRILESCHAJEFF gefundenen Rk. zwischen Ä.- u. Chlf.-Lsgg. von Benzoylhydroperoxyd mit KW-stoffen ist eine sichere Methode gegeben, um zu entscheiden, ob ein KW-stoff eine Doppelbindung oder einen dreigliedrigen Ring enthält. Die Anwendung der Methode auf die bei der Dehydratation von Alkoholen gebildeten KW-stoffe läßt erkennen, ob die Rk. zur B. einer 1,2-Doppelbindung geführt hat oder in Richtung 1,3 unter B. eines dreigliedrigen Ringes vor sich gegangen ist. Bei einigem Überschuß von Benzoylhydroperoxyd verlief die Rk. mit ungesätt. KW-stoffen quantitativ, während die isomeren tricycl. KW-stoffe, wie Tricyclen, cyclo-Fenchen unter gleichen Bedingungen mit Benzoylhydroperoxyd gar nicht reagierten. Die Menge des nicht verbrauchten Benzoylhydroperoxyds ist titrierbar, und somit ist die Methode zu einer schnellen Best. der Richtung des Verlaufs der Dehydratation anwendbar; außerdem kann sie zur Best. der Zahl der Doppelbindungen in einem KW-stoff dienen. Von der Chlf.-Lsg. des Benzoylhydroperoxyds mit $0,4-0,5\%$ akt. O wurde die doppelte theoret. Menge mit je $0,2-0,3$ g KW-stoff 2—3 Tage lang stehen gelassen und ein Leervers. daneben angesetzt. Nach Zugabe von KJ-Lsg. u. 10% ig. H_2SO_4 wurde titriert. An einer Reihe von Beispielen wird die Brauchbarkeit der Methode dargelegt: *Menthen* wurde zu 99% , *Limonen* (Schimmel) zu 100% oxydiert; *Tricyclen* enthielt $3,5\%$ ungesätt. KW-stoff, wahrscheinlich Camphen; *Fenchocyclen* (cyclo-Fenchen), $C_{10}H_{16}$, war fast reiner tricycl. KW-stoff; α -Methylcamphen, F. $44-48^\circ$, enthielt 98% ungesätt. KW-stoff u. 2% vermutlich von Methylcyclen, F. $110,5-111^\circ$. — Bornylen, aus A., F. $101,5-102,5^\circ$, enthielt 80% Bornylen u. 20% Tricyclen; von einem Gemisch von gesätt. u. ungesätt. KW-stoff (Menthan u. Limonen) wurde durch Benzoylhydroperoxyd nur der ungesätt. KW-stoff oxydiert. (Journ. f. prakt. Ch. [2] **112**. 169—76. Moskau, Univ.) LEHM.

S. C. J. Olivier, *Über die Einführung von zwei Atomen Brom in Acet-m-toluidid*. Für die aus Acet-m-toluidid darstellbaren Dibromverbb., 1-Methyl-3-amino-4,6-dibrombenzol (I) u. 1-Methyl-3-amino-2,6-dibrombenzol (II), geben NEVILLE u. WINTHER

(Ber. Dtsch. Chem. Ges. **13**. 971 [1880]) F. 74,6—75,5° bezw. F. 33—35° an. Vf. findet für **I** 76—77°, für **II** dagegen 66,5—67°; NEVILE u. WINTHER haben statt **II** offenbar ein eutekt. Gemisch von **I** u. **II** in Händen gehabt. — Die Behandlung von *m*-Toluidin in essigsaurer Lsg. mit 2 Moll. Br ergab große Menge Tribrom-*m*-toluidin; dagegen entstanden bei Verwendung von Acet-*m*-toluidid, ebenfalls in essigsaurer Lsg., keine nennenswerten Mengen des Tribromderiv.; dementsprechend ist die B. des Monobromderiv. nur gering. Nach dem Abkühlen u. längerem Stehenlassen wird mit alkoh. Kalilauge verseift, W. zugesetzt, mit H₂SO₄ neutralisiert, der A. verdampft u. filtriert. Ausbeute an Rohprod. ca. 93% der Theorie. Fraktionierte Krystallisation ergab **I** (F. 76—77°); aus den Mutterlaugen wurde ein Prod. vom F. 33—35° isoliert (eutekt. Gemisch von **I** u. **II**; vgl. NEVILE u. WINTHER, l. c.). Verss., das Gemisch durch fraktionierte Krystallisation aus A. zu trennen, waren ohne Erfolg. Die Isolierung von **II** gelang schließlich durch Fraktionierung des nicht verseiften Rohprod. (Gemisch der Dibromacet-*m*-toluidide) aus A. Aus den ersten Fraktionen wurde 1-Methyl-3-acetylamino-4,6-dibrombenzol, F. 171,5—172,5°, swl. in k. A., isoliert, das bei der Verseifung **I** ergab. Aus den Mutterlaugen wurde 1-Methyl-3-acetylamino-2,6-dibrombenzol, F. 117—128°, erhalten, farblose Nadeln aus A., ll. in A., das bei der Verseifung **II** ergab. Gesamtausbeute an **II** ca. 10%. Die Konstst. von **I** u. **II** wurden durch Überführung in 2,4-Dibrombenzoesäure, F. 172,5—173,5°, bezw. 2,6-Dibrombenzoesäure, F. 150—151°, bewiesen. — Für die Gemische von **I** u. **II** wird die F.-Kurve gegeben, aus der sich ergibt, daß die von NEVILE u. WINTHER erhaltene Verb. (F. 33—35°) das eutekt. Gemisch von **I** u. **II** mit ca. 55% **I** darstellt. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**. 1109—12. 1925. Wageningen.)

ZANDER.

L. Elion, Mitteilung über die Chlorierung der *o*- u. *p*-Aminobenzoessäure. Beim Einleiten von Chlor in Anthranilsäure in Eg.-Lsg. unter Wasserkühlung entsteht bald ein Nd., der nach Zusatz von Natriumsulfidlg. abfiltriert, gewaschen u. mit NaOH wieder in Lsg. gebracht wird. Das gleichzeitig in geringen Mengen entstandene 2,4,6-Trichloranilin bleibt hierbei ungelöst u. wird abgetrennt. Nach dem Ansäuern fällt die 3,5-Dichlor-2-aminobenzoessäure, C₇H₅O₂NCl₂, in 75% Ausbeute der Theorie aus, kleine, farblose Nadeln aus A., F. 231°. — 3,5-Dichloracetylanthranil, C₉H₅O₂NCl₂, aus vorigem durch 1/4-stdg. Kochen mit Acetanhydrid, Tafeln aus A., F. 151°. — 3,5-Dichlor-2-acetylamino-aminobenzoessäure, C₉H₅O₃NCl₂, aus vorigem durch Kochen mit verd. NaOH, in dem bald Lsg. eintritt, u. Ansäuern, farblose Nadeln aus A., F. 203°. — 3,5-Dichlor-4-aminobenzoessäure, analog der Anthranilsäure aus *p*-Aminobenzoessäure, Ausbeute ca. 35% der Theorie; die Ausbeute ist hier geringer, da sich größere Mengen 2,4,6-Trichloranilin bilden. Die in *p*-Stellung zur Aminogruppe befindliche Carboxylgruppe wird demnach leichter durch Cl verdrängt als die *o*-ständige. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**. 1106—08. 1925. Utrecht, Univ.) ZAND.

Géza Zemplén, Bemerkungen zur Arbeit von Ernst Waser: Untersuchungen in der Phenylalaninreihe. VI. Decarboxylierung des Tyrosins und des Leucins. Vf. weist die von WASER (S. 1400) an seinem Verf. zur Darst. von Tyramin geübte Kritik zurück. In der Patentschrift ist von Diphenylmethan nicht die Rede, sondern von Diphenylamin, welches besondere Vorteile bietet. (Helv. chim. Acta **9**. 115. Budapest, Techn. Hochsch.)

LINDENBAUM.

L. Ruzicka und **E. A. Rudolph**, Höhere Terpenverbindungen. XXVII. Zur Kenntnis der Azulene. (XXVI. vgl. RUZICKA, MEYER u. PFEIFFER, S. 374.) Die Unters. des blauen KW-stoffs Azulén bietet erstens wegen seiner auffallenden Färbung, zweitens wegen seiner möglichen Beziehung zu den Sesquiterpenen Interesse. Denn das Azulén ist isomer mit dem Cadalin, u. bei der Dehydrierung mancher Sesquiterpene mit S entsteht eine blaue Substanz mit den Eigenschaften des Azuléns (vgl. RUZICKA, PONTALTI u. BALAS, Helv. chim. Acta **6**. 859; C. 1924. I. 43). Vff.

haben den KW-stoff außer aus Schafgarbenöl auch aus Kamillenöl isoliert, welches mindestens 4,5% davon enthält u. wohl das azulenreichste äther. Öl sein dürfte. Die Azulene beider Herkunft sind völlig ident. Die Formel $C_{15}H_{18}$ wurde durch Analysen des über das Pikrat gereinigten KW-stoffs, des Pikrats u. Styphnats bestätigt. Die von KREMERS (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 717; C. 1923. III. 48) aufgestellte Konst.-Formel ist zweifellos unrichtig. Ein derartiges Benzofulvenderiv. könnte höchstens gelb sein u. sollte glatt zu Methylphthalsäure oxydiert werden, während Vff. mit alkal. $KMnO_4$ -Lsg. weder eine Phthalsäure noch Aceton erhielten, sondern nur CO_2 u. ein Gemisch niederer Fettsäuren. Daraus folgt, daß Azulen keinen aromat. Ring enthält. — Verss., das Azulen mittels HCO_2H zu isomerisieren, waren ohne Erfolg. — Nicht ganz zutreffend sind auch die Angaben von SHERNDAL u. KREMERS über die Red. des Azulens. Mit Na tritt sowohl in feuchtem Ä. wie in A. Entfärbung ein, aber definierte Prodd. konnten nicht gefaßt werden. Erfolgreicher war die Red. mit Na u. Amylalkohol. Es entsteht ein *Hexahydroazulen* (allerdings nicht ganz O-frei erhalten), also ein Isomeres der gewöhnlichen Sesquiterpene. Daß aber kein Hydronaphthalinderiv. vorliegt, zeigt die Dehydrierung mit S, welche viel energischer verläuft wie bei den Sesquiterpenen u. Azulen zurückliefert. Die Oxydation des Hexahydroazulens mit alkal. $KMnO_4$ ergab nichts Brauchbares. — Bei der katalyt. Hydrierung des Azulens soll nach SHERNDAL ein KW-stoff $C_{15}H_{26}$, nach KREMERS $C_{15}H_{28}$ entstehen. Beide Autoren haben die Formeln nur aus dem H-Verbrauch erschlossen u. geben übrigens übereinstimmende physikal. Konstanten an. Vff. fanden, daß die Formel $C_{15}H_{26}$ richtig ist u. die Mol.-Refr. am besten für einen bicycl., einfach ungesätt. KW-stoff stimmt. Diese KW-stoffe scheinen also eine schwer hydrierbare Doppelbindung zu enthalten, wie manchmal bei höheren Terpenverbb. beobachtet.

Zur Entscheidung der Frage, ob das Azulen zu den Sesquiterpenen Beziehungen hat, wurden die blauen KW-stoffe näher untersucht, welche RUZICKA u. PONTALTI (l. c.) durch Dehydrierung einiger Sesquiterpene erhalten hatten. Die aus Eucalyptusglobulus-Öl u. Guajol gewonnenen Prodd. (*Eucazulen* u. *Guajazulen* genannt) besitzen zwar die gleiche Zus. u. fast denselben Kp. wie das Azulen aus Schafgarben- oder Kamillenöl (von nun an *Chamazulen* genannt), aber die FF. der Pikrate u. Styphnate zeigen, daß die KW-stoffe verschieden sind. Ob auch Eucazulen u. Guajazulen unter sich verschieden sind, ist noch ungewiß. Besonders wertvoll ist die B. eines Azulens aus dem wohldefinierten, obwohl seiner Konst. nach unbekannten Guajol, einem bicycl., einfach ungesätt. Alkohol der Formel $C_{15}H_{26}O$. Aus seinem Anhydrierungsprod., Guajen, erhielten Vff. durch gemäßigte Hydrierung ein *Dihydroguajen*. [Guajol selbst ist zu einem Tetrahydroguajen hydriert worden, was wieder auf eine schwer hydrierbare Doppelbindung schließen läßt.] Da dieses nun fast die gleichen Konstanten aufweist wie obiges *Octohydrochamazulen*, so dürften auch dieses u. mithin das Chamazulen selbst bicycl. sein. Auch die prakt. Identität der Absorptionsspekttra beider Azulene (vgl. unten) läßt auf ihren sehr ähnlichen Bau schließen. Auch das Guajazulen liefert ein *Octohydroderiv.*, das nach der Mol.-Refr. bicycl., einfach ungesätt. ist, muß also gleichfalls bicycl. sein. Es erhebt sich nun die Frage, ob die beiden Azulene skelettident., d. h. nur durch verschiedene Lage der Doppelbindungen voneinander abweichend, oder skelettisomer sind. Im ersteren Falle sollten die Dehydrierungsprodd. der Octohydroderivv. ident. sein. Es ergab sich jedoch, daß Octohydrochamazulen von S in Chamazulen, Octohydroguajazulen (u. auch Dihydroguajen) in Guajazulen zurückverwandelt werden. Daher dürften die beiden Azulene skelettisomer sein, falls nicht etwa die Doppelbindung der Octohydroderivv. eine verschiedene Lage aufweisen sollte.

Vf. besprechen sodann die Arbeit von HERZENBERG u. RUHEMANN (S. 1336) u. sind der Ansicht, daß deren Folgerungen bzgl. der Identität ihrer auf verschiedenen Wegen gewonnenen blauen KW-stoffe der Nachprüfung durch Vergleich der Pikrate





u. Styphnate bedürfen. — Die Absorptionsspektren des Chamazulens u. Guajazulens (näheres vgl. Original) sind prakt. ident. Da die Octohydroderiv. nur eine geringfügige Absorption im äußersten Ultraviolett aufweisen, so muß man schließen, daß die Absorption der Azulene im sichtbaren Teil nur durch die Anordnung der Doppelbindungen, nicht durch das C-Gerüst bedingt ist. Aus der Identität der Spektren im sichtbaren Teil darf nicht auf Identität der KW-stoffe geschlossen werden, vielmehr ist eingehende Unters. im äußersten Ultraviolett erforderlich. — Aus den bisherigen Unterss. geht nur hervor, daß die Farbe der Azulene durch eine unbekannte Gruppierung von 5 C-Doppelbindungen (ohne aromat. Ring) in einem bicycl., dem mancher Sesquiterpene nahestehenden C-Gerüst bedingt wird. Ein stark ungesätt. Zentrum (z. B. 3-wertiger C) kommt nicht in Frage, da Entfärbung erst nach Aufnahme von 4–5 H eintritt.

Versuche. *Chamazulen*, $C_{15}H_{18}$. 1. Aus Schafgarbenöl. Dieses wird fraktioniert, die Fraktion Kp_{12} 110–170° mit PAe verd., unter starker Kühlung wenig H_3PO_4 (D. 1,7) zugesetzt, 5 Min. geschüttelt, absetzen gelassen, Säureschicht mit Eiswasser u. Ä. zerlegt. Das Prod. wird im Vakuum oder mit Dampf dest., in sd. A. in das Pikrat übergeführt, dieses mit w. 5%ig. NaOH zerlegt, Prod. in Ä. aufgenommen, dest. 2,8 kg Schafgarbenöl lieferten 46 g reines Azulen. — 2. Aus Kamillenöl. Wird vorher nicht dest., sonst wie beschrieben. Ausbeute 4,6%. Kp_{11} 159°, D_4^{18} 0,9881. *Pikrat*, $C_{21}H_{21}O_7N_3$, schwarze Nadeln aus A., F. 115°. *Styphnat*, schwarze Kryställchen aus A. oder CH_3OH , F. 95–96°. — *Eucazulen*, $C_{15}H_{18}$. Die Fraktion Kp_{12} 121 bis 135° des Eucalyptusglobulus-Öls wird weiter fraktioniert u. jede Fraktion für sich mit S in bekannter Weise dehydriert. Die Dehydrierungsprodd. werden gemeinsam, wie oben auf Azulen verarbeitet, doch ist hier längeres Schütteln mit H_3PO_4 erforderlich. Ausbeute 2–3% obiger Fraktion. $Kp_{0.5}$ ca. 135°. *Pikrat*, $C_{21}H_{21}O_7N_3$, schwarze Nadelchen aus A., F. 118–120°. *Styphnat*, aus A. oder CH_3OH , F. 122–23°. — *Guajazulen*, $C_{15}H_{18}$. Aus Guajol nach RUZICKA u. PONTALTI (l. c.) dargestelltes Guajen wird mit S dehydriert. Weiter wie oben. Ausbeute 20% (auf Guajen berechnet). Kp_{11} 164°, D_4^{18} 0,9759. *Pikrat*, $C_{21}H_{21}O_7N_3$, schwarze Nadelchen, F. 122°. *Styphnat*, schwarze Nadelchen aus CH_3OH , F. 105–106°. — *Hexahydrochamazulen*, $C_{15}H_{24}$, nach Dest. über Na $Kp_{0.1}$ 94–95°, D_4^{20} 0,9177, $n_D^{20} = 1,5200$. Enthielt noch über 1% O, der auch durch mehrfache Dest. über Na u. K (hierbei stets starke Zers.) nicht entfernt werden konnte. — *Octohydrochamazulen*, $C_{15}H_{26}$. Durch Hydrieren in k. Essigester (+ Pt) bei 0,1 at Überdruck. Entfärbung erst nach Aufnahme von ca. 2,5 H_2 . Dünnes Öl, Kp_{13} 119–121°, D_4^{20} 0,8932, $n_D^{20} = 1,4856$, oxydabel. — *Octohydroguajazulen*, $C_{15}H_{26}$. Darst. analog bei 60°. Kp_{11} 123–125°, D_4^{20} 0,8872, $n_D^{20} = 1,4834$, oxydabel. Entfärbt Br in CS_2 sofort unter HBr-Entw. — *Dihydroguajen*, $C_{15}H_{26}$. Darst. in k. Essigester. Kp_{15} 124–125°, D_4^{20} 0,8955, $n_D^{20} = 1,4894$ (Helv. chim. Acta 9. 118–40.)

LINDENBAUM.

L. Ruzicka und **Fr. Liebl**, *Über die Konstitution der Teresantalsäure*. Zunächst sei bemerkt, daß die Formeln I. („Camphenform“) u. II. („Campherform“), welche SEMMLER für die *Teresantalsäure* offen gelassen hat, nur zwei verschiedene Schreibweisen ein u. derselben Formel sind. — Aus der CO_2 -Abspaltung zu Santen ergibt sich, obwohl die Konst. des letzteren feststeht, weder die Stellung des CO_2H noch die Lage des aus Wahrscheinlichkeitsgründen angenommenen Dreiringes. Schon SEMMLER u. BARTELT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3101 [1907]) haben die Stellung des CO_2H aufzuklären versucht. Sie erhielten vom Teresantalsäuremethylester aus über das Teresantalol (den II. entsprechenden Alkohol) durch Einw. von PCl_5 auf dieses u. Red. des Chlorids einen fl. KW-stoff, den sie zwar als Teresantalan bezeichnen, der jedoch ein ungesätt. Isomeres des festen *Tricyclens* (III.) ist, wahrscheinlich durch Ringsprengung bei der Chlorierung entstanden. Vff. erhielten nun tatsächlich III., als sie das Teresantalol zum *Teresantalal* (dem II. entsprechenden Aldehyd) oxy-


dierten u. dessen Semicarbazon nach dem Verf. von WOLFF spalteten. III. lieferte mit Eg.-H₂SO₄ *i*-Bornylacetat, dieses *i*-Borneol (IV.) u. letzteres durch Oxydation *Campher*. Das CO₂H befindet sich demnach an der in II. bezeichneten Stelle. Noch nicht einwandfrei bewiesen ist die Lage des Dreiringes, aber die Anlagerung des OH an das C-Atom 2 beweist, daß dieses ein Bestandteil des labilen Ringes sein muß. Damit ist die Richtigkeit der Formel II. äußerst wahrscheinlich geworden. — *Teresantalol*. Eine Lsg. von Teresantalol (dargestellt nach SEMMLER u. BARTELT) in Bzl. wird mit einer Lsg. von K₂Cr₂O₇ in verd. H₂SO₄ mehrere Stdn. geschüttelt, dann



auf dem Wasserbad erhitzt, mit Soda versetzt u. der rohe Aldehyd übergeführt in das *Semicarbazon*, C₁₁H₁₇ON₃, Nadelchen aus CH₃OH, F. 217°. — *Tricyclen* (III.). Aus dem Semicarbazon mit NaOC₂H₅-Lsg. (Rohr, 180°, 8 Stdn.), mit W. verdünnen, mit PAe. ausziehen. Kp. 150—152°, F. ca. 55° (statt 64°), wahrscheinlich verunreinigt durch Camphen. (Helv. chim. Acta 9. 140—44. Zürich, Techn. Hochsch.) LB.

P. Schläpfer und **O. Stadler**, *Untersuchungen über den Cuprenteer. Beitrag zur Kenntnis pyrogener Acetylenkondensationen.* Bei der techn. Gewinnung des Cuprens durch Überleiten von Rohacetylen über Cu bei ca. 300° entsteht als Nebenprod. eine teerartige Fl., die Vff. als *Cuprenteer* bezeichnen. Nach Angaben des Elektrizitätsverkes Lonza, welches Vffn. das Untersuchungsmaterial zur Verfügung gestellt hat, erhält man 75—80% Cupren, 5,5—7% Cuprenteer u. 13—17% Abgase. Über die chem. Natur des Cuprens herrscht noch völliges Dunkel, es besteht aus hochmolekularen KW-stoffen mit wechselndem C- u. H-Gehalt, reaktionsträge, unl. — Vff. haben sich eingehend mit dem Cuprenteer befaßt. Er ist grünlichblau, ziemlich leichtfl., neutral, stark ungesätt. D.¹⁵ im Mittel ca. 0,89. Eine Probe enthielt 89,38% C, 9,78% H, 0,04% S, 0,80% O + N. Verbrennungswärme pro g = 10329 cal. Der Teer wurde durch fraktionierte Dest., zuerst unter at-Druck, dann im gewöhnlichen Vakuum, schließlich im Hochvakuum, in eine Reihe von Fraktionen zerlegt, die als Vorlauf, Benzol-, Toluol-, Xylol-, Mesitylen-, Naphthalin- u. Methylnaphthalinfraktion bezeichnet wurden. Zur Trennung der KW-stoffeihen u. Isolierung bezw. Identifizierung einzelner KW-stoffe dienten chem. u. physikal. Verff. Einzelheiten, Tabellen, Kurven vgl. Original. Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Cuprenteer ein ausgesprochen aromat., aber stark ungesätt. Teer ist. Der Hauptanteil besteht aus gesätt. aromat. KW-stoffen der Benzol- u. Naphthalinreihe nebst wenigen Vertretern der Anthracenreihe. Der Benzol- u. Naphthalinkern ist ein- u. mehrfach durch CH₃, C₂H₅, selten C₃H₇, substituiert. Als zweitwichtigste Körperklasse sind Olefine u. Styrole vorhanden; Hexen, Hepten u. Octen wurden nachgewiesen, höhere Olefine liegen nicht vor. Nur der Vorlauf enthält geringe Mengen Paraffine. Dieser Befund erklärt, daß der Teer auch keine Ringverbb. mit längeren Seitenketten enthält. Zur B. höherer Paraffine fehlt ja auch von Anfang an der H. Der Vergleich mit aus Acetylen nach

anderen Verff. u. bei höheren Temp. gewonnenen Teeren zeigt, daß sich der Cuprenteer von diesen durch seinen großen Gehalt an ungesätt. Bestandteilen unterscheidet, der wesentlich auf die niedrige Bildungstemp. zurückzuführen ist, während das Cu nur physikal. zu wirken scheint. — Von besonderem Interesse ist, daß in den hochsd. Fraktionen ($Kp_{0.5}$ 85—125°) ein *blauer KW-stoff* enthalten ist. Zur Isolierung desselben haben sich Vff. des für das Azulen angegebenen Verf. bedient. Es genügt, auf die Abhandlung von RUZICKA u. RUDOLPH (vorvorst. Ref.) zu verweisen. Die Ausbeute aus den genannten Fraktionen betrug 2,2—2,5%. Der KW-stoff zeigte $Kp_{0.7}$ 95—100°, D.¹⁵ 0,9889, 91,25% C, 8,61% H, Mol.-Gew. 170,3. Wird durch Red. entfärbt, nimmt 4Br additiv, 1Br substitutiv auf. *Pikrat*, schwarze Nadeln aus A., F. 118°, mit 58,29% C u. 4,72% H. Es scheint sich danach um den KW-stoff $C_{14}H_{16}$, ein nächst niederes Homologes des Azulens, zu handeln. — Bei der Einw. von konz. H_2SO_4 auf die verschiedenen Cuprenteerfraktionen tritt schon in der Kälte teilweise Kondensation der Olefine u. Styrole mit den aromat. KW-stoffen zu ca. 100° höher sd. Prodd. ein, z. B.:




Diese Rk. dürfte auch bei der üblichen Reinigung von KW-stoffgemischen mit konz. H_2SO_4 eine Rolle spielen u. kann Analysenfehler verursachen (vgl. SCHÜTZ, BUSCHMANN u. WISSEBACH, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 871; C. 1923. II. 1125). Bei der Benzol- u. Toluolfraktion bilden sich Kondensate zwischen Bzl. u. Toluol einerseits, Hexen u. Hepten andererseits, bei der Xylol- u. Mesitylenfraktion zwischen den aromat. KW-stoffen einerseits, Octen u. styrolartigen KW-stoffen andererseits. Analysen u. Konstanten dieser Prodd., die mehr oder weniger komplizierte Gemische darstellen, vgl. Original. (Helv. chim. Acta 9. 185—99. Zürich, Techn. Hochschule.) LB.

H. Rupe und **F. Fehlmann**, *Über neue Derivate des Campholcarbinols*. Das *Campholcarbinol*, $C_9H_{17} \cdot CH_2(OH)$, das RUPE u. LÄUGER (Helv. chim. Acta 3. 272; C. 1920. I. 800) aus dem Campholsäurephenylester dargestellt haben, läßt sich ebenso gut aus dem Äthylester gewinnen, wenn man die alkoh. Lsg. von 70 g schnell zu 65 g Na fließen läßt, mit Dampf dest. u. das Prod. über die Phthalestersäure reinigt. Dabei entsteht auch etwas *neutraler Phthalester des Campholcarbinols*, $C_6H_4(CO_2C_{10}H_{19})_2$, der bei der Dampfdest. der alkal. Fl. zurückbleibt, Nadeln aus verd. A., F. 80°, meist ll., wird von sd. alkoh. KOH verseift. Gesamtausbeute an Carbinol 55%. — *Campholbrommethan*, $C_9H_{17} \cdot CH_2Br$. Aus dem Carbinol mit gesätt. Eg.-HBr (100°, 16 Stdn.). Beim Verjagen des Ä. darf die Temp. nicht über 60° steigen. Dünnes, unangenehm riechendes Öl, Kp_9 94—95°, zers. sich an Luft u. Licht. Bei Dest. unter at-Druck fast völlige HBr-Abspaltung. — *KW-stoff* $C_{10}H_{18}$. Durch Schütteln des vorigen mit Ag-Acetat in Eg. Nach Dest. über Na Kp_{742} 164°. — Behandelt man das Bromid mit Mg (durch C_2H_5Br aktiviert) in sd. Ä. u. fraktioniert nach üblicher Zerlegung des Rohprod., so besteht die erste Fraktion, Kp_9 46—48°, aus einem Gemisch der *KW-stoffe* $C_{19}H_{18}$ u. $C_{10}H_{20}$. Die dritte Fraktion liefert bei nochmaliger Dest. den *KW-stoff* $C_{20}H_{38}$ (Würtz-Fittig-Synthese), dickes, angenehm terpenartig riechendes Öl, Kp_{10} 177—178°. — *Campholmethylanilin*, $C_9H_{17} \cdot CH_2 \cdot NH \cdot C_6H_5$. Aus dem Bromid u. Anilin (150°, 20 Stdn.). Ein Vorlauf vom Kp_9 46—50° besteht aus obigem KW-stoff $C_{10}H_{18}$. Hauptprod. ist ein dickes, gelbliches Öl, Kp_9 173°, das allmählich erstarrt; haarförmige Krystalle aus PAe., F. 59°, meist ll. *Hydrochlorid*, $C_{16}H_{26}NCl$, mit HCl-Gas in Ä., Nadeln, F. 156° (Zers.), l. in k. W., beim Erwärmen Hydrolyse. *Nitrosamin*, gelbes Öl, nicht unzers. destillierbar. — Den mehrfach erwähnten KW-stoff $C_{10}H_{18}$ hat auch **Briellmann** (noch nicht veröffentlicht) aus Campholcarbinol u. $ZnCl_2$ oder besser sirupöser H_3PO_4 erhalten; addiert in Eg. HBr, u. dieses Bromid gibt mit Anilin obiges Anilid. — *Campholcarbinolphenylthiourethan*, $C_6H_5 \cdot NH \cdot CS \cdot OC_{10}H_{19}$. Mit Phenylsenfö (Rohr, 120—130°, 16 Stdn.). Nadeln aus Bzn., dann 80%ig. A., F. 101°, wl. in k. Bzl., Bzn., sonst ll. — Zur Darst. der folgenden *Campholcarbinolester* erhitzt man je 1 Mol. Carbinol u. Säurechlorid mit 2 Moll. Pyridin 2 Stdn. auf dem Wasserbad. Opt. Unters. derselben vgl. nachst. Ref. —

Acetat, $C_{12}H_{22}O_2$, Kp.₉ 101°, angenehm riechend. — *Propionat*, $C_{13}H_{24}O_2$, Kp.₁₀ 112°, sehr angenehm riechend. — *Camphocarbonsäureester*, $C_{21}H_{34}O_3$, F. 145°, meist ll. $FeCl_3$ färbt die alkoh. Lsg. grün bis violett. — *Phenylacetat*, $C_{18}H_{26}O_2$, Kp.₁₂ 191°, schwach riechend. — *Hydrozimtsäureester*, $C_{19}H_{28}O_2$, Kp.₁₂ 206°, geruchlos. — *Zimtsäureester*, $C_{19}H_{26}O_2$, Kp.₁₁ 217°, Kp._{0.5} 148°, fast geruchlos. — *p-Nitrobenzoat*, $C_{17}H_{25}O_4N$, gelbliche Nadeln, F. 95°, mit Wasserdampf flüchtig, von starkem Blütengeruch. — *p-Aminobenzoat*, $C_{17}H_{25}O_2N$. Aus dem vorigen mit $FeCl_2$ u. HCl . Kp._{13.5} 242—243°, zu wachsaartiger M. vom F. 74° erstarrend, meist ll., von nur schwach anästhesierender Wrkg. *Hydrochlorid*, mit HCl -Gas in Ä., Nadelchen, F. 140—146° (Zers.), unbeständig.

Campholmethyllketon. Darst. nach RUPE u. KLOPPENBURG (Helv. chim. Acta 2. 366; C. 1919. III. 522), jedoch in Bzl. — Als Nebenprod. entsteht dabei *Verb.* ($C_{10}H_{17}O$)₂, vielleicht *Dicamphoyl*, mit Dampf nicht flüchtig, Kp.₁₁ 200—215°, Tafeln aus verd. A., F. 67°. Gibt mit PCl_5 das *Chlorid* $C_{20}H_{33}OCl$, Nadeln aus A., F. 117°. — *Campholacetyl-bromid*, $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2Br$. Aus obigem Keton mit Br in k. Eg. Die Rk. erfolgt plötzlich nach ca. 1 Stde. In W. gießen, Rohprod. mit Aufsatz fraktionieren. Kp.₁₂ 138—142°, F. 35°, ll., von aromat. Geruch, die Haut reizend, mit Dampf langsam flüchtig. Zers. sich an Luft u. Licht. — *Campholacetyldibromid*, $C_{11}H_{18}OBr_2$. Aus dem vorigen mit Br in CS_2 oder direkt aus dem Keton mit stark $2Br_2$. Nadeln aus 80°/ig. A., F. 52°, Kp.₁₂ 164°, ll. — *Camphoylcarbinolacetat*, $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot OCOCH_3$. Aus obigem Bromid mit K-Acetat u. wenig Eg. (140°, 16 Stdn.). Angenehm riechendes Öl, Kp.₁₂ 146°. — *Campholcarbinol*, $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2(OH)$. Durch $\frac{1}{2}$ -std. Kochen des vorigen mit 1,5% HCl enthaltendem CH_3OH . Nach Vakuumdest. Reinigung über das Benzoat, das mit methylalkoh. KOH verseift wird. Schwach riechendes Öl, Kp.₁₁ 123°, mit Dampf etwas flüchtig. Gibt eine Verb. mit $CaCl_2$. — *Benzoat*, $C_{18}H_{24}O_3$. Darst. in Pyridin (Wasserbad). Blättchen aus verd. A., F. 82°, l. in k. Ä., Aceton, Bzl., Chlf., Eg., in h. A., CH_3OH , Ig. — *Phenylacetat*, $C_{19}H_{26}O_3$, gelbliches, fast geruchloses Öl, Kp.₁₂ 224°. — *Camphoylcarbinol* wird durch Na-Amalgam in A. oder Al-Amalgam in feuchtem Ä. zu Campholmethyllketon reduziert, wobei zweifellos das Glykol als Zwischenprod. anzunehmen ist:




Verb. $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH(OCH_3)_2$. Aus Campholacetyldibromid u. sd. 20°/ig. methylalkoh. KOH ($\frac{1}{2}$ Stde.). Gelbliches, unangenehm riechendes Öl, Kp.₁₂ 128—130°. Reduziert Fehlingsche u. alkal. Ag-Lsg. *Semicarbazon*, F. 181°. — *Campholacetylphthalimid*, $C_{19}H_{23}O_3N$. Aus dem Bromid u. Phthalimid-K in sd. A. (10 Stdn.). Gelbliche Blättchen aus 80°/ig. A., F. 98—99°. — *N-Campholacetylphthalaminsäure*, $C_{19}H_{25}O_4N$. Durch Lösen des vorigen in methylalkoh. KOH , Zusatz von W. u. HCl . Nadeln aus A., F. 143° (Zers.). — *Campholacetylaminhydrochlorid*, $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2(NH_2) \cdot HCl$. Aus dem vorigen mit sd. 20°/ig. HCl . Sandiges Pulver, F. 229° (Zers.), ll. in W., A. — *Campholacetylamin*. Durch Schütteln des vorigen mit verd. $NaOH$ u. Ä. Bei der Vakuumdest. bleibt ca. die Hälfte als zähes, nicht destillierbares Öl zurück. Stark bas. riechendes Öl, Kp._{12.5} 128°. Geht an der Luft bald in ein zähes, gelbes Öl über. — *Phenylthioharnstoffderiv.*, $C_{18}H_{26}ON_2S$. Mit Phenylsenfö. Blättchen aus verd. A., F. 105° (Zers.). — *Campholacetylmethylamin*, $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot NH(CH_3)$. Aus dem Bromid mit k. 33°/ig. alkoh. $NH_2(CH_3)$ -Lsg. (24 Stdn.). Hellgelbes, nach Pyridin u. Campher riechendes Öl, Kp.₁₁ 123°. Ausbeute nur ca. 60% (Rückstand vgl. unten). *Hydrochlorid*, $C_{12}H_{24}ONCl$, mit HCl -Gas in Ä., unl. in Ä., Chlf. — *Phenylthioharnstoffderiv.*, $C_{19}H_{28}ON_2S$, Blättchen aus verd. A., F. 147°. — *Dicampholacetylmethylaminhydrochlorid*, $(C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2)_2N \cdot CH_3 \cdot HCl$. Aus obigem Dest.-Rückstand mit HCl -Gas in Ä. Blättchen aus Chlf. + Ä., F. 199°, ll. außer in Ä., Bzn. Die freie Base ist ein stark bas. riechendes Öl. — *Dicampholacetylanilin*, $(C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2)_2N \cdot C_6H_5$. Mit Anilin (100°, 14 Stdn.). Nadelchen aus verd. Eg., F. 212°, unl. in Säuren. — *Campholacetyltrimethylammoniumbromid*, $[C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot$

$N(CH_3)_3Br$. Mit 33%ig. alkoh. $N(CH_3)_3$ -Lsg. (100°, 3 Stdn.), mit Ä. fallen. Krystalle aus w. Chlf. + wenig Ä., mit Ä. auskochen, F. 230° (Zers.), ll. außer in Ä., Bzn., beständig. — *Campholacetylpyridiniumbromid*, $[C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot NC_5H_5]Br$. Mit Pyridin. Blättchen aus A. + Ä., F. 214°, unl. in Ä., Bzn. Die wss. Lsg. liefert mit NaOH die freie Pyridiniumbase, goldgelb, krystallin., ll. außer in W., unbeständig. — Einw. von Mg in Ä. auf das Bromid liefert nach üblicher Zerlegung nur wenig Campholmethylketon (aus der Grignardverb.). Im übrigen wurde gelegentlich sehr wenig einer Verb. $C_{23}H_{40}O_2$ isoliert, Krystalle aus verd. A., F. 82°. C_2H_5MgBr wirkt auf das Bromid nur schwach ein. — *Oxymethylencampholmethylketon*, $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH : CH(OH)$. Zur äth. Lsg. des Ketons gibt man trockenes $NaOC_2H_5$ u. läßt Amylformiat zutropfen, schüttelt mit W., äthert aus, säuert an u. nimmt in Ä. auf. Schwach riechendes Öl, Kp._{12.5} 122—123°, ll. Ferrisalz ziegelrot. Cu-Salz, grünblaue Nadelchen aus verd. A., ll. außer in W., zers. sich allmählich. — *Camphoylälthylalkohol* (*Campholacetylcarbinol*), $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CH_2(OH)$. Durch Hydrierung des vorigen (+ Ni) in 65%ig. A. Dickliches Öl, Kp.₁₃ 146—148° (Helv. chim. Acta 9. 80—97.)

LINDENBAUM.

H. Rupe und J. Perret, Über optisch aktive Ester des Camphoylcarbinols und des Camphoylälthylalkohols. (Vgl. vorst. Ref.) Vom Camphoylcarbinol wurden einige weitere Ester nach dem Pyridinverf. dargestellt. — *Propionat*, $C_{14}H_{24}O_3$, fast geruchloses Öl, Kp.₁₁ 157°. — *Butyrat*, $C_{15}H_{26}O_3$, schwach aromat. riechendes Öl, Kp.₁₁ 167,5°. — *Hydrozimtsäureester*, $C_{20}H_{28}O_3$, Kp. im Hochvakuum 136—138°. — Während das Carbinol selbst wesentlich zu Campholmethylketon reduziert wird (vorst. Ref.), erhält man aus dem Acetat größere Mengen von *Campholglykol*, $C_9H_{17} \cdot CH(OH) \cdot CH_2(OH)$. Der Ester wird in k. 70%ig. A. unter Rühren mit 2%ig. Na-Amalgam behandelt, wobei weitere Mengen wss. A. zugefügt werden müssen. Dauer 3 Tage. Man gibt W. zu, äthert aus, säuert an u. äthert wieder aus. Der erste äth. Auszug liefert Campholmethylketon, der zweite das Glykol. Kp.₉ 146°, Nadeln aus verd. A., F. 108°, sll., von schwach terpenartigem Geruch, mit Dampf flüchtig, langsam l. in verd. Lauge. Ausbeute bis zu 42%. — *Diacetat*, $C_{15}H_{26}O_4$. Mit sd. Acetanhydrid. Dickes, orangegelbes, angenehm terpenartig riechendes Öl, Kp.₉ 205—207°, ll. — *Monobenzoat*, $C_{18}H_{26}O_3$. Darst. in Pyridin (Wasserbad). Öl, Kp.₁₂ 198—199°. Spaltet bei der Dest. etwas Benzoesäure ab. — Das Glykol wird von HNO_3 (D. 1,36) bei vorsichtigem Erwärmen zu Camphoylcarbinol oxydiert. Abspaltung von H_2O aus dem Glykol gelang nicht. — Neu dargestellt wurde das *Campholcarbinolbutyrat*, $C_{14}H_{26}O_2$, Kp.₁₁ 128,5—129°, meist ll. — *Oxymethylencampholmethylketon*. Die Darst. wurde noch verbessert. Ni-Salz, hellgrüne Nadelchen, wl. in A., Ä., ll. in Pyridin. — *Benzoat*, $C_{19}H_{24}O_3$. Darst. in Pyridin bei 40° (3 Stdn.). Blättchen aus verd. A., F. 65°, ll. außer in W. Zers. sich allmählich unter Abspaltung von Benzoesäure u. B. des unten beschriebenen Tricamphoylbenzols. — *Hydrozimtsäureester*, $C_{21}H_{28}O_3$, gelbliches, aromat. riechendes Öl, Kp.₁₀ 216—218°, zersetzlich. — *p-Toluidinderiv.*, $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH : CH \cdot NH \cdot C_6H_4 \cdot CH_3$. Aus dem Na-Salz der Oxymethylenverb. u. Toluidinhydrochlorid in wenig k. W. Gelbe Blättchen aus A., F. 80° (Zers.). — *Tri-*



camphoylbenzol, $C_{38}H_{54}O_3$ (nebenst.). Entsteht immer in einer Menge von ca. 10% bei der Darst. der Oxymethylenverb. u. wird aus dem äther. Auszug der alkal. Fl. isoliert. Federförmige Nadeln aus Bzn., dann A., F. 136°, ll. in Ä., Bzl., Aceton, Essigester, zwl. in A., Eg., swl. in Bzn. Die leichte B. dieser Verb. bewirkt, daß die Oxymethylenverb. sich nie völlig in Alkali löst. Eine äth. Lsg. der letzteren gibt mit festem K_2CO_3 unter spontaner Erwärmung 40% des Kondensationsprod. — *Camphoylälthylalkohol* läßt sich nicht gut mittels der Ester reinigen, weil diese bei der Dest. u. Verseifung teilweise Säure abspalten unter B. der unten beschriebenen polymeren Methylenverb. Er wird ganz rein erhalten, wenn man ihn mit dem gleichen Gewicht $CaCl_2$ verreibt, bis alles fest ist, die $CaCl_2$ -Verb. unter Bzl. pulvert, mit Bzl. wäscht u. mit W. zerlegt. Kp.₁₂ 143°, ll.

außer in W. — *Phenylthiourethan*, $C_{19}H_{27}O_2NS$. Mit Phenylsenfö (130—140°, 16 Stdn.). Nach Verreiben mit Bzl. gelbliche Blättchen aus A., F. 154°. — *Acetat*, $C_{14}H_{24}O_3$. Nach dem Pyridinverf. Schwach riechendes Öl, Kp.₁₂ 159°, ll. außer in W. — *Propionat*, $C_{15}H_{26}O_3$, Kp. im Hochvakuum 93—94°, fast geruchlos. Spaltet bei Dest. unter 12 mm Propionsäure ab. — *Butyrat*, $C_{16}H_{28}O_3$, Kp. im Hochvakuum 104—106°. — *Benzoat*, als Rohprod. dunkelgelbes Öl, ll. Spaltet auch bei Dest. im Hochvakuum Benzoesäure ab. — *p-Nitrobenzoat*, $C_{10}H_9NO_5$, Blättchen aus verd. A., F. 51°, sl., beständig. — *Camphoyläthylbromid*, $C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CH_2Br$. Aus dem Alkohol mit gesätt. HBr-Eg. (Rohr, 100°, 4 Stdn.). Kp.₉ 130—131°. — *Polymeres Methylenecampholmethyllketon*, $[C_9H_{17} \cdot CO \cdot CH : CH_2]_x$. Erwärmt man Camphoyläthylalkohol mit 75%ig. H_2SO_4 (Wasserbad), so scheidet sich allmählich ein dunkelrotes Öl ab. Auf Eis gießen, in Ä. aufnehmen. Der Ä. hinterläßt eine kolophoniumartige M. Weißes, amorphes Pulver aus Ä. + A., F. über 250°. Wird mit Bzl. durchscheinend, dann klebrig, löst sich erst bei längerem Kochen; die erkalte Lsg. ist dickfl. u. scheidet nichts aus. Mol.-Gew.-Best. in sd. Bzl. ergab $x = 4-7$. — Verss. zur Gewinnung der monomeren Methylenverb. führten nicht zum Ziel. Mit k. 75%ig. oder w. 40%ig. H_2SO_4 , sirupöser H_3PO_4 , methyllalkoh. KOH liefert Camphoyläthylalkohol auch hauptsächlich obiges Polymere, jedoch wurde bei verschiedenen Verss. daneben ein Destillat vom Kp.₉ 115—140° erhalten. Zerlegung in weitere Fraktionen u. Analysen derselben ergaben, daß das Destillat eine ca. 8%ig. Lsg. der Methylenverb. in Camphoyläthylalkohol darstellt. Camphoyläthylbromid ist gegen alkoh. KOH ziemlich beständig, gibt aber mit sd. Anilin reichlich polymere Methylenverb.

In der folgenden Tabelle sind die Werte für D_{40}^{20} u. $[\alpha]_D^{20}$ der in vorst. u. dieser Arbeit beschriebenen Alkohole, Ester u. Bromide zusammengestellt.

Substanz	D_{40}^{20}	$[\alpha]_D^{20}$	Substanz	D_{40}^{20}	$[\alpha]_D^{20}$
Campholcarbinol* . . .	—	67,18	Benzoessäureester* . .	0,8948	38,33
Essigsäureester . . .	0,9433	46,72	Phenylessigsäureester .	1,0668	49,90
Propionsäureester . . .	0,9341	46,60	Hydrozimsäureester . .	1,0566	45,27
Buttersäureester . . .	0,9280	45,04	„* . . .	0,8935	43,92
Benzoessäureester* . . .	—	47,81	Oxymethylenecampholmethyllketon . . .	0,9946	59,85
Phenylessigsäureester . .	1,0042	36,62	Camphoyläthylalkohol .	0,9947	52,94
Hydrozimsäureester . . .	0,9988	33,81	Essigsäureester . . .	1,0103	43,35
Zimtsäureester . . .	1,0167	41,25	Propionsäureester . . .	1,0006	42,48
Camphoylcarbinol . . .	1,0002	87,16	Buttersäureester . . .	0,9886	40,64
Essigsäureester . . .	1,0256	63,28	Campholglykol* . . .	0,8863	47,60
Propionsäureester . . .	1,0155	62,28	Campholacylbromid* . .	0,9055	63,77
Buttersäureester . . .	1,0021	58,32	Campholacyldibromid* .	—	73,75
			Camphoyläthylbromid .	1,2042	49,77

* 10%ig. Bzl.-Lsg.

Im Original sind auch die Drehungen für die Strahlen C , E_{Hg} u. F angegeben. Die Drehungen der Ester sind stets kleiner als die der Alkohole. Ferner zeigt sich auch hier wieder (vgl. RUPE u. SCHAEFER, S. 1401), daß bei längeren Ketten die rein aliph. Ester immer stärker drehen als die mit endständigem C_6H_5 , welches letzteres mit der Entfernung vom asym. Komplex rasch seine Wrkg. verliert. Die Unters. der Rotationsdispersion ergab im allgemeinen n. Verhältnisse. Die Konstanten betragen im Mittel: in der Campholcarbinolreihe $\lambda_0^2 = 0,02780$, $\lambda_\alpha = 679,1$, $[\alpha]_F : [\alpha]_C = 1,933$, P. R. D. = 113,0; in der Camphoylcarbinolreihe $\lambda_0^2 = 0,01434$, $\lambda_\alpha = 699,1$, $[\alpha]_F : [\alpha]_C = 1,875$, P. R. D. = 83,24; in der Camphoyläthylalkoholreihe $\lambda_0^2 = -0,0129$, $\lambda_\alpha = 742,1$, $[\alpha]_F : [\alpha]_C = 1,778$. Unbedeutende Anomalien zeigen der Campholcarbinolzimtsäureester, das Camphoylcarbinolbenzoat u. das Camphoyläthylalkoholacetat. Das

Camphoylcarbinol selbst gab Zahlen, die von denen der Ester stark abweichen, wofür vorläufig die Erklärung fehlt. (Helv. chim. Acta 9. 97—115. Basel, Univ.) LB.

V. Grignard und J. Savard, *Über das Vorkommen des natürlichen i-Pulegons. Isolierung des α -(i-) und β -(gewöhnlichen) Pulegons und ihrer Enole in reiner Form.* (Vgl. S. 1539.) Nachdem l. c. gezeigt worden war, daß natürliches Pulegon aus einem Gemisch von gewöhnlichem u. i-Pulegon besteht, ist jetzt auch die Trennung der beiden Isomeren gelungen auf Grund der bekannten Tatsache, daß nur Pulegon eine Bisulfitverb. bildet. Man schüttelt das Gemisch mit 2 Voll. NaHSO_3 -Lsg. (36°Bé.) u. 0,5 Vol. A., filtriert die Krystalle nach Maßgabe ihrer B. ab u. verfährt mit dem Filtrat unter Erneuerung des NaHSO_3 so lange in gleicher Weise, bis sich keine Krystalle mehr abscheiden (mindestens einen Monat). Die Krystalle werden mit A. ausgezogen, die Lsg. mit W. gefällt u. nebst den Mutterlaugen ausgeäthert. Zur Entfernung der letzten Spuren Pulegon wird das rohe i-Pulegon mit Al-Amalgam behandelt (vgl. HARRIES u. ROEDER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 32. 3357 [1899]). Ausbeuten bei Prodd. verschiedener Herkunft 16 u. 18% , also genau übereinstimmend mit dem Ergebnis des Ozonverf. (S. 1539). Das reine natürliche i-Pulegon (nach dem Ozonverf. 100% ig.) besitzt Kp._6 78° , D.^{14}_4 0,9097, $n_D^{14} = 1,46332$, $[\alpha]_D = +34,03^\circ$. Semicarbazon, F. 172° . Hydrobromid, F. 48° , gibt leicht HBr ab. Letzteres konnte neben dem Pulegonhydrobromid (F. 40 — 41°) auch aus dem ursprünglichen Pulegongemisch isoliert werden. Diese beiden 8-Brom-p-menthanone-(3) repräsentieren entweder enantiomorphe oder geometr. isomere Formen. Das zum Vergleich aus dem Hydrobromid vom F. 40 — 41° nach HARRIES u. ROEDER (l. c.) synthetisierte i-Pulegon besaß Kp._6 81° , D.^{14}_4 0,9097, $n_D^{14} = 1,46335$, $[\alpha]_D = -7,13^\circ$. Semicarbazon, F. 173 bis 174° . Die Werte gleichen den obigen bis auf die Drehung; l-i-Pulegon racemisiert sich übrigens freiwillig. — Das aus der Bisulfitverb. regenerierte reine natürliche Pulegon besitzt Kp._6 88 — 89° , D.^{13}_4 0,9346, $n_D^{13} = 1,48940$, $[\alpha]_D = +21^\circ$. — Aus diesen reinen natürlichen Ketonen wurden nach dem früher (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1573; C. 1925. I. 954) angegebenen Verf. die Enole dargestellt. α -Enol, Kp._6 80 — 81° , D.^{14}_4 0,8965, $n_D^{14} = 1,46732$, $[\alpha]_D = -4,3^\circ$ (in ca. 5% ig. Toluollsg.). Das Enol aus synthet. i-Pulegon besaß bis auf die Inaktivität dieselben Konstanten. — β -Enol, Kp._6 88° , D.^{13}_4 0,9160, $n_D^{13} = 1,48312$, $[\alpha]_D = +24,6^\circ$ (in ca. 5% ig. Toluollsg.). Da beide Enole eine Exaltation der Mol.-Refr. anweisen, enthalten sie wahrscheinlich beide eine Konjugation, woraus zu folgern wäre, daß die Enolisation in beiden Fällen nicht in demselben Sinne verläuft. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 422—25.) LB.

M. O. Forster und P. P. Shukla, *Über die Konstitution von Manasses Oxy-campher.* (Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 267—273. 1925. — C. 1926. I. 642.) LB.

Peter George Carter, Henry George Smith und John Read, *Die Einwirkung von Phosphorsäure auf gewisse Terpene und verwandte Verbindungen.* l- α -Phellandren ($\alpha_D^{20} = -77,05^\circ$) wurde längere Zeit mit Phosphorsäurelsg. (D. 1,75) geschüttelt, wobei Isomerisation, Racemisierung u. Polymerisation erfolgte. Die zurückerhaltene Terpenfraktion betrug 56% des Ausgangsmaterials u. war opt. fast inakt.; die Hauptbestandteile waren anscheinend α -Terpinen u. γ -Terpinen. Als weiteres Prod. wurde ein rechtsdrehendes Diterpen, $\text{C}_{20}\text{H}_{32}$, erhalten, Kp._{16} 182 — 184° , welches möglicherweise auch ein Gemisch verschiedener Diterpene darstellt. Verss. mit anderen Terpenen führten zu ähnlichen Ergebnissen; nur waren die physikal. Konstanten des Diterpens je nach Herkunft verschieden.

Die B. des Diterpens ist allem Anscheine nach nicht auf Polymerisation zurückzuführen, sondern auf die Kondensation eines Terpenmol. mit einem intermediär gebildeten Terpenhydrat (vielleicht Piperitol) unter Austritt eines Mol. W. Bromwasser wird durch das Diterpen entfärbt. Krystallisierte Derivv. des Diterpens wurden jedoch nicht erhalten. α -Terpinen u. Piperiton werden durch Phosphorsäure nur in ganz

Diterpen aus:	Roh- ausbeute	Kp.	n_D^{20}	α_D^{20}	D^{20}_4	Mol.- Refr.
1- α -Phellandren .	40%	182—184° ₁₆ mm	1,5171	+14,96°	0,9257	89,05
Öl aus Eucalyptus divers	50	193—195° ₂₄ „	1,5178	+13,20°	0,9245	89,25
Öl aus Eucalyptus phellandra . . .	40	194—196° ₂₄ „	1,5173	+ 3,28°	0,9272	88,91
Öl aus Melaleuca acuminata . . .	45	191—193° ₂₂ „	1,5183	+ 1,00°	0,9303	88,73
d-Limonen	75	192—194° ₂₃ „	1,5186	+ 0,16°	0,9278	89,04
d-Pinen	75	179—181° ₁₈ „	1,5157	— 0,10°	0,9315	88,27
l-Pinen	75	197—200° ₂₉ „	1,5186	+ 0,07°	0,9290	88,96
Cineol	60	193—195° ₂₅ „	1,5169	+ 0,00°	0,9236	89,20

geringem Maße verändert. (Journ. Soc. Chem. Ind. **44**. T. 543—47. 1925. Sydney, Univ.) ZANDER.

M. Busch, Über Phenolalkylierung. Die Tatsache, daß ein u. dasselbe Phenol ein Alkyl je nach dessen Natur am O oder am C aufnimmt, läßt sich nur durch die Annahme intermediärer Anlagerungsprodd. erklären, bei denen der Einfluß beider Komponenten aufeinander zum Austrag kommen kann. Beim *Diphenylmethylchlorid* u. *-bromid* entstehen in Ggw. von Phenolen intensiv gefärbte Schmelzen dieser Anlagerungsprodd. (Halochromie), die sich mit fortschreitender Rk. aufhellen u. bei Beendigung der Halogenwasserstoffabsplaltung ihre Farbe mehr oder weniger verloren haben. Beim *p-Oxybenzaldehyd* u. *p-Oxybenzoesäureäthylester* wurden derartige Anlagerungsprodd. in fester Form isoliert. Das Anlagerungsprod. aus *p-Oxybenzaldehyd* u. *Diphenylmethylbromid* ist dunkelrosa gefärbt; beim Umkrystallisieren aus sd. Bzl. oder A. wird es farblos u. geht unter HBr-Abspaltung in *3,5-Dibenzhydryl-4-oxybenzaldehyd* über. Die Zus. des Additionsprod. ist: 3-Benzhydryl-4-oxybenzaldehyd + *Diphenylmethylbromid*, da schon beim Vermischen der beiden Komponenten bei Zimmertemp. lebhafte HBr-Abspaltung einsetzt, so daß das Additionsprod. Oxybenzaldehyd + 2 *Diphenylmethylbromid* nicht gefaßt werden konnte. — Nach allen bisherigen Erfahrungen über die Phenolalkylierung kann gesagt werden, daß mit steigender Valenzbeanspruchung die Tendenz zur C-Alkylierung vorherrscht. Die Natur des Halogens scheint keine wesentliche Rolle zu spielen, da sich *Diphenylmethylbromid* wie das Chlorid verhält. Die Homologen des Phenols, Kresole, Xylenole u. Naphthole, verhalten sich im allgemeinen wie das Phenol selbst, dagegen tritt bei mehrwertigen Phenolen die Neigung zur Disubstitution stärker hervor; so ergibt Hydrochinon 95% Disubstitutionsprod. u. nur 5% Monoprod. Denselben Einfluß zeigt die Einführung von Halogen in den Phenolkern. Die isomeren Nitrophenole, die als Alkaliphenolate O-Äther liefern, reagieren in freier Form ganz verschieden. *p-Nitrophenol* liefert ein zweifach im Kern substituiertes Deriv., *o-Nitrophenol* reagiert überhaupt nicht, u. *m-Nitrophenol* liefert in guter Ausbeute den O-Äther (*m-Nitrophenolbenzhydryläther*). — Die O-Benzhydryläther der Phenole werden bequem mit *Diphenyldiazomethan* erhalten. Die bei dieser Rk. entstehenden Äther zeichnen sich in den meisten Fällen durch gutes Krystallisationsvermögen aus. Die Ausbeuten sind verschieden; während sie in Ggw. von elektronegativen Gruppen in o- oder p-Stellung (Nitrophenole) fast quantitativ sind, betragen sie in anderen Fällen nur 10%. Mehrwertige Phenole reagieren nicht unter Ätherbildung. — Die O-Äther lassen sich nicht in die entsprechenden C-substituierten Verbb. umlagern; Wanderung des Alkyls in den Kern findet nicht statt. (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 1145—46. 1925. Erlangen.) ZANDER.

G. Davis Buckner, Phenolphthalol, seine Herstellung und seine Wirkung auf Oxydasen und Peroxydasen. Da Phenolphthalol, $C_{20}H_{18}O_3$, nach der Vorschrift von

BAEYER (LIEBIGS Ann. **202**. 87. [1880]) nicht erhalten wurde, wird eine neue einfache Methode der Darst. mitgeteilt. 2 g *Phenolphthalin*, $C_{20}H_{16}O_4$, werden in 500 ccm sd. W. suspendiert u. durch Zutropfen von 50%ig. Essigsäure in Lsg. gebracht. Zu der sd., auf dem gleichen Vol. gehaltenen Lsg. werden im Laufe von 3 Stdn. 500 g 4%ig. Na-Amalgam in kleinen Anteilen gegeben, wobei die Lsg. durch weiteren Säurezusatz stets schwach sauer gehalten wurde. Nach Verdünnen mit so viel W., daß die Fl. milchig getrübt war, ließ man über Nacht stehen. Der krystallin. Nd. wurde durch Umfällen aus seiner Lsg. in h. Eg. mit W. gereinigt; schwach gelbliche Prismen, F. 190°. 0,01 g Phenolphthalol in W. suspendiert u. A. bis zur völligen Lsg. zugegeben, färbt sich nicht mit NaOH; die alkal. Lsg. wird durch $K_3[Fe(CN)_6]$ tiefrosa; beim Stehen an der Luft oder unter Einw. einer Oxydase wird Phenolphthalein gebildet, was durch die Färbung mit NaOH nachgewiesen werden kann. Die Rk. ist äußerst empfindlich; Blut kann noch in einer Verdünnung 1:5000000 nachgewiesen werden. — Die Molluske *Tapes decussatus* oxydierte das ihr injizierte Phenolphthalol nicht. Weder in frischen oder getrockneten Organen, noch im Blut dieser Molluske konnte eine Oxydase oder eine Peroxydase nachgewiesen werden. (Amer. Journ. Physiol. **74**. 354—58. 1925. Kentucky, Landwirtsch. Versuchsstat.) HESSE.

L. Bert und P. Ch. Dorier, *Über das echte α -Naphthylpropin*. (Vgl. BERT, DORIER u. LAMY, S. 2329.) α - ω -Chlorallylnaphthalin, $C_{10}H_7 \cdot CH_2 \cdot CH : CHCl$. Man bereitet α -Naphthyl-MgBr, gibt Toluol zu, dest. den Ä. ab u. läßt bei ca. 100° 0,75 Mol. 1,3-Dichlorpropen eintropfen. Hellgelbes, schwach riechendes Öl, Kp_{14} 170° (korr.), D_4^{20} 1,196, D_{14}^{15} 1,185, $n_D^{13} = 1,632$. — *Echtes α -Naphthylpropin*, $C_{10}H_7 \cdot CH_2 \cdot C : CH$. Durch Eintropfen des vorigen in eine Suspension von 2,5 Moll. NH_2Na in Xylol bei 120°, letzteres im Vakuum abdest., mit eiskalter verd. Säure zerlegen. Nach Reinigung über das grünlichgelbe Cu-Salz hellgelbes Öl, vom Geruch des Phenylpropins u. seiner Homologen, beim Rühren schäumend, Kp_{15} 154° (korr.), D_4^{20} 1,066, D_{14}^{15} 1,056, $n_D^{13} = 1,630$. *Ag-Salz*, $C_{13}H_9Ag$, $AgNO_3$, weiß. — Beide Verbb. weisen eine auch bei anderen Naphthalinderivv. beobachtete starke Exaltation der Mol.-Refr. auf. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **37**. 1600—02. 1925. Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand.) LINDENBAUM.

Paul Ruggli und Marc Reinert, *Über Phenyl- β -naphthylacetylen*. 5. Mitt. *über Acetylen derivative*. (4. vgl. RUGGLI, Helv. chim. Acta **3**. 559; C. **1920**. III. 458.) Als Ausgangsmaterialien für nachfolgende Unterss. dienen das *Benzyl- α - (I) u. - β -naphthylketon (II)*. Aus Phenylacetylchlorid, Naphthalin u. $AlCl_3$ soll nach GRAEBE u. BUNGENER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **12**. 1078 [1879]) ein Keton vom F. 57° entstehen. Vff. haben jedoch gefunden, daß ein Gemisch beider Isomeren vorliegt, die mittels der Pikrate getrennt werden können. Außerdem arbeitet man bei der Darst. besser in CS_2 . Die Konst. beider Verbb. folgt aus der Oxydation zu α - bzw. β -Naphthoesäure. Als Zwischenstufen entstehen dabei die *Phenyl-naphthylglyoxale* (Analoge des Benzils). Bei der Einw. von PCl_5 auf II wurde nicht das Dichlorid, sondern sofort die um HCl ärmere Verb. $C_6H_5 \cdot CH : CCl \cdot C_{10}H_7$ erhalten, welche von methylalkoh. KOH u. sogar von KOH + NaOH bei 210° nicht angegriffen wird. Die Abspaltung von HCl gelang schließlich mit KOH in Pyridin; letzteres bildet wahrscheinlich zunächst ein Additionsprod. mit der Chlorverb. Das *Phenyl- β -naphthylacetylen* hat keinen stark ungesätt. Charakter, doch konnte mittels k. konz. H_2SO_4 H_2O addiert u. das Rk.-Prod. mit II identifiziert werden. Ferner wird die Konst. des KW-stoffs durch eine von **A. Jenny** ausgeführte, noch nicht veröffentlichte andersartige Synthese bestätigt. — Aus II u. PBr_5 bildet sich infolge der leicht erfolgenden Dissoziation des letzteren die Verb. $C_6H_5 \cdot CHBr \cdot CO \cdot C_{10}H_7$. Die Stellung des Br folgt daraus, daß es leicht gegen OH ausgetauscht u. die so entstehende Verb. zum „Benzil“ oxydiert wird. — In der α -Reihe konnte auch die Verb. $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CCl_2 \cdot C_{10}H_7$ gefaßt werden. Die

Darst. des Phenyl- α -naphthylacetyls gelang nicht, da das Cl hier noch viel fester haftet.

Versuche. *Benzyl-naphthylketone (I + II).* Aus 30 g Phenylacetylchlorid + 24 g Naphthalin in CS_2 mit 35 g AlCl_3 , über Nacht stehen lassen, $\frac{1}{2}$ Stde. kochen. Kp.₁₁ 237 bis 243°, bald erstarrend. — *Benzyl- β -naphthylketonpikrat*, $\text{C}_{24}\text{H}_{17}\text{O}_8\text{N}_3$. Man löst das vorige mit Pikrinsäure in sd. Bzl. u. saugt den Nd. bei 30° ab. Gelbe Nadelchen aus A.₇ F. 142,5—143,5°, ll. in Ä., w. A., Bzl. — *Benzyl- β -naphthylketon*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}\cdot\text{C}_{10}\text{H}_7$ (II). Aus dem vorigen mit sd. Sodalsg. Nadelchen aus A., F. 99—99,5°, ll. in Ä., Bzl., Chlf., h. A. H_2SO_4 -Lsg. orangefarbig. — *Phenylhydrazon*, $\text{C}_{24}\text{H}_{20}\text{N}_2$, Krystalle aus Eg., F. 165—167°, aus Pyridin + W., F. 170—171°. — *Oxim*, $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{ON}$, Nadelchen aus verd. A., F. 128—129,5°, ll. in A., Ä., Bzl., Chlf. — *Benzyl- α -naphthylketonpikrat*, $\text{C}_{24}\text{H}_{17}\text{O}_8\text{N}_3$. Aus der Mutterlauge des β -Pikrats. Gelbe Nadelchen aus A., F. 101 bis 102°. — *Benzyl- α -naphthylketon*, $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}$ (I). Man entfernt aus der Mutterlauge des β -Pikrats das Bzl. im Vakuum u. zerlegt den Rückstand mit Soda. Blättchen aus A., F. 66—67°, sll. in Ä., Bzl., Chlf., h. A. H_2SO_4 -Lsg. grünstichig gelb. — *Phenylhydrazon*, $\text{C}_{24}\text{H}_{20}\text{N}_2$, aus Eg., dann A., F. 101—101,5°, zwl. in A., Ä., ll. in Eg., Bzl., an der Luft zerfließend. — *Oxim*, $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{ON}$, Kryställchen aus verd. A., F. 148—152° (Zers.), zl. in Ä., Bzl., Chlf., w. A. — *Phenyl- β -naphthylglyoxal*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CO}\cdot\text{CO}\cdot\text{C}_{10}\text{H}_7$. Aus II in Pyridin mit KMnO_4 in W. + Pyridin (Wasserbad). Gelbe Nadelchen aus verd. A., F. 86,5—87,5°, ll. in A., Ä., Bzl. — *β -Naphthoesäure*. Aus der Mutterlauge des vorigen nach Eindampfen u. Ansäuren. Nadelchen aus verd. A., F. 181,5—183°. — *2-Phenyl-3-[β -naphthyl]-chinoxalin*, $\text{C}_{24}\text{H}_{16}\text{N}_2$. Aus obigem Glyoxal u. o-Phenylendiamin in sd. A. Hellgelbliche Nadelbüschel aus A., F. 108—110°, meist ll. — *1-Phenyl-2-[β -naphthyl]-2-chloräthylen*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CH}\cdot\text{CCl}\cdot\text{C}_{10}\text{H}_7$. Aus II u. PCl_5 in sd. Chlf. ($\frac{1}{2}$ Stde.), dann in Eiswasser + Ä. Krystalle aus A., F. 116—117°. Entfärbt KMnO_4 erst nach ca. 2 Min. — *Phenyl- β -naphthylacetylen*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{C}\equiv\text{C}\cdot\text{C}_{10}\text{H}_7$. Aus dem vorigen mit festem KOH in sd. Pyridin (2 Stdn.), mit W. ausspritzen. Krystalle aus A., F. 115 bis 116°. Entfärbt KMnO_4 nach ca. 1 Min. — *1-Phenyl-1-brom-2-[β -naphthyl]-äthanon-(2)*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CHBr}\cdot\text{CO}\cdot\text{C}_{10}\text{H}_7$. Aus II u. PBr_5 in k. Bzl. (2 Tage) oder in sd. Chlf. ($\frac{1}{2}$ Stde.). Krystalle aus A., F. 111—111,5°. — *1-Phenyl-1-oxy-2-[β -naphthyl]-äthanon-(2)*, $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_2$. Aus dem vorigen mit sd. methylalkoh. KOH, dann mit wenig W. verdünnen. Krystalle aus A., F. 151—152°. Wird von CrO_3 in Pyridin (Wasserbad) zu Phenyl- β -naphthylglyoxal oxydiert. — Die folgenden Verbb. werden analog aus I dargestellt. — *Phenyl- α -naphthylglyoxal*, $\text{C}_{18}\text{H}_{12}\text{O}_2$, gelbe Nadelchen aus verd. A., F. 101,5—102°. — *α -Naphthoesäure*, Nadelchen aus W., F. 159°. — *2-Phenyl-3-[α -naphthyl]-chinoxalin*, $\text{C}_{24}\text{H}_{16}\text{N}_2$, gelbliche Krystalle aus A., F. 137—139°, ll. außer in PAe. — *1-Phenyl-2-[α -naphthyl]-2-chloräthylen*, $\text{C}_{18}\text{H}_{13}\text{Cl}$. Mit PCl_5 bei 100° ($\frac{1}{2}$ Stdn.), dann 200° ($\frac{1}{2}$ Stde.), wobei POCl_3 überdest. Dickes gelbes Öl, Kp.₁₁ 228—233°, nicht ganz rein, enthält wahrscheinlich etwas der folgenden Verb. Hatte nach 7-std. Kochen mit KOH in Pyridin erst ca. 10% Cl abgegeben. — *1-Phenyl-2-[α -naphthyl]-2,2-dichloräthan*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CCl}_2\cdot\text{C}_{10}\text{H}_7$. Aus I u. PCl_5 in sd. Chlf. (30 Min.). Krystalle aus Ä. + PAe., F. 102° unter HCl-Entw., wenig haltbar, nicht völlig rein erhalten. Geht durch Erhitzen auf 120—130° u. mehrfache Vakuumdest. in das vorige über. — *1-Phenyl-2-[dibrom- α -naphthyl]-2-bromäthylen*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CH}\cdot\text{CBr}\cdot\text{C}_{10}\text{H}_5\text{Br}_2$ (?). Aus I u. PBr_5 (Wasserbad, dann 180°, 1 Stde.). Krystalle aus Eg., F. 170—171°. — *1-Phenyl-1-brom-2-[α -naphthyl]-äthanon-(2)*, $\text{C}_{18}\text{H}_{13}\text{OBr}$. Mit PBr_5 bei Zimmertemp. Krystalle aus A., F. 63—64°. — *1-Phenyl-1-oxy-2-[α -naphthyl]-äthanon-(2)*, $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_2$, Nadelchen aus A., F. 105—105,5°. Liefert mit h. verd. NaOH α -Naphthoesäure. (Helv. chim. Acta 9. 67—79. Basel, Univ.)

LINDENBAUM.

E. Gysin, Über Dekahydronaphthalin und seine Substitutionsprodukte. Vf. hat die bereits von BORSCHÉ u. LANGE (LIEBIGS Ann. 434. 219; C. 1924. I. 321) ausgeführte Chlorierung des Dekalins erheblich verbessert. Nach einer Reihe von Verss.

(Tabellen im Original) hat es sich zur Erreichung einer intensiven Wrkg. als am besten erwiesen, das Dekalin direkt durch das der Bombe unter hohem Druck entströmende Cl zu zerstäuben u. das Gemisch in Ggw. von 1% J mit elektr. Licht zu bestrahlen. Hierfür wurde ein geeigneter App. konstruiert (beschrieben in der Dissertat. des Vfs.). Das Rk.-Prod. wird mit W. u. Soda gewaschen, über CaCl_2 getrocknet u. im Vakuum fraktioniert. Mit 5 Kilo Cl_2 lassen sich 1,5 Kilo Dekalin in ca. 5 Stdn. chlorieren. Man erhält 2-Chlordekalin u. 2,3-Dichlordekalin. Beispiel: 270 g Dekalin lieferten 20 g Dekalin, 120 g Chlordekalin (Kp_{18} 110—125°), 25 g Gemisch, 60 g Dichlordekalin (Kp_{18} 148—152°), 120 g höher sd. Prodd. Obiger App. eignet sich auch vortrefflich zu anderen Chlorierungen (als Beispiel ist p-Cymol angeführt). — Vf. hat eine Reihe von Substitutionsprodd. aus Chlordekalin dargestellt. — *Dekalin-2-carbonsäure*. Der l. c. angegebenen Darst. ist nichts hinzuzufügen. Verss., mit KCN in sd. A. das Säurenitril zu erhalten, lieferten nur gewisse Mengen *Octalin*. Auch AgCN führte nicht zum Ziel. — Negativ verliefen auch Verss. zur Darst. von Dekalinsulfonsäure, Dekalindicarbonsäure u. Dekalylamin. — *Verb.* $\text{C}_{10}\text{H}_{17} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$. Aus Chlordekalin, Bzl. u. AlCl_3 (Wasserbad, $1\frac{1}{2}$ Stdn.). Fl., Kp_{18} 170—180°, zunächst grün, blau fluorescierend, nach 24 Stdn. dunkelgelb, violett fluorescierend. — *Verb.* $\text{C}_{10}\text{H}_{17} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_3$. Mit Toluol. Kp_{18} 180—190°, gelb, violett fluorescierend. — *Verb.* $\text{C}_{10}\text{H}_{17} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)_2$. Mit m-Xylol. Kp_{18} 182—192°, viscos, violett fluorescierend. — *Verb.* $\text{C}_{10}\text{H}_{17} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)(\text{C}_3\text{H}_7)$. Mit p-Cymol. Kp_{18} 192—212°, hellgelb, sehr stark violett fluorescierend. — *Verb.* $\text{C}_{10}\text{H}_{17} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{OCH}_3$. Mit Anisol. Kp_{18} 185—195°, gelb, blau fluorescierend. — *Verb.* $\text{C}_{10}\text{H}_{17} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{OCH}_3)_2$. Mit Resorcindimethyläther. Kp_{18} 225—235°, orangegelb, grün fluorescierend. — *Verb.* $\text{C}_{10}\text{H}_{17} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{OCH}_3)_2$. Mit Hydrochinondimethyläther in CS_2 . Kp_{18} 208 bis 225°, hellgelb, stark blaugrün fluorescierend. — *Verbb.* $\text{C}_{10}\text{H}_{17} \cdot \text{C}_{10}\text{H}_7$. Mit Naphthalin in CS_2 . Kp_{18} 240—280°, allmählich erstarrend. Ein Teil löst sich in w. CH_3OH u. bildet weiße Blättchen, F. 62°. Der Rest liefert aus Bzl. grüngelbe Blättchen, F. 68° (Helv. chim. Acta 9. 59—67. Genf, Univ.)

LINDENBAUM.

R. Eder und **O. Manoukian**, *Untersuchungen über Derivate des β -Methylanthrachinons*. VII. *Über einige Nitroderivate des 1-Oxy-3-methylanthrachinons und Umwandlungsprodukte derselben*. (VI. vgl. EDER u. HAUSER, Helv. chim. Acta 8. 140; I. 1923.) Im Anschluß an die Nitrierung des 2-Methylanthrachinons (vgl. 4. Mitt.; C. 1924. I. 2695) haben Vff. die des 1-Oxy-3-methylanthrachinons untersucht. Es war zu erwarten, daß letzteres gleich dem 1,3-Dimethylanthrachinon (vgl. SCHOLL, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 353 [1910]) nur homonukleare NO_2 -Derivv. liefern würde. In der Tat wurden als Hauptprod. das 2,4-Dinitroderiv., als Nebenprodd. das 2- u. 4-Mononitroderiv. erhalten. Daß sämtliche Substituenten im gleichen Kern stehen, folgt daraus, daß die Mononitroderivv. zu dem genannten Dinitroderiv. weitenitriert werden u. letzteres von alkal. KMnO_4 -Lsg. zu Phthalsäure oxydiert wird. Das Dinitroderiv. konnte durch Austausch der NO_2 -Gruppen gegen OH, allerdings mit geringer Ausbeute, in *Methylpurpurin* übergeführt werden. — Die Konst. der Mononitroderivv. wurde durch Red. zu den Aminoderivv. u. Vergleich letzterer mit dem 1-Oxy-3-methyl-4-aminoanthrachinon [F. 258° (korr.)] von ULLMANN u. SCHMIDT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 2112; C. 1920. I. 528), dessen Konst. feststeht, entschieden. Dieses Amin haben Vff. auch aus dem im D.R.P. 131402 beschriebenen 1-Amino-4-brom-2-methylanthrachinon (F. 245—246°, nicht 215—216°, wie im Patent angegeben) nach dem Verf. des D. R. P. 203083 dargestellt. Es erwies sich als ident. mit dem Amin aus dem einen der beiden Nitroderivv., womit auch die Konst. des anderen ohne weiteres gegeben ist.

Versuche. 1-Oxy-3-methylanthrachinon. Aus Phthalsäureanhydrid, m-Kresol u. Borsäure nach BENTLEY, GARDNER u. WEIZMANN (Journ. Chem. Soc. London 91. 1626 [1907]. Anhydrierung der Oxymethylbenzoylbenzoesäure mit 1 Teil Borsäure, 2 Teilen Monohydrat u. 10 Teilen 20%ig. Oleum (Wasserbad, 4 Stdn.), Rohprod. mit Soda auskochen. — 1-Oxy-3-methyl-2,4-dinitroanthrachinon, $\text{C}_{15}\text{H}_8\text{O}_7\text{N}_2$. Aus dem

vorigen in 4 Teilen konz. H_2SO_4 mit 1 Teil KNO_3 (Wasserbad, 5 Stdn., über Nacht stehen lassen). Gelbe, perlmutterglänzende Nadeln aus Eg., F. 275—276° (Zers.), swl. in k. konz. H_2SO_4 , beständig gegen sd. HNO_3 (D. 1,3). Na-Salz, mkr. fleischrote Nadeln. — *1-Oxy-3-methyl-2,4-diaminoanthrachinon*. Aus dem vorigen mit sd. 5%ig. Na_2S -Lsg. Tiefviolette Nadeln aus Eg., F. 259—260°. H_2SO_4 -Lsg. orangerot. — *Methylpurpurin* (*1,2,4-Triox-3-methylanthrachinon*), $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_5$. Das Dinitroderiv. mit NaOH in CH_3OH 15 Stdn. kochen, CH_3OH mit Dampf abtreiben, ansäuern, Rohprod. (infolge Red. durch CH_3OH hauptsächlich aus Aminoverbb. bestehend) mit konz. HCl u. Eg. im Rohr 6 Stdn. auf 190° erhitzen, W. zugeben, Prod. mit Bzl. auskochen, Bzl.-Lsg. mit 5%ig. Sodalg. ausschütteln, mit Eg. fällen. Nach Vakuumsublimation Krystalle aus Bzl., F. 231—232°. Lsg. in Soda rosarot, violettstichig, in H_2SO_4 carminrot, in organ. Lösungsm. gelb. Ba-Salz, violette, swl. Nadeln. — Darst. der Mononitroderiv. wie oben, jedoch mit weniger KNO_3 u. bei Zimmertemp. Rohprod. in 80—100 Teilen sd. Eg. lösen; beim Erkalten scheidet sich Dinitroderiv. aus, ebenso zunächst nach Einengen; später folgen die Mononitroderiv. Trennung durch abwechselnde Behandlung mit Aceton u. Eg. — *1-Oxy-3-methyl-2-nitroanthrachinon*, $\text{C}_{15}\text{H}_9\text{O}_5\text{N}$, hellgelbe Blättchen aus Aceton, F. 272—273° (Zers.). Wird von sd. NaOCH_3 -Lsg. kaum verändert. — *1-Oxy-3-methyl-2-aminoanthrachinon*, $\text{C}_{15}\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}$. Mit Na_2S . Violette Nadeln aus Eg., F. 238°. H_2SO_4 -Lsg. orangegeb. — *1-Oxy-3-methyl-4-nitroanthrachinon*, hellgelbe Nadeln, F. 241—242°, leichter l. in Aceton als das Isomere. — *1-Oxy-3-methyl-4-aminoanthrachinon*. 1. Aus dem vorigen mit Na_2S . Rotviolette Nadeln aus Eg., F. 253—254°. H_2SO_4 -Lsg. orangerot. 2. Aus 1-Amino-4-brom-2-methylanthrachinon mit Borsäure in Monohydrat (90—100°, dann 110—115°, je 6 Stdn.). F. 251°; Misch.-F. 252—253°. (Helv. chim. Acta 9. 51—59. Zürich, Techn. Hochsch.)

LINDENBAUM.


J. P. Wibaut, Über die Darstellung von *N*-Methylpyrrolidin durch katalytische Hydrierung von *N*-Methylpyrrol. Die Red. der Pyrroline zu Pyrrolidinen mit naszierendem H gelingt nicht; dagegen liefert die katalyt. Hydrierung mit Pt-Oxyd-Katalysatoren gute Resultate. Die Hydrierung des *N*-Methylpyrrols verläuft zwar langsam; die Ausbeute ist aber gut, u. das *N*-Methylpyrrolidin wird leicht in reinem Zustande erhalten.

Experimenteller Teil. Die Red. des *N*-Methylpyrrols zu *N*-Methylpyrrolidin mit Zn u. HCl bei Zimmertemp. verlief glatt; bei Verss. zur weiteren Red. des *N*-Methylpyrrolins mit Sn u. HCl oder Na u. Alkohol blieb das Ausgangsmaterial unverändert. — Katalyt. Hydrierung: Der Pt-Katalysator wurde durch Schmelzen von Platinchlorwasserstoffsäure mit NaNO_3 dargestellt; als Lösungsm. wurde Eg. verwandt; der H-Überdruck betrug etwa 20 cm W. 8,1 g *N*-Methylpyrrol in 40 cm Eg. (+ 3,0 g Katalysator) nahmen in 41 Stdn. 4,5 l H auf (theoret. 4,48 l). Erhöhung der Temp. auf 50° war ohne Einfluß auf die Hydrierungsgeschwindigkeit. Ausbeute 74,8% der Theorie an *N*-Methylpyrrolidin, Kp. 78—80°. Reinigung über das Pikrat (F. 225°, korr.). (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 1101—05. 1925. Amsterdam, Univ.)

ZANDER.

J. van der Lee, Darstellung von Indol aus ω ,*o*-Dinitrostyrol. ω ,*o*-Dinitrostyrol wurde durch verschiedene Mittel reduziert, wobei als Endprod. der Rk. Indol isoliert wurde. Der Reaktionsverlauf ist anscheinend folgender: Die erste Reduktionsstufe ist das ω ,*o*-Diaminostyrol, welches unter NH_2 -Abspaltung in ω -Oxyaminostyrol übergeht; dieses lagert sich in *o*-Aminophenylacetaldehyd um, welches sich unter Wasseraustritt zu Indol kondensiert. — Die Red. des Dinitrostyrols mit Eisenpulver u. Essigsäure bei 90° ergab 9,4% der theoret. Ausbeute an Indol, die Red. mit Zinkstaub u. Essigsäure in äth. Lsg. ergab 11% der theoret. Ausbeute. Mit Al-Amalgam wurde ebenfalls Indol erhalten; die Ausbeute wurde hier nicht bestimmt. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 1089—92. 1925. Leiden, Univ.) ZANDER.

H. J. Backer und C. H. K. Mulder, *Einige Oxyderivate des 1,2,4-Triazols*. Für das aus Benzaldehyd-(2-methylsemicarbazon) durch Oxydation erhaltliche *2-Methyl-5-phenyl-3-oxy-1,2,4-triazol* kommen die tautomeren Formen **I**, **II** u. **III** in Frage. Da dieses Triazol schwach saure Eigenschaften besitzt u. sich in verd. Alkalien löst, ist Formel **I** (Enolform) den anderen vorzuziehen. Die Nitrosierung gelang nicht; die Nitrierung ergab kein Nitramin, sondern ein in der p-Stellung der Phenylgruppe substituiertes Mononitroderiv. Die anderen dargestellten Triazole ergaben ebenfalls keine Nitramine. — Von den 3 Diphenyl-3-oxy-1,2,4-triazolen, **IV**, **V** u. **VI**, ist bisher nur **IV** bekannt. **V** u. **VI** lassen sich aus Benzaldehyd-(2-phenylsemicarbazon) bezw. (3-phenylsemicarbazon) darstellen. Die Existenz dieser 3 Isomeren veranschaulicht die Veränderlichkeit des 1,2,4-Triazolkerns.




Versuchsteil. *2-Methyl-5-p-methoxyphenyl-3-oxy-1,2,4-triazol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_3$, aus p-Anisaldehyd-(2-methylsemicarbazon) (F. 192°) durch Oxydation mit alkoh. Ferrichloridlsg. bei 110–120° (Einschlußrohr), weiße Nadeln aus 50%ig. A., F. 223,5°; schwach sauer, l. in NH_3 u. Alkalien. — *Piperonal-(2-methylsemicarbazon)*, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}_3$, aus Piperonal u. 2-Methylsemicarbazid, Nadeln aus A., F. 226°. — *2-Methyl-5-(methylenedioxyphenyl)-3-oxy-1,2,4-triazol*, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_3$, aus vorigem durch Oxydation, Nadeln aus A., F. 273°. — *2-Methyl-5-p-nitrophenyl-3-oxy-1,2,4-triazol*, $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_3\text{N}_4$, aus 2-Methyl-5-phenyl-3-oxy-1,2,4-triazol (**I**) durch Nitrierung mit $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ (kurze Zeit auf 100° erhitzen u. eingießen in Eiswasser), verhält sich wie eine einbas. Säure. — *2,5-Diphenyl-3-oxy-1,2,4-triazol*, $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{ON}_3$ (**V**), aus Benzaldehyd-(2-phenylsemicarbazon) (F. 152°) durch Oxydation mit alkoh. Ferrichloridlsg. (2 Stdn. 125°), Nadeln, F. 234,5°. — *Benzaldehyd-(3-phenylsemicarbazon)*, $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{ON}_3$, aus Benzaldehyd u. 3-Phenylsemicarbazid, Nadeln, F. 177°. — *4,5-Diphenyl-3-oxy-1,2,4-triazol*, $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{ON}_3$, aus vorigem durch Oxydation, Nadeln, F. 260–261°. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**. 1113–17. 1925. Groningen, Univ.)

ZANDER.

Heinrich Biltz und Helmut Hanisch, *Versuche zur Herstellung von 8-Alkylallantoinen; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis von Hydroxonsäure und 5-Aminohydantoin*. Verss. zur Herst. methylierter Allantoine haben bisher nur zu soviel, nämlich 8, Methyl-Derivv. geführt, als der Formel eines Oxy-acetylen-diureins für das Allantoin entspricht, während Unterss. über das Allantoin u. seine Alkylabkömmlinge für jenes die alte Grimauxsche Formel ergeben hatten, nach der im ganzen 14 Methylabkömmlinge möglich sind. Die Bemühungen der Vff. zur Darst. noch fehlender Methylallantoine waren ergebnislos. — Bestätigt wird die B. von Allantoin aus *alloxansäurem Harnstoff* und *Harnstoff*, dagegen nicht die B. von Allantoin aus freier Alloxansäure u. Harnstoff nach BEHREND u. ZIEGER (LIEBIGS Ann. **410**. 340; C. **1916**. I. 45). Verss., Allantoin als das Säureamid der Hydroxonsäure aus deren Estern herzustellen, mißlangen ebenfalls. Hergestellt wurden einige Salze der *Hydroxonsäure*: Methylammoniumsalz, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_4\text{N}_3 \cdot \text{NH}_3 \cdot \text{CH}_3$; ll. in W., wl. in CH_3OH u. A. — Bariumsalz, $(\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_4\text{N}_3)_2\text{Ba}$, H_2O . — Dikaliumsalz, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_4\text{N}_3\text{K}_2$, H_2O , Zers. bei 313°. — Verss., 5-Aminohydantoin aus Hydroxonsäure durch Abspalten von CO_2 , sowie durch Red. von Allantoxaidin oder aus i-Cyansäureestern u. Allantoxaidin oder aus Alloxansäure u. NH_3 herzust., mißlangen. — *5-Acetylaminohydantoin*, $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_3\text{N}_3$, aus *Diacetylaminohydantoin* durch 20std. Kochen mit W., ll. in W., wl. in CH_3OH u. A., F. 218–219°. — *3-Methyl-5-acetylaminohydantoin*, $\text{C}_6\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_3$, aus

vorst. Verb. mit Diazomethan, ll. in CH_3OH u. A., F. 210° . — *Salze des 5-Acetylaminohydantoin*: Na-Salz, $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_3\text{Na}$, H_2O , ll. in W., F. (undeutlich) $66-106^\circ$. Ag-Salz, $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_3\text{Ag}$, H_2O . — *Salzsaures 5-Aminohydantoin*, aus der Diacetyl- oder Triacetylverb. mit CH_3OH u. HCl . Verss. zur Herst. der freien Base aus dem Chlorid mit Ag_2O oder NaOH mißlingen. — Aus 3-Methylallantoin wurde 3-Methyloxonsäure hergestellt. — *Methylester der 3-Methyloxonsäure*, Zers. bei 214° unter Abspaltung von CO_2 u. B. von *Methylallantoxaidin*, l. in W. u. CH_3OH , wl. in A. — *Dimethylallantoxaidin* aus 3-Methyloxonsäure u. Diazomethan oder aus Allantoxaidin-Ag-Salz mit CH_3J , F. 164° . — *ω -Methylbiuret* wurde durch Biuretspaltung des 3-Methylallantoxaidins erhalten u. als *ω -Nitroso- ω -methylbiuret* vom F. 139° identifiziert. — *3-Methyl-hydroxonsäure*, $\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_4\text{N}_3$, aus 3-methyloxonsaurem K. u. Na-Amalgam, ll. in W., wl. in CH_3OH , swl. in A., F. $246-247^\circ$. — NH_4 -Salz. $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4\text{N}_3$, $\text{NH}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, Zers.-Punkt 260° . — K-Salz, $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4\text{N}_3\text{K}$, H_2O , bei 270° Braunfärbung, einige Grade höher Aufschäumen. — Ag-Salz, $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4\text{N}_3\text{Ag}$, Zers. 192° . — Ba-Salz, $(\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4\text{N}_3)_2\text{Ba}$, Zers. oberhalb 265° . — Pb-Salz, $(\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_4\text{N}_3)_2\text{Pb}$, Zers. 350° . — Äthylester, $\text{C}_7\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_3$, ll. in W., CH_3OH ; wl. in A., Essigester, F. $172-173^\circ$. — Methylester, $\text{C}_6\text{H}_9\text{O}_4\text{N}_3$, ll. in W., CH_3OH , wl. in A., Essigester, F. $210-211^\circ$. — *1-Acetyl-3-methyl-5-acetylaminohydantoin*, $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_3$, aus 3-Methyl-5-acetylaminohydantoin u. $(\text{CH}_3\text{COO})_2$ oder aus 1-Acetyl-5-acetylaminohydantoin mit Diazomethan oder aus 1,3-Diacetyl-5-acetylaminohydantoin wie bei vorst. Verb. oder aus 3-Methyl-hydroxonsäure mit $(\text{CH}_3\text{COO})_2$, ll. in W., $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$, CH_3OH , wl. in A., Chlf., swl. in Bzl., unl. in Ä. — *Salzsaures 3-Methyl-5-aminohydantoin*, $\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$, HCl , aus $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_3$, ll. in W., wl. in CH_3OH , A. — Perchlorat, $\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$, HClO_4 , aus Eg., F. 222° , ll. in W., CH_3OH , $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$, wl. in A., Eg., unl. in Bzl., Chlf. — Rhodanat, $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_4\text{S}$, F. $188-189^\circ$, ll. in W., CH_3OH , wl. in A. — *3-Methyl-allantoin*, aus $\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$, HCl mit KCNO , F. 225° . — Aus $\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$, HCl konnte weder mit Ag_2O noch Ag_2CO_3 die freie Base *3-Methyl-5-aminohydantoin*, $\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$, gewonnen werden, mit MgO wurde sie in geringer Ausbeute erhalten, ll. in W., CH_3OH mit grüner Fluorescenz, wl. in A. Umsetzung mit Alkyl-i-cyanaten gelang nicht. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 138—63. Breslau, Univ.) LEHMANN.

P. Karrer und H. Lier, *Zur Kenntnis des Gypsophilasapogenins*. II. (I. vgl. KARRER, FIORONI, WIDMER u. LIER, Helv. chim. Acta 7. 781; C. 1924. II. 988.) Die in der 1. Mitt. dem *Alsapogenin* auf Grund der Oxydation u. der CO-Abspaltung durch konz. H_2SO_4 erteilte Formel muß geändert werden, da auch das *Alsapogenol*, das *Alsapogeninoxim*, die *Alsapogeninsäure* u. das *Alsapin* unter der Einw. von konz. H_2SO_4 CO abspalten. Bedenkt man ferner, daß auch α -Oxycarbonsäuren zur CO-Abspaltung unter denselben Bedingungen befähigt sind, so kann zwischen den Formeln einer α -Oxy- u. α -Ketocarbonsäure eine Wahl noch nicht getroffen werden. Die Tatsache, daß auch die *Alsapogeninsäure* leicht CO abgibt, würde zu dem Schluß zwingen, daß im *Alsapogenin* der ganze O auf die drei letzten C-Atome der Seitenkette verteilt ist. Danach wären zwei Formeln möglich:



Es ist bisher nicht gelungen, diese Formeln durch weiteren Abbau der *Alsapogeninsäure* zu stützen. Die Oxydation führt zu mehreren O-reichen Prodd. Die Red. ergab eine gut krystallisierende Verb., vielleicht $\text{C}_{27}\text{H}_{42}\text{O}_2$ oder $\text{C}_{27}\text{H}_{44}\text{O}_2$, die weder Lacton- noch Ketoneigenschaften aufweist. Bei der Oxydation des *Alsapogenins* entstehen außer der *Alsapogeninsäure* noch andere Verbb., die sich in der Mutterlauge befinden u. von denen eine der wahrscheinlichen Formel $\text{C}_{26}\text{H}_{40}\text{O}_6$ isoliert wurde. Sie ist eine einbas. Säure u. scheint außerdem zwei CO-Gruppen zu enthalten.

Versuche. Aus der *Alsapogeninsäure* erhält man mit k. konz. H_2SO_4 in der Kälte oder in sd. Eg. eine Verb. mit 78,5—78,9% C u. 9,7—10,2% H. Sie bildet

mkr. Nadeln aus Eg., F. 306°, l. in h. Eg., k. Bzl. u. CHBr₃, wl. in A., entfärbt nicht KMnO₄ in k. Eg., gibt auch mit w. konz. H₂SO₄ keine Gasentw., reagiert nicht sauer. — Verb. C₂₇H₄₂O₂ oder C₂₇H₄₄O₂. Durch 7-std. Kochen von Albsapogeninsäure mit amalgamiertem Zn u. konz. HCl in Eg. Krystalle aus Eg., F. 314° nach Sintern, l. in h. Eg., Bzl., Chlf., swl. in A., unl. in W. Reagiert nicht sauer, wird von sd. NaOH nicht verändert. — Verb. C₂₆H₄₀O₆. Man oxydiert Albsapogenin nach den Angaben der 1. Mitt. u. gießt die Mutterlauge von der Albsapogeninsäure nach zweitägigem Stehen in W. Nadelchen aus Eg., dann achtmal aus A., F. 226°, ll. in A., Eg., zl. in Ä., Bzl., unl. in W. Durch Titration gefundenes Mol.-Gew. 493 statt 448. Gibt ein Dioxim. Neutralisiert man die alkoh. Lsg. mit alkoh. NaOH, dunstet im Vakuum ein, löst in A. u. fällt mit HCl, so erhält man aus A. Nadeln derselben Zus., aber vom F. 235° u. Mol.-Gew. 587. (Helv. chim. Acta 9. 26—30. Zürich, Univ.) LB.



Jean Roche, *Über Methämoglobinbildung. Die Wirkung von Hydroxylamin auf das Blutpigment.* Bei Mengenverhältnissen, die 10 mg NH₂OH auf 10 cem Oxyhämoglobin-Lsg. (respirator. Kapazität 18) nicht übersteigen, bestehen streng gesetzmäßige Beziehungen zwischen der zugesetzten Menge NH₂OH, der Menge des gebildeten Methämoglobins u. NH₃ u. des frei werdenden N. Ebenso entstehen proportional dem NH₂OH-Zusatz Nitrate, die Red. des Oxyhämoglobin hält Schritt mit der Hydroxylaminzers. Bei größeren NH₂OH-Mengen komplizieren sich die Verhältnisse. Die Methämoglobin-B. bleibt bei 80% stehen. Die N-, NH₃- u. NO₃-Produktion wird gesteigert, bis die Hydroxylaminmenge 20 mg erreicht hat. Die Zers. von NH₂OH bleibt infolge der Veränderung der aktuellen Rk. bei Benutzung des Chlorhydrats stehen. Ferner kann festgestellt werden, daß die Red. von Oxyhämoglobin u. Methämoglobin zu Hämoglobin nur während der NH₂OH-Zers. verläuft, die Zunahme des N u. NH₃ bei Überschuß des Reagens nur bei alkal. Rk. zu bemerken ist u. daß die B. neuer Methämoglobinmengen nach erneutem Hinzufügen von Oxyhämoglobin, wenn die Methämoglobin-, N- u. NH₃-Produktion stehen geblieben ist, nur einsetzt, wenn das Ganze alkal. gemacht wurde. Für die Vorgänge wird die Gleichung:

$$11\text{NH}_2\text{OH} + 6\text{HbO}_2 = 5\text{HbO} + \text{Hb} + 2\text{N}_2 + 3(\text{NH}_4)\text{NO}_3 + \text{NH}_3 + 9\text{H}_2\text{O}$$

aufgestellt. (C. r. soc. de biologie 93. 1377—78. 1925. Straßburg, Inst. de chim. biol.)

OPPENHEIMER.

Maurice Nicloux und Jean Roche, *Studie über die Reaktion von Ferricyankalium auf Hämoglobin, Oxyhämoglobin, Kohlenoxydhämoglobin, und über den Sauerstoffgehalt des Methämoglobins.* Auf Grund der quantitativen Auswertung der Resultate der eudiometr. CO-Best. bei Einw. wechselnder Mengen K₃Fe(CN)₆ auf die genannten Hämoglobinverbb. werden die Vorgänge durch folgende Gleichungen wiedergegeben:



Die Ergebnisse beweisen aufs neue, daß das Methämoglobin die Hälfte des Sauerstoffs von Oxyhämoglobin besitzen muß. (C. r. soc. de biologie 93. 1373—76. 1925. Straßburg, Inst. de chim. biol.)

OPPENHEIMER.

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

Richard Willstätter und Eugen Bamann, *Zur Kenntnis der Hefemaltase.* VI. Mitt. (V. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 134. 224; C. 1924. II. 344.) In der Arbeit werden eine Anzahl von Beobachtungen mitgeteilt, welche für die Best. der Maltase wesentlich sind. Die direkte Vergärung der Maltose wird wahrscheinlich gemacht. Es werden Maße für die Maltase gegeben. Es werden neue Methoden zur Herst. der Enzym-lsgg. aus Hefe beschrieben. — Entgegen den Angaben von RONA u. MICHAELIS (Biochem. Ztschr. 58. 148; C. 1914. I. 565) bezw. WILLSTÄTTER u. STEIBELT (Ztschr. f. physiol.

Ch. 115. 199; C. 1921. III. 1435) wird das Optimum der Hefemaltase bei p_H 6,75—7,25 gefunden; p_H = 6,1 ist schon erheblich ungünstiger als neutrale Rk. u. p_H = 7,5 ist viel günstiger als p_H = 6,1. Wichtig ist die Verwendung reichlicher Puffermengen, da die Hefeautolysate bei der Maltosespaltung infolge proteolyt. Vorgänge saurer werden. — Maltase aus Hefen u. Autolysaten (frisch u. gealtert) folgen zwischen 30 u. 60% Maltosehydrolyse der von WILLSTÄTTER, OPPENHEIMER u. STEIBELT (Ztschr. f. physiol. Ch. 110. 232; C. 1921. I. 93) aufgefundenen, von dem monomolekularen Reaktionsverlauf abweichenden Zeit-Umsatzkurve. Im Zustande der Tonerdeadsorbate (oder wenn Tonerde in die Maltaselsg. eingetragen wird) u. in den hieraus gewonnenen Elutionen folgt die Maltase nicht mehr der für Hefe bzw. Autolysat beobachteten Kinetik; aus dieser zweiten Zeit-Umsatzkurve ergeben sich dann für aufeinanderfolgende Beobachtungszeiten Halbspaltungszeiten, die im Verlauf der Spaltung stark ansteigen, also ungünstiger werden. Es wird gezeigt, daß diese Erscheinung nicht auf Zerstörung des Enzyms beruht. Diese Änderung der Kinetik kann auch beim Filtrieren der gealterten Autolysate eintreten; läßt man das Filtrat 4—6 Stdn. stehen, so findet häufig wiederum eine Änderung der Kinetik in Richtung auf die ursprüngliche Kinetik statt. Es kommt auch vor, daß die Maltase in Tonerdeadsorbaten u. vor allem in Restlsgg. diesen beiden Kurven nicht unterliegt u. sich auch nicht ein u. demselben weiteren Zeitgesetz fügt. — Diese Veränderlichkeit der Kinetik sowie die Tatsache, daß in allen vorsichtig bei 0° aufbewahrten Hefeauszügen die Wrkg. der Maltase ansteigt, führt dazu, daß man Maltasewerte, aber nur scheinbare Maltaseeinheiten bestimmen kann. Unter Maltasewert (M.-W.) wird das 1000-fache des reziproken Maltasezeitwertes (vgl. V. Mitt., I. c.) verstanden. Als scheinbare Maltaseeinheit, M.-[e]. wird die Enzymmenge bezeichnet, die 2,5 g Maltosehydrat in 50 ccm Lsg. bei p_H = 6,8 u. 30° zu 50% in 1 Min. spaltet; d. i. die Enzymmenge in 1 g Trockensubstanz vom Zeitwert 1. Maltasewert (M.-W.) ist die in 1000 g Trockenhefe enthaltene Anzahl von M.-[e]. Der Ausdruck M.-[e]. wird ergänzt durch die Angabe der zugrundeliegenden Kinetik $[e_1]$, $[e_2]$. 1 M.-[e]. ist in 30—40 g Trockenhefe vom Maltasezeitwert 30—40 oder vom Maltasewert 33—25 enthalten. Um bei den Verss. der Trennung von Saccharase u. Maltase (vgl. nachst. Ref.) die Enzyme mit gleichartigen Maßen zu messen, wird die Saccharasevergleichseinheit (S.-V. E.) eingeführt, d. i. die Enzymmenge, welche 2,375 g Rohrzucker in 50 ccm bei 30° u. p_H = 4,3 zu 50% in 1 Min. spaltet; 1 S.-V. E. (entspr. 0,12 S.-E.) ist z. B. in 2 g Trockenhefe vom Invertin-Vergleichszeitwert 2 (entspr. Zeitwert 333). — Um den Nachweis der direkten Biosegärung zu vervollständigen, wird die Methode der Maltasebest. in der Hefe (II. Mitt.) erneut geprüft; die früheren Angaben werden bestätigt; es wird empfohlen, die zur Verflüssigung der Hefe erforderliche Einw. von Essigester auf 10—15 Min. auszudehnen u. die Puffermenge auf 1 g Phosphatmischung für je 100 ccm Best.-Lsg. zu erhöhen; Zusatz von 5—6 Tropfen Toluol auf 100 ccm ist zur Verhinderung jeglicher Gärung erforderlich. — Weitere Methoden werden ausgearbeitet, bei denen die Hefe mit Diammonphosphat oder mit NaCl abgetötet u. verflüssigt wird. Man verreibt 10 g abgepreßte Hefe mit 1 g feingepulvertem Diammonphosphat bis zu der in 8 bis 10 Min. erfolgten vollständigen Verflüssigung, verd. mit W. auf 50 ccm u. trägt je 20 ccm in die Maltaselsg. ein. Zur Verflüssigung durch rein osmot. Vorgänge können auch 10% NaCl vom Gew. der Frischhefe angewandt werden. Nach 10—30 Min. wird verd. u. mit etwa 10 ccm 1%ig. NH_3 für je 1 g Frischhefe neutralisiert. — Die direkte Vergärung der Maltase wird nochmals geprüft, u. zwar an maltasearmen Brennereihafen sowie an Brauereihafen, deren Maltasegehalt beim Verf. der Invertinverminderung (vgl. S. 2207) verringert war. Es ergab sich, daß die Gärung dabei stets schneller verläuft als die Hydrolyse der Maltase. Eine Brennereihefe, welche eine Halbspaltungszeit für Maltose von 100000 Min. hatte, zeigte unter den gleichen Bedingungen eine Halbgärzeit von 242 Min. Die Maltose wird also (ebenso wie von anderen Brannt-

weinhefen) in Zeiten vergoren, in denen die Hydrolyse des Malzzuckers keine Rolle spielt. Bei dem Verf. der Invertinverminderung wird auch der Maltasegehalt verringert, z. B. vom Zeitwert 42 auf Zeitwert 2000 (während gleichzeitig der Invertinzeitwert von 366 auf 3000 sinkt). Der hieraus berechneten Halbspaltungszeit für Maltose von 4000 Min. entspricht eine Halbgärzeit von 167 Min. Jedoch sind diese Zahlen nicht direkt vergleichbar, da infolge der Neubildung der Gehalt an Maltase steigt u. am Schluß der Gärung dem Zeitwert 106 entspricht. Unter diesen ungünstigen Bedingungen steht dann der Halbgärzeit von 212 Min. die Halbspaltungszeit von 167 Min. gegenüber. Vff. machen darauf aufmerksam, daß man besser die Zeiten der $\frac{1}{8}$ -Gärung bzw. $\frac{1}{8}$ -Spaltung vergleicht; auch ist unberücksichtigt, daß die Maltase bei der Gärung infolge der Vergärung der die Maltase hemmenden Glucose stärker wirken kann, als die Maltasebest. anzeigt. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß Maltose direkt vergoren wird (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. **115**. 199; C. **1921**. III. 1435).

In Fortsetzung früherer Arbeiten über *Invertin* (*Saccharase*) (LIEBIGS Ann. **425**. 1; C. **1922**. I. 200) wird die Herst. von Enzymlsgg. aus Hefe studiert. Wesentlich für Herst. von Enzymlsgg. höherer Reinheitsgrade ist es, die Freilegung eines Enzymes von den gesamten Vorgängen der Hefeautolyse soweit als möglich zu trennen. Die besten Enzymlsgg. erhält man, wenn man die Hefe in unverd. Zustand mit einem Zellgift (z. B. 100 ccm Essigester auf 100 g Hefe) verflüssigt, nach etwa $\frac{1}{2}$ Stde. mit W. verd., abzentrifugiert u. nun nach erneutem Zusatz von Essigester den Hefenrückstand etwa einen Tag lang autolytisiert. Bei dieser energ. Abtötung der Hefe u. besonders infolge der Abtrennung des Verflüssigungssaftes findet im Gegensatz zu der früher üblichen langsamen Vergiftung bei Behandeln mit W. + Zellgift ein nur geringfügiger enzymat. Abbau des Hefeinhaltes statt, so daß nur etwa $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{10}$ der Hefe-M. (anstatt etwa $\frac{1}{2}$ beim älteren Verf.) in Lsg. geht. — Den besten Weg zur Gewinnung von Maltase u. Saccharase stellt die Verflüssigung mit Diammonphosphat dar; hierzu wird die scharf abgepreßte, nicht weniger als 25—27% Trockensubstanz enthaltende Hefe mit 10% ihres Gew. an fein gepulvertem Phosphat verrührt u. nach 1 Stde. mit W. (der 10-fachen Menge des Trockengew.) ohne vorherige Neutralisation verd.; nach 5—8 Stdn. ist die Maltase quantitativ in Lsg. gegangen. — Maltaselsgg. hält man am besten ständig bei 0° (nicht nur im Eisschrank!). Bei Zimmertemp. ist die Maltase nur schlecht haltbar. Die bei 0° stehenden Lsgg. hielten sich mehr als 1 Woche; ihr Maltasegehalt begann am 2. oder 3. Tage zuzunehmen u. stieg bis zu 67% des ursprünglichen Wertes. Es ist möglich, daß diese bei Saccharase von den Vff. nie beobachtete Erscheinung durch Veränderung oder Ausscheidung eines hemmenden Begleitstoffes bedingt ist. Man beobachtet beim Stehen der Lsgg. die B. eines feinen Nd.; dieser hat jedoch keine die Maltase hemmende Wrkg. Die Annahme der Neubildung von Enzym ist unwahrscheinlich, da unter Bedingungen, bei denen reichliche B. von Saccharase beobachtet wird, nämlich bei Gärführung unter niedriger Konz. an Zucker, der Maltasegehalt nur wenig steigt; auch bleibt die Maltasemenge beim Lösen aus der Hefe anscheinend konstant. — Da bei den Reinigungsoperationen alkal. u. saure Mittel angewandt werden, untersuchen Vff. den Einfluß der Rk. auf die Haltbarkeit. Es ergab sich, daß $p_H = 4,5$ u. 8,3 bei Temp. von wenig über 0° einige Stdn. lang mit nur etwa 7% Verlust ertragen werden; dieser Verlust läßt sich durch Abkürzen der Operationen u. Arbeiten bei 0° auch noch vermeiden. (Ztschr. f. physiol. Ch. **151**. 242—72.)

HESSE.

Richard Willstätter und Eugen Bamann, Trennung von Maltase und Saccharase. VII. Mitt. über Maltase. (VI. vgl. vorst. Ref.) In der Arbeit ist es gelungen, die nahe verwandten Carbohydrasen aus Hefe, *Maltase* u. *Saccharase*, durch verfeinerte Adsorptionsmethoden zu trennen. Hierbei wurde z. T. mit Tonerdesorten der Arbeiten von R. WILLSTÄTTER, H. KRAUT u. O. ERBACHER (vgl. S. 1374) gearbeitet. Diese adsorbierten im Gegensatz zu den gewöhnlichen Tonerdesorten die

Maltase reichlich, während Saccharase nur spärlich adsorbiert wurde. Es ist auf diese Weise gelungen, die Adsorption auswählend zu gestalten. Ebenso konnte die Elution auswählend gestaltet werden, da Maltase u. Saccharase durch schwach alkal. oder neutrales Phosphatgemisch gleichmäßig eluiert werden, während primäres Alkaliphosphat fast nur die Saccharase eluiert u. dabei der größte Teil der Maltase im Adsorbat verbleibt. Zur Beurteilung des Wertes von Adsorptionsmitteln muß man daher die Adsorbentien an verschiedenen Enzymen prüfen. — Angewandt wurde 1. Tonerde C, 2. ein sehr rasch hergestelltes Tonerdegel $\text{Al}(\text{OH})_3$, 3. Tonerdegel 2 nach Alterung von einem Tag oder einigen Tagen, 4. Tonerdegel von der Formel AlO_2H . Dieses reagiert weder mit 38%ig. HCl noch mit 4%ig. NaOH; es hat von den genannten Tonerdesorten die beste Adsorptionsfähigkeit für Maltase, aber nur eine verschwindend geringe Adsorptionsfähigkeit für Saccharase. Diese ausgesprochene Selektivität bei Mangel an chem. Reaktionsfähigkeit zeigt, daß nicht die sauren oder bas. Eigenschaften der Tonerde, sondern noch nicht genau definierte Affinitätsverhältnisse für die Adsorptionswrkgg. bestimmend sein müssen. Bei den genannten Adsorptionsmitteln steigt die Bevorzugung von Maltase gegenüber Saccharase in der Reihenfolge 1—4 an. Der Adsorptionswert der Tonerden für Maltase ist bei 1 fünfmal besser als bei 4; Saccharase wird aber von 4 25mal schlechter als von 1 aufgenommen. Andere Metallhydroxyde boten keine Vorteile. *Kaolin*, das mit HCl behandelt war und dann vollständig ausgewaschen wurde, adsorbiert die Maltase aus den Autolysaten viel reichlicher als die Saccharase; jedoch wird die Maltase in diesen Adsorbaten bald zerstört, während sie in Tonerdeadsorbaten bemerkenswert haltbar ist. — Zur Befreiung der Saccharase von der Maltase wurden Invertinlsgg. (am besten aus invertinreichsten Hefen) mit denjenigen Tonerdesorten behandelt, welche die Maltase bevorzugt adsorbieren. Maltase wird frei von Saccharase erhalten, wenn aus dem mit einer geeigneten Sorte Tonerde hergestellten, nur geringe Mengen Saccharase enthaltenden Adsorbat bei 0° die Saccharase mit primärem Phosphat eluiert wurde und dann erst die Maltase mit Diammonphosphat frei von Saccharase eluiert wurde. Adsorptionen u. Elution der Maltasen müssen stets bei 0° vorgenommen werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. **151**. 273—85. München, Lab. d. Akad. d. Wissenschaften.)

HESSE.

Richard Willstätter, Karl Schneider und Erwin Wenzel, *Zur Kenntnis des Invertins*. XII. Abhandl. (XI. vgl. S. 2207.) Diese als Abschluß der vorliegenden Reihe von Mitt. gedachte Arbeit bringt weitere Verbesserungen der Adsorptionsmethoden u. der Reinigung der *Saccharase*. Die Methode wurde so entwickelt, daß man jetzt in kurzer Zeit zu Invertinpräparaten von S.-W. = 5 gelangt, was früher nur nach langwierigen Operationen möglich war. Es gelingt nämlich durch weitere Verbesserung des Freilegungsverf. (s. unten) Hefeauszüge mit S.-W. 0,5—1 zu erhalten; diese Saccharasewerte betragen das 10—20-fache der S.-W. der in den früheren Mitt. (I. c.) beschriebenen invertinreichsten Hefen. Durch Dialyse steigt die Konz. des Enzyms auf S.-W. 2,5 (Zeitwert 0,40). Aus diesem günstigen Ausgangsmaterial ließen sich jedoch wider Erwarten keine Präparate mit besonders hoher Enzymkonz. erhalten; bei Adsorptionen wurden nur Präparate mit dem üblichen Grenzwert des Saccharasewertes, nämlich etwa S.-W. = 5, erzielt. Auch die Vornahme der fraktionierten Autolyse der Hefe bei Zimmertemp. sowie die Vermeidung der Alterungsprozesse ändern hieran nichts. Die Zus. der Invertinpräparate wird nicht beeinflusst durch Vornahme der Autolyse in der Wärme oder in der Kälte, wohl aber dadurch, ob die Autolyse rasch mit unverd. Hefe (X. Abh.) oder langsam nach Verdünnen vorgenommen wird; die energ. Abtötung der unverd. Hefe mit Toluol führt (auch in der Wärme) zu schonender Freilegung, während bei der langsamen Autolyse die Abbaenzyme stärker arbeiten u. eine weniger auswählende Entleerung der Hefe u. ein stärkerer Abbau des Saccharasekomplexes erfolgt. Noch reiner erhält man dann die Saccharase,

wenn man sie nach WILLSTÄTTER u. BAMANN (vorvorst. Ref.) durch auswählende Adsorption von Maltase bzw. deren Inaktivierungsprod. befreit. — Der Vergleich der nach diesen u. nach den früheren Methoden hergestellten Präparate zeigt, daß in nach den jetzigen Methoden hergestellten Autolysaten u. Präparaten die Aggregate der Saccharase mit ihren Begleitstoffen mehr geschont sind, während bei den langdauernden Autolysen die natürlichen Enzymkomplexe verändert werden unter Wechsel ihrer Begleitstoffe. Die neuen Präparate sind daher auch beständiger. — Wie bereits gesagt, kommt man mit den Adsorptionen an Tonerde u. Kaolin zu Präparaten, die den Grenzwert S.-W. = 5 nicht wesentlich überschreiten, wobei das Enzym so fest mit seinen Koadsorbentien vereinigt ist, daß es bei Adsorption an Tonerde das Verh. eines einheitlichen Stoffes zeigt. Durch Fällung dieser Präparate mit Tannin bei 0° u. Isolieren aus dem Nd. läßt sich aber eine weitere Steigerung auf S.-W. = etwa 9 erhalten. Auch lassen sich die durch Kaolin u. Tonerde gereinigten u. so nicht weiter zu reinigenden Invertinpräparate durch fraktionierte Adsorption an einen in der Lsg. erzeugten Nd. von Pb-Phosphat weiter reinigen. Es werden Präparate mit S.-W. = etwa 10 erzielt. Gleichzeitig findet dabei eine Trennung von den Inaktivierungsprodd. des Enzyms statt. — Der Gehalt an *Tryptophan* bzw. an einem es enthaltenden Peptid ist in den Präparaten wechselnd u. auch nicht für die Beständigkeit wichtig. Es wurden jetzt Präparate erhalten, die bei den Saccharasewerten 8,4, 11,9 u. 9,7 auf 1 S.-E. 0,12, 0,16 u. 0,18 mg Tryptophan enthielten. Wenn auch die Forderung von EULER u. JOSEPHSON (Ztschr. f. physiol. Ch. **145**. 130; C. **1925**. II. 1604) nach reproduzierbaren Methoden zur Entfernung des Tryptophans unter Beibehaltung der Aktivität der Präparate nicht erfüllt ist, so ist doch nachgewiesen, daß der Gehalt an irgendeinem bestimmten Peptid für die Zus. der Saccharase nicht wesentlich ist. — In den Arbeiten über Saccharase ist es gelungen, zu zeigen, daß man jeden einzelnen der mit der Saccharase vergesellschafteten u. als Koadsorbentien wirkenden Begleitstoffe für sich von dem Enzym trennen kann. Ein abtrennbarer Begleitstoff ist für die Zus. des Enzyms als bedeutungslos anzusehen, auch dann, wenn er etwa Einfluß auf Affinitätsverhältnisse oder Hemmungserscheinungen hat. Die bei den Reinigungsvornahmen gewonnenen Erfahrungen machen es wahrscheinlich, daß die Natur des kolloiden Trägers veränderlich ist. Das Enzym vermag seine Aggregate zu wechseln. „Es erscheint nur noch nicht als erreichbar, die chem. wirkende akt. Gruppe, die man das eigentliche Saccharasemolekül nennen sollte, unter Erhaltung der Wirksamkeit von den schützenden Kolloiden vollkommen abzutrennen.“

Versuche. Es werden eine Anzahl von Verss. mitgeteilt, die eine Verbesserung der Autolysate bezwecken. Als zumeist angewandte Methode wird die Methode der X. Abh. angegeben, die in Führung der Brauereihefe bis zu einem Zeitwert von etwa 20 Abtötung in unverd. Zustand mit Toluol bei 30°, Verdünnen mit dem gleichen Gewicht W. nach 1 Stde. u. Neutralisieren mit verd. NH_3 , Abtrennung der neutral gehaltenen Vorfraktion nach 2 weiteren Stdn., Freilegung des Invertins in 8—24 Stdn. bei 30° mit einer Ausbeute von 95% des nach Abtrennung noch vorhandenen (das sind 85% des gesamten) Invertins besteht. Das mit der doppelten oder vierfachen W.-Menge verd. Autolysat wird nun zunächst mit der Zentrifuge abgetrennt u. danach durch geringes Ansäuern mit Essigsäure von Eiweiß vollständig befreit. Für Arbeiten mit Saccharase, bei denen Ggw. von Hefegummi u. Peptiden nicht stört, wird Anwendung dieser Autolysate empfohlen. Die Autolysate (mit Zeitwert 2—1) sind bei einem Gehalt von 1 S.-E. in 40 ccm so gut wie farblose, wasserklare Lsgg., die erst nach Eindampfen (auf 1 S.-E. in 2—4 ccm) grünlichgelb u. etwas trüb werden. Eintrocknet sind es hygroscop., sandfarbige Pulver; Millon-Rk. ist positiv, kann aber bei Dialyse oder bei Fällung mit A. oder bei einmaliger Adsorption an Kaolin verschwinden. Ein Autolysat vom Zeitwert 1,19 enthielt (bezogen auf Trockengewicht) 7,3% *Hefegummi* u. 1,10% Tryptophan, d. i. je 1 S.-E. 4,35 mg bzw. 0,65 mg. Nach 3-wöchentlicher Dialyse

war die Konz. verdreifacht (Zeitwert 0,39—0,40), der Tryptophangehalt in % des Trockengewichtes fast unverändert, aber auf 1 S.-E. berechnet zurückgegangen, nämlich auf 0,23 mg. Die auf 1 S.-E. treffende Tryptophanmenge ist 4-mal kleiner als in den besten Präparaten der VIII. Abb. (Ztschr. f. physiol. Ch. **142**. 257; C. **1925**. I. 1747). Für Adsorption an Kaolin sind diese dialysierten Autolysate ungeeignet, da das Invertin im Adsorbat z. T. zerstört wird. Präparate höheren Reinheitsgrades werden erhalten, indem man ohne Dialyse an Kaolin oder ohne Dialyse nach Fällung mit A. an Tonerde adsorbiert. Die letzte Methode lieferte ein Präparat von S.-W. 7,31 (Zeitwert 0,137), dessen Zeitwert prakt. infolge der Verluste bei Dialyse (6%) u. Elektrodialyse (8%) 0,158 betrug; es war frei von Hefegummi u. enthielt 2% Tryptophan. — Invertin ist mit Tannin bei gewöhnlichen Bedingungen nicht, wohl aber bei Erniedrigung der Temp. auf 7°, am besten auf 0°, fällbar; die Fällung ist stark von der Konz. des Tannins u. weniger von der des Enzyms abhängig. Bei gewöhnlicher Temp. ist das Invertin gegen Tannin sehr unbeständig; die Zerstörung kann durch rasches Arbeiten bei 0° verringert werden. Da die Adsorption an Tonerde durch Tannin nicht gestört wird, sondern nur der Adsorptionswert stark erniedrigt wird, kann man das Enzym von Tannin trennen, indem man die Lsg. des Nd. mit Tonerde versetzt; dabei geht das Tannin mit an die Tonerde, nicht aber in die Elution mit Diammonphosphat. Während auf diese Weise der Hefegummi ganz entfernt wurde, betrug der Tryptophangehalt eines Präparates von S.-W. 9,43 (Zeitwert 0,106) 5,9%. — Während es früher nicht glückte, inaktivierte u. akt. Saccharase zu trennen, zeigen Vff. jetzt, daß man dies durch eine fraktionierte Fällung mit in der Lsg. erzeugtem Bleiphosphat (u. zwar in allen untersuchten Fällen) erreichen kann; zur systemat. Fraktionierung erwies es sich günstig, eine ausprobierte Menge Ammonphosphat zu der konz. Invertinlsg. zu setzen u. dann aus einer Bürette unter starkem Schütteln Pb-Acetatlg. zuzugeben. (Pb-Acetat allein ruft nur in Autolysaten, nicht aber in reineren Saccharaselsgg. einen Nd. hervor.) Die ersten Fraktionen des Nd. enthielten entweder inakt. oder nur wenig akt. Enzym. Dabei gelang es, das Invertin in tryptophanreichere u. -ärmere Fraktionen zu zerlegen. Im Anschluß an diese Verss. werden die seit der Arbeit von EULER u. JOSEPHSON (l. c.) erhaltenen Präparate u. ihr Tryptophangehalt zusammengestellt. Es ergibt sich, daß kein Zusammenhang zwischen den Saccharasewerten u. dem Tryptophangehalt besteht. — Das tryptophanhaltige Peptid läßt sich aus den Enzymkomplexen durch Leucylglycin, Leucylglycylglycin u. Glycyltyrosin verdrängen; die Fraktionierung mit Hilfe des Bleiphosphat-Nd. ergibt Anteile, die stark wechselnde Mengen Tryptophan enthalten. — Bei der fraktionierten Adsorption wurden häufig Beständigkeitseinbußen beobachtet; es läßt sich zeigen, daß die Saccharase zwar einer oder mehrerer kolloider Schutzstoffe bedarf, daß jedoch dies sicher nicht Hefegummi oder tyrosin- oder tryptophanhaltiges Peptid sind. — Die Höchstwerte der nach dem Bleiphosphatverf. erhaltenen Präparate waren S.-W. (11,9) bei einem sehr unbeständigen u. S.-W. 9,6 u. 9,7 (dieses mit 3,5% Tryptophan) bei sehr beständigen Präparaten. Bei einem mit Tanninfällung hergestellten Präparat wurde S.-W. 9,41 erreicht. Der N-Gehalt dieser Präparate betrug 8,20, 8,92 bzw. 9,52%. — Reinere Präparate von S.-W. = 5 ergaben im C-Gehalt keinen bemerkenswerten Unterschied gegenüber früheren Präparaten von S.-W. 2,0, 1,17, 5,0 u. 3,45. Der Unterschied im N-Gehalt war groß. Früher war bei Präparaten mit S.-W. 3,45, 5,0 u. 4,17 der Gehalt an N zu 17,5, 12,7 u. 4,8% gefunden worden. In zwei Präparaten, dem schwerst adsorbierbaren Anteil einer Fraktionierung mit S.-W. = 5,0 u. dem leichtest adsorbierbaren Teil der gleichen Fraktionierung mit S.-W. = 4,55 wurden gefunden 2,9 bzw. 1,7% Tryptophan; 0,94 bzw. 8,57% Asche, 45,96 bzw. 40,20% C, 7,30 bzw. 6,37% H, 9,90 bzw. 7,72% N. (Ztschr. f. physiol. Ch. **151**. 1—30. München, Lab. Akad. d. Wiss.)

HESSE.

Hans v. Euler und Ragnar Nilsson, *Zur Kenntnis der Oxydo-Reduktase (Dehydrogenase) der Hefen. II.* (I. vgl. S. 1212.) Die vorliegende Unters. erstreckt sich auf die als von der Co-Zymase verschieden erkannte *Co-Reduktase*. Es werden Vorarbeiten zu ihrer Reinigung u. quantitativen Charakterisierung beschrieben. Die Wrkg. der Reduktase wurde an der zur Entfärbung von Methylenblaulsg. (0,5 g in 1000 cem W.) gebrauchten Zeit gemessen. Biokatalysator Z aus Hefe oder Gerstenkeimlingen (EULER u. SWARTZ, Ztschr. f. physiol. Ch. **140**. 146; C. **1924**. II. 2769) kann die aus der Hefe fortgewaschene Co-Reduktase ersetzen. Der Glührückstand des Biokatalysators hatte keine Wrkg. — Co-Reduktase konnte in Muskelsaft nachgewiesen werden; sie wurde nicht gefunden in den durch 4-std. Extraktion mit sd. W. aus Birnen, Kartoffeln oder Salatblättern erhaltenen Lsgg. — Formaldehyd hemmt die Reduktase; die geringe, durch Acetaldehyd bewirkte Hemmung kann auf Verschiebung des pH beruhen. Die beiden Aldehyde üben auch in Ggw. von Co-Reduktase keine beschleunigende Wrkg. aus. — Wird die Hefe zunächst 30 Min. lang auf 40° erwärmt, so beobachtet man eine wesentliche Beschleunigung der Reduktasewrkg. — Es wird gezeigt, daß diese Oxydo-Reduktionssysteme auch Nitrate reduzieren können. (Ztschr. f. physiol. Ch. **151**. 155—64. Stockholm, Hochsch.) HESSE.

Ernst Waldschmidt-Leitz und Anton Schäffner, *Zur Kenntnis des Darmerepsins. V. Mitt. zur Spezifität tierischer Proteasen.* (IV. vgl. S. 1664.) Nachdem es in dieser Arbeit gelungen ist, das Darmerepsin von den geringen Mengen von *Trypsin* zu trennen, ergab der Vergleich von Darm- u. Pankreaserepsin, daß keine Anhaltspunkte für eine Verschiedenheit der beiden Enzyme mehr vorliegen, sondern daß sie als ident. zu betrachten sind. Trypsin u. Erepsin sind scharf voneinander zu unterscheiden. Erepsin ist nur zur Spaltung von einfachen *Peptiden* befähigt (vgl. III. Mitt.), die von Trypsin nicht angegriffen werden. Es ist noch nicht erkannt, ob die spezif. Wrkg. des Trypsins sich auf die Abspaltung gewisser besonderer Proteinbausteine bezieht oder ob sie sich etwa bei einer bestimmten Länge der Polypeptidkette oder bei besonderen cycl. Strukturen geltend macht. Da die Wrkg. des Trypsins unter Abspaltung von Aminosäuren erfolgt (vgl. III. Mitt.), können die von HERZOG, ABDERHALDEN oder BERGMANN vertretenen Vorstellungen über die Struktur der Proteine bezw. ihrer Bausteine nicht zutreffen. — Die *Aminosäurentitration* in 90°/öig. A. wird durch die bei der Messung des Erepins notwendige größere Konz. an Phosphat (da dieses in A. wl. ist) gestört; man kann aber die Titration ebensogut in 80—85°/öig. CH₃OH vornehmen; bei dieser Konz. wurde kein Nd. der Phosphate beobachtet. — Das Optimum der Wrkg. gegen *Leucylglycin* u. *Glycylglycin* liegt, wie schon DERNBY (Biochem. Ztschr. **81**. 107; C. **1917**. II. 111) angegeben hat, bei pH 7,8. Man muß zur Konstanthaltung der [H⁺] größere Puffermengen anwenden. Für Pankreaserepsin wurde in der II. Mitt. das gleiche Optimum gefunden. — Unabhängig von der [H⁺] verläuft die Spaltung von Glycylglycin nach der Reaktionsgleichung erster Ordnung. Im Bereich der Enzymmengen 1:10 wird für Darmerepsin Proportionalität von Enzymmenge u. Reaktionsgeschwindigkeit gefunden. Damit werden die Befunde von DERNBY (l. c.) im Gegensatz zu denen von ABDERHALDEN u. FODOR (Fermentforschung **1**. 533; C. **1917**. I. 311) bestätigt. Nur bei ganz kleinen Enzymmengen wird die Proportionalität nicht gefunden. — Zur Best. des Erepins werden 0,001 Mol = 0,1320 g Glycylglycin in 5,00 cem 0,2-mol. Phosphatpuffer von pH = 7,8 gel. u. die Lsg. durch eine in einem Vorvers. in Ggw. von Enzymlsg. ermittelte Menge 0,2-n. NaOH (gewöhnlich 1,80 cem) wieder auf pH = 7,8 gebracht; nach Zusatz von Enzymlsg. wird auf 10,8 cem aufgefüllt; nach der Versuchszeit bei 30° wird die Enzymwrkg. durch Eintragen in 130 cem CH₃OH unterbrochen u. nach Zusatz von 1,0 cem 0,5°/öig. Lsg. von Thymolphthalein + 20 cem W. mit 0,2-n. 90°/öig. alkoh. KOH bis zur schwachblauen Färbung des Indicators titriert; der in der Leerbest. ermittelte Alkaliverbrauch wird in Abzug gebracht. Störungen der Methode durch Salze (vgl. DERNBY,

l. c.) sind nicht in Betracht zu ziehen. Die Enzymmenge ist so zu wählen, daß der Reaktionskoeffizient erster Ordnung zwischen 0,005 u. 0,0005 liegt; die Spaltung soll 60% nicht überschreiten. Als Erepsin-Einheit (Er.-E.) wird das 1000-fache derjenigen Enzymmenge bezeichnet, für die unter den angegebenen Bedingungen sich der Reaktionskoeffizient 0,001 ergibt; dieser gibt dann die Anzahl von Enzymeinheiten in der untersuchten Probe an. Erepsin-Wert (Er.-W.) ist die Anzahl von Enzymeinheiten in 1 g Präparat. — Erepsinlsgg. werden am besten durch Extraktion der Schleimhaut (z. B. 100 g) mit 87%ig. Glycerin (500 ccm) erhalten. Glycerin stabilisiert das in wss. Lsgg. wenig haltbare Enzym. Vorsichtiges Trocknen der Schleimhaut mit Aceton u. Äther führt zu fast vollständiger Zerstörung des Enzyms. — Fällern der Enzymlsgg. mit verd. Säure oder Ausfällen des Enzyms selbst mit A. oder Aussalzen mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ sind zur Reinigung des Enzyms ungeeignet. — Das Adsorptionsverhalten des Darmerepsins gleicht dem des Pankreaserepsins. Eine wesentliche Steigerung der enzymat. Konz. wurde bei den Adsorptionen (mit Tonerde oder Kaolin) nicht erreicht. Dagegen wird bei der Adsorption an Tonerde eine Befreiung des Erepsins von Trypsin bewirkt, da Trypsin aus saurer Lsg. von Tonerde kaum aufgenommen wird; die Elution mit 0,2-mol. Phosphatpuffer ($\text{pH} = 8,2$) enthält etwa 80% des ursprünglich vorhandenen Erepsins u. kein Trypsin. — Das vom Trypsin befreite Erepsin spaltet *Alaninylglycin*, *Leucylglycin*, *Glycyltyrosin*, *Glycylglycin* u. *Leucylalanin*, dagegen werden Pepton, Clupeinsulfat, Thymushiston, Casein, Fibrin, Gliadin, Zein, Eialbumin u. Ricinusglobulin nicht gespalten, wie das in der III. Mitt. bereits für Pankreaserepsin gezeigt wurde. (Ztschr. f. physiol. Ch. **151**. 31—55. München, Lab. der Akademie d. Wissenschaften.) HESSE.

St. J. Przylecki, *Der Abbau der Harnsäure bei den Wirbeltieren. I. Über ein neues Ferment: die Allantoinase*. Der Frosch scheidet geringe Mengen Harnsäure aus (pro 100 g Tier 0,04 mg pro Tag). Auch im Hunger tritt Harnsäure im Urin auf. (Endogener Ursprung damit erwiesen). Aus subcutan injizierten Purinbasen wird Harnsäure gebildet. Abbau von Harnsäure durch Harnanalyse nach Injektion bestimmter Mengen Harnsäure nachgewiesen. Der Abbau geht über Allantoin, Harnstoff bis zu NH_3 . Dialursäure u. Alloxan treten als Intermediärprodd. nicht auf. Allantoinabbau erfolgt durch ein Ferment, *Allantoinase*, das sich bis zu einem gewissen Grad entsprechend bekannten Verff. reinigen läßt. Ggw. von O_2 ist beim Allantoinabbau zu Harnstoff u. NH_3 erforderlich. Als N-freies Endprod. konnte Oxalsäure nachgewiesen werden. (Arch. internat. de physiol. **24**. 238—64; Ber. ges. Physiol. **32**. 638—39. 1925. Poznan, Laborat. de physiol. fac. de méd. Ref. BARKAN.) OPP.

H. W. van Urk, *Beitrag zur Frage: Ist die Fermentwirkung als eine kolloidchemische aufzufassen? (Untersuchungen an Pepsin.)* Die Unters. der Viscosität von Pepsin-HCl-Lsgg. im Ostwaldschen Viscosimeter ergab, daß Pepsinlsgg. bei $\text{pH} = 1,7$ ein Maximum u. bei $\text{pH} = 0,6—0,3$ ein Minimum der Viscosität zeigen; das Maximum fällt etwa mit dem Optimum der Pepsinwrkg. zusammen. — Bis zu einer Konz. von $m/2$ konnte kein Einfluß von Neutralsalzen (NaCl , K_2SO_4 , KJ , KCl , KBr , KNO_3 , KCNS) auf die Viscosität der Pepsinlsgg. gefunden werden. (Biochem. Ztschr. **165**. 358—63. 1925. Helder [Holland], Marinehosp. z. Willemsoord.) HESSE.

Shizuaki Tamura, *Weiterer Beitrag zur Kenntnis des Verlaufs der fermentativen Polypeptidspaltung*. Glykokoll, d-Alanin, dl-Alanin Glutaminsäure hemmen die Glycyltyrosinspaltung durch Hefepreßsaft u. Erepsin. d- u. dl-Milchsäure hat keinen Einfluß. (Acta scholae med. Kioto **6**. 441—47. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 640. 1925. Kyoto, Med. chem. Inst. Ref. FELIX.) OPPENHEIMER.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

W. S. Iljin, *Der Einfluß von Salzen auf die Veränderung der Zellsaftkonzentration bei Pflanzen*. Der Konz.-Anstieg des Zellsaftes, wenn Parenchymzellen von Blättern in verschiedenen Konz. von NaCl-Lsgg. gebracht werden, ist größer als es der Konz. der Außenslg. entspricht. Die Erscheinung kann durch einfache Permeabilität nicht erklärt werden. NaCl u. KCl einerseits, CaCl₂ u. MgCl₂ andererseits wirken antagon. Vermutlich hängt die Erhöhung des osmot. Druckes mit Erscheinungen zusammen wie z. B. der B. von Monosacchariden aus Stärke, kurz es handelt sich unter obigen Bedingungen vielleicht um Neubildungen von osmot. wirksamen Substanzen. (Studies from the plant physiol. laborat. 2. 5—25; Ber. ges. Physiol. 32. 507—08. 1925. Prag, Charles univ. Ref. WALTER.)

OPPENHEIMER.

A. Dean, *Dispersitätsgrad der Lipide*. Eine stärkere Dispergierung der Fette ist bei der Keimung des Samens (Juniperus wurde untersucht) u. in anderen Geweben der Pflanzen bei gesteigerter Lebenstätigkeit zu beobachten; umgekehrt vergrößern sich die Lipoidteilchen in alternden Zellen. (Baton. gaz. 79. 334—38; Ber. ges. Physiol. 32. 459. 1925. Chicago, Hull. botan. laborat. Ref. FREY.)

OPPENHEIMER.

Kurt Mothes, *Die Bedeutung der Säureamide für den Stickstoffwechsel der höheren Pflanze*. Die Theorie, nach der Asparagin nur ein Abbauprod. des Reserveeiweißes ist u. zur Translokation des N dient, ist abzulehnen. Vf. unterstützt die Ansicht, nach der im Auftreten von Asparagin ein Entgiftungsvorgang für das beim oxydativen Eiweißabbau auftretende NH₃ zu erblicken ist. In den Verss. wird morgens u. abends in den Blättern Gesamt-N, Eiweiß-N u. l. N bestimmt. In letzterem wurden präformierter NH₃-N, abspaltbarer Amid-N u. Rest-N (Aminosäuren, organ. Basen) getrennt. Einfluß der Kohlehydraternährung auf den N-Stoffwechsel wurde studiert. Bei Kohlehydratmangel steigt die NH₃-Menge. Kohlehydratzufuhr ermöglicht die Asparagin- bzw. Eiweißsynthese. (Ztschr. f. wiss. Biol., Abt. E: Arch. f. wiss. Botanik 1. 317—20; Ber. ges. Physiol. 32. 526—27. 1925. Leipzig, Botan. Inst. Ref. STRAUSS.)

OPP.

Robert B. Dustman, *Begleitumstände bei der Absorption mineralischer Stoffe durch Pflanzen*. Es ergeben sich mäßige Schwankungen der [H⁺] in den Pflanzenpreßsäften bei verschiedenem Ca-Gehalt der Nährlsgg. — Aus der CO₂-Ausscheidung von Pflanzen mit verschiedenen Wurzelsystemen läßt sich die Bedeutung der Aufschließungsfähigkeit für mineral. Stoffe erkennen. (Botanical Gazette 79. 233—64; Ber. ges. Physiol. 32. 516. 1925. Chicago, Hull botan. lab. Ref. ARNBECK.)

OPP.

K. Ludewig, *Beiträge zum Studium der Blattrollkrankheit der Kartoffel*. 1. Über die Wirkung von Salzlösungen auf die Ableitung der in Blättern rollkranker Kartoffelpflanzen gestauten Stärke. Nachprüfung u. Bestätigung der von HILTNER (vgl. Prakt. Blätter für Pflanzenbau u. Pflanzenschutz 1919. 15) angegebenen Beobachtung. — 2. Über den Einfluß der Phosphor- und Kalidüngung auf die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Durch P₂O₅- u. K-Gaben ließ sich die Krankheit nicht bekämpfen, entgegen den Feststellungen HILTNERs u. SCHEWES. (Landw. Jahrb. 63. 277 bis 303.)

TRÉNEL.

G. J. Harrison und C. J. King, *Das Alter von Sämlingen ein Faktor in der Empfindlichkeit von Mais gegen Natriumchlorid*. Die Empfindlichkeit von Mais-sämlingen gegen NaCl nimmt zunächst mit fortschreitender Entw. ab, nach Entw. des 1. Blattes jedoch wieder zu. (Journ. Agricult. Research. 31. 633—40. 1925. Unit. Stat. Dep. of Agricult.)

TRÉNEL.

Mato Nikolič, *Beiträge zur Physiologie der Spaltöffnungsbewegung*. I. Der Einfluß von Säuren auf Transpiration und Spaltöffnungsbewegung. Säuren beeinflussen den Abbau der Stärke in den Schließzellen. Durch Erhöhung des osmot. Druckes wird ein Öffnen der Stomata veranlaßt, womit der transpirationsfördernde Einfluß erklärt ist. Organ. Säuren erhöhen die Transpiration stärker als HCl u. H₂SO₄. (Beitr. z.

botan. Centrbl. **41**. 309—26. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 766. 1925. Ref. WÄCHTER. Graz, Pflanzenphysiol. Inst.)

OPPENHEIMER.

August Rippel, *Notiz über die Verarbeitung von Thioharnstoff durch Aspergillus niger v. Tgh.* Im Anschluß an die Befunde von NICOLAS (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1286; C. **1925**. II. 1367), daß Thioharnstoff von Soja-Urease nicht angegriffen wird, teilen Vff. Verss. über Einw. von *Asp. niger* auf Thioharnstoff mit. Es ergab sich, daß der Thioharnstoff zwar schwierig, aber deutlich nachweisbar von *Asp. niger* angegriffen wird, wobei S zu H_2SO_4 oxydiert wird. (Biochem. Ztschr. **165**. 473—74. 1925. Göttingen, Univ.)

HESSE.

H. Jastrowitz und **M. Weinberg**, *Untersuchungen über Abbauprodukte des Tuberkelbacillus. II. Mitt.* Enteiweißung der Tuberkulinpräparate zeigt, daß die Proteinfraction mit der eigentlichen tox. Wrkg. des Tuberkulins nichts zu tun hat. Aus einigen Prodd. ließ sich eine Albumosenfraction isolieren, deren Wirksamkeit der des Tuberkulins entspricht. Weitere Fraktionierung durch Methylalkohol gelang nicht. Die Tatsache, daß die Wirksamkeit aber in eine Lsg. des Präparats in 75% A. überging, ließ an Deuteroalbumose C erinnern. Da — allerdings schwächer — auch der methylalkoh. Peptonfraction tox. Eigenschaften zukommen, wird vermutet, daß es sich beim Toxin des Tuberkulins nicht um eine einheitliche Substanz handelt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **48**. 392—410. Halle, Med. Poli- u. Kind.-Klin.)

OPPENHEIMER.

R. Dujarric de la Rivière und **Et. Roux**, *Über die Wirkung einiger chemischer Agentien auf die Flockung von Antimeningokokkenserum.* Im weiteren Verfolg der Beobachtung über die Flockungserscheinungen von genanntem Serum in Ggw. von Benzoecharz u. Meningokokkenextrakten, wird festgestellt, daß das Optimum der Flockung bei dem System: Harz + Zimtsäure + Benzoesäure eintritt; während Zusatz einzelner Stoffe die Flockung nur mangelhaft begünstigt. Die $[\text{H}^+]$ spielt keine entscheidende Rolle. (C. r. soc. de biologie **94**. 244—46. Paris, Serv. du Dr. L. MARTIN.)

OPPENHEIMER.

Robert L. Starkey, I. *Zur Physiologie des Thiobacillus thiooxydans, eines autotrophischen Bacteriums, das in saurem Medium Schwefel oxydiert.* II. *Über die C- und N-Nahrung des Thiobacillus thiooxydans, eines autotrophischen Bacteriums, das in saurem Medium Schwefel oxydiert.* I. Der genannte Bacillus wird auf einem Nährboden aus $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, KH_2PO_4 , CaCl_2 , MgSO_4 , FeSO_4 , S bzw. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ u. W. gezogen. Es entsteht H_2SO_4 bis zu 2,08-n. (10,2%). Säurebldg.- u. Bakterienwachstumskurve verlaufen analog. Abhängigkeit der Säurebldg. von der Konz. der S-Verb. wird besprochen. Die bei der S-Oxydation frei werdende Energie wird zu 4,3—5,4% zur Assimilation von C benutzt, die nur in Ggw. von CO_2 vor sich geht. Steigender CO_2 -Partialdruck steigert die S-Oxydation. II. Glucose kann als C-Quelle dienen, aber nur in Ggw. von S, dessen Oxydation dem Glucoseverbrauch parallel geht. Citronensäure, Nitrate usw. können die Oxydation stören. Als N-Quelle kommt nur NH_3 in Betracht, das der Bacillus aber auch in den kleinsten Mengen ausnutzen kann. Glykoll unterbindet die Oxydationen, Pepton, dessen NH_3 -Verunreinigungen verwertbar sind, setzt sie deutlich herab. (Journ. of bacteriol. **10**. 135—63; Ber. ges. Physiol. **32**. 647—48. 1925. New Brunswick, Dep. of soil chem. a. bacteriol. Ref. BREGMANN.)

OPP.

Emil Abderhalden, *Ergänzung zu der Mitteilung „Zur Kenntnis der Biokatalysatoren des Kohlehydratumsatzes“.* III. Von Hans v. Euler und Karl Myrbäck. Vf. betont, daß er gegenüber der Zitierung seiner Angaben durch v. EULER u. MYRBÄCK (S. 1833) den Eindruck, als habe er „dem Insulin selbst, d. h. dem in ihm enthaltenen, im Kohlehydratstoffwechsel des tier. Organismus wirksamen Prinzip, eine beschleunigende Wrkg. auf die alkoh. Gärung zuerkannt“, ausschalten wolle. Die Befunde des Vfs., daß Insulin eine ganz geringe Beschleunigung der Gärung in den ersten 2—9 Std. ausübe, konnten nochmals bestätigt werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. **151**. 165—66. Halle, Univ.)

HESSE.

E₅. Tierphysiologie.

Gaston Parturier, *Cholesterin. Vegetatives Nervensystem und endokrine Drüsen.* Übersichtsarbeit. Die gegenseitige Abhängigkeit der genannten Faktoren wird dargestellt. (Rev. de méd. **42**. 81—100. 1920; Ber. ges. Physiol. **32**. 554—56. 1925. Ref. SCHMITZ.) OPPENHEIMER.

Witold Rawita-Witanowski, *Die Beziehungen zwischen Wirkung und Konstitution der acylierten Aminoalkohole. Ein Beitrag zum Wirkungsmechanismus des Hormons der Darmbewegung.* Die Intensität der Wrkg. am Rattendarm u. Froschherz ließ sich in folgender Reihe darstellen: *Acetylcholin* > *Acetylmethylkolin* > *Acetyldimethylkolin* > *Acetylkolin*. (Trav. de l'inst. M. NENCKI **36**. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 675. 1925. Ref. KORÉC.) OPPENHEIMER.

Yutaka Harada, *Weitere Studien über die Zerstörung des Adrenalins im Organismus.* (Vgl. Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Tokyo **31**. 339. 1924; C. **1925**. II. 1457.) Eine spezif. Fähigkeit der Leber oder irgendeines Bauchorgans, Adrenalin zu zerstören, läßt sich nicht nachweisen. Es bleibt nur noch übrig, anzunehmen, daß das Adrenalin rasch von den sympath. innervierten Organen aufgenommen u. zerstört wird, dabei ist zu bedenken, daß sich bei biolog. Prüfung ein „Verschwinden“ des Adrenalins erweisen kann, ohne daß es chem. verschwunden ist. (Mitt. a. d. med. Fak. d. kais. Univ. Tokyo **32**. 409—29. Ber. ges. Physiol. **32**. 602. 1925. Ref. FROMHERZ.) OPPENHEIMER.

Karl Csépai und St. Weiß, *Über den kardiovaskulären Antagonismus von Insulin und Adrenalin.* Auf der Höhe der Insulinwrkg. ist die Blutdrucksteigerung auf Adrenalin geringer; sie ist aber gesteigert, wenn bei stärkerer Kohlehydratzufuhr die Blutzuckersenkung ausbleibt. Veränderung der Adrenalinempfindlichkeit ist also keine direkte Wrkg. des Insulins. (Wien. Arch. f. inn. Med. **10**. 195—200; Ber. ges. Physiol. **32**. 546. 1925. Budapest, I. med. Klin. Ref. FROMHERZ.) OPPENHEIMER.

Alfred Gigon, *Über das Insulin.* Unter Insulinwrkg. nimmt der Gesamt-C des Blutes um 0,48 g pro 100 g (= 4%) ab, während der Blutzucker nur um 0,049 abgenommen hat. Vf. nimmt an, daß unter Insulin eine Substanz im Blut verschwindet, die kein Traubenzucker, Milchsäure, Acetaldehyd oder „Proteidzucker“ ist. (Schweiz. med. Wochenschr. **54**. 1126—29. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 545. 1925. Ref. LESSER.) OPP.

Leonard Brahme, *Einige mikrorespirometrische Versuche über die Wirkung des Insulins auf die Gewebeatmung.* Vf. wiederholt u. bestätigt die Verss. AHLGREENS über die Beschleunigung der Oxydation durch Insulin. (Methylenblaumethode mit dem Thunbergschen Mikrorespirometer.) (Acta med. scandinav. **62**. 188—96. Ber. ges. Physiol. **32**. 545. 1925. Lund, Physiol. Inst. Ref. LESSER.) OPPENHEIMER.

David L. Drabkin und H. Shilkret, *Insulinanhydrämie und Wasseraufnahme.* Die Rk. dürstender u. reichlich mit W. versehener Hunde auf Insulin ist bzgl. Hypoglykämie die gleiche. Aber die Bluteindickung ist bei ersteren größer u. der tödliche Ausgang nach Verss. mit großen Insulingaben auch mit Zuckerzufuhr nicht zu vermeiden. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 369—71. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 775. 1925. Ref. LESSER. New Haven, Laborat. of physiol. chem. Yale Univ.) OPP.

Paolo Introzzi, *Die Wirkung des Insulins auf die alimentäre Hyperglykämie und Glucosurie.* Trotz Insulin kommt es bei Galaktosezufuhr zu Galaktosurie. Vermutlich wird die Ausnutzung dieses Zuckers durch Insulin nicht beeinflusst. (Problemi d. nutriz. **2**. 51—65. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 775. 1925. Ref. LESSER. Pavia, Istit. di chim. med. univ.) OPPENHEIMER.

I. Simon, *Der Gehalt des Körpers an Saccharose und Glucose, untersucht mit der Gefrierpunktsbestimmung der Organe.* Die molekulare Konz. der Organe bzw. des Serums steigt nach Injektion der beiden Zucker. Bei Glucose ist die Erhöhung im Herzen, bei Saccharose im Serum am stärksten. Unterss. über die Rückkehr zu n.

Verhältnissen. (Arch. die science biol. 7. 109—27; Ber. ges. Physiol. 32. 426—27. 1925. Sassari, Istit. di materia med. e di farmacol. Ref. Fr. N. SCHULZ.) OPP.

Georges Fontès und Alexandre Yovanovitch, *Sind Ammoniumsalze im Blut?* Die Prüfung der Frage, warum die Antworten auf die Titelfrage so verschieden lauten, ergibt, daß die Widersprüche der Wahl eines ungeeigneten Alkalizusatzes zum Blut u. fehlerhafter Blutentnahme zuzuschreiben sind. Technik der Vff., die sich in vielen Kontrollverss. als die beste erwies: 100—250 ccm Blut werden unter K-Oxalat in 60—100 Sek. aufgefangen, in einen großen Dest.-Kolben übergeführt u. sofort mit $\frac{1}{20}$ des Vol. gesätt. LiCO_3 -Lsg. versetzt, im Vakuum bei einer Temp. nicht über 50° innerhalb 30 Min. dest. Einige Tropfen Oktylalkohol verhindern das Schäumen. Ein kleiner Überschuß $\frac{1}{70}$ -n. HCl zum Destillat, der mit $\frac{1}{70}$ -n. NaOH zurücktitriert wird. Kontrolle mit NESSLERS Reagens, daß keine andere flüchtige Base gefaßt wurde. Im arteriellen Blut sind 0,1 mg NH_3 pro Liter, im venösen 0,05 mg. Da nach PARNAS u. HELLER an der Luft Blut bei 20° um 0,07 mg NH_3 reicher wird, ist zu schließen, daß das kreisende Blut k e i n e Ammoniumsalze enthält. Auch im Hungerzustand wird keine NH_3 -Vermehrung gefunden. Venöses Blut wird außerhalb der Gefäße rascher an NH_3 reicher als arterielles. Zum Schluß theoret. Besprechung der Entstehung der Ammoniumsalze im Harn u. des Harnstoffs. Die bisherigen Theorien bedürfen nach dem obigen Befund der Revision. (Bull. Soc. Chim. Biol. 7. 1044—55. 1925. Straßburg, Inst. de Chim. biolog.) OPP.

K. Lucille Mc Cluskey, *Die Verteilung der Phosphorverbindungen im Blut bei Tuberkulose*. Im P-Stoffwechsel treten Veränderungen bei Tuberkulose auf, die sich in Verschiebungen der Werte für Total-P, Lecithin-P u. säurel. P im Plasma u. Zellen äußern. Aus den Veränderungen lassen sich Schlüsse für die Prognose ziehen. (Journ. Lab. Clin. Medicine 10. 466—74. 1925. Chicago, Lab. of the Municip. Tuberc. san.) OPP.

Loeper, Decourt, Olivier und Lesure, *Hämolyse und Aminosäuren*. (Vgl. S. 1837.) Blutgerinnsel hat einen höheren Aminosäuregehalt als Serum. Während der Resorption von Hämatomen, von Blutextravasaten oder injizierten Blutmengen ist der Gehalt des Blutes an Aminosäuren erhöht. (C. r. soc. de biologie 94. 271—72.) OPP

Loeper, Decourt und Lesure, *Über die Aminosäurebildung in der Milz*. (Vgl. vorst. Ref.) Das Blut der Milzvene ist reicher an Aminosäure als das der Milzarterie. Nach Milzentfernung ist das Blut des Vers.-Tieres ärmer, nach Adrenalininjektion (Kontraktion der Milz!) reicher an Aminosäuren. (C. r. soc. de biologie 94. 272—73. 1925.)

OPPENHEIMER.

René Fabre und Henri Simonnet, *Beitrag zur Kenntnis des Hämatoporphyrins*. I.: *Über einige optische Eigenschaften dieses Farbstoffs. Anwendung auf die Bestimmung des Hämatoporphyrins in der Harderschen Drüse der weißen Ratte*. II.: *Über die sensibilisierende Wirkung des Hämatoporphyrins auf die roten Blutkörperchen*. (Bull. Soc. Chim. Biol. 8. 56—66. — C. 1926. I. 1223. 1603.)

LINDENBAUM.

F. Vlès und A. de Coulon, *Über physikalisch-chemische Eigenschaften gewisser Serumbestandteile*. Die Sera n. u. kranker Menschen werden nach Gerinnung unter Eis u. Gewinnung durch Zentrifugieren, verd. u. unter verschiedenem pH (5—12) der Kataphorese unterworfen u. alsdann mit A.-Aceton (1:1) behandelt, wobei nach 24 Stdn. ein Nd. u. Flocken erhalten werden (vgl. ähnliche Unterss. mit Muskeln, C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1924. 182; C. 1924. II. 2060), die unter verschiedenen pathol. Umständen verschiedenes Verh. zeigen, bezw. unter verschiedenem pH entstehen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1189—91. 1925.) OPP.

Charles Powell White, *Die Bezugskoeffizienten des Harnes mit besonderer Berücksichtigung des Carcinoms*. Der Bezugskoeffizient zeigt die Abhängigkeit eines Harnbestandteils von den Veränderungen eines andern an. Bei hohem Koeffizienten hängt die Ausscheidung der betreffenden Substanzen gesetzmäßig voneinander ab, u. zwar liegen bei positiven Koeffizienten die Veränderungen in gleicher, bei negativem

in entgegengesetzter Richtung. Harnstoff steht in Beziehung mit Kreatinin, PO_4 , K u. pH , Kreatinin mit K, Na, Cl u. W., Harnsäure mit PO_4 u. pH , bei Carcinom auch mit Ca. SO_4 hat Beziehungen zu Mg u. K, PO_4 zu K, Ca u. Mg, usw. Ammonium ist bei Gesunden besonders verbunden mit schwachen Säuren u. Alkaleszenz, bei Krebskranken mit starken Säuren u. Acidität. (Journ. of pathol. a. bacteriol. **28**. 211—31; Ber. ges. Physiol. **32**. 598. 1925. Manchester, Christie hosp. a. Helen Swindells cancer research laborat. Ref. PINCUSSEN.)

OPPENHEIMER.

Misao Honda, *Untersuchung des Harns gravider Frauen*. (Vgl. Journ. of biochem. **2**. 351. 1923; C. **1924**. I. 1223.) Im Harn einer Graviden wurden nachgewiesen *Histidin*, *Arginin*, *Lysin*, *Alanin*, *Leucin*, *Prolin*, *Phenylalanin*, *Kreatinin* u. *Hippursäure*. Zweifelhaft ist die Anwesenheit von *Valin*, *i-Leucin* u. *Reductonovain* (KUTSCHER). *Kreatin* fehlte. (Act. schol. med. Kioto **6**. 405—13. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 598. 1925. Kioto, Frauenklin.)

OPPENHEIMER.

Alois Velich, *Die Milchsekretion ohne Schwangerschaft*. Besprechung bisheriger Beobachtungen aus der Literatur u. eigener Feststellungen. In den meisten Fällen handelt es sich um Erregung der Milchdrüsen unter dem Einflusse von inneren Sekreten aus den Ovarien. (Le Lait. **6**. 1—8. 102—07. Prag, Techn. Hochsch.)

GROSZFELD.

Ch. Porcher und **A. Tapernoux**, *Wirkung des Aderlasses auf die Milchsekretion*. Der Einfluß auf Milchmenge u. Fettgehalt ging nicht über die n. Schwankungen hinaus. (Le Lait. **5**. 965—68. 1925.)

GROSZFELD.

Robert Eichloff, *Über den Einfluß der Verfütterung gekochter Milch an junge Tiere auf die Entwicklung ihres Organismus*. Vgl. Unterss. an einem Wurf junger Hunde. Nach Überwindung des Widerwillens gegen gekochte Milch nehmen die mit gekochter Milch ernährten Tiere stärker zu als die mit roher Milch gefütterten. Fibrin-, Aschen-, Eiweißgehalt des Blutes (bezw. des defibrinierten Blutes) ist geringer, das Knochenmark ist blutärmer, die Knochenasche geringer als bei den Rohmilchtieren. Die Ursache wird in Veränderungen des Caseins gesucht. (Milchwirtsch. Forsch. **2**. 233—44; Ber. ges. Physiol. **32**. 538. 1925. Ref. ARON.)

OPPENHEIMER.

Emile F. Terroine und **Anne-Marie Mendler**, *Über den Einfluß des Zusatzes stickstofffreier Nahrungsmittel zur Milch auf den Umfang der Stickstoffretention im Verlauf des Wachstums*. Verss. am jungen Schwein mit fettfreier, künstlich fettreich gemachter Milch, oder mit Milch, der Mehl zugesetzt ist, zeigen, daß die N-Retention keinesfalls allein eine Funktion des N-Gehalts der Nahrung ist. Die Zus. des Eiweiß im Körper ist ein komplexes Phänomen, das durch Fett u. Kohlehydrate grundsätzlich beeinflußt werden kann. Die Milch ist für das Wachstum des Vers.-Tieres nicht das Optimum eines Nahrungsmittels, sie läßt sich — auch unter voller Würdigung der Toleranz-, Aufnahme- u. Verdauungsfähigkeit — durch Zusatz N-freier Substanzen verbessern. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1176—79. 1925.)

OPPENHEIMER.

Charles Richet, **Gardner** und **Goodbody**, *Wirkung der Zirkonium-, Titan- und Mangansalze auf die Ernährung*. In langfristigen Hundeverss. haben die Citrate der genannten Elemente keinen tox. Einfluß erkennen lassen. Ti u. Zr haben vielleicht einen günstigen Einfluß auf den Ernährungszustand der Tiere. Mn übte auf das Körpergew. eine Wrkg. aus, die stark abhängig war von der Menge, die verabfolgt wurde. (1 g täglich: Abnahme; 1 g alle 4 Tage: Zunahme.) (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1105—06. 1925.)

OPPENHEIMER.

Hans Kaiser, *Über Vitamine*. Vortrag anläßl. der Gründg. der Ortsgruppe Heidelberg d. dtsh. pharmaceut. Ges. Der Vortragende bringt zuerst Allgemeines über die heutige Einteilung u. Bezeichnung der Vitamine. Noch am ungeklärtesten ist die Chemie der Vitamine. Auch über die Wirkungsweise herrschen bis jetzt nur Theorien. Sind die Vitamine Ergänzungsstoffe, die entweder der Entgiftung oder der Ernährung dienen, oder sind sie notwendig, um lebenswichtige Funktionen im

Gang zu halten? Hinweis auf die Arbeiten von KARRER u. HESS (Cyanwasserstoffblockade der Gewebsoxydasen). BÜRGI stellte sich die Aufgabe, die funktionellen Eigenschaften der Vitamine zu prüfen u. fand, daß Vitaminextrakte im menschlichen Organismus wahrscheinlich eine Schutzwirkg. auf das Atmungszentrum der Morphinlähmung gegenüber zeigen. Zum Schluß mahnt Vf., die zurzeit massenhaft auf den Markt gebrachten Vitaminpräparate nur mit sehr großer Vorsicht aufzunehmen. (Süddtsch. Apoth.-Ztg. **66**. 23—24. 1926.)

HIRSCH-KAUFFMANN.

E. C. van Leersum, *Nomenklatur von Vitaminen*. (Science **62**. 494. 1925. — C. 1926. I. 1227.)

HIRSCH-KAUFFMANN.

Kurt Scheer, *Hormone und Vitamine*. 2. Mitt. *Über die Wirkungsweise des Wachstumsvitamins auf das Wachstum*. (1. vgl. S. 2116.) Aus Hefe gewonnene, an Vitamin B bzw. D reiche Fraktionen wirken auf Kalbsmuskel u. Gelatine stark quellungsfördernd, ganz ähnlich der Thymusdrüsensubstanz. Die wachstumsfördernde Wirkg. beruht bei beiden Prodd. wahrscheinlich auf der quellungsfördernden; zwischen beiden wird eine innere Verwandtschaft angenommen. (Jahrb. f. Kinderheilk. **108**. 171—79; Ber. ges. Physiol. **32**. 772. 1925. Ref. ARON. Frankfurt a. M., Univ.) SPIEGEL.

Luigi Scotti-Foglieni, *Über die Hitzebeständigkeit der Vitamine*. Kleie (Vitamin B) u. Milch (Vitamin A) verlieren bei der üblichen Erhitzung im Autoklaven, bzw. bei der üblichen Sterilisation ihre Wirksamkeit bei avitaminot. Tieren (Maus bzw. Ratte). Wird aber Kleie u. Milch in einem geschlossenen Metallzylinder, aber in sonst gleicher Weise erhitzt, dann bleibt der Faktor B u. teilweise auch der Faktor A wirksam, woraus Vf. schließt, daß die Temp. allein nicht die Wirksamkeit zerstören kann. (Boll. d. soc. med. chir. **37**. 183—92; Ber. ges. Physiol. **32**. 544—45. 1925. Pavia, Laborat. di patol. gen. ed istol. Ref. LAQUER.)

OPPENHEIMER.

Gladys Annie Hartwell, *Geschlechtsunterschiede im Bedarf nach gewissen Nahrungsbestandteilen während des Wachsens*. Männliche Ratten zeigen bei Zugabe von Weizenkeimlingsextrakten oder Vitamin-B-haltigen Stoffen Erhöhung der Wachstumsquote. Weibchen bleiben in ihrem Wachstum unbeeinflusst. Männchen haben somit größeren Bedarf an Vitamin B. Bei Gelatinezusatz zur Kost entstehen n. Wachstumskurven der beiden Geschlechter. Bei Glutenezusatz wachsen die Geschlechter gleich stark, das Männchen bleibt also gegen die Norm zurück. (Brit. journ. of exp. biol. **2**. 323—30; Ber. ges. Physiol. **32**. 542. 1925. London, Kennington, Physiol. laborat. household a. soc. science Dep. Ref. ROMEIS.)

OPPENHEIMER.

Ira A. Manville, *Pathologische Veränderungen an weißen Ratten, die mit einer Vitamin-A-armen Kost aufgezogen wurden*. Vitaminmangel macht sich bei ausgewachsenen Tieren weniger bemerkbar als bei Jungen. (Arch. of internat. med. **35**. 549—56; Ber. ges. Physiol. **32**. 543. 1925. Portland, Dep. of physiol. univ. of Oregon med. school. Ref. MANCKE.)

OPPENHEIMER.

C. M. Jackson, *Spontan-Nephritis und kompensatorische Nierenhypertrophie bei Albinoratten nach Vitamin-A-armer Ernährung*. Die Nierenentzündung wird auf eine Infektion zurückgeführt, die auf dem Boden der herabgesetzten Widerstandsfähigkeit der Gewebe infolge Vitamin-A-mangel sich ausbreitete. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 410—13; Ber. ges. Physiol. **32**. 542. 1925. Minneapolis, Dep. of anat. univ. of Minnesota. Ref. HEYMAN.)

OPPENHEIMER.

L. Randoiu und A. Michaux, *Glykogenreserven und arterielle Glykämie (effektive und proteidische) im Verlauf des experimentellen Skorbut*. Der Blutzucker, der Eiweißzucker des Blutes, der Glykogengehalt der Leber u. der Muskeln werden bei Meerschweinchen, die unter n. Nahrung u. vitaminfreier Nahrung stehen, bestimmt, wobei festgestellt wird, daß der Glykogenvorrat im Skorbut vermindert ist, aber nicht vollkommen schwindet. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1179—81. 1925.)

OPPENHEIMER.

G. Mouriquand und Leulier, *Avitaminose C (mit und ohne Tuberkulose) und der Cholesteringehalt des Blutes und der Nebennieren*. (Vgl. S. 1838). Obwohl im Blut erkennbare Unterschiede des Cholesteringehalts zwischen n. u. avitaminot. Meerschweinchen nicht gefunden werden (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1699; C. **1925**. II. 2000) zeigt der Cholesteringehalt der Nebennieren bei akuter wie chron. Avitaminose C an, daß im Cholesterinstoffwechsel Störungen ernster Art vor sich gehen, die durch Tuberkulose verschlimmert werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 434—35. 1925.) OPPENHEIMER.

Arthur Israel und Robert Fränkel, *Versuche über den Einfluß der Avitaminose auf die Heilung von Knochenbrüchen*. In 3 Versuchsreihen von je drei jungen männlichen u. weiblichen Meerschweinchen, denen die gleiche Fraktur am linken Oberschenkel möglichst in der Mitte der Diaphyse beigebracht wurde, wurde der Einfluß der Ernährung auf die Heilung der Fraktur studiert. Die 1. Reihe diente zur Kontrolle und wurde mit Hafer, Mohrrüben u. Heuhäcksel ernährt, bei der 2. Reihe wurde statt Mohrrüben Citrone in einer Verdünnung von 1:30 gegeben u. bei der 3. Reihe das Vitamin C ganz fortgelassen u. dafür nur W. angeboten. Bei den Normaltieren u. Citronentieren war nach 5—6 Wochen die Konsolidation eingetreten. Die vollständig avitaminot. Tiere starben meist zwischen dem 21. u. 28. Tage an Skorbut, die Bruchheilungsvorgänge waren in dieser Zeit völlig lahmgelegt. Bei vitaminarmer Ernährung (Verfütterung von Citronensaft in Verdünnung 1:60 statt Mohrrüben) gelang es, eine Fraktur in das klin. Bild einer Pseudarthrose umzuwandeln. Entzieht man n. ernährten Tieren 14 Tage nach dem Oberschenkelbruch das Vitamin C vollkommen, so erfolgt anfangs die n. Knochenregeneration, erst nach 8-wöchiger Avitaminose unterlag jedoch der schon geheilte Bruch dem zehrenden Aufbrauch des Nährschadens, es trat im Callus eine Spontanfraktur auf. Hingegen ist eine skorbut. Fraktur heilbar, wenn man rechtzeitig den Tieren n. Kost gibt. (Klin. Wchschr. **5**. 94—97.) Hl.-Kff.

Jaroslav Křiženecký und Jan Podhradský, *Einige Experimente über die stimulierende Wirkung der Vitaminpräparate auf das Wachstum*. Nachweis der Wachstumsbeschleunigung bei Mäusen, Kaninchen u. Hühnern durch Verabreichung von *Bioklein*, *Zooklein* I u. II. Das Präparat *Zoosan* versagte. In quantitativer Hinsicht sprechen die einzelnen Tierarten verschieden an. (Zeitschr. f. Tierzucht u. Züchtungsbiol. **3**. 189—207; Ber. ges. Physiol. **32**. 540. 1925. Brünn, Sekt. f. Züchtungsbiol. mähr. zootechn. Landesforschungsinst. Ref. KOPÉČ.) OPPENHEIMER.

John W. Gowen, J. M. Murray, M. E. Gooch und Forrest B. Ames, *Rachitis, ultraviolettes Licht und Milch*. Die Tatsache, daß ultraviolettes Licht die Rachitis verhindern oder heilen kann, führte zu der Hypothese, daß die Behandlung des Muttertieres mit ultravioletttem Licht eine Vermehrung der antirachit. Substanz in seiner Milch bewirken kann. Zum Beweis wurde die Milch von bestrahlten u. nicht bestrahlten Kühen an rachit. Küken verfüttert. Die Darreichung der Milch bestrahlter Kühe konnte die Rachitis zum Stillstand bzw. zur Ausheilung bringen, während die Milch der unbestrahlten Tiere keinen Einfluß zeigte: klin. u. röntgenolog. schritt die Rachitis weiter fort. (Science **63**. 97—98.) HIRSCH-KAUFFMANN.

J. S. Hughes, R. W. Titus und J. M. Moore, *Ultraviolettes Licht und antirachitisches Vitamin in Hühnereiern*. An 4 Versuchsreihen von Hennen wurden die Unterrs. angestellt. Gruppe 1 erhielt direktes Sonnenlicht u. täglich Höhensonne für 30 Minuten, Gruppe 2 durch Glas gefiltertes Sonnenlicht u. Höhensonne, Gruppe 3 direktes Sonnenlicht, Gruppe 4 durch Glas gefiltertes Sonnenlicht. Um den antirachit. Vitamingehalt der Eier dieser Tiere zu prüfen, wurden sie an Küken verfüttert, die bei einer bestimmten Grundnahrung nach etwa 6 Wochen an einer Rachitis erkrankten würden. Bei Fütterung der Eier von Gruppe 1 u. 3 zeigte sich ein völlig n. Wachstum, bei Beigabe der Eier der Gruppe 2 zur Grundnahrung wurde eine geringe Rachitis beobachtet, bei Zugabe von Gruppe 4 entstand eine hochgradige Rachitis. Aus diesen

Unterss. folgt, daß der antirachit. Vitamingehalt der Eier von der Bestrahlung der Hennen mit ultraviolettem Licht abhängt, wenn ihr Futter an dieser Substanz gering ist. Lebertran ($\frac{1}{2}$ ccm täglich pro Henne verfüttert) hat dieselbe Wrkg. auf die Eier wie direkte Sonnenbestrahlung. (Science **62**. 492—93. 1925.) HIRSCH-KAUFFMANN.

Philip Eggleton und Leslie J. Harris, *Ultraviolettes Licht und antiskorbutisches Vitamin*. (Vgl. auch S. 157.) Vff. fanden, daß für die Synthese des *Vitamins C* in der Pflanze Licht nicht notwendig ist im Gegensatz zum Vitamin A, das zu seiner B. in der Pflanze stets Licht gebraucht. — Ultraviolettes Licht kann den Ausbruch des Skorbut bei Tieren, die eine Skorbut erzeugende Nahrung erhalten, nicht verhindern, auch einen bereits bestehenden Skorbut nicht heilen. — Wird das Vitamin C z. B. durch Hitze zerstört, so kann es durch ultraviolettes Licht nicht regeneriert werden, auch findet bei Höhensonnenbestrahlungen einer an Vitamin-C reichen Nahrung keine Vermehrung des antiskorbut. Faktors statt. (Brit. Medical Journal **1925**. II 989 bis 91.) HIRSCH-KAUFFMANN.

S. Kozowa, M. Kusunoki und N. Hosoda, *Über den Rest-N des Blutes bei menschlicher Beriberi und bei Avitaminose von Kaninchen*. Der Rest-N ist in beiden Fällen erhöht. (Japan. med. world **5**. 83—86; Ber. ges. Physiol. **32**. 544. 1925. Osaka, II. med. clin. Ref. FELIX.) OPPENHEIMER.

Elia Liberopulo, *Versuche über den Chemismus des Magens in bezug auf die Nährstoffe, die Wirkung des Kochens und den Einfluß von Adrenalin, Atropin und Strychnin*. Das Verhältnis des proteolyt. Ferments zu HCl oder Gesamtsäure des Magensaftes u. von dieser zum Verdauungsvermögen ist, wie aus 1584 Probeanalysen geschlossen wird, sehr wechselnd. Auch Arzneimittel wie *Adrenalin* u. *Atropin* wirken nicht regelmäßig. (Rif. med. **41**. 435—37; Ber. ges. Physiol. **32**. 564. 1925. Genova, Istit. di patol. spec. med. dimonstrat. Ref. ROSENTHAL.) OPPENHEIMER.

Gösta Becker, *Untersuchungen über Acidosis*. Bei einseitiger Butter- oder Schweinefettdiät zeigen $\text{CO}_2\%$ des Blutes keine Unterschiede. β -Oxybuttersäuremengen im Blut waren während der Schweinefettperiode größer als während der Butterperiode. (Duodecim. **40**. 329—56. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 550. 1925. Ref. YLPÖ.) OPPENHEIMER.

Roger S. Hubbard und Floyd R. Wright, *Einfluß von kleinen Natriumdicarbonatgaben auf die Ausscheidung von Acetonkörpern*. Acetonkörperausscheidung wird durch 1,3 g NaHCO_3 (6—10 Tage lang gegeben) bei einer Diät von ca. 60—90 g Kohlehydrate, ca. 60 g Protein u. 180—200 g Fett gesteigert. (Ann. of clin. med. **3**. 634—41; Ber. ges. Physiol. **32**. 550. 1925. New York, Clifton Springs. MAGNUS-LEVY.) OPPENHEIMER.

N. Jean Novello und Carl P. Sherwin, *Das Verhalten einiger heterocyclischer Verbindungen im Stoffwechsel*. Imidazol vermehrt bei Kaninchen die Harnsäureausscheidung, nicht aber die Sulfate u. Glukuronsäure. $\frac{1}{3}$ der Substanz erscheint unverändert im Harn. *Pyridin* erscheint im Hundeharn als Methylderiv., im Kaninchenharn wurde kein Paarungsprod. gefunden. *Pyrrol* ließ beim Kaninchen kein Entgiftungsprod. entstehen. *Pikrinsäure* wird als Pikraminsäure ausgeschieden. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 394; Ber. ges. Physiol. **32**. 553. 1925. New York, Chem. research laborat. Fordham univ. Ref. KAPFHAMMER.) OPPENHEIMER.

Gustav Embden und Herbert Hentschel, *Über Phosphorsäureabspaltung nach er-müdender Arbeit von Frostmuskeln*. Es wird nachgewiesen, daß bei längere Zeit fortgesetzter Reizung isolierter Frostmuskeln sowie ganzer Froschschenkel eine den Kontraktionszustand überdauernde Abspaltung von anorgan. H_3PO_4 statthat. Schon früher war dieser Befund an Warmblütern gemacht worden; am Frosch wurde eine Vermehrung der H_3PO_4 bisher nur beobachtet, wenn die chem. Vorgänge bei der Kontraktion möglichst schnell durch sofortiges Abtöten des Muskels unterbrochen worden waren. Dagegen hatten PARNASS u. WAGNER, sowie LAQUER keine Zu-

nahme der H_3PO_4 in völlig ermüdeten Muskeln feststellen können. — In der Versuchsanordnung wurde gewöhnlich ein Gastrocnemius oder Semimembranosus sofort auf den Gehalt an Phosphat verarbeitet, der symmetr. M. nach Reizung entweder mit Einzelschlägen (55 pro Min.) mit zumeist abgeblendeten Schließungsschlägen oder nach tetan. Reizung. Die Belastung war beim Gastrocnemius 25, beim Semimembranosus 25/3 g; die Reizstärke war maximal. — Der H_3PO_4 -Gehalt war nach 275 Einzelschlägen nicht regelmäßig, jedoch immer nach 550, und zwar um 4,7—8,3%, vermehrt. Die Abspaltung stieg mit zunehmenden Reizschlägen u. betrug maximal bei einem noch nicht völlig ermüdeten Muskel 31,4%, im Durchschnitt etwa 20% des Ruhewertes. Dasselbe Resultat wurde auch am ganzen Frosch erhalten. Die Größe der Abspaltung steigt mit der Belastung. — Bei tetan. Reizung von Gastrocnemien wurde erst eine Abspaltung bei Mindestreizungen von $3 \times$ je 60 sec. Dauer mit je 60 sec. Pause erhalten. Die Zunahme betrug bei beliebig lange fortgesetzter Reizung nie mehr als 11,7%. Das Verh. des Semimembranosus ist komplizierter. Bei kurzer Reizung (12—20 sec.) war im gereizten u. ungereizten Muskel der H_3PO_4 -Gehalt nicht merklich verändert, bei mittlerer Reizdauer (etwa $1 \times$ 60 sec.) wurde deutliche Abnahme, bis 7,1%, und bei längerer Reizung wie beim Gastrocnemius Zunahme bis 14,8% gefunden. Die Abnahme des H_3PO_4 -Gehalts wird nach DEUTICKE durch die Syntheseförderung der Zuckerphosphorsäure durch das Lactation erklärt. Das Fehlen dieser Synthese im Gastrocnemius fand bisher keine Deutung. Auch bei tetan. Reizung ganzer Froschenkel bis zur völligen Ermüdung war der H_3PO_4 -Gehalt im Gastrocnemius erhöht.

Die in mit Einzelschlägen oder tetan. gereizten Muskeln abgespaltene H_3PO_4 wird bei 2-std. Erholung der Muskeln in O_2 entweder ganz oder teilweise zu Lactacidogen oder einer lactacidogenähnlichen Substanz resynthetisiert. Dieser Wiederaufbau kann auch in H_2 erfolgen, da er nicht, wie das Verschwinden der Milchsäure, an eine Oxydation gebunden ist. Jedoch verläuft unter aeroben Bedingungen die Umwandlung der abgespaltenen H_3PO_4 zu Lactacidogen leichter als in der Anaerobiose. Von EMBDEN u. LAWACZEK (Biochem. Ztschr. 127. 181; C. 1922. I. 1250) war gezeigt, daß die bei einer einzelnen Reizung abgespaltene H_3PO_4 außerordentlich schnell resynthetisiert wird. Daß nach längerer angestrenzter Arbeit der Vorgang der Lactacidogenspaltung vorübergehend irreversibel wird, kann nach EMBDEN u. JOST (Dtsch. med. Wchschr. 51. 636; C. 1925. II. 946) als der Ausdruck von alterungsartigen Kolloidzustandsänderungen angesprochen werden. Die gänzliche oder teilweise Rückbildung in der Erholung zeigt, daß es sich um eine n. Begleiterscheinung bei der Ermüdung handelt. Dementsprechend scheint ein langsames Reiztempo eine geringere H_3PO_4 -Abspaltung herbeizuführen. Bei gleichem Reiztempo wiesen in Luft oder in H_2 gereizte Muskeln stärkere Abspaltung auf als in O_2 gereizte. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 167—202. Frankfurt, Inst. f. vegetative Physiologie, Univ.) LOH.

Manfred Altmann, *Über den Einfluß der Temperatur auf die Phosphorsäurebildung bei ermüdender Muskelarbeit.* Für die H_3PO_4 -Abspaltung bei ermüdender Arbeit des Froschmuskels (Gastrocnemius) erwies sich auch die Temp. von Einfluß (vgl. vorst. Ref.). Beim Aufbewahren der ruhenden Muskeln bei den Versuchstemp. von 5° u. 25° trat nur ein geringfügiger Unterschied im H_3PO_4 -Gehalt ein. Nach der Reizung mit 800—900 Einzelschlägen (Reizfrequenz 45 u. 55 pro Min.) wies der „Warmmuskel“ gegenüber dem „Kaltmuskel“ einen Mehrgehalt von 2,0—15,0% H_3PO_4 auf. Bei dem letzteren traten im Gegensatz zum ersteren stets deutliche Verkürzungsrückstände auf. Die Zubildung an H_3PO_4 im Kaltmuskel selbst betrug 3,7—7,7% bei 900 Einzelschlägen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 203—08. Frankfurt, Inst. f. vegetative Physiol., Univ.) LOHMANN.

G. Embden, H. Hirsch-Kauffmann, E. Lehnartz und H. J. Deuticke, *Über den Verlauf der Milchsäurebildung beim Tetanus.* Unter anaeroben Bedingungen ent-

stammt die bei länger andauernder Arbeitsleistung freiwerdende Energie der Milchsäurebildung aus Kohlenhydraten. Diese Tatsache entscheidet jedoch nicht, ob die im Kontraktionsaugenblick freiwerdende Energie aus der gleichzeitig erfolgenden Milchsäurebildung herrührt oder ob im Kontraktionsmoment potentielle Energie in kinet. übergeht, so daß das Wesen der Kontraktion auf einen physikal. Vorgang, auf Zustandsänderungen an den Eiweißkolloiden, zurückzuführen ist. In diesem Falle koinzidiert die Milchsäurebildung nicht mit der Kontraktion. — Da es experimentell nicht gelingt, die Milchsäurebildung nach einer einzelnen Zuckung zu bestimmen, wurde mit kurzen Tetani von 5–10 sec. Dauer gereizt, der eine Muskel sofort nach der Reizung in fl. Luft versenkt, der andere nach einer Erholungszeit von 5–30 sec. Zu jeder Best. wurden die Gastrocnemien u. Semimembranosi von 6–12 Fröschen verwendet. Die Muskeln wurden teils unbelastet, teils mit Belastung von 17 oder 25 g gereizt. Der Reizstrom (direkte Reizung) war stets so stark, daß der Muskel sich maximal kontrahierte. Die Muskeln erschlafften sofort nach der Unterbrechung des Stromes; manchmal blieb ein gewisser Verkürzungsrückstand zurück. Es wurde oft bei Rollenabstand 0 des Induktionsapp. gereizt. Die Fehlerbreite der Bestst. war höchstens 8–10%. — Von 34 Verss. war der Milchsäuregehalt 22-mal vermehrt (bis zu 50%, zumeist etwa 30%), 11-mal innerhalb der Fehlerbreite unverändert und einmal verringert. Die nachträgliche Milchsäurebildung in den positiven Resultaten übertrifft die anaerobiot. Milchsäurebildung in der Ruhe um das Mehrhundertfache. Die Vff. sehen die Milchsäurebildung nicht als Folge einer Überreizung an. Auf Grund dieser Ergebnisse scheinen die Energiequellen der Muskelkontraktion in noch unbekannten exotherm verlaufenden chem. Rkk. zu bestehen, oder physikochem. (kolloidchem.) Natur zu sein. Im letzteren Falle käme den chem. Rkk. mit entweder oxydativem oder gährungsartigem Charakter nur die Bedeutung der Wiederaufladung eines sich im Kontraktionsaugenblick entladenden physikochem. Akkumulators zu. Die Nachbildung der Milchsäure kann mit der verzögerten anaeroben Wärme von HARTREE u. HILL in Zusammenhang gebracht werden. Doch ist das Auftreten einer verzögerten Wärme infolge Milchsäurenachbildung nicht nötig, da deren therm. Effekt ganz oder teilweise durch die kolloidchem. Vorgänge kompensiert werden könnte. (Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 209–31. Frankfurt, Inst. f. vegetative Physiol., Univ.)

LOHMANN.

Otto Meyerhof und **K. Lohmann**, *Über die Vorgänge bei der Muskelermüdung.*

Die Unterss. befassen sich mit der Milchsäurekonz. u. der Wasserstoffzahl im ruhenden, ermüdeten u. starren Muskel, mit den Puffersubstanzen im Muskel, mit dem zeitlichen Zusammenhang von Kontraktion u. Milchsäurebildung u. mit der Änderung der pH bei der Spaltung des Hexosephosphats. — Die Wasserstoffzahl des Muskels erwies sich weitgehend bestimmt durch den Gehalt an Milchsäure. Zur Messung der $[\text{H}^+]$ wurde zumeist der ruhende, ermüdete oder auch starre Muskel in sehr gut gekühltem W. mit Sand fein zerrieben u. nach Abzentrifugieren des Gewebes die pH -Messung mit der Chinhydronelektrode von BILMANN unter Verwendung von Goldelektroden ausgeführt. Die durch das Zerreiben bedingte Milchsäureneubildung beträgt bei ruhender Muskulatur nur 0,02%. Das „physiol.“ Ruheminimum war für Sommer- u. Herbstfrösche 0,02–0,03%, für Frösche, die 6–8 Monate gehungert hatten, 0,01–0,02% Milchsäure bei einem pH von im Mittel 7,3. Das Maximum bei vollständiger Ermüdung war 0,4–0,45%, $\text{pH} = 6,4$, bezw. für Hungerfrösche 0,16–0,30% Milchsäure (bei tetan. Reizung mit 15–20 Sek. Intervall), bei Chloroformstarre 0,5–0,6, $\text{pH} = 6,0$ bezw. 0,3%. Der geringere Milchsäuregehalt bei den Hungerfröschen ist mit einer etwas geringeren Pufferkraft verbunden. Die Veränderung der pH im Muskel bei Ermüdung u. Starre wird ausschließlich durch Milchsäure herbeigeführt; denn zu der Suspension nicht ermüdeten Muskulatur hinzugefügte Milchsäure ergab dieselbe Verschiebung der $[\text{H}^+]$ wie eine entsprechende Menge spontan gebildeter Milchsäure. — Zur Unterss.

der Puffersubstanzen im Muskel wurden symmetr. ruhende u. ermüdete Muskeln zunächst mit A., dann mit W. extrahiert u. in den Extrakten sowie im unl. Rückstand vergleichend die Asche sowie z. T. auch die Phosphate bestimmt. Im alkoh. Extrakt ermüdeten Muskeln ist der Gehalt an Asche wegen der Löslichkeit des Alkalilactats in A. erhöht. Die Berechnung ergibt, daß die Milchsäure bei der Ermüdung eine etwa äquivalente Basenmenge aus dem in A. unl. Anteil der Muskelsubstanz freimacht, so daß die äquivalente Aschenzunahme des alkoh. Extrakts annähernd der Milchsäurebildung bei der Ermüdung entspricht. Zusammen mit Bestst. des Aschenverlustes u. des P-Gehaltes im wasserlöslichen u. wasserunlöslichen Anteil des Muskelrückstandes ergab sich, daß die Hälfte (bis zwei Drittel) der Milchsäure sich mit Protein u. der Rest mit Phosphat umsetzt. Dieses Resultat entspricht dem Ergebnis von ANDREWS, BEATTIE u. MILROY (Biochemical Journ. 18. 993; C. 1925. I. 400), daß die Pufferkapazität des Preßsaftes von Pferdemuskeln gegen 200% höher ist als der Phosphatgehalt. Ferner wurde beobachtet, daß beim Filtrieren von in gesätt. NaCl-Lsg. oder, weniger gut, in dest. W. zerriebener Muskulatur aus ermüdeten Muskeln das Mehrfache an Filtrat erhalten wird als aus nicht ermüdeten, in denen durch Alkaliabgabe das Protein durch Annäherung an den isoelekt. Punkt instabil wird, wobei wahrscheinlich eine Dehydratation stattfindet, die vielleicht mit positiver Wärmetönung verknüpft ist.

EMBDEN hatte gefunden, daß im größeren Teil einer Versuchsreihe mit Froschmuskeln, die 5—10 Sek. tetan. direkt gereizt waren, der Milchsäuregehalt der Muskeln, die sofort nach der Reizung durch Eintauchen in fl. Luft getötet wurden, geringer war als in den Muskeln, die sich nach der Reizung noch 10—30 Sek. ärob oder anärob erholt hatten, u. schließt daraus (Dtsch. med. Wchscr. 51. 636; C. 1925. II. 946), daß die Energie der Muskelkontraktion nicht auf Kosten sich im Kontraktionsaugenblick abspielender chem., sondern exotherm verlaufender kolloidchem. Prozesse entstände. Vff. finden dagegen, daß innerhalb der mittleren Fehlergrenze der Milchsäurebest. von 0,0011% oder 2—3% der gesamt vorhandenen Milchsäure die Milchsäurebildung stets mit der Kontraktion koinzidiert, wenn die Muskeln „physiol.“, d. h. entweder indirekt gereizt werden oder auch direkt mit Strömen, die nur eine eben maximale Kontraktion hervorrufen. Nur in den Verss., in denen mit übermaximalen Strömen direkt gereizt wurde, trat eine Nachbildung von Milchsäure in der Erholungszeit auf. Die Verss. wurden so angestellt, daß die Muskeln isoton. oder isometr. 5 bis 15 Sek. gereizt wurden, dann ein Muskel sofort in fl. Luft getaucht, der andere nach einer Erholungszeit von 10—150 Sek., zumeist nach 20—30 Sek. Die Unterbrechung des Reizstromes u. das Töten der ersten Muskelreihe (je 3 Gastrocnemien) erfolgte bei den isometr. Reizungen mechan. synchron. Die Milchsäurezunahme betrug bei physiol. Reizung in 10 Sek. unter verschiedenen Bedingungen 0,015—0,028%; bei übermäßiger Reizung in 9—16 Sek. 0,028—0,074%; die Milchsäurenachbildung in der Ruhe war hier 0,015—0,030%, etwa 30—90% der im Tetanus gebildeten Milchsäure. Gegen eine Nachbildung von Milchsäure spricht auch der Vers., daß in einem 4 Sek. langen Tetanus bei isometr. Kontraktion u. indirekter Reizung von übermaximaler Stärke 0,027%, im s. Muskel nach 8 Sek. 0,033% Milchsäure gebildet wurden. — Demnach wird die bei unphysiol. Reizung auftretende Extramilchsäure von den Vff. auf eine Schädigung des kontraktile App. zurückgeführt. In Verss., in denen der isometr. Koeffizient der Milchsäure ($K_m = g \text{ Spannung} \times cm \text{ Muskellänge} : mg \text{ Milchsäure}$) bestimmt wurde, konnte gezeigt werden, daß diese Extramilchsäure für die Arbeitsleistung verloren ist, sie also eine Vergeudung darstellt. K_m war bei normaler Reizung 128—152, bei überstarker Reizung nur 56—108. Die letzteren Werte hängen wohl mit der Kontrakturspannung zusammen, indem der Muskel nach den ersten übermäßigen Reizen erst allmählich in die Ruhelage zurückgeht (etwa nach 40 bis 50 Einzelreizen). Schon an diesem Punkt unterbrochene Verss. ergaben sogar K_m .

Werte von 31 u. 38. Bei sämtlichen Reizverss. war zu beachten, daß die Intensität des Reizstromes und erst recht die Stromdichte bei direkter Reizung mit farad. Induktionsströmen nur in weiten Grenzen reproduzierbar ist, da z. B. schon eine kleine Verstellung im Kontakt des Neef'schen Hammers die mittlere Stromstärke im Primärkreis im Verhältnis 1:2 zu ändern vermag. Als Ergebnis bestätigen die Befunde die Hill-Meyerhofsche Anschauung, daß nicht die Milchsäurebildung, sondern -entfernung als Restitutionsvorgang aufzufassen ist. In Übereinstimmung mit dieser Deutung der Milchsäurenachbildung als Überreizung stehen neue myotherm. Messungen von HARTREE u. FURUSAWA, nach denen nach einem Tetanus von $\frac{1}{20}$ Sek. mit übermaximal starken Induktionsströmen im Sartorius in dem sonst wärmefreien Intervall unmittelbar im Anschluß an die Kontraktion eine Extrawärme auftrat, die zwischen 34—80% der initialen Wärme betrug.

Nach Verss. EMBDENS übertrifft häufig im Moment der Kontraktion die Abspaltung anorgan. Phosphats aus dem Lactacidogen die Milchsäurebildung. Die Annahme, daß die Abspaltung des Phosphats in höherem Maße als die Milchsäure an der Verschiebung der $[H^+]$ bei der Kontraktion beteiligt sei, wird als irrtümlich zurückgewiesen, da die zweite Dissoziationskonstante der Phosphorsäure etwa 700-mal schwächer ist als die Dissoziationskonstante der Milchsäure. Für die Spaltung der Hexosephosphorsäure kommt nur die zweite Konstante in Betracht, weil eine Abspaltung des primären H-Ions, also der freien Säure, bei der Hydrolyse der Hexosephosphorsäure, die im ruhenden Muskel bei einem pH von 7,0—7,4 als Alkalisalz vorliegen dürfte, wenig verständlich erscheint. Zur Prüfung wurde eine $\frac{1}{12}$ -m. Lsg. von Na-Hexosediphosphat durch 11-stg. Erhitzen auf 110° unter völligem O_2 -Abschluß in die Komponenten gespalten. Die Wasserstoffzahl verschob sich bei dieser Spaltungsart nur geringfügig, von $pH = 7,4$ auf 7,0 bzw. 7,0 auf 6,4. Die Best. der c_H -Verschiebung bei Zusatz von 0,044-m. Milchsäure zu gespaltenem u. ungespaltenem Hexosephosphat ergab, daß die Pufferkapazität des gespaltenen Hexosephosphats etwas ansteigt. Dabei war im Endeffekt die $[H^+]$ dieselbe, ob die Milchsäure zum gespaltenen oder ungespaltenen Hexosephosphat hinzugegeben wurde. Phosphatpuffer verhielt sich wie gespaltenes Hexosephosphat. Auch diese Verss. bestätigen, daß die Säuerung im Muskel bei der Ermüdung ausschließlich durch Milchsäure verursacht wird. (Biochem. Ztschr. 168. 128—65. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biologie.) LOHMANN.

H. W. Kranz, *Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß relativ kurzwelliger ultraroter Strahlen auf das Auge mit besonderer Berücksichtigung der Cysteine-reaktion der Linse*. Wellen von 670—700 $\mu\mu$ können neben Rkk. des Sphincter Linsen- trübung an der lebenden Linse durch Wärmewrkg. hervorrufen; in der Vers.-Anordnung werden Tempp. bis zu 65° erreicht u. der Koagulationspunkt für Linseneiweiß liegt bei 50° (in W. unl. Albumoid), 72° (α -Krystallin) u. 63° (β -Krystallin). Eine Beeinträchtigung der cysteinhaltigen Linsenkrystalline durch ultrarote Strahlen ließ sich nicht beobachten. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 74. 56—68; Ber. ges. Physiol. 32. 618—19. 1925. Giessen, Univ.-Augenklinik.) OPPENHEIMER.

Ach. d'Haenens, *Die Verteilung des Arsens nach intravenöser Injektion*. Milz u. Lunge enthalten absolut fast die gleiche As-Menge. Die Leber hält relativ geringere Mengen fest. Nach Neosalvarsan- u. Na-Cacodylatinjektionen verschwindet As rasch aus dem Blut, länger verweilt es nach Na-Arseniatzufuhr. Nach Zusatz von Cacodyl, Atoxyl, Arrhenal, Liqu. Fowleri zu geschlagenem Rinderblut ist alles As im Serum zu finden. Bei Fällung von Serum, das mit As versetzt ist, durch halbgesätt. $(NH_4)_2SO_4$ geht kein As in den Nd. Auch das 10-fache Vol. A fällt kein As. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérap. 30. 291—309. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 668. 1925. Ref. BEHRENS. Louvain, Laborat. de thérap.) OPPENHEIMER.

A. Lacassagne, J. Lattès und J. Lavedan, *Experimentelle Studien der biologischen Wirkungen des in den Körper eingeführten Poloniums*. Po tötet in Mengen

von 500 elektrost. Einh. injiziert Kaninchen nach 6—12 Tagen. Schwere Veränderungen des Blutes, der Organe, besonders der Nieren, als Ausscheidungsorgane wurden gesehen. Studien über die Verteilung des Po (Paraffinschnitte des Organs auf photograph. Platten gelegt, lassen je nach Schwärzung auf den Po-Gehalt schließen) lassen erkennen, daß die Tubuli contorti der Nieren, die reticuloendothelialen Zellen des Darms u. das Alveolarepithel der Lunge bevorzugte Speicherungsplätze sind (Journ. de radiol. et d'électrol. **9**. 67—82. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 667—68. 1925. Ref. BEHRENS. Paris, Inst. du radium.) OPPENHEIMER.

C. Pulcher, *Die Wirkung des Äthylalkohols auf den Muskel in Beziehung zur Temperatur*. Bei Durchströmung von Fröschen mit A. treten bei Kühllhaltung im Muskel Kontraktionen auf u. die durch elektr. Einzelreize ausgelösten Zuckungen nehmen tetan. Charakter an. Über 18° sind nur narkot. Wrkgg. zu beobachten. (Arch. di scienze biol. **7**. 143—49; Ber. ges. Physiol. **32**. 503. 1925. Ref. WACHOLDER. Turin, Istit. di fisiol.) OPPENHEIMER.

Moa Fujiharasa, *Über das Schicksal des parenteral eingeführten Zuckers bei Säugtieren*. Zucker oder reduzierende Substanzen ließen sich im Hungerzustand der Tiere weder im Harn noch im Darm nachweisen. Nach intravenöser Traubenzuckerinjektion tritt in vordem abgetrennten Darmstücken (oder Magen) Zucker auf. (Okayama-Igakkaï-Zasshi **1925**. 507—12; Ber. ges. Physiol. **32**. 776. 1925. Ref. SCHULZ. Okayama, Pathol. Inst.) OPPENHEIMER.

Jesse L. Bollman, *Experimentelle Beobachtungen über die therapeutische Wirksamkeit des Traubenzuckers*. Der günstige Effekt von Traubenzuckerinfusionen läßt sich experimentell nach Leberexstirpation, bei Anlage einer Eck-Fistel, bei Chlf.-u. P-Vergiftung, bei uräm. Zuständen, nach Nierentransplantation demonstrieren; er ist zurückzuführen auf die Eiweißeinsparung, auf die Vollkommenheit der Fettsäureverbrennung u. anderer tox. Substanzen u. auf die Kuppelung tox. Stoffe in Form von Glucuronsäuren, schließlich auf die diuret. Wrkg. Reinheit des Zuckers ist Bedingung, da Verunreinigungen tox. Symptome auslösen. (Surg. clin. of North America **5**. 871—79; Ber. ges. Physiol. **32**. 673—74. 1925. Ref. HILDEBRANDT.) OPPENHEIMER.

Lise Emerique, *Untersuchungen über den Nährwert des Inulins und inulinhaltiger Leguminosen*. Von Mäusen wird Inulin unverändert mit den Fäces wieder ausgeschieden. Meerschweinchen resorbieren Inulin, können sogar im Magen schon Inulin in Fruktose umwandeln. (Ann de physiol. **1**. 123—31. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 538. 1925. Paris, Sorbonne Laborat. de physiol. Ref. KAPFFHAMMER.) OPPENHEIMER.

Alfredo Chistoni, *Über die sekundäre Dissoziation komplexer Ionen im Organismus*. Aus der Wrkg. von Kaliumkupfercyanid auf den isolierten Darm ist zu schließen, daß in Berührung mit Gewebe eine Dissoziation in Cu^{++} u. CN^- erfolgt, u. daß je nach Konz. die Wrkg. des Anions oder des Kations überwiegt. (Ach. d. scienze biol. **7**. 1—7. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 666—67. 1925. Camerino, Istit. di farmacol. Ref. KAISER.) OPPENHEIMER.

I. Kuroda, *Beiträge zur Kenntnis der physiologischen Wirkung einiger Glyoxalinderivate*. Vorl. Mitt. Glyoxalin (Imidazol) erregt die glatten Muskeln, Glyoxalinaldehyd wirkt zentral reflexsteigernd, dann lähmend, Glyoxalincarbonsäure ist fast unwirksam, Oxymethylglyoxalin hat eine abgeschwächte Glyoxalinwrkg. (Journ. of biophysics **1**. 14—15. 1923; Ber. ges. Physiol. **32**. 669. 1925. Ref. FROMHERZ. Tokyo, Gen. meet., physiol. soc.) OPPENHEIMER.

A. Brissemoret, *Bemerkung über „Anti-Opium“-Pflanzen*. Der Vorschlag mit Berberinzufuhr Morphiomane zu behandeln, der auf konstitutionstheoretische Vorstellungen zurückging, speziell auf dem Umstand fußte, daß Berberin an Stelle der gesätt. Bindung der Phenanthrenderivv. vom Typus des Morphins eine Äthylengruppe

(Stilben) besitzt, hat zu prakt. Erfolgen geführt. (C. r. soc. de biologie **93**. 1341—43. 1925.) OPPENHEIMER.

Léo Deckers, *Chloroform und Äther. Erforderliche Mengen für die verschiedenen Stadien der Narkose.* Mit der Dauer der Narkose erniedrigen sich die Konz., bei denen Anästhesie aufrecht erhalten bleibt beim Ä. auf 25%, beim Chlf. auf 35% des Anfangswertes. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie **30**. 229—49. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 674. 1925. Louvain, Laborat. de thérapeut. Ref. SCHÜBEL.) OPPENHEIMER.

H. C. Rolnick, *Experimentelle Untersuchungen an Vas deferens. Die Wirkung von Antiseptics. Mercuriochrom, Mercuriophen, Meroxyl, Kollargol u. Chlorazen* hinterlassen an dem sonst zu starker Regenerationsfähigkeit neigenden Samenstrang-epithel in Konz., die über der therapeut. liegen, schwerste Zerstörung u. Obliteration. (Journ. of urol. **12**. 445—77. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 636. 1925. Chicago, Dep. of genito-urin. surg. Ref. KORNITZER.) OPPENHEIMER.

A. Richard Bliss, jr., *Eine pharmacodynamische Untersuchung über die antheilmintischen Eigenschaften von zwei Chenopodiumölen.* Das Chenopodiumöl aus den Pflanzen, die in „Middle Western states“ kultiviert werden, ist gegen Ascariden ebenso wirksam wie das Öl aus „Maryland“. (Journ. Lab. Clin. Medicine **10**. 456 bis 461. 1925. Memphis, Labor. Phys. a. Pharm. Univ. Tennessee.) OPPENHEIMER.

Tsunematsu Tsurumaki, *Experimentelle Studien über die Wirkung von Ozon auf das durch gewisse Gifte ermüdete oder beeinflusste Herz.* (Vgl. S. 1596.) Feststellung der Wrkgg. des Ozons auf das durch K, Campher, Acetylcholin, Pilocarpin, Digitoxin, Atropin u. Adrenalin geschädigte Froschherz. (Acta scholae med. Kioto **7**. 113—21. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 664. 1925. Ref. SCHÜBEL. Kyoto, Pharmol. inst. imp. univ.) OPPENHEIMER.

René Hazard und **L. J. Mercier**, *Wirkung des Atropins auf den Herzrhythmus.* (Vgl. S. 1597.) Wird Atropin in kleinen Dosen u. regelmäßigen Abständen — also „fraktioniert“ — einem Hunde eingespritzt, so ist die Wrkg. auf den Herzrhythmus grundsätzlich anders, als wenn die Gesamtmenge mit einem Male injiziert wird. Bei „fraktionierten“ Gaben wird der Vagus auch gelähmt, nie tritt aber Beschleunigung, stets ständige Abnahme der Frequenz auf. (C. r. soc. de biologie **94**. 254—55. Paris, Labor. de pharmac. Fac. de méd.) OPPENHEIMER.

Sanya Uéda, *Pharmakologische Untersuchungen an Herzstreifen nach Loewe.* II. Mitt. *Versuche bei Kalium.* (Vgl. S. 1597.) KCl wirkt auf den Herzmuskel nur lähmend, auf das Reizleitungssystem erregend. Die K-Kontraktur kommt nur in Ggw. von Ca zustande, das die Kontrakturbereitschaft bedingt. Die Kontraktur selbst ist durch die Reizung des Leitungssystems hervorgerufen. (Acta scholae med. Kyoto **6**. 333—57. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 666. 1925. Ref. BRAUN. Kyoto, Pharmak. Inst.) OPPENHEIMER.

Carl F. Cori und **Gerty T. Cori**, *Über den Kohlenhydratstoffwechsel maligner Tumoren.* (Vgl. S. 975.) Tumoren haben einen niedrigeren Traubenzuckergehalt als n. Gewebe. Der Gehalt nimmt nach intraperitonealer Injektion des Zuckers zu. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 254—55. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 496 bis 497. 1925. Ref. LASNITZKI. Buffalo, Stat. inst. study of malignant. dis.) OPP.

Ruth C. Theis und **Stanley R. Benedict**, *Über die anorganischen Bestandteile des Carcinomserums.* Nur der Ca-Gehalt des Serums von Carcinomkranken ist herabgesetzt. (Journ. of cancer research **8**. 499—503. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 497. 1925. Ref. LASNITZKI. New York, Cancer research, mem. hosp.) OPPENHEIMER.

Masao Yamauchi, *Studien zur Geschwulstimmunität.* IV. Mitt. *Immunisierungsversuche mit Thorium X.* Th X kann Tiere aleukocytär machen. Die durch Th erzielte Immunität gegen maligne Tumoren ist geringer als nach anderen Maßnahmen.

(Zeitschr. f. Krebsforsch. **21**. 230—40. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 498. 1925. Ref. HERBERT KAHN. Frankfurt/Main, Staat. Inst. f. exp. Therap.) OPPENHEIMER.

A. H. Roffo und **L. M. Correa**, *Das ultrafiltrierbare Calcium im Serum Krebskranker*. 62% des Gesamt-Ca im Carcinomserum sind ultrafiltrierbar, womit gegenüber n. Seren kein wesentlicher Unterschied erkennbar ist. (Bol. del inst. de med. exp. **1**. 340—43. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 761. 1925. Ref. ROFFO.) OPPENHEIMER.

A. H. Roffo, *Das lipolytische Verhältnis und der Wassergehalt in normalen und pathologischen Geweben*. W.-Gehalt u. Cholesteringehalt von Tumor u. Tumorträger werden in Beziehung gesetzt. (Bol. del inst. de med. exp. **1**. 333—39. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 761. 1925. Ref. ROFFO.) OPPENHEIMER.

F. Pharmazie. Desinfektion.

H. A. Metz Laboratories, Inc., New York, übert. von: **Charles W. Hooper**, Jamaica, New York, V. St. A., *Herstellung eines Analgeticums*. Eine Lsg. von $MgSO_4$ oder $MgCl_2$ in W. wird mit einer kleinen Menge eines Alkaminesters einer arom. Säure in zugeschmolzenen Glasampullen sterilisiert. — Z. B. löst man in 100 cem dest. W. 50 g $MgSO_4$, 7 H_2O u. 2,5 g *p*-Aminobenzoesäurediäthylaminoäthylestermonochlorhydrat, bezw. 25 g u. 1,25 g u. sterilisiert die Lsgg. in zugeschmolzenen Glasampullen. Durch den Zusatz des Alkaminesters wird die analget. u. anästhesierende Wrkg. des $MgSO_4$ wesentlich gesteigert u. verlängert. Es findet in Form von subcutanen oder intramuskulären Injektionen therapeut. Verwendung. An Stelle des obigen Alkaminesters lassen sich auch das Chlorhydrat des Zimtsäurediäthylaminopropylesters, sowie das Sulfat des *p*-Aminobenzoesäure- γ -di-*n*-butylaminopropylesters verwenden. Eine aussalzende Wrkg. der Mg-Salze auf die Alkaminester tritt beim Lösen in W. nicht ein. (**A. P. 1 563 087** vom 22/1. 1925, ausg. 24/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Charles Raymond Downs, New Haven, Connecticut, V. St. A., *Herstellung eines blutstillenden Mittels*. Man mischt *Phthalylperoxyd* u. *Phthalsäure* mit einem indifferenten Füllmittel, wie Talk, Ton oder Asbest. — In kleinen Mengen auf die Haut gebracht, bringt das Pulver hartnäckige Blutungen sofort zum Stillstand. Der hierbei freiwerdende O_2 wirkt gleichzeitig sterilisierend. (**A. P. 1 563 346** vom 12/8. 1924, ausg. 1/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Jacques Wolf & Co., Passaic, New Jersey, übert. von: **Selman A. Waksman**, New Brunswick, New Jersey, V. St. A., *Herstellung eines festen Enzympräparates*. Weizenkleie oder Apfeltrester werden mit W. gemischt, das Gemisch ca. 1 Stde. mit Dampf sterilisiert u. die Maische auf 30° abgekühlt. Hierauf gibt man eine wss. Aufschwemmung von *Schimmelpilzsporen*, wie *aspergillus oryzae* oder *aspergillus flavus* hinzu u. läßt die geimpfte Maische bei 30° ca. 40—48 Stdn. stehen, bis kein weiteres Wachstum der Kulturen zu bemerken ist, worauf die M. gegebenenfalls getrocknet wird. Alsdann wird die M. mit W. ausgelaugt, der Auszug filtriert u. mit frischen Pilzkulturen versetzt. Nach 1—2 Stdn. dampft man das W. aus dem Gemisch soweit ab, daß der Rückstand nur noch ca. 5% W. enthält. Das diastat. u. proteolyt. Eigenschaften besitzende Prod. findet als Klärmittel für Fruchtsäfte, sowie zu therapeut. Zwecken gegen *Dyspepsie* Verwendung. (**A. P. 1 564 385** vom 11/8. 1922, ausg. 8/12. 1925.) SCHOTTL.

H. A. Metz Laboratories, Inc., New York, übert. von: **Charles W. Hooper**, Jamaica, New York, V. St. A., *Herstellung beständiger, steriler Morphinlösungen*. Man versetzt eine Lsg. von Morphinsulfat in W. mit $NaHSO_3$ u. gegebenenfalls $MgSO_4$, sowie *p*-Aminobenzoesäurediäthylaminoäthylesterchlorhydrat, füllt die Mischung in Ampullen u. erhitzt diese nach dem Zuschmelzen 15—30 Minuten in sd. W. — Das $MgSO_4$ wirkt nicht nur wie das $NaHSO_3$ oxydationshindernd beim Sterilisieren der Morphinlg. sondern auch bei der Verwendung synergist. Der Alkaminester steigert die analget. Wrkg. des Morphins bei subcutanen Injektionen u. verhindert eine Ge-

wöhnung an das Morphin, sowie dessen bekannte Nebenwrkgg. Die Lsg. ist längere Zeit haltbar u. jederzeit gebrauchsfähig u. verursacht keine Infiltrationen oder Nekrosen. (A. P. 1 563 086 vom 8/10. 1924, ausg. 24/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Aktiebolaget Pharmacia, Liljeholmen, übert. von: **Lars Flodquist**, Stockholm, und **Inge Gustafsson Blomquist**, Stocksund, Schweden, *Antiseptisch und anästhesierend wirkendes Arzneimittel*. (A. P. 1 569 956 vom 20/9. 1923, ausg. 12/1. 1926. — C. 1925. II. 749.) SCHOTTLÄNDER.

Vincenzo Cesa, Hoboken, New Jersey, V. St. A., *Heilsalbe*, bestehend aus zu Schaum geschlagenem Eiweiß, Schweineschmalz u. S-Blüte. — Das Prod. findet bei Hautausschlägen aller Art, Pickeln usw. therapeut. Verwendung. (A. P. 1 566 271 vom 8/4. 1921, ausg. 22/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Joseph L. Smith, Denver, Colorado, V. St. A., *Masse zur vorübergehenden Füllung von Zahnkanälen*, bestehend aus Bienenwachs, Vaseline, MgO, Na-Diborat u. NaHCO₃. — Hierbei wirkt das NaHCO₃ neutralisierend auf die Säuren der Mundhöhle, das Na-Diborat verhindert die Dunkelfärbung der Zähne durch das NaHCO₃, u. das MgO wirkt schmerztlindernd. (A. P. 1 564 375 vom 30/6. 1923, ausg. 8/12. 1925.) SCHOTTL.

John T. Leland, Herman, Minnesota, V. St. A., *Herstellung eines Zahnreinigungsmittels*. Man füllt in eine zusammendrückbare, doppelwandige Tube mit 2 Austrittsöffnungen, u. zwar in den inneren kleinen Behälter, eine fl. Paste aus CaCO₃, krystallin. J u. Glycerin, in den äußeren größeren Behälter dagegen NaCl, Stärke, etwas krystallin. Menthol u. fl. Seife. — Zum Gebrauch drückt man die beiden Bestandteile aus der Tube auf eine Zahnbürste. Beim Zähnebürsten vollzieht sich dann die Mischung der beiden Pasten unter B. von NaJ, J-Stärke u. etwas freiem Cl₂. Das Mittel wirkt sowohl baktericid u. prophylakt. gegen Kropferkrankungen, als auch bläugend auf den Zahnschmelz. (A. P. 1 566 218 vom 17/8. 1922, ausg. 15/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

The Special Chemicals Company, übert. von: **Robert S. Black**, Highland Park, Illinois, V. St. A., *Zahnreinigungsmittel*, bestehend aus dem Lacton der Galactonsäure, Illi-Subnitrat, A. u. Vaseline. (Can. P. 250 376 vom 13/8. 1924, ausg. 2/6. 1925.) SCH.

The Special Chemicals Company, übert. von: **Carl Pfanstiehl**, Highland Park, Illinois, V. St. A., *Zahnreinigungsmittel*, bestehend aus den üblichen indifferenten Füllmitteln, einer wss. Lsg. von Galactonsäurelacton u. Äpfelsäure. — Letztere dient dazu, dem Lacton seine ursprüngliche Acidität wieder zu verleihen. (Can. P. 250 377 vom 13/8. 1924, ausg. 2/6. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

J. N. A. Sauer, Amsterdam, *Aktive Kohle für medizinische Zwecke*. Vegetabil. Stoffe werden gegebenenfalls nach oder unter Zusatz anorgan. Stoffe verkohlt, durch ein aktivierendes Gas aktiviert, wobei man das Material durch ein eingeblasenes Gas oder auf mechan. Weise in Suspension oder Bewegung erhält. (E. P. 243 801 vom 4/9. 1924, ausg. 31/12. 1925. Zus. zu E. P. 174 702; C. 1922. II. 1096.) KAUSCH.

G. Analyse. Laboratorium.

M. Speter, *Gerät zur gleichzeitigen Bestimmung verschiedener Schmelzpunkte*. (Chemisch Weekblad 23. 135. — C. 1926. I. 1236.) GROSZFELD.

Emil Weiss, *Elektrisch geheizter Trichter für filtrierende Medien*. Der einfache Apparat soll das Arbeiten mit Gelatine u. Agar vereinfachen. (Journ. Lab. Clin. Medicine 10. 499—500. 1925. Chicago, Loyola Univ., Dep. of Path. a. Bacter.) OPP.

Carl W. Keuffel, *Ein Spektrophotometer für direkte Ablesung*. Beschreibung eines App., der gleichzeitig Helligkeit u. Farbe einer Probe zu messen gestattet. (Journ. Opt. Soc. America 11. 403—10. 1925.) KELLERMANN.

T. Thorne Baker und **L. F. Davidson**, *Eine einfache Photometereinrichtung zur Absorptionsmessung im Ultravioletten*. Das Prinzip der von den Vff. benutzten photometr. Methode besteht in der photograph. Aufnahme einer Anzahl von gleichen

Absorptionsspektren mit zugehörigen Vergleichsspektren; letztere sind nacheinander in meßbarer Weise in ihrer Intensität abgestuft. Indem man für eine bestimmte Wellenlänge die Schwärzung des Absorptionsspektrums in die Schwärzung der in bekannter Weise abgestuften Vergleichsspektren einordnet, läßt sich die Absorption an dieser Stelle des Spektrums angeben. Die Anordnung der Vff. erfordert außer einem Quarzspektrographen nur zwei planparallele Quarzzellen C_1 u. C_2 für Lösungsm. (Vergleichsspektrum) u. Lsg. (Absorptionsspektrum) u. eine einfache mechan. Anordnung, die dafür sorgt, daß abwechselnd C_1 u. C_2 vor den Spalt gebracht werden, derart, daß das Licht, das durch C_1 geht, nur die obere Hälfte u. das, welches durch C_2 geht, jeweils nur die untere Hälfte des Spaltes bestrahlt. Durch einen rotierenden Sektor kann das Vergleichsspektrum allein in meßbarer Weise geschwächt werden. (Journ. Scient. Instruments **3**. 13—15. 1925.) STEINER.

Stab des Versuchslaboratoriums der General Electric Co., Photoelektrische Photometrie. Die umfangreiche Zusammenfassung berichtet vor allem über die Verbesserung der zur photoelektr. Photometrierung benutzten Photozellen u. über die Erfahrungen, die mit ihnen bei der Photometrierung von Glühlampen gewonnen wurden. Der Photozelle wird eine Form gegeben, bei der es vermieden ist, daß stark belichtete Teile der Zellenwand in ungenügendem Kontakt mit der Kathode sind. Der Photostrom wird nunmehr der Strahlung besser proportional als früher. Vollständige Proportionalität konnte jedoch nicht erreicht werden. Weiter wurde festgestellt, daß die charakterist. spektrale Empfindlichkeit von verschiedenen Zellen von demselben Metall nicht die gleiche ist. Der Versuch, die Zellen zur absoluten Messung zu benutzen, wurde daher aufgegeben; sie wurden nur noch zum Vergleich von Lampen von nahezu derselben Intensität u. Farbe verwandt. Die Methoden zur Untersuchung der Glühlampen werden ausführlich beschrieben. Zur Charakterisierung einer Glühlampe ist wesentlich der dem Auge sichtbare Teil der ausgestrahlten Energie, der sogenannte Lichtstrom. Es wird ein Lichtfilter angegeben, daß die spektrale Empfindlichkeit einer Rb-Zelle so abändert, daß sie der des menschlichen Auges sehr nahe kommt. Besonders brauchbar erwies sich das Wrattenfilter Nr. 9. Dieses absorbiert alles Licht von Wellenlängen $< 4600 \text{ \AA}$, während es oberhalb $5200 \text{ \AA}$ nur wenig absorbiert. (Journ. Scient. Instruments **3**. 2—6. 38—42. 77—86. 1925.) STEINER.

Amerikanische Optische Gesellschaft, Ausschuß für die Fortschritte auf dem Gebiet der Radiometrie und Photometrie, Bericht vom Oktober 1924. Kurzer Bericht über die in den Jahren 1923 u. 1924 erschienenen einschlägigen Veröffentlichungen. (Journ. Opt. Soc. America **11**. 357—69. 1925.) KELLERMANN.

P. Reiss, Reduktion der Indikatoren als Ursache von Täuschung bei der Messung von p_H auf colorimetrischem Wege. Bei Verwendung von Kresylblau, Nilblau, Bromphenolblau u. Bromkresolpurpur ist die Red. des Farbstoffs innerhalb bestimmter p_H -Intervalle zu berücksichtigen. (C. r. soc. de biologie **94**. 289—90. Straßburg, Inst. de Physique biol.) OPPENHEIMER.

Hippolyte Copaux und André Copaux, Auf die Verwendung der photoelektrischen Kette gegründete Bestimmungsmethode der gefärbten Gase und ihre Anwendung auf die nitrosen Dämpfe. Eine lichtempfindliche Elektrode wird mittels einer konstanten Lichtquelle beleuchtet, wobei das Licht ein Rohr passieren muß, durch welches Luft- NO_2 -Gemische verschiedener Zus. durchgeführt werden. Vergleicht man die jedem Gemisch entsprechende Stromstärke mit der chem. bestimmten Zus. des Gemisches, so bekommt man eine Kurve, die die Best. des NO_2 -Gehaltes einer unbekannten Mischung auf Grund der Angaben des lichtelektr. Stromes ermöglicht. Die Kurve kann mit hoher Genauigkeit (0,05%) ermittelt werden; sie ist bei 11 u. 17° gleich. — Der Absorptionskoeffizient von NO_2 nimmt bei hoher Verd. stark zu, was mit der Dis-

soziation der farblosen N_2O_4 -Moll. in gefärbte NO_2 -Moll. bei Verd. in Einklang steht. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1058—60. 1925.)

BIKERMAN.

Elemente und anorganische Verbindungen.

A. Besombe, *Über die Bestimmung des Eisens mit Hilfe von Bichromat*. Der Umschlag der Titration des Fe mit $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ tritt nur langsam ein (Indicator $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$). Aus den Gleichungen über die Reaktionsgeschwindigkeit ergibt sich, daß eine Vermehrung der Fe^{++} -Ionen den Eintritt des Umschlages beschleunigt. Es wird folgendes Verf. vorgeschlagen. Die Lsg. des Fe-Salzes wird auf 5 ccm konz., SnCl_2 bis zur Entfärbung zugegeben u. nach dem Erkalten mit 10 ccm einer 5%ig. Lsg. von HgCl_2 versetzt u. mit $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ titriert. (Bull. Soc. Chim. Belgique **34**. 338—41. 1925. Charleroi, Univ.)

ENSZLIN.

K. Swoboda und **R. Horny**, *Die Bestimmung des Cers im Edelmetall*. Nach Überprüfung verschiedener anderer Methoden wird die Fällung des Cers als Fluorid empfohlen. Ausführung: 2 g der Probe werden in 60 ccm HCl (1 : 1) unter Erwärmen gel. Aus einem Tropffläschchen wird genau so viel HNO_3 zugesetzt, wie zur Oxydation des Fe u. W erforderlich. Zur h. Lsg. Zusatz von 60 ccm Weinsäure-Lsg. (25%) u. 30—35 ccm salzsaure SnCl_2 -Lsg. (10%). Es folgt Fällung mit konz. NaOH in geringem Überschuß u. Überführen in 500 ccm-Meßkolben. Nach Abkühlung Zusatz von 10 ccm A. u. Auffüllung zur Marke, Filtration durch 2 ineinandergelegte Faltenfilter. 250 ccm des Filtrats werden mit HCl bis zur deutlich sauren Rk. tropfenweise versetzt u. zum Sieden erhitzt. Entfernen der Flamme u. Füllen des Ce durch Zugabe von 2 g festem $(\text{NH}_4)\text{F}$. Die überstehende Fl. wird mit NH_3 neutralisiert u. mit 1—2 Tropfen HCl angesäuert u. der Nd. 1 Stde. absitzen gelassen. Filtrieren durch Barytfilter unter Anwendung von Filterschleim u. Auswaschen mit h. $(\text{NH}_4)\text{F}$ -haltigen (3 g/l) W. bis zur Alkalifreiheit. Veraschen u. Glühen im Pt-Tiegel, Wiegen als CeO_2 (Faktor = 0,8142). (Ztschr. f. anal. Ch. **67**. 386—98. Lab. der Böhlerwerke A.-G., Kapfenberg, Österreich.)

HEIMANN.

John H. Hastings, *Bestimmung von Zink im gerösteten Erz*. 0,5 g werden in verd. HCl gel., ohne zu kochen auf 5 ccm konz., mit NH_4Cl u. NH_4OH etwa vorhandenes Fe gefällt u. nach dem Filtrieren mit Methylorange als Indicator eben neutralisiert. Die Färbung wird mit einigen Tropfen Br entfernt, die Lsg. gekocht u. mit $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ in einigen Tropfen einer 5%ig. Lsg. von $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$ unter Zusatz von 50 ccm einer 1%ig. Lsg. von Natriumhyposulfit titriert. Die Einstellung der Lsg. erfolgt mit reinem Zn, welches wie das zu untersuchende Erz behandelt wurde. Ist Mn vorhanden, so wird dieses vor der Titration durch Persulfat oder Br gefällt. Das ungeröstete Erz muß erst mit 5 g KClO_3 u. 10 ccm HNO_3 abgeraucht werden. (Engin. Mining Journ.-Press **121**. 247—48.)

ENSZLIN.

Geo. W. Sears, *Kritische Untersuchungen der Schmelze von Erzen seltener Metalle*. II. *Die Trennung von Tantal und Niob*. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 922; C. 1925. II. 389.) Vf. untersucht die Pyrosulfatschmelze von Tantalit u. Columbit. Die Verss. zeigten, daß die Schmelzdauer u. das Verhältnis der Flußmittelmenge zur Erzmengenge keinen großen Einfluß auf die Löslichkeit der gebildeten Ta- u. Nb-Verbb. ausüben. Eine größere Rolle spielt die Temp., bei der die Schmelze ausgeführt wurde. Zur Prüfung von Nb u. Ta wurde die abgekühlte Schmelze mit W. behandelt, der ungel. Rückstand wurde in einer Pt-Schale mit HF (1:1) behandelt, die Lsg. auf 1—2 ccm eingedampft, abgekühlt, KCl -Lsg. zugesetzt u. Ta als K_2TaF_7 nachgewiesen. Nb wurde durch die Farbänderung durch Red. mit Zn oder Sn nachgewiesen. Zur Trennung von Ta u. Nb ist konz. H_2SO_4 viel geeigneter als HF . Konz. H_2SO_4 kann mit $\frac{1}{3}$ ihres Vol. mit W. verd. werden, ohne die lösende Wrkg. auf Nb zu verlieren; gegen Ta wird sie bei niederen Konz. etwas weniger aktiv. Eine vollständige Trennung von Ta u. Nb wird mit konz. H_2SO_4 erreicht, wenn die Schmelze zwischen 835 u. 875° aus-

geführt wird, dann befindet sich Nb in der Lsg., Ta im Rückstand. K. 6-n. H₂SO₄ hat keinen Einfluß auf die Nb-Lsg., in h. Lsg. erfolgt vollständige Ausfällung. Vi. gibt folgende Arbeitsvorschrift: Die abgekühlte M., die bei 835—875° geschm. worden war, wird mit W. ausgelaugt u. aus dem Tiegel entfernt, filtriert, der Rückstand durch Dekantation mit h. 3-n. HCl gewaschen u. so von Fe u. Mn befreit. (Die gewöhnliche verd. 6-n. HCl löst etwas Nb.) Der weiße Rückstand wird in einem Becherglas mit einem Gemisch von 1:1 H₂SO₄ auf dem Sandbad erhitzt, bis das Sieden aufhört. Dann wird das Gemisch durch ein Asbestfilter gesaugt, der Rückstand mit k. 6-n. H₂SO₄ gewaschen, bis die Waschfl. mit NH₄OH keinen Nd. mehr gibt. Auf diese Weise wird Nb vollständig gel., während Ta im Rückstand bleibt. — Wahrscheinlich werden bei der Pyrosulfatschmelze Tantalate u. Niobate gebildet u. nicht Sulfate oder Doppelsulfate. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 343—48. Reno [Nev.], Univ.) JOSEPHY.

Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Deutschland, *Glas- oder Quarzgefäße*. (F. P. **596 273** vom 4/4. 1925, ausg. 20/10. 1925. D. Prior. 5/4. 1924. — C. **1925**. I. 1113 [D. R. P. 407 021].) KÜHLING.

Hermann Weisz, Wien, *Taglichtfilter*. Man mischt mit molekulardispersen oder kolloidalen Lsgg. von Metallen oder Metallverb. gefärbtes, gepulvertes Glas oder dgl. mit einem Bindemittel (Canadabalsam o. dgl., Acetylcellulose, unschmelzbare Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodd. oder andere Emulsionskolloide oder leicht schmelzende Glasflüsse). (E. P. **215 752** vom 5/5. 1924, ausg. 9/7. 1924. Oe. Prior. 9/5. 1923.) KAUSCH.

Gesellschaft für Nautische Instrumente G. m. b. H., Kiel, *Verbrennungskammer für die Entdeckung von brennbarem Gas in der Atmosphäre u. dgl.* Die Kammer, in der durch elektr. erhitzte Fäden oder Drähte, elektr. Funken o. dgl. die Verbrennung explosiver Gasgemische erfolgt, besteht wenigstens z. T. aus sehr porösem Material, so daß einerseits der zur Explosion erforderliche Druck in der Kammer nicht entstehen kann, andererseits die Verbrennung nicht nach außen dringen kann. (E. P. **213 587** vom 26/3. 1924, ausg. 28/5. 1924. D. Prior. 26/3. 1923.) KAUSCH.

H. Angewandte Chemie.

IV. Wasser; Abwasser.

Henry C. Parker und **John R. Baylis**, *Mitteilungen über die Wasserstoffionenkonzentration von Trinkwasser*. Textliche u. bildliche Beschreibung eines mit Kalomelzellen u. Tungsten-Elektroden ausgestatteten App. zur dauernden, automat. Kontrolle des pH, der sich in den Montebellowerwerken von Baltimore bewährt hat. (Journ. Amer. Water Works Assoc. **15**. 22—34. Philadelphia, Pa., Research Department, LEEDS & NORTHRUP Co., sowie Baltimore, Md., Water Department.) SPLITTGERBER.

H. A. Lilly, *Sterilisation mit frisch hergestelltem Hypochlorit*. Das durch Einw. von freiem Cl₂ auf Lsgg. von kohlensauen oder ätzenden Alkalien entstehende Hypochlorit setzt sich unter Freimachung von O₂ zu Alkalichlorid um. In den Filtern der Stadt Badin genügte schon die Anwendung von 0,3 mg/l Cl₂ aus Hypochlorit, um die Keimzahl von ursprünglich 50 auf 0—2 herunterzusetzen. — Der App. wird unter Beigabe einer Skizze näher beschrieben. (Journ. Amer. Water Works Assoc. **15**. 60—61. Badin, N. C., Tallassee Power Co.) SPLITTGERBER.

Lucien Cavel, *Über den Stickstoffverlust bei Reinigung der Abwässer nach dem Verfahren der aktivierten Schlämme*. Man bestimmt die gesamte N-Menge in mit wenig Ammoniumsalz versetzten Abwässern, vermischt sie mit dem aktivierten Schlamm, leitet die Luft so lange durch, bis sie kein NH₃ mehr enthält u. bestimmt den von der Luft mitgerissenen u. im Gemisch gebliebenen N. Es stellt sich heraus, daß ein be-

trächtlicher Teil (bis über 40%) des N bei dieser Behandlung verschwindet. Vf. glaubt, daß er in der Form des freien N₂ entweicht. In der techn. Praxis ist der Verlust geringer, weil die Behandlung der Abwässer mit dem aktivierten Schlamm nicht so lange dauert. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1101—03. 1925.) BIKERMAN.

O. Haempel, Die Einwirkung von bei der Papierfabrikation verwendeten Farbstoffen auf die Tierwelt des Wassers. Verss. an den empfindlichen Formen: Gammarus pulex, Limnaea stagnalis u. Ovata, Planorbis, Ephemera sp., Tubifex, Trutta iridea, den weniger empfindlichen: Cyclops sp., Ostracoden, Simocephalus u. Chydorus, Culex u. Tendipeslarven, Goera, den widerstandsfähigen: Asellus aquaticus, Sialislarve. Verd. 1 : 10⁵ — 1 : 10⁶. Als unschädlich erwiesen sich die Farbstoffe: Baumwollrot 4B, Orange II, Neufuchsin 90, Safranin OF, Naphthamin RON, als schwach giftig: Auramin conc., Canarygelb 40, als stärker giftig: Methylviolett 34 B 80, als stark giftig: Viktoriablau B extra, Brillantgrün kryst., Benzolgrün EO. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **50**. 423—26. 1925. Wien, Hochsch. f. Bodenkultur.) GROSZFELD.

Karl Keiser, Vergleichende Untersuchungen über die Oxydierbarkeit des Wassers nach dem Verfahren von Kubel-Tiemann und die Bestimmung des Chlorbindungsvermögens. Der Einfluß der Rohwasserchlorung auf die Filtertätigkeit. Seitdem auch in Deutschland die Behandlung des für Wasserversorgungszwecke bestimmten Flußwassers mit Cl₂ sich einzubürgern beginnt, hat die möglichst genaue Best. der gesamten organ. Substanz des W. für die Praxis große Bedeutung gewonnen. Die Verss. des Vf. zeigen, daß die Werte für Oxydierbarkeit u. Chlorbindungsvermögen mit einander parallel gehen, solange es sich um W. handelt, in dem keine oder nur geringe Mengen von Eiweißzerfalls-Prod. enthalten sind. Bei derartigen WW. lassen sich beide Methoden gleich gut verwenden u. durch einander ersetzen. Anders liegen die Verhältnisse, wenn unter den organ. Substanzen des W. sich Zersetzungsprod. von Eiweißstoffen finden oder in ihnen nach Lage der Verhältnisse zu vermuten sind.

In diesem Falle gibt die Best. des Permanganatverbrauchs keinen genügenden Aufschluß über die organ. Verunreinigung eines W., da die in Frage kommenden Stoffe von Permanganat nicht angegriffen werden. Dagegen besitzen wir dann in der Ermittlung der Chlorzahl ein Verf., das ein zureichendes Bild von der Beschaffenheit eines W. u. eine Grundlage für die Bemessung der zur Desinfektion des W. bestimmten Cl₂-Menge zu geben vermag. — Es wurde ferner nachgewiesen, daß durch die Chlorierung des Rohwassers vor dem Filtern die Filtriertätigkeit beeinflußt werden kann, während die Oxydierbarkeit eines W. durch den Zusatz kleiner Mengen von freiem Cl₂ noch nicht verändert wird. (Gas- u. Wasserfach **69**. 41—43. 65—69. Hamburg, Hygien. Staatsinstitut.) SPLITTGERBER.

H. Noll, Bemerkungen zu dem Aufsatz von Gustav Alsterberg „Methoden zur Bestimmung von in Wasser gelöstem elementarem Sauerstoff bei Gegenwart von salpetriger Säure. Vf. widerlegt die Einwände von ALSTERBERG (Biochem. Ztschr. **159**. 36; C. 1925. II. 1084) gegen die Harnstoffmethode von LEHMANN u. NOLL u. gegen die Korrektionsmethode von WINKLER u. NOLL bei der Best. von in W. gel. elementarem Sauerstoff bei Ggw. von HNO₂. (Biochem. Ztschr. **165**. 497—99. 1925. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) LASCH.

Karl Schnetzer, Obersiedlitz b. Aussig a. E. (Tschechoslowakei), Verhütung des Kesselsteinansatzes in Dampfkesseln, Verdampfern, Vorwärmern u. dgl. Bei dem Verf. des Hauptpat. wird der Strom abwechselnd, von verschiedenen Anschlüssen aus, in verschiedenen Richtungen durch den Behälter geleitet. Es wird dadurch erreicht, daß die Wrkg. des Stromes längs der ganzen Behälterfläche erfolgt. (Schwz. P. **112752** vom 28/7. 1924, ausg. 16/11. 1925. Tschechoslow. Prior. 5/4. 1924. Zus. zu Schwz. P. 107069; C. 1925. I. 1517.) OELKER.

P. Preiss, Katernberg b. Essen, *Reinigen von Abfallflüssigkeiten*. — Zwecks Entfernung von Phenolen u. seinen Homologen aus Abwässern u. dgl. behandelt man diese im Gegenstrom mit geeigneten, in Dampfform befindlichen Lösungsmitteln, wie Bzl., Trichloräthylen u. dgl. (E. P. 241682 vom 19/9. 1924, ausg. 19/11. 1925.) OELKER.

V. Anorganische Industrie.

A. A. Blowski und **J. H. Bon**, *Entfärbungskohlen*. Vff. untersuchten eine Reihe bekannter Entfärbungskohlen auf ihre Brauchbarkeit mit dem Resultate, daß sie alle hohe Entfärbungskraft u. hohe Aschenabsorption ergaben. Zwei Proben zeigten schlechte Filtrationsfähigkeit. Weitere Verss. bezweckten den Ersatz von Knochenkohle durch andere Kohlen in der Zuckerraffination. Zurzeit verdient Knochenkohle noch den Vorzug, jedoch dürfte dieser bald von den anderen Kohlen eingeholt werden. (Ind. and Engin. Chem. 18. 32 — 42. Crockett [Calif.].) GRIMME.

A. C. Thaysen, *Die Bildung von Wasserstoff durch Mikroorganismen*. Die großgewerblich durchgeführte Vergärung der Kohlehydrate zu Butylalkohol liefert H_2 als Nebenprod. In einem üblichen Ansatz fallen z. B. auf 1 t Mais 343 cbm H_2 an, oder in einer kleineren Anlage mit 20 t verarbeitetem Mais pro Tag bereits 6860 cbm. (Chemistry and Ind. 45. 71—72.) HEIMANN.

Ture Robert Haglund, *Der Haglund-Prozeß zur elektrothermischen Herstellung von reinem Aluminiumoxyd*. Das Verf. von HAGLUND besteht im Zuschlag von 15—25% Al_2S_3 zum Bauxit, wodurch die Arbeitstemp. bedeutend verringert wird (F. von $Al_2S_3 = 1100^\circ$, von $Al_2O_3 = 2200^\circ$). Die Sulfid-Oxydschlacke ist sehr fl. u. läßt sich leicht abziehen. Außerdem krystallisiert aus ihr Al_2O_3 in tadellosen Krystallen. Die erkaltete Schlacke wird zerkleinert u. mit W. behandelt, wobei Al_2S_3 gemäß der Gleichung $Al_2S_3 + 6H_2O = 2Al(OH)_3 + 3H_2S$ zerfällt. H_2S wird aufgefangen u. zur Herst. von neuem Al_2S_3 verwandt. Das verbleibende Gemisch von krystallisiertem Al_2O_3 , $Al(OH)_3$ u. den geringen Verunreinigungen wird in geeigneten App. mechan. getrennt, das Al_2O_3 wird mit w. H_2SO_4 gewaschen u. getrocknet. $Al(OH)_3$ kann kalzinieren u. auf Al oder Al-Salze verarbeitet werden. — Die Herst. von Al_2S_3 geschieht im Sinne der Gleichung:



(Ind. and Engin. Chem. 18. 67—68. Stockholm [Schweden].)

GRIMME.

Tubize Artificial Silk Co of America, Delaware, übert. von: **Emile Bindschedler**, Lansdowne, Pennsylvan., und **Edward W. Rugeley**, Hopewell, Virginia, *Schwefelwasserstoffgas*. (A. P. 1 565 894 vom 15/4. 1924, ausg. 15/12. 1925. — C. 1925. II. 594.) KA.

Grasselli Chemical Co., Cleveland, Ohio, übert. von: **Henry Howard**, Cleveland, *Natriumthiosulfat*. Man läßt S im Status molekularer Unterteilung aus Na_2SO_3 einwirken. (A. P. 1 570 253 vom 13/1. 1925, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

H. Petersen, Berlin-Steglitz, *Schwefelsäure*. Man stellt H_2SO_4 aus SO_2 -Gasen u. Nitro- oder Nitrosyl- H_2SO_4 in SCHMIEDELS Walzenapp., KELLERS Sprühapp., Sprinklern usw. her. (E. P. 244 764 vom 11/12. 1925, Auszug veröff. 10/2. 1926. Prior. 16/12. 1924.) KAUSCH.

Merrimac Chemical Company, Woburn, übert. von: **Frank G. Stantial**, Melrose, und **John H. Clarke**, Winchester, Mass., *Schwefelsäure*. (Can. P. 246 420 vom 10/3. 1924, ausg. 27/1. 1925. — C. 1923. IV. 449.) KAUSCH.

American Lurgi Corporation, New York, übert. von: **Hans Klencke**, Frankfurt a. M., *Schwefelsäure*. (A. P. 1 561 985 vom 28/3. 1924, ausg. 17/11. 1925. — C. 1924. II. 1384 [D. R. P. 398 318].) KAUSCH.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelfstofaktieselskab, Christiania, übert. von: **Ivar Wafrid Cederberg**, Berlin-Steglitz, *Ammoniaksynthese*. (Can. P. 250 080 vom 27/9. 1924, ausg. 26/5. 1925. — C. 1925. I. 747.) KÜHLING.

Luigi Casale und **René Leprestre**, Rom, *Apparat zur Ammoniaksynthese*. (Schwz. P. 96 869 vom 1/12. 1920, ausg. 16/11. 1920. — C. 1924. I. 1250.) KAUSCH.

Pittsburgh Plate Glass Co., Pittsburgh, übert. von: **Hugh A. Galt**, Akron, Ohio, *Ammoniaksodaverfahren*. Man mischt rohes NH_3 , konz. NaCl -Lauge u. schwaches CO_2 -Gas, leitet dann starkes CO_2 in das Gemisch u. calciniert das dabei erhaltene NaHCO_3 . (A. P. 1 570 299 vom 1/5. 1922, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm, und **Henrik Gustav Allan Ramsay**, Linköping, Schweden, *Stickoxyde*. (Can. P. 249 391 vom 20/9. 1923, ausg. 5/5. 1925. — C. 1924. I. 1702 [H. G. A. RAMSAY].) KAUSCH.

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, N. Y., übert. von: **Pierre E. Haynes**, N. Y., *Helium aus Naturgas*. (Can. P. 245 587 vom 12/5. 1924, ausg. 23/12. 1924. — C. 1925. I. 2502.) KAUSCH.

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, übert. von: **C. Lourens**, *Adsorptions- und Entfärbungskohle*. (Schwed. P. 58 137 vom 17/11. 1922, ausg. 20/1. 1925. D. Prior. 26/5. 1922. — C. 1923. IV. 478 [J. N. A. SAUER].) KAUSCH.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelfstofaktieselskab, Christiania, übert. von: **Birger Fjeld Halvorsen**, **Oystein Ravner**, Christiania, und **Hans Joachim Falsk**, Notodden, Norwegen, *Tonerde aus Tonerdenitraten*. (Can. P. 251 775 vom 2/6. 1924, ausg. 14/7. 1925. — C. 1925. I. 1785 [F. P. 581 865].) KAUSCH.

American Lurgi Corporation, New York, übert. von: **Heinrich Specketer**, **Gustav Münch** und **Fritz Rossteutscher**, Griesheim a. M., *Aluminiumchlorid*. (Can. P. 244 933 vom 15/5. 1924, ausg. 2/12. 1924. — C. 1924. I. 1252 [Chem. Fabrik Griesheim-Elektron].) KAUSCH.

Samuel Marshall Evans, Essex Fells, N. J., *Bleioxyd*. PbSO_4 wird in fein verteiltem Zustande mit einer geringen Menge von fein verteiltem Pb gemischt u. die Mischung in der Lsg. einer Alkalibase gekocht. (A. P. 1 570 438 vom 5/3. 1923, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

Eagle Picher Lead Co., Cincinnati, übert. von: **John Ahlum Schaeffer**, St. Louis, **John Henry Calbeck** und **Bernard Sylvester White**, Joplin, V. St. A., *Basisches Bleisulfat*. (Can. P. 249 345 vom 18/6. 1924, ausg. 5/5. 1925. — C. 1925. II. 86.) KÜHLING.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

R. D. Rege, *Industrielle Abfälle als Düngemittel*: I. *Ajowan- und Mohuakuchen*. II. *Nutzbarmachung von Kehrriht*. I. Die analyt. Unters. ergibt, daß Ajowan- u. Mohuakuchen als Düngemittel brauchbar ist, daß dagegen Mohnkuchen wegen seines Saponingehalts, der die Nitratbildung verhindert, nicht in Frage kommt. — II. Die Zers. des Kehrrihts unter verschiedenen Bedingungen wird analyt. verfolgt, ohne daß vorläufig Schlüsse für die prakt. Anwendung des Kehrrihts gezogen werden können. (Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 245—65. 1925. Ind. Inst. of Sc. Bangalore.) TRÉNEL.

Horace J. Harper, *Der Ammoniakgehalt des Bodens in seiner Beziehung zum Gesamt-Stickstoff, Nitratgehalt und Bodenreaktion*. Zwischen dem Ammoniakgehalt einerseits u. dem Gesamt-N., Nitratgehalt u. der Bodenrk. andererseits konnte keine Beziehung nachgewiesen werden. (Journ. Agricult. Research. 31. 549—53. 1925. Jowa, Agric. Exp. Stat.) TRÉNEL.

J. T. Scott, *Der Einfluß der H^+ -Ionenkonzentration auf das Wachstum der Fusarium lycopersici und auf Tomatenfäule*. Zum Zwecke der Bekämpfung von Tomatenfäule durch Fusarii studiert Vf. die Abhängigkeit des Wachstums von der $[\text{H}^+]$ der

Nährsg. in Reinkulturen u. von der Rk. des Bodens, in dem die mit *Fusarium lycopersici* infizierten Tomaten aufgezogen wurden. 1. Bei den Kulturverss. wurde ein Minimum zwischen pH 5,3 bis 5,8 beobachtet, das beiderseits — bei pH 4,5 bis 5,3 und pH 5,85 bis 6,85 — durch Maxima begrenzt wird. 2. Die Vegetationsverss. ergaben jedoch das Minimum der Tomatenfäule bei einer Bodenrk. von pH 6,4 bis 7,0, das auch hier beiderseits von Maxima eingeschlossen wird. Vf. glaubt danach, die Tomatenfäule durch entsprechende Auswahl des Bodens hinsichtlich seiner pH bekämpfen zu können. (BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. **54**. 533—34. 1925. Exp. Stat. Rec. **51**. 51. 1924.)

TRÉNEL.

S. B. Hendricks, A. M. Bacot und H. C. Young, *Die relative Giftigkeit von Calciumarsenaten*. Die mit Heuschrecken u. Baumwollrüsselkäfern ausgeführten Verss. ergaben, daß im ersteren Falle die Giftigkeit mit dem CaO-Gehalte im Molekül abnimmt, wobei künstlicher Zusatz von Ca(OH)₂ ohne Einfluß war. Im zweiten Falle erwiesen sich alle sauren Arsenate giftiger als die bas., welche unbeschadet des Verhältnisses CaO : As₂O₅ im Molekül von gleicher Wrkg. waren. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 50—51. Tallulah [La.].)

GRIMME.

E. R. de Ong, *Kaliumxanthogenat als Bodenröucherungsmittel*. Kaliumxanthogenat spaltet in saurem Medium Xanthogensäure ab, welche bei mäßiger Temp. in CS₂ u. A. zerfällt. Natriumxanthogenat verhält sich ähnlich. Diese Eigenschaften machen die Verbb. äußerst brauchbar zur CS₂-Behandlung von verseuchten Ackerböden, da man die Gaben besser dosieren u. verteilen kann, ohne Gefahr zu laufen, die Kulturpflanzen zu schädigen. Näheres im Original. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 52—55. Berkeley [Calif.].)

GRIMME.

J. Bodnár und Alexander Terényi, *Beiträge zur Biochemie der Wirkung von Quecksilberverbindungen auf die Steinbrandsporen des Weizens*. Vorl. Mitt. (Vgl. auch S. 770.) Die Verss. ergaben, daß eine in W. dissoziierende Hg-Verb. [Hg(C₂H₃O₂)₂] wie Cu-Verbb. keimungshindernd wirkt. Von den schwach dissoziierenden, einfachen anorgan. Hg-Verbb. haben die Lipoidverbb. HgCl₂, HgBr₂ eine tötende Wrkg. auf Sporen. Hg(CN)₂ ist wirkungslos, weil es nicht dissoziiert u. kein Lipoid ist. Als kleinste, Sporenkeimung verhindernde Menge in 10 ccm Ca(NO₃)₂-Nährsg. bestimmten Vff.: Hg(CN)₂: 0,79; Hg-Acetat: 0,32; HgCl₂: 0,22; HgBr₂: 0,11 mg. Auch im günstigsten Falle ist mehr Hg nötig als Cu. (Chem.-Ztg. **50**. 109—10. Budapest u. Debrecen, Univ.).

JUNG.

R. N. Chapman und A. H. Johnson, *Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen von Chlorpikrin als ein Begasungsmittel bei Cerealien*. Chlorpikrin ist ein starkes Insektengift; die tödliche Dosis für plodia interpunctella Huebn. war 32 g pro cbm. Da Chlorpikrin die Gärung im Mehl verzögert, muß so behandeltes Mehl genügend gelüftet werden, wodurch es vollständig vom Chlorpikrin befreit wird. (Journ. Agricult. Research. **31**. 745—60. 1925. Minnesota, Agric. Exp. Stat.)

TRÉNEL.

Theodore Parker, *Arsenhaltige und arsenfreie Insektenbekämpfungsmittel*. Die „Äpfelpanik“ und ihre Lehren. Anlässlich der Vergiftungen, die durch Genuß von Äpfeln, die mit arsenhaltigen Insektenbekämpfungsmitteln behandelt waren, in London vorgekommen sind, bespricht Vf. die Anwendung von arsenfreien Mitteln, die den Entomologen in Phenol- u. Phenanthrenderivv. zur Verfügung stehen. (Chem. Trade Journ. **78**. 251—53.)

TRÉNEL.

W. Deckert, *Befall von Tabak mit Speckkäfern (Dermestes vulpinus F.)*. Die Käfer waren von außen her in die Ballen gelangt. Die restlose Vernichtung ohne Schaden für den Tabak gelang mittels Durchgasung mit 2%ig. HCN. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **50**. 426. 1925. Hamburg.)

GROSZELD.

J. B. Lindsey und J. G. Archibald, *Der Wert von Calciumphosphat als Futterzusatz für Milchkühe*. Vorl. Mitt. Der Einfluß von Ca-Phosphat auf Aussehen, Gesundheitszustand, Körpergewicht, Milchproduktion, Zusammensetzung der Milch

prägte sich nicht deutlich aus. (Journ. Agricult. Research. **31**. 771—91. 1925. Massachusetts Agric. Exp. Stat.)

TRÉNEL.

J. Hudig und C. W. G. Hettersch, *Ein Verfahren zur Bestimmung des Kalkzustandes in Humus-Sandböden. (Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in Bodenauflösungswässern.)* Beschreibung einer Apparatur zur elektrometr. Titration von Böden mittels der Chinhydronelektrode. (Landw. Jahrb. **63**. 207—18.) TRÉNEL.

E. W. Bobko und D. L. Askinasi, *Bestimmung der Absorptionskapazität und des Ungesättigtheitsgrades der Böden.* (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. Abt. A. **6**. 99—126. 1925. — C. **1926**. I. 2045.)

TRÉNEL.

Br. Tacke und Th. Arnd, *Studien über die Acidität der Moorböden. 1. Die Bestimmung der Gesamtsäure nach Tacke-Süchting.* Aus dem Vergleich mit anderen Methoden zur Best. der Acidität von Moorböden schließen Vff., daß ihr eigenes Verf. das beste zur Best. der „Gesamtsäure“ ist. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung [Abt. A.]. **6**. 295—306.)

TRÉNEL.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaestofaktieselskab, Christiania, übert. von: **Peter Tomy Axelsen**, Rjukan, Norwegen, *Düngemittel.* (A. P. **1567 408** vom 14/1. 1924, ausg. 29/12. 1925. — C. **1924**. I. 2535.)

KÜHLING.

American Cyanamid Company, New York, übert. von: **Kennet F. Cooper**, Great Neck, New York, V. St. A., *Verfahren zum Vernichten von Ungeziefer aller Art.* Man verwendet hierzu eine an feuchter Luft gasförmige HCN entwickelnde Verb. in Pulver-, Flocken- oder Blättchenform, die in die Insektennester oder Mäuselöcher usw. eingebracht wird oder mit der die zu schützenden Pflanzenteile bestäubt werden. — Besonders eignet sich hierzu rohes $\text{Ca}(\text{CN})_2$, das an feuchter Luft allmählich unter B. von gasförmiger HCN u. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ bzw. CaCO_3 zers. wird. Gegebenenfalls kann man auch Mischungen von CaCl_2 u. NaCN an Stelle des $\text{Ca}(\text{CN})_2$ verwenden. (Can. P. **251 951** vom 28/7. 1924, ausg. 21/7. 1925. F. P. **581 278** vom 5/5. 1924, ausg. 26/11. 1924.) SCH.

Harry C. Young, St. Louis, Missouri, übert. von: **Walter C. O'Kane**, Durham, New Hampshire, und **Paul Moore**, Washington, Columbia, V. St. A., *Schwefel in kolloidaler Form enthaltendes fungicides und insekticides Mittel.* (Can. P. **249 162** vom 12/6. 1923, ausg. 28/4. 1925. — C. **1925**. I. 1006.)

SCHOTTLÄNDER.

California Spray-Chemical Company, Watsonville, California, V. St. A., *Insekticides Mittel*, bestehend aus wss. Emulsionen gereinigter Petroleum-KW-stoffe u. einem flüchtigen organ. Lösungsm., mit oder ohne Zusatz anderer insekticider Mittel. — Man reinigt Petroleumdestillate in üblicher Weise durch Dest., Behandeln mit rauchender H_2SO_4 , Neutralisieren der Säure, Wasserdampfdest. u. Filtrieren. Das Prod., ein farbloses, durchsichtiges bei gewöhnlicher Temp. geruchloses u. nicht flüchtiges Öl, D. 0,8917 bis 0,8092 (27—43° Be.), ist frei von ungesätt. KW-stoffen u. S, u. nicht viscos. Man verwendet es entweder für sich als *Spritzmittel* für die Pflanzen, oder emulgiert es mit W., unter Zusatz von Schutzkolloiden, wie Sulfitecelluloseablauge, Stärkekugummi oder Dextrin, u. flüchtigen Verdünnungsmitteln, wie gereinigtem Petroleum, das noch ungesätt. KW-stoffe enthält. Gegebenenfalls setzt man der Emulsion noch eine wss. Suspension von $\text{Pb}_3(\text{AsO}_4)_2$ zu. Die Emulsion wird ebenfalls als *Spritzmittel* verwendet. Schädliche Nebenwrrkgg. auf die Pflanzen üben die Mittel nicht aus. (E. P. **245 179** vom 18/8. 1924, ausg. 28/1. 1926. F. P. **586 567** vom 8/9. 1924, ausg. 30/5. 1925.) SCH.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

V. Kulebakin und W. Wolkow, *Über die Quer- und Axialmagnetisierung der Eisenstäbe.* Die Permeabilität hat in Eisentelegraphendrähten bei Quermagnetisierung einen 2—5mal kleineren Wert als durch die gewöhnlichen die Methoden bei Axialmagnetisierung bestimmt wird. Es wird eine Methode zur genauen Best. der magnet. Eigenschaften von Eisendrähten unter den im Betrieb vorhandenen Magnetisierungs-

bedingungen, bei Stromdurchfluß, also Quermagnetisierung, beschrieben. (Elektrotechn. Ztschr. 47. 126—29. Staatl. Elektrotechn. Experimental-Institut, Moskau.) Wl.

—, *Eine Legierung von großer Permeabilität und geringer Hysteresis*. Von der Guttapercha Company of Wharf Road, City Road, London wird neuerdings eine Legierung von Ni, Cu u. Fe unter dem Namen „*Mumetal*“ in den Handel gebracht. Diese Legierung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 1. große magnet. Permeabilität auch bei kleinen Feldstärken. 2. großen spezif. Widerstand. 3. durch außerordentlich geringen Hysteresisverlust. Die Legierung ist dem weichen Fe in allen Eigenschaften überlegen mit Ausnahme ihres geringen Sättigungswertes der magnet. Induktion. (Journ. Scient. Instruments 3. 24—25. 1925.) STEINER.

Minerals Separation Ltd., London, übert. von: **Cornelius Herman Keller** und **Carl Pierce Lewis**, San Francisco, *Konzentration von Erzen durch Flotation*. (E. P. 223 860 vom 6/5. 1924, ausg. 17/12. 1924. A. Prior. 23/10. 1923. — C. 1926. I. 1279 [A. P. 1 560 170].) OELKER.

Alois Helfenstein und **Helfenstein-Elektro-Ofen G. m. b. H.**, Österreich, *Ausführung chemischer, besonders metallurgischer Verfahren*. (F. P. 597 837 vom 24/3. 1925, ausg. 30/11. 1925. Oe. Prior. 24/3. 1924. — C. 1925. II. 592 [Schwz. P. 109 529].) KÜHLING.

J. G. Platon, Nièvre, Frankreich, *Entschwefeln von Eisen*. Das geschmolzene Fe wird mit Strömen von Luft oder inertem Gas behandelt, welche dicht unter der Oberfläche in das Metallbad eingeblasen werden. (E. P. 245 083 vom 3/12. 1925. Auszug veröff. 17/2. 1926. Prior. 27/12. 1924.) KÜHLING.

Chicago Crucible Co., übert. von: **David H. Crosser**, Chicago, *Behandlung von Eisen*. Um Cr, Al, Mn, Si o. dgl. gleichmäßig mit Fe zu legieren, werden die Elemente, gegebenenfalls in Form von Ferrochrom, Ferromangan u. dgl. gepulvert, mit Ton gemischt, die Mischungen zu Briquets geformt u. in das geschmolzene Fe eingetragen. (A. P. 1 568 271 vom 29/8. 1924, ausg. 5/1. 1926.) KÜHLING.

Heinrich Lanz, übert. von: **Karl Sipp**, Mannheim, *Graues Gußeisen*. (A. P. 1 564 284 vom 15/5. 1924, ausg. 8/12. 1925. — C. 1925. I. 2467.) KÜHLING.

Isaac M. Scott und **Samuel Peacock**, Wheeling, V. St. A., *Entphosphorn von Eisen und Stahl*. Dem im offenen Herd mit bas. Futter geschmolzenen Fe oder Stahl wird eine sauerstoffhaltige Chromverb., zweckmäßig ein chromhaltiges Eisenerz, zugefügt. Das Cr wird durch den Luft-O₂ zu Chromat oxydiert, welches seinerseits unter Mitwirkung von CaO den vorhandenen P in Ca₃(PO₄)₂ verwandelt. Die Entphosphorung schreitet weiter fort als die von Mn bewirkte. In der Schlacke vorhandenes CaCrO₄ kann durch Verschmelzen mit Na₂SO₄ als Na₂CrO₄ gewonnen werden. (A. P. 1 568 186 vom 7/3. 1925, ausg. 5/1. 1926.) KÜHLING.

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., übert. von **Guernsey H. Cole**, Forest Hills Borough, *Hitzebehandlung von Stahl*. Die zu behandelnden Stahlstücke werden in langsamem Zeitmaß auf Wagen durch lange Öfen bewegt, wobei für mäßigen Zutritt von O₂ (Luft) u. dafür gesorgt wird, daß die Erhitzung des Stahls 700° nicht übersteigt. Die elektr. Eigenschaften des Stahls werden durch diese Behandlung wesentlich verbessert. (A. P. 1 569 355 vom 21/12. 1920, ausg. 12/1. 1926.) KÜHLING.

Samuel Peacock und **Nelson E. Cook**, Wheeling, V. St. A., *Entgasen von Stahl*. Geschmolzener Stahl wird mit wasserfreien Natriumaluminaten oder -silicaten, besonders Na₃AlO₃, versetzt. Der Zusatz bewirkt die Verflüchtigung von gel. bzw. gebundenem CO, N₂ u. H₂, sowie die Red. von vorhandenem FeO. (A. P. 1 570 176 vom 3/3. 1925, ausg. 19/1. 1926.) KÜHLING.

Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, übert. von: **Öystein Ravner**, Kristiania, *Verdichten von Zinkdämpfen*. (A. P. 1 562 473 vom 7/3. 1921, ausg. 24/11. 1925. — C. 1922. II. 697.) KÜHLING.

Goro Matsukata, Tokyo, Japan, übert. von: **James W. Neill**, Pasadena, V. St. A., *Gewinnung von Kupfer*. Mittels Säuren aus Erzen gewonnene kupferhaltige Lsgg. werden über Koks o. dgl. filtriert, welcher Fe in feiner Verteilung enthält. Das in metall. Form auf dem Koks niedergeschlagene Cu wird im Kuppelofen unter Zuschlag von Flußmitteln ausgeschmolzen u. gegossen. (A. P. 1 568 464 vom 20/4. 1925, ausg. 5/1. 1926.) KÜHLING.

National Trust Co. Ltd., Toronto, übert. von: **Robert Lee Peek**, Ottawa und **Torgny Frederick Torell**, Aylmer, Kanada, *Aufarbeitung kupferhaltiger Nickelsteine*. Durch Einw. von Säure, besonders H₂SO₄, aus den Steinen erhaltene, Salze des Cu u. Ni enthaltende Lsgg. werden mit den ausgelaugten Steinen im Überschuß behandelt. Cu wird in metall. Form niedergeschlagen u. durch Ni ersetzt. Die erhaltenen Lsgg. dienen zur Herst. von Reinnickel. (A. P. 1 569 137 vom 26/8. 1920, ausg. 12/1. 1926.) KÜHLING.

Gustav Schreiber, Griesheim a. Main, und **Adolf Beck**, Schwanheim a. Main, *Behandlung von geschmolzenem Magnesium*. (Can. P. 249 945 vom 11/6. 1924, ausg. 26/5. 1925. — C. 1924. II. 755 [D. R. P. 387 979].) KÜHLING.

Julius Züblin und **Rudolf Gautschi**, Singen, Deutschland, *Herstellung von Aluminiumfolien*. Vor dem Mehrfachwalzen werden die Walzen des Streckwerkes in beliebiger Weise, z. B. mittels elektr. Widerstände, auf eine Temp. von 60—90° erhitzt, wobei das zum Einfetten benutzte Öl verdampft. (Schwz. P. 113 204 vom 26/3. 1925, ausg. 2/1. 1926.) KÜHLING.

Western Electric Co., Inc., New York, übert. von: **Edwin F. Kingsbury**, Rutherford, V. St. A., *Legierungen*. (A. P. 1 561 247 vom 7/9. 1923, ausg. 10/11. 1925. — C. 1925. I. 2467.) KÜHLING.

Isabellenhütte G. m. b. H., übert. von: **Friedrich Heusler**, Dillenburg, *Behandlung von Kupferlegierungen*. (A. P. 1 559 963 vom 29/8. 1921, ausg. 3/11. 1925. — C. 1921. IV. 801.) KÜHLING.

Orkla Grube-Aktiebolag, Lokken Verk, übert. von: **Harald Pedersen**, Trondhjem, Norwegen, *Behandlung von Kupfereisenlegierungen*. (A. P. 1 562 472 vom 16/4. 1924, ausg. 24/11. 1925. — C. 1925. II. 2187.) KÜHLING.

Emile Conti, Alfortville, übert. von: **Charles Alexandre Fontane**, Paris, *Legierungen*. (A. P. 1 563 079 vom 2/2. 1924, ausg. 24/11. 1925. — C. 1925. I. 2726 [Schwz. P. 107 906].) KÜHLING.

W. C. Heraeus G. m. b. H., übert. von: **Ernst Haagn**, Hanau, *Legierungen*. (A. P. 1 566 534 vom 21/8. 1924, ausg. 22/12. 1925. — C. 1925. II. 348 [D. R. P. 412 135].) KÜHLING.

Goldsmith Bros. Smelting & Refining Co., übert. von: **Melvin M. Goldsmith**, Chicago, V. St. A., *Legierungen*, bestehend aus 65—85% Os, 10—20% Rh u. 3—10% Ni. Die Legierungen eignen sich zur Herst. von Federspitzen. (A. P. 1 569 921 vom 16/11. 1923, ausg. 19/1. 1926.) KÜHLING.

James J. Mee, Hamilton, V. St. A., *Legierungen*, bestehend aus W, V, Cr, C, S, Cu, Fe u. gegebenenfalls Ir, bezw. W, Mo, V, Cr, Co, Cu, C u. Fe. Die Legierungen sind gegen oxydierende Einflüsse sehr beständig u. sehr bruchfest. Hauptbestandteil ist W, erhalten werden sie durch Zusammenschmelzen der Bestandteile. (A. P. 1 569 996 vom 6/2. 1925, ausg. 19/1. 1926.) KÜHLING.

Merco Nordstrom Valve Co., San Francisco, übert. von: **Ernest Greenway Jarvis**, Buffalo, V. St. A., *Legierungen*. (Can. P. 249 608 vom 11/6. 1924, ausg. 12/5. 1925. — C. 1925. II. 985.) KÜHLING.

Soc. an. Nieuport-Astra, Issy-les-Moulineaux, Frankreich, *Legierungen*. (Schwz. P. 112834 vom 5/1. 1925, ausg. 1/12. 1925. F. Prior. 23/1. 1924. — C. 1925. I. 1239 [F. P. 576 225].) KÜHLING.

Henri Paul Soulié-Cottineau und **Jean François Paul Bernard**, Frankreich, *Wiedergewinnen von Metallen aus Abfällen*. (F. P. 597 091 vom 7/3. 1924, ausg. 12/11. 1925. — C. 1925. II. 984 [E. P. 230 471].) KÜHLING.

F. M. Becket, New York, *Behandeln von Metallbädern*. (E. P. 237 088 vom 9/7. 1924, ausg. 14/8. 1925. — C. 1925. I. 2725 [E. P. 583 511].) KÜHLING.

Pittsburgh Research Corp., Pittsburgh, übert. von: **Joseph L. Dixon**, New York, *Metallreinigung*. Bei der Reinigung von Metallen im elektr. Ofen wird eine Mehrzahl von Elektroden verwendet. Einigen von diesen wird Strom von niedriger, anderen Strom von höherer Spannung zugeführt. Es werden gleichmäßigere Ergebnisse erzielt als bei Verwendung von Strom gleicher Spannung. (A. P. 1 569 464 vom 5/9. 1919, ausg. 12/1. 1926.) KÜHLING.

IX. Organische Präparate.

Kenneth K. Kelley, *Thermodynamische Erwägungen über den synthetischen Methanolprozeß*. Auf Grund theoret. Erwägungen u. prakt. Verss. kommt Vf. zu dem Resultate, daß das Optimum der Methanolsynthese bei 600—900° u. 150 at Gesamtdruck liegt. (Ind. and Engin. Chem. 18. 78. Stanford [Calif.]) GRIMME.

A. B. Lorges, *Die Herstellung der Benzoesäure*. Zusammenfassende Darst. (Rev. de chimie ind. 35. 10—14.) JUNG.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., übert. von: **Mathias Pier**, Heidelberg, und **Carl Müller**, Mannheim, *Darstellung von Methanol*. Man läßt auf Gemische von CO mit einer überwiegenden Menge von H₂ bei höherem Druck u. höherer Temp. Kontaktmassen einwirken, die bei den Arbeitsbedingungen nicht zu Metall reduzierbare O₂-Verbb. von Metallen enthalten. — Als Kontaktmassen können auch Gemische von nicht reduzierbaren Oxyden mit einem Metall verwendet werden. — Solche Verbb. sind z. B. Oxyde, Hydroxyde oder Carbonate der Alkali-, Erdalkali- u. Erdmetalle, ferner Gemische von MgO oder Al₂O₃ mit den Oxyden des Pb, Bi, Tl, Zn, Cd, Cu, Sn, Sb, Si, B, Ti, Fe, Ni u. Co dürfen höchstens nur in geringen Mengen vorhanden sein, da sie leicht zur B. von CH₄ oder anderen KW-stoffen führen. Die in den Kontaktofen eingefüllten Katalysatoren werden in körniger oder stückiger Form angewendet. Die innige Mischung verschiedener Katalysatoren erfolgt durch gemeinsame Fällung oder Schmelzung oder Verrühren des einen Stoffes in der Lsg. oder Schmelze des anderen. Ferner kann man Träger, wie Asbest, benutzen. Das CO kann auch während der Rk. durch Einw. von H₂ auf CO₂ erzeugt werden, so daß es in dem ursprünglichen Gasgemisch teilweise oder ganz durch CO₂ ersetzt sein kann. Ferner kann dieses H₂-reiche KW-stoffe, wie CH₄, N₂ u. dergleichen enthalten. Die innezuhaltenden Temp. liegen zwischen 300 u. 600°, bei besonders akt. Massen auch unter 300°. Der Druck wird zweckmäßig über 50 at. gehalten. Der entstandene CH₃OH, der auch andere O₂-haltige organ. Verbb. enthalten kann, wird ohne Aufhebung des Druckes durch Kühlung, z. B. in mit Raschigringen gefüllten Türmen, oder durch Waschung mit W. oder anderen Fl. abgeschieden. Folgende Beispiele sind angegeben: Ein 75 Teile H₂ u. 25 Teile CO enthaltendes Gasgemisch wird unter 500—1000 at. Druck bei 550° über Kalikalk oder ein Gemisch gleicher Teile KOH u. Al₂O₃ geleitet. Das austretende Gasgemisch scheidet beim Abkühlen unter Druck eine aus CH₃OH, neben geringen Mengen anderer Alkohole u. oft etwas W., jedoch keine öligen Beimengungen enthaltende Fl. ab. — Beim Strömen eines 22% CO, 3% CO₂, 71% H₂ u. 4% N₂ enthaltenden Gasgemisches unter 180 at. Druck bei 520° über MgCrO₄ oder eine gekörnte Mischung von PbO u. Al₂O₃ mit etwas KOH scheiden sich beim Abkühlen reichliche Mengen von Alkoholen, besonders CH₃OH, ab. — CH₃OH als Hauptprod. entsteht auch beim Überleiten eines Gemenges von 20% CO, 3% CO₂, 4% CH₄ u. C₂H₆, 70% H₂ u. 3% N₂ unter 800 at. Druck bei 350 bis 400° über MgO oder ZnO u. KOH oder RbOH bezw. deren Carbonate. — Gute Aus-

beuten an CH_3OH erhält man ferner beim Überleiten eines Gasgemenges von 90 Teilen H_2 u. 10 Teilen CO über ein inniges Gemisch von Cu u. Al_2O_3 , durch Anzünden einer Mischung von CuO u. Al -Pulver an der Luft oder in indifferenten Atmosphäre gewonnen. — Als Katalysatoren lassen sich auch Gemische von K -, Cs - oder Rb -Verbb. mit $z. B.$ den Oxyden des U , Al , Cr , Mn , Ce , La , Th , Zr oder Y , ferner Gemische oder Verbb. von ZnO mit CuO , Al_2O_3 , BaO , seltenen Erden, Cr_2O_3 , MgO , Mo -Oxyd, Mn_2O_3 , Ta -Oxyd, Ti -Oxyd, Vanadinsäure, W -Oxyd, oder Sb -Oxyde mit BeO , oder Th -Oxyd-haltige W -Fäden oder metall. Mo oder Tl mit Al_2O_3 -Gehalt verwenden. Ein gut wirksamer Katalysator entsteht schließlich beim Eintragen von ZnO , Mn_2O_3 oder den Oxyden des Tl , Ce , U , Th , Zr , in geschmolzenes $K_2Cr_2O_7$, weiterem Erhitzen, Ausgießen auf Metallbleche, Zerkleinern, gegebenenfalls Auslaugen des KOH mit W . oder Red . (**Can. P. 251 483** vom 7/11. 1923, ausg. 7/7. 1925. **E. P. 229 714** vom 23/8. 1923, ausg. 26/3. 1925. **F. P. 571 354** vom 1/10. 1923, ausg. 16/5. 1924. **D. Priorr. 22/2. u. 19/3. 1923. Oe. P. 101 331** vom 26/9. 1923, ausg. 26/10. 1925. **D. Priorr. 22/2. u. 19/3. 1923. Schwz. P. 107 200** vom 26/9. 1925, ausg. 16/10. 1924. **D. Priorr. 22/2. u. 19/3. 1923.**)

SCHOTTLÄNDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., übert. von: **Mathias Pier**, Heidelberg, **Martin Müller-Cunradi**, **Gustav Wietzel** und **Karl Winkler**, Ludwigshafen a. Rh., *Katalytische Darstellung eines Methylalkohol enthaltenden Produktes aus Oxyden des Kohlenstoffes*. Gemische von CO oder CO_2 u. H_2 werden bei höheren Tempp. u. Drucken mit geeigneten Katalysatoren behandelt. Die zur Umsetzung dienenden Gasgemische müssen nicht nur von den gewöhnlichen Kontaktgiften, sondern auch von den flüchtigen Fe -Verbb. vollständig befreit sein. — Der Reinigung der Gase geht zweckmäßig eine Behandlung mit Dampf in Ggw. von Kontaktmassen voraus. — Das Verf. ermöglicht die Verwendung der verschiedensten techn. Gase. Zweckmäßig soll in ihnen der Gehalt an H_2 den an CO überwiegen. Man kann *z. B.* Wassergas mit 40% CO , 55% H_2 , 4% N_2 u. 1% KW -stoffen, oder *Kohlendestillationsgase*, wie *Leuchtgas*, *Kokereigas*, *Tieftemperaturgas* oder Gemische, denen man gegebenenfalls fehlende Bestandteile, wie H_2 oder CO zusetzen oder überschüssige Mengen daraus entfernen kann, bis die gewünschte Zus., *z. B.* auf 1 Vol. CO 3—4 Voll. H_2 , erreicht ist. Nachdem die Hauptmenge der Verunreinigungen sowie ungesätt. u. arom. KW -stoffe in üblicher Weise abgeschieden sind, läßt man COS u. andere organ. S -Verbb. durch akt. Kohle absorbieren oder zers. sie mit Natron- oder Kalikalk. Ferner kann man die Gase in der Hitze über eine alkal. M . oder mit Wasserdampf gemischt über einen zur teilweisen Umsetzung des CO mit W -Dampf zu CO_2 u. H_2 geeigneten Katalysator leiten, wobei die organ. S -Verbb. unter B . von leicht entfernbarem H_2S zers. werden. Zur völligen Befreiung der Gase von Fe -Carbonyl leitet man sie durch eine Schicht einer für Fe -Carbonyl besonders aufnahmefähigen akt. Kohle oder führt sie in der Hitze über eine Cu -haltige M . oder einen Vorkontakt u. entfernt den gegebenenfalls entstandenen Fe -Nebel durch Filter. Die Reinigung des Gasgemisches kann unter gewöhnlichem Druck oder nach erfolgter Kompression bewirkt werden. Die verwendeten Katalysatoren werden ebenfalls zweckmäßig von S u. anderen schädlichen Bestandteilen frei gehalten, wenngleich bei einem Gehalt der Katalysatoren an starken Basen oder solche bildenden Elementen geringe Mengen S , Cl_2 , P , As , meist nicht oder nur wenig schädlich wirken. Zwecks Verhinderung erneuter Verunreinigung der gereinigten Gase durch flüchtige Fe -Verbb. überzieht man den Reaktionsraum sowie metall. Teile in ihm mit gegen CO widerstandsfähigen Stoffen, wie Cu . Als Hauptprod. entsteht bei dem Verf. CH_3OH neben anderen O_2 -haltigen organ. Verbb. (**Can. P. 251 485** vom 7/11. 1923, ausg. 7/7. 1925. **E. P. 228 959** vom 23/8. 1923, ausg. 12/3. 1925. **F. P. 571 285** vom 29/9. 1923, ausg. 14/5. 1924. **D. Priorr. 5/4. u. 11/4. 1923. Schwz. P. 107 391** vom 26/9. 1923, ausg. 16/10. 1924. **D. Prior. 5/4. 1923.**)

SCHOTTLÄNDER.

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, übert. von: **Carnie B. Carter** und **Albert E. Coxe**, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von Alkoholen*. Monohalogenierte KW-stoffe werden mit Alkalihydroxyden oder -carbonaten, bezw. Erdalkalihydroxyden, W. u. geringen Mengen eines Alkohols auf ca. 100° unter Druck u. unter zeitweiser Entfernung von Alkohol aus dem Reaktionsgemisch, derart, daß die Konz. des Alkohols in der Mischung unterhalb 20% liegt, erhitzt. — Die gleichzeitige B. von Äthern wird so wesentlich zurückgedrängt. Z. B. wird CH_3Cl mit einer Lsg. von NaOH in 5%ig. CH_3OH 1 Stde. unter Druck auf 100° erhitzt. Beträgt der Gehalt an CH_3OH in der Lsg. 10—15%, so wird abdest. u. das Gemisch von CH_3OH u. *Dimethyläther* in üblicher Weise fraktioniert. (**A. P. 1 566 818** vom 28/8. 1922, ausg. 22/12. 1925.) SCH.

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, übert. von: **Carnie B. Carter**, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von Methylal*. Man läßt ein Gemisch von CH_3Cl_2 , CH_3OH u. Alkalihydroxyd bei Temp. oberhalb 60° aufeinander einwirken. — Z. B. werden CH_3OH , NaOH u. CH_2Cl_2 ca. 40 Min. unter Druck auf 100—125° erhitzt, worauf man das in einer Ausbeute von ca. 85% entstandene *Methylal* $\text{CH}_2(\text{OCH}_3)_2$ in geeigneter Weise aus dem Reaktionsgefäß entfernt. (**A. P. 1 566 819** vom 26/7. 1924, ausg. 22/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Elektrizitätswerk Lonza, Basel, Schweiz, *Herstellung von Metaldehyd*. Man behandelt *Acetaldehyd* mit solchen Katalysatoren, die bei Verwendung des Metaldehyds zu Brennstoffzwecken restlos verflüchtigt werden oder auf den Metaldehyd in der Kälte keine schädliche Wrkg. ausüben. — Solche Katalysatoren sind Salze organ. Basen mit starken Säuren, O_2 -haltige organ. Verbb., die mit Halogenwasserstoffsäuren Oxoniumsalze liefern, Ammoniumsalze oder andere anorgan. Derivv. des NH_3 , wie z. B. NH_4Br , Hydrazinchlorhydrat, Pyridinbromhydrat, Harnstoffchlorhydrat, Diphenylthioharnstoffbromhydrat, Halogenhydrate von Alkylaminen u. des $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$, Pyridinperbromid, Tetraäthylammoniumtrichlorid, tribromessigsäures Chinolin, das Chlorhydrat des Anisaldehyds, das Bromhydrat des Benzalacetophenons, Thiophen, Salze des Hydroxylamins oder der Nitritotrisulfosäure mit starken Säuren. Zweckmäßig verwendet man den CH_3CHO u. die Katalysatoren in wasserfreiem Zustand u. setzt zur Begünstigung der Wrkg. der letzteren einen kleinen Überschuß einer starken Säure zu. Die Ausbeuten an *Metaldehyd* sind so sehr gut. Das Verf. bietet den Vorteil, daß der mit diesen Katalysatoren hergestellte Metaldehyd *Preßlinge* liefert, die sich bei der Verbrennung nicht mit einer Schicht kohligter Stoffe bedecken, wodurch die restlose Verbrennung des Metaldehyds selbst behindert würde. (**F. P. 587 261** vom 1/9. 1924, ausg. 15/4. 1925. D. Prior. 23/6. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, V. St. A., *Herstellung von reinem Crotonaldehyd*. Man erhitzt reines oder CH_3CHO u. Salze enthaltendes *Aldol* unter etwas vermindertem Druck, unter Luftausschluß auf 165° nicht wesentlich übersteigende Temp. — Das Aldol muß in einer indifferenten Gasatmosphäre, wie N_2 oder C_2H_2 , hergestellt u. gelagert sein u. in das Reaktionsgefäß ebenfalls unter möglichstem Luftausschluß übergeführt werden. Während der Erhitzens leitet man in den Kessel Dampf oder N_2 , wodurch gleichzeitig der gebildete Crotonaldehyd entfernt wird. Die austretenden Dämpfe werden ebenfalls unter Luftausschluß gesammelt, kondensiert u. das Kondensat fraktioniert. Der so gewonnene reine *Crotonaldehyd* eignet sich besonders zur Hydrierung u. liefert hierbei höhere Ausbeuten an *Butyraldehyd* u. *n-Butylalkohol* als der in üblicher Weise dargestellte. (**E. P. 242 521** vom 31/3. 1925, ausg. 3/12. 1925. **F. P. 595 962** vom 31/3. 1925, ausg. 13/10. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

The Commercial Solvents Corporation, Terre Haute, Indiana, übert. von: **Clarence W. Hancock**, Peoria, Illinois, V. St. A., *Herstellung von Buttersäure*. Man versetzt fl. *Butylaldehyd* mit Mn-Butyrat, verteilt die kolloidale Lsg. über einer M. mit großer Oberfläche u. leitet durch die M. bei 21—40° solange ein freies O_2 ent-

haltendes Gas, bis der größte Teil des Aldehyds zu Buttersäure oxydiert ist. (**Can. P. 249 868** vom 30/5. 1924, ausg. 19/5. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., *Lösungen von Blausäure*. Gasförmige CNH wird in wss. Lsgg. geleitet, welche CaO u. Alkalisulfat unter solchen Bedingungen enthalten, daß sich kein Doppelsalz von Alkalisulfat u. Ca abscheidet. Hierzu wird entweder bei Tempp. von höchstens 15° gearbeitet, oder die Konz. des Alkalisulfats niedrig gehalten. (**E. P. 245 152** vom 23/12. 1925. Auszug veröff. 17/2. 1926. Prior. 23/12. 1924.) KÜHLING.

National Aniline & Chemical Co., Inc., New York, übert. von: **Clarence G. Derick**, **Thomas H. Leaming** und **Walter M. Ralph**, Buffalo, New York, V. St. A., *Herstellung von 2-Amino-1-methoxy-4-methylbenzol*. Man gibt bei ca. 40 bis 50° zu einem Gemisch von 4-Methyl-2-nitro-1-oxybenzol, Dimethylsulfat u. W. allmählich eine wss. NaOH-Lsg. u. erhitzt das entstandene 4-Methyl-2-nitro-1-methoxybenzol mit einer wss. Lsg. von Na₂S₂ bezw. Na₂S u. S. — Bei der Red. des Nitromethyläthers ist es wesentlich, die Na₂S₂-Lsg. allmählich zu der h. wss. Suspension des Nitromethyläthers zufließen zu lassen, um eine heftige Rk. zu vermeiden. Nach beendeter Red. wird mit Wasserdampf dest., wobei das 2-Amino-1-methoxy-4-methylbenzol, F. 48—50°, rein u. in guter Ausbeute erhalten wird. (**A. P. 1 564 214** vom 9/3. 1920, ausg. 8/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Karl Friedrich Schmidt, Heidelberg, *Herstellung von Derivaten des hypothetischen Imins, einschließlich von Aminen und deren Substitutionsprodukten*. Man behandelt KW-stoffe oder deren Derivv., wie Aldehyde oder Ketone, mit N₃H in Ggw. von konz. Mineralsäuren. (Hierzu vgl. auch Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 704; C. 1924. I. 2603.) — Folgende Beispiele sind angegeben: Rührt man eine Lsg. von N₃H in Bzl. kräftig bis zur Beendigung der N₂-Entw. mit wenig konz. H₂SO₄ oder sirupöser H₃PO₄, so erhält man *Anilin*. — Analog erhält man aus *p-Xylol* das 2-Amino-1,4-dimethylbenzol (*p-Xylidin*). — Aus *Acetaldehyd*, N₃H in äth. Lsg. u. konz. H₂SO₄ unter Eiskühlung entstehen 64% *Acetonitril*, Kp. 79°, u. 20% *N-Methylformamid*. — *Benzaldehyd* wird durch in Bzl. gel. N₃H u. konz. H₂SO₄ unter Kühlung in 70% *Benzonitril*, Kp. 189—193°, u. 13% *Formanilid*, Kp. 278—282°, übergeführt. Bei Anwendung größerer Mengen konz. H₂SO₄ überwiegt die Menge des *Formanilids*. — *Aceton* gibt mit N₃H in Ggw. eines starken Überschusses an konz. Säure quantitative Ausbeuten an *N-Methylacetamid*, — *Benzophenon* mit in Bzl. gel. N₃H in Ggw. konz. H₂SO₄ ebenfalls quantitativ *Benzanilid*, aus A. Krystalle, F. 180°. — Tropft man eine Lsg. von *cyclo-Hexanon* u. N₃H in Bzl. langsam in mit Bzl. überschichtete konz. H₂SO₄ unter Eiskühlung, so hört die N₂-Entw. nach Beendigung des Eintragens der benzol. Lsg. auf. Die saure Schicht scheidet nach dem Verd. mit Eiswasser u. vorsichtigem Neutralisieren mit konz. NaOH-Lsg. ein Öl ab, das nach Aufnahme in Chlf. u. Abdest. des letzteren als in allen Lösungsm. ll. Sirup zurückbleibt. Man verd. diesen mit W. u. fällt das als Nebenprod. entstandene α,β -cyclo-Pentamethylen-tetrazol mit gesätt. HgCl₂-Lsg. aus, behandelt das Filtrat mit H₂S u. dampft es ein. Der Rückstand wird entweder durch Dest. oder Umkrystallisieren gereinigt. Man erhält so reines ϵ -Leucinlactam, F. 65°. (**A. P. 1 564 631** vom 8/5. 1925, ausg. 8/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Philip A. Kober, Hastings-upon-Hudson, New York, V. St. A., *Herstellung des Natriumsalzes der 4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzolmonoformaldehydsulfoxylsäure in reiner Form*. Eine wss. Suspension von Diaminodioxyarsenobenzol wird mit der berechneten Menge 2-n. NaOH gel. u. die Lsg. bei Tempp. unterhalb 20° mit einer wss. Lsg. von formaldehydsulfoxylsaurem Na versetzt. Nach 1/2-std. Stehen wird mit 5-n. HCl bis zur kongosauren Rk. versetzt, wobei die freie Formaldehydsulfoxylsäure ausfällt. Der filtrierte u. mit dest. W. gewaschene Nd. wird mit W. zu einer dicken, gleichmäßigen Paste angeschlämmt u. mit einer zur vollständigen Lsg. unzureichenden

Menge gesätt. Na₂CO₃-Lsg. versetzt. Man filtriert die neutrale Lsg. von dem ungel. Anteil ab, zweckmäßig durch Watte, u. verdampft im Vakuum von 2—10 mm Hg-Druck bei 58—80° zur Trockne. Man erhält ein von überschüssigem freiem Alkali, von A. u. S-haltigen tox. Verunreinigungen freies Prod., das in zugeschmolzenen, mit indifferenten Gasen gefüllten Ampullen aufbewahrt wird. (A. P. 1564 859 vom 12/4. 1920, ausg. 8/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Philip A. Kober, Hastings-upon-Hudson, New York, V. St. A., *Herstellung der Chlorhydrate des 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzols in reiner Form.* 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol wird in W. suspendiert u. in 2-n. NaOH gel. Zu der Lsg. gibt man sd. W. u. soviel 5-n. HCl, daß die gesamte Base gefällt wird. Der Nd. wird filtriert u. mit dest. W. gewaschen, wobei er frei von S-haltigen Verunreinigungen erhalten wird. Man verreibt zu einem steifen Brei u. gibt eine zur vollständigen Lsg. unzureichende Menge 5-n. HCl hinzu. Die entstandene Lsg. des *Monochlorhydrats* wird durch Watte filtriert u. entweder im Vakuum unter 2—10 mm Hg-Druck bei 50—80° zur Trockne eingedampft, das beständige, gelbe, pulverförmige Prod. ist in W. etwas leichter l. als das *Dichlorhydrat*, oder durch Zugabe der berechneten Menge 5-n. HCl in das *Dichlorhydrat* übergeführt, das ebenfalls im Vakuum zur Trockne eingedampft wird. Das Verf. vermeidet völlig die Verwendung von A. oder Ä. als Fällungsmittel, so daß weniger tox. Prodd. erhalten werden. (A. P. 1564 860 vom 12/4. 1920, ausg. 8/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

The Wellcome Foundation Ltd. und William Herbert Gray, London, *Darstellung eines Derivates der p-Aminophenylstibinsäure.* Das Na-Salz der p-Aminophenylstibinsäure wird in wss. alkal. Lsg. mit Glucose behandelt. — Z. B. wird p-acetylaminophenylstibinsäures Na bis zur völligen Verseifung mit 5%ig. NaOH-Lsg. erhitzt. Nach dem Filtrieren wird mit CH₃CO₂H schwach angesäuert, der Nd. abfiltriert, sorgfältig mit W. ausgewaschen u. in einem Gemisch von 10%ig. NaOH u. 40%ig. wss. Glucoselsg. gel. Nach 3-tägigem Stehen wird das Gemisch genau mit konz. HCl neutralisiert u. in 96%ig. A. eingegossen. Nach 1-std. Stehen wird das ausgefallene Na-Salz des Glucosids der p-Aminophenylstibinsäure der Zus. C₃₆H₄₉O₂₂·N₃Sb₃Na filtriert, erst mit 50%ig., dann mit 96%ig. A. gründlich ausgewaschen u. über H₂SO₄ im Vakuum getrocknet. Es ist ein schwach gelbliches, in W. mit neutraler Rk. ll. Pulver, an der Luft ziemlich beständig, wird jedoch besser in einer N₂-Atmosphäre in zugeschmolzenen Röhren aufbewahrt u. findet gegen *Kala-Azar* u. andere *Tropenkrankheiten* therapeut. Verwendung. (E. P. 234 677 vom 12/8. 1924, ausg. 25/6. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. von: **Homer W. Hillyer**, Farmington, Connecticut, V. St. A., *Herstellung von Alkalisalzen aromatischer Sulfosäuren.* Man behandelt wss. Lsgg. von Ca-Salzen arom. Sulfosäuren der Benzolreihe mit NaCl, KCl oder NH₄Cl in solchen Mengen, daß nicht nur eine Umsetzung der Ca-Salze, sondern auch Fällung oder Krystallisation der entstandenen Alkalisulfonate aus der wss. Lsgg. erfolgen kann. — Das Verf. vermeidet die Verwendung starker Säuren zur Zers. der Ca-Salze bzw. diejenige von Na₂CO₃ u. die Entfernung des unl. CaCO₃ aus den Lsgg. der Alkalisulfonate. Aus den neutralen oder nahezu neutralen Lsgg. der Ca-Sulfonate erhält man vielmehr unmittelbar die festen Alkalisalze, die abfiltriert u. zur Entfernung anhaftender Ca-Salze (CaCl₂ oder unverändertem Ca-Sulfonat) mit einer konz. Alkalichloridlsg. gewaschen werden. Beispiele für die Herst. des Na-Salzes der *Benzolsulfosäure*, des Na-Salzes der *Chlorbenzol-p-sulfosäure* u. des Na-, K-, NH₄-Salzes der *2-Nitro-1-chlorbenzol-4-sulfosäure* aus den entsprechenden Ca-Salzen sind angegeben. (A. P. 1564 239 vom 3/1. 1920, ausg. 8/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Alois Erlach, Wien, *Darstellung von Hydrochinon* durch Oxydation von Anilin mittels CrO₃ in schwefelsaurer Lsg. u. darauffolgende Red. des Chinons, dad. gek

daß das bei der Oxydation entstehende Chinon durch Wasserdampfdest. im Vakuum unter Zusatz von H_3BO_3 abgeschieden u. sodann in bekannter Weise, z. B. mit SO_2 , zu Hydrochinon reduziert wird. — Z. B. wird in 25%ig. H_2SO_4 gel. *Anilin* bei 5 bis 10° mit wss. $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ versetzt u. nach 12 Stdn. bei gleicher Temp. nochmals $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ zugegeben. Nach Zusatz von H_3BO_3 u. weiteren 4 Stdn. wird das Ganze in kleinen Anteilen der Wasserdampfdest. im Vakuum unterworfen. Nachdem das ganze Reaktionsgemisch in das Destillationsgefäß eingetragen wurde, dest. man noch ca. $\frac{1}{2}$ Sde. weiter, wobei die Konz. der H_2SO_4 auf etwa 60% steigt u. das gesamte *Chinon* mit der H_3BO_3 in die Vorlage überdest. Der Temp.-Unterschied zwischen dem Blaseninnern u. der Vorlage soll 30° betragen. Der Rückstand wird nochmals mit $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ oxydiert u. dann dest. Die vereinigten wss. Destillate werden mit fl. SO_2 behandelt. Nach 1 Sde. wird die Fl. eingengt, wobei H_3BO_3 mit dem Wasserdampf übergeht u. erneut verwendet werden kann. Nach dem Erkalten der konz. Fl. krystallisiert das *Hydrochinon* in langen Nadeln aus u. ist nach einmaligem Umkrystallisieren handelsüblich rein. Seine Ausbeute beträgt 65–80% des Anilengewichtes. Das Verf. erübrigt die Verarbeitung großer Flüssigkeitsmengen u. die bisher erforderliche Extraktion des Hydrochinons mit Ä. (**Oe. P. 98 418** vom 21/4. 1923, ausg. 10/11. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *Darstellung von Salicylsäure-n-butylester*. Salicylsäure wird nach den üblichen Methoden mit n. Butylalkohol verestert. — Z. B. wird eine Lsg. von *Salicylsäure* in n. Butylalkohol mit trockenem HCl -Gas gesätt., hierauf 3 Stdn. unter Rückfluß auf 120° erhitzt u. alsdann auf Eis gegossen. Die ölige Schicht wird mit W. u. verd. Na_2CO_3 -Lsg. gewaschen u. im Vakuum fraktioniert. Der *Salicylsäure-n-butylester*, angenehm riechendes Öl, wl. in W., l. in organ. Lösungsm., Kp. 128° , findet in der *Riechstoffindustrie* Verwendung. (**F. P. 595 871** vom 27/3. 1925, ausg. 10/10. 1925. D. Prior. 11/4. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

La Industrial Resinera-Ruth, S. A., Bilbao, Spanien, übert. von: **Carl Ruder**, Nürnberg, *Darstellung eines Gemisches von Camphen und i-Bornylester aus Pinenchlorhydrat*. (**Can. P. 247 784** vom 30/5. 1924, ausg. 17/3. 1925. — **C. 1925. I. 1013.**)

SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *Herstellung von Aminoalkylaminonaphthalinsulfosäuren*. (**E. P. 230 457** vom 4/3. 1925, ausg. 29/4. 1925. D. Prior. 4/3. 1924. — **C. 1925. II. 1807** [A. P. 1 543 569].) SCHOTTL.

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. von: **Walter M. Ralph**, Buffalo, New York, V. St. A., *Herstellung von 4-Nitro-1-acetylamidonaphthalin-6(7)-sulfosäure*. Ein Gemisch von *1-Acetylamidonaphthalin-6-* u. *-7-sulfosäure* (= Acetyl-Clevesäure) wird in schwefelsaurer Lsg. mit Salpeter-Schwefelsäure behandelt u. das Nitroprod. in eine wss. Lsg. von Na_2CO_3 , dessen Menge zur Neutralisation der Nitrosulfosäure ausreicht, eingetragen. — Z. B. wird trockene 100%ig. *1-Aminonaphthalin-6(7)-sulfosäure* mit Eg. u. Na-Acetat 24 Stdn. unter Rückflußkühlung u. Rühren bis zur Beendigung der Acetylierung erhitzt, hierauf die überschüssige $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ abdest. u. der Kesselnrückstand abgelassen, abgekühlt u. erstarren gelassen. Das Prod. enthält höchstens 1–2% unacetylierten Ausgangsstoff. Das Na-Salz der so entstandenen *1-Acetylamidonaphthalin-6(7)-sulfosäure* wird in H_2SO_4 66° Bé in kleinen Anteilen eingetragen u. das Gemisch bis zur Lsg. der Acetylverb. bei 15° gerührt, wozu ca. 24 Stdn. erforderlich sind. Während der letzten 4 Stdn. wird Luft durch die Lsg. geblasen, wodurch eine wesentliche Ausbeutesteigerung erzielt wird. Die durch Kühlschlangen auf 0° abgekühlte Lsg. läßt man dann in ein Gemisch von 48% konz. H_2SO_4 u. 46% HNO_3 einlaufen, wobei die Temp. 10° nicht übersteigen darf. Nach 5-std. Einlaufenlassen wird noch 1 Sde. weiter gerührt. Alsdann trägt man das Reaktionsgemisch in ein Gemisch von Na_2CO_3 , wenig W. u.

viel Eis allmählich ein, rührt andauernd bei Temp. unterhalb 20°, bis alles eingetragen ist u. dann noch weitere 24 Stdn. Hierbei scheidet sich langsam das Na-Salz der 4-Nitro-1-acetylamidonaphthalin-6(7)-sulfosäure aus, infolge der aussalzenden Wrkg. des bei der Neutralisation der H₂SO₄ entstandenen Na₂SO₄. Das Gemisch des Na-Salzes der Nitrosulfosäure u. des Na₂SO₄ wird abfiltriert, zur Entfernung des Na₂SO₄ mit wenig W. aufgerührt u. nochmals abfiltriert. (A. P. 1566 425 vom 29/11. 1920, ausg. 22/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. von: **Orin D. Cunningham**, Buffalo, New York, V. St. A., Herstellung von 2-Aminoanthrachinon. Anthrachinon-2-monosulfosäure wird mit wss. NH₃ in Ggw. von BaCl₂ u. NH₄Cl unter Druck auf höhere Temp. erhitzt. — Z. B. wird das Na- oder Ba-Salz der Anthrachinon-2-sulfosäure mit BaCl₂ u. NH₄Cl sowie 23%ig. wss. NH₃ unter Rühren im eisernen Autoklaven während 18—20 Stdn. auf 180—185° erhitzt. Das überschüssige NH₃ wird abgeblasen u. aufgefangen, das rohe 2-Aminoanthrachinon abfiltriert u. nacheinander mit sd. Na₂CO₃-Lsg., mit verd. HCl u. mit W. gewaschen. Die Ausbeuten betragen mehr als 82%, während bei Abwesenheit von NH₄Cl nur ca. 74% der Theorie an 2-Aminoanthrachinon erhalten werden. (A. P. 1564 210 vom 7/6. 1921, ausg. 8/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

British Alizarine Company Ltd., John Anderson und William Haywood Dawson, Manchester, Darstellung von Leuko-1,4,5-trioxyanthrachinon. Man reduziert 1,4,5-Trioxyanthrachinon mit Na₂S₂O₄ in alkal. Lsg. — Z. B. wird das Trioxyanthrachinon in wss. NaOH gel. u. auf 40° erwärmt. Hierauf gibt man das Na₂S₂O₄ hinzu, erhöht die Temp. auf 60° u. hält hierbei bis zur vollständigen Red. Beim Eingießen der Lsg. in verd. H₂SO₄ fällt die Leukoverb. aus, die abfiltriert, gewaschen u. getrocknet wird. Es werden so besonders gute Ausbeuten erhalten. (E. P. 234 263 vom 6/5. 1924, ausg. 18/6. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Claude Robert Smith, Washington, und **Theodore John Dosch**, San Francisco, California, V. St. A., Herstellung von Dipyridylen. Na wird mit einem großen Überschuß von Pyridin behandelt, bis das gesamte Na verschwunden ist, das Gemisch unter Luftausschluß im geschlossenen Gefäß auf 110—135° erhitzt, abgekühlt, trockener O₂ oder Luft in das Gefäß eingeleitet u. das überschüssige Pyridin durch Dest. entfernt. — Z. B. läßt man Na auf trockenes Pyridin 24 Stdn. oder länger einwirken, erhitzt dann im Autoklaven unter Luftabschluß ca. 8 Stdn. auf 115° oder 2 Stdn. auf 125°, kühlt auf 90—100° ab u. leitet solange trockenen O₂ oder Luft in den Autoklaven, bis die Farbe der Mischung von blau nach braun umgeschlagen ist. Hierauf wird das überschüssige Pyridin abdest. u. das Gemisch von Dipyridylen u. NaOH in üblicher Weise getrennt. Das in einer Ausbeute von ca. 90% erhaltene Gemenge von hauptsächlich 2,2'-, 3,3'- u. 3,4'-Dipyridyl neben wenig 4,4'-Dipyridyl findet an Stelle von Nicotin als insekticides Mittel Verwendung. (E. P. 228 849 vom 5/8. 1924, ausg. 8/4. 1925. Canad. Prior. 8/2. 1924. F. P. 579 456 vom 5/3. 1924, ausg. 17/10. 1924. Canad. Prior. 8/2. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, übert. von: **Hermann Fritzsche und Paul Schädeli**, Basel, Schweiz, Oxynaphthylsubstitutionsprodukte des 1,3,5-Triazins. (A. P. 1566 742 vom 26/3. 1925, ausg. 22/12. 1925. — C. 1925. II. 780 [Schwz. P. 107 619 usw.])

SCHOTTLÄNDER.

S. Karpen & Brothers, Chicago, Illinois, übert. von: **Carnie B. Carter**, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., Verfahren zur Trennung von Hexamethylentetramin und Ammoniumchlorid. Das durch Einw. von NH₃ auf CH₂Cl₂ entstandene Gemenge wird dadurch getrennt, daß es mit konz. wss. NH₃ extrahiert, wobei das NH₄Cl gel. wird, während das C₆H₁₂N₄ zurückbleibt, mit wss. verd. NH₃ gewaschen u. abfiltriert wird. (A. P. 1566 821 vom 26/7. 1924, ausg. 22/12. 1925.)

SCHOTTL.

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, übert. von: **Carnie B. Carter**, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von Hexamethylenetetramin und Ammoniumchlorid*. Man erhitzt ein Gemisch von CH_2Cl_2 mit einem großen Überschuß von wss. NH_3 (300—400% der theoret. erforderlichen Menge) unter mäßig erhöhtem Druck bis zur völligen Umsetzung auf 100°, gibt die Fl. in einen gekühlten Behälter u. übersättigt mit NH_3 -Gas. Der Nd. von $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$ wird abfiltriert, gewaschen u. getrocknet. Aus der Mutterlauge dest. man das NH_3 ab, kühlt die Fl., wobei die Hauptmenge des NH_4Cl ausfällt u. abfiltriert wird. Man wäscht u. trocknet den Nd. u. dampft aus dem Filtrat einen Teil des W. ab, worauf man die Lsg. von NH_4Cl u. etwas $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$ in einem neuen Ansatz als Lösungsm. für das CH_2Cl_2 wieder verwendet. (**A. P. 1 566 822** vom 26/7. 1924, ausg. 22/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Julius Obermiller, *Einige Bemerkungen über den farbaufhellenden Einfluß von Sulfoxygruppen bestimmter Stellung bei Azofarbstoffen*. Zu den Arbeiten von WANNER (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 513; C. 1925. II. 1095) teilt Vf. mit, daß er auch in verschiedenen Fällen *hypsochrome Wirkung* bei der Einführung von Sulfoxygruppen (= Sulfogruppen) in Azofarbstoffe beobachtet hat. Mono-, Dis- u. Trisazofarbstoffe, die als Endkomponente die β -Naphthol-6-sulfonsäure (Schäffersche Säure) trugen, waren stets etwas aufgehellter, als wenn sie mit dem nicht sulfonierten β -Naphthol abschlossen. Hiernach wirkt die Sulfogruppe in der 6-Stellung des β -Naphthols hypsochrom. Entsprechend sind die Azofarbstoffe mit der β -Naphthol-6,8-disulfonsäure (G-Säure) etwas aufgehellt gegenüber den Azofarbstoffen mit der β -Naphthol-8-sulfonsäure (Croceinsäure). (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 1044. 1925. München-Gladbach.) ZANDER.

B. Brauner, *Farben für die Zuckerfabriken*. Vf. erörtert die Verwendung von Farben als Schutzanstriche in den Zuckerfabriken vom techn. u. wirtschaftl. Standpunkte aus beim Einkauf u. bei der Verwertung. (Ztschr. f. Zuckerind. d. čechoslovak. Rep. **50**. 173—76. 181—83. Prag.) RÜHLE.

Marthe Madeleine Labitte, Seine, Frankreich, *Gauffrieren und Bedrucken von Watte und ähnlichen Stoffen*. Die in Stücke geschnittene Watte wird auf ein Weidengeflecht gelegt u. zur Verminderung des Gummigehaltes in einem Verdampfer mit einer 9%ig. Lsg. von A. auf etwa 90° erhitzt; nach dem Trocknen unter Luft- u. Lichtabschluß werden die Stücke mit einer Mischung aus 300 g calc. Magnesia, 200 g Talk, 200 g fein pulverisierter, weißer Seife u. 300 g Stärke auf beiden Seiten eingestäubt; man gauffriert dann durch Pressen bei etwa 90°, die Stücke werden dann auf dem Weidengeflecht getrocknet, zur Erzeugung von farbigen Drucken verwendet man mit Eiweiß angeriebene Farbstoffe. (**F. P. 596 066** vom 26/1. 1925, ausg. 15/10. 1925.) FRANZ.

Société d'Exploitation des Procédés Escaich, Paris, *Färben und Bedrucken mit anorganischen Farbstoffen*. (**Holl. P. 14 068** vom 20/11. 1923, ausg. 15/12. 1925. — C. 1925. I. 1654.) FRANZ.

Miltiade Vassiliou, Seine, Frankreich, *Nachahmen von Breitschwanzpelzen*. Weißgare, gereinigte Antilopen- oder Gazellenfelle werden schwarz gefärbt, mit Eiweiß oder Chromgelatine appretiert u. getrocknet, hierauf werden die Haare mit einer Bürste oder einer geeigneten Vorr. in die gewünschte Richtung gebracht u. gauffriert. (**F. P. 595 292** vom 20/1. 1925, ausg. 30/9. 1925.) FRANZ.

Valentin Andrianoff, Seine, Frankreich, *Mischung zur Erzeugung von Reliefmustern auf Gewebe, Papier, Leder oder anderen biegsamen Stoffen*. Man vermischt eine Lsg. von Kautschuk in einem rasch verdunstenden Lösungsm. mit Öllack, Leinölfirnis u. Zinkweiß. Der Mischung kann man einen Farbstoff zusetzen oder man bringt den

Farbstoff nach dem Auftragen der Mischung auf das Gewebe durch Aufstäuben auf; die aufgetragenen Muster werden nach dem Trocknen nicht rissig u. brechen nicht. (F. P. 596 720 vom 15/4. 1925, ausg. 30/10. 1925.) FRANZ.

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, übert. von: **Wilhelm Herzberg**, Berlin-Wilmersdorf, und **Gerhard Hoppe**, Berlin-Treptow, *Farbstoffe*. (A. P. 1 556 326 vom 12/12. 1924, ausg. 6/10. 1925. — C. 1926. I. 1050.) FRANZ.

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: **Oscar Kaltwasser**, Berlin, **Hans Oehr**n, Charlottenburg, und **Hermann Kirchhoff**, Berlin-Lichterfelde, *Darstellung von o-Oxyazofarbstoffen*. (D. R. P. 423 091 Kl. 22a vom 29/7. 1924, ausg. 18/12. 1925. — C. 1926. I. 1047.) FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., übert. von: **Richard Stüsser**, Köln-Deutz, *Disazofarbstoffe*. (A. P. 1 560 949 vom 15/4. 1924, ausg. 10/11. 1925. — C. 1924. II. 2424.) FRANZ.

Graselli Dyestuff Corporation, New York, V. St. A., übert. von: **Georg Kränzlein**, **Martin Corell** und **Robert Sedlmayr**, Höchst a. M., Deutschland, *Anthrachinonfarbstoffe*. (A. P. 1 564 584 vom 27/9. 1923, ausg. 8/12. 1925. — C. 1924. I. 710.) FR.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, übert. von: **Bertram Mayer** und **Jakob Würzler**, Basel, Schweiz, *Indigoide Farbstoffe*. (A. P. 1 561 560 vom 4/1. 1924, ausg. 17/11. 1925. — C. 1924. II. 1027.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., übert. von: **Arthur Lüttringhaus**, **Hugo Wolff**, Mannheim und **Heinrich Neresheimer**, Ludwigshafen a. Rh., *Benzanthranderivate und Küpenfarbstoffe*. (A. P. 1 564 423 vom 26/4. 1923, ausg. 8/12. 1925. — C. 1924. I. 448.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, übert. von: **Louis Haas**, Paris, Frankreich, und **Emil Reber**, Basel, Schweiz, *Schwefelfarbstoffe*. (A. P. 1 565 736 vom 7/5. 1923, ausg. 15/12. 1925. — C. 1924. I. 2013.) FRANZ.

Wilhelm Eberlein, Kochel, *Farblacke*. (Schwz. P. 112 606 vom 4/8. 1923, ausg. 2/11. 1925. — C. 1925. II. 1392 [D. R. P. 415 203].) KÜHLING.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

Jean-Ch. Bongrand, *Die Arbeiten über den Kautschuk und seine Industrie. Ein Betätigungsfeld für die Chemiker in Frankreich*. Vf. gibt zunächst einen Abriß der Geschichte des Kautschuks u. seiner Anwendungen, bespricht sodann den Übergang zur Plantagenwirtschaft. Es wird die Gewinnung u. Bearbeitung des Kautschuks auf den Plantagen geschildert. Sodann werden die Arbeiten über die physikal. u. chem. Eigenschaften des Kautschuks besprochen. Dabei wird der Einw. der Halogene, der salpetrigen Säure, der Reduktionsmittel u. der Metalle kurz gedacht. Es folgen Ausführungen über die Vulkanisation u. die Vulkanisationsbeschleuniger, über die Kautschukwarenfabrikation u. die Verwendung von nicht koaguliertem Latex, sowie über die industrielle Kautschuksynthese. (Chimie et Industrie 14. 823—38. 1925.) ACK.

H. Pohle, *Kautschuk als Dispersionsmittel*. Der an Modellverss. festgestellte Feinheitsgrad aus verschiedenen Füllstoffen weicht in der Praxis wegen der „Pakungsfinheit“ der verschiedenen Füllstoffe stark ab. Füllstoffe, welche mit Kautschuk die höchst dispersen Systeme geben, neigen im trockenen Zustand zur B. großer Sekundärteilchen (Zusammenbacken). — Nähere Best. der Dispersionszustände ist möglich durch Messung der Lichtadsorption in dünnen Schichten. Man kann damit auch den Mischungsprozeß verfolgen. Vf. ist nicht der Ansicht GREIDERS, der die Festigkeit durch Koagulation bei der Vulkanisation erklärt. Es kann nämlich keine Verschiebung der Lichtadsorption durch Vulkanisation festgestellt werden. (Kolloid-Ztschr. 38. 75—76. Hannover.) LASCH.

O. de Vries, *Das spezifische Gewicht von Hevea latex. Einige weitere Angaben über Latex mit niedrigem Kautschukgehalte und einem höheren spezifischen Gewichte als*

Wasser. Die älteren Literaturangaben über Latex mit D. über 1 sind sämtlich als unrichtig anzusehen. Eine D. höher als 1, kommt jedoch vor, wenn durch das Zapfsystem oder andere physiolog. Faktoren der Kautschukgehalt unter 17% sinkt. Angabe eines Beispiels (D. 1,004, Kautschuk 14⁰/₁₀). Die D. läßt sich nach der Mischungsregel (Serum 1,020, Kautschuk 0,914) berechnen. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie **10**. 1—14 [15—23] Buitenzorg.) GROSZFFELD.

St. Reiner, *Einfluß der Korngröße auf die Aceton-Extraktionszeit.* Nach der Anschauung von SPENCE u. SCOTT dauert die Extraktion des Harzes aus Kautschuk mit Aceton sehr lange. Vf. untersucht diese Verhältnisse bei Para verschiedener Korngröße (Durchmesser der Scheibchen von 18,1—6,8 mm). Von Wichtigkeit ist die gleichmäßige Strömungsgeschwindigkeit des Acetons u. die Anwendung eines Rührwerks bei der Extraktion. Mit abnehmender Korngröße stellt sich das Gleichgew. schneller ein, so daß bei entsprechend kleiner Korngröße des zu extrahierenden Kautschuks weniger als die bisher üblichen 8—10 Stdn. Extraktionszeit nötig sind. (Kautschuk **1926**. Januar 5—6.) EVERS.

H. L. Curtis und **A. T. Mc Pherson**, *Dielektrizitätskonstante, Leistungsfaktor und Widerstand von Kautschuk und Guttapercha.* Vff. untersuchen Kautschuk u. Guttapercha auf DE., Leistungsfaktor u. Widerstand. Sie finden, daß die DE. bei Kautschuk um den Wert 2,4 schwankt, bei Guttapercha etwa zwischen 2,56 bis 3,01 je nach Harzgehalt. Die dielektr. Verluste, gemessen durch den Leistungsfaktor, schwanken bei guten Kautschuksorten u. Guttapercha nur wenig. Der Widerstand bei Kautschuk liegt in der Größenordnung 10¹⁴ Ohm, bei Guttapercha ebenso u. steigt nur für gereinigte um eine Zehnerpotenz an.

Bei Vulkanisaten beobachten sie mit zunehmendem S-Gehalt ein Ansteigen der DE. bis zu einem Gehalt von 8% S; ähnlich verhält sich der Leistungsfaktor, während der Widerstand annähernd konstant bleibt. Füllstoffe erhöhen die DE. erheblich, ebenso den Leistungsfaktor. Besonders hervorgehoben seien: Gasruß, Bleiglätte, ZnO u. Se. Quarz hat eine schwache Wrkg., erhöht dafür aber den Widerstand. Die Einw. von H₂O auf Vulkanisate erhöht die DE. ebenfalls, der Leistungsfaktor steigt bis zu einem Maximum, geht aber dann nahezu auf seinen Anfangswert zurück, während der Widerstand mit steigender Einw. fällt.

Vff. ziehen aus ihren Beobachtungen den Schluß, daß Gummiisolierung für Seekabel der Guttaperchaisolierung überlegen ist. Die App. u. Meßmethoden, mit denen die Resultate gewonnen wurden, sind am Anfang der Arbeit eingehend beschrieben. (Department of Commerce. Technologic Papers of the Bureau of Standards. **19**. No. 299. 54 Seiten. 1925.) EVERS.

—, *Die elektrischen Eigenschaften von Kautschuk und Guttapercha.* Gekürzte Mitteilung der Unters. über die elektr. Eigenschaften des Kautschuks u. der Guttapercha. (Department of Commerce. Technologic Papers of the Bureau of Standards **19**. No. 299. 1925. India Rubber Journ. **71**. 235—43.) EVERS.

R. Houwink, *Neue Hartgummi-Prüfvorrichtungen in der Schopper-Maschine.* Es werden zur Prüfung der Qualität des Hartgummis einige neue Vorr. beschrieben; u. zwar ein App. zur Best. des Biegemoduls, ein App. zur Best. des Widerstandes gegen Druck u. ein App. zur Best. der Härte des Hartgummis. (India Rubber Journ. **71**. 227—28.) EVERS.

The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, übert. von: **Sidney M. Cadwell**, Leonia, New Jersey, *Vulkanisationsbeschleunigung.* (A. P. **1 564 825** vom 15/5. 1922, ausg. 8/12. 1925. — C. **1925**. II. 361.) FRANZ.

Rudolf Ditmar, Graz, *Herstellung von Kautschukartikeln.* Zur Verhütung der Koagulation vermischt man Kautschukmilch mit etwa 0,1—10% Glycerin, man gibt

dann die Zusatzstoffe, wie Schwefel, ZnO, Kaolin, Cement, Gips, Zellstoffwatte, Baumwollabfallwatte usw. zu, trocknet locker u. formt u. vulkanisiert; zum Imprägnieren zieht man die Gewebe durch eine Düsenbatterie, aus der die mit Glycerin u. den erforderlichen Zusatzstoffen versetzte Kautschukmilch gleichmäßig auf das Gewebe aufgespritzt wird, nach dem Trocknen wird vulkanisiert; die mit Glycerin versetzte Kautschukmilch kann man auch auf Papier, Pappe, Mörtelbewurf, Ziegel usw. aufspritzen (Oe. P. 99 664 vom 27/11. 1923, ausg. 10/4. 1925.) FRANZ.

Gustav Håkanson, Viskafors, Schweden, *Gemusterte Formen für die Herstellung von Weichkautschukgegenständen*. (A. P. 1 550 160 vom 23/11. 1923, ausg. 18/8. 1925. — C. 1925. II. 245.) FRANZ.

Jean Joseph Henri Frossard, Seine, Frankreich, *Kautschukmischungen*. Man vermischt Kautschuk mit etwa 10% Schmirgel; die Mischung dient zur Herst. von Schuhsohlen, Radreifen usw. (F. P. 586 089 vom 13/6. 1924, ausg. 14/3. 1925.) FR.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Scheunert, *Über die Vitamine und ihr Verhalten bei der Herstellung von Konserven*. Zunächst Allgemeines über die Einteilung der Vitamine. Bei der Konservierung der Nahrungsmittel ist es wichtig, die Empfindlichkeit der Vitamine gegen die hierbei möglichen Einww. zu betrachten. In Frage kommt vor allem die Einw. der Hitze auf die Vitamine, ihre Löslichkeitsverhältnisse u. ihr Verh. bei der Trocknung. Am wenigsten empfindlich ist das *Vitamin A*, das bei Anwendung nicht zu hoher Tempp. (120°) unter Luftabschluß keine erhebliche Verminderung seines Gehaltes erfährt, nur bei Trocknung wird vor zu langer Ausdehnung der Heißluftbehandlung gewarnt. Bei *Vitamin B* besteht eine viel größere Empfindlichkeit gegen Tempp., die über 100° liegen, u. gegen Auswaschgefahr wegen seiner Wasserlöslichkeit. Am allerempfindlichsten ist das *Vitamin C*, bei dem eine sehr leichte Oxydierbarkeit u. Wasserlöslichkeit vorhanden ist, so daß es schon beim Stehen an der Luft zerstört wird. Hier wird man daher den Verkochprozeß u. die Auslaugung möglichst vermeiden u. die Sterilisation unter strengstem Luftabschluß möglichst mild gestalten. Nur unter diesen Maßnahmen wird man die vitaminreichste Konserve erhalten. (Konserven-Ind. 13. 37—38. 46—48. 64—66.) HIRSCH-KAUFFMANN.

Javillier, *Kann man die Mehle auf künstlichem Wege entfärben und reifen lassen?* Von den überhaupt in Frage kommenden gasförmigen Verbh. (Cl_2 , NCl_3 , O_3 , NOCl , nitrose Gase), Flh. (H_2O_2) u. festen Körpern (Benzoylperoxyd) darf der Gebrauch von Cl_2 u. NCl_3 nur in ganz vereinzelt Fällen zugelassen werden; jede Behandlung des Mehles ist deutlich zu kennzeichnen. (Ann. des Falsifications 18. 580—95. 1925. Paris, Landwirtschaftliches Institut.) SPLITTGERBER.

C. B. Morison und M. R. Reeser, *Kochsalz*. An Geschmacksproben wurde gefunden, daß in Kochsalz für Backzwecke Gehalte an CaCl_2 unter 0,6%, an MgCl_2 bis zu 0,8%, an $\text{MgCl}_2 + \text{CaCl}_2$ bis zu je 0,5% noch keinen bitteren Geschmack bedingten. Die zugesetzte Salzmenge betrug 1,75% des Mehles. In Handelssalz wurden nicht mehr als 0,15 bzw. 0,14% CaCl_2 bzw. MgCl_2 gefunden. (Baking Technology 5. 23—25.) GD.

Artur Fornet, *Tabellarische Übersicht über die gebräuchlichsten Spezial-Konsumbrote*. Die Übersicht enthält Angaben über Reinigung des Korns, Art der Vermahlung, Mehanteil, Kleianteil, Behandlung der Kleie, Lockerungsmittel, Backart, Backzeit, Farbe der Krume, Feinheitgrad des Brotes, Lockerungsgrad u. beabsichtigten physiol. Effekt von Kommiß-, Schrot-, Graham-, Finkler-, Schlüter-, Klopfer-, Steinmetz-, Simons-, Growitt-, Hellamin-, Wittlamin-, Treydtamin-, Dreikornbrot u. Pumpkernnickel. (Volksernährung 1. 105—07.) GROSZFELD.

Hanns Eckart, *Untersuchungen von Apfelsäften und Pektinerzeugnissen des Handels*. Untersuchungsergebnisse von Handelspräparaten. Der Pektingehalt nach der Calciumpektatmethode scheint heute den besten Maßstab für die Gelierfähigkeit

zu geben. Für die Beurteilung des Handelswertes spielt neben der Preisfrage die satte Gelierfähigkeit im Endprod. die ausschlaggebende Rolle, daneben aber die Zus. des Extraktes. Nach der Pektinwertziffer beurteilt handelt es sich bei den techn. *Apfelsäften Nollco* u. den zugehörigen Pektinpräparaten nur um verschieden stark konz. Säfte; dagegen weisen die *Prodd. der Pomosinwerke* u. auch die amerikan. *Douglas-Präparate* eine Pektinanreicherung auf. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **50**. 405—15. 1925. München, Betriebslab. der Fa. JOHS. ECKART.) GROSZFELD.

H. Eckart und **A. Diem**, *Beiträge zur Untersuchung von Fruchtsäften*. Zur richtigen Beurteilung sind außer den analyt. Untersuchungsergebnissen eine Reihe von für jede Ernteperiode fortlaufend u. systemat. zu ermittelnden Erfahrungsdaten notwendig. Angabe solcher für Himbeermuttersaft der Ernte 1925. Die *Anwendung des Refraktometers* hat sich besonders für die Praxis als Schnellmethode bewährt. (Konserver-Ind. **13**. 83—85. 92—93.) GROSZFELD.

P. Martell, *Vanille und Vanillin*. Behandelt werden Gewinnung der Vanille, Behandlung der Vanilleschoten nach der Ernte, Handelssorten, Vanillingehalt, Haltbarkeit u. Verfälschungen der Vanille. Hinweis auf die Bedeutung des künstlichen Vanillins. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **50**. 415—20. 1925.) GROSZFELD.

J. Prescher und **R. Claus**, *Kürzere Mitteilungen aus der Praxis*. Eine Anzahl von *Kakaofettproben* war frei von Alkali, enthielt aber, anscheinend von Natur aus, deutliche Mengen (10 mg/100 g) CaO. — Eine *angebliche Bleiweißfarbe* war eine Anreicherung von Leinöl (32,70%) mit Lithoponweiß. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **50**. 429—30. 1925. Cleve.) GROSZFELD.

J. Prescher und **R. Claus**, *Die Verwendung gefritteter Glastiegel bei der Abscheidung der Digitoninsteride zwecks Prüfung von Fetten auf Phytosterin*. Die Verwendung der Tiegel erfordert folgende Abänderung des Verf.: Man fällt im Scheidetrichter mit gekürzter Abflußröhre bei 75°, läßt das klare Fett von dem sich oben ansammelnden Nd. möglichst ab, behandelt dann mit Chlf., CCl₄ oder Trichloräthylen, läßt abermals ab u. bringt dann erst den Nd. mittels Ä. auf den Tiegel (1 G 3/2 — 3) von 25 cm Inhalt. Zum Absaugen der Sterinacetatkrystalle dient besser der feinporigere Tiegel 1 G 3/5—7. Die Glasfilter bieten den Vorteil, daß man Reinigen u. Auswaschen der Ndd. besser verfolgen kann. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **50**. 420—23. 1925. Cleve u. Goch, Staatl. Chem. Untersuchungsamt.) GROSZFELD.

A. Goske, *Die Bestimmung des Aschengehaltes der Mehle*. Durch Mischen von 1,5 g fein gepulvertem Bimsstein mit 0,8—1 g Mehl, Anfeuchten mit W., Trocknen u. Veraschen gelang in etwa 1/4 Stde. restlose völlig kohlefreie Veraschung. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **50**. 428—29. 1925. Mülheim (Ruhr), Chem. Untersuchungsamt.) GROSZFELD.

H. Lührig, *Über den Nachweis kleiner Mengen Arsen im Kakao*. Da Mg₂As₂O₇ glühbeständig ist, kann man 15 g Kakaopulver + 10 ccm W. + 0,5 g MgO + 5 ccm konz. HNO₃ eintrocknen, veraschen, mit HCl aufnehmen, mit H₂SO₄ wieder eindampfen u. dann nach MARSH prüfen. Noch 0,3 mg As in 100 g Kakao ließen sich so leicht nachweisen. Einfacher kocht man nach REINSCH 15 g Kakao mit 75 ccm HCl (16%ig) in Ggw. von Cu-Blech (1 × 4 cm) 20—25 Min., wobei As dunkel schwarze bis leicht graue Beläge bewirkt. Prüfung derselben durch vorsichtige Sublimation (Oktaeder), wie näher beschrieben wird. Die untersuchten Kakaoproben waren As-frei. (Pharm. Zentralhalle **67**. 1—3. Breslau, Städt. Untersuchungsamt.) GROSZFELD.

John F. Norton und **Margaret Seymour**, *Untersuchung über Kulturmedien zur Schätzung des Bakteriengehaltes der Milch*. Vorschriftsmäßiger *Fleischextrakt-Agar*, entwässerter *Nähr-Agar* u. entwässerter *Milchpepton-Agar* erwiesen sich als etwa gleich befriedigend. Weniger bewährte sich *Ayers Milchpulver-Agar*, zumal

wegen dessen schwieriger Zubereitung. *Kalbfleisch-Aufguß* ist als Medium nicht zu empfehlen. (Amer. Journ. Publ. Health **16**. 35—39. Chicago, Univ.) GROSZFELD.

Arnold R. Tankard, *Bemerkung über das Filtrierverfahren zum Messen der Schmutzstoffe in Milch*. Das hierfür übliche Verf. zum Sammeln u. Sichtbarmachen des Milchschatzes auf einer Filterscheibe ist nicht quantitativer Art, weil nicht alle Schmutzteile durch das Filter zurückgehalten werden u. weil ein Messen oder Wägen des zurückgehaltenen Schmutzes nicht möglich ist. Das Verf. gibt nur nützliche Anhaltspunkte vorläufiger Art über den Grad der Verschmutzung. (Analyst **51**. 31.) RÜHLE.

R. Richard, *Analyse von Milchpulver. Beitrag zur Frage der Fett- und Wasserbestimmung*. Nach WEIBULL (Aufschluß mit HCl) wurden bei 8 Proben 0,6—1,9% mehr Fett gefunden, als durch direkte Extraktion. Beschreibung des Teichertschen Verf. Bei der Best. des W. ist zu beachten, daß Milchpulver sehr hygroskop. u. sein Wassergehalt (n. 5—7%) von der Luftfeuchtigkeit abhängig ist. (Le Lait. **6**. 86—88. Brüssel, hôpitaux.) GROSZFELD.

Rudolf Wildt, *Beiträge zur Kenntnis der Schardinger-Reaktion*. Betrachtungen über die Beeinflussung der Rk. durch Erkrankungen, Sexualrhythmus u. Fütterung des die Milch liefernden Tieres. Rk. verzögert bei Kolostralmilch, beschleunigt zur Zeit der Brunst u. Beginn der Grünfütterung. (Milchwirtsch. Forsch. **2**. 249—59. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 456. 1925. Ref. PESCHEK. München, Tierhyg. Inst.) OPP.

Alfred George Maunder Stabback, Streatham, *Konservierung von Naturprodukten, wie Früchte, Blüten und Eier*. Man überzieht die Prodd. mit einer dünnen Schicht eines Gummis (Tragantgummi) im Gelzustande. Dem Gummi wird eine hygroskop. u. antiseptische anorgan. Substanz (H₂SO₄) zugesetzt. (E. P. **212 979** vom 18/12. 1922, ausg. 17/4. 1924.) KAUSCH.

Johannes Petrus Hermanus Jansen, Schiedam, Holland, und **Hendrik Christianus Jansen**, Delft, Holland, *Aufbewahrung verderblicher Güter in geschlossenen Gefäßen unter Einlagerung eines porösen mit einem hygroskop. Salz getränkten Blocks aus Ton, Papier, Asbest usw.* (E. P. **216 212** vom 23/2. 1923, ausg. 19/6. 1924.) KAUSCH.

Kellogg Company, Battle Creek, übert. von: **John Leonard Kellogg**, Battle Creek, Michigan, *Nährmittel aus Kleie*. (A. P. **1 564 181** vom 26/10. 1922, ausg. 1/10. 1925. — C. **1924**. II. 2709.) OELKER.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, übert. von: **Otto Stiner**, Alfred Hauswirth, Bern, und **Alfons Gams**, Basel, Schweiz, *Halbbares, polyvalentes Vitaminmalzpräparat*. (A. P. **1 568 196** vom 18/1. 1919, ausg. 5/1. 1926. — C. **1921**. IV. 821.) SCHOTTLÄNDER.

Naamlouze Vennootschap Noury & Vander Landis Handelmaatschappij, Deventer, übert. von: **Thilo Kroeber**, Berlin-Westend, *Behandlung von Mehl und Mühlenprodukten*. (A. P. **1 565 375** vom 29/4. 1925, ausg. 15/12. 1925. — C. **1925**. I. 2124. [F. P. 579 040].) OELKER.

Oelwerke Noury & Van der Lande G. m. b. H., Emmerich a. Rh., und **Thilo Kroeber**, Charlottenburg, *Behandlung von Mehl und Mehlprodukten*. (E. P. **213 268** vom 19/3. 1924, ausg. 21/5. 1924. D. Prior. 19/3. 1923. — C. **1925**. I. 2124 [F. P. 579 040].) KAUSCH.

Robison Foreign Patents Co., Detroit (Michigan, V. St. A.), *Behandlung von Kaffee*. (Oe. P. **1 01 660** vom 3/9. 1920, ausg. 25/11. 1925. A. Prior. 24/10. 1917. — C. **1921**. II. 970 [E. P. 157 493].) OELKER.

Walter Rougier Bramwell St. John Gates, Guildford, Surrey, *Milchpräparate*. Man mischt ein Kohlehydrat oder Mischungen, die solche enthalten, mit Fett u. erhitzt das Gemisch so hoch, daß es pasteurisiert oder sterilisiert ist; dann wird der Wasser-

gehalt durch längeres Erhitzen bei niedrigerer Temp. vermindert u. Milchpulver dazu gemischt. (E. P. 215 039 vom 20/12. 1922, ausg. 29/5. 1924.) KAUSCH.

Hoyberg Co. A/S., Dänemark, *Fettbestimmung bei der Erzeugung von Butter.* (F. P. 596 583 vom 11/4. 1925, ausg. 27/10. 1925. Dän. Prior. 16/4. 1924. — C. 1925. I. 1824.) KAUSCH.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Maurice Deschiens, *Das Celluloseacetat und seine industriellen Anwendungen.* Zusammenfassende Besprechung an Hand des Schrifttums u. der Patentschriften. Im vorliegenden Teile werden die geschichtliche Entw. des Verfs., die Acetylierung der Cellulose, die Hydrolyse der Celluloseacetate u. die zur Acetylierung erforderlichen Katalysatoren besprochen. (Rev. des produits chim. 29. 5—8. 37—42.) RÜHLE.

Ernst Wilke-Dörfurt, A. Simon und E. Gühring, *Über das Auftreten von Stickoxyd, Kohlenoxyd und Blausäure im Zersetzungsrauch von Triolin.* Triolin entwickelt nach den Verss. der Vff. (App. zur Best. u. zu Tierverss. ist im Original beschrieben) beim Verbrennen oder bei der schon bei 125° beginnenden Zers. giftigen Rauch, der verhältnismäßig hohen Gehalt an NO, CO u. HCN aufweist. Nach einem Vers. ist anzunehmen, daß ein Teil der HCN durch sekundäre Rk. zwischen NO u. C entsteht. Triolin gibt bereits bei 20° Stickoxyde an strömende Luft ab. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 196—98. Stuttgart.) JUNG.

Gugnolio Piana C., Chiavazza, Biella, Italien, übert. von: **Vittorio Piana**, Chiavazza, Italien, *Behandlung von Seidenconabfällen.* (A. P. 1 565 196 vom 21/3. 1923, ausg. 8/12. 1925. — C. 1924. I. 2757.) KAUSCH.

Gesellschaft für Mechanische Zellulose m. b. H., Köln, übert. von: **Johann Jacob Gähler**, Herisau, Schweiz, *Herstellung von Halbstoff für die Celluloseverarbeitung.* (E. P. 216 533 vom 26/5. 1924, ausg. 16/7. 1924. D. Prior. 25/5. 1923. — C. 1925. I. 2519.) MAI.

Beckwith Box Toe Ltd., Sherbrooke, Quebec, Canada, übert. von: **Albert Lewis Clapp**, Danvers, Mass., V. St. A., *Pappe.* (Can. P. 249 329 vom 16/5. 1924, ausg. 5/5. 1925. — C. 1925. I. 1147.) OELKER.

Gesellschaft für Mechanische Zellulose m. b. H., Köln, übert. von: **Johann Jacob Gähler**, Herisau, Schweiz, *Herstellung von Papier.* (E. P. 216 532 vom 26/5. 1924, ausg. 16/7. 1924. D. Prior. 25/5. 1923. — C. 1925. I. 2269.) MAI.

Société Industrielle pour l'Application de Brevets et Procédés, Rueil (Seine et Oise), übert. von: **Jaques Edwin Brandenberger**, Neuilly sur Seine, Frankreich, *Behandlung von Cellulosehydraten.* (Can. P. 249 916 vom 4/9. 1923, ausg. 19/5. 1925. — C. 1923. IV. 860.) OELKER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung gefärbter Massen aus Celluloid oder celluloidartigen Stoffen.* Man vermischt Nitrocellulose- oder Celluloseacetatmassen mit organ. Farbstoffen, die in den zur Herst. der Celluloseestermassen dienenden organ. Lösungsm. unl. oder nahezu unl. sind, man vermischt z. B. Celluloid auf Mischwalzen solange mit einem unl. organ. Farbstoff, bis die erhaltene M. mit einem den Farbstoff nicht lösenden Lösungsm. eine Lsg. liefert, aus der sich der Farbstoff auch bei längerem Stehen nicht absetzt, bei dieser Arbeitsweise kann man an Stelle der unl. organ. Farbstoffe auch anorgan. Farbstoffe verwenden; die Lsgg. der so gefärbten Massen kann man zum Überziehen von Leder, Holz, Glas, Metallen, Papier, Faserstoffen usw. verwenden; die hiernach erhältlichen gefärbten celluloidartigen Massen sind infolge der feinen Verteilung der unl. Farbstoffe durchsichtig, die Lsgg.

liefern Überzüge, die trotz der Durchsichtigkeit der benutzten gefärbten Massen, ein gewisses Deckvermögen besitzen, diese Erscheinung ist die gleiche wie bei dem Tyndallphänomen. (F. P. 588 903 vom 15/11. 1924, ausg. 18/5. 1925. D. Priorr. 26/6. u. 10/10. 1924.)

FRANZ.

Jacques Delpech, Ille-et-Vilaine, *Verarbeitung von Kunstseide aus Nitrocellulose oder Celluloid*. Um die Entflammbarkeit der Nitrocelluloseseide während der Verarbeitung herabzusetzen, trinkt man die Kunstseide mit Lsgg. feuersichermachender Salze, wie Phosphaten, Boraten, Oxalaten usw., oder mit einer Glycerinlsg., man kann auch der Nitrocelluloselsg. 2% Glycerin zusetzen; nach der Verarbeitung der Kunstseide durch Verspinnen oder Verweben mit pflanzlicher oder tierischer Faser werden die feuersichermachenden Salze durch Waschen mit W. wieder entfernt. (F. P. 598 748 vom 25/5. 1925, ausg. 23/12. 1925.)

FRANZ.

Eastman Kodak Co., übert. von: **Henry E. van Derhoef**, Rochester, New York, V. St. A., *Herstellung von gewalzten Filmen*. Man vereinigt zwei Filme aus verschiedenen Cellulosederivv., z. B. einen Cellulosenitratfilm mit einem Celluloseacetatfilm oder einem aus einem in W. unl. Cellulosealkyläther hergestellten Film usw., indem man die gegossenen Filme nur so weit trocknen läßt, daß sie sich ohne Schädigung von der Unterlage entfernen lassen, diese Filme, die noch einen Teil der benutzten Lösungsm. enthalten, werden durch Walzen zusammengepreßt, nach dem Verdampfen des Restes der Lösungsm. erhält man einen klaren fest zusammenhaftenden aus mehreren Schichten bestehenden Film. (A. P. 1 540 822 vom 27/6. 1924, ausg. 9/6. 1925.)

FRANZ.

Société Chimique des Usines du Rhône, Paris, übert. von: **Nicolas Benoit Grillet**, Neuilly, Frankreich, *Celluloseester*. (A. P. 1 566 398 vom 22/11. 1924, ausg. 22/12. 1925. — C. 1925. II. 2331.)

FRANZ.

Wladimir Plinatus, Schweiz, *Herstellung von durchsichtigen Massen, Filmen, Platten aus kolloidalen Dispersionen von anorganischen oder organischen Celluloseestern*. Man dispergiert Cellulosenitrat oder -acetat auf mechan. Wege unter Erwärmen in W. unter Zusatz eines Gelatinierungsmittels, Glycerinester anorgan. oder organ. Säuren. Die M. kann man nach dem Entfernen des W. auf Filme, Platten usw. verarbeiten. (F. P. 581 183 vom 9/8. 1923, ausg. 24/11. 1924.)

FRANZ.

Wladimir Plinatus, Schweiz, *Lösen und Gelatinieren von Celluloseestern*. Man vermischt Cellulosenitrat oder -acetat mit Emulsionen von Glycerinestern organ. Säuren in W. (F. P. 581 651 vom 14/8. 1923, ausg. 3/12. 1924.)

FRANZ.

Wladimir Plinatus, Schweiz, *Herstellung von marmor-, holzähnlichen oder geaderten Massen aus Celluloseestern*. Cellulosenitrat, Celluloseacetat wird unter Ausschluß von Campher auf plast. Massen verarbeitet, man verwendet hierzu die Ester von mehrwertigen Alkoholen, Zucker usw. mit organ. oder anorgan. Säuren, wie Essig-, Oxal-, Milch-, Wein-, Benzoe-, Phthal-, Salicyl-, Naphthensäure. Man stellt mit Hilfe dieser Grundmasse mehrere verschieden gefärbte Mischungen her, walzt zu dünnen Blättchen aus u. walzt dann auf die als Grund dienende Schicht die in entsprechende Stücke geschnittene anders gefärbten Plättchen ein. (F. P. 581 652 vom 14/8. 1923, ausg. 3/12. 1924.)

FRANZ.

The Viscose Development Co. Ltd. und **Charles Frederick Cross**, England, *Herstellung haltbarer schrumpffähiger Stoffe aus Cellulosehydraten*. Die aus Cellulose-xanthogenat gewonnenen Gebilde werden mit einer Lsg. von 22 Teilen $ZnCl_2$, 22 Teilen Glycerin in 56 Teilen W. getränkt u. nach dem Abtropfen oder Abschleudern an der Luft getrocknet, die so erhaltenen Gebilde sind lange Zeit haltbar, vor dem Gebrauch werden die zugesetzten Stoffe durch Waschen mit W. entfernt, sie verhalten sich dann wie frisch hergestelltes Cellulosehydrat; das Verf. eignet sich besonders zur Herst. von *Flaschenkapseln, Filmen, Kunstfäden* usw. An Stelle des $ZnCl_2$ kann man die Chloride des Ca, Mg usw. verwenden, etwa vorhandene Mineralsäure kann durch Zusatz essig-

saurer Salze neutralisiert werden. (F. P. 597 738 vom 7/5. 1925, ausg. 27/11. 1925. E. Prior. 12/5. 1924.) FRANZ.

Max Ow, Wien, *Lösen von Celluloseestern und Celluloseäthern*. (Oe. P. 99 665 vom 24/3. 1924, ausg. 10/4. 1925. — C. 1925. II. 872.) FRANZ.

American Rubber Company, East Cambridge, übert. von: **Charles H. Dennison**, Quincy, Massachusetts, V. St. A., *Herstellung von Kunstleder*. (A. P. 1 532 234 vom 27/8. 1921, ausg. 7/4. 1925. — C. 1925. I. 2425.) FRANZ.

Masarek & Spol, Tschechoslowakei, *Kunststoffe*. Man vermischt Holzmehl, Maisstärke, Kolophonium u. W. u. formt in der Presse. Man vermischt z. B. 25 Teile Holzmehl, 20 Teile Maisstärke, 7 Teile Kolophonium u. 48 Teile W., die Mischung wird in eine geheizte Form gebracht, wobei sich die Stärke in Kleister verwandelt, alsdann wird 2—5 Minuten gepreßt. (F. P. 598 368 vom 19/5. 1925, ausg. 15/12. 1925, Tschech.-Slowak. Prior. 22/5. 1924.) FRANZ.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

E. Zimmermann, *Das Vorkommen und die Unschädlichmachung des im Grubenwasser der linksrheinischen Zechen auftretenden Bariumsulfats*. Die im rhein.-westfäl. Schiefergebirge vorkommenden Schwerspatgänge sind ursprünglich azsender Natur, entstammen in der Hauptsache den Diabaseruptionen des jüngeren Devons u. den Basaltergüssen des Tertiärs u. Quartärs u. haben sich in dem aus der Umlagerung älterer Gebirgsschichten hervorgegangenen Buntsandstein angereichert, bis der Schwerspat von dort wieder zu Wanderungen gezwungen worden ist. — Die in den abgepumpten Grubenwässern auftretenden Ba-Lsgg. verursachen erhebliche Schäden, insbesondere Rohrverstopfungen, deren Verhütung möglich ist durch Einbau von Kiesfiltern zwecks Zurückhaltung des bereits unl. gewordenen BaSO₄ durch Abfangen der Ba-Lsgg. an bestimmten Stellen, möglichst getrennt von den sulfatreichen sonstigen Grubenwässern, endlich durch Verdünnen der Ba-haltigen Wässer mit Salzsolon, wodurch die Löslichkeit von BaSO₄ erhöht wird. (Glückauf 62. 270—74. Berlin.) SPL.

J. Gwosdz, *Die Mittel zur Ermöglichung einer Verwendung von backenden Brennstoffen im Gaserzeuger*. Vf. erörtert verschiedene Mittel, um das Zusammenbacken der Kohle im Gasgenerator zu verhüten: Brennstoffaufgabe in dünnen Schichten, mechan. Rühren u. langsames Erwärmen des Brennstoffs auf 450—500° in einem besonderen Schwelschacht. Letzteres Verf. hat sich bei der Power-Gas-Corporation sehr gut bewährt. (Die Wärme 49. 75—76. Berlin.) NEIDHARDT.

Kausch, *Neuerungen auf dem Gebiete der Erzeugung von Wasser- und Generatorgasen*. Übersicht über die im Jahre 1925 in Deutschland patentierten Neuerungen auf oben genanntem Gebiet. (Wasser u. Gas 16. 449—54. Berlin.) SPLITTGERBER.

Alice Hamilton, **Paul Reznikoff** und **Grace M. Burnham**, *Tetraäthylblei*. Die Vff. beanstanden das Gutachten des „Bureau of Mines“, das zur Freigabe des ursprünglich verbotenen Tetraäthylblei als Zusatz zu den Motorbrennstoffen führte. Die Ungiftigkeit des Stoffes, wie er in den Auspuffgasen erscheint, ist sicher nicht bewiesen. (Journ. of the Americ. med. assoc. 84. 1481—86; Ber. ges. Physiol. 32. 667. 1925. Ref. FLURY.) OPPENHEIMER.

G. Polysius Eisengießerei und Maschinenfabrik, Dessau, *Verfahren, die flüssige Schlacke von Gaserzeugern und Kohlenstaubfeuerungen auf Portlandzement zu verarbeiten* nach Patent 421427, 1. dad. gek., daß die Erwärmung der fl. Schlacke u. die Zuteilung der Zuschläge in einer oder mehreren sich drehenden Kammern erfolgt. — 2. Vorr. zur Ausführung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daß die Kammern aus sich drehenden, in Hohlachsen gelagerten, mit Schamotte ausgekleideten Hohlkugeln u. dgl. oder Trommeln runden oder eckigen Querschnitts bestehen. — Die Mischung

der Schlacke mit den Zuschlägen vollzieht sich vollkommener als bei dem Verf. gemäß dem Hauptpatent, auch die Wärmeverteilung ist gleichmäßiger. (D. R. P. 423 793 Kl. 80b vom 5/5. 1922, ausg. 11/1. 1926. Zus. zu D. R. P. 421 427; C. 1926. I. 1695.) KÜ.

Humphreys & Glasgow Limited, Westminster, und **John Morrell Rusby**, Philadelphia, *Vergasung bituminöser Kohle o. dgl.* (E. P. 216 021 vom 2/8. 1923, ausg. 12/6. 1924. — C. 1925. I. 2204.) MAI.

Regenerative Coal Gasification System Limited, Manchester, übert. von: **Morris William Travers**, London, und **Frank William Clark**, Lymm, Cheshire, *Gas aus Kohle*. Man bläst Luft durch h. Koks u. leitet die dabei entstehenden Gase durch einen Regenerator, in dem sie verbrannt werden. Alsdann bläst man Wasserdampf durch den Koks u. das dabei erhaltene Wassergas durch den Regenerator. Ein Teil des darin erhitzten Gases wird direkt unten in die Kohle u. der Rest in eine Kammer geleitet, die durch die Blasegase erhitzt u. in die Öl eingeführt wird. (Can. P. 245 977 vom 20/6. 1924, ausg. 6/1. 1925.) KAUSCH.

L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés G. Claude, Paris, übert. von: **George Claude**, Paris, *Leucht- und Koksöfengas*. (Can. P. 248 884 vom 24/10. 1924, ausg. 21/4. 1925. — C. 1924. II. 1541.) KAUSCH.

Le Roy Wilbur Heffner, East Norristown Township, und **William Tiddy**, Jeffersonville, Pennsylvania, V. St. A., *Verfahren zur Abscheidung von Phenolen aus Gaswasser oder andern phenolhaltigen Abwässern*. Man unterwirft die phenolhaltige Fl. bei ca. 98° der Dest., gegebenenfalls unter Zusatz von konz. NH₃, wobei die Phenole mit dem NH₃ ausgetrieben werden, trennt die Dämpfe von den Phenolen durch Einleiten in NaOH-Lauge oder durch Überleiten über Absorptionskohle u. führt einen Teil der gereinigten NH₃-Dämpfe in die Destillierblase zurück. — Die Phenolatlaugen können in üblicher Weise auf freie Phenole, die von den Phenolen befreite Fl. auf wss. NH₃ oder (NH₄)₂SO₄ verarbeitet werden. Enthält das phenolhaltige Abwasser, z. B. die bei der Herst. von harzartigen Kondensationsprodd. aus Phenolen u. CH₂O abfallende Fl., kein NH₃, so muß dieses vor der Dest. dem Abwasser zugesetzt werden. (A. PP. 1 566 795 u. 1 566 796 vom 16/12. 1924, ausg. 22/12. 1925.) SCHOTTL.

V. L. Oil Processes Ltd., Owen David Lucas und **Ernest Lawson Lomax**, London, *Raffinieren von Kohlenwasserstoffen*. (E. P. 223 066 vom 14/11. 1923, ausg. 6/11. 1924. — C. 1924. II. 2379.) KAUSCH.

Fred Curtis Thornley, London, **Frank Ford Tapping** und **Otto Reynard**, London, *Herstellung von Emulsionen aus Pech und anderen unverseifbaren Stoffen*. (E. P. 219 348 vom 26/1. 1923, ausg. 21/8. 1924. — C. 1925. I. 2522 [F. P. 583 759].) OE.

Clark T. Henderson und **Ludwig Rosenstein**, San Francisco, California, V. St. A., *Holzkonserverung*. Man imprägniert das Holz mit einer Emulsion von wss. Lsgg. tox. Salze in Asphaltöl. — Z. B. wird das Holz zunächst bei 80° bis 115° gedämpft, dann kurze Zeit im Vakuum behandelt u. dann unter Druck bei 50—105° mit einer Emulsion imprägniert, die man durch Einrühren einer wss. 70%ig. ZnCl₂-Lsg. in mit Naphthensulfosäure als Dispergiermittel versetztes Asphaltöl erhalten kann. Das ZnCl₂ läßt sich durch NaF, HgCl₂ oder andere tox. Salze ersetzen. Das Verf. eignet sich besonders zu beständigen Imprägnierungen von Eisenbahnschwellen. (A. P. 1 565 503 vom 21/6. 1922, ausg. 15/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Larrowe Construction Co., Detroit, Michigan, übert. von: **Edwin H. Crofoot**, Mason City, Iowa, *Antigefrierlösung*. Man verwendet in einem Radiator Abfallfl. der Zuckerextraktionsverff. (konz. Steffensches Abwasser). (Can. P. 251 530 vom 12/6. 1924, ausg. 17/7. 1925.) KAUSCH.

Chemisches Zentralblatt.

1926 Band I.

Nr. 15.

14. April.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

F. Lüdy jr., *Über die alchemistischen Zeichen*. Vf. teilt eine systemat. Zusammenstellung der alchemist. Zeichen mit alphabet. Verzeichnis u. Erläuterungen mit. (Schweiz Apoth.-Ztg. **64**. 25—34. Burgdorf.) JUNG.

M. G. Mellon, *Systematischer Entwurf für die chemische Literatur*. Systemat. Zusammenstellung der Literaturangaben für chem. Arbeiten. (Chem. Metallurg. Engineering **33**. 97—98.) ENSZLIN.

Ronald George Wreyford Norrish und **Griffith Glyn Jones**, *Studien zur Valenzfrage*. VII. *Oberflächenpolarität und die Reaktion zwischen Äthylen und Chlor*. Die Wirkung der adsorbierten Wasserhaut. (Vgl Journ. Chem. Soc. London **123**. 3006; C. **1924**. I. 1764.) Untersucht wurde die Rk. zwischen Äthylen u. Chlor bei einem Anfangsdruck von 200 mm u. an Oberflächen von Glas, Stearinsäure u. Paraffin. Die Resultate der früheren Unterss. an Äthylen u. Br (l. c.) konnten im allgemeinen bestätigt werden, es gelang im Reaktionsgefäß eine Paraffinschicht zu erzeugen, welche die Reaktionsgeschwindigkeit auf $\frac{1}{1200}$ herabsetzte. Anwesenheit von Wasserdampf mit einem Partialdruck von 6 mm erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit an Glasflächen um 30%, hat aber gegenüber Paraffinoberflächen keinen Einfluß. Durch Paraffinieren erzielt man somit bei feuchten Gasen dieselbe Wrkg. wie durch vollständige Entfernung der Wasserhaut durch Erhitzen. Wird die Innenfläche des Reaktionsgefäßes mit Stearinsäure überzogen, so läßt sich durch Wasserdampf derselbe Effekt erzielen wie bei Anwendung von Glaswänden. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 55—62. Cambridge, Univ.) TAUBE.

Richard Lorenz und **J. J. van Laar**, *Erweiterung der neuen Grundgleichungen des Massenwirkungsgesetzes auf den Fall eines Zusatzes zu den Komponenten einer Phase*. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **145**. 239; C. **1925**. II. 1123 u. S. 1917.) Rein theoret. Abhandlung über den Fall, daß zu den eine Phase bildenden zwei Komponenten eines mehrphasigen Gleichgewichts ein weiterer Stoff zugesetzt wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **150**. 329—34. Frankfurt, Univ. u. Tavel sur Clarens.) GOTTFR.

A. Benrath, *Über die Anwendung der dilatometrischen und der stalagmometrischen Methode bei kinetischen Untersuchungen*. Unter Mitarbeit von **Diderichs**, **Geuer**, **Sass**, **Schleicher**, **Viedebantt** und **Kraheek**. Vf. prüft die dilatometr. u. die stalagmometr. Methode auf ihre Verwendbarkeit für kinet. Unterss.; die Ergebnisse stimmen im ganzen mit den nach spezif. Methoden gefundenen überein. — Die dilatometr. Methode (vgl. Ztschr. f. physik. Ch. **67**. 501; C. **1909**. II. 1188) ändert Vf. ab, indem die D. nicht mehr mit Hilfe eines Spengel-Ostwaldschen Pyknometers gemessen, sondern die Volumänderung einer abgemessenen Menge der Lsg. in einem 50 ccm-Kölbchen mit engem, gradiertem Hals bestimmt wird. — *Esterbildung* verläuft unter Volumenzunahme, die Änderung ist proportional der Verringerung der Säurekonz. Untersucht wurde die Rk. zwischen *Amylalkohol* einerseits u. *Eg.*, *Propionsäure* u. *Buttersäure* andererseits. — Die *Hydrolyse des Acetamids* verläuft in Ggw. von HCl, HBr oder HNO₃ unter Kontraktion, die proportional der Konz.-Abnahme des Acetamids ist. Bei äquivalenten Mengen von Amid u. Säure verläuft die Rk. bimolekular, bei Säureüberschuß monomolekular. Tabellar. zeigt Vf., daß die Gesamtkontraktion von der Konz. der Säure unabhängig ist, während die Geschwindigkeitskoeffizienten mit steigendem Säure-

gehalt sinken. Bei Anwendung von H_2SO_4 sinkt die Kontraktion mit steigender Säurekonz., während die Geschwindigkeitskonstante proportional dem Säurezusatz steigt. Verwendung von H_3PO_4 ergibt verschiedene Komplikationen. — Die *Hydrolyse bromsubstituierter Säuren* verläuft unter Dilatation. Vf. untersucht die Verseifung der Salze der Brombernsteinsäure, Bromessigsäure u. α -Brompropionsäure. Zusatz von Neutralsalzen verringert ein wenig die Dilatation u. vergrößert die Geschwindigkeit, ähnlich wirkt A. Die Messungsergebnisse werden tabellar. gebracht.

Die von Vf. ausgearbeitete stalagmometr. Methode, die auf der Änderung der Oberflächenspannung der Lsg. während einer chem. Rk. beruht, ergab brauchbare Resultate bei Anwendung einer Tropfenmethode, bei welcher die Fl. unter konstantem Überdruck aus einem Tropfer austritt. Untersucht wird wiederum die Verseifung des Acetamids in saurer Lsg. HCl u. die meisten anorgan. Säuren setzen die Oberflächenspannung wenig, aber proportional ihrer Konz. herab. Salzlsgg. wirken umgekehrt. Acetamid drückt die Oberflächenspannung herunter. Der Einfluß des Eg. ist bedeutend, die Abnahme der Oberflächenspannung verläuft hier aber nicht proportional der Konz. Tabellar. bringt Vf. die ausgeführten Hydrolyseverss. Die Ergebnisse mit HCl u. HNO_3 gleichen denen der dilatometr. Methode, während H_2SO_4 ein ganz anderes Bild gibt. — Beide Methoden geben eine Zunahme der Geschwindigkeit mit steigendem Säurezusatz. Die Verschiedenheit einiger Ergebnisse beruht darauf, daß stalagmometr. die B. des Eg., dilatometr. die B. von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ gemessen wird. Die verschiedenartige Wrkg. starker u. verd. Säuren u. von Neutralsalzen sucht Vf. theoret. zu deuten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 53—67. Bonn, Univ.) ULMANN.


V. Kohlschütter, *Aus der Chemie fester Körper: einiges zur Morphologie des Kohlenstoffs*. Im Gegensatz zu den meisten chem. Rkk., bei denen die reagierenden Stoffe in molekularer Verteilung u. Beweglichkeit auftreten, verlaufen die topochem. Rkk. fester Körper ohne molekulare Aufteilung der Materie unter Beibehaltung ihrer strukturellen Anordnungen wie ihres Raumgitters oder anderer fester Verbände. Die Beziehungen zwischen amorphem C u. Graphit, die Bildung von Glanzkohlenstoff durch Abscheidung aus C-haltigen Gasen an glatten Oberflächen werden als Beispiele für die Auswirkung der örtlichen Festlegung eines chem. Prozesses herangezogen. Eine topochem. Rk. ist die B. von Graphitsäure aus Graphit u. ihre Red. zu Graphit; beides sind Vorgänge, die ohne gestaltliche Veränderung der Substanz vor sich gehen. Die erwähnten Rkk. stellen einen Spezialfall topochem. Rkk. dar, den FREUNDLICH permutoide Rk. genannt hat. Graphit, Graphitsäure, krystallin. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ lassen sich nach RINNE als parakrystallin. bezeichnen im Gegensatz zu den wirklich dispersen Substanzen. Auch bei der Bildung der organisierten, sogenannten somatoiden Stoffformen, bei denen Teile mit verschiedenen Funktionen unterscheidbar sind, wirken topochem. Rkk. mit; diese Formen scheinen nach RUFF für die Aktivität der Kohlen von Bedeutung zu sein. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 345—47.) LEH.

W. Herz, *Die Ausdehnungskoeffizienten bei gleichen reduzierten Dichten*. Ausgehend von der Beobachtung, daß man zu einfachen Beziehungen gelangt, wenn man die Temp. u. die Sättigungsdrucke zusammenstellt, die zu gleichen reduzierten DD. gehören, behandelt Vf. von dem gleichen Gesichtspunkt aus die Ausdehnungskoeffizienten zahlreicher Stoffe als Fl. u. als gesätt. Dämpfe. In einer Tabelle werden die Ausdehnungskoeffizienten der untersuchten Stoffe für die doppelte bzw. 2,75-fache krit. D. (fl. Zustand) u. den zehnten bzw. fünfzigsten Teil der krit. D. (gasförmiger Zustand) zusammengestellt. Bildet man Quotienten aus je zwei Reihen, so zeigen diese eine erhebliche Annäherung an Konstanz. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **150**. 326—28. Breslau, Univ.) GOTTFRIED.

W. Herz, *Regeln über den Zusammenhang von Eigenschaften normaler Flüssigkeiten*. Vf. berechnet für eine große Anzahl von Flüssigkeiten den Quotienten $T/\sqrt[3]{Mv}$,

wonach T der Kp. u. Mv das Mol.-Vol. beim Kp. bedeuten, der nach TYRER eine Konstante liefern soll. Konstanz konnte nicht einwandfrei nachgewiesen werden, doch ist eine Gleichartigkeit der Quotienten unverkennbar. Durch Kombination der Tyrschen Formel mit der von Vf. gefundenen $L = p_k \cdot T / T_k \cdot d_k$, wo $T = \text{Kp.}$, T_k , p_k u. d_k die krit. Temp., den krit. Druck u. die krit. D. bedeuten, erhält man $p_k (M/d_k)^{2/3} = \text{Konst.}$. Die nach dieser Formel ebenfalls für eine große Reihe von Stoffen errechneten Werte schwanken ebenfalls um einen bestimmten Zahlenwert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **150**. 335—38. Breslau, Univ.) GOTTFRIED.

E. Moles, *Das Molekularvolumen des Wassers in den krystallisierten Hydraten*. Ein systemat. Studium des Molekularvolumens des Wassers in den krystallisierten Hydraten führt den Vf. zu dem Schluß, daß die heteropolaren Verbb. keine Molekularhydrate bilden, sondern daß die H_2O -Moll. engstens mit den Kationen oder Anionen des Hydrates verbunden sind. Eine Berechnung des Mol.-Vol. des W. in einer großen Anzahl von Chloriden, Sulfaten, Doppelsulfaten, Alaunen, Nitraten u. Nitriten ergibt, daß das Mol.-Vol. des Hydratwassers der Kationen meist 14,6 beträgt. Dieser Wert liegt nahe dem von H_2O am absoluten Nullpunkt eingenommenen Vol. (14,3). Das Mol.-Vol. des Hydratwassers der Anionen hat, wie Vf. an einigen Säuren u. Säurehydraten zeigt, den Wert von ca. 10. Ein abweichendes Verhalten zeigen hierbei die *o*-Phosphorsäure u. die phosphorige Säure. Hier ist nämlich der berechnete Wert für das Mol.-Vol. höher u. läßt auf eine andere Anordnung des H_2O -Mol. schließen. Entsprechend dem sonstigen Verhalten dieser Säuren u. ihrer Salze nimmt Vf. an, daß nur 1 H-Ion vorhanden ist u. das W. mit einer Nebenvalenz an das Zentralatom gebunden ist. Ähnlich wie die Säuren des P verhalten sich die Säuren des N, As u. Sb, so daß an die Stelle des P in den nebenstehenden Formeln auch diese Elemente eingesetzt werden können. — Das H-Ion



der Säuren verhält sich wie ein normales Kation u. hat als Maximum die Koordinationszahl 1. Die Koordinationszahl der dreiwertigen Kationen in den Alaunen ist 12, die einwertigen sind mit Ausnahme von Na u. Li anhydriisch. In den Doppelnitraten der seltenen Erden $[\text{3Me}^{\text{II}}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{2Me}^{\text{III}}(\text{NO}_3)_3 \cdot \text{24H}_2\text{O}]$ haben die dreiwertigen Metalle der seltenen Erden die Koordinationszahl 3. Entgegen der Ansicht von HÜTTIG (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 135; C. **1925**. I. 1929) u. LEMBERT (Ztschr. f. physik. Ch. **104**. 101; C. **1923**. III. 1140) ist Vf. der Ansicht, daß in den Sulfaten der zweiwertigen Metalle dem Kation die Koordinationszahl 5 zukommt. — Weiter macht Vf. aufmerksam auf einen Parallelismus, der zwischen dem Mol.-Vol. des Hydratwassers u. der Hydratationswärme in den verschiedenen Verbb. existiert. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **23**. 557—85. 1925. Madrid, Lab. de Invest. Fisicas.)

HANTKE.

E. Moles, *Die Volumenänderungen bei der Bildung der anorganischen Verbindungen*. Für die Permanganate u. Chloride berechnet Vf. auf Grund der zuverlässigsten Bestst. der D. dieser Stoffe das Verhältnis Molekularvolumen: Summe der Atomvolumina. Diese Änderung des Vol. wird in Verb. gebracht mit der Bildungswärme der Elemente pro Cl-Atom der Chloride. Eine Zusammenstellung dieser Resultate läßt die Formulierung einiger Regeln zu: Wenn die Bildungswärme pro Atom Cl den Wert 50 cal (Cal?) übersteigt, tritt eine Volumenkontraktion ein, während bei den Stoffen, die gegenüber der Summe der Atomvoll. ein größeres Mol.-Vol. besitzen, die Bildungswärme pro Cl-Atom unter 50 cal liegt. Die Elemente, die 1 oder 2 Stellen hinter jedem Edelgas im period. System stehen, zeigen in ihren Chloriden durchweg Kontraktion; die Elemente, die 1—5 Stellen vor dem Edelgas stehen, zeigen in den Chloriden Dilatation. Die Elemente, bei denen sowohl Kontraktion wie auch Dilatation beobachtet wird, stehen in der Gruppe 1b, 7a u. 8 des period. Systems nach PANETH; die seltenen Erden gehören ebenfalls hierhin. Bei den

Chloriden der 1. u. 2. Art nimmt die Kontraktion bzw. Dilatation mit steigendem At.-Gew. zu, während die Elemente, die sowohl Kontraktion als auch Dilatation zeigen, konstante Werte geben. Die Existenz dieser Regeln gestattet die unbekannten At.-Voll. von Elementen zu berechnen, wenn nur die Voll. ihrer Verbb. bekannt sind. Eine solche Berechnung wird für das Ra u. Gd durchgeführt. — Das Vol. des Radikals CO wird für das Gas CO zu 24,2 berechnet u. bei den Metallecarbonylen des Fe, Ni, Co u. Mo gefunden, daß hier das CO einen normalen Wert für sein Vol. gibt, nur bei den Carbonylen des Fe ist es etwas niedriger. An einer Reihe von Kobaltamminen wird gezeigt, daß bei dem Eintritt von NH_3 , H_2O , Cl u. NH_3 in den Kern die Regel der Additivität der Voll. streng erfüllt ist. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **23**. 524—39. 1925.) HANTKE.

J. Errera, *Einfluß der Molekularstruktur auf den Dipolcharakter isomerer Äthylenverbindungen; Berechnung des Molekularmomentes*. (Vgl. Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] **11**. 154; C. **1925**. II. 897 u. S. 1962.) Aus den mitgeteilten Verss. über die dielekt. Polarisation u. den Einfluß der Temp. auf ihren Wert ergibt sich, daß die cis-Verbb. permanente Dipole, dagegen die trans-Verbb. nur nicht-permanente Dipole besitzen. Vf. berechnet unter Anwendung der Formeln von LANGEVIN-DEBYE u. ausgehend von verd. Lsgg. die Molekularmomente folgender Verbb. mit permanenten Dipolen: $\text{CHCl}:\text{CHCl}$ $1,89 \cdot 10^{-18}$; $\text{CHCl}:\text{CHBr}$ $1,55 \cdot 10^{-18}$; $\text{CHBr}:\text{CHBr}$ $1,35 \cdot 10^{-18}$; $\text{CHJ}:\text{CHJ}$ $0,71 \cdot 10^{-18}$. (Journ. de Physique et le Radium [6] **6**. 390—96. 1925.) K. WOLF.

D. Balarew, *Löslichkeit und Korngröße*. II. (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **145**. 122; C. **1925**. II. 1006.) Einige Ergänzungen zur früheren Arbeit, welche zeigen, daß die Zerstäubung eine allgemeine Erscheinung beim Zerreiben von Krystallen darstellt. Die kleinsten Teilchen, welche sicher nur aus einigen Atomkomplexen bestehen, werden wegen der Kleinheit ihrer Radien u. wegen der Größe ihrer Oberfläche schnell in n gesätt. Lsgg. aufgenommen u. bewirken in den ersten Momenten die beobachtete Vergrößerung der Leitfähigkeit der letzteren. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 68—70. Sofia, Univ.) ULMANN.

Kingo Sano, *Über die Löslichkeit der Aminosäuren bei variierter Wasserstoffzahl*. Es wird die Löslichkeit von *Leucin*, *Tyrosin*, *Cystin* bei 25^0 u. wechselndem pH untersucht, wobei nur solche Säuren u. Basen angewendet wurden, welche mit der Aminosäure II. Salze bilden. Es wurde bei geringer Konz. stets vollkommene Dissoziation der Salze angenommen. Nach der Löslichkeitstheorie von MICHAELIS ist die totale Löslichkeit $A = \lambda + k \cdot \lambda / [\text{H}^+]$, wobei k die Dissoziationskonstante der Säure u. λ die Konz. der gesätt. Lsg. an undissoziierter Aminosäure bedeutet. Für zweibas. Säuren kommen noch die Ionen der zweiten Dissoziationsstufe hinzu u. es ist dann die gesamte Löslichkeit:

$$A = \lambda + \frac{K_1}{[\text{H}^+]} \lambda + \frac{K_2}{K_1} \left(\frac{K_1}{[\text{H}^+]} \right)^2 \lambda.$$

Bei den Ampholyten muß man beide Betrachtungen für Säuren u. Basen gleichzeitig anstellen. Wenn aber das Prod. der Säuren u. Basenkonstanten kleiner als 10^{-16} ist, so ist die isoelekt. Zone so breit, daß man auf der sauren Seite allein die Theorie für Basen, auf der alkal. die für Säuren anwenden kann. — Am einfachsten läßt sich die Theorie für *Leucin* bestätigen, das sowohl als Säure als als Base einwertig ist. Das *Tyrosin* ist als Säure zweiwertig, das *Cystin* sowohl als Säure wie als Base zweiwertig. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes wird die Theorie ebenfalls bestätigt. Zu diesem Zwecke hat man als Dissoziationskonstanten anzunehmen: für *Leucin* $K_a = 3,16 \cdot 10^{-10}$, $K_b = 2,8 \cdot 10^{-12}$, für *Tyrosin*: $K_{a_1} 7,94 \cdot 10^{-10}$, $K_{a_2} 7,94 \cdot 10^{-11}$, $K_b = 1,6 \cdot 10^{-12}$, für *Cystin* $K_{a_1} 1,4 \cdot 10^{-8}$, $K_{a_2} 1,4 \cdot 10^{-10}$, $K_{b_1} = 1,8 \cdot 10^{-12}$, $K_{b_2} 4,5 \cdot 10^{-13}$. (Biochem. Ztschr. **168**. 14—33. Nagoya, Japan. Biochem. Inst. d. Aichi-Medizin. Univ.) LASCH.

Philipp Gross, *Notiz über geschmolzene Salze als Lösungsmittel starker Elektrolyte*. (Vgl. Physikal. Ztschr. **26**. 636; C. **1925**. II. 1586.) Eingangs bespricht Vf. auf Grund der vorliegenden experimentellen Tatsachen das Verh. starker Elektrolyte, die in geschmolzenen Salzen aufgelöst sind, u. ferner das Verh. starker Elektrolyte in Lösungsm. prinzipiell beliebiger DE. — Vf. ist der Ansicht, daß die hohe Eigendissoziation der Lösungsm. ausreicht, das Verh. starker Elektrolyte, die in geschmolzenen Salzen aufgelöst sind, wiederzugeben. Die Annahme von WALDEN, daß die geschmolzenen Salze eine große DE. haben, hält Vf. theoret. nicht gerade für wahrscheinlich. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **150**. 339—42. Wien, Univ.) GOTTFR.

L. L. Bircumshaw, *Die Löslichkeit von Wasserstoff in Zinn und Aluminium bei hohen Temperaturen*. Im Gegensatz zu früheren Ansichten konnte der Vf. feststellen, daß H_2 sich dennoch in Sn bei etwa 800° in geringem Ausmaße löst, desgleichen auch in Al dicht oberhalb des F. Die Lösungsgeschwindigkeit wurde manomet. verfolgt. — Um die beiden Metalle im Vakuum vollständig gasfrei zu erhalten, bedarf es außerordentlich langer Zeiträume. (Philos. Magazine [7] **1**. 510—22. Nat. physical lab.) HA.

H. Cassel, *Bemerkung zur Theorie der Zweistoffkatalysatoren*. Die durch die Arbeiten von M. VOLMER u. seinen Schülern sichergestellte Beweglichkeit adsorbierter Molekeln u. Atome innerhalb der Adsorptionsschicht scheint eine Erklärung für den Promotoreffekt zu bieten. Die Berührungsgrenzen benachbarter Katalysatoren können als Zonen erhöhter Reaktionsgeschwindigkeit wirken, indem Zu- u. Abfuhr der Reaktionsteilnehmer teilweise durch Diffusion längs der Oberflächen stattfindet. Experimentelle Beweise stehen noch aus. (Naturwissenschaften **14**. 103—04.) CASS.

Hugh S. Taylor, *Vierter Bericht des Ausschusses für Kontaktkatalyse*. Die neueren experimentellen Arbeiten über die Abhängigkeit des Adsorptionsvermögens u. der Aktivität von Katalysatoren von der Temp., der Herstellungsart u. der Natur der reagierenden Stoffe, die Möglichkeit der stufenweisen Vergiftung u. andere Erscheinungen bei der Kontaktkatalyse werden zusammengefaßt u. an Hand der folgenden Theorie erklärt: Ein akt. Katalysator ist ein unvollständig kristallisierter Körper, der noch Atomgruppen außerhalb des Krystallgitterverbandes enthält. Diese isolierten Atome u. in geringerem Grade auch Atome an Krystallecken sind weniger durch Bindung an Nachbaratome gesätt., als solche, die Krystallflächen angehören. Während für gewisse Rkk. (Zers. von organ. Säuren zu Ketonen, von Aminen zu Nitrilen, von Alkylhalogeniden in Olefine u. Halogenwasserstoff) die ganze Katalysatoroberfläche akt. ist, ist in zahlreichen anderen Fällen die Wirksamkeit auf die ungesätt. Stellen beschränkt. Ihre Zahl u. Anordnung, die von der Herstellungsart des Katalysators abhängt, bestimmt den Verlauf der katalyt. Rk. Die Zunahme der ungesätt. Atome bei wachsendem Verhältnis von Oberfläche zu Vol. erklärt die mehrfach in der Literatur mitgeteilte Beobachtung, daß die therm. Daten für feinverteilte Stoffe größer sind als für das kompakte Material u. den abnorm hohen Dissoziationsdruck feinverteilter Oxyde u. Oxydgemische. Auf der hohen Verdampfungsgeschwindigkeit der akt. Zentren beruht auch die Schädigung von Katalysatoren durch Erhitzen oder unter dem Einfluß der Reaktionswärme beim Gebrauch selbst. Die hohe Aktivität gewisser Oxydgemische kommt dadurch zustande, daß durch Einschiebung mehrerer Krystallgitter ineinander die Zahl isolierter oder an Krystallecken liegender Atome vermehrt wird. In manchen Fällen ist die Wrkg. von beschleunigenden Zusätzen außerdem darauf zurückzuführen, daß sie einen der reagierenden Stoffe aktivieren oder das Verhältnis der Adsorption der reagierenden Stoffe ändern. (Journ. Physical Chem. **30**. 145—71.) KRÜGER.


A. Madinaveitia, *Die katalytische Hydrierung mit feinverteilten Metallen*. Zusammenfassender Bericht. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **23**. Revista 297 bis 310. 1925.) HANTKE.

G. R. Levi und R. Haardt, *Die katalytische Wirksamkeit der Metalle der Platingruppe und ihr Verteilungsgrad*. Vff. untersuchen verschiedene Arten von Pt röntgen-

spektroskop. u. zwar 1. Platinschwarz von HERAEUS; 2. Platinschwarz, das aus saurer Lsg. in der Wärme mittels Al aus H_2PtCl_6 ausgefällt wurde; 3. Platinschwarz aus 5%ig. neutraler H_2PtCl_6 -Lsg. mittels Al-Spänen in der Kälte gefällt; 4. Platinschwamm aus $(\text{NH}_4)_2\text{PtCl}_6$ bei 320° dargestellt; 5. Platinschwamm wie 4 dargestellt, aber nach Wiedererwärmen auf 250° . Für die Größe der Seite eines Teilchens wurden so gefunden in 1. $6,93\mu$; 2. $5,28\mu$; 3. $4,8\mu$; 4. $11,27\mu$ u. 5. $9,00\mu$. (Atti. R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **3**. 91—97.) GOTTFRIED.

Erich Müller, *Die Oxydation des Ammoniaks zu Nitrit in wäßriger Lösung durch Sauerstoff bei Gegenwart von metallischem und gelöstem Kupfer*. (Experimentelle Mitarbeit von **H. Wiebols**†, **H. Eggersglüs** u. **F. Uhlig**). Verss. machen es wahrscheinlich, daß sämtliche aktivierenden u. katalyt. Wrkgg. des Cu oder seiner Verbb. bei Oxydationsprozessen auf der intermediären B. einer höheren Oxydationsstufe des Cu beruhen. In Ammoniak gelöstes Cu(2) katalysiert dessen Oxydation durch O_2 zu Nitrit dadurch, daß sich intermediär das reaktionsfähige Cu(3) bildet. In Ammoniak gelöstes Cu(1) beschleunigt die Nitritbildung durch O_2 ganz erheblich mehr als Cu(2). Es handelt sich hierbei nicht um eine streng katalyt. Wrkg., weil Cu(1) dabei gleichzeitig in Cu(2) übergeht. Bei der beschleunigenden Wrkg. von metall. Cu auf die Rk. zwischen NH_3 u. O_2 zu Nitrit beteiligt sich das Cu nur indirekt, indem es zu Cu(1) u. Cu(2) wird. Auch die spezif. Wrkg. des Cu oder Kupferoxydes als Anode oder die vom gelösten Cu(2) bei der elektrolyt. Oxydation des NH_3 ist ebenfalls durch intermediäre B. von Cu(3) bedingt. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 109—20. Dresden.) UL.

Don M. Yost, *Die katalytische Wirkung von Silberammoniakion bei der Oxydation von Ammoniak durch Peroxysulfate*. (Vgl. S. 2429.) Die Rk.:



wird untersucht. Die Rk. ist nicht reversibel, u. obwohl sie mit einer großen Verminderung an freier Energie stattfindet, verläuft sie ohne Katalysator sehr langsam. Vf. untersucht die Katalyse durch Ag-Ion. Die Unters. wird dadurch kompliziert, daß die Ag-Ionen fast vollständig in Form von Ag-NH_3 -Komplexen auftreten. Die Rk.-Geschwindigkeit ist direkt proportional den Konz. der S_2O_8 -Ionen u. der Ag-NH_3 -Ionen. Die Rk.-Geschwindigkeit wächst auch mit der NH_3 -Konz. u. nimmt mit der OH-Ionenkonz. ab, aber weder direkt proportional der ersten, noch umgekehrt proportional der letzten. Die Wrkg. des NH_3 wird folgendermaßen erklärt: da Silbertriäminchlorid, $\text{Ag}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}$, als feste Phase existiert, existiert in der Lsg. wahrscheinlich auch das Ion $\text{Ag}(\text{NH}_3)_3^+$ (wenn auch in kleinem Betrage) u. das S_2O_8 -Ion reagiert damit mit anderer Geschwindigkeit als mit $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$. Eine langsam verlaufende Rk. zwischen dreiwertigem Ag u. NH_3 kann zur Erklärung nicht herangezogen werden, da Ag_2O_3 mit NH_3 schnell reagiert. Die Wrkg. des OH-Ions kann vermutlich zum Teil durch die B. einer nicht ionisierten Verb. $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$, die langsamer mit $\text{S}_2\text{O}_8''$ reagiert als $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$, erklärt werden u. zum Teil durch die dadurch verminderte Aktivierung der $\text{S}_2\text{O}_8''$. Demgemäß bestehen die langsamen Stufen der katalysierten Rk. aus 3 nebeneinander verlaufenden Rkk., den Oxydationen von $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$, $\text{Ag}(\text{NH}_3)_3^+$ u. $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\cdot\text{OH}$ durch $\text{S}_2\text{O}_8''$ zu dreiwertigem Ag^{+++} ; die letzte, schnell verlaufende Stufe ist die Rk. zwischen Ag^{+++} u. NH_3 unter B. von N_2 , Ag^+ u. Säure. — Ein Vergleich der Rk.-Geschwindigkeiten der Oxydationen von Cr u. NH_3 durch $\text{S}_2\text{O}_8''$ bei Ggw. von Ag-Salzen (vgl. l. c.) lehrt, daß das Ag-Ion mehr als 10-mal so schnell mit $\text{S}_2\text{O}_8''$ reagiert, wenn es in Form eines Ag-NH_3 -Ions vorhanden ist, als ein hydratisiertes Ag-Ion. Das beweist, daß die Rk.-Geschwindigkeiten verschiedener Verbb. desselben Elementes zum großen Teil von der Natur der an das Element gebundenen Gruppen abhängen. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 374—83. Pasadena [Cal.], Inst. of Technology.) JOSEPHY.

P. Farup, *Über die katalytische Einwirkung von Eisenerzen auf die Spaltung des Kohlenoxyds*. Durch Erhitzen von verschiedenen Eisenerzen — in pulveriger Konzentrat-form u. in Erzstücken — im CO-Strom bei 420 — 430° wird der katalyt. Einfluß der

Erze auf die Rk. $2\text{CO} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{C}$ untersucht. Die Resultate sind ziemlich ungleichmäßig, indem verschiedene Erze ähnlicher Zus. die Rk. bald stark, bald wenig katalysieren, so daß hieraus kein Schluß zu ziehen ist, ob die katalyt. Wrkg. an eine bestimmte Eisenverb. gebunden ist. Die untersuchten Erze waren *Magnetit*, *Hämatit* u. Konzentrate. Weiterhin wurde dann der Einfluß des Brikettierens von *Eisenerzen* auf ihre Eigenschaft, die *Spaltung des Kohlenoxyds* zu katalysieren untersucht. Die von einem Konzentrat bei verschiedenen Tempp. hergestellten Briketts zeigten in ihren katalyt. Fähigkeiten untereinander kaum Unterschiede, wohingegen sie bedeutend kräftiger als das unbrikettierte Konzentrat wirkten, was durch die Veränderung der Oberfläche des Katalysators erklärt wird. Zugleich scheint aber eine Red. der Eisenoxyde vor sich zu gehen. Zur Unters. der Oberflächenwrkg. der Erze wurden Verss. gemacht, bei denen diese mit CaCO_3 oder mit NaCl glasiert wurden. Dadurch konnte tatsächlich eine gewisse Verringerung der katalyt. Eigenschaften bei ziemlich neutralen Erzen erreicht werden. Bei SiO_2 -reichen Erzen ließ sich die Spaltung von CO fast verhindern. Doch sind nach den Angaben des Vfs. die Erfolge mit dem Glasieren ungleichmäßig. (*Tidskrift for Kemi og Bergvaesen* **6**. 1—6. 15—17.)

HANTKE.

H. A. Spoehr und J. H. C. Smith, *Studien über atmosphärische Oxydation. I. Die Oxydation von Glucose und verwandten Substanzen in Gegenwart von Natriumferropyrophosphat*. (Vgl. S. 2282 u. *Journ. Americ. Chem. Soc.* **46**. 1494; C. **1924**. II. 937.) *Natriumferropyrophosphat*, erhalten durch Lösen von Ferrosulfat in Natriumpyrophosphat, wirkt als Katalysator bei der Oxydation von Kohlehydraten u. Oxysäuren durch Luftsauerstoff. Um den Mechanismus der Oxydation zu ergründen, wurden die Natur u. Wirkungsweise dieses Katalysators untersucht. *Natriumferropyrophosphat*, $\text{Na}_2(\text{FeP}_2\text{O}_7)$, wird an der Luft leicht zu *Natriumferripyrophosphat*, $\text{Na}(\text{FeP}_2\text{O}_7)$, oxydiert. Versuche, diese Verb. zu isolieren, hatten keinen Erfolg, sie sind nicht kolloidal, das Eisen ist komplex gebunden. Deswegen nehmen Vff. an, daß die Katalyse keine Oberflächenwirkung ist, sondern durch die elektrochem. Reaktion $\text{ferri} \rightarrow \text{ferro} + e$ zu erklären ist, mit welcher Annahme auch die ausgeführten Messungen übereinstimmen. Die Oxydation von Glucose ist möglich, ob die Ferro- oder Ferri-Verb. anfänglich vorhanden ist. Ameisensäure wird mit der Ferri-Verb. jedoch nicht oxydiert. Daraus folgt, daß nur solche Verb., welche Natriumferripyrophosphat reduzieren, zur katalyt. Oxydation fähig sind. Die Oxydation verschiedener organ. Säuren wurde untersucht, ferner die Red. von *Natriumferripyrophosphat* durch *Glucose*, *Fructose* u. *Mannose*. Geringe Mengen von KCN begünstigen die Oxydation, Platin u. Insulin haben dagegen keinen Einfluß auf dieselbe. (*Journ. Americ. Chem. Soc.* **48**. 236—48. Carmel-by-the-Sea, Californien.)

WINKELMANN.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

A. L. Klein, *Die sekundäre Emission aus einer Nickeloberfläche hervorgerufen durch Bombardement langsamer positiver Ionen*. Der benutzte App. bestand aus einer Anzahl koaxialer Ni-Zylinder, s. um einen Mo-Streifen angeordnet. Die Aktivierung des Mo-Streifens geschah durch eine darauf angebrachte dicke Schicht von AlPO_4 . Die erzielte sekundäre Elektronenemission nimmt angenähert zu mit dem Quadrat der primären Ionenenergie u. erreicht 22% des Primärionenstromes, für Primärionenenergie entsprechend 380 Volt. Die erhaltenen Kurven zeigen, daß eine große Anzahl der reflektierten positiven Ionen Energie zwischen 0 u. 2 V besitzen u. ferner eine Gruppe reflektierter positiver Ionen vorhanden ist mit Energien von ca. 0,9 der Primärenergie. (*Physical Review* [2] **26**. 800—06. 1925. Pasadena [Cal.].) K. W.

P. J. Nolan, *Der Charakter der Ionisation, die durch Zerstäuben von Wasser hervorgerufen wird*. Die Versuchsanordnung, speziell die Art der W.-Zerstäubung, sowie die Messung der dabei auftretenden Ionisation mit Hilfe der Zelenyschen Doppelektrodenmethode wird beschrieben. Es ergab sich aus den Verss., daß verschiedene

Ionen hergestellt werden können, je nach Art der Ionisation, ferner, daß es Ionen gibt, die eine verschiedene Beweglichkeit aufweisen u. somit auch eine andere Ladung tragen. Zur Erklärung dieser Erscheinungen werden eine Reihe von Annahmen gemacht, wofür bisher nur wenig experimentelle Beweise gebracht werden konnten. (Philos. Magazine [7] **1**. 417—28. 1926. Dublin, Univ. Coll.) HAASE.

A. Keith Brewer, *Ionisierung in reagierenden Gasen*. (Physical Review [2] **26**. 633—42. 1925. — C. 1926. I. 583.) CASSEL.

Paul E. Boucher, *Die Beweglichkeit der negativen Ionen in Gasolin-, Wasserstoff- und Chlorwasserstoffflammen*. Zur Messung der Beweglichkeit der negativen Ionen wurde die Halleffektmethode angewandt; die horizontale oder vertikale Flamme befand sich in einem Feld von 4000—5000 Gauss. Die Beweglichkeit nimmt in einer H₂-Flamme mit der Temp. zu, in einer Gasolindampfflamme dagegen ausgesprochen ab. Der Zusatz von Cl, Bzl., CHCl₃, CCl₄, NH₄Cl oder J (in alkoh. Lsg.) zu den beiden vorgenannten Flammen erniedrigt die Beweglichkeit; Cl hat den stärksten Einfluß, der dann in der angegebenen Reihenfolge abnimmt. In der HCl-Flamme wurden niedrige Werte von 52 cm/sec pro V/cm erhalten. Der höchste erzielte Wert ist 5600 für die H₂-Flamme mit NaCl. (Physical Review [2] **26**. 807—19. 1925.) K. WOLF.

Henry A. Erikson, *Die Ionenbeweglichkeit der aktiven Niederschläge von Thorium und Radium*. Ein Luftstrom von 10 m/sec weht zwischen zwei Kondensatorplatten mit einer Potentialdifferenz von 3200 Volt hindurch. Das aktive Präparat wird in die Nähe des dem Winde zugekehrten Randes der oberen Platte gebracht. In der unteren Platte befindet sich ein dem Rande paralleler verschiebbarer Schlitz, hinter dem sich eine Ionisierungskammer öffnet. So wird die Ablenkung der von den Strahlen der aktiven Ndd. erzeugten Ionenströme mit dem Quadrantelektrometer nachweisbar. — Th, Ac u. Ra-Emanation erzeugen zwei deutlich verschiedene, bei diesen Elementen gleiche Ionenarten. Die Deutung dieses Ergebnisses bleibt noch offen. (Physical Review [2] **26**. 629—32. 1925. Univ. of Minn.) CASSEL.

Otto Hahn und Johannes Heidenhain, *Über hochemanierende Radiumpräparate*. (Vgl. LIEBIGS Ann. **440**. 121; Naturwissenschaften **12**. 1140; C. 1925. I. 609. 610.) Mit Radiothor versetztes Eisenhydroxyd weist ein Emanierungsvermögen von 80 bis 85% auf, wobei dieses definiert ist als das Verhältnis der bei Zimmertemp. aus der Substanz herausdiffundierenden Emanationsmenge zu der Gesamtmenge der von dem Radioelement gebildeten; es beweist die ungeheure Oberflächenentw. des untersuchten Präparates; die innere Oberfläche ist etwa 1 Million mal größer als die äußere sichtbare Oberfläche. Sehr viel kleiner ist die Oberfläche der grob krystallisierten Carbonate oder Sulfate, weshalb die Ra-Salze des Handels ihre Emanation nur zu einem kleinen Prozentsatz nach außen entweichen lassen, im Gegensatz zu Th- u. Aktiniumpräparaten. — Zweck vorliegender Unters. war der, Ra-Präparate zu gewinnen, die, ähnlich wie Th- u. Aktiniumpräparate, ihre Emanation im lufttrocknen Zustande entweichen lassen, also durch ein hohes Emanierungsvermögen ausgezeichnet sind (vgl. HERCHFINKEL, C. r. d. l'Acad. des sciences **149**. 275; C. 1909. II. 1410). Während die Haltbarkeit von den in oberflächenreicher Form im kolloiden Zustand hergestellten, zu verwendenden Ra-Salzen sehr beschränkt ist, war es aussichtsreicher, die Ra-Salze in solchen oberflächenreichen Ndd. einzubetten, die ihre große Oberfläche möglichst lange beibehalten. — Zur Best. der freiwillig aus dem Präparat nach außen diffundierenden Emanationsmenge zu der Gesamtmenge diente die Messung der Emanation selbst im *Emanationselektroskop*; dazu sind nur Ra-Mengen von 10⁻⁹ bis 10⁻¹⁰ g erforderlich; einfacher ist die Best. der γ -Strahlen des akt. Nd., wozu aber $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{20}$ mg Ra erforderlich sind. — Bei der Fällung einer Lanthanacetatlsg. (10 mg La pro cem) + einer Ra-Ba-Lsg., die pro cem ca. 4×10^{-5} g Ba u. 10⁻⁹ g Ra enthielt, mittels HF wurde das vorhandene Ra quantitativ mit ausgefällt. Die Ra-haltigen Lanthanfluoride besitzen sehr hohes Emanierungsvermögen, 3 Monate nach ihrer Herst. 68—69%,

unmittelbar nach der Herst. erheblich höher. Das Emanierungsvermögen sinkt beim Altern. Voraussetzung für das hohe Emanierungsvermögen ist, daß die Menge des La-Salzes groß ist zur Ra-Menge; ein steigender Ga-Gehalt beeinträchtigt stark die Emanierfähigkeit. — Da die mit La-Fluorid als Träger erhaltenen oberflächenreichen Ra-Präparate schnell altern u. nicht geeignet erscheinen, die übliche Methode zur Gewinnung der Ra-Emanation, die Herst. aus Lsgg., zu übertreffen, wurden mit anderen Erdfluoriden keine weiteren Verss. durchgeführt, u. an Stelle der oberflächenreichen Fluoride *Eisenhydroxyd* gewählt, das durch eine sehr große Oberflächenentw. ausgezeichnet ist u. diese ohne nennenswerte Alterung behält. Ausgetrocknete Präparate, deren Emanierungsvermögen gesunken war, regenerierten dieses in feuchter Luft. Außerdem ist das Eisenhydroxyd durch ein besonders stark entwickeltes Adsorptionsvermögen ausgezeichnet, so daß wl. Ra-Salze beim Fällen mit $\text{Fe}(\text{OH})_3$ im Überschuß immer quantitativ ausfielen, ob das Löslichkeitsprod. des Ra-Salzes erreicht war oder nicht. — Durch Fällen von Ra-Sulfat oder -Carbonat + FeCl_3 -Lsg. mittels NH_3 wurden Präparate erhalten mit einer Emanierfähigkeit von 98–99%, die in geringem Maße alterten; es konnten so auch sehr starke Ra-Präparate dargestellt werden. Die so gewonnenen Ra-Präparate zeigten über Jahre hinaus ein außerordentlich hohes Emanierungsvermögen. Eine weitere Verlangsamung der Alterung wird möglicherweise durch sorgfältige Reinigung der Ndd. u. Aufbewahren unter solchen Bedingungen, daß der Krystallisationsprozeß möglichst aufgehalten wird, ohne daß andererseits eine Adsorption der Emanation eintritt, erreicht. Die Präparate wurden in 70–90% Feuchtigkeit enthaltender Luft aufbewahrt. — Die im lufttrockenen Zustande ihre Emanation abgebenden Präparate bieten für mancherlei Verwendungszwecke einen Vorteil gegenüber den üblichen Ra-Präparaten. Sie sind vor allem zur Gewinnung der Emanation geeignet. — Zur Herst. konzentrierterer Emanationspräparate wird eine Apparatur beschrieben. — Die Präparate bieten weiter eine bequeme Quelle für die Gewinnung von *Radium D* u. *Polonium*: man stellt die Substanz in einem Gläschen in ein größeres Wägegglas; die Emanation sammelt sich in dem Gefäß an u. das entstehende Ra D u. Polonium setzen sich an den Wänden u. am Boden des Wägeggläschens ab. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 284–94. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Chem.)

BUSCH.

Irène Curie und Nobuo Yamada, *Über die von verschiedenen radioaktiven Substanzen ausgesandten α -Teilchen von langer Reichweite*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1487; C. **1925**. II. 2240.) Es wird für die α -Strahlen von *ThC* in Luft, O_2 u. CO_2 bis zu 3–4 at experimentell bestätigt, daß die Reichweite umgekehrt proportional dem Drucke ist. (Journ. de Physique et le Radium [6] **6**. 376–80. 1925.) K. W.

Nobuo Yamada, *Über die von Polonium und den aktiven Niederschlägen von Thorium und Radium ausgesandten Teilchen langer Reichweite*. (Vgl. vorst. Ref.) (Journ. de Physique et le Radium [6] **6**. 380–89. 1925. — C. **1925**. II. 2241.) K. WOLF.

F. K. Richtmyer, *Die sichtbare Form der X-Strahlenlinien und Absorptionsgrenzen*. (Vgl. RICHTMYER u. WARBURTON, Physical Review [2] **22**. 539; C. **1924**. II. 8.) Vf. untersuchte bei seinem Spektrometer (nach BRAGG) den Einfluß von Apparaturfaktoren auf die beobachtete Intensitätsverteilung von X-Strahlenlinien u. bei Absorptionsgrenzen. Es ergeben sich, wenn man von dem Einfluß des Krystalls (vgl. DAVIS u. STEMPFL, Physical Review [2] **19**. 504; C. **1923**. III. 1133) absieht, folgende drei Faktoren: Schlitzbreite, Schlitzhöhe u. ungleichförmige Energieverteilung über den Brennpunktort, die bei der Unters. der wirklichen Form von X-Strahlenlinien u. Absorptionskanten u. der Durchführung von Präzisionswellenlängenmessungen zu berücksichtigen sind. (Physical Review [2] **26**. 724–35. 1925. Cornell Univ.)

K. WOLF.

Robert Thoraes, *Die Röntgenspektren der leichteren Elemente*. Die Verss. wurden mit Hilfe eines Hochvakuum spektrographen ausgeführt. Als Reflexionsmittel für

die langen Wellen wurde Laurin- u. Palmitinsäure verwandt, weil einerseits ihre reflektierende Kraft groß ist u. andererseits ihr F. so hoch liegt, daß ein Verdampfen im Vakuum praktisch nicht eintritt. Die Gitterkonstanten dieser Stoffe sind bekannt; ein Nachteil des Verf. ist die Unschärfe der erhaltenen Linien langer Wellenlänge. Vf. nahm den Ort tiefster Schwärzung als den richtigen Wert an. Es werden zwei Arten von Röntgenröhren beschrieben, die eine besitzt sowohl eine bewegliche Kathode wie Antikathode, die andere nur eine herausnehmbare Antikathode. — Mit Hilfe der $L\alpha$ -Linien des Zn, Cu, Ni, Co wurden die Gitterkonstanten der Laurin- u. der Palmitinsäure nachgeprüft u. für $2d$ gefunden 54,536 Å bzw. 70,98 Å. Die $L\alpha$ - u. $L\gamma$ -Linien des Fe u. die $K\alpha$ -Linie des Fluors wurden gefunden u. bestimmt. Von Rb, Br, Se, As, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn u. Cr wurden die $L\zeta$ -, $L\eta$ -, $L\alpha_1$ -, α_2 -, $L\beta$ -Linien bestimmt u., soweit sie zu erhalten waren, in einer Tafel zusammengestellt. (Philos. Magazine [7] 1. 312—21. Upsala, Univ.)

HAASE.

Samuel K. Allison und **Alice H. Armstrong**, *Eine Nachprüfung der Wellenlängen und relativen Intensitäten in den K-Serien des X-Strahlenspektrums von Molybdän*. (Vgl. S. 833.) Es wurden für $d = 3,028 \text{ Å}$ folgende Wellenlängen bestimmt: $\alpha_2 = 0,71185$, $\alpha_1 = 0,707525$, $\beta_3 = 0,631354$, $\beta_1 = 0,630791$, $\gamma = 0,619526$. Die Differenz 0,000563 für $\beta_3 - \beta_1$ ist in guter Übereinstimmung mit der von COSTER bestimmten Differenz $L\beta_3 - L\beta_1$. Es werden ferner die Wellenlängen für $d = 3,02904 \text{ Å}$ u. die ν/R - u. $\sqrt{\nu}/R$ -Werte mitgeteilt. (Physical Review [2] 26. 701—13. 1925.)

K. WOLF.

Samuel K. Allison und **Alice H. Armstrong**, *Versuche über die relativen Intensitäten einiger X-Strahlenlinien im L-Spektrum von Wolfram und im K-Spektrum von Kupfer*. Die Verss. von DUANE u. PATTERSON (Proc. National Acad. Sc. Washington 8. 85; C. 1923. III. 714) über die starken Linien in den L-Serien von W wurden mit einem verbesserten App. wiederholt u. es wurden einige der schwächeren Linien untersucht. Der von DUANE u. PATTERSON gefundene Wert 10 für die relative Intensität von $L\alpha_1 : L\alpha_2$ wurde bestätigt. Das theoret. Verhältnis ist 9. Für die β -Gruppe ergab sich für die relativen Intensitäten $\beta_1 : \beta_2 : \beta_3 \dots \beta_9 : \beta_{10} = 100 : 49,3 : 15,0 : 7,7 : 4,7 : 2,0 : 0,4 : 0,68 : 0,60$. Für die γ -Gruppe wurde für die relativen Intensitäten gefunden $\gamma_1 : \gamma_2 : \gamma_3 : \gamma_4 : \gamma_5 : \gamma_6 : \gamma_8 = 100 : 14,0 : 22,3 : 7,0 : 3,0 : 2,3 : 1(?)$. γ_8 wurde nicht immer erhalten. Die Übereinstimmung des beobachteten Wertes des Intensitätsverhältnisses für $\beta_3 : \beta_4$ mit dem theoret. Wert 2 bestätigt die Stonesche Annahme, daß zweimal soviele Elektronen in der M_{22} -Bahn sind als in M_{21} . — Für die K-Serienlinien von Cu ergab sich als Mittel zweier Bestst. der relativen Intensität von $\beta : \gamma$ der Wert 100/2,4. (Physical Review [2] 26. 714—23. 1925. Harvard Univ.)

K. WOLF.

M. de Broglie und **A. Dauvillier**, *Spektrographische Untersuchungen über den Comptoneffekt*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 11; C. 1924. II. 2448.) Eine Zusammenfassung der von Vf. erzielten Versuchsergebnisse. (Journ. de Physique et le Radium [6] 6. 369—75. 1925.)

K. WOLF.

William Hamilton McVicker, **Joseph Kenneth Marsh** und **Alfred Walter Stewart**, *Teslalumineszenzspektren. VI. Einige Aminoderivate*. (V. vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 999; C. 1925. II. 520.) Bestimmt wurden die Emissionsspektren einiger arom. Aminoderiv. bei 1—2 mm Druck u. Expositionszeiten von 15 Min. Die Werte sind in Ångström-Einheiten angegeben. Anilin, starkes, kontinuierliches Spektrum von 2880—4000, Banden bei 2895, 2915, 2927, 2938, 2960, 2976, 2985, 2999, 3010, 3022, 3031, 3050, 3070, 3098, 3122, 3145, 3171, 3199 u. 3224. Monomethylanilin, starkes, kontinuierliches Spektrum von 2965—4250; Intensitätsmaximum bei 3300. Monoäthylanilin, starkes, kontinuierliches Spektrum von 2695—4250; Intensitätsmaximum bei 3340. Dimethylanilin, starkes, kontinuierliches Spektrum von 3025 bis

4300; Intensitätsmaximum bei 3420. *Diäthylanilin*, mittelstarkes, kontinuierliches Spektrum von 3010—4225; Intensitätsmaximum bei 3375. *i-Amylanilin*, starkes, kontinuierliches Spektrum von 2995—4300; Intensitätsmaximum bei 3340. *Benzylamin*, schwaches, kontinuierliches Spektrum von 2671—3390; diffuse Banden bei 2671, 2714 u. 2800. *Benzylanilin*, starkes, kontinuierliches Spektrum von 2980—4225; Intensitätsmaximum bei 3345. *Diphenylamin*, schwaches, kontinuierliches Spektrum von 3070 bis 3875. *Triphenylamin*, mittelstarkes, kontinuierliches Spektrum von 3260—4220. *Benzidin*, starkes, kontinuierliches Spektrum von 3200—4600; Intensitätsmaximum bei 3830. *Hydrazobenzol*, sehr schwaches, kontinuierliches Spektrum von 3050—4125; Intensitätsmaximum bei 3340. *Phenylhydrazin*, schwaches, kontinuierliches Spektrum von 2980—3640; sehr schwache Banden bei 3024 u. 3052. α -*Methylphenylhydrazin*, starkes, kontinuierliches Spektrum von 2940—4225; Intensitätsmaximum bei 3345. α -*Naphthylamin*, starkes, kontinuierliches Spektrum von 3320—4700; diffuses Band bei 3780, Anzeichen von Banden bei 3340, 3399, 3443 u. 3506. β -*Naphthylamin*, starkes, kontinuierliches Spektrum von 3280—4700; Intensitätsmaximum bei 3800. *Ammoniak*, zwei Maxima bei 3360 u. 3371 u. Banden von hier aus nach beiden Seiten nach 3286 u. 3450 auslaufend. Vielleicht noch Banden im Sichtbaren bei 5690 u. 6600. Zusammenfassend ergibt sich: NH_2 direkt am Benzolring haftend verschiebt die Emission nach Rot; Ersatz des NH_2 -Wasserstoffes durch Alkyl hat keinen tiefen Einfluß auf die Emission; ein Phenylrest in die NH_2 -Gruppe eingeführt schwächt die Intensität des Spektrums, ein zweiter Phenylrest erhöht sie schwächer, als der erste sie erniedrigt hat. Auffallend ist der starke Intensitätsunterschied der Spektren von Hydrazobenzol u. Benzidin, bei welcher die Intensität des Benzidinspektrums nicht auf die Nähe der Phenylkerne zueinander, sondern auf die primären Aminogruppen zurückzuführen ist. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 17—20. Belfast, Univ.) TAUBE.

Frank C. Hoyt, *Anwendung der Korrespondenzprinzipien auf relative Intensitäten in Serienspektren*. (Vgl. Physical Review [2] **25**. 174; C. **1925**. I. 2528.) Mathematisch. (Physical Review [2] **26**. 749—60. 1925. Univ. Chicago.) K. WOLF.

Léon Brillouin, *Die Rotationsspektren in der neuen Quantenmechanik mit dem Matrizenkalkül*. Mathemat. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 374—76.) ENSZLIN.

D. R. Hartree, *Dublett- und Triplett-Trennungen in den optischen Spektren als Zeichen, ob die Bahnen in den Rumpf eindringen*. Die Gültigkeit einer von LANDÉ (Ztschr. f. Physik **25**. 46; C. **1924**. II. 1052) abgeleiteten Beziehung zwischen den relativistischen Dubletts der Röntgenspektren u. den Dubletts u. Triplets der opt. Spektren ist begrenzt auf die Fälle, in denen das Elektron in den Rumpf eintaucht. Hierauf gründet sich die Unters. des Vfs. über das Eindringen von Elektronenbahnen in den Rumpf. p-Terme entsprechen eintauchenden Bahnen (außer bei Li-ähnlichen Atomen). Ob d-Terme ebenfalls Tauchbahnen entsprechen, ist nicht sicher, doch ist es für die d-Terme des Cs (I) u. Tl (I) wahrscheinlich. Diese Feststellungen stehen z. T. in Gegensatz zu den Bohrschen Bezeichnungen der Quantenzahlen. Weiter setzt sich Vf. kurz mit der Arbeit von HEISENBERG (Ztschr. f. Physik **32**. 841; C. **1925**. II. 1255) auseinander. (Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**. 904—18. 1925. St. John's Coll.) HANTKE.

Adolfo T. Williams, *Die spezifischen Linien der Bogenspektren*. Eine eingehende Betrachtung der Bogenspektren der Metalle der 1. u. 2. Gruppe des period. Systems führt zu folgenden Ergebnissen. Es gibt Linien, die allein dem Bogenspektrum u. nicht den Funkenspektren angehören. Chemisch verwandte Elemente haben ähnliche Bogenspektren. Die nicht klassifizierbaren Linien in den Spektren können den Elementen in instabilem Zustand (Orthoelementen) zugeschrieben werden. Die Auswahlregel wird bei den Bogenspektren mit wenigen Ausnahmen mit großer Exaktheit befolgt. Die Intensität der Linien wird von der Bohrschen Theorie beherrscht. Das Verhältnis A/C , wo A die Anzahl der Linien im Bogenspektrum, C die Anzahl

der Linien im Funkenspektrum bedeuten, gibt als Abhängige der Atomnummer graphisch dargestellt eine Funktion, die eine Umkehrung der Ionisierungsspannung—Ordnungszahl—Kurve ist. (Annales Soc. Cientif. Argentina **99**. 13—84. 1925. Buenos Aires.) HANTKE.

L. Vegard, *Über die Besprechung der Emissionsspektren des festen Stickstoffs und der festen Mischungen des Stickstoffs mit inerten Gasen.* (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1084; C. **1925**. II. 911.) Besprechung der früher erhaltenen Ergebnisse. Aus den Berechnungen ergibt sich, daß sowohl die Bande N_1 , N_2 u. N_3 wie die Serien ε u. η für den festen N_2 charakterist. sind u. daß sowohl die Serien, welche mit reinem N_2 erhalten wurden, wie die mit Ar u. Spuren N_2 erhaltenen allein dem N_2 angehören. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 211—13.) ENSZLIN.

W. H. B. Cameron, *Die Gewinnung einiger Spektren des Kohlenstoffs, Sauerstoffs und Stickstoffs in Gegenwart von Neon.* Das C-Spektrum in Ggw. von Ne verschiedenen Druckes wies wie bei Anwesenheit von He die Kometenschweifbanden, das C-Linienspektrum, negative C-Banden, CH- u. CS-Banden u. eine bisher unbekannte Art von Banden, die trotz langer Belichtung nur schwach aufgenommen u. daher nicht näher identifiziert werden konnte. Im allgemeinen waren sämtliche Linien schwächer als in He vorhanden. Das Spektrum der Ne- O_2 -Mischungen wurde unter Zuhilfenahme verschiedener elektr. Entladungen untersucht u. eine Anzahl von Linien verschiedener Intensität, je nach Stärke der Entladung, gefunden. Bei der Unters. der Ne- N_2 -Mischungen wurde eine Zunahme der Intensität der negativen Banden mit abnehmendem N_2 -Partialdruck beobachtet. Als einziger Unterschied zwischen den Verhältnissen, die beim He herrschen u. denen beim Ne, war die Abwesenheit von C-Bogenlinien in Ggw. von Ne zu erkennen. Beim Ar sind nur wenige der Linien vorhanden. (Philos. Magazine [7] **1**. 405—17.) HAASE.

N. K. Sur, *Über das Funkenabsorptionsspektrum des Eisens unter Wasser.* In dieser Unters. sollte die Brauchbarkeit des Funkenspektrums des Fe unter W. für kontinuierliches, ultraviolettes Licht geprüft werden. Das Funkenspektrum, das durch hochfrequenten Strom an Fe-Elektroden unter dest. W. erhalten wird, wurde mit dem Spektroskop analysiert. Aus den Ergebnissen war zu ersehen, daß diese Methode zur Gewinnung von Absorptionsspektren ebenso geeignet ist, wie die der Gewinnung des Spektrums im Ofen. Ferner zeigte sich, daß alle Multipletts, welche die drei höchsten Gruppen besaßen, nämlich d^1 , f^1 u. gelegentlich auch F^1 , in der Absorption erhalten wurden. (Philos. Magazine [7] **1**. 433—50. Allahabad, Univ.) HAASE.

N. K. Sur und **K. Majumdar**, *Über die Absorptionsspektren von Aluminium und Kobalt.* (Vgl. vorst. Ref.) In der Arbeit werden die Befunde der Absorptionsspektren des Al u. Co, die in einem Hochtemp.-Ofen gewonnen wurden, an Hand von übersichtlichen Tafeln zusammengestellt. Die $2p_1-2s$, $2p_2-2s$ -Linien des Al werden erst oberhalb 1520° absorbiert; für die höheren Glieder der $p\ s$ - u. $p\ d$ -Serien erfolgt dieselbe erst um 1700° .

Das Absorptionsspektrum des Co wurde von $4500\text{ \AA}$ bis $3000\text{ \AA}$ bei 2000° photographiert. Auch hier wurden die zu den f^1 , f^2 u. F^1 gehörenden Gruppen als Absorptionslinien erhalten. Nur die Linie $\lambda = 4190,709$ wurde nicht absorbiert, weil sie zu der Gruppe der Resonanzlinien gehört nach CATALAN u. BECHERT. (Philos. Magazine [7] **1**. 451—62. Allahabad, Univ.) HAASE.

Wilhelm Stenström und **Melvin Reinhard**, *Ultraviolette Absorptionsspektren von Blutserum und gewissen Aminosäuren.* (Vgl. S. 1109.) Die Absorptionsbande des Blutserums bei ca. $2800\text{ \AA}$ ist den anwesenden Eiweißstoffen, besonders den Tyrosin- u. Tryptophankomponenten zuzuschreiben. Die Absorptionsbande des Tyrosins ist in alkal. Lsg. gegen die größeren Wellenlängen verschoben u. nimmt an Intensität zu. In ähnlicher Weise, aber geringerem Ausmaße ändert sich die Absorption des Blutserums, wenn die $[H^+]$ unter $10^{-12,7}$ sinkt. Ein Gemisch von Tyrosin, Tryptophan,

Phenylalanin, Cystin, Glycin, Leucin u. Glutaminsäure in dem durch Blutanalyse angezeigten Verhältnis gab Absorptionskurven, von denen die bei $p_H = 12,7$ aufgenommene qualitativ mit der des Blutserums bei gleichem p_H übereinstimmt; quantitative Übereinstimmung fand sich nach Herabsetzung der Konz. jenes Gemisches um 25%. (Journ. Biol. Chem. **66**. 819—27. 1925. Buffalo, State Inst. f. the study of malignant disease.) SPIEGEL.

John Q. Stewart, *Verallgemeinerungen der Rayleighschen Formel für die molekulare Zerstreuung*. Vom Standpunkt der klass. Theorie aus diskutiert Vf. die einschränkenden Voraussetzungen, unter denen die Formel ursprünglich abgeleitet wurde u. die bekannten Verallgemeinerungen für dichte Medien (durch SMOLUCHOWSKI u. EINSTEIN) u. für anisotrope Moleküle (durch CABANNES u. KING). Nach demselben Verf. gelangt Vf. zu zwei neuen Verallgemeinerungen 1. für den Fall der „Resonanzstreuung“, 2. für den Fall von Gasgemischen. Zum Schluß kurze Erörterung der Beziehung zwischen Zerstreuung u. Opaleszenz. (Journ. Opt. Soc. America **11**. 581 bis 597. 1925. Princeton [N. J.]) CASSEL.


K. R. Ramanathan und **N. G. Srinivasan**, *Die optische Anisotropie einiger einfacher, anorganischer gasförmiger Verbindungen*. Messungen der Depolarisation von Licht, das durch HCl -, H_2S - u. NH_3 -Gas zerstreut wurde, ergaben eine Depolarisation in Richtung senkrecht zum einfallenden Strahl u. zwar in allen Fällen gleich 0,008, was einen hohen Grad opt. Symmetrie bedeutet. (Philos. Magazine [7] **1**. 491—96. Rangoon, Univ. Coll.) HAASE.

C. M. Sogani, *Über die optischen Eigenschaften von chromatischen Emulsionen*. An nicht homogenen Emulsionen, d. h. solchen, deren Teilchen keine einheitliche Größe haben, wird der Einfluß der Lichtintensität, der Schichtdicke der Emulsion, der Teilchengröße, der Konz. der dispersen Phase, der dispergierenden Kräfte u. der Lichtbrechung durch die Emulsion untersucht. Auf mathemat. Wege wird eine Beziehung zwischen dem Brechungsvermögen der Emulsion u. dem der beiden Phasen aufgefunden. Experimente konnten diese Beziehung bestätigen. — An homogenen Emulsionen, die durch Sedimentation gewonnen wurden, konnten keine kontinuierlichen Ringe, wie bei den inhomogenen Emulsionen, beobachtet werden, dagegen aber wohl definierte, kreisförmige Beugungsringe, deren nach der bekannten Formel berechnete Durchmesser mit den experimentell gefundenen gut übereinstimmten. An der Grenzfläche zwischen sedimentierter Emulsion u. klarer Fl. tritt totale Reflexion ein. (Philos. Magazine [7] **1**. 321—33. Calcutta.) HAASE.

Gerhard Jung, *Der Einfluß optischer Eigenschaften auf die Dickenmessung von Anlaufschichten*. Die Verdickungsgeschwindigkeit der Reaktionsschichten, die sich beim Überleiten chem. wirksamer Gase über polierte Metallplatten bilden u. als Interferenzfarben dünner Blättchen beobachtet werden können, wurde von TAMMANN u. seinen Schülern (vgl. TAMMANN u. MARAIS, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **135**. 137; C. **1924**. II. 166) gemessen. Dabei wurden einige Anomalien, wie sprunghafte Dickenänderung, plötzliches Anwachsen der Verdickungsgeschwindigkeit usw. beobachtet. Vf. legt dar, daß diese Anomalien auf die Dispersion des Blättchenmediums, auf die Dispersion der Unterlage des dünnen Blättchens u. den mit der Wellenlänge variierenden Phasenverlust bei Reflexion an metall. absorbierenden Unterlagen zurückzuführen sind. (Ztschr. f. physik. Ch. **119**. 111—22. Berlin, Physikal. chem. Inst.) R. SCHMIDT.

Francis Perrin, *Bestimmungen der mittleren Verweilzeit der fluoreszierenden Moleküle im aktiven Zustand*. Berichtigung einer früher angegebenen Formel der Verweilzeit (vg. C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 581; C. **1925**. I. 2210) u. Angabe von weiteren Möglichkeiten zur Berechnung derselben. Für *Erythrosin* berechnet sie sich zu $0,16 \cdot 10^{-8}$ Sek. u. für *Rose Bengale* zu $0,14 \cdot 10^{-8}$ Sek. in Lsg. mit verschiedenen Alkoholen u. für *Fluorescein* in alkal. Lsgg. von Gemischen aus Glycerin u. W. zu $0,4 \cdot 10^{-8}$ Sek. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 219—21.) ENSZLIN.

Bernhard Batscha, *Über die Fluoreszenz des Fluoresceins in sauren Lösungen*. Es wurde untersucht, ob u. in welchem Grade sich die Fluoreszenz einer stark verd. alkoh. Fluorescein-Lsg., die schon an u. für sich fluorescierte, obgleich mehrfach dest. ca. 95%ig. A. zur Lsg. genommen wurde, nach dem Zusatz von Säuren ändert. — Zur Anwendung kamen HCl, HBr, HNO₃, H₂SO₄, C₂H₂O₄, C₄H₆O₆, C₆H₈O₇ in 1/10-n. Stärke, indem sie allmählich u. in denselben Mengen zu gleichen Teilen der Fluoresceinlsg. hinzugesetzt wurden. — Bei den ersten 4 Säuren wurde ein rasches Ansteigen der Fluoreszenz bis zum Maximum der Intensität bemerkt, bei der Oxalsäure in etwas verringertem Maße u. am langsamsten bei der schwachen Wein- u. Citronensäure. Durch Einw. der Säuren schlug die ursprüngliche rötlich-gelbe Färbung in Grünlich-gelb um, wobei die Geschwindigkeit dieses Vorgangs parallel mit der Steigerung der Fluoreszenz verläuft. — Danach beeinflussen also H-Ionen auch in der gewöhnlichen Fluoresceinlsg. die Fluoreszenz in einem Grade, der bis zum Optimum der Fluoreszenz mit wachsender Konz. jener zunimmt. — Wenn man einen Überschuß von 1/1-n. Säuren (in gleichen Mengen) zu den alkoh. Fluoresceinlsgg. hinzusetzt, so wird die Fluoreszenz abgeschwächt, doch bei HCl u. HBr in viel höherem Grade als bei den anderen Säuren; diese Erscheinung erinnert an die „auslöschende“ Wrkg. der Halogenwasserstoffsäuren auf die Fluoreszenz des Chinins. — Die Ergebnisse der Unters. weisen deutlich auf eine Wesensgleichheit beider Lumineszenz-Erscheinungen, Fluoreszenz u. Phosphoreszenz (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 187; C. 1925. I. 1049) hin. Die Lumineszenzerscheinungen der festen u. gewöhnlichen (sauren) Fluoresceinlsgg. können deshalb vom gleichen Gesichtspunkt betrachtet u. die Annahme, daß das Fluorescein sich mittels freier Valenzen mit den Stoffen, die freie H-Ionen führen, zu instabilen, komplexen Moll. verbindet, auch auf die gewöhnliche saure Lsg. ausgedehnt werden. Durch jede Änderung des durch die Gleichung:



(R = Anion) veranschaulichten Gleichgewichtszustandes wird die Lumineszenz beeinflusst. — Aus dem Zusammenhang zwischen Reaktionsgeschwindigkeit u. Lumineszenz folgt, daß in einem u. demselben System vor allem Konz. u. Temp. einen wesentlichen Einfluß auf die Lumineszenzerscheinung nehmen müssen. — Die phosphoreszenzfähigen festen Fluoresceinlsgg. sind gegen Temp.-Erhöhung sehr empfindlich, auch in der gewöhnlichen, sauren Fluoresceinlsg. konnte eine Einflußnahme der Temp. betrachtet werden; die Fluoreszenz nahm beim Erhitzen ab u. kam beim Abkühlen mit ursprünglicher Stärke zurück. — Vom Standpunkte der kinet. Betrachtungsweise vollzieht sich der Übergang der Fluoreszenz in Phosphoreszenz von selbst, wenn die Reaktionsgeschwindigkeit entsprechend verringert wird. Dies ist der Fall in der starren Fluoresceinlsg., in welcher sich die Moll. nur langsamer bewegen können als in einer gewöhnlichen Lsg. Dadurch wird es möglich, daß unter sonst gleichen Bedingungen eine größere Lichtmenge absorbiert wird u. daß die Emission des Lichtes längere Zeit andauert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 311—15. Olmütz, Dtsch. Staats-Oberreal-schule.)

BUSCH.

A. Carrelli, *Über den zusammengesetzten photoelektrischen Effekt*. Theoret. Erörterungen über eine Arbeit von AUGER (vgl. S. 585). (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 82—87.)

GOTTFRIED.

Edward J. Lorenz, *Die sogenannte positive photoelektrische Emission (umgekehrter Effekt), und die Realität des Subelektrons*. Der umgekehrte photoelektr. Effekt ist ein unechter u. ist nicht zurückzuführen auf die Entladung positiver Elektrizität. Verss. an Öl, Glycerin u. Hg bestätigten dies. (Philos. Magazine [7] 1. 499—509. Pasadena, Cal. Inst. of Techn.)

HAASE.

William Rule, *Über die Änderung der E. M. K. einer photoaktiven Zelle, die einen fluoreszierenden Elektrolyten enthält, wenn die Menge des fluoreszierenden Materials in der Lösung geändert wird.* Mit Hilfe der üblichen Brückenschaltung u. unter Anwendung eines empfindlichen Instrumentes wird die E. K. einer verschiedene Mengen *Fluorescein* enthaltenden, stark verd. NaOH, sowohl im Dunkeln wie unter starker Beleuchtung der Elektrode mit dem Licht einer Quecksilberbogenlampe gemessen. Es ergab sich, daß die E. K. zunächst mit abnehmender Fluoresceinkonz. zunimmt, aber, wenn die Verdünnung einen gewissen Betrag überschreitet, sehr stark u. sehr plötzlich bis fast auf Null abnimmt. Vgl. zitiert noch einige analoge Vorgänge u. versucht für die eigenen Befunde eine theoret. Deutung. (Philos. Magazine [7] 1. 532—41. Newcastle-upon-Tyne, Armstrong Coll.) HAASE.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Abraham Lincoln Marshall, *Die galvanische Abscheidung von Zink aus schwefelsauren Lösungen.* Zur Messung der Ströme bis zu 15 Amp. u. mehr wurde ein passender Cu-Coulombmesser hergerichtet. Die Unterss. wurden bei verschiedener Temp., Stromdichte, Zn-Konz. u. Säuregehalt ausgeführt. Mit reinen Lsgg. steigt mit höherer Temp. stets die Menge des Zn-Nd., u. zwar um so schneller, je geringer der Zn-Gehalt u. je höher der Säuregehalt der Lsg. ist. Das Potential der Zn-Elektrode fiel mit steigender Dauer der Zn-Abscheidung, was sicherlich auf eine Vergrößerung der Oberfläche zurückzuführen ist. Außerdem hafteten die H₂-Blasen bei höheren Temp. fester am Zn an u. waren auch größer als bei niedrigeren Temperaturen. Dies zeigte auch die Oberfläche des abgeschiedenen Zn deutlich, denn bei 80° war sie ganz mit kleinen Kratern übersät; hier hatte sich das Zn um die Blasen herum abgeschieden. Die erhöhte Zn-Abscheidung mit steigender Temp. wird auf chem. Polarisation zurückgeführt. Einige Verss. wurden über die Wrkg. der Temp., Zn-Konz.- u. Säureänderungen auf den Kraftverbrauch der Zn-Zelle gemacht. Interessant sind die Wrkgg. der Verunreinigungen auf den Zn-Nd. Bei einem Cu-Gehalt von 0,75 g auf 850 cem u. höher wurde der Zn-Nd. stets schlecht, während bei geringem Cu-Gehalt u. bei 40 u. 60° die Zn-Abscheidung stets sehr gut war. Bei Zusatz von FeSO₄ zum Elektrolyten wurde der FeSO₄-Gehalt allmählich geringer, bis ein Konzentrationsgleichgewicht erreicht war. Nur eine Spur Fe ging in das abgeschiedene Zn. Bei 20° verzögert ein Mn-Zusatz die H₂-B. u. erhöht dadurch die Wirksamkeit. Bei höheren Temp. bildet sich MnO₂, das in der Lsg. suspendiert bleibt u. die Abscheidung verringert. Bei Sb zeigte sich nur bei 20° u. 1 mg Zusatz keine schlechte Einwirkung auf den Nd. (Trans. Faraday Soc. 21. 297—318. 1925.) WILKE.

G. Grube, R. Heidinger und L. Schlecht, *Über das elektrochemische Verhalten des Chroms.* I. Mitt. *Über das anodische Verhalten des Elektrolytchroms.* Die Aufnahme der anod. Stromdichtepotentialkurven von *Elektrolytchrom* bei verschiedenen Temp. in H₂SO₄, HCl, NaCl-Lsg. u. KOH zeigt, daß bei niederen Stromdichten aktives Cr primär zweiwertig in Lsg. geht. Der sekundäre Vorgang an einer Cr-Anode besteht in der B. von Chromsäure bezw. Chromat. Wird h. NaCl-Lsg. verwandt, so oxydiert sich bei niederer Stromdichte das gebildete Chromosalz zu Chromisalz u. erst bei hoher Stromdichte tritt B. von Chromsäure ein. In allen Fällen verlaufen die anod. Stromdichtepotentialkurven des aktiven Cr in zwei, durch einen Potentialsprung von mehr als 1 Volt getrennten Stufen. Auf der ersten Stufe ist in allen Lsgg., mit Ausnahme der 1. NaCl-Lsg., der Vorgang $\text{Cr} + 2 \oplus \rightleftharpoons \text{Cr}^{++}$ potentialbestimmend. In h. NaCl-Lsg. verläuft die erste Stufe bei den etwas edleren Potentialen der Rk. $\text{Cr}^{++} + \oplus \rightleftharpoons \text{Cr}^{+++}$. In alkal. Lsg. wird der Eintritt der *Passivität* des Cr aller Wahrscheinlichkeit nach durch eine Oxydschicht veranlaßt. In saurer Lsg. hingegen waren keinerlei Anhaltspunkte für Deckschichtbildung zu gewinnen, so daß hier wahrscheinlich die begrenzte

Geschwindigkeit des primären Anodenvorganges die Ursache des zur Passivität führenden Potentialsprunges ist.

Bleche aus Elektrolytchrom eignen sich besonders gut zur Vorführung der Passivitätsverss. Konz. HNO_3 wird mit verd. HCl überschichtet; beim Eintauchen eines aktiven Cr-Blechtes in die HCl -Schicht setzt sofort lebhaftes H_2 -Entw. ein, um bei Berührung des unteren Blechrandes mit der HNO_3 plötzlich abzubrechen. Erst nachdem das Cr wieder völlig von HCl umspült wird u. nach Berührung mit einem aktiven Blech beginnt die H_2 -Entw. von neuem. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 70—79. Stuttgart, Techn. Hochsch.) ULMANN.

Hugo Fricke, *Mathematische Behandlung der elektrischen Leitfähigkeit und Kapazität disperser Systeme. II. Die Kapazität einer Suspension leitender Sphäroide, welche von einer nichtleitenden Haut umgeben sind, für niederfrequenten Wechselstrom.* (I. vgl. Physical Review [2] **24**. 575; C. **1925**. I. 344.) (Physical Review [2] **26**. 678—81. 1925.) CASSEL.

Hugo Fricke, *Die elektrische Kapazität von Suspensionen roter Hundblutkörperchen.* Messungen in der Wechselstrombrücke mit Frequenzen von 800 bis $4,5 \cdot 10^6$ Perioden an Suspensionen von 10—84% Blutkörperchengehalt. Die nach der in vorst. referierter Arbeit gegebenen Theorie berechnete Kapazität des einzelnen Teilchens erweist sich als unabhängig von Frequenz u. Konz. u. von der Größe $0,81 \mu\text{F}/\text{qcm}$. (Journ. Physical Chem. [2] **26**. 682—87. 1925. Dep. of Biophysics Cleveland [O.]) CASS.

Mark Rabinowitsch, *Beiträge zur elektrischen Eigenleitfähigkeit von dielektrischen individuellen Verbindungen und metalloiden Elementen. I.—III. Mitt. Zur Erforschung des Mechanismus der elektrolyt. Dissoziation wurden Messungen der Eigenleitfähigkeit von Essigsäure u. den Chloressigsäuren vorgenommen. Soweit möglich wurden die Messungen auch unterhalb der FF. an den festen Krystallen durchgeführt u. insbesondere der Sprung der Leitfähigkeitswerte am F., der Auflockerungsgrad, festgestellt. Die Vers.-Anordnung gestattete noch Leitfähigkeitswerte von der Größenordnung 10^{-12} zu messen. Die Temp. wurde mittels eines Thermostaten bzw. Kryostaten von 0,1 bis $0,3^\circ$ konstant gehalten. Die für die Verss. bestimmten Präparate — Essigsäure, die 3 Chloressigsäuren, ihre Äthylester u. das Methylenchlorid, wurden durch wiederholte fraktionierte Dest. gereinigt. Um die Körper absolut trocken zu erhalten, wurden sie vor der Dest. mit P_2O_5 geschüttelt u. das Fraktionieren bis zur Konstanz der Leitfähigkeitswerte wiederholt. Die Ester wurden mit wasserfreiem CuSO_4 getrocknet. — Die Reihenfolge der Leitfähigkeiten für die Säuren ist: $\text{CH}_3\text{COOH} < \text{CH}_2\text{ClCOOH} > \text{CHCl}_2\text{COOH} > \text{CCl}_3\text{COOH}$; die Auflockerungsgrade in der Nähe der FF., d. h. das Verhältnis der Leitfähigkeit im festen zu der im fl. Zustand, haben für CH_3COOH bei 0° u. für CCl_3COOH bei 47° die Werte 0,34 bzw. 41, für CH_2ClCOOH bei 61° u. für CHCl_2COOH bei 0° die Werte 0,08 bzw. 0,098. — In absol. H_2SO_4 als Lösungsm. besteht dieselbe Reihenfolge der Leitfähigkeiten, dagegen ist sie in wss. Lsg. umgekehrt, eine Erscheinung, die WALDEN (Ztschr. f. physik. Ch. **54**. 205 [1905]) ebenfalls bei den Nitromethanen beobachtet hat. Die Chloressigsäuren sind in Bzl. assoziiert u. die Lsgg. leiten nicht; daraus ergibt sich für die Polarität der Säuremoleküle eine dem Assoziationsgrad analoge Abstufung, die ihrerseits der Polarität der Säuren im individuellen Zustand entspricht. — Betrachtet man die Dissoziation als Folge einer Polarität im Mol. selbst, so ergibt sich, daß durch Einführung eines negativen Substituenten in das CH_3 -Radikal der Essigsäure oder des Methans die Symmetrie im Mol. geschwächt, die Polarität gesteigert wird, womit ein Wachsen der Eigenleitfähigkeit u. des Wertes der DE. verbunden ist. Bei weiterer Einführung von Substituenten steigt die Symmetrie wieder, während Polarität, Eigenleitfähigkeit u. DE. abnehmen. — In wss. Lsg. dagegen sind an Stelle des am negativen Rest haftenden Protons hydratisierte H-Ionen $[\text{H}_3\text{O}]^+$ vorhanden, u. die Verbb. haben um so ausgeprägteren Salzcharakter, je mehr negative Substituenten eingeführt sind, so daß*

sich die umgekehrte Reihenfolge der Leitfähigkeiten ergibt. Aus der Tatsache dieser Umkehrung ist zu folgern, daß die „dissoziierende Kraft“ des Lösungsm. nicht in direkter Beziehung zur DE. stehen kann, da für W. die DE. = 80, für H_2SO_4 die DE. > 84 ist, also eine Beeinflussung der Leitfähigkeit in gleicher Richtung stattfinden müßte. Vielmehr ist für die elektrolyt. Dissoziation in erster Linie die DE. des gel. Stoffes selbst, dann erst die des Lösungsm. maßgebend. — Der Auflockerungsgrad ist bei Molekülgittern ein Maß für die im fl. Zustand erhöhte Ionenfreiheit im Vergleich zu der im starren Zustand, so daß bei Molekeln mit starker intermolekularer Ionisation beim Übergang vom festen in den fl. Zustand viel Ionen frei werden, d. h. der Auflockerungsgrad klein ist.

II. *Einige Kohlenwasserstoffe, organische Säuren und Systeme aus zwei schlecht leitenden Komponenten.* Unter Hinweis darauf, daß ein prinzipieller Unterschied zwischen gel. Stoff u. Lösungsm. nicht besteht, werden die Eigenleitfähigkeiten u. Auflockerungsgrade an 3 Gruppen von Objekten gemessen: 1. *Benzol, Naphthalin, Anthracen* u. einige ihrer Derivv., *Nitrobenzol, Benzoesäure, Brombenzol* u. *Brom-1-naphthalin*. 2. *i-Valeriansäure, Caprylsäure, Palmitinsäure* u. *Stearinsäure*, 3. einige Lsgg. in Bzl., Ä. u. CS_2 . Die Unters. der 1. Gruppe ergab, daß die Eigenleitfähigkeiten vom Bzl. zum Naphthalin merklich wachsen, dagegen die Werte für Anthracen u. Naphthalin fast gleich sind. Entsprechend der homöopolaren Natur dieser KW-stoffe haben die Auflockerungsgrade α große Werte. Durch Einführung von NO_2 , COOH u. Br in den Benzolkern steigt die Leitfähigkeit, während die α -Werte kleiner werden. — 2. Gruppe. Die Eigenleitfähigkeiten dieser Säuren sind viel kleiner als die der Essigsäure. — 3. Gruppe. Lsgg. von Palmitin- u. Stearinsäure in Bzl. u. Ä. Die Leitfähigkeiten nahmen unmittelbar nach der Auflösung ab u. stellten sich erst nach einiger Zeit auf konstante Werte ein, was auf *Solvolyse* von primär gebildeten, salzartigen Ätheraten zurückgeführt wird. — Bei Lsgg. von Naphthalin in Bzl. u. Ä. stellte sich der Endwert schneller ein. — Ferner wurde die Leitfähigkeit von J_2 in Bzl., Ä. u. CS_2 gemessen. — Die Unterss. haben ergeben, daß die Abstufung der Leitfähigkeitswerte für Stoffe, die einer chem. Reihe angehören, in gewisser Beziehung zu der Änderung des Mol. steht u. daß auch homöopolare Stoffe bis zu einem gewissen Grade als Ionenbildner zu betrachten sind.

III. *Die Eigenleitfähigkeit der Halogene.* (Vgl. PLOTNIKOW u. ROKOTJAN, Ztschr. f. physik. Ch. **84**. 365. [1913]). Die Eigenleitfähigkeiten von Br_2 u. J_2 im festen u. fl. Zustand wurden gemessen. Die positiven Temp.-Koeffizienten des Br_2 im fl. u. festen Zustand sprechen für die elektrolyt. Natur seiner Eigenleitfähigkeit. — Im festen J_2 wird wegen des positiven Temp.-Koeffizienten u. des Leitfähigkeitssprunges am F. ebenfalls elektrolyt. Leitung angenommen, dagegen spricht der negative Temp.-Koeffizient des geschmolzenen J_2 für metall. Leitfähigkeit, die darauf zurückzuführen wäre, daß neben elektrolyt. dissoziierten auch ionisierte Molekeln (positiv geladene Ionen u. freie Elektronen) vorhanden sind. — Zur Erklärung der elektrolyt. Dissoziation der elementaren Halogene nimmt Vf. an, daß in den Halogenen Molekeln mit verschiedener Polarität vorhanden sind, deren Mittelwert gemessen wird, u. daß die Zustände der einzelnen Molekeln zueinander in gewissen Quantenbeziehungen stehen. (Ztschr. f. physik. Ch. **119**. 59—69. 70—78. 79—86. Kiew, Polytechnikum.) R. SCHMIDT.

G. E. Gibson und T. E. Phipps, *Die Leitfähigkeit der Lösungen von Alkalimetallen in flüssigem Ammoniak und in Methylamin.* (Vgl. PHIPPS, LANSING u. COOKE, S. 2438.) Vff. messen die Leitfähigkeiten der blauen Lsgg. von Na u. K in fl. NH_3 u. von K, Cs u. CsJ in *Methylamin* bei verschiedenen Temp. Die Ergebnisse in NH_3 stimmen mit denen von KRAUS (Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 749; C. 1921. III. 813. KRAUS u. LUCASSE, Journ. Americ. Chem. Soc. **44**. 1941. **45**. 2551; C. 1922. III. 112. 1923. I. 1262) überein. Bei allen Verdünnungen ist die Leitfähigkeit eine Exponentialfunktion der Temp. In Methylamin

sind die Metalle weniger ionisiert als in NH_3 . Das Minimum der mol. Leitfähigkeit liegt in NH_3 bei niedrigeren Konz. als in Methylamin, aber die Leitfähigkeitskurven sind in beiden Lösungsm. vom selben Typus. Die Meßdaten sind tabellar. angegeben u. durch Kurven veranschaulicht. Daran schließt sich eine Diskussion der Ergebnisse, in welcher dargelegt wird, daß die gefundenen Leitfähigkeiten im Einklang stehen mit der Hypothese, daß die negativen Träger Elektronen, die an Lösungsmittelmoleküle gebunden sind, sind. Der Grad der Solvation nimmt mit steigender Temp. ab. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 312—26. Berkeley [Cal.], Univ.) JOSEPHY.

Richard Lorenz und **Josef Westenberger**, *Beiträge zur Theorie der elektrolitischen Ionen*. Nr. 31. *Die Überföhrungszahlen und das Ionenleitvermögen in Lithiumchlorid und Kaliumchlorid*. (30. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **145**. 277; C. **1925**. II. 1134.) Vff. ermitteln die Ionenbeweglichkeiten nach der von LORENZ infolge der von BJERRUM u. Vf. unabhängig voneinander gezogenen Schlußfolgerung von der praktisch vollständigen Dissoziation starker Elektrolyte entwickelten Theorie des Zusammenhangs zwischen Überföhrungszahlen u. Ionenleitvermögen für NaCl u. LiCl . Die Ergebnisse für BaCl_2 , CdCl_2 , CdBr_2 , KBr u. NaBr werden nicht veröffentlicht. — Die von anderen Forschern experimentell bestimmten Überföhrungszahlen für LiCl bei 18° werden als Funktion von der 3. Wurzel der molaren Konz. mit denselben nach der Lorenzschen Formel errechneten Funktionswerten graphisch verglichen. Hierbei tritt die Veränderung der Überföhrungszahl mit der Konz. deutlich hervor. — Bei einem Vergleich der Ionenbeweglichkeiten für Li u. Cl mit den von KOHLRAUSCH bestimmten Werten des molaren Leitvermögens von LiCl bei 18° läßt sich eine recht gute Übereinstimmung zwischen den aus dem Material sehr verschiedener Beobachter so ermittelten Werten erkennen. Für KCl wurde aus Messungen von BOGDAN u. JAHN die Überföhrungszahl des Anions in seiner Abhängigkeit von der Konz. zusammengestellt, und hieraus graphisch eine Überföhrungswerttabelle dargestellt. Aus den so gefundenen zwei Werten für die Ionenbeweglichkeit des Chlorions wurde ein Mittelwert berechnet u. mit den Kohlrauschschen Werten verglichen. Die Differenz schwankt je nach der Konz. zwischen 0,72 (0,0001 molare Konz.) u. 0,12 (0,01 molare Konz.) zugunsten des Wertes von KOHLRAUSCH. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **150**. 304—10. Frankfurt, Univ.) GOTTFRIED.

Niels Bjerrum und **Ludwig Ebert**, *Über einige neue Untersuchungen betreffend die Gemische starker Elektrolyte*. (Vgl. S. 2174.) Vff. zeigen, daß die Überföhrungsverss. mit KCl - NaCl -Lsgg. von SCHNEIDER u. BRALEY (Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 1121; C. **1923**. III. 989) auch durch die Theorie vollständiger Dissoziation gedeutet werden können, wenn man annimmt, daß die Beweglichkeit eines Ions im Gemisch seiner Beweglichkeit in der Lsg. des reinen Salzes bei gleicher totaler Ionenkonz. gleich ist. Ebenso ist die Annahme der Ionenkomplexe von WELLS u. SMITH (Journ. Americ. Chem. Soc. **42**. 185; C. **1920**. III. 3) nicht nötig, weil ihre Verss. in Einklang mit der Theorie vollständiger Dissoziation gebracht werden können unter der Annahme der Hydratation von K' u. Na' . Aus dem Vergleich von NaCl u. KCl ergibt sich, daß Na' um ca. 2,2 Moll. W. mehr bindet, als das K' , aus dem Vergleich von NaJ u. KJ , daß diese Differenz ca. 3,9 Moll. W. beträgt. (Kong. Danske Vidensk. Meddelelser. Mathematisk-fysiske Meddelelser. **6**. Nr. 9. 1—20. 1925. Kopenhagen, Landwirtsch. Hochschule.) BIKERMAN.

Linus Pauling, *Quantentheorie der Dielektrizitätskonstanten von Chlorwasserstoff und ähnlichen Gasen*. Umgestaltung der von W. PAULI jr. gegebenen Theorie durch Einführung halbstufiger Quantenzahlen u. Erweiterung derselben für niedrige Temp. Eine eingehendere Unters. soll mit Rücksicht auf die ungenügende Stütze durch die Erfahrung folgen. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 32—35. California Inst. of Techn.) CASSEL.

O. M. Corbino, *Thermoelektrische Kraft und Koeffizient von Hall*. Theoret. u. experimentelle Unterss. über das der Theorie nicht entsprechende Verh. von *Cu* u. *Bi* in dem Ausdruck **I**, der durch Einsetzen des Hall'schen Koeffizienten in die Gleichung **II** erhalten wird. *P* u. *Q* = zwei Metalle, n_p u. n_Q = die elektr. Konz. in

$$\text{I } E_{P,Q} = \frac{2}{3} \frac{\alpha}{e} \log \frac{R_p}{R_Q}, \quad \text{II } E = \frac{2}{3} \frac{\alpha}{e} \log \frac{n_Q}{n_p}$$

den beiden Metallen, R_p u. R_Q = Hall'sche Koeffizienten u. $\alpha/C = 4,27 \times 10^{-7}$ elektrostat. Einheiten. (*Atti R. Accad. dei Lincei*, Roma [6] **2**. 526—30. 1925.) GOTTFR.

H. B. Dixon und **W. F. Higgins**, *Über den Verbrennungspunkt von Gasen bei verschiedenen Drucken*. (Vgl. S. 29.) Die Verss. wurden in einem konzent. Röhrenapp. ausgeführt. In der innersten Röhre stieg das brennbare Gas, in der äußeren Luft oder O_2 empor. Dabei wurden sie auf eine bestimmte Temp. erhitzt u. dann gemischt. Die Zeit, die zwischen dem Mischen der Gase u. ihrem Verbrennungsbeginn verstrich, wurde gemessen u. die Temp., bis zu der die Gase erhitzt waren, wurde als Verbrennungstemp. für dieses Zeitintervall angenommen. Die Verss. ergaben höhere Verbrennungstemp. von H_2 in O_2 u. in Luft bei Normaldruck, als Vff. früher gemessen haben. Das wird durch die Änderung der Versuchsbedingungen erklärt. Für die Messungen unter Druck wurde die Apparatur noch einmal verändert u. die *Verbrennungstemp. von H_2 u. CH_4 in O_2 u. in Luft* gemessen. Bei den Messungen unter Druck variierte dieser bei Methan-Luft-Mischungen zwischen 100 mm u. 7 at. Für dasselbe Zeitintervall erhielten Vff. hier mit fallendem Druck steigende Verbrennungstemp. Bei CH_4 - O_2 -Mischungen gibt es ein Maximum der Verbrennungstemp. bei 200 mm Druck. H_2 -Luft-Mischungen zeigen bei gleichen Zeitintervallen mit steigendem Druck bis zu 1000 mm ein Ansteigen der Verbrennungstemp. (mehr als 100°). Bei Drucken über 1000 mm beginnt ein Sinken der Verbrennungstemp. Vff. suchen diese Maxima zu erklären. (*Memoirs & Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society*. **70**. 8 Seiten. Sep.) HANTKE.

W. T. David, *Drucke, die bei der Explosion von Gasgemischen hoher Dichte entstehen*. (Vgl. BONE, NEWITT u. TOWNEND, *Proc. Royal Soc. London*, Serie A **108**. 393; C. 1925. II. 1135.) Vf. bespricht die Erscheinung, daß das Verhältnis von Maximaldruck zu Anfangsdruck mit steigenden Anfangsdrucken zunimmt. Es werden besonders zwei Argumente dafür angeführt, 1. die vollständigere Verbrennung in dichteren Gemischen im Augenblick des Maximaldruckes u. 2. die Abnahme der spezif. Wärme der gasförmigen Verbrennungsprodukte bei hohen Tempp. in dem Maße wie die Gasdichte zunimmt. Die wahrscheinliche Richtigkeit dieser Annahme wird durch einige Verss. zu stützen gesucht. Benutzt wurden Gemische von *Sauerstoff* u. *Kohlenoxyd*, verdünnt durch verschieden große Mengen Ar, N_2 oder O_2 . Die angewandten Drucke schwankten zwischen 3 u. 75 at. (*Philos. Magazine* [7] **1**. 334 bis 337. Leeds, Univ.) HAASE.

André Pignot, *Über die adiabatische Entzündung von Kohlenstoffverbindungen*. Es wurden Verss. angestellt, die Grenzen der Entflammbarkeit von KW-stoffen mit reiner trockener Luft bei konstantem Druck u. in verschiedenen Gemischen festzustellen. Untersucht wurden *n-Hexan*, *n-Heptan*, *n-Octan*, *cyclo-Hexan*, *Bzl.*, *Toluol*, *m-Xylol*, *Mesitylen* u. A. Nach den gefundenen Kurven, welche nicht angegeben sind, unterscheiden sich die aromat. KW-stoffe deutlich von den aliphat. Die Schwankungen der Entzündungstemp. mit dem Prozentgehalt des Gemisches sind dabei viel ausgeprägter u. die Kurve zeigt ein Minimum. Bei 9-facher Volumkompression, bei welcher viele Verss. angestellt wurden, zeigt absol. A. eine dem Bzl. sehr ähnliche Kurve. Durch Zusatz von W. steigt die Entzündungstemp. Es tritt eine Abplattung der Kurve bis zu einem Minimum bei 40% W. ein. Es wurden auch Gemische mit Körpern, welche Explosionen verhindern (Antidetnantien), untersucht, z. B. *cyclo-Hexan* mit 10% *Toluidin*.

Die Stoffe haben nur geringen Einfluß auf die Entzündungstemp. Auch wurden Gemische von cyclo-Hexan-Bzl. untersucht, deren Kurven eine kontinuierliche Deformation ohne Anomalien zeigen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 376—77.) ENSZLIN.

Wm. J. Walker, *Die Veränderlichkeit der spezifischen Wärme in Beziehung zur dynamischen Wirkung der Gase und zur Zustandsgleichung*. Hochüberhitzter Wasserdampf strömt durch Düsen bekannter Form u. Größe, welche die Verbindung zwischen zwei Kesseln bilden, in denen Druck u. Temp. gemessen werden. Die durchgelassene Dampfmenge wird in einem Oberflächenkondensator niedergeschlagen u. ausgewogen, so daß auch die Strömungsgeschwindigkeit ermittelt werden kann. Größte Sorgfalt wird auf die Überhitzung verwendet, welche durch Heizdrähte bis auf 700° gesteigert wird. — Die Theorie des Vfs. (Philos. Magazine [6] **43**. 589; C. **1922**. I. 1266) gestattet Rückschlüsse auf die mittlere spezif. Wärme des Dampfes u. ihren Gang mit der Temp. Die Einführung variabler spezif. Wärmen bei konstantem Druck in die thermodynam. Beziehungen führt zu einer der Jeans-Dietericischen ähnlichen Zustandsgleichung, die bei hohen Temp. das sonst anomal erscheinende Verh. einiger Gase u. Dämpfe mit gutem Anschluß an die Erfahrung rationell begründet. (Philos. Magazine [6] **50**. 1244—60. 1925. Dundee, Univ.) CASSEL.

E. Lange und F. Dürr, *Thermochemische Prüfung einiger Alkalihalogenide auf Metastabilität*. (Vgl. WÜST u. LANGE, Ztschr. f. physik. Ch. **116**. 161; C. **1925**. II. 1415.) Die Angaben von BERTHELOT u. ILOSVAY (Ann. de Chimie [5] **29**. 295), wonach bei einigen Alkalihalogeniden, insbesondere bei KCl u. NaCl, ein Unterschied in den Lösungswärmen von ca. 170 cal/Mol zu bemerken sei, je nachdem, ob die Salze vorher geschmolzen wurden oder nicht, konnten Vf. trotz weitgehender Variation der Aufbewahrungsdauer u. -Temp. nicht bestätigen. Untersucht wurden KCl, NaCl u. NaBr. Es ergab sich somit keine Andeutung dafür, daß die Alkalihalogenide Gemische metastabiler Modifikationen darstellen. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 85—87. München, Akad. d. Wiss.) ULMANN.

W. A. Roth, *Einige Bemerkungen zu der Arbeit der Herren Swietoslawski und Popow: „Korrekturen an den thermochemischen Daten von P. Lemoult“*. (Vgl. SWIETOSLAWSKI u. POPOW, S. 599.) Die Liste der umgerechneten Zahlen ist unvollständig. LEMOULT scheint wiederkehrende Fehler bei seinen Messungen gemacht zu haben, so daß die Anwendung eines konstanten Umrechnungsfaktors nicht am Platze ist. LEMOULTS Verbrennungswärme von Styrol weicht um 1,2% von den Zahlen dreier anderer Forschergruppen ab, so daß der Korrektionsfaktor hier nicht 0,5, sondern 1,2% beträgt, ähnlich bei Styrolerivv. Für den Ersatz eines H durch eine Phenylgruppe berechnet Vf. bei Konjugation ein Inkrement von 718,0 kcal, in Verbb. ohne Konjugation 722,2 kcal. LEMOULTS Werte für Diphenylstyrol u. Styrol geben nur bei Korrektion um 1,2% einen damit übereinstimmenden Wert; die Schmelzwärme des Styrols wird zu 2,8 kcal berechnet. Neu bestimmt werden die spezif. Verbrennungswärmen von Diphenylamin (9053 cal₁₅ für 1 g, in Luft gewogen), von Phenacetin (7170 cal) u. von Azobenzol (8464 cal). LEMOULTS Zahlen sind 0,4, 1,4 bzw. 1,9% größer, so daß auch aus diesen Neubestst. folgt, daß ein konstanter Umrechnungsfaktor bei LEMOULTS Zahlen nicht am Platze ist. Der Grund, der das Zahlenmaterial von LEMOULT inhomogen macht, wird angegeben versucht. (Rec. trac. chim. Pays-Bas **45**. 248—56. Braunschweig, Techn. Hochschule.) ROTH.

R. Casares, *Molekularmechanik*. Unter Voraussetzung einer intramolekularen Anziehungskraft, die umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung wirkt, stellt Vf. eine Formel für das Gleichgewicht zwischen einer Fl. u. ihrem Dampf auf: $Cm^2 = Td$. Hierin bedeutet m die M. einer Molekel, T die Temp. u. d den Abstand zwischen den Moll. Für den fl. oder festen Zustand gilt $Cm^2 > Td$, für den gasförmigen $Cm^2 < Td$. Aus den Daten für den Druck von H₂O-Dampf bei verschiedenen Temp. berechnet Vf. aus obiger Gleichung den 0-Wert für T u. rechnet mit „Temp. der Tension“, die

von diesem 0-Punkt an rechnen. Für W. liegt er bei -56° . Der absol. Nullpunkt fällt mit diesem Nullpunkt der Tension bei einigen permanenten Gasen zusammen. Im Nullpunkt der Tension existiert kein gasförmiger Aggregatzustand, der Körper ist unl. usw. Diese Theorie wird an einigen Fällen demonstriert. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 23. 551—56. 1925. Málaga.)

HANTKE.

Max Trautz und **Oskar Emert**, *Die Abweichungen vom Daltonschen Teildruckgesetz*. Die Druckänderungen beim Mischen einiger anorgan. Gase werden von Vff. in einer besonderen Apparatur mit einer Genauigkeit von $\frac{1}{100}$ mm Hg untersucht u. ihre Abhängigkeit von Druck u. Temp. bestimmt. Die gefundenen Werte wurden mit den aus der van der Waals-van Laarschen Zustandsgleichung berechneten verglichen. Die berechneten Werte wichen über die Fehlergrenze der Messung hinaus von den experimentellen ab. Für die Messungen jedoch, die nur eine Genauigkeit bis $\frac{1}{10}$ mm Hg verlangen, ließen sich die Verhältnisse bei Gasgemischen mittels der Beziehungen aus der obigen Gleichung mit befriedigender Genauigkeit finden. Das Daltonsche Gesetz unter Benutzung der van der Waalsschen Zustandsgleichung zur Berechnung der Gasabweichungen der als rein vorgestellten Komponenten der Mischung gab zu große Drucke, ausgenommen bei der Mischung von H_2 mit den permanenten Gasen. Bei Gemischen gleich unidealer Gase gibt das einfache Gasgesetz die Druckverhältnisse besser wieder als eine Berücksichtigung der Abweichungen nur der reinen Komponenten vom Gasgesetz. Untersucht wurden folgende Gemische: $SO_2 + H_2$, $SO_2 + O_2$, $SO_2 + \text{Luft}$, $SO_2 + N_2$, $CO_2 + H_2$, $CO_2 + O_2$, $H_2 + O_2$, $H_2 + N_2$, $N_2 + O_2$, $CO_2 + \text{Luft}$, $CO_2 + N_2$, $O_2 + \text{Luft}$. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 150. 277—303. Heidelberg, Univ.)

GOTTFRIED.

W. Schottky, *Eine Verallgemeinerung der Fowlerschen Verteilungsstatistik*. Verallgemeinerung für den Fall, daß sich beim Verdampfen die Eigenschaften des Bodenkörpers kontinuierlich ändern. (Ann. der Physik [4] 78. 434—38. 1925.) CASSEL.

R. Miravalles und **E. Moles**, *Physikalisch-chemische Eigenschaften des Jodwasserstoffgases*. Die Dampfdruckkurve des Jodwasserstoffs zwischen -56° u. -35° wurde an einem besonders reinen, aus den Elementen hergestellten Präparat bestimmt. Die Messungen lassen sich durch die Formel $\log p = 7,20833 - 1025,71 \cdot 1/T$ darstellen. Als Verdampfungswärme berechnet sich ein Wert von 4916 cal. Der Kp_{760} des HJ liegt bei $-36,0^{\circ}$, sein F. bei $-50,0^{\circ}$. Aus der Tatsache, daß andere Forscher einen höheren Kp. u. einen niedrigeren F. fanden, wird geschlossen, daß das von den Vff. benutzte Gas von ganz besonderem Reinheitsgrad ist. Die Troutonsche Konstante des HJ wird zu 20,74 berechnet, das Gas ist also ein normaler, nicht assoziierter Körper. Die krit. Temp. wird nach der Regel von GULDBERG-GUYE aus der Temp. des Kp. zu $T = 420^{\circ}$ ermittelt. Dieser Wert steht in gutem Einklang mit den experimentellen Ergebnissen anderer Autoren. Schließlich wenden sich Vff. gegen die Behauptung von PANETH u. RABINOWITSCH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1138; C. 1925. II. 1947), daß HJ in seinem Kp. u. F. u. in seiner Verdampfungswärme einen anomalen Charakter äußert. Durch Vergleich dieser Daten von HCl, HBr u. HJ mit denen von den entsprechenden Edelgasen wird gezeigt, daß HJ sich ganz normal verhält. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 23. 509—23. 1925. Madrid, Lab. de Invest. Fisicas.)

HANTKE.

Worth H. Rodebush und **Alfred L. Dixon**, *Die Dampfdrucke von Metallen; eine neue Experimentalmethode*. (Vgl. S. 601.) Vff. benutzen zur quasi-stationären Methode der Dampfdruckmessung folgende Anordnung. Ein die Fl. enthaltendes Gefäß A, das zwecks Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Temp. von einem Heizmantel umgeben ist, ist durch ein vertikales Rohr C mit einem Manometer M u. einem mit einem neutralen unter geeignetem Druck stehenden Gas wie beispielsweise N_2 gefüllten Behälter verbunden, u. durch ein zweites vertikales Rohr B mit einer intermittierenden Pumpe verbunden. Außerhalb des Heizmantels ist zwischen B

u. *C* ein Differentialmanometer *D* eingeschaltet. Es werden nun sukzessive N₂-Mengen durch *B* weggepumpt bis das Manometer *D* eine bleibende Druckdifferenz zeigt; der dann an *M* abgelesene Druck ist der gewünschte Dampfdruck. Die Arbeitsweise der Anordnung beruht darauf, daß, wenn der Druck in *M* < Dampfdruck, N₂ zwecks Ausgleichs irgendeiner durch die Pumpe verursachten Druckdifferenz von *C* nach *B* nur durch Diffusion gegen den aufwärtsströmenden Dampf in *C* gelangen kann. Die nach obiger Methode gemessenen Werte für den Dampfdruck von Hg zwischen 170–203° sind durchschnittlich 0,04 mm größer als die von SMITH u. MENZIES (Journ. Americ. Chem. Soc. **32**. 1434. [1910]). Der Dampfdruck von Pb zwischen 1118° u. 1235° variiert von 5,70 mm bis 19,70 mm, in guter Übereinstimmung mit der Gleichung: $\log_{10} p \text{ (mm)} = -10\,372/T - \log_{10} T - 11,35$. Die Verdampfungswärme von Pb bei seinem F. wird zu 46 300 cal berechnet. Für die chem. Konstante *C*₀ (vgl. SIMON, Ztschr. f. physik. Ch. **110**. 572; C. **1924**. II. 1897) ergibt sich –1,40. (Physical Review [2] **26**. 851–58. 1925. Univ. Illinois.) K. WOLF.

Franklin E. Poindexter, Quecksilberdampfdruck bei niedrigen Temperaturen. (Vgl. HUGHES u. POINDEXTER, Philos. Magazine [6] **50**. 423; C. **1925**. II. 2322.) Vf. beschreibt einen modifizierten Buckleyschen Ionisationsmesser für einen Bereich von 10^{–2} bis 4·10^{–9} mm, der für die Dampfdruckmessung von Hg benutzt wurde. Es wurde zwischen 20° bis –80° gemessen. Die Meßwerte entsprechen den Gleichungen $\log_{10} p \text{ (fl.)} = 8,86 - 3,44 \cdot 10^3/T$ u. $\log_{10} p \text{ (fest)} = 9,35 - 3,55 \cdot 10^3/T$. Die Verdampfungswärme von Hg bei 20° bis –80° wurde aus der Beziehung berechnet: $\lambda = -Rd(\log p)/d(1/T)$. Oberhalb F. entsprechen die Ergebnisse der Gleichung $\lambda = 15\,900 - 10t$ (*t* = Temp.). Nach FOLGER u. RODEBUSH (Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 2080; C. **1924**. I. 1748) ist die Verdampfungswärme bei 142° von Hg 14 490 cal pro Mol. Vf. findet 15 700 cal bei 20° u. 16 300 bei –39,5°, oder eine durchschnittliche Abnahme von 10 cal pro Grad Temperatursteigerung. Ist obiger Wert bei 142° richtig, so ist der Temperaturkoeffizient von 20° bis 142° 9,9 cal pro Grad, also prakt. in guter Übereinstimmung mit den früheren Messungen. (Physical Review [2] **26**. 859–68. 1925. St. Louis, Washington Univ.) K. WOLF.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

A. Lottemoser, Über kolloide Elektrolyte. Zusammenfassender Vortrag über die Ionisationserscheinungen in Hydrosolen. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 347–53.) LEH.

Oscar Knefler Rice, Gleichgewicht in kolloiden Systemen. Im Anschluß an die Betrachtungen von TOLMAN (Journ. Americ. Chem. Soc. **35**. 307; C. **1913**. I. 2077) wird eine Verallgemeinerung der Phasenregel in einer auf neutrale u. elektr. geladene Kolloide anwendbaren Form ausgesprochen u. daraus abgeleitet, daß im Gleichgewicht nur Teilchen einer oder weniger bestimmter Größen existieren können. Die Gleichung für die Zahl der Freiheitsgrade *f* lautet: $f = 1 + c - r + nr + v - e$, worin *c* die Zahl der Komponenten, *r* die Zahl der Regionen, *n* die Zahl von Variablen, die außer den Zuss. zur thermodynam. Charakterisierung jeder Region erforderlich sind, *v* die Zahl anderer, nicht einer speziellen Region angehöriger Variabler, z. B. die Zahl der Kolloidteilchen, u. *e* die Zahl irgendwelcher zusätzlicher Beziehungen bedeutet; eine solche ist z. B. bei elektr. geladenen Kolloiden die Bedingung, daß die Gesamtladung 0 ist. Vf. entwickelt ferner die Gleichgewichtsbedingungen in kolloiden Systemen unter der Annahme verdd. Lsgg. mit inkompressiblen, gegenseitig unl. Phasen, wobei temporär (in bezug auf Austausch von Materie von Partikel zum Dispersionsmittel oder von Partikel zu Partikel ohne Änderung der Partikelzahl) stabile u. permanent (in bezug auf Austausch von Materie unter Änderung der Partikelzahl) stabile Gleichgewichte unterschieden werden. Im Anschluß daran wird eine Theorie der Koagulation entwickelt, deren mathemat. Folgerungen mit den experimentellen Ergebnissen von ELLIS (Ztschr. f. physik. Ch. **80**. 579; C. **1915**. I. 865), daß die Teilchengröße bei einem be-

stimmten krit. Potential sehr stark zunimmt, qualitativ übereinstimmen. Alle Einzelheiten der rein theoret. Arbeit müssen im Original nachgelesen werden. (Journ. Physical Chem. **30**. 189—204. Berkeley, Univ. [Cal.].)

KRÜGER.

A. Gutbier, Gustav F. Hüttig und **G. Linck**, *Zur Kenntnis des Pandermits*. (Experimentelle Mitarbeit von **R. Fahr** u. **B. Ottenstein**.) Unters. des natürlichen Pandermits der Lagerstätte Sultan Tschair ergab die Zus. $4\text{CaO} \cdot 5\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 7,61\text{H}_2\text{O}$. Aus der Abbaukurve (allmähliche Entwässerung) schließen Vff., daß die Art der Wasserbindung gleich der in den Zeolithen ist. Es handelt sich um eine Zwischenstellung zwischen der rein chem. u. der rein osmot. zu deutenden Art der Wasserbindung. Der auf die gleiche Art untersuchte *Colemanit*, $2\text{CaO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ergab eine gänzlich verschiedene Abbaukurve, wenn auch gleichartige Wasserbindung anzunehmen ist. Weiterhin untersuchten Vff. künstlichen Pandermits, sowohl ein frisch bereitetes kolloides Präparat, wie auch ein über H_2SO_4 gealtertes. Die Verss. geben eine künstliche Wiederholung des von LINCK (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1923**. 193; C. **1924**. I. 154) für die B. des natürlichen Pandermits angegebenen Vorganges u. gewähren einen Einblick in das Wesen von Vorgängen, die sich bei dem Übergang eines kolloiden Systems in ein mit Krystallwasser krystallisierendes System abspielen. Zweifellos ist bei einer großen Gruppe von Kolloiden die ausschlaggebende Ursache dafür, daß der Wasserdampfdruck der Systeme im Vergleich zu dem des reinen W. bei freier Oberfläche herabgemindert zu sein scheint, in der Capillaritätswrkg. zu suchen. In dem Maß, in dem man zu Kolloiden mit immer engeren Capillaren übergeht, gelangt man schließlich zu Systemen, deren Capillaritätsdurchmesser in die Größenordnung der Gitterabstände fällt. Hier können Verhältnisse obwalten, unter denen die osmot. Gleichung: $\ln p_0/p = K/n$ Gültigkeit erlangt (p = Dampfdruck des kolloiden Systems, p_0 = des reinen W., n = Anzahl der Mole W. in dem System, k = individuelle Konstante.) Ein solcher, die kolloiden Erscheinungen an die osmot. der Lsgg. anschließender, idealer Grenzfall ist selten realisierbar, z. B. im System der weißen Wolframsäure (vgl. HÜTTIG u. KURRE, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **126**. 167; C. **1923**. I. 1265), im allgemeinen finden sich starke Abweichungen, welche durch assoziations- oder dissoziationsähnliche Vorgänge oder durch Wrkg. von van der Waalschen Kräften zu deuten sind. Den von Vff. untersuchten Systemen käme eine Zwischenstellung zwischen den ideal kolloiden u. echten stöchiometr. Verbb. zu. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 79—84. Jena, Univ.)

ULMANN.

D. Graffi, *Untersuchungen über zufällige Doppelbrechung von Kolloiden in Bewegung*. Vf. berichtet über Doppelbrechung von in Bewegung befindlichem Bravaischem Eisen in einem Gefäß mit rechtwinkligem Querschnitt. Bei einigen untersuchten Fällen beobachtet Vf. mit gekreuzten Nikols vollständige Dunkelheit bei einer Stellung, die parallel mit der Achse des Gefäßes geht, während andererseits, ebenfalls bei gekreuzten Nicols u. Stellung 45° zur Achse, ein gleichmäßig helles Feld erscheint. Anschließend theoret. Erörterungen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **3**. 28—31.)

GOTTFRIED.

A. Pontremoli, *Betreffend einige neue Untersuchungen über die zufällige Doppelbrechung von Kolloiden in Bewegung*. Entgegnung auf die Arbeit von D. GRAFFI (vgl. vorst. Ref.) (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **3**. 75—77.)

GOTTFRIED.

H. Freundlich und **H. Dannenberg**, *Über die zeitliche Veränderung der Strömungsdoppelbrechung in Solen mit nichtkugeligen Teilchen*. I. u. II. Mitt. I. Das Verhalten des Vanadinpentoxysols. (Vgl. FREUNDLICH, STAPELFELDT u. ZOCHER, Ztschr. f. physik. Ch. **114**. 161; C. **1925**. I. 1852.) Das mit HCl aus einer NH_4VO_3 -Lsg. abgeschiedene V_2O_5 wurde mehrfach abzentrifugiert u. durch Schütteln mit W. peptisiert. Die Vermutung, daß der Gehalt an H_3PO_4 hemmend auf die als Alterung bezeichnete zeitliche Änderung der Strömungsdoppelbrechung wirke, bestätigte sich nicht, sondern die als Verunreinigung vorhandene Arsensäure wurde als Ursache dieser Erscheinung

erkannt. — Da NaCl zwar koagulierend wirkt, aber nur geringen Einfluß auf die Alterungsgeschwindigkeit hat, wird der Mechanismus der Alterung nicht als Koagulations- sondern als Krystallisationsvorgang angesehen, indem angenommen wird, daß sich das gel. V_2O_5 auf größeren Teilchen niederschlägt. Der Einfluß der Arsensäure besteht dann darin, daß sie an der Oberfläche der V_2O_5 -Teilchen adsorbiert u. dadurch die Krystallisationsgeschwindigkeit (K.-G.) vermindert wird. Die Abhängigkeit der K.-G. von der Konz. der Arsensäure läßt sich näherungsweise mittels der Adsorptionsisothermen berechnen. Der besondere Einfluß der Arsensäure wird in ihrem Isomorphismus mit der Vanadinsäure vermutet.

II. *Das Verhalten des Benzopurpurinsols.* (Vgl. FREUNDLICH, SCHUSTER u. ZOCHER, Ztschr. f. physik. Ch. **105**. 119; C. **1923**. III. 470.) Das Sol wird durch Zusatz von Elektrolyten doppelbrechend. Der Einfluß der Konz. von zugesetztem NaCl auf den Farbstoffgehalt der Lsg. u. die Veränderlichkeit der Doppelbrechung wurde untersucht. Bei einem NaCl-Gehalt von 40 Millimol/l ergab sich eine optimale Wrkg., d. h. der Farbstoffgehalt der Lsg. sank bei dieser Konz. am schnellsten u. die Doppelbrechung erreichte einen bestimmten Wert in der kürzesten Zeit. Im Gegensatz zum V_2O_5 -Sol wird die Alterung nicht durch Krystallisation, sondern durch geordnete Koagulation hervorgerufen. (Ztschr. f. physik. Ch. **119**. 87—95. 96—103. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physik. Chemie.) R. SCHMIDT.

N. K. Adam und G. Jessop, *Die Struktur dünner Häute.* VII. *Kritische Verdampfungsphänomene bei geringen Kompressionen.* (VI. vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A. **106**. 694; C. **1925**. I. 931.) Mit Hilfe eines neuen verbesserten App. konnte der Oberflächendruck monomolekularer Häute bei Zimmertemp. genau bis herab zu 0,01 Dyn/cm gemessen werden. Bei Flächen, deren Seitenlänge zwischen 100 u. 5000 Å lag, wurden Druckisothermen erhalten, die denen für Fl. u. Dampf im dreidimensionalen System ähneln. Die ausgebreiteten Häute sind den Fl. u. nicht den Dämpfen analog. Zu den Verss. fanden Laurin-, Tridecyl-, Myristyl-, Penta-decyl- u. Palmitinsäure Verwendung, ferner Dodecyl-, Tetradecyl- u. Hexadecylalkohol, die Äthylester der Laurin-, Myristyl-, Pentadecyl-, Palmitin-, Margar.- u. Stearinsäure u. endlich die Nitrile der Myristyl-, Pentadecyl-, Palmitin-, Margar.- u. Stearinsäure. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **110**. 423—40.) HAASE.

N. K. Adam und G. Jessop, *Mitteilung über die Ausbreitung fester Stoffe auf Wasseroberflächen.* Vf. setzt die Verss. CARY u. RIDEALS (S. 1126) fort bis herab zu sehr niedrigen Kompressionen. Ein geringer Druck, gleich dem der Häute in „gasförmigen“ Zustand stellt sich wenige Sekunden nachdem der Krystall die Oberfläche berührt hat ein u. der sogenannte zweidimensionale Dampfdruck kurze Zeit später. Die Verss. wurden an Myristylsäure ausgeführt. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **110**. 441—43.) HAASE.

David Wilbur Horn, *Einige abnormale Oberflächenspannungen.* Vf. führt Messungen der Oberflächenspannung an Seifen, Tannin, Saponin u. Süßholzwextrakt aus. Auffallend ist, daß große u. kleine Mengen Seifen die gleiche Erniedrigung der Oberflächenspannung hervorrufen, während mittlere Konz. von Seifen u. Tannin die Oberflächenspannung des W. erst auf ein Minimum erniedrigen u. bei zunehmender Konz. wieder erhöhen. Eigentlich müßten Seifen als Salze die Oberflächenspannung erhöhen. Vf. erklärt dieses abnormale Verhalten an Hand der Anschauungen von MC BAIN (Journ. Americ. Chem. Soc. **42**. 426; C. **1920**. III. 533), der die Seifen als kolloidale Elektrolyte bezeichnet, bei denen ein Ion durch eine hydratisierte Mizelle, die elektr. Ladung mit sich führt, ersetzt ist. In hohen Konz. ist die undissoziierte Substanz ein gewöhnliches Kolloid, in verd. Lsgg. findet ein allmählicher Übergang in den krystalloiden Zustand statt. (Amer. Journ. Pharm. **98**. 53—58.) LA.

Louis Kahlenberg, *Über die Trennung von Krystalloiden voneinander durch Dialyse.* Zur Dialyse von nichtwäßrigen Lsgg. diente eine Membran aus

vulkanisiertem Kautschuk. Als am besten geeignet für diese Verss. erwies sich *Pyridin*, ebenfalls brauchbar war *A.*, ferner KW-stoffe u. deren Halogensubstitutionsprodd., jedoch hatten letztere den Nachteil, daß sie zu langsam wirkten u. die Membran verschlechterten. Ester, Ketone, Aldehyde u. Nitrile waren unbrauchbar. — Substanzen, die sowohl in *Pyridin* als auch in KW-stoffen l. sind, dialysieren durch die Membran; Substanzen dagegen, die nur in *Pyridin* l. sind, nicht aber in KW-stoffen, treten nicht durch die Membran, weil Kautschuk prakt. ein KW-stoff ist. Viele auf dem genannten Verhalten der Stoffe beruhenden Trennungen durch Dialyse werden aufgezählt u. kurz besprochen.

Zur Unters. der Dialyse wss. Lsgg. diente die bekannte *Kupferferrocyanid-membran*, mit der die Trennung von *Zucker* u. *Harnstoff* vorgenommen wurde. — Der Herst. anderer halbdurchlässiger Membranen wurde große Aufmerksamkeit gewidmet. Im *Lanolin*, dessen W.-Aufnahmefähigkeit bekannt ist, hat Vf. eine geeignete Membran gefunden, sobald er Seide mit einer Lsg. von *Lanolin* in *Chlf.* tränkt. Eine große Anzahl von Trennungen anorgan. Stoffe von organ., wie auch anorgan. untereinander, wird mitgeteilt. Die Erklärung für das so merkwürdige Verhalten des *Lanolins* wird in dem Gehalt an *Cholesterin* gesucht. (*Philos. Magazine* [7] 1. 385—94. *Wisconsin, Univ.*) HAASE.

Helmut Mommsen, *Über den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf die Diffusion von Farbstoffen in eine Gelatinegallerte. (Ein Beitrag zum Zellpermeabilitätsproblem.)* Die von BETHE (*Biochem. Ztschr.* 127. 18; C. 1922. I. 1152) beobachteten Änderungen der Membrandurchlässigkeit infolge von Reaktionswechsel haben ihre Ursache in veränderter Adsorption, nicht aber in veränderter Diffusionsgeschwindigkeit. Diese wirkt nach der Exner-Eulerschen Formel den beobachteten Erscheinungen sogar entgegen, indem sie mit der Menge des durchtretenden Farbstoffes abnimmt. — Die Verss. des Vfs. wurden an *Eosin*, *Croceinorange G*, *Safranin T*, *Capriblan* u. *Rhodanin B* durchgeführt. Die Diffusionsgeschwindigkeit dieser Farbstoffe wurde beim Eindringen in saure bezw. alkal. Gelatine so beeinflußt, daß saure Farbstoffe durch die saure, alkal. durch die alkal. Gallerte verlangsamt wurden. Dabei ist es gleichgültig, ob der Farbstoff aus gallertiger oder wss. Lsg. diffundiert. — Die eingedrungenen Mengen sind in den Verss., bei welchen die Diffusion aus Gallertlsgg. erfolgt, den Diffusionswegen annähernd proportional. Bei der Diffusion aus wss. Lsgg. sind die eingedrungenen Mengen bei sauren Farbstoffen in der sauren, bei alkal. in der alkal. Gelatine größer. Dieses Verh. wird durch die geänderten Adsorptionsverhältnisse erklärt. Die Verss. stützen die Hypothese von BETHE über den Einfluß der $[H^+]$ auf die Permeabilität von Zellmembranen. (*Biochem. Ztschr.* 168. 77—87. *Frankfurt a. M., Inst. f. animal. Physiologie, Theodor-Stern-Haus.*) LASCH.

L. A. Munro und **F. M. G. Johnson**, *Die Sorption von Dämpfen durch Tonerde*. Vff. untersuchen die Adsorption von Wasserdampf durch Al_2O_3 bei Partialdrucken von 73—24 mm u. Temp. von 40—80°. Der von ihnen benutzte App. gestattet, eine gemessene Menge mit Wasserdampf bei bestimmter Temp. gesätt. Luft über das erhitzte Adsorbens zu leiten u. dessen Gewichtszunahme während des Vers. durch Wägung zu verfolgen. Das Al_2O_3 wurde durch Fällung mit NH_3 u. Erhitzen auf 300° gewonnen. Die 80°- u. 60°- u. der Anfangsteil der 50°-Isotherme entsprechen den Gleichungen von FREUNDLICH u. PATRICK, die 40°-Isotherme keiner von beiden. Die Troutonsche Adsorptionsregel ist annähernd gültig. Es werden Kurven gegeben, die die Abhängigkeit des Adsorptionsvermögens des Al_2O_3 von Temp. u. Wasserdampfkonz. zeigen. Das hohe Adsorptionsvermögen des Al_2O_3 für W. verglichen mit anderen Dämpfen läßt schließen, daß es sich nicht nur um Capillarkondensation, sondern um die Betätigung spezif., chem. Kräfte handelt. (*Journ. Physical Chem.* 30. 172—88. *Montreal, MC GILL Univ.*) KRÜGER.


James William Mc Bain, *Die scheinbare Viscosität kolloider Lösungen und eine Theorie der neutralen Kolloide als solvatisierte, aggregationsfähige Micellen.* (Vgl. Nature 115. 805; C. 1925. II. 991.) Die hohe Viscosität von Cellulosenitratlsgg. läßt sich nicht aus den Gleichungen von EINSTEIN oder HATSCHEK unter Annahme weitgehender Solvation ableiten, sondern wird offenbar durch die Ggw. verzweigter, durch Nebenvalenzen zusammengehaltener Aggregate, die Teile des Lösungsm. fest einschließen, bedingt. Ähnliche Struktur besitzen auch Sole anderer neutraler Kolloide, z. B. Seifensole. Hohe Viscosität ist demnach kein Zeichen für starke Solvation, sondern für geringe Dispergierung der Micellen. Das Lösungsvermögen von Fl. für Nitrocellulose hängt von ihrer Fähigkeit, die Bindungen zwischen den Kolloidteilchen unter B. von Nitrocellulose-Lösungsm.-Komplexen zu lösen, ab. Gelatinierung von Solen braucht nicht mit erheblichen Änderungen im Bau der Micellen verbunden zu sein; es genügt, wenn an einzelnen Stellen ihrer Oberfläche Nebenvalenzen frei werden, um die Partikeln lose miteinander zu verknüpfen. (Journ. Physical Chem. 30. 239—47. Bristol, Univ.) KRÜGER

B. Anorganische Chemie.

E. Dufilho, *Darstellung reinen Chlors aus Salzsäure und einem Alkalichlorat.* Die Umsetzung von NaClO_3 mit HCl nach $\text{NaClO}_3 + 6\text{HCl} = 3\text{H}_2\text{O} + \text{NaCl} + 3\text{Cl}_2$ gibt eine sehr gute Ausbeute an Chlor, jedoch ist die Rk. bei gewöhnlicher Temp. sehr gefährlich, da sich Cl_2O , Cl_2O_3 und Cl_2O_4 als Nebenprodd. bilden, die äußerst heftig explodieren. Da keine der letzteren Verbb. über 70° beständig ist, wird die Rk. techn. brauchbar, wenn von Anfang an bei Temp. von 95 — 100° u. in Ggw. eines großen Überschusses von HCl gearbeitet wird. Während des Krieges sind nach diesem Verf. täglich mehrere hundert Tonnen Chlor ohne das geringste Unglück gewonnen worden. — Der Vf. empfiehlt das Verf. zur Herst. von Cl im Laboratorium. Der Entwicklungskolben (2 l) wird mit 200 ccm W. + 100 ccm konz. HCl beschickt. In das kochende Gemisch läßt man 500 ccm HCl (21°Bé) und eine Lsg. von 80 g NaClO_3 im Liter gleichzeitig zu ungefähr gleichen Mengen eintropfen, wobei erstere unbedingt im Überschuß sein muß. Die Gew.-Mengen reichen für 50 l Cl . Vor dem Trockenturm wird ein Rückflußkühler angebracht, um W.- u. HCl -Dämpfe zurückzuhalten. — Wird das NaClO_3 statt in W. in NaCl -Lsg. aufgelöst, so kann zur Zers. konz. H_2SO_4 Verwendung finden. (Zusammen mit 250 g H_2SO_4 läßt man 1 l 25%ig. NaCl -Lsg., der ca. 70 g NaClO_3 enthält, eintropfen.) (Bull. soc. pharm. Bordeaux 63. 41—47. 1925.) HARMS.

K. A. Hofmann, Walter Linnmann, Helene Galotti, Hermann Hagenest, Ulrich Hofmann, *Oxydation von gebundenem Stickstoff zu Salpeter bei niederen Temperaturen und Reduktion von Salpeter zum Cyanid.* Vff. fanden, daß man den 3-wertigen N aus NH_3 , Nitriden, Cyanamiden, Cyanaten, Cyaniden bei Tempp., die weit unterhalb Rotglut liegen u. sich der Zimmertemp. nähern, mit den verschiedensten Oxydationsmitteln, wie Chloraten, Superoxyden u. insbesondere mit Luft-O auffallend glatt, zum Teil fast quantitativ in Nitrat überführen kann, wenn man die Ggw. von W. tunlichst ausschließt, wie dies für die Salpeterplantagen auch geboten ist. — Dem oxydierbaren N kommt die besondere Fähigkeit zu, in O-haltige Oberflächen einzudringen, um ohne Absplitterung von N-Gas oder Stickoxyd das Nitrit u. das Nitrat zu bilden, woraus die starke Affinität des N-Atoms zum O erhellt (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 818; C. 1924. II. 294). Dies zeigt sich auch bei Stoffen mit amid-, imid-, nitril- oder nitridartig gebundenem N. Die Natur des Oxydationsmittels spielt bei der Nitrat-B. keine Rolle. — Ein 3—4% NH_3 enthaltender trockner Luftstrom vor bedeutender Geschwindigkeit kann bei 400° u. darunter an bas. Kontakten restlos nitrifiziert werden; hierfür eignet sich Natronkalk, u. als Beschleuniger sind u. a. wirksam Ag, Au, CuO u. besonders Nickeloxyd; der Prozeß ist der natürlichen Sal-

Salpeterbildung vergleichbar, übertrifft ihn aber an Leistungsfähigkeit. — Die Ggw. von W. ist für die Salpeterbildung nicht erforderlich. — Der aus dem NH_3 stammende N dringt in die krystallinesten Körper ein zur Nitrit-Nitratbildung, ohne daß die labilen Zwischenprodd. NO u. NO_2 nach außen verloren gehen oder die B. des N_2 -Mol. stattfindet. Letzteres führt zu der Annahme, daß der O gleichzeitig mit der Oxydation der an 3-wertigen N gebundenen Atome oder Gruppen den N oxydiert, so daß keine N-Valenzen freigelegt werden, die mit ihresgleichen das N-Mol. $\text{N}\equiv\text{N}$ bilden würden. Der eindringende O verdrängt die an N gebundenen H-, C- oder Metallatome, indem er trennend zwischen diese Bindungen eintritt u. ohne Valenzwechsel den 3-wertigen N in Nitrit überführt, das sich schnell zum Nitrat weiter oxydiert. — Die *Autoxydation von Natriumamid* (vgl. SCHRADER, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **108**. 44; C. **1919**. III. 853) führt über $\text{NaNH}_2\cdot\text{O}_2$ bei feuchter Luft zu hydrat. Na_2O_2 , in trockenem O zu NaNO_2 . Dies kann stattfinden, wenn NaNH_2^* in schlecht verschlossenen Flaschen aufbewahrt wird u. kann dann beim Schmelzen mit organ. Stoffen Explosionen bewirken. Auch die *Oxydation von freiem NH_3* etc. durch freien O wird eingeleitet durch Anlagerung von Peroxyd-O etc. nach dem Schema:



Auch bei der techn. NH_3 -Verbrennung wird der N im NH_3 fast quantitativ oxydiert, u. die B. des N_2 -Mol. unterbleibt nahezu gänzlich, wenn die Temp. nicht über 600° steigt. —

Versuche. Die Nitritmengen wurden zusammen mit dem entstandenen Salpeter bestimmt; Cyanat u. Cyanamid wurden vorher durch sd. verd. H_2SO_4 , KOH u. Erhitzen auf 150° zers. — Die *Einw. von NO auf KClO_3* verlief neben dem Zerfall in Chlorid u. O nach der Gleichung: $2\text{NO} + 2\text{KClO}_3 = 2\text{KNO}_3 + \text{Cl}_2 + \text{O}_2$. Die Umsetzung zu KNO_3 u. KCl begann bei 210° u. verlief bis 300° beschleunigt. Der frei werdende O oxydiert überschüssiges NO zu Nitrit u. Nitrat. Im N_2O -Strom zerfällt KClO_3 in Chlorid u. O, ohne daß Nitrit u. Nitrat auftreten. Erhitztes Chlorat ist gegen H u. CO träge. — *Kaliumcyanat* gibt mit KClO_3 erhitzt, Gasentw. u. starke Explosion; die Rk. kann durch gebrannten Kalk oder trockne Soda gemäßigt werden, wobei ohne Feuererscheinung CO_2 , Chlorid u. KNO_3 entsteht. — *Harnstoff* verpufft mit Na_2O_2 beim Erwärmen; nach Verd. mit gebranntem Kalk entsteht viel Nitrat. — *Magnesiumnitrid* gibt mit Na_2O_2 beim Erwärmen ohne Feuererscheinung NaNO_3 . — *Kalkstickstoff* gibt mit BaO_2 bei $60\text{--}80^\circ$ Nitrit u. sehr viel Nitrat; mit Na_2O_2 ohne Feuererscheinung NaNO_3 u. Spuren Nitrit. — Bei der *Oxydation von Kaliumcyanat*, NH_3 , *Kalkstickstoff* mit Luft bei niederen Temp. u. der *Red. von Nitrat zum Cyanid* wurde die Temp. bei 400° u. darunter gehalten, um das entstehende Nitrat vor der Zers. durch die regulierend wirkenden Ausgangsstoffe zu bewahren. — Beim KNO_3 wird durch organ. Staubeilchen schon bei 415° schwache Gasentw. veranlaßt; von 465° an wird O entwickelt unter Nitritbildung; die Zers. erreicht bei 580° eine erhebliche Geschwindigkeit. — Aus $\text{NC}\cdot\text{OK}$ u. Luft wurde mit Na_2CO_3 KNO_3 erhalten. Die Ausbeuten stiegen nach Beimengung von Cu, Ni, bas. Kupfercarbonat, Nickelcarbonat u. Ag (in dieser Reihenfolge); bei 460° sanken die Ausbeuten auf die Hälfte; nächst dem Ag erweist sich auch Au gut wirksam. Kleine Mengen W.-Dampf wirken günstig, wohl wegen primärer Spaltung des Cyanats in Carbonat u. NH_3 . — Der O tritt an die Stelle von C im $\text{N}\equiv\text{C}\text{—}\text{OK}$ -Molekül, u. bildet zunächst wohl Nitrit, das schnell zu Nitrat weiteroxydiert wird. Da $\text{NC}\cdot\text{OK}$ durch Oxydation von KCN entsteht, gilt dasselbe auch für die Überführung von Cyanid in Nitrat. — Die B. von KCN bei der Red. von Nitrat mittels Kohle u. Salpeter ergab nur schlechte Ausbeuten,

*) Im Original steht auf S. 207, Zeile 5 v. o. anstatt Natriumamid versehentlich Natriumsuperoxyd. D. Referent.

bei höheren Temp. vielleicht bessere, u. ist nicht als Umkehrung der Nitrifizierung von Cyanid-Cyanat anzusehen, insofern, als der N seinen Platz verläßt u. nachträglich als Gas auf das glühende Verbrennungsprod., K_2CO_3 u. überschüssige Kohle zurückwirkt. — Die Oxydation von NH_3 durch Luft zu Nitrat gelingt bei Temp. unterhalb Rotglut, wenn die Gase auf bas. Kontakte geleitet u. geeignete Überträger zugesetzt werden. — *Techn. Kalkstickstoff* (Calciumcyanamid + C + Kalk) von 18,33% N-Gehalt läßt sich schon bei Temp. unter 200° nitrifizieren, wenn man ihn, mit Natronkalk u. CuO vermischt, in flacher Schicht mehrere Tage lang der Luft aussetzt. Bis 450° wächst die Rk.-Geschwindigkeit, doch darf man anfangs nicht über 400° gehen. Von den Überträgern erwies sich hier wie bei der NH_3 -Oxydation *Nickelcarbonat* als der wirksamste. — Sehr geringe Mengen W.-Dampf dürften auf die Nitratbildung beschleunigend wirken. — Es liegt hier doch wohl eine direkte Oxydation des im Calciumcyanamid gebundenen N zum Nitrat vor, die durch gewisse Hilfsmittel sehr beträchtlich beschleunigt werden kann, besonders durch erhöhten Druck. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 204—12. Berlin, Techn. Hochsch.) BUSCH.

A. Schmidt, *Über den Einfluß von Wasserdampf und Chlorwasserstoff auf die Zersetzungsgeschwindigkeit von Ammoniak*. Der hemmende Einfluß von Wasserdampf u. HCl auf die Zerfallsgeschwindigkeit von NH_3 wurde untersucht u. zunächst mittels der Methode der strömenden Gase die Zerfallsgeschwindigkeit von trockenem NH_3 gemessen. Als Reaktionsgefäß diente eine außen glasierte Porzellanbirne von 100 ccm Inhalt mit capillarer Zu- u. Ableitung. Das entstandene N_2/H_2 -Gemisch wurde über W. aufgefangen, das unzersetzte NH_3 in $1/10$ -n. HCl absorbiert. Die Verss. wurden bei 800 — 1000° ausgeführt u. ein fortwährendes langsames Steigen der Zerfallsgeschwindigkeit beobachtet: am 1. Tag wurden in 0,39 Min. 28,7%, am 5. Tag in 0,16 Min. 64,4% NH_3 zersetzt. Als Ursache dieser Erscheinung wurde die durch Reduktionswrkg. des zerfallenden NH_3 bewirkte Abscheidung von metall. Fe auf der Innenwand der Porzellanbirne erkannt, wodurch die weitere Zers. katalyt. beschleunigt wird. — Bei Ggw. von Wasserdampf in genügender Konz. wird die Abscheidung von Fe infolge der Rückläufigkeit der Rk. $Fe_3O_4 + 4H_2 = 3Fe + 4H_2O$ u. damit die katalyt. Zers. des NH_3 verhindert. Die schützende Wrkg. von HCl erklärt sich dadurch, daß durch zersetztes NH_3 abgeschiedenes Fe als Chlorid verflüchtigt wird. Zersetzungsverss. an Koks zeigten, daß der Zerfall des NH_3 in dem Maße langsamer wird, wie durch Einw. von HCl das im Koks enthaltene Fe fortdestilliert. (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 1146—54. 1925. Berlin, Univ. Physik.-chem. Inst.) R. SCHMIDT.

A. Thiel, *Über das Schmelzen des Kohlenstoffs*. Kritisierung der Arbeiten von LUMMER (Verflüssigung der Kohle u. Herst. der Sonnentemp., Vieweg u. Sohn, 1914), FAJANS bezw. RYSCHKEWITSCH (Ztschr. f. Elektrochem. **31**. 54. 63; C. 1925. II. 387) u. KOHN u. GUCKEL (Ztschr. f. Physik **27**. 305; C. 1924. II. 2233) u. Verss., eine Erklärung der Verschiedenheiten der F.-Temp. zu finden auf Grund der capillarelektr. Beziehungen. Vf. gelangt zu der Folgerung, daß der F. des C im Krater eine Funktion der örtlich herrschenden Ladungsdichte ist. Die von LUMMER beobachteten Flimmererscheinungen sind auf abwechselndes Schmelzen u. Erstarren infolge von örtlichen Verschiedenheiten der Ladungsdichte zurückzuführen, die örtlichen Helligkeitswechsel sind verursacht durch das verschiedene Emissionsvermögen von Fest u. Flüssig. Nach THIEL (Ztschr. f. Elektrochem. **12**. 257. [1906]) tritt wegen der verschiedenen Beladungszustände u. somit verschiedenen Oberflächenspannungen ein Fließen der Oberfläche von Orten niederer nach Orten höherer Oberflächenspannung ein. Auch der fl. C wird durch Kapillarkräfte von den Stellen höchster elektr. Belastung nach Stellen geringerer Belastung abfließen. Bei Vergrößerung des Kraters durch Erhöhung der Stromstärke wird sich das sichtbare Schmelzphänomen nach den Kraterwänden hinziehen. Die Vorstellungen des Vfs. sind nur eine Hypothese, denn es ist noch nicht erwiesen, daß sich die großen Temp.-Differenzen bei der F.

Best. von C durch capillarelekt. Erscheinungen erklären lassen. (Sitzungsber. d. Ges. zur Beförd. d. ges. Naturwiss. zu Marburg 1925. 9 Seiten. Sep.) SITTIG.

M. Ussanowitsch, *Dilatometrische Untersuchung des Natriumcarbonats*. Der Umwandlungspunkt des Dekahydrats der Soda in das Heptahydrat wurde dilatometr. (vgl. MEYERHOFFER, Ztschr. f. physik. Ch. 3. 448. [1889]) mit Petroleum als Meßfl. zu 31,85° festgestellt. (Ztschr. f. physik. Ch. 119. 139—40. Kiew, Univ.) R. SCHMIDT.




H. E. Watson und **M. Rajagopalan**, *Über die Reaktion zwischen Natriumsulfit und Schwefel*. Zum Zweck der techn. Darst. von $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ wurde die Rk. zwischen Na_2SO_3 u. S untersucht. Zur Analyse wurde das Reaktionsgemisch mit 0,5-n. H_2SO_4 mit Methylorange als Indicator titriert; der Endpunkt zeigt den Übergang von Sulfit in Bisulfit an. Dann wurde vom suspendierten S abfiltriert u. vom Filtrat so viel zu einer bestimmten Menge 0,1-n. Jodlsg. gegeben, bis diese entfärbt wurde; die dabei entstandene HJ wurde mit 0,1-n. NaOH-Lsg. u. Phenolphthalein titriert. Wenn a ccm 0,1-n. Jodlsg. u. b ccm NaOH verbraucht wurden, berechnet sich der Prozentgehalt von in Thiosulfat umgewandeltem Sulfit zu $100(3a-2b)/(3a-b)$. — Als günstigste Temp. wurde 80° gefunden, bei der die Rk. in 1 Stde. beendet ist, wenn 4 Mole S u. 22 Mole H_2O auf 1 Mol Na_2SO_3 angewandt werden. Ferner wird die Rk. durch schnelles Rühren beschleunigt, ebenso durch Zusatz von Na_2S , jedoch durch letzteres in stärkerem Maße nur bei niedrigen Temp. — Bzgl. des Reaktionsmechanismus wurde festgestellt, daß die Geschwindigkeit der Rk. durch die Menge des gel. S u. nicht durch die Konz. des Sulfits bestimmt wird; es wird angenommen, daß die Rk. in 2 Phasen verläuft: 1. Lsg. des S bis zu einer bestimmten Menge, 2. Verb. des gel. S mit dem Sulfit. Behandelt man den S vor der Rk. mit Sulfitlsg., so geht bedeutend weniger S in Lsg. (Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 275—86. 1925. Bangalore, Indian Inst. of Sc.) R. SCHMIDT.

Alfred Benrath, *Untersuchungen über komplexe Thalliumverbindungen*. Mit **H. Weiland** u. **H. Hamacher** untersucht Vf. eine Reihe von *Thalliumschöniten*. Bei diesen Doppelsalzen ist das Tl_2SO_4 immer die weniger l. Komponente, das Vitriol muß daher bei im Umwandlungsintervall befindlichen Salzen in der Lsg. im Überschuß sein, damit die gesuchte Verb. rein auskristallisieren kann. Die Gleichgewichtsverhältnisse werden graph. gebracht. — *Kupfer(2)-Thallium(1)-sulfat*, $\text{CuSO}_4 \cdot \text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, blaue Krystalle, sie verlieren bei 185° ihr W. u. schmelzen bei ca. 300°. Zersetzungspunkt in konz. Lsgg. zwischen 25,6 u. 25,8°. — *Nickel(2)-Thallium(1)sulfat*, $\text{NiSO}_4 \cdot \text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, grasgrüne Krystalle; das erst oberhalb 300° völlig entwässerte Salz ist gelb, geschmolzen orangerot. Beim Lösen in W. tritt scheinbar keine Spaltung ein, doch müssen die Lsgg. metastabil sein. — *Zink-Thallium(1)sulfat*, $\text{ZnSO}_4 \cdot \text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, farblose Krystalle, die nicht mit W. gewaschen werden dürfen, da schon zwischen 11,2 u. 11,4° Zers. eintritt. — *Kobalt-Thallium(1)sulfat*, $\text{CoSO}_4 \cdot \text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, tiefrote Krystalle, die bis 155° ihr W. abgeben, geschmolzen blau. — *Eisen(2)-Thallium(1)sulfat*, $\text{FeSO}_4 \cdot \text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, hellgrüne Krystalle, die schon bei 0° stark zersetzt sind. — *Mangan(2)-Thallium(1)-sulfat*, $\text{MnSO}_4 \cdot \text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, blaßrosa Krystalle, zersetzlich. — *Magnesium-Thallium(1)-sulfat*, $\text{MgSO}_4 \cdot \text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, weiße Krystalle, mit W. schon bei 0° zersetzt. — Mit **G. Ammer** bestimmt Vf. eine wl. Doppelverb. *Cadmium-Thalliumchlorid*, $\text{CdCl}_2 \cdot 2\text{TlCl}$, welche sich aus einer Lsg. von TlCl mit mehr als 6% CdCl_2 ausscheidet.

Thallium(1)-thallium(3)-sulfate. Bearbeitet von **E. Kircheisen**. II. (I. vgl. A. BENRATH u. H. ESPENSCHIED, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 121. 361; C. 1922. II. 476.) Im Doppelsalzintervall tritt bei tiefen Temp. das Salz 1:5, bei hohen dagegen 1:1 auf. Vff. bemühen sich, die Existenzbedingungen der einzelnen Salze aufzuklären, als Lösungsm. diente 14% H_2SO_4 , unter welchen Bedingungen ein Salz 1:3 nicht beständig ist. Graph. werden die Existenzfelder der Verb. Tl_2SO_4 , $(\text{Tl}_2\text{SO}_4)_5 \cdot \text{Tl}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Tl}_2(\text{SO}_4)_3$ u. $\text{TlOH}\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ wiedergegeben; die Löslichkeits-

bestst. wurden bei 18, 45 u. 60° vorgenommen. — Bei der gravimetr. Best. des TI nach J. MEYER (vgl. J. MEYER u. H. WILK, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **132**. 239; C. **1924**. I. 1493) fand Vf. nach Verss. mit **Michelsohn**, daß die Temp. des Trocknens von TI_2O_3 bedeutend höher als 70° zu nehmen ist, Befunde von RABE (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **55**. 130; C. **1907**. II. 1218) bestätigend. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 21—30. Bonn, Univ. u. Aachen, Techn. Hochsch.) ULMANN.


A. Benrath, *Studien über komplexe Kupfersalze*. (Vgl. vorst. Ref.). 1. *Komplexe Kupferthiosulfate*. Bearbeitet von **H. Niehaus**. Zwecks Aufklärung der Konst. komplexer Kupferthiosulfate untersuchen Vff. die beim Zusammengeben von $CuSO_4$ u. $Na_2S_2O_3$ sich bildenden Systeme von *Natrium-Kupfer-(I)-thiosulfat*. Vgl. ROSENHEIM u. STEINHÄUSER (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **25**. 72; C. **1900**. II. 713). Für den Bodenkörper, welcher sich bei den Bedingungen vorfindet, unter welchen die Löslichkeitskurve einen Knick aufweist, finden Vff. die Zus. $Cu_2S_2O_3 \cdot Na_2S_2O_3 \cdot 2H_2O$. Die Mischbarkeit dieses Doppelsalzes mit $Na_2S_2O_3$ ist unbegrenzt, mit $Cu_2S_2O_3$ geht sie bis zur Verb. $5Cu_2S_2O_3 \cdot 4Na_2S_2O_3 \cdot 9H_2O$. Die nach ROSENHEIM u. STEINHÄUSER hergestellten *Kalium-Kupfer-(I)-thiosulfate* untersuchen Vff. in wss. Lsg. u. in Ggw. von $K_2S_2O_3$. Die grüne Verb. $Cu_2S_2O_3 \cdot K_2S_2O_3 \cdot 2H_2O$ zersetzt sich schnell; in Ggw. von verd. $K_2S_2O_3$ -Lsg. bildet sich das gelbe $Cu_2S_2O_3 \cdot 2K_2S_2O_3 \cdot 3H_2O$ (ROSENHEIM u. STEINHÄUSER fanden $2H_2O$). Dieses ist metastabil u. geht leicht in das weiße $Cu_2S_2O_3 \cdot 2K_2S_2O_3$ über. Die Existenzgebiete der drei Salze legen Vff. durch Löslichkeitsbest. fest. Mit gasförmigem NH_3 gibt das gelbe K-Salz die weiße Verb. $Cu_2S_2O_3 \cdot 2K_2S_2O_3 \cdot NH_3$ (I.); das Na-Salz mit $2H_2O$ die Verb. $Cu_2S_2O_3 \cdot Na_2S_2O_3 \cdot 2NH_3$ (II.). Eine eindeutige Formulierung gestatten die Unterss. der Vff. nicht. Das W. scheint in den Hydraten mit dem S_2O_3 -Rest verbunden zu sein: $[Cu_2(S_2O_3 \cdot H_2O)_2]K_2$, $[Cu_2(S_2O_3 \cdot H_2O)_3]K_4$, $[Cu_2(S_2O_3)_3]K_4$. Bei der NH_3 -Einw. ist es aber unwahrscheinlich, daß NH_3 das H_2O ersetzt, es tritt wohl an das Cu. Die der K_4 -Verb. entsprechende Na_4 -Verb. konnte nicht erhalten werden, wohl aber das *Cupri-cupro-natriumthiosulfat-ammoniak*, $2Na_2S_2O_3 \cdot Cu_2S_2O_3 \cdot 5NH_3$ (III.).



2. *Ammino-Kupfer-(2)-cyanurate*. Bearbeitet von **H. Meckenstock**. Auf Grund der Unterss. von AD. KLAUS u. O. PUTENSEN (Journ. f. prakt. Ch. [2] **38**. 208) liegen vor: $Cu(C_3N_3O_3H_2)_2 \cdot 2NH_3$, WIENEMANNs violettes Salz; $Cu(C_3N_3O_3H_2)_2 \cdot 3NH_3$, WÖHLERS violettes Salz u. $Cu(C_3N_3O_3H_2)_2 \cdot 4NH_3$, WÖHLERS blaues Salz. Vff. stellen die Existenzbereiche der drei Verbb. fest, bei Unters. der Lsgg. ergaben sich keine Anhaltspunkte für das Auftreten NH_3 -ärmerer oder -reicherer Verbb. Trockenes NH_3 -Gas wirkt auf die $2NH_3$ -Verb. nicht ein, mit feuchtem Gas wird die $4NH_3$ -Verb. erhalten. — 3. *Kupferalkalicarbonate*. Bearbeitet von **H. Essers**. Behandelt man bas. Kupfer-(2)-carbonat mit einer h. Lsg. von K_2SO_3 u. $KHCO_3$ in W., so bildet sich ein dunkelblaues Salz der Zus. $K_6[Cu(CO_3)_4]$, ll. in W., worin es sich aber zersetzt u. das hellblaue Salz $K_2[Cu(CO_3)_2]$ fällt aus. Rührt man letztere Verb. bei 25° mit W., so erhält man hellgrünes $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$. Die gleiche Zers. tritt in Lsgg. auf, die in 100 g W. 20 g $KHCO_3$ u. 0—80 g K_2CO_3 enthalten. Bei höherem K_2CO_3 -Gehalt bildet sich ein grasgrüner Bodenkörper, *neutrales Kupfer-(2)-carbonat*, $CuCO_3$, der sich abnutschen u. mit CO_2 -haltigem W. waschen läßt, reines W. wandelt in bas. Carbonat um. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 31—40. Aachen, Techn. Hochsch.) ULMANN.

Lothar Wöhler und **O. Schliephake**, *Die Silicide des Calciums und Magnesiums*. Nach Darst. einer erst bei 1560° erweichenden u. gegen Silicide beständigen *Tiegelmasse*, bestehend aus Bolus u. Tonerde (5:2), woraus sich Tiegel u. dünne Schutz-

röhrchen für das Thermoelement gießen lassen, gelang es Vff., die therm. Analyse Ca-reicher Silicide durchzuführen. Aus dem aufgenommenen Diagramm ergibt sich B. u. F. (1220°) des schon früher (vgl. L. WÖHLER u. F. MÜLLER, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **120**. 49; C. **1922**. I. 527) erhaltenen *Calciummonosilicids*, CaSi , sowie die von S. TAMARU (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **62**. 81; C. **1909**. I. 1688) angenommene Verb. *Calciumdisilicid*, CaSi_2 , F. 1020°. Außerdem wird das *Dicalciummonosilicid*, Ca_2Si , F. 920° mindestens wahrscheinlich gemacht; seine leichte Zers. erschwert die Charakterisierung. Ergebnisse von Potentialmessungen stützen diese Befunde. — Von Mg-Siliciden finden Vff. das von R. VOGEL (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **61**. 46; C. **1909**. I. 435) schmelzanalyt. nachgewiesene *Dimagnesiumsilicid*, Mg_2Si u. *Magnesiumsilicid*, MgSi . Bei langsamer Abkühlung der Schmelze wird nur Mg_2Si erhalten. Das Beständigkeitsgebiet von MgSi liegt vermutlich im Flüssigen oberhalb 1050°, es wird bei intensivem Abschrecken kleiner Mengen auf unter 600° erhalten, oberhalb dieser Temp. lagert es sich langsam in Mg_2Si um. Da aber gleichzeitig sich aus Mg_2Si Mg verflüchtigt u. schließlich, schnell bei über 1100°, völliger Zerfall in die Elemente eintritt, so ist auch hier als unbeständiges Zwischenprod. MgSi anzunehmen.



(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 1—20. Darmstadt, Techn. Hochsch.) ULMANN.

L. Blanc und G. Chaudron, *Untersuchung über die Umwandlung und die Oxydation des Chromsesquioxids*. $\text{Cr}_2\text{O}_3\alpha$ (blau) wandelt sich beim Erhitzen an der Luft bei 500° in das olivgrüne $\text{Cr}_2\text{O}_3\beta$ um, wobei die Umwandlungstemp. sich in Ggw. von inerten Gasen u. im Vakuum verschiebt. Beim plötzlichen Erhitzen gehen die bei 200° entstandenen Verbb. CrO_2 u. Cr_5O_9 (MANCHOT u. KRAUSS) bei 440° unter starker Wärmeentw. in $\text{Cr}_2\text{O}_3\beta$ über. Dabei entsteht auch etwas schwarzes Oxyd. Hält man die Oxyde einige Stdn. auf 350°, so erhält man eine Mischung von $\text{Cr}_2\text{O}_3\beta$ u. einem schwarzen Oxyd, welches zwischen 450 u. 500° unter Wärmeabsorption in $\text{Cr}_2\text{O}_3\beta$ übergeht. CrO_3 zers. sich bei 300° unter Wärmeentw. zu einem schwarzen Oxyd, welches sich ebenfalls bei 450° wie vorher in $\text{Cr}_2\text{O}_3\beta$ umwandelt. Genau analog verhält sich durch Schmelzen in Borsäure hergestelltes Guignetgrün. Es geht bei 200° in das schwarze Oxyd über u. bei 500° bildet es unter Wärmeabsorption $\text{Cr}_2\text{O}_3\beta$. Das schwarze Oxyd hat die Zus. Cr_5O_9 . Die Umwandlung des $\text{Cr}_2\text{O}_3\alpha$ in $\text{Cr}_2\text{O}_3\beta$ geht also über Cr_5O_9 u. Cr_5O_{10} . (C. r. d. Acad. des sciences **182**. 386—88.) ENSZLIN.

Le Blanc und H. Sachse, *Versuche zur Darstellung von reinem Nickelmonoxyd* (NiO). Verss. zeigen, daß es auch durch noch so starkes Glühen von bas. Nickelcarbonat an der Luft nicht möglich ist, zu vollkommen reinem NiO zu gelangen. Wird dagegen das Abkühlen des geglühten Prod. in prakt. O_2 -freiem, getrocknetem N_2 vorgenommen, so ist ein von höheren Oxyden freies NiO erhältlich, welches je nach der Darstellungstemp. 0—1% W. enthält. Auch durch Zers. von Nickelcarbonat im Vakuum bei Temp. über 280° bildet sich die reine Verb. mit weniger als 0,5% W. Wird in indifferenten, durch CaCl_2 getrockneter Gasatmosphäre bei 300° gearbeitet, so zeigt das von höheren Oxyden freie NiO einen Wassergehalt von 5—6%. Eine ähnliche Zus. hatte auch die aus schwarzem Oxyd durch Red. mit H_2 bei 100° hergestellte Verb. Oxydation von fein verteiltem Ni an der Luft lieferte ganz ungleichmäßige, schwarz bis grau gefärbte Prodd. — Zur Best. der dem bei verschiedenen Versuchsbedingungen erhaltenen NiO beigemengten Verunreinigungen an höheren Oxyden, arbeiten Vff. eine Methode aus, welche auf der Rk. mit HJ ($\text{KJ} + \text{HCl}$), die unter J-Abscheidung verläuft, beruht, u. bei völliger Ausschaltung des Luftsauerstoffes zufriedenstellende Ergebnisse ergab. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 58—62. Leipzig, Univ.) ULMANN.

Ellen Gleditsch und C. Chamié, *Beitrag zum Studium der chemischen Eigenschaften des Mesothorium 2 und des Actiniums*. Mesothorium 2 (MsTh_2) wurde nach einer Methode von YOVANOVITCH aus Mesothorium 1 hergestellt. Da das MsTh_2 fast immer

die seltenen Erden begleitet, wurden einige einfache Rkk. mit einem Gemisch von Cererden (I) u. einem solchen von Yttererden (II) angestellt. MsTh_2 wurde 2 g von I u. 2 g MgCl_2 beigegeben, die Lsg. mit NH_4OH gefällt u. das Mg in das Pyrophosphat verwandelt. Das gesamte MsTh_2 geht mit den seltenen Erden in den Nd. Beim Zufügen zu einer Lsg. von II u. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, Füllen mit NH_4OH , Ausziehen des $\text{Al}(\text{OH})_3$ mit NaOH bleibt es ebenfalls im Nd. Eine Probe von I u. II als Sulfate mit MsTh_2 zeigte beim Zugeben einer konz. Lsg. von K_2SO_4 bis zum Verschwinden des Nd-Spektrums in der Lsg., daß nur noch 2,3—2,4% des MsTh_2 in der Lsg. blieben. Beim Füllen einer Lsg. von I mit einer alkal. Lsg. von KMnO_4 bleibt das MsTh_2 bei den Erden in Lsg., während das ausgefällte $\text{Ce}(\text{OH})_4$ vollkommen inakt. ist. Radiothorium geht dabei mit in den Nd. des $\text{Ce}(\text{OH})_4$. Die Hydroxyde von I wurden in W. suspendiert mit MsTh_2 versetzt. Beim Zufügen von Br_2 geht das La u. mit ihm 87,4% des MsTh_2 in Lsg. Diese Ergebnisse können auch auf Ac angewandt werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 380—81.)

ENSZLIN.

Fritz Ephraim und Gottfried Beck, *Über Schwermetallvanadate und deren Ammoniakate.* Zur Darst. der sauren Schwermetallvanadate wurden jeweils die Sulfate mit saurem Bariumvanadat der Zus. $2\text{BaO} \cdot 3\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ umgesetzt. Die leichter l. Schwermetallsalze bleiben in Lsg., während sich BaSO_4 abscheidet. Das erwähnte Ba-Salz wird durch Kochen von 30 g NH_4VO_3 mit 15 g CaO u. 200 g W., Versetzen mit konz. HCl , bis die Gelbfärbung eben noch vorhanden ist, u. 500 cem 2-n. Eg. u. Füllen dieser Lsg. mit BaCl_2 erhalten. Es bildet lanzettförmige, dichromatfarbene Krystalle. *Trinickel-dekavanadat* ($3\text{NiO} \cdot 5\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$) entsteht durch Umsetzung äquivalenter Mengen des Ba-Salzes mit NiSO_4 auf dem Wasserbad bei 40° in wss. Lsgg. nach dem Filtrieren des BaSO_4 u. Versetzen mit 15 cem A. u. 5 cem Ä. in Form eines schweren olivgrünen Öls, welches nach einiger Zeit zu einer gelben Krystallmasse erstarrt. Aus der wss. Schicht scheiden sich nur wenig gelbe Blättchen aus. Ausbeute 94%. Die Verb. verliert ihr Krystallwasser bei 220° u. wird dunkelbraun. In W. ist sie ll. *Dikobaltohexavanadat* ($2\text{CoO} \cdot 3\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 15\text{H}_2\text{O}$) wird analog der Ni-Verb. dargestellt. Ein Zusatz von A. ist unnötig, da sich nach der Filtration des BaSO_4 große, glänzend braune, sechseckige Blättchen ausscheiden, welche wahrscheinlich triklin sind. Es verwittert leicht. Bei 200° ist alles Krystallwasser weggegangen, wobei schwarze Pseudomorphosen nach dem Hydrat auftreten. *Tricupridekavanadat* ($3\text{CuO} \cdot 5\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 22\text{H}_2\text{O}$) entsteht auf Zusatz von viel Ä. zu der filtrierten Lsg. in Form von dünnen irisierenden Blättchen. Bei 220° entwässert ist es rotbraun. *Diberyllhexavanadat* ($2\text{BeO} \cdot 3\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 11\text{H}_2\text{O}$) ist in W. leichter l. als die anderen Salze. Auf Zusatz von A. tritt kein Nd. auf, erst auf Zugabe von Ä. bilden sich zwei Schichten, welche aber nicht krystallisieren. Erst beim Verdunsten des Lösungsm. bei 50° entstehen dunkelorange, hygroskopische Krystalle. Bei 220° sind sie entwässert, wobei sie erst schwarz, dann kaffeebraun werden. Nach der Entwässerung sind sie sehr hygroskopisch. *Dizinkohexavanadat* ($2\text{ZnO} \cdot 3\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 15\text{H}_2\text{O}$) bildet beim Zusatz von A. Öltröpfen, aus denen sich dem Cu-Salz ähnliche dünne sechseckige Blättchen abscheiden. Durch Behandlung von ZnVO_3 mit HNO_3 wurde ein Salz der Zus. $3\text{ZnO} \cdot 5\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (*Trizinkodekavanadat*) erhalten. Das *Dicadmiumhexavanadat* ($2\text{CdO} \cdot 3\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 15\text{H}_2\text{O}$) bildet große, sechseckige Krystalle von orangeroter Farbe u. dem Aussehen des Co-Salzes ohne Zusatz von A. u. Ä. *Dimanganohexavanadat* ($2\text{MnO} \cdot 3\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 11\text{H}_2\text{O}$) kann mit A. quantitativ gefällt werden. Das entstandene Öl krystallisiert nur schwer. Die Krystalle sind ähnlich dem Cu-Salz. Ein *Ferrovanadat* konnte nicht dargestellt werden. *Triplumbotetравanadat* ($3\text{PbO} \cdot 2\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) entsteht aus der 10%ig. wss. Lsg. des Mn-Salzes mit $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ als swl. hellgelber Nd. Das *Dicalciumdekavanadat* ($2\text{CaO} \cdot 5\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) bildet dichromatfarbene Krystalle, welche beim Entwässern braun werden u. beim Hydratisieren wieder ihre alte Farbe erhalten. *Tristrontiumtetравanadat* ($3\text{SrO} \cdot 2\text{V}_2\text{O}_5 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) entsteht durch Zu-

tröpfeln einer Lsg. von $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ zu $\text{K}_2\text{O} \cdot 2\text{V}_2\text{O}_5$. Es ist krystallinisch. Die Pyrovanadate des Sr u. Ca zeigen große Löslichkeitsunterschiede. Das Sr-Salz ist bedeutend schwerer l., doch reicht der Unterschied zu einer quantitativen Trennung nicht aus. — Die *Ammoniakate* dieser Salze bilden sich bei Verwendung von gasförmigem NH_3 nur sehr langsam. Rascher geht die Aufnahme des NH_3 beim Digerieren mit fl. NH_3 . Das *Nickelsalz* nimmt in entwässertem Zustand bei Zimmertemp. 14,7 Moll. NH_3 auf, wobei es sich in ein grauviolett Pulver verwandelt. Bei 94° betrug der Gehalt noch 12 Moll. NH_3 (Tetrammin). Erst bei 125° trat eine neue Gasentw. auf, welche nach der Überhitzung auf 135° weit unter die Anfangstemp. verfolgt wurde. Diese sank auf 113° bei 11 Moll. NH_3 : Es betrug der Gehalt an NH_3 bei 138° 7 Moll., bei 160° 5,7 Moll., bei 198° 4,4 Moll., bei 214° 2,7 Moll. u. bei 225° 2,6 Moll. Die Farbe war bei 128° rein gelb, bei 198° goldgelb u. bei 214° kupferbraun. Das *Cu-Salz* addierte 12,6 Moll. NH_3 . Der Abbau setzte bei 94° ein. Es waren noch vorhanden bei 120° 11 Moll. (dunkelgrün), bei 170° 7 Moll., bei 190° 6,3 Moll., bei 215° 5,3 Moll. u. bei 245° 2,8 Moll. (Monammin, braun). Beim *Co-Salz* ist die Aufnahme, wohl infolge der bei der Entwässerung auftretenden Veränderungen, gering. Das *Be-Salz* addierte nur sehr langsam 12 Moll. NH_3 (Hexammin). Beim Abbau treten Zers. der weißen Substanz ein. Zwischen 160° u. 220° erfolgt der Abbau zum Triammin (ockerbraun). Zwischen 260 u. 295° entsteht das Monammin. Das *Zn-Salz* addiert 16 Moll. NH_3 , von denen beim Stehen an der Luft 4 entweichen. Bei 170° besteht das Triammin, bei 225° das Diammin (braun) u. bei 235° das braune Monammin. Das *Mn-Salz* nimmt nicht ganz 12 Moll. NH_3 auf. Die Geschwindigkeit der Aufnahme ist nach erfolgtem Abbau u. beim frischen Salz dieselbe. Das Hexammin ist graubraun, das Triammin rotbraun. Zwischen 203° u. 210° blieben noch 3 Moll. NH_3 , bei 240° ist das Monammin (2NH_3) erreicht. Das *Bleisalz* addiert ebenfalls ziemlich viel NH_3 . $2\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ u. $2\text{CaO} \cdot 5\text{V}_2\text{O}_5$ sowie die entsprechenden *Be-Salze* nehmen kaum NH_3 auf. Ebenso verhält sich das $(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot 3\text{V}_2\text{O}_5$. Bei V_2O_5 ist eine Rk. mit NH_3 sicher. Es werden etwa 11,4% NH_3 aufgenommen, wobei das Oxyd olivbraun wird. An der Luft scheint aber nur eine Verb. von V_2O_5 mit 1 NH_3 beständig zu sein. Die Art der Konst. der Verbb. von V_2O_5 mit NH_3 ist noch nicht aufgeklärt. NH_4VO_3 zersetzt sich bei 720 mm u. 202° unter B. einer Verb. $(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot 3\text{V}_2\text{O}_5$, welche sich unter Zers. bei 305—315° zu einem schwarzen Reduktionsprod. umwandelt. Bei 300° entwässertes $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ addierte in fl. NH_3 15 Moll. NH_3 in 2 Tagen. Die Farbe wird dabei erst dunkelblau, dann blauviolett. Wird das $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$ bei 500° entwässert, so addiert es schwieriger u. nicht mehr als 2,5 Moll. NH_3 . (Helv. chim. Acta 9. 38—51. Bern, Univ.)

ENSZLIN.

Friedrich Emich, *Einige weitere Bemerkungen über die Rubidium-(Cäsium-) Silber-Gold-Halogenide*. Vf. weist auf die beiden nachstehend referierten Arbeiten hin. Nach ERICH BAYER (Monatshfte f. Chemie 41. 223; C. 1921. II. 284) haben die von ihm dargestellten Tripelchloride die Formel $\text{X}_3(\text{Ag}_6\text{Au}_2)\text{Cl}_9$, worin X = Cs oder Rb ist, u. Ag u. Au können sich in ihnen gegenseitig vertreten. Nach WELLS (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [5] 4. 476; C. 1923. I. 1265) kommt ihnen die Formel $\text{Cs}_2\text{AgAuCl}_6$ bzw. $\text{Rb}_2\text{Ag}_2\text{Au}_3\text{Cl}_{17}$ zu u. eine gegenseitige Vertretung von Ag u. Au ist nicht möglich. Diese Streitfrage wird nunmehr als zugunsten der Auffassung von WELLS entschieden erklärt. Ferner haben Cs u. Rb in diesen Verbb. keine Neigung, sich gegenseitig zu vertreten, sondern, wie VOGEL feststellte, kann durch einmalige Fällung einer RbCl u. CsCl enthaltenden Lsg. mit AgCl u. AuCl_3 eine spektroskop. Rb-freie Cs-Verb. erhalten werden. — Die Halogenverbb. des Ag u. des einwertigen Cu bilden nach REICHEL Mischkrystalle, u. zwar krystallisieren CuBr u. CuCl aus Ag-Lsgg. stets Ag-haltig, dagegen enthalten aus Cu-Halogenidlsgg. krystallisierendes AgBr u. AgCl keine nachweisbare Mengen Cu-Halogenid. Am stärksten ist die Fähigkeit zur B. von Mischkrystallen beim AgJ u. CuJ ausgeprägt in Lsgg., die einen großen

Überschuß an HJ enthalten. (Monatshefte f. Chemie **46**. 261—63. Graz, Techn. Hochschule.) R. SCHMIDT.

Josef Vogel, *Untersuchungen über die Rubidium-(Cäsium-)Silber-Gold-Halogenide*. (Vgl. vorst. Ref.) Es wurden Titrationsverss. mit Lsgg. vorgenommen, die einerseits CsCl, HCl u. AgCl, andererseits CsCl, HCl u. AuCl₃ enthielten, wobei Ag u. Au in Form ihrer Chlorcäsiumdoppelsalze (CsAgCl₂, CsAuCl₄) angewandt wurden. Die zunächst für eine gegenseitige Vertretbarkeit von Au u. Ag in den gefällten Tripelchloriden sprechenden Resultate konnten auf Grund der Analyse nicht bestätigt werden. Diese weist auf eine konstante Zus. des Salzes hin, unabhängig davon, ob die Ag-Lsg. mit der Au-Lsg. oder umgekehrt titriert wird. — Zur Prüfung der Frage, ob sich Ag u. Au in anderen Verbb. vertreten können, wurde AgCl aus HCl bei Ggw. von AuCl₃ auskrystallisiert; das entstandene AgCl zeigte keinerlei Au-Rk. — Ferner wurde bromwasserstoffsaurer Guanidin in HBr, der auch AgBr enthielt, gelöst u. mit AuBr₃ versetzt; das ausfallende Au-Salz erwies sich als Ag-frei. — Auf Grund des Löslichkeitsunterschiedes u. der Verschiedenheit der Krystallformen der beiden Cs- u. Rb-Tripelchloride wurde festgestellt, daß aus einer CsCl u. RbCl enthaltenden salzsauren Lsg. durch einmalige Fällung mit AgCl u. AuCl₃ das Cäsiumtripelchlorid völlig Rb-frei abgeschieden wird. (Monatshefte f. Chemie **46**. 265—71. Graz, Techn. Hochschule.) R. SCHMIDT.

Erich Reichel, *Beiträge zur Kenntnis der Isomorphieverhältnisse der Cupro- und Silberhalogenide*. (Vgl. EMICH, vorvorst. Ref.) I. *Chloride u. Bromide*. Zur Darst. der Krystalle wurde einmal das Cu-Halogenid aus Ag-halogenhaltiger Lsg. umkrystallisiert, im anderen Falle umgekehrt verfahren. Die Verss. wurden in HCl- bzw. HBr-Lsg. im Einschmelzrohr ausgeführt. Das aus cuprohalogenidhaltiger Lsg. erhaltene AgCl bzw. AgBr zeigte bei der mikrochem. Prüfung keinen nachweisbaren Cu-Gehalt. Beim Umkrystallisieren von CuCl u. CuBr aus AgCl- bzw. AgBr-haltiger Lsg. ergab sich dagegen eine geringe Löslichkeit der Ag-Halogenide in den Cu-Verbb., die bei den Bromiden größer als bei den Chloriden ist.

II. *Jodide*. Die Verss. wurden in analoger Weise wie bei den Chloriden u. Bromiden ausgeführt u. eine sehr weitgehende, wahrscheinlich vollkommene Mischbarkeit festgestellt. Zur Analyse wurde das Gemisch der Jodide in KCN gelöst u. Cu u. Ag gemeinsam kathod. abgeschieden, in verd. HNO₃ gelöst u. Ag mit HCl gefällt. Sämtliche Mischkrystalle haben einen gelben Farbton, der bei den AgJ-reichen Krystallen heller als bei den Cu-reichen ist. Die Prüfung der Mischkrystalle auf Homogenität ergab die geringste Inhomogenität bei den Endgliedern der Mischungsreihe, d. h. bei den Krystallen mit sehr hohen u. sehr niedrigen AgJ-Gehalten. — Bei Schmelzverss. mit darauffolgender Abkühlung wurden bei den Präparaten mit dem höchsten AgJ-Gehalt (88,85—73,60%) doppelbrechende Anteile festgestellt, was auf teilweise Entmischung zurückgeführt wird. — Mittels des Zustandsdiagramms des Zweistoffsystems CuJ-AgJ u. der Röntgenogramme beider Stoffe wurde festgestellt, daß aus HJ-Lsg. zwei Typen von Mischkrystallen entstehen, nämlich die γ -Mischkrystalle, die als isomorphe Mischung aus dem oberhalb 147° beständigen α -AgJ u. bis 402° beständigen γ -CuJ anzusehen sind, u. die β -Mischkrystalle, die wahrscheinlich eine isomorphe Mischung aus dem unterhalb 147° beständigen β -AgJ u. dem von 402 bis 440° beständigen β -CuJ sind. Die große Mischbarkeit der Krystalle wird auf die Ähnlichkeit der Gitterverhältnisse zurückgeführt. — Sowohl am reinen CuJ wie bei einem Teil der Mischkrystalle wurde *Photoluminescenz* im ultravioletten Licht beobachtet. In den Mischkrystallen erfährt das ausgesandte Fluorescenzlicht mit steigendem AgJ-Gehalt eine Intensitätsverminderung an den Lichtarten extremer Wellenlängen u. eine Vermehrung an solchen der mittleren gegenüber dem reinen CuJ. (Monatshefte f. Chemie **46**. 355—82. Graz, Techn. Hochschule.) R. SCHMIDT.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

W. Lawrence Bragg und **G. B. Brown**, *Die Krystallstruktur des Chrysoberylls*. An einem kleinen Krystall wurden nach der Reflexionsmethode 80 Aufnahmen der verschiedenen Flächen gemacht, aus denen sich ergibt, daß das Mineral ein einfaches orthorhomb. Raumgitter mit 4 Molekülen BeAl_2O_4 im Elementarkörper u. den Abständen $a = 4,420 \text{ \AA}$, $b = 9,390 \text{ \AA}$ u. $c = 5,470 \text{ \AA}$ besitzt. Es gehört der Symmetriegruppe V_h^{16} an. Die Lage der Be-Atome konnte nicht festgestellt werden, da die Reflexe derselben zu schwach sind. Die O-Atome bilden ein geschlossenes hexagonales Gitter. Der nächste Abstand zweier O-Atome beträgt $2,7 \text{ \AA}$. Die Al-Atome liegen in den Zwischenräumen zwischen 6 O-Atomen, u. zwar die Hälfte als Symmetriezentren mit keinem Freiheitsgrad u. die andere auf den Reflexionsebenen. Ihre Lage wird durch 2 Parameter bestimmt. Durch die Al-Atome wird das Gitter der O-Atome etwas deformiert, doch macht diese Dislokation wahrscheinlich nicht mehr als $0,2 \text{ \AA}$ aus. Der Unterschied vom Spinell liegt in der Anordnung der O-Atome, welche bei letzterem ein kub. Gitter besitzen. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. **110**. 34—63. Manchester, Univ.)

ENSZLIN.

L. S. Ramsdell, *Vorläufiger Bericht über die Krystallstruktur einiger metallischer Sulfide*. Silberglanz hat nach Röntgenunterss. an Pulvern von künstlichem Ag_2S keine kub. Atomanordnung. Zinnober u. Covellin geben verschiedene Röntgenbilder. Ullmanit hat Pyritstruktur mit einer Kantenlänge von etwa $5,91 \text{ \AA}$. (Amer. Mineralogist **10**. 67. 1925; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 6—7. Ref. W. EITEL.) ENSZ.

E. Billows, *Über Schwefelkrystalle, die den Anglesit und Bleiglanz von Monteponi begleiten*. Beschreibung der den Anglesit u. Bleiglanz begleitenden Schwefelkrystalle u. Angabe der kristallograph. Daten. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **2**. 563 bis 567. 1925.)

GOTTFRIED.

Fr. Ulrich, *Beitrag zur Kenntnis der Eisen- und Tonerdephosphate*. In den verlassenen Fe- u. Mn-Erzgruben des Eisengebirges wurden verschiedene Phosphatminerale gefunden, deren jüngstes der Vivianit ist. Fouchérit u. Vaskegit sind die nächst älteren. Letzterer bildet nierenförmige Gebilde der Härte 2. D. 1,92. Er ist isotrop u. hat die Lichtbrechung $1,504 (\text{NaD})$. Delavauxit ist ein kastanienbraunes bis ziegelrotes, isotropes Mineralgel. Härte 2,5. D. 1,815—1,999. Lichtbrechung (NaD) 1,726. Destinezit bildet weiche licht gelbgraue Konkretionen. Außerdem kommt noch Variscit in Nestern u. Überzügen vor. (Rozprawy Česká Akademie **31**. Kl. 2. Nr. 10; Franz. Résumé im Bl. intern. de l'Ac. de Sc. de Bohême **1922**; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 31—35. Ref. FR. ULRICH.)

ENSZLIN.

V. Veselý, *Chemische Zusammensetzung einiger Minerale von Chvaletice und Litošice*. Analysen der im vorst. Ref. angegebenen Mineralien. Delavauxit hat das Molverhältnis $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{P}_2\text{O}_5:\text{H}_2\text{O} = 2:1:9$. Für Destinezit ist das Verhältnis $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{P}_2\text{O}_5:\text{SO}_3:\text{H}_2\text{O} = 2:1:2:13$. Weiter sind die Analysen des Diallogits von Chvaletice u. Litošice, des Pyrrhosiderits u. Stilpnosiderits von Chvaletice angegeben (Rozpravy Česká Akademie **31**. Kl. 2. Nr. 9. Sep. 9 Seiten; Franz. Résumé im Bl. intern. de l'Acad. de Sc. de Bohême **1922**; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 35—36. Ref. FR. ULRICH.) ENSZ.

V. Veselý, *Chemische Zusammensetzung des Variscits von Železník*. Der Variscit zeigt nach Abzug des unl. Rückstands das Molverhältnis $\text{R}_2\text{O}_3:\text{P}_2\text{O}_5:\text{H}_2\text{O} = 1:1:4,6$, worin R_2O_3 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 u. Cr_2O_3 bedeuten. SCHALLER hat für kristallisierten Variscit das Verhältnis 1:1:4 gefunden. (Časopis Národního musea v Praze **1923**. Sep. 1 S.; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 36—37. Ref. FR. ULRICH.) ENSZLIN.

E. S. Larsen und **W. T. Schaller**, *Die Identität des Variscits und Peganits und die limorphe Form Metavariscit*. Eine sorgfältige Prüfung ergab, daß das ursprünglich als Variscit beschriebene Mineral von den andern Varietäten der Variscite u. Peganite verschieden ist. Es wird deshalb Metavariscit genannt u. ist rhomb. mit $a:b:c =$

0,8944:1:1,0919 u. der Lichtbrechung $\alpha = 1,551$, $\beta = 1,558$ u. $\gamma = 1,582$. Er hat die Zus. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{P}_2\text{O}_5 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ u. die D. 2,54. Alle andern Mineralien gehören der Spezies *Variscit* an (sowohl die *Variscite* wie die *Peganite*). Der *Lucinit* ist ebenfalls zu streichen. Der *Variscit* ist rhomb. mit $a:b:c = 0,8729:1:0,9788$ u. $\alpha = 1,562$, $\beta = 1,583$ u. $\gamma = 1,590$. Die chem. Zus. ist die gleiche wie die des *Metavariscits*. (Amer. Mineralogist 10. 23—28. 1925; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 37—38. Ref. W. EITEL.) ENSZL.

N. Lestschenko, *Über Uranmineralien aus Lotsmanskaja Kamenka bei Jekaterinoslaw und Khutor Golowin bei Shitomir und ihre Radioaktivität*. Die beiden Uranmineralien, von denen das erste nicht näher bestimmt werden konnte, stammen aus Pegmatiten. Ersteres wird von Mineralsäuren unter Gasentw. angegriffen. Es ist citronengelb u. stark radioakt. (50% der Radioaktivität der Pechblende). Der *Wikit* ist olivbraun bis dunkelbraun. Härte 5. Strich hellgelb. Mikrochem. wurden U, Th, Si, Fe u. Nb (?) nachgewiesen. Seine Radioaktivität beträgt 60% der des Uranpecherzes. (Nachr. des Berginstituts Jekaterinoslaw 19. 171—75; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 48. Ref. PETER TSCHIRWINSKY.) ENSZL.

Earl V. Shannon, *Einige Mineralien aus der Kensington Glimmer-Mine, Montgomery County, Maryland*. Die in dem Pegmatit vorkommenden Mineralien *Feldspat*, *Beryll*, *Apatit*, *seltene Erdmineralien*, *Spessartit* mit 34,40% MnO werden kurz beschrieben. Der Pegmatit ist anders geartet, als die sonst in der dortigen Gegend auftretenden Pegmatite. (Amer. Mineralogist 11. 35—37.) ENSZL.


John Parry und F. E. Wright, *Afwillit, ein neues wasserhaltiges Calciumsilicat von Dutoitspan, Kimberley, Südafrika*. *Afwillit* wurde in einem Doleriteinschluß gefunden. Zus. $2\text{H}_2\text{CaSiO}_4 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$. Er ist monoklin mit dem Achsenverhältnis $a:b:c = 2,097:1:2,381$ u. $\beta = 98^\circ 26'$. Brechungsexponenten für Na_D $\alpha = 1,6169$, $\beta = 1,6204$ u. $\gamma = 1,6336$ u. für die grüne Hg-Linie $\alpha = 1,6201$, $\beta = 1,6236$ u. $\gamma = 1,6366$. (Geophys. Labor. Carnegie Inst. of Washington, Nr. 553; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 23—24. Ref. A. BRAUNS.) ENSZL.

Earl V. Shannon, *Benjamininit, ein neues Sulfosalzmineral der Klaprotholithgruppe*. Das Mineral von Round Mountain, Nye Cy, Nev., tritt in einer Quarzader unregelmäßig verteilt auf. Es ist grau metall. glänzend. Härte 3,3—3,5. Ll. in h. konz. HNO_3 u. HCl . Zus. $2\text{PbS} \cdot (\text{Cu}, \text{Ag})_2\text{S} \cdot 2\text{Bi}_2\text{S}_3$ (Proceed. of the Unit. St. Nat. Mus. 65. 1—9; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 22—23. Ref. A. BRAUNS.) ENSZL.

E. V. Shannon, *Barrandit von Manhattan, Nevada*. Der *Barrandit* wurde in einem Kontakt von Kalk gegen Rhyolith als amorphes undurchsichtiges Mineral gefunden. U. Mk. ist er feinkrystallin. Härte 2. Lichtbrechung 1,640. Er ist gelblichbraun u. hat die Zus. $(\text{Fe}, \text{Al})_2\text{O}_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. (Amer. Mineralogist 8. 182—84. 1923; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 40—41. Ref. W. EITEL.) ENSZL.

E. T. Wherry, *Bentonit als ein eindimensionales Kolloid*. Unter eindimensionaler Kolloiden werden solche verstanden, welche in ihrer Flächenausdehnung makroskop. Dimensionen, aber nur molekulare Dicke haben. Es gelingt, solche Krystalle von p-Toluidin u. Spaltblättchen von Glimmer herzustellen. *Bentonit* bildet ebenfalls solche Kryställchen. Er entsteht bei der Entglasung von vulkan. Gläsern in Aschen u. Tuffen u. hat mit den Kolloiden das hohe Adsorptionsvermögen gemein. In feuchtem Zustand wird er plast. u. quillt auf. Auf dem Adsorptionsvermögen, welches eine Folge der großen Oberflächenwrkg. wenigstens in einer Richtung ist, beruht seine Eignung zum Enthärten von W. (Amer. Mineralogist 10. 120—23. 1925; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 11—12. Ref. W. EITEL.) ENSZL.

E. T. Wherry, *Bemerkungen über Mimetesit, Thaumazit und Wavellit*. *Mimetesit* von Tintic Distrikt, Utah, ist farblos, spitznadelig u. zeigt eine ungewöhnlich krystallograph. Ausbildung. Für den *Thaumazit* schlägt Vf. die Konstitutionsformel:



vor, welche seine B. u. die Bindung des W. als Krystall-(14H₂O) bzw. Konst.-W. (1H₂O) gut wiedergibt. *Wavellit* hat das Achsenverhältnis $a:b:c = 0,559:1:0,405 \pm 0,005$. (Proceed. U. S. Nat. Mus. **54**. 373—81. 1919; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 27. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.

E. T. Wherry, *Bemerkung über die Konstitution des Cöruleofibrils*. Vf. gibt dem von HOLDEN beschriebenen Mineral die Formel $\text{Cu}_3\text{Cl}_3(\text{AsO}_4) \cdot 9\text{Cu}(\text{OH})$. Er faßt es als ein Trichlorkupferarseniat mit neun Molekülen „Krystall-Kupferhydroxyd“ auf. (Amer. Mineralogist **7**. 145. 1922; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 43. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.

Alfred Schoep, *Neue Versuche über den Dewindtit: Doppelbrechung, chemische Zusammensetzung und Entwässerung dieses Minerals. Vergleich mit dem Dumontit*. (Bull. Soc. Chim. Belgique **34**. 347—54. 1925. — C. **1925**. II. 1022.) ENSZLIN.

William F. Foshag, *Die Identität des Newtonits mit dem Alunit*. Nach den Unterss. soll der von BRACKETT u. WILLIAMS (Amer. Journ. Science, SILLIMAN **42**. 11. [1890]) beschriebene *Newtonit* mit dem *Alaun* identisch sein. Es wurde eine Probe desselben Fundorts analysiert u. eine ganz andere Zus., aber sonst gleiche Eigenschaften gefunden. Der Name *Newtonit* ist daher zu streichen. (Amer. Mineralogist **11**. 33—35.) ENSZLIN.

William F. Foshag, *Radialstrahliger Chrysotil von Franklin Furnace, New Jersey*. Das Mineral ist licht haarbraun mit $\alpha = 1,546$, $\beta = 1,550$ u. $\gamma = 1,557$ (je $\pm 0,003$). In den 7,5 mm langen Fasern ist etwas Calcit eingeschlossen, welcher sich durch Citronensäure entfernen läßt. Vf. ist der Ansicht, daß der Chrysotil durch Verdrängung des Calcits durch Lsgg. entstanden ist. (Amer. Mineralogist **11**. 38—39.) ENSZLIN.

J. H. C. Martens, *Scorodit von Putnam County, New York*. *Scorodit* wurde als Umwandlungsprod. des Arsenkieses in einer alten Arsenkiesgrube von Pind Pond, Putnam Co., gefunden. Härte 2, D. 2,70—2,86 u. mittlere Lichtbrechung 1,775. (Amer. Mineralogist **9**. 27—28. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 41. Ref. W. EITEL.) ENSZ.

Earl V. Shannon und **Esper S. Larsen**, *Ein merkwürdiger manganhaltiger Serpentin von Franklin Furnace*. Das Mineral ist rotbraun u. erinnert an dichten Granat. Härte 5,5. Durch schwere Lsgg. getrennt ist das Pulver goldbraun. Eine Analyse zeigt, daß es zu den Serpentininen mit einem Gehalt von 7,57% MnO zu rechnen ist. Seine Lichtbrechung beträgt $\alpha = 1,561$, $\beta = 1,567$ u. $\gamma = 1,568$. (Amer. Mineralogist **11**. 28—30.) ENSZLIN.

A. F. Rogers und **R. D. Reed**, *Sand-Calcitkrystalle von Monterey County, California*. Beschreibung der bei Cholame Hills im Nordwesten Montereys gefundenen Sandcalcite, welche seltene Verwachsungen zeigen. (Amer. Mineralogist **11**. 23 bis 28.) ENSZLIN.

T. L. Walker und **A. L. Parsons**, *Die Arseniate des Kobalts, Nickels und Eisens, welche in den silberhaltigen Adern in Cobalt, Ontario, beobachtet werden*. (Vgl. S. 42.) Die rosarote „Kobaltblüte“ ist wahrscheinlich ein Gemenge von Erythrit mit etwas Annabergit. In diesen Mischungen treten je nach dem Verhältnis Ni:Co pfirsichblütenrote bis grünlichweiße Varietäten auf. Die ersteren enthalten 34,11% Co u. 0,52% Ni, die letzteren 3,40% Co u. 33,82% Ni. Ein Zwischenglied mit 6,43% Co u. 29,30% Ni ist weiß, ein anderes mit 16,33% Co u. 17,37% Ni blaßbrosa. In einer rosaroten Blüte wurde ein tief bernsteinbraunes, harzglänzendes Mineral der Zus. $3\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{As}_2\text{O}_5 \cdot 16\text{H}_2\text{O}$ gefunden, welches als *Ferrisymplessit* bezeichnet wurde, da es als Oxydationsprod. des Symplessits aufzufassen ist. Letzterer hat die Zus. $3\text{FeO} \cdot \text{As}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$. Der *Ferrisymplessit* hat die Lichtbrechung 1,65 u. ist stark doppelbrechend. (Contrib. to Canad. Mineral. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. **17**. 13—17. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 41—42. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.

T. L. Walker und **A. L. Parsons**, *Pegmatitmineralien von Neu Ross, Neuschottland*. Es werden *Albit*, *Amblygonit*, *Manganapatit*, *Lepidolith* u. *Zinnwaldit* beschrieben.

(Contrib. to Canad. Min. 1924. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. 17. 46—50. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 56—57. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.

W. F. P. Mc Lintock, *Über das Vorkommen von Petalit und pneumatolithischem Apatit in dem Meldon Aplit, Okehampton, Devonshire.* (Mineral Magazine 20. 140—50. 1923.; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 57—58. Ref. K. BUSZ.) ENSZLIN.

J. H. S. Washington, *Die Rhyolithe von Lipari.* Petrograph. Beschreibung der in der amerikan. Literatur Rhyolithe genannten Liparite von Lipari. (Boll. soc. geol. It. 39. 141—59. 1920; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 92—95. Ref. K. WILLMANN.) ENSZLIN.

T. L. Walker, *Uraninit von Cardiff Township, Ontario.* Der Uraninit wird in rötlich-gelben Würfeln oder Oktaedern mit rauen Oberflächen in den Pegmatiten von Cardiff, Haliburton Co. gefunden. D. 9,082. Er enthält neben 11,40% Th auch 0,35% He. Die Gasabgabe erfolgt bereits beim Pulverisieren. Nach dem He-Gehalt berechnet sich das Alter auf $271 \cdot 10^6$ Jahre, nach dem Pb-Gehalt zu $1239 \cdot 10^6$ Jahre (im Original fälschlich $1,239 \cdot 10^6$). (Contrib. to Canad. Min. 1924. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. 17. 42—45. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 47—48. Ref. W. EITEL.) EN.

T. L. Walker, *Das Alter einiger kanadischer Pegmatite.* Das Alter der radioaktiven Mineralien läßt sich aus dem Gehalt Pb-U-Th nach der Formel:

$$\text{Alter} = \frac{\text{Pb}}{\text{U} + 0,38 \text{ Th}} \cdot \frac{1}{1,21} \cdot 10^{10}$$

berechnen. Es fällt zu hoch aus, wenn primär schon Pb enthalten war. Andererseits liefert das Verhältnis He/U gewöhnlich zu niedrige Werte. Das Alter der Greenvilleserie berechnet sich so mindestens zu 623 Millionen Jahren u. höchstens zu 1580 Millionen Jahren. Es werden in einer Tabelle die Werte für verschiedene Uranmineralien zusammengestellt. (Contrib. to Canad. Mineral. 1924. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. 17. 51—54. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. 1926. I. 58—59. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.

Edward H. Orser, *Kirkeland-See: Ontarios zweites Goldgebiet.* Beschreibung der sedimentären Lagerstätte, ihres Abbaus, der Aufbereitung der Erze u. der Produktion. (Engin. Mining Journ.-Press 121. 317—23. Swastika, Ont.) ENSZLIN.

Samuel G. Gordon, *Bergbau auf Kryolith in Grönland.* Beschreibung der geolog. Lagerung u. des Abbaus des einzigen natürlichen Kryolith-V. der Erde. (Engin. Mining Journ.-Press 121. 236—40.) ENSZLIN.

E. Blanck und A. Rieser, *Über die chemische Veränderung des Granits unter Moorbedeckung. Ein Beitrag zur Entstehung des Kaolins.* Es werden die durch Bedeckung mit Moorboden u. durch Verwitterung an der Luft entstehenden Prodd. der Brockengranite untersucht u. festgestellt, daß zwischen beiden Verwitterungsarten kein wesentlicher Unterschied besteht. Vff. glauben nicht, daß durch Moorbedeckung eine Kaolinisierung des Granits hervorgerufen wird, sondern daß die aus der Zers. von organ. Stoffen sich bildende H_2SO_4 die Gesteine bleicht u. umwandelt. (Chemie der Erde 2. 15. BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 55. 49—51. Ref. GIESECKE.) ENSZ.

Hiram W. Hixon, *Chlor als ein magmatisches Lösungsmittel für Metalle.* Erwiderung auf die Arbeiten von FREEMAN u. SPURR (vgl S. 1521 u. 1522). Na_2S setzt sich mit CO_2 in Ggw. von W. zu Na_2CO_3 u. H_2S um, u. da im Magma immer CO_2 vorhanden ist, so kann Na_2S in solchen Lsgg. nicht bestehen. Vf. nimmt an, daß das Cl mit den Metallen flüchtige Verbb. bildet, welche durch die Gesteine diffundieren u. erst bei niedrigeren Tempp. u. bei Anwesenheit von W. mit H_2S , welcher sich aus SO_2 u. H_2 bildet, unter B. von Sulfiden reagieren. Die Ausfüllung von Klüften mit Quarz u. Calcit kann nur durch alkal. Lsgg. geschehen. (Engin. Mining Journ.-Press 121. 249. Cannes, Frankreich.) ENSZLIN.

Fritz Klauder, *Über die im Buntsandstein wandernden Verwitterungslösungen in ihrer Abhängigkeit von äußeren Einflüssen.* Es werden die Verwitterungslsgg. der

sächs.-böhm. u. Pfälzer Buntsandsteine untersucht u. auf ihren hohen prozentualen Gehalt an SO_3 hingewiesen. Die H_2SO_4 ist als Hauptagens der Verwitterung anzusehen. Die Konz. ist in den tieferen Schichten größer als in den oberen. (Chemie der Erde 2. 49. BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 55. 51—53. Ref. GIESECKE.) ENSZLIN.

Ch. Lormand, *Chemische Analyse des Wassers von Capvern*. Die Quelle von Capvern (Oberpyrenäen) ist eine reine Gipsquelle mit einem sehr geringen Gehalt an Alkalien u. Cl. Ihr Glührückstand aus 1000 g W. beträgt 1,5406 g. Die Radioaktivität beträgt 0,405 Millimikrocurie pro Liter, die pH = 8 u. die Temp. 23,8°. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 404—06.) ENSZLIN.

Rey, *Über ein Auffangen von Mineralwasser durch die Methoden der sogenannten reziproken hydrostatischen Drucke*. Die Methode beruht auf der Trennung von spezif. verschieden schweren Fll. beim ruhigen Stehen. Die Schwefelquellen von Challes-Eaux (Savoyen) zeigen innerhalb der Fassung einen konstanten Zulauf von Süßwasser, welches sich, soweit es sich nicht mit dem Mineralwasser mischt, an der Oberfläche ansammelt u. dadurch das Mineralwasser vor Oxydation durch Luft schützt. Beide Schichten haben besondere Ausläufe. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 230 bis 32.) ENSZLIN.



H. Buisson und **C. Jausseran**, *Über die Schwankungen des Ozongehaltes in der oberen Atmosphäre*. Die Begrenzung des Sonnenspektrums nach der ultravioletten Seite hin wird nach FABRY u. BUISSON (Journ. de Phys. [6] 2. 197 [1921]) durch die Absorption der Strahlen durch das Ozon hervorgerufen, so daß es möglich ist, die Schichtdicke des Ozons zu bestimmen. Vff. haben nun die Veränderung des Ozongehalts in den Monaten August u. September 1925 in Dignes (600 m hoch) verfolgt u. Schwankungen gegen den angegebenen Wert (0,3 cm) von 0,045 cm gefunden. Der Ozongehalt erwies sich unabhängig vom Barometerstand. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 232—34.) ENSZLIN.

G. P. Merrill, *Bemerkungen über den Meteor von Colby, Wisconsin*. Der Stein fiel am 4. 7. 1917 bei Colby, Clark County, in 2 Stücken. Er besteht zu 91,415% aus mineral. Stoffen, zu 0,995% aus metall. u. zu 7,590% aus Troilit u. ist dicht feinkörnig mit kleinen Chondren u. schwarzen Adern. Als Mineralien treten außer Troilit Olivin, Eumatit, etwas Maskelynit, Merrillit u. Chromit auf. (Proceed. U. S. Nat. Mus. 67. Art. 2. 1925. 3 S.; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 61—62. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.

D. Organische Chemie.

C. Mannich und **Ph. Horkheimer**, *Über Abkömmlinge des β -Aminobutyraldehyds und des β -Aminobutylalkohols*. Es wird Crotonaldehyd als Ausgangsmaterial für β -Aminoaldehyde benutzt. Die ursprüngliche Absicht, aus Methylamin u. 2 Moll. Crotonaldehyd einen Methylaminoaldehyd I zu erhalten, konnte nicht durchgeführt werden. Bei direkter Rk. zwischen verschiedenen Basen bezw. deren Salzen u. freiem Crotonaldehyd konnten keine einheitlichen Körper isoliert werden. Die dabei entstandenen bas. Öle siedeten ganz inkonstant u. verharzten in kurzer Zeit. Dagegen entstanden Aminoacetale bei Rk. von alkoh. NH_3 , Methylamin, Dimethylamin, Diäthylamin u. Piperidin mit β -Chlorbutyracetal. Die Rk. erfolgt nur bei großem Überschuß von Base u. langem Erhitzen auf 120—130°, bezw. 150° für Diäthylamin u. Piperidin. Ausbeute 20% (bei NH_3) bis 80% (Methylamin). β -Brombutyracetal erwies sich für die Rk. als zu empfindlich. Die weitere Umsetzung von β -Methylaminobutyracetal mit einem weiteren Mol. β -Chlorbutyracetal zu β -Methylaminodibutyracetal gelang nicht, dagegen ließ sich die Verb. mit Estern halogensubstituierter Säuren (Chloressigester u. β -Chlorpropionsäureester) glatt zur Rk. bringen. Bei der Zers. des Rk.-Prod. (II) aus β -Methylaminobutyracetal u. Chloressigester mit konz. HCl entstand Sarkosin. Zu β -Alkoholen wurden folgende Acetalbasen gespalten: β -Methylaminobutyracetal,

β -Dimethylaminobutyrcetal, β -Diäthylaminobutyrcetal u. β -Piperidinobutyrcetal. Die durch Einw. stark gekühlter HCl entstandenen Chlorhydrate der Aminoaldehyde, welch letztere sich nur als Sirupe erhalten ließen, wurden ohne weitere Reinigung mit Na-Amalgam bei essigsaurer Rk. reduziert. Aus der alkal. gemachten Rk.-Fl. konnten mit W.-Dampf die β -Alkoholbasen abdest. werden. Ihr Kp. lag regelmäßig 15—20° tiefer als der der zugehörigen Acetalbasen. Erhalten wurden β -Methylamino-, β -Dimethylamino-, β -Diäthylamino- u. β -Piperidinobutylalkohol. Die Chlorhydrate ihrer Benzoesäureester zeigten nur schwache anästhet. Wirkgg.




Versuche. β -Brombutyrcetal, $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{BrO}_2$, aus HBr-gesätt. A. u. Crotonaldehyd durch Stehenlassen in der Kälte (10 Min.). Sehr zers. Fl. Kp.₁₂ 80—83°. — Verb. $\text{C}_{14}\text{H}_{31}\text{O}_4\text{N}$ (III) aus β -Chlorbutyrcetal u. Aminoacetal im Bombenrohr bei 125° (12 Stdn.). Fl. von stark bas. Geruch. Kp.₁₄ 140—145°. Ausbeute ca. 40%. Nicht ganz rein erhalten. — β -Aminobutyrcetalchlorhydrat, $\text{C}_8\text{H}_{20}\text{O}_2\text{NCl}$, aus 1 Vol. β -Chlorbutyrcetal mit 10 Voll. k. gesätt. alkoh. NH_3 im Autoklaven bei 120 bis 130° (14 Stdn.). Ausbeute bis 20%. Die freie Base ist mischbar mit W., A. u. PAe. Zusatz von alkoh. HCl im Unterschuß gibt die Verb. Nadelchen aus Aceton + Ä. F. 74°. — β -Benzylidenaminobutyrcetal, $\text{C}_{15}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{N}$. Öl, Kp.₁₂ 140°. Ausbeute 80%. — β -Methylaminobutyrcetal, $\text{C}_9\text{H}_{21}\text{O}_2\text{N}$. Öl, Kp.₁₂ 77—79°. Ausbeute 70%. Riecht bas., ist mischbar mit W. Chlorhydrat, $\text{C}_9\text{H}_{22}\text{O}_2\text{NCl}$, am besten als Nebenprod. der Umsetzung mit Chloressigester. Weiche, hygroskop. u. gegen Säuren äußerst empfindliche Nadeln aus Aceton + Ä. — β -Methylaminobutyraldehyd konnte nur als Sirup erhalten werden. Goldsalz, $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{ONCl}_4\text{Au}$. Krystalle aus HCl-haltigem W., F. 96°. — N-Benzoylverb. des β -Methylaminobutyrcetals, $\text{C}_{10}\text{H}_{25}\text{O}_3\text{N}$ (IV) Sirup. — Verb. $\text{C}_{13}\text{H}_{27}\text{O}_4\text{N}$ (II) aus 2,5 Moll. β -Methylaminobutyrcetal u. 1 Mol. Chloressigester durch Stehenlassen nach Erwärmung auf 40° (30 Min.) Fl. von stechendem Geruch, Kp.₁₃ 133—135°. Unl. in W., Ausbeute 80%. Verb. $\text{C}_{14}\text{H}_{29}\text{O}_4\text{N}$ aus 2,5 Moll. β -Methylaminobutyrcetal u. 1 Mol. β -Chlorpropionsäureester. Stechend riechendes Öl, Kp.₁₃ ca. 150°. Unl. in W., zers. sich bei 10 Stdn. Erhitzen im Bombenrohr auf 200° ca. zur Hälfte u. bildet β -Methylaminobutyrcetal u. ein N-freies, ungesätt. Öl vom Kp.₁₅ ca. 100°, das nicht näher untersucht wurde. Verss., die Verb. durch Einw. von Kondensationsmitteln zum Ringschluß zu bringen, waren, wie bei der vorst. Verb., erfolglos. — β -Methylaminobutylalkohol, $\text{C}_8\text{H}_{15}\text{ON}$, Öl, Kp.₁₄ 65°. L. in W. Wird bei längerem Stehen dickfl. — β -Dimethylaminobutyrcetal, $\text{C}_{10}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{N}$. Aminartig riechende Fl., Kp.₁₅ 92°. Ausbeute 50%. Jodmethylat, $\text{C}_{11}\text{H}_{26}\text{O}_2\text{NJ}$, Krystalle aus A. + Ä., F. 133°. — β -Dimethylaminobutyraldehyd. Chlorhydrat aus dem Acetal u. konz. HCl bei —10°. Sirup. Goldsalz, $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{ONCl}_4\text{Au}$. Gelbe Nadeln aus verd. HCl, F. 172°. — β -Dimethylaminobutylalkohol, $\text{C}_8\text{H}_{15}\text{ON}$, Öl. Kp.₁₄ 78°. L. in W. Ausbeute 30 bis 35% der Theorie. Goldsalz, Krystalle aus verd. HCl, F. 130—132°. Jodmethylat, $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{ONJ}$. Blättchen aus A., F. 242°. Benzoesäureesterchlorhydrat (V), $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{NCl}$, Krystalle aus Essigester, F. 105°, ll. in W., A. u. Aceton. Kaum anästhesierend. — β -Diäthylaminobutyrcetal, $\text{C}_{12}\text{H}_{27}\text{O}_2\text{N}$, aus gleichen Teilen β -Chlorbutyrcetal u. Diäthylamin im Bombenrohr (155—160°, 20 Stdn.) Aus 20 g Acetal 3,5 g. Fl. Kp.₁₅ 105°. Swl. in W. Jodmethylat, $\text{C}_{13}\text{H}_{30}\text{O}_2\text{NJ}$. Krystalle aus absol. A. + Ä., F. 98 bis 100°. — β -Diäthylaminobutyraldehyd. Chlorhydrat u. Goldsalz konnten nicht kristallisiert erhalten werden. — β -Diäthylaminobutylalkohol, $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{ON}$. Öl, Kp.₁₃ 85°. Wl. in W., Ausbeute 45% der Theorie. Bildet krystallin. Goldsalz u. festes Jodmethylat.

see
errata
p. 3976

Benzoessäureesterchlorhydrat, $C_{15}H_{24}O_2NCl$, Krystalle aus trockenem Aceton. F. 161° . Deutlich anästhesierend. — β -*Piperidinobutyraldehyd*, $C_{13}H_{27}O_2N$, Öl von eigenartigem Geruch. Kp.₁₃ 125 – 135° , da wohl noch piperidinhaltig. Unl. in W. *Jodmethylat* krystallisiert nicht. — β -*Piperidinobutyraldehyd*. *Goldsalz*, $C_9H_{18}ONCl_4Au$. Krystalle aus verd. HCl, F. 97° . — β -*Piperidinobutylalkohol*, $C_9H_{18}ON$, Öl, Kp.₁₅ 110° . Unl. in W., Ausbeute 40% der Theorie. *Goldsalz*, F. 81° . *Jodmethylat*, $C_{10}H_{22}ONJ$. Krystalle aus A. + Aceton, F. 112° . — *Benzoessäureesterchlorhydrat*, $C_{15}H_{24}O_2NCl$. Nadelchen aus trockenem Aceton, F. 159° . Deutlich anästhesierend. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 167–80. Frankfurt a. M., Univ.) HARMS.

Gilbert T. Morgan und Cyril James Allan Taylor, *Keto-Enolisomerie des Äthylenbisacetylacetons*. Vff. haben von dem aus Na-Acetylaceton u. Äthylenbromid zugänglichen Äthylenbisacetylaceton drei isomere Formen hergestellt, u. zwar das *keto-Äthylenbisacetylaceton* (I), eine leicht fl., farblose Verb., welche in alkohol. Lsg. mit $FeCl_3$ nur langsam eine violette Färbung gibt, das *mono-enol-Äthylenbisacetylaceton* (II), Krystalle vom F. 99° , in alkohol. Lsg. mit $FeCl_3$ sofort eine tiefviolette Färbung, u. das *dienol-Äthylenbisacetylaceton* (III), Krystalle vom F. 140 – 143° , mit $FeCl_3$ sofort violette Färbung. III ist an der Luft unbeständig, der F. sinkt schnell auf 100 – 110° . Mit über-schüssigem Hydroxylamin liefern I u. II stereoisomere *Tetraoxime*, im Falle II lagert demnach das Reagens die Enolform zur Ketoform um.




Versuche. Na-Acetylaceton liefert mit Äthylenbromid zur Rk. gebracht u. das Reaktionsprod. bei 3–5 mm fraktioniert destilliert eine Reihe von Fraktionen, welche sich wie folgt auflösen lassen. Fraktion 80 – 100° enthält das *keto-Äthylenbisacetylaceton*, $C_{12}H_{18}O_4$ (I), Kp.₂₀ 97 – 99° . Fraktion 120 – 130° enthält ein *Dehydrierungsprod.* des Äthylenbisacetylacetons, $C_{24}H_{30}O_5 - 2C_{12}H_{18}O_4 - 3H_2O$, aus A. hexagonale Platten, keine Farbbrk. mit $FeCl_3$. Fraktion 170 – 220° enthält *enol-Äthylenbisacetylaceton*, $C_{12}H_{18}O_4$ (II), aus Bzl. F. 99 – 100° , *Cu-Salz*. Die Mutterlaugen von II liefern mit ammoniakal. Cu-Acetat über das Cu-Salz das *di-enol-Äthylenbisacetylaceton*, $C_{12}H_{18}O_4$ (III), F. 140 – 143° , *Cu-Salz*, Zers. bei 250° , unl. in allen organ. Lösungsm. Die Titration mit alkoh. $\frac{1}{10}$ -n. Br liefert für I Anwesenheit von nur 0,8% Enolform, für II Vorliegen der reinen Mono-enolform, für III dagegen ein Gemisch von ca. 25% Dienol u. 75% Mono-enolform. III ist wahrscheinlich in der festen Phase nahezu reine Dienolform, gibt aber in alkoh. Lsg. ein Gleichgewichtsgemisch von II u. III. I u. II geben mit Hydroxylamin auf dem Wasserbad erwärmt α -*Tetraoxim*, $C_{12}H_{22}O_4N_4$, aus Ä. F. 165° . Aus II ferner das β -*Tetraoxim*, aus h. W. F. 220 – 222° (Zers.). I liefert mit $TeCl_4$ in Chlf. rückfließend erhitzt kein Tellurderiv., sondern β -*Chloräthylacetylaceton*, $C_7H_{11}O_2Cl$, aus Hexan F. 79° . (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 43–49. Edgbaston, Univ. Birmingham.) TAUBE.

Edgar J. Witzemann, *Der Einfluß von Phosphaten auf die Oxydation der Buttersäure mit Wasserstoffperoxyd*. (Vgl. Journ. Biol. Chem. **49**. 123; C. **1921**. I. 489.) Buttersäure wurde mit KOH neutralisiert u. mit H_2O_2 in Ggw. von Mono- u. Dialkaliphosphaten einige Wochen bei Zimmertemp. stehen gelassen. Dann wurde der Grad der Oxydation nach einer bestimmten Zeit durch Best. des gebildeten CO_2 u. Acetons festgestellt, wobei es sich herausstellte, daß die Dialkaliphosphate die Oxydation mehr beschleunigen als die Monoalkaliphosphate, daß ferner die Kaliphosphate besser katalyt. wirken als die Natriumphosphate. Bei der vollständigen Oxydation der Buttersäure wurde Essigsäure, Aceton u. CO_2 erhalten. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 202–08.) WINKELMANN.

Edgar J. Witzemann, *Die gleichzeitige Oxydation von Glucose und Buttersäure*. (Vgl. vorst. Ref.) Glucose u. buttersaures K wurden gleichzeitig in Ggw. von Di-alkaliphosphat mit H_2O_2 oxydiert. Es zeigte sich, daß der Grad der Oxydation des Kaliumbutyrats durch die Glucose nicht beeinflusst wurde, daß das Butyrat aber rascher oxydiert wurde als die Glucose, während es sonst meist umgekehrt ist. Eine antiketogenet. Wrkg. der Glucose wie im lebenden Organismus wurde nicht beobachtet. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 208—10.) WINKELMANN.

Edgar J. Witzemann, *Die Oxydation von α - und β -Oxybuttersäure mit Wasserstoffperoxyd*. Die in den beiden vorangehenden Artikeln behandelte Oxydation der Buttersäure verläuft wahrscheinlich in folgender Weise: Es entstehen als Zwischenprodd. α -Oxybuttersäure, welche zu Essigsäure u. CO_2 weiteroxydiert wird, u. β -Oxybuttersäure die Aceton gibt. Die Oxydation dieser Oxysäuren unter verschiedenen, möglichst den biolog. ähnlichen Bedingungen wurde nun untersucht, u. zwar benutzte Vf. *d,l*- α -Oxybuttersäure (I) (aus α -Brombuttersäure) u. *l*- β -Oxybuttersäure (II), dargestellt aus Diabetikerurin. Dabei fand er, daß I in allen Fällen leichter oxydiert wird als II. — Während Milchsäure mit Kaliumpermanganatlg. ohne Alkali unter B. von Essigsäure fast ganz nach folgender Gleichung reagiert:




gab I nur in einem Falle analog $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2\text{CO}_2\text{H} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$; sonst reagierte es überwiegend folgendermaßen:



Mit H_2O_2 in Ggw. von Phosphaten wurde keine B. von Propionsäure konstatiert, in nichtalkalischer Lsg. fand bei Zimmertemp. Oxydation zu Essigsäure u. CO_2 statt. II reagierte mit Permanganatlg. nur bei einem Überschuß an Alkali:



mit H_2O_2 in Ggw. von Phosphaten wurde es nicht merklich oxydiert. — *Brenztraubensäure*, welche intermediär bei der Oxydation von *Aceton*, *Milchsäure* u. α -*Propylen-glykol* entsteht, zerfiel bei der Oxydation mit KMnO_4 -Lsg. nach folgendem Schema:




Aceton u. *Acetessigsäure* ließen sich mit Peroxyd in Ggw. von Dinatriumphosphat nur schwer oxydieren. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 211—22. Chicago, Sp. M. Inst.) WINKELMANN.

M. H. Power und Fred W. Upson, *Die Oxydation von d-Glucose durch Luft in Calciumhydroxydlösung*. (Vgl. NEF, LIEBIGS Ann. **403**. 206; C. **1914**. I. 1491 u. GLATTFELD u. HANKE, Journ. Americ. Chem. Soc. **40**. 973; C. **1918**. II. 710.) Von 100 g *d*-Glucose, die zu 10 l gesätt. Kalklg. gegeben wurden, wurden durch Luftsauerstoff in 236 Stdn. 95,0 g oxydiert. Die Oxydationsprodd. waren: 4,87 g CO_2 , 23,1 g Ameisensäure u. 84,9 g nichtflüchtige Säuren. Die Zerlegung der nichtflüchtigen Säuren ergab: 14,7 g unreines *d*-Arabonsäurephenylhydrazid, 9,67 g *Ca*-Glykolat, 4,1 g Oxalsäure, 6 g hochschm., in A. unl. Brucinsalz (wahrscheinlich von *d*-Erythronsäure) u. 19,8 g hochschm., in A. l. Brucinsalz, aus dem ein Chininsalz isoliert wurde, das die Eigenschaften des *Chinin-l-glycerats* aufwies; der größte Teil der nichtflüchtigen Fraktion bestand aus undefinierbaren Oxysäuren. *d*-Arabonsäurephenylhydrazid wurde durch Umkrystallisieren aus h. W. u. Entfärben mit Kohle gereinigt, F. 210° , $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = -14,1^\circ$, u. in das *Ca*-Salz, $\text{Ca}(\text{C}_5\text{H}_5\text{O}_6)_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, übergeführt, $[\alpha]_{\text{D}}^{22} = -2,58$, aus welchem reines *d*-Arabonsäurelacton erhalten werden konnte, F. $90-92^\circ$, $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = +69,6^\circ$. — Zum Vergleich wurde α -Fructose unter den nämlichen Bedingungen oxydiert. Dabei wurde weniger CO_2 (4,28 g), jedoch mehr Oxalsäure (9,1 g) als bei der Oxydation der *d*-Glucose erhalten. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 195—202. Lincoln, Nebraska, Univ.) WINKELMANN.

Hans Pringsheim und Jesaia Leibowitz, Über die Beziehung zwischen optischem Drehungsvermögen und Struktur in der Polysaccharidchemie. Vf. wenden das Prinzip der opt. Superposition nach dem Verf. von HUDSON auf die von ihnen erhaltenen Spaltstücke des Stärkemoleküls an. Denkt man sich das Molekül der Glucose in 2 Teile A u. B zerlegt gemäß Formel I u. in analoger Weise die Moleküle der Amylobiose (II) u. der Amylotriose (III), so ergeben sich für die Mol.-Drehungen dieser Zucker folgende Gleichungen:

$$M_{\text{Glucose}} = M_A + M_B; \quad M_{\text{Amylobiose}} = M_A + M_L + M_{A'} + M_B;$$
$$M_{\text{Amylotriose}} = M_A + M_L + M_{A'} + M_L + M_{A'} + M_B =$$
$$M_A + M_B + 2M_{A'} + 2M_L,$$

folglich $M_{\text{Amylotriose}} - M_{\text{Amylobiose}} = M_{\text{Amylobiose}} - M_{\text{Glucose}} = M_{A'} - M_L.$ Da



die Drehungen der α - u. β -Formen der Di- u. Triose nicht bekannt sind, werden

der Berechnung diejenigen Werte zugrunde gelegt, die sich aus den Gleichgewichtsdrehungen ergaben, unter der Annahme, daß die Gleichgewichtskonstante $k = c_\beta/c_\alpha$ für die meisten bisher untersuchten Zucker eine konstante Größe ist. Es ergibt sich daraus:

$$\begin{array}{lcl} M_{\text{Amylotriose}} & = 504 \times 124^\circ = 62\,700 & \} \text{ Differenz} = 25\,100. \\ M_{\text{Amylobiose}} & = 342 \times 110^\circ = 37\,600 & \\ M_{\text{Glucose}} & = 180 \times 53^\circ = 9\,500 & \} \text{ Differenz} = 28\,100. \end{array}$$

Viel besser wird die von der Theorie geforderte Übereinstimmung, wenn man die entsprechenden Acetate heranzieht. Für α -Amylobioseoktacetat ist $[\alpha]_D = +121^\circ$ (Chlf.), für α -Amylotriosehendekaacetat $[\alpha]_D = +128^\circ$ (Chlf.). Die entsprechenden Differenzen werden dann 41 600 bzw. 42 200. Vff. schließen daraus, daß der in der Amylobiose angenommene γ -Glucoseres in der Amylotriose zweimal, u. zwar mit gleicher Konfiguration, auftritt. — Ganz analog liegen die Verhältnisse beim Di- u. Trihexosan (IV u. V). Die Differenz beträgt für die Anhydride 30 400, für die Acetate 42 800. Dihexosanhexacetat $[\alpha]_D = +151,6^\circ$, Trihexosannonacetat $[\alpha]_D = +151,3^\circ$, beide in Chlf. gemessen. — Nimmt man an, daß im Dihexosan der eine Glucoseres α -glucosid., der andere β -glucosid. gebunden ist, so folgt:

$$M_{\text{Dihexosan}} = M_{A'} + M_L - M_{A'} + M_L = 2M_L,$$

folglich $M_L = 25\,100$. Mithin ist:

$$M_{A'} = M_{\text{Amylobiose}} - M_{\text{Glucose}} - M_L = 3000 \text{ und}$$

$$M_{\text{Trihexosan}} = 3M_L + M_{A'} = 3 \cdot 25\,100 + 3000 = 78\,300$$

in guter Übereinstimmung mit der Erfahrung. — Aus diesen Berechnungen leiten Vff. ab, daß die Triamylose aus der Diamylose durch Einschlebung des gleichen Komplexes hervorgeht, um den auch das Dihexosan erweitert werden muß, um Trihexosan zu ergeben. — Im Anschluß daran weisen Vff. darauf hin, daß die Glieder jeder der beiden Polyamylosenreihen fast genau die gleiche $[\alpha]_D$ besitzen, u. erblicken darin eine Stütze für die Annahme, daß die Polymerisation der Grundkörper Di- u. Triamylose zu den höher molekularen Polyamylosen ausschließlich durch die Betätigung von intermolekularen Kräften ohne intramolekulare Hauptvalenzverschiebung erfolgt. Das opt. Verh. ist also als eine Funktion der Konst. der Strukturmolekel aufzufassen u. von deren Polymerisations- bzw. Assoziationszustand fast unabhängig. Vff. folgern weiter daraus, daß Di- u. Trihexosan nicht die wahren Elementarkörper des Amylopektins bzw. der Amylose darstellen, sondern aus den sehr labilen Elementarkörpern durch innere Umlagerung hervorgegangen sind. — Auf Grund analoger Berechnungen lehnen Vff. die Formel für die *Diamylose* nach KARRER ab. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2808—14. 1925. Berlin, Chem. Inst. der Univ.)

OHLE.

C. S. Hudson, H. Pringsheim und J. Leibowitz, *Beziehungen zwischen Drehungsvermögen und Struktur in der Zuckergruppe. XI. Optische Beziehungen zwischen Amylobiose, Amylotriose und Glucose.* (X. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2052; C. 1925. II. 1741.) Der Inhalt der Arbeit deckt sich mit dem 1. Teil der Arbeit von PRINGSHEIM u. LEIBOWITZ (vorst. Ref.). (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 288—291.)

OHLE.


R. F. Hunter, *Die Chemie der polycyclischen Systeme in ihrer Beziehung zu ihren homocyclischen, ungesättigten Isomeren. II. Intraannulare Tautomerie.* (I. vgl. Chem. News 128. 209; C. 1924. II. 2463.) Vf. bespricht eingehend die Isomerieverhältnisse der *Dimethyl-dicyclo-pentanoncarbonsäure*, welche Verb. als solche, sowie als die isomere ungesätt. Mono-cyclo-carbonsäure reagieren kann. (Chem. News 132. 117 bis 122.)

TAUBE.

Charles D. Hurd, *Acetyldiphenylamin aus Keten.* Während VAN ALPHEN (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 826; C. 1925. I. 80) *Acetyldiphenylamin* aus Diphenyl-

amin u. Keten nicht erhalten konnte, ist es dem Vf. auf folgende Weise gelungen: Er leitete Keten im Überschuß durch eine eiskalte Lsg. von Diphenylamin in Ä., fällte das überschüssige Diphenylamin durch Einleiten von trockenem HCl, filtrierte u. ließ im Filtrat den Äther verdunsten. Das zurückbleibende Öl wurde bei Zusatz von W. fest u. zeigte nach der Reinigung auf Ton den F. 98—100°. Beste Ausbeute: 33%. Wenn das Reaktionsgefäß nicht in Eis gekühlt wurde, betrug die Ausbeute nur 8%. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 291. Evanston, Illinois, Northwestern Univ.) WI.

Hans Schmidt und Friedrich Hoffmann, *Über innere Diazobenzolchloridstibinchlorürkomplexsalze. Über aromatische Antimonverbindungen. IX.* (VIII. vgl. LIEBIGS Ann. **429**. 123; C. **1923**. III. 37.) Bei Diazotierung amino-substituierter Arylverb. des 3-wertigen Sb vom Typus $\text{NH}_2(\text{HCl})\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{SbCl}_2$ entstehen gelb bis orange gefärbte, wl. Diazoverb. Diese sind als Sonderfall der Mayschen Doppelsalze (**I**) (Journ. Chem. Soc. London **101**. 1037; C. **1912**. II. 1019) mit innerer Komplexbildung u. als neuer Typus innerer Komplexsalze anzusehen. Als Zwischenglied ist eine noch unbekannte Verb. vom Typus **II** anzunehmen. Am stabilsten war die aus *p*-Chlor-*m*-aminophenylstibinchlorürchlorhydrat, 3- $\text{NH}_2(\text{HCl})\cdot 4\text{-Cl}\cdot\text{C}_6\text{H}_3\cdot 1\text{-SbCl}_2$, entstandene Verb., für welche die Formel **III** am wahrscheinlichsten ist. Dagegen sind die analogen Verb. aus *m*- u. *p*-Aminophenylstibinchlorür (**IV** u. **V**) so labil, daß sie nicht getrocknet u. analysiert werden konnten. — Mit W. tritt Entfärbung u. Hydrolyse des Antimonchlorürs ein. Andere Lösungsm., z. B. CH_3OH , zers. unter N_2 -Entw. Mit wss. Alkalien entstehen alkalil. Stibinsäuren, die schwierig zu trennen u. zu reinigen sind.




Versuche: *m*-Amino-*p*-chlorphenylstibinchlorürchlorhydrat. Die Darst. wurde gegenüber HANS SCHMIDT (LIEBIGS Ann. **421**. 231; C. **1921**. I. 134) etwas abgeändert. Aus 33 g *m*-Nitro-*p*-chlorphenylstibinsäure 22—23 g. F. 151—153°. Läßt sich aus 20 Teilen CH_3OH , 35 Teilen W. u. 2 Teilen HCl (D. 1,17) umkrystallisieren (geringe Sb-Abspaltung). — *p*-Chlor-*m*-diazobenzolchloridstibinchlorür-Komplexsalz $\text{C}_6\text{H}_3\cdot 4\text{-Cl}\cdot 3\text{-N}_2\text{Cl}\cdot 1\text{-SbCl}_2 = \text{C}_6\text{H}_3\text{N}_2\text{Cl}_4\text{Sb}$ (**III**) am reinsten aus *p*-Chlor-*m*-aminophenylstibinchlorürchlorhydrat in CH_3OH auf Zusatz von Eg. u. Amylnitrit; Ausbeute fast 100% bei Diazotierung in wss.-salzsaurer Lsg. Orangegelbes Pulver, verpufft manchmal schon bei vorsichtigem Drücken, im F.-Röhrchen schon unter 100° bei langsamem Erhitzen. Unl. in Ä., Bzl. u. Bzn.; A. u. CH_3OH zers. unter N_2 -Entwicklung, ebenso W., verd. HCl, Eg. u. Na-Acetatlsg. in der Kälte. — Für *m*-Aminophenylstibinchlorürchlorhydrat wurde *m*-Aminoacetanilid als Ausgangsmaterial gewählt. Aus *m*-Nitroacetanilid mit Fe u. HCl. Blättchen aus Aceton-Bzl., F. 86,5° (SCHIFF u. OSTROGOVICH, LIEBIGS Ann. **293**. 382 [1896]: 70—100°), sl. in W. u. Aceton, unl. in Bzl. Chlorhydrat, Nadelchen, F. 245° (SCHIFF u. OSTROGOVICH: 194°, WALLACH u. SCHULZE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **15**. 3020 [1882]: 280°). Daraus nach D. R. P. 254 421 *m*-Acetylstibansäure, die zu *m*-Aminophenylstibinsäure verseift u. mit HCl + Eg. u. SO_2 in *m*-Aminophenylstibinchlorürchlorhydrat übergeführt wird. *m*-Stibinchlorürdiazobenzolchloridkomplexsalz, $\text{C}_6\text{H}_4\cdot 3\text{-N}_2\text{Cl}\cdot 1\text{-SbCl}_2$ (**IV**). Sehr zers.

Kleine Mengen ließen sich trocknen (Tonteller) u. zeigten den Zers.-Punkt 165—167°. — *p*-Aminophenylstibinchlorürchlorhydrat $\text{C}_6\text{H}_7\text{NCl}_3\text{Sb}$. Darst. ganz analog der *m*-Verb.




(s. o.). Krystalle aus $\text{Eg.} + \text{HCl}$. F. $122-125^\circ$ bei verschiedenen Darstst. Der *m*-Verb. sehr ähnlich, aber noch zersetzlicher. Ll. in CH_3OH . — *p*-Diazobenzolchloridstibinchlorürkomplexsalz, $\text{C}_6\text{H}_4-3-\text{N}_2\text{Cl}-1-\text{SbCl}_2$ (V), tiefgelber, krystalliner Körper,

wird beim Trocknen braun u. harzig. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 555—60.) HARMS.

Hans Schmidt und Friedrich Hoffmann, Ein inneres Diazobenzolchloridarsinchlorürkomplexsalz und seine Umsetzung zur *p*-Phenylarsinsäure. Über aromatisch-Arsenverbindungen. II. (I. vgl. LIEBIGS Ann. 421. 159; C. 1921. I. 133.) Amino-substituierte Arylarsinchlorüre vom Typus $\text{NH}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{AsCl}_2$ geben beim Diazotieren gelb gefärbte wl. Diazoverb., die als innere Komplexsalze aufzufassen sind (s. vorst. Ref.). Die vom *p*-Aminophenylarsinchlorür abgeleitete Diazoverb. wurde durch Red. von *p*-Diazophenylarsinsäure mit SO_2 in stark salzsaurer Lsg. fast quantit. erhalten. Sie ist sattgelb gefärbt, was durch den Nebenvaleanzring der Formel I verständlich wird u. ist als Sonderfall der von FÖLDI (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2489; C. 1924. I. 301) beschriebenen Doppelsalze von Diazobenzoltrichlorid u. AsCl_3 anzusehen. Sie ist in ihrem Verh. dem *p*-Chlor-*m*-diazobenzolchloridstibinchlorürkomplexsalz sehr ähnlich. Bei Einw. von NaHCO_3 tritt Zers. ein nach:



Durch Mol.-Gew.-Best. des Reduktionsprod. von II (III) konnte bewiesen werden, daß die Verb. II monomolekular ist. Diese selbst ist zur Best. des Mol.-Gew. zu wl. Es gelang nicht, die hellbräunliche Färbung von II u. III zu entfernen. — Die Diazoverb. des *m*-Amino-*p*-oxyphenylarsinchlorürs ist nur hellgelb gefärbt u. ist sl. in W. u. A. Die wss. Lsg. färbt sich am Licht unter langsamer Zers. rot. Sie ist aufzufassen als ein Diazophenol (Chinondiazid). Die Verb. ist kein salzsaures Salz, u. es ist nicht anzunehmen, daß zwischen dem modifizierten Diazorest u. der $-\text{AsCl}_2$ -Gruppe eine Komplexbindung besteht.



Versuche: *p*-Diazobenzolchloridarsinchlorürkomplexsalz $\text{C}_6\text{H}_4-4-\text{N}_2\text{Cl}-1-\text{AsCl}_2 = \text{C}_6\text{H}_4\text{N}_2\text{Cl}_3\text{As}$ (I). Die Red. der *p*-Diazophenylarsinsäure (s. o.) wird durch 1 Tropfen n. HJ in 3 ccm HCl (D. 1,17) katalysiert. Zartes, gelbes Pulver, Zers.-Punkt ca. 100° . Ein Teil des Chlors ist hydrolyt. durch OH ersetzt. Auch durch direktes Diazotieren von *p*-Aminophenylarsinchlorür in wss.-salzsaurer bzw. mit Amylnitrit in alkoh.-salzsaurer Lsg. erhältlich. W. entfärbt ohne zu lösen u. zers. allmählich. K. CH_3OH löst nicht u. verändert nicht die Farbe, beim Stehen oder Kochen N_2 -Entw. — *p*-Phenylarsinsäure, $\text{C}_6\text{H}_4-1,4-\text{AsOOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_3\text{As}$ (II). Pulver. Magnesiainmischung erzeugt auch beim Kochen keine Fällung. Unl. in W., wl. in CH_3OH , etwas besser in alkoh. HCl. Verliert H_2O im Vakuumexsiccator, das an der Luft wieder angezogen wird. Ausbeute 70%. — *p*-Phenylenchlorarsin, $\text{C}_6\text{H}_4-1,4-\text{AsCl}$ (III), aus II mit SO_2 in konz. alkoh. HCl u. HJ als Katalysator. Voluminöses Pulver von elektr. Eigenschaften. Erweicht über 200° . Wl. in CH_3OH , Bzl. u. Aceton, besser in CS_2 u. Chlf. — 1-Arsinchlorür-3,4-diazophenol (1-Arsinchlorür-3,4-chinon-3-diazid), $\text{C}_6\text{H}_3-1-\text{AsCl}_2-3-\text{N}_2-4-\text{O} = \text{C}_6\text{H}_3\text{ON}_2\text{Cl}_2\text{As}$ (IV), durch Lösen der aus *m*-Amino-*p*-oxyphenylarsinsäure in CH_3OH u. Fällern mit Ä. erhaltenen Verb., die dabei 1 HCl verliert. Sie fällt also aus als Verb. $\text{C}_6\text{H}_4\text{ON}_2\text{Cl}_3\text{As}$. Blaßgelbes Pulver, das beim Erhitzen auf dem Platinblech verglimmt, ohne zu schmelzen. Beim Fällern aus CH_3OH wird

auch ein geringer Teil des am As gebundenen Cl abgespalten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 560—64. Dresden, Techn. Hochsch.)

HARMS.



G. Stadnikow und **Anna Weizmann**, *Über den anomalen Verlauf Grignard-scher Reaktionen*. Es werden magnesiumorgan. Verbb. besprochen, deren Additionsprodd. mit Aldehyden bei Zers. mit W. die Ausgangsmaterialien zurückliefern. Die Mg-organ. Verbb. gehen zurück auf Verss. von STADNIKOFF (Journ. f. prakt. Ch. [2] 88. 19 [1913]). Die Mischungen von Mg, Äthyljodid u. Dimethylanilin u. zum Teil Bzl. wurden in zugeschmolzenen Gefäßen mehrere Jahre lang sich selbst überlassen. Wie l. c. erwähnt, bildeten sich die Krystalle des *Dimethyläthylphenylammoniumjodids*, die aber bei Ggw. von Bzl. sich mit diesem u. Mg umsetzten. Nach 1 Jahr war alles Mg verschwunden unter B. eines dicken Öls, das von Bzl. bedeckt war. Bei weiterer Aufbewahrung vergrößerte sich die untere Schicht auf Kosten des Bzls. Erstere stimmte annähernd auf $C_{16}H_{22}NMgJ = C_6H_5 \cdot (CH_3)_2 \cdot NC_2H_5 \cdot MgJ \cdot C_6H_5$. Die Verb. zers. sich schon bei mehrtägigem Aufbewahren im Exsiccator unter Abscheidung von J u. Bzl. Mit W. entwickelt sich kein Äthan, ein Teil des Dimethylanilins wird in aliph. tertiäre Amine umgesetzt. — Eine Vers.-Fl., in der sich ziemlich große durchsichtige Krystalle abgesetzt hatten, wurde, zusammen mit dem schweren Öl (s. o.) u. Bzl. mit Benzaldehyd versetzt. Die Masse wurde ziemlich dick, woraus zu schließen war, daß die Mg-organ. Verb. mit Benzaldehyd in Rk. getreten war. Indessen wurde nach Zers. mit W. der Aldehyd unverändert zurückgehalten. — Eine andere Mg-organ. Verb., die in ihrem Verh. zu Benzaldehyd die gleiche Anomalie zeigt, wurde aus Mg, Propyljodid u. Benzhydrylbutyläther u. einigen Tropfen Dimethylanilin erhalten. Zusatz von Benzaldehyd gab eine zuerst energ. Rk. Das Prod. wurde mit W. zers. u. aufgearbeitet. Neben Tetraphenyläthan u. in der Hauptsache Benzaldehyd, Benzhydrylbutyläther wurde das erwartete *Phenylpropylcarbinol* nur in ganz geringer Menge erhalten. Auch nach 2-std. Erwärmen des Rk.-Gemisches auf dem Wasserbad war die aus 18 g Propyljodid erhaltene Carbinolmenge nicht einmal ausreichend, um mit Phenyl-i-cyanat die zur Analyse notwendige Substanzmenge zu liefern. Es ist also der Schluß zu ziehen, daß sich mit der Vergrößerung der Masse des Moleküls des Endkomplexes der Mg-organ. Verb. — hier hervorgerufen durch Komplexbildung mit Dimethylanilin u. Benzhydrylbutyläther — der Gang der Rk. immer mehr kompliziert. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 177—86. Moskau, Karpow-Inst.)

HARMS.

C. A. Rojahn und **Gustav Lemme**, *Über Oxy- und Äthoxymercaptane und ihre Kondensationsprodukte*. Um hypnot. wirksame Hydroxyl- und Äthoxylgruppen in Schlafmittel der Sulfonal- oder Veronalreihe einzuführen, sollte die Na-Verb. des Äthylidendiäthylsulfons $Na(CH_3)C(SO_2 \cdot C_2H_5)_2$ mit Äthylenchlorhydrin bezw. β -Chlor-diäthyläther umgesetzt werden, was jedoch nicht gelang. Ebenso wenig konnte Äthylidendiäthylsulfonbromid $Br(CH_3)C(SO_2 \cdot C_2H_5)_2$ mit β -Bromdiäthyläther bei Ggw. von molekularem Cu-Pulver in Xylollsg. umgesetzt werden. Auch die erwartete B. von Dichlormercaptol fand nicht statt. Vielmehr entstand hauptsächlich α, α' -Dithioäthylacetone, $(C_2H_5 \cdot S \cdot CH_2)_2CO$, bezw. bei Anwendung von überschüssigem Mercaptan 1,2,2,3-Tetrathioäthylpropan, $(C_2H_5 \cdot S \cdot CH_2)_2C(SC_2H_5)_2$. Eine andere Möglichkeit bot die Kondensation von Ketonen mit Oxy- u. Äthoxymercaptanen u. Oxydation der Mercaptole zu Sulfonen. Auch letztere Rk. ließ sich noch nicht durchführen. — β -Oxyäthylmercaptan, $HO \cdot CH_2 - CH_2 \cdot SH$ ließ sich mit 55% Ausbeute nach MACDONALD u. BENNETT (Journ. Chem. Soc. London 119. 423; C. 1921. III. 306) aus Glykolchlorhydrin u. NaHS (aus geschmolzenem $Na_2S + H_2S$) erhalten.

Noch besser war die Ausbeute bei γ -Oxypropylmercaptan, $HO \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot SH$, aus Trimethylenglykolchlorhydrin, da die zur B. von Diäthylendisulfid aus Oxyäthylmercaptan führende Nebenrk. ausblieb. Ferner wurden die dem Äthylen- u. Trimethylenglykol entsprechenden Äthermercaptane nach dem Schema I. hergestellt (vgl.

CRETSCHER u. PITTENGER, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 1503; C. **1924**. II. 820)



(β -Äthoxyäthylmercaptan). Letztere Rk. verlief nicht glatt. Neben anderen Nebenprodd.

I $\begin{matrix} \text{S} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \\ | \\ \text{S} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \end{matrix} > \text{S}$ konnten Diäthylendisulfid, Diäthylentrisulfid (I) u. β, β' -Diäthoxydiäthylendisulfid, $\text{S}(\text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{OC}_2\text{H}_5)_2$, erhalten werden. Das Diäthylentrisulfid geht bei Red. in Trithiodiglykol über. — Durch Kondensation mit Äthylmethylketon wurde aus β -Äthoxyäthylmercaptan Methyläthylketon-di-(β -äthoxyäthyl)-mercaptol, $\text{C}_2\text{H}_5(\text{CH}_3)\text{C}(\text{S} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{OC}_2\text{H}_5)_2$, erhalten. — Die Darst. des γ -Äthoxypropylmercaptans, $\text{C}_2\text{H}_5 \cdot \text{O} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2\text{SH}$, war weniger von B. von Nebenprodd. begleitet. Diese Verb. u. auch γ -Oxypropylmercaptan ließen sich mit Hilfe von ZnCl_2 zu Mercaptolen kondensieren, jedoch ließ sich keines der letzteren zu einem Sulfonaleriv. oxydieren.

Versuche. 1,1'-Dithioäthyl-2-propanon, $(\text{C}_2\text{H}_5 \cdot \text{S} \cdot \text{CH}_2)_2\text{CO} = \text{C}_7\text{H}_{14}\text{OS}_2$, aus Dichloraceton u. Äthylmercaptan. Öl, Kp.₁₅ 117—121°. Aus 12,7 g Dichloraceton ca. 6 g. Semicarbazon, $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{N}_3\text{OS}_2$, Krystalle aus Bzn. F. 98—99°. Ll. in Bzl., weniger in A. u. Bzn., wl. in W. Dijodmethylat, $\text{C}_5\text{H}_{20}\text{S}_2\text{J}_2\text{O}$, durch Erhitzen mit CH_3J im Rohr auf 100° (4 Stdn.). Krystalle aus A. F. 182°. Wl. in Bzn., Bzl. u. W. — 1,2,2,3-Tetra-thioäthylpropan, $\text{C}_{11}\text{H}_{24}\text{S}_4$, Öl, Kp.₁₅ 51—53°. — Trimethylenglykolmonoäthyläther aus Trimethylenglykolchlorhydrin u. Na-Äthylat. Daraus mit PBr_3 γ -Brompropyläthyläther. — γ -Äthoxypropylmercaptan, $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{OS}$, durch Zusatz von γ -Brompropyläthyläther zu einer konz. alkoh. Lsg. von KHS u. Rückflußkochen (1 Stde.). Äther. riechende Fl., Kp.₂₀ 52 bis 54°. L. in A., Ä., Bzl., wl. in W. Aus 33,5 g Äther 15—20 g. — Daraus, bezw. dem Na-Salz γ -Äthoxypropylbenzylsulfid, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{OS}$, mit alkoh. Benzylchloridlsg. Öl, Kp.₁₈ 161°. Unl. in W., l. in A., Ä. u. Bzl. Ausbeute fast quantitativ. — Daraus γ -Äthoxypropylbenzylsulfon, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_3\text{S} = \text{C}_2\text{H}_5 \cdot \text{O} \cdot (\text{CH}_2)_3 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_5$, durch Oxydation mit 30%ig. H_2O_2 . Krystalle, F. 45—46°. Ll. in Bzl. u. A., wl. in PAe. u. W. — Acetondi-(γ -äthoxypropyl)-mercaptol, $\text{C}_{13}\text{H}_{28}\text{O}_2\text{S}_2$, durch Kondensation der Komponenten mit ZnCl_2 . Esterartig riechende Fl., nicht destillierbar. — Analog Methyläthylketondi-(γ -äthoxypropyl)-mercaptol, $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{S}_2$. Ausbeute 70%. Auch aus γ -Oxypropylmercaptol u. Dimethylsulfat in alkal. Lsg. Ausbeute 60—70%. Öl, nicht unzers. destillierbar. — γ -Oxypropylmercaptan, $\text{C}_3\text{H}_8\text{OS} = \text{HO} \cdot (\text{CH}_2)_3 \cdot \text{SH}$, aus γ -Chlorpropylalkohol u. NaHS. Unangenehm riechende Fl., Kp.₁₅ 85—90°. Ausbeute 70—80%. Wl. in verd. NaOH. HgCl_2 gibt käsigen Nd. Dibenzoat, $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{S}$. Öl. — Mono-(γ -chlorpropyl)äther des Dithiotrimethylenglykols, $\text{HS} \cdot (\text{CH}_2)_3 \cdot \text{S} \cdot (\text{CH}_2)_3 \cdot \text{Cl} = \text{C}_6\text{H}_{13}\text{S}_2\text{Cl}$, durch Rückflußkochen von 4,5 g γ -Oxypropylmercaptan mit überschüssiger rauchender HCl (3—4 Stdn.). Ausbeute 2 g. Knoblauchartig riechendes Öl. Unl. in W. Benzoat, $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{OS}_2\text{Cl}$. Fast farbloses Öl. Unl. in W. — γ -Oxypropylidisulfid, $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2\text{S}_2$, aus der alkal. Lsg. des γ -Oxypropylmercaptans mit Jod. Unangenehm riechende Fl. L. in W. u. A. Dibenzoat, $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_4\text{S}_2$, dickfl. Öl. — γ -Oxypropylbenzylsulfid, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{OS}$. Fast farblose Fl. Kp.₂₀ 185—188° (etwas Zers.), unl. in W., l. in A. u. Ä. Ca. 30% Ausbeute. Benzoat, $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{S}$. Dickfl. Öl, fast farblos, nicht destillierbar. — Acetondi-(γ -oxypropyl)-mercaptol, $\text{C}_9\text{H}_{20}\text{O}_2\text{S}_2$, wie die Äthoxyverb. Unangenehm riechende Fl. Ll. in A. u. Ä., unl. in W. Nicht unzers. destillierbar. Dibenzoat, $\text{C}_{23}\text{H}_{28}\text{O}_4\text{S}_2$. Fast farblos. Öl. Unl. in W., l. in Ä. u. A. — Methyläthylketondi-(γ -oxypropyl)-mercaptol, $\text{C}_{10}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{S}_2$. Ausbeute 60—70% d. Theorie. Nicht destillierbares gelbliches Öl. Dibenzoat, $\text{C}_{24}\text{H}_{30}\text{O}_4\text{S}_2$, grünliches, zähfl., nicht unzers. destillierbares Öl. — Benzaldehyd-di-(γ -oxypropyl)-mercaptol, $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{S}_2$. Fast farblos. Öl. Dibenzoat, wie alle beschriebenen Benzoate nach SCHOTTEN-BAUMANN erhalten, $\text{C}_{27}\text{H}_{28}\text{O}_4\text{S}_2$. Zähfl. Öl. — Diacetat des β -Oxyäthylmercaptans, $\text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{S} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{O} \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3 = \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3\text{S}$. Aus 15 g Oxyäthylmercaptan durch Rückflußkochen mit Acetanhydrid u. Na-Acetat (2 Stdn.). Ausbeute 8,5 g. Fl., Kp.₂₅ 118—120°. — β -Äthoxyäthylmercap-

see
errata
p. 3976

tan, $C_4H_{10}OS$. (Darst. s. o.) Äther. riechende Fl., leicht flüchtig. Kp_{-15} 37—40°. L. in A., Ä., Chlf. u. Bzl., wl. in W. — β, β' -Di-(äthoxyäthyl)-disulfid, $C_8H_{18}O_2S_2$, aus dem nach dem Abdestillieren voriger Verb. bleibenden Rückstand durch Dest. Öl, Kp_{-15} 150—152°. L. in Ä., A. u. Bzl. — β -Äthoxyäthylbenzylsulfid, $C_{11}H_{16}OS$. Öl. Kp_{-16} 146°. Ausbeute 72%, Unl. in W. — Methyläthylketon-di-(β -äthoxyäthyl)-mercaptol, $C_{12}H_{26}O_2S_2$. Grünlichgelbe, angenehm äth. riechende, nicht unzers. destillierbare Fl. L. in Ä. u. A. Ausbeute 70% d. Theorie. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 263. 612—24. 1925. Braunschweig, Techn. Hochsch.)


HARMS.

Herbert Henry Hodgson und Herbert Greensmith Beard, *Chloride der m-Oxybenzaldehyds*. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 876; C. 1925. II. 21.) m-Oxybenzaldehyd liefert in Eg. mit gasförmigem Cl chloriert 2-Chlor-3-oxybenzaldehyd, $C_7H_5O_2Cl$, aus verd. Eg. F. 139,5°. (Dieselbe Verb. läßt sich auch aus 2-Nitro-3-oxybenzaldehyd nach SANDMEYER herstellen.) Mit Dimethylsulfat hieraus der Methyläther, aus verd. A. F. 57°, mit $KMnO_4$ 2-Chlor-3-methoxybenzoesäure, $C_8H_7O_3Cl$, F. 160°. Ferner vom Aldehyd: Acetylderiv., $C_9H_7O_3Cl$, F. 62°, Benzoylderiv., $C_{14}H_9O_3Cl$, F. 88°, Oxim, $C_7H_6O_2NCl$, aus verd. A., F. 149°, p-Nitrophenylhydrazon, $C_{13}H_{10}O_3N_3Cl$, aus A. F. 244—245°, Semicarbazon, $C_8H_8O_2N_3Cl$, F. 236—237°. 4-Nitro-3-oxybenzaldehyd liefert nach SANDMEYER 4-Chlor-3-oxybenzaldehyd, $C_7H_5O_2Cl$, F. 121°, Oxim, $C_7H_6O_2NCl$, aus verd. A. mit Krystallwasser Zers. bei 106—110°, F. wasserfrei 126°, p-Nitrophenylhydrazon, $C_{13}H_{10}O_3N_3Cl$, aus verd. A. F. 226—227°, Semicarbazon, $C_8H_8O_2N_3Cl$, F. 238 bis 239°. — 2-Chlorbenzaldehyd liefert bei 0—5° mit $NaNO_3$ u. H_2SO_4 nitriert, das Nitroderiv. oximiert u. das Oxim mit Ferrosulfat reduziert 2-Chlor-5-aminobenzaldoxim, $C_7H_7ON_2Cl$, aus A. F. 159—160°. Das Oxim gibt mit $NaNO_2$ diazotiert u. die Diazoverb. mit h. verd. H_2SO_4 zers. 6-Chlor-3-oxybenzaldehyd, $C_7H_5O_2Cl$, aus verd. Eg. F. 111°. (Die Verb. kann auch aus 6-Nitro-3-oxybenzaldehyd nach SANDMEYER hergestellt werden.) Oxim, $C_7H_6O_2NCl$, aus verd. A. mit H_2O , F. wasserfrei 146—147°. p-Nitrophenylhydrazon, $C_{13}H_{10}O_3N_3Cl$, aus verd. A. F. 250—251°, Semicarbazon, $C_8H_8O_2N_3Cl$, F. 236°. 2-Chlor-3-oxybenzaldehyd liefert in Eg. chloriert 2,6-Dichlor-3-oxybenzaldehyd, $C_7H_4O_2Cl_2$, aus W. F. 140°. (Die Verb. entsteht auch aus m-Oxybenzaldehyd durch stärkere Chlorierung in Eg. neben wenig 4,6-Dichlorderiv., sowie aus 6-Chlor-3-oxybenzaldehyd durch Chlorierung in Eg.) Oxim, $C_7H_5O_2NCl_2$, aus verd. A. F. 174—175°, p-Nitrophenylhydrazon, $C_{13}H_9O_3N_3Cl_2$, F. 205—206°. 4-Chlor-3-oxybenzaldehyd gibt in Eg. chloriert 2,4-Dichlor-3-oxybenzaldehyd, $C_7H_4O_2Cl_2$, aus verd. Eg. F. 141°, Oxim, $C_7H_5O_2NCl_2$, aus verd. A. F. 188°, p-Nitrophenylhydrazon, $C_{13}H_9O_3N_3Cl_2$, F. 277—278° (Zers.). Die n. Chlorierung mit $3Cl_2$ liefert 2,4,6-Trichlor-3-oxybenzaldehyd, aus verd. Eg. F. 114°, Na-Salz, Oxim, F. 174°, p-Nitrophenylhydrazon, $C_{13}H_8O_3N_3Cl_3$, F. 272—273° (Zers.). Die folgenden Methoxyderivate lassen sich durch Erhitzen der Oxyverb. mit Bicarbonat u. Dimethylsulfat (15 Min.) herstellen; sie werden aus verd. A. umkrystallisiert. Aus dem entsprechenden Methoxyaldehyd mit $KMnO_4$ 6-Nitro-3-methoxybenzoesäure, F. 255°. Ag-Salz. 2-Chlor-3-methoxybenzaldehyd, $C_8H_7O_2Cl$, F. 56°, Oxim, $C_8H_8O_2NCl$, F. 130,5°. p-Nitrophenylhydrazon, $C_{14}H_{12}O_3N_3Cl$, F. 226—227°. p-Bromphenylhydrazon, $C_{14}H_{12}ON_2 \cdot ClBr$, F. 155—156°. 4-Chlor-3-methoxybenzaldehyd, F. 52°, Oxim, F. 98—99°. p-Nitrophenylhydrazon, F. 251°, p-Bromphenylhydrazon, F. 134°. 6-Chlor-3-methoxybenzaldehyd, F. 62°. (Durch Oxydation 6-Chlor-3-methoxybenzoesäure, F. 170—171°.) Oxim, F. 101,5°. p-Nitrophenylhydrazon, F. 229°. p-Bromphenylhydrazon, F. 100°. 2,6-Dichlor-3-methoxybenzaldehyd, $C_8H_6O_2Cl_2$, F. 102°. (Durch Oxydation 2,6-Dichlor-3-methoxybenzoesäure, $C_8H_6O_3Cl_2$, aus verd. A. F. 149,5°.) p-Nitrophenylhydrazon, $C_{14}H_{11}O_3N_3Cl_2$, F. 214 bis 215°. 2,4-Dichlor-3-methoxybenzaldehyd, F. 82°. (Durch Oxydation 2,4-Dichlor-3-methoxybenzoesäure, F. 163°.) p-Nitrophenylhydrazon, F. 258—260°. 2,4,6-Trichlor-3-methoxybenzaldehyd, $C_8H_5O_2Cl_3$, aus A. F. 76°. (Durch Oxydation 2,4,6-Trichlor-3-methoxybenzoesäure, F. 109°.) Die Nitrierung des 3-Methoxybenzaldehyds liefert 2- u.

6-Nitro-3-methoxybenzaldehyd. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 147—55. Huddersfield, Techn. Coll.) TAUBE.

Grace Potter Rice, *Die isomeren Ester der p-Phenoxy-benzoylacrylsäure*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2319; C. 1924. II. 2841.) Die stabilen *Methyl-* u. *Äthylester* der *p*-Phenoxybenzoylacrylsäure werden durch Einw. des Sonnenlichts in ihre labilen Isomeren umgewandelt, welche mit Jod oder konz. HCl wieder in die stabilen Formen übergehen. Die Säure selbst bildete kein Isomeres. Es wurde ferner das Verh. der Ester zu verseifenden Agenzien u. zu Semicarbazid untersucht. — *p*-Phenoxybenzoylpropionsäure, aus $(C_6H_5)_2O$, Succinanhydrid u. $AlCl_3$ in CS_2 , Ausbeute 58% der Theorie, F. 118—119°. — *Methyl-p-phenoxybenzoylpropionat*, $C_6H_5 \cdot O \cdot C_6H_4 \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CO_2 \cdot CH_3$, F. 59°. — *Äthyl-p-phenoxybenzoylpropionat*, $C_6H_5 \cdot O \cdot C_6H_4 \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CO_2 \cdot C_2H_5$, Kp.₁₅ 255°. Aus diesen beiden Estern wurden durch Bromierung u. darauffolgende Abspaltung von HBr erhalten: *Methyl-p-phenoxybenzoylacrylat* (I), gelbe Nadeln, F. 93°, l. in Ä., CS_2 , Bzl., Chlf. u. h. Methylalkohol, u. *Äthyl-p-phenoxybenzoylacrylat* (II), gelbe Nadeln, F. 46°, ll. in Bzl., Ä., h. A. Letzteres bildete ein *Dibromid* $C_{18}H_{16}O_4Br_2$, F. 78° (Zers.). — *p*-Phenoxybenzoylacrylsäure, $C_6H_5 \cdot O \cdot C_6H_4 \cdot CO \cdot CH:CH \cdot CO_2H$, aus $(C_6H_5)_2O$, Maleinsäureanhydrid u. $AlCl_3$ in 25,5% Ausbeute, Nadeln, F. 121°, ll. in Ä., A., Chlf. u. Eg., wl. in h. W. Gibt mit Brom in Eg., ein *Dibromid* $C_{16}H_{12}O_4Br_2$, F. 156° (Zers.) u. in Chlf. ein *Dibromid* $C_{16}H_{12}O_4Br_2$, F. 116—119° (Zers.). Bei 30-std. Kochen mit verd. Salzsäure wurde in geringer Ausbeute ein krystall. Prod. erhalten, wahrscheinlich α -Hydroxyl-*p*-phenoxy-benzoylpropionsäure, F. 120°, ll. in A., Ä., Chlf. u. h. W. — Aus I u. II entstanden durch mehrwöchige Einw. des Sonnenlichts in Bzl.- oder Ä.-Lsg. die Isomeren: *Farbloses Methyl-p-phenoxybenzoylacrylat* (III), Nadeln, F. 83°, sl. in den gewöhnlichen organ. Solventien u. *farbloses Äthyl-p-phenoxybenzoylacrylat* (IV), Fl. III gab mit 2 Äquivalenten salzsauren Semicarbazids in Ggw. von Na-Acetat α -Semicarbazido-methyl-*p*-phenoxybenzoylacrylat, $C_6H_5 \cdot O \cdot C_6H_4 \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CH(NH \cdot NH \cdot CO \cdot NH_2) \cdot CO_2CH_3$, F. 184°, unl. in den üblichen organ. Solventien. Mit 1 Äquivalent Semicarbazid entstanden 2 isomere *Semicarbazone* $C_6H_5 \cdot O \cdot C_6H_4 \cdot C:(N \cdot NH \cdot CO \cdot NH_2)CH:CH \cdot CO_2CH_3$, F. 141° u. 150°, die sich durch fraktionierte Krystallisation trennen ließen. Auf analoge Weise wurden aus IV α -Semicarbazido-äthyl-*p*-phenoxybenzoylacrylat, F. 178°, unl. in den üblichen Solventien, u. 2 isomere *Semicarbazone* $C_6H_5 \cdot O \cdot C_6H_4 \cdot C:(N \cdot NH \cdot CO \cdot NH_2)CH:CH \cdot CO_2C_2H_5$, F. 156 u. 85°, erhalten. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 269—74. New York, Barnard Coll.) WINKELMANN.

F. Mauthner, *Die Synthese des Oxydivarins*. Die von NAKAO (Journ. Pharm. Soc. Japan Nr. 496. 29; C. 1925. II. 1768) dem *Oxydivarin* zugeschriebene Konst. eines 3,4,5-Triox-1-propylbenzols (V) konnte auf folgendem Wege bewiesen werden. 3,4,5-Trimethoxybenzoylessigester (I) wurde zu 3,4,5-Trimethoxybenzoylmethyllessigsäure-äthylester (II) alkyliert, aus dem durch Ketonspaltung 3,4,5-Trimethoxyphenyläthylketon (III) entsteht. Hieraus wird durch Red. nach CLEMMENSEN 3,4,5-Trimethoxy-1-propylbenzol (IV) erhalten, das durch HJ zu V entalkyliert wird. Das entstandene 3,4,5-Triox-1-propylbenzol war vollkommen ident. mit dem aus *Ramalina diracerata* erhaltenen *Oxydivarin*. Die Verb. hat hiernach große Ähnlichkeit mit *Elemicin* (3,4,5-Trimethoxy-1-allylbenzol) u. *Pikamar* (3,5-Dimethoxy-4-ox-1-propylbenzol).




Versuche. *Trimethylgallussäuremethylester* siedete, viel höher als nach der


Angabe WILES (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **21**. 2022 [1888]), bei 297—298° (767 mm). Die Darst. des 3,4,5-Trimethoxybenzoylessigesters konnte wesentlich verbessert werden. Die Ausbeute betrug 30,5 g aus 64 g Trimethylgallussäuremethylester. Die Alkylierung erfolgte mit Na-Äthylat u. CH_3J , u. die Ketonspaltung durch Erwärmen mit 25%ig. H_2SO_4 . Aus 30 g Trimethoxybenzoylessigester wurden 16,5 g 3,4,5-Trimethoxyphenyläthylketon, $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_4$ (III) erhalten. Nadeln aus Lg. F. 51—52°. Ll. in k. A., Bzl., Eg. u. warmem Lg. u. PAe. *p*-Nitrophenylhydrazon, $\text{C}_{16}\text{H}_{21}\text{O}_6\text{N}_3$, rote Nadeln aus A. F. 182 bis 183°. Red. mit amalgam. Zn u. HCl durch 8 Stdn. Kochen zu 3,4,5-Trimethoxy-1-propylbenzol, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_3$, Öl. Kp.₁₁ 143—144°. Aus 27,2 g Keton 8 g. Der F. des Oxydivarins wurde zu 78° gefunden. (Journ. f. prakt. Ch. [2] **112**. 268—72. Budapest, Univ.)

HARMS.



Lauder W. Jones und Everett S. Wallis, Die Beckmannsche Umlagerung beim Vorhandensein optisch-aktiver Radikale. JONES u. HURD (Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 2422; C. 1922. III. 509; vgl. HURD, Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 1472; C. 1923. III. 1458) geben für die Umlagerung der Halogenamide, Säureazide u. Hydroxamsäuren nach dem Vorbilde von STIEGLITZ folgendes Schema:



Vff. prüfen nun die von ihnen aufgestellte Hypothese an Verbb. mit opt. akt. R. Es können theoret. hierbei 3 Fälle eintreten: entweder racemisiert sich R oder es bleibt akt. u. behält seine Konfiguration, oder es bleibt akt. u. erleidet Waldensche Umkehrung. *d*-Benzylmethylacetazid, $\text{C}_7\text{H}_7(\text{CH}_3) \cdot \text{CH} \cdot \text{CO} \cdot \text{N}_3$, gibt ein rechtsdrehendes i-Cyanat (III). Zur Erklärung kann man annehmen, daß in dem hypothet. Zwischenprod. (II) R vor der Ablösung vom C-Atom schon mit dem N-Atom durch eine Partialvalenz gebunden ist, u. daß somit eine Konfigurationsänderung von R verhindert wird. Andererseits kann man im Hinblick auf die Umsetzung:



während der das asymm. Mol. ein positives Ion ist, annehmen, daß in unserem Falle R während der Wanderung als freies positives Radikal vorhanden ist. *d*-Benzylmethylmethyl-i-cyanat gibt mit HCl salzsaures *d*-Benzylmethylmethylamin, mit NH_3 *d*-Benzylmethylmethylharnstoff u. mit sd. W. s. *d,l*-Dibenzylmethylmethylharnstoff. Das K-Salz des *d*-Benzylmethylmethylhydroxamsäurebenzylesters zerfällt zum deutlich wahrnehmbaren i-Cyanat, das mit sd. W. obigen s. *d,l*-Harnstoff gibt. Die Racemisation ist vielleicht durch die hohe Temp. bedingt.



Versuche. Zur Erzielung eines besseren Ausbeute erfolgt die Darst. von *d,l*-Benzylmethylelessigsäure (IV) in Abänderung der Angaben von CONRAD u. BISCHOFF (LIEBIGS Ann. **204**. 177 [1880]) derart, daß zuerst die Methyl-, dann die Benzylgruppe eingeführt wird. Benzylelessigsäureäthylester sd. unter teilweiser Zers. (vgl. EHRLICH, LIEBIGS Ann. **187**. 13. [1879]; CONRAD, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **11**. 1055. [1878]). *dl*-Benzylmethylelessigsäureäthylester wird durch überschüssiges alkoh. KOH zur Säure IV, F. 36,5°, Kp.₉ 144°, verseift. Die Spaltung in die opt.-akt. Isomeren erfolgt nach KIPPING u. HUNTER (Journ. Chem. Soc. London **83**. 1005 [1903]). Aus dem *d*-Chininsalz, F. 120—121°, erhält man mit verd. H_2SO_4 die *d*-Benzylmethylelessigsäure, $\alpha_D^{20} = +20,10^\circ$; $+20,74^\circ$; $+20,35^\circ$ ($l = 100$ mm). Die Rückstände der fraktionierten Krystallisation geben unreine *l*-Benzylmethylelessigsäure, $\alpha_D^{20} = -9,56^\circ$ ($l = 100$ mm). *d*-Benzylmethylelessigsäuremethylester, aus *d*-Säure in wasserfreiem Methylalkohol u. trockenem HCl bei 0—30°, angenehm riechende farblose Fl., $\alpha_D^{20} = +26,75^\circ$ ($l = 100$ mm). Der analog dargestellte *l*-Benzylmethylelessigsäuremethylester war nicht rein, $\alpha_D^{20} = -12,66^\circ$. — *d*-Benzylmethylacethydroxamsäure, $\text{C}_7\text{H}_7(\text{CH}_3)\text{CH} \cdot \text{CO} \cdot \text{NH} \cdot \text{OH}$. B. aus

d-Benzylmethylelessigsäuremethylester u. freiem Hydroxylamin in A. in Ggw. von Natriumäthylat. Die Reindarst. erfolgt über das Cu-Salz, das durch H_2S zersetzt wird. Krystalle (aus Essigester + Lg.). F. 121,5°. Swl. in Lg. u. Bzl., wl. in k. W. $[\alpha]_D^{20} = +63,2^\circ$. Zeigt nach 12 Wochen keine nennenswerte Racemisation. *l*-Benzylmethylethylacethydroxamsäure war nicht ganz rein. F. 118,5—120°. $[\alpha]_D^{20} = -31,1^\circ$. *d,l*-Benzylmethylacethydroxamsäure, F. 124,4°. *d,l*-Benzylmethylacethydroxamsäurebenzoyl ester, $C_6H_7(CH_3)CH \cdot CO \cdot NH \cdot O \cdot CO \cdot C_6H_5$, Krystalle (aus Essigester + Lg.), F. 111 bis 120°. — *d*-Benzylmethylacethydroxamsäurebenzoyl ester, F. 116°; unl. in W. $[\alpha]_D^{20} = +54,5^\circ$. Beim Erwärmen in verd. NaOH erfolgt Umlagerung. — *l*-Benzylmethylacethydroxamsäurebenzoyl ester, F. 114—116°. $[\alpha]_D^{20} = 25,3^\circ$. Trocknes K-Salz lagert sich an der Luft in heftiger Rk. um. Ein Überschuß von A. oder alkoh. NaOH hydrolysiert zur Säure. Löst man das K-Salz in W. von 5° u. läßt die Lsg. sich auf 15—20° erwärmen, so erfolgt ebenfalls Umlagerung. Beim Kochen mit W. bildet sich *s*. *Dibenzylmethylmethylharnstoff*. Nadeln (aus Essigester od. Aceton). F. 199°. L. in h. A., unl. in W. *d*- u. *l*-Benzoyl ester geben einen Harnstoff, F. 198—199°, der in A. eine kaum nennenswerte Rotation zeigt. — *d*-Benzylmethylelessigsäure gibt mit $SOCl_2$ das *d*-Benzylmethylacetylchlorid, das nur einmal bei der Dest. racemisiert wurde. Fl. Kp., 105°. $\alpha_D^{20} = +12,70^\circ$ (l = 50 mm). Gibt bei 5° mit Natriumazid in Ä. *d*-Benzylmethylacetazid. (Über 5° erfolgt teilweise Zers.) Unbeständige, farblose Fl. Zers. sich langsam oberhalb 10°. L. in den gewöhnlichen organ. Mitteln. $\alpha_D^{20} = +36,77^\circ$ (l = 50 mm, bei 5°). Lagert sich in Bzl. um zu *d*-Benzylmethylmethyl-*i*-cyanat. Kp., 82°. $\alpha_D^{20} = +28,75^\circ$ (l = 50 mm); $[\alpha]_D^{20} = +52,5^\circ$. Bei der Dest. hinterbleibt ein geringer Rückstand, wahrscheinlich eine polymere Verb. — *d,l*-Benzylmethylmethyl-*i*-cyanat, Kp., 78°, entsteht auf analoge Weise. *d,i*-Cyanat gibt mit sd. W. *s*. *Dibenzylmethylmethylharnstoff*, Krystalle. F. 198°, in Methylalkohol keine nennenswerte Rotation. Gibt ferner mit NH_3 in Bzl. *d*-Benzylmethylmethylharnstoff, aus verd. A. F. 136°, $[\alpha]_D^{20} = +10,7^\circ$. *d,l*-Benzylmethylmethylharnstoff. F. 149°. *d,i*-Cyanat gibt mit konz. Salzsäure salzsaures *d*-Benzylmethylmethylamin, hygroskop. Krystalle. F. 147°. $[\alpha]_D^{20} = +16,6^\circ$. — Es wurde die Zersetzungsgeschwindigkeit von Benzylmethylacetazid bei 35° in Bzl. gemessen, sie entsprach einer unimolekularen Rk.; $K_{350} = 0,01178$. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 169—81. Princeton, Univ.) WINK.


H. W. Underwood, jr. und E. L. Kochmann, Reaktionen der Aminoziämsäureäthylester mit Brom. *o*-, *m*- u. *p*-Aminoziämsäureäthylester werden in 45, 60 u. 52%ig. Ausbeute aus den entsprechenden Nitroverbb., welche nach der Methode von MÜLLER (LIEBIGS Ann. 212. 124. [1882]) erhalten wurden, durch Red. mit Zinn u. Salzsäure dargestellt. Die Bromierung erfolgte in der Kälte, Lösungsm. Chlf. — *o*-Aminoziämsäureäthylester gab 2 Bromderivv. Beim Behandeln von 1 Mol. Ester mit 8 Atomäquivalenten Brom wurde eine dunkelrote M. erhalten, F. 235—239°, deren Analyse für ein Perbromid $C_{11}H_{11}O_2NBr_7$ sprach. Dieses wurde beim Stehen über Nacht gelb. Nachdem es mehrmals aus Eg. u. dann aus A. umkrystallisiert worden war, schmolz es bei 251—253° u. schien der Analyse zufolge Tetrabrom-*o*-aminoziämsäureäthylester, $C_{11}H_{11}O_2NBr_4$, zu sein. Wenn statt 8 nur 2 Atomäquivalente Brom angewandt wurden, erhielt man dieselbe Verb. Wahrscheinlich sitzen 2 Br-Atome in der Seitenkette u. 2 im Kern, welche Annahme durch eine Fällung mit Silbernitrat erhärtet wurde. — *m*-Aminoziämsäureäthylester bildete ebenfalls 2 Bromderivv., u. zwar je nach den angewandten Brommengen Pentabrom-*m*-aminoziämsäureäthylester, $C_{11}H_{10}O_2NBr_5$, F. 145°, u. Tribrom-*m*-aminoziämsäureäthylester, $C_{11}H_{10}O_2NBr_3$, F. 110°. Die Rkk. dieser Derivv. deuten darauf hin, daß sich in dem einen Fall 2 Br-Atome in der Seitenkette u. 3 im Kern, in dem andern Fall alle 3 im Kern befinden. Wahrscheinlich geht die Substitution im Kern leichter vonstatten als die Anlagerung an die Doppelbindung der Seitenkette. — Wenn *p*-Aminoziämsäureäthylester mit einem Überschuß an Brom behandelt wurde, entstand Tribrom-*p*-aminoziämsäureäthylester, $C_{11}H_{12}O_2NBr_3$, F. 112,5°,

mit nur 1 Br-Atom in der Seitenkette. Man kann sich dies erklären, wenn man annimmt, daß das Brom zuerst in den Ring eintritt u. der dabei gebildete HBr an die ungesätt., aliphat. Bindung addiert wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 254—57. Cambridge, Mass. Inst. of Techn.)

WINKELMANN.

Hans Stobbe, Gustav Ljungren und Joachim Freyberg, *Eine Parallele zwischen Diphenylfulgid und Dibenzalthiodiglykolsäureanhydrid*. Das *Diphenylfulgid* (I) u. das *Dibenzalthiodiglykolsäureanhydrid* (II) haben im Gegensatz zu ihren farblosen Dicarbonsäuren eine leuchtend citronengelbe Farbe; I bleibt in Bzl. im Dunklen nach 4 Wochen unverändert, II wird stetig hydratisiert. — Beim Verd. einer gesätt. gelben Eg.-Lsg. von I mit W. auf 70% wird erst nach 14 Tagen ein Krystall der *Diphenylfulgensäure* abgeschieden; gesätt. gelbe Eg.-Lsgg. von II dagegen zeigen bei Verd. mit W. schneller Beginn der Säureabscheidung u. Verschwinden der gelben Lösungs-farbe. I wird also leichter gebildet u. umgekehrt schwerer hydratisiert als II u. der 5-Ring ist hier dem 6-Ring an Beständigkeit wesentlich überlegen. — Die Absorptionskurven für neutrale Lsgg. von I u. II weisen beide sehr charakterist., in gleichen Spektralgebieten liegende Doppelbänder auf (vgl. Original); die von I sind flacher als von II, u. die Maxima von II sind mehr nach den Stellen geringerer Konz. verlegt. — Dem S-Atom in II wird keine wesentliche Bedeutung in opt. Hinsicht zuzuschreiben sein; es fungiert nicht als Chromophor, ist in stark gesätt. Zustände, entfaltet also nur ein geringes Maß von Restaffinitäten. — I u. II lösen sich in Trichloressigsäure mit weit tieferer Farbe als in Chlf. oder anderen neutralen Fl. Zusatz von W. scheidet die gelben Anhydride ab, nicht die leicht dissoziierbaren Trichloracetate. Die Absorptionskurve der Trichloracetatlsg. von I ist in ihrem Gesamtverlauf gegenüber der Kurve der Chlf.-Lsg. stark nach dem Sichtbaren verschoben u. zeigt ein schmales, scharfes Band bei $1/\lambda = 2600$, die Kurve der Trichloracetatlsg. von II dagegen zeigt nur eine Andeutung eines Bandes an entsprechender Stelle u. ist weniger stark nach dem Sichtbaren verschoben. Die Halochromie ist also bei I weit ausgeprägter als bei II. — Das Trichloracetat von II ist analog dem Diphenylfulgidtrichloracetat (vgl. STOBBE u. DIETZEL, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 3567; C. **1923**. I. 434) zu formulieren. — In II werden die freien Valenzen des S-Atoms durch das in p-Stellung befindliche O-Atom zum größten Teil abgesättigt, so daß dem S-Atom nur eine geringe Restaffinität bleibt. — Aus der im Original wiedergegebenen Kurve der Lichtabsorption der *Diphenylfulgensäure* u. der *Dibenzalthiodiglykolsäure* im A. u. in Trichloressigsäure folgt, daß die bei I stark ausgeprägte, bei II eben noch erkennbare Halochromie nach Sprengung des Anhydridringes kaum mehr in die Erscheinung tritt.

Versuche. Nach Verss. von **Otto Horn** wurden aus Bernsteinsäureester u. Benzaldehyd unter verschiedenen Bedingungen *Diphenylfulgensäure*, *Dibenzalbernsteinsäure* (III) u. γ -Phenylitaconsäure (IV) dargestellt. In äther. Lsg. überwiegt bei starker Kühlung III, bei Temp. bis zu 35° IV; in alkoh. Lsg. tritt fast nur IV auf.




— Am besten erhält man III aus 1 Mol. Benzaldehyd u. Phenylitaconsäureester + 2 Moll. alkoh. Na-Äthylat. — *Dibenzalthiodiglykolsäure*, aus 2 Moll. Na-Äthylat + 2 Moll. Benzaldehyd in A. oder Ä. + 1 Mol. Thiodiglykolsäureester; F. 228° (Zers.); in 100 ccm sd. Bzl. l. 0,0244 g. — *Dibenzalthiodiglykolsäureanhydrid*, $\text{C}_{18}\text{H}_{12}\text{O}_3\text{S}$ (II), aus der Säure mit sd. Acetylchlorid; citronengelbe Nadeln, aus CS_2 oder Bzn., F. 110°; ll. in Chlf., l. in Eg., A., swl. in PAe. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 265—72. Leipzig u. Lund.)

BUSCH.

G. S. Hiers und Roger Adams, *Über die Reduktion der o-Phenylen-essig-propionsäure und verschiedener aromatischer Amine mit Wasserstoff unter Verwendung von Platinoxid-Platinschwarz als Katalysator.* XII. Mitt. (XI. vgl. TULEY u. ADAMS, S. 1640.) Der durch Schmelzen von reiner Platinchlorwasserstoffsäure mit NaNO_3 hergestellte *Platinoxid-Platinschwarzkatalysator* (vgl. ADAMS u. SHRINER, Journ. Americ. Chem. Soc. **45**, 2171; C. 1924. I. 281) hat sich dem nach WILLSTÄTTER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **45**, 1471; C. 1912. II. 249) dargestellten *Platinschwarz* u. dem nach SKITA (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**, 1977. C. 1925. I. 389) bereiteten kolloidalen Pt bei der katalyt. Red. von *o-Phenylenessigpropionsäure* (F. 140—141°) u. verschiedenen aromat. Aminen als überlegen erwiesen. — 10 g dieser Säure wurden in 150 ccm 95%ig. A. mit 1 g Platinoxid-Platinschwarz bei 50° u. 2—3 Atm. in 51 Min. reduziert unter B. eines Hexahydroprod., das anscheinend aus einem Gemisch von Stereoisomeren der Säure $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_4$ besteht. — In einer Tabelle im Original werden Verss. über die Red. von Aminen (*Anilin*, *N-Methylanilin*, *N-Dimethylanilin*, *Benzylamin*) zusammengestellt, bei denen äquivalente Mengen von Pt, entweder als Kolloid (nach SKITA) oder als Schwarz (nach ADAMS) in Anwendung kamen. Bei den Verss. mit kolloidalem Pt werden die Basen als solche, bei den Experimenten mit Platinoxid-Platinschwarz in Form äquivalenter Mengen ihrer Hydrochloride verwendet; in einer zweiten Tabelle werden Ergebnisse von Verss. über die Red. von Aminen wiedergegeben, bei welchen Platinoxid-Platinschwarz in weit geringeren Mengen u. unter wechselnden Temp.-Bedingungen verwendet wurde. Unter den innegehaltenen Vers.-Bedingungen war ein geringerer Betrag an Platinoxid-Platinschwarzkatalysator erforderlich, als sich zwecks Erreichung des gleichen Red.-Betrages bei früheren Verss. mit kolloidalem Pt als notwendig erwiesen hatte. Schon verhältnismäßig geringe Mengen des Platinoxid-Platinschwarzkatalysators führten die vollständige Red. der Amine, allerdings in viel Zeit, herbei; Vergrößerung der Konz. des Katalysators über einen bestimmten Betrag hinaus führt keine Verkürzung der zur Red. erforderlichen Zeit herbei. — Zur vollständigen Red. der Amine mit kolloidalem Pt muß die Konz. des letzteren hoch sein. — Steigert man die Temp., so ist der der Red. unterliegende Anteil der Substanz beim kolloidalen Pt größer als beim Platinschwarz. — Die Darst. des Platinoxid-Platinschwarzes direkt in der reagierenden Mischung, die einen Katalysator mit frischer, sauberer Oberfläche ergibt, erklärt wohl die gesteigerte Wirksamkeit. — Das Platinoxid-Platinschwarz hat gegenüber dem kolloidalen Pt den Vorteil voraus, daß es in der Regel ein einfacheres Verf. bei der Isolierung des Rk.-Prod. zuläßt (nur Abfiltrieren u. Verdampfen des Lösungsm.). — Für katalyt. Redd. mit Platinoxid-Platinschwarz ist A. das beste Lösungsm. — Aus einer weiteren Tabelle im Original ist der Einfluß zu ersehen, den die relativen Mengen W. u. A. hinsichtlich einer Beschleunigung der Red. ausüben. — Bei der Red. mit Platinoxid-Platinschwarz ergab sich, daß Monomethylanilin schneller als Anilin u. dieses wieder schneller als Dimethylanilin reduziert wird. Die Prodd. der Red. waren die gleichen, die auch von SKITA erhalten wurden. Jedoch wechselten bei der Red. des *Anilins* die Ausbeuten an *cyclo-Hexyl-* u. *Dicyclohexylamin* bei kleinen Abänderungen der Rk.-Bedingungen nicht so ausgesprochen, wie bei der Verwendung von kolloidalem Pt. — Bei einem Vers. mit *Monomethylanilin* (mit einer großen Menge Pt, bei hoher Temp.) ließ sich in geringer Menge *Methyl-dicyclohexylamin* nachweisen, alle anderen Verss. lieferten ausschließlich *Methylcyclohexylamin*. — Red. des *Dimethylanilins* ergab nur *Dimethylcyclohexylamin*, des *Benzylamins* nur *Hexahydrobenzylamin*. — $\text{C}_6\text{H}_{11}\cdot\text{NH}_2$, Kp.₇₄₄ 132—133°; Kp.₂₆ 35—36°. — $(\text{C}_6\text{H}_{11})_2\text{NH}$, Kp.₇₄₄ 248—250°; Kp.₂₆ 136—138°. — $(\text{CH}_3)(\text{C}_6\text{H}_{11})\text{NH}$, Kp.₇₄₈ 145—147°. — $(\text{CH}_3)_2(\text{C}_6\text{H}_{11})\text{N}$, Kp.₇₄₈ 159—161°. — $(\text{CH}_3)(\text{C}_6\text{H}_{11})_2\text{N}$, Kp.₇₄₉ 263—265°; Kp.₂₆ 140—141°. — $\text{C}_6\text{H}_{11}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{NH}_2$, Kp.₇₄₈ 161—162°. — *cyclo-Hexylamin* gibt mit W. ein konstant sd. Gemisch, Kp.₇₄₈ 94—95°; aus dem Gemisch läßt sich das W. nur durch metall. Na entfernen;

es besteht aus 59,2% cyclo-Hexylamin u. 40,8% W. — *Trimethylphenylammonium-chlorid* läßt sich nur langsam reduzieren; 0,1 Mol. erfordern bei 0,20 g Platinoxyd-Platinschwarz bei 20—25° u. 2—3 Atm. 32 Std.; nach der Gleichung:






finden sich im Rk.-Prod. *cyclo-Hexan* u. salzsaures *Trimethylamin*. — Während Eisen-(II)-salze eine ungeheure Zunahme der Wirksamkeit des Katalysators bei der Red. von Aldehyden bewirkt u. O den Katalysator bei diesen Verss. reaktiviert, wirken im Gegensatz hierzu Spuren von Ferrosalzen bei der Red. von Aminen als Katalysatorgift u. erniedrigen den Ertrag an reduziertem Prod.; ferner ließ sich hier ein erschöpfter Katalysator durch O nicht wieder beleben. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 162—70. Urbana, Illinois.)

BUSCH.

René Lucas, *Über das Drehungsvermögen des Camphers*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 45; C. 1925. II. 1657.) Der Campher besteht aus zwei molekularen Formen verschiedenen Dreh- u. Dispersionsvermögens. In Ameisensäure gel. wird die Drehung geringer als in benzol. Lsg. In konz. H_2SO_4 gibt der reine rechtsdrehende Campher linksdrehende Lsgg. Diese Umkehr des Sinns der Drehung kann nicht durch B. einer Verb. etwa mit der Enolform des Camphers erklärt werden, da die Drehung sofort nach der Herst. der Lsg. konstant ist. Sulfoderivv. des Camphers bilden sich erst bei erhöhter Temp. (95—100°) u. sind ebenso rechtsdrehend wie der Campher selbst. Auch kann der letztere beim Verdünnen mit W. wiedergewonnen werden. Durch Anwendung von Gemischen von H_2SO_4 u. Eg. als Lösungsm. geht die Linksdrehung je nach dem Mischungsverhältnis zurück. Die graph. Aufzeichnung für 2 verschiedene Wellenlängen nach DARMOIS gibt in Übereinstimmung mit der Mischungsregel von BIOT ein Bild, wie es für die Ggw. zweier Modifikationen gefordert wird. Die rechtsdrehende Form ist wahrscheinlich die molekulare Form des kristallisierten Camphers. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 378—79.)

ENSZLIN.

S. Nametkin und **Antonina Sabrodina** (i. Orig. **Zabrodin**), *Über das wahre α -Camphenon*. Aus dem α -Nitrocamphen (vgl. LIEBIGS Ann. 441. 181; C. 1925. I. 1182) wurde durch Red. mit frischer SnCl_2 -Lsg. nach KONOWALOFF in kleinen Mengen das α -Camphenon (I.) gewonnen. Der Name *Camphenon* ist dem von ANGELI durch Erwärmen von Diazocampher gewonnenen Prod. schon beigelegt worden, das aber nach den Unterss. von BREDT u. HOLZ (Journ. f. prakt. Ch. [2] 95. 133; C. 1917. II. 614) von tricycl. Konst. u. als Deriv. des Isocyclens (II.) aufzufassen, daher zweck-












mäßig als *Isocyclenon* (III.) zu bezeichnen ist. — α -Camphenon, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}$ (I.), krystallin., campherartige Substanz, beim Sublimieren zweigartige Krystalle, F. 77—78°, l. in W., auf dessen Oberfläche rotierend, entfärbt KMnO_4 in Kälte schnell, Lsg. von Br in Chlf. unter Selbsterwärmung. *Oxim*, rechtwinklige Prismen (aus A. + Chlf. bei langsamem Verdunsten), F. 117—118°. *Semicarbazon*, Blättchen (aus A.), F. 205° (Zers.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 368—69. Moskau, II. Univ.)

SPIEGEL.

W. R. Orndorff und **Theophilus Parsons**, *o-Oxybenzoyl-o-tetrachlorbenzoesäure, i-Phenoltetrachlorphthalein und einige Derivate derselben*. (Vgl. ORNDORFF u. BARETT, Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2483; C. 1925. I. 375.) *o-Oxybenzoyl-o-tetrachlorbenzoesäure* (Ib, in Ia als Lacton) wurde nach der Methode von ULLMANN u. SCHMIDT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 2098; C. 1920. I. 528) durch Kondensation von Tetrachlorphthalsäureanhydrid u. Phenol in Acetylen-tetrachloridlsg. mit AlCl_3 erhalten. Ausbeute an roher Säure: 82%. Sie wurde


gereinigt durch Lösen in verd. Ammoniaklsg., Ausfällen mit Salzsäure u. Umkrystallisieren aus Eg. F. 210°. Sie hat wahrscheinlich Lactonstruktur (Ia), denn sie ist farblos u. bildet auch ein farbloses *Diacetat*, F. 168°. Letzteres ist sl. in Bzl., ll. in Eg. u. Chlf., l. in A., swl. in Methylalkohol, l. in konz. H₂SO₄ mit orangefelber Farbe. Durch h. Alkalilsgg. wird es leicht verseift, wobei als Endprod. **III** entsteht. — 5,6,7-Trichlorxanthon-8-carbonsäure (**III**). B. **I** wurde 1 Stde. lang mit NaOH-Lsg (30%ig.) erhitzt, das ausfallende Na-Salz mit HCl zers. u. aus A. umkrystallisiert.




F. 262—265° (Zers.). Zl. in Chlf., h. Eg., wl. in Methyl- u. Äthylalkohol. Die Lsg. in konz. H₂SO₄ ist grüngelb. Die B. von **III** beweist, daß in **I** die OH-Gruppe sich in o-Stellung befindet. *Ba-Salz* ist wl. in W., unl. in A. *Na-Salz*, wl. in 95%ig. A. u. in W. — *i*-Phenoltetrachlorphthalein (**II**). B. beim 24-std. Erhitzen eines Gemisches von **I** u. Phenol mit Zinnchlorid bei 95—100°. Ausbeute: 74%. Krystalle. F. 293°. L. in Methyl-, Äthylalkohol, Bzl., wl. in Eg., Toluol, Chlf. Die Lsg. in konz. H₂SO₄ ist tiefrot, die in konz. Ammoniaklsg. blau, in Alkalien purpurfarben. Der Schmelzpunkt des *Phenoltetrachlorphthaleins*, welcher in der Literatur nicht angegeben ist, wurde bei 307° festgestellt. Von **II** wurden folgende Deriv. hergestellt: *Diacetat*, Nadeln. F. 189°. Ll. in Bzl., Eg., h. Chlf., l. in A., swl. in Methylalkohol; *Dibenzooat*, Krystalle, F. 245°, ll. in Bzl., Aceton, Chlf., h. Xylen, l. in A., wl. in Eg., swl. in Methylalkohol; die Lsg. in konz. H₂SO₄ ist rot, es tritt Verseifung ein, ebenso beim Erhitzen mit verd. Alkalilsgg.; *Dimethylester*, Krystalle, F. 183°, sl. in Bzl., l. in Methyl-, wl. in Äthylalkohol, unl. in Alkalilauge; die Lsg. in konz. H₂SO₄ ist tiefrot. Sowohl **II** wie seine Deriv. sind im festen Zustande farblose Krystalle. Daher ist die Lactonformel berechtigt. Bei der Darst. von **II** entsteht als Nebenprod. *Tetrachlorfluoran* (**IV**), F. 298° (Zers.), das ORNDORFF u. BLACK (Amer. Chem. Journ. **41**. 349) schon be-

schrieben haben; die Angabe, daß diese Verb. bei 300° noch nicht schm., ist aber ein Irrtum. O. u. B. fanden, daß IV beim Erhitzen mit Äthyljodid in alkoh. Kali ein Prod. gibt, das 21,72% Cl enthält. Diesem Körper kommt wahrscheinlich die Formel VI zu u. er bildet sich aus dem K-Salz V, welches als Zwischenprod. entsteht, durch Abspaltung von KCl u. KJ. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 283—88. Ithaka, New York, Cornell Univ.) WINKELMANN.

Lauder W. Jones und Frank Brian Root, Die Umlagerung von Hydroxamsäuren, welche mit Triphenylacethydroxamsäure isomer sind. Die Umlagerung, welche durch folgende Gleichungen wiedergegeben wird:



ist eingehend untersucht worden (JONES u. HURD, Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 2432; C. **1922**. III. 509. HURD, Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 1472; **47**. 174; C. **1923**. III. 1458; **1925**. I. 1292). JONES u. HURD stellten im Verlauf ihrer Unterss. die Hypothese auf, daß die Rk. b) von der Natur des Radikals *R* abhängt, u. zwar soll sie dann eintreten, wenn *R* als freies Radikal existieren kann. Um diese Annahme zu prüfen, haben Vff. die Umlagerungen von Derivv. der Triphenylacethydroxamsäure mit den Umlagerungen ähnlicher Derivv. von Hydroxamsäuren verglichen, die sich von *o*- u. *p*-Triphenylmethancarbonsäure, $(C_6H_5)_2CH \cdot C_6H_4 \cdot COOH$, ableiten. Denn während der Triphenylrest das typ. Beispiel eines freien Radikals ist, sind die dem Triphenylrest isomeren Radikale I u. II nie frei beobachtet worden. Die Unterss. bestätigten die Annahme, daß die Umlagerung b) eintritt, wenn *R* die Neigung hat, als freies Radikal aufzutreten. — *p*-Benzhydrylbenzoesäure wurde 1. durch Oxydieren der *p*-Tolyldi-phenylessigsäure zu *p*-Carboxyphenyldiphenylessigsäure u. Erhitzen derselben, 2. durch Red. von *p*-Carboxytriphenylmethan dargestellt. F. 160—161°. Chlorid, F. 88—90°. *p*-Benzhydrylbenzhydroxamsäure, $p-[(C_6H_5)_2CH]C_6H_4 \cdot CO \cdot NHOH$. Aus dem Säurechlorid u. freiem Hydroxylamin in Bzl. Blättchen. F. 156—57°. Ll. in Essigester u. Aceton. *p*-Benzhydrylbenzhydroxamsäurebenzoat, $p-[(C_6H_5)_2CH]C_6H_4 \cdot CO \cdot NHOCO \cdot C_6H_5$. Mit Benzoesäureanhydrid oder nach SCHOTTEN-BAUMANN. Das K-Salz, $[(C_6H_5)_2CH]C_6H_4 \cdot CO \cdot N \cdot KO \cdot CO \cdot C_6H_5$, ein weißes Pulver, welches bei 91° verpufft, lagert sich beim Kochen mit W. in *s*. Di-*p*-benzhydrylphenylharnstoff $[(C_6H_5)_2CH \cdot C_6H_4NH]_2CO$ (III), Nadeln, F. 262—263°, u. beim Erhitzen mit A. auf 100° in *p*-Benzhydrylphenylurethan, $p-(C_6H_5)_2CH \cdot C_6H_4NH \cdot CO \cdot O \cdot C_2H_5$ (IV), F. 102—103° um. Das Na-Salz, welches sich bei 109° zers., erleidet dieselben Umlagerungen. Das weiße Ag-Salz wird im Licht dunkel, zers. sich bei 190° u. wird schwarz. — *p*-Benzhydrylbenzhydroxamsäureacetat, $p-[(C_6H_5)_2 \cdot CH]C_6H_4 \cdot CO \cdot NHO \cdot COCH_3$, Nadeln, F. 157—158° bildet ein K-Salz, das sich bei 130° zers. u. ein Na-Salz, Zers. bei 140°. Beide Salze lagern sich ebenso wie die entsprechenden Benzoylverb. um. Das Ag-Salz zers. sich bei 200°. — Die Umlagerungsprodd. III u. IV wurden noch auf andere Weise dargestellt: IV entstand aus *p*-Benzhydrylbenzamid, bereitet aus *p*-Benzhydrylbenzoylchlorid u. NH_3 in Bzl.



oder Ä., Nadeln, F. 149°, durch Einw. von Na-Äthylat u. Brom in alkoh. Lsg. IV wurde in Chlf. gel. u. mit PCl_5 behandelt. Das dabei entstehende, aber nicht isolierte *p*-Benzhydryl-i-cyanat, $\text{p}-[(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}]\text{C}_6\text{H}_4\text{NCO}$, wurde mit *p*-Benzhydrylanilin, $[(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}]\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$, welches durch Kondensation von *p*-Nitrobenzaldehyd mit Bzl. in Ggw. von konz. H_2SO_4 u. darauffolgende Red. der entstandenen Nitroverb. erhalten wurde u. bei 83° schmolz, behandelt, wobei III erhalten wurde. — Beim Behandeln der *o*-Benzhydrylbenzoesäure (V), F. 161°, mit reinem Thionylchlorid entstand 9-Phenyl-9-chloranthron (VI), F. 164°. Das Thionylchlorid wirkte in diesem Falle also chlorierend u. kondensierend. Wenn aber die Säure V in einem Gemisch von Chlf. u. CS_2 gel. u. dann mit einem Überschuß von SOCl_2 behandelt wurde, entstand das erwartete *o*-Benzhydrylbenzoesäurechlorid, $\text{o}-[(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}]\text{C}_6\text{H}_4\text{COCl}$, Nadeln, F. 85°. — *o*-Benzhydrylbenzhydroxamsäure, $\text{o}-[(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}]\text{C}_6\text{H}_4\text{CO}\cdot\text{NHOH}$, Nadeln, F. 177—178° (Zers.), l. in den meisten organ. Mitteln. Beim Erhitzen Zers. zu *s*. Di-*o*-benzhhydrylphenylharnstoff, $[\text{o}-(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{NH}]_2\text{CO}$ (VII), F. 196°. — *o*-Benzhydrylbenzhydroxamsäurebenzozat, $\text{o}-[(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}]\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{CO}\cdot\text{NHO}\cdot\text{COC}_6\text{H}_5$, Nadeln, F. 118—120°. Bei 2-std. Kochen des in Kalilauge suspendierten Esters trat Umlagerung in VII ein. Das K-Salz schwärzte sich beim Erhitzen etwa bei 200°, das Ag-Salz bei 210°. VII wurde ferner erhalten durch Einw. von Phosgen auf *o*-Benzhydrylanilin, $\text{o}-[(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}]\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$, welches durch Red. von *o*-Amino-triphenylcarbinol in Eg. mit Zn u. darauffolgende Behandlung mit alkoh. HCl u. dann mit Alkali gewonnen wurde u. bei 128° schmolz. — In der *o*-Reihe wurde endlich noch *o*-Benzhydrylbenzamid (VIII), F. 129—130°, hergestellt, das bei der Oxydation über das entsprechende Triphenylcarbinol-Deriv. (IX) Diphenylphthalid (X), F. 114°, gab. — In der *m*-Reihe wurde nur die *m*-Benzhydrylbenzoesäure, $\text{m}-(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{COOH}$, dargestellt, u. zwar nach der Sandmeyerschen Rk. aus *m*-Aminotriphenylmethan, $\text{m}-(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2$, F. 120°. *m*-Benzhydrylbenzoesäure bildet farblose Nadeln. F. 179°. Die Ausbeute war sehr gering. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 181—95. Princeton, Univ.)

WINKELMANN.

Herbert Henry Hodgson und Ernest Kilner, Herstellung von 1-Halogen-2-nitronaphthalinen und 2-Nitronaphthalinen. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 807; C. 1924. II. 37.) 2-Nitro-1-naphthol liefert mit $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ u. wss. NH_3 im Rohr 6 Stdn. auf 120—130° erhitzt 2-Nitro-1-naphthylamin, aus A. F. 144° neben einer in A. unl. Verb., wahrscheinlich dem 2,2'-Dinitrodinaphthylamin, $\text{C}_{20}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_3$. Analog entsteht aus 4-Nitro-1-naphthol bei 140—160° 4-Nitro-1-naphthylamin, aus A. F. 191°. Aceto- β -naphthalid (aus β -Naphthylamin u. Eg. + Essigsäureanhydrid) liefert in Eg. bei 8—10° nitriert u. mit HCl verseift 1-Nitro-2-naphthylamin, aus A. F. 122°. 2-Nitro-1-naphthylamin (s. o.) gibt in $\text{H}_2\text{SO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$ gel., bei 0° mit NaNO_2 versetzt u. die Diazolsg. mit CuCl in konz. HCl umgesetzt 1-Chlor-2-nitronaphthalin, $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_2\text{NCl}$, aus A. F. 76°. Die Verb. gibt mit 2-Nitro-1-naphthol keine Schmelzpunktsdepression. Analog entsteht bei Anwendung von CuBr 1-Brom-2-nitronaphthalin, $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_2\text{NBr}$, aus A. F. 97°. Mit KJ wie oben 1-Jod-2-nitronaphthalin, $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_2\text{NJ}$, aus A. F. 111°. 1-Nitro-2-naphthylamin liefert diazotiert u. die Diazoverb. in der Hitze zers. 2-Nitronaphthalin, mit Wasserdampf destilliert F. 79°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 7—9. Huddersfield, Techn. Coll.)

TAUBE.


Harold Ainsworth Harrison und Frank Albert Royle, Die Nitrierung der β -Naphthoesäure und einige neue Amino- und Nitronaphthoesäuren. Systemat. Nachprüfung der Verss. von EKSTRAND (Journ. f. prakt. Ch. 42. 273 [1890]) zeigte, daß die Behauptung, von den 7 möglichen Mononitro- β -naphthoesäuren 5 hergestellt zu haben, sich nicht aufrecht erhalten läßt. Die Wiederholung der Ekstrandschen Nitrierungsverss. ergab, daß im wesentlichen nur 5- u. 8-Nitro-2-naphthoesäuren, mit insgesamt 95% Ausbeuten entstehen, neben Spuren an 1-Nitro-2-naphthoesäure. Ferner wurden die nach BUTLER, ROYLE u. SCHEDLER (Journ. Chem. Soc. London 123. 1641 u. 1649; C. 1923. III. 767 u. 1317) hergestellten Oxynaphthoesäuren als Na-Salze mit NH_3 u.

see
errata
p. 3977

Bisulfit unter Druck umgesetzt u. so eine Reihe neuer Aminonaphthoesäuren hergestellt. Diese konnten durch Umsetzung der entsprechenden Diazoverbb. mit Cu-Pulver u. NaNO_2 in die Nitronaphthoesäuren übergeführt werden.

Versuche. Die entsprechenden Oxynaphthoesäuren werden in wss. Bicarbonat gel., mit NH_3 ($d = 0,88$) versetzt, bei 15° mit SO_2 gesätt. u. im Autoklaven 10 Stdn. auf $200\text{--}210^\circ$ erhitzt. Die resultierenden Aminosäuren entstehen in nahezu theoret. Ausbeute u. sind in A. u. Eg. ll., wl. in Ä., Aceton u. Essigester, swl. in Bzl. 6-Amino-1-naphthoesäure, $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$, aus A. F. 203 $^\circ$, Hydrochlorid, Acetylderivat, aus A. F. 170 bis 172 $^\circ$. 7-Amino-1-naphthoesäure, aus A. F. 223—224 $^\circ$, Hydrochlorid, Acetylderiv. aus A. F. 229—230 $^\circ$. 6-Amino-2-naphthoesäure, aus verd. A. F. 225 $^\circ$, Hydrochlorid, Acetylderiv., aus A. F. 262 $^\circ$, wl. in Eg., swl. in den übrigen organ. Lösungsm., Äthylester, aus A. F. 245 $^\circ$, Acetylderiv., aus verd. A. F. 200—201 $^\circ$ (Zers.). Die Aminosäuren zeigen schöne Fluoreszenz, welche für verschiedene Lösungsm. tabellar. zusammengestellt ist. Die so hergestellten Aminonaphthoesäuren liefern in Eg. u. H_2SO_4 unter Rühren eingetragen, das ausfallende Sulfat in der Suspension mit NaNO_2 bei 0° diazotiert u. die Diazolsg. in NaNO_2 -Lsg. bei Ggw. von Cu-Bronze eingegossen die entsprechenden Nitrosäuren. 6-Nitro-2-naphthoesäure, $\text{C}_{11}\text{H}_7\text{O}_4\text{N}$, aus A. F. 310 $^\circ$, Äthylester, aus Essigester F. 177 $^\circ$. 7-Nitro-2-naphthoesäure, aus A. F. 262 $^\circ$, wl. in Eg., swl. in den übrigen organ. Lösungsm., Äthylester, aus A. F. 131 $^\circ$. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 84—89. Manchester, Univ.) TAUBE.

S. Nametkin und Olga Madajew-Ssitschew, Über die Nitrierung des Dekalins. Die Nitrierung erfolgt am besten durch andauerndes Kochen mit HNO_3 von D. 1,2 am Rückflußkühler. In 6 Stdn. traten ca. 20% des Dekalins in Rk. Als Hauptprod. wurde wider Erwarten tertiäres Nitrodekalin (I., unl. in wss. u. alkoh. KOH) erhalten, das zum Amin reduziert u. weiter mit HNO_2 in das entsprechende Dekalol übergeführt wurde. Aus diesem konnten Vff. zum ungesätt. KW-stoff Octalin gelangen, der, wenn die Abspaltung n. verlief, die Konst. II. (Δ 9,10) oder III. (Δ 1,9) haben muß. — In




geringerem Grade wurde auch ein sek. Nitrodekalin gewonnen, in dem nach den Eigenschaften des daraus hergestellten Ketons NO_2 in α -Stellung steht. — Das Ausgangsmaterial, aus techn. Dekalin durch sorgfältige Fraktionierung gewonnen, hatte Kp. $192\text{--}193^\circ$ (korr.), D_{20}^{20} 0,8870, $n_D^{20} = 1,4772$, war nach Vergleich mit den Angaben HÜCKELS also vermutlich cis-Dekalin mit geringen Beimengungen von trans-Dekalin.

Tert. Nitro-9-dekalin, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\cdot\text{NO}_2$, schweres, farbloses Öl, riecht ähnlich wie Dekalin, aber etwas schärfer, Kp. $96\text{--}97^\circ$, D_{20}^{20} 1,0847, $n_D^{20} = 1,4944$. — Ditert. Din Nitro-9,10-dekalin (?), $\text{C}_{10}\text{H}_{16}(\text{NO}_2)_2$, aus dem Rückstand von der Dest. des vorigen, Krystalle (aus Ä.), F. 164° (Zers.). — Tert. Aminodekalin, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\cdot\text{NH}_2$, am besten mit Zn-Staub in Eg., ziemlich dicke, farblose Fl. vom Geruch der aliph. Amine, Kp.₁₅ 98° , D_{20}^{20} 0,9435, $n_D^{20} = 1,4932$. HCl-Salz, prismat. Krystalle (aus W.), zwl. in k. W. Benzoylderiv., Nadeln oder Prismen (aus A.), F. $148\text{--}149^\circ$. — Tert. Dekalol-9, seidenartige Nadeln (aus A.), F. 65° . — Octalin, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$ (II. oder III.?), entsteht in der Hauptmenge, wenn das Prod. aus dem Aminodekalin u. HNO_2 mit W.-Dampf dest., das Destillat mit Ä. extrahiert u. der Rückstand des Extraktes im Vakuum dest. wird. Kp.₁₄ $88\text{--}89^\circ$, D_{20}^{20} 0,9200, $n_D^{20} = 1,4979$. Stimmt am besten mit dem von ZELINSKY (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2062; C. 1925. I. 380) aus einem Chlordekalin durch alkoh. KOH erhaltenen überein. — Sek. Nitro-1-dekalin, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\cdot\text{NO}_2$, aus alkal. Lsg. bei Abtrennung der tert. Verb. durch CO_2 , hellgelbes Öl, Kp.₁₄ 108 bis

109°, D.₂₀⁴ 1,0825, n₂₀²⁰ = 1,4978, l. in Alkali. *Pseudonitrol* fl. — α -*Dekalone*, C₁₀H₁₆O, aus dem vorigen durch KMnO₄, Kp.₁₁ 107°, D.₂₀⁴ 0,9933, n₂₀²⁰ = 1,4881. Die *Semicarbazone* zeigen weit auseinanderliegende FF., von 180—195° (1. Krystallisation aus A.) bis 205—208°, einmal (aus bei Fraktionieren der rohen tert. Nitroverb. aufgefangenem Keton) 228—229°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 370—74. Moskau, II. Univ.) SPIEGEL.




Marston Taylor Bogert und Carl Norman Andersen, *Untersuchungen von organischen Seleniumverbindungen. VI. Brom-, Schwefel- und Quecksilberderivate des 2,4-Diphenylselenophens und Experimente mit einigen verwandten Verbindungen.* (V. vgl. BOGERT u. ANDERSEN, Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 217—18; C. 1925. II. 655.) Im Anschluß an die Arbeit von BOGERT u. HERRERA (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 238; C. 1923. III. 774) wurden einige weitere Deriv. des 2,4-Diphenylselenophens dargestellt u. untersucht. — Durch Erhitzen von *Bernsteinsäure* mit Phosphorpentaselenid wurde ein Öl erhalten, das dem von FOA (Gazz. chim. ital. 39. II. 527 [1909]) beschriebenen angeblichen *Selenophen* sehr ähnlich war. Die Ausbeute war aber zu gering, um weitere Unterss. anzustellen. — 2,5-Dimethylselenophen (2,5-Selenoxen) wurde nach PAAL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 18. 2255 [1885]) aus Acetonylacetone u. P₂Se₅ bei 180° dargestellt. Wenn man dieses Selenoxen zu einer Suspension von Phthalsäureanhydrid in CS₂ gibt, dann AlCl₃ hinzufügt u. kocht, so bildet sich *Phthaloylselenoxen* (I) in 7%ig. Ausbeute, F. 155,5°, l. in A. u. Ä. Beim Behandeln mit konz. H₂SO₄ tritt intensive Rotfärbung ein, wahrscheinlich infolge B.



der Verb. II. 2,4-Diphenylselenophen (III) wurde nach den Angaben von BOGERT u. HERRERA bereitet. Dadurch, daß man bei niedrigerer Temp. (235—40°) arbeitete u. dafür länger (20 Stdn.) erhitze, wurde die Ausbeute auf 90% erhöht. — 3,5-Dimethyl-2,4-diphenylthiophen. B. aus *Propiophenonanil* (REDDELIEN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 2478. [1910]) u. Schwefel bei 240°. F. 163,8°. Ll. in Chlf., Ä., Aceton, wl. in A., Bzl., Eg., unl. in W., NaOH, HCl. Mit Selen bildete Propiophenonanil keine krystallisierte Verb. — *n*-Butyrophenonanil wurde nach der Methode von REDDELIEN dargestellt. Ausbeute 60%. Öl. Kp.₂₅ 198—202°. Durch 8-std. Erhitzen mit Schwefel auf 200—220° entstand 3,5-Diäthyl-2,4-diphenylthiophen, Blättchen, F. 286°, wl. in *n*-Butylalkohol, Eg., noch weniger l. in Aceton, Ä., Bzl., unl. in W. u. Ä. Ein entsprechendes Selenophen konnte nicht erhalten werden. — *Dibrom-2,4-diphenylselenophen*. B. aus III (5 g) u. 10 g Brom in Eg., Nadeln, F. 86,7°. Ll. in W., Ä. oder Eg. Ausbeute 80%. *Tribrom-2,4-diphenylselenophen* (IV). B. aus III (1,5 g) u. 10 g Brom in Eg., Nadeln, F. 126,7°. L. in A., *n*-Butylalkohol, Aceton, Ä., unl. in W. Ausbeute 36%. Zu 0,5 g Na in 100 ccm Ä. wurde 1 g der Verb. IV u. 3 g Methyljodid gegeben u. nach 24-std. Stehen bei gewöhnlicher Temp. einige Stdn. gekocht. Dabei bildete sich in 74%ig. Ausbeute ein krystallisiertes Prod., F. 139,8°, welches vielleicht ein Methylderiv. von IV ist. *Tetrabrom-2,4-diphenylselenophen*. B. beim Eintropfen von 4 g Brom in eine kochende Lsg. von III (1 g) in 20 ccm A. im Sonnenlicht. Feine Nadelchen, F. 176,5°. L. in A., Ä., CCl₄, unl. in W. Ausbeute 30%. — 2,4-Diphenylselenophentetrasulfonsäure, C₁₆H₁₂O₁₂S₄Se. B. aus III u. Chlorsulfonsäure in PAe. bei 0°. Prismen. F. über 300°. Ll. in W. Geringe Ausbeute. — 5-Chlormercuri-2,4-diphenylselenophen (V), ClHgC₁₆H₁₁Se, konnte durch 12-std. kräftiges Rühren bis zu einer Ausbeute von 90% erhalten werden. F. 224°. Durch 1 Std. langes Erhitzen mit Br₂ u. W. am Rückflußkühler wurde IV gebildet. Mit KBr in Acetonlsg. erfolgte

B. von VI u. VII (s. u.). — 5-Brommercuri-2,4-diphenylselenophen (VI), $\text{BrHgC}_{16}\text{H}_{11}\text{Se}$. B. aus III (5 g) in 95%ig. A. Durch Behandlung mit Na-Acetat (33%ig. wss. Lsg.) u. Quecksilberbromid. Feine Nadeln. F. 215°. L. in A., Bzl., Toluol, Eg. Ausbeute 50%. Durch Einw. von NaBr entsteht VII in 65%ig. Ausbeute. — 5-Jodmercuri-2,4-diphenylselenophen, $\text{JHgC}_{16}\text{H}_{11}\text{Se}$. B. durch 10 Min. langes Erhitzen von VII (s. u.) mit Mercurijodid in Aceton, Krystalle, F. 176°. Ausbeute 30%. — 5-Cyanmercuri-2,4-diphenylselenophen, $\text{NC}\cdot\text{HgC}_{16}\text{H}_{11}\text{Se}$. B. aus V (1 Mol.) u. 1 Mol. NaCN in Aceton. Farbloses Pulver, F. 256,4°, Ausbeute 50%. Es konnte auch aus VII u. Mercuricyanid erhalten werden. Beim Kochen mit Bzl., Toluol oder Xylol zerfiel es in III u. Mercuricyanid. — Mercuri-bis-[2,4-diphenylselenophen-5] (VII), $[(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{C}_4\text{HSe}]_2\text{Hg}$. B. aus V (1 Mol.) mit NaCN (2 Mol.) oder mit KBr oder aus VI mit NaBr, auch aus V u. NaJ, feine Nadelchen, F. 236,7°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 223—31. New York, Columbia Univ.) WINKELMANN.



Marston Taylor Bogert und Arthur Stull, Untersuchungen über Thiazole. VIII. Die Kondensation von o-Aminophenylmercaptan und o-Aminophenyldisulfid mit Säurechloriden, Anhydriden und Estern. (VII. vgl. S. 1811.) Durch Einw. von Säurechloriden, Anhydriden u. Estern auf o-Aminophenyldisulfid (I) wurden Acyl-deriv. erhalten, welche bei der Red. die entsprechenden Benzthiazole ergaben. Auch durch direkte Einw. von Säurechlorid auf Zink-o-aminophenylmercaptan (II) wurden einige neue Benzthiazole erhalten. Ferner wurde konstatiert, daß 2-Phenyl-, 2- α -Furyl- u. 2- α -Thienylbenzthiazole große Ähnlichkeit miteinander haben, die am deutlichsten in ihrem angenehmen, an Teerosen oder Geranien erinnernden Geruch ausgeprägt ist. — Äthyloxanilat-o-disulfid (III), $(-\text{SC}_6\text{H}_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CO}\cdot\text{CO}\cdot\text{OC}_2\text{H}_5)_2$, bei 5-std. Kochen einer Lsg. von 3,5 g o-Aminophenyldisulfid in 30 g Oxalsäureäthylester, Platten, F. 104° (korr.). Unl. in W., ll. in A. — Oxanilamid-o-disulfid, $(-\text{SC}_6\text{H}_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CO}\cdot\text{CONH}_2)_2$, aus III in 95%ig. A. u. einem Überschuß von NH_4OH , Nadeln, F. 240° (Zers.) — Oxanilid-o-disulfid, $(-\text{SC}_6\text{H}_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CO}\cdot\text{CO}\cdot\text{NHC}_6\text{H}_5)_2$, feine Nadeln, F. 229 bis 230° (korr.). Sll. in A. — Benzthiazol-2-carbonsäure (IV). Das Na-Salz entsteht



bei Einw. von Na auf III in alkoh. Lsg. Es ist ll. in W. Die wss. Lsg. gibt beim Ansäuern die Säure, Nadeln, F. 107° (korr.). Beim Schmelzen entweicht CO_2 , u. es bildet sich ein gelbes Öl, das bei 230° siedet u. den charakterist. Geruch von Benzthiazol zeigt. — Bis-2,2'-benzthiazolyl (Oxalamidothiophenol) (V). Aus Zink-o-aminophenylmercaptan u. Oxalylchlorid (Rückfluß). Nadeln oder Platten, F. 300,5° (unkorr.). Sll. in A., l. in konz. H_2SO_4 mit grüngelber Farbe. — Succinansäure-o-disulfid $[-\text{SC}_6\text{H}_4\text{NHCO}(\text{CH}_2)_2\text{COOH}]_2$, aus Bernsteinsäureanhydrid, Nadeln, F. 167—168° (korr.). Ll. in A. u. 10%ig. NaOH, swl. in Chlf. — Glutaransäure-o-disulfid, $[-\text{SC}_6\text{H}_4\text{NHCOC}(\text{CH}_2)_3\text{COOH}]_2$, aus Glutarsäureanhydrid, Nadeln, F. 155—156° (korr.). — Campheransäure-o-disulfid, $(-\text{SC}_6\text{H}_4\text{NHCOC}_8\text{H}_{14}\text{COOH})_2$, aus Camphersäureanhydrid. Rhomb. Krystalle, F. 229° (korr.). (Zers.). Ll. in A. u. Chlf., l. in wss. Alkalien, swl. in Bzl. — Maleinansäure-o-disulfid, $(-\text{SC}_6\text{H}_4\text{NHCOC}_6\text{H}_4\text{CH}:\text{CHCOOH})_2$, aus Maleinsäureanhydrid. Mikrokrystallin. Masse. F. 200—201° (Zers.). Wl. in den meisten organ. Mitteln, ll. in wss. kaust. Alkalien u. h. Nitrobenzol. — o-Phthalimido-phenyl-o-disulfid (VI), aus Phthalsäureanhydrid, F. 219° (korr.). L. in Eg. Beim Erwärmen mit 10%ig. alkoh. Kali löst es sich unter hydrolyt. Spaltung zu Phthalsäure. — 2,2'-[p-Phenyl]-bis-benzthiazol (VII), aus II mit p-Phthalylchlorid, Blättchen, F. 263° (korr.), sll. in A. — Brenzschleimanilsäure-o-disulfid $(-\text{SC}_6\text{H}_4\text{NHCOC}_6\text{H}_3\text{O})_2$ (VIII), aus Brenzschleimsäurechlorid (BAUM, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 2951; C. 1904. II. 992) u. I, Prismen, F. 160,5° (korr.). Ll. in h. A. — 2- α -Furylbenzthiazol, durch Red.

von VIII mit Zinn u. Salzsäure. Ferner bei $\frac{1}{2}$ -std. Kochen von II mit Brenzschleimsäurechlorid. Krystalle, F. 105° (korr.). Ist mit dem schon in der VII. Mitt. beschriebenen 2- α -Furylbenzthiazol (S. 1812) identisch. — α -Thenoylanilid-*o*-disulfid, ($-\text{SC}_6\text{H}_4\text{NHCOC}_6\text{H}_5\text{S}-$)₂ (IX), aus I u. α -Thenoylchlorid (JONES u. HURD, Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 2444; C. **1922**. III. 509), Nadeln, F. 154° . — 2- α -Thienylbenzthiazol, durch Red. von IX mit Zinn u. Salzsäure, oder aus II u. α -Thenoylchlorid bei $\frac{1}{2}$ -std. Kochen, Nadeln, F. $99,5^{\circ}$ (korr.). (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 248—54; New York, Columbia Univ.) WINKELMANN.

Marston Taylor Bogert und **Hugh Blake Corbitt**, *Untersuchungen über Thiazole*. X. Über die Synthese einiger 2-Phenylbenzthiazolarsinsäuren. (Vgl. vorst. Ref.) Einige sich vom 2-Phenylbenzthiazol ableitende Arsinsäuren u. Deriv. wurden dargestellt. Vorläufige pharmakolog. Verss. mit einigen der neuen Verbb. sind vielversprechend. — 2-Phenylbenzthiazol-6-arsinsäure, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{NSAs}$ (I). 6-Amino-2-phenylbenzthiazol wird in konz. H_2SO_4 gel., auf Eis gegossen, diazotiert, Na-Acetat zugesetzt u. in alkal., mit Kupferbronze versetzte K-Arsenitlsg. von 0° eingegossen, unter Zusatz weiterer Mengen KOH, nach 2-std. Stehen gekocht, filtriert u. angeläuert. Gelbe Nadeln aus A., schm. nicht bei 310° , wl. in A. Ausbeute 5—6%. —



2-Phenylbenzthiazol-*p*-arsinsäure, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{NSAs}$ (II.). Ebenso aus 2-[*p*-Aminophenyl]-benzthiazol, in HCl diazotieren. Hellgelbes Pulver, schm. nicht bei 302° . Ausbeute 26%. — Nitroderiv., $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_2\text{SAs}$. Mit HNO_3 - H_2SO_4 bei 40 — 45° (15 Min.). Dunkelgelbes, noch etwas II. enthaltendes Pulver. NO_2 steht wahrscheinlich in 6. — Aminoderiv., $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}_2\text{SAs}$. Durch Red. mit FeSO_4 u. Alkali. Graugrünes Pulver, swl. in W., A. mit grünlicher Fluorescenz, unl. in Ä., Toluol. Lsg. in verd. Alkali braun mit grünlicher Fluorescenz, in HCl schwach rosafarbig, darauf mit NH_4OH , MgCl_2 u. NH_4Cl beim Erhitzen hellgelblicher Nd. Gibt nach Diazotieren mit alkal. β -Naphthollsg. kirschroten Farbstoff. Die Lsg. des Na-Salzes wirkt intravenös etwas stärker, obwohl langsamer, auf Tr. equiperdum als Atoxyl, ebenso etwas toxischer auf weiße Ratten, wirkt aber nicht auf das Nervensystem. — 2-[*p*-Oxyphenyl]-benzthiazolarsinsäure, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{NSAs}$. 2-[*p*-Oxyphenyl]-benzthiazol wird nitriert, die Nitroverb. reduziert u. die Aminoverb. obiger Rk. unterworfen. Schokoladenbraunes Pulver, swl. in A., nicht rein erhalten. Ausbeute ca. 47%. (Proc. National Acad. Sc. Washington **11**. 768—72. New York, Columbia Univ.) LI.

C. Mannich und **K. Ritsert**, *Über die Kondensation von Ammoniumchlorid mit Formaldehyd und Aceton*. Bei neuerlicher Unters. der Rk. zwischen NH_4Cl , Formaldehyd u. Aceton konnten einige Rk.-Prodd. gefaßt werden, die jedoch den Verlauf der Rk. keineswegs völlig aufklären, da sie nur einen geringen Bruchteil der entstandenen organ. Basen darstellen. Isoliert wurde eine Triketobase der Konst. $\text{N}(\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_3)_3$, deren B. nach:

$\text{HCl}\cdot\text{NH}_3 + 3\text{CH}_2\text{O} + 3\text{CH}_3\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_3 = \text{HCl}\cdot\text{N}(\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_3)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
vor sich geht. Ferner konnte ein 1,4-Dimethyl-3-acetotetrahydropyridin isoliert werden, das mit dem aus Methylamin, Formaldehyd u. Aceton entstandenen ident. ist. — 3,5 Mol Aceton, 1,25 Mol 30%ig. Formaldehydlsg. u. 0,5 Mol NH_4Cl wurden 12 Stdn. auf dem Wasserbade erhitzt. Aus der dunklen, stark fluorescierenden Fl. ließen sich 32 g Rohbasen erhalten, deren Hauptfraktion im Vakuum bei 125 — 135° sd. Die Öle verdichten sich schon nach einigen Stdn. Auch frisch dest. gaben sie keine krystallisierende Benzoylverb., Phenylhydrazon, Semicarbazon oder Jodmethylat. Dagegen entstand mit Hydroxylaminhydrochlorid das Trioxim des Tributylon-3-aminchlorhydrats, $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{O}_3\text{N}_4\text{Cl}$. Nadelchen aus A. F. 177 — 178° . Aus 4,5 g der Hauptfraktion

1,2 g. Trioxim des Tributylon-3-amins, $C_{12}H_{24}O_3N_4$, Nadelchen aus absol. A. F. 132°. — Bei Einw. alkoh. HCl auf das Rohbasengemisch wurden nach 3-tägigem Stehen Basen erhalten, die mit Jodmethyl Krystalldrusen des Jodmethylats des 1,4-Dimethyl-3-acetotetrahydropyridins vom F. 173° gaben. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 164—67.) HARMS.

Clemens Zöllner, *Bemerkungen zur Abhandlung von Hanns John: Chinolinderivate.*

II. Die von JOHN (S. 1572) beschriebene Synthese des $[\beta-(2\text{-Phenyl-4-chinoly})\text{-}\alpha\text{thyl}]\text{-amins}$ ist in derselben Weise bereits 1921 vom Vf. ausgeführt u. im D. R. P. 421087 (Anm. vom 19/11. 1922) beschrieben. *Chinoly-4-propionsäure* ist zuerst von KOENIGS u. MÜLLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **37**. 1337; C. **1904**. I. 1362) dargestellt worden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 509. Berlin, Chem. Fabr. auf Aktien [vorm. E. SCHERING].) SPIEGEL.


Hanns John, *Chinolinderivate. III. Oxydation von Py-alkylierten Chinolinen.*

(II. vgl. S. 1572 u. 1655.) Der photochem. Oxydationsmethode von ECKERT unterworfen, lieferten *Chinolin* u. *2-Methylchinolin* nur wenig harzige Substanzen. 83% blieben unverändert. Ähnlich war das Verhalten von *4-Methylchinolin*, das jedoch in sehr geringer Menge ein alkalilösliches Prod. lieferte, das mit $HgCl_2$ u. *Pikrinsäure* krystallisierte Ndd. gab. Analog verhielt sich $[2'\text{-Phenyl-4'-chinoly}]\text{-2-propan-(1,3)}$. Aus *2-Phenyl-4-methylchinolin* entstand dagegen ohne Harzbildung mit 27% Ausbeute *2-Phenylchinolin-4-carbonsäure*, während der Rest unverändert zurückerhalten wurde. — Der F. der aus Chinolin erhaltenen braunen M. war 160°. Ein anderer Teil, wl. in verd. HCl, ll. in A., sinterte bei 183° u. war bei 310° noch nicht geschmolzen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 387—89. Prag, Dtsch. Hyg. Inst.) HARMS.

Günter Scheibe und Walter Fischer, *Über Chinolinrot und verwandte Farbstoffe der Dichinoly-methan-Reihe.* Die für *Chinolinrot* wahrscheinlichste Formel ist **I**, jedoch waren von vornherein auch **II** u. **III a** und **b** nicht auszuschließen. **III a** u. **II** scheiden aus, sobald ein echtes Chinolinrot synthetisiert werden kann, das am Zentral-C (9) noch ein Radikal trägt. Als Charakteristikum für echtes Chinolinrot ist die starke Fluorescenz anzusehen, die vermutlich auf dem Vorhandensein des Pyrimidinrings beruht. Aus *Trichinoly-methan* entstand durch Kondensation mit *Benzylchlorid* dieser Ring u. die Verb. zeigt fast genau dieselbe Farbe wie Chinolinrot, gelbrote Fluorescenz u. zwei Streifen (545,5 u. 505 $\mu\mu$). Säurezusatz, der den dritten Pyridinkern zum NH_4 -Salz macht, bewirkt nur eine geringe Verschiebung der Farbe nach Orangerot ohne die Fluorescenz aufzuheben. Zweifellos liegt ein echter Chinolinrotfarbstoff vor, dessen Formulierung nach **III a** unmöglich ist. Formel **II** scheidet auch aus, weil danach die Säure gegenüber Alkali nicht so festgehalten werden könnte, wie es bei Chinolinrot u. den Farbstoffen der Cyaninreihe der Fall ist. — Wird an *Trichinoly-methan* Jodmethyl angelagert u. aus der entstandenen Verb. HJ abgespalten, so erhält man die Farbbase *N-Methylchinolylen-2-dichinoly-2',2''-methan (IV)*, deren Farbe sich kaum von der entsprechenden Verb. des *Dichinoly-methans* unterscheidet. Benzylchlorid lagert sich an unter teilweiser B. eines gefärbten Salzes. Bei Versuch der HCl-Abspaltung wird aber *Trichinoly-methan* regeneriert. Neben dem gefärbten Prod. entsteht immer in großer Menge die am Zentral-C-Atom benzylierte Verb. **V**. Sie ist weiß, bildet mit Säuren Salze, aber keinerlei gefärbte Verbb. mehr.

Mit Methyl konnte eine Zentral-C-Alkylierung nicht beobachtet werden, wohl aber mit Amyl. Nach dem Befund am C-Benzyltrichinoly-methan ist auch die Formel **III b** auszuschließen, da Chinolinrot dann nicht farbig sein könnte. Also bleibt nur **I** übrig. — Durch Anlagerung von CH_3J an **IV** entstehen 2 Farbstoffe der *Dichinoly-methanreihe*, die keine Fluorescenz, aber die Farbe des Chinolinrots zeigen. Die Verb. mit einem CH_3J ähnelt in der Alkalibeständigkeit dem ps-i-Cyanin, ist aber in der Farbe nach Rotviolett vertieft. Die beiden Streifen sind in einen breiten (560 $\mu\mu$ ca.) zusammengezogen. Die Verb. mit 2 CH_3J ist in der Farbe kaum von

see
errata,
p. 3977




ps-i-Cyanin zu unterscheiden, hat aber auch nur einen Streifen (ca. 505 $\mu\mu$), ist in wss. Lsg. alkalibeständig. In alkoh. Lsg. wird durch Alkali eine luft- u. lichtempfindliche blauviolette Lsg. erzeugt. — Nicht nur Substitution an 9 (I) läßt den Charakter als Chinolinfarbstoff ungestört, sondern auch an 10. Aus *Dichinolylmethan* u. Methylenjodid entsteht ein Farbstoff, der in Fluoreszenz u. Farbe dem Chinolinrot völlig ähnlich ist (566,5 u. 525 $\mu\mu$) (VI). Es liegt also hypsochrome Wrkg. der Phenylgruppe beim Chinolinrot vor. Mit Äthylenbromid entsteht ebenfalls Ringschluß (VII). Der Farbstoff ist gelbrot mit 2 Absorptionsstreifen (516,8 u. 481,7 $\mu\mu$) u. prachtvoll grüner Fluoreszenz, kann also noch als Chinolinrotfarbstoff gerechnet werden. Die Erweiterung des Ringes hat aber viel größeren Einfluß auf Farbe u. Fluoreszenz als Substitution am Pyrimidinring. Das durch verdd. Lsgg. hindurchgelassene Licht muß ein Weiß höherer Ordnung sein, da die Lsgg. dem Auge bereits farblos erscheinen, während im Spektroskop noch deutliche Streifen zu erkennen sind.

Versuche: *N-Methylchinolyl-2-dichinolyl-2',2''-methan*, $C_{29}H_{21}N_3$, aus dem Jodmethylat des Trichinolylmethans mit verd. NaOH. Grünglänzende Kryställchen aus Pyridin auf Zusatz von A. F. 228°. Ll. mit gelbroter Farbe in Pyridin u. Bzl. Bas. u. sehr beständig. *Dipikrat* $C_{41}H_{27}O_{14}N_9$, rote Nadelchen aus Bzl. Zers.-Punkt 242°. — *Hg-Doppelsalz*: $C_{29}H_{21}N_3 \cdot 1\frac{1}{2} HgCl_2$, amorpher brauner Nd. Die Darst. der Base durch Anlagern von Dimethylsulfat an Trichinolylmethan gelang nicht, die Anlagerung von C_2H_5J an letzteres nur durch mehrstd. Erhitzen im W.-Badschießofen zum *Trichinolylmethanjodäthylat*, grünglänzende Nadelchen aus A. auf W.-Zusatz. F. 168°. — *Hg-Doppelsalz des Trichinolylmethans*: $C_{28}H_{19}N_3 \cdot HgCl_2$, fast weiße Nadelchen, swl. in h. A. — *Hg-Doppelsalz des symm. Dichinolyl-2-methans*, $C_{19}H_{14}N_2 \cdot HgCl_2$, schwach rötliche Nadelchen, swl. in h. A. — Nach $\frac{1}{2}$ Stde. Kochen

mit überschüssigem Benzylchlorid gab Trichinolylmethan ein *Kondensationsprod.* $C_{35}H_{27}N_3Cl_2$, grünglänzende rote Krystalle vom F. 252°, nicht umkrystallisierbar. Mit Alkali wurde stets Trichinolylmethan abgespalten. Konst. unsicher. Aus der Mutterlauge schied sich auf Zusatz von A. *C-Benzyl-trichinolylmethan*, $C_{35}H_{25}N_3$, ab. Derbe Prismen aus Pyridin auf Zusatz von A. F. 202°. Noch basisch, farblos, l. in verd. Säuren. — *Perchlorat*, $C_{35}H_{26}O_4N_3Cl$. Nadelchen. F. 236° (unscharf, bei 200° Rötung). In quantitativer Ausbeute konnte C-Benzyltrichinolylmethan durch Erhitzen von Trichinolylmethan mit Benzyljodid im Einschlußrohr bei 40° erhalten werden. — *Anlagerungsprod. von Jodmethyl an N-Methylchinolylen-2-dichinoly-2',2''-methan*, $C_{30}H_{24}N_3J$, durch Kochen gleicher Mole der Komponenten in Bzl. (4 Std.). Aufzufassen als ein am Zentral-C-Atom substituiertes ps-i-Cyanin. Ausbeute 40–50%. Violette Krystalle vom F. 213° aus A. auf Zusatz von Ä. L. in Pyridin u. A. mit rotvioletter Farbe. *Verb.* $C_{31}H_{27}N_3J_2$ durch 2-std. Erhitzen von N-Methylchinolylen-2-dichinoly-2',2''-methan mit überschüssigem CH_3J im W.-Bad-schießen. Rote Nadelchen aus A. F. 208°. L. in A. u. W. mit roter Farbe. Aufzufassen als am Zentral-C substituiertes ps-i-Cyanin, das noch 1 Mol. CH_3J enthält. *Dipikrat* $C_{43}H_{31}O_{14}N_9$ (halogenfrei), orangerote Nadelchen vom Zers.-Punkt 253°. — Durch Kochen von Trichinolylmethan mit überschüssigem Benzalchlorid ($\frac{1}{4}$ Std.) wurde eine *Verb.* $C_{35}H_{26}N_3Cl_3$ erhalten. Rote Blättchen vom F. 245°. Nicht umkrystallisierbar. Mit Alkali wird der Benzylrest abgespalten. Wird 1 Stde. lang gekocht, so bildet sich ein violetter Krystallbrei. Die ammoniakal. Abkochung der Krystalle gibt mit h. wss. KJ-Lsg. rote Flocken. Nadeln aus Pyridin auf Zusatz von A. *Verb.* $C_{35}H_{24}N_3J$. F. über 330°. Die Lsgg. fluorescieren gelbrot. Die *Verb.* ist ein am Zentral-C-Atom substituiertes Chinolinrot. *Jodmethylat*, sehr unbeständig, Farbe etwas mehr nach Orangerot. — *Chinolinrot aus symm. Dichinolylmethan u. Methylenjodid*, $C_{20}H_{15}N_2J$. Goldglänzende Krystalle aus Pyridin. F. über 330°. Die *Verb.* enthält an Stelle der Phenylgruppe des Originalchinolinrots ein H-Atom. — *Kondensation von symm. Dichinoly-2-methan mit Äthylenbromid durch 2–3 Std.* Erhitzen lieferte eine grünglänzende Krystallmasse, die in verd. HCl + etwas A. zum Teil l. war. Die Lsg. gab mit h. wss. KJ-Lsg. rote Nadelchen der *Verb.* $C_{21}H_{17}N_2J$. L. in h. W. mit blaßroter Farbe u. grüner Fluorescenz. F. über 330°. Die grünglänzende Krystallmasse gab nach dem Umkrystallisieren grünschillernde Nadeln vom F. 197 bis 198°, l. mit bordeauxroter Farbe. Bas., bildet 2 Reihen Salze. Aus hochsd. Lösungsmm. wird die *Verb.* in messinggelben Tafeln erhalten, die durch Lösen in Pyridin u. Fällen mit A. wieder grünschillernde Nadeln geben. *Verb.* $C_{30}H_{24}ON_3Br$ durch Kochen von Trichinolylmethan mit überschüssigem Äthylenbromid. Grünglänzende Prismen aus viel A. F. über 330°. Alkali spaltet Trichinolylmethan ab. Ein kleiner Teil des Br ist mit W. umgesetzt, so daß die *Verb.* etwas OH enthält. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 502–08. Erlangen, Inst. f. angew. Chemie.) HARMS.

Arthur J. Hill und De Witt T. Keach, *Einige Derivate des Diäthylmalonesters und der Barbitursäure*. Vff. haben nach folgendem Schema eine Reihe von 5,5-Disubstitutionsprod. der Barbitursäure dargestellt, um ihre pharmakolog. Eigenschaften zu untersuchen:



Vom Typus I wurden 6 Verbb. ($R = \text{Methyl-, Äthyl-, Propyl-, n-Butyl-, i-Butyl-}$,

Benzyl-), vom Typus II 3 Verbb. (R = Methyl-, Äthyl-, Propyl-) bereitet. Die Chlor-methyläther ROCH_2Cl wurden nach der Methode von HENRY (Bull. Soc. Chim. Belgique [3] 26. 629 [1893]) u. FAVRE (Bull. Soc. Chim. Paris [3] 11. 1095. 879 [1894]) aus dem entsprechenden Alkohol, Formalin u. HCl gewonnen. Von ihnen sind neu: *n*-Butylchlormethyläther, Kp_{760} 134°, *i*-Butylchlormethyläther, Kp_{760} 120—121°, u. Benzylchlormethyläther, Kp_{40} 125°. Diese Chlormethyläther wurden in die äth. Lsg. des Natrium- bzw. Dinatriumdithylmalonesters eingetragen, wobei folgende Verbb. resultierten: Äthyl-methoxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{18} 125—126°, Äthyl-äthoxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{13} 120—121°, Äthyl-propoxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{15} 135—40°, Äthyl-*n*-butoxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{5-6} 133°, Äthyl-*i*-butoxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{9-10} 135°, Äthyl-benzoyloxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{10-11} 190 bis 192°, Propoxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{2-3} 107—108°, Bisäthoxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{7-8} 123—125°, Bispropoxymethyl-diäthylmalonester, Kp_{2-3} 124—125°. Durch Kondensation mit Harnstoff wurden aus diesen substituierten Malonestern folgende Barbitursäurederiv. erhalten: 5,5-Äthyl-methoxymethyl-barbitursäure, $F. 184^\circ$, 5,5-Äthyl-äthoxymethylbarbitursäure, $F. 166^\circ$, 5,5-Äthyl-propoxymethyl-barbitursäure, $F. 174^\circ$, 5,5-Äthyl-*n*-butoxymethyl-barbitursäure, $F. 135^\circ$, 5,5-Äthyl-*i*-butoxymethyl-barbitursäure, $F. 177^\circ$, 5,5-Äthyl-benzoyloxymethyl-barbitursäure, $F. 139-140^\circ$, 5,5-Bisäthoxymethyl-barbitursäure, $F. 201-203^\circ$, 5,5-Bispropoxymethyl-barbitursäure, $F. 187^\circ$, 5-Propoxymethyl-barbitursäure, $F. 163-165^\circ$. Durch Kondensation von Äthyl-äthoxymethyl-diäthylmalonester mit Thioharnstoff wurde 5,5-Äthyl-äthoxymethyl-2-thiobarbitursäure, $F. 147^\circ$, dargestellt, die sich nicht desulfurieren ließ, wie eigentlich erwartet wurde. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 257—62. New Haven, Connecticut. Univ.) WI.

Luis A. Bontempi, Die Absorptionsspektren von Morphinlösungen im Ultraviolett. Lsgg. von Morphin u. Morphinchlorhydrat zeigen im Ultraviolett zwischen 2950 u. 2620 Å eine starke selektive Absorption. Vf. beobachtet, daß bei Zusatz von NaOH einer bestimmten Konz. eine sprunghafte Verschiebung der Absorption nach längeren Wellenlängen stattfindet. Es ergibt sich, daß diese Verschiebung dann stattfindet, wenn die Konzz. des Morphinchlorhydrats u. der NaOH äquimolekular sind. Da bei Phenolen ähnliche Beobachtungen gemacht worden sind, wird die OH -Gruppe des C-Atoms 6 nach der Formel von KNORR-HÖRLEIN des Morphins für dieses Verhalten verantwortlich gemacht. Ob hierbei eine Keto-Enol-Umlagerung stattfindet, läßt sich nicht sagen, doch wird irgend eine Änderung der Struktur der durch die Wrkg. der NaOH in Freiheit gesetzten Base letzten Endes die Ursache der beobachteten Verschiebung sein. (Annales Soc. Cientif. Argentina 99. 209—28. 1925. Buenos Aires.) HA.

Alfons Kunz, Studien über Salicin. I. Eigenartige Drehung der Halogenetetracetyl-derivate des Salicins. Eine neue Salicinsynthese. Die Tetraacetylsalicinhalogenide zeigen eigentümlicherweise eine opt. Rechtsdrehung, obwohl sie ohne Zweifel β -Glucoside sind. Der Wert der Drehung ist um so höher, je größer das At.-Gew. des Halogens ist. Vf. hofft durch Auffindung der entsprechenden α -Salicinverbb. diese ungewöhnliche Drehung erklären zu können u. hat zunächst eine neue Synthese des β -Salicins ausgearbeitet: β -o-Kresylglucosid (RYAN, Journ. Chem. Soc. London 75. 1056 [1899]) wurde acetyliert zu Tetraacetyl- β -o-kresylglucosid, $F. 141^\circ$, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} = -25,4$, ll. in Ä., l. in Chlf., Bzl. u. h. A., unl. in PAe. Durch Behandlung desselben mit Br_2 in Chlf. in der Sonne entstand Tetraacetylsalicinbromid, $[\alpha]_{\text{D}}^{24,5} = +42,7$, das sich mit Silbercarbonat überführen ließ in Tetraacetylsalicin, Nadeln, $F. 126^\circ$, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} = -15,9$, ll. in Ä., l. in A., Aceton, Essigester u. Chlf., unl. in PAe. Dies Tetraacetylsalicin ließ sich leicht zu Pentaacetylsalicin acetylieren, woraus durch Einw. von Na Salicin bereitet wurde. Tetraacetylsalicinchlorid, Nadeln, $F. 160^\circ$, $[\alpha]_{\text{D}}^{23,5} = +11,5$, u. Tetraacetylsalicinjodid, $F. 158^\circ$, $[\alpha]_{\text{D}}^{24} = +62,7$, wurden aus Tetraacetylsalicin bzw. aus Salicin gewonnen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 262—68. Washington.) WINKELMANN.

E. Biochemie.

R. Keller, *Neue Methoden in der Mikro-Physiko-Chemie*. Es wird auf eine neue Methodik hingewiesen, die der Elektrizitätsladung u. dem Dispersitätsgrad der natürlichen Zellteile nachgeht. Die Berechnung u. das Experiment zeigen, daß es sich in den lebenden Zellen um relative Hochspannungen in der Größenordnung von 500 000 V pro cm handelt. (Biochem. Ztschr. **168**. 88—93.) LASCH.

R. Keller, *Kataphorese von Stoffen unter physiologischen Bedingungen*. Nach Verss. von **R. Fürth** u. **J. Gicklhorn**. (Vgl. vorst. Ref.) Werden gefärbte oder ungefärbte Verbb. unter den Verhältnissen der lebenden Zellen also unter hoher Spannung u. minimaler Stromstärke zur Wanderung im elektr. Strom gebracht, so läßt sich der Wanderungssinn in wenigen Sekunden feststellen. Es wurden Spannungen bis 800 V u. Chamotte-Elektroden angewendet u. es gelang so, das Verhalten der Farbstoffe im physiolog. Milieu glatt u. sicher zu reproduzieren. Die Sulfosäurefarbstoffe wanderten in Alkali zur Anode, in Säure zur Kathode, Methylenblau in W. rein zur Kathode, in Alkali überwiegend zur Kathode, in Serum rein zur Anode wie im lebenden Tiere. Ebenso stimmte die Wanderung anderer untersuchter Farbstoffe gut mit ihrem Verh. in den pflanzlichen u. tier. elektrohistolog. Testobjekten überein. Nur Kongorot u. Kongorubin bildet bisher eine Ausnahme. (Biochem. Ztschr. **168**. 94—97.) LASCH.

R. Keller und **J. Gicklhorn**, *Kataphorese von Sauerstoff und Kohlensäure. Positiver Sauerstoff?* (Vgl. vorst. Ref.) Die Atmungsorgane der niederen u. der höheren Tiere sind negativer als das benachbarte Gewebe, besitzen einen großen Reichtum an Reduktionsorten u. sind etwas stärker alkal. als das Nachbargewebe. Es fehlen jedoch nicht charakterist. positive Punkte u. Oxydationsorte in den Atmungsorganen. Anodizität u. Oxydationsorte in den Atmungsorganen fallen immer zusammen. Wie an Kataphoreseverss. festgestellt wurde, werden naszierender O₂ oder O₂ abgebende Verbb. von den negativen Punkten (Kathoden) angezogen, CO₂ von ihnen abgestoßen. (Biochem. Ztschr. **168**. 98—105.) LASCH.

R. Keller und **J. Gicklhorn**, *Kataphorese von Zuckern unter physiologischen Bedingungen*. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird die Kataphorese von Glucose u. anderen Zuckerarten in dem von FÜRTH angegebenen App. untersucht. Glucose wandert unter gewöhnlichen Umständen u. unter der Acidität des Säftemilieus zur Anode. Alle untersuchten Zucker lassen sich in saurem Milieu u. noch nicht ganz erforschten Bedingungen auf kathod. Wanderungssinn umladen. Insulin wandert ebenfalls anod. Es wird auf die Verss. von WERTHEIMER (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **208**. 670; C. **1925**. II. 1282) verwiesen u. seine Versuchsanordnung empfohlen. (Biochem. Ztschr. **168**. 106—09. Prag, Inst. f. theoret. Physik d. Deutschen Univ.) LASCH.

A. H. Roffo und **H. de Giorgi**, *Die elektrische Leitfähigkeit des normalen und neoplastischen Gewebes*. Unterschiede in der Leitfähigkeit von n. u. neoplast. bzw. embryonalem Gewebe führen Vff. auf verschiedenen Gehalt an Na- u. K-Ionen einerseits u. Ca-Ionen andererseits zurück. (Bol. del inst. de med. exp. **1**. 256; Ber. ges. Physiol. **32**. 465. 1925. Ref. HARTMANN.) OPPENHEIMER.

Emma Eisenberg, *Über die Wirkung der pulsierenden Vakuolen bei Infusorien. Beitrag zur Kenntnis der Permeabilität der Zelle*. Die Tätigkeit der Vakuolen von Einzellern erweist sich abhängig von der Ggw. verschiedener Elektrolyte besonders Kationen. Eine Reihe der Kationen bzgl. der Intensität ihrer Beeinflussung läßt sich aufstellen. Zusammenhänge mit der Elektrolytbeeinflussung der Permeabilität. (Trav. de l'inst. M. Nencki **37**. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 466. 1925. Ref. KOPÉC.) OPPENHEIMER.

E₂. Pflanzenchemie.

E. S. Dowding, *Die örtliche und zeitliche Verteilung des Kaliums in pflanzlichen Geweben*. Best. von K auf mikrochem. Wege mit dem Na-Co-Nitritreagens von

Macallum in den einzelnen Teilen von *Picea canadensis* u. im keimenden Weizenkorn. (Ann. of botany **39**. 459—74; Ber. ges. Physiol. **32**. 529—30. 1925. Edmonton, Canada, Botann. laborat. Ref. BORESCH.) OPPENHEIMER.

J. Arthur Harris, Clara T. Hoffman und **Walter F. Hoffman**, *Der Sulfatgehalt des Blattgewebesafte von ägyptischer und Upland-Baumwolle*. Der Sulfatgehalt der binnenländ. Arten ist höher als der der ägypt. Baumwolle (Pima). (Journ. Agricult. Research. **31**. 653—61. 1925. Minnesota Agric. Exp. Stat.) TRÉNEL.

Em. André, *Beitrag zur Kenntnis der Öle der Chaulmoogrgruppe*. (Vgl. S. 1827.) Vf. untersuchte einige der gegen Aussatz verwendeten Öle der Chaulmoogrgruppe.

Pflanze	D.	n_D	α_D	F. ^o	VZ.
<i>Taraktogenes Kurzii</i> . . .	0,9425 (32°)	—	+48° 00'	33,0—39,0	210,4
<i>Hydnocarpus anthelmintica</i>	0,9447 (29°)	1,4755 (29°)	+58° 10'	26,0—29,0	191,0
"	0,9427 (32°)	1,4742 (29°)	+48° 00'	25,0—26,0	187,3
<i>Hydnocarpus alpina</i> . . .	0,9346 (32°)	1,4764 (29°)	+57° 00'	20,5	201,0
<i>Hydnocarpus wightiana</i>	0,9330 (32°)	1,4780 (29°)	+61° 40'	28,0—32,0	197,2
<i>Asteriastigma macrocarpa</i>	0,9217 (32°)	1,4725 (25°)	+44° 00'	37,0—39,0	189,4
<i>Oncoba echinata</i>	0,9286 (32°)	1,4740 (31°)	+56° 10'	40,5—41,5	184,5
<i>Carpotroche brasiliensis</i> .	0,9499 (32°)	1,4755 (31°)	+53° 40'	21,0—23,0	183,7

Die Öle wurden mit Ä. ausgezogen, mit Ausnahme der zweiten Probe *Hydnocarpus anthelmintica* (*Krabaöl*), die durch Auspressen gewonnen wurde. Die α_D -Werte beziehen sich auf 5°/ig. Lsgg. in Chlf. Das auffallendste Merkmal sämtlicher Öle ist ihre starke Rechtsdrehung, die durch die Ggw. von *Chaulmoogra*- u. *Hydnocarpsäure* allein nicht erklärbar ist, weil auch die fl. aus den Ölen isolierten Glyceride stark nach rechts drehen. Das *Chaulmoograöl* des Handels nähert sich eher dem von *H. anthelmintica* u. *wightiana*, als dem von *Taraktogenes Kurzii*, obwohl die letzte das echte *Chaulmoograöl* erzeugt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1089—91. 1925.) BKM

Walter F. Hoffman, *Ein aus poliertem Reis isolierter alkohollöslicher Eiweißkörper*. Die von OSBORNE, VAN SLYKE, LEAVENWORTH u. VINOGRAD (Journ. Biol. Chem. **22**. 259; C. **1915**. II. 1195) erwähnte in A. 1. Eiweißsubstanz des Reises konnte auch unter Verwendung größerer Reismengen u. von 70°/ig. A. nur in geringer Menge gewonnen werden. Sie ähnelt in der Löslichkeit den Prolaminen von Kaffernhirse u. Sorghum, enthält aber nicht die reichliche Menge Amid-N, die als charakterist. für Prolamine angesehen wird. Nach den ersten 2 oder 3 Extraktionen wird kein Eiweiß mehr ausgezogen, Vf. hält es daher für unwahrscheinlich, daß es sich um einen Teil des Reisglutelins handelt. (Journ. Biol. Chem. **66**. 501—04. 1925. St. Paul, Univ. of Minnesota.) SPIEGEL.

L. Rosenthaler, *Phytochemische Notizen*. 1. *Mannit in Jalapenknollen*: Die von WIDMANN (Büchners Repert. für die Pharm. **54**. 220 [1835]) herrührende Angabe, daß Jalapenknollen Mannit enthalten, deren Richtigkeit stets bezweifelt wurde, konnte durch Isolierung u. Identifizierung dieser Verb. sicher bestätigt werden. Der Anteil an der Abführwrkg. dürfte indessen sehr gering sein. 2. *Saccharose aus Belladonnawurzel*: Aus dem alkoh. Auszug von *Radix Belladonnae* abgeschiedene Krystalle erwiesen sich nach F., Drehungs- u. Reduktionsvermögen, vor u. nach der Invertierung u. Resorcin-HCl-Rk. als Saccharose. 3. *Über das Blausäureglykosid der Rinde von Pirus aucuparia Gaertner* (gemeinsam mit **F. Kollé**). Mit der Mutterlauge der auf übliche Weise (L. Rosenthaler, Grundzüge d. chem. Pflanzenunters., 2. Aufl., S. 32) aufgearbeiteten 4 kg Stammrinde von *Pirus aucuparia* wurde der enzymolyt. Index nach BOURQUELOT (Journ. Pharm. et Chim. [6] **4**. 481 [1901]. Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **245**. 164 [1907]) zu 560° bestimmt. Diesem Wert kommt am nächsten *Mandelnitritglykosid* mit 517. Die mit rauchender HCl verseifte Mutterlauge lieferte beim Ausäthern l. Mandelsäure. 4. *Über das Vorkommen eines Blau-*

säureglykosides in Achillea millefolium L. Mit 600 g Kraut wurde der enzymolyt. Index bestimmt. Die Drehung in der 2-dm-Röhre sank nach Behandlung mit Emulsin um 0,17°, der Zuwachs an Zucker betrug auf 100 ccm 141,4 mg. Hiernach liegt ein *Benzaldehydcyanhydringlykosid* vor. Der berechnete Wert stimmt mit keinem bekannten überein. Ob ein unbekanntes HCN-Glykosid oder ein Gemisch vorliegt, kann nicht entschieden werden. Im Juni 1922 wurde der HCN-Gehalt zu 3 mg %, Ende Mai 1924 zu 7 mg % u. Mitte Mai 1925 zu 6 mg % bestimmt. 5. *Über das Vorkommen von Blausäure in Chloris petraea.* Das südafrikan. Gras *Chloris petraea* zeigte einen HCN-Gehalt von 2 mg %. Im Destillat konnte Aceton nachgewiesen werden. Auch die frische Pflanze dürfte keinen bedeutenden HCN-Gehalt haben, da Fütterungsverss. von THEILER (Pretoria) keine Vergiftung ergaben. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **263**. 561—66. 1925. Bern.) HARMS.

W. D. Salmon und Emerson R. Miller, *Der Gehalt an wasserlöslichem Vitamin bei der „Velvet“-Bohne.* Fütterungsverss. mit Tauben u. Ratten zeigen, daß die bei einseitiger Ernährung mit poliertem Reis auftretenden Verfallerscheinungen durch Gaben von 2 g pro Tag erfolgreich bekämpft werden können; höhere Gaben wirkten schädlich. Bohnen, die mit A. extrahiert waren, hatten keine Schutzwirkg. mehr. (Journ. Agricult. Research. **31**. 793—99. 1925. Agric. Exp. Stat. Alabama, Polyt. Institute.) TRÉNEL.

E₅. Tierphysiologie.

U. G. Bylsma, *Die Einwirkung subcutan injizierten Hypophysenextraktes auf die Ausscheidung von Wasser und Kochsalz durch die Nieren.* Die Verss. ergaben stets, schon bei Eingabe von 0,003 mg Extrakt pro kg, Beschleunigung der NaCl-Ausscheidung, während die Verhältnisse der W.-Ausscheidung vom Verhältnis NaCl:W. im Körper u. der absol. Menge beider abhängen. (Mededeelingen van het Rijks-Inst. voor pharmaco-therapeutisch Onderzoek. **1925**. 55—59. Sep.) SPIEGEL.

Shigeschi Ogawa, *Einfluß des Hungers auf die Adrenalinsekretion und den Adrenalingehalt der Nebenniere.* Die anfänglich unter Hunger gesteigerte Adrenalinsekretion nimmt im weiteren Verlauf einer Hungerperiode ständig ab. Der Adrenalingehalt zuerst unverändert, kann nach 18 Tagen auf $\frac{1}{3}$ gesunken sein. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **107**. 171—79. Keijo [Japan], Chir. Klin.) OPPENHEIMER.

Pierre Mauriac und A. Gandy, *Über die intratracheale Applikation von Insulin.* Nach intratrachealer Injektion oder Infusion (mit Kanüle) von Insulin tritt beim Vers.-Tier eine Hypoglykämie ein, die derjenigen nach subcutaner Applikation nicht nachsteht, freilich weniger regelmäßig ist. (C. r. soc. de biologie **93**. 1524—26. 1925. Bordeaux.) OPPENHEIMER.

Allan Beskow, *Wirkt das Insulin auf die Aktivität des überlebenden Froschherzens ein?* Bzgl. des Arbeitseffektes bei Zufuhr von Glucose ergab sich kein wesentlicher Unterschied zwischen den isolierten Herzen von n. u. pankreasdiabet. Fröschen. In beiden Fällen hatte Zusatz von Insulin zur Perfusionsfl. keinen Einfluß auf die Aktivität. (Skand. Arch. f. Physiol. **47**. 127—45. Upsala, Univ.) SPIEGEL.

Thomas P. Nash jr., *Insulin und Phlorrhizindiabetes.* II. Mit weiteren Beobachtungen über den Mechanismus des Phlorrhizindiabetes. Unter Mitarbeit von Ben K. Harned und William B. Wendel. (I. vgl. Journ. Biol. Chem. **58**. 453; C. **1924**. I. 1959. Vgl. auch NASH u. BENEDICT, Journ. Biol. Chem. **61**. 423; C. **1924**. II. 2594.) Wenn hungernden, mit Phlorrhizin behandelten Hunden Glucose allein oder mit Insulin zusammen gegeben wurde, traten die folgenden Erscheinungen ein: 1. Verminderung der N-Ausscheidung im Harn um 30—65% mit solcher des Nichteiweiß-N-Gehaltes im Blute. — 2. Geringe oder keine Beeinflussung der Kreatininausscheidung. — 3. Starke Abnahme oder völliges Verschwinden der Ausscheidung von anorgan. Phosphat, meist mit Erniedrigung seiner Konz. im Blute. — 4. Starke Ab-

nahme oder völliges Verschwinden der Ketosis u. Ketonurie. — 5. Ausgesprochene zeitweilige Besserung im phys. Zustande der Tiere, gefolgt von Perioden abnormer Schwäche u. Hinfälligkeit. — 6. Ergiebige Synthese u. Speicherung von Glykogen in Muskeln u. Leber. — Konstante quantitative Differenzen in diesen Effekten zwischen Anwendung von Glucose allein oder zugleich mit Insulin wurden nicht beobachtet, doch betrug die wiedergewonnene Glucose im ersten Falle durchschnittlich 91, im zweiten nur 72,5%. Hier findet möglicherweise Synthese von Fett statt. Die Zunahme des Respirationsquotienten hierbei braucht vorläufig nicht notwendig als Beweis für die Oxydation von Zucker seitens des Phlorrhizinhundes angesehen zu werden. (Journ. Biol. Chem. **66**. 869—900. 1925. Memphis, Univ. of Tennessee Coll. med.) SPIEGEL.

Oliver Henry Gaebler und **John R. Murlin**, *Der Einfluß des oral und subcutan verabreichten Insulins bei Phlorrhizindiabetes*. Bei unter vollem Einfluß von Phlorrhizin stehenden Hunden verursachte subcutan beigebrachtes Insulin sofort Verringerung der Zuckerausscheidung u. Steigerung des Respirationsquotienten (R. Q.). Schon Eingabe von Glucose ohne Insulin vermindert die N-Ausscheidung (Einsparung von Eiweiß), mit Insulin zusammen aber in stärkerem Grade. Peroral in darmüberzogenen Tabletten in Kombination mit Äpfelsäure, Na-Oleat oder einer HCl freimachenden Aminosäure, auch in Blutserum gel. gab Insulin zwar positive, aber sehr mäßige Resultate in der Verminderung des Harnzuckers, Steigerung des R. Q. u. Eiweißersparnis, viel geringer als subcutan, besonders bzgl. der Ausscheidung in den nächsten Std. Der nach subcutaner Anwendung aus dem Harn verschwindende, nicht wieder erscheinende Zucker wird für die klin. Einheit Insulin zu 0,28 bis 0,48 g gefunden. Es ergaben sich Anzeichen dafür, daß Phlorrhizin Insulin in der Wrkg. behindert, u. hierauf beruht vielleicht zum Teil seine diabeteserzeugende Wrkg. (Journ. Biol. Chem. **66**. 731—81. 1925. Rochester [N. Y.], Univ. of Rochester.) SPIEGEL.

Horace A. Shonle und **John H. Waldo**, *Die zerstörende Wirkung von Säuren, Alkalien und Enzymen auf Insulin*. Durch H_2SO_4 , NaOH u. Trypsin wurde die Wirksamkeit in dem Grade der fortschreitenden Eiweißhydrolyse geschwächt. (Journ. Biol. Chem. **66**. 467—74. 1925. Indianapolis, LILLY Res. Labb.) SPIEGEL.

Sergius Morgulis, *Blutveränderungen während der Verdauung unter besonderer Berücksichtigung der Harnstoffbildung*. Unter Mitarbeit von **A. C. Edwards**, **Grace Thomas** und **Otakar Barkus**. Es ergab sich während der Resorption von Eiweißverdauungsprodd. bei Ernährung von Hunden mit Fleisch oder Dryco, einer eiweißreichen synthet. Nahrung, Zunahme des Harnstoffs im Aderblut oft früher als solche des Aminosäure-N, besonders wenn der Vers. kurz nach einer Hungerperiode stattfand. Dies wird als Beweis für die vorwiegende Bedeutung der Leber für die B. des Harnstoffs betrachtet, wofür weiter spricht, daß bei entsprechenden Verss. an Hunden mit Eck-scher Fistel die Harnstoffkonz. des Blutes ungewöhnlich niedrig, der Aminosäure-N dagegen völlig n. gefunden wurde. (Journ. Biol. Chem. **66**. 353—65. 1925. Omaha, Univ. of Nebraska.) SPIEGEL.

Donald D. van Slyke und **Erik Vollmund**, *Untersuchungen über Methämoglobinsbildung*. Mittels der von VAN SLYKE (S. 2613) angegebenen Technik wurde die Einw. von Anilin, Nitrobenzol, Ferricyanid u. Nitrit auf Hämoglobin verfolgt. Nitrobenzol lieferte weder bei Einw. auf Blut in vitro noch bei Aufnahme durch Kaninchen, wo es Anämie erzeugte, ein als Methämoglobin identifizierbares Prod., die 3 anderen ergaben mit Methämoglobin darin übereinstimmende Prodd., daß sie O_2 oder CO nicht ohne vorherige Red. mit Hydrosulfit zu binden vermochten. Die Einw. von Anilin erfolgt nur langsam mit einer zuweilen mehrstd. Latenzperiode, u. zur Vollendung sind mehrere Mole von jenem auf 1 Mol Hämoglobin erforderlich; die B. des Methämoglobins erfolgt auch bei nicht lackfarben gemachtem Blut, es müssen also Anilin oder die aus ihm zunächst entstehenden Prodd. die Zellen zu durchdringen vermögen.

Nitrit u. Ferricyanid wirken auf lackfarben gemachtes Blut fast momentan unter B. von Methämoglobin in annähernd molaren Mengen. Nitrit vermag auch die Zellen zu durchdringen, Ferricyanid nicht. (Journ. Biol. Chem. **66**. 415—24. 1925. New York, ROCKEFELLER Inst. f. med. res.) SPIEGEL.

E. J. Bigwood, *Die Grenzen der Wasserstoffionenkonzentration im normalen Blut*. Krit. Besprechung der Bestst. von p_H im Blut. Die elektrometr. muß bei Körpertemp. vorgenommen werden. Die colorimetr. hat eine Fehlerbreite von $\pm 0,02$. Die indirekte Methode mit Hilfe der Hasselbachschen Gleichung aus dem Wert der freien u. gebundenen CO_2 ist am wenigsten scharf, in Krankheitsfällen nur mit Einschränkung zu gebrauchen u. hat mit einer Fehlerbreite von $\pm 0,03$ zu rechnen, wenn p_k mit 6,12 fixiert wird. Der mittlere p_H -Wert im Blut schwankt zwischen $p_H = 7,32$ u. 7,40. (Bull. Soc. Chim. Biol. **7**. 868—83. 1925.) OPPENHEIMER.

E. J. Bigwood, *Die Regulation des Blut- p_H -Wert in normalen und pathologischen Zuständen*. (Vgl. vorst. Ref.) In der Norm regelmäßiger Parallelismus der Kurve für freie u. der Kurve für gebundene CO_2 u. für p_H . Charakterist. Veränderung dieser Faktoren u. des entsprechenden Kurvenverlaufs über einen Tag oder längere Perioden bei acidot. oder alkalot. Zuständen. Verss. an Hunden, n. Menschen, Diabetes- u. Epilepsiefällen. (Bull. Soc. Chim. Biol. **7**. 884—92. 1925.) OPPENHEIMER.

J. Harold Austin, William C. Stadie und Howard W. Robinson, *Die Beziehung zwischen colorimetrischer Ablesung und wahren p_H von Serum oder Plasma*. Unter patholog. beim Menschen u. unter n. u. experimentellen Verhältnissen beim Hunde zeigen sich beträchtliche Schwankungen in der Differenz zwischen colorimetr. Ablesung von p_H des verd. Serums oder Plasmas sowohl bei 20° als auch bei 38° u. dem wahren p_H von unverd. Serum oder Plasma bei 38° . Die notwendige Korrektur muß daher in jedem Falle bestimmt werden, wofür Vff. einen Weg angeben. (Journ Biol. Chem. **66**. 505—19. 1925. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania.) SPIEGEL.

Alan R. Moritz, *Der Zustand des Serumcalciums bei experimenteller Hypo- und Hypercalciämie*. Nach demselben Verf. wie in einer früheren Arbeit (Journ. Biol. Chem. **64**. 81; C. **1925**. II. 835) wurden diffundierbares Ca (I) u. kolloides (II) getrennt. Die Verss. wurden an Kaninchen angestellt. Bei den Kontrolltieren fand sich auch nach $\frac{1}{2}$ -std. Ä.-Anästhesie keine Schwankung des Verhältnisses zwischen I u. II über 13% hinaus. Von 7 Tieren, die im Gefolge von Thyreoparathyreoidektomie Hypocalciämie entwickelten, zeigten 6 verhältnismäßig schnelleren Abfall von I als von II; soweit sie genasen, war Tendenz zur Wiederherst. des ursprünglichen Verhältnisses mit beginnendem Wiederanstieg des Serum-Ca vorhanden. Von Tieren, bei denen durch Nebenschilddrüsenextrakt das Serum-Ca vermehrt wurde, blieb in $\frac{1}{2}$ der Fälle das Verhältnis I:II unverändert, während in $\frac{1}{2}$ I relativ schneller stieg. (Journ. Biol. Chem. **66**. 343—51. 1925. Cleveland, Western Reserve Univ.) SPIEGEL.

O. Birger und H. Rawitsch-Birger, *Über die Wirkung der Toxine auf die Gefäße eines isolierten Organes*. Beim Durchleiten von Toxinen reagieren die Gefäße des isolierten Kaninchenohres nach den von KRAWKOW für andere Gifte ermittelten Gesetzen. Der Hauptunterschied, auf stärkerer Bindung der Toxine durch das Zellprotoplasma beruhend, zeigt sich am deutlichsten im Ausgangsstadium. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I. **46**. 183—89. Moskau, Inst. „Elias Metschnikoff“.) SPIEGEL.

E. Singer, *Über den Einfluß des Mangans auf die Antikörperbildung bei der experimentellen Fleckfieberinfektion*. Durch Injektion von $MnCl_2$ konnte bei fleckfieberinfizierten Meerschweinchen die B. von Agglutininen gegen OX 19 herbeigeführt werden. Das Serum so behandelter Tiere erwies sich im Schutzvers. als stärker wirksam als dasjenige von Tieren, die eine Fleckfieberinfektion durchgemacht hatten, aber nicht mit Mn behandelt waren. Die B. der Antikörper bleibt aber auch im günstigsten Falle

schwach. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I. **46**. 288—94. Prag, Dtsch. Univ.) SPIEGEL.

N. R. Blatherwick, Marion Bell, Elsie Hill und M. Louisa Long, *Die Ausscheidung von Zucker in normalem Harn*. Zusatz von Glucose zu einer Normalkost verursachte vermehrte Ausscheidung von vergärbarem Zucker ohne merkliche Änderung im nichtvergärbaren Anteil, wobei Handelsglucose etwas stärker wirksam erschien als ein reineres Präparat („Exose“ der CORN PRODUCTS REFINING COMPANY), doch blieb jene Zunahme stets gering. Bei verschiedenen zusammengesetzter Kost ergab sich wachsender $\%$ -Satz von unvergärbarem Zucker mit Zunahme der Eiweißzufuhr, die beobachteten täglichen Schwankungen bei gleichbleibender Nahrung lassen aber vorläufig nicht zu dem Schlusse kommen, daß jener Zuckeranteil ausschließlich dem Eiweißstoffwechsel entstamme, wenn dieser auch die Hauptquelle dafür zu sein scheint, während den vergärbaren Zucker der Kohlenhydratstoffwechsel als solcher angezeigt wird. (Journ. Biol. Chem. **66**. 801—10. 1925. Santa Barbara, Cottage Hosp.) SP.

W. Mestrezat und Y. Garreau, *Die Sättigung der Körperflüssigkeiten mit Chloriden und ihre Beziehungen zur Geschwindigkeit des Mineralaustauschs und zu den selektiven Eigenschaften der Zellpermeabilität*. Ausführliche Darst. bereits veröffentlichter Verss. (Vgl. C. r. soc. de biologie **92**. 1439; C. **1925**. II. 663) illustriert durch Wiedergabe von Kurven. (Bull. Soc. Chim. Biol. **7**. 860—67. 1925. Paris.) OPP.

Margaret S. Chaney und Katharine Blunt, *Die Wirkung von Orangensaft auf die Retention von Calcium, Phosphor, Magnesium und Stickstoff und organische Säuren des Harns wachsender Kinder*. Der Orangensaft förderte die Retention von Ca u. P beträchtlich über den eigenen Gehalt an diesen Elementen hinaus, auch, aber in geringerem Grade die Retention von Mg, steigerte ferner die N-Assimilation, auch bei unveränderter N-Zufuhr. Im Harn wurde NH_3 vermindert, pH u. Gehalt an organ. Säuren vermehrt, letzterer um ca. 7% der zugeführten Citronensäure. Die Kinder nahmen deutlich an Gewicht zu. (Journ. Biol. Chem. **66**. 829—45. 1925. Chicago, Univ. of Chicago.) SPIEGEL.

Erik Essen-Möller, *Studien über die Einwirkung der Wasserstoffionenkonzentration auf die Oxydationsprozesse der Muskulatur*. Das pH-Optimum für die Oxydationsprozesse der Froschmuskulatur wurde nach der Thunbergschen Methylenblaumethode unter colorimetr. Best. der $[\text{H}^+]$ im Medium bei ca. 7,8—7,9 gefunden. (Skand. Arch. f. Physiol. **47**. 164—73. Lund, Univ.) SPIEGEL.

William G. Lennox, *Eine Untersuchung über die Retention von Harnsäure während des Fastens*. Unter Mitarbeit von **Marie O'Connor**. (Vgl. Journ. Lab. Clin. Medicine **10**. 99; C. **1925**. II. 1078.) Die bei diesen Verss. beobachteten hohen Werte der Blutharnsäure sind auf verminderte Ausscheidung zurückzuführen, in der die täglichen u. stündlichen Schwankungen fehlten. Obwohl die Harnsäurekonz. im Harn sehr niedrig war, vermochten die Nieren die Harnsäure in n. Maße zu konzentrieren. Bei abnehmendem Harnvol. schien die Harnsäureausscheidung zu wachsen. Die Retention machte sich zuerst im Plasma geltend, ging mit steigender Konz. der Harnsäure in diesem in steigendem Maße in die Zellen über, bei den höheren Konz. bestand anscheinend Gleichgewicht zwischen beiden. Die Zunahme der Konz. in der Gewebsfl. betrug auf dem Höhepunkt 30% von derjenigen im Plasma. Ca. 60% der während des Fastens zurückgehaltenen Harnsäure kamen in der Nachperiode wieder heraus. Von in die Venen injizierter Harnsäure erschien während des Fastens ein geringerer Anteil im Harne als in der Norm. Verfütterung von Fett milderte die Retention nicht, wohl aber von Kohlenhydrat, Schilddrüsenextrakt, Aminosäuren u. Eiweiß. Nach kleinen Nahrungsmengen trat gesteigerte Harnsäureausscheidung ohne Änderung des Nierenschwellenwertes ein, nach Atophan Erniedrigung desselben mit Entziehung von Harnsäure erst aus dem Blute, dann aus den Geweben. — Es scheint danach, daß Änderungen der Harnsäureausscheidung nach verschiedenen purinfreien

Kostmaßen nicht Änderungen in der Produktion, sondern im Gehalte in Blut u. Geweben bedeuten u. daß fettarme Kost für Behandlung der Gicht in Betracht kommt. (Journ. Biol. Chem. **66**. 521—72. 1925. Boston, HARVARD med. school; Massachusetts Gen. Hosp.) SPIEGEL.

Cesare Serono, *Über den Stoffwechsel der Kohlenhydrate im tierischen Organismus und über den wahrscheinlichen Ursprung der Glykosurien*. Zusammenfassender Bericht über die Unterss., die Vf. über die Einw. von konz. Glycerinextrakten der verschiedenen an der Verdauung beteiligten Organe auf Stärke u. die anderen in Betracht kommenden Kohlenhydrate in den letzten Jahren angestellt hat, u. Folgerungen daraus für den Ablauf des Kohlenhydratstoffwechsels. Über den 2. Teil der Arbeit, die Glykosurien betreffend, ist bereits referiert. (Vgl. Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. **25**. 315; C. **1926**. I. 2016.) (Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. **24**. 253—62. 1925.) SP.

F. S. Randles und **Arthur Knudson**, *Untersuchungen über Cholesterin*. I. *Synthese von Cholesterin im Tierkörper*. Durch Verss. an weißen Ratten mit einer in besonderer Weise bereiteten cholesterinfreien Kost wird die Möglichkeit der Synthese von Cholesterin im Tierkörper erwiesen. Die Entfernung desselben aus vitaminhaltigen Bestandteilen der Nahrung ohne wesentliche Schädigung des Vitamins erfolgte durch Ä. (Journ. Biol. Chem. **66**. 459—66. 1925. Albany, Union Univ.) SPIEGEL.

C. J. Weber, **A. P. Briggs** und **Edward A. Doisy**, *Die Bildung von Milchsäure durch pankreaslose Hunde*. (Vgl. BRIGGS, KOECHIG, DOISY u. WEBER, Journ. Biol. Chem. **58**. 721; C. **1924**. II. 367.) Nach Entfernung des Pankreas behalten Hunde die Fähigkeit, Milchsäure während Strychninkrämpfen oder beim Laufen zu bilden. Die Vorstufen der Milchsäure werden im Muskel mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit festgehalten u. durch Behandlung mit Adrenalin schnell auf niedrige Werte gebracht. (Journ. Biol. Chem. **66**. 653—69. 1925. St. Louis, St. Louis Univ. school of med.) SPIEGEL.

Carl F. Cori, *Das Schicksal des Zuckers im Tierkörper*. I. *Die Absorptionsgeschwindigkeit von Hexosen und Pentosen aus dem Darmkanal*. Eine gewogene Menge der zu prüfenden Substanz wurde mittels Magensonde an die Ratte verfüttert, nach bestimmter Zeit das Tier getötet u. die in den Gedärmen noch vorhandene Menge der Substanz bestimmt. Die für die Einheit des Körpergewichts u. 1 Stde. berechnete Menge absorbierter Substanz ist der Absorptionskoeffizient. Durch Unterss. an wachsenden Ratten ergab sich Proportionalität zwischen der absorbierenden Oberfläche des Darmes u. dem Körpergewicht. Für Hexosen ergab sich konstante Absorptionsgeschwindigkeit für jede Zuckerart, unabhängig von der absol. Menge u. der Konz. Die Stufenfolge der Absorptionsgeschwindigkeit ist Galaktose > Glucose > Fructose > Mannose > Xylose > Arabinose. Hyperton. Zuckerlsg. wird im Magen durch Abscheidung von W. verd. Dabei verlieren Blut, Leber u. Muskeln kein W., wohl aber die Haut. Nach Glucose trat auch bei 15 g pro kg Körpergewicht kein Zucker im Harn auf, von der absorbierten Galaktose wurden ca. 50% im Harn ausgeschieden. (Journ. Biol. Chem. **66**. 691—715. 1925. Buffalo, State Inst. of malignant disease.) SPIEGEL.

Luigi Tocco-Tocco, *Über Vergiftung mit Carlina gummifera*. V. Mitt. *Wirkung des Kaliumatractylats auf den kardiovaskulären Apparat und die Muskeln*. (Vgl. Arch. intern. de pharmacodyn. **26**. 171 u. 291. 1922; C. **1923**. III. 576—77.) *K-Atractylat* erregt in Dosen 1:5—10000 u. lähmt in Dosen 2,5:100 die Funktion des Froschherzens. Ähnliche Ergebnisse an Warmblütern. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie **29**. 1—10. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 684. 1925. Messina, Istit. die farmacol. e di terap. Ref. JASTROWITZ.) OPPENHEIMER.

Wendell H. Griffith, *Benzoylierte Aminosäuren im Tierkörper*. I. *Das Verhalten der Hippursäure im Verlauf ihrer peroralen Verabreichung*. Die Ausscheidung der Hippursäure wurde bis 6 Stdn. nach innerlicher Eingabe bei Kaninchen verfolgt. Sie wurde durch Hippursäuresalz mit Glycin oder glycinreichen Eiweißstoffen er-

hebelich gesteigert. Dies wird zurückgeführt auf eine vermehrte Synthese aus der durch Hydrolyse der eingeführten Hippursäure im Darm gebildeten Benzoessäure u. dem überschüssigen Glycin. Aus Dünndarmschlingen, die Na-Benzat schnell absorbieren, wurde das Hippurat nur langsam absorbiert. (Journ. Biol. Chem. **66**. 671—81. 1925. Ann Arbor, Univ. of Michigan. St. Louis, St. Louis Univ. school of med.) SPIEGEL.

Wendell H. Griffith und Powel B. Cappel, *Benzoylierte Aminosäuren im Tierkörper. II. Die Hydrolyse der Hippursäure im Ernährungskanal des Kaninchens.* (I. vgl. vorst. Ref.) Hippursäure u. Benzoylalanin wurden im Dickdarm des Kaninchens gespalten, wahrscheinlich durch ein intracelluläres Histozyt gewisser Darmmikroorganismen. Benzoyl- α -aminobuttersäure, auf die das Histozyt nicht einwirkt, wurde nicht gespalten. Nach Eingabe dieser Säure konnte keine Hippursäure aus dem Harn isoliert werden, wohl aber nach Benzoylalanin. (Journ. Biol. Chem. **66**. 683—90. 1925. St. Louis, St. Louis Univ. school of med.) SPIEGEL.

Tamura Shizuaki, *Über das Verhalten des Chinolins im Tierkörper. I. u. II. Mitt.* Im Hundeharn konnte nach Fütterung von 0,3—0,4 g Chinolin pro die, insgesamt 9,5 g, durch Fällung mit bas. essigsäurem Pb u. NH_3 eine Substanz gewonnen werden, deren Pt- u. Au-Salz einem Methylchinolin entsprachen. Beim Kaninchen stieg nach subkutaner Injektion von 0,2 g Chinolin die Ätherschwefelsäuremenge des Harns (er zeigte Linksdrehung) auf das Dreifache. (Acta scholae med. **6**. 449—58. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 553. 1925. Kyoto, Med. chem. Inst. Ref. SCHULZ.) OPPENHEIMER.

Giovanni De Candia, *Der Übertritt von Chininum sulfur. in die Milch und sein Einfluß auf die Gesundheit der Neugeborenen.* Das in die Milch übertretende Chinin — es ist dort bereits 1 Stde. nach Einnahme nachweisbar — hat auf den Säugling bestimmt keine schädliche Wrkg. Andere Behauptungen erklären sich mit dem Umstand, daß das Kind, dem Chinin angeblich geschadet haben soll, schon vorher erkrankt war. (Clin. ostetr. **27**. 153—63; Ber. ges. Physiol. **32**. 678—79. 1925. Siena, Clin. ostetr.-ginecol. Ref. ZUNTZ.) OPPENHEIMER.

Jerzy Kaulbersz, *Über den Einfluß einiger Alkaloide auf die Absonderung des Pankreassaftes nach Einführung von Sekretin in die Blutbahn. Atropin hemmt die Fermentsekretion des Pankreas. Physostigmin u. Pilokarpin steigern die Verdauungskraft. Nicotin beeinflusst die Fermentsekretion, hemmt in größeren, steigert in kleinen Dosen die Saftmenge, Adrenalin u. Chinin vermindern sowohl Saft- wie Fermentmenge. Cocain vermindert den Saft u. läßt die Fermente unbeeinflusst.* (Medycyna doświadczalna i społeczna **4**. 59—99; Ber. ges. Physiol. **32**. 683. 1925. Krakau, Inst. f. Physiol. Ref. PARNAS.) OPPENHEIMER.

J. Holló, J. A. Patai und E. Kolta, *Über die Wirkung des Morphins auf das Säure-Basengleichgewicht des Menschen.* Unter Morphin (in therapeut. Dosen) kommt es zu einer Erhöhung der alveolaren CO_2 -Spannung u. einer Abnahme des Bicarbonatgehalts des Plasma. Die direkt gemessenen pH-Werte bleiben annähernd konstant, woraus gefolgert wird, daß die Beziehungen der Blut- CO_2 -Spannung zur alveolaren CO_2 -Spannung nicht immer rein physikal. Natur sind u. die Hasselbachsche Gleichung zur Berechnung der Blut-Wasserstoffzahl unter Morphinwrkg. nicht anwendbar ist. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **107**. 162—70. Budapest, I. med. Klin.) OPP.

R. Kayser, *Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Strychnins auf den Gesichtssinn.* Auf Grund der Verneinung aller früheren Angaben über Wrkg. des Strychnins auf den Gesichtssinn durch SCHLAGINTWEIT (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **95**. 104; C. **1923**. I. 613) unternahm Vf. eine Nachprüfung durch Best. der Reizschwelle für Licht verschiedener Wellenlängen im roten Teil des Spektrums vor u. nach Einnahme einer Strychnindosis mit Hilfe eines „Liminospektroskops“ von GÖTHLIN (Kgl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar **1917**. Nr. 58), das auch hier beschrieben u. abgebildet ist. Aus den Ablesungen ergibt sich mit Sicherheit ein steigernder Einfluß

des Strychnins auf das Lichtwahrnehmungsvermögen, bei der benutzten Dosis (5 mg per os) durchschnittlich auf das Doppelte. (Skand. Arch. f. Physiol. **47**. 121—26. Upsala, Univ.) SPIEGEL.

Konrad Zucker, *Über die Wirkung des Physostigmins bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems*. (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. **58**. 11—30; Ber. ges. Physiol. **32**. 681. 1925. Rostock-Gehlsheim, Psychiatr. u. Nervenklin. Ref. RIESE.) OP.

M. Rosenfeld, *Über die Wirkung des Scopolamins auf die motorischen Systeme des Zentralnervensystems*. (Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. **58**. 1—10; Ber. ges. Physiol. **32**. 681—82. 1925. Rostock-Gehlsheim, Psychiatr. u. Nervenklin. Ref. RIESE.) OPP.

P. Delmas-Marsalet, *Einfluß der Mobilisierung und des Scopolamins auf die Haltungsreflexe*. Mit Scopolamin hydrobromicum (2,5 mg pro Tag) lassen sich — auch exakt nachweisbar — die Zustände des Parkinsonismus bessern. (C. r. soc. de biologie **93**. 1519—22. 1925. Bordeaux, Service du Prf. SABRAZÈS.) OPPENHEIMER.

Stig Björkman, Gunnar Wiberg und C. G. Santesson, *Vergleichende Versuche über die Wirkung von Cocain und d-ψ-Cocain (Psicain)*. Auf den Geschmack wirkt das saure d-ψ-Cocainditartrat (Psicain) nahezu nicht, das eben neutralisierte dauernder u. intensiver, wenn auch vielleicht nicht so rasch wie neutrales Cocainhydrochlorid. Stärkere neutralisierte Psicainlsg. (10%ig) wirkt dabei nicht viel stärker als 3%ig., während bei entsprechenden Cocainsalzlsgg. ausgesprochenere Unterschiede hervortreten. Auch die taktile Empfindlichkeit der Zungenschleimhaut schien vom neutralisierten Psicain stärker u. dauernder als von Cocainhydrochlorid herabgesetzt zu werden. — Auf die Pupille waren das von Vff. neutralisierte Psicain u. das Mercksche Psicain-N ohne Einfluß. — Auf das motor. Leistungsvermögen des Froschischidiacus hat saures Psicaintartrat keine selbständige Wrkg., Cocainhydrochlorid (neutral) bedeutend schwächere als die beiden neutralisierten Psicainpräparate, die untereinander ziemlich gleich wirken, noch stärkere das bis zur Trübung alkalisierte Cocainhydrochlorid („Cocainmilch“) u. noch intensivere die ebenso hergestellte „Psicainmilch“. — d-ψ-Cocainnatriumtartrat (Psicain-N) scheint sonach für den therapeut. Gebrauch vor Cocainhydrochlorid bestimmte Vorzüge, stärkere u. dauerndere Anästhesierung schon in kleineren Gaben u. wohl auch geringere Giftigkeit zu haben. — *Allyl- u. Benzylbenzoylgonin* (vgl. POULSSON u. WEIDEMANN, Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **105**. 58; C. **1925**. I. 2566) kommen an allgemeiner Giftwrkg. dem Cocain etwa gleich bei bedeutend stärkerer lokalanästhesierender Wrkg. (Kaninchencornea). Die Allylverb. wirkt viel schwächer mydriat. als Cocain, erweitert die Gefäße, erhöht nicht den intraokularen Druck, schmerzt örtlich etwas mehr bei der Instillation u. hat sich bei Augenoperationen besser als Cocain bewährt. (Skand. Arch. f. Physiol. **47**. 145—63. Stockholm, Karolin. medicochirurg. Inst.) SPIEGEL.

G. Lüscher, *Untersuchung über das Verhalten von Trypaflavineiweißverbindungen (Peracrina 303) im Organismus*. Peracrina 303 (Herst. Haco-Gesellschaft A. G., Bern), eine Verb. von Trypaflavin mit besonderen, aus Hefe gewonnenen Eiweißkörpern, hat nach J. WALKER (Arch. f. Schiffs- u. Tropenhygiene **28**. 540 [1924]) gute Erfolge bei Malaria gezeigt. Die vergleichenden Verss. des Vfs. ergaben folgendes: 1. Trypaflavin in Substanz (I) scheint bei höheren Konz. stärker parasitocid auf Ciliaten zu wirken als in Form von Peracrina (II), bei Verdünnungen von $> \frac{1}{1000}$ -n. umgekehrt. — 2. Bei Kaninchen wirkt II eher weniger giftig als I, bei beiden tritt bis zu einem gewissen Grade Angewöhnung ein. — 3. II bleibt, auch wenn es vorher einem Verdauungsprozeß unterworfen wurde, nach intravenöser Einspritzung bedeutend länger im Blute als I, das nach 15 Min. prakt. aus dem kreisenden Blute verschwunden war. — 4. Für subkutane Injektion lassen sich keine vergleichbaren Resultate erhalten, weil II ein nur in großen Zeiträumen resorbierbares Depot bildet, I viel schneller unter verhältnismäßig langer Ggw. im Serum resorbiert wird. Nekrot. Erscheinungen zeigen Meerschweinchen nach I u. II, Kaninchen nur nach I. — 5. Perorale Einverleibung

ergibt bei Ratten, Kaninchen, Hunden u. Menschen größere Konz. u. langsamere Ausscheidung des Trypaflavins aus dem Blute nach II als nach I. — 6. Das aus dem Blute austretende Trypaflavin verteilt sich bei oraler u. intravenöser Verabreichung zuerst auf die Körpergewebe, konz. sich dann immer mehr auf Milz, Leber, Nieren, Blase, wird schließlich durch den Harn ausgeschieden. Diese Erscheinungen sind bei I u. II prinzipiell gleichartig. — 7. Von dem peroral als I oder II gegebenen Trypaflavin verläßt ca. $\frac{1}{10}$ den Körper unverändert im Harn, der größte Teil wird sehr wahrscheinlich in heller gefärbte, durch Fluoreszenz nicht mehr bestimmbare Prodd. umgewandelt. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I. **46**. 265—87. Lausanne, Univ.) SP.

Walter A. Jacobs, *Einige Ausblicke für die Chemotherapie protozoischer und bakterieller Infektionen*. Übersicht. (Medicine **3**. 165—93. 1924; Ber. ges. Physiol. **32**. 685. 1925. New York, Rockefeller inst. f. med. research. Ref. SCHNITZER.) OPPENHEIMER.

J. C. Munch und **E. W. Schwartz**, *Narkotische und Giftwirkung aliphatischer Alkohole auf Kaninchen*. Bei oraler Verabfolgung aliph. Alkohole an Kaninchen wurde festgestellt, daß mit wachsendem Mol.-Gew. auch narkot. u. Giftwrkg. größer werden, u. zwar in den meisten Fällen die erstere schneller als die letztere. Es wurden die kleinste narkot. u. die sicher letale Dosis festgestellt für CH_3OH , A., *n*-Propyl-, *i*-Propyl-, *n*-Butyl-, *i*-Butyl-, *sek.*-Butyl-, *tert.*-Butyl-, *i*-Amyl-, *sek.*-Amyl- u. *tert.*-Amylalkohol. (J. Lab. and Clin. Med. St. Louis **10**. 985; Journ. Franklin Inst. **201**. 115.) HARMS.

Ralph H. Major, **O. O. Stoland** und **C. R. Buikstra**, *Beobachtungen über die Wirkungen von Leberextrakten bei durch Guanidinverbindungen erzeugter Blutdrucksteigerung*. (Vgl. MAJOR u. STEPHENSON, Bull. Johns Hopkins Hospital **35**. 186; C. 1925. I. 2095. MAJOR u. BUIKSTRA, S. 1674.) Die Herabsetzung dieser Blutdrucksteigerung durch Leberextrakt wird in weiteren Verss. bestätigt. Die Wirksamkeit scheint nicht auf Gehalt an Cholin oder Histamin oder Pepton zu beruhen. Die beiden ersten konnten in den Extrakten nicht nachgewiesen werden, auch blieb die Wirksamkeit nach wiederholtem Ausschütteln mit Amylalkohol in alkal. Lsg. wie auch nach Behandlung mit Bleiessig, durch welche Behandlungen Histamin ganz oder größtenteils beseitigt werden müßte, unverändert. Die Ggw. von Pepton ist nach der Bereitungsweise eines Teiles der Extrakte unwahrscheinlich, bei anderen blieb die Wrkg. auch nach Entfernung der zunächst erhaltenen Peptone mit absol. A. erhalten. Auch fehlte bei den Versuchstieren der nach intravenösen Peptoninjektionen zu erwartende Shock. (Bull. Johns Hopkins Hospital **38**. 112—23. Kansas City [Kansas], Univ. of Kansas school of med.) SPIEGEL.

Arthur D. Hirschfelder und **Charles Cervenka**, *Die Wirkung von Chinidin auf die Leitung im Vorhof und auf die Erregbarkeit im Herzen der Sumpfschildkröte*. Chinidin hemmt die Erregbarkeit stärker als die Reizleitung der Herzvorhöfe. (Dieser experimentell belegte Satz ist für die Theorie der Chinidinwrkg. beim Flimmern von Bedeutung.) (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 311—12; Ber. ges. Physiol. **32**. 679. 1925. Minneapolis, Dep. of pharmacol., univ. of Minnesota. Ref. ROTHBERGER.) OP.

Fr. Warmoes, *Die Gifte des lokalen oder metasympathischen Nervensystems des Darms*. Betrachtung der Giftwrkg. von Adrenalin, Atropin, Eserin, Nicotin, BaCl_2 , Cocain u. der elektr. Reizung veranlaßt Vf., ein besonderes, lokales = „metasympath.“ Nervensystem des Darms u. anderer Organe anzunehmen, weil die Erscheinungen, besonders nach gleichzeitiger Einw. verschiedener Gifte nicht in Einklang zu bringen sind mit der Annahme einer Wrkg. der Gifte auf sympath. bzw. parasympath. Nervenenden. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie **30**. 171—227; Ber. ges. Physiol. **32**. 681. 1925. Ref. WACHHOLDER.) OPPENHEIMER.

L. Lendle, *Untersuchungen über den pharmakodynamischen Grenzwert des Curarin*. Grenzwert für die Nervenendigungen von Rana temporaria von Curarin (BOEHM) = $5 \cdot 10^{-7}$. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **107**. 155—61. Kiel, pharmakol. Inst.) OPP.

A. P. Dustin, *Die differenzierten Empfindlichkeiten gegenüber Giften, die den Zellkern zerstören, bei der weißen Maus*. Besprechung der histolog. Veränderungen, die *Tryp-
flavin* an der n. u. Tumor tragenden Maus verursacht. (C. r. soc. de biologie **93**. 1535
bis 37. 1925. Brüssel.)

OPPENHEIMER.

F. Pharmazie. Desinfektion.

A. Schamelhout, *Löslichkeitsverhältnisse einiger Medikamente*. Vf. gibt die Zahlen
der im Amerikanischen Arzneibuch X behandelten Arzneistoffe an. (Journ. Pharm.
de Belgique **8**. 65—68. 83—85. 99—103.)

ROJAHN.

J. Bodnár und **Johann Ferenczy**, *Über die Zersetzlichkeit des Atropinsulfats*.
Aus Kahlbaumschem Atropinsulfat gewonnenes *Goldsalz* schmolz nicht bei 135—137°,
sondern schon bei 124°, ein aus Atropinsulfat „Chinoin“ erhaltenes bei 127°. Daß die
Differenz nicht auf Unreinheit des Atropins zurückzuführen war, konnte bewiesen
werden; sie konnte also nur von einer Zers. des Sulfats herrühren. Bei der Hydrolyse
des Atropins mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ u. HCl entstehen Tropin u. Tropasäure. Ersteres konnte
nur indirekt nachgewiesen werden durch Änderung des Pt-Gehaltes der Pt-Salze der
aus der mit NH_3 versetzten u. ausgeätherten Lsg. erhaltenen Basen. Das aus unge-
kochter Atropinsulfatlsg. isolierte Atropin gab ein Salz mit 19,20% Pt (Theorie 19,07%).
Dagegen war der Pt-Gehalt der aus eine Stde. im sd. Wasserbad erhitzten Atropinsulfat-
lsg. erhaltenen Salze 20,43 bezw. 20,99%. Da der Pt-Gehalt des Tropinplatinosalzes
28,43% beträgt, ist zu schließen, daß das aus den gekochten Lsgg. isolierte Atropin
Tropin enthält. Ferner wurden die nach dem Ausschütteln des Atropins verbleibenden
Lsgg. mit HCl angesäuert u. nochmals ausgeäthert. Die Ausschüttelung der gekochten
Lsgg. ließ nach dem Verdunsten des Ä. einen Rückstand, der mit *Tropasäure* keine
F.-Depression gab. Damit ist die Zers. wss. Atropinsulfatlsgg. beim Kochen in Tropin
u. Tropasäure erwiesen. Gehalt an freier H_2SO_4 änderte das Ergebnis auch zahlenmäßig
nicht. Atropinnitrat, -chlorid u. -phosphat zeigten dagegen beim Kochen ihrer Lsg.
keinerlei Hydrolyseerscheinungen. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **263**.
566—70. 1925. Debrecen, Budapest, Szeged, Univv.)

HARMS.

W. Unger, *Radix Belladonnae und Radix Sambuci Ebuli*. Im Hinblick auf eine
kürzlich vorgekommene Verwechslung der beiden äußerlich sehr ähnlichen Drogen
werden für beide Rhizome an Hand von Querschnittabbildungen detaillierte Be-
schreibungen gegeben. Ferner sind Abb. zweier Belladonnarhizome von knolligem
u. gestrecktem Charakter u. von Sambucusrhizom beigelegt. (Arch. der Pharm. u.
Ber. der Pharm. Ges. **263**. 606—11. 1925. Würzburg.)

HARMS.

L. Herboth, *Über den Einfluß der Natronlauge auf die Adsorption von arseniger
Säure durch Eisenzucker*. Die Adsorption von As_2O_3 durch Eisenzucker wird durch
 NaOH stark beeinflußt. Da mit zunehmendem Alter der Präparate die Adsorptions-
fähigkeit sich einer unteren Grenze nähert, dürfte die B. von Na_2CO_3 durch den CO_2 -
Gehalt der Luft zur Erklärung dienen. Durchleiten von CO_2 durch frische Eisenzucker-
lsgg. setzte die Adsorptionsfähigkeit von 19,8% (auf Fe berechnet) nach 1 Stde. auf
17,09 u. nach 12 Stdn. auf 15,7% herab. Auch Zusatz von HCl zur teilweisen Bindung
der im handelsüblichen Eisenzucker enthaltenen Natronlauge gemenge verringerte deutlich
die Adsorptionsfähigkeit. Diese ist für abgelagerten Eisenzucker am größten, wenn
der vom Arzneibuch gestattete NaOH -Gehalt (0,75%) um 0,5% überschritten wird.
An dieser Stelle liegt der Sättigungswert bei der Adsorption von As_2O_3 . Aus den graph.
dargestellten Verss. kann man schließen, daß die Na-Salze der arsenigen Säure besser
adsorbiert werden, als die Säure selbst. Die Alkalimengen, die zur B. von Mono- u.
Dinatriumarsenit führen, machen sich durch einen Knick in der Adsorptionskurve be-
merkbar. War der ursprüngliche Wert für die in % auf Fe berechnete As_2O_3 -Adsorption
12,57, so stieg dieser nach Zusatz von ca. 0,53% NaOH (auf Eisenzucker berechnet)

auf ca. 27%. Diese NaOH-Menge reichte zur B. von Na_2HAsO_3 aus. — Die Versuchsanordnung war die von MANNICH u. ROJAHN (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **262**. 238; C. **1924**. II. 1232) gewählte. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 181—86. Göttingen, Univ.)

HARMS.

Conrad Stich, *Steriles natives Hühnereiweiß in Ampullen*. Die Technik der Entnahme von sterilem Hühnereiweiß, das neuerdings von PAYR, Leipzig, versuchsweise ordiniert wird, aus frischem Hühnerei wird beschrieben. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **263**. 625—26. 1925. Leipzig.)

HARMS.

R. Guyot, *Durch Mikroben verursachte Veränderung von glukosehaltigen Serumampullen (Buttersäuregärung)*. Serumampullen mit 4,7% Glucose, die 20 Minuten im Autoklaven bei 105° sterilisiert waren, zeigten nach 1½ Monaten flockige Trübungen. Beim Öffnen erfolgte heftige Gasentw. (CO_2 u. H_2). In der Fl. war einwandfrei *Buttersäure* nachzuweisen. Die Zers. war durch den *Bacillus amylobacter* hervorgerufen. Da dieser anaerob ist, muß man annehmen, daß eine aerobe Schimmelpilzart den O_2 verzehrt hat, bevor sich die Bacillussporen entwickeln konnten. In einigen anderen Ampullen war nur der Schimmelpilz aufzufinden. Diese zeigten weder Säurebildung, noch Gasentw. — Es empfiehlt sich, glukosehaltiges Serum bei 115° im Autoklaven zu sterilisieren. (Bull. soc. pharm. Bordeaux **63**. 47—50. 1925.)

HARMS.

R. Guyot, *Schwefelwasserstoffgärung eines Calciumhypophosphitsirups*. Die Entw. von H_2S aus obigem Sirup dürfte auf einen CaSO_4 -Gehalt des Calciumhypophosphits zurückzuführen sein. Da sich dieses nicht völlig löste, wurde etwas freie H_3PO_4 zugesetzt. Nachdem Bakterien CaSO_4 zu CaS reduziert hatten, wurde durch die Säure H_2S entwickelt. (Bull. soc. pharm. Bordeaux **63**. 50—53. 1925.)

HARMS.

S. Rabow, *Übersicht der im Laufe des Jahres 1925 bekannt gewordenen therapeutischen Neuheiten einschließlich der Spezialitäten und Geheimmittel*. *Gitapurin*, weißes Pulver, W. l., mit den wirksamen Bestandteilen der Digitalisblätter. Intravenös injizierbar. — *Glandescol* (STICHELBERGER u. Co. A. G., Basel), Pepsin-Pankreaspräparat. Bei dyspeptischen u. diarrhoischen Erkrankungen. — *Halkajod* (Vertriebsgesellschaft f. Quellsalzprodukte, Bad Sulza [Thür.]), Speisesalz aus Solquelle von Bad Sulza. 0,5 KJ auf 100 kg NaCl zur Behandlung u. Verhütung des Kropfes. — *Histoplast* (LABOSCHIN A. G., Berlin NW), Salbenmull auf Zn-Kautschukpflaster mit einer Staphylokokkenvakzine. Bei Furunkulose, Hordeolum, Chalazaeon. — *Hormokutan*, früher *Hormokutin* (Hageda A. G., Berlin NW 21), Extrakte der Hypophyse, des Thymus u. Ovariums in Salbengrundlage. Einreibung gegen Rachitis. — *Hypertherman* (Sächs. Seruminstitut A. G., Dresden A.), Injektion zur Proteinkörpertherapie der Fettleibigkeit. — *Icterosan* (Chem. Fabrik vorm. E. SCHERING, Berlin N 39), Ampullen mit 10% Atophan u. 0,16% β -Eucain. Bei Icterus-, Leber- u. Gallenleiden. — *Idramint* (J. D. RIEDEL A. G., Berlin-Britz), Paraform-Mundtabletten. Bei Entzündung der Mund- u. Rachenhöhle. — *Introcid* („Nibrag“-Werk, Weschow bei Calau [N.-L.]), Cerium-Jodverb. zur intramuskulären u. intravenösen Injektion bei malignen Neubildungen, Puerperalsepsis usw. — *Irritren-Tabletten* (Chem. Fabrik Promonta, G. m. b. H., Hamburg 26), Yatren, S, Si, Ammon-phosphor. zur Reiztherapie. Bei chronisch-rheumatischen Muskel- u. Gelenkerkrankungen. — *Isatose* (KARL ENGELHARD, Fabrik pharmaz. Präparate, Frankfurt a. M.), Bouillonwürfel mit je 1 g Bromsalz. — *Jodcalcium-Diuretin* (KNOLL u. Co., Ludwigshafen a. Rh.), Tabletten mit 0,5 Ca-Diuretin u. 0,1 KJ. Bei Asthma, Angina pectoris. — *Jodgorgon* (W. KATHE A. G., Halle a. S.), Schilddrüsensubstanz. Bei Mixödem. — *Lactinium* (Byk-Guldenwerke, Chem. Fabrik A. G., Berlin NW 7), neutrales Al-Lactat in haltbarer fester Form; Adstringens u. Desinfiziers, wie essigsäure Tonerde. — *Linifect* (Dr. LABOSCHIN A. G., Berlin NW 21), Leinsamen mit Milchwuckelhülle, Abführmittel. — *Livonal*, 20%ig. alkoh. Lsg. von Benzylbenzoat. Bei Dysmenorrhoe u. Asthma. — *Neo-*

Livonal (Dr. NEUMANN u. Co., Chem. Fabrik Adlershof). — *Ludarin* (A. WOELM A. G., Fabrik chem.-pharm. Präparate, Spangenberg), Tabletten mit Veronal 0,3, Neuronal 0,3, Eukodal 0,008. Schlafmittel. — *Lunital* (Hygiea-Apotheke, Breslau), Tabletten mit Aponal, Dial, Phenacetin u. Baldrianextrakt. Sedativum u. Hypnoticum. — *Magnocid* (Chem. Fabrik E. MERCK), basisches Mg-Hypochlorit. W. unl., zur Wundbehandlung u. Händedesinfektion. In Tabletten u. Pastenform. — *Mercutin* (Chem. Fabrik vorm. E. SCHERING, Berlin), Mischung von Hg u. Talkum. Bei Lues u. zur Läusebehandlung. — *Neo-Bornyval* (J. D. RIEDEL A. G., Berlin), neuerdings an Stelle von Bornyval = Borneol-i-Valeriansäureester. Sedativum. — *Neo-Livonal* siehe Livonal. — *Neuracen* (W. KATHE, A. G., Halle a. S.), Hefepräparat in Tabletten, bei Stoffwechselkrankheiten, Anämie, Skrofulose usw. — *Nitroscleran* (TOSSE u. Co., Chem. Fabrik, Hamburg 22), NaCl 6, NaNO₂ 20, Na-Phosphat 3,6, K-Phosphat 2, W. ad 1000. Bei Hypertonie, Sklerose des Gefäßsystems zur Herabsetzung des Blutdrucks. — *Normacid* (Chem. Fabrik Dr. JACOB u. Co., Wiesenburg i. Sa.), Tabletten mit Na sulfur., Na bicarbon., Na phosphoric. Bei Magenbeschwerden, Superacidität u. Verstopfung, Ulcus ventriculi u. duodeni. — *Novogosan* (ELERT u. Co., G. m. b. H., Berlin SW 61), Gelatine kapseln mit Kawa-Kawa (20%), gel. in Anethol u. Terpenen. Antigonorrhoeum. — *Ocenta* (Chem. Fabrik Promonta, Hamburg 26), Hypophysenextrakt nebst Eiweiß, Kalk, P u. Fe. Lactagogum. — *Orinol* (Orinol Gesellschaft m. b. H., Bonn), kolloidales Cu-Silicat mit 0,1% Cu. In Lsg. u. Salben, äußerlich anzuwenden gegen Katarrh der Luftwege, Schnupfen usw. — *Oxan* (Farbenfabriken vorm. FRIEDR. BAYER u. Co., Leverkusen a. Rh.), Aspirinschnupfpulver. — *Oxykur* (WAGEMANN, Bückeburg), Tabletten mit Na-Silicat u. CaCl₂. Anthelminticum. — *Phlogetan* (C. A. F. KAHLBAUM, Berlin-Adlershof), 10%ig. Lsg. von Eiweißspaltprodd. Zur unspezifischen Reizkörpertherapie bei Tabes, Paralyse, Lues, Tuberkulose. — *Präphyson* (Chem. Fabrik PASSEK u. WOLF, G. m. b. H., Hamburg 26), Präparat aus der Pars ant. der Hypophysis cerebri. Gegen Fallsucht, Dystrophia adiposo-genitalis, Infantismus. — *Röntyum* (C. A. F. KAHLBAUM, Berlin-Adlershof), Ba-Kontrastmittel für die Durchleuchtung des Magendarmkanals. — *Ruscinol* (Hirschapotheke, Frankfurt a. M.), alkoh. Auszug von Ol. Rusci. Bei Hautkrankheiten. — *Salgyran* (Farbenfabriken vorm. MEISTER LUCIUS u. BRÜNING, Höchst a. M.), 10%ig. sterile Lsg. einer Hg-Verb. des salicylamido-essigsäuren Na. Antilueticum u. Diureticum. — *Sanocrysin*, Na-Salz der Aurithioschwefelsäure Au(S₂O₃)₂Na₃, gegen Tuberkulose. — *Santal* (Medipharma G. m. b. H., Berlin, Rosenthalerstr. 61), Santal-Methylenblaukapseln. Gegen Gonorrhoe, Cystitis, Pyelitis. — *Septajod* (Chem. Fabrik Dr. JOACHIM WIERNIK, Berlin), J-Lsg. mit angeblich 10-fachem Gehalt an J-Salzen. Bei sept. Puerperalkrankheiten, Encephalitis lethargica. — *Somnolin* (Chem. Fabrik JOH. A. WÜLFING, Berlin), Kombination von Chloralhydrat mit Acetyl-p-Amidophenol. Beruhigungs- u. Schlafmittel bei Schmerzen (Ischias, Migräne). — *Spirocid* (Farbenfabriken vorm. MEISTER LUCIUS u. BRÜNING, Höchst a. M.), identisch mit Stovarsol, Oxymethylaminophenylarsensäure. Bei Syphilis, auch als Prophylacticum, Trypanosomiasis usw. — *Subtonin* (Sanabo-Chinoïn-Fabrik, Wien), Kombination von Kalk u. Hormonen zur Herabsetzung des Blutdruckes. — *Ther-nulsin* (Embrocato, Fabrik pharm. Präp. G. m. b. H., Wilmersdorf), Ol. terebinthin. an Gallerte gebunden. Zu Einreibungen. — *Thiosept* (Tiroler Ölwerke - G. m. b. H., Reuth i. Tirol), aus Tiroler Ölschiefer gewonnenes S-hal-tiges Prod. Bei Fluor albus. — *Ulcusin* (Fabr. pharm. Präp. KARL ENGELHARD, Frankfurt a. M.), Kapseln mit kolloid. Ag-Salz 0,05, Extr. Belladon. 0,015 i. Na phosphor. Bei Ulcus ventriculi. — *Vistosan* (Troponwerke DINKLAGE u. Co., Köln-Mülheim), Milchproteinpräparat zur unspezif. Reiztherapie für Augen-

heilkunde. I. enthält je Ampulle 0,0006 Strychnin, bei Bindehautentzündung, Cornea, Nerv. optic. usw. II. mit Zusatz von 0,0035 Strychnin-kakodylic. Bei Iritis, Glaskörpertrübung, Sehnervenatrophie usw. (Chem.-Ztg. 50. 127—28. 137—38. 149 bis 150.)

ROJAHN.

A. Schamelhout, *Die Wachspasten, Salben und Pomaden des amerikanischen Arzneibuches X.* Vf. bespricht die Zus. obiger Zubereitungen. (Journ. Pharm. de Belgique 8. 115—17.)

ROJAHN.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, *Adsorptionsverbindung aus Paraffinkohlenwasserstoffen und Getreidemehl*. Die Rohstoffe werden unter Zusatz von W. erwärmt u. die Mischungen bei mäßiger Hitze getrocknet. Die therapeut. Verwendung der Paraffinkohlenwasserstoffe wird durch das Verf. wesentlich erleichtert. (**Schwz. P. 107 093** vom 20/9. 1923, ausg. 16/10. 1924.)

KÜHLING.

Ludwig Lange, Göttingen, *Herstellung eines äußerst feinen Metallpulvers aus Metallegierungen zur Amalgambereitung, besonders für zahnärztliche Zwecke*, dad. gek., daß die dünnen, gemäß Patent 369 356 aus der Legierung hergestellten Folien nochmals zum Zwecke der Vergrößerung der Oberfläche u. zur Verringerung der Tiefe der einzelnen Metallteilchen zu einem feinen Pulver zermahlen werden. — Die Legierungen erhärten sehr schnell. (**D. R. P. 424 751** Kl. 30h vom 3/8. 1924, ausg. 29/1. 1926. **Zus. zu D. R. P. 369 356; C. 1923. II. 888.**)

KÜHLING.

Georg Simon's Chemische Fabrik & Exportgeschäft, Berlin, *Herstellung von Präparaten für Inhalationszwecke*, dad. gek., daß man geeignete Rinden mit organ. Lösungsmm. auslaugt, das Lösungsm. verdampft, den Rückstand mit Aceton aufnimmt u. aus der filtrierten Lsg. das Aceton durch Abdest. entfernt. — Das Verf. dient z. B. zum Ausziehen von Eichenrinde mittels A. (**D. R. P. 424 749** Kl. 30 h vom 21/5. 1924, ausg. 29/1. 1926.)

KÜHLING.

H. Grevé, Langelsheim a. Harz, *Diagnostikum für bösartige Geschwülste und andere Krankheiten u. dgl.*, bestehend aus einem Gemisch von zweckmäßig in einem Lösungsm., wie A., gel. gesätt. höheren Fettsäuren mit einer Kochsalzlg. — Das Serum des an bösartigen Geschwülsten u. dgl. Erkrankten gibt mit dem Mittel eine Ausflockung feiner bis größerer Teilchen. (**D. R. P. 424 845** Kl. 30 h vom 30/8. 1924, ausg. 2/2. 1926.)

KÜHLING.

Stephan Döring, Frankfurt a. M., *Träger für Sondernähr- und Heilmittel*. Die Nähr- oder Heilmittel werden in einem Stoff verteilt oder in diesem aufgesaugt, der im Verdauungskanal nicht verändert wird. Geeignete Stoffe sind Kleie, Holzkörner, Kugeln aus Filtermasse, Holzkohle, Zement u. dgl. Das Verf. bietet den Vorteil, daß die Nähr- u. Heilmittel allmählich aufgenommen werden. (**Schwz. P. 111 663** vom 19/10. 1923, ausg. 1/9. 1925. D. Prior. 20/10. 1922.)

KÜHLING.

Allan Kilpatrick, übert. von: **John H. Harrington**, Quebec, Kanada, *Desinfektionsmittel*, bestehend aus mit geglühtem CaSO_4 gemischtem u. zu Täfelchen geformtem $\text{Ca}(\text{OCl})_2$. (**Can. P. 249 929** vom 11/5. 1923, ausg. 19/5. 1925.)

KÜHLING.

Elias Auerbach, Montreal, Kanada, *Desinfektionsmittel*, bestehend aus CaSO_4 , C_{10}H_8 , kleinen Mengen Eucalyptusöl, Farbstoff u. W. (**Can. P. 251 041** vom 18/11. 1924, ausg. 30/6. 1925.)

KÜHLING.

G. Analyse. Laboratorium.

Henri Dackweiler, *Die Rolle des Wassers in der analytischen Chemie. Neue Anschauungen über die Hydrolyse*. Vf. bespricht die neueren Anschauungen über die elektrol. Dissoziation u. die Hydrolyse. (Journ. Pharm. de Belgique 8. 33—37.)

ROJ.

I. M. Kolthoff, *Die Reaktion von neutralem und destilliertem Wasser*. (Biochem. Ztschr. 168. 110—21. — C. 1926. I. 2023.)

LASCH.

G. Giemsa, *Über ein bewährtes, mit Dampf von etwa 120° beheiztes Wasserbad*. Vff. beschreibt ein in den Laboratorien des tropenhygien. Instituts Hamburg verwendetes Wasserbad, das von einem zentralen Kessel mittels einer Heizschlange geheizt wird (Herst.: F. u. M. LAUTENSCHLÄGER, Berlin N 39, Chausseestr. 92). Es kann auch als Heißluftbad verwendet werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 283. Hamburg.) JUNG.

Geo. F. Taylor, *Ein kleines Widerstandsthermometer*. Vff. beschreibt ein Thermometer, bei dem ein Pb-Draht von 1,5 cm Länge u. $2 \cdot 10^{-3}$ mm Durchmesser in einem $4 \cdot 10^{-5}$ mm dicken Glasröhrchen angeordnet ist; Draht + Glasröhrchen sind in Letternmetall eingebettet, derart, daß letzteres mit dem einen Drahtende Kontakt macht. Über die Herst. des feinen Metalldrahtes vgl. TAYLOR (Physical Review [2] 23. 655; C. 1924. II. 818.) Für den Ausdehnungskoeffizienten von Letternmetall (Pb 85%, Sb 12%, Sn 3%) wurde gefunden, daß er 0,864 desjenigen von Pb zwischen 0—100° ist, oder $25,23 \cdot 10^{-6}$ pro Grad. Von dem oben beschriebenen Widerstandsthermometer lassen sich eine ganze Reihe unter sich gleiche herstellen u. zwar mit einem derartigen Widerstand, daß 1 Ohm mit 1° äquivalent ist. (Physical Review [2] 26. 841—50. 1925. Washington, Bureau of Plant Ind.) K. WOLF.

Heinrich Menzel und **Franz Krüger**, *Notizen zur Methodik elektrometrischer pH-Bestimmungen*. Einige Bemerkungen über Meßdraht u. Capillarelektrometer, wie sie beim Kompensationsverf. verwandt werden, u. Beschreibung eines kleinen Elektrodengefäßes für geringe Lösungsmengen (1,5 ccm), zwecks Anwendung als Ersatz von Tauchelektroden, welche zur Verfolgung der pH-Änderung eines gerührten Bades während elektrolyt. Prozesse, nicht geeignet sind. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 93—97. Dresden, Techn. Hochsch.) ULMANN.

Carl Hesse, *Zeitgemäße Zentrifugal-Luftpumpe für direkten elektrischen Antrieb*. Die Luftpumpe hat ein beiderseits offenes Schaufelrad u. besitzt keine Ventile u. Schieber. (Chem.-Ztg. 50. 157. Chemnitz.) JUNG.

G. W. C. Kaye, *Eine verbesserte Ganzmetall-Quecksilber-Vakuumpumpe*. Genaue Beschreibung der Pumpe an Hand einer Skizze. Angabe der Wirkungsweise u. Wirksamkeit. Sehr eingehend wird ein Mikrometer-Nadelventil beschrieben, das zur genauen Regulierung des Vakuums dienen soll. (Philos. Magazine [7] 1. 349 bis 353.) HAASE.

Guy Barr, *Das Luftblasenviscosimeter*. Die Messung der Viscosität mit Hilfe des Luftblasen-Viscosimeters besteht in der Messung der Geschwindigkeit, mit der eine Luftblase von bestimmter Größe in einem senkrechten Rohr von bestimmtem Durchmesser aufsteigt. Aus zahlreichen Verss. an W. u. Glycerin, sowie an einer Reihe verschieden schwerer Öle, wurde festgestellt, daß diese Art von Viscosimeter sich nur zur vergleichsmäßigen Best. gleichartiger Substanzen eignet, da das Aufsteigen in hohem Maße von der Oberflächenspannung abhängig ist. (Philos. Magazine [7] 1. 395—405.) HAASE.

A. Mittasch und **E. Kuss**, *Vorsicht beim Arbeiten mit Kältebädern*. Im Anschluß an die Mitteilung von BILTZ (S. 981) beschreiben Vff. zwei ähnliche Fälle, bei denen Äthylen u. Eisencarbonyl durch Springen des Kondensationsgefäßes mit fl. Luft in Berührung kamen. In vielen Fällen sind gekühlte Al-Blöcke (vgl. STOCK, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 751; C. 1920. IV. 157) zu empfehlen. Die Verwendung mit fl. Luft gekühlter akt. Kohle zur Herst. von Vakuum ist nicht unbedenklich; Vff. schlagen akt. SiO_2 vor. Zur Herst. von Badfl. bewährte sich ein Cu-Becher, der in ein Metalldewar-gefäß eingehängt war. (Chem.-Ztg. 50. 125. Ludwigshafen-Oppau.) JUNG.

Camille Matignon und **G. Marchal**, *Radioaktive Messungen*. Vff. beschreiben die in der Radioaktivität hauptsächlich üblichen Meßmethoden, und zwar behandeln sie die Ionisationsmethoden, die auf die Wrkg. der von den zu untersuchenden radioakt. Substanzen ausgesandten α - u. γ -Strahlen u. der von diesen Stoffen entwickelten Emanation beruhen. Bei der Beschreibung der Emanationsmessungen werden auch

die gebräuchlichsten Verff. angegeben, radioakt. Mineralien in Lsgg. zu bringen, die die Emanation gut abgeben und so genaue Messungen ermöglichen. (Chimie et Industrie **14**. 503—10. 1925.)

PHILIPP.

François Béhounek, *Über eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung der in der Atmosphäre enthaltenen Radiumemanation*. (Vgl. Journ. de Physique et le Radium [6] **4**. 77; C. **1923**. III. 108.) Vf. beschreibt an Hand einer Skizze die zur Radonbest. erforderliche Vorrichtung. Hierbei wird die große Löslichkeit der Radiumemanation in CS_2 bei tiefen Temp. benutzt. Die Absorption erfolgt bei -80° (Gemisch von fester $\text{CO}_2 + \text{Ä.}$). Die prakt. ausgeführten Messungen zeigen, daß die Methode Resultate mit 3% Genauigkeit liefert. Der Verbrauch an CS_2 ist gering, da bei -80° nur wenig verdampft. Die Extraktion erfordert nicht mehr als 8 Min. Eine Erneuerung der festen CO_2 während der ganzen Zirkulationsdauer ist nicht erforderlich. Der App. arbeitet automat. (Journ. de Physique et le Radium [6] **6**. 397—400. 1925.)

K. WOLF.

Jasper B. O'Sullivan, *Die Anwendung der Chinhydronelektrode auf die Messung der pH -Werte in Lösungen, die Kupfer- und andere divalente Ionen enthalten*. Die Chinhydronelektrode kann in vielen Fällen angewandt werden, in denen die übliche H_2 -Elektrode wegen ihrer großen Reduktionswrkg. versagt. Die Anwendung beschränkt sich nicht auf Cu-Salze, sondern diese Elektrode ist auch bei neutralen oder schwach sauren Salzlsgg. solcher Metalle wie Sn, Pb u. Ni anwendbar. So ist das Potential einer Pb-Elektrode in einer $1/10$ -n. Lsg. an Pb-Ionen u. $1/1000$ -n. an H_2 -Ionen $-0,149$ V, bei einer H_2 -Elektrode $-0,174$ Volt. Auch die Chinhydronelektrode ist in ihrem Anwendungsbereich durch ihre Reduktionswrkg. beschränkt. So kann sie auch nicht in schwach sauren Hg-, Ag- u. Au-Lsgg. verwandt werden, die ein normales Elektrodenpotential von mehr als 0,7 V haben. (Trans. Faraday Soc. **21**. 319—25. 1925. Sir John Cass Techn. Inst.)

WILKE.

A. C. Andersen und **B. Norman Jensen**, *Zur Bestimmung des Stickstoffs nach Kjeldahl*. Die Fehlerquellen bei der Best. des N_2 nach KJELDAHL werden untersucht u. zuverlässige Arbeitsvorschriften gegeben. Die meisten Fehlerquellen liegen in dem Zerstörungsprozeß der organ. Substanz, die übrigen in der Dest. des gebildeten NH_3 . — 1. Dest. u. Titration. Das als Kontaksubstanz benutzte Hg wird zweckmäßig mit Na_2S abgeschieden; um ein Überdest. von S-Verbb. zu vermeiden, wird bei Beginn des Siedens CuSO_4 -Lsg. zugegeben. Der Dest.-Kolben soll ein 1 l Jenaer Rundkolben mit flachem Boden sein u. auf einer mit kreisrundem Ausschnitt versehenen Asbestplatte direkt erhitzt werden. Der Kolbeninhalt soll ca. 350 ccm betragen, 125—135 ccm davon sind überzudestillieren, wofür meist 8 Min. genügen. Die zum Titrieren benutzte Natronlauge muß kohlensäure- u. nitritfrei sein. — 2. Zur Zerstörung der organ. Substanz werden am besten auf 20 ccm konz. H_2SO_4 10 g K_2SO_4 , 1 g krystallisiertes $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ u. 0,75 g HgSO_4 verwendet. Das Kochen ist 2—4 Stdn. fortzusetzen, nachdem die Fl. klar geworden ist. Wenn die zu untersuchenden Körper größere Mengen Chlorid enthalten, setzt man HgSO_4 erst nach Entfernung der HCl durch Kochen zu. Zur Vermeidung von Siedeverzug beim Kochen der H_2SO_4 wird in besonderer Weise präparierter Graphit zugesetzt. — Verss. über die Vollständigkeit der NH_3 -B. wurden an einer Reihe organ. Körper vorgenommen. (Ztschr. f. anal. Ch. **67**. 427—48. Kopenhagen, Landwirtschaftl. Vers.-Station.) R. SCH.

Elemente und anorganische Verbindungen.

Marcel Lemire, *Analyse trockner Natriumhydrosulfite*. Die durch Red. mittels Zn u. mittels HCOOH erhaltenen Prodd. sind miteinander ihrem Gehalt u. der Beständigkeit beim Liegen an der Luft u. in wss. Lsg. nach verglichen. Die Analyse mittels CuSO_4 , Indigo, J_2 u. Ferricyankalium wird besprochen. Die beiden letztgenannten sind die genauesten. Die Analyse mittels Ferricyankalium ist dazu einfach


u. rasch, die mittels J_2 eignet sich besonders für Formaldehydhydrosulfite. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 248—49. 281—82.) SÜVERN.

Cyrus H. Fiske und Yellapragada Subbarow, *Die colorimetrische Bestimmung des Phosphors*. Kritik der Methode von BELL u. DOISY u. der Modifikationen von BRIGGS (Journ. Biol. Chem. 53. 13; C. 1922. IV. 739). Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn als Reduktionsmittel statt Hydrochinon 1,2,4-Aminonaphtholsulfosäure benutzt wird. Genaue Beschreibung des Verf. u. der anzuwendenden Lsgg. Vorschriften für Best. des anorgan. Phosphats in Harn u. Blut, wie auch des Gesamtphosphats u. Bemerkungen für andere Anwendungen werden gegeben. (Journ. Biol. Chem. 66. 375—400. 1925. Boston, HARVARD med. school.) SPIEGEL.

Gunner Jörgensen, *Die Bestimmung der Phosphorsäure als Magnesiumammoniumphosphat*. (Analyst 51. 61—72. — C. 1925. II. 1074.) RÜHLE.

K. Zwicknagl, *Beiträge zur Kenntnis und Verwertung der Bettendorfschen Reaktion*. Die günstigsten Bedingungen für das Zustandekommen der Bettendorfschen Rk. sind konz. salzsaure Lsg., Überschuß von $SnCl_2$ u. Erwärmen, was Vf. durch zahlreiche Verss. belegt. Die Rk. wird auch erhalten beim Lösen von H_3AsO_4 in HCl u. Zugabe von $SnCl_2$, nur tritt sie hier etwas langsamer ein. Für die bei äquivalenten Substanzmengen entwickelte Wärmemenge findet Vf. 42 000 cal., welcher Wert bei Verdünnung abnimmt. — Der bei der Fällung des As aus einer Lsg. von As_2O_3 in reiner HCl erhaltene Nd. stellt ein schwarzes, schweres Pulver dar, l. in HNO_3 u. beim Erwärmen in konz. H_2SO_4 . Analyse ergab 98,18% As u. 1,85% Sn. An Luft oxydiert sich die $AsSn$ -Verb. bis zu 24% Gewichtszunahme, mkr. sind danach kleine Oktaeder (As_2O_3) u. amorphes Pulver unterscheidbar. Analyse ergab 79,48% As_2O_3 , 19,13% As u. 11,45% Sn. — Der bei Fällung des As aus roher techn. HCl erhaltene Nd. zeigte die Zus. von 94,34% As, 2,25% Sn u. 3,23% Se; nach Oxydation an der Luft (Gewichtszunahme ca. 15%) 53,65% As_2O_3 , 41,40% As, 2,00% Sn u. 2,86% Se. — Die Unters. von mit $SnCl_2$ behandelter As-haltiger HCl erwies ihre Reinheit u. Benutzbarkeit für forens. Zwecke. — Quantitativ ist die Bettendorfsche Rk. zur Trennung von As u. Sb in stark salzsaurer Lsg. anwendbar, Ggw. von Se, Au u. Hg stören natürlich. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151. 41—52. Preßburg u. Saubersdorf, Lab. der Dynamit Nobel A.-G.) ULMANN.

B. Ormont, *Die iodometrische Bestimmung der Arsensäure*. Anstatt das durch die oxydierende Wrkg. der Arsensäure aus HJ ausgeschiedene J_2 mit Thiosulfat zu titrieren (vgl. ROSENTHALER, Ztschr. f. anal. Ch. 45. 596 [1906]), entfernt Vf. das J_2 durch Erwärmen u. Durchleiten eines aus Oxalsäure u. H_2SO_4 entwickelten Gasstromes von CO u. CO_2 durch die Lsg. u. bestimmt das entstandene As_2O_3 durch Titration mit J_2 . Das Reaktionsschema ist:



Durch Entfernung des J_2 wird die Umkehrbarkeit der Rk. ausgeschlossen, während dies bei dem gebräuchlichen Verf. bei unzureichender Säurekonz. nicht der Fall ist. Die günstigste H_2SO_4 -Konz. ist 15—20%, bei der fast völlige Entfärbung der Lsg. durch den Gasstrom in 20—30 Min. erreicht wird, wenn die Temp. 85—95° beträgt. Bei höherer Säurekonz. wird AsJ_3 beim Sieden J_2 ausgeschieden. Ebenso ist ein Überschuß an KJ zu vermeiden, wegen der Oxydationsmöglichkeit durch die H_2SO_4 , wodurch das Austreiben des J_2 mehr Zeit erfordern würde. Da die völlige Entfernung des J_2 durch den Gasstrom nicht erreicht wird, gibt man zuletzt aus einer Bürette etwas $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{30}$ -n. Na_2SO_3 -Lsg. zu. Nach völliger Entfärbung werden 1 bis 2 Tropfen Phenolphthalein u. soviel gesätt. NaOH-Lsg. zugegeben, daß schwache rosa Färbung eintritt, worauf mit 1—2 Tropfen H_2SO_4 (1:3) wieder entfärbt wird. Zu der abgekühlten Lsg. wird $NaHCO_3$ -Lsg. gegeben u. die arsenige Säure mit J_2 titriert. — An Stelle von H_2SO_4 kann auch HCl benutzt werden, am besten soviel, daß die Fl. beständig 10—12% enthält. — Die Methode gestattet die Best. von Ar-

senit- u. Arsenation nebeneinander, indem zunächst in einem Teil der Lsg. das Arsenat in Arsenit übergeführt u. das Gesamt-Arsenit durch Titration bestimmt, während in einem anderen Teil der Lsg. das anfänglich vorhandene Arsenit direkt titriert wird. — Dieses Titrationsprinzip ist fast für alle Bestst. brauchbar, die nach dem Schema: $O + 2 HJ = H_2O + J_2$ verlaufen. (Ztschr. f. anal. Ch. **67**. 417—26. Kiew, Polytechn. Inst.)

R. SCHMIDT.

Ludwig Moser und **Franz Hanika**, *Die Absorption von Kohlenoxyd durch Lösungen von Kupfer-(1)-chlorid*. Die Absorption von CO durch CuCl wurde in HCl- u. NH₃-Lsgg. bei 20° untersucht. Die beiden Systeme: CuCl-HCl-H₂O u. CuCl-NH₃-H₂O wurden mit Hilfe des Roozeboomschen Dreiecks graph. dargestellt u. durch die erhaltenen Absorptionskurven die für die Absorption des CO günstigste Zus. der Lsgg. ermittelt. Für die HCl-Lsg. ist das Optimum in Gewichtsteilen: 16—18 CuCl, 24—27 HCl (D. 1,19) 55—60 H₂O u. 0,2—0,3 g SnCl₂; der Zusatz von SnCl₂ wirkt beschleunigend. — Die Unters. des Systems CuCl-NH₃-H₂O ergab dessen Überlegenheit über die HCl-Lsg. Während zur Absorption von 30 ccm CO in HCl-Lsg. 16 Gew.-Teile CuCl nötig sind, erfordert die ammoniakal. Lsg. nur 11 Gew.-Teile. Die günstigste Zus. der Lsg. ist in Gew.-Teilen: 11—12 CuCl, 13—14 NH₃ u. 74—76 H₂O. (Ztschr. f. anal. Ch. **67**. 448—56. Wien, Techn. Hochschule.)

R. SCHMIDT.

P. Schuftan, *Bestimmung von Kohlenoxyd in Wasserstoff*. Man kann CO in O₂-freiem H₂ bis zu einem Gehalt von 10% durch Messen der Kontraktion beim Überleiten über einen auf 200—300° erhitzten Ni-Al₂O₃-Katalysator rascher u. mit dreifacher Genauigkeit bestimmen, als mit den üblichen Verff. Vf. beschreibt die Herst. des Katalysators. Bei höheren Tempp. oder höheren CO-Gehalten tritt störende B. von CO₂ ein. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 276—78. Hölriegelskreuth b. München.)

JUNG.

L. Le Boucher, *Über die quantitative Bestimmung des Kaliums als Kobaltinitrit*. Die quantitative Best. des Kaliums als Kobaltinitrit ist von verschiedenen Autoren als zweifelhaft hingestellt worden. Vf. prüft auf Grund eigener Erfahrungen die Bedingungen, unter denen eine absol. sichere Best. des K nach dieser Methode möglich ist. Von großer Wichtigkeit ist eine tropfenweise Zugabe des Reagens u. ein intensives Rühren der gesamten Flüssigkeitsmenge. Nach dem Ausfällen wird im Goochtiegel filtriert u. mit W., das mit Essigsäure angesäuert ist, gewaschen. Mit 95° warmem A. u. schließlich im Ofen bei 100—110° wird getrocknet. Der Fehler der Best. ist kleiner als 1%. Die Analyse des Nd. ergibt eine Zus. gemäß der Formel NaK₂Co(NO₂)₆·H₂O, falls er unter den vom Autor fixierten Bedingungen gefällt ist. Die Methode kann direkt zur Trennung des K vom Na verwandt werden, wenn dieses die K-Konz. nicht um mehr als das 15-fache übersteigt. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **23**. 540—50. 1925. Sevilla.)

HANTKE.

R. Guérin, *Analyse des Handels-Magnesiums*. Bericht über das von der „Commission de standardisation des métaux et alliages légers“ angenommene Unters.-Verf. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] **8**. 34—40.)

JUNG.

A. Lassieur, *Über das Mitreißen des Magnesiums durch das Aluminium*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 117; C. **1925**. II. 2010.) Die Trennung des Al vom Mg geht ohne Schwierigkeiten quantitativ ohne einen Überschuß an Ammonsalzen, wenn nur dafür gesorgt wird, daß der Überschuß an NH₄OH nicht zu stark wird. Am besten wird in einer Lsg. der pH = 7, entsprechend dem Blauumschlag von Bromthymolblau gearbeitet. Wird ein Überschuß an NH₄OH zum Fällen des Al verwandt, so muß Ammonsalz in beträchtlichen Mengen zugesetzt werden (10 g NH₄NO₃). (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 384—86.)

ENSZLIN.

E. Dittler, *Zur Ermittlung des Chroms in Chromeisenstein*. Ein Vergleich der Titration mit Permanganat u. der mit Thiosulfat an 19 Chromitproben (Analysen ausgeführt mit **K. Benesch**; Tabelle im Original) ergab, daß der mit der alten Fresenius'schen Zahl 0,3109 multiplizierte Fe-Titer die beste Übereinstimmung gibt. Für die

Analyse von *Chrom Eisenstein* ist mit dem theoret. Faktor 0,3105 oder mit 0,3109 zu arbeiten, wenn der Gehalt an Cr_2O_3 nicht mehr als 60—65% beträgt. In völliger Übereinstimmung damit ist eine Äußerung von FRANKE, Wien. Für Schiedsanalysen ist ausschließlich das jodometr. Verf. zu empfehlen. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 279. Wien, Univ.)

JUNG.

Organische Substanzen.

G. Chabot, *Volumetrische Bestimmung des Äthylalkohols*. Vf. oxydiert mit *Bichromat-Schwefelsäure* bei 80° u. titriert den nicht verbrauchten Überschuß an CrO_3 jodometr. Es werden Vorschriften zur Bereitung der Reagentien u. Maßflüssigkeiten gegeben. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die H_2SO_4 erst im Augenblick des Beginns einer Best. zur wss. Lsg. von $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ zu geben. Für verschiedene alkoh. Fl. (*Biere* u. dgl.) sind Beispiele gegeben, wie man prakt. in den einzelnen Fällen zu verfahren hat. Die Resultate sind durchweg sehr befriedigend. (Bull. Soc. Chim. Belgique **34**. 328—37. 1925. Gent, Gärungs-Institut.)

HORST.

Clive Newcomb, *Die Bestimmung von Alkohol und Äthylchlorid in Chloroform*. Vf. erörtert die Entfernung einiger Verunreinigungen aus Chlf. Alle Verss. wurden bei 27°, der Temp. des Laboratoriums, ausgeführt. W. entfernt man durch Behandeln des Chlf. mit trockenem K_2CO_3 , A. durch Waschen mit W., wodurch $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ nur zum Teil entfernt wird. Zur Best. der D. des Chlf. wurde die Westphalsche Wage benutzt; der Grad der Änderungen der D. mit der Temp. u. dem Wassergehalte wird festgestellt. Der Unterschied der D. vor u. nach dem Waschen des Chlf. gibt ein Maß für den Gehalt an A. u. der Unterschied der D. zwischen dem gewaschenen Chlf. u. reinem, mit W. gesätt. Chlf. ein Maß für den Gehalt an $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$. Aceton wurde in keinem der untersuchten Chlf. des Handels gefunden. Entfernen läßt es sich, wenn vorhanden, auch durch Waschen mit W., aber nicht so schnell wie A. Äthylcarbonat wird durch Waschen nicht entfernt, ebenso wenig CCl_4 . Die Einw. des Gehaltes an A. u. an $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ auf die D. des Chlf. wird festgestellt. Das ganze $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ wird unter gewissen Bedingungen durch Kochen des Chlf. mit KOH entfernt. Die D. reinen, trockenen Chlf. ist bei 0° nach THORPE (Journ. Soc. Chem. Ind. **1880**. 196) 1,52637 u. nach TIMMERMANN (C. r. d. l'Acad. des sciences **174**. 365; C. **1922**. II. 725) 1,52635. Daraus berechnet sich nach THORPE (l. c.) die D.²⁷ zu 1,4752 u. für feuchtes Chlf D.²⁷ zu 1,4747; diesen Wert benutzt Vf. für Chlf., feucht bei 27°. An einem Beispiele zeigt Vf. die prakt. Anwendung des Verf. (Analyst **51**. 19—30. Madras.)

RÜHLE.

F. Mach und **F. Sindlinger**, *Die Bestimmung des Nicotins nach Ulex*. Vff. decken als Fehlerquellen bei der Best. des Nicotins nach ULEX (Chem.-Ztg. **35**. 121. [1911]) auf: 1. Die Ungenauigkeit der Titration großer Voll., insbesondere bei Anwendung von Lackmus, 2. Nicotinverluste, 3. die Mitbest. von NH_3 , das teils ursprünglich vorhanden und teils bei der Dest. des Nicotins entsteht. Sie raten zu grundsätzlicher Ablehnung dieses Verf. (Ztschr. f. anal. Ch. **67**. 369—84. 1926.)

HEIM.

L. van Itallie und **A. J. Steenhauer**, *Mikrochemische Reaktionen zur Erkennung von p-Oxyphenyläthylamin (Tyramin) und β -Imidazolyläthylamin (Histamin)*. Es werden folgende Rkk. angegeben. Für Tyramin: Mit Pikrinsäure schwachgelbe Nadeln u. Prismen, mit Platinchlorid schwach gelbe Prismen u. Platten. Beim Zusatz von Na_2S u. nachher Platinchlorid entstehen große, braun-violette Prismen, die zu Sternen vereint sind. Mit K-Wismutjodid u. wenig HCl entstehen große, gerade auslöschende Prismen von rot-oranger Farbe. Phosphorwolframsäure gibt anfänglich Tropfen, die allmählich in blumenkohlartige Warzen u. schließlich in rautenförmige Platten übergehen. Für Histamin folgende Rkk.: Mit Pikrinsäure schwach gelbe, zu Büscheln verzweigte Nadeln. Mit Platinchlorid gelbe, schief auslöschende Prismen. Mit NaJ u. Platinchlorid braunschwarze Prismen, die einzeln

auftreten. Mit Silicowolframsäure weißer Nd., der sich nach einiger Zeit in Prismen u. Ranken verwandelt. (Mikrochemie 3. 65—67. 1925. Leiden, Univ.) LASCH.

Oscar L. Brady und **Gladys V. Elsmie**, *Die Anwendung von 2,4-Dinitrophenylhydrazin als Reagenz auf Aldehyde und Ketone*. Wie bereits bekannt, liefert das 2,4-Dinitrophenylhydrazin mit Aldehyden u. Ketonen gut krystallisierende u. leicht zu reinigende Ndd. u. ist nach Ansicht der Vff. trotz seiner etwas langsamen Einw. u. geringen Löslichkeit in kaltem A. in vielen Fällen anderen Reagentien zur Abscheidung u. Charakterisierung von Aldehyden u. Ketonen überlegen. Zur Bereitung des Reagens werden 50 g 2,4-Dinitrochlorbenzol in 750 ccm h. A. gel. u. 100 ccm 50%ig. Hydrazinhydrat in kleinen Anteilen hinzugefügt. Unter heftiger Rk. scheidet sich sofort das 2,4-Dinitrophenylhydrazin ab, wird nach dem Abkühlen mit k. A. u. W. gewaschen, an der Luft getrocknet u. aus viel A. umkrystallisiert. Zur Anwendung gelangt die Base entweder in alkoh. Lsg., wobei auf ihre relativ geringe Löslichkeit in diesem Lösungsm. Rücksicht zu nehmen ist, oder, falls die betreffenden Aldehyde u. Ketone wasserlöslich sind, als Chlorhydrat in 2-n. HCl. Die Abscheidung der Hydrazone erfolgt in wss. Lsg. sofort, in alkoh. nach 1-std. Kochen unter Rückfluß beim Abkühlen. Man reinigt durch Umkrystallisieren aus A. Außer den schon bekannten Verbb. führen die Vff. folgende neue an: *n*-Propylaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, $C_9H_{10}O_4N_4$, rötliche Nadeln, F. 155°. — *n*-Butylaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, $C_{10}H_{12}O_4N_4$, blaßorange Tafeln, F. 122°. — *i*-Butylaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, $C_{10}H_{12}O_4N_4$, orange Nadeln, F. 182°. — *i*-Valeraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, $C_{11}H_{14}O_4N_4$, orangefarbene Nadeln, F. 123°. — *n*-Capronaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, $C_{12}H_{16}O_4N_4$, orangegelbe Nadeln, F. 104°. — *n*-Heptylaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, $C_{13}H_{18}O_4N_4$, blaßorange Nadeln, F. 106°. — *n*-Nonylaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, $C_{15}H_{22}O_4N_4$, hellgelbe Tafeln, F. 96°. — Methyläthylketon-2,4-dinitrophenylhydrazon, $C_{10}H_{12}O_4N_4$, orange Nadeln, F. 115°. (Analyst 51. 77—78. Univ. Coll., London.) GRUNERT.

René Dubrisay, *Anwendung der Capillarmessungen auf die Untersuchung von Fettsäuregemischen*. (Vgl. Bull. Soc. chim. de France [4] 37. 996; C. 1925. II. 2250.) Ist die Grenzflächenspannung an der Trennungsfläche Bzn. / alkal. Lsg. des Fettsäuregemisches einmal als Funktion der Zus. des Gemisches bestimmt, so kann man nun von der Grenzflächenspannung des zu untersuchenden Gemisches auf seine Zus. schließen. Beispiel für Gemische der Stearin- u. Myristinsäure. Während das 50%ig. Gemisch der beiden Säuren sonst ähnliche Eigenschaften hat, wie die Palmitinsäure, sind die Grenzflächenspannungen des Gemisches u. der Palmitinsäure ganz verschieden (0,64 bzw. 0,07 in willkürlichen Einheiten). Auf demselben Wege wird gezeigt, daß Daturinsäure, $C_{17}H_{34}O_2$, kein Gemisch der Palmitin- u. Stearinsäure darstellt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1060—62. 1925.) BIKERMAN.

W. H. Dore, *Die Zusammensetzung des Pektins: eine vorläufige Mitteilung über die Bestimmung der Galakturonsäure in Pektin*. (Vgl. EHRLICH, Chem.-Ztg. 41. 197; C. 1917. I. 854.) Vf. benutzte die Eigenschaft der Galakturonsäure, beim Kochen mit HCl in Furfurol u. CO_2 zu zerfallen, zu ihrer quantitativen Best. im Pektin, indem er eine Modifikation der Lefèvre-Tollensschen Methode zur Ermittlung des gebildeten CO_2 anwandte. Der Gehalt an Galakturonsäureanhydrid schwankte bei den 5 verschiedenen Pektinproben, welche untersucht wurden, zwischen 39,66 u. 61,26%. Es wurde ferner versucht, diese Werte durch Best. des aus der Galakturonsäure entstandenen Furfurols zu kontrollieren. Dies konnte nicht ohne weiteres ausgeführt werden, da die im Pektin vorhandene Arabinose mit HCl ebenfalls Furfurol liefert. Nachdem die Arabinose durch Extrahieren mit 70%ig. A. entfernt worden war, wurde die aus dem Rückstand entstehende Furfurolmenge bestimmt. Die Resultate zeigten jedoch zu den ersten keine einfache Beziehung. Vf. versucht hierfür in Anlehnung an die von NANJİ, PATON u. LING (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 253; C. 1925. II. 394) vorgeschlagene Sechs-

ring-Strukturformel der Pektinkörper eine Erklärung zu geben. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 232—36. Berkeley, Kalifornien, Univ.) WINKELMANN.

G. Denigès, *Krystallisationsanreize in der Mikrochemie und ihre Anwendung zur Erkennung gewisser Zucker und mehrwertiger Alkohole*. Das Verf. greift zurück auf Verss. BOURQUELOTS (Soc. mycologique de France **7**. 208 [1891]), der die im Champignonsaft enthaltene Trehalose auf einem Präparierglas zur Krystallisation brachte, das vorher leicht mit einem Trehalosekrystall bestrichen war. — Bei sehr kleinen Substanzmengen ist es nötig, durch ein Tröpfchen Lösungsm. die durch Reibung oder Impfung erhaltenen, sehr unübersichtlichen Rohkrystalle zum Teil in Lsg. zu bringen. Nach dem Verdunsten dieses Lösungsm. werden sehr deutliche Krystalle erhalten. Bewährt haben sich für Zucker u. mehrwertige Alkohole Aceton, Eg. u. besonders ein Gemisch zu gleichen Teilen. — Für die Gewinnung der zur Impfung dienenden Mikrokrystalle gibt der Vf. eine detaillierte Anleitung. Substanzmengen von 0,1—0,2 mg lassen sich, in einem Wassertropfen von 3—4 mm ϕ gel. u. bis zur glasigen Konsistenz eingedunstet, nach Impfen mit dem gleichen Mikrokrystall u. zweimaliger Behandlung mit Lösungsm. sehr schön krystallisiert erhalten. Die schönsten Krystalle gaben: *Sorbose*, *Fructose*, *Glucose* (letztere beiden zuletzt mit reinem Eg. behandelt), *Trehalose*, *Saccharose*, *Lactose*, *Erythrit*, *Perseitol*, *Sorbit*, *Inositol* u. *Quercitol*. Da absol. Isomorphie verschiedener Verbb. prakt. ausgeschlossen ist, bietet die Mikrokrystallerzeugung ein sehr sicheres Mittel zur Identifizierung minimalster Substanzmengen. (Bull. soc. pharm. Bordeaux **63**. 3—10. 1925.) HARMS.

Lauri Paloheimo, *Die Verwendung der Säurehydrolyse zur Ligninbestimmung*. Vf. deckt durch genaue Unterss. eine Anzahl Fehlerquellen bei der Ligninbest. durch Säurehydrolyse auf. Die bisher gefundenen Zahlen waren durchweg zu hoch. Bei kürzerer Hydrolysenzeit tritt beim Verd. mit W. eine Kohlehydratfällung ein, bei längerer Hydrolysendauer koagulieren beim Verd. humusartige Substanzen, weshalb Vf. vor dem Verd. filtriert. Auch durch Adsorption von Kondensationsprodd. an die Ligninkorpuskeln können Fehler eintreten. Ferner kann schwer hydrolysierbares Protein dem Ligninrest beigemengt sein, was durch N-Best. festgelegt u. in Abzug gebracht werden muß. — So ergab eine Probe *Fichtenholz* 30% Ligninrest, nach Korrektur 25; *Kleeheu* früher 25%, nach Korrektur 7%; *Roggenstroh* früher 20, jetzt 3%. (Biochem. Ztschr. **165**. 463—64. 1925. Helsingfors, Inst. f. Haustierlehre d. Univ.) LASCH.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Ernst Mislowitzer und **Werner Schaefer**, *Die Elektrotitration in physiologischen Flüssigkeiten*. II. Mitt. *Die Bestimmung von Eisen*. (Vgl. Biochem. Ztschr. **159**. 77. 80; C. **1925**. II. 843.) Es werden Unterss. über die elektrometr. Best. von Eisen in einer Ferro-Ferrisalzlsg. mitgeteilt, wobei die Menge Ferroeisen mit Hilfe eines Oxydationsmittels (Bromat), die Menge Ferrieisen mit Hilfe eines Reduktionsmittels (Titantrichlorid) elektrometr. titriert wird. Der Potentialsprung ist jedesmal der Indicator für die Beendigung der Rk. Die Titration zerfällt in 3 Vorgänge. Zunächst wird durch Zugabe einer überschüssigen Menge Titantrichlorid alles Ferrieisen zu Ferroeisen reduziert, wobei die äquivalente Menge TiCl_3 in TiCl_4 übergeht. Dann wird durch Zufügen von Bromat zunächst das überschüssige TiCl_3 u. im Anschluß daran das zweiwertige Fe oxydiert. Auf diese Weise läßt sich die Summe des ursprünglich vorhandenen Ferro- u. Ferrieisens titrieren. — Eisen-Serummischungen werden am besten mit Zusatz von NH_3 verascht u. dann auf dieselbe Weise titriert. Ebenso werden Bestst. von Fe im Blut ausgeführt. (Biochem. Ztschr. **168**. 203—16.) LASCH.


Ernst Mislowitzer, *Die Elektrotitration in physiologischen Flüssigkeiten*. III. Mitt. *Eine neue Zuckerbestimmungsmethode*. (II. vgl. vorst. Ref.) Es wird eine neue Methode der Zuckerbest. mitgeteilt, die auf die elektrometr. Best. von Ferroeisen hinausläuft. Die *Glucose* wird in einer Lsg. von CuSO_4 , NaOH u. zitronensaurem Na oxydiert. Das

gebildete Cu_2O wird durch Ferrieisen in salzsaurer Lsg. direkt — ohne Isolierung — oxydiert. Schließlich wird das entstandene Ferrieisen mit Hilfe von Bromat unter Verwendung des Potentialsprungs als Indicator titriert. Die Methode ist als Mikro- u. Halbmikromethode ausgearbeitet. (Biochem. Ztschr. **168**. 217—26. Berlin, Patholog. Inst. d. Univ. Charité.) LASCH.

L. van Itallie und **A. Harmsma**, *Auffindung und Bestimmung kleiner Mengen von Morphin in Gemischen*. Die Abscheidung des Morphins muß je nach den im betreffenden Gemisch noch vorhandenen Bestandteilen in geeigneter Weise erfolgen, wofür einige Beispiele gegeben werden. Für die Best. fanden Vff. am geeignetsten die Red. von Jodsäure u. Beurteilung der dabei auftretenden Färbung, die durch Zusatz von NH_3 verstärkt wird. Es wird folgendes Verf. empfohlen: Zu 10 ccm wss. neutraler oder schwach saurer Morphinlsg. werden 5 ccm 5%ig. wss. Jodsäurelsg. gegeben, nach 3 Min. mit ebenso behandelten u. ebenso lange stehenden Lsgg. bekannten Gehaltes verglichen. (Mededeelingen van het Rijks-Inst. voor pharmacotherapeutisch Onderzoek. **1925**. 52—54. Sep.) SPIEGEL.

M. Bridel und **C. Charaux**, *Biochemische Bestimmungsmethode für hydrolysable Glykoside in Pflanzen durch die Rhammodiastase*. Hinweis auf die Brauchbarkeit der Rhammodiastase für die Aufdeckung von Glukosiden in den verschiedensten Pflanzengattungen u. -teilen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1167—68. 1925.) OPP.

Milton T. Hanke, *Die quantitative Bestimmung von Tyrosin und Histidin im Eiweiß. Eine Methode zur Bestimmung von Tyramin in eiweißhaltigen Mischungen*. Wenn Tyrosin mit Hg-Acetat unter geeigneten Bedingungen gekocht u. die entstandene



klare Lsg. mit NaCl behandelt wird, entsteht eine Verb. von der Formel $\text{C}_9\text{H}_5\text{O}_3\text{N} \cdot \text{Cl}_2\text{Hg}_2$, der Vf. nach Bildungsart u. Verh. nebenst. Konst. zuschreibt. In dieser Form

kann Tyrosin mehr oder weniger vollständig von den anderen bei der Eiweißhydrolyse gebildeten Aminosäuren getrennt werden. Der Nd. kann in verd. H_2SO_4 oder 20%ig. HCl gel., durch H_2S vom Hg befreit u. der Tyrosingehalt der Lsg. dann nach HANKE u. KOESSLER (Journ. Biol. Chem. **50**. 235. 271; C. **1922**. II. 609) bestimmt werden. Von den in kleinen Mengen mitgefällten anderen Aminosäuren würde nur Histidin diese Best. beeinflussen. Dieses wird deshalb zuvor mit Ag_2SO_4 u. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ gefällt u. nach Zerlegung der Ag-Verb. mit HCl in gleicher Weise bestimmt. Tyramin gibt mit Hg-Acetat einen ähnlichen Nd. wie Tyrosin. Es wird ein Verf. angegeben, zunächst Tyramin u. Histamin zusammen aus den Hydrolyseprodd. zu gewinnen, dann nach Fällung des Histamins als Ag-Salz das Tyramin als Hg-Verb. zu fällen u. zu bestimmen. (Journ. Biol. Chem. **66**. 475—88. 1925. Chicago, OTHO S. A. SPRAGUE Mem. Inst.; Univ. of Chicago.) SPIEGEL.

Milton T. Hanke, *Der Histidin- und Tyrosingehalt einer Anzahl von Eiweißstoffen*. Unterss. mittels der an anderer Stelle (vgl. vorst. Ref.) angegebenen Methode. Es wurden im Mittel folgende %-Gehalte an Histidin (Tyrosin) gefunden: Gelatine 0,53 (0,25), Casein 2,61 (4,5), krystallin. Eialbumin 2,3 (2,35), Kürbissamenglobulin 2,26 (3,05), Gliadin 2,1 (2,35), Hordein 0,98 (2,43), Zein 1,25 (3,66), Secalin 1,23 (1,37), Sativin 0,74 (1,56), Sorghumin 0,51 (2,3), Fibrin vom Schaf 2,18 (3,3), vom Schwein 2,27 (3,45), vom Rind 2,05 (3,5). (Journ. Biol. Chem. **66**. 489—93. 1925. Chicago, OTHO S. A. SPRAGUE Mem. Inst.; Univ. of Chicago.) SPIEGEL.

M. Javillier, **P. Baude** und **Simonne Lévy-Lajeunesse**, *Über die physiologische Bestimmung des A-Faktors*. Die Methode beruht auf der Beobachtung, daß der Gehalt irgendeiner Substanz an Vitamin A am besten, u. auch, wie in den Einzelheiten ausgeführt, bis zu einem gewissen Grad quantitativ erkannt werden kann, wenn das Vers.-Tier (Testobjekt) in einem bestimmten Zustand der Avitaminose sich befindet. Die Tiere sind vitaminfrei zu ernähren, bis 10% des Maximalgewichts verloren

gegangen ist, dann erhalten sie in variierten Mengenverhältnissen die Substanz, in der Vitamin A vermutet bzw. deren Gehalt an Faktor A zu bestimmen ist; die Gewichtskurve gibt dann die nötigen Anhaltspunkte. Es wird an Hand der Verss. eine „Einheit“ für die Menge des Faktors A vorgeschlagen. (Bull. Soc. Chim. Biol. **7**. 831—41. 1925. Inst. des rech. agronomiques.)

OPPENHEIMER.

Donald D. van Slyke, *Die Bestimmung von Gasen im Blut und in anderen Lösungen durch Vakuumextraktion und manometrische Messung. III. Gasometrische Bestimmung von Methämoglobin.* (II. vgl. HARINGTON u. VAN SLYKE, Journ. Biol. Chem. **61**. 575; C. 1924. II. 2606.) Vf. benutzte das CO-Verf. von NICLOUX u. FONTÈS (Bull. Soc. Chim. Biol. **6**. 728; C. 1925. I. 396) unter Verwendung der Apparatur von VAN SLYKE u. NEILL. Statt CO konnte ohne merklichen Fehler das New Yorker Leuchtgas, ca. $\frac{1}{3}$ CO enthaltend, benutzt werden. (Journ. Biol. Chem. **66**. 409—14. 1925. New York, ROCKEFELLER Inst. f. med. res.)

SPIEGEL.

Anton R. Rose und **Fred Schattner**, *Die Verhinderung der Glykolyse in Blutproben.* FNa verhindert einige Tage die Glykolyse. Gleichzeitiger Zusatz von Trichloräthylen, Monochlor- oder Monobrombenzol, die allein nichts nützen, hemmen die Glykolyse etwa 10 Tage lang. Verminderung des Zuckers um 0,01% in den ersten 3 Tagen läßt sich auf keine Weise verhindern. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 363—64. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 582. 1925. Ref. SCHMITZ. Newark, N. J., Laborat. Prudential Insurance Co.)

OPPENHEIMER.

B. Pohorecka-Lelesz, *Mikrobestimmung des Harnstoffs in 0,1 ccm Blut.* Zers. des Harnstoffs in den Untersuchungsfl. mit Urease u. Trocknung in einem Spezialapp. (nähere Angaben mit Zeichnung im Original). Die Spuren $\text{NH}_3\text{-N}$ werden auf jodometr. Wege (vgl. vorst. Ref.) bestimmt. (Bull. Soc. Chim. Biol. **7**. 1085—88. 1925. Poznan, Lab. chim. physiol.)

OPPENHEIMER.

R. C. Corley und **W. Denis**, *Die Bestimmung von Calcium in Geweben, Faeces und Milch.* Die Besonderheit der hier angegebenen Verf. besteht darin, daß der Aufschluß des Materials durch Erhitzen mit verd. NaOH unter Druck erfolgt. Bei Geweben werden 10 g fein zerriebenes Material u. 50 ccm $\frac{1}{10}$ -n. NaOH auf 180° 2 Std. erhitzt, von Faeces 1 g, von Kuhmilch 1 ccm u. von Frauenmilch 5 ccm mit 50 ccm $\frac{1}{100}$ -n. NaOH 1 Stde. auf 160°. Auch für Knochen kann das Verf. dienen. (Journ. Biol. Chem. **66**. 601—17. 1925. New Orleans, Tulane Univ.)

SPIEGEL.

Henri Wunschendorff, *Das Enteiweißen organischer Flüssigkeiten mit Eisen.* Modifikation der Methode von MICHAELIS (Biochem. Ztschr. **59**. 166. [1914]). Nach scharfem Zentrifugieren werden 2 ccm der organ. Fl. (Serum, Plasma, Spinalfl.) abgenommen u. mit 20 ccm W. versetzt. Tropfenweise wird aus einer Bürette 15 ccm kolloidales Eisenhydrat (1:5) unter ständigem Schütteln zugelassen. In Ggw. von Hämoglobin kommt 0,1 g K_2SO_4 , fein gepulvert hinzu. $\frac{1}{4}$ Stde. wird stehen gelassen. Durch ein kleines Filter wird filtriert, wobei die ersten Filtrate 4—5-mal zurückgeschüttet werden, bis sie farblos sind. 18 ccm werden dann in einem Kjeldahlkolben mit CuSO_4 usw. wie üblich weiterbehandelt u. NH_3 bestimmt. (Bull. Soc. Chim. Biol. **7**. 768—77. 1925. Alger. Lab. de Chim. biol.)

OPPENHEIMER.

Henri Wunschendorff, *Indirekte Bestimmung der Proteine im Liquor cerebrospinalis und in andern eiweißhaltigen Flüssigkeiten nach Enteiweißung durch Eisen.* (Vgl. vorst. Ref.) Mit der üblichen, in Einzelheiten die kleinere Menge des Ausgangsmaterials berücksichtigend, N-Best. (KJELDAHL) wird 1. der Gesamt-N festgestellt, 2. im Filtrat des nach obiger Methode enteiweißten Materials der Nicht-Eiweiß-N. Wenn Harnstoff mit einer der bekannten Methoden bestimmt wurde, läßt sich (wie durch die Differenz 1 u. 2 die Eiweißmenge) durch Abzug von Harnstoff-N von Nicht-eiweiß-N auch der Rest-N berechnen. (Bull. Soc. Chim. Biol. **7**. 778—84. 1925. Alger. Lab. de chim. biol.)

OPPENHEIMER.

Irvine McQuarrie und **A. T. Shohl**, *Eine colorimetrische Methode zur Bestimmung des p_H der Rückenmarksflüssigkeit*. Bei dem Verf. wird der Verlust von CO_2 verhindert u. die colorimetr. Best. bei 38° vorgenommen. Unter diesen Kautelen ergab sich für n. Rückenmarksfl. gleicher p_H -Wert wie für n. Blut, $7,35-7,40 \pm 0,02$. (Journ. Biol. Chem. **66**. 367—74. 1925. New Haven, YALE Univ. school of med.) SPIEGEL.

Paul Fleury und **Edmond Guinébault**, *Die Ausscheidung der Phenyläthylbarbitursäure*. Nach längere Zeit fortgesetzter Phenyläthylbarbitursäureeinnahme läßt sich die Substanz im Harn nachweisen, doch bleibt die renale Ausscheidung stets hinter der Einnahme zurück. Methodik: Fällung des Harns mit neutralem Pb-Acetat; nach Ä.-Ausschüttelung wird die Gesamtmenge der Phenyläthylbarbitursäure durch $HgSO_4$ gefällt. Die Menge kann durch Differenzbest. des unl. gemachten Hg oder durch Behandlung des Nd. mit H_2S oder durch Zn in Ggw. von HCl u. Ä.-Ausschüttelung der wss. Phase bestimmt werden. (C. r. soc. de biologie **93**. 1508—10. 1925.) OPP.

I. M. Kolthoff, *Die Klärung von zuckerhaltigem Harn mit Kohle*. Es wird die Adsorption von Glucose an 8 verschiedenen Kohlesorten unter wechselnden Bedingungen untersucht u. gefunden, daß dieselbe sehr bedeutend sein kann. Wenn jedoch eine Fl. außerdem sehr stark adsorbierbare, gefärbte Substanzen enthält, so kann man die Lsgg. prakt. vollständig mit Kohle entfärben, ohne daß ein Zuckerverlust auftritt, weil die Glucose von der Oberfläche verdrängt wird. Dies wird bei Entfärbung von Harn mit Kohle angewendet. Wenn man nicht mehr Kohle hinzufügt als zur Entfärbung eben nötig ist, so bleibt die Glucose quantitativ im Filtrat. (Biochem. Ztschr. **168**. 122—27. Utrecht, Reichsuniv.) LASCH.

Ryo Tsukasaki, *Ein Mikroverfahren zur Bestimmung der Milchsäure in Blut, Harn und Milch*. (Einschließlich eines Mikroextraktionsapparates für Flüssigkeiten.) Verf. soll sich von älteren Methoden (MEYERHOF, EMBDEN, HIRSCH-KAUFMANN) nicht unterscheiden. (Tohoku journ. of exp. med. **5**. 429—37; Ber. ges. Physiol. **32**. 583. 1925. Ref. SCHMITZ.) OPPENHEIMER.

C. S. Robinson, *Die Anwendung der Chinhydronelektrode zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration von Faeces*. Die Chinhydronelektrode wurde für diesen Zweck ebenso zuverlässig wie die H_2 -Elektrode u. weit bequemer befunden. (Journ. Biol. Chem. **66**. 811—12. 1925. East Lansing, Michigan Agric. Exp. Station.) SPIEGEL.

Brandino, *Die Gefrierpunktsbestimmung der Organe, benutzt zur gerichtlichen Diagnose: Tod durch Trunkenheit*. Die Zunahme der molaren Konz. der Organe, besonders des Gehirns, nach dem Tode infolge A.-Wrkg., die sich von den Konz.-Änderungen in n. Fällen unterscheidet, läßt mit Sicherheit noch 120 Stdn. nach dem Tode, auch wenn nur 3 g A. pro kg verabreicht wurden, die Diagnose auf A.-Wrkg. stellen (Kaninchenverss.). (Arch. di scienze biol. **7**. 210. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 673. 1925. Ref. LAQUER. Sassari, Istit. di mat. med.) OPPENHEIMER.

Emil Lenk, *Quantitative Bestimmung wasserlöslicher Exkrete von Wassertieren*. Mit Hilfe der Best. des elektr. Leitvermögens kann man den Gang der zeitlich ausgeschiedenen Prodd. bei Wassertieren verfolgen. Als Versuchstiere wurden Pfrillen (*Plixinus laevis*) verwendet. — Gefütterte Fische scheiden erst viel, dann immer weniger Substanzen aus, wobei eine quantitative Best. ausgeschlossen ist. Die Ausscheidung beginnt etwa 2 Stdn. nach der Fütterung. Die Verss. wurden bei 10, 18 u. 25° durchgeführt. Je höher die Temp., desto reger ist der Stoffwechsel, doch stimmt die RGT-Regel nicht. Es handelt sich um reine, physikal. verlaufende Diffusionsvorgänge. Der Temp.-Koeffizient schwankt zwischen 1—1,4 u. ist bei höherer Temp. etwas höher als bei niedrigerer. (Biochem. Ztschr. **168**. 61—68. Biolog. Station Lunz, Niederösterreich.) LASCH.

Carl R. Fellers und **Ray W. Clough**, *Indol- und Skatolbestimmungen in Bakterienkulturen*. Nährböden (mit W. verd.) werden der W.-Dampfdest. unterworfen. Destillat mit Ä. ausgeschüttelt, nachdem vorher mit konz. HCl angesäuert wurde; der

Ä.-Extrakt mit NaOH, dann mit HCl gewaschen. Ä. wird verdampft u. die wss. Lsg. auf Indol (mit Dimethylaminobenzaldehyd) u. Skatol (mit Dimethylanilin) geprüft. (Journ. of bacteriol. **10**. 105—33. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 646—47. 1925. Ref. BREGMANN. Washington, Nat. canners assoc. Seattle.) OPPENHEIMER.

A. Kircher und **F. v. Ruppert**, Zu dem Aufsatz von Dr. Alfred Hirsch (vgl. HIRSCH, S. 190): Über ein wertvolles Reagens zur Erkennung nicht einwandfreien Neosalvarsans. Vff. zeigen durch eine Reihe von Verss., daß Strontiumuran zum Nachweis von nicht einwandfreiem anoxydiertem Neosalvarsan unbrauchbar ist u. daher als Reagens abzulehnen sei. (Pharm. Ztg. **71**. 264—65. 1925. Höchst a. M.) ROJAHN.

Clément Genot, Einige Versuche zur Identifizierung des Hedonals. Vf. bespricht Löslichkeitsverhältnisse, Eigenschaften, Anwendung, Krystallbilder aus verschiedenen Lösungsm. u. die chem. Rkk. des Hedonals. (Journ. Pharm. de Belgique **8**. 131 bis 35.) ROJAHN.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

—, Ununterbrochene Filtration von leichten Destillaten. Beschreibung u. Abbildung eines App. (Chem. Metallurg. Engineering **33**. 113.) ENSZLIN.

Leo Stein, Baumwollfiltertücher und ihre Anwendung, Theorie und Praxis. (Chem.-Ztg. **50**. 97—98. 110. 125—27. — C. **1926**. I. 1245.) JUNG.

—, Herstellung und Anwendung eines neuen mineralischen Adsorptionsmittels. Es wird die Herst. u. Reinigung des nicht näher beschriebenen Adsorbens „Filtrol“ beschrieben, welches sich mit Vorteil zur Entfärbung von mineralischen, animalischen u. pflanzlichen Ölen verwenden läßt. (Chem. Metallurg. Engineering **33**. 99 bis 101.) ENSZLIN.

Rudolf Koetschau, Über neuere Fortschritte der Adsorptionstechnik. Angabe techn. wichtiger Werte für das Silicagel der Maschinenfabrik FR. HERRMANN G. m. b. H.: H₂O-Gehalt 3—4%. Korngröße 1—2 mm. Schüttgewicht bei 2 mm Korngröße ~ 0,4 kg/Ltr. Spez. Wärme 0,25. Wärmebedarf zur Regenerierung 160000 WE für 100 kg Gel. Ferner beschreibt Vf. Gewinnung u. Eigenschaften der Terrana-Bleicherden der Sirius-Werke A.-G. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 210—13. 1926.) HEIMANN.

Air Reduction Co., Inc., New York, übert. von: **Claude C. van Nuys**, Cranford und **Walter Wilkinson**, Jersey City, Trennung von Gasgemischen. Man komprimiert, kühlt u. läßt die Gasgemische teilweise expandieren. Die expandierten Gase werden bei einem höheren als dem anfänglich verwendeten Druck verflüssigt u. die erhaltenen Fl. rektifiziert. (A. P. **1 571 461** vom 24/6. 1921, ausg. 2/2. 1926.) KAUSCH.

Adolf Steinbrückner, Maschinenbau-Anstalt und Dampfkesselfabrik, Akt.-Ges. Darmstadt vorm. Venuleth & Ellenberger und Göhrig & Leuchs, Darmstadt, Dichtungen für Trommelöfen mittels eines in einem Steg geführten Dichtungsringes, dad. gek., daß der Dichtungsring aus mehreren Ringscheiben besteht, die sich bei schlingender Bewegung der Trommel stufenartig verschieben u. dadurch eine dauernde Abdichtung bewirken. (D. R. P. **424 448** K. 82a vom 6/4. 1924, aus. 25/1. 1926.) OE.

Norman Edward Siderfin, **William Vivian Shannan** und **The Gas Light & Coke Company**, London, Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von kleinen, nicht aneinander haftenden Krystallen aus Lösungen. (E. P. **211 556** vom 18/11. 1922, ausg. 20/3. 1924. — C. **1924**. II. 2072 [F. P. 573016]. **1926**. I. 1250 [D. R. P. 422320].) SCH.

A. Schmalenbach, Essen, Destillieren. Um zwei Bestandteile eines Flüssigkeitsgemisches (Bzl. u. W.) voneinander zu trennen, werden die durch Dest. der Fl. im hohen Vakuum getrennt erhaltenen Dämpfe kondensiert u. das Destillat nochmals

dest. u. rektifiziert in einem niedrigerem Vakuum. (E. P. 244 736 vom 23/11. 1925, Auszug veröff. 10/2. 1926. Prior. 22/12. 1924.) KAUSCH.

Clarence V. Steinhart, Westfield, N. J., *Masse mit niedrigem Erstarrungspunkt*, bestehend aus einem Erdalkalichlorid (CaCl_2), einem Alkalisalz (Borax) u. Glycerin. (Can. P. 250 258 vom 8/5. 1924, ausg. 2/6. 1925.) KAUSCH.

Ernest Joseph Lush, London, *Metallkatalysatoren in Pulverform*. (N. P. 39 853 vom 6/8. 1923, ausg. 6/10. 1924. E. Priorr. 20/10. 1922 u. 9/2. 1923. — C. 1924. II. 1380 [Technical Research Works Ltd. u. E. J. LUSH].) KAUSCH.

Ammonia Casale S. A., Rom, *Katalysatoren für die Ammoniaksynthese*. (N. P. 39 516 vom 21/6. 1922, ausg. 18/8. 1924. — C. 1925. I. 1002 [Oe. P. 97 665].) KÜHLING.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Louis Desvergnès, *Analyse von ligurischem Tongeschirr aus dem alten gallischen „oppidum vindalium“ (Vauluse)*. Vf. teilt die Analyse von 2 ligur. Tongeschirren mit. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 8. 40—41.) JUNG.

W. K. Lewis und **A. H. Radasch**, *Messung des Wirkungsgrades eines Ofens*. Berechnung der Wirkung eines Kalkofens aus der Zus. der Kohle u. den Analysen der Gase. Es ist daraus zu ersehen, daß das System ELDRED-DOUGHERHY mit wiederholter Zirkulation der Abgase nicht durch geringeren Kohlenverbrauch, sondern durch die bessere Qualität u. die größere Gleichmäßigkeit des gebrannten Kalkes vorteilhafter arbeitet. (Chem. Metallurg. Engineering 33. 76—78. New York, State School of Ceramics.) ENSZLIN.

G. Agde und **P. Assmann**, *Beiträge zur Kenntnis der Herstellung von hydraulischen Bindemitteln aus Kupferschlacken*. Vff. beschreiben Verss. zur Herst. von Zement aus den Schlacken der Aufarbeitung von Altkupferlegierungen. Durch einen oxydierenden Sinterungsbrand gelingt die Herst. eines Erzzementes. Es lassen sich Prodd. gewinnen mit Festigkeiten über der Norm, die zum Teil schon nach 3 Tagen erreicht sind (Übersichtstabelle über 43 Prodd. im Original). Das CuO wirkt nicht nachteilig. Die Phosphate können auf die Festigkeit nachteilig wirken, wenn ihr Gehalt $0,6\%$ P_2O_5 im fertigen Zement übersteigt. Portlandzement mit mehr als $0,6\%$ P_2O_5 zeigt Treiberscheinungen im Gegensatz zu Erzzement. Durch Zusatz von 3% Gips läßt sich der Beginn des Abbindens hinausschieben, die gesamte Abbindezeit aber verkürzen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 271—76. Darmstadt, Techn. Hochschule.) JUNG.

F. Strumpf, *Betriebsmethode zur schnellen Bestimmung von Kieselsäure und Kalk im Rohmehl des Hochofenzementes*. Bei der Best. von SiO_2 u. CaO im Zementrohmehl werden Fe_2O_3 u. Al_2O_3 vor der Fällung des Ca mit Ammoniumoxalat nicht entfernt, sondern in essigsaurer Lsg. in Phosphate übergeführt. Die Fällung von Ca als Oxalat geschieht ebenfalls in essigsaurer Lsg. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 278—79. Bremen.) JU

Travers und **de Goloubinoff**, *Beitrag zur Untersuchung der Silicasteine. Dilatometrische Analyse. Prüfung des Rohstoffes*. (Fortsetzung von S. 2040.) Zur Best. der Bestandteile von Silicasteinen wird das dilatometr. Verf. angewendet, das es ermöglicht, die amorphe Kieselsäure zum Ausdruck zu bringen. Dann werden die sich auf den Rohstoff beziehenden Verss. besprochen: bei der chem. Unters. sind vor allem die Flußmittel festzustellen, nämlich die Alkalien u. Eisenoxyd, während man mit Hilfe des Polarisationsmikroskopes die Verunreinigungen im Rohstoff beobachten kann. Eine unregelmäßige Verteilung bedingt eine zweckdienliche Vermahlung des Gesteines im Verlauf des Fabrikationsvorganges. Eine der wichtigsten Unterss. ist die der Dilatation; doch wird an Stelle der Messung des Wachsens nach dem Brennen entsprechend dem Vorschlag von WERNICKE eine dilatometr. Analyse der Bestandteile nach dem Brennen für geeigneter gehalten. (Rev. de Métallurgie 23. 100 bis 117.) KALPERS.

Chemische Werke vorm. Auergesellschaft m. b. H., Kommanditges., Berlin, übert. von: **Fritz Sommer**, Berlin-Charlottenburg, und **Max Groth**, Berlin-Oranienburg, *Emaillen und Glasuren*. (**A. P. 1564907** vom 17/5. 1923, ausg. 8/12. 1925. — **C. 1924. I.** 2630 [D. R. P. 392 213].) **KÜHLING.**

Abrasive Co. übert. von: **Clarence J. Brockbank**, Philadelphia, V. St. A., *Schleifmittel*. Al₂O₃ enthaltende Erze, vorzugsweise Bauxit, werden unter Zusatz von Kohlenmengen, welche die zur Red. des vorhandenen Fe₂O₃, TiO₂ u. SiO₂ erforderlichen übersteigen, von H₃BO₃ u. gegebenenfalls Abfalleisen geschmolzen. Das erschmolzene Erzeugnis wird gemahlen, gesiebt u. magnet. geschieden. Das Schleifmittel enthält weniger metall. Beimengungen als die ohne Mitverwendung von H₃BO₃ erschmolzenen u. ist deshalb bröcklicher als diese. (**A. P. 1568873** vom 17/9. 1920, ausg. 5/1. 1926.) **KÜHLING.**

Eugene Charles Buck, New York, *Gegen Flußsäure u. dgl. beständige Gläser*. Die Gläser enthalten im wesentlichen HPO₃, Al₂O₃ u. CaO oder MgO; die Menge des CaO bzw. MgO ist wesentlich größer als die des Al₂O₃. Die Erzeugnisse werden durch Zusammenschmelzen von CaH₄(PO₄)₂, AlPO₄ u. gegebenenfalls P₂O₅ oder HPO₃ erhalten. Vorhandene SiO₂ wird durch Zusatz von Fluoriden, wie AlF₃, CaF₂ oder Kryolith oder durch überschüssige HPO₃ unschädlich gemacht. (**A. P. 1570202** vom 26/2. 1924, ausg. 19/1. 1926.) **KÜHLING.**

Westinghouse Lamp Co., übert. von: **James Bryant Whitmore** und **John Ebling Ferguson**, Bloomfield, V. St. A., *Überziehen von Glas*. (**Can. P. 249 151** vom 4/6. 1924, ausg. 28/4. 1925. — **C. 1926. I.** 766.) **KÜHLING.**

Comp. Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, Frankreich, *Quarzglas*. (**F. P. 30 057** vom 23/1. 1925, ausg. 26/1. 1926. A. Prior. 25/1. 1924. — **C. 1925. I.** 2510 [E. P. 228 191].) **KÜHLING.**

Ohio Brass Co., Mansfield, übert. von: **Arthur O. Austin**, Barberton, V. St. A., *Keramische Erzeugnisse*. Bei der Herst. von aus Ton u. Füllstoffen, wie Feldspat, Kreide u. dgl. bestehenden MM. werden die Füllstoffe durch trockenes Absieben, der Ton nach Aufschlemmen mittels W. u. Sieben o. dgl. der Mischung von größeren Teilchen befreit. Hierauf werden die Erzeugnisse sorgfältig gemischt u. in üblicher Weise verarbeitet. Das Verf. ist besonders von Wichtigkeit, wenn es sich um die Herst. von elektr. Isolatoren für hohe Spannungen handelt, deren Wirksamkeit durch ungleichmäßige Zus. beeinträchtigt wird. (**A. P. 1569251** vom 1/3. 1923, ausg. 12/1. 1926.) **KÜHLING.**

Evans Lime Putty Co., Kansas City, Miss., übert. von: **David A. Evans**, Kansas City, *Löschen von Kalk*. Man läßt die gelöschte Kalkmasse, die überschüssiges H₂O enthält, absitzen, bis das W. die ganze M. vollkommen gesätt., worauf man das W. vom Boden der M. aus abzieht. (**A. P. 1566587** vom 1/12. 1924, ausg. 22/12. 1925.) **KAUSCH.**

K. P. Billner, Stockholm, *Bindemittel*. Portland- oder anderer Zement wird mit geringen Mengen (0,3—2%) gepulvertem Al oder Zn oder einer Mischung von beiden u. gegebenenfalls CaO vermengt. (**E. P. 244 963** vom 11/3. 1925, ausg. 21/1. 1926.) **KÜHLING.**

O. Simon, Berlin-Lankwitz, *Wasserdichter Zement und Mörtel*. Die wasserdicht zu machenden Stoffe werden vor, während oder nach dem Mahlen mit einem feiner als Portlandzement gemahlenen Stoff, z. B. Asche, bituminösem Gestein, Gips, Kieselgur, Kohle oder Pyrolusit vermischt. Die Wrkg. wird verstärkt durch Mitverwendung von Alkalien, CaCl₂, MgCl₂, Säuren, bituminösen Stoffen, Zellstoffablauge oder mittels durchgeleiteter elektrischer Ströme. (**E. P. 244 603** vom 22/1. 1925, ausg. 14/1. 1925.) **KÜHLING.**

W. J. S. Dufton, **T. Obank**, **W. J. Obank** und **L. S. Obank** (in Firma: **Dufbank Tile Co.**), Bradford, *Zementmischungen*. Gegebenenfalls Füllmittel, wie

Magnesit, Glaspulver, Sand o. dgl. enthaltender Zement wird mit Casein, Albumin oder Protein, mit Ton, Ölen, Fetten u. dgl., welche Fettsäuren, besonders *Sebacinsäure* enthalten, u. gegebenenfalls Schwefel gemischt. (E. P. 244973 vom 27/3. 1925, ausg. 21/1. 1926.) KÜHLING.

James Thomas, Montrose, V. St. A., *Künstliche Steine*. Breiige, gegebenenfalls gefärbte Mischungen von „Keenes Zement“ u. W. werden in eine Form gegossen, mittels trockenen gefärbten Zementes Aderungen erzeugt u. der M. durch Einführung von stückenförmigen Zement ein gesteinsartiges Aussehen gegeben. Mehrere solcher Schichten werden übereinander angeordnet. (A. P. 1 570 538 vom 24/3. 1925, ausg. 19/1. 1926.) KÜHLING.

Andrew Knutson, Saskatoon, V. St. A., *Kunststeine*. Die Kunststeine werden erzeugt aus MgO, Asbestpulver, Asche, W. u. MgCl₂. (Can. P. 252 084 vom 16/5. 1925, ausg. 28/7. 1925.) KÜHLING.

Société d'Étude des Agglomérés, Paris, übert. von: **Frédéric Charles Fridtjof Le Coultre**, *Feuerfeste Massen*. (A. P. 1 565 472 vom 9/10. 1924, ausg. 15/12. 1925. — C. 1925. I. 888.) KÜHLING.

Metal & Thermit Corp., Chrome, übert. von: **Simon J. Lubowsky**, Jersey City, V. St. A., *Feuerfeste Gegenstände*. (A. P. 1 567 445 vom 18/12. 1922, ausg. 29/12. 1925. — C. 1925. I. 1788 [F. P. 576 489].) KÜHLING.

Celite Co., Los Angeles, übert. von: **Webb T. Irvin**, Lompoc, V. St. A., *Wärmeschutzmassen*. Kieselgur, ein Erdalkali, besonders CaO u. Asbest, werden unter Zuführung von W. u. Dampf gut gemischt, geformt, gepreßt u. getrocknet. (A. P. 1 569 755 vom 24/12. 1924, ausg. 12/1. 1926.) KÜHLING.

Chicago Crucible Co., übert. von: **Adolph F. Hottinger**, Chicago, V. St. A., *Feuerfeste Gegenstände*. Hitzebeständige Stoffe werden mit l. Silicaten gemischt, die Mischungen geformt, durch Erhitzen entwässert, mit weiteren Mengen l. Silicats bestrichen u. bis zum Schmelzen des letzteren erhitzt, wobei sich eine Glasur bildet. (Can. P. 247 522 vom 12/5. 1923, ausg. 10/3. 1925.) KÜHLING.

Corning Glass Works, übert. von: **Jesse T. Littleton**, Corning, V. St. A., *Feuerfeste Erzeugnisse*. Ein in der Hitze nicht zersetzlicher u. nicht flüchtiger Stoff wird geschmolzen, die geschmolzene M. geformt u. mit ungeschmolzenem gekörntem Stoff von ungefähr gleicher Zus. gemischt. (Can. P. 247 523 vom 26/5. 1924, ausg. 10/3. 1925.) KÜHLING.

Deutsche Gasglühlicht-Auer-Ges., Berlin, *Feuerfeste Massen*. Reines ZrO₂ wird mit bis zu 5% eines Erdalkalioxydes gemischt u. die Mischung entweder unmittelbar bei Temp. von 1800—2000° gebrannt oder zunächst bei etwa 1300° gesintert u. dann bei höherer Temp. gebrannt. (E. P. 245 101 vom 16/12. 1925. Auszug veröff. 17/2. 1926. Prior. 24/12. 1924.) KÜHLING.

George Sylvin Loy, Seine, Frankreich, *Feuerfeste Stoffe*. Man vermischt pulverisierte Kohlenasche mit einer etwa 30% Al enthaltenden Tonerde; das Pulver wird dann mit Ton vermischt, geformt u. gebrannt. (F. P. 598 387 vom 2/9. 1924, ausg. 15/12. 1925.) FRANZ.

J. W. Hand und **F. H. Ebner**, London, *Fußböden*. Über einer aus Holzmehl u. MgO bestehenden Schicht wird eine dünne Schicht angeordnet, welche aus Ton, MgO u. MgCl₂-Lsg. besteht. (E. P. 244 556 vom 23/10. 1924, ausg. 14/1. 1926.) KÜHL.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

E. Blanck und **F. Alten**, Über „*Surophosphat*“ oder „*Dasadiünger*“. In den Gefäßverss. der Vff. war das Düngemittel ohne jede Wrkg. (Journ. f. Landw. 74. 39—49.) TRÉNEL.

E. Blanck und **A. Hahne**, *Untersuchungen und Versuche mit Kalksalpeter der Badischen Anilin- und Sodafabrik*. Bzgl. der N-Wrkg. erwies sich der Kalksalpeter

dem NaNO_3 gleichwertig, bzgl. seiner Wrkg. auf die Verschlechterung der Bodensubstrukt ist er letzterem vorzuziehen. (Journ. f. Landw. **74**. 51—64.) TRÉNEL.

Ch. Brioux und J. Pien, Vergleich der befruchtenden Wirkung von verschiedenen Stickstoffarten, welche in den neuen harnstoffartigen Stickstoffdüngern, den Derivaten des Cyanamids, vorkommen. 400 g Pflanzenerde wurden mit 0,33 g N_2 in verschiedenen Formen versetzt. Nach 50 Tagen betrug der Gehalt an N_2 als Nitrat: ohne Düngung 0,071 g, mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 0,257 g, mit Guanylharnstoffsulfat 0,065 g, mit Dicyandiamid 0,006 g. Außerdem wurden Versuchskulturen mit Mais u. weißem Senf mit den verschiedenen Düngern angepflanzt, aus denen sich ebenfalls der geringe Wert des als Dicyandiamid u. Guanylharnstoff gebundenen N_2 ergibt. Es werden aufgenommen von NaNO_3 70,3%, von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 68%, von Cyanamid 64,6%, von Harnstoff 63,1%, von Phosphat + Harnstoffnitrat 64,0%, von Guanylharnstoffsulfat 13,2% u. von Dicyandiamid 6% des zur Düngung verwandten N_2 . Es muß also bei der Herst. der Düngemittel aus Cyanamid darauf gesehen werden, daß diese Stoffe sich nicht bilden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 410—12.) ENSZLIN.

Walther Herzog, Die neuere Entwicklung der Schädlingsbekämpfung mittels Blausäure. Vf. beschreibt die Vergasung mit „Zyklon B“ der „Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung“, Kieselgur mit HCN u. Chlorameisensäureestern als Warnungsmittel getränkt. (Österr. Chem.-Ztg. **29**. 27—28. Wien.) JUNG.

Alex Wendler, Charlottenburg, Erhöhung des Bodenertrages an Pflanzen und Früchten, dad. gek., daß der Boden mit wetterbeständigem, wasserdichtem Bodenbelag, wie Papierbahnen oder Papierflächen u. ähnlichem, bedeckt wird, die Stromleiter enthalten. — Durch die Leiter wird Strom geführt. Die gemeinschaftliche Anwendung der Elektrizität u. des Bedeckens des Bodens mit die Verdunstung des W. verhindernden Belägen soll die Erträge beträchtlich steigern. (D. R. P. **424 767** Kl. 45 I vom 23/4. 1925, ausg. 2/2. 1926.) KÜHLING.

Rudolf Maag, Dielsdorf, Schweiz, Pflanzenschutzmittel. Pasten von Bleiarseniat werden mit Seife, Casein, Sulfitzellstoffpech u. dgl. vermischt. Die Zusätze verhindern die Entmischung der beim Verdünnen mit W. entstehenden Aufschwemmungen. (Schwz. P. **106 494** vom 12/10. 1923, ausg. 1/9. 1924.) KÜHLING.

Hugo Wertheim, Wien, Bakterielle Schädlingsvertilgungsmittel mit erhöhter Wirksamkeit. Den Mitteln, z. B. Nährlsgg. von Mäuse- oder Rattentyphusbakterien werden pulverförmige, aber scharfkantige Füllmittel, z. B. Kieselgur, beigemischt, welche die inneren Schleimhäute der (tier.) Schädlinge beschädigen. (Oe. P. **100 223** vom 17/4. 1924, ausg. 25/6. 1925.) KÜHLING.

Barberis & Segliè, Turin, Bekämpfung von Pflanzenschädlingen, besonders Phylloxera. Gegebenenfalls in üblicher Weise von Phenolen befreites schweres Teeröl wird mit Schwefel u. Seifen, vorzugsweise Schmierseifen vermischt. Das Mittel wird in wss. Suspension oder im Gemenge mit inerten festen Stoffen u. Düngemitteln benutzt. (Schwz. P. **106 489** vom 20/7. 1923, ausg. 16/8. 1924, F. P. **568 994** vom 24/7. 1923, ausg. 4/4. 1924. Ital. Prior. 5/8. 1922, Schwz. P. **106 490** vom 20/7. 1923, ausg. 16/8. 1924 u. F. P. **568 995** vom 24/7. 1923, ausg. 4/4. 1924. It. Prior. 12/10. 1922.) KÜHLING.

Rudolf Maag, Dielsdorf, Schweiz, Ungeziefervertilgung. p-Dichlorbenzol wird in den zu entwesenden Räumen verstäubt. (Schwz. P. **106 493** vom 12/10. 1923, ausg. 16/8. 1924.) KÜHLING.

Rudolf Maag, Dielsdorf, Schweiz, Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen. CS_2 wird mittels Petroleifen oder Lsgg. der Alkaliseifen der Sulfosäuren vegetabil. Öle, besonders des Rizinusöls, in Emulsion gebracht. Zweckmäßig wird len Lsgg. noch Phenol, p-Dichlorbenzol u. dgl. zugesetzt. (Schwz. P. **106 495** vom 12/10. 1923, ausg. 1/9. 1924.) KÜHLING.

Walter Ilisch, Quakenbrück, Prov. Hannover, *Bekämpfung von Pflanzenschädlingen*. Den zu schützenden Pflanzen werden durch die Wurzeln l. Bestandteile anderer Pflanzen zugeführt, welche von den zu bekämpfenden Schädlingen nicht befallen werden. Geeignet sind Säfte oder Auszüge der Tomate, des Rhabarbers, Tabak, von Papaver, Digitalis, Delphinium usw. Den Fll. können geeignete Chemikalien zugesetzt werden. (Schwz. P. 109 831 vom 26/3. 1924, ausg. 16/4. 1925. D. Prior. 4/4. 1923.) KÜHLING.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Anton Apold und **Hans Fleissner**, *Über das Rösten und Brennen von Erzen, Kalkstein u. dergl.* Das beschriebene Verf. beruht darauf, daß das Rösten oder Brennen durch Überleiten von h. Gasen ausgeführt wird. (Chem.-Ztg. 50. 156—57.) JUNG.

A. M'Cance, *Reaktionsgleichgewichte bei der Eisengewinnung*. Es werden die Gleichgewichte bei der Red. durch CO besprochen, u. die Kurven wiedergegeben, die das Gleichgewicht zwischen Fe u. Kohlenstoffoxyden veranschaulichen: $\text{FeO} + \text{CO} = \text{Fe} + \text{CO}_2$, $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO} = 3\text{FeO} + \text{CO}_2$ und unter 503° $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{CO} = 3\text{Fe} + 4\text{CO}_2$. Weiter wird die Red. durch H_2 behandelt: $\text{FeO} + \text{H}_2 = \text{Fe} + \text{H}_2\text{O}$, $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2 = 3\text{FeO} + \text{H}_2\text{O}$ u. unter 503° $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2 = 3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}$, die Dissoziation der Eisenoxyde: $\frac{1}{2}\text{Fe}_3\text{O}_4 = \frac{3}{2}\text{Fe} + \text{O}_2$; $2\text{Fe}_3\text{O}_4 = 6\text{FeO} + \text{O}_2$, die Red. der Eisenoxyde durch C: $2\text{CO} = \text{CO}_2 + \text{C}$, $\text{FeO} + \text{C} = \text{Fe} + \text{CO}$, $2\text{FeO} + \text{C} = 2\text{Fe} + \text{CO}_2$ (das entstandene Gasgemisch erreicht bei 710° den Druck von 1 at) u. entsprechend $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{C} = 3\text{Fe} + 3\text{CO}$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} = 2\text{Fe} + 3\text{CO}$. Einen breiteren Raum nimmt die Desoxydation von fl. Stahl ein. Zuerst wird unabhängig von ROSENHAIN u. HANSON die Löslichkeit von Eisenoxyd in festem Fe bei etwa 1200° u. dementsprechend auch in fl. Fe bewiesen. Fe, das mit FeO bei 1500° gesättigt ist, u. dem soviel Mn zugesetzt wird, daß 0,5% Mn in der Mischung bleibt, wird bis zu 81,7% desoxydiert. Es ist nicht möglich, durch größeren Zusatz von Mn sämtliches FeO restlos zu entfernen. Ähnlich wird die reduzierende Wrkg. des Si behandelt. Dann wird die theoret. ermittelte relative Desoxydationswrkg. von Mn u. Si mit den prakt. Ergebnissen verglichen u. die rund 5-fache Mn-Menge im Vergleich zur 1-fachen Si-Menge einwandfrei festgelegt. Aber auch durch Si-Zusatz ist es nicht möglich, den restlichen O_2 -Gehalt von 0,04—0,05% des oxydierten Fe noch weiter zu erniedrigen. Am wirksamsten ist Al, es braucht nur in geringen Mengen zugesetzt zu werden, um große Wrkgg. zu erzeugen. Eine Zahl für relative Desoxydationswrkg. kann nicht genau angegeben werden, die Wrkg. ist bei 1600° etwa 1000° stärker als bei Mn. — Der Einfluß der Desoxydationsmittel auf Gase wurde auch einer Unters. unterzogen. Es kann angenommen werden, daß Al, Si u. Mn bei Temp. der Stahlgewinnung CO_2 reduzieren, aber nur Al reduziert CO merkbar. Si u. Mn reduzieren nur einen sehr kleinen Teil dieses im Fe gelösten Gases u. dieser geringe Betrag wird mit steigender Temp. noch kleiner. Entsprechend der geringen Konz. der Gase geht die Rk. langsam vor sich u. gebraucht längere Zeit bis zur Vollendung. Es sind Gründe zur Annahme vorhanden, daß CO_2 bedeutend weniger l. im Fe als CO ist u. daß CO_2 letzten Endes die Ursache der Blasen im Fe ist. Zum Schluß wird die Red. von SiO_2 in den sauren Schlacken u. die B. der Einschlüsse besprochen. (Trans. Faraday Soc. 21. 176 bis 201. 1925.)

WILKE.

Peter M. Macnair, *Schlackenreaktionen*. Es werden die Rkk. zwischen Schlacke u. Futter in dieser Arbeit behandelt. Die dabei angegebene Viscosität der Schlacken ist nicht das Ergebnis genauester Unterss., sondern soll nur einen ungefähren Anhalt geben. Im sauren Prozeß absorbiert die Schlacke SiO_2 oder ändert sich ähnlich in der Zus. durch Red. von FeO. Bei einem Gehalt von 60% SiO_2 ist die Schlacke bei den üblichen Ofentemp. sehr viscos, u. zwar wird sie bei über 40% SiO_2 , wenn sie Fe-haltig ist, stärker viscos als der SiO_2 -Gehalt steigt. Dadurch wird die Schlacke reaktionsträge. Wird Fe-Erz in diesem Falle zugesetzt, so geht FeO in die Schlacke,

vermindert den SiO_2 -Gehalt durch Verdünnung, die Schlacke wird dünnfl., die Rkk. beginnen von neuem bis sie wieder zum Stillstand kommen. Beim sauren Siemens-Martin-Prozeß hat bei dickfl. Schlacken von rund 58—62% SiO_2 der Gehalt an CaO , FeO u. MnO keinen Einfluß mehr. Im bas. Prozeß wird die Schlacke inakt. bei etwa 60% CaO , 40% SiO_2 , wenig FeO u. bei 1600°, während bei steigenden Beträgen von FeO u. MnO der SiO_2 -Gehalt sich verringert. Mit höherem SiO_2 -Gehalt wird die Schlacke wieder fl. u. greift das Futter an, bei niedrigerem Gehalt neigen feste CaO -Teilchen dazu, auf der Oberfläche zu schwimmen. Die Bedingungen für gute Bindung von P_2O_5 in der bas. Schlacke sind bei geringem FeO - u. MnO -Gehalt (weniger als 3%) ungefähr 40% $\text{SiO}_2 + \text{P}_2\text{O}_5$; dieser Grenzbetrag fällt mit steigendem Gehalt an den flüssigeren Basen. (Trans. Faraday Soc. 21. 243—48. 1925. Univ. Coll., Swansea.)

WILKE.


W. J. Rees, *Die Mikrountersuchung der bei der Stahlgewinnung benutzten feuerfesten Materialien*. Einige Beispiele zur Unters. solcher Materialien werden gegeben (z. B. Unterscheidung von Quarz, Tridymit von Kristobalit). (Trans. Faraday Soc. 21. 293—96. 1925.)

WILKE.


J. H. Whiteley, *Die Funktion von Ferrioxyd in sauren und basischen Schlacken von Siemens-Martin-Ofen*. Der Ausdruck Ferrioxyd ist nicht als bestimmtes Prod. gedacht, denn das bei 1350° magnet. werdende Oxyd (FeO , Fe_2O_3) ist mit einbegriffen. Fe_2O_3 wirkt als Sauerstoffüberträger, u. zwar im bas. Prozeß stärker als im sauren, was wohl auf den höheren Fe_2O_3 -Gehalt zurückzuführen ist. Außerdem besteht eine bestimmte Beziehung zwischen dem Gehalt der beiden Säuren SiO_2 u. P_2O_5 u. dem Fe_2O_3 , was an einem Diagramm Mol.-% $\text{SiO}_2 + \text{P}_2\text{O}_5$ u. % Fe_2O_3 gezeigt wird. Der Betrag der Oxydation durch das Gas steigt also mit der Basizität der Schlacke, so daß es z. B. mit einer hochbas. Schlacke möglich sein müßte, eine hoch C-haltige Charge ohne Anwendung von Erzen oder Hammerschlag fertig zu entkohlen. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß sich eine Verb. zwischen Fe_2O_3 u. CaO bilden kann, entsprechend dem vorhandenen freien CaO . (Trans. Faraday Soc. 21. 249—54. 1925.)

WILKE.

T. P. Colclough, *Eine Untersuchung der Reaktionen beim basischen Siemens-Martin-Ofen*. Si ist das erste Element, das im bas. Ofen oxydiert wird:



Es steigt als SiO_2 empor u. verbindet sich mit den bas. Oxyden zu einem Monosilicat. Red. tritt bei den üblichen Tempp. nicht ein. — Die Rk. $\text{C} + \text{FeO} \rightleftharpoons \text{CO} + \text{Fe} - 36 \text{ cal}$ ist endotherm u. geht meistens restlos von links nach rechts. Die Oxydation des P geht nach $2\text{P} + 5\text{FeO} \rightleftharpoons \text{P}_2\text{O}_5 + 5\text{Fe} + 37 \text{ cal}$. Das gebildete P_2O_5 ist aber unter den herrschenden Bedingungen unbeständig u. reagiert nach:



außerdem kann der Kalk ebenfalls reagieren nach $4\text{CaO} + \text{P}_2\text{O}_5 = 4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$.

Unter bestimmten Umständen greift der P auch das Mn der Schlacke an:



Die Oxydation von C u. P hängt also in erster Linie von der Basizität der Schlacke ab. — Die Verteilung des Mn zwischen Metall u. Schlacke ist noch ein ungelöstes Problem. Es finden folgende Rkk. statt: $\text{Mn} + \text{FeO} \rightleftharpoons \text{MnO} + \text{Fe} + 26 \text{ cal.}$, außerdem $\text{C} + \text{MnO} \rightleftharpoons \text{CO} + \text{Mn} - 63 \text{ cal}$ u. die oben erwähnte Rk. mit P, in beiden letzten Rkk. ist die Basizität der Schlacke wiederum wesentlich. Zum Schluß werden Unterlagen gegeben für die Parallelität zwischen der Mn-Verteilung u. der Entschwefelung, weiter die Bedingungen für die Entfernung des S besprochen u. auf die Möglichkeit der B. einer Verb. von Kalk u. Ferrioxyd-Calciumferrit bei bestimmten Schlacken hingewiesen. (Trans. Faraday Soc. 21. 202—23. 1925.)

WIL.

E. F. Northrup, *Induktionserwärmung*. Übersicht über dieses Gebiet einschließ-
VIII. 1.

lich des S. 1026 beschriebenen Hochfrequenzinduktionsofens. (Journ. Franklin Inst. 201. 221—44. Ajax Electrothermic Corp.) WILKE.

Frank T. Sisco, *Die chemischen Reaktionen im basischen elektrischen Verfahren*. (Trans. Faraday Soc. 21. 224—39. 1925. — C. 1926. I. 1880.) WILKE.

John Bright Ferguson, *Gleichgewichte in Ferroxyd-Systemen*. Theoret. Betrachtungen u. Vergleiche der Ergebnisse des bisherigen Schrifttums. (Trans. Faraday Soc. 21. 240—42. 1925. Univ. Toronto.) WILKE.

B. Bogitch, *Über die Legierungen Eisen-Eisensulfid*. Kein Gemisch von in Abwesenheit fremder Stoffe geschmolzenem Fe-FeS gibt Veranlassung zur B. von 2 fl. Phasen. Erfolgt die Schmelzung in Anwesenheit gewisser Körper in veränderlichen Anteilen, so erhält man entweder sehr verschiedenartige Metalle oder doppelte Lagen. Im letzten Fall ist die Rolle des C besonders bemerkenswert, da er eine Versetzung des S in dessen Legierungen mit dem Fe hervorruft. O bewirkt in Fe-FeS-Gemischen Segierungen, ebenso Cu. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 217—19.) KALPERS.

Francis W. Rowe, *Ermüdungsfehler im Stahl*. Zuerst werden einige der allgemeinen Probleme der Ermüdungserscheinungen mit Beispielen besprochen, besonders hinsichtlich der Zugverstärkungen an scharfen Querschnittänderungen einschließlich der Wrkg. der Oberflächenrisse u. auch hinsichtlich des Mangels der Beziehungen zwischen der Dauerfestigkeit des Stahls u. seiner hauptsächlichsten mechan. Eigenschaften. Dann werden einige interessante Beispiele typ. Ermüdungserscheinungen beschrieben u. gleichzeitig die falsche metallurg. Behandlung oder die Konstruktionsfehler erläutert. (Metal Ind. [London] 28. 133—35. 157—59. 185—86.) WILKE.

R. A. Hadfield, *Physikalische Chemie bei der Stahlherstellung*. Nach einer kurzen Zusammenfassung des bisher Geleisteten stellt Vf. einige Hauptprobleme fest, die allgemeines Interesse haben: 1. Unters. des Gleichgewichts in der Schlacke, das der Schlüssel zu den Rkk. im Fe ist. 2. Ursache der Schlackeneinschlüsse im Fe u. Mittel zu ihrer Beseitigung. 3. Rk. zwischen dem geschmolzenen Metall u. dem feuerfesten Material der Öfen u. die Bedingungen des Eindringens der Oxide. 4. Unters. der physikal. Eigenschaften der Schlacken bei hohen Temp., Viscosität, Flüssigkeit, Oberflächenspannung. 5. Unters. der Art des Ingotabkühlens, die Aufschluß über die Entmischung u. die physikal. Eigenschaften der Segregate geben würde. (Trans. Faraday Soc. 21. 172—75. 1925.) WILKE.

Léon Guillet, *Über die Eigenschaften gewisser behandelter Nickel-Chromstähle*. Unter gewissen Bedingungen werden verschiedene Sonderstähle bei der therm. Behandlung sehr spröde, während die anderen mechan. Eigenschaften ziemlich konstant bleiben. Diese Erscheinungen wurden an Stählen untersucht, die aus 0,26% C, 3,76% Ni, 0,67% Cr, 0,54% Mn, 0,11% Si, 0,037% S u. 0,021 %P bestanden. In dem einen Falle fand die Abkühlung nach einem ersten Anlassen langsam mit nachfolgendem wiederholten Anlassen u. schnellerer Abkühlung statt, im anderen Falle erfolgten die Abkühlungsarten umgekehrt. Es wurde festgestellt, daß der Stahl nach der 2. Behandlungsart spröder geworden ist. Diese Sprödigkeit verliert sich wieder bei 200°. Das Mikrogefüge zeigt in beiden Fällen keine Veränderung, ebenso geben die Dilatationsvers. u. die Thermoelektrizität keine Auskunft. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 249—51.) KALPERS.

Albert Portevin und Francois Le Chatelier, *Über einige physikalische Eigenschaften der Ultraleichtlegierungen von Magnesium*. Zweck der vorgenommenen Unters. war die Best. der D., Ausdehnbarkeit u. des elektr. Widerstandes von Ultraleichtlegierungen des Mg unter Zusatz von Al, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Si, Zn. Unter Berücksichtigung der festgestellten mechan. Eigenschaften erscheinen am bemerkenswertesten von den binären Legierungen die Mg-Ni- u. Mg-Cu-Legierungen, von den ternären die Mg-Al-Ni- u. Mg-Al-Cu-Legierungen, die die beste D., Elastizität, Härte, Wärme-

leitfähigkeit u. die für gewisse Verwendungszwecke notwendige Ausdehnbarkeit (z. B. für Motorkolben) vereinen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 382—84.) KALPERS.

Robert J. Anderson, *Schmelzen zweiten Aluminiums und Aluminiumlegierungen*. III. *Zusammensetzung und Bewertung von hoch aluminiumhaltigem Abfall*. (II. vgl. Metal Ind. [New York] **23**. 10; C. **1925**. I. 1907.) Große Unsicherheit herrscht über die chem. Zus. der Gekrätze vom Al u. den Al-Legierungen. Eine typ. Analyse des Gekrätzes einer Al-Legierung (Nr. 12 Legierung), die durch übliches Schmelzen erhalten wird, ist wie folgt: 14,23% SiO₂, 4,47% CuO, 13,43% Fe₂O₃, 64,70% Al₂O₃ u. 3,04 ZnO. Das Material was zuerst gesiebt worden, um alle Metalle zu entfernen. Die Probenahme u. der Schmelzvers. mit der Probe, zwecks Feststellung des Wertes des Gekrätzes, wird beschrieben. Der Schmelzvers. wird sowohl im Betrieb wie auch im Laboratorium ausgeführt u. das gewonnene Metall analysiert. So kann man oft z. B. 56% wiedergewinnbares Metall feststellen, in dem kein Fe, 12% Cu, 40% Zn u. 47% Al enthalten sind. Bohrspäne werden in gleicher Weise untersucht. Ein typ. Resultat hierfür ist: 3% Öl, 6% Schmutz, 88% Metall, davon 3% magnet. Fe, 0,9% Fe, 8,4% Cu, 0,4% Zn u. 90,3% Al. Zum Schluß wird eine Berechnung des Preises aus den Ergebnissen einer solchen Schmelzanalyse gegeben. (Metal Ind. [New York] **24**. 63—65.) WILKE.

E. D. Campbell, *Eine Untersuchung der Beziehung des remanenten Magnetismus zum spezifischen Widerstand einiger reiner Eisen-Kohlenstoff-Legierungen*. Das Anwachsen des spezif. Widerstandes ist stets der Carbidkonz. proportional. Der magnet. Widerstand steigt langsamer als der spezif. bis zu der eutektoiden Konz. an, aber schneller in den übereutektoiden Stücken. Diese Änderung im magnet. Widerstand zeigt an, daß man freien Ferrit haben muß, um den Widerstand niedrig zu halten. Die innere magnetomotor. Spannung steigt schnell mit wachsendem Carbidgehalt bis zu einem Maximum bei rund 0,60%, nachdem findet nur noch geringes oder kein weiteres Anwachsen mit steigendem Carbidgehalt statt. Kein anderer im Fe gelöster Bestandteil scheint eine so starke magnetomotor. Spannung zu haben wie die gel. Carbide. (Trans. Faraday Soc. **21**. 338—48. 1925. Univ. Michigan.) WILKE.

Francis F. Lucas, *Metallographie mit starker Vergrößerung. Einige neueste Fortschritte in der Photomikrographie und der metallurgischen Untersuchungen*. Nach einer Einführung in die Metallographie mit starker Vergrößerung werden an Hand zahlreicher Mikrophotographien mit 3230-facher Vergrößerung einige Unterss. besprochen. 0,5% C enthaltendes Fe, gewalzt u. normalisiert, wurde mit dem einen Ende auf hohe Temp. erhitzt, während das andere auf Raumtemp. blieb, dann wurde das Ganze in einer Eis- u. Salzwasserlsg. abgeschreckt. Der Längsschnitt wurde zuerst mit einer 5%ig. alkohol. Pikrinsäurelsg. geätzt, die Ferrit, aber nicht Eisencarbid angreift. Der ganze Schliff wurde vom harten zum weichen Ende hin untersucht u. in Zwischenräumen photographiert, so daß man hier ein Bild der stattgefundenen Härtung bekommt. Am harten Ende besteht die Grundmasse aus Austenit u. Martensit. Längs einiger Martensitnadeln haben sich dunkle Troostitstreifen gebildet, im Innern einiger Troostitflächen ist ein weißer Bestandteil zu sehen, Ferrit. Der Troostit vermehrt sich dann u. umgibt teilweise größere Flächen der Austenit- u. Martensitgrundmasse. Der freie Ferrit im Innern des Troostits wird größer. Der Troostit vermehrt sich dann immer weiter, wird aber körniger, nimmt dann ab u. zeigt große Flächen von freiem Ferrit, um dann fast zu verschwinden. Der übrig gebliebene Troostit erscheint nun leicht gestreift u. kleine schwarze Punkte sind auf den Austenit- u. Martensitflächen (Ferritbildung) zu sehen, die sich stark vermehren, sich verlängern, u. schließlich ist auf diesen Flächen lamellarer Perlit. Der restliche Troostit, der vollständig gestreift ist, orientiert sich nach den benachbarten Körnern. Dann wird der knotenförmige Troostit u. die Kaltarbeit u. Rekristallisation behandelt. (Journ. Franklin Inst. **201**. 177—216. Bell Telephone Lab., New York City.) WILKE.

—, *Das Schmieden mit dem Fallhammer bei den Nichteisen-Legierungen.* I. Aluminiumlegierungen. II. Kupfer und Messing. Beim Duraluminium, Y-Legierung, Cu u. den hauptsächlichsten warm bearbeiteten Messingsorten wird dies Schmieden in seinen Einzelheiten beschrieben. (Metal Ind. [London] **28**, 149—52, 197—99.) WIL.

Alexander L. Feild, *Physikalisch-chemische Erscheinungen von der Schmelze bis zum Ingot.* Es wird beschrieben: die Kinetik der Oxydation im Metallbad (C, Mn, Si, P u. S), die chem. Wrkg. der Ofengase, das Gleichgewicht $Mn + FeO \rightleftharpoons Fe + MnO$ in der Metallphase, das Gleichgewicht $C + Fe \rightleftharpoons Fe + CO$ im Metallbad, die Beziehung zwischen der tatsächlichen Verteilung des Eisenoxys zwischen Schlacke u. Metall u. der theoret. Gleichgewichtsverteilung, die desoxydierende Wrkg. der Fe-Mn-Zusätze, die Rkk. des Fe, das nur mit Fe-Mn desoxydiert worden war, nach dem Guß, die Gießpfannenrkk. des mit Si desoxydierten Fe u. die relative Desoxydation u. Reinigung von Mn u. Si. Auf die reichhaltige Arbeit u. die umfangreiche Aussprache über diesen Gegenstand sei hiermit besonders hingewiesen. (Trans. Faraday Soc. **21**, 255—92, 1925, New York.) WILKE.

H. E. Haring, *Chromierung von Druckplatten.* (Metal Ind. (New York) **24**, 68—69. — C. 1926. I. 485.) WILKE.

Emil Bruce Pratt, East Cleveland, V. St. A., *Reduktion von Metalloxyden.* Metalloxyde oder Metalloxyde enthaltende MM., vornehmlich oxydische Eisenerze, werden mit KW-stoffen gemischt, in feuerfesten Röhren bis zur unter Kohlebildung verlaufenden Zersetzung der KW-stoffe erhitzt u. dann in einen elektr. geheizten Tiegel übergeführt. (Can. P. **250 234** vom 12/6. 1924, ausg. 2/6. 1925.) KÜHLING.

Thomas James Taplin jr. und **Metals Production, Ltd.**, London, *Auslaugen von Kupfererzen.* Die Kupfererzschlämme werden erst vom Sand befreit u. dann in eine große Menge ammoniakal. Lösungsfl. unter Belüftung gebracht. Die resultierende Lauge wird zum Auslaugen des Sandes benutzt. (E. P. **213 343** vom 1/1. 1923, ausg. 24/4 1924.) KAUSCH.

E. G. Bek, Pforzheim, *Überzüge von Edelmetallen auf unedlen Metallen.* Die zu überziehenden Metalle werden sorgfältig gereinigt, gegebenenfalls auf elektrolyt. Wege durch Tauchen oder Verreiben mit einer dünnen Schicht eines oder mehrerer anderer Metalle überzogen, dann als Kathode bei der Elektrolyse von Edelmetallsgg., vorzugsweise Cyanidsgg., verwendet u. die hierbei gewonnenen Erzeugnisse einer Hitzebehandlung unterzogen. (E. P. **244 487** vom 11/12. 1925, Auszug veröff. 10/2. 1926, Prior. 11/12. 1924.) KÜHLING.

Vladimir A. Samelson, New York, übert. von: **Adolph Abele**, Berlin, *Löten von Gußeisen.* Die zu verlötenden Flächen werden mit durch Red. von Eisenverb. mittels H_2 gewonnenem reinen Fe, Borax, MnO_2 u. HgO bedeckt u. dann geschmolzenes Cu darauf gebracht. (Can. P. **251 323** vom 9/6. 1924, ausg. 30/6. 1925.) KÜHLING.

F. Rathjen, Hamburg und **M. Ragg**, Wentorf, Holstein, *Rostschützende Farben.* Bleioxyde, wie PbO oder Pb_3O_4 , Bleiweiß u. ähnliche Bleiverbb. werden mit organ. Stoffen „von bas. oder indifferenter Natur“, wie Vaseline, Paraffin, Ceresin, Schmieröl, Anthracenöl, Kohlenwasserstofföle, Phenole u. dgl. unter Luftabschluß auf etwa 300° erhitzt. Flüchtige KW-stoffe, Leucht- oder Wassergas, können über die erhitzten Bleiverbb. geleitet werden. Die Erzeugnisse werden mit Bindemitteln u. gegebenenfalls Kupfer- oder Arsenverb. gemischt. (E. P. **244 481** vom 11/12. 1925, Auszug veröff. 10/2. 1926, Prior. 11/12. 1924.) KÜHLING.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

J. Bocquet, *Gefahren der Trockenreinigung (Benzinwäsche).* Angaben über Explosions- u. Feuerverhütung, Verwendung besonderer Seifen, Entfernung von Luft aus den Waschmaschinen, Handhabung u. Aufbewahrung des Bzn., Einrichtung

der Arbeitsräume, allgemeine Verhaltensmaßregeln, Löschen. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 278—79. 309—10. 341.) SÜVERN.

Wa., *Wie werden farbige Seiden gebleicht?* Das Arbeiten mit H_2O_2 , Na_2O_2 u. SO_2 ist beschrieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 67.) SÜVERN.

Jos. Pokorny, *Reduktionskraft von Natriumhydrosulfit in alkoholischer Lösung.* Beim Bleichen von Tussahseide, welches näher beschrieben ist, ist die Mitverwendung von W. wesentlich. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 288.) SÜVERN.

—, *Die Verwendung von Natriumperborat zum Bleichen, in der chemischen Bleiche und beim Entfernen von Flecken.* Wegen seiner Verwendbarkeit für tier. u. für pflanzliche Fasern, seiner leichten Handhabung, seiner Luft- u. Lichtbeständigkeit wird NaBO_3 als das ideale Bleichmittel bezeichnet. Die verschiedenen Handelsformen, das Bleichen mit Dampf, Erzielung von Vollweiß, die Verwendung bei der chem. Bleiche werden besprochen. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 216—17. 249—50. Nach Wäscher-Zentralblatt 1924. 420. 431.) SÜVERN.

J. Merritt Matthews, *Wichtigkeit der Benzineiseife in der Kleiderfärberei und der Trockenreinigung.* Angaben über die Brandgefahr bei der Verwendung von Bzn., die dielektr. Eigenschaften des Bzn., die kolloidale Natur von Bzn.-Seifenlsgg. u. die Herst. der zur Verhinderung von Funkenbildung verwendeten Mg-Bzn.-Seife. (Color Trade Journal and Textile Chemist 1924. 79; Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 244—46.) SÜVERN.

P. Montavon, *Über einige mit Metallsalzen erzielte Farbtöne.* (Vgl. Rev. gén. des Matières colorantes etc. 11. 253.) Angaben über Manganbister, Preußischblau u. durch Überfärben von Preußischblau mit Chromgelb erzielbares Grün. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 230—31.) SÜVERN.

L. Eymer, *Beschleunigungsreaktionen, die in der Textilindustrie angewendet werden.* Als „Réactions par entraînement“ bezeichnet Vf. z. B. die Erleichterung der Oxydation von Anilin durch Zusatz von z. B. p-Phenylendiamin, den Zusatz von Anilinchlorhydrat im Chromierungsbad für unvergrünliches Anilinschwarz oder die Indigoätze mit $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, H_2SO_4 u. Oxalsäure. Nach einer Beobachtung von E. SCHLUMBERGER aus dem Jahre 1871 wirkt HNO_3 kaum auf Rosanilin u. seine Salze, zerstört aber Indigotin. Es gelang aber nicht, auf einem mit Indigo u. Fuchsin gefärbten Stoff durch HNO_3 Rosaätzen zu erzielen, die Färbung wurde nicht verändert. Aufbringen von Fe- oder Cu-Feile, von FeSO_4 oder SnCl_2 brachte die Ätzung zustande. Bringt man zwei verschieden oxydierbare Stoffe mit HNO_3 zusammen bei einer Temp. u. unter Bedingungen, daß bei getrennter Behandlung der Stoffe der eine oxydiert würde, der andere nicht, so hängt der Reaktionsverlauf von dem Mengenverhältnis der Stoffe ab. Auf eine Beschleunigungsreaktion läuft auch der Zusatz von FeSO_4 zu Appreturen hinaus, wo die Oxydation der Farbe auf dem Gewebe durch HNO_3 bewirkt wird, ferner die Behandlung mit Na_2SO_3 bei der Oxydation von S-Farbstoffen. SCHEURER hat ferner festgestellt, daß leicht verseifbare Fette die Verseifung schwerer verseifbarer beschleunigen. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 325. 352—53.) SÜVERN.

—, *Echtheitsversuche mit Wollfärbungen.* Vier verschieden scharfe Waschechtheitsprüfungen u. ihnen entsprechende Farbstoffe werden angegeben. (American Dyestuff Reporter 1925. 228; Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 307—08. 340.) SÜ.

Leslie Ewart Morris, *Mehltau auf Baumwollwaren. Das Wachsen von Schimmelpilzen auf Schlichte- und Appreturmitteln.* Die wichtigsten Schlichte- u. Appreturmittel wurden auf ihre Fähigkeit untersucht, Pilzwachstum zu begünstigen. 7 verschiedene auf Baumwolle wachsende Pilze wurden auf Stärke u. Agar gezogen, ihr Wachstum auf den Schlichte- u. Appreturmitteln geprüft u. festgestellt, wann Sporenbildung eintrat. Am schnellsten wachsen die Pilze auf Weizen-, Reis- u. Cassavamehl, auf Dextrinen tritt nach einiger Zeit ein langsames Wachstum ein. In der

Mitte stehen Weizen- u. Maisstärke, Traganth u. l. Stärke. Am wenigsten neigen zu Pilzwucherungen Tapiocamehl (Cassavastärke), Sago u. Mehl. Mit NaOH-Lsg. behandeltes Mehl läßt Pilze nicht mehr wachsen. Das bessere Wachsen auf Mehlen als auf Stärken wird ihrem Zucker- u. N-Gehalt zugeschrieben. (Journ. Textile Inst. 17. T 1—22.) SÜVERN.

Leslie Ewart Morris, *Mehltau auf Baumwollware. Das Wachstum von Schimmelpilzen auf angerührter Weizenstärke*. Acht verschiedene Schimmelpilze wurden auf harter u. weicher Stärke, die verschieden lange mit W. angesetzt war, gezogen. Fermentieren setzt die Möglichkeit, Pilzwucherungen zu entwickeln, herab, die verschiedenen Pilze verhalten sich aber ganz verschieden. Längeres Stehenlassen der genetzten Stärke hemmt mehr u. mehr das Wachstum von *Fusarium* u. *Cladosporium*, beeinflusst aber das von *Aspergillus* u. *Penicillium* nicht. Diese besonderen Unterschiede zeigen sich auch, wenn unter Zus. von 6% ZnCl_2 gearbeitet wird, *Aspergillus flavus* wird aber weniger beeinflusst als *Cladosporium*. Neutralisieren mit NaOH erhöht die Angreifbarkeit, die von der Zeitdauer unabhängig ist, ebenso wirkt Auswaschen von Säure, die Wrkg. des ZnCl_2 -Zusatzes wird durch Waschen aufgehoben. (Journ. Textile Inst. 17. T 23—37.) SÜVERN.

Jos. Pokorny, *Resorcin im Druck*. Nach Besprechung der bekannten Anwendungsformen von Resorcin wird darauf hingewiesen, daß Baumwolle, die mit einer Lsg. von 1 Teil Resorcin in 1 Teil W. einige Stdn. behandelt ist, sich gegenüber direkten Farbstoffen, Tanninen, Naphtholen usw. wie Baumwolle verhält, die mit konz. NaOH-Lsg. behandelt ist. Beim Auflösen von Resorcin in W. tritt erhebliche Herabsetzung der Temp. ein. Behandelt man Baumwolle, die mit direkten Farbstoffen gefärbt ist, mit einer 6%ig. Resorcinlsg. u. überdruckt mit Hydrosulfit-Formaldehydätzfarben, so sind diese Farben viel tiefer. Ebenso wirkt Vorbehandlung mit Rotöl. Ätzfarben mit bas. Farbstoffen werden besonders seifenecht, wenn man das geätzte Gewebe breit durch Brechweinstein, W., eine Lsg. von 20 g Tannin im Liter, Brechweinstein, 10 g im Liter, W., Seife usw. gehen läßt. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 224.) SÜVERN.

L. G. Lawrie, *Neue Verbesserungen in der Färberei der Acetatseide*. Das Färben mit den eine ω -Sulfosäure enthaltenden Ionaminen, mit Bisulfitverbb., mit COOH-haltigen, SO_3H -freien Farbstoffen, auch solchen der Aminoanthrachinonreihe, u. mit unl. Farbstoffen, die durch Ricinusölsulfosäure u. a. m. in kolloidale Verteilung gebracht sind, ist beschrieben. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 227—28. 260—61.) SÜVERN.

—, *Die Farbstoffindustrie in Italien und neue Verfahren zur Herstellung einiger Zwischenprodukte*. Nach Angabe der in Italien hergestellten Farbstoffe wird die synthet. Herst. von HCl, die katalyt. Red. von H-Säure mittels H_2 , die katalyt. Herst. von p-Aminophenol u. die Herst. von Benzidin durch Red. von Nitrobenzol mittels elektrolyt. Na-Amalgams beschrieben. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 296—98. 363—65.) SÜVERN.

Walther Herzog, *Die Verwertung der Nebenprodukte der Saccharinfabrikation in der Industrie synthetischer Farbstoffe sowie in der Färberei (1918—1925)*. Die Verwendung von p-Toluolsulfochlorid, -amid u. -säure wird hauptsächlich an Hand der Patentliteratur besprochen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 36—38. Wien.) SÜVERN.

—, *Neue Farbstoffe*. *Xylenechblau FF* von SANDOZ ist ein neuer Wollfarbstoff, der sich auch zum Nüancieren von Cr-Farbstoffen sowie zum Färben von Halbwolle u. für Seide eignet. — Ein neuer S-Farbstoff der British Dyestuffs Corporation Ltd. ist *Thionolkorinth 2R*, seine Egalisierungsfähigkeit u. die leichte Verwendbarkeit neben anderen Farbstoffen wird hervorgehoben. — *Diphenylchloringelb P* von GEIGY wird wie direkte Farbstoffe angewendet, zieht gut auf Viscoseseide, beim Färben von Halbwolle wird die Wolle weniger gefärbt, beim Färben von Halbseide

im schwach alkal. Seifenbade bleibt die Seide weiß. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 367.) SÜVERN.

J. R. Geigy, *Neue Farbstoffe*. Die *Setacyl*farben eignen sich zum Färben von Acetatseide in gemischten Geweben sowie zur Erzielung zwei- u. mehrfarbiger Effekte. *Novazolblau B* u. *Novazolviolett B* dienen zum Färben von Wolle, Seide u. Halbseide. Vorschriften für das Färben u. Drucken. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1926. 335—36.) SÜVERN.

L. Eymer, *Einwirkung von Chromsäure auf Indigo*. Das rasche Ätzen von Indigo durch CrO_3 in Ggw. von Oxalsäure beruht darauf, daß Oxalsäure bisher die einzige organ. Säure ist, die in der Kälte energ. CrO_3 reduziert unter intermediärer B. von Chromchromat u. O_2 . (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 225—26.) SÜVERN.

Flemming, *Echte Färbungen mit Beizenfarbstoffen auf Wolle*. Das Reinigen der Wolle, das Färben mit Cr-Entwicklungsfarbstoffen nach den hauptsächlich in Betracht kommenden Verff. u. mit den Neolanfarbstoffen ist beschrieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 48—50.) SÜVERN.

Richardson Co., Lockland, Ohio, übert. von: **Harry C. Fisher**, Cincinnati, Ohio, *Färben von Mineralstoffen*. Man überzieht ein körniges Mineral mit entwässertem, gefärbtem Silicat, indem man Mineralkörner u. trockenen Farbstoff zusammenmischt, W. u. Silicat unter Umrühren zusetzt u. schließlich die M. entwässert. (A. P. 1 572 425 vom 27/7. 1925, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Commonwealth White Lead and Paints Proprietary, Ltd., Melbourne, übert. von: **George Freeman Lloyd**, Brighton und **Frederick Harper Campbell**, Melbourne, *Bleiweiß*. 112 Teile PbO werden mit 10—16 Teilen konz. H_2SO_4 behandelt in Ggw. einer kleinen Menge einer anderen Säure u. etwas W. Das entstehende bas. PbSO_4 , welches 60—70,5% Pb(OH)_2 enthält, wird mittels einer Aufschwemmung von 12 Teilen Na_2CO_3 u. 24 Teilen NaHCO_3 in 12 Teilen W. in bas. PbCO_3 mit einem Gehalt von 25—35% Pb(OH)_2 verwandelt. (Can. P. 252 373 vom 8/8. 1924, ausg. 4/8. 1925.) KÜ.

Frederick William Attack, Manchester, England, *Schwefelfarbstoffe*. Kurzes Ref. nach E. P. 196993; C. 1923. IV. 331. Nachzutragen ist folgendes: Z. B. werden das *Indophenol* aus *Carbazol* u. *p-Nitrosophenol*, *n-Butylalkohol*, Na_2S (60% ig) u. gepulverter S langsam auf 100° angeheizt u. dann 50 Stdn. unter Rückfluß erhitzt. Man verd. mit W., entfernt den Butylalkohol durch Dest. u. filtriert den *Schwefelfarbstoff* ab. Er färbt Baumwolle aus der $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ -Küpe in wasch-, licht- u. chlorechten blauen Tönen. Der *n-Butylalkohol* läßt sich ganz oder teilweise durch *Pyridin* als Lösungsm. für die Alkalipolysulfide ersetzen. Auch andere organ. Verbb. als Indophenole liefern nach dem Verf. *S-haltige Verbb.*, soweit sie bei dem Kp. des *n-Butylalkohols* (116,8°) sulfidierbar sind. (A. P. 1 571 181 vom 22/1. 1923, ausg. 2/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

XI. Harze; Lacke; Firnis.

M. E. Barnes, *Ein Überblick über die Terpentindustrie im Hinblick auf larvenschädliche Substanzen*. *Holzterpentin* (destillierend bei 150—180°), *Kiefernöl* (170—225°) u. *Terpentinöl* wurden auf ihre Fähigkeit Larven zu schädigen untersucht. Das erste Prod. ist wenig wirksam, das letzte ist das Beste, aber auch Teuerste, obwohl alle Prodd. aus *Pinus palustris* hergestellt wurden. (Americ. journ. of hyg. 5. 309—14; Ber. ges. Physiol. 32. 685. 1925. Baltimore, Dep. of med. zool. school of hyg. a public health. John Hopkins univ. Ref. KIPPING.) OPPENHEIMER.

Maurice Deschiens, *Über Flugzeugschutzüberzüge*. (Chimie et Industrie 14. 18—27. — C. 1926. I. 505.) REINER.

Max Oppenheimer, *Gelatinierung und Eisblumenbildung von Holzöl*. Durch Patent oder Patentanmeldungen geschützte Vorschläge zur Verhinderung des Gela-

tinierens des Holzöls, zur Verflüssigung festgewordenen Holzöls u. zur Erzielung glänzend u. glatt auftrocknender Firnisse aus Holzöl werden besprochen. (Farbe u. Lack 1926. 28—29.)

SÜVERN.

Carleton Ellis, übert. von: **Joseph R. Kuhn**, Montclair, New Jersey, V. St. A., *Verfahren zur Herstellung eines schwefelhaltigen Kresolharzes*. Ein Gemisch von *m*- u. *p*-Kresol in einem indifferenten organ. Verdünnungsmittel wird mit S_2Cl_2 behandelt, durch das Reaktionsgemisch bei Temp. bis zu 150° h. Luft geblasen, das gereinigte Harz in einem alkoh. Lösungsm. gel. u. mit etwas H_3PO_4 versetzt. — Man löst z. B. *m,p*-Kresol in Toluol, u. gibt allmählich die 1½-fache Gewichtsmenge des Kresols an S_2Cl_2 hinzu. Nachdem die HCl-Entw. beendet ist, wird durch die auf 150° erhitzte Lsg. ½ Stde. Luft geblasen, wobei der Rest der HCl u. das Toluol entfernt wird. Das Harz wird in denaturiertem A. mit dunkelbrauner Farbe leicht gel. Durch Zugabe von etwas sirupöser H_3PO_4 geht die Farbe der Lsg. in hellgelb über. Die alkoh. Lsg. des selbst gegen rauchende H_2SO_4 beständigen Harzes dient zur Herst. säurebeständiger Überzüge, z. B. auf Holz. Sie läßt sich mit Farbstoffen aller Art färben. (A. P. 1564 002 vom 12/1. 1922, ausg. 1/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H., übert. von: **Willy O. Herrmann**, **Hans Deutsch** und **Wolfram Haehnel**, München, *Veredelung synthetischer und natürlicher Harze*. (Can. P. 249 338 vom 3/8. 1923, ausg. 5/5. 1925. — C. 1924. II. 1137.)

SCHOTTLÄNDER.

Isoline Goldschmidt und **Oskar Neuss**, Berlin-Charlottenburg, *Plastische Massen aus Harnstoff und Formaldehyd*. (Oe. P. 101 453 vom 17/8. 1923, ausg. 10/11. 1925. D. Prior. 17/8. 1922. — C. 1925. I. 1455 [E. P. 202 651].)

SCHOTTL.

A. Eichengrün, Berlin-Charlottenburg, *Lösungsmittel für organische Stoffe*. Zum Lösen von Fetten, Ölen, Mineralölen, Kautschuk, Harzen, Kunstharzen, Fettsäuren oder ihren Verbb., bituminösen Stoffen, Alkaloiden, Celluloseestern verwendet man Methylenchlorid für sich oder in Mischung mit anderen Lösungs- oder Nichtlösungsm.; man löst z. B. acetonlösliches Celluloseacetat mit oder ohne Zusatz von chloroformlöslichem Celluloseacetat in der Kälte mit Methylenchlorid, mit oder ohne Zusatz eines anderen Lösungsm. oder eines Celluloseacetat nicht lösenden Stoffes; Methylenchlorid kann zum Extrahieren von Fetten oder Alkaloiden, zur Herst. von Lacken, Klebmitteln, zur Entfernung von Flecken aus Geweben usw. verwendet werden. (E. P. 243 030 vom 17/11. 1925, Auszug veröff. 13/1. 1926. Prior. 17/11. 1924.)

FRANZ.

A. Eichengrün, Berlin-Charlottenburg, *Celluloseacetatlacke*. Man löst acetonlösliches Celluloseacetat oder eine Mischung von acetonlöslichem u. chloroformlöslichem Celluloseacetat in der Kälte in Methylenchlorid u. CH_3OH oder seinen Homologen; anstelle von CH_3OH kann man auch Aceton, Ameisen- oder Essigsäureester, Bzl., Äthylenchlorid verwenden, der Lsg. können Füllstoffe, Weichhaltungsmittel usw. zugesetzt werden; die Lsgg. dienen zum Überziehen von Geweben oder festen Gegenständen. (E. P. 243 031 vom 17/11. 1925, Auszug veröff. 13/1. 1926. Prior. 17/11. 1924.)

FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *Lacke*. Lsgg. von Celluloseacetat in Chlorhydrinen, wie Äthylenchlorhydrin, Monochlorhydrin, allein oder in Mischung mit W. oder anderen Lösungsm. für Celluloseacetat, wie Aceton, werden durch Zusatz geringer Mengen organischer Basen haltbar gemacht; man verwendet z. B. Harnstoff, aliphatische Aminosäuren oder ihre Ester oder Derivv., Anilin, Pyridin, Chinolin. (E. P. 243 722 vom 23/11. 1925, Auszug veröff. 27/1. 1926. Prior. 26/11. 1924.)

FRANZ.

Mechanical Rubber Co., New York, V. St. A., *Kautschuklacke*. Man verwendet einen Kautschuklack, der zu einer Hartkautschukschicht eintrocknet; man löst z. B.

Rohkautschuk in einem hochsd. Lösungsm., wie Solventnaphtha, Xylol, Naphthalin, setzt die zur Erzeugung von Hartkautschuk erforderliche Menge von 15—32% S zu u. erhitzt die Mischung mit oder ohne Zusatz eines Vulkanisationsbeschleunigers auf 160—170°. (E. P. 243 966 vom 8/4. 1925, ausg. 31/12. 1925.) FRANZ.

Wladimir Plinatus, Schweiz, *Überzugsmassen zum Überziehen von Gegenständen aus Celluloseestern, Kunstleder, Metallen, Holz, Papier usw.* Man löst Nitrocellulose, Celluloseacetat usw. in einem flüchtigen Lösungsm. unter Zusatz von Estern mehrwertiger Alkohole, die erhaltene Lsg. liefert widerstandsfähige Überzüge. (F. P. 581 653 vom 14/8. 1923, ausg. 3/12. 1924.) FRANZ.

Wladimir Plinatus, Schweiz, *Lacke und Imprägniermittel aus Cellulosederivaten.* Man vermischt Cellulosenitrat oder -acetat mit den Estern mehrwertiger Alkohole, der Phenolester der Naphthensäuren usw. u. pulverförmigen Massen, wie Kork, Asbest, u. verdünnt mit flüchtigen Lösungsm., je nach den angewandten Mengenverhältnissen erhält man elast., kautschukähnliche bis glasharte Überzüge; die Massen dienen zum Überziehen von Holz, Metallen, Papier, Geweben, Kunstleder, Beton, Kunststeinen usw. (F. P. 28 581 vom 14/8. 1923, ausg. 11/3. 1925. Zusatz zu F. P. 581 653; vorst. Ref.) FRZ.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

—, *Die Zuckerrübe in Nordafrika und besonders in Marokko.* Es werden die Möglichkeiten der Zucht der Zuckerrübe in Marokko eingehend erörtert. Es scheint danach, daß die marokkan. Landwirtschaft noch nicht auf dem vervollkommenen Stande angelangt ist, den die Rübenzucht darstellt u. erfordert, sondern daß sie dahin erst allmählich gelangen wird, in dem Maße, wie die ihr zur Verfügung stehenden Mittel wachsen. (Bull. soc. encour. industrie nationale 1925. 745—89.) RÜHLE.

Wohryzek, *Auf dem Wege zur spodiumlosen Weißzucker-Erzeugung und Raffination. Antwort an Berthold Block.* (Vgl. S. 517.) Auseinandersetzung mit BLOCK (l. c.) über dessen Kritik. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1342—43. 1925. Dioseg.) RÜHLE.

J. Dedek, *Das Beurteilen von Entfärbungskohlen.* Vf. erörtert die Wirtschaftlichkeit der Anwendung von Carboraffin u. Norit, wie sie sich aus Verss., die nach dem Gleichleistungsverf. angestellt sind, ergibt. Danach ist die Noritarbeit bedeutend wirtschaftlicher als die Carboraffinarbeit. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 76—78. Prag.) RÜ.

Freda Hoffmann, *Über die Farbzunahme von Erstproduktfüllmassen während der Verkochnung.* Die Farbmessungen bezogen sich auf die Farbenzunahme der Füllmasse im Vergleich zum Dicksaft; sie geschahen im Polarisationsphotometer mit zweifachem Blaufilter, die Schichtdicke der absorbierenden Flüssigkeitssäule war 1 cm; gemessen wurden die Extinktionskoeffizienten für 16 Dicksäfte, 16 Füllmassen u. 11 Abläufe. Im Mittel betrug die Verfärbung von Erstprodukt-Füllmassen während der Verkochnung 47%, bezogen auf die ursprüngliche Färbung des eingezogenen Dicksaftes. Unter den Bedingungen der Verss. entsprach 1° Stammer dem Extinktionskoeffizienten $\alpha = 0,058$. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 91—98.) RÜHLE.

L. A. Wills, *Zehn Jahre Zuckerraffination in den Vereinigten Staaten.* (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 53—59. New York [N. Y.]. — C. 1926. I. 2152.) RÜHLE.

Schecker, *Das Verhalten der Raffinose bei den Krystallisationsvorgängen des Betriebes.* Die Unterss. MEHRLES (Vgl. S. 518) werden als unrichtig zurückgewiesen. (Dtsch. Zuckerind. 50. 1413. 1925. Stettin.) RÜHLE.

Berthold Block, *Schönen und Blauen von Zucker in der Schleuder.* In Ergänzung seiner früheren Arbeit (vgl. S. 518) teilt Vf. mit, daß das Sum-azine in einer Menge von nur 28 g auf 1 Tonne Zucker gebraucht wird; es ist kein reines Blau, sondern ein Gemisch von Farben (Angabe der Sugar Manufacturers Supply Co., Ltd., London), das am besten in dem Krystallkocher verwendet wird. Bonbonfabriken verlangen, daß der Zucker bei etwa 160° ohne Verfärbung schm.; bei ungebläutem Zucker ist dies leicht erreichbar, dagegen soll sich mit Indanthren oder Sum-azine gebläut

Zucker schon bei viel niedrigeren Temp. verfärben, so daß daraus eine gute Bonbonmasse nicht herstellbar ist. Ultramarin soll sich in dieser Beziehung wesentlich besser verhalten. (Dtsch. Zuckerind. 50. 1414. 1925.) RÜHLE.

G. Bruhns, *Das Abgleichungs- oder Differenzverfahren zur Vereinfachung von Berechnungen.* (Vgl. Chem.-Ztg. 49. 528; C. 1925. II. 957.) Erläuterung des Verf. an einigen Beispielen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 78—79. Charlottenburg.) RÜHLE.

Leonhard Pink, Berlin, *Herstellen von genießbarem Zucker aus Holz*, dad. gek., daß man den mit H₂O₂ vermischten Holzbrei mit Cl-Gas sättigt u. nach gründlichem Auswaschen in an sich bekannter Weise mit verd. Säure verzuckert. — Die Ausbeute an Zucker wird erhöht. (D. R. P. 425 023 Kl. 89i vom 7/6. 1922, ausg. 11/2. 1926.) OELKER.

Home and Colonial Investments Ltd., London, übert. von: **Ineo de Vecchis**, Rom, *Behandlung von Zuckerrüben zwecks Zuckergewinnung.* (A. P. 1562 151 vom 5/12. 1923, ausg. 17/11. 1925. — C. 1924. I. 2644.) OELKER.

Joseph James Ragg, Lautoka, *Herstellung von weißem Zucker.* Zur Klärung u. Reinigung des Zuckersirups wird diesem zunächst Kalkwasser bzw. gepulverter Kalk zugesetzt u., nach erfolgter Klärung, unter Rühren mit Tierkohle behandelt. (E. P. 219194 vom 5/8. 1923, ausg. 14/8. 1924.) MAI.

Dr. J. Perl & Co. Kommandit-Gesellschaft, Deutschland, *Durch basische Salze nicht fällbare Stärkeemulsionen.* (F. P. 599 908 vom 26/11. 1924, ausg. 25/1. 1926. — C. 1925. I. 1821 [W. LEONHARDT].) FRANZ.

XV. Gärungsgewerbe.

H. Lührig, *Alkoholschwund in Branntweinen.* In offenen Porzellanschalen fiel der Alkoholgehalt in 6 Tagen von 33,50 auf 17,98 Vol.-%, derselbe Branntwein, 3 l in einer 3,5-l-Flasche in 2 Tagen auf nur 33,45 Vol.-%, eine andere Probe in offener 3-l-Flasche in 6 Tagen von 36,07 auf 36,03 Vol.-%. Für Faßlagerung sind Angaben von KRÄMER (Brennerei-Ztg.) wegen der Nichtberücksichtigung des Extraktes wertlos. Der tatsächlich eintretende Schwund ist von verschiedenen Umständen abhängig. Eine nachträgliche Entmischung ist für Branntwein in Glasgefäßen wegen der Diffusion auszuschließen; bei ungenügender Mischung verläuft die nachträgliche Diffusion aber sehr langsam, Beispiel in einem 2 m hohen Faß nach Lagerung von 7 Wochen, oben, mitten, unten, 40,70—37,70—36,33 Vol.-% A. Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse (nicht spundvolle Fässer, Temperaturschwankungen) können bei langem Lagern in großen Fässern (nicht z. B. in Ausschankflaschen) Verschiedenheiten beobachtet werden, so in einem 250-l-Faß mit reichlich 20 l Schwund nach 2³/₄ Jahr oben 40,44, mitten 40,35, unten 40,06 Vol.-%. — Bei der direkten Best. des A. findet Vf. etwa 0,10—0,15% A. weniger als nach der indirekten. (Pharm. Zentralhalle 67. 49—55. Sührig, Breslau, Stadt. Untersuchungsamt.) GROSZELD.

Fred M. Maynard, *Kohlensäure — das natürliche Erhaltungsmittel des Bieres.* Es wird der Wert der CO₂ für die Beschaffenheit des Bieres u. die Maßnahmen, die beim Brauvorgange dieser Bedeutung Rechnung tragen sollen, erörtert. (Brewers Journ. 62. 37—38.) RÜHLE.

F. Levallois, *Die Weintannine.* Vf. erörtert die Verwendung des Tannins in der Kellerwirtschaft, die verschiedenen hierfür angebotenen u. gekauften Tannine u. Tanninzubereitungen u. deren Unters. u. Beurteilung an Hand des Schrifttums u. eigener Erfahrungen. Von den Verff. zur Unters. der verschiedenen Tannine u. tanninhaltigen Zubereitungen wird das offizielle Schüttelverf. des internationalen Vereins der Lederchemiker empfohlen. (Ann. des Falsifications 19. 15—28.) RÜHLE.

E. Hugues und Pujó, *Die Wirkung der Sonnenbestrahlung auf die Reifung der Weintraube und auf die Zusammensetzung des Weines.* Starke Bestrahlung hemmt die

Reifung oder verhindert sie durch Eintrocknen ganz. Solche übermäßig bestrahlte Trauben hatten zu Beginn der Lese einen geringeren Grad der Reife erreicht als weniger bestrahlte Trauben; jene waren weniger reich an Zucker, enthielten aber viel mehr Säure als diese. Dementsprechend enthielten die aus stark bestrahlten Trauben erhaltenen Weine einen geringeren Gehalt an A. u. einen höheren Gehalt an freier Säure u. an freier Weinsäure. (Ann. des Falsifications 19. 40—43. l'Hérault.) RÜ.

J. L. Chelle, *Normales Vorkommen von Salicyl- und Benzoesäure im Wein*. Der Vf. gibt eine Übersicht über die Literatur zur Frage der Weinverfälschung mit Salicyl- u. Benzoesäure u. zu den früheren Unterss. über ein n. V. von Salicylsäure im Wein. Da ein Rundschreiben des (französ.) Landwirtschaftsministers empfiehlt, schon bei der Wahrscheinlichkeit eines Konservierungszusatzes auf eine Fälschung zu schließen, untersucht er nochmals garantiert reine Bordeauxweine nach der Methode von DENIGÈS (katalyt. Oxydation von Benzoesäure zu Salicylsäure) auf Benzoesäure u. findet, daß jeder der untersuchten Weine *Salicylsäure* in Mengen von 0,6—2,5 mg/l enthält. Zur colorimetr. Gehaltsbest. wurden Benzoesäurelsgg. verwendet, die analog mit $\text{FeCl}_3 + \text{H}_2\text{O}_2$ oxydiert waren. Ist G die Gesamtfärbung, so läßt sich diese zerlegen in $G = S + B$, wobei S die von natürlich vorkommender u. B die von durch Oxydation von Benzoesäure erhaltener Salicylsäure herrührende Färbung bezeichnet.

Der Vf. glaubt erst dann eine Fälschung durch Zusatz von *Benzoesäure* mit Sicherheit behaupten zu können, wenn G größer ist als die mit Naturwein + 20 mg Benzoesäure/Liter erhaltene Färbung. Die Unters. auf Salicylsäure (S) u. Benzoesäure + Salicylsäure (G) soll mit 200 ccm angestellt werden. Die Oxydation der Benzoesäure ist sehr unvollständig. Aus 1—4 mg Benzoesäure in 5 ccm W. konnten nur Mengen von 0,02—0,09 mg Salicylsäure mit Bzl. ausgeschüttelt werden, entsprechend 2—2,5% Ausbeute. Die Methode von BLAREZ (Identifizierung der Benzoesäure durch die Form der aus dem Ätherauszug erhaltenen Krystalle) war ganz unzuverlässig. — Für die Unters. auf *Salicylsäure* nach BLAREZ wurde von 20 ccm Wein ausgegangen, die nach Zusatz von HCl mit Bzl. ausgeschüttelt wurden. Zeigte die wss. Ausschüttelung des Benzols mit FeCl_3 Rosa- oder Violettfärbung, so war mit Sicherheit auf **Zusatz** von Salicylsäure zu schließen, da Naturweine nach dieser Methode nie einen Salicylsäuregehalt erkennen ließen. Zur colorimetr. Gehaltsbest. wurden die Musterlsgg. (Weine mit 1—10 mg Salicylsäure/Liter) um den Verteilungskoeffizienten zu berücksichtigen, genau wie oben behandelt u. erst dann verglichen. — Der Vf. nimmt für den Ursprung der normalerweise im Wein enthaltenen Benzoe- u. Salicylsäure die Zers. von Phenylalanin bzw. Tyrosin oder die Hydrolyse von Glucosiden an. (Bull. soc. pharm. Bordeaux 63. 14—37. 1925.) HARMS.

Eduard Jacobsen, *Alkoholfreie Getränke*. Alkoholfreier Wein darf nur aus Wein selbst durch Alkoholentzug bereitet werden. Einige prakt. Angaben, auch für alkoholfreie Schaumweine u. Liköre. (Konserven-Ind. 13. 85—86.) GROSZFELD.

Th. Röttgen, *Vom Essigstiche der Mostobstgetränke*. Die Ursachen des Essigstiches werden ausführlich besprochen. Vff. empfehlen die Entfernung der den Essigstich begleitenden unangenehmen Gerüche durch Behandlung mit *Eponit*, wodurch bis zu einem gewissen Grade eine Wiederherstellung der Getränke möglich ist. (Süddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 94—95. Stuttgart, städt. chem. Unters.-Amt.) HESSE.

Staiger, *Phosphorsäurebestimmung in der Hefe*. Man schließt 3 g Hefe im Kjeldahlkolben mit 10 ccm konz. H_2SO_4 u. 10 ccm konz. HNO_3 auf, verd. auf 200 ccm mit W., stumpft 50 ccm der Lsg. mit NaOH ab, gibt 20 ccm $\text{NH}_4\cdot\text{NO}_3$ -Lsg. (340 g zu 1 l) u. 10 ccm HNO_3 (D. 1,153) zu u. erhitzt zum Sieden. Gleichzeitig erhitzt man 45 ccm NH_4 -Molybdatlsg. (120 g zu 4 l) zum Sieden u. gibt unter ständigem Umrühren in dünnem Strahle zu der Phosphatlsg. Man läßt $\frac{1}{4}$ Stde. stehen, dekantiert die überstehende Fl. durch ein Filter ab, was man mit 50 ccm h. Waschl. (200 g $\text{NH}_4\cdot\text{NO}_3$ u. 160 ccm HNO_3 zu 4 l gel.) wiederholt. Den Nd. löst man in etwa 10 ccm 8%ig. NH_3 ,

gibt 20 cem $\text{NH}_4\cdot\text{NO}_3$ -Lsg., 30 cem W. u. 1 cem NH_4 -Molybdatlsg. zu, erhitzt zum Sieden u. fällt mit 20 cem h. HNO_3 (D. 1,153). Der Nd. ist ganz rein. Man filtriert ihn nach 10 Minuten im Goochtiiegel ab; er enthält auf 1 Mol. P_2O_5 24 Moleküle MoO_3 . Den Tiegel wäscht man mit reinem Aceton, trocknet im Vakuumexsiccator (100 bis 200 mm) u. wägt nach 30 Minuten. (Brennereiztg. **43**. 17. Berlin, Inst. f. Gärungsgew.) RÜHLE.

X. Rocques, *Die Bestimmung des Alkoholgehaltes*. Vf. erörtert die Anwendung des Alkoholometers u. dabei häufig gemachte Fehler. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] **8**. 10—12.) RÜHLE.

Fonzes-Diacon, *Unterscheidung anormal kleiner Weine von gewässerten Weinen*. (Vgl. S. 1893.) Das Verf. beruht auf der Festlegung des Verhältnisses zwischen Kalium einerseits u. dem Gehalt an Weinsäure, an nichtflüchtigen Säuren + A. sowie an flüchtigen Säuren andererseits. (Ann. des Falsifications **18**. 606—07. 1925.) SPLITTGERBER.

Nikolaus Moskovits, Budapest, *Aceton u. dgl. durch Vergärung*. Den Maischen werden außer den Aceton u. dgl. bildenden Kleinlebewesen, z. B. *Bacillus macerans*, Reduktionsmittel, z. B. Hydrosulfite, Thiosulfate oder Sulfite zugesetzt. Letztere wirken besonders günstig, weil sie nicht nur die Acetonbildung begünstigen, sondern auch die der Rk. schädlichen Einflüsse lähmen. (Oe. P. **100 444** vom 6/3. 1922, ausg. 10/7. 1925. Ung. Prior. 11/3. 1921.) KÜHLING.

Fleischmann Co., New York City, übert. von: **Erwin Klein**, Vöslau b. Wien, *Hefe*. Zur Herst. von Bäckerhefe züchtet man Hefe in einer Nährlsg. unter Lüftung in der Weise, daß man eine sog. „forcierte“ Hefe erhält. Diese kräftigt man durch Zuführung von Nährstoffen, welche leichter assimilierbar sind als diejenigen, welche während der Forcierung zugeführt wurden und hört mit der Zuführung dieser Nährsubstanzen auf, wenn die Hefe die Eigenschaften einer guten Bäckerhefe zeigt. (Can. P. **250 753** vom 20/11. 1923, ausg. 16/6. 1925.) OELKER.

Soc. Ricard, Allenet & Cie., Melle, Deux-Sèvres, Frankreich, *Entwässern von Alkohol*. (E. P. **210 761** vom 22/1. 1924, ausg. 26/3. 24. Belg. Prior. 3/2. 1923. — C. **1924**. II. 405.) OELKER.

Max Hamburg, Lichtenegg b. Wels (Oberösterreich), *Herstellung von Obstweinen, welche in Geruch und Geschmack Traubenweinen ähnlich sind*. Die in beliebiger Weise erhaltenen Obst- oder Beerensäfte werden durch Abdest. im luftverdünnten Raum von den flüchtigen Aromastoffen zum größten Teile befreit und dann in bekannter Weise mit Weinhefe vergoren. (Oe. P. **97 133** vom 5/7. 1923, ausg. 10/6. 1924.) OE.

Walter Vogl und **Orville Adalbert Dafert-Stensel-Timmer**, Wien, *Melioration und Trinkbarmachung von säurestichigen Weinen bezw. Obstweinen* mit Ausnahme von solchen mit Essigstich, gek. dad., daß die zu behandelnden säurestichigen Fll. mit solchen in W. bezw. Wein oder Obstwein unl. Metalloxyden, Metalloxydverb. oder deren Gemischen behandelt werden, welche die Fähigkeit haben, die zu entfernenden Säuren in unl. Form zurückzuhalten. (Oe. P. **97 134** vom 10/8. 1923, ausg. 10/6. 1924.) OELKER.

Rudolf Lehmann, Wiesbaden, *Herstellung von Getränken aus Zucker*, dad. gek., daß man Monosaccharide in konz. Lsg. bei verhältnismäßig niedriger Temp. (etwa 70°) einer gelinden Einw. von Alkali unter Vermeidung einer Karamelbildung aussetzt, die entsprechend verd. Lsg. mit einer für Genußzwecke geeigneten Säure, z. B. Milchsäure, ansäuert, eine geringe Menge eines geeigneten Fruchtsaftes oder Weines hinzusetzt und die Mischung entweder einer Gärung überläßt oder sie in bekannter Weise mit CO_2 imprägniert. (D. R. P. **424 824** Kl. 53k vom 22/6. 1922, ausg. 4/2. 1926.) OE.

see
errata
p. 3977

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Ed. Lasausse, *Das Aussieben der jungen eingemachten Erbsen*. Die in Büchsen eingemachten grünen jungen, noch unreifen *Erbsen* (petits pois de conserve) können durch Unterschiebung älterer oder reifer Erbsen verfälscht werden. Vf. hat deshalb versucht, die MUTTELET (Ann. des Falsifications 18. 5; C. 1925. I. 2120 u. C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 317; C. 1925. II. 98), in der chem. Zus. Anhaltspunkte für die Beurteilung des Alters der Erbsen zu finden, die er in rohem Zustande oder nach ausreichender Lagerung in eingemachtem Zustande (3 Monate bis 1 Jahr) durch Sieben in Anteile gleichen mittleren Durchmessers scheidet, deren jeder Anteil für sich untersucht wurde. Es zeigte sich zunächst bei rohen jungen Erbsen, daß enge Beziehungen zwischen dem Durchmesser u. der chem. Zus. nicht bestehen. Junge Erbsen aus denselben Schoten, also verschiedener Größe, zeigten sehr nahe übereinstimmende Beziehungen zwischen dem trocknen Extrakte einerseits u. dem Gesamt-N u. dem gesamten Stärkegehalte in % andererseits; dagegen zeigten junge Erbsen derselben Siebung, aber verschiedener Herkunft verschiedene Verhältnisse Stärke zu trockenem Extrakte u. Stärke zu Saccharose. Bei eingemachten jungen Erbsen (auf 1 kg rohe Erbsen, zweimal gesiebt, $\frac{1}{2}$ kg Salzlake u. Erhitzen in geschlossener Büchse auf 112°) bezieht Vf. die Ergebnisse der Best. des trocknen Extrakts, der Stärke u. des Gesamt-N auf 100 Stück Erbsen (1 Jahr in Büchse gelagert); es fand sich dann, daß diese Ergebnisse für jede Siebung (Sieb Nr. 24, 26 u. 29) etwas schwankten, aber nicht in den Bereich einer anderen Siebung übergriffen; es handelt sich hierbei allerdings um Erbsen desselben Jahrgangs u. derselben Gegend. Die Ergebnisse werden im einzelnen in Tabellen zusammengefaßt gegeben u. die Verff. der Unters. kurz besprochen. (Ann. des Falsifications 19. 28—40. Nantes.) RÜHLE.

Wm. A. Rooker, *Die industrielle Herstellung von Pektinsirupen und gepulverten Pektinen*. Teil V. (IV. vgl. Fruit Products Journ. and Amer. Vinegar Ind. 5. Heft 4. Dez. 1925.) Im vorhergehenden Teile (IV. l. c.) wurde das Ausziehen des Pektins aus Apfeltrestern eingehend erörtert; im vorliegenden Teile wird die weitere Verarbeitung der Pektinslg. zu Sirup u. trockenem Pektin besprochen; sie wird zunächst vorgeklärt durch Zentrifugieren u. abgekühlt. Zur Hydrolyse der Stärke u. von Protein (die trockenen Trester enthalten noch 3—5,5% Protein u. 12—20% Stärke) wird die Pektinslg. dann mit einem geeigneten Enzyme — empfohlen wird das Protosym von JACQUES WOLF u. Co., Passaic, New Jersey, das akt. Enzym gewisser Pilze, besonders von *Aspergillus oryzae* — behandelt, wozu 20—60 Min. bei 47,8 bis 48,9° erforderlich sind. Dann muß erhitzt werden auf etwa 76,7° um das Enzym zu zerstören, weil es sonst bei der Konz. der Lsg. das Pektin selbst anzugreifen vermag. (Fruit Products Journ. and Amer. Vinegar Ind. 5. 14—16. Hood River [Oreg.].) RÜ.

Wm. A. Rooker, *Die Bewertung von Pektinrohstoffen*. Die Annahme, daß je höher der Pektinegehalt sei um so geeigneter das Rohmaterial zur Gewinnung des Pektins sei, ist nicht richtig, denn es kommt hierbei nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Güte des Pektins an. Vf. gibt ein Verf. als Einheitsverf., das im einzelnen Falle in geeigneter Weise dem jeweiligen Rohstoffe angepaßt werden soll. Apfeltrester sind geeigneter als Rohstoff für die Pektindarst., da Apfelschalen u. Apfelnkerngehäuse weniger Pektin enthalten als die Trester von denselben Äpfeln. Apfeltrester sollten im Mittel 8—16% W. enthalten. Zur Best. des Wassergehaltes empfiehlt Vf. einen Feuchtigkeitsprüfer von MOJONNIER u. Trocknen von 1,5 bis 2 g der Probe während 5 Min. bei 57,2°. Auch ein Prüfer nach BROWN DUVEL ist brauchbar, bei dem 50 g der Probe zum Abtreiben des W. zu nehmen sind. Außerdem kann der Gehalt an W. auch durch Trocknen von 5—7,5 g bei 102—103° während 5 Stdn. bestimmt werden. Zur Best. der Gelierbarkeit werden zunächst die schädlichen in k. W. l. Pektine durch Auslaugen von 400 g Trestern in einem

gewöhnlichen kon. Perkolator entfernt. Darauf übergießt man die ausgelaugten Trester mit 3 l 0,2^o/_{ig} Milchsäurelsg., wägt das Ganze, erhitzt in 20–25 Min. auf 96,1^o u. beläßt dabei 60 Min., indem man jede 10 Min. das verdunstete W. durch sd. W. bis zum Anfangsgewicht ergänzt. Dann preßt man in einer geeigneten Fruchtpresse ab, läßt den Saft abkühlen u. seiht durch Baumwolle. Der Säuregehalt des Saftes wird durch Titration bestimmt. Zur Best. der Gelierbarkeit werden je 100 g des Saftes mit 70, 80, 90, 100, 120, 130 u. 262,5 g Rohrzucker vermischt, wozu Vf. Al-Pfannen verwendet. Zum Vergleiche werden 50 g eines Vergleichseinheits-sirups mit 150 g W. u. 262,5 g Rohrzucker gemischt. Als Vergleichssirup wählt Vf. einen Sirup, von dem 100 g eine Gallerte mit 525 g Zucker bilden; die erhaltene Gallerte wiegt 866,2 g u. hat einen Säuregehalt entsprechend 0,25^o/_{ig} Milchsäure. Die in den 8 Al-Pfannen enthaltenen Gemische werden durch Zugabe von Milchsäure auf einen Säuregehalt von genau 0,25^o/_{ig} Milchsäure gebracht. Der Inhalt der Pfannen wird dann unter beständigem Umrühren soweit eingengt, daß auf je 100 g Zucker 165 g Gallerte kommen. Ist das eingetreten, so gießt man die h. M. in Gelierrgläser, die man 24 Stdn. stehen läßt. Die dann gebildete Gallerte wird auf ihre mechan. Eigenschaften, die ihre Güte bedingen, geprüft. (Fruit Products Journ. and Amer. Vinegar Ind. 5. 22–25. Hood River [Oregon].) RÜHLE.

E. B. Forbes, J. August Fries und W. W. Braman, *Der „Rein-Nährwert“ von Luzerneheu und Mehl*. Grob geschnittenes Luzerneheu hatte denselben Nährwert wie feingemahlene Luzernemehl; die Verdaulichkeit des letzteren war um 2,2^o/_{ig} geringer. (Journ. Agricult. Research. 31. 987–95. 1925. Pennsylvania State Coll.) TRÉNEL.

C. F. Muttelet, *Fortschritt zur Unterscheidung von Konserven aus aufgefrischten, getrockneten Erbsen und Konserven aus grünen Erbsen*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 317; C. 1925. II. 98.) Vf. hat Konserven verschiedener Art untersucht u. festgestellt, daß die Verhältnisse Stärke zu Zucker, Stärke zu Cellulose u. in W. unl. N₂ zu l. N₂ wichtige Unterscheidungsmerkmale für Konserven aus frischen, grünen u. getrockneten, aufgefrischten Erbsen liefern. Das Verhältnis Stärke zu Zucker ist im ersten Fall 4,1–6,3, im zweiten 9,5–12,8, das von Stärke zu Cellulose einmal 3,5–5,1, im anderen Fall 7,2–8,2 u. das Verhältnis von unl. N₂ zu l. N₂ bei den grünen Erbsen 2,5–4,8 u. bei den aufgefrischten 9,4–10,6. Außerdem ist der Gehalt an Cellulose verschieden. Er beträgt bei grünen Erbsen 10,5–14,5^o/_{ig} u. bei den anderen 7,2–8,1^o/_{ig} jeweils auf Trockensubstanz berechnet. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 238–40.) ENSZ.

W. L. Davies, *Untersuchungen über Fischmehle*. II. *Schwankungen des wasserlöslichen Stickstoffs und des Gehaltes an wasserlöslichem Phosphor, die bei verschiedenen Verfahren der Behandlung und Lagerung vor sich gehen*. (I. vgl. S. 1621.) Proben von 5 Arten *Fischmehl* wurden aufbewahrt 1. während 7 Monaten in Papierbeuteln, in offenen Gefäßen u. in trockenem, w. Zustande u. 2. während 3 Wochen in feuchtem Zustande bei gewöhnlicher Temp. u. in der Wärme. Es wurden wss. Auszüge (50 g Mehl auf 350 com W.) der Mehle hergestellt u. untersucht auf Anfangsacidität, in W. l. N-Verbb., titrierbare Säureradikale u. Aminogruppen in alkoh. Lsgg., die aus diesen wss. Auszügen erhalten wurden, flüchtige Basen in alkoh. Auszügen u. l. Phosphate in den wss. Auszügen. Bei der kurzen feuchten Behandlung vermehrte sich die Acidität, ebenso infolge des Schimmelwachstums bei langer Lagerung. Die Zunahme des in W. l. N schwankte mit der Behandlung u. der Mehlsorte; kurze feuchte Lagerung war im allgemeinen mit einer Zunahme an l. N verbunden, die lange Lagerung verursachte im allgemeinen Abnahme des in W. l. N (bei 3 Mehlen 6–40^o/_{ig} des ursprünglich vorhandenen Gehaltes). In einigen Fällen war fast der ganze in W. l. N auch in A. l. Bei w. trockner Lagerung trat eine Desaminierung der in W. l. Verbb. aller Mehle ein. Feuchte Lagerung vermehrte den Gehalt an flüchtigen Basen im in W. l. Anteile; bei den andern Behandlungsarten verminderte sich der Gehalt an flüchtigen, in die Luft entweichenden Basen um 1–3,6^o/_{ig} des Gesamt-N des Mehles. Die Zunahme des

Gehaltes an l. P bei jeder Behandlung war ganz unregelmäßig, sie stand in keinem Verhältnisse mit der Anfangsacidität; w. trockene Behandlung hatte die größte Wrkg., während die andern Arten der Lagerung nur geringe Änderungen verursachten. Schimmelwachstum verursachte Abnahme an l. Phosphat u. Zunahme der Anfangsacidität, hatte aber keine Wrkg. auf den Gehalt an flüchtigen Basen des wss. Auszuges. Bei feuchter Lagerung wurden alle Mehle ungesund; bei Lagerung in Beuteln wurden fetthaltige Mehle ranzig. (Journ. Soc. Chem. Ind. **45**. T. 25—29.) RÜHLE.

Alfred Schneck, *Beschreibung einiger türkischer Käse*. Die Zus. zweier Käse war (‰):

	Surke oder Djibné Nahme	Djibné Chadra	
		1.	2.
W.	15,0	14,6	13,8
Fettgehalt bezogen auf Trockensubstanz . . .	47,7	36,9	34,8
Aschengehalt bezogen auf Trockensubstanz . .	11,9	15,1	11,5
CaO, bezogen auf Asche	11,5	16,8	23,2

Die 3 Proben waren bereits stark ausgetrocknet u. hart geworden. Die Bereitungsweise, die eingehend angegeben wird, geht darauf aus, den Bruch möglichst unzersetzt zu erhalten, also die Reifung nach Möglichkeit zu verhindern. Es zeigt sich dies an den geringen Mengen in W. l. N-haltiger Stoffe der beiden Käsearten, die gefunden wurden zu (‰):

	Djibné Nahme	Djibné Chadra
Gesamt-N	4,82	4,65
in W. l. N, bezogen auf Gesamt-N	6,64	12,91
mit P-W-Säure nicht fällbarer N, bezogen auf in W. l. N	46,87	43,33
Ammoniak-N, bezogen auf in W. l. N	31,25	13,32

(Milchwirtschaftl. Zentralblatt **55**. 17—20. Halle a. S.) RÜHLE.

J. W. Stevens, *Die Bedeutung von Lackmus, Bromkresolpurpur und Janusgrün für die Untersuchung der Knöllchenorganismen in Milchkulturen*. Vf. verfolgt die Rk.-Veränderungen, die in Milchkulturen von verschiedenen Leguminosenknöllchen eintreten. Am geeignetsten erwies sich Lackmus, um die Kulturen an ihrer Rk. zu charakterisieren. (Journ. Agricult. Research **31**. 997—1000. 1925. Univ. of Wisconsin.) TRÉNEL.

P. Borinski, *Ein neues Reagens zum Nachweis der Peroxydase in der Milch*. Vf. gibt die Herst. eines Peroxydasenreagens aus Guajakharz an, das durch Zusatz von H₂O₂ sofort brauchbar u. für prakt. Zwecke lang genug haltbar ist. Es eignet sich auch zum Nachweis von Blut; der Zusatz von altem Terpentinöl erübrigt sich. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 281—83. Berlin.) JUNG.

Kellogg Company, Battle Creek, Michigan, übert. von: John Leonhard Kellogg, Battle Creek, Michigan, *Nährmittel*, welches dadurch erhalten wird, daß man Kleie mit Dampf unter Druck kocht u. der M. während des Kochens geeignete Gewürze zusetzt. (A. P. **1 569 861** vom 28/11. 1922, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

Richard Fanto und Max Daniek, Wien, *Vitaminhaltiges Kindermehl*, welches dadurch erhalten wird, daß in bekannter Weise bereitetes Kindermehl mit trockenen Vitaminstoffen oder solche enthaltenden Siccumextrakten vermengt wird, oder daß das Kindermehl mit aus geeigneten Pflanzenteilen gewonnenen vitaminhaltigen Säften befeuchtet und dann vorsichtig getrocknet wird. (Oe. P. **99 683** vom 22/11. 1923, ausg. 10/4. 1925.) OELKER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

Walter Obst, *Flüssige Seifen*. Beschreibung der Herst. (Allg. Öl- u. Fett-Ztg. 23. 89—90.) JUNG.

G. Knigge, *Abietinsäure aus Kiefernöl*. Vf. stellte *Abietinsäure* aus „Pflanzenfettsäure H“, schwed. Harzöl, durch Absaugen der Krystalle u. Umkrystallisieren dar. Nach einem Vers. eignet sich die abfiltrierte techn. *Abietinsäure* zur Seifenherst. (Allg. Öl- u. Fett-Ztg. 23. 88—89. Berlin-Lichterfelde.) JUNG.

G. I. Finch und **A. Karim**, *Ein schnelles Verfahren zur Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit beim Seifenkochen*. Eine Probe des Reaktionsgemisches wird soweit auf ein bekanntes Vol. mit W. verd., daß in der Lsg. etwa 2—3% der Probe vorhanden sind; dann sättigt man einen gewissen Teil (25ccm) der Lsg. mit festem neutralem NaCl, das Seife u. Fett ausfällt, während freies Alkali, soweit es mit dem Nd. nicht niedergelassen worden ist, in Lsg. bleibt. Man titriert dann mit Säure u. Phenolphthalein als Indicator, gibt nahe am Endpunkte Leichtpetroleum zu, wodurch das niedergelassene freie Alkali in Freiheit gesetzt wird, u. titriert zu Ende. Einen andern Teil der Lsg. titriert man mit Säure u. Methyloorange als Indicator u. erhält das Gesamtalkali. Der Unterschied gibt das gebundene Alkali u. damit, da von früheren Analysen her die zum Verseifen erforderliche Menge Alkali bekannt ist, den Umfang der in der vorliegenden Probe eingetretenen Verseifung. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 35—36. London.) RÜHLE.

H. Kreis, *Ein neuer Wasserbestimmungsapparat*. Vf. bringt die Abbildung eines noch etwas einfacheren App. als der von NORMANN (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 380; C. 1925. II. 365) angegebene (Herst.: E. KELLER, Basel) u. empfiehlt die Verwendung von *Toluol*. BESSON (Chem.-Ztg. 41. 346; C. 1917. I. 1045) nennt Vf. irrtümlich als denjenigen, der Xylol vorgeschlagen hat (vgl. KREIS, Chem.-Ztg. 32. 1042; C. 1908. II. 1831). (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 8. 33—34. Basel.) JUNG.

F. F. Shelley, *Der Nachweis von Erdnußöl in Olivenöl*. Ist heutzutage nach POWELL (vgl. S. 266) mit der Ggw. von *Stearinsäure* in Olivenöl zu rechnen, so ist dies ein weiterer Grund für das Auftreten von Ndd. oberhalb 16 oder 17° bei der von LUERS abgeänderten Bellierschen Probe. (Vgl. auch RICHMOND, POWELL u. CAULKIN, Analyst 50. 285; C. 1925. II. 1500.) (Analyst 50. 498.) RÜHLE.

G. D. Elsdon und **Percy Smith**, *Die Bestimmung von Palmkernfett und Butterfett in Margarine*. Die früheren Bestst. von Cocosfett u. Butterfett in Margarine (Analyst 50. 53; C. 1925. I. 2265) sind auf *Palmkernfett* ausgedehnt worden. Die Ergebnisse werden gegeben. (Analyst 51. 72—76.) RÜHLE.

Karl Friedrich Wilhelm, Stralsund, *Entfernung von Fettsäuren, Harzen, Bitterstoffen und Schleimstoffen aus Ölen und Fetten*, dad. gek., daß die Öle oder Fette mit einem Fettsäure-, aber nicht Neutralöl lösenden, mit W. mischbaren Stoff, wie z. B. A., unter Zusatz von NH₃ behandelt werden. — Beim Stehenlassen der Mischung tritt eine glatte Trennung des Neutralöls von der Mischlg. ein, aus welcher eine fast reine Fettsäure durch Dest. gewonnen werden kann. (D. R. P. 425 124 Kl. 23a vom 25/12. 1923, ausg. 10/2. 1926.) OELKER.

Laval Separator Co., New York, übert. von: **Cyrus H. Hapgood**, Nutley, N. J., und **George F. Mayno**, East Orange, N. J., *Reinigen von vegetabilischen Ölen*. (Can. P. 251 504 vom 28/6. 1924, ausg. 7/7. 1925. — C. 1925. II. 1906.) OELKER.

Naamlouze Vennootschap „Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken“, Oss, Holland, *Reinigung und Geruchlosmachung von Ölen und Fetten*, 1. dad. gek., daß bei der bekannten Behandlung mit Wasserdampf oder indifferenten Gasen (ausgenommen H₂), gegebenenfalls auch im Vakuum, gleichzeitig pulverförmige Oxyde, bas. Carbonate

oder Silicate der Schwermetalle, allenfalls auch fein verteiltes Fe oder Bleicherden als Zusatzstoffe verwendet werden. — 2. dad. gek., daß man die genannten Stoffe in bekannter Weise auf einen indifferenten Träger niederschlägt. (Oe. P. 96 154 vom 7/4. 1921, ausg. 25/2. 1924.)

OELKER.

Camillo Melhardt, Tutzing, Oberbayern, *Destillation von Ölen, flüssigen Fetten, Kohlenwasserstoffgemengen o. dgl.* Die Öle etc., welche zum Teil aus auch ohne Temperaturerhöhung flüchtig werdenden Körpern bestehen, werden zwecks Abkürzung der Destillationsdauer und schärfster Trennung von den anderen Bestandteilen bis zur Erschöpfung durch W. oder diesen gleichkommende schwache Salzlsgg., die zwischen porösen Körpern in heftigem Sieden gehalten werden, hindurchgedrückt. — Ein zu langes Verweilen des Destillationsgutes im Destillationsgefäß wird vermieden. (D. R. P. 424 678 Kl. 23b vom 18/1. 1925, ausg. 11/2. 1926.)

OELKER.

N. V. Sallandsche Vloerzeil- & Linoleumfabriek, Wijke, Holland, *Oxydieren von Leinöl.* (Holl. P. 13 885 vom 28/4. 1922, ausg. 16/11. 1925. — C. 1926. I. 1734 [P. W. H. J. V. DE WAEL Schwz. P. 101617].)

FRANZ.

Gerhard Piorkowski, Berlin, *Herstellung einer desinfizierenden Seife.* Einer hochprozentigen festen oder salbenartigen Spiritusseife werden sauerstoffabgebende Stoffe, wie Persulfate, Perborate, Alkaliperoxyde, Magnesiumperoxyd usw. zugesetzt. — Die Seife soll in erster Linie zur völligen Keimfreimachung der Hände dienen. (D. R. P. 425 178 Kl. 23e vom 11/5. 1924, ausg. 12/2. 1926.)

OELKER.

Grigori Petrow, Moskau, *Trennen oxydierter von nichtoxydierten Fettsäuren.* Man löst die Mischungen dieser Säuren in A. oder CH₃OH u. extrahiert die Lsgg. mit organ. Lösungsm. (Bzn., aromat. KW-stoffe, wie Bzl., Toluol, Xylol, Terpenin usw.), in denen die nichtoxydierten Fettsäuren l., die oxydierten unl. sind. (E. P. 212 990 vom 20/12. 1922, ausg. 17/4. 1924.)

KAUSCH.

Vapo Products Co., Inc., übert. von: **Carl T. Wiese**, Sand Point, Idaho, *Reinigungsmittel für gefärbte Gewebe usw.*, bestehend aus einer Seifenbase (19 Pfd. verseiftes Baumwollsaamenöl u. 2½ Gallonen W.), einer Sassafras- u. Seifenrindenlsg. (1 Pfd. Sassafras, 8 Unzen Seifenrinde u. 2½ Gallonen W.), Bleicherde, 1 Quart W., Na₂S₂O₄, Natriumsalicylat (gel. in 1 Quart W.) u. 5 Pfd. Borax. (A. P. 1 571 829 vom 9/10. 1922, ausg. 2/2. 1926.)

KAUSCH.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Eduard Herzinger, *Das Mercerisieren der Baumwollstücke.* Das Arbeiten mit NaOH-Lsg. von 25—30° B. unter rollendem Druck auf der Krabbmaschine ist geschildert. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 64—65.)

SÜVERN.

A. Le Moine, *Die Bedingungen, unter denen sich Gespinnstfasern von selbst entzünden können.* In sachgemäß behandelter Baumwolle kann nicht so viel oxydierbares Öl vorkommen, daß eine Selbstentzündung eintreten kann, auch eine Funkenbildung durch Hertzsche Wellen u. die Metallteile der Ballenumschnürungen kann eine Entzündung von Baumwolle nicht bewirken. Verss. von HENRY über diesen Punkt werden mitgeteilt. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1925. 222. 252—54. Nach Bull. Soc. Ind. de Rouen.)

SÜVERN.

Alexander Robert Urquhart und **Alexander Mitchell Williams**, *Die Feuchtigkeitsverhältnisse von Baumwolle. Wasserabsorption von Baumwollen verschiedener Herkunft.* (Vgl. S. 1735.) Die Abweichungen in der Hygroskopizität verschiedener Rohbaumwollen, die frühere Bearbeiter beobachtet haben, treten nicht mehr so stark auf, wenn durch Kochen mit W. eine teilweise Reinigung vorgenommen wird. Es ist wahrscheinlich, daß die reinen Cellulosen verschiedener Baumwollen nur wenig von-

einander abweichen. Das Entfernen von Nichtcellulosen ist von einer Herabsetzung der Hygroskopizität begleitet, weitere Herabsetzung der Hygroskopizität zeigt das gefärbte Gut, sie kann nicht durch die Aufnahme nichthygroskopischer Stoffe durch die Baumwollfaser erklärt werden. (Journ. Textile Inst. 17. T. 38—45.) SÜVERN.

K. Stephan, *Die Entfernung der Druckerschwärze von Altpapier*. Vf. pflichtet der Meinung ALBRECHTS (S. 1902) bei, daß die vorgeschlagenen Verff. zu teuer sind. Ein Bedürfnis der Verarbeitung von Altpapier auf Zeitungspapier liegt jedoch vor. Eine vom Vf. hergestellte tiefschwarze beständige Farbe, die mit verd. H_2SO_3 ausgebleicht werden kann, ermöglicht die Aufarbeitung mit geringen Unkosten. (Chem.-Ztg. 50. 137. Charlottenburg.) JUNG.

K. Stephan, *Entfernung der Druckerschwärze von Altpapier*. Ein Nacharbeiten des von BERL u. PFANNMÜLLER (vgl. S. 271) vorgeschlagenen Verf. führte zu keinem befriedigenden Resultat. Das Verf. ist nicht rentabel. Nach dem Verf. des Vfs. (vorst. Ref.) wird mit einer Farbe aus Braunstein u. organ. Farben, die mit SO_2 entfärbt werden kann, gedruckt. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 269—70. Charlottenburg.) JUNG.

Eugene C. Bingham, Guy F. Rolland und Guido E. Hilbert, *Sulfitcelluloseablauge als Schutzkolloid*. Gereinigte Sulfitcelluloseablauge hat vermöge ihres Gehaltes an Saponinen eine stark oberflächenspannungserniedrigende Wrkg., weshalb sie die Seife da, wo diese aus chem. Gründen nicht angewendet werden kann, zu ersetzen vermag. Sie ist vieler Anwendungsmöglichkeiten fähig; so in der Ton-, Graphit- u. Linoleumindustrie, ferner als Schmiermittel wegen ihrer hohen Adhäsion für viele Stoffe. (Ind. and Engin. Chem. 17. 952—53. 1925.) RIESS.

Compagnie Générale des Industries Textiles und E. C. Duhamel, Roubaix, *Reinigen von Faserstoffen*. Bei der Verwendung von Wollwaschlaugen zum Reinigen von Rohwolle setzt man der Fl. fäulnisverhindernde Stoffe, wie Thymol, Chlf. oder KCN zu. (E. P. 240 499 vom 8/9. 1924, Auszug veröff. 18/11. 1925. Prior. 7/9. 1923.) FRANZ.

Ernst Löwenstein, Wien, *Verfahren, um Stoffe aller Art ungezieferwidrig zu machen*. Man bestreicht oder trinkt die Stoffe mit Lsgg. von Chinin, dessen Salzen oder Derivv. (Oe. P. 99 430 vom 22/12. 1923, ausg. 10/3. 1925.) FRANZ.

Compagnie Générale des Industries Textiles und E. C. Duhamel, Roubaix, Frankreich, *Waschen von Faserstoffen*. Vom Wollfett gereinigte Wolle wird mit gereinigter Wollwaschlauge von 4° Bé behandelt, hierdurch wird die Weichheit, Festigkeit u. Elastizität der Wollfaser erhöht; die bei der Reinigung von Wolle gewonnene Wollschweißlauge wird durch eine zweistufige Schleuder gereinigt. (E. P. 240 477 vom 8/9. 1924, Auszug veröff. 18/11. 1925. Prior. 7/9. 1923.) FRANZ.

Compagnie Générale des Industries Textiles und E. C. Duhamel, Roubaix, Frankreich, *Waschen von Faserstoffen*. Rohwolle wird zuerst mit Wollwaschlauge von 4° Bé u. dann mit einem Seifenbad behandelt. (E. P. 240 482 vom 8/9. 1924, Auszug veröff. 18/11. 1925. Prior. 7/9. 1923.) FRANZ.

Millard Brandt, Tamaqua, Pa., *Wasser- und feuersicheres Papier*. Man behandelt das Papier mit geeigneten Salzen, z. B. mit NH_4Cl , um es feuerfest zu machen, u. überzieht es dann mit einer wasserundurchlässigen Schicht, z. B. Kautschuk. (Can. P. 251 843 vom 24/1. 1925, ausg. 21/7. 1925.) OELKER.

West Virginia Pulp and Paper Company, New York, übert. von: **Viggo Drewsen**, Larchmont, N. Y., V. St. A., *Behandlung von Sulfitablaugen*. — Man konz. die Fl. im Vakuum bis zu einem Wassergehalt von etwa 50%, setzt 25—75% gepulverten Kalk hinzu und unterwirft das Prod. der trockenen Dest. in Ggw. von überhitztem Wasserdampf, wobei Aceton, Methylalkohol u. andere flüchtige Stoffe erhalten werden.

Der Retortenrückstand wird dann verascht, aus der CaS und Na₂CO₃ enthaltenden Asche das letztere ausgelaugt, der Rückstand mit CO₂ enthaltenden Ofengasen behandelt, wodurch das CaS in CaCO₃ u. H₂S übergeführt wird, letzteres zu SO₂ verbrannt u. diese zur Umwandlung des Na₂CO₃ in Na₂SO₃ verwendet, das zur Herst. neuer Koch-lauge benutzt wird. Aus dem zurückbleibenden CaCO₃ wird durch Brennen CaO erzeugt, der ebenfalls wieder in dem Prozeß Verwendung finden kann. (Can. P. 252 010 vom 11/6. 1923, ausg. 21/7. 1925.)

OELKER.

Walter Marcus, Wien, *Dauerwäsche*. Die aus Celluloid oder dergl. bestehende Dauerwäsche wird an den Stellen, die durch Biegen usw. besonders in Anspruch genommen werden, mit einer Weichmachungsfl. behandelt, die an der Oberfläche wieder ausgewaschen wird, so daß das Weichmachungsmittel nur innerlich wirksam bleibt. (Oe. P. 96 271 vom 23/5. 1921, ausg. 10/3. 1924.)

FRANZ.

Henry Dreyfus, London, übert. von: **Charles Wilfred Palmer** und **William Whitehead**, Spondon bei Derby, *Kunstseidefäden*. (Can. P. 252 227 vom 6/2. 1923, ausg. 28/7. 1925. — C. 1924. II. 1297.)

KAUSCH.

Henry James Hands, Chiswick, Middlesex, *Nitrocelluloseschichten, -filme usw.* Schichten oder Filme von Cellulose aus Viscose, Kupferoxydammoniakcellulose lsgg., ZnCl₂-Lsg., organ. Cellulosesderiv. werden auf beiden Seiten mit einer dünnen Nitro-celluloseschicht überzogen. (E. P. 243 032 vom 17/5. 1924, ausg. 27/12. 1925.)

FRANZ.

G. Schicht, Aussig a. E., und **A. Eisenstein**, Schreckenstein b. Aussig, *Linoleum*. Man vermischt die Rohstoffe in solchen Mengenverhältnissen miteinander, daß das erhaltene Gemisch gerade noch pulverförmig ist; das Gemisch wird dann nach den üblichen Verff. oxydiert, wobei man die Temp. über 70°, jedoch unterhalb der Verkohlungstemp. hält, die frei werdende Wärme kann zum Oxydieren von frischem Leinöl verwendet oder durch Zusatz von Korkmehl herabgesetzt werden. Man erhitzt z. B. Ölfirnis mit Harz u. vermischt diese Mischung in einer Mischvorr. mit Holzmehl u. einer Mineralfarbe bei etwa 150°; sobald die Rk. einsetzt, wird das Erhitzen unterbrochen u. neue Mengen von dem Ölharzgemisch zugesetzt, schließlich wird der Rest des Ölharzgemisches, des Holzmehles u. der Mineralfarbe zugesetzt. (E. P. 242 832 vom 3/2. 1925, ausg. 10/12. 1925.)

FRANZ.

Rudolf Schwartz, Wien, *Herstellung von Kunsthorn und ähnlichen Massen*. Man verwendet hierzu in W. l. Blutmehl; es wird mit W. zu einer Paste angerührt, heiß gepreßt u. in der Presse erkalten gelassen, hierauf wird mit CH₂O nachbehandelt u. getrocknet. (Oe. P. 95 806 vom 23/11. 1921, ausg. 25/1. 1924.)

FRANZ.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

C. H. S. Tupholme, *Verkohlung von Seelgen*. Die Algen werden lufttrocken in horizontalen Retorten bei 600° verkocht. Es entsteht dabei 40% Kohle mit einem Aschengehalt von 64,26%. Dieser Aschengehalt wiederum enthält 71,92% l. Salze mit einem Gehalt von 2—2,5% NaJ u. 23,8—24,2% KCl. Außerdem entstehen Gase, welche anfangs viel CO₂ enthalten. Der CO₂-Gehalt sinkt nach etwa 30 Min. beträchtlich. Die dann entstehenden Gase können weiter verbrannt werden. Der gebildete Teer ist eine schwarze, viscose Fl., hat die D₁₅ 1,048. Bei seiner Dest. gehen bei 200° 14% (D₁₅ 0,885), zwischen 200° u. 250° 20,9% (D₁₅ 0,954), zwischen 250° u. 300° 16% (D₁₅ 0,978), zwischen 300° u. 315° 12,8% über, während 35,5% Pech zurückbleiben. Mit NaOH können 12,2% u. mit H₂SO₄ 11,2% ausgezogen werden. Zur Heizung der Retorten können außer dem Gas auch die nach der Extraktion der l. Stoffe verbleibende Kohle u. der Teer verwandt werden. (Chem. Metallurg. Engineering 33. 81—82. London.)

ENSZLIN.

Gustav Keppeler und **Jürgen Schmidt**, *Über die Ölkreide bei Heide i. Holstein*. Ein Vers., das Öl aus der Heider Ölkreide durch Auflösen der Kreide in HCl zu isolieren, schlug infolge mangelhafter Benetzbarkeit fehl. Mit Bzl. wurden 80% des

Gehaltes als schwarzes hochviscoses u. stark ungesätt. Öl gewonnen. Das durch Schwelen mit bis zu 89% Ausbeute erhaltliche grüne Öl mit rotbrauner Fluoreszenz ist hingegen nur wenig viscos u. enthält nur 50—60% ungesätt. Anteile. Der Benzingeht der Schwelöle beläuft sich auf 2—6%. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 220—24.) HEIMANN.

N. Zelinsky, *Künstliche Naphtha aus Balchasch-Sapropeliten. Beitrag zur Hypothese über die organische Entstehung des Erdöls.* Vf. untersuchte den „Elaterit“ von Balchasch-Distrikt, den er als einen Sapropelit von pflanzlicher Herkunft u. ohne direkte Beziehung zu Naphtha erkannte. Es ist eine trockene elast. M. von charakterist. Wachs- u. Talgeruch mit einem Gehalt von 96% an organ. Substanz. Bei 110° entweichen 1,8% W., es bleiben bei der Verbrennung 4% Asche. Die organ. Substanz enthält 73,76% C, 10,91% H, 1,03% S, 0,56% N, Spuren P u. 13,74% O. Mit Lösungsmm. konnten bis zu 42,1% organ. Substanz extrahiert werden, in der über 40% freie Säure und, einschließlich der gebundenen, 60% Gesamtsäure, auf Stearinsäure umgerechnet, enthalten waren. Bei der trockenen Dest. des Sapropelits entstanden aus 4930 g Rohmaterial 2810 g (57%) eines fl. Kondensats (Teer) einschließlich des enthaltenen u. entstandenen W. Der Teer war beweglich u. von intensiv granatroter Farbe u. spezif. Gew. 0,82. Daneben blieben 1190 g = 24% fester Rückstand, aus dem durch nochmalige Dest. noch 307 g = 6,2% Teer sich erzielen ließen. Dabei verblieben 795 g = 16% Koks.

Aus den (nach Abzug von 562 g pyrogenet. H₂O verbleibenden) 2248 g Teer der primären Zers. wurde durch Dest. u. Raffination eine Ausbeute von 383 g oder 12,6% bis 150° sd. Bzn.-KW-stoffe = 7,8% des Sapropelits u. 1228 g = 54,6% schwererer, dem Petroleum entsprechender KW-stoffe (Kp.₇₆₀ 150°—Kp.₂₀ 200°) = 26% des Sapropelits erzielt. Aus den Ölen der sekundären Zers. wurden noch so viel schwere KW-stoffe gewonnen, daß die gesamte Petroleumfraktion sich auf 60% belief. Das leichte Bzn. bestand überwiegend aus gesätt. KW-stoffen der Formel C_nH_{2n+2}, die Petroleumfraktionen, deren höchste Anteile zu festen Paraffinen erstarrten, zeigten eine Zusammensetzung entsprechend C_nH_{2n}. (Brennstoffchemie **6**. 365—69. 1925.)

BÖRNSTEIN.

International Coal Products Corporation, New York, *Herstellung von Brennstoff.* Zwecks Erzeugung von dichtem u. festem Koks aus Kohlen mit einem hohen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen, wird nicht backende Kohle, die reich ist an flüchtigen Bestandteilen, mit einem aus einer ebensolchen nicht backenden Kohle u. Weichpech bestehenden Zuschlag, dessen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen etwa 11—20% des Gewichtes der ganzen M. beträgt, gemischt, brikettiert u. verkocht. (Oe. P. **96 138** vom 16/6. 1920, ausg. 25/2. 1924. A. Prior. 18/2. 1918.) OELKER.

Rudolf Tormin, Düsseldorf, *Herstellen eines stückigen oder geformten Brennstoffes aus Koks.* — Koksgrus wird zerkleinert, durch Erhitzen getrocknet, dann mit Teer oder einem anderen geeigneten Bindemittel innig gemischt u. schließlich in beliebiger Weise geformt oder zu Stücken zusammengeballt. Dem trockenen Koks können Braunkohle oder feinkörniger Grudekoks, oder beide zugemischt werden. (D. R. P. **424 982** Kl. 10b vom 19/10. 1924, ausg. 8/2. 1926.)

OELKER.

L. G. Wilkening, Biebrich a. Rh., *Behandlung von Torf o. dgl. Torf, Marschboden o. dgl., bzw. Mischungen derartiger Stoffe werden, gegebenenfalls unter Mitverwendung von borsäuren oder phosphorsäuren Salzen mit der verd. wss. Lsg. eines Alkali- oder Ammoniumhalogenids, z. B. LiCl, getränkt u. dann ausgepreßt.* Die Behandlung verleiht dem Torf usw. wasserabweisende Eigenschaften u. macht ihn feuersicher. (E. P. **244 716** vom 2/10. 1925, Auszug, veröff. 10/2. 1926. Prior. 17/12. 1924.)

KÜHLING.

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, übert. von: **Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston**, Paris, *Imprägnieren von Schiefer*. Schiefer wird zur Entfernung der Feuchtigkeit einem Vakuum unterworfen u. dann mit Leinöl, Firnis, Harzen, Chlorderivv. des Naphthalins oder dergl. imprägniert; die Imprägnierungsmittel werden dann durch Oxydation, Polymerisation, Trocknen usw. in den festen Zustand übergeführt; der so behandelte Schiefer soll als *elektrisches Isoliermittel* dienen. (**E. P. 243 709** vom 16/11. 1925, Auszug veröffentlicht 27/1. 1926. Prior. 29/11. 1924.) FRANZ.

Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz, *Konservierung des Öles in Ölkesseln elektrischer Apparate*. 1. dad. gek., daß das Öl mit „oktaedrischem“ Borax ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 5\text{H}_2\text{O}$) in Berührung gebracht wird. — 2. dad. gek., daß Faserstoffe mit h. gesättigter Boraxlsg. getränkt, getrocknet u. im elektr. App. angebracht werden. — Im Öl gebildete Säuren werden neutralisiert, ohne daß das Öl selbst angegriffen wird, wie dies z. B. bei Zusatz von Alkalien u. Ätzalkalien der Fall ist. (**D. R. P. 425 051** Kl. 23c vom 6/5. 1924, ausg. 11/2. 1926. Schweiz. Prior. 14/4. 1924.) OELKER.

Merco Nordstrom Valve Company, übert. von: **Sven Johan Nordstrom**, San Francisco, Calif., *Schmiermittel*, welches aus 32% harter Seife, 52% weicher Seife, 4% Graphit u. 12% Glycerin besteht. Das Schmiermittel ist in Gasolin unl. (**Can. P. 251 988** vom 11/6. 1924, ausg. 21/7. 1925.) OELKER.

August Baumann, Coburg, *Trocknen von Hölzern*. Die Hölzer werden der Einw. feuchtwarmer Luft ausgesetzt, der flüchtige Stoffe beigemengt sind. Diese flüchtigen Stoffe sollen in die Poren des Holzes eindringen, die im Holz vorhandenen Eiweißstoffe zum Gerinnen bringen u. diese sollen die Gerbstoffe, Harze u. Salze des Holzes einschließen. Gleichzeitig wird die Feuchtigkeit des Holzes ausgetrieben. Die Erzeugnisse sollen den naturtrockenen Hölzern gleichen. (**Schwz. P. 111 171** vom 18/8. 1924, ausg. 1/8. 1925.) KÜHLING.

Carl Fischer, Berlin, *Ausschleifen von stark porösen Hölzern vor dem Beizen*, dad. gek., daß die Holzflächen mit einer kombinierten Bürste, bei der Borsten u. Metallfeindrahtborsten abwechselnd in der Längsrichtung reihenweise eingesetzt sind, bearbeitet werden. — Die bisher schwer zu beizenden Poren der Hölzer, besonders Eichenhölzer, werden geöffnet u. die Holzstruktur geklärt u. gehoben. (**D. R. P. 424 470** Kl. 38h vom 24/2. 1925, ausg. 23/1. 1926.) KÜHLING.

Anton Braun, Wien, *Herstellung von Zedernholzersatz*. Weichhölzer, wie Holz der Erle, Linde u. Fichte, werden 6—10 Stdn. unter 5—6 Atm. Druck der Einw. von Naßdampf ausgesetzt u. dann $\frac{1}{2}$ —3 Stdn. mit überhitztem Dampf von 200—250° behandelt. (**Oe. P. 99 213** vom 28/4. 1924, ausg. 10/2. 1925.) KÜHLING.

Gebr. Himmelsbach A.-G., Freiburg i. B., *Konservierung von Hölzern nach dem Eintauchverfahren*. Beim Kyanisieren werden die Laugen auf mehr als 40° erwärmt u. zwangsläufig durch die zur Aufnahme des Holzes bestimmten Tröge geleitet. Das Verf. verläuft rascher als das mit nicht erwärmter ruhender Lauge arbeitende u. kann auch im Winter ausgeübt werden. (**Schwz. P. 112 049** vom 22/1. 1925, ausg. 1/10. 1925 u. **F. P. 592 932** vom 5/2. 1925, ausg. 12/8. 1925. D. Prior. 11/10. 1924.) KÜHL.

Carl Schmittutz, Bad Kissingen, *Verfahren zum Imprägnieren lebender Bäume*. Man bohrt den Baumstamm an einigen Stellen an, kappt die Baumkrone oder die Zweige u. führt unter so hohem Druck in die Bohrungen die Imprägnierfl. oder die Farbstofflsg. ein, daß der natürliche Saft des Baumes völlig ausgetrieben u. durch die fremde Fl. ersetzt wird. — Der Saft tritt hierbei an den Zweigenden in Form eines feinen Strahls aus. Der anzuwendende Druck richtet sich je nach der Dicke des Baumstammes. Innerhalb $\frac{1}{2}$ —1 Stde. ist die Imprägnierung völlig durchgeführt. Das Verf. gestattet die Gewinnung wertvoller Säfte, wie von *Gummi-, Fichten-, Eucalyptus-* oder *Birkenbäumen*. Besonders wertvoll ist es für die Gewinnung von *Kaut-*

schukmilch, da es das restlose Austreiben des Saftes vor dem Fällen der Gummibäume ermöglicht. (A. P. 1564 141 vom 11/10. 1924, ausg. 1/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Andreas Zwenig, Mallnitz (Kärnten), *Herstellung von Bügelkohlenziegeln* aus Holzkohlengries unter Beimengung von KNO_3 u. Zement, dad. gek., daß zu 100 Gewichtsteilen Hartkohlengries, 1,5 Gewichtsteile KNO_3 , 12—14 Gewichtsteile Portlandzement, 9 Gewichtsteile Sand u. 19 Gewichtsteile W. zugesetzt werden, worauf nach Durchmischung die M. in an sich bekannter Weise zu Ziegeln gepreßt u. getrocknet wird. (Oe. P. 96 984 vom 23./1. 1923, ausg. 26/5. 1924.) OELKER.

Fuel Development Corporation, Wilmington, Del., übert. von: **Grant Hammond**, New Haven, Connecticut, *Brennstoff*, insbesondere für Verbrennungskraftmaschinen, welcher aus Petroleum, einem leicht entzündlichem KW-stoff, Aceton, Butylalkohol u. Glycerin besteht. (A. P. 1 570 059 vom 17/6. 1922, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

Fuel Development Corporation, Wilmington, Del., übert. von: **Grant Hammond**, New Haven, Connecticut, *Brennstoff* für Explosionsmotoren u. dgl., welcher aus 40—50 Teilen Petroleum, 50—60 Teilen Gasolin, 1—4 Teilen Butylalkohol ($\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$) u. 3—12 Teilen Bzl. besteht. (A. P. 1 570 060 vom 3/5. 1923, ausg. 19/1. 1926.) OE.

General Motors Research Corp., übert. von: **Dayton-Wright Co.**, übert. von: **Thomas Midgley, jr.**, Dayton, Ohio, *Motortreibmittel*. (Can. P. 251 325 vom 23/6. 1919, ausg. 30/6. 1925. — C. 1924. II. 2108.) OELKER.

Siemens & Halske A.-G., Siemensstadt, übert. von: **Max Moeller**, Berlin, *Analyse von Abgasen*. (A. P. 1 562 243 vom 22/11. 1924, ausg. 17/11. 1925. — C. 1925. I. 2458.) KÜHLING.

XXI. Leder; Gerbstoffe.

W. D. Bancroft, *Kolloidchemie in der Gerberei*. Entschiedene Stellungnahme gegen die von PROCTER, von WILSON u. von BOGUE vertretene Ansicht, daß sich bestimmte chem. Verbb. zwischen Gerbstoff u. Haut bilden. Besonderer Hinweis auf färb. Vorgänge, bei welchen — mit Ausnahme der „Diazotierung der Wolle“ — man niemals von chem. Verbb. zwischen Farbstoff u. Faser sprechen könne. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 565—73. 1925.) GERNGROSS.

Leopold Pollak, *Neue Gerbmateriale und Hilfsstoffe für die Lederindustrie*. Besprechung von Zus. u. Wrkg. von *Anti-oxydul*, *Pellastol C* u. *N* der Farb- u. Gerbstoffwerke C. FLESCH jr., Frankfurt a. M. Sie enthalten im wesentlichen sulfurierte Öle, die Pellastole außerdem Mineralöle. (Gerber 51. 213—14. 1925.) GERNGROSS.

Arthur W. Thomas und **Stuart W. Foster**, *Der zerstörende und erhaltende Effekt von Neutralsalzen auf Hautsubstanz*. Die hydrolyt. Wrkg. von verschiedenen konz. Neutralsalzlsgg. ordnet sich in die Reihe: $\text{NaBr} > \text{CaCl}_2 > \text{LiCl} > \text{NaJ} = \text{MgCl}_2 > \text{KCl} = \text{NaCl} > \text{H}_2\text{O} > \text{MgSO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4$. Danach sind CaCl_2 u. MgCl_2 , die im Handels-NaCl enthalten sind, stark lösend, Mg u. Na_2SO_4 am besten konservierend. Es wird erwogen, das gebräuchliche NaCl durch Na_2SO_4 als Einsalzmittel zu ersetzen. (Ind. and Engin. Chem. 17. 1162—64. 1925. New York, Columbia Univ.) GERNGROSS.

K. H. Gustavson, *Die Einwirkung von Natriumchlorid auf die Wasserstoffionenkonzentration und Stabilität gegen Alkali von Chromchloriden*. Zugabe kleiner Mengen NaCl erniedrigt die $[\text{H}^+]$, während größere Mengen sie stark erhöhen; dies um so deutlicher, je verdünnter u. je basischer die Brühe ist. Die Ausflockungszahl u. Ausflockungsbasisität werden durch NaCl-Zusatz beträchtlich vermindert, besonders bei verd. u. stark bas. Brühen. Die anfängliche Erniedrigung der $[\text{H}^+]$ u. Ausflockungszahl durch NaCl wird durch die Stabilisierung von Cl in der koordinativen Sphäre erklärt, während die spätere Erhöhung der $[\text{H}^+]$ auf die Hydratation des NaCl u. die dadurch verursachte Konz.-Erhöhung zurückgeführt wird. (Ind. and Engin. Chem. 17. 945 bis 952. 1925.) RIESS.

K. H. Gustavson, *Aufnahme der Bestandteile der Chrombrühen aus hochkonzentrierten Chromlösungen durch Hautsubstanz*. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. dehnt seine Untersuchungen auf Brühen mit mehr als 100 g Cr_2O_3 pro Liter aus. Bei allen Brühen fällt die Cr-Aufnahme mit steigender Konz. Die 50% bas. Brühe zeigt drei Maxima der Cr-Aufnahme bei 17—20, 140 u. 193 g Cr_2O_3 pro Liter, die Vf. aus der Wrkg. 1-, 2- u. 3-wertiger Cr-Kationen erklärt. Bei den beiden letzteren Konz. hat die Aciditätskurve der Cr-Kollagenverb. Minima. Die Ergebnisse werden durch das Zusammenwirken von chem. Rk. u. Niederschlagsbildung entgegengesetzt geladener Cr-Komplexe u. Protein erklärt. (Ind. and Engin. Chem. **17**. 823—26. 1925.) **RIESS**.

Ivanović Berestovoj und **Liboslav Mäsner**, *Die Extraktion des Chrom aus Chromleder durch Seignettesalz*. (Gerber **52**. 23—25. — C. **1926**. I. 1091.) **GERNGROSS**.

Gust. Klemp, *Grundzüge der Technologie des Leders*. Vf. gibt eine Zusammenstellung der verschiedenen Ledersorten u. vergleicht deren chem. u. physikal. Eigenschaften miteinander. Schließlich werden verschiedene Gerbtheorien besprochen. (Chem. Rundschau Mitteleuropa u. Balkan **2**. 262—64. 1925.) **RIESS**.

Spingbok, *Die Fabrikation von Futterledern*. Mitteilung von Verff. u. Rezepten. (Le Cuir Technique **17**. 336—38. 354. 1925.) **GERNGROSS**.

John Arthur Wilson und **Guido Daub**, *Aspergillus niger*, ein gewöhnlicher Schimmel, der auf dem Leder schwarze Flecken erzeugt. Vf. beschreibt Wesen u. Wachstum des *Aspergillus niger* in Reinkultur. Er wächst in saurer Lsg. u. besonders gut auf Cr-Leder. Alkali hindert das Wachstum. Zur Bekämpfung kann Chlor dienen, das schon in wss. Lsg. von 1:50 000 in 10 Min. alle Sporen tötet; HgCl_2 u. Formol sind viel weniger wirksam. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **20**. 400—05. 1925.) **RIESS**.

G. R. A. Short, *Quebrachorinde*. Zusammenstellung vorwiegend botan. Literatur. (Pharmaceutical Journ. **116**. 103—04.) **GERNGROSS**.

Leopold Pollak, *Über die Verwendung synthetischer Gerbstoffe*. Es ist besonders auf Kalkfreiheit der Blößen Wert zu legen. Als bestes Präparat wird Gerbstoff F (*B A S F*) bezeichnet. (Gerber **52**. 1—3.) **GERNGROSS**.

Raymond Dru, *Ein modernes, sehr nützliches, unter dem Pseudonym „Der synthetische Gerbstoff“ bekanntes Produkt*. Es werden die großen Vorteile der synthet. Gerbstoffe für die Fixierung der Schwellung, für die Vorgerbung u. Beschleunigung der nachfolgenden Gerbung, für Erzielung eines feinen Narbens, für die Peptisation „des Unlöslichen“, die Verbesserung der Farbe des Leders, die Unterdrückung der Fermentation der Brühen geschildert. Die künstlichen Gerbstoffe haben sich nach manchem Kampf einen unverlierbaren Platz in der internationalen Gerberei erworben. Genannt werden für Deutschland: Neradol, Ordoval; für England: Syntan, Maxyntan; für Belgien: Calnel B u. P u. BB; für Frankreich: Diatan fest u. fl., ferner Clarex; für U. S. A.: Sorbanol u. Leukanol. Von synthet. Gerbstoffen in Kombination mit Mineralgerbstoffen werden Corinal u. Eskoextrakt, Clarex C u. Diatan C erwähnt. (Le Cuir Technique **17**. 348—51. 1925.) **GERNGROSS**.

Douglas Mc Candlish, Leeds, und **William Rearden Atkin**, Heckmondwike, England, *Verfahren zum Weichen, Enthaaren und Beizen von Häuten und Fellen*. Man behandelt die Häute oder Felle mit einer wss. Lsg. von autolyseierter Hefe, mit oder ohne Zusatz von Aktivatoren, wie NH_4 -Salzen u. Säuren, wie HCO_2H , oder Alkalisalzen, wie Na_2CO_3 oder Na_2HPO_4 . — Zum Weichen trockener Häute bringt man diese in ein Bad, enthaltend eine Lsg. von autolyseierter Hefe u. wss. HCO_2H , bzw. Na_2CO_3 oder Na_2HPO_4 u. beläßt sie 24—48 Stdn. in dem Bade. — Zum Enthaaren verwendet man eine wss. Lsg. von autolyseierter Hefe u. NaHCO_3 . — Zum Beizen bringt man die in üblicher Weise geäscherten Häute, nach Entfernung der Haare, Auswaschen u. gegebenenfalls Neutralisieren, in eine wss. Lsg. von autolyseierter Hefe. (**A. P.** **1 570 383**

vom 22/7. 1925, ausg. 19/1. 1926. **E. P. 235 678** vom 10/4. 1924, ausg. 16/7. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Gioachino Carlo Precerutti Taparelli, Turin, Italien, *Herstellung radioaktiver Felle, Häute, Leder oder Pelze*. Man unterwirft die Felle, Häute usw. während der Gerbung der Emanation radioakt. Stoffe in offenen Gefäßen oder geschlossenen Räumen, oder mischt die radioakt. Stoffe mit vegetabil. oder mineral. Gerbmitteln u. gerbt hiermit. — Ebenso kann man die radioakt. Stoffe mit Farbstoffen vermischen u. verwendet diese Mischungen zum Färben von Leder oder Pelzen. (**Can. P. 250 265** vom 6/6. 1923, ausg. 2/6. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Rohm & Haas Company, Delaware, übert. von: **John Breedis**, Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von in kaltem Wasser leicht löslichen Gerbstoffpräparaten*. Man behandelt in W. wl. oder unl. vegetabil. Gerbstoffe in Ggw. von Alkali mit Sulfitecelluloseablauge u. säuert das Reaktionsprod. an. — Z. B. wird *Marrikinogummi* in der gleichen Gewichtsmenge 25%ig. NaOH gel., die Lsg. mit neutralisierter Sulfitecelluloseablauge (25%ig.) versetzt u. auf 85° erhitzt. Nach 2—3 Stdn. hat das Gemisch eine gleichmäßige Beschaffenheit u. andere Färbung angenommen u. wird hierauf mit einer geringen Menge konz. H₂SO₄ schwach angesäuert. Das in k. W. ll. Prod. besitzt eine gute *Gerburkg.* (**A. P. 1 563 010** vom 23/2. 1924, ausg. 24/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Albert Schmidt, Paris, *Gerbmittel durch Chlorierung von Sulfitecelluloseablauge*. (**A. P. 1 567 395** vom 30/3. 1922, ausg. 29/12. 1925. — C. 1922. IV. 978 [F. P. 533 884].) SCHOTTLÄNDER.

Robeson Process Company, New York, übert. von: **Thomas Blackadder**, Great Neck Estates, New York, V. St. A., *Herstellung von Gerbmitteln*. Rohe, Ca u. Mg enthaltende Sulfitecelluloseablauge wird mit mehr Ca(OH)₂ als zur Neutralisation der Ablauge erforderlich ist, zweckmäßig bei mäßig erhöhten Temp., versetzt, der ausgefallene Nd. entfernt u. das Filtrat mit der für die Ausfällung des gel. Ca(OH)₂ berechneten Menge H₂SO₄ oder Oxalsäure behandelt. — Die rohe Sulfitecelluloseablauge wird z. B. auf 70—80° erhitzt u. mit einem Überschuß an aus MgO-freiem CaO in Form von Kalkmilch versetzt. Der sich schnell u. dicht absetzende Nd. wird abfiltriert, das klare Filtrat im Vakuum bis zur D. 1,25 = 29° Bé konz., abgekühlt u. mit der berechneten Menge 60%ig. H₂SO₄ weiter behandelt. Nach Abfiltrieren des CaSO₄ enthält die Ca(OH)₂ u. H₂SO₄-freie Fl., D. 1,1707 = 21,1° Bé, 36,11% feste Bestandteile, von denen 22,49% Gerbstoffcharakter haben. Der beim Eindampfen erhaltliche feste Rückstand ist in W. l. Die Acidität der Lsg., berechnet als CH₃CO₂H, ist 6,36%. Durch Einblasen von Luft läßt sich die CH₃CO₂H entfernen u. durch Einleiten der austretenden Luft in Kalkmilch wieder gewinnen. Der Gesamtaschengehalt beträgt nur 1%. (**A. P. 1 571 873** vom 10/6. 1924, ausg. 2/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Charles Wesley Nance, London, *Gerbverfahren*. Die zu gerbenden Häute u. die Gerbstofflsg. werden in einen Autoclav gebracht, dieser sehr stark entlüftet u. unter zeitweiligem Zuleiten geringer Mengen sauerstofffreier Luft (zwecks Bewegung des Gefäßinhalts) auf etwa 40° erhitzt. Dann wird durch stärkeres Erhitzen Druck erzeugt. Durch Anwendung mehrerer Druckgefäße wird das Verf. zu einem stetig durchführbaren. (**E. P. 223 621** vom 27/4. 1923, ausg. 20/11. 1924.) KÜHLING.

Egon Strager, Wien, *Lederartige Stoffe aus Häuten*. Wie bei den bekannten Verff. wird die Interzellulärschicht von den Hautfasern getrennt, aber nicht verworfen, sondern durch ein geeignetes Reduktionsverf. wieder gewonnen u., gegebenenfalls unter gleichzeitiger Beifügung von Nachbehandlungsmitteln, zur erneuten Umhüllung der Hautfasern benutzt u. der gewonnene Brei mit Gerbmitteln behandelt. (**Oe. P. 101 017** vom 22/9. 1924, ausg. 25/9. 1925.) KÜHLING.

Chemisches Zentralblatt.

1926 Band I.

Nr. 16.

21. April.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Niels Bjerrum, *Die Entdeckung des Aluminiums*. (Vgl. GOLDSCHMIDT, S. 805.) Die Arbeiten FOGHS u. TOUSSAINTS zeigen, daß es wohl möglich war, nach dem Verf. OERSTEDTS Al zu erhalten. Die Behauptung WÖHLERS, das Al OERSTEDTS sei nur Al-haltiges K gewesen, war ohne Berechtigung. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 316 bis 317. Kopenhagen.) JUNG.

Otto Merz, *Hundert Jahre Benzol*. Geschichtliches u. Beschreibung der Eigenschaften u. Verwendung des Bzl. (Kunststoffe **16**. 29—30. Berlin-Neukölln.) SÜVERN.

F. Schuster, *Studien zur Zustandstheorie der Materie*. III. *Beziehungen zwischen der Oberflächenspannung und den Konstanten der Zustandsgleichung*. (II. vgl. S. 1755.) Von der Waldenschen Gleichung $p_k/\gamma_s = \text{konst.}$ ($p_k = \text{krit. Druck}$, $\gamma_s = \text{Oberflächenspannung}$) (vgl. P. WALDEN, Ztschr. f. physik. Ch. **66**. 385; C. **1909**. II. 90) ausgehend, gelangt Vf. zu einem Ausdruck für die erste van der Waalsche Konstante: $b_k = c_1 T_s/\gamma_s$ ($T_s = Kp.$) (vgl. auch W. HERZ, Ztschr. f. Elektrochem. **27**. 25; C. **1921**. III. 849). Für n. Stoffe ergibt sich für $10^5 \cdot b_k \cdot \gamma_s / T_s$ ein Mittelwert von 31,1. Auf assoziierte Medien ist die Formel nicht anwendbar. Die zweite Konstante läßt sich durch $a_k = C_2 T_s^2/\gamma_s$ ausdrücken u. gilt mit hinreichender Annäherung für n. Fll.; im Mittel findet Vf. für $10^6 \cdot a_k \gamma_s / T_s^2$ 6,10. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 46—47. Wien, Univ.) UL.

T. Carlton Sutton, *Über die Natur des „kritischen Inkrements“ chemischer Wirkung*. Vf. betrachtet den Zusammenstoß zweier aktivierter Moll. vom Standpunkt der kinet. Theorie u. kommt zu denselben Resultaten wie GARNER (Philos. Magazine [6] **49**. 463; C. **1925**. I. 1840), der die Frage thermodynam. behandelte. Bei diesen Zusammenstößen hängt der Erfolg, d. h. die B. neuer Moll., ab von der Translations- u. der Rotationsenergie der aktivierten Moll., u. es gibt viele Zusammenstöße, bei denen keine neuen chem. Einheiten gebildet werden. (Philos. Magazine [7] **1**. 606—08.) HANTKE.

W. P. Jorissen, *Reaktionsgebiete*. I. Vf. betrachtet die Rkk. zwischen 3 verschiedenen Substanzen u. ermittelt die Reaktionsgebiete, indem er die Grenzmischungen bei denen noch eine Rk. eintritt, graph. unter Benutzung von gleichseitigen Dreiecken aufträgt. Dieses Verf. wird für Reaktionsmischungen von 3 Gasen, von 2 Gasen u. einer festen Substanz, von Fll. mit festen Körpern u. von 3 festen Körpern angewandt u. an Hand einer großen Anzahl von Beispielen illustriert. (Chem. News **132**. 149—52. Leiden, Univ., Lab. f. anorg. Chemie.) HANTKE.

Niels Bjerrum, *Zur Theorie der chemischen Reaktionsgeschwindigkeit*. II. (I. vgl. Ztschr. f. physik. Ch. **108**. 82; C. **1924**. I. 2665.) Vf. sucht nachzuweisen, daß die Ansicht von BRÖNSTED (Ztschr. f. physik. Ch. **115**. 337; C. **1925**. II. 511), wonach die für eine einseitig verlaufende Rk. gültige Geschwindigkeitsformel auch für die Geschwindigkeit des inneren Umsatzes im Gleichgewichtszustande gelten muß u. dadurch auf ihre Richtigkeit geprüft werden kann, nicht richtig ist. Auf die Kompliziertheit des Problems wird hingewiesen. Seine eigene „Konzentrationshypothese“ hält Vf. aufrecht: Eine einfache, einseitig verlaufende chem. Rk., bestehend in der Umwandlung von einzelnen Moll. oder von Molekülkomplexen bestimmter Konfiguration, verläuft mit einer der Konz. der betreffenden Molekülarart oder des Molekülkomplexes proportionalen Geschwindigkeit. (Ztschr. f. physik. Ch. **118**. 251—54. 1925. Kopenhagen, Tierärztl. u. Landw. Hochsch.) ULMANN.

E. Briner, H. Biedermann und A. Rothen, *Über die Kompressibilität des Stickoxyds und seinen Zerfall.* (Journ. de Chim. physique **23**. 157—75. 1925. — C. 1926. I. 1625.) SCHMIDT.

Marie Lewitsky, *Das Biegen des Steinsalzes in Luft und Wasser.* Bei der Messung der Elastizitätsgrenze von Steinsalzkrystallen wurde festgestellt, daß die röntgenograph. gemessene Elastizitätsgrenze f' nicht mit der mit Spiegel u. Skala gemessenen f übereinstimmt. Erstere liegt höher als diese u. fällt zusammen mit dem beginnenden Fließen des Krystalls. In dem Gebiete zwischen diesen beiden Punkten ist keine Änderung der Laueflecke zu bemerken, woraus Vf. schließt, daß die Deformation aus reiner Translation besteht. In W. u. NaCl-Lsgg. bleibt die Elastizitätsgrenze f dieselbe wie in Luft, doch tritt bald hierauf das Fließen des Krystalls ein, auch die röntgenograph. gemessene f' ändert sich nicht. Dieses stützt den eben genannten Schluß, jenes erklärt die Plastizität des NaCl unter W. Bei dem Punkte f' beginnt die Zerstörung des Krystallgitters des NaCl. — Die Elastizitätsgrenze des untersuchten (Bachmutter) Steinsalzes beträgt bei Zimmertemp. 720 g/qmm, bei 300° 400 g/qmm; der Elastizitätsmodul beträgt 4179 kg/qmm (20°) u. 3380 kg/qmm (300°). (Ztschr. f. Physik **35**. 850—62. Leningrad, Phys.-Techn. Röntgeninst.) HANTKE.

H. Grunert, *Über innere Reibungen und Dichten von gemischten wäßrigen Salz- und Säurelösungen.* (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **145**. 394; C. 1925. II. 1124.) Verss. zeigen, daß die innere Reibung von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg. durch H_2SO_4 -Zusatz stetig erhöht wird. Trägt man den Säurezusatz als Abszisse, die innere Reibung als Ordinate auf, so wird bis zu 1,72 Mol H_2SO_4 (Dauer der B. des salzsauren Salzes) eine schwach gekrümmte Linie, von hier ab eine Gerade erhalten. Zusätze von HNO_3 zu KNO_3 -Lsg. u. HCl zu NaCl -Lsg. geben in dieser Beziehung keine Unstetigkeitenstellen. Die D.-Zusatzkurve ist in allen 3 Fällen eine Gerade. Ein Vergleich der einzelnen Säuren bei Angabe in Molen ergibt, daß H_2SO_4 die innere Reibung des Sulfates am meisten steigert, dann folgen mit sinkender Wrkg. HNO_3 auf Nitrat u. HCl auf Chlorid. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 309—12. Breslau, Univ.) ULMANN.

V. Unkowskaja und E. Wolowa, *Die Koeffizienten der inneren Reibung einiger Paare isofluider Flüssigkeiten.* Es wurde die Viscosität η folgender isofluider (vgl. BIRON, C. 1912. II. 2008) Flüssigkeitspaare untersucht: Chlorbenzol u. Brombenzol, Propylacetat u. Äthylpropionat, *i*-Butylacetat u. Äthyl-*i*-valerianat, *i*-Butylformiat u. Äthylpropionat, Äthylbutyrat u. Äthyl-*i*-butyrat. η beträgt bei 20° 0,00800, 0,01136, 0,005756, 0,005309, 0,006936, 0,00745—0,00765, 0,006276, 0,00663 bzw. 0,00590. Für die η der Gemische gilt mit genügender Annäherung die Formel von SSACHANOW u. RJA-CHOWSKI (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **47**. 113; Ztschr. f. physik. Ch. **86**. 529; C. 1916. I. 729; 1914. I. 1625) $\eta = \eta_1 x^2 + \eta_2 (1-x)^2 + k \sqrt{\eta_1 \cdot \eta_2} \cdot x(1-x)$, worin η_1 u. η_2 die Viscositäten der Komponenten, x u. $1-x$ ihre Molenbrüche, k eine Konstante bedeutet. k ergab sich für das erste Paar zu 1,941 (20°), 1,970 (40°) bzw. 1,982 (60°); für das 2. Paar 1,991 (20°) bzw. 1,999 (40°); für das 3. 2,012 (20°) bzw. 2,005 (40°); für das 4. 1,993 (20°) bzw. 1,998 (40°). Die η des Paares Äthylbutyrat—Äthyl-*i*-butyrat setzen sich additiv aus η_1 u. η_2 zusammen. Wie ersichtlich sind die Abweichungen von der Additivität auch in den anderen Paaren nicht groß (am höchsten im 1. Paar bei 20°: 1,98%) u. fallen mit steigender Temp. Die η ist größer als die nach der Additivitätsregel berechnete in den ersten 3 Paaren, kleiner im vierten. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 107—23. 1925.) BIKERMAN.

G. Friedel, *Zum Gegenstand der Fettsäuren und der smektischen Körper.* (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 409; C. 1925. I. 2142) Erwiderung auf die von WYCKOFF, HUNT u. MERWIN (S. 2167) erhobene Kritik. Die Fettsäuren gehören nach der Ansicht des Vfs. gar nicht zu den smekt. Körpern, da sie in krystallisiertem Zustand schon lange bekannt sind. Außerdem zeigen sie im Röntgenogramm neben

den auch den smekt. Stoffen eigenen Ringen noch deutliche weitere Ringe, welche den Reflexen einer ganzen Reihe rechtwinkliger Ebenen entsprechen. Der smekt. Zustand ist von dem subkrystallinen (LEHMANN) vollkommen verschieden u. stellt ein eigenes Zustandsgebiet dar. (C. r. d.l'Acad. des sciences **182**. 425—27.) ENSZLIN.

N. Kolossowsky, *Thermochemische Untersuchungen über den Lösungsvorgang*. 5. u. 6. Mitt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 17—21. 22—26. 1925. — C. **1925**. II. 144. 145.)

BIKERMAN.

N. Kolossowsky und Kraeff, *Thermochemische Untersuchungen über den Lösungsvorgang*. 7. Mitt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 27—30. 1925. — C. **1925**. II. 144.)

BIKERMAN.

Wlad. Perschke, *Die Verteilung eines Stoffes zwischen zwei Lösungsmitteln und die Löslichkeit*. (Vgl. S. 2427.) Auf Grund der thermodynam. Hauptsätze gibt Vf. einen theoret. Beweis für die Gleichheit der Verteilungskoeffizienten eines Stoffes zwischen zwei nichtmischbaren Fl. mit dem Löslichkeitsverhältnis desselben Stoffes in denselben Lösungsm. u. bei derselben Temp. — Unters. des Systems *Hexan-Methylalkohol-Azobenzol*, bei welchem die Lösungsm. eine erhebliche gegenseitige Löslichkeit besitzen, ergab für den Verteilungskoeffizienten einen Wert (ca. 0,9), welcher ziemlich gut mit dem des Löslichkeitsverhältnisses in den Lösungsm., die sich durch die Ggw. einer gegebenen Menge Azobenzol verändert haben, übereinstimmt. Hingegen weicht der Verteilungskoeffizient erheblich ab von dem Löslichkeitsverhältnis sowohl in reinen Lösungsm., wie auch in solchen, die sich vorher gegenseitig gesätt. haben. — Desgleichen ist im System *W.-Ä.-Bernsteinsäure* die Übereinstimmung zwischen den Verteilungskoeffizienten (ca. 6,1) u. dem Löslichkeitsverhältnis bei den durch Ggw. der Säure geänderten Lösungsm. ganz befriedigend. Das Löslichkeitsverhältnis bei Lösungsm., die sich bei Abwesenheit der Säure gesätt. haben, differiert hingegen von dem Wert des Verteilungskoeffizienten um 14%. Die Verss. wurden mit verschiedenen Mengen Säure u. bei verschiedenen Temp. ausgeführt. Die Abhängigkeit des Wertes des Verteilungskoeffizienten von der Menge des verteilten Stoffes läßt sich berechnen nach der Gleichung $K = 5,16 + 0,0225 S \dots$ (S = Summe der Konz. der wss. u. äth. Schicht) (vgl. auch BERTHELOT u. JUNG-FLEISCH, Ann. Chim. et Phys. **26**. 400 [1872]) u. ergibt gute Übereinstimmung mit den von BERTHELOT u. JUNG-FLEISCH gefundenen experimentellen Werten. — Es gibt selbst bei konstanter Temp. keinen konstanten Verteilungskoeffizienten, der von den absol. Mengen der verteilten Substanz unabhängig wäre. Den Anschauungen des Vf. widerspricht auch nicht der Fall der Verteilung einer Fl., die sich mit den Lösungsm. in allen Verhältnissen mischt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 239—52. Swedlowsky, Polytechn. Inst. zu Ural.)

ULMANN.

Henry L. Cox und Leonard H. Cretcher, *Der Einfluß der Temperatur auf die reziproke Löslichkeit von Monoalkyläthern des Äthylenglykols und Wasser*. (Vgl. CRETCHER u. PITTINGER, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 1503; C. **1924**. II. 820.) Vf. haben die Löslichkeit des Äthylenglykolmono-*n*-butyläthers u. des Äthylenglykolmono-*i*-butyläthers in W. untersucht u. die Ergebnisse tabellar. u. graph. niedergelegt. Die Äther mischen sich mit W. in jedem Verhältnis u. bilden geschlossene Löslichkeitskurven. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 451—53. Pittsburgh, Univ.) WINK.

F. H. Constable, *Die Dynamik der Oberflächenwirkung in geschlossenen Gefäßen*. Vf. entwickelt Gleichungen für die Geschwindigkeit katalyt. Rkk. in geschlossenen Gefäßen. (Nature **117**. 230—31. Cambridge, St. Johns Coll.)

JOSEPHY.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

Haber, *Die Versuche, chemische Elemente in andere zu verwandeln*. Vortrag in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Geschichtliche Übersicht über obiges Thema bis zu den jüngsten Verss., *Hg* in *Au* umzuwandeln, von NAGAOKA u. MIETHE u. STAMM-

REICH. Nachprüfungen dieser Verss. ergaben jedoch, daß das im Hg nach elektr. Behandlung gefundene Au nur als Verunreinigung anzusehen ist, die aus den elektr. Leitungsteilen stammt. (Metallbörse 16. 540—41.) JOSEPHY.

G. Tammann, *Über die Verteilung zweier Atomarten in Mischkristallreihen*. Vf. wendet sich gegen eine Arbeit von LAUE (S. 1928). Die Bemerkungen über die regelmäßigen u. die n. Anordnung der Atome in Mischkristallreihen beziehen sich auf die Systeme *Au-Cu*, *KCl-KBr*, *Fe-Si* u. *Cu-Pd*. (Ann. der Physik [4] 79. 81—84. Leipzig.) LÜDER.

Sven Holgersson, *Röntgenographische Strukturuntersuchungen von einigen Metalllegierungen*. (Die Reihen *AuAg* und *NiCu*.) Vf. stellte röntgenograph. die Gitterkonstanten der Mischkristallreihen *Ag-Au* u. *Ni-Cu* fest u. bespricht die Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen dieser Methode u. den sonstigen Eigenschaften der Legierungen. (Ann. der Physik [4] 79. 35—54. Leipzig.) LÜDER.

Stab des Versuchslaboratoriums der General Electric Co., *Die Emission von Elektronen unter dem Einfluß starker elektrischer Felder*. Unter Mitarbeit von **B. S. Gossling**. Es wird eine Beschreibung der elektr. Phänomene gegeben, die unter dem Einfluß hoher elektr. Felder an Metalloberflächen vor sich gehen, u. die unter dem Namen LILIENTHALS Auto-Elektronen-Entladung bekannt sind. Die Verss. stimmen im allgemeinen mit denen von MILLIKAN u. EYRING (S. 2289) überein. Während diese Autoren jedoch nur ein Abnehmen der Stärke des Elektronenstroms nach dem Erzeugen verhältnismäßig hoher „Feldströme“ beobachten, finden Vf. auch den entgegengesetzten Effekt, der durch den Einfluß von Na-Salzen hervorgerufen wird. Sie vermeiden es, eine allgemeine Erklärung der Phänomene zu geben, da die experimentellen Grundlagen nicht genau genug sind. (Philos. Magazine [7] 1. 609—35.) HANTKE.

M. Bronstein, *Über die Bewegung eines Elektrons im Felde eines festen Zentrums mit Berücksichtigung der Massenveränderung bei der Ausstrahlung*. Die Bewegung eines Elektrons im Coulombschen Zentralfelde wird betrachtet. Die Berücksichtigung des Einsteinschen Gesetzes über die Trägheit der Energie zeigt, daß in diesem Falle die Ruhemasse des Elektrons von seiner Lage im elektr. Felde abhängt. Die Bewegung des Elektrons stellt sich bei Benutzung der Lagrangeschen Bewegungsgleichungen als eine rosettenförmige Bahn dar, bei der die Periheldrehung im umgekehrten Sinne wie in der Sommerfeldschen Theorie stattfindet. Nach dem Vorbilde SOMMERFELDS werden Quantenbedingungen aufgestellt, in denen die Bahnenergie durch 2 Quantenzahler dargestellt wird. Die Resultate weichen ganz bedeutend von denen SOMMERFELDS ab, indem die Relativitätskorrektur in diesem Falle negativ ist. Zu den gleichen Resultaten führt eine Benutzung der Hamilton-Jacobischen Methode u. der Störungsmethode von BOHR. — Eine Anwendung der Ergebnisse dieser Betrachtung auf die Spektren wasserstoffähnlicher Atome ist jedoch nicht statthaft, da hier nur das Einkörperproblem behandelt ist, während im andern Fall ein Zweikörperproblem vorliegt. (Ztschr. f. Physik 35. 863—82. Kiew.) HANTKE.

G. Hertz, *Über die Diffusion langsamer Elektronen im elektrischen Felde*. Nach Versuchen mit **R. K. Klopfers**. Vf. prüft experimentell das Ergebnis seiner theoret. Überlegungen (Ztschr. f. Physik 32. 298; C. 1925. II. 637) mit folgender Anordnung. An einem Punkte in der Mitte zwischen zwei Metallplatten werden Elektronen einer bestimmten Geschwindigkeit v_0 erzeugt. Haben beide Platten dasselbe Potential, so werden die auf die beiden Platten gelangenden Elektronenströme gleich sein. Wird dagegen zwischen die beiden Platten eine Spannung gelegt, so werden mehr Elektronen auf die in der Richtung der negativen Feldstärke gelegene Platte gelangen als auf die andere. Das Verhältnis der auf die beiden Platten gelangenden Elektronenströme (bei Anwesenheit des Feldes) läßt sich berechnen. Die Versuchsergebnisse für *Ne* u. *Ar* bestätigen die zunächst überraschende Folgerung aus der Theorie, daß Elektronen bei Anwesenheit von Gasmoll., mit denen sie elast. zusammenstoßen, in höherem Maße

instande sind, gegen ein elektr. Feld anzulaufen als im Vakuum. (Physikal. Ztschr. 26. 868—70. 1925. EINDHOVEN.) K. WOLF.

Arthur Bramley, *Geschichtete Entladung im Wasserstoff*. Mit Hilfe von 11 in das Entladungsrohr eingeschmolzenen Drähten wird die Potentialverteilung, die Elektronenkonz. u. die mittlere Elektronenenergie längs des Weges der Entladung bestimmt. (Physical Review [2] 26. 794—99. 1925.) KELLERMANN.

G. P. Thompson, *Die freie Weglänge langsamer Protonen in Helium*. Zu der Mitt. von DEMPSTER (vgl. S. 1365) bemerkt Vf., daß die Streuung von Protonen in He ein Maximum für Strahlen von der Energie von etwa 10 000 V ist. Für die langsamsten der untersuchten Strahlen von 3500 V beträgt die Streuung nur 75% des maximalen Wertes. In H₂ treten solche Abnormalitäten wie in He u. Ne nicht auf. In H₂ wächst die Streuung mit abnehmender Energie der Strahlen. (Nature 117. 235. Aberdeen, Univ.) JOSEPHY.

J. Stuart Foster, *Elektrische Entladung in Gasen*. Beschreibung der Vorgänge in verschiedenen Entladungsröhren. (Nature 117. 197. Montreal, MC GILL Univ.) JOS.

Robert W. Lawson, *Restionisation in geschlossenen Gefäßen*. Hinweis auf die bisher scheinbar unbekannt gebliebene Arbeit von BERGWITZ (Elster-Geitel-Festschrift 1915. 585), in der der kleinste Wert der Restionisation von 0,8 Ionenpaaren pro ccm pro sec. gefunden worden ist. Die Restionisation ist von Bedeutung für die Ionisation der Atmosphäre durch die durchdringende Nebel- γ -Strahlung. (Nature 117. 235. Sheffield.) JOSEPHY.

A. Quintana Mari, *Die Begriffe der Radioaktivität*. Elementare Darst. der Theorie der Radioaktivität. (Quimica e Industria 3. 29—32. Tarragona.) HANTKE.

Benjamin Markus Bloch, *Über eine Abschätzung der Leuchtdauer der Wasserstoff-Kanalstrahlenemission aus dem Verhalten derselben beim Übergang aus einem elektrischen Felde in einen feldfreien Raum*. Die Meßanordnung des Vfs. beruht auf dem Prinzip, daß Wasserstoff-Kanalstrahlen ein gewisses Gebiet durchlaufen, dessen einer Teil feldfrei ist, während im anderen sich ein elektr. Feld befindet. Die Kanalstrahlen, die zuerst den Raum mit dem elektr. Feld durchlaufen, müssen den Starkeffekt zeigen u. ihn an der Grenze des feldfreien Raumes bei einem bestimmten Verhältnis zwischen Leuchtdauer u. Geschwindigkeit noch eine gewisse Strecke mit in den feldfreien Raum hineinnehmen. Bei bekannter Geschwindigkeit läßt sich also die Leuchtdauer berechnen. Die Resultate sprechen dafür, daß die Leuchtdauer höchstens von der Größenordnung 10^{-10} sec ist. (Ztschr. f. Physik 35. 894—904. Prag.) HANTKE.

Jean Thibaud, *Die Spektrographie der γ -Strahlen. Sekundäre β -Spektren und kristalline Diffraktion*. (Vgl. Journ. de Physique et le Radium [6] 6. 82; C. 1925. II. 1335 u. S. 1763.) Eine Zusammenfassung der bisherigen Arbeiten des Vfs. über obiges Thema. Vf. hebt hervor, daß seine Darlegungen durch die Arbeit von HAHN u. MEITNER (S. 1934) bestätigt werden. (Ann. de Physique [10] 5. 73—152.) K. WOLF.

C. G. Barkla und S. R. Khastgir, *Die „modifiziert gestreute“ Röntgenstrahlung*. (Vgl. BARKLA, Philos. Magazine [6] 49. 1033; C. 1925. II. 886.) Nachdem die J-Umwandlung in einer gestreuten Röntgenstrahlung stattgefunden hat, u. diese eine „modifiziert gestreute“ Strahlung geworden ist, ist ihre Absorbierbarkeit durch Substanzen nach ihrem Durchgang durch diese Substanzen genau so groß wie die der primären, gemessen an anderen Substanzen. Ferner ist die Durchdringungskraft der sekundären u. primären Strahlungen durch einige Substanzen gleich. Trotzdem sich die Wellenlänge ändert, ändert sich die Absorption in allen Substanzen nicht entsprechend. Dann wird zweifelhaft, ob eine Änderung des Diffraktionswinkels bei spektroskop. Messungen auch wirklich einer Änderung der Wellenlänge entspricht. Die krit. Bedingung, welche das J-Phänomen beherrscht, ist nicht die Wellenlänge sondern etwas der „Temp.“ des Strahls (Durchdringungsvermögen) Analoges. Vff. sehen sich somit vor die folgenden beiden Alternativen gestellt: 1. Die 2. Spektral-

linie in COMPTONS Vers. stellt keine andere Wellenlänge der auf den Krystall des Spektrometers einfallenden sekundären Strahlung dar, oder 2. die Wellenlänge kann sich ohne eine entsprechende Änderung der Aktivität einer Röntgenstrahlung ändern. Dieses scheint nur unter der Annahme einer zweifachen Natur der Strahlung, wie sie J. J. THOMSON gemacht hat, möglich zu sein. (Nature **117**. 228—29. Edinburgh, Univ.) JOSEPHY.

G. E. Uhlenbeck und **S. Goudsmit**, *Rotierende Elektronen und die Struktur der Spektren*. Vff. zeigen, daß sie mit ihrer Hypothese (vgl. S. 1106) die Feinstruktur der Spektren erklären können. Zur Erläuterung ist ein Beispiel mit Zeichnung angegeben, das die Unterschiede in der alten Sommerfeldschen Theorie u. der neuen Theorie der Vff. deutlich hervortreten läßt. Auch die Struktur der Röntgenspektren wird durch die neue Theorie erklärt. An die Ausführungen der Vff. schließt N. BOHR einige Bemerkungen. (Nature **117**. 264—65. Leyden, Inst. voor Theoret. Natuurkunde.) JOSEPHY.

Johann Kudar, *Zur Quantentheorie der Dublettspektren und ihrer anomalen Zeeman-effekte*. Vf. gibt eine Verb. der relativist. u. magnet. Theorie der Dubletts, die zu einer Erweiterung des Korrespondenzprinzips führt. Hiermit läßt sich der Einfluß von schwachen u. starken Magnetfeldern auf ein n. Dublettmodell deuten. (Ztschr. f. Physik **35**. 888—93. **36**. 168. Szeged.) HANTKE.

J. R. Collins, *Die Änderung des infraroten Absorptionsspektrums von Wasser mit der Temperatur*. Maxima der Absorption werden bei folgenden Wellenlängen festgestellt:

0°	0,775	—	0,985	1,21	1,45	1,96 μ
95°	0,74	0,845	0,97	1,17	1,43	1,94 μ

Es zeigt sich ein Gang nach kürzeren Wellenlängen bei steigender Temp. Die Erscheinung läßt sich mit einer Änderung des Assoziationsgrades des H₂O erklären. (Physical Review [2] **26**. 771—79. 1925.) KELLERMANN.

Frederick H. Getman, *Die ultravioletten Absorptionsspektren wässriger Lösungen von Schwefeldioxyd und einiger seiner Derivate*. Die Extinktionskoeffizienten der Lsgg. wurden mit Hilfe eines großen Hilgerquarzspektrographen mit einem Ultraviolettspektrophotometer nach LEWIS gemessen. Die experimentellen Daten sind graph. dargestellt. Die wss. Lsgg. von SO₂ zeigen eine charakterist. Absorptionsbande bei $\lambda = 276 \mu\mu$. Die Absorption wird dem hydratisierten Schwefeldioxyd, SO₂·H₂O, das aus dem Anion der schwefligen Säure gebildet wird, zugeschrieben. Wenn O₂ u. CO₂ ferngehalten werden, werden stets reproduzierbare Werte erhalten. Das Beersche Gesetz gilt für keine dieser Lsgg. — Frisch hergest. Lsgg. von Kaliummetabisulfit, K₂S₂O₅, liefern eine charakterist. Absorptionsbande bei $\lambda = 263 \mu\mu$. Beim Stehen der Lsgg. verschwindet diese Bande, statt dessen tritt die des Schwefeldioxyds bei 276 $\mu\mu$ auf. Aus der Bande bei 263 $\mu\mu$ wird auf die Existenz des unzers. Metabisulfits in der Lsg. geschlossen. In Lsgg. von Na₂SO₃ wurde keine selektive Absorption gefunden. Frisch bereitete Lsgg. von NaHSO₃ absorbieren auch nicht selektiv, aber beim Stehen im Licht tritt bei Ggw. von O₂ Photooxydation des Ions HSO₃⁻ ein, gleichzeitig tritt die Bande der Schwefeldioxydlsgg. auf. Der Absorptionskoeffizient nimmt etwa 30 Tage lang zu, bis das Maximum erreicht ist. Durch die Ggw. von Rohrzucker wird die Oxydation, die nur im Licht stattfindet, stark verzögert. — Die Beziehung zwischen den absorbierten ultravioletten Frequenzen u. der fundamentalen infraroten Vibrationsfrequenz von BALY (vgl. Philos. Magazine [6] **27**. 632. **29**. 223 [1914]. **30**. 510 [1915]) wird an den charakterist. Absorptionsbanden von SO₂·OH u. K₂S₂O₅ bestätigt. (Journ. Physical Chem. **30**. 266—76. Stamford [Conn.], Hillside Labor.) JOSEPHY.

Enos E. Witmer, *Das kritische Potential des negativen Bandenspektrums vom Stickstoff*. Reiner, auf chem. Wege hergestellter N₂ wird durch Elektronen, die von

einem W-Draht ausgehen, angeregt. Anode ist eine Ni-Hülse mit einem seitlichen Loch, durch das die spektroskop. Beobachtung erfolgt. Bei einem Druck von 0,1 mm u. bei 22,75 V sind die negativen Banden sehr deutlich, bei abnehmender Spannung sinkt die Intensität, bei 17,75 V ist $\lambda = 4278 \text{ \AA}$ noch sichtbar, desgl. Spuren von $\lambda = 4708$ u. $4236 \text{ \AA}$. Die Verss. zeigen, daß die negativen Banden als Ganzes bei der Ionisierungsspannung von N_2 erscheinen oder im Bereich zwischen Ionisierungsspannung u. 17,75 Volt. (Physical Review [2] **26**. 780—85. 1925.) KELLERMANN.

M. Duffieux, *Die Natur des aktiven Stickstoffs*. (Vgl. BIRGE, S. 1766, u. SPONER, S. 1106.) Vf. ist der Ansicht, daß der akt. Stickstoff atomarer Stickstoff ist, von ihm wird die 2. positive u. die negative Gruppe ausgesandt. Ein Linienspektrum sendet das N-Atom jedoch unter den Bedingungen, unter welchen obige Gruppen emittiert werden, nicht aus. Das bei viel höherer Spannung emittierte Linienspektrum scheint ein Funkenspektrum höherer Ordnung zu sein u. von einem mehrfach ionisierten N-Atom herzurühren, dessen Struktur von dem des n. neutralen N-Atoms, wie es im akt. Stickstoff vorliegt, sehr verschieden ist. (Nature **117**. 302—03. Marseille, Faculté des Sciences.) JOSEPHY.

Raymond T. Birge, *Die Energieniveaus des Kohlenmonoxydmoleküls*. Vf. findet, daß die von DUNCAN (S. 1367) dem N_2 zugeschriebenen Bandensysteme zum C gehören, u. zwar ist DUNCANS zweite negative Gruppe die erste negative Gruppe des C, seine 7. positive Gruppe ist die 4. positive Gruppe des C, die gewöhnlich dem CO zugeschrieben wird, u. seine 5. positive Gruppe ist wahrscheinlich die 3. positive Gruppe des C, die gewöhnlich dem CO_2 zugeschrieben wird. Ferner werden die Elektronenenergieniveaus des CO-Moleküls u. des ionisierten CO^+ berechnet. Die o-o-Bande der verschiedenen Systeme müßte danach bei den folgenden Spannungen angeregt werden: 4. Gruppe (λ 1545) bei 8 V, Ängströmbande (λ 4511) bei 10,7 V, Kometenschweifbande (λ 4880) bei 16,7 V, 1. negative Gruppe (λ 2190) u. Kombinationsbande (λ 3974) bei 19,8 Volt. (Nature **117**. 229—30. Univ. of California.) JOS.

W. E. Curtis, *Neue Serien im sekundären Wasserstoffspektrum*. Im sekundären Wasserstoffspektrum findet Vf., daß einige Linien, die bisher nicht klassifiziert werden konnten, als Glieder einiger neuer Serien angesprochen werden können. Die bisher bekannte K-Serie u. die neu gefundenen werden zusammengestellt, u. das Verh. der Serien u. Linien wird charakterisiert. Die vom Vf. gefundenen Serien werden mit G u. H bezeichnet, sie enthalten 6 bzw. 5 Linien, von denen schon einige von KIMURA u. NAKAMURA (Jap. Journ. Phys. **1**. 85; C. **1923**. III. 1204) angeführt wurden. Die K- u. G-Serien sind einigermaßen gesichert, während die H-Serie trotz der regulären Differenzen etwas problemat. ist. Eine zahlenmäßige Beziehung zwischen den 3 Serien konnte nicht gefunden werden. Das Trägheitsmoment des H_2 -Mol. beträgt $3,7 \cdot 10^{-41} \text{ g/qcm}$. (Philos. Magazine [7] **1**. 695—700.) HANTKE.

A. L. M. Sowerby und **S. Barratt**, *Die Absorptionslinienspektren der Alkalimetalle*. (Vgl. SUR u. GOSH, Philos. Magazin [6] **49**. 69; C. **1925**. I. 1477.) Aus den Arbeiten von FOOTE, MOHLER u. MEGGERS wurde gefolgert, daß die Linie $1s-3d$ ($4641 \text{ \AA}$) in Abwesenheit von äußeren Feldern u. im Gegensatz zum Auswahlprinzip entsteht. Eine zufällige Beobachtung der Absorption der entsprechenden Rb-Linie $1s-3d$ ($5165 \text{ \AA}$) durch den Metaldampf veranlaßte Vf. zu untersuchen, ob sämtliche Alkalimetalle diese „verbotenen“ Linien zu absorbieren vermögen. Die Verss. zeigen, daß die Alkalimetalle die Kombinationslinien $1s-md$ absorbieren. Die Absorption von $1s-2d$ für K wird nicht beeinflusst in Ggw. von Ar bei 2 at Druck. Auf Grund gewisser Annahmen wird geschätzt, daß 12000-mal so viel Atome die ersten Glieder der Hauptserien von K u. Rb zu absorbieren vermögen, als die die Linie $1s-3d$ absorbieren; das Verhältnis ist für beide Metalle dasselbe. Die entsprechenden Linien der verschiedenen Alkalimetalle lassen sich in Absorption bei gleichen Dampfdrucken feststellen. Die atom. „Löschungskoeffizienten“ müssen angenähert dieselben für

entsprechende Linien sein. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. **110**. 190—97. London, Univ.) K. WOLF.

R. V. Zumstein, *Das Absorptionsspektrum von Mangandampf im Sichtbaren und Ultraviolett*. (Vgl. Physical Review [2] **25**. 523. **26**. 189; C. **1925**. II. 138. 1931.) Vf. untersucht das Absorptionsspektrum von Mn bei 1200—1600°. Als Lichtquelle dient eine 100-Watt-W-Lampe, für kleinere Wellenlängen als λ 4000 Å wird eine Pb-Bogenlampe benutzt. Es werden 31 Absorptionslinien gefunden u. den verschiedenen Termen zu geordnet. (Physical Review [2] **26**. 765—70. 1925.) KELLERMANN.


J. L. Snoek, jr., *Intensitätsverteilung in der Feinstruktur (Trabanten) des Quecksilbertripletts $2p_1 - 2s$* . (Ztschr. f. Physik **35**. 883—87. Utrecht, Phys. Inst. d. Univ.) HANTKE.

F. Goos und H. Meyer, *Über die Intensität der Resonanzstrahlung des Quecksilberdampfes*. Mit einer photograph.-photometr. Methode wurde bei Veränderung der Temp. des Dampfes zwischen 0 u. 40° u. bei Veränderung des eintretenden Lichtbüschels die Intensität der Resonanzstrahlung des Hg-Dampfes gemessen. Es zeigte sich, daß je nach der Eindringungstiefe die Intensität wechselte, u. zwar lag die Höchstintensität bei einer Eindringungstiefe von 0,6—0,8 mm. Bis zu diesen Tiefen nimmt die Intensität stark zu, um bei größeren Tiefen abzunehmen. Die Abnahme ist größer bei höheren Temp. Mit Annäherung der erregenden Strahlungsquelle an das Beobachtungsfenster wird der Intensitätsabfall steiler. Zusatz von Luft zum Hg-Dampf hat denselben Effekt. Weitere Verss. beschäftigen sich mit der Abhängigkeit der Höchstintensität von der Temp. des Dampfes bei konstantem Abstand der Eintrittsblende vom Austrittsfenster. (Ztschr. f. Physik **35**. 803—11. Hamburg, Phys. Inst. d. Univ.) HANTKE.

Hugh S. Taylor, A. L. Marshall und J. R. Bates, *Durch Resonanzstrahlung hervorgerufene chemische Wirkungen*. (Vgl. S. 3.) Die Verss. der Vff. zeigen, daß sich H_2 u. O_2 bei Ggw. einer Konz. von Hg-Dampf, wie sie durch das Durchleiten der Gase durch fl. Hg entsteht, unter der Resonanzstrahlung aus einem gekühlten Hg-Bogen schnell vereinigen. Diese Befunde stehen im Widerspruch zu denen von HIRST u. RIDEAL (vgl. S. 1362), welche eine Katalyse durch die Oberfläche des fl. Hg angenommen haben. Vff. finden ferner, daß H_2O_2 dabei als primäres Rk.-Prod. auftritt, die Menge des H_2O_2 nimmt ab, wenn die Strömungsgeschwindigkeit der Gase abnimmt, dann wird die Menge des gebildeten W . größer. Daneben wird auch HgO gebildet. Bei Abwesenheit von Hg-Dampf wird in den Verss. der Vff. weder H_2O_2 noch W . gebildet, sondern die kurzen Wellenlängen des Hg-Bogens bewirken nur wie auch bei Ggw. von Hg-Dampf Ozonisierung. Da H_2O_2 bei Ggw. von Hg-Dampf in der Gasphase nachweisbar ist, muß die Oberfläche des fl. Hg die Rk.-Geschwindigkeit beeinflussen, da H_2O_2 bei Ggw. von Hg zers. wird. Solche sekundären Wrkgg. des fl. Hg treten auch bei der Rk. von H_2 u. C_2H_4 u. von H_2 u. CO, wenn auch im entgegengesetzten Sinn, auf. Eine photosynthetisierende Wrkg. des fl. Hg wird von Vff. abgelehnt. (Nature **117**. 267. Princeton [N. J.], Univ.) JOSEPHY.


Adrien Perret, *Zinkoxyd als photochemischer Sensibilisator*. Das photochem. Verh. des ZnO wird vom Standpunkt der Theorie von BAUR (Ztschr. f. Elektrochem. **29**. 105; C. **1923**. III. 661) untersucht, wonach das Grundphänomen der Sensibilisation in einer Molekularelektrolyse besteht, da auch bei der Photolyse dieselben Oxydations- u. Reduktionsprodd. des zersetzten Körpers wie bei der Elektrolyse entstehen. Da diese jedoch große Neigung zur Wiedervereinigung haben, stellt der ganze Vorgang ein Analogon einer Wechselstromelektrolyse mit hoher Frequenz dar, die ebenfalls nur schwer die eigentlichen Prodd. der Elektrolyse liefert. Durch Anwendung von Depolarisatoren, Substanzen, die sich schnell mit einem der Elektrolysenprodd. verbinden, kann man die Rückkehr zum Ausgangszustand verhindern u. die Zers.-Prodd. der Moleküle, d. h. ihre Ionen, erhalten; diese werden durch den Sensibilisator entladen. — Anschließend wird ein histor. Überblick über die von verschiedenen Autoren

angestellten Unterss. der photochem. Aktivität des ZnO gegeben. — Vf. knüpft bei seinen Unterss. an die Beobachtungen von TAMMANN (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **114**. 151; C. **1921**. I. 399) sowie KOHLSCHÜTTER u. D'ALMENDRA (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**. 1961; C. **1921**. III. 1187) an, wonach Lsgg. von AgNO₃ oder Ag₂SO₄, die ZnO enthalten, durch Sonnenlicht geschwärzt werden. Vom Standpunkt der Baurischen Theorie spielt in diesem System das AgNO₃ die Rolle eines idealen Depolarisators, da das Ag-Atom leicht oxydierbar ist. Der kathod., in metall. Phase sich verteilende Depolarisator verhindert die Wiedervereinigung der anod. u. kathod. Zers.-Prodd. u. ermöglicht die anod. Entw. vom O₂. Wird der Sensibilisator durch das Symbol ZnO ⊕ u. ZnO ⊖ dargestellt, so ergibt sich folgendes Reaktionsschema:




Falls NO₃⁻ oder AgNO₃ als anod. Depolarisator wirken, läßt die Baurische Theorie die Entw. von H₂ nach dem Schema: ZnO ⊖ + H⁺ = $\frac{1}{2}$ H₂ u. ZnO ⊕ + OH⁻ + Reduktionsmittel = Oxydationsprod. + $\frac{1}{2}$ H₂O erwarten. Bei Wiederholung der Verss. von TAMMANN wurden bei kurzer Belichtung auf der Oberfläche des ZnO glänzende schwarze Flitter beobachtet, die mit kleinen Gasblasen bedeckt waren; die ganze M. war in Essigsäure vollständig l. Bei mehrstd. Exposition war dagegen keine Spur der glänzenden Flitter mehr vorhanden, sondern eine gelbliche, in Essigsäure unl. Substanz. — Die qualitative u. quantitative Unters. der Prodd. der Rk. ergab die B. von metall. Ag, einer intermediären O-Verb. des Ag u. in der Lsg. Zn(NO₃)₂. Der Verlauf der Rk. wird durch die Gleichung $2\text{AgNO}_3 + \text{ZnO} = 2\text{Ag} + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{Zn(NO}_3)_2$ veranschaulicht, wobei zu beachten ist, daß die Auflösung des ZnO nur eine Nebenerscheinung ist, die mit der eigentlichen Photolyse nichts zu tun hat. Durch Prüfung des ZnO auf Reinheit wurde festgestellt, daß es sich um eine spezif. Wrkg. des ZnO handelt; andere Kontrollverss. ergaben, daß die von den meisten Autoren behauptete Sensibilität des Ag₂O, das durch Einw. des alkal. ZnO auf AgNO₃ entstehen soll, nicht vorhanden ist, sondern daß als Zwischenprod. Silberperoxyd entsteht. — Die Prüfung des Experiments von SCHULTZE (EDER, S. 120), wonach eine photochem. Sensibilität von Ag-Salzen bei der Rk. mit CaCO₃ wirksam ist, ergab, daß die dabei auftretende schwarze Färbung auf der B. des Ag-Photochlorids beruht, sowie daß die Einw. von CaCO₃ auf AgNO₃ nach der Gleichung $2\text{AgNO}_3 + \text{CaCO}_3 = \text{Ca(NO}_3)_2 + \text{Ag}_2\text{CO}_3$ verläuft u. ganz verschieden von der des ZnO unter denselben Bedingungen ist.


Zur Verallgemeinerung der Sensibilisationstheorie wurden noch andere Kationen auf dieselbe Fähigkeit wie das Ag⁺ geprüft, wobei die Unterss. auf solche Kationenlsgg. beschränkt wurde, die in Berührung mit ZnO nicht merklich Hydroxyde oder Oxydsalze bilden u. deren Normalpotentiale negativer als das des Ag⁺ sind. Diesen Bedingungen entspricht das Hg⁺⁺ in *Sublimatlsgg.* Das Sensibilisationsschema ist:



Analoge Depolarisationsrkk. spielen sich zwischen ZnO u. Hg₂Cl₂ sowie zwischen ZnO u. dem Cl⁻-Ion ab. — Die Verss. ergaben, daß die Rk. viel langsamer verläuft als die zwischen ZnO u. AgNO₃. Die Prodd. der Rk. sind: O₂, Hg₂Cl₂ u. ZnCl₂; die Photolyse verläuft nach den Gleichungen:



Die Gesamtumsetzung entspricht der Gleichung:



wobei zu bemerken ist, daß diese Rk. ebenso wie die mit AgNO₃ unter Zunahme der freien Energie verläuft. Kontrollverss. ergaben, daß eine gesätt., filtrierte Lsg. von ZnO nicht photochem. auf HgCl₂ einwirkt. Ebensowenig ist die Rk. durch Zers. der Oxydationsprodd. der Hydrolyse am Licht zu erklären, ferner wurde die Stabilität von HgCl₂-Lsgg. festgestellt. — Die photochem. Unters. des Kalomels ergab, daß es bei Ggw. von Luft im Gemisch mit ZnO sowohl oxydiert wie reduziert wird. Die Oxydation des Kalomels durch O₂ beweist, daß die Photolyse von HgCl₂-Lsgg. im geschlossenen

Gefäß einem stationären Gleichgewichtszustand zustrebt; der O₂ der Luft spielt die Hauptrolle bei der Oxydation. In Ggw. von organ. Reduktionsmitteln wie Rohrzucker u. Glucose findet eine erhebliche Red. des Hg₂Cl₂ statt. Die Unters. des Einflusses der organ. Reduktionsmittel ergab, daß sich in ihrer Ggw. die photochem. Red. von Hg₂Cl₂ zu Hg ebenso schnell wie die Red. von HgCl₂ zu Hg₂Cl₂ vollzieht.

Im Anschluß an Verss. von CHAKRAVARTI u. DHAR (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 299; C. **1925**. I. 1683) über die Einw. von Sonnenlicht auf Lsgg. von *Methylenblau* wurde der Farbstoff auf seine Eigenschaften als Depolarisator untersucht u. festgestellt, daß ZnO bei der photochem. Umwandlung des Methylenblaus in seine Leukoverb. u. ein Oxydationsprod. als Sensibilisator wirkt. Bei 2-std. Einw. von ZnO u. künstlichem Licht auf Methylenblaulsgg. (1 g ZnO + 150 cem Lsg. M/16500) tritt völlige Entfärbung ein, im Dunkeln kehrt die Farbe bei Luftabschluß in 24 Stdn. nicht zurück, aber schnell bei Luftzutritt. Das Reduktionspotential des ZnO erreicht bei der Sensibilisation das Normalpotential von H₂ u. sein Oxydationspotential das des O₂, wahrscheinlich sogar des O₃. Journ. de Chim. physique **23**. 97—129. 1925. École polytechnique fédérale.) R. SCHMIDT.

T. M. Lowry, *Optische Rotationsdispersion. Ein Beitrag zur Erinnerung an Biot (1774—1862). Geschichtliche Übersicht.* (Nature **117**. 271—75.) JOSEPHY.

A. D. Power, *Fluorescenz von Cadmiumdampf.* Hg-Dampf, mit Al-Funken bestrahlt, fluoresciert die Linie $\lambda = 2537 \text{ \AA}$ stärker, wenn der Dampf frisch gebildet ist, als wenn er älter ist. Vf. untersucht die Verhältnisse bei Cd-Dampf. Erregt wird mit Cd-, Fe- oder Ni-Funken. Die Linien $\lambda = 3262, 4678, 4800$ u. $5086 \text{ \AA}$ erscheinen stärker bei frischem Dampf. $\lambda = 2289$ wird durch den Cd-Funken ebenfalls stärker erregt bei frischem Dampf, mit Fe- u. Ni-Funken erfolgt keine Anregung. Besondere Verss. zeigen, daß die frische B., nicht Temp. u. Druck maßgebend für die Verstärkung der Fluorescenz ist. — Th u. In, die im Cd als Verunreinigungen vorhanden sind, werden auch zur Fluorescenz angeregt, obgleich die Linien dieser Metalle im Erregerfunken nicht enthalten sind. (Physical Review [2] **26**. 761—64. 1925.) KELLERMANN.

S. Wawilow und **W. Lewschin**, *Die Beziehungen zwischen Fluorescenz und Phosphorescenz in festen und flüssigen Medien.* Es werden 2 Phosphoroskope beschrieben, die es gestatten, *Phosphorescenz* von einer Dauer von 10^{-4} bis 10^{-6} sec zu beobachten. Mit diesen App. wurde die *Phosphorescenz* u. *Fluorescenz* einiger Farbstoffe (besonders am *Rhodulinorange N*) in verschiedenen Lösungsm. untersucht, um festzustellen, ob die Fluorescenz in zähen Medien im Vergleich zu der in weniger zähen Medien verlängert wird, eine Konsequenz, die aus der Auffassung WAWILOWS (Ztschr. f. Physik **31**. 750; C. **1925**. I. 2610) folgt. Diese Annahme wird durch die Verss. nicht bestätigt. Weitere Verss. führen Vff. zu dem Schluß, daß zwischen Fluorescenz u. Phosphorescenz ein wesentlicher Unterschied besteht, u. daß kein Übergang zwischen beiden Phänomenen existiert, trotzdem die Spektren von Phosphorescenz u. Fluorescenz die gleichen sein können, wie die Unterss. der Vff. lehren. Auch in bezug auf die Polarisation verhalten sich beide Erscheinungen gleichmäßig. — Im *Uranglas* tritt nur Phosphorescenz auf, keine Fluorescenz. Sie beginnt mit einer Verspätung von $5 \cdot 10^{-6}$ bis $1 \cdot 10^{-5}$ sec gegen das erregende Licht u. weist ein Maximum auf, das bei 3 bis $5 \cdot 10^{-5}$ sec liegt. *Uranylinitrat* verhält sich ähnlich. Durch Verminderung der Absorption bei Beleuchtung mit intensivem Funkenlicht ließen sich die Zeiten des erregten Zustandes der phosphoreszierenden Moll. am Uranglas ermitteln. Doch ist die Genauigkeit dieser Messung gering. (Ztschr. f. Physik **35**. 920—36. Moskau.) HANTKE.

H. Beutler, **St. v. Bogdandy** und **M. Polanyi**, *Über Luminescenz hochverdünnter Flammen.* (Vgl. BEUTLER u. POLANYI, Naturwissenschaften **13**. 711; C. **1925**. II. 1501.) Vff. beschreiben eine neue Anordnung zur Unters. des Leuchtens bei der Rk. von Alkalidämpfen mit Halogenen, durch die sowohl die Intensität des Lichts als auch die Lichtausbeute um das Vielfache gesteigert werden. Die thermoelekt. gemessene

Lichtstrahlung beträgt bei der Rk. von Na bzw. K mit Cl_2 bzw. Sublimat 10% des theoret. möglichen Maximums. In Übereinstimmung hiermit betrug die photometr. gemessene Lichtstärke der D-Linie 2—6 HK. Die Lichtstrahlung des K besteht zum größten Teil aus der Doppellinie 7665/99. Das Licht wurde auch spektral untersucht, bzgl. der Einzelheiten der Ergebnisse sei auf das Original verwiesen. Die Energie des einzelnen Elementarprozesses schreibt keineswegs die Anregungsgrenze vor, diese wird bei $Na + HgCl_2$ bis zu 42 kcal. überschritten. Bei Na trat die bisher noch nicht beobachtete Linie $1s-3d$ auf, die auch bei K ungewöhnlich stark war. Leitfähigkeitsmessungen an der Flamme ergaben eine Ionisation von etwa $\frac{1}{10000}$ der umgesetzten Stoffe. (Naturwissenschaften 14. 164—65. Berlin.) JOSEPHY.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

R. Zsigmondy, *Über Hydrogele und Hydrate*. Vf. geht auf die Publikationen von WILLSTÄTTER u. KRAUT u. anderen u. den abweichenden Standpunkt von VAN BEMMELEN bzgl. des Auftretens von bestimmten Hydraten in den Hydrogelen der Oxyde ein. — Gegen die Allgemeingültigkeit der Auffassung von WILLSTÄTTER, KRAUT u. FREMERY (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1499; C. 1924. II. 2126), daß durch Feststellung einer über ein größeres Temperaturintervall beständigen Zus. des getrockneten Gelrückstandes der Beweis eines chem. Hydrats erbracht werden kann, äußert Vf. Bedenken. — Während VAN BEMMELEN die Gleichgewichte zwischen dem Dampfdruck der Gele u. der Gasphase in zahlreichen Fällen u. damit das Schicksal, welches die Gele bei langsamer Trocknung erleiden, genau festgestellt hat, sucht WILLSTÄTTER durch rasches Arbeiten die Umwandlung der Hydrate möglichst zu vermeiden u. ihre Zus. nach neuen Methoden festzustellen. Auch dieses Verf. ist für die Kenntnis der Gele wertvoll. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 467—70. Göttingen, Inst. f. anorgan. Ch.) BU.

F. Haber, *Über die Hydroxyde des Aluminiums und des dreiwertigen Eisens*. (Vgl. BÖHM, S. 1518.) Von den Hydroxyden des Al u. Fe^{III} existieren zwei krystallograph. verschiedene Verbindungsreihen, die γ - u. die α -Reihe, die folgende Gestalt haben: $Al(OH)_3$ γ : Hydrargillit, α : fehlt; AlO_2H γ : Bauxit, α : Diaspor; $Al_2O_3\gamma$: γ -Aluminiumoxyd, α : Korund; $Fe(OH)_3$ fehlt in der γ - u. der α -Reihe; Fe_2O_3H γ : Rubinglimmer, α : Goethit; Fe_2O_3 γ : γ -Eisenoxyd, α : Eisenglanz. Diese Formen sind durch chem. Zus. u. krystallograph. Merkmale wohl definiert. Bemerkenswert ist, daß alle krystallisierten Formen Zuss. haben, die mit einem Atom Al bzw. Fe in der Konst.-Formel geschrieben werden können, u. es fehlen bisher krystallisierte Formen, die nach ihrer Zus. zwei oder mehr Metallatome im Mol. besitzen müssen. Daraus kann man schließen, daß die krystallisierten Verbb. tatsächlich Monometallhydroxyde sind, u. daß diese vor den Polymetallhydroxyden durch größeres Krystallisationsvermögen ausgezeichnet sind. Das wird auch dadurch bestätigt, daß von den drei Verbb. $Al_2O_3 \cdot H_2O$, $Al_2O_3 \cdot 2H_2O$ u. $Al_2O_3 \cdot 3H_2O$ nur die zweite Verb., ein bisher nicht in krystallisierter Form beobachtetes Hydrat, ein Polymetallhydroxyd ist. — Daß beim Fe die dem Hydrargillit entsprechende Form fehlt, ergibt sich thermodynam. aus dem Unterschied der Hydratisierungswärmen der Tonerde u. des Eisenoxyds. Bei beiden Metallen ist die γ -Reihe die unstabilere. Beim Erhitzen in einem Luftstrom, der einen Partialdruck von 10 mm Wasserdampf besitzt, treten merkliche W.-Verluste bei den folgenden Tempp. ein: Hydrargillit 200°, synthet. Bauxit 300°, Diaspor 420°, Rubinglimmer 240°, Goethit 290°. — Bemerkenswert ist ferner die Stabilität der Krystallanordnung bei den Umwandlungen, die innerhalb der einzelnen Reihen stattfinden. Beide Reihen sind gittermäßig in sich gleichartig u. gleichzeitig voneinander durchaus verschieden. — Ferner behandelt Vf. die Frage, durch welchen Mechanismus die Monometallhydroxyde aus den Lsgg. entstehen. Die Bauxitbildung läßt sich mit Hilfe des amphoteren Charakters der Tonerde erklären. Thermodynam. ist es möglich, daß ein amorphes oder höchst feinteiliges Oxydhydrat bei konstanter

Temp. sich freiwillig in ein anderes verwandelt, das einen anderen W.-Gehalt hat, u. daß dieses neue Hydrat wieder bei derselben Temp. freiwillig in eine grob-krystalline Form des Ausgangshydrats übergeht. — Von den nicht krystallisierten Polymetallhydroxyden ist das Hydroxyd $\text{Al}_2\text{O}_5\text{H}_4$ bekannt, das als einfachstes Ergebnis des Zusammentritts ungleich geladener Ionen $\text{Al}(\text{OH})_2^+$ u. $\text{OAl}(\text{OH}_2)^-$ aufgefaßt werden kann, die im amphoteren Gebiet nebeneinander auftreten. — Zum Schluß geht Vf. noch auf den gallertartigen Zustand dieser Hydroxyde ein. (Naturwissenschaften)

13. 1007—12. 1925. Berlin-Dahlem.)

JOSEPHY.

J. Smorodinzew und **A. Adowa**, *Über die Grenzen der Fällbarkeit der Gelatine durch Tannin*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 124—26. 1925. — C. 1925. II. 2117.)

BIKERMAN.

William D. Harkins und **Henrietta Zollman**, *Grenzflächenspannung und Emulgierung*. I. *Die Wirkung von Basen, Salzen und Säuren auf die Grenzflächenspannung zwischen wässrigen Natriumoleatlösungen und Benzol*. II. *Extrem kleine, durch gelöste Stoffe hervorgerufene Grenzflächenspannungen*. Vff. bestimmen die Grenzflächenspannung γ zwischen Bzl. u. wss. Legg. von Na-Oleat mit verschiedenen Zusätzen, u. zwar einerseits sofort nach dem Zusammenbringen der beiden Phasen, andererseits nach Einstellung des Gleichgewichts durch langsames Schütteln. Die Grenzflächenspannung zwischen W. u. Bzl. bei 20° ist 35,0 dyn/cm, zwischen Bzl. u. 0,1-n. wss. Na-Oleatlg. sofort nach dem Zusammenbringen 2,64 dyn/cm, im Gleichgewicht 1,46 dyn/cm. Ggw. von NaOH, NaCl oder NaJ in der wss. Phase oder von Ölsäure in der Bzl.-Phase erniedrigt γ ; die Wrkg. von Ölsäure ist jedoch erst bei höheren Oleatkonz. merklich. Der Einfluß der Zusätze unter Gleichgewichtsbedingungen ist nur in beschränkten Fällen meßbar, da beim Schütteln spontan Emulgierung eintritt, wenn $\gamma < \text{ca. } 1 \text{ dyn/cm}$ ist. In den nicht gemischten Systemen werden die kleinsten γ -Werte — 0,04 dyn/cm — bei gleichzeitiger Ggw. von Na-Oleat, NaOH, NaCl u. Ölsäure in 0,1-n. Konz. erhalten. — Unter Anwendung besonders feiner Spitzen von ca. 0,4 mm Radius werden die sehr kleinen Grenzflächenspannungen zwischen wss. NaOH u. Legg. von Ölsäure in Bzl., Paraffinöl u. Olivenöl bei Ggw. von NaCl u. CaCl_2 untersucht. Die Daten sind z. T. der unveröffentlichten Arbeit von **Harkins** u. **Thomas** entnommen. Zusatz von geringen Mengen CaCl_2 hebt die durch NaCl bewirkte Erniedrigung von γ auf. Aus der Gibbsschen Gleichung in der Form $\mu = -[\alpha c/2RT][\partial\gamma/\partial(\alpha c)]$ (α = Aktivitätskoeffizient des Elektrolyten) ergibt sich für die von einer Na-Oleatmolekel in dem monomolekularen Film eingenommene Fläche in rein wss. Legg. 47 Å, bei Ggw. von NaCl 40 Å. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 69—80. Chicago [Ill.]) KRÜ.

M. Lewalt-Jeserski, *Über den osmotischen Druck der Lösungen*. (Vgl. S. 1127.) Vf. folgert aus der Literatur, daß der osmot. Druck, die Dampfdruck- u. die Gefrierpunktserniedrigung einander tatsächlich proportional sind u. bekennt sich zur Hypothese, wonach diese Größen auch mit der wirklichen Konz. der Lsg. proportional sind. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 151—60. 1925.)

BIKERMAN.

S. Liepatow, *Über die Kinetik der Quellung und Entquellung der Gele*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 55—64. 1925. — C. 1925. II. 272.)

BIKERMAN.

Jul. Salkind, *Die Quellung von Kautschuk und die chemische Konstitution des Lösungsmittels*. Zur Unters. der Frage, ob der Unterschied in der Quellung von chem. Natur der Fl. oder von einer bestimmten physikal. Konstante abhängig ist, wurde die Quellung in isomeren Fll. näher untersucht. Als solche wurden eine Reihe von Estern verwendet u. zwar: Äthylformiat (I), Methylacetat (II), Propylformiat (III) Äthylacetat (IV), Methylpropionat (V), i-Butylformiat (VI), Propylacetat (VII), Äthylpropionat (VIII) u. Methylbutyrat (IX). — Die Quellung wurde bei rohem Kautschuk „Para fine“, „Smoked sheets“ u. auch bei vulkanisiertem Kautschuk gemessen. Ob gleich die Quellung des vulkanisierten Kautschuks kleiner als die des rohen bleibt verhalten sich die isomeren Ester auch hier ähnlich wie dort. Das Quellungsmaximum

wächst mit dem Mol.-Gew. des Esters. Bei isomeren Estern sind die Quellungsmaxima verschieden groß, u. zwar dort größer, wo eine längere grade C-Kette vorhanden ist (III > IV, IX > VIII). Das Radikal der Säure scheint einen größeren Einfluß als das Radikal des Alkohols auszuüben (V > III, VIII > VII); dieser Einfluß des Säureradikals kann sogar die Wrkg. einer längeren C-Kette überwiegen (VII > VI). Die Quellungsmaxima bei leichteren Estern (I, II, IV) bleiben fast dieselben beim rohen u. vulkanisierten Kautschuk; die *Vulkanisation* vermindert also nicht die Zahl der aufgenommenen Moll. Bei VI—IX findet man aber mit dem vulkanisierten Kautschuk ganz erheblich niedrigere Werte: die größeren Moll. scheinen viel schwerer in den vulkanisierten Kautschuk eindringen zu können. — Weder die DE., noch die Capillarität oder D. verlaufen auch nur annähernd parallel der Quellung; die Formel von Wo. OSTWALD (Kolloid-Ztschr. 29. 100; C. 1922. I. 1377) ist also nicht anwendbar u. die chem. Konst. scheint hier die erste Rolle zu spielen: die chem. Verwandtschaft der C-Kette zum Kautschuk-KW-stoff scheint bei der Quellung mitzuwirken. — Die Geschwindigkeit der Quellung ist bei isomeren Estern annähernd dieselbe; sie wird deutlich kleiner beim Übergang von den Estern C₄H₈O₂ zu den Homologen C₅H₁₀O₂; anscheinend ist dabei die innere Reibung der Fl. entscheidend, welche die Geschwindigkeit der Diffusion beeinflusst. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 525—28. Leningrad.) BUSCH.

L. Abonnenc, *Die Rolle der Adsorption in der Kolloidchemie.* (Vgl. Rev. gén. des Sciences pures et appl. 36. 229. 262; C. 1925. II. 902.) Die Bedeutung der Ionenadsorption für die kataphoret. Geschwindigkeit u. die Stabilität kolloider Teilchen wird besprochen. (Rev. gén. des Sciences pures et appl. 37. 106—13.) KRÜGER.

Otto Ruff, *Aktive Kohle. VI. Die Theorie der Adsorption an Kohlen.* (V. vgl. S. 2308.) Vf. gibt ein Bild von der Struktur einer aktiven oder aktivierbaren, d. h. amorphen Kohle, sowie dem Wesen ihrer Aktivität. Amorphe Kohle enthält neben geordneten auch ungeordnete, ungesätt. Atome, die in Schichten kleine Hohlräume umschließen (Ultraporosität nach HERBST). Dieses Gefüge bildet den aktiven Grundkörper aller amorphen Kohlen u. die ungesätt. von der Oberfläche der Hohlräume her zugänglichen C-Atome bilden die Anziehungszentren der Adsorption. Liegt dieser Körper zutage, so ist die Kohle aktiv, wie die an Eisen abgeschiedenen CO-Ruße oder die durch Verkohlungs organ. Stoffe mit Alkalien erhaltenen Kohlen. — Bei allen anderen Formen liegt der Grundkörper unter einer Haut dicht gelagerter, ungesätt. C-Atome, die bei nachträglicher Aktivierung amorpher Kohlen entfernt werden muß. Die Tiefenentw. des Grundkörpers u. ihr Verhältnis zur Dicke der Haut bestimmen die scheinbare Dichte der Kohlen. Solange die Haut geschlossen ist, verringern die Hohlräume die scheinbare Dichte, nach Entfernung der Haut kann die Dichte durch Füllung der Hohlräume mit Fl. steigen. Sie nähert sich der des Graphits. Ordnung der Atome des Grundkörpers, wie sie durch höhere Temp. eintritt, verringert die Aktivität u. damit auch die Dichte. — Nach der Inaktivierung zeigt der Grundkörper nur schwache Graphitinterferenzen. Vf. schlägt vor, die durch Erhitzen aus amorpher Kohle erhaltene Übergangsform als „parakrystallinen Kohlenstoff“ zu bezeichnen. (Kolloid-Ztschr. 38. 174—77. Breslau.) LASCH.

R. Audubert und **M. Quintin**, *Über den Mechanismus der Ionenadsorption.* Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 1925. I. 2541. Nachzutragen ist: die Hydrolyse von Cu-, Zn- u. Cd-Salzen wurde elektrometr. untersucht. — Albumin u. Casein verhalten sich in bezug auf H-Ionen wie Gelatine. — Verschiedene Unterss. anderer Autoren über die Adsorption von Farbstoffen werden kurz beschrieben u. ihre Ergebnisse als Bestätigung der eigenen Auffassung des Adsorptionsmechanismus u. der Formel $u = A \cdot C^{1/2}$ angeführt. (Journ. de Chim. physique 23. 176—96.) R. SCHMIDT.

R. Kenworthy Schofield, *Eine experimentelle Bestätigung von Gibbs' Adsorptionsgleichung durch Beobachtung der Adsorption von Quecksilberionen aus der Lösung von*

Quecksilber und ihr Verhalten zur Nernstschen Theorie des Elektrodenpotentials. Vf. mißt einerseits den Betrag von Mercuro-sulfat, der in einem System $Hg-Hg_2SO_4$ ($-1/10$ -n. H_2SO_4) von der Quecksilberoberfläche adsorbiert ist. Andererseits bestimmt er durch Messungen der Oberflächenspannung unter Benutzung der Gibbsschen Adsorptionsgleichung dieselbe Größe u. findet, daß beide Werte übereinstimmen. Die Zahl der von der Hg-Oberfläche adsorbierten Hg-Ionen ist ident. mit der Zahl von Ionen, die gemäß der Nernstschen Theorie des Elektrodenpotentials an die Hg-Oberfläche abgegeben wird u. ihr ihre Ladung erteilt. Diese Ladung läßt sich auch aus der Lippmannschen Gleichung $d\sigma/d\Delta = \epsilon \cdot 10^7$ berechnen, wo σ die Oberflächenspannung u. Δ die Potentialdifferenz zwischen Metall u. Lsg. bedeuten, u. steht in engster Beziehung zur Gibbsschen Gleichung, wie Vf. zeigt. (Philos. Magazine [7] 1. 641—58. Cambridge Trinity Coll.) HANTKE.

S. Liepatow, *Über die Adsorption der Elektrolyte an Baumwollfaser. Cellulose* (gebleichte Baumwollgewebe) adsorbiert verdd. Säuren prakt. gar nicht. 16%ig. u. noch stärkere HNO_3 wird schwach adsorbiert u. zwar ca. proportional der Konz. $NaOH$ wird begierig aufgenommen; die adsorbierte Menge steigt bis ca. 16% linear mit steigender Konz. von $NaOH$ (im Gleichgewicht), nimmt dann (bei ca. 17—19%ig. $NaOH$) sehr steil zu, um bei noch höheren $NaOH$ -Konz. fast konstant zu bleiben. Der erhöhten Adsorptionsfähigkeit in 17—19%ig. $NaOH$ entspricht eine starke Quellung der Cellulose, die dabei glasiges Aussehen bekommt. Die Adsorption von $NaOH$ ist reversibel. — Es wurde $NaOH$ -Aufnahme aus verschiedenen konz. Lsgg., die daneben stets 1 Mol. bzw. 0,5 Mol./l KCl , KCN oder KNO_3 enthielten, untersucht. Sie bleibt bei geringen $NaOH$ -Konz. hinter der in Abwesenheit von Salzen beobachteten zurück, erreicht aber die Werte für reine $NaOH$ -Lsgg. bei höheren Konz. Die Anomalie bei 17—19% $NaOH$ ist viel schwächer ausgeprägt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 31—47. 1925.) BIKERMAN.

S. Liepatow, *Über die Adsorption von Alkalien durch Cellulose.* (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 48—54. 1925. — C. 1925. I. 2154.) BIKERMAN.

R. Whytlaw-Gray, *Rauch als Luftkolloid.* Rauch kann als eine Suspension in Luft aufgefaßt werden, u. W. E. GIBBS glaubt an einen engen Parallelismus dieser kolloiden Systeme mit den bekannten Hydrosolen. Nach den Unters. des Vf. weicht feiner Oxydrauch aus nichtflüchtigen Substanzen jedoch in zwei wesentlichen Punkten von den Hydrosolen ab. 1. Im Rauch findet auch bei Verd. spontane Anhäufung statt. Im Gegensatz zu den beständigen Metallhydrosolen, sind also die „Aerosole“ unbeständige, koagulierende Systeme; ein nicht koagulierendes Aerosol ist bisher unbekannt. 2. Die geladenen Teilchen im Rauch haben nicht alle das gleiche Vorzeichen, sondern Rauch ist elektr. neutral, — Vf. untersucht die Koagulation dieser Aerosole vom Standpunkt der Smoluchowskischen Theorie. Die aus der Größenverteilung u. mit Hilfe der Stokesschen Gleichung berechneten Radien der Teilchen fallen viel zu klein aus. Die wahren Radien der Rauchteilchen sind im allgemeinen größer als 3×10^{-5} cm, so daß in vielen Fällen die ultramkr. geglaubten Teilchen mkr. Dimensionen besitzen. Obgleich die Bestandteile eines komplexen Teilchens fest aneinander gebunden sind, führen sie die Brownsche Bewegung unabhängig voneinander aus. Das Rauchteilchen stellt somit ein System primärer Einheiten dar, die sich unter den entgegengerichteten Kräften der Brownschen Bewegung u. der elektr. Anziehung oder Kohäsion im dynam. Gleichgewicht befinden. (Nature 117. 201—02.) JOSEPHY.

B. Anorganische Chemie.

Julius Meyer und Walter Gulbins, *Über Nitrosi-selensäure.* Löst man fl. N_2O_4 in starker H_2SO_4 oder *Selensäure* auf, die 10—20% H_2O enthält u. durch festes CO_2

gekühlt wird, tritt B. von 2 blaugefärbten Schichten auf; dasselbe beobachtet man beim Schütteln von fl. N_2O_4 bei tiefen Temp. mit etwas W., indem nach der Gleichung $2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} = \text{N}_2\text{O}_3 + 2\text{HNO}_3$ eine obere Schicht aus HNO_3 , die durch aufgelöste Stickoxyde blaugefärbt ist, u. eine untere aus blauem, fl. N_2O_3 entsteht. Ähnlich wirkt auch die kleine Wassermenge in der H_2SO_4 u. H_2SeO_4 auf das fl. N_2O_4 ein. Aus der unteren dunkelblauen Schicht entsteht bei etwas höherer Temp. *Nitrosylselen-* bzw. *Nitrosylschwefelsäure*, die gegen Feuchtigkeit sehr empfindlich sind. Die B. einer blauen *Dinitrosylverb.* (vgl. LENHER u. MATHEWS, Journ. Americ. Chem. Soc. **28**, 516; C. **1906**. I. 1774; MEYER u. WAGNER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**, 690; C. **1922**. I. 915) tritt nicht ein. — Beim Auflösen von *Nitrosylselenensäure* in *Selensäuremonohydrat*, $\text{H}_2\text{SeO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ u. Schütteln mit wenig Hg entsteht eine Blaufärbung, die durch Kupferselenatlsg. vertieft werden kann. Bei Verd. der blauen Lsg. mit W. oder durch milde Oxydationsmittel verschwindet die Blaufärbung unter Entw. von NO. — In der blauen Säure liegt wahrscheinlich eine *Nitrosiselenensäure* $(\text{HO})\text{ON} \cdot \text{SeO}_3\text{H}$ vor; entsteht auch aus einer Auflösung von NaNO_2 in starker Selensäure u. Schütteln mit Hg. Ist nur in hochkonz. Selensäure beständig, in 80%ig. nur vorübergehend, in 60%ig. gar nicht:

$$(\text{HO})\text{ON} \cdot \text{SeO}_3\text{H} = \text{NO} + \text{HO} \cdot \text{SeO}_2 \cdot \text{OH}.$$

Das Cu-Salz ist tiefblau; das Cu liegt anscheinend in komplex gebundener Form vor; die blaue Farbe der Säure ist auf das 4-wert. N-Atom zurückzuführen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**, 456—57. Breslau, Univ.)


BUSCH.

W. Ipatjew und **W. Nikolajew**, *Einwirkung von Wasserstoff und Wasser auf Phosphor bei hoher Temperatur unter Druck*. (Vorl. Mitt.) Roter oder weißer P gibt beim Erhitzen unter Druck mit W. u. H_2 *Phosphorsäure* u. *Phosphorwasserstoff*; die Druck-Temp.-Kurven haben eine regelmäßige Form. In Abwesenheit von W. wird (bei nicht über 360°) nur die B. von PH_3 beobachtet; die Kurve wird gradliniger; d. h. die B. von PH_3 verläuft entsprechend langsam. Ohne H_2 , nur in Ggw. von W., wird wieder B. von PH_3O_4 u. PH_3 beobachtet, wobei sich letzterer nun auf Kosten des W. bildet. Die Rk.-Kurve wird in diesem Fall zu einer geraden Linie, die bei ca. 290° u. einem Druck von 40—50 at. einen Knickpunkt aufweist, der dem Zeitpunkt der B. von PH_3 entspricht. — Bei Ausschluß von H_2 wird 35% der P-Menge bis zur Phosphorsäure oxydiert; bei Ggw. von H_2 verringert sich dieser Anteil bis zu 20—15% der P-Menge, um so mehr, je mehr H_2 vorhanden war. Die Menge des PH_3 variiert in entgegengesetztem Sinne. — Die Darst. der P-Oxydation durch W. durch die Gleichungen: $3\text{P}_2 + 15\text{H}_2\text{O} = 3\text{P}_2\text{O}_5 + 15\text{H}_2$, $3\text{P}_2\text{H}_5 + 9\text{H}_2\text{O} = 6\text{PH}_3\text{O}_4$, $5\text{P}_2 + 15\text{H}_2 = 10\text{PH}_3$ ergibt dieselben Zahlen, wie die Verss. — In den Verss. schwankte die Temp. zwischen 238° u. 360° , der Druck zwischen 57 u. 360 at. — Beim kurzen Erhitzen von P mit W. (248° u. 48 at.) u. schnellem Unterbrechen des Prozesses beobachtet man B. des *krystallin. purpurfarbigen P*, unl. in CS_2 , Entflammungspunkt 210° , D. 1,93. — Bei Temp. nicht unter 216° u. einem Druck nicht unter 89 at., am besten bei 360 — 380° beobachtet man B. des *schwarzen krystallin. P*, wohl auf Kosten des Zerfalls des PH_3 ; D. 3,06; Entflammungstemp. um 500° ; unl. in CS_2 . (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**, 595—97. Leningrad, Akad. d. Wiss.)

BUSCH.

W. Kistjakowski, *Sodabildung beim Kontakt von Eisen, Glaubersalzlösung und Luft im Zusammenhang mit dem Rosten des Eisens*. (Vgl. S. 1517.) Ein Fe-Band wird zum Teil in 2%ig. Na_2SO_4 -Lsg. eingetaucht. Nach einigen Tagen scheiden sich am Flüssigkeitsrand Sodakrystalle aus. Als techn. Verf. zur Sodadarst. hat diese Bildungsweise keinen Wert, da die höchste Ausbeute nur 4 g Na_2CO_3 pro 1 m Kontaktlinie betrug. Die Ausbeute wird erhöht durch CO_2 -Anreicherung der Luft, Beschleunigung der Verdampfung der Lsg., Verwendung des „subaktiven“, Fe ($\epsilon_h = 0,2$ — $0,4$), Abwesenheit der Mg-Salze. — Das Eisen löst sich in Na_2SO_4 -Lsg., während gleichzeitig Na' an der Oberfläche als Soda gefällt bzw. mit CO_3 neutralisiert wird. Verhindert



man die Verdampfung der Lsg. u. damit die Sodaabscheidung, so mischt sich die gebildete Soda mit der übrigen Lsg., wobei die Rk.:



u. daran anschließend $\text{Fe}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$ erfolgt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 97—106. 1925. St. Petersburg, Polytechn. Inst.) BIKERMAN.

Otto Hahn, *Zur Frage nach der Existenz des Ekacæsiums*. Die Stellung der Elemente 85 u. 87, des Ekajods u. Ekacæsiums, im period. System macht es wahrscheinlich, daß diese Elemente, wenn sie überhaupt existieren, radioaktiv sind, denn die benachbarten Elemente 84, 86 u. 88 sind als radioaktiv bekannt. Dann ist es unwahrscheinlich, daß Ekajod u. Ekacæsium in den Mineralien ihrer niederen Homologen, die nicht radioaktiv sind, vorkommen, sondern man muß sie bei den bekannten radioaktiven Substanzen suchen. Da die n. Umwandlungsreihen des U u. Th bekannt sind, könnten Ekajod u. Ekacæsium nur in sog. Verzweigungen oder Seitenlinien auftreten. Vf. diskutiert die Möglichkeiten, wie diese beiden Elemente in Form radioaktiver Atomarten als Seitenlinien bei dem n. Zerfall der Radioelemente entstehen könnten. Als Muttersubstanz für das Ekacæsium (Ordnungszahl 87) kämen in Frage einerseits Actinium (Ordnungszahl 89) bezw. sein Isotop Mesothor 2, andererseits die radioaktiven Emanationen (Ordnungszahl 86). Mit einem hochakt. Ra-haltigen Mesothorpräparat wird versucht, das hypothet. Ekacæsium an Cs gebunden abzutrennen. Die Aktivität des Cs betrug 2 Tage nach dem Beginn der Verarbeitung des MsTh 1,5 Zehnmilliardstel der Ausgangsaktivität des MsTh. Auch diese minimale Aktivität rührt wahrscheinlich nur vom MsTh her. Die Existenz eines aus MsTh 2, RaEm oder ThEm entstehenden Ekacæsiums mit einer Halbwertszeit von einigen Stdn. oder darüber dürfte nach Ansicht des Vfs. damit prakt. als ausgeschlossen zu betrachten sein. (Naturwissenschaften 14. 158—62. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie.) JOSEPHY.

R. Weinland und Adolf Stark, *Über Komplexe der Ameisensäure mit Thorium*. Anhang: *Über ein Aluminium- und ein Manganformiat*. Vf. haben im Thorium ein Metall gefunden, das mit Ameisensäure sowohl Anionen als mehrkernige Kationen bildet. Verbb. I—V sind solche mit Formiatothoriumanionen; I—III enthalten ein Hexaformiatoanion; IV u. V enthalten nur 5 Ameisensäurereste, wonach dem Th in ihnen die Koordinationszahl 5 zukäme; sie können aber auch zweikernig nach Ia formuliert werden, so daß die Koordinationszahl der Zentralatome 6 wird. — Bei der Darst. der Salze muß das betreffende Metallformiat in großem Überschuß vorhanden sein; die einmal gebildeten Thoriumformiatoanionen sind aber ganz beständig; die Salze lassen sich aus W. umkrystallisieren, reagieren sämtlich neutral, mit Ausnahme des Pyridinsalzes mit schwachsaurer Rk. Die wss. Lsg. der Salze wird beim Erwärmen sauer, beim Verdampfen der Lsg. krystallisieren die Salze unverändert wieder aus; durch NH_3 oder Alkalihydroxyde werden die Salze zers. — In den Verbb. VI—X wird der Fall eines 4-wertigen Metalls (Th) beobachtet. Ersetzt man im bas. Formiat X einen Ameisensäurerest durch den Überchlorsäurerest usw., so gelangt man zu den Salzen VI—IX; danach leiten sich alle von einem Kation ab, das aus 3 Th-Atomen, 6 Ameisensäureresten u. 5 OH-Gruppen besteht; X ist das Formiat dieses Kations; die ionogen gebundenen Säurereste im Anion lassen sich leicht austauschen. — Was die Konst. des Hexaformiatotrithoriumkations betrifft, so kommt der Zusammenhalt der Th-Atome fraglos durch Nebervalenzen eines O-Atoms der COOH-Gruppe zustande. Aber es bleibt willkürlich, wie man die einzelnen Bestandteile des Kations anordnet. — Einem oder mehreren W.-Moll. ist so, wie sie ihnen in den typischen Metallammoniakverbb. zukommt, eine wichtige Rolle im Komplex nicht zuzuschreiben; indessen können sich die W.-Moll. doch teilweise in dem mehrkernigen Kation befinden, nur nicht mit derselben Funktion wie in den Metallammoniakverbb.



Ia form = $\text{H}\cdot\text{COO}$
 Versuche: *Ammoniumhexaformiatothoreat* (I), aus $1/100$ Mol. Thoriumformiat in w. W. + $1/10$ Mol. Ammoniumformiat; farblose Krystalle von octaedr. bezw. kub. Habitus; ll. in W. — *Bariumhexaformiatothoreat* (II), weißes, krystallin. Pulver, aus W.; zll. in W.; enthält 2 H_2O , das es nicht im Vakuum über H_2SO_4 verliert. — *Strontiumhexaformiatothoreat* (III), weiße Säulchen, u. Mk., aus W.; enthält 2 H_2O , das es nicht im Vakuum über H_2SO_4 verliert. — *Kaliumpentaformiatothoreat* (IV), weiße kugelig-strahlige Aggregate, u. Mk., aus W. — *Pyridinpentaformiatothoreat* (V), Tafeln, aus W. — *Hexaformiatopentahydroxotriothoreperchlorat* (VI), aus Thoriumformiat + W. + Natriumperchlorat; sechseckige Pyramiden, u. Mk., verliert im Vakuum über H_2SO_4 das gesamte W.; verwittert an der Luft; verpufft nicht beim Erhitzen. — *Hexaformiatopentahydroxotriothorenitrat* (VII), vierseitige Prismen, aus W., verwittert an der Luft; verliert das W. im Vakuum über H_2SO_4 ; ll. in W. — *Hexaformiatopentahydroxotriothorechlorat* (VIII), farblose Krystalle, aus W., verwittert an der Luft; verliert das W. im Vakuum über H_2SO_4 . — *Hexaformiatopentahydroxotriothorerhodanid* (IX), rechtwinklige Täfelchen, u. Mk., aus w. W., verwittert an der Luft, verliert über H_2SO_4 das gesamte W. — *Hexaformiatopentahydroxotriothoreformiat* (X), aus Thoriumformiat in w. W. + 5%ig. NH_3 -Lsg.; Tafeln von rhomb. Umriß, u. Mk.; verwittert nicht an der Luft; verliert über H_2SO_4 im Vakuum sein W. — *Manganiformiat*, $[\text{Mn}_3\text{form}_6]\text{form}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$, aus $\text{MnO}_2 + 90\%$ ig. HCOOH ; rotbraune Stäbchen; wird von W. u. A. zers. unter Abscheidung von $\text{Mn}_2\text{O}_3 + x\text{H}_2\text{O}$; l. in Essigsäure mit tiefdunkelroter Farbe. Da es sich in höchst konz. Alkaliformiatlsg. zers., können keine Verb. mit Formiatoanionen dargestellt werden; auch Verb. mit einem Formiatokation ließen sich mittels NaClO_4 usw. nicht erhalten, da das Manganiformiat in dieser Lsg. ebenfalls hydrolyt. gespalten wird. — *Bas. Aluminiumformiat*, $\text{Al}(\text{form})_2(\text{OH}) + \text{H}_2\text{O}$, aus frisch gefälltem $\text{Al}(\text{OH})_3$ in h. 90%ig. HCOOH ; weißes Pulver, verliert über H_2SO_4 kein W.; l. in k. W. mit schwacher Trübung. Verss., Salze eines Aluminiumformiatokations darzustellen, führten nicht zum Ziel. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 471—79. Würzburg, Univ.)

BUSCH.

Alfred Benrath, Über saure Salze des Chloropentammoniakkobalt-(3)-restes. (Mitarbeit L. Sontheimer u. J. Mannheims.) (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 226; C. 1925. I. 945 u. auch S. 2554.) Verss. zeigen, daß die Löslichkeit des *Chloropentammoniakkobalt-(3)-chlorids* in Ggw. steigender Mengen HCl oder KCl beständig abnimmt, während aber der Bodenkörper sich nicht verändert; es tritt keine B. eines Doppelsalzes ein. Bei Ggw. von HgCl_2 steigt, bis zu einem Gehalt von 0,1782 g HgCl_2 in 100 g W., die Löslichkeit des Kobaltsalzes an, um nachher abzufallen, während der Bodenkörper sich rosa färbt u. die Verb. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot 3\text{HgCl}_2$ darstellt (vgl. JÖRGENSEN, Journ. f. prakt. Ch. 18. 224; 19. 51.) Auf Grund weiterer Verss. u. von Leitfähigkeitsmessungen teilt Vf. dem Komplex die Formel $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{Cl}\cdot\text{HgCl}_2)](\text{Cl}\cdot\text{HgCl}_2)_2$ zu. Anzeichen für eine Anlagerung von HCl oder Chloriden an den Kationkomplex wurden nicht gefunden. — Das *Chloropentammoniakkobalt-(3)-sulfat* krystallisiert aus W. je nach den Versuchsbedingungen stabil wasserfrei $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}](\text{SO}_4)$, oder metastabil wasserhaltig $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}](\text{SO}_4) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Vf. untersucht diese Verhältnisse die Angaben von JÖRGENSEN ergänzend. Enthält die Kobaltlsg. zwischen 13 u. 48% H_2SO_4 , so hat der Bodenkörper die Zus. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}](\text{SO}_4)_4 \cdot 3\text{H}_2\text{SO}_4$, in Ggw. noch größerer Mengen von H_2SO_4 bildet sich der Bodenkörper $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}](\text{SO}_4) \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$. — Wird die Annahme fallen gelassen, daß sich die Säuren u. das HgCl_2 an

das komplexe Kation anlagern, so kommt man für die untersuchten Doppelverbb. zu den Formeln: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}_3\text{Hg}](\text{Cl}_3\text{Hg})_2$; $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]_4(\text{SO}_4)(\text{SO}_4\cdot\text{SO}_4\text{H}_2)_3$; $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}](\text{SO}_4\cdot\text{SO}_4\text{H}_2)$. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151. 343—48. Aachen, Techn. Hochsch.)



ULMANN.

W. Manchot und E. Linckh, *Über die Konstitution und die Absorptionsspektren der Ferro- und Cupri-Stickoxydsalze*. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 22. C. 1925. I. 28.) Es werden die Absorptionsspektren der dissoziierenden Ferrostickoxydsalze, bei denen man schon nach ihrer Farbe drei Reihen von Salzen unterscheiden kann (braune bis braunschwarze, grüne u. rote), bei konstanter Schichtdicke unter Variation der Konz. unters. (vgl. Diss. LINCKH, München, Techn. Hochsch. 1924). — Die in wss. Lsg. entstehenden braunen Ferrostickoxydverbb. FeSO_4 , NO sowie FeSeO_4 , NO u. FeCl_2 , NO stimmen bzgl. Form u. Lage ihrer Lichtabsorptionskurven vollständig überein; charakterist. ist die starke Bande im Gelb u. die Durchlässigkeit im Grün. Der Träger der braunen Farbe in ihnen ist das Kation FeNO^+ ; dieser Komplex wird durch die opt. indifferenten Ionen Cl^- , SO_4^{2-} , SeO_4^{2-} nicht verändert. Bei der Umsetzung der Salze mit Laugen wird er in der Form $\text{FeNO}(\text{OH})_2$ niedergeschlagen. Auffallend ist die vollkommene Ähnlichkeit der Kurven der grünen Verbb. untereinander (FeCl_2 , NO in A., Estern wie Essigester, Benzoessäureester, Malonester u. konz. HCl). Der farbtragende Komplex muß also in den grünen Lsgg. auf gleiche Art aufgebaut sein. An die Stelle der Ester- oder A.-Moleküle im Komplex kann also auch das Mol. HCl treten. Diese grünen Verbb. enthalten zufolge dem Überführungsvers. ein NO-haltiges Ferroanion. — Andersartig dagegen muß die Konst. der farbtragenden Komplexe sein in der roten Lsg. von FeSO_4 , NO in konz. H_2SO_4 . Hier liegt also ein besonderer Fall vor. Ähnliche Bewandnis hat es mit der Lsg. von FeCl_2 , NO in Pyridin. — Weiter wurden die Lichtabsorptionskurven von Kupferstickoxydsalzen in konz. H_2SO_4 , A. u. Essigsäureester aufgenommen. Die Form ist bei allen drei Kurven sehr ähnlich, die Maxima u. Minima liegen im Bereich der gleichen Wellenlängen. Alle diese Kupferstickoxydverbb. gehören somit dem gleichen Typus an u. entsprechen dem grünen der Ferrostickoxydsalze; das Analogon der braunen fehlt hier gänzlich. — Im Gegensatz zum Fe gehört die Lsg. in konz. H_2SO_4 zu demselben Typus wie die Lsgg. in organ. Lösungsmm. u. in konz. HCl. In allen diesen Lsgg. müssen also die Kupferstickoxydverbb. gleichartige Konst. haben; vielleicht kommt die tintenblaue Farbe lediglich der Verb. CuX_2 , NO zu. — Die nichtwss. Lösungsmm. vermindern außerordentlich stark die Dissoziation des gebundenen NO, wobei wohl ein Additionsvermögen des NO an diese Lösungsmm. eine unterstützende Rolle spielt. — Beim Cu tritt somit nur eine Reihe von NO-Verbb. auf, welche der grünen Reihe beim Fe entspricht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 406—11.)


BUSCH.

W. Manchot und E. Linckh, *Über die Konstitution und die Absorptionsspektren der Schwefeleisen-Stickoxyd-Verbindungen (Roussinschen Salze) und ihre Beziehungen zu den dissoziierenden Ferro-Stickoxydsalzen*. Die Schwefeleisenstickoxydsalze unterscheiden sich von den Ferrostickoxydsalzen (vgl. vorst. Ref.) hauptsächlich darin, daß bei ihnen der leichte Zerfall in NO u. Fe-Salz fehlt; das NO ist in ihnen fest gebunden, u. zwar an jede Atomgruppe $\text{FeS} \cdot 2\text{NO}$. — Man unterscheidet eine Reihe roter u. eine Reihe schwarzer Salze, die sämtlich die Gruppe $\text{FeS}(\text{NO})_2$ im Anion enthalten, während NH_4 , K u. a. als Kation auftreten (vgl. ROUSSIN, Ann. Chim. et Phys. [3] 52. 285 [1858]; PAVEL, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 15. 2600 [1882]). — Die Synthesen von Derivv. des roten Salzes $\text{Fe}(\text{NO})_2\text{SK}$, das durch Abbau aus dem schwarzen Salz $\text{Fe}_4(\text{NO})_7\text{S}_3\text{K}$ entsteht, in denen das K-Atom durch die an S gebundene Gruppe $-\text{SO}_3\text{K}$ oder durch Alkyl ersetzt ist (vgl. HOFMANN, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 9. 295 [1895]), kommen darauf hinaus, daß FeSO_4 , NO mit einer die Gruppe $-\text{SH}$ enthaltenden Substanz in Ggw. von NO reagiert, welches nicht nur mit dem

vollen Betrag des von FeCl_2 zu bindenden einen Mol., sondern darüber hinaus noch mit einem 2. Mol. addiert wird. *Kaliumthiocarbonat*, *Natriumxanthogenat*, *Thio-salicylsäure* u. a. Thiosäuren liefern mit FeCl_2 , NO sämtlich Körper von der Art der Roussinschen Salze; man kann daher allgemein sagen, daß Substanzen, welche eine *HS-Gruppe* enthalten, Schwefeleisenstickoxydsalze liefern, u. umgekehrt bei positivem Ausfall der Rk. auf Ggw. einer HS-Gruppe schließen. — Nach Verss. von **H. Haunschild** ergab die Synthese der Verb. $\text{Fe}(\text{NO})_2\text{S} \cdot \text{SO}_3\text{K}$ aus Ferrosulfat, Thio-sulfat u. NO bei verschiedenen Partialdrucken von NO stets einen Verbrauch von 2 NO; bei der Verfolgung des Zers.-Vorganges eines nach **HOFMANN** dargestellten Präparates der gleichen Verb. wurden dagegen gelegentlich Substanzen beobachtet, bei welchen das Verhältnis Fe:NO dem Wert 1:1 fast genau entsprach; es waren aber Zufallsprodd., die nach dem Umkrystallisieren wieder den ursprünglichen Körper mit dem Verhältnis Fe:NO = 1:2 lieferten. Die Verb. $\text{Fe}(\text{NO})_2\text{S} \cdot \text{SO}_3\text{K}$ wird haltbarer, wenn man sie nach dem Umkrystallisieren aus W. mit A. abwäscht. — Die Absorptionsspektren der drei Verbb. der roten Reihe, K-Salz, $-\text{SO}_3\text{K}$ -Verb. u. C_2H_5 -Verb., lassen ihren analogen Aufbau erkennen; die unter sich übereinstimmenden Absorptionsspektren finden unter den dissoziierenden Ferrostickoxydsalzen kein Analogon. — Das rote Salz $\text{Fe}(\text{NO})_2\text{SK}$, bezw. das Bruchstück $\text{Fe}(\text{NO})_2\text{S}$ ist der Baustein, der an dem Aufbau der schwarzen Schwefeleisenstickoxydsalze einen wesentlichen Anteil hat. Die Konst. des roten Esters $\text{Fe}(\text{NO})_2\text{S} \cdot \text{C}_2\text{H}_5$ könnte durch die komplexe Formel I ausgedrückt werden. — Die Konstitutionsformel II für die



Salze des schwarzen Typus $\text{Fe}_4(\text{NO})_7\text{S}_3\text{K}$ konnte einmal durch den Vergleich der Absorptionsspektren bewiesen werden; das Spektrum der schwarzen Schwefeleisenstickoxydsalze ist sehr ähnlich dem der braunen dissoziierenden Ferrostickoxydsalze (vgl. vorst. Ref.); die Lichtabsorptionskurve des schwarzen Salzes zeigt ein ausgeprägtes Minimum u. Maximum für die gleichen Wellenlängen wie die Kurven der braunen dissoziierenden Ferrostickoxydsalze, läßt aber zugleich ein zweites Maximum an der gleichen Stelle erkennen, wo es bei den roten Schwefeleisenstickoxydsalzen auftritt. Der zweite Beweis beruht auf der Synthese des schwarzen Salzes aus dem roten Salz durch Umsetzung mit FeSO_4 , NO nach der Gleichung:



Entsprechend der Formel II wird beim Sättigen von $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ in W. bei 0° mit NO u. Zugabe in der NO-Atmosphäre von 3 Moll. $\text{Fe}(\text{NO})_2\text{SK} + 2\text{H}_2\text{O}$ in W. u. weiterem Sättigen mit NO durch das zentrale Fe-Atom 1 Mol. NO, aber nicht 2 NO wie durch die drei anderen Fe-Atome gebunden; schwarze Krystalle, aus 70° h. W. — Nach II können die roten Salze aus den schwarzen nur durch Abbau unter teilweiser Zers. entstehen, d. h. unter Abspaltung von Fe, das, mit NO verbunden, austritt, dabei aber zu Oxyd oxydiert wird, indem N_2O u. a. Red.-Prodd. (NH_3) auftreten. Umgekehrt können die roten Salze in schwarze nur bei Zusatz von Ferrostickoxydsalz umgewandelt werden. Diejenigen roten Derivv. von $\text{Fe}(\text{NO})_2\text{SK}$, in denen das K-Atom durch einen unbeweglichen Substituenten ersetzt ist, können überhaupt nicht in Derivv. der schwarzen Reihe übergeführt werden. — Die schwarzen Salze stellen somit einen Übergang vor zwischen den roten Schwefeleisenstickoxydsalzen u. den normalen Ferrostickoxydsalzen der braunen Reihe, also eine Kombination dieser beiden Verbb. Hierbei ist das zentrale Fe-Atom der schwarzen Salze im elektrochem. Sinne, d. h. nach seiner Oxydationsstufe, als zweiwertig anzusehen, weil es an zwei einwertige Anionen gebunden ist u. die NO-Gruppe sich als Neutralteil betätigt. Für die rote Reihe ergibt sich einwertiges Fe, z. B. in $[(\text{NO})_2\text{FeS}]\text{K}$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 412—18. München, Techn. Hochsch.)

BUSCH.

L. Tschugajew und **W. Chlopın**, *Über Oxydation von Komplexverbindungen des Platins. I. Oxydation durch Wasserstoffsuperoxyd und Ozon.* Bearbeitet und verfaßt von **E. Fritzmann**. (Vgl. TSCHUGAJEW Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**. 287. 319; C. **1925**. II. 536. 537.) Vff. untersuchen Oxydationsrkk. bei Komplexverb., um ein tieferes Eindringen in die Konst. derselben zu ermöglichen. Durch H_2O_2 gehen Verb. des Pt^{II} in der Regel in solche des Pt^{IV} über, wobei an jedes Pt-Atom je zwei OH-Gruppen gebunden werden, wenn nur die Reaktionsbedingungen die B. von freier Halogenid ausschließen. Oxydation durch O_3 in salzsaurem Medium erhöht die Wertigkeit des Pt, wodurch zwei Cl-Atome in die innere Koordinationssphäre eindringen u. dort gebunden werden. Viel komplizierter liegen die Verhältnisse bei Oxydation in alkal. Medium, wobei an das Zentralatom zwei OH-Gruppen gebunden werden, wenn in der inneren Sphäre eine genügende Menge NH_3 -Gruppen vorhanden sind u. somit eine Substitution ausgeschlossen ist. Andernfalls findet eine Addition u. Substitution zugleich statt, wenn in dem Reaktionsmedium freie Ionen von Hydroxyl u. Ammonium zugegen sind. Bei der Oxydation von Isomeren macht sich in einigen Fällen eine bemerkenswerte Passivität des einen Cl-Atoms, welches stets in der trans-Stellung gebunden ist, bemerkbar.

Versuchsteil. — *Dihydroxo-chloroplatinatammonium*, $[PtCl_4(OH)_2] \cdot 2NH_4$, krystallin. orangefarbiger Nd., durch Einw. von 10%ig. H_2O_2 auf eine wss. Lsg. von Ammoniumchloroplatinat in Ggw. von $(NH_4)_2CO_3$. Die wss. Lsg. des Salzes gibt mit der I. Reisetischen Base ein rosafarbenes Prod. der Zus. $[Pt \cdot 4NH_3]PtCl_4(OH)_2$, in W. ll. In beiden Verb. ist das OH leicht durch Säurereste ersetzbar, z. B. $[Pt \cdot 4NH_3]PtCl_4(HSO_4)_2 + 4H_2O$. — $[Pt \cdot 2NH_3 \cdot Cl_2 \cdot (OH)_2]$ aus dem Peyroneschen Salz $[Pt \cdot 2NH_3 \cdot Cl_2]$ durch H_2O_2 ; es ist isomer mit der aus dem Chlorid der II. Reisetischen Base durch H_2O_2 erhaltenen Verb. — Wird in wss. salzsaure Lsg. von K- oder Ammoniumchloroplatinat ein O_3 -Strom eingeleitet, so fällt bald das betreffende Chloroplatinat aus. Unter den gleichen Bedingungen ergab die I. Reisetische Base $[Pt \cdot 4NH_3 \cdot Cl_2]Cl_2$. — Verb. $[Pt \cdot 2En \cdot Cl_2][PtCl_4]$, durch Einw. von O_3 auf das Chlorid des Plato-diäthylendiamins u. Zugabe von Kaliumchloroplatinat. — Verb. $[Pt \cdot 2C_5H_5N_2O_2 \cdot Cl_2]$ entsprechend aus Plato-methyläthylglyoxim. — Die Einw. von O_3 in alkal. Medium nehmen Vff. in einer Lsg. von $(NH_4)_2CO_3$ u. NH_3 vor. Das Peyronesche Chlorid geht hierbei in das Platinhydroxopentamin über. Das zur Ausgangsverb. isomere Chlorid der II. Reisetischen Base gibt unter den gleichen Oxydationsbedingungen u. nach Umwandlung des Carbonates in das Chlorid die Verb. $[Pt \cdot 5NH_3 \cdot Cl]Cl_3$. Es tritt hier der Unterschied in der Beweglichkeit der beiden trans-Cl-Atome deutlich zutage. — Verb. $[Pt \cdot 4NH_3(OH)_2]Cl_2$, entsprechend, aus dem Chlorid der I. Reisetischen Base. — Verb. $PtCl_{10}H_{17}N_4O_4Na$, aus Plato-methyläthylglyoxim u. NaOH, gelbe Krystalle. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 253—68. Leningrad, Akad. d. Wiss.) ULMANN.

D. Organische Chemie.

David Henry Peacock und **Bala Krishna Menon**, *Darstellung von Methyl- und Äthyljodid aus den entsprechenden Toluolsulfonsäureestern.* Zur Lsg. von 42 g KJ in 42 ccm W. gibt man 47 g *p*-Toluolsulfonsäuremethylester bzw. 50 g -äthylester, kocht im letzteren Fall $2\frac{1}{2}$ Stdn. u. dest. Ausbeute an Methyljodid 30 g = 84,5%_o, an Äthyljodid 26 g = 66,6%_o. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. **2**. 240. 1925. Rangoon, Univ.) LINDENBAUM.

S. Lebedew und **E. Filonenko**, *Untersuchungen auf dem Gebiete der Polymerisation. X. Über die Einwirkung einiger Silicate auf ungesättigte Verbindungen.* (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 127—34. 1925. — C. **1925**. I. 947.) BIKERMAN.

A. Terentjew, *Über Magnesiumalkoholate und ihre Anwendung zur Synthese von Alkoholen. III. Über Kondensationen zwischen verschiedenen Alkoholen.* (II. vgl.

S. 1960.) Vf. hat einige Fälle untersucht, in denen ein Alkohol auf das Mg-Alkoholat eines anderen Alkohols zur Einw. gelangt. Hier war von vornherein mit teilweiser Verdrängung des mit Mg verbundenen Alkohols durch den anderen u. daher mit B. schwer trennbarer Gemische von Alkoholen zu rechnen. In der Tat gelang es auch bisher nicht, im einfachsten Fall, nämlich Einw. von C_2H_5OH auf $(CH_3O)_2Mg$, die B. von Propylalkohol mit aller Sicherheit nachzuweisen. Wenn aber der Kp. des zu erwartenden höheren Alkohols hoch genug liegt, so gelangt man zum Ziel. — (Mit **I. Gribkow.**) *n*-Amylalkohol, $C_5H_{11}OH$. Man bereitet, wie früher beschrieben, Mg-Propylat u. läßt auf dasselbe C_2H_5OH einwirken (400° , 4—5 Stdn.), wobei sich Gase entwickeln. Rektifikation des Rk.-Prod. liefert 7% Ausbeute (auf Mg berechnet). Kp. 137 — 138° , D_{20}^{20} 0,8220, $n_D^{20} = 1,4153$. Ersatz von Mg durch Ca verbessert die Ausbeute nicht. — (Mit **N. Titow.**) *sek*-Hexylalkohol, $CH_3 \cdot [CH_2]_3 \cdot CH(OH) \cdot CH_3$. Aus Mg-Propylat u. *i*-Propylalkohol (375 — 380° , $3\frac{1}{2}$ Stdn.). Keine Gasentw., Temp. in der Kolonne gleichmäßig 82° , also weder B. von Propen noch von Aceton. Ausbeute ca. 5%. Kp. 136 — 138° , D_{20}^{20} 0,8215, $n_D^{20} = 1,4193$. — Der *i*-Propylalkohol wurde durch Hydrierung von Aceton nach SABATIER u. SENDERENS dargestellt, u. zwar in demselben App., der zur Kondensation der Alkohole mit den Mg-Alkoholaten dient. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 44—47. Moskau, Univ.) LINDENBAUM.

Pastureau und Zamenhof, Über die Darstellung des Propyliden- und *i*-Amylidenacetons über die entsprechenden Ketole. Vff. haben sich zur verbesserten Darst. dieser ungesätt. Ketone des von GRIGNARD u. DUBIEN (Ann. de Chimie [10] **2**. 289; C. **1925**. I. 637) für das Butylidenaceton angegebenen Verf. bedient. Die Ketole wurden genau nach Vorschrift, nur unter Eiskühlung u. Schütteln, hergestellt. — Hexanol-(3)-on-(5), $CH_3 \cdot CH_2 \cdot CH(OH) \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_3$. Aus Aceton u. Propionaldehyd. Kp. 25 90° / D_{20}^{20} 0,951, $n_D^{18} = 1,4368$. Spaltet bei Dest. unter 30 mm schon teilweise H_2O ab. Ausbeute 60%. — 2-Methylheptanol-(4)-on-(6), $(CH_3)_2CH \cdot CH_2 \cdot CH(OH) \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_3$. Aus *i*-Valeraldehyd. Kp. 7 75° , D_{20}^{20} 0,9247, $n_D^{20} = 1,4366$. Ausbeute 70%. — Die Dehydratisierung der Ketole wird am besten nach dem Verf. von LOCQUIN (Ann. de Chimie [9] **19**. 41; C. **1923**. III. 1262) durch Dest. mit 2% wasserfreier Oxalsäure bewirkt. Die Prodd. werden erst mit Na_2SO_4 , dann durch Dest. mit völlig wasserfreiem Bzl. getrocknet, wie es GRIGNARD u. DUBIEN für das Butylidenaceton vorgeschlagen haben. Ausbeute an Propyliden- u. *i*-Amylidenaceton 90%. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 323 bis 25.) LINDENBAUM.

Pastureau und Bader, Über die Chlorhydrine einiger α,β -ungesättigter Ketone. PASTUREAU u. BERNARD (C. r. d. l'Acad. des sciences **174**. 1555; C. **1923**. I. 817) fanden, daß Mesityloxyd leicht $HOCl$ addiert unter B. des Chlorhydrins. Die Rk. läßt sich auf andere α,β -ungesätt. Ketone übertragen. Vff. haben sich jetzt des Verf. von DETOEUF (Bull. Soc. Chim. de France [4] **31**. 102; C. **1922**. III. 40) bedient. — Äthylidenacetonchlorhydrin, $CH_3 \cdot CH(OH) \cdot CHCl \cdot CO \cdot CH_3$. Zur Lsg. von 94,45 g Chlornharnstoff in 1 l W. gibt man 84 g Äthylidenaceton u. 15 g Eg. u. schüttelt auf der Maschine. Die Temp. steigt auf ca. 35° . Nach 4 Stdn. ist die $HOCl$ verschwunden. Am anderen Tag wird in Ä. aufgenommen. Gelbliche, campherartig riechende, die Schleimhäute reizende Fl., Kp. 15 75 — 78° , D_{20}^{22} 1,1254, $n_D^{22} = 1,4548$. Zers. sich am Licht unter Schwarzfärbung. Ausbeute 35%. — Propylidenacetonchlorhydrin, $C_2H_5 \cdot CH(OH) \cdot CHCl \cdot CO \cdot CH_3$. Darst. analog. Keine Temp.-Erhöhung, Rk. träge, nach 2 Tagen noch Spuren $HOCl$ vorhanden. Kp. 13 94° , D_{20}^{15} 1,1396, $n_D^{15} = 1,4639$, sonst wie das vorige. Ausbeute 19%. — *i*-Amylidenacetonchlorhydrin, $(CH_3)_2CH \cdot CH_2 \cdot CH(OH) \cdot CHCl \cdot CO \cdot CH_3$. Rk. noch träger, nach 3 Tagen noch $HOCl$ vorhanden. Erhöhung der Konz. ist ohne Einfluß. Aromat. riechende, nicht reizende Fl., Kp. 5 61° , D_{20}^{22} 1,099, $n_D^{22} = 1,4690$, sonst wie die vorigen. Ausbeute 6%. — Die Ausbeute an Chlorhydrin fällt also mit wachsendem Mol.-Gew. des Ketons; beim Mesityloxyd betrug sie 33%. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 527—29.) LINDENBAUM.

H. Ley und **H. Hünecke**, *Lichtabsorption einfacher Carbonsäuren im Ultraviolett*. Die vorliegenden Messungen wurden als Vorarbeiten zur Aufklärung gewisser Anomalien bei der Absorption ultravioletten Lichtes durch aliphat. Aminosäuren (LEY u. ZSCHACKE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1700; C. **1924**. II. 2480) unternommen. Bei sämtlichen untersuchten Estern, Säuren u. Salzen hatten die verwendeten Lösungsm. (W., A., Hexan, Chlf. u. Ä.) auf die Absorption sehr erheblichen Einfluß. Dieser zeigte sich am deutlichsten beim *Methylacetat*, dessen Absorption in wss. Lsg. am geringsten, in Hexanlsg. am stärksten war, während die alkoh. Lsg. ein mittleres Verh. aufwies. Als ungefähres Maß für die Verschiedenheit des Einflusses der Lösungsm. dienten die Frequenzdifferenzen einer Reihe von Molarextinktionen für je 2 Lösungsm. Für Methylacetat ergaben sich die fast konstanten Werte Δ_{W-A} ($W.-A.$) = 34,4; Δ_{A-H} ($A.-Hexan$) = 13,1. — Für Äthylacetat ergaben sich ungefähr die gleichen Zahlen. Monochloressigsäureäthylester u. Dichloressigsäureäthylester ließen in ihren Lsgg. in A. u. Hexan mit wachsender Zahl der Cl-Atome Verschiebung der Absorption nach längeren Wellen u. Abnahme der Frequenzdifferenzen erkennen, eine Erscheinung, die beim Trichlormethyl- u. Trichloräthylacetat in den gleichen Lösungsm. noch deutlicher in die Augen fiel. Die Frequenz-Extinktionskurven kamen hier fast ganz zur Deckung, u. die Differenzen entzogen sich der Beobachtung. Für Glykolsäureäthylester war abweichend von den bisher untersuchten Stoffen die Reihe der Medien (nach zunehmender Absorption geordnet): W., Hexan, A. Den opt. Einfluß der Lösungsm. erklären Vff. durch B. von Solvaten dergestalt, daß die Moll. von Medien mit starken Restaffinitäten (W. u. Alkohole) sich mit der ungesätt. Carbonylgruppe des Esters vereinigen. Gestützt wird diese Auffassung dadurch, daß nach Arbeiten anderer Autoren der opt. Einfluß des Lösungsm. auf Aceton u. einige andere Carbonylverb. der gleiche ist wie auf Methyl- u. Äthylacetat, u. durch Messungen V. HENRIS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **46**. 1314 [1913]), wonach die im äußeren Ultraviolett meßbare Grenzabsorption höchstwahrscheinlich der CO- bzw. der COOH-Gruppe zugehört. Im Gegensatz zu den Estern ergibt sich für die Säuren nach zunehmender Absorption folgende Reihe der Medien: W., Hexan, A., Ä., u. zwar ist der Sinn der Absorptionsänderungen der gleiche für Essigsäure, Mono- u. Trichloressigsäure u. Glykolsäure. Salzbildung mit starken Basen verschiebt die Absorption nach kürzeren Wellen. Die Absorption des Ions wird vom Medium nur wenig beeinflusst. Die Frequenzdifferenzen zwischen den Absorptionen von Na-Salz u. Säure in wss. Lsg. sind gleichsinnig für Essig-, Chloressig- u. Glykolsäure u. nicht allzusehr verschieden. Für Trichloressigsäure ist $\Delta_{NaS} - \Delta_{HS}$ sehr gering. Zur Erklärung des Absorptionsunterschiedes zwischen Säuren u. Estern ist zunächst zu berücksichtigen, daß die Ester auch in Medien mit niedriger DE. nach Unterss. von BECKMANN u. AUWERS fast gar nicht assoziiert sind, während Trichloressigsäure in Hexan nach Messungen der Vff. vorwiegend Doppelmoleküle bildet, was auch für Essigsäure u. Chloressigsäure in Hexan wahrscheinlich ist. Ferner nehmen Vff. an, daß in den Säuren sowohl CO- als auch OH-Gruppe solvationsfähig sind, während in den Estern sich nur das Carbonyl als lyophile Gruppe betätigt. Für die Existenz einer komplexen Säureform $[RCO_2]H$ im undissoziierten Zustand mit salzartiger Absorption neben der bisher ausschließlich angenommenen mit esterartiger Absorption fanden Vff. keine Anhaltspunkte, da die bei Säuren beobachteten Lösungsmittleffekte auch bei Estern auftreten, die Säurekurve durchaus nicht immer zwischen Ester- u. Salzkurve verläuft u. die durch Salzbildung bewirkte Änderung der Absorption von derselben Größenordnung ist wie die durch Medien hervorgerufene. Etwas komplizierter als bei den rein aliphat. Verb. lagen die Absorptionsverhältnisse bei der Phenylelessigsäure, ihrem Methylester u. dem Na-Salz insofern, als hier erstens in A. u. W. eine langwellige Absorptionsbande auftrat, die in Hexanlsg. sich in drei Teilbänden auflöste u. dem Benzol zuzuschreiben ist, u. ferner ein kurzwelliges Gebiet, das durch alle drei Lösungsm., sowie durch Salzbildung in gleichem Sinne beeinflusst wurde,


wie die entsprechenden Verbb. der Essigsäure u. infolgedessen wohl der Carbonylgruppe angehört. Sämtliche Messungen wurden nach der Methode von HENRI (Physikal. Ztschr. 14. 516 [1913]) unter Verwendung allerreinsten Materialien ausgeführt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 510—24. Münster, Chem. Inst. d. Univ.) GRUNERT.

M. Tilitschejew, *Zersetzung cyclischer Ester durch Erhitzen. Zersetzung des Bernsteinsäureesters des Äthylenglykols.* (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2218; C. 1923. III. 1552.) Die meisten cycl. Ester zerfallen beim Erhitzen in Säureanhydrid u. Aldehyd, z. B. Kohlensäureäthylenester in Acetaldehyd u. CO₂ (VORLÄNDER, LIEBIGS Ann. 280. 188; C. 94. II. 657; vgl. auch BUTLEROW, LIEBIGS Ann. 111. 248; GOLOWKINSKI, LIEBIGS Ann. 111. 252; DESCUDÉ, Ann. Chim. et Phys. [7] 29. 525; C. 1903. II. 656; ADAMS u. WEEKS, Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 2519; C. 1917. I. 633). Ähnliche Zers. erfährt auch Bernsteinsäureäthylenester, der aber zum geringen Teil auch Äthylen u. CO₂ liefert.


Versuche. Bernsteinsäureäthylenester, C₆H₈O₄, aus 100 g Bernsteinsäure u. 52,5 g Äthylenglykol bei 150—275°; Trocknung bei 275° unter 9 mm Druck. Ausbeute 90%. F. 88—89°. Unter Atmosphärendruck auf 350—355° erhitzt, lieferten 29 g Ester ca. 2 g Bernsteinsäureanhydrid, 0,6 g Acetaldehyd, 150 ccm Äthylen, 6,8 g CO₂, 4,7 g Kohle u. ein saures Öl, Kp., 160—205°. Unter 3—6 mm Druck bei 340—390° ergaben 15,4 g Ester 12,5 g krystallin. Destillat, das nach Waschen mit Chlf. 2,4 g Bernsteinsäureanhydrid zurückließ. Das eingeeengte Chlf.-Filtrat wurde mit CH₃OH gefällt: 0,85 g Krystalle (aus A.), F. 129—130°, Zus. C₆H₈O₄, die Kryoskopie in Eg. weist auf ein doppeltes Mol.-Gew. hin, dennoch hält Vf. die Verb. für ein Isomeres des Bernsteinsäureäthylenesters. Das Filtrat wurde durch Erhitzen bis 360° von flüchtigen Bestandteilen befreit u. es blieb ein bei 110—122° schm. Prod., das wahrscheinlich das eben genannte Isomere in unreinem Zustand darstellt. (Journ. Russ. Phys. Chem. Ges. 57. 143—50. 1925. Moskau, Landw. Akad. Petrowsko-Rasumowskoje.)

BIKERMANN.

Richard Kuhn und Fritz Zumstein, *Über die Konfiguration der Diaminobernsteinsäuren.* II. (Zur Stereochemie des tetraedrischen Kohlenstoffatoms. III.) (II. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1429; C. 1925. II. 2204.) Die Zersetzlichkeit des d,l-Dichlorhydrates u. des d,l-Dibromhydrates der α,β-Diaminobernsteinsäure im Gegensatz zu der Beständigkeit der entsprechenden Salze der meso-Säure spricht dafür, daß das abweichende Verh. der Diaminosäuren bei der Salzbildung nicht durch spezif. Löslichkeitsunterschiede erklärt werden kann, u. daß die Ursache der Erscheinung in einer verschiedenen Basizität der NH₂-Gruppen zu suchen ist. — Vff. nehmen an, daß die Salzbildung an der zweiten NH₂-Gruppe um so schwieriger vor sich geht, je näher die bereits geladene -NH₂⁺-Gruppe ist. Diese wird ja auf H⁺-Ionen, die sich in ihrer Umgebung befinden, eine elektrostatische Abstoßung ausüben. Daraus folgt, daß die NH₂-Gruppen der meso-Säure (I), die leicht ein Dichlorhydrat bildet, weiter voneinander entfernt sind als die NH₂-Gruppen der d,l-Säure (II); für die verschiedene Basizität wird auch der Umstand von Bedeutung sein, daß die NH₂-Gruppen von I durch die Kraftfelder anderer Atome getrennt sind, im Gegensatz zu II; I u. II lassen sich dahin deuten, daß die Abstoßung der COOH-Gruppen für die Konfiguration der Moleküle von größerer Bedeutung ist als die Abstoßung der NH₂-Gruppen. — Die Grundannahme dieser Konfigurationsbetrachtung, daß die Basizität der zweiten NH₂-Gruppe um so schwächer ist, je näher die erste NH₂-Gruppe sitzt, hat sich durch Best. der Dissoziationskonstanten anderer Diamine (vgl. nachst. Ref.) bestätigt. Für



die Formeln I u. II spricht ferner das Ergebnis von Umlagerungsverss.; I konnte nicht in II, diese aber in I umgelagert werden.



u. Einleiten von HBr bei 0°; Prismen, F. ca. 204° (Zers.); mit W. Zerfall in Diaminösäure u. HBr. — *meso*-Diaminobbernsteinsäuresulfat, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4\text{N}_2, \text{H}_2\text{SO}_4$, aus der *meso*-Säure in 3 Teilen h. 40°/ig. H_2SO_4 ; Täfelchen, Zers. 203° (unkorr.). — *d,l*-Diaminobbernsteinsäuremonobromhydrat, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4\text{N}_2, \text{HBr}$, aus der *d,l*-Säure in bei 0° gesätt. HBr + A.; Prismen; Zers. 205°; ll. in W. — *d,l*-Diaminobbernsteinsäuredibromhydrat, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4\text{N}_2, 2\text{HBr}$, Prismen, Zers. ca. 180°, nach 2-monatigem Aufbewahren ca. 190°. — *meso*-Diaminobbernsteinsäure gibt mit 38°/ig. HCl im Rohr bei 140° braune Zers.-Prodd. von kollidinähnlichem Geruch, bei 180° weitgehende Zers. — *d,l*-Diaminobbernsteinsäure gibt in 15°/ig. sd. HCl *meso*-Diaminobbernsteinsäuredichlorhydrat, F. 186°. *d,l*-Dibenzoyl- u. *l*-Dibenzoyldiaminobbernsteinsäure gibt ebenso *meso*-Dichlorhydrat. — *meso*- bzw. *d,l*-Diaminobbernsteinsäure geben in 1-n. NaOH + β -Naphthalinsulfochlorid in A.-freiem Ä. die *meso*- u. die *d,l*-*N,N'*-Di- β -naphthalinsulfodiaminobbernsteinsäure, $\text{C}_{24}\text{H}_{20}\text{O}_8\text{N}_2\text{S}_2$; aus 2 Teilen W. + 1 Teil A. gibt die *meso*-Verb. spindelförmige Krystalle, F. 234° (unkorr.), die *d,l*-Verb. Täfelchen, F. 200° (unkorr.). — *meso*- bzw. *d,l*-Diaminobbernsteinsäure geben in 1-n. NaOH mit Phenyl-i-cyanat die Ureidosäuren, die durch sd. 25°/ig. HCl in die doppelten Hydantoin **III** oder in Verbb. der Konst. **IV** übergeführt werden. Das Deriv. der *meso*-Säure $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_4$ gibt rechtwinklige Rauten, swl. in den üblichen Lösungsmm., das der *d,l*-Säure $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_4$ Täfelchen, aus sd. Eg. — Das Zwischenprod. *N,N'*-Diphenylureido-*d,l*- α,β -diaminobbernsteinsäure, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_6\text{N}_4$, bildet aus wss. CH_3OH u. Eg. farblose Nadeln, F. 200° (unkorr.); ll. in verd. NaOH; durch Kochen mit 25°/ig. HCl entsteht das *d,l*-Hydantoin. — *meso*-Diaminobbernsteinsäure gibt in konz. HCl u. W. mit Cl u. NO *meso*-Dichlorbernsteinsäure, $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4\text{Cl}_2$; Prismen, aus Ä., F. 215° (unkorr.). — *d,l*-Diaminobbernsteinsäure gibt ebenso mit Nitrosylchlorid *d,l*-Dichlorbernsteinsäure, $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4\text{Cl}_2$, F. 175°. — Mit Nitrosylbromid entstehen ebenso *meso*-Dibrombernsteinsäure, $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4\text{Br}_2$, aus Ä. u. h. W., F. 241° (unkorr.) u. *d,l*-Dibrombernsteinsäure, $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4\text{Br}_2$, aus Ä., F. 167° (unkorr.). — Dasselbe Ergebnis wie mit NOBr u. NOCl erhält man durch Eintragen von AgNO_2 in die stark HBr- bzw. HCl-saure Lsg. der Diaminobbernsteinsäuren. — Dasselbe Verf., Zusatz von AgNO_2 zur stark salzsauren Lsg. u. Turbinieren bei 0°, bei dem sich das AgNO_2 durch NaNO_2 ersetzen läßt, dürfte auch zur Umwandlung von *opt.*-akt. Aminosäuren in *opt.*-akt. Halogenfettsäuren sehr geeignet sein; *l*-Asparaginsäure gibt so *opt.* reine (—)-Chlorbernsteinsäure, F. 176°; $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = -21,6^\circ$ (in W.). — *d,l*-Diaminobbernsteinsäure gibt in 10°/ig. HCl + W. mit NaNO_2 ausschließlich Traubensäure. — In allen untersuchten Fällen erfolgt der Ersatz der NH_2 -Gruppen durch -OH, -Cl u. -Br entweder ohne Konfigurationswechsel, oder es findet gleichzeitig an beiden Asymmetriezentren Waldensche Umkehrung statt. — Umsetzungen der beiden Diaminobbernsteinsäuren mit nur 1 Mol. Nitrit bzw. NOCl, um durch Abspaltung von Halogenwasserstoff aus den Halogenaminobbernsteinsäuren zu den N-haltigen Analoga der *cis*- u. *trans*-Glycididicarbonsäure zu gelangen, führten nie zu Oxyasparaginsäure bzw. Chloraminobbernsteinsäure: 50°/ der angewandten Diaminosäure blieben unverändert, 50°/ wurden zu Weinsäure bzw. Dichlorbernsteinsäure umgesetzt. Die Angabe von NEUBERG u. SILBERMANN (Ztschr. f. physiol. Ch. **44**, 154; C. **1905**, I. 1089), daß bei der Einw. von $\text{Ba}(\text{NO}_2)_2$ auf *meso*-Diaminobbernsteinsäure in schwefelsaurer Lsg. Oxyasparaginsäure

Versuche. *d,l*-Diaminobbernsteinsäuredichlorhydrat, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4\text{N}_2, 2\text{HCl}$, aus der *d,l*-Säure in 4 Teilen konz. HCl u. Einleiten von HCl; Prismen, Zers. 180°; ll. in k. W. — *meso*-Diaminobbernsteinsäuredibromhydrat, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4\text{N}_2, 2\text{HBr}$, B. mit konz. HBr.

entsteht, wurde nicht bestätigt. — (—)-Dibenzoyldiaminobbernsteinsäure gibt mit sd. 15%ig. HCl das Chlorhydrat der akt. (—)-Diaminobbernsteinsäure neben meso-Säure, von der sich die opt.-akt. Diaminobbernsteinsäure auf Grund ihrer größeren Löslichkeit in k. verd. HCl trennen läßt. Die akt. Säure $C_4H_8O_4N_2$ bildet Nadeln; $[\alpha]_D^{20} = -18,9^0$ (in 10%ig. HCl, auf freie Diaminosäure berechnet); $[\alpha]_D^{20} = -10,1^0$ (in 0,3-n. KOH, auf freie Diaminosäure berechnet). — Die (—)-Diaminobbernsteinsäure gibt mit NOBr die opt. akt. Dibrombernsteinsäure, $[\alpha]_D^{20} = +42,7^0$ (in Essigester). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 479–88.) BUSCH.

Richard Kuhn und Fritz Zumstein, *Über die Dissoziationskonstanten aromatischer Diamine und über den räumlichen Bau des Benzidins. (Zur Stereochemie aromatischer Verbindungen. II.)* (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1432; C. 1925. II. 2207.) Vff. entwickeln ein Verf. zur Berechnung der 1. u. 2. Dissoziationskonstanten von Diaminen, dessen Anwendbarkeit am Beispiel des *o*-, *m*- u. *p*-Phenylendiamins geprüft wird. Die gefundenen Dissoziationskonstanten werden unter dem Gesichtspunkt der Theorie von BJERRUM (Ztschr. f. physik. Ch. 106. 220; C. 1923. III. 1589) erörtert, u. es wird eine Nutzanwendung der gemachten Erfahrungen auf das Problem des Benzidins versucht. — Die Meßmethode beruht auf der elektrometr. Best. der Wasserstoffionenaktivität in annähernd äquimolaren Mischungen von freier Base u. Monochlorhydrat, woraus die 1. Dissoziationskonstante K_1 abgeleitet wird, u. in annähernd äquimolaren Mischungen von Mono- u. Dichlorhydrat, woraus die 2. Dissoziationskonstante K_2 folgt. Die Salzbildung betrachten Vff. als zustandekommend durch Anlagerung eines H^+ -Ions an die NH_2 -Gruppe. — Die Messungen wurden teils in W. (DE. 81), teils in 50%ig. CH_3OH ausgeführt, u. zwar in Gemischen gleicher Volumteile CH_3OH u. W., so daß der $CH_3\cdot OH$ -Gehalt etwa 44,5 Gew.-% beträgt; für die Mischung ergibt sich DE. 61. — Für die 1. u. 2. Dissoziationskonstante eines Diamins werden folgende Formeln abgeleitet:

in W. $-\log K_1 = -\log a_{H^+} - \log \frac{[Bz]}{[Bz \cdot HCl]} - 0,32 \sqrt[3]{c_{Ion}}$

in 50%ig. CH_3OH . . . $-\log K_1 = -\log a_{H^+} - \log \frac{[Bz]}{[Bz \cdot HCl]} - 0,43 \sqrt[3]{c_{Ion}}$

in W. $-\log K_2 = -\log a_{H^+} - \log \frac{b + [H^+]}{c - [H^+]} - 0,96 \sqrt[3]{c_{Ion}}$

in 50%ig. CH_3OH . . . $-\log K_2 = -\log a_{H^+} - \log \frac{b + [H^+]}{c - [H^+]} - 1,28 \sqrt[3]{c_{Ion}}$

Hierin bedeuten a_{H^+} = die potentiometr. gemessene Aktivität der Wasserstoffionen, $[Bz]$ = die Konz. des ungeladenen Benzidins, c_{Ion} = die Ionenkonz. der Lsg., b = die aus der Einwage berechnete molare Konz. an Monochlorhydrat, c = die Molarität des Dichlorhydrats in den aus den beiden Chlorhydraten dargestellten Puffergemischen.

Versuche: *o*-Phenylendiamin, aus W., F. 103° (unkorr.). — $C_6H_8N_2$, HCl, aus 15 Teilen CH_3OH + ber. 20%ig. HCl + Ä., Prismen. — $C_6H_8N_2$, 2HCl, aus h. W. + überschüssiger konz. HCl, schwach rosastichige Krystalle. — *m*-Phenylendiamin, Kp.₁₅ 157°; F. 65° (unkorr.). — *p*-Phenylendiamin, aus W., F. 141° (unkorr.). — $C_6H_8N_2$, HCl, Prismen. — $C_6H_8N_2$, 2HCl. — Während der Messungen blieben die Gemische aus Mono- u. Dichlorhydrat farblos, während die Gemische aus freier Base + Monochlorhydrat schwach violette Farbe annahmen. — Benzidin, aus A., F. 127 bis 128° (unkorr.). — $C_{12}H_{12}N_2$, HCl, aus 12 Teilen w. CH_3OH + berechneter 20%ig. HCl, Prismen, aus W. — $C_{12}H_{12}N_2$, 2HCl, aus h. 90%ig. A. + 2 Teilen absol. A., Plättchen. — Einzelheiten der Meßmethode sind aus dem Original zu ersehen; es wurden folgende 1. Dissoziationskonstanten $p_1 = -\log K_1$ (mit 1. bezeichnet) u.


2. Dissoziationskonstanten $p_2 = -\log K_2$ (mit 2. bezeichnet) gefunden: o-Phenylendiamin 1. in W. 4,60; 1. in 50%ig. CH_3OH 4,57; 2. in 50%ig. CH_3OH 1,3. — m-Phenylendiamin 1. in W. 5,02; 2. in W. 2,65. — p-Phenylendiamin 1. in W. 6,23; 2. in W. 3,29. — Benzidin 1. in 50%ig. CH_3OH 4,89; 2. in 50%ig. CH_3OH 3,74. — Die Basizität der ersten Aminogruppe steigt beim Übergang von der o- zur m-Verb. etwa auf das 2,5-fache, beim Übergang von der m- zur p-Verb. annähernd auf das 16-fache; es ist die umgekehrte Reihenfolge, die hinsichtlich der Acidität der ersten COOH -Gruppe bei den Benzoldicarbonsäuren gefunden wurde. Die Benzoessäure ist erheblich schwächer als die Terephthalsäure in erster Stufe, das Anilin fügt sich zwischen die K_1 -Werte von o- u. m-Phenylendiamin ein. — Die 2. Dissoziationskonstanten der Phenylendiamine nehmen in derselben Reihenfolge wie die 1. Dissoziationskonstanten zu, im Gegensatz zu den Dicarbonsäuren, bei denen dem größeren K_1 -Wert der kleinere K_2 -Wert entspricht. — Aus den Dissoziationskonstanten der Phthalsäuren u. der Phenylendiamine wird der Abstand der ionogenen Gruppen bei denselben in Å.-E. berechnet u. mit den gefundenen in einer Tabelle zusammengestellt. — Wenn man die Abweichung zwischen Theorie u. Experiment ($r_{\text{ber.}}$ — $r_{\text{gef.}}$, wobei r den Abstand der Ladungen in cm bedeutet) mit BJERRUM auf Elektronenverschiebungen in der Atomkette zurückführt, so folgt aus dem Vergleich der Dicarbonsäuren mit den Diaminen, daß die Wrkg. durch die Atomkette des Bzl. wesentlich von der Natur der Substituenten abhängt. Ferner folgt, daß bei den Diaminen die Wrkg. nach der p-Stellung stärker ist als nach der m-Stellung. — Aus den Dissoziationskonstanten des Benzidins in 50%ig. CH_3OH erhält man für den Abstand der beiden NH_2 -Gruppen $r = 7,5$ Å.-E. Diese Messungen lassen sich mit der Benzidinformel von KAUFLEDER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3253; C. 1907. II. 1072) nicht in Einklang bringen, stehen aber mit der klassischen Formel des Benzidins in keinerlei Widerspruch; trotzdem kann man die gefundenen Dissoziationskonstanten mit den von KAUFLEDER beschriebenen Ringschließungsrrkk. vereinbaren, wenn man die Vorstellung eines starren Benzidin-Mol. aufgibt. Es könnte etwa im Krystallgitter der Kauflerschen Formel entsprechen, in Lsg. aber u. bei der Salzbildung könnten infolge der Abstoßung der geladenen NH_2 -Gruppen die Bzl.-Kerne auseinander weichen. — Bezüglich der Zwischenbindung im *Diphenyl* wird die Ansicht von VORLÄNDER (S. 111) bestätigt. Die Zwischenbindung verhält sich, auch in Hinsicht auf die Dissoziationskonstanten wie ein Isolator u. ist von ganz anderer Art als die Bindungen innerhalb der beiden Bzl.-Kerne. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 488—98. München, Bayer. Akad. d. Wiss.) BUSCH.

Y. Asahina und S. Nakayama, Über die Verseifung der höheren β -Ketonsäureester der Fettreihe. Auf Grund der Beobachtung von ASAHINA u. NAKANISHI (S. 135), daß der β,κ -Diketomyristinsäureester mit Lauge nur die Ketonspaltung erleidet, haben Vff. einige höhere β -Ketonsäureester nach dieser Richtung untersucht. — β -Ketoundecylsäureester, $\text{CH}_3 \cdot [\text{CH}_2]_7 \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$. Pelargonsäurechlorid wird mit Na-Acetessigester kondensiert u. das Rohprod. mit NH_4OH behandelt. Gelbliches Öl, Kp_{26} 140—160°, D_{20} 0,907. Wird von FeCl_3 rot gefärbt. Cu-Salz, F. 87°, l. in Bzl., Chlf. Gibt mit Phenylhydrazin 1-Phenyl-3-octylpyrazolon-(5), $\text{C}_{17}\text{H}_{24}\text{ON}_2$, F. 239° (Zers.), Blaufärbung mit FeCl_3 . Der Ester wird von 0,5%ig. Lauge (70°, 30 Min.) in Methyl-octylketon (Semicarbazon, F. 119—121°), Pelargonsäure u. Essigsäure gespalten. Die rohen sauren Spaltprodd. färben sich mit FeCl_3 rot, enthalten also β -Ketoundecylsäure. — β -Ketomyristinsäureester, $\text{CH}_3 \cdot [\text{CH}_2]_{10} \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$. Aus Laurinsäurechlorid. Kp_{26} 155—173°. Liefert mit 1%ig. Lauge (70°, 1 Stde.) hauptsächlich β -Ketomyristinsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}_3$, F. 39—40°, mit FeCl_3 Rotfärbung; Semicarbazon, F. 253°. Bei längerer Dauer oder mit stärkerer Lauge erleidet der Ester Spaltung in Methylundecylketon (Semicarbazon, F. 118—119°) u. Laurinsäure. — β -Ketostearinsäureester, $\text{CH}_3 \cdot [\text{CH}_2]_{14} \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$. Aus Palmitinsäurechlorid. Krystalle aus Pae., F. 104—105°. Mit FeCl_3 Rotfärbung. Liefert mit 2%ig. alkoh. KOH (100°, 4 Stdn.)

nur β -Ketostearinsäure, $C_{18}H_{34}O_3$, F. 64—65°, die von $FeCl_3$ nicht gefärbt wird; *Semicarbazon*, F. 295—300°. — Aus den Verss. folgt, daß der Widerstand der β -Keton-säuren gegen die Säurespaltung mit steigendem Mol.-Gew. zunimmt u. daß β -Keton-säuren, die mit $FeCl_3$ keine roten Komplexsalze mehr liefern — dies gilt auch von der Diketomyristinsäure (l. c.) —, auch keine Säurespaltung mehr erleiden. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. No. 526. 3—5.)

LINDENBAUM.

James B. Allison und R. M. Hixon, *Synthese und Eigenschaften der 3-Chlor-diacetonglucose*. 3-Chlordiacetonglucose (II), $R-Cl$, wurde durch Einw. von PCl_5 auf



Diacetonglucose (I) in 25%ig. Ausbeute, ferner durch Chlorierung von III mit PCl_5 in trockenem PAe. erhalten. Es ist ein farbloses Öl, das im Hochvakuum (0,05—0,005 mm) bei 127° siedet. Das Cl-Atom ist sehr fest gebunden, beim Kochen mit 6-n. NaOH-Lsg. wird die Verb. nicht verändert; mit konz. alkoh. Natron erfolgt aber Verseifung zu I. Durch diese Verseif-


barkeit u. die 2 verschiedenen Darst.-Methoden ist die für II angenommene Konst. bewiesen. — *Bis-[diacetonglucose]-sulfid* (III), $R-O-SO-OR$, wurde durch Einw. von $SOCl_2$ auf I, sowie auf das entsprechende Na-Salz bei 0° in quantitativer Ausbeute erhalten. Es ist ein farbloses Öl u. wird von Hydrazin u. verd. Alkali-Lsg. zu I verseift. Läßt man $SOCl_2$ bei 70—90° auf $R-OH$ oder $R-ONa$ einwirken, so entsteht neben III *Diacetonglucosediacetonglucosesulfonat*, $R-O-SO_2-R$, das mit Hydrazin Hydrazindiacetonglucose, F. 98°, gibt. Die Beständigkeit dieses Sulfonats zeigt ebenso wie die Stabilität des Cl-Atoms in II den negativen Charakter des 3. C-Atoms in Diacetonglucose an. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 406—10. Ames, Iowa State Coll.) Wt.

John Walter Hyde Oldham, *Umwandlungen der Zuckersalpetersäureester*. 2,3,5-Trimethylglucosan in Chlf. gibt mit rauchender HNO_3 2,3,5-Trimethylglucose-1,6-dinitrat, 1,6-Diacetyl-2,3,5-trimethylglucose dagegen einen Sirup. Trimethylglucosedinitrat reduziert Fehlingsche Lsg. weder vor noch nach dem Kochen mit Säure. Die Nitrogruppe in 1 kann durch Methoxyl beim Kochen mit CH_3OH in Ggw. von $BaCO_3$ ersetzt werden. Es resultiert *Trimethylmethylglucosid-6-mononitrat*. Nach der Hydrolyse entsteht dasselbe Trimethylmethylglucosid, das aus Trimethylglucosan erhalten wird. Einen endgültigen Beweis für die 6-Stellung der Nitrogruppe bildet der Übergang mit NaJ in dasselbe Trimethylmethylglucosidjodhydrin, das aus der Acetodibromglucose erhalten wurde. (Vgl. IRVINE u. OLDHAM, S. 2184.) — Die Einw. von rauchender HNO_3 auf Triacetylglucosan ergab einen gelben Sirup mit hohem N-Gehalt u. ein *Triacetylglucose-1,6-dinitrat*, das ebenfalls Fehlingsche Lsg. weder vor noch nach dem Kochen reduzierte. Durch Kochen mit Eg. u. Na-Acetat entstand *Tetraacetylglucose-6-mononitrat*, daraus durch Hydrolyse *Tetraacetylglucose*, ein Isomeres des von FISCHER beschriebenen Prod., in dem die Hydroxylgruppe in 6 nicht substituiert ist. Mit CH_3OH entsteht *Triacetylmethylglucosid-6-mononitrat* u. daraus *Triacetylmethylglucosid* u. *Triacetylmethylglucosid-6-jodhydrin*. *Methylglucosid-6-mononitrat* ist stets durch Acetamid verunreinigt. Triacetylmethylglucosid-6-jodhydrin ergab mit Dimethylamin eine geringe Ausbeute an *Methylglucosid-6-jodhydrin*. Bei der Darst. von Triacetylmethylglucosid-6-mononitrat wurde ein geringer Abbau zur Pentosegruppe beobachtet.

Versuche. 2,3,5-Trimethylglucose-1,6-dinitrat, $C_9H_{16}O_{10}N_2$; aus abs. A. Nadeln. F. 86°. Unl. in W. u. PAe., sonst l. $[\alpha]_D = +149,3^\circ$ (Chlf.; $c = 2,3193$). — *Trimethylmethylglucosid-6-mononitrat*, $C_{10}H_{19}O_9N$. Aus PAe. F. 53—54°. $n_D = 1,4565$. Unl. in W., sonst l. $[\alpha]_D = -5,2^\circ$ (Chlf.; $c = 2,0653$). Liefert durch Kochen mit Fe-Staub in Eg. in 50%ig. Lsg. Trimethylmethylglucosid. — *Triacetylglucose-1,6-dinitrat*, $C_{12}H_{18}$.

$O_{13}N_2$. Triacetylglucosan in einer Mischung von 30% Chlf. u. 70% HNO_3 (D. 1,54) gel., dazu festes N_2O_5 . 110 Stdn. bei gewöhnlicher Temp. Aus h. absol. A. F. 132—133°. Unl. in W., PAe., k. A. $[\alpha]_D = +144,2^\circ$. (Gemisch von 70% rauchender HNO_3 u. 30% Chlf.; $c = 5,0$). — *Tetraacetylglucose-6-mononitrat*, $C_{14}H_{19}O_{12}N$. Aus absol. A. F. 142—143°. Reduziert Fehlingsche Lsg. beim Kochen. $[\alpha]_D = +23,2^\circ$ (Eg.; $c = 2,494$). — *Tetraacetylglucose*, $C_{14}H_{20}O_{10}$. Aus Ä. Nadeln. F. 126,5—127,5°. $[\alpha]_D = +9,8^\circ$ (Chlf.; $c = 0,816$). — *Triacetylmethylglucosid-6-mononitrat*, $C_{13}H_{19}O_{11}N$. Roter Rückstand aus absol. A. F. 133,5—134,5°. $[\alpha]_D = -14,3^\circ$ (Chlf.; $c = 5,964$). — *Triacetylmethylglucosid*, $C_{13}H_{20}O_9$. Aus Ä. F. 134—134,5°. $[\alpha]_D = -19,1^\circ$ (Chlf.; $c = 1,514$). — *Methylglucosid-6-mononitrat*, $C_7H_{13}O_8N$. Sirup. 2-mal mittels Ag_2O methyliert. Das Prod. krystallisierte beim Animpfen mit Trimethylmethylglucosid-6-mononitrat. Aus PAe. umkrystallisiert zeigte es den F. dieses Prod. — *Triacetylmethylglucosid-6-jodhydrin*, $C_{13}H_{19}O_8J$. Aus wss. A. Nadeln F. 111—112,5°. Unl. in W., PAe., $[\alpha]_D = +0,9^\circ$ (Chlf.; $c = 3,027$). — *Methylglucosid-6-jodhydrin*, $C_7H_{13}O_5J$. Schlechte Ausbeuten. Aus Chlf.-Essigester farblose Krystalle; gewöhnlich schwach rosa gefärbt. F. 157—158°. $[\alpha]_D = -16,1^\circ$ (Chlf.; $c = 1,677$). — *Acetonitropentose*, $C_{11}H_{15}O_{10}N$. Mutterlaugen vom Triacetylmethylglucosid-6-mononitrat zur Trockne eingedampft, $\frac{1}{2}$ Stde. mit Acetanhydrid u. Na-Acetat gekocht. Aus absol. A. F. 168—169°. $[\alpha]_D = +92,0^\circ$ (Chlf.; $c = 1,214$). (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2840—45. 1925. St. Andrews, Univ.) BER.

Edmund Knecht und Eva Hibbert, *Das Verhalten der Glucose und verschiedener anderer Kohlehydrate gegen Farbstoffe und Ferricyankalium in alkalischer Lösung*. (Vgl. Journ. Soc. Dyers Colourists **41**. 94; C. **1925**. II. 1103.) Die vorliegenden Verss. wurden hauptsächlich mit dem *K-Salz der Indigotetrasulfonsäure* ausgeführt. Die reduzierte Indigomenge entsprach einer O-Aufnahme von 3 Atomen auf 1 Mol. Glucose, 4 Atomen O auf 1 Mol. Lävulose u. $3\frac{1}{2}$ Atomen O auf 1 Mol. Invertzucker. Galaktose u. Glucosaminchlorhydrat zeigten dasselbe Verh. wie Glucose. Maltose wurde augenscheinlich hydrolysiert, da das Mol. eine 6 Atomen O entsprechende Menge Indigo reduzierte. Mit Thioindigosulfonsäure wurden ähnliche Resultate erzielt. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **40**. 3821; C. **1907**. II. 1709.) — *Ferricyankalium* kann bei der Titration von Glucose, Lävulose u. Glucosamin Indigo ersetzen. Die Rk. geht hier außerordentlich schnell (15 Sek.) vor sich. Das entstandene Ferrocyanid wurde nach Zugabe von H_2SO_4 mit $KMnO_4$ titrimetr. bestimmt, der Überschuß an Ferrieyanid mit $TiCl_4$ in Ggw. von Spuren von $FeCl_3$ zurücktitriert. In allen 3 Fällen wurden übereinstimmende Ergebnisse erhalten. Vff. nehmen an, daß bei der Oxydation der Glucose u. Galaktose Hexantetraoxydicarbonsäuren entstehen, bei der Lävulose gleiche Mengen einer Mono- u. einer Dicarbonsäure gebildet werden. Eine Identifizierung der Oxydationsprodd. gelang jedoch trotz wiederholter Verss. nicht. Die bei der Oxydation der Glucose u. Lävulose mit Ferricyankalium entstandenen Dicarbonsäuren konnten durch Titration mit Phenolphthalein als Indicator nachgewiesen werden. — Bekanntlich kommen bei der Red. von Fehlingscher Lsg. durch Glucose weniger als $2\frac{1}{2}$ Atome O auf 1 Mol. Glucose. Wird dagegen $CuCO_3$ -Lsg. in einer Lsg. von $Na_2CO_3 + NaHCO_3$ angewandt (vgl. SOLDAINI, Gazz. chim. ital. **6**. 322 [1876]), so ist die Oxydationswrkg. doppelt so stark. Verss., durch Zusatz von alkal. Carbonat bei der Titration der Glucose mit Indigo die Oxydationswrkg. zu steigern, lieferten jedoch keine von den früheren abweichende Resultate. Bei dieser Titration müssen die einzelnen Prodd. in bestimmter Reihenfolge zur Glucose zugegeben werden. — Bei der Titration mit Kitionblau (I) entsprachen 1 Mol. Glucose




u. 1 Mol. Lävulose einer O-Aufnahme von genau 2 Atomen. Dieses würde der B. von Glucuronsäure aus der Glucose u. Oxygluconsäure aus Lävulose entsprechen. Bei nachfolgender Titration mit Indigo wurden von der Glucose u. Lävulose noch je ein

weiteres O-Atom aufgenommen. — Bei *Rosindulin 2 B* als Oxydationsmittel entsprach die O-Aufnahme 1 Atom auf 1 Mol. Glucose. Bei einer folgenden Methylenblautitration wurde eine weitere Oxydation nicht beobachtet. Vff. nehmen hierbei eine quantitative B. von *Gluconsäure* an. — Die Ausführung der Titrationsen war in allen Fällen dieselbe. Eine gewogene Zuckermenge, am besten 0,01—0,05 g, wurde mit einer bestimmten Menge der Farbstofflsg. (Überschuß) im N_2 -Atom erhitzt. Zur sd. Lsg. wurde KOH 0,5 g oder 5 ccm einer 10%ig. Lsg. zugegeben, u. das Kochen eine bestimmte Zeit fortgesetzt, dann angesäuert u. der Überschuß an Farbstoff mit $TiCl_4$ im CO_2 -Strom zurücktitriert. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 2854—60. 1925. Manchester, Univ.) BE.

James Colquhoun Irvine und **John Walter Hyde Oldham**, *Polymerisation von β -Glucosan*. Die Konstitution synthetischer Dextrine. Vff. setzen die Unterss. PICTETS über die Polymerisation von β -Glucosan fort. Als Katalysator wurde metall. Zn verwandt. Die Ausbeute an verschiedenen Polymerisationsprodd. ist ferner abhängig von der Temp. u. der Dauer des Erhitzens. — Alle Verss. wurden bei einem Druck von 15 mm ausgeführt. Die Polymerisationsprodd. wurden durch fraktionierte Fällung aus wss. Lsg. in 3 Hauptfraktionen erhalten, die mit zunehmender Löslichkeit folgende Abnahme im spezif. Drehungsvermögen zeigten: Dextrin I $+83,9^\circ$, Dextrin II $+60,7^\circ$ u. Dextrin III $+29,9^\circ$. Im Gegensatz zu den von PICTET beschriebenen Prodd. gaben alle Dextrine ein Triacetat. Durch Methylieren konnte nachgewiesen werden, daß je 6 C-Atomen 3 Hydroxylgruppen entsprechen. Die Prodd. wurden als *Heptaglucosan*, *Tetraglucosan* u. *Triglucosan* charakterisiert, womit jedoch die Zahl der möglichen Isomeren nicht erschöpft ist, da Vff. ebenfalls die Darst. von anderen Isomeren gelang. — Das von ihnen untersuchte Tetraglucosan ist, wie die charakterist. Daten zeigen, verschieden von dem von PICTET u. späterhin von PRINGSHEIM untersuchten Prod. — Die Annahme, daß die Hydroxylgruppen gleichmäßig an den C_6 -Komplexen eines Polysaccharids verteilt sind, bedarf in jedem Fall einer besonderen Unters., da Vff. zeigen konnten, daß bei der Methylierung u. folgenden Hydrolyse des β -Glucosans eine 2,3,5-Trimethylglucose entsteht, während von einem polymerisierten Glucosan Di-, Tri-, u. Tetramethylglucose erhalten wurde (vgl. Journ. Soc. Chem. London **119**. 1744; C. 1922. I. 678). — Bei vorliegender Unters. schließen Vff. aus der Identität der physikal. Konstanten der Gemische, daß Hepta-, Tetra- u. Tri-(trimethylglucosan) dieselben Di-, Tri- u. Tetramethylglucosen geben. Die hierbei isolierte Tetramethylglucose ist ein unmittelbares Spaltprod. der methylierten Dextrine. — Die bei der Methylierung des vollständig polymerisierten Prod. erhaltenen Isomeren wurden durch Vakuumdest. voneinander getrennt. Die erste Fraktion bestand aus Trimethylglucosan, die zweite, ein viscoser Sirup, aus Di-(trimethylglucosan). Der zurückbleibende Sirup, nicht flüchtig bei 200°/0,4 mm, erstarrte beim Erkalten durchsichtig rot glasig. Dieses Prod. enthielt alle höheren Polymeren u. wurde als Poly-(trimethylglucosan) bezeichnet. Di-(trimethylglucosan) ergab Dimethylmethylglucosid u. Tetramethylmethylglucosid u. daraus 2,3,5,6-Tetramethylglucose u. eine Dimethylglucose. Poly-(trimethylglucosan) ergab 2,3,5,6-Tetramethylmethylglucosid, 2,3,5-Trimethylmethylglucosid, Dimethylmethylglucosid u. wenig Monomethylmethylglucosid, infolge unvollständiger Methylierung. — Der Polymerisationsmechanismus. Da 2,3,5,6-Tetramethylglucose u. eine Dimethylglucose aus allen Polyglucosanen erhalten werden, so folgt daraus, daß zuerst eine Umwandlung von Glucosan in Glucose stattfindet, worauf 1 Mol. derselben sich mit 1 Mol. Glucosan kondensiert usf. Obwohl die Konst. der entstandenen Dimethylglucose noch nicht feststeht, nehmen Vff. die der 2,5-Dimethylglucose als die wahrscheinlichere an. Für Diglucosan käme dann Formel I in Betracht. Da bei allen höheren Polymeren daneben noch 2,3,5-Trimethylglucose entsteht, so kann Triglucosan nur die Konst. II besitzen. — Die beiden isomeren Formen des Tetraglucosans können dadurch erklärt werden, daß die Polymerisation in dem einen Fall stattfindet, indem das gebildete Diglucosan sich mit einem weiteren Molekül Glucosan zum Tri-

glucosan u. dieses in gleicher Weise zum Tetraglucosan kondensiert, während im zweiten Fall 2 Moll. der Di-Verb. sich zu einer Tetra-Verb. vereinigen können. — Die Strukturähnlichkeit des Triglucosans u. der Maltose erlaubt die Bezeichnung *Glucosanmaltosid* für Triglucosan. — An verschiedenen Beispielen suchen Vff. die Anwendbarkeit der Methylierung bei Strukturaufklärungen der Kohlehydrate nachzuweisen.



Versuche. Polymerisation des β -Glucosans. 7 g Glucosan + 0,1 g Zn-Staub im Vakuumkolben, in dem die Luft vollständig durch trockenes H_2 verdrängt ist, auf 250° erhitzt. Beim Schmelzen des Glucosans Leitung zur Wasserstrahlpumpe geschlossen, da sich sonst das Prod. unverändert verflüchtigt. Durch wechselweises Öffnen u. Schließen der Leitung wurde eine vollständige Polymerisation ohne Zers. erreicht. Rückstand mit sehr wenig h. W. ausgezogen u. mit A. versetzt. Dunkler Nd. Nach Entfärben absol. A. zum Filtrat. *Dextrin I*. Feines Pulver. Aus zuviel W. dagegen klebriger Nd. Mutterlauge eingengt u. mit A. nacheinander *Dextrin II* u. *Dextrin III* gefällt. — *Dextrin I*, Heptaglucosan, $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_7$. Hygroskop. Pulver. Unl. in organ. Lösungsmm. außer in CH_3COOH . Reduziert nicht. $[\alpha]_D = +83,9^\circ$ (W.; c = 2,08). Daraus Triacetat $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_8$. Aus h. absol. A. Pulver. F. 142° . Unl. in W., k. absol. A., Ä., sonst ll. $[\alpha]_D = +85,1^\circ$. (50%/ig. A.; c = 2,2315). Durch Erhitzen des Dextrins in mit HCl gesätt. CH_3OH entsteht Methylglucosid. — *Dextrin II*, Tetraglucosan. Hygroskop. Pulver. $[\alpha]_D = +60,7^\circ$ (W.). Gibt dasselbe Triacetat wie Dextrin I. — *Dextrin III*, Triglucosan. $[\alpha]_D = 29,9^\circ$ (W.); stimmt im sonstigen Verh. mit Dextrin II überein. — Bei der Methylierung von Dextrin I in CH_3OH wurde die Einw. von Ag_2O u. CH_3J unterbrochen, wenn zwei Alkylgruppen in jeden C_6 -Komplex eingeführt sind. Das entstandene glasige Prod. $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_5$ ist leicht zu pulvern. $[\alpha]_D = 76,0^\circ$ (Chlf.; c = 0,6035). Mit Methylsulfat methyliert resultiert ein Prod. von $[\alpha]_D = 89,4^\circ$ (Chlf.; c = 2,745); durchweg ll. — Dextrin II u. Methylsulfat gibt einen Sirup. $[\alpha]_D = +66,6^\circ$ (Chlf.; c = 3,3335). Nach 9 Methylierungen noch unvollständig. — Dextrin III 11-mal mit Methylsulfat methyliert, trotzdem unvollständig. $[\alpha]_D = +53,5^\circ$ (Chlf.; c = 2,1035). Bei 180 bis $200^\circ/0,5$ mm Depolymerisation. — Die indirekte Isolierung von Polyglucosanen in Form methylierter Derivv. ergab durch Dest. Fraktion I. Kp._{0,2} 135° . 17% Trimethylglucosan, $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_5$. Krystallisiert. Fraktion II 23,6% Di-(trimethylglucosan) $(\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_5)_2$. Kp._{0,2} $205\text{--}210^\circ$. Sirup. $[\alpha]_D^{20} = +46,5^\circ$ (Chlf.; c = 1,9515). Rückstand 57,8% Poly-(trimethylglucosan). Glasig. $[\alpha]_D = +63,3^\circ$ (Chlf.; c = 1,850) (Journ. Chem. Soc. London 127. 2903—22. 1925. St. Andrews, Univ.) BEREND.

P. Karrer und **Th. Lieser**, *Polysaccharide*. XXXIV. Beitrag zur Kenntnis der *Hydro- und Oxycellulose*. (XXXIII. vgl. S. 2194.) Vff. verweisen auf die Angaben verschiedener Forscher über die Nichteinheitlichkeit der Hydrocellulose u. Oxycellulose. Die nach dem Knoevenagel-Hess'schen Verf. gewonnene Hydrocellulose steht der eigentlichen Cellulose näher als die meisten Hydrocellulosen. — Vff. haben eine vollkommen alkalilösliche *Hydrocellulose* dargestellt, deren Schwalbesche Kupferzahl unter 3 liegt. Ihr Reduktionsvermögen kommt damit nahe an das bei manchen nativen Cellulosen beobachtete heran. Nach viermaligem Methylieren dieses Prod. betrug der Methoxylgehalt 42,5% (gegen 45,5% für ein vollständig methyliertes Prod.) Durch Erhöhung der Alkalikonz. u. der Temp. konnte eine Steigerung dieses Wertes nicht erzielt werden. Es verhält sich also Hydrocellulose mit niedriger Kupferzahl beim Methylieren wie native Gerüstcellulose u. Reservecellulose (Lichenin). Sie ist ebenso in k. W. klar l., u. fällt beim Kochen wieder aus. — Die Acetolyse der Hydrocellulose ist langsamer als die der Baumwolle bei gewöhnlicher Temp., bei 120° (Dauer 1,5 Min.) nahezu gleich. — Vff. nehmen an, daß die Auflösung der Hydrocellulose in NaOH auf einer Peptisation oder B. von Additionsverbb. mit den Alkalihydroxyden beruht. Durch Leitfähigkeitsbest. in 2-n. NaOH war ein Beweis hierfür nicht zu erbringen. Die Leitfähigkeit der Lauge erfährt durch Auflösen von Hydrocellulose eine Verminderung. — Zum Unterschied gegen Oxycellulosen fehlt guten Hydrocellulosen der saure Charakter. (Vgl. SCHWALBE u. BECKER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**, 545; C. **1921**. II. 881.) — Vff. bestätigen die Angaben SCHWALBES u. seiner Mitarbeiter über die Titration von Oxycellulosepräparaten. Die Acidität wird durch die Aciditätszahl ausgedrückt; das ist die Anzahl cem Normallauge, die von 1 g Substanz bei der Titration gebunden werden (Phenolphthalein). Die Isosaccharinbildung, die bei der Kalkkochung der Oxycellulose u. gewisser Hydrocellulosepräparate beobachtet wurde, tritt bei der nativen Cellulose nicht ein. Nach der Dialyse der Lsgg. von Oxycellulose in 10%ig. NaOH bis zur Alkalifreiheit zeigt sich gallertartiges Ausflocken des größten Teiles der Cellulosepräparate in der Dialysierhülle.

Zur Reinigung der *Cellulosexanthogenate* wurden ihre Lsgg. dialysiert. Bei steter Bewegung der Viscoselsg. war sie nach ca. 8 Stdn. farblos u. alkalifrei. Die Analyse ergab, daß auf 2 Reste $C_6H_{10}O_5$ je 2 S u. 2 oder etwas weniger Na treffen. Die Fl. reagiert gegen Phenolphthalein neutral. Die Lsgg. sind wenig haltbar, da die Hydrolyse des Xanthogenats durch die starke Verdünnung bei der Dialyse begünstigt wird. In den dialysierten Lsgg. ist unter dem Ultramikroskop Brownsche Bewegung zu beobachten. Im elektr. Überführungsvers. (220 Volt) zerfällt die Verb. in ihre Bestandteile. An der Anode scheidet sich S-freie Cellulose ab. Mit Metallsalzen geben die Xanthogenlsgg. die bekannten Schwermetallsalzfällungen von zum Teil anderer Färbung. Mit Dimethylsulfat entsteht der *Methylester der Cellulose-Xanthogensäure*; er ist sehr unbeständig. Verss. mit dem Xanthogenat der Reservecellulose fielen analog aus. Nach OTT (S. 1966) stimmen die krystallinen Anteile von Reservecellulose (Lichenin) u. umgefällter Gerüstcellulose (Hydro- u. Hydratcellulose) chem. überein. (Vgl. KARRER, JOOS u. STAUB, Helv. chim. Acta **6**, 800; C. **1923**. III. 1454.)

Versuche. Darst. von *Hydrocellulose* mit H_3PO_4 . Gut zerzupfte Watte in 84%ig. H_3PO_4 während mehrerer Stdn. unter gründlichem Durchrühren bei Zimmertemp. stehen gelassen. Darauf $\frac{1}{2}$ Stde. im W.-Bad auf 35° erwärmt, allmähliche Lsg. Durch Einrühren von Eisstückchen wurde die Cellulose langsam zur Ausfällung gebracht. Nach dem Absaugen mehrere Stdn. mit W. gewaschen. In diesem Zustand in 8%ig. NaOH spielend l., nach dem Trocknen weniger leicht u. nicht vollständig. Zur Trocknung wurde die Phosphorsäure-Hydrocellulose längere Zeit in A., danach in Ä. gelegt; dieser schließlich im Vakuumexsiccator verdampft. Kupferzahl 2,9. — Methylierung der Phosphorsäure-Hydrocellulose. In 20%ig. NaOH unter Rühren gel., dann Dimethylsulfat unter Turbinieren eingetropft, Temp.

unter 25°. Noch NaOH u. Dimethylsulfat zugegeben, bis Lsg. gerade neutral. Zum Sieden erhitzt, ausgefallene Methylcellulose nach Absaugen mit sd. W. gewaschen. Noch 2-mal in gleicher Weise methyliert. Beim 3. Mal Rk.-Gemisch stets schwach alkal. gehalten. Rk.-Dauer 2 Stdn., Temp. um 0°. — Fermentativer Abbau der Phosphorsäure-Hydrocellulose: 0,1 g trockene Phosphorsäure-Hydrocellulose, 1 ccm Phosphatpuffer ($pH = 5,28$) u. 4 ccm Schnekenenzym 18 Tage im Brutschrank aufbewahrt. Nach der Filtration im Filtrat 99,6 mg Glucose, also 89,6% Spaltung. — Best. der Aciditätszahl alkalil. Cellulose: Oxycellulose in 2-n. NaOH gel., + W., mit n. HCl (Phenolphthalein) zurücktitriert. Differenz in ccm, dividiert durch Einwage = Aciditätszahl. — In einer Tabelle geben Vff. einige Verss. zum Nachweis der Inhomogenität der Oxycellulosen wieder. — Red. von Hydro- u. Oxycellulose. Hydrocellulose besitzt nach der Red. mit Na-Amalgam gegen Fehlingsche Lsg. kein Reduktionsvermögen, ist aber vollkommen alkalilöslich; Oxycellulose, in gleicher Weise behandelt, reduziert Fehlingsche Lsg. spurenweise. Ebenfalls vollkommen alkalilöslich. — Dialyse der Viscose. Vol. der Viscoselsg. während der Dialyse (8 Stdn.) ca. auf das Vierfache vermehrt. Ausdialysierte Viscoselsg. klare oder sehr schwach getrübbte, schwer bewegliche Fl. Verss., das Cellulosexanthogenat aus der dialysierten Lsg. durch Konz. derselben im Vakuum u. Ausfällen der Präparate mit A. zu isolieren, führten zu Zersetzungssprod. — Methylester des Cellulosexanthogensäure. Gallerte, Atomverhältnis $S:CH_3 = 0,21:0,12$, ungefähr wie es ein Xanthogensäure-Methylester $R \cdot CSSCH_3$ verlangt. Ll. in 10%ig. NaOH, unl. in organ. Lösungsmm. Langsam zersetzlich. — *Lichenin-xanthogenat* wird in ähnlicher Weise wie das Cellulosexanthogenat hergestellt u. besitzt ähnliche Zus. wie letzteres. (Cellulosechemie 7. 1–6.) BEREND.

R. O. Herzog, *Röntgenspektrographischer Vergleich von Lichenin und Cellulose*. Während sich das Röntgendiagramm von Lichenin von demjenigen der nativen Cellulose deutlich unterscheidet (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 63; C. 1925. I. 1940), weist es zu dem Röntgendiagramm von umgefällter Hydratcellulose bedeutend größere Ähnlichkeit auf, ohne mit ihm ident. zu sein. Danach darf man annehmen, daß Lichenin u. β -Cellulose einander chem. sehr nahestehen u. daß deren krystallisierte Hauptmengen vielleicht nicht ganz einheitlich, in der Hauptsache aber ident. sind. Es wird die Vermutung ausgesprochen, daß die umgefällte Cellulose die Vorstufe der nativen Cellulose darstellt, die sich aus ihr im Organismus bildet. Für die Amorphisierung der Cellulose u. des Lichenins beim Umfällen wird eine bestimmte Vorstellung entwickelt. Der wesentliche Unterschied bei beiden Diagrammen liegt in der Interferenz am nächsten dem Durchstoßpunkt, deren Glanzwinkel bei β -Cellulose zu $6^\circ 4'$, bei Lichenin zu $5^\circ 46'$ gemessen wurde. Die Photometrierung ergibt, daß es sich um eine Doppellinie handelt, die mit dem Auge nicht, wohl aber durch das Photometer aufgelöst wird; ihre Komponenten liegen bei beiden Präparaten innerhalb der Fehlergrenzen von 6–11 Min. an der gleichen Stelle, treten aber mit verschiedener Intensität auf, so daß der Schwerpunkt der Schwärzung beim Lichenin nach innen, bei der β -Cellulose nach außen gelegt wird. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 119–24. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Faserchemie.) GUGGENHEIM.



H. W. Gonell, *Röntgenographische Studien an Chitin*. Das Chitin liefert bei der röntgenoskop. Unters. infolge seiner krystallograph. Struktur Debye-Scherrer-Ringdiagramme, wie von einer ungeordneten Krystallmasse. Isoliert man durch Behandeln mit Glycerin + 25%ig. HCl die einzelnen Schichten des Chitinpanzers voneinander, so erhält man ein schönes Faserdiagramm, ähnlich wie bei Cellulose, das beim Chitin der Käfer am schönsten ausgeprägt war, weniger beim Chitin der Ringelwürmer Käferschnecken, Kopffüßer, Käferpuppen, Schmetterlingsraupen, Krebse. Es bestätigt sich dabei die Erfahrung, daß bei Körperteilen, die eine bevorzugte Wachstumsrichtung aufweisen u. krystalline Substanz enthalten, die Krystallite in der Wachstumsrichtung geordnet sind, wobei der Grad der Ordnung sehr verschieden ist. Von der

untersuchten 13 verschiedenen Chitinarten zeigten nur die Schalen von Nautilus u. die Kiefer des Ringelwurmes Eunice gigantea gewisse Abweichungen. Dagegen besaßen Chitinpräparate aus den Pilzen Cantharellus cibarius (Pfifferling) bezw. Boletus edulis (Steinpilz) die gleichen Diagramme wie die Chitine tier. Herkunft. Die Kante des Elementarkörpers (Identitätsperiode) in der Faserachse ist $c = 10,44 \text{ \AA}$. Bei der Auswertung der Diagramme ergaben sich folgende Anhaltspunkte für die Struktur: Bei hexagonalem Elementarparallelepiped ist die Kante der Basis $a = 21,8 \text{ \AA}$, das Volumen $4280 \text{ \AA}^3$. Der Elementarkörper enthält 18 Acetylglucosaminanhydridmoleküle, von denen je 1, 2, 3, 6 oder alle in einem Krystalliten enthaltenen eine Gruppe bilden können. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 18–30. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Faserstoffchemie.) GUGGENHEIM.


Leonid Andrussow, *Über die katalytische Oxydation von Cyanwasserstoffsäure und Ammoniak. (Ein Vergleich.)* Eine vollständige Analogie zu der katalyt. Oxydation von NH_3 (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 321) findet man bei der Verbrennung der HCN (vgl. HARA u. SINOZAKI, The technology reports of the Tôhoku imp. univ. **5**. 71; C. **1925**. II. 2124). — In einer Figur werden die Versuchsergebnisse der NH_3 - u. HCN-Verbrennung zusammengestellt. — Die HCN-Oxydation wurde noch nicht bei Temp. unter $450\text{--}500^\circ$ verfolgt; die Versuchsergebnisse unter 600° sind infolge Inhomogenität des Gasgemisches ungenau. — Die Oxydations- u. Reduktionsprozesse am Katalysator müssen im wesentlichen in Addition, innerer Umlagerung u. Spaltung bestehen. Zieht man eine Parallele zu den Verbrennungen von HCN u. NH_3 , so kommt man zu folgenden möglichen Rkk.:

I. $\text{NH}_3 + \text{O}_2 = \text{NH}_2\text{O}_2 = \text{HNO} + \text{H}_2\text{O}$ I. $\text{HCN} + \text{O}_2 = \text{HCNO}_2 = \text{HNO} + \text{CO}$.
Das sich in beiden Fällen bildende HNO führt im weiteren Verlauf der Rkk. zu Stick-

oxyden: II. $2 \text{HNO} \xrightleftharpoons{+\text{O}_2} \text{H}_2 + 2 \text{NO}$. — Beide Rkk., I. u. II. sind umkehrbar. — Durch Red. von NO mit H kommt man zum HNO u. dann in Ggw. von H_2O zu NH_3 , in Ggw. von CO zu HCN. — Die B. von NH_3 u. HCN neben N_2 aus NO konnte qualitativ bestätigt werden. — Das Nitroxyl kann nach III in Rkk. eintreten, die zur B. von freiem N führen:



wodurch das Auftreten großer Mengen N bei Temp. unter 600° zu erklären ist; mit steigender Temp. gewinnt die zu Stickoxyden führende Rk. das Übergewicht. Bei Temp. von 550° an u. höher wird bei etwas größeren Verweilzeiten auch eine andere Gruppe von zu N führenden Rkk. bemerkbar, die jedoch einen anderen Zeitverlauf zeigen u. deren Einfluß durch Vergrößerung der Gasströmungsgeschwindigkeiten gering gemacht werden kann. — Die am Pt von 500° an meßbare Rk.:



ist durch den therm. Zerfall des NH_3 u. NO bedingt. Bei den Rkk.:



ist dasselbe Verh. zu erwarten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 458–61.) BUSCH.


John Baldwin Shoesmith und **Robert Henry Slater**, *Herstellung, Hydrolyse und Reduktion von Fluor-, Chlor- und Brombenzylbromiden*. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London **121**. 1392. **125**. 2278; C. **1923**. I. 60. **1925**. I. 484.) Die weiter unten angeführten Benzylbromide verlieren ihr Br in wss.-alkoh. Lsg. als Bromidion mit einer Leichtigkeit, die sich durch folgende Reihe ausdrücken läßt: 1. p-Fluorbenzylbromid > Benzylbromid > o-Fluor > m-Fluorbenzylbromid; 2. Benzylbromid > p-Chlor > o-Chlor > m-Chlorbenzylbromid; 3. Benzylbromid > p-Brom > o-Brom > m-Brom-

benzylbromid. Die Leichtigkeit der Red. mit HJ läßt sich wie folgt zusammenstellen: 1. o-Fluor > m-Fluor > Benzylbromid > p-Fluorbenzylbromid; 2. o-Chlor > p-Chlor > m-Chlor > Benzylbromid; 3. o-Brom > p-Brom > m-Brom > Benzylbromid.

Versuche. Die Chlorverbb. wurden aus dem entsprechenden Chlortoluol durch Chlorieren mit PCl_5 , Verseifen mit 98% HCOOH , Umsetzen des Aldehyds mit KOH u. Bromieren des Alkohols mit HBr in Bzl. hergestellt. *o*-Chlorbenzylbromid, $\text{C}_7\text{H}_6\text{ClBr}$ Kp.₉ 102°; *m*-Chlorbenzylbromid, Kp.₁₀ 109° (aus *m*-Nitrobenzaldehyd). Die Bromverbb. wurden durch Bromieren von Bromtoluolen hergestellt, die Jodverbb. aus den Bromverbb. durch Kochen mit KJ in verd. Aceton. *o*-Brombenzyljodid, $\text{C}_7\text{H}_6\text{BrJ}$, aus PAe., F. 47°. *m*-Brombenzyljodid, F. 42°. *p*-Brombenzyljodid, F. 73°. Zur Herst. der Fluorbenzylbromide wurden die entsprechenden Toluidine bei -5° diazotiert, die Lsg. mit käuflicher HF-Lsg. in einer Kupferretorte mit Kupferkühler unter Kühlung vermischt, dann vorsichtig auf dem Wasserbad 1 Stde. erwärmt, das Reaktionsgemisch mit absteigendem Kupferkühler in ein mit 30% NaOH beschicktes Kupfergefäß dest. u. die Fluortoluole mit Ä. extrahiert. Durch die siedenden Fluortoluole wurde mit Br-Dampf gesätt. Luft hindurchgeleitet u. die Fluorbenzylbromide nach einer eingehend beschriebenen Reinigung im Vakuum fraktioniert. *o*-Fluorbenzylbromid, Kp.₁₅ 84—85°, *m*-Fluorbenzylbromid, Kp.₁₂ 77°, *p*-Fluorbenzylbromid, Kp.₁₅ 85°. Die Hydrolyse in verd. A. wurde durch Titration des freiwerdenden HBr verfolgt, die Red. in Eg. durch HJ bei 101° wie früher (l. c.) bestimmt. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 214—22. Edinburgh, Univ.)

TAUBE.


Harold Ward Dudley und William Veale Thorpe, Eine Synthese von *N*-Methylputrescin und von Putrescin. Bei Einw. von $\text{CH}_3\cdot\text{NH}_2$ auf δ -Brom- oder Jodbutylamin trat stets Ringschluß unter ausschließlicher B. von Pyrrolidin ein. Dagegen liefern die nahezu quantitativ entstehenden Monobenzoylverbb. jener Halogenbutylamine mit Methylamin Monobenzoyl-*N*-methylputrescin, aus dem $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CO}$ durch HCl abgespalten wird. Auf demselben Wege wird unter Verwendung von NH_3 Putrescin erhalten. Hier entsteht aber neben Monobenzoylputrescin auch Di- δ -benzoylaminobutylamin, $\text{NH}[(\text{CH}_2)_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CO}\cdot\text{C}_6\text{H}_5]_2$, aus dem durch Entbenzoylierung Di- δ -aminobutylamin erhalten wurde. — *N*-Methylputrescin wurde ferner auf folgendem Wege synthetisiert, wobei aber die Gewinnung des Nitrils Schwierigkeiten machte:



Versuchsteil. *Phenoxybutylamin.* HCl-Salz, F. 157,5° (korr.). *Pikrat*, F. 159,5° (korr.). — *Benzoyl- δ -brombutylamin*, Krystalle (aus Ä.), F. 52° (korr.). — *Monobenzoyl-N-methylputrescin*, Öl, unl. in W., wl. in Ä., l. in A. u. Chlf. Gibt bei weiterer Benzoylierung das Dibenzoylderiv. HCl-Salz, farblose Nadeln (aus alkoh. Lsg. durch Ä.), F. 150°. — *N-Methylputrescin*, $\text{C}_5\text{H}_{14}\text{N}_2$, farbloses, an Luft rauchendes Öl von piperidinartigem Geruch, Kp. 161—163°, sll. in W., fast unl. in Ä., l. in Chlf. HCl-Salz, $\text{C}_5\text{H}_{14}\text{N}_2\cdot 2\text{HCl}$, hygroskop. Nadeln (aus 95%ig. Ä.), F. 179° (korr.), sll. in W., unl. in A. u. Aceton. *Pikrat*, $\text{C}_5\text{H}_{14}\text{N}_2\cdot 2\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_7\text{N}_3$, Prismen oder Nadeln (aus W.), F. 229—230,5° (korr.; Zers.), fast unl. in A. u. K. W. *Chloraurat* $\text{C}_5\text{H}_{14}\text{N}_2\cdot 2\text{HAuCl}_4\cdot \text{H}_2\text{O}$, tiefgelbe Prismen (aus 1/10-n. HCl), F. 192° (korr.) nach Erweichen, Zers. 215° (korr.). — *Chlorplatinat*, $\text{C}_5\text{H}_{14}\text{N}_2\cdot \text{H}_2\text{PtCl}_6$, rötliche Prismen (aus verd. HCl), Zers. 230,5° (korr.), fällt aus wss. Lsg. durch A. *Pikrolonat*, Nadeln (aus W.), Zers. zwischen 254 u. 265°, swl. in A. *HgCl₂-Verb.*, Krystalle (aus W.), F. 148° (korr.), wl. in A. — *Dibenzoyl-N-methylputrescin*, Nadeln (aus verd. A. oder aus Chlf. durch Ä.), F. 115,5° (korr.), sll. in Chlf. u. A. — *Monobenzoylputrescin*. Aus dem Gemisch der bei Erhitzen von Benzoyl- δ -jodbutylamin mit alkoh. NH_3 auf 100° erhaltenen Basen scheidet

sich nach Lösen in 10%ig. HCl, so daß neutrale Lsg. resultiert, allmählich, schneller in Kältemischung, das Salz des Di- δ -benzoylaminobutylamins ab, aus dem Filtrat hiervon das Salz des Monobenzoylputrescins. Dessen Base ist ein Öl, wl. in W., unl. in Ä., sl. in Chlf. u. A. *HCl-Salz*, $C_{11}H_{17}ON_2Cl$, Nadeln (aus A.), F. 171° (korr.), l. in W. u. A. *Pikrat*, Prismen (aus W.), F. 173° (korr.), wl. in W. u. A. — *Putrescin*, *Dichlorhydrat*, F. 300°. — *Di- δ -benzoylaminobutylamin*, $C_{22}H_{29}O_2N_3$, Nadeln (aus alkoh. Lsg. durch W.), F. 68°, sl. in A. u. Chlf., wl. in W. u. Ä. *HCl-Salz*, $C_{22}H_{30}O_2N_3Cl$, Prismen (aus A.), F. 233° (korr.), wl. in k. W. u. A. *Pikrat*, Nadeln (aus sehr verd. Aceton), F. 121° (korr.), wl. in W. u. A. — *Di- δ -aminobutylamin*, $C_8H_{21}N_3$, an feuchter Luft rauchendes Öl von Geruch wie Putrescin, sl. in W. u. Chlf., mit Dampf nicht flüchtig, durch sd. 25%ig. NaOH nicht angegriffen. *HCl-Salz*, Nadeln (aus verd. A.), bei ca. 290° unter Schwärzung erweichend, sl. in W., unl. in A. *Triplikrat*, $C_8H_{21}N_3 \cdot 3C_6H_5O_7N_3$, nadelähnliche Tafeln (aus W.), F. 255° (korr.; Zers.), wl. in A. *Chloraurat*, Prismen (aus $\frac{1}{10}$ -n. HCl), F. 209° (korr.; Zers.). (Biochemical Journ. 19. 845—49. 1925. Mount Vernon, Nat. Inst. f. med. res.) SPIEGEL.

D. Iwanow, *Über die Darstellung von Phenolen aus Organomagnesiumverbindungen*. Während aliph. Organomagnesiumverbb. bei der Oxydation mit O oder Luft gute Ausbeuten an Alkoholen liefern, sind die Ausbeuten an Phenolen aus aromat. Organomagnesiumverbb. infolge zahlreicher Nebenrkk. nur gering. PORTER u. STEEL (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 2650; C. 1921. I. 491) erhielten aus C_6H_5MgBr bei 0° ca. 23% Phenol u. formulieren die Hauptrk. wie folgt:



Von dem Gedanken ausgehend, daß es darauf ankommt, die B. der Peroxyde zu verhindern oder letztere durch Red.-Mittel zu zersetzen, haben Vff. den Einfluß der verschiedenen Faktoren untersucht. Erniedrigung der Temp. erwies sich als günstig, bei -20° waren die Ausbeuten um ca. 6% höher als bei PORTER u. STEEL. Noch tiefere Temp., ferner Erhöhung der Konz. u. Oxydationsgeschwindigkeit waren ohne Einfluß. Ersatz des Ä. durch Bzl. erhöhte die Ausbeuten um einige %. — Die Zahl der brauchbaren Red.-Mittel erwies sich als recht beschränkt. Am besten haben sich aliph. Organomagnesiumverbb. (1 Mol. auf 1 Mol. der aromat.) bewährt, u. zwar um so besser, je höher ihr Mol.-Gew. ist. Bei Anwendung von $i-C_5H_{11}MgBr$ u. -20° n. Ä. waren die Ausbeuten ca. 20% höher als ohne dasselbe. Erhöhung der Menge der aliph. Organomagnesiumverb. war ohne nennenswerten Einfluß. Bemerkenswert, daß nur Chloride u. Bromide, nicht jedoch Jodide wirksam sind. — Zur Aufklärung des Rk.-Mechanismus wurden die bei der Oxydation der verschiedenen Organomagnesiumverbb. entwickelten Wärmemengen bestimmt. Sie betrugen in cal. pro Mol. C_6H_5MgBr ca. 60000, $C_6H_5 \cdot CH_2MgCl$ 66500, $n-C_3H_7MgBr$ 77000, C_2H_5MgBr 92500. Da die Hauptrk. zweifellos obigem Schema entspricht, so ist klar, daß die Affinität der aliph. Organomagnesiumverbb. zum O größer ist als die der aromat. Zuerst bildet sich daher das aliph. Peroxyd, das teilweise vom aromat. $RMgX$ reduziert wird. Da man aber sehr wahrscheinlich den aliph. Organomagnesiumverbb. auch die größere reduzierende Wrkg. zuschreiben muß, so wird ein Teil des aliph. Peroxyds vom aliph. $RMgX$ reduziert werden, u. zwar ein um so größerer, je größer die Affinität des letzteren zum O, d. h. je kleiner sein Mol.-Gew. ist. Daher sind die Ausbeuten an Phenolen bei Anwendung höher molekularer aliph. Organomagnesiumverbb. höher. — Die Menge des gebildeten Phenols ist dem absorbierten O-Vol. nicht proportional, sondern für kleinere O-Voll. größer. Das kommt daher, daß im Anfang die Konz. des reduzierenden C_6H_5MgBr hoch ist u. die Rk. n. nach obigem Schema verläuft, während später die Nebenrkk. einsetzen. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 7—55. Sofia, Univ.)

LINDENBAUM.

Henry Gilman und **J. Merriam Peterson**, *Die elektronische Deutung der Äthylenbindung*. Um die Art der Äthylen Doppelbindung zu untersuchen, haben Vff. verschiedene Äthylenverbb. auf Äthylmagnesiumbromid, ferner *1,1-Diphenyläthylen* auf *Butoxymagnesiumjodid*, $n. C_4H_9OMgJ$, *p-Tolylmercaptanmagnesiumjodid*, $CH_3C_6H_4SMgJ$, *Methylanilinmagnesiumbromid*, $C_6H_5N(CH_3)MgBr$ u. *Äthylzinkjodid* einwirken lassen. Dabei fand keine Addition statt. Deswegen nehmen Vff. an, daß die Äthylenbindung entweder nicht akt. oder polar ist oder daß sie zu wenig akt. ist, um Verbb. vom Typ $RMgX$ zu addieren. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 423—29. Ames, Iowa State Coll.)

WINKELMANN.



J. V. Supniewski und **Roger Adams**, *Organische Wismutverbindungen*. I. Darstellung von *Tricarboxytriphenylwismutdichloriden* und einigen *Nitrotriaryl-wismutverbindungen*. Triaryl-wismutverbb. wurden dargestellt, indem man zu 3 Moll. eines aromat. Halogenids u. 3,3 Moll. Mg in Ä. eine Lsg. von 1 Mol. $BiCl_3$ langsam hinzugab. Die Ausbeute betrug meist 30—65%, beim *Tri-p-anisylwismut* jedoch nur 10%. Neu war *Tri-o-anisylwismut*, $(o-CH_3OC_6H_4)_3Bi$, aus CHl_3 , F. 169—170°. — Triaryl-wismutdihalogenide wurden aus den in CCl_4 gel. Triaryl-wismutverbb. durch Einw. von Halogen (Cl u. Br) bei niedriger Temp. erhalten. *Tri-m-tolyl-wismutdichlorid*, $(m-CH_3C_6H_4)_3BiCl_2$, aus Aceton, F. 132—133°. *Tri-m-tolylwismutdibromid*, $(m-CH_3C_6H_4)_3BiBr_2$, F. 52°, zersetzte sich schnell an der Luft. *Triphenylwismutdiacetat*, F. 152—153°, *Tri-p-tolylwismutdiacetat*, F. 162°, u. *Tri-m-tolylwismutdiacetat*, F. 148—149°, gingen beim Erhitzen mit HCl in die entsprechenden Chloride über. — *Tri-o-carboxytriphenylwismutdichlorid*, $(o-HO_2CC_6H_4)_3BiCl_2$, aus *Tri-o-tolylwismutdichlorid* durch Oxydation mit Chromsäure in Eg.-Lsg. bei 68—70° in 15%ig. Ausbeute, F. 157—159°. *Tri-p-carboxytriphenylwismutdichlorid*, $(p-HO_2CC_6H_4)_3BiCl_2$, aus *Tri-p-tolylwismutdichlorid* durch Oxydation mit Chromsäure oder mit 2,5%ig. $KMnO_4$ -Lsg. unter 20°. F. 130°. *Tri-p-carbomethoxytriphenylwismutdichlorid*, $(p-CH_3O_2CC_6H_4)_3BiCl_2$, aus der Säure u. in der Kälte mit HCl gesätt. Methylalkohol. F. 103°. — Triaryl-wismutdinitrate wurden durch Behandlung der entsprechenden Dihalogenide in Aceton mit $AgNO_3$ in 50%ig. Alkohol dargestellt. Es sind farblose Verbb. u. sie lassen sich leicht aus Aceton reinigen. *Tri-m-tolylwismutdinitrat* u. *Tri-p-carbomethoxytriphenylwismutdinitrat* explodierten heftig bei 150—160° u. konnten daher nicht analysiert werden. *Trinitrotriphenylwismutdinitrat*, $(p-NO_2C_6H_4)_3Bi(NO_3)_2$, aus Triphenylwismutdinitrat u. rauchender HNO_3 bei 0°, zersetzte sich bei 147°. *Trinitrotriphenylwismutdichlorid*, $(p-NO_2C_6H_4)_3BiCl_2$, aus dem Dinitrat durch Erhitzen mit konz. HCl. F. 132—134°. *Trinitrotri-p-tolylwismutdinitrat*, $[NO_2(CH_3)C_6H_4]_3Bi(NO_3)_2$, aus *Tri-p-tolylwismutdinitrat* u. rauchender HNO_3 bei Zimmertemp., aus Aceton, Zers. bei etwa 160°. *Trinitrotri-p-tolylwismutdichlorid*, $[NO_2(CH_3)C_6H_4]_3BiCl_2$, aus Aceton, F. 156°. *Trinitrotri-o-tolylwismutdichlorid*, $[NO_2(CH_3)C_6H_4]_3BiCl_2$, F. 149 bis 150°, sehr unbeständig. *Trinitrotri-p-carbomethoxytriphenylwismutdinitrat*, $[NO_2(CH_3)O_2CC_6H_4]_3Bi(NO_3)_2$, explodierte bei 150—160°. *Trinitrotri-p-carbomethoxytriphenylwismutdichlorid*, $[NO_2(CH_3)O_2CC_6H_4]_3BiCl_2$, aus dem Dinitrat durch Kochen mit 10%ig. HCl. F. 250—260° (Zers.). — Die Red. von Triaryl-wismutdihalogeniden zu Triaryl-wismutverbb. ließ sich am besten in Aceton, bei 0° mit Natriumhydrosulfit in konz. wss. Lsg. ausführen. *Trinitrotriphenylwismut*, $(p-NO_2C_6H_4)_3Bi$, F. 121°, zersetzte sich beim Stehen. *Trinitrotri-p-tolylwismut*, $[NO_2(CH_3)C_6H_4]_3Bi$, F. 126°. — Durch Sulfurierung von *Tri-o-tolylwismutdichlorid* mit 98%ig. H_2SO_4 wurde eine Verb. erhalten, die bei 154° schmolz u. sich nach einigen Tagen zersetzte. — Versuche, aus *o-Brombenzylmethyläther*, Kp.₇₄₅ 225°, u. *p-Brombenzylmethyläther*, Kp.₇₅₀ 201°, die Grignardschen Verbb. herzustellen, um daraus die entsprechenden Triaryl-wismutverbb. zu gewinnen, waren erfolglos. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 507—17. Urbana, Illinois, Univ.)

WINKELMANN.

N. Kishner und **G. Wendelstein**, *Über die hydrolytische Zersetzung der Sulfonsäuren isomerer Xylole unter besonderer Berücksichtigung der Reinigung des technischen Xylole*. Die Zus. eines Gemisches von *m*- u. *p*-Xylol kann aus seinem F. ermittelt werden; das reine *p*-Xylol schm. bei 13,5°, ein Gemisch aus 75% *p*- u. 25% *m*-Xylol bei 2,5°, ein Gemisch aus je 50% *m*- u. *p*-Xylol bei -12°. Äthylbenzol erniedrigt den F. des *p*-Xylole um den gleichen Betrag, wie das *m*-Xylol. — Zur Isolierung der Xylole aus ihrem Gemisch kann man sich der verschiedenen Haltbarkeit ihrer Sulfonsäuren bedienen. Man löst Xylol in 1,2 Vol. H_2SO_4 (D. 1,84) auf dem Wasserbad (weil *p*-Xylol in der Kälte sich zu langsam löst), versetzt mit 1,1 Vol. W. u. erhitzt. 1. Am Rückflußkühler. Bei 135° zerfällt die Sulfosäure aus dem *m*-Xylol in 30 Min. zu 12%, in 90 Min. zu 98%, die aus dem *p*-Xylol in 1 Stde. zu 6%, in 12 Stdn. zu 100%. 2. Bei Dest. zwischen 130—150° geht 78%, zwischen 150—180° noch 18% *m*-Xylol über; vom *p*-Xylol wird abdestilliert 5% bis 160°, 42% zwischen 160—180°, 20% zwischen 180 u. 210°. — Die Sulfosäure aus *o*-Xylol gleicht in ihrer Beständigkeit der aus *p*-Xylol. — Äthylbenzol löst sich nur in rauchender H_2SO_4 , die entstandene Sulfosäure zers. sich mit W. bis 160° nur zu 5%, bis 200° zu 50%. — Ein Gemisch aus 75% *m*- u. 25% *p*-Xylol mit H_2SO_4 (D. 1,84) u. W. wie oben behandelt, gab bei Dest. eine Fraktion (65,3% des Gemisches, 125—150°) mit nur 8,5% *p*-Xylol, während die bei 180—210° entstandene Fraktion 78% *p*-Xylol enthielt. In anderen Vers. glückte die Trennung noch vollständiger. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 1—12. 1925. Trust „Anil-savody“.)

BIKERMAN.

P. J. van Ryn, *Die Einwirkung von Natriumäthylat auf symmetrisches Trichlor-dinitro- und -trinitrobenzol und von Hydroxylamin auf symmetrisches Trinitrotrimethoxy(phenoxy)benzol*. Nach BORSCHKE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 1494. 1939. C. **1923**. III. 550. 1313) werden OCH_3 , OC_2H_5 , OC_6H_5 in arom. Verb. durch NH_2OH u. durch darauffolgende Oxydation der NHOH -Gruppe mit konz. HNO_3 durch die Nitrogruppe ersetzt. Das Ziel der Arbeit war die Darst. des Penta- u. Hexanitrobenzols. — 1,3,5-Trichlor-2,4,6-trinitrobenzol, $\text{C}_6\text{Cl}_3(\text{NO}_2)_3$, F. 184°, wurde nach der Vorschrift von JACKSON (Amer. Chem. Journ. **18**. 667 [1896]) nur in sehr geringer Ausbeute erhalten. Bei der Einw. von NaOCH_3 (2 Moll.) auf 1,3,5-Trichlor-2,4-dinitrobenzol (1 Mol.) in benzol-methylalkoh. Lsg. entstehen zwei isomere Monochlordinitrodimethoxybenzole, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_6\text{N}_2\text{Cl}$ vom F. 218° (I) u. 102° (II), daneben noch 1,3,5-Trichlor-2-nitro-4-methoxybenzol, F. 45,5° (HUGOUNENQ, Ann. Chim. et Phys. [6] **20**. 526 [1890] fand 48,5°). I gibt beim Erhitzen mit Anilin ein 4,6-Dinitro-5-anilido-1,3-dimethoxybenzol vom F. 189°, das BLANKSMA (Rec. trav. chim. Pays-Bas **27**. 253; C. **1908**. II. 1923) auf andere Weise dargestellt hat. Hieraus schließt Vf. auf die Richtigkeit der Formeln





I u. II. — 1-Chlor-2,4,6-trinitro-3,5-dimethoxybenzol, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_6\text{N}_3\text{Cl}$ (III) aus I oder II durch (24 Stdn.). Einw. von k. HNO_3 (D. 1,52). Schuppen aus A., F. 85° (vgl.

SCHLUBACH, S. 1403). — 1,3,5-Trimethoxy-2,4,6-trinitrobenzol, $\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_9\text{N}_3$ (IV) aus III mit NaOCH_3 in Bzl. Krystalle aus CH_3OH , F. 75°. Beim Kochen (2½ Stdn.) einer absol.-alkoh. Lsg. von IV (1 Mol.) mit 3,5 Moll. $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ u. der entsprechenden Menge NaOC_2H_5 entsteht hauptsächlich 1,3,5-Triäthoxy-2,4,6-trinitrobenzol (V), F. 118° (JACKSON, Amer. Chem. Journ. **15**. 612 [1893]; **32**. 173 [1904] fand 119°) u. in geringer Menge Trinitrodioxaminoäthoxybenzol, $\text{C}_6(\text{NO}_2)_3(\text{NHOH})_2 \cdot \text{OC}_2\text{H}_5$, F. gegen 200°. — 1,3,5-Tribrom-2,4,6-trinitrobenzol nach JACKSON (Amer. Chem. Journ. **10**. 284 [1888] **12**. 9 [1890]), dabei entsteht noch eine Verb. von F. 224°, die 1,3-Dinitro-2,4,5,6-tetrabrombenzol, $\text{C}_6(\text{NO}_2)_2\text{Br}_4$, F. 228°, zu sein scheint. 1,3,5-Triphenoxy-2,4,6-trinitrobenzol, $\text{C}_{24}\text{H}_{15}\text{O}_9\text{N}_3$ (VII). Aus V mit Phenolnatrium in Bzl., Krystalle aus Bzl., F. 181° (JACKSON fand 175°, Amer. Chem. Journ. **13**. 189 [1891]). Gibt beim Stehen

mit NaOC_2H_5 Verb. V. Einw. von NH_2OH auf VII gab neben unverändertem Ausgangsmaterial ein Phenol enthaltendes Harz. Auch IV gab mit NH_2OH kein faßbares Prod. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 257—66. Leiden, Univ.) BRAUNS.

Herbert Henry Hodgson und **Francis Harry Moore**, *Die Nitrierung des m-Bromphenols*. (Vgl. S. 903.) Vf. dehnt die Nitrierungsverss. am m-Chlorphenol (Journ. Chem. Soc. London 127. 1599; C. 1925. II. 1845) nunmehr auch auf das m-Bromphenol aus. m-Bromphenol liefert mit NaNO_3 u. konz. H_2SO_4 nitriert 3-Brom-6-nitrophenol, aus PAe., F. 42° , Methyläther, F. $85,5^\circ$, Benzoat, F. 104° . Analog 3-Brom-4-nitrophenol, aus PAe., F. 131° , Methyläther, F. 45° , Benzoat, F. 102° . Die Nitrierung mit HNO_3 u. Oleum gibt 3-Brom-2-nitrophenol, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_3\text{NBr}$, aus PAe. gelbe Nadeln vom F. 65 — 67° . (Die gelben Nadeln stellen die wasserfreie Verb. dar, daneben ist noch eine wasserhaltige, farblose Form beständig, aus PAe., F. 33° .) Methyläther, $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3\text{NBr}$, aus verd. A., F. 73° , Benzoat, aus A., F. 133° , Na-Salz. Bei der Nachprüfung des früher (l. c.) beschriebenen 3-Chlor-2-nitrophenols zeigten sich ebenfalls zwei Formen u. zwar die gelbe, wasserfreie Form vom F. 45 — 47° u. die farblose wasserhaltige Form, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_3\text{NCl}\cdot\text{H}_2\text{O}$ aus PAe., F. $37,5$ — 38° . Die heftigere Nitrierung des m-Bromphenols liefert 3-Brom-4,6-dinitrophenol, $\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_5\text{N}_2\text{Br}$, aus PAe., F. 92° , Ag-Salz in zwei gelben u. einer roten Modifikation. Ferner 3-Brom-2,6-dinitrophenol, $\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_5\text{N}_2\text{Br}$, aus PAe., F. 131° , Ag-Salz; 3-Brom-2,4-dinitrophenol, $\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_5\text{N}_2\text{Br}$, aus W., F. 175° , Ag-Salz. 3-Brom-2,4- u. -2,6-dinitrophenol liefern mit wss. NaOH 2,4-Dinitroresorcin vom F. 146° , mit NH_3 im Rohr eine Verb. $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_4\text{N}_4$ vom F. 258° , wahrscheinlich entweder 2,4- oder 4,6-Dinitro-m-phenylendiamin. Die heftige Nitrierung des m-Bromphenols liefert 3-Brom-2,4,6-trinitrophenol, aus W., F. 149° , Ag-Salz. Ferner 3-Brom-2,5,6-trinitrophenol, $\text{C}_6\text{H}_2\text{O}_7\text{N}_3\text{Br}$, aus W., F. 146° , Ag-Salz u. 3-Brom-2,5,6-trinitrophenolkalium-4-sulfonsaures-K, $\text{C}_6\text{Br}(\text{OK})(\text{NO}_2)_3\cdot\text{SO}_3\text{K}$, aus A. gelbe Krystalle, welche beim Erhitzen explodieren. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 155—61. Huddersfield, Techn. Coll.) TAUBE.

Walter M. Lauer, *Die Konstitution des Tribromphenoltbromids und verwandter Verbindungen*. Dem Tribromphenoltbromid wurde von BENEDIKT (LIEBIGS Ann. 199.



127 [1879]) die Konst. I, von THIELE u. EICHWEDE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 673 [1900]) die Konst. II gegeben. — Die vom Vf. angestellten Verss. ergaben nun, daß Formel II für das bei Einw. von Br_2 auf Tribromphenol entstehende Prod. unwahr-

scheinlich ist, daß aber ganz entfernt die Möglichkeit besteht, es als ein Gemisch einer o- u. p-chinoiden Form anzusehen. Formel I erklärt die angeführten Tatsachen, wenn man eine partielle Umlagerung von Trihalogenphenolchloriden, welche Br in p-Stellung erhalten, zu den isomeren Trihalogenphenoltbromiden annimmt.

Experimentelles: Verb. $\text{C}_6\text{H}_2\text{BrCl}_3\text{O}$. B. 4-Brom-2,6-dichlorphenol (nach HUNTER u. JOYCE, Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 2644; C. 1918. II. 187, aus p-Bromphenol dargestellt) wurde mit Chlor behandelt u. das entstehende Prod. in h. Chlf. aufgenommen. Beim teilweisen Verdunsten des Chlf. blieb eine gelbe, krystallin. M. zurück, die sich bei 114° unter Entw. von Br_2 zersetzte. — Verb. $\text{C}_6\text{H}_2\text{ClBr}_3\text{O}$. B. analog der soeben beschriebenen durch Einw. von Brom auf p-Chlordibromphenol (welches nach HUNTER u. JOYCE bereitet wurde). Gelbe Krystalle. Bei etwa 115° Zers. unter Br-Entw. — Bei Einw. von Chlor auf Tribromphenol entstand ebenfalls eine Verb. $\text{C}_6\text{H}_2\text{ClBr}_3\text{O}$, welche sich beim langsamen Erhitzen bei 131° unter Br-Entw. zersetzte. — Die tetrahalogenierten Phenole gaben beim Erhitzen mit A. Halogen ab, u. zwar:

Verb. $\text{C}_6\text{H}_2\text{ClBr}_3\text{O}$ (aus p-Chlordibromphenol)	96 %	Br u.	4 %	Cl
„ $\text{C}_6\text{H}_2\text{ClBr}_3\text{O}$ („ Tribromphenol)	43,5 %	„ „	56,5 %	„



Verb. $C_6H_2Cl_3BrO$ (aus Trichlorphenol) 96% Br u. 4 % Cl
 „ $C_6H_2Cl_3BrO$ („ p-Bromdichlorphenol) 40% „ „ 60 % „
 (Journ. Americ. Chem. Soc. 48, 442—51. Minneapolis [Minn.], Univ.) WINKELMANN.

Pierre Nicolle, Über einige acyclische trisubstituierte α -Glykole. Vf. hat festgestellt, daß *Hexyldimethylglykol*, $C_6H_{13} \cdot CH(OH) \cdot C(OH)(CH_3)_2$, u. *Hexyldiphenylglykol*, $C_6H_{13} \cdot CH(OH) \cdot C(OH)(C_6H_5)_2$, ohne Umlagerung zu *Hexyl-i-propylketon*, $C_6H_{13} \cdot CO \cdot CH(CH_3)_2$, u. *Hexylbenzhydrylketon*, $C_6H_{13} \cdot CO \cdot CH(C_6H_5)_2$, dehydratisiert werden. Das entspricht den Erfahrungen von TIFFENEAU u. Mitarbeitern, nach denen für das Zustandekommen einer Umlagerung bei der Dehydratisierung trisubstituierter α -Glykole die Ggw. von mindestens einem Aryl erforderlich ist, welches sich außerdem an demselben C-Atom befinden muß wie das H-Atom. Ein acycl. Radikal mit 6 C-Atomen ist dem C_6H_5 in dieser Hinsicht nicht gleichwertig. — Vom *Hexyläthylbutylglykol*, $C_6H_{13} \cdot CH(OH) \cdot C(OH)(C_2H_5)(C_4H_9)$, wurden nach dem Verf. von TIFFENEAU u. LÉVY (C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1724; C. 1924. II. 647) beide stereoisomere Formen dargestellt, wie übrigens l. c. schon kurz erwähnt. — Eine größere Anzahl acycl. trisubstituierter Glykole wurde zwecks Unters. ihrer hypnot. Eigenschaften dargestellt. Über letztere hat Vf. bereits berichtet (vgl. Bull. Sciences Pharmacol. 31. 433; C. 1924. II. 2349). Die hypnot. Wrkg. ist danach nicht an die Ggw. eines cycl. Radikals gebunden.

Versuche. *Propyldiäthylglykol* oder 3-Äthylheptandiol-(3,4), $C_9H_{17} \cdot CH(OH) \cdot C(OH)(C_2H_5)_2$. Man bereitet aus Butyraldehydbisulfid u. KCN in wenig W. α -Oxy-pentansäurenitril, sättigt die absol. alkoh. Lsg. desselben bei 0° mit HCl, gießt auf Eis u. äthert aus. Der erhaltene α -Oxypentansäureäthylester wird mit C_2H_5MgBr umgesetzt. Nadeln aus PAe., F. 45—46°, ll. in W., A., zl. in PAe., von etwas bitterem Geschmack. — *i-Propyldimethylglykol* oder 2,4-Dimethylpentandiol-(2,3), $(CH_3)_2CH \cdot CH(OH) \cdot C(OH)(CH_3)_2$. Aus α -Oxy-i-valeriansäureäthylester (Kp.₇₆₀ 170°, aus i-Butyraldehyd wie oben) u. CH_3MgJ . Nadeln aus PAe., F. 59°, ll. in W., A., PAe. — *i-Propyldiäthylglykol* oder 3-Äthyl-5-methylhexandiol-(3,4), $C_9H_{20}O_2$. Mit C_2H_5MgBr . Nadeln aus PAe., F. 76°, wl. in k. W., ll. in A., Ä., PAe. — *i-Butyldimethylglykol* oder 2,5-Dimethylhexandiol-(2,3), $(CH_3)_2CH \cdot CH_2 \cdot CH(OH) \cdot C(OH)(CH_3)_2$. Aus i-Butylglykolsäureäthylester (Kp. 180—185°, aus i-Valeraldehyd) u. CH_3MgJ . Angenehm riechendes Öl, Kp.₂₀ 100—105°, D. 0,925, wl. in W., l. in A., PAe. — *i-Butyldiäthylglykol* oder 3-Äthyl-6-methylheptandiol-(3,4), $C_{10}H_{22}O_2$. Mit C_2H_5MgBr . Nadeln, F. 75—76°, wl. in W., ll. in A., zl. in PAe., Olivenöl. — *i-Butyldipropylglykol* oder 4-Propyl-7-methyloctandiol-(4,5), $C_{12}H_{26}O_2$. Mit C_3H_7MgBr . Aus PAe., F. 59—60°, swl. in W. — *i-Butylglykolsäureamid*, $C_6H_{13}O_2N$. Aus obigem Ester mit konz. NH_4OH . Aus Bzn., F. 51—52°, ll. in A., wl. in PAe. — Die folgenden Glykole der Formel $C_6H_{13} \cdot CH(OH) \cdot C(OH)R_2$ werden aus Hexylglykolsäureäthylester (Kp.₇₆₀ 230—235°, aus Önanthol) u. $RMgX$ dargestellt. — *Hexyldimethylglykol* oder 2-Methylnonandiol-(2,3), $C_{10}H_{22}O_2$. Enthalten in den Fraktionen Kp.₂₁ 115—125°, 125—139°, von angenehmem, stechendem Geruch. D.⁰ 0,9375, wl. in W. Wird von k. konz. H_2SO_4 übergeführt in *Hexyl-i-propylketon*, $C_{10}H_{20}O$, Kp. 200—202°, D.⁰ 0,843. Letzteres wurde zum Vergleich wie folgt synthetisiert: Önantholoxim (F. 51°) wird mit sd. Acetanhydrid (5 Stdn.) zu Heptansäurenitril (kümmlertartig riechende Fl., Kp. 175—180°) dehydratisiert u. dieses mit $i-C_3H_7MgBr$ umgesetzt. Das Keton gibt kein Oxim oder Semicarbazon. — *Hexyldiäthylglykol* oder 3-Äthyldecandiol-(3,4), $C_{12}H_{26}O_2$, aus PAe., F. 45—46°, swl. in W., zl. in Olivenöl. — *Hexyldipropylglykol* oder 4-Propylundecandiol-(4,5), $C_{14}H_{30}O_2$, aus PAe., F. 57—58°, ll. in A., zl. in PAe., Olivenöl, swl. in W. — *Hexyldibutylglykol* oder 5-Butyldodecandiol-(5,6), $C_{16}H_{34}O_2$, aus PAe., F. 73—74°, fast unl. in W., zl. in Olivenöl. — *Hexyldiphenylglykol* oder 1,1-Diphenyloctandiol-(1,2), $C_{26}H_{26}O_2$, aus A., F. 102—103°, unl. in W., wl. in PAe., zl. in A., l. in Bzl. Wird von k. konz. H_2SO_4 übergeführt in *Hexylbenzhydrylketon*, $C_{20}H_{24}O$, nach Reinigung über das Semicarbazon (Nadeln

aus A., F. 121°) Kp.₂₀ 225—230°, D.⁰ 1,022; lieferte bei der Oxydation mit CrO₃ in Essigsäure Benzophenon. — Als Ausgangsmaterial für die folgenden Glykole der Formel C₆H₁₃·CH(OH)·C(OH)RR' dient das Hexylglykolsäureamid, C₆H₁₃·CH(OH)·CONH₂, das mit 70% Ausbeute durch Einleiten von HCl-Gas in die äth. Lsg. von Önantholcyanhydrin erhalten wird. Es liefert mit RMgX die Ketonalkohole C₆H₁₃·CH(OH)·CO·R, die mit R'MgX umgesetzt werden. Die Ausbeuten sind hier besser als in der Phenylreihe (vgl. TIFFENEAU u. LÉVY, S. 905). — *Hexylacetylcarbinol* oder *Nonanol-(3)-on-(2)*, C₆H₁₈O₂. Aus dem Amid u. CH₃MgJ. Gelbliche Fl., Kp.₃₁ 128 bis 130°, D.⁰ 0,9513. Reduziert (wie alle folgenden Ketonalkohole) Fehlingsche Lsg. *Semicarbazon*, F. 184°. — *Hexylpropionylcarbinol* oder *Decanol-(4)-on-(3)*, C₁₀H₂₀O₂. Mit C₂H₅MgJ. Kp.₂₁ 126—131°, D.⁰ 0,9349. *Semicarbazon*, F. 121°. — *Hexylmethyläthylglykol* oder *3-Methyldecandiol-(3,4)*, C₁₁H₂₄O₂. Aus Hexylacetylcarbinol u. C₂H₅MgBr oder aus Hexylpropionylcarbinol u. CH₃MgJ. Öl, Kp.₁₉ 126—142°, D.⁰ 0,939. — *Hexylbutyrylcarbinol* oder *Undecanol-(5)-on-(4)*, C₁₁H₂₂O₂. Aus dem Amid u. C₃H₇MgBr. Gelbe Fl. von brennendem Geschmack, Kp.₁₈ 134—136°, D.⁰ 0,9243. *Semicarbazon*, aus A., F. 258—260° (Zers.) bei schnellem Erhitzen. — *Hexylmethylpropylglykol* oder *4-Methylundecandiol-(4,5)*, C₁₂H₂₆O₂. Aus dem vorigen u. CH₃MgJ. Dicke Fl., Kp.₁₈ 150°, D. 0,9355. — *Hexylbenzoylcarbinol* oder *1-Phenyl-octanol-(2)-on-(1)*, C₁₄H₂₀O₂. Aus dem Amid u. C₆H₅MgBr. Kp.₃₆ 200°. — *Hexylmethylphenylglykol* oder *2-Phenyl-nonandiol-(2,3)*, C₁₅H₂₄O₂. Aus dem vorigen u. CH₃MgJ. Kp.₁₆ 160—180°. — *Hexylvalerylcarbinol* oder *Dodecanol-(6)-on-(5)*, C₁₂H₂₄O₂. Aus dem Amid u. C₄H₉MgBr. Gelbe Fl., Kp.₁₉ 145 bis 146°, D.¹⁵ 0,904. *Semicarbazon*, F. 270°. — *Hexyläthylbutylglykol* oder *5-Äthyl-dodecandiol-(5,6)*, C₁₄H₃₀O₂. *α-Form*: Aus Hexylpropionylcarbinol u. C₄H₉MgBr. Aus PAe., F. 61°, ll. in A., zl. in Olivenöl, wl. in PAe., swl. in W. *β-Form*: Aus dem vorigen u. C₂H₅MgJ. Aus PAe., F. 46—47° [nicht 106°, wie bei TIFFENEAU u. LÉVY (l. c.) angegeben]. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 55—67. Paris, Hôpital Boucicaud.) LB.

Jeanne Lévy, *Semipinakolinumlagerung*. Über die Notwendigkeit der Gegenwart des Phenylradikals für die molekularen Umlagerungen. II. (I. vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] **33**. 1655; C. 1924. I. 2682.) Aus den bisherigen Unterss. geht hervor, daß *trisubstituierte α-Glykole* in folgenden Fällen ohne Umlagerung dehydratisiert werden: 1. Glykole vom Typus I., wenn R' = Alkyl, R = CH₃, C₆H₅·CH₂ (1. Mitt.) oder C₆H₁₃ (NICOLLE, vorst. Ref.); wenn R' = C₆H₅, R = CH₃ (STÖRMER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **39**. 2302 [1906]), i-C₄H₉ (TIFFENEAU, C. r. d. l'Acad. des sciences **143**. 127 [1906]), C₆H₁₃ (vorst. Ref.), C₆H₅·CH₂ (1. Mitt.). 2. Glykole vom Typus II., wenn R = Alkyl (TIFFENEAU u. LÉVY, Bull. Soc. Chim. de France [4] **33**. 742; C. 1924. I. 2246). Um den Ursachen dieses Verh. näher zu kommen, hat Vf. einige Glykole untersucht, deren Radikale sehr verschiedene Affinitätsgehalte aufweisen. Es wurden gewählt: CH₃ u. C₆H₅ mit starker, C₆H₅·CH₂ u. (C₆H₅)₂CH mit schwacher Affinität. Es ergab sich jedoch, daß die Glykole III., IV. u. V. sowohl von konz. als verd. H₂SO₄ ohne Umlagerung dehydratisiert werden, während z. B. das III. analoge Phenyldibenzylglykol Umlagerung erleidet (ORÉCHOW, Bull. Soc. Chim. de France [4] **25**. 113; C. 1919. III. 259). Hieraus folgt von neuem, daß die Ggw. eines an der Gruppe CH(OH) haftenden C₆H₅ für das Zustandekommen einer Umlagerung unbedingt notwendig ist.



Versuche. *Methyldibenzylglykol* oder *1-Phenyl-2-benzylbutandiol-(2,3)* (III.). Aus Milchsäureäthylester u. Benzyl-MgCl. Rohprod. mit Dampf dest. Kp.₃₄ 241 bis 243°, sehr viscose, beim Abkühlen erstarrende M., F. 34—35°. — *1-Phenyl-2-benzylbutanon-(3)*, CH₃·CO·CH(CH₂·C₆H₅)₂. Aus III. mit sd. 50%/ig. H₂SO₄ (6 Stdn.).


Kp.₂₀ 200—205°. *Semicarbazon*, aus A., F. 154—155°. Das Keton wurde zum Vergleich wie folgt synthetisiert: *1-Phenyl-2-benzylbutanol*-(3). Aus Dibenzylacetaldehyd (Kp. 200—210°) u. CH_3MgJ . Kp.₂₅ 215—220°. Wird von CrO_3 in sd. Essigsäure zu obigem Keton oxydiert. — *Benzhydryldimethylglykol* oder *3-Methyl-1,1-diphenylbutandiol*-(2,3) (IV.). Man behandelt Benzhydrylglykolsäurenitril in absol. A. mit HCl -Gas, zerlegt mit W. u. setzt den Benzhydrylglykolsäureester (F. 66°) mit CH_3MgJ um. Rohprod. mit alkoh. KOH kochen. Sehr viscose Fl., Kp.₃₇ 235—236°. — *3-Methyl-1,1-diphenylbutanon*-(2), $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}(\text{CH}_3)_2$. Aus IV. mit k. konz. H_2SO_4 . Aus PAe., F. 76—77° (vgl. TIFFENEAU u. ORÉCHOW, Bull. Soc. Chim. de France [4] **33**. 195; C. **1923**. III. 1015). — *Benzhydryldiphenylglykol* oder *1,1,3,3-Tetraphenylpropan-diol*-(1,2) (V.). Aus Benzhydrylglykolsäureester u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Aus A., F. 110—111°. — *Tetraphenylacetone*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CH}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$. Aus V. mit konz. H_2SO_4 bei 0° oder sd. 50%ig. H_2SO_4 . Aus Eg., F. 135—136°. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 67—72. Paris, Fac. des Sciences.)

LINDENBAUM.

V. Grignard und F. Chambret, *Über die Ketonspaltung der tertiären Alkohole*. Veranlaßt durch die Beobachtungen, daß die aus Methylheptonen u. RMgX dargestellten tertiären Alkohole bei der Dest. unter at-Druck wieder in KW-stoff u. genanntes Keton zerfallen (vgl. GRIGNARD u. ESCOURROU, C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 1860; C. **1924**. I. 36), obwohl sich die Doppelbindung in γ befindet, u. daß Phenylmethyl- α -pentenylcarbinol bei der Vakuumdest. in Acetophenon u. α -Penten zerfällt (vgl. GRIGNARD u. DUBIEN, Ann. de Chimie [10] **2**. 285; C. **1925**. I. 637), haben Vff. zahlreiche gesätt. sowie α -, β - u. γ -ungesätt. tertiäre Alkohole in dieser Richtung untersucht. Am wenigsten stabil sind die α -Alkenylcarbinole; bei Dest. unter at-Druck erleiden sie hauptsächlich Dehydratisierung, in gutem Vakuum dagegen einige recht glatt die Ketonspaltung. Gesätt. sowie β - u. γ -Alkenylcarbinole sind im allgemeinen unzersetzt destillierbar, einige geben bei mehrstd. Kochen Spuren von Ketonen. Setzt man sie aber höheren Temp. aus, so tritt zunächst Dehydratisierung ein, die mit steigender Temp. zugunsten der Ketonspaltung zurücktritt. Letztere erfolgt bei 650—700° fast ausschließlich, allerdings unter teilweiser Verkohlung. Um diese zu vermeiden, läßt man die Substanz ein mit Glaswolle gefülltes, auf ca. 600° (bei at-Druck) oder 4—500° (im Vakuum) erhitztes Rohr passieren. Unter diesen Bedingungen scheint die Ketonspaltung eine ganz allgemeine Erscheinung zu sein, da Vff. keiner Ausnahme begegnet sind. Am wenigsten glatt verläuft die Rk. bei den α -Alkenylcarbinolen, da diese gleichzeitig stark dehydratisiert werden. — Die folgenden Resultate wurden, wo nichts angegeben, unter at-Druck bei ca. 600° erhalten. Die eingeklammerten Zahlen sind Ausbeuten in %. — *Phenylmethyl- α -octenylcarbinol* bei einfacher Vakuumdest.: *Acetophenon*. — *Benzylmethyl- α -octenylcarbinol* ebenso: *Önanthylidenacetone*. — *Propyl- u. i-Butylmethyl- α -pentenylcarbinol* (GRIGNARD u. DUBIEN, l. c.) bei 500° u. 180 mm: *Butylidenacetone*. — *Allylmethylpropylcarbinol*: *Methylpropylketone* (50, bei 500° u. 160 mm 60—65). — *Allylmethylbenzylcarbinol*: *Phenylacetone* (60, bei 400—450° u. 30 mm 90). — *Allylmethylphenylcarbinol*: *Acetophenon* (80). — *Crotonylmethylbutylcarbinol*: *Methylbutylketone* (30). — *Crotonylmethylbenzylcarbinol*: *Methylbenzylketone* (60—65, bei 400° u. 30 mm 90). — *Crotonylmethylphenylcarbinol*: *Acetophenon* (80). — γ -*Butenylmethylbutyl-* u. γ -*Butenylmethylbenzylcarbinol*: *Allylacetone* (20—30 u. 50—60). — γ -*Butenylmethylphenylcarbinol*: *Acetophenon* (50) u. wenig *Allylacetone*. — γ -*Pentenylmethylbutyl-* u. γ -*Pentenylmethylbenzylcarbinol*: *Crotonylacetone* (50 u. 50—60). — γ -*Pentenylmethylphenylcarbinol*: *Acetophenon* (50—60) u. wenig *Crotonylacetone*. — *Methyldibutylcarbinol*: *Methylbutylketone* (30). — *Phenyldimethylcarbinol*: *Acetophenon* (80). — *Benzyldimethylcarbinol*: *Acetone* (60). — *Äthylpropylbutylcarbinol*: Gemisch von Ketonen. — Die beiden ersten Carbinole werden aus *Önanthylidenacetone* dargestellt. Dieses erhält man nach dem Verf. von GRIGNARD u. DUBIEN (l. c.), wenn man in Aceton, mit Ä. verd., + NaOH

1-Phenylcyclohexandiole-(1,2) krystallin. sind; in Vfs. Verss. entstand also ein Gemisch der beiden. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 75—79. 1925. Moskau, 2. Univ.) BKM.

Woodford Stanley Gowan Plucknett Norris, *cyclo-Hexanspirocyclohexan*. NORRIS u. THORPE (Journ. Chem. Soc. London **119**. 1199; C. **1922**. I. 93) haben aus *cyclo*-Hexylidenacetone u. Na-Malonester den Ester **II** u. aus diesem *cyclo*-Hexanspirocyclohexan-3,5-dion (**I**) hergestellt. Nach CROSSLEY u. LE SUEUR (Journ. Chem. Soc. London **83**. 110 [1903]) liefert **I** in Chlf. mit PCl_3 das ungesätt. Chlorketon **III**. Die Red. von **III** mit Na u. feuchtem Ä. liefert nur wenig des spiro-Alkohols **IV**, dagegen führt die Red. mit Zn in sd. Eg. glatt zu *cyclo*-Hexanspirocyclohexan-3-on (**V**). **V** gibt mit Na u. feuchtem Ä. reduziert *cyclo*-Hexanspirocyclohexan-3-ol (**IV**), dessen Konstitution aus der Oxydation mit HNO_3 zu *cyclo*-Hexan-1-essig-1-propionsäure (**VI**) hervorgeht. Die Umsetzung von **IV** zu dem Bromderiv. **VII** verläuft außerordentlich schwierig, doch kann durch Red. mit Zn in A. *cyclo*-Hexanspirocyclohexan (**VIII**) neben einem ungesätt. KW-stoff **IX** oder **X** erhalten werden. Letzterer liefert dann schließlich mit H_2 u. Pd **VIII**.





Versuche. *cyclo*-Hexanspirocyclohexan-3,5-dion (**I**) liefert mit wss. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ verseift *cyclo*-Hexan-1-aceton-1-essigsäure, $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_3$, aus PAe., F. 67°, ll. in Ä., Bzl. u. A., wl. in W. u. PAe., Semicarbazone, $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{ON}_3$, aus Methylalkohol, F. 183,5° (Zers.). **I** gibt mit PCl_3 in Chlf. 3 Stdn. rückfließend erhitzt *cyclo*-Hexanspiro-5-chlor- Δ^4 -cyclohexen-3-on, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{OCl}$ (**III**), aus PAe., F. 47°, Kp.₁₂ 157°, Semicarbazone, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{ON}_3\text{Cl}$, aus Methylalkohol, F. 219° (Zers.). Die Red. von **III** in sd. Eg. mit Zn-Staub (24 Stdn.) führt zu *cyclo*-Hexanspirocyclohexan-3-on, $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}$ (**V**), Kp.₁₅ 130°, Kp.₇₇₂ 225°, $n_D = 1,48685$, $d_{21,7}^{20} = 0,98417$, Semicarbazone, $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{ON}_3$, aus A., F. 224,5° (Zers.). Oxim, $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{ON}_2$, aus PAe., F. 128°. **V** gibt in feuchtem Ä. mit Na reduziert *cyclo*-Hexanspirocyclohexan-3-ol, $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}$, (**IV**), Kp.₁₅ 127—128°, F. 58°, *p*-Nitrobenzoat, $\text{C}_{18}\text{H}_{23}\text{O}_4\text{N}$, aus A., F. 102°. Die Oxydation von **IV** mit HNO_3 in der Hitze liefert *cyclo*-Hexan-1-essig-1-propionsäure, $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_4$, (**VI**), aus Chlf. + PAe., F. 142,5°, Ca-Salz, Äthylester, $\text{C}_{15}\text{H}_{26}\text{O}_4$, Kp.₁₄ 179—183°. Die Einw. von HBr auf **IV** liefert ein unreines Bromderiv. (**VII**), ebenso gibt HCl kein einheitliches Prod. Das rohe Bromprod. gibt in 90% A. mit Zn-Staub reduziert ein Gemisch von **VIII** mit **IX** bzw. **X** u. dieses mit H_2 u. Pd reduziert *cyclo*-Hexanspirocyclohexan, $\text{C}_{11}\text{H}_{20}$, Kp.₇₇₇ 208°, $d_{20,6}^{20} = 0,87833$, $n_D = 1,47313$. Ferner noch bei der Einw. von PCl_5 auf **I** *cyclo*-Hexanspiro-3,5-dichlor- $\Delta^{2,4}$ -cyclohexadien, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{Cl}_2$ (**XI**), Kp.₂₁ 152°, doch kann das Halogen weder durch saure, noch durch alkal. Red. befriedigend entfernt werden. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 245—53. Sunbury, Anglo-Persian Oil Co.) TAUBE.

Raymond Delaby und **Maurice-Marie Janot**, Über *cyclo*-Hexylglycerin. Während aus Vinylalkylcarbinolen, $\text{CH}_2:\text{CH}\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{Alk}$, u. Br in n. Rk. Alkyl-dibromhydrine, $\text{CH}_2\text{Br}\cdot\text{CHBr}\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{Alk}$, entstehen (vgl. DELABY, Ann. de Chimie [9] **19**. 275; C. **1924**. I. 2338), erhielten MOUREU u. GALLAGHER (Bull. Soc. Chim.

de France [4] 29. 1009; C. 1922. I. 741) aus Vinylphenylcarbinol u. Br Phenyltribromhydrin, $\text{CH}_2\text{Br}\cdot\text{CHBr}\cdot\text{CHBr}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$. Vff. haben daher das *Vinyl-cyclo-hexyl-carbinol*, $\text{CH}_2:\text{CH}\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{C}_6\text{H}_{11}$, nach gleicher Richtung untersucht. Es entsteht aus molekularen Mengen Acrolein u. cyclo-Hexyl-MgBr bei tiefer Temp. Kp_{13} 93—94°, D_4^{20} 0,9352, $D_4^{17,5}$ 0,9202, $n_D^{17,5} = 1,4811$. *Allophanat*, F. 169—170°. Mit Br in Eg. erhält man in n. Rk. *cyclo-Hexyldibromhydrin*, F. 73,5° (Hg-Bad), ident. mit dem von VALEUR u. LUCE (Bull. Soc. Chim. de France [4] 27. 611 [1920]) beschriebener „Bromid“. Dieses liefert mit K-Acetat in Eg. — unter teilweiser HBr-Abspaltung — ein Gemisch von Acetinen u. letzteres mit 1%ig. methylalkoh. HCl *cyclo-Hexyl-glycerin*, nach Vakuumdest. (Kp_{20} 188—190°) sofort erstarrend. Prismen aus Essigester, F. 73,5° (Hg-Bad), weniger hygroskop. als die Alkylglycerine, wl. in A., unl. in Bzl., Chlf., l. in CH_3OH , Essigester. Ausbeute mindestens 30% (berechnet auf Carbinol). (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1146—47. 1925.) LINDENBAUM.

Marcel Godchot und Pierre Bedos, *Beitrag zur Kenntnis der geometrischen Stereoisomerie in der cyclo-Hexanreihe*. III. Über die Chlorierung des inaktiven *m*-Methyl-cyclo-hexanons und die Konstitution einiger Disubstitutionsprodukte des cyclo-Hexanols. (II. vgl. S. 1980.) (Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 1924. II. 639.) Nachzutragen ist: Vorliegende Arbeit enthält die in der 2. Mitt. angekündigte Beweisführung für die Konst. der 2-Chlor-5-methyl- u. 2,5-Dimethyl-cyclo-hexanone u. des 2,5-Dimethyl-cyclo-hexanons (Semicarbazone, F. 122°). Nachdem Verss., genanntes Keton oder das Dimethyl-cyclo-hexanol (Allophanat, F. 158°) zu oxydieren, die Chlormethyl-cyclo-hexanone zu *m*- oder *p*-Methyl-cyclo-hexanol zu reduzieren oder die Dimethyl-cyclo-hexanone zu einem Xylenol zu dehydrieren, keine brauchbaren Ergebnisse geliefert hatten, wurde folgender Weg gewählt: Oxydation der Chlormethyl-cyclo-hexanone zu einem Chlormethyl-cyclo-hexanon u. Abspaltung von HCl aus diesem, wobei ein 4-Methyl-cyclo-hexen-(2)-on-(1) (I.) oder ein 5-Methyl-cyclo-hexen-(2)-on-(1) (II.) zu erwarten war. KÖTZ u. STEINHORST haben inakt.



I. u. akt. II. dargestellt u. ihre Konst. bewiesen. Vff. waren daher genötigt, die Darst. des inakt. II. aus *inakt. m*-Methyl-cyclo-hexanon nachzuziehen, wobei sie sich des Verf. genannter Autoren bedienten. Das fl., nicht absol. reine *inakt. 2-Chlor-5-methyl-cyclo-hexanon*, $\text{C}_7\text{H}_{11}\text{OCl}$, besaß Kp_6 80—86°, D_4^{20} 1,089, $n_D^{20} = 1,47065$, das andere, Kp_6 90°, bildet Nadeln aus Lg., F. 55—56°, von schwach minzenartigem Geruch, u. ist bereits von FAWORSKI u. BAJOWSKI (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 46. 1097 [1914]) beschrieben worden. — Das aus seinem Semicarbazone, $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{ON}_3$, Blättchen aus CH_3OH , F. 182°, regenerierte *inakt. 5-Methyl-cyclo-hexen-(2)-on-(1)*, $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}$ (II.), ist eine bewegliche, schwach nach Pfeffer riechende Fl., Kp_{760} 170° (korr.), D_4^{26} 0,919, $n_D^{26} = 1,44635$. — Das durch Oxydation des Chlorhydringemisches aus Δ^3 -Methyl-cyclo-hexen erhaltene *Chlormethyl-cyclo-hexanon* konnte nicht zum Krystallisieren gebracht werden, da es offenbar durch nicht zu entfernende Reste von Chlorhydrin verunreinigt war, die übrigens bei der weiteren Verarbeitung nicht stören. Wie unten gezeigt werden wird, liegt nur eines der beiden Stereoisomeren vor, u. zwar das vom F. 55—56°. — Eine einfache Überlegung sagt bereits, daß aus Δ^3 -Methyl-cyclo-hexen über die Chlorhydrine einerseits, aus *m*-Methyl-cyclo-hexanon durch Chlorierung andererseits hervorgehende Chlormethyl-cyclo-hexanone, die durch Abspaltung von HCl sämtlich II. liefern, nur 2-Chlor-5-methyl-cyclo-hexanone sein können. Trotzdem haben Vff. noch die drei auf den beschriebenen Wegen gewonnenen Chlormethyl-cyclo-hexanone mittels CH_3MgJ in die 2,5-Dimethyl-cyclo-hexanone übergeführt. Diese Ergebnisse (schon im kurzen Ref. mitgeteilt) bestätigen die Richtigkeit der Formeln. Da das nicht krystallisierende Chlormethyl-cyclo-hexanon aus dem Chlorhydringemisch (vgl. oben)


daselbe Dimethyl-cyclo-hexanon (Semicarbazon, F. 122°) liefert wie das Chlormethyl-cyclo-hexanon vom F. 55—56°, so ist es mit diesem ident. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 83—99. Fac. des Sciences de Montpellier.) LINDENBAUM.

S. Nametkin und **A. Sseliwanowa**, *Untersuchungen in der iso-Bornylangruppe*. Kurzes Ref. nach Ber. Dtsch. Chem. Ges. vgl. C. 1924. II. 2747. Nachzutragen ist, daß das *sek. Nitro-i-bornylan* (I.), $C_{10}H_{17}O_2N$, bei Oxydation mittels $KMnO_4$ in alkal. Lsg. ein Ketongemisch (Kp. 205—206°) liefert u. nicht, wie erwartet wurde, das *i-Bornylon*. Dadurch wird nahegelegt, daß auch I. ein Gemisch ist, welches zustande kommt, weil HNO_3 die beiden Ringe des *i-Bornylans* gleichzeitig anzugreifen vermag. Auch die Konst. des *i-Bornylons* wird durch diesen Befund in Frage gestellt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 65—74. 1925. Moskau, 2. Univ.) BIKERMAN.


S. Nametkin und **L. Brüssowa**, *Untersuchungen auf dem Gebiete der Campher-homologen*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 80—86. 1925. — C. 1924. II. 2145.) BKM.

S. Nametkin und **A. Sabrodina** (= **Zabrodin**), *Über die Nitrierung des Tri-cyclens und den Mechanismus der Einwirkung von Salpetersäure auf Kohlenwasserstoffe verschiedener Reihen*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 87—96. 1925. — C. 1925. I. 1182.) BIKERMAN.

William L. Gilliland und **Arthur A. Blanchard**, *Nickelcarbonyl, Kohlenoxyd und Grignardsche Reagentien*. Kohlenoxyd wurde in Form von Nickelcarbonyl mit Phenyl-MgBr in Rk. gebracht, u. zwar derart, daß das Nickelcarbonyl aus dem frei werdenden Ni u. zugeleiteten CO beständig regeneriert wurde. (Beschreibung der Apparatur s. im Original). Als Rk.-Prodd. wurde neben einem unkrystallisierbaren Öl *Triphenylmethan*, *Triphenylvinylalkohol*, *Pentaphenyläthan* u. *Tetraphenyläthylen* isoliert, deren Entstehung Vff. analog den Grignardschen Rkk. u. indem sie für Nickelcarbonyl die Konst. $Ni(=C=O)_4$ annehmen, folgendermaßen formulieren:



II gibt bei der hydrolyt. Spaltung Triphenylmethan. Aus I entsteht a) Triphenylvinylalkohol, b) Tetraphenyläthylen:



Durch Einw. von CO auf II entsteht die Verb. $(C_6H_5)_3C-C(=O)-MgBr$. Diese gibt mit

2 Moll. C_6H_5MgBr eine Verb. $(C_6H_5)_3C-C \begin{array}{c} C_6H_5 \\ \text{MgBr} \\ C_6H_5 \end{array}$, aus welcher durch hydrolyt. Spaltung

Pentaphenyläthan gebildet wird. Wie man ersehen kann, ist die Zahl der möglichen Umsetzungen sehr groß. Wahrscheinlich besteht das unkrystallisierte Öl aus einem Gemisch verschiedener solcher Zwischenprodd., wie sie in diesem Schema angegeben sind. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 410—20. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) WIN.

B. Helferich und **H. Sieber**, *Berichtigung*. Die früher (vgl. HELFERICH u. Mitarbeiter, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 872. 1605; C. 1925. II. 279. 2271) als *salzsaures Triphenylcarbinol* beschriebene Verb. ist eine *Doppelverb. von salzsaurem Pyridin mit Triphenylcarbinol*, $C_{19}H_{16}O, C_5H_5N, HCl$; aus Essigester oder Aceton, F. 174°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 600.) BUSCH.


9-anthron gibt in Pyridin + Essigsäureanhydrid *1-Chlor-9-anthranylacetat*, $C_{16}H_{11}O_2Cl$, aus A., F. 110—112°; analog *4-Chlor-9-anthranylacetat*, F. 124—126°. Die Bromierung von 1-Chloranthron in CS_2 liefert *1-Chlor-10-bromanthron*, $C_{14}H_8OClBr$, aus Chlf., F. 165° (Zers.), daraus durch Verseifen mit wss. Aceton *1-Chlor-10-oxyanthron*, $C_{14}H_9O_2Cl$, aus Bzl., F. 144—145°. Analog aus 4-Chlor-10-bromanthron *4-Chlor-10-oxyanthron*, aus Bzl., F. 144—145° (keine Schmelzpunktsdepression mit dem 1-Chlorderiv.). 10-Oxyanthron liefert mit HCl in Toluol *10-Chloranthron*, $C_{14}H_9OCl$, aus Bzl. mit C_6H_6 , F. analysenrein 225° (Gasentw.); mit Pyridin in der Wärme *10-Oxyanthranyl-9-pyridiniumchlorid*, $C_{19}H_{14}ONCl \cdot H_2O$, aus sehr verd. HCl, F. 204° (Zers.). 4-Chlor-10-oxyanthron liefert in Bzl. mit HCl *4,10-Dichloranthron*, $C_{14}H_8OCl_2$, aus Chlf. u. PAe., F. 127—128°. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 236—45. John Cass Techn. Inst.)

TAUBE.

Harry H. Reynolds und Lucius A. Bigelow, *Eine Untersuchung über die Darstellung von Chinizarin*. Es wurde der Einfluß verschiedener Faktoren auf die Ausbeute u. Reinheit des aus p-Chlorphenol, Phthalsäureanhydrid, Borsäure u. konz. H_2SO_4 dargestellten *Chinizarins* untersucht. Dabei werden folgende Bedingungen als die günstigsten erkannt: Die geeignetste Temp. ist 200°. Durch Verlängerung der Reaktionszeit steigt die Ausbeute. Borsäure hat einen bemerkenswerten Einfluß auf die Rk., man nimmt am besten 2,5% der angewandten H_2SO_4 . Es empfiehlt sich, 227% der berechneten Menge Phthalsäureanhydrid anzuwenden. Vf. gibt eine ausführliche Darst.-Methode an, nach welcher die Ausbeute an reinem Chinizarin, F. 194 bis 195° (korr.), 75% der Theorie betrug. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 420—22. Providence, Rhode Island.)

WINKELMANN.

Praphulla Chandra Guha und Satis Chandra Dey, *Über Heteroringbildungen mit Thiocarbonyldiazid*. II. Kondensationen mit Diketonen und Aldehyden. (I. vgl. Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. **1**. 141; C. **1925**. I. 1999.) Mit *o*-Diketonen reagiert Thiocarbonyldiazid (I) in verschiedener Weise. Je 1 Mol. der Komponenten tritt zusammen in den Fällen *Benzil*, *Acenaphthenchinon*, *Campherchinon* u. *Alloxan*. Den neuen Verbb. kommt wahrscheinlich nicht die allgemeine Formel II., sondern III. zu, da sie nicht die Eigenschaften von Mercaptanen besitzen. Dagegen kondensieren sich vom *Phenanthrenchinon*, β -*Naphthochinon* u. *Isatin* je 2 Moll. mit 1 Mol. I. Da auch diese Verbb. in Alkali unl. sind, so wird man sie nicht nach IV., sondern nach V. zu formulieren haben. — Einige *o*-Diketonmonoxime liefern mit I n. *Hydrazone* (VI.), welche sich leicht zu *Bistriazolen* (VII.) anhydrieren lassen. Aus *Phenanthrenchinonmonoxim* entsteht ohne Zwischenprod. sofort die Verb. VII. — *Aldehyde* u. *Ketone* kondensieren sich mit I zu *Dihydrazonen* (VIII. u. IX.). Monohydrazone sind nicht erhältlich.



Versuche. Die Kondensationen der Diketone u. Monoxime mit dem Hydrochlorid von I werden in sd. Eg. ausgeführt. — *3-Thioketo-6,7-diphenyl-1,2,4,5-heptatetrazin*, $C_{15}H_{12}N_4S$ (nach III.). Aus Benzi. Ausbeute sehr gering. Nach Waschen mit W. u. Aceton hellgelbe Krystalle, F. 118—120°, ll. in A., Pyridin, unl. in W., Aceton, Bzl., verd. Säuren u. Laugen. — *3-Thioketoacenaphthen-1,2,4,5-heptatetrazin*, $C_{13}H_8N_4S$, aus Nitrobenzol oder Pyridin, dunkelbraun, F. 253°, unl. in A., Aceton, Bzl., Eg., verd. Säuren u. Laugen. H_2SO_4 -Lsg. dunkelbraun. — *3-Thioketocampher-1,2,4,5-heptatetrazin*, $C_{11}H_{16}N_4S$, gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 290°, ll. in A., zl.




in Eg., unl. in Aceton, Bzl., Chlf., verd. Säuren u. Laugen. H_2SO_4 -Lsg. gelb. — *3-Thio-ketoalloxan-1,2,4,5-heptatetrazin*, $\text{C}_5\text{H}_4\text{O}_2\text{N}_6\text{S}$, orangegelbe Krystalle aus Pyridin, schm. nicht bei 295° , unl. in W., A., Aceton, Eg., Bzl., Nitrobenzol, verd. Säuren, ll. in h. Pyridin, Laugen. H_2SO_4 -Lsg. braun. — *Diphenanthrenchinonthiocarbohydrazon*, $\text{C}_{29}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}_4\text{S}$ (nach V.), scharlachrote Krystalle, F. 242° , aus Pyridin hellrote Nadeln mit $1\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$. — *Di- β -naphthochinonthiocarbohydrazon*, $\text{C}_{21}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_4\text{S}$, graue, amorphe M. aus Pyridin (Tierkohle) + W., dann Nitrobenzol, schm. nicht bei 290° , unl. in W. A., Eg., Aceton, Bzl., verd. Säuren u. Laugen. Verkohlt mit konz. H_2SO_4 . — *Diisatin-thiocarbohydrazon*, $\text{C}_{17}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_6\text{S}$, orangefarbige Nadeln aus Nitrobenzol, F. 262° (Zers.), ll. in Pyridin, sd. Nitrobenzol, swl. in A., unl. in W., Aceton, Bzl., Chlf., Eg., verd. Säuren, l. in verd. Laugen (rot). H_2SO_4 -Lsg. violettrot. — *Diacetylmonoximthiocarbohydrazon*, $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_6\text{S}$ (nach VI.), aus Pyridin (Tierkohle) + W., amorph, F. 285° nach Verkohlen bei 220° , ll. in Eg., Pyridin, Laugen (rot), unl. in A., Aceton, Bzl., Chlf., verd. Säuren. — *Thioketobisdimethyltriazol*, $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{N}_6\text{S}$ (nach VII.). Aus dem vorigen mit Eg. + konz. HCl (Rohr, 100° , 6 Std.). Amorph, schm. nicht bei 300° , unl. — *Thioketobisphenanthrentriazol*, $\text{C}_{29}\text{H}_{16}\text{N}_6\text{S}$, Nadeln aus Nitrobenzol, F. 230° , ll. in sd. Nitrobenzol, Pyridin, unl. in A., Aceton, Bzl., Chlf., Eg., verd. Säuren, swl. in sd. verd. NaOH (rot). H_2SO_4 -Lsg. braun. — *Isatoximthiocarbohydrazon*, $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_8\text{S}$, gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, F. 228° (Zers.), ll. in A., Eg., Nitrobenzol, verd. NaOH (rot), unl. in W., Aceton, Bzl., verd. Säuren. H_2SO_4 -Lsg. tiefrot. — *Thioketobisisatintriazol*, $\text{C}_{17}\text{H}_{10}\text{N}_8\text{S}$. Aus dem vorigen mit alkoh. HCl (Rohr, 100°). Grünstichig gelbe Nadeln aus Pyridin, schm. nicht bei 290° , ll. in Pyridin, Nitrobenzol, wl. in Eg., unl. in A., Aceton, Bzl., Chlf., verd. Säuren u. Laugen. H_2SO_4 -Lsg. rot.

Die Kondensationen mit den Aldehyden u. Ketonen vollziehen sich in wss.-alkoh. Lsg., teilweise schon bei Zimmertemp. — *Dibenzylidenthiocarbohydrazid*, $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{S}$ (nach VIII.), aus Eg., F. 194° , zl. in A., unl. in W., Ä. Gibt mit AgNO_3 in A. einen gelben, gelatinösen Nd. — *Di-m-nitrobenzylidenthiocarbohydrazid*, $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{O}_4\text{N}_6\text{S}$, nach Auskochen mit A. gelbes Pulver, F. 227° , meist swl. — *Dicinnamylidenthiocarbohydrazid*, $\text{C}_{19}\text{H}_{18}\text{N}_4\text{S}$, nach Auskochen mit A. gelbe Platten aus Nitrobenzol, F. 235° (Zers.), wl. oder unl. außer in sd. Nitrobenzol. — *Di-o-oxylbenzylidenthiocarbohydrazid*, $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_4\text{S}$, Platten aus Aceton, F. 190° (Zers.), l. in A., Aceton, unl. in Ä., Bzl., Chlf. — *Dianisylidenthiocarbohydrazid*, $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}_4\text{S}$, hellgelbe Platten aus verd. Aceton, F. 158° unl. in W., Ä., Chlf., wl. in sd. Bzl. — *Difurfurylidenthiocarbohydrazid*, $\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_4\text{S}$, Platten aus Eg., F. 250° (Zers.), unl. in W., Ä., Bzl., wl. in Aceton, ll. in h. A. — *Dipiperonylidenthiocarbohydrazid*, $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_4\text{S}$, gelbliche Platten aus Aceton oder Eg. F. 195° (Zers.), unl. in W., A., Bzl., Chlf., zl. in Aceton. — *Diacetonthiocarbohydrazon*, $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{N}_4\text{S}$ (nach IX.), Krystalle aus Aceton + W., F. 195° (Zers.). — *Diacetophenonthiocarbohydrazon*, $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{N}_4\text{S}$, Platten aus A., F. 185° . — *Dibenzophenonthiocarbohydrazon*, $\text{C}_{27}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{S}$. Hier tritt die Rk. erst nach Zusatz von Na-Acetat ein. Krystalle aus A. oder Eg., F. 230° (Zers.) bei schnellem Erhitzen, unl. in W., Ä., Bzl., Chlf. Nitrobenzol, zl. in h. A., Eg. — *Dimethyläthylketonthiocarbohydrazon*, $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{N}_4\text{S}$, Krystalle aus W., F. 220° (Zers.), unl. in A., Ä., Bzl., Chlf. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 225—39. 1925. Dacca, Univ.)

LINDENBAUM.

B. Sjollem und **L. Seekles**, *Über Ketoenoldesmotropie des 5-Methyl-2-thiohydantoin*s. (Vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 827; C. 1925. II. 1966.) Um die l. c. bereits vermutete Ketoenoldesmotropie des 5-Methyl-2-thiohydantoin's zu beweisen haben Vff. eine opt.-akt. Form desselben vom l-Alanin aus nach dem Verf. von JOHNSON dargestellt. Tatsächlich verschwindet die Aktivität völlig, wenn man die wss. Lsg. mit 1 Mol. KOH versetzt. Der üblichen Anschauung entsprechend ist das Asymmetriezentrum infolge Enolisierung verloren gegangen. Da die Verb. nur schwach dreh (vielleicht wegen teilweiser Racemisierung bei der Darst.) u. daher keine ganz sicheren Schlüsse gestattet, wurde noch das Benzoylderiv. (I.) vom l-Benzoylalanin aus dar

gestellt. Dasselbe liefert mit 1 Mol. KOH eine hellgelbe, noch die volle ursprüngliche Drehung zeigende Lsg. Erst mit einem zweiten Mol. KOH wird die Lsg. inakt. u. gleichzeitig farblos. Zweifelloso bildet sich zuerst das Salz II., darauf das Enolsalz III., womit auch der Farbwechsel seine Erklärung findet.



Versuche. *l*-Benzoylalanin. Darst. nach FISCHER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 32. 2454 [1899]). Nach 6-maligem Umkrystallisieren des Brucinsalzes zeigte die daraus abgeschiedene Säure F. ca. 140°, $[\alpha]_{\text{D}}^{15} = -37,4^\circ$ (8,823%ig. Lsg. des K-Salzes). — *l*-Alaninhydrochlorid. Aus dem vorigen mit 20%ig. HCl. $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = -9,6^\circ$ (11,68%ig. wss. Lsg.). *l*-Alanin wird daraus mit frisch gefälltem $\text{Pb}(\text{OH})_2$ abgeschieden. — *l*-5-Methyl-2-thiohydantoin. Aus *l*-Alanin, $\text{NH}_4 \cdot \text{SCN}$ u. Acetanhydrid (0°, 1 Woche), dann in Eiswasser. Das *l*-Acetylderiv. (F. 163—166°) wird mit konz. HCl eingedampft. Aus A., F. 161°, $[\alpha]_{\text{D}}^{17} = -3,4^\circ$ (1,3125%ig. wss. Lsg.). — *l*-1-Benzoyl-5-methyl-2-thiohydantoin. Ebenso aus *l*-Benzoylalanin (4 Tage). Lufttrockenes Rohprod. mit A. bei 0° bis zur Lsg., darauf mit Tierkohle schütteln, im Eisschrank über H_2SO_4 verdampfen. Hellgelbe Prismen, F. 158—159°, wl. in W., zl. in A., ll. in Aceton. $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = -8,7^\circ$ (8,42%ig. Acetonlsg.). (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 232—35. Utrecht, Univ.)

LINDENBAUM.

P. Billon, Über Verbindungen von Oximen mit Zinkchlorid. Bei der Darst. von Oximen aus Ketonen u. Crismersalz (Hydroxylaminchlorozinkat) sind noch niemals Zwischenprodd. isoliert worden. Solche erhält man bei Ausschluß von W., am besten, wenn man ganz ohne Lösungsm. arbeitet. Sie bestehen aus 2 Moll. Oxim + 1 Mol. ZnCl_2 , bilden Krystalle von scharfem F. u. sind meist l. außer in Lg., mittels dessen sie von freiem Oxim getrennt werden können. Man kann sie auch aus fertigem Oxim u. ZnCl_2 in absol. A. darstellen. Von W. werden sie in die Komponenten zerlegt, woraus folgt, daß ihre Existenz bisher unbemerkt bleiben mußte, weil man in wss.-alkoh. Lsg. gearbeitet hat. Bisher wurden krystallisiert erhalten die Verbb. aus: Aceton, F. 104°; Methyläthylketon, F. 71°; Methyl-*i*-propylketon, F. 94°; Diäthylketon, F. 51°; Dipropylketon, F. 42°. Aus anderen Ketonen erhielt Vf. fl. Prodd., ist daher nicht sicher, ob es sich um definierte Verbb. oder einfache Lsgg. handelt. Aus Acetylaceton entsteht, gleich, ob man mit $\frac{1}{2}$ oder 1 Mol. Crismersalz arbeitet, der ZnCl_2 -Komplex des Dimethylisoxazols (nebenst.), F. 92—93°. (C. r. d. l'Acad. des sciences

LINDENBAUM.

182. 584—86.)

Leslie Marshall Clark, Quaternäre Salze des Benzoxazols. (Vgl. Clark, Journ. Chem. Soc. London 127. 973; C. 1925. II. 722.) Benzoxazoljodmethylyat gibt in W. gel. eine gegen Lackmus saure Lsg., aus welcher nach Zugabe des Äquivalentes an Alkali *o*-Formylmethylaminophenol isoliert werden kann. Analog liefern *l*-Methylbenzoxazol- u. *l*-Phenylbenzoxazoljodmethylyat *o*-Acetyl- bzw. *o*-Benzoylmethylaminophenol. Die Rk. verläuft somit nach:



Die Reversion der Hydrolyse durch Rk. von *o*-Benzoylmethylaminophenol mit trockenem HJ gelingt nicht. Verss., durch Methylierung ein Zwischenprod. der nebenstehenden Formel zu fassen, schlugen fehl, es konnte lediglich *o*-Benzoylmethylaminoanisol isoliert werden, dessen Konstitution durch Synthese aus *o*-Nitroanisol bestätigt wurde. Die Benzoxazoliniumsalze unterscheiden sich somit von den Benzthiazoliniumsalzen durch ihre Unbeständigkeit in W. u. die Unmöglichkeit der Reversion aus den *o*-Acylmethylaminophenolen durch Säuren.


VIII. 1.

175

Versuche. Aus 1-Methylbenzoxazol u. CH_3J bei 100° (8 Stdn.) hergestelltes 1-Methylbenzoxazoldimethylat, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{ONJ}$, aus Aceton F. 196° (Zers.), liefert in W. gel. u. mit Na-Perchlorat gefällt 1-Methylbenzoxazoldimethoperchlorat, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_5\text{NCl}$, aus Aceton + Ä., F. 173° . Dieses liefert in W. $1\frac{1}{2}$ Stdn. erhitzt, o-Acetylmethylaminophenol vom F. 151° . Dieses entsteht auch aus dem Jodmethylat mit KOH oder Ag_2O . Aus 1-Phenylbenzoxazol u. CH_3J bei 100° (36 Stdn.) hergestelltes 1-Phenylbenzoxazoldimethylat, $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{ONJ}$, aus A., F. 196° (Zers.), liefert in W. mit KOH o-Benzoylmethylaminophenol; aus diesem mit Phenylcarbimid das Urethan, $\text{C}_{21}\text{H}_{18}\text{O}_3\text{N}_2$, aus A., F. 144° . 1-Phenylbenzoxazoldimethylat liefert mit Dimethylsulfat u. NaOH o-Benzoylmethylaminoanisol, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$, aus verd. A., F. 115° . Die Verb. wurde zur Identifizierung synth. aus o-Nitroanisol über die Aminoverb. hergestellt. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 232—35. Hampton Wick.) TAUBE.

P. J. van Ryn, Die Nitrierung des 2,4,6-Trimethylpyridins (Kollidins). Die Nitrierung von Kollidindicarbonsäure mit HNO_3 im Einschlußrohr bei 200° gab neben CO_2 u. NO_2 nur unverändertes Ausgangsmaterial. Bei der Einw. von HNO_3 u. H_2SO_4 (mit 7,5% SO_3 Gehalt) auf Kollidin (3 Stdn. bei 100°) wurde ein Mononitrokollidin, $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$, erhalten, F. $35,5^\circ$. Die Einführung einer zweiten Nitrogruppe mißlang. Salze des Mononitrokollidins: Pikrat, $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_3\text{O}_7\text{N}_3$, F. 176° nach Sintern bei 170° . Chlorplatinat, $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, F. gegen 200° . Chloraurat, $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{H AuCl}_4$, F. 128° . — Methyljodidverb. $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{CH}_3\text{J}$. Durch Erhitzen (4 Stdn.) mit CH_3J im Einschlußrohr auf 100° . Blättchen aus A., F. 210 — 211° . (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 267—70. Leiden, Univ.) BRAUNS.

Leonard Eric Hinkel und William Rees Madel, Die Kondensation von 3-Brom- und 3-Nitro-4-dimethylaminobenzaldehyd mit Acetessigester und Ammoniak. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 117. 137; C. 1920. I. 894.) Untersucht wurde das Verhalten der 3-Brom- u. 3-Nitro-4-dimethylaminobenzaldehyde bei der Hantzschschen Pyridinsynthese. Das bei der Kondensation mit Acetessigester entstehende Dihydro-lutidin (I) läßt sich mit gasförmiger salpetriger Säure in normaler Weise oxydieren,




liefert jedoch kein Jodmethylat. Analog reagiert auch 3-Nitro-4-dimethylaminobenzaldehyd. — 3-Brom-4-dimethylaminobenzaldehyd liefert in Acetessigester mit alkoh. NH_3 zur Rk. gebracht 4-[m-Brom-p-dimethylaminophenyl]-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäurediäthylester, $\text{C}_{21}\text{H}_{27}\text{O}_4\text{N}_2\text{Br}$ (I), aus A., F. 133° , ll. in verd. HCl. Die Oxydation mit gasförmiger salpetriger Säure führt zu 4-[m-Brom-p-dimethylaminophenyl]-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarbonsäure, $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{O}_4\text{N}_2\text{Br}$, aus A., F. 91° . Analog wie oben aus 3-Nitro-4-dimethylaminobenzaldehyd 4-[m-Nitro-p-dimethylaminophenyl]-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäurediäthylester $\text{C}_{21}\text{H}_{27}\text{O}_6\text{N}_3$, aus verd. A., F. 127° . Durch Oxydation hieraus 4-[m-Nitro-p-dimethylaminophenyl]-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarbonsäure, $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{O}_6\text{N}_3$, aus A., F. 109° . (Journ. Chem. Soc. London 1926. 161—63. Swansea, Univ.) TAUBE.

James Davidson Fulton, Die Einwirkung von Acetylenetetrabromid auf organische Basen. Tertiäre organ. Basen geben mit Acetylenetetrabromid Additionsverb. der entsprechenden Hydrobromide mit $\text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$. Die so entstehenden Verb. sind in h. Methylalkohol u. A. ll., Umkrystallisieren aus Aceton oder Chlf. liefert fast quantitativ die reinen Hydrobromide, durch W. werden die Verb. zersetzt, indem $\text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$ in Freiheit gesetzt wird. — Verb. aus Nicotin, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2 \cdot 2\text{HBr} \cdot 2\text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$, F. 178 — 180° (Zers.). Sintern bei 140° u. $(\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2 \cdot 2\text{HBr})_2 \cdot \text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$, F. 182 — 183° (Zers.). Bromaurat, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2 \cdot 2\text{HBr} \cdot \text{AuBr}_3$, F. 183° , l. in A., wl. in W. Verb. aus Pyridin, $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HBr} \cdot \text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$, F. 108 — 109° , Bromaurat, $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HBr} \cdot \text{AuBr}_3$, F. 318 — 319° . Verb. aus Chinolin, $(\text{C}_9\text{H}_7\text{N} \cdot \text{HBr})_2 \cdot \text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$, Sintern bei 115° , F. 136° , Bromaurat, $(\text{C}_9\text{H}_7\text{N} \cdot \text{HBr})_2 \cdot \text{AuBr}_3$, F. 171 — 172° . Verb. aus i-Chinolin, $(\text{C}_9\text{H}_7\text{N} \cdot \text{HBr})_2 \cdot \text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$, F. 155 — 156° .

(wahrscheinlich nicht ganz rein), Bromaurat, $C_9H_7N \cdot HBr \cdot AuBr_3$, F. 223°. Verb. aus Lutidin, $(C_7H_5N \cdot HBr)_2 \cdot C_2H_2Br_4$, F. 135—140°. Verb. aus α -Picolin, $C_6H_7N \cdot HBr \cdot C_2H_2Br_4$, F. 104—105°. Piperidin, Coniin, Homopiperonylamin, Menthylamin, Hexamethylentetramin u. Phenylhydrazin geben wie oben behandelt nur die Hydrobromide, Antipyrin krystallisiert aus $C_2H_2Br_4$ unverändert aus, ebenso erweist sich Pyrrol als indifferent. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 197—99. Glasgow, Univ.) TAUBE.

Calvin J. Overmyer, *Eine Synthese von Substitutionsderivaten des Indigos*. I. *o*-Nitrobenzoylessigsäure und verwandte Verbindungen. Es werden einige Verbesserungen für die Darst. von Indigo aus *o*-Nitrobenzoylessigsäure (I), ferner die Konst. u. Eigenschaften des aus *o*-Nitrobenzoylacetessigsäureäthylester (II) erhaltenen Reduktionsprod. u. einige verwandte Verbb. beschrieben. Bei der Red. von I mit Dextrose oder Zinkstaub in alkal. Lsg. betrug die Ausbeute an Indigo etwa 80%, bei Red. mit Ferrosulfat u. Ammoniak entstand 2,4-Dioxychinolin (III). Weitere Umsetzungen von Chinolinderiv., die bei Red. von II erhalten wurden, sind aus dem angegebenen Schema ersichtlich.



Experimentelles. II wurde nach BÜLOW u. HAILER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 915; C. 1902. I. 805) hergestellt, woraus nach der Methode von GABRIEL u. GERHARD (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 1069; C. 1921. III. 333) *o*-Nitrobenzoyl-essigsäureäthylester krystallin. erhalten wurde, der bei Behandlung mit H_2SO_4 die Säure ergab. — 2,4-Dioxychinolin (III), Nadeln, ist in den üblichen Mitteln unl., gibt mit Ferrichlorid Rotfärbung. — 2-Methyl-4-oxychinolin-3-carbonsäureäthylesteroxid (IV), aus II in verd. Na- oder Ammoniumhydroxydls. mit heißgesätt. Ferrosulfatls., Nadeln (aus A.), gab beim Verseifen 2-Methyl-4-oxychinolin-3-carbonsäureoxd (V), Nadeln, F. 214°, welches durch Red. mit Zn u. HCl in 2-Methyl-4-oxychinolin-3-carbonsäure (VIII) überging; Nadeln aus verd. Essigsäure, F. 245° (Zers.). Ll. in h. W., Bzl., Ä., l. in A. u. Alkalien. — 2-Methyl-4-oxychinolin (VII) wurde durch Erhitzen von VIII u. durch Red. von 2-Methyl-4-oxychinolinoxyd (VI) gewonnen. — 2-Methyl-

4-methoxychinolincarbonsäureoxyd (IX), farblose, krystallin. M., F. 190° (Zers.), l. in A. u. Alkalien. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 454—60. Brookline [Mass.] Oxford Univ.) WINKELMANN.

Paul Fleury, *Quantitative Untersuchung der Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Dialkylbarbitursäuren. II. Diallyl- und i-Propylallylbarbitursäure.* (I. vgl. S. 1998.) Der Inhalt dieser Arbeit ist schon nach einer anderen Zeitschrift referiert (vgl. S. 1463). (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 99—108.) LINDENBAUM.



Emil Abderhalden und **Ernst Schwab**, *Studien über strukturisomere Formen der 2,5-Dioxopiperazine und der Polypeptide.* Enolisierte Dioxopiperazine (vgl. S. 1193) lassen sich leichter als die Ketoformen zu Dipeptiden aufspalten, welche unter Umständen in der Enolform erhalten werden können. Es wird vermutet, daß Proteine, welche gegenüber den Verdauungsfermenten sehr widerstandsfähig sind (Seidenfibroin, Keratin usw.), in der stabilen Ketoform vorliegen, während die leicht verdaulichen Eiweißkörper in der Enolform auftreten. In den Enolformen erblicken die Vff. mögliche Zwischenprodd. zur B. von Aminoalkoholen, Aminoaldehyden u. polycycl. hydroaromat. Verbb. wie Cholesterin, sowie eine Erklärung für die Labilität der physikal.-chem. Eigenschaften der Proteine u. für den Umstand, daß bei der Hydrolyse stets geringe Beimengungen von Racemverbb. auftreten (LEVENE u. PFALTZ, Journ. Biol. Chem. **63**. 661; C. **1925**. II. 302). Letztere würden der Enolform entstammen, während die Halbenolform u. die desmotropen Verbb., welche die Doppelbindung zwischen C u. N enthalten, zu opt.-akt. Aminosäuren führen. — *Enolisiertes Glycinanhydrid*, welches sich beim Erwärmen der wss. Lsg. zwischen 90° u. 100° in die Ketoform umlagert, wird durch Schütteln mit 20%ig. n. NaOH rasch aufgespalten. Nach Neutralisation mit HJ wird zur Trockne gedampft u. das NaJ mit A. entfernt. Das zurückbleibende *enolisierte Glycylglycin* zeigt ungesätt. Charakter, entfärbt kalte KMnO₄-Lsg.; Salpetersäure gibt positive Xanthoprotein- u. Ninhhydrin-Rk., negative Anhydrid-Rk. L. mit gelber Farbe, welche beim Erwärmen verschwindet. Bei der Einw. von Diazomethan entsteht ein in Ä. + A. ll. Rk.-Prod. von stark bas. Rk., das nicht krystallisiert erhalten werden konnte u. neben dem Ätherester C₆H₁₂O₃N₂ wahrscheinlich noch Ester C₅H₁₀O₃N₂ enthält. Das *enolisierte Leucylglycin* wurde durch Aufspaltung des entsprechenden Anhydrids u. durch Erhitzen von Leucylglycylleucin mit der 10-fachen Menge Diphenylamin auf 200° neben Anhydrid erhalten. Das Diphenylamin wurde mit Ä., das Anhydrid mit Chlf. entfernt. Ausbeute an enolisiertem Dipeptid 20%. Die Enolform des Leucylglycins wird durch 1/5-n. NaOH nach 9 Stdn. gespalten, während die gesätt. Form nach 15 Stdn. noch keine Veränderung des p_{II} auswies. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 88—94.) GUGGENHEIM.

Emil Abderhalden und **Fritz Gebelein**, *Über Decarboxylierung von Aminosäuren unter Bildung der entsprechenden Amine und über die Darstellung der Enolform von 2,5-Dioxo-piperazinen.* (Vgl. vorst. Ref.) Tyrosin liefert beim Erhitzen in der 20-fachen Menge Diphenylamin auf 240° *Oxyphenyläthylamin* in einer Ausbeute von 95% (vgl. hierzu JOHNSON u. DASCHAVSKY, Journ. Biol. Chem. **62**. 197; C. **1925**. I. 672). Glykokoll u. Alanin liefern unter den gleichen Bedingungen *Methyl- u. Äthylamin*. *d,l-Leucylglycin* spaltet zwischen 210—230° W. ab u. verwandelt sich in die Enolform des *d,l-Leucylglycinanhydrids* vom F. 240°. Die Doppelbindung ließ sich mit KMnO₄ nicht quantitativ titrieren. J wird nicht angelagert. Bei der Benzoylierung bei schwach soda-alkal. Rk. erfolgt Aufspaltung zum Dipeptid. *α-Amino-i-butyryl-α-amino-i-buttersäure*, ein Dipeptid, dessen Aminogruppen an einem tertiären Kohlenstoffatom haften, liefert entsprechend der Voraussetzung ein Anhydrid, das keine Enolbindung u. infolgedessen eine negative Xanthoprotein- u. KMnO₄-Rk. aufweist. — *d,l-Leucyl-d,l-valin* verwandelt sich beim Erhitzen auf 180—190° fast quantitativ in die *Enolform des Anhydrids* C₁₁H₂₀N₂O₂ vom F. 242°, *d,l-Alanyl-d,l-*

alanin zwischen 220—230° in das Anhydrid $C_6H_{10}N_2O_2$ vom F. 262°, *d,l*-Leucyl-*d,l*-leucin bei 180—185° in das Anhydrid $C_{12}H_{22}N_2O_2$ vom F. 266°. Beim Erhitzen von Tripeptiden mit Diphenylamin entstehen keine einheitlichen Verbb. Auch Glycylglycin u. Glycylalanin verhalten sich nicht wie die anderen Dipeptide. Eine Umlagerung der stabilen Dioxypiperazinform in die Enolform gelang nicht. — α -Brom-*i*-butyryl- α -amino-*i*-buttersäure $C_8H_{14}O_3NBr$ aus α -Brom-*i*-butyrylbromid u. α -Amino-*i*-buttersäure; weiße Blättchen aus verd. A., ll. in Ä. u. A., wl. in W., unl. in KW-stoffen, F. 169°. α -Amino-*i*-butyryl- α -amino-*i*-buttersäure $C_8H_{16}O_3N_2$, derbe Krystalle, F. 244—246°, zl. in W. — Amino-*i*-butyrylamino-*i*-buttersäureanhydrid $C_8H_{14}O_2N_2$, B. beim Erhitzen des Dipeptids mit der 15-fachen Menge Diphenylamin auf 180°. Sublimiert bei 260°. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 125—31.) GUGGENHEIM.

Emil Abderhalden und **Hans Sickel**, *Beitrag zur Kenntnis des Prolins*. *Prolin-chlorhydrat* $C_5H_9O_2N \cdot HCl$; derbe Krystalle aus W., F. 140°, Zers. bei 240°. — *Prolin-äthylesterchlorhydrat* $C_7H_{15}O_3N \cdot HCl$, mit W. nur schwierig verseifbar. Mikrokristallin, sehr hygroskop. — *Prolinäthylester*. Kp._{10–11} 78—79°. Leicht bewegliche Fl. von eigentümlichem Geruch u. brennendem Geschmack. In organ. Lösungsmm. mischbar. Beim Stehen in W.-freiem Ä. erfolgt B. von geringen Mengen von *Prolin-anhydrid* $C_{10}H_{14}O_2N_2$, feine Nadelchen, F. 176°, nach vorherigem Sintern bei 165°, Rk. schwach sauer. Ninhydrin-, Xanthoprotein- u. Biuret-Rk. negativ. Dagegen positive Carbonyl-Rk. Geschmack bitter. Ll. in W. u. A., mäßig l. in Chlf. u. Aceton, in Essigester wl., swl. in Ä. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 95—100. Halle a. S., Univ.) GUGGENHEIM.

Anukul Chandra Sircar und **Pran Kumar De**, *Über heterocyclische Verbindungen*. I. Vom 2,3-Diaminophenazin (I) aus sollen verschiedene Typen von Verbb. mit zwei ungleichartigen Heteroringen aufgebaut werden, um zu erfahren, ob letztere einen gegenseitigen Einfluß aufeinander ausüben. I ist zu Ringkondensationen weniger geeignet als o-Phenylendiamin, der Azinring scheint die Reaktionsfähigkeit der NH_2 -Gruppen herabzusetzen. Mit Dicarbonsäureanhydriden u. Aldehyden entstehen *Phenazinoimidazol*-deriv. (II. u. III.). Die Verbb. II. sind sämtlich gelb wie I. — Das Kondensationsprod. von I mit Oxalylchlorid ist nicht als α,β -Dioxo-2,3-phenazinochin-oxalintetrahydrid, sondern als das tautomere *Dioxyphephenazinochinoxalin* aufzufassen, da es nicht die Kondensationsfähigkeit der o-Diketone besitzt. — Mit HNO_2 liefert I ein *Azimid*, mit Senfölen nur *Thioharnstoffe*, keine cycl. Guanidine. Mit Acetanhydrid oder Benzoylchlorid entstehen keine Imidazole. Mit Chlorameisensäureester oder SO_2 reagiert I nicht.



Versuche. *Campheroxylen-2,3-phenazinoimidazol*, $C_{22}H_{20}ON_4$ (nach II.). I wird mit Camphersäureanhydrid bei 240° verschm., $\frac{1}{2}$ Stde. auf 210° erhitzt, später mit Ä. extrahiert, Ä.-Rückstand mit W. ausgekocht. Gelbe Nadeln aus verd. A., F. 215—219° nach Sintern bei 202°, unl. in W., l. in A., Ä. H_2SO_4 -Lsg. grünlichschwarz. — *o-Benzoyloxylen-2,3-phenazinoimidazol*, $C_{20}H_{10}ON_4$. Mit Phthalsäureanhydrid (210—230°, 2 Stdn.). Nach Ausziehen mit W. u. Eg. hellgelbe Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 300°, unl. in W., Ä., swl. in A., Bzl., Eg., ll. in Pyridin, Nitrobenzol. H_2SO_4 -Lsg. rot. — *Naphthoxylen-2,3-phenazinoimidazol*, $C_{24}H_{12}ON_4$. Mit Naphthalsäureanhydrid (270 bis 280°, $1\frac{1}{2}$ Stde.). Nach Auskochen mit A. u. Eg. hellgelbe Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 300°, unl. in W., A., Ä., Eg., wl. in Pyridin. H_2SO_4 -Lsg. tiefviolett. — *Diphenoxylen-2,3-phenazinoimidazol*, $C_{26}H_{14}ON_4$. Mit Diphensäureanhydrid (220—240°, 1 Stde.). Nach Ausziehen mit A. u. Pyridin grünlichgelbe Nadeln aus Nitrobenzol,

schm. nicht bei 290°, unl. außer in Nitrobenzol. H_2SO_4 -Lsg. blutrot. — *4,5-Phenazino-2-phenylimidazol*, $\text{C}_{19}\text{H}_{12}\text{N}_4$ (nach III.). Mit sd. Benzaldehyd. Braune Nadeln aus A., schm. nicht bei 290°, unl. in W., l. in A. mit grüner Fluoreszenz, Bzl. H_2SO_4 -Lsg. blutrot. — *4,5-Phenazino-2-[4'-methoxyphenyl]-imidazol*, $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{ON}_4$. Mit sd. Anisaldehyd (1 Min.), mit Ä. fallen. Orange gelbe Platten aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 270°, unl. in W., Ä., l. in A., Eg., Pyridin, Nitrobenzol, w. verd. NaOH (rot). H_2SO_4 -Lsg. tiefblau. — *4,5-Phenazino-2-[3'-nitrophenyl]-imidazol*, $\text{C}_{19}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_5$. Mit m-Nitrobenzaldehyd in sd. verd. HCl + wenig A. (7 Min.). Nach Auskochen mit NH_4OH orange gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 300°, unl. in W., verd. HCl, zl. in A., l. in Eg., Nitrobenzol, w. verd. NaOH (rot). — *4,5-Phenazino-2-[4'-dimethylamino-phenyl]-imidazol*, $\text{C}_{21}\text{H}_{17}\text{N}_5$. Ebenso mit p-Dimethylaminobenzaldehyd (15 Min.). Schokoladenbraune Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 290°, unl. in W., verd. HCl, Ä., w. in A., l. in Eg., Pyridin, Nitrobenzol. H_2SO_4 -Lsg. blutrot. — *Dioxy-2,3-phenazinochinoxalin*, $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_4$. Mit Oxalylchlorid in sd. Nitrobenzol (15 Min.), mit Ä. fallen, aus NH_4OH + HCl umfallen. Amorph, braun, schm. nicht bei 280°, unl. außer in Alkalien. H_2SO_4 -Lsg. blutrot. — *2,3-Phenazinoazimid*, $\text{C}_{12}\text{H}_7\text{N}_5$. Mit KNO_2 in starker HCl (Zimmertemp.). Nach Waschen mit Na-Acetatls. goldgelbe Nadeln aus Nitrobenzol, F. 280°, unl. außer in Pyridin, Nitrobenzol, verd. NaOH (tiefrot). H_2SO_4 -Lsg. blutrot. — *3-Aminophenazin-2-o-tolylthioureid*, $\text{C}_{20}\text{H}_{17}\text{N}_5\text{S}$. [Die Bezeichnung „Ureid“ ist unzutreffend. D. Ref.] Mit o-Tolylsenfö in sd. Eg. ($\frac{1}{2}$ Stde.), mit W. u. etwas NaCl fallen. Violette Nadeln aus A., schm. nicht bei 300°, l. in A., h. W., verd. HCl. H_2SO_4 -Lsg. grün. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 312—18. 1925. Dacca, Univ.)


LINDENBAUM.

Ch. Courtot und Jan Krolkowski, *Über eine neue Darstellung des α -Indanons*. (Vgl. COURTOT u. DONDELINGER, S. 1168.) Dieselbe besteht in der Oxydation von α -Chlorindan mit 50%ig. H_2SO_4 u. 50%ig. $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -Lsg. (entsprechend 1 Atom O) bei 55—57°. Ausbeute an α -Indanon 90—95%. Man braucht nicht von reinem Inden, sondern kann von den ca. 10% Inden enthaltenden Phenolölen des Steinkohlenteers ausgehen, die mittels NaOH u. verd. Säuren von Phenolen u. Basen befreit u. rektifiziert werden. Die von 175—185° sd. Indenöle (enthaltend 56—62% Inden) werden bei 0° mit HCl-Gas gesätt. u. die überschüssige HCl unter 10—15 mm bei 40—50° entfernt. Aus der Gewichtszunahme, entsprechend der B. von α -Chlorindan, berechnet sich die Menge des Oxydationsmittels, da die Begleitstoffe keinen O verbrauchen. Ausbeute ca. 72% (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 320—23.)

LINDENBAUM.

Harry Dugald Keith Drew, *Cyclische Organometallverbindungen. I. Tellurverbindungen*. (Vgl. MORGAN u. DREW, Journ. Chem. Soc. London 127. 2307; C. 1926. I. 1147.) TeCl_4 u. Diphenyläther reagieren in der Hitze miteinander unter B. von p-Phenoxyphenyltelluritrichlorid, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{TeCl}_3$, einer Verb., in der die Gruppe $-\text{TeCl}_3$ ein H des arom. Kernes ersetzt hat. Dies folgt aus den Resultaten der Red. mit K-Metabisulfit, welche pp'-Diphenoxydiphenylditellurid, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{Te}:\text{Te}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$, liefert, eine Verb., welche in Bzl. n. kryoskopisches Verh. zeigt. Auf 200° erhitzt, liefert das Telluritrichlorid unter HCl-Verlust 10,10-Dichlorphenoxitellurin (I), welches durch Red. in Phenoxitellurin (II) übergeführt werden kann. II addiert leicht Br u. J unter B. der 10,10-Dihalogenverbb., sowie HNO_3 zu dem 10,10-Dinitrat. Wie MORGAN u. DREW (l. c.) gezeigt haben, nimmt die $-\text{TeCl}_3$ -Gruppe bei Kondensationen mit Phenetol stets die p-Stellung zum Äthoxyl ein, was durch Analogieschluß für das Telluritrichlorid (s. oben) die Formel III verlangen würde. III könnte dann durch Umlagerung u. innere Kondensation I liefern. Zur Nachprüfung wurde die Einw. von konz. HNO_3 auf das Ditellurid untersucht, welche zunächst das Tellurittrinitrat, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{Te}(\text{NO}_3)_3$, u. weiter pp'-Dinitrodiphenyläther liefert. Dies kann nach $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{Te}(\text{NO}_3)_3 + \text{HONO}_2 = \text{Te}(\text{NO}_3)_3\text{OH} + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2$ oder nach $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{Te}(\text{NO}_3)_3 + \text{HNO}_3 = \text{Te}(\text{NO}_3)_4 + \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ erklärt werden, ohne daß

somit eine Entscheidung bezüglich der Stellung des Te-Atoms möglich wäre. Als Nebenprod. der Kondensation von TeCl_4 u. Diphenyläther sowie beim Erhitzen des Tellurtrichlorides mit überschüssigem Diphenyläther auf 160° entsteht *pp'*-Diphenoxydiphenyltelluridichlorid, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{TeCl}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$. Über die Stellung des Te-Atoms in p- oder o-Stellung läßt sich auch bei dieser Verb. nichts aussagen.




Versuche. TeCl_4 u. Diphenyläther liefern 26 Stdn. in Chlf. rückfließend, erhitzt, *p*-Phenoxyphenyltelluritrichlorid, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{OCl}_3\text{Te}$, aus Chlf. oder CCl_4 , F. unscharf $156\text{--}157^\circ$, unl. in PAe., wl. in CCl_4 , l. in Chlf. u. Bzl. Die obige Verb. liefert erneut mit Diphenyläther 6 Stdn. auf $140\text{--}165^\circ$ erhitzt, *pp'*-Diphenoxydiphenyltelluridichlorid, $\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{Cl}_2\text{Te}$, aus A. oder Methylalkohol, F. $157\text{--}158^\circ$, ll. in Bzl., Chlf. u. Ä., unl. in PAe. Die Red. des Trichlorides mit K-Metabisulfit führt zu *pp'*-Diphenoxydiphenylditellurid, $\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{Te}_2$, aus PAe. oder A. dunkelrote Nadeln vom F. $87\text{--}88^\circ$, Sintern bei 85° , ll. in Bzl., Chlf., CCl_4 u. Ä., unl. in W. Mit Br entsteht in Chlf. ein Bromid vom F. 180° , wahrscheinlich ein Analogon des obigen Trichlorides. TeCl_4 liefert mit Diphenyläther im N_2 -Strom im Laufe von 13 Stdn. von 100° auf 240° erhitzt, 10,10-Dichlorphenoxotellurin, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{OCl}_2\text{Te}$ (I) aus Toluol, F. 265° , unl. in Ä. u. PAe., wl. in Chlf. u. A., l. in Bzl. u. Toluol, ll. in Aceton. Die Red. von I mit K-Metabisulfit liefert Phenoxotellurin, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{OTe}$ (II), aus PAe. citronengelbe Nadeln vom F. $78\text{--}79^\circ$, unl. in W., ll. in A., Ä., Bzl. u. CCl_4 . Mit konz. HNO_3 aus II das Dinitrat, Zers. bei 258° . Ferner das 10,10-Dibromid, aus Chlf. Zers. bei 290° , u. 10,10-Dijodid, unscharfe Zers. bei 270° . (Journ. Chem. Soc. London 1926. 223—31. Edgbaston, Univ. Birmingham.)

TAUBE.

Praphulla Chandra Guha und Manindra Nath Chakladar, Über Dithiobrenzcatechin. Vff. haben Dithiobrenzcatechin (I) auf drei verschiedenen Wegen dargestellt. Das erste Verf. geht aus vom K-Salz der 5-Brom-2-xanthobenzolsulfonsäure, $\text{Br} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{S} \cdot \text{CS} \cdot \text{O} \cdot \text{C}_2\text{H}_5)(\text{SO}_3\text{K})$ (vgl. ARMSTRONG u. NAPPER, Proceedings Chem. Soc. 16. 160 [1900]). p-Bromanilin-o-sulfonsäure wird in verd. H_2SO_4 diazotiert u. das isolierte Diazoanhydrid mit gesätt. wss. Lsg. von K-Äthylxanthogenat umgesetzt, schließlich bei 70° . Gelbliche Kryställchen aus W. — K-Salz der 4,4'-Dibromdiphenyldisulfid-2,2'-disulfonsäure, $[\text{Br} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{SO}_3\text{K}) \cdot \text{S}]_2$. Das vorige wird ca. 1 Stde. mit verd. KOH gekocht, dann lange Luft durchgeblasen u. eingeengt. — Disulfochlorid, $[\text{Br} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{SO}_2\text{Cl}) \cdot \text{S}]_2$. Aus dem vorigen mit PCl_5 (Wasserbad, 4—5 Stdn.), dann auf Eis. Aus Bzl. umkrystallisieren. — 4-Bromdithiobrenzcatechin, $\text{C}_6\text{H}_5\text{BrS}_2$ (II). Aus dem vorigen mit Sn u. h. konz. HCl (5—6 Stdn.), mit Dampf dest. Aus A. + W., F. $43\text{--}44^\circ$, ll. in A., Ä. Pb- u. Hg-Salz hellgelb. — Dithiobrenzcatechin, $\text{C}_6\text{H}_5\text{S}_2$ (I). Aus dem vorigen mit Zn-Staub u. sd. verd. KOH (9—10 Stdn.), ansäuern, ausäthern. Wie Thiophen o riechendes Öl, Kp. $238\text{--}239^\circ$, E. $28\text{--}29^\circ$, ll. in A., Ä. — Das zweite Verf. geht auch vom Bromxanthobenzolsulfonat aus. Dieses wird mit sd. wss. KMnO_4 -Lsg. zum K-Salz der 4-Brombenzol-1,2-disulfonsäure oxydiert u. letzteres wie oben in das Disulfochlorid übergeführt. Aus Bzl., F. 100° . Bei energ. Red. desselben mit Sn u. HCl, wobei ein rotes Zwischenprod. (wahrscheinlich ein Thiolacton) auftritt, erhält man II. Besser reduziert man das Brombenzoldisulfonat mit Zn-Staub u. KOH, fällt das Zn mit CO_2 aus, engt ein u. krystallisiert das K-Salz der Benzol-o-disulfonsäure aus W. um. Dieses wird mit PCl_5 in das Disulfochlorid (aus Bzl., F. 143°) übergeführt u. letzteres mit Sn u. HCl zu I reduziert, wobei ebenfalls ein rotes Zwischenprod. auftritt. Man dest. das Rohprod. mit Dampf, bringt durch Eiskühlung zum Erstarren, filtriert schnell, krystallisiert aus A. + W. um u. dest. — Das dritte Verf. besteht darin, daß Na-Phenolat

mit S 6 Stdn. auf 170—180° erhitzt wird, wobei verschiedene Substanzen, darunter I, entstehen. Wegen sehr geringer Ausbeute ist dies Verf. nicht zu empfehlen.

Disulfid des Dithiobrenzcatechins, $C_6H_4S_2$. Aus I mit alkoh. J-Lsg. Ist nach Waschen mit A., KJ-Lsg. u. W. rein. F. 185—190°, unl. — *Dibenzoyldithiobrenzcatechin*, $C_{20}H_{14}O_2S_2$, aus Aceton, F. 77°. — *o-Nitrobenzylidendithiobrenzcatechin*, $C_6H_4:S_2:CH \cdot C_6H_4 \cdot NO_2$. Mit o-Nitrobenzaldehyd in mit HCl gesätt. A. (Rohr, 100°, 8 Stdn.). Gelbe Nadeln aus A., F. 106°. — *Verb.* $C_{18}H_{10}OS_2 = (C_{10}H_6CO)C:S_2:C_6H_4$. Mit Acenaphthen chinon in sd. A. (7—8 Stdn.). Gelbe Nadeln aus A., F. 190°. — *Disulfid des 4-Bromdithiobrenzcatechins*, $C_6H_3BrS_2$. Aus II mit alkoh. J-Lsg. F. 154°, unl. — *Dibenzoyl-4-bromdithiobrenzcatechin*, $C_{20}H_{13}O_2BrS_2$, F. 85°. — *4-Bromdithiobrenzcatechin* diäthyläther, $C_{10}H_{13}BrS_2$. Aus dem K-Salz von II: 1. mit C_2H_5Br in sd. 50%ig. A.; 2. mit Chlorameisenester in sd. Bzl. unter Abspaltung von $2CO_2$. Krystalle aus verd. A., F. 54°. — *4-Brombenzol-1,2-dithiodiglykolsäure*, $Br \cdot C_6H_3(S \cdot CH_2 \cdot CO_2H)_2$. Man erwärmt das K-Salz von II mit K-Chloracetat in W. u. säuert an. Platten aus W., F. 170°. — Kocht man aber ca. $\frac{1}{2}$ Stde. mit freier Chloressigsäure u. säuert an, so erhält man das *Thio-lacton* $C_8H_5OBrS_2 + 2H_2O$ (III.), Krystalle aus W., F. 191°, l. in Laugen, unl. in Dicarboxonat. — *Benzyliden-4-bromdithiobrenzcatechin*, $Br \cdot C_6H_3:S_2:CH \cdot C_6H_5$. Aus dem K-Salz von II mit Benzalchlorid in sd. Toluol oder aus II u. Benzaldehyd in alkoh. HCl (Rohr, 100°, 7—8 Stdn.). Aus Bzl., F. 170°. — *Glyoxaldi-4-bromdithiobrenzcatechin*,








$(Br \cdot C_6H_3:S_2:CH)_2$ oder IV. (IV. wird bevorzugt). Aus dem K-Salz von II mit Acetylen-tetrachlorid in sd. Toluol, mit PAe. fällen. Prismen aus Bzl., F. 236—238°, unl. in A. — *4-Bromdithiobrenzcatechinsulfid*, $Br \cdot C_6H_3:S_2:SO$. Ebenso mit $SOCl_2$. Gelbliche Substanz, F. 220° (Zers.), unl. — *4-Bromdithiobrenzcatechinoxalat*, $Br \cdot C_6H_3:S_2:(CO)_2$. Mit Oxalylehlorid. Krystallin. Prod. aus A.-Bzl., sublimiert bei 150°. — *4-Bromdithiobrenzcatechinthiocarbonat*, $Br \cdot C_6H_3:S_2:CS$. Mit Thiophosgen, mit A. fällen. Gelbe Nadeln aus Aceton (Tierkohle), F. 140°. — *Verb.* $C_{14}H_7O_2BrS_2$ (V. oder VI.). Aus II u. Phthalsäureanhydrid + $ZnCl_2$ (125—136°, 3—4 Stdn.). Nadeln aus W., unl. in k. Alkali. Da die Verb. schon von sd. Eg. verseift wird, bevorzugen Vff. Formel VI. Es ist bemerkenswert, daß Brenzcatechin unter gleichen Bedingungen Alizarin u. Hystazarin liefert; hier zeigt sich die Reaktionsfähigkeit der SH-Gruppen. — *Verb.* $C_{20}H_{11}OBrS_2 = (C_{12}H_8CO)C:S_2:C_6H_3 \cdot Br$. Aus II u. Phenanthrenchinon in sd. A. (6 Stdn.). Hellgelbes krystallin. Pulver aus Eg., F. 195°. — *Verb.* $C_{26}H_{14}Br_2S_4 = C_{12}H_8(C:S_2:C_6H_3 \cdot Br)_2$. Ebenso in alkoh. HCl (Rohr, 100°, 7—8 Stdn.). Krystallin. Prod. aus A., F. 115°. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 318—35. 1925. Dacca, Univ.)

LINDENBAUM.



Edmund Speyer und August Popp, Über die Einwirkung von Ozon auf Dihydrokodein und Äthyl-dihydro-morphin. (Ein Beitrag zur Aufspaltung des Morphin-Moleküls.) Vff. setzen die Verss. PSCHORRS (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3652; C. 1907. II. 1423) mit Morphin u. Kodein fort. Bei der Ozonisierung des Kodeins sowohl in neutraler als auch in ameisen-saurer Lsg. konnte trotz durchgreifender Veränderung der Substanz ein krystallisierendes Prod. nicht isoliert werden. — Bei der Einw. von Ozon auf eine ameisen-saurer Lsg. von Dihydro-kodein färbt sich die Lsg. gelb, dann dunkler u. wird schließlich annähernd farblos, am nach Zugabe von NH_3 wieder dunkelbraun zu werden. Mit Chlf. wurde ein in W. l. Öl Ozo-dihydrokodein (I) isoliert. Die Cl-, Br- u. Jodhydrate $C_{18}H_{23}O_5N \cdot HCl(HBr, HJ)$ waren schön krystallisierende Verbb. Die tertiäre Natur des Stickstoffs zeigte sich in der glatten B. eines Jodmethylats, $C_{18}H_{23}O_5N \cdot CH_3J$. In

der neuen Verb. ist die im Dihydro-kodein vorhandene sekundäre Alkoholgruppe ebenfalls enthalten, was durch die B. einer *Monoacetylverb.* (II) nachgewiesen wurde. Ferner konnte die alkoh. Hydroxylgruppe bei der Einw. von PCl_5 durch Cl ersetzt werden. Die Erhaltung der O-Brücke folgte aus der Unlöslichkeit der Verb. in fixen Alkalien in der Kälte. Eine Keton- oder Aldehydbildung konnte nicht festgestellt werden. Fehlingsche Lsg. wurde nicht reduziert. — Die Aufspaltung des Mol. fand an der Doppelbindung der C-Atome 3,4 des Benzolkerns statt, indem das eine O-Atom am C-Atom 3 unter Esterbildung, das andere O-Atom am C-Atom 4 unter Lactonbildung eingetreten war. Dieses konnte durch Verseifung des Ozonisierungsprod. nachgewiesen werden. Hierbei resultierte *Dihydromorphinsäure*, $\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{O}_6\text{N}$ (IV). Die bas. Eigenschaften dieser Aminosäure waren derart zurückgedrängt, daß weder Salzbildung noch eine Addition von CH_3J erfolgte. — Ein weiterer Beweis für die Sprengung der Doppelbindung wurde durch die Ozonisierung des Dihydroäthylmorphins erbracht. Es resultierte eine ölige Base *Ozodihydroäthylmorphin* (V), die ein kristallisiertes *Jodhydrat*, $\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{O}_5\text{N}$, HJ, lieferte. Bei der Verseifung der Base entstand eine *Aminosäure*, $\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{O}_6\text{N}$ (IV), die ident. war mit dem aus Ozodihydrokodein erhaltenen Prod. — Die elektrolyt. Red. nach TAFEL ergab aus dem Ozodihydrokodein eine in W. ll. Aminosäure: *5-Desoxydihydromorphinsäure* (VI), $\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{O}_5\text{N}$. — Da das *Ozodihydroäthylmorphin* bei der elektrolyt. Red. zur gleichen Verb. führte, so läßt sich die Rk. durch eine Verseifung des Methylesters in Stellung 3 bei der elektrolyt. Red. in schwefelsaurer Lsg. unter gleichzeitiger Addition von 1 Mol. H_2 an die Lactonbindung erklären. — Beim Schütteln des Ozodihydrokodeinchlorhydrates mit Pd-H_2 fand eine Aufnahme von 1 Mol. H_2 statt. Es resultierte *5-Desoxydihydromorphinsäure-3-methylester*, $\text{C}_{18}\text{H}_{25}\text{O}_5\text{N}$ (VII), deren bas. Charakter durch die B. eines Cl- u. Jodhydrates u. eines Pikrates nachgewiesen wurde. Die sekundäre Alkoholgruppe in 6 wurde durch die B. einer *Monoacetylverb.*, ferner eines Chlorderiv. bewiesen. Da die hydrierte Verb. bei der Verseifung in saurer u. alkal. Lsg. sehr leicht in VII überging, so muß die Addition von 1 Mol. H_2 am Lactonring erfolgt sein. — Die Hydrierung des Ozodihydroäthylmorphins u. nachfolgende Verseifung der resultierenden Base lieferte wieder VII. — Bei der Einw. von Pd-H_2 auf Dihydromorphinsäure, $\text{C}_{17}\text{H}_{25}\text{O}_6\text{N}$ (VIII oder IX).





VI Säure (VII Methylester)


IX C·CH₂·CH₂·COOH

VIII

— *Ozodihydrokodeinjodmethylyat*, $C_{18}H_{23}O_5N$, CH_3J . Aus 96%ig. A. Trapezförmige Säulen. Sintern bei 152°. Zers. bei 155°. — *Chloroozodihydrokodein* (III), $C_{18}H_{22}O_4NCl$. Aus 96%ig. A. verfilzte Nadeln. F. 157—158°. Sintern bei 152°. In A., Chlf., Ä. ll. In W. swl. *Chloroozodihydrokodeinpikrat*, $C_{24}H_{25}O_{11}N_4Cl$. Aus Eg. Nadeln. Zers. bei 249—250°. — *Acetylozodihydrokodein* (II). Dunkelbraunes Öl. Daraus *Pikrat*, $C_{26}H_{28}O_{13}N_4$. Aus verd. A. Nadeln. Zers. bei 208—209°. — *Dihydromorphinsäure* (IV), $C_{17}H_{23}O_6N$. Aus 96%ig. A. Nadeln. Sintern bei 195°. Zers. bei 227°. In W. u. Eg. ll., in Aceton, Ä., Bzl. u. Chlf. swl. $[\alpha]_D^{16} = +30,9^\circ$. (W.; $c = 1,838$.) — *Ozodihydroäthylmorphin* (V), rotgelbes, viscoses Öl. In W., A., Ä. u. Chlf. ll. *Ozodihydroäthylmorphinjodhydrat*, $C_{19}H_{25}O_5N$, HJ. Aus A. u. einigen Tropfen W. Nadeln. Zers. bei 255—256°. $[\alpha]_D^{17} = +69,1^\circ$. (W.; $c = 2,508$.) — *Dihydromorphinsäure* aus V ident. mit IV. — Die Red. von I mit Zn-Staub u. CH_3COOH liefert ein Öl u. daraus ein *Chlorhydrat*, $C_{18}H_{27}O_5N$, HCl, Prismen. F. 232—233°. Ausbeute 5% der Theorie. — Die Elektrolyt. Red. von I führte zur *5-Desoxydihydromorphinsäure* (VI), $C_{17}H_{23}O_5N$. Aus wss. A. + Ä. Nadeln. Bei 245° Sintern; F. 248° (Zers.), $[\alpha]_D^{17} = +28,3^\circ$. (W. $c = 5,0$.) *Pikrat*, $C_{23}H_{26}O_{12}N_4$. Aus A. Nadeln. Zers. bei 222—223°. — Die Red. des Hydrochlorids von I mit Pd- H_2 lieferte *5-Desoxydihydromorphinsäure-3-methylesterchlorhydrat* (VII), $C_{18}H_{25}O_5N$, HCl. Aus wss. A. Blättchen. F. 247—248°. $[\alpha]_D^{18} = +13^\circ$ (W.; $c = 5,0$). — Aus I u. Pd + H_2 resultierte *5-Desoxydihydromorphinsäure-3-methylester* (VIII), $C_{18}H_{25}O_5N$. Aus 96%ig. A. Prismen. F. 150—151°. Ll. in W. Ä., Chlf. *5-Desoxy-dihydro-morphinsäure-3-methylester-jodhydrat*, $C_{18}H_{25}O_5N$, HJ. Aus wss. A. Blättchen. Zers. bei 195°. *5-Desoxydihydromorphinsäure-3-methylesterpikrat*, $C_{24}H_{28}O_{12}N_4$. Aus Eg. Nadeln. Zers. bei 228—229°. *5-Desoxydihydromorphinsäure-3-methylesterjodmethylyat*, $C_{18}H_{25}O_5N$, CH_3J . Aus wss. A. Prismen. F. 183—184°. — *Acetyl-5-desoxydihydromorphinsäure-3-methylester*. Öl. *Jodmethylyat*, $C_{21}H_{30}O_6N$, J, aus 70%ig. A. Zu Drusen vereinigte Nadeln. Zers. bei 225°. — *Chloro-5-desoxydihydromorphinsäure-3-methylester*, $C_{18}H_{24}O_4NCl$. Aus 96%ig. A. Säulen. F. 143°. In A., Ä. Chlf. ll., in W. swl. *Pikrat*, $C_{24}H_{27}O_{11}N_4Cl$, aus 96%ig. A. Blättchen. Zers. bei 211° bis 214°. — Die Verseifung von VII lieferte VI. — *5-Desoxydihydromorphinsäure-3-äthylester*. Öl. *Pikrat*, $C_{25}H_{30}O_{12}N_4$. Aus verd. A. Nadelchen. Zers. bei 234—235°. Auch der Äthylester lieferte nach der Verseifung VI. — Wss. Lsg. von IV mit H_2 gesätt. Pd-Kohle in einer H_2 -Atmosphäre geschüttelt. 1 Mol. H_2 aufgenommen. *Tetrahydromorphinsäure*, $C_{17}H_{25}O_6N$ (VIII oder IX). Aus 96%ig. A. Stäbchen. Sintern bei 202°. F. 217—218°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 390—406. Frankfurt a. M. Univ.)

BEREND.

F. v. Bruchhausen und Katsuji Saway, *Über die Alkaloide von Corydalis cava: Corybulbin und i-Corybulbin*. Die Veröffentlichung der Verss. von SPÄTH u. DOBROWSKY (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1247; C. **1925**. II. 1165) veranlaßt Vff. zum Abbruch ihrer Unterss. u. zur Mitteilung der bisherigen Resultate. — Zur Darst. der *Methyl-äthyl-äther-nor-m-hemipinsäure* gehen Vff. vom Kreosoläthyläther (I) aus. Dieser kondensiert sich mit CH_3COCl u. AlCl_3 zum 3-Methoxy-4-äthoxy-6-acetotoluol (II). Bei der Oxydation in sodaalkal. Lsg. mit Permanganat entsteht daraus 2-Methyl-4-methoxy-5-äthoxybenzoesäure (III) u. 2-Methyl-4-methoxy-5-äthoxybenzoylameisensäure (IV), die bei der Oxydation mit H_2O_2 u. Alkali glatt in III übergeht. Bei weiterer energ. Oxydation mit Permanganat entsteht *Methyl-äthyl-äther-nor-m-hemipinsäure* (V). Das hieraus hergestellte Äthylimid schm. bei 205° , in Übereinstimmung mit den Angaben von SPÄTH u. DOBROWSKY.




Versuche. Kreosoläthyläther (I), Kp_{11} $108-110^\circ$. 3-Methoxy-4-äthoxy-6-acetotoluol (II), Kp_{11} $156-160^\circ$. Aus Bzn. Nadeln. F. $50-51^\circ$. — Oxim. Aus Bzn. F. 99 bis 100° . — Semicarbazon. Aus W.-A. Nadeln. F. $185-186^\circ$. — Die Oxydation von II mit KMnO_4 gibt 2-Methyl-4-methoxy-5-äthoxybenzoesäure (III), $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_4$ u. 2-Methyl-4-methoxy-5-äthoxybenzoylameisensäure (IV), $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_5$, die durch fraktionierte Ausschüttelung getrennt werden. — IV aus 30%ig. CH_3COOH Nadeln. F. $75-77^\circ$. Methylester. Aus wasserfreiem CH_3OH . F. $108-109^\circ$. — III aus 30%ig. CH_3COOH Nadeln. F. $180-183^\circ$. Methylester. Aus CH_3OH Nadelchen. F. $64-65^\circ$. — Oxydation von III in Sodalslg. mit KMnO_4 -Lsg. in der Siedehitze zu Methyl-äthyl-äther-nor-m-hemipinsäure, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_6$ (V). Trennung der entstandenen Dicarbonsäure vom unangegriffenen Ausgangsmaterial mittels der Ba-Salze. F. der freien Säure $184-185^\circ$. — Äthylimid. Sublimation bei 185° . Aus A. F. 205° . (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **263**. 602—05. 1925.)

BEREND.

F. v. Bruchhausen, *Über die Konstitution des Corycavidins und Corycavamins*. (Vgl. GADAMER u. v. BRUCHHAUSEN, Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **260**. 97; C. **1923**. III. 68.) GADAMER gibt für Corycavidin die empir. Formel $\text{C}_{22}\text{H}_{25}\text{O}_5\text{N}$ an. 2 O-Atome wurden von ihm als Methoxylsauerstoffatome, 2 weitere O-Atome als zu einer Dioxymethylengruppe gehörig erkannt. Vorliegende Unterss. bestätigen die Ergebnisse GADAMERS. Um die Funktion des 5. O-Atoms aufzuklären, wurde eine Umlagerung mit CH_3COCl zur quartären Isoverb., wie sie bei den Zehnerringbasen bisher immer beobachtet war, versucht. Sie trat jedoch nicht ein; ebensowenig gelang die Feststellung einer CO-Gruppe mittels NH_2OH oder Semicarbazid. Die Methylierung u. Aufspaltung des Methosulfates des Corycavidins mit Na-Amalgam in saurer Lsg. führte zu einer tertiären Base, die opt. akt. war u. als ein Tetrahydro-methylderiv. $\text{C}_{23}\text{H}_{31}\text{O}_5\text{N}$ erkannt wurde. Verss., die gleichzeitig eingetretene Red. einer Carbonylgruppe zur sekundären Alkoholgruppe durch Veresterung der entstandenen Hydroxylgruppe mit CH_3COCl nachzuweisen, führten statt dessen unter Wasserabspaltung zu einer inakt. Anhydrobase. Dieser Vorgang erinnert an das Verh. des Toluylenhydrates, das gleichfalls unter der Einw. verd. Säuren W. abspaltet u. in Stilben übergeht. Durch den Übergang des opt.-akt. Tetrahydroprod. in das inakt. Anhydroprod. wird der Ort der as. C-Atome festgelegt u. mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der des ursprünglichen as. C-Atoms. Nach der Annahme eines toluylenhydratartigen Körpers muß das ursprüngliche as. C-Atom zwischen 2 Phenylresten stehen. — Die Oxydation des Anhydroprod. durch Einw. von KMnO_4 auf das neutrale

Acetat des Anhydrotetrahydromethylcorycavidins, $C_{23}H_{29}O_4N$ ergab 5 Spaltstücke: einen mit W.-Dämpfen flüchtigen neutralen Körper vom F. $70-71^\circ$ (I), eine in Ä. ll. Säure vom F. 183° (II), eine in Ä. swl. Säure vom F. 243° (III), einen N-haltigen Aldehyd: *N-Methylhydrastinin* (IV), eine N-haltige Säure mit innerer Salzbildung: *4,5-Dioxymethylen-2,β-dimethylaminoäthylbenzoesäure*. I ist ein Körper von der Formel $C_{11}H_{14}O_3$, dessen O-Funktionen als Methoxylsauerstoff u. Carbonylsauerstoff bestimmt wurden. Durch die Rk. mit Hypojodit, wobei neben Jodoform die Säure II entsteht, wurde der Körper als *Methylacetovertatron*, $C_{11}H_{14}O_3$ erkannt. Zus. u. Eigenschaften von II stimmen mit den von PERKIN (vgl. Journ. Chem. Soc. London **109**. 815; C. **1917**. I. 236.) für *Methylveratrumsäure*, $C_{10}H_{12}O_4$ gefundenen Werten überein. Zum Vergleich wurden Methylacetovertatron u. Methylveratrumsäure vom o-Kresol ausgehend durch Synthese u. auch durch Abbau des Corydalins dargestellt. — III ist eine hochmolekulare, N-freie Säure, wahrscheinlich durch Aboxydation der Dimethylaminoäthylseitenkette zur Carboxylgruppe entstanden. Sie wurde infolge der geringen Ausbeuten nicht weiter untersucht. — Aus diesen Oxydationsergebnissen folgt für das *Anhydrotetrahydromethylcorycavidin* die Strukturformel V. Daraus leitet sich die Formel des *Tetrahydromethylcorycavidins* als das dem Stilbenderiv. V zugehörige Toluylenhydrat VI ab. Die Formel des *Corycavidins* wurde rückschließend daraus als das dem Toluylenhydrat entsprechende Desoxybenzoinderiv. aufgefaßt gemäß VII. — Bei der Behandlung des Corycavidins mit Chlorkohlensäureäthylester trat eine ansehnliche Aufspaltung ein, was zu gewissen Bedenken gegen Formel VII Anlaß gab. Das hierbei erhaltene Urethan VIII war im Gegensatz zum Ausgangsmaterial linksdrehend u. enthielt locker gebundenes Cl im Mol., ein bisher in der Papaveraceenreihe nicht beobachteter Fall. Immerhin gibt Formel VII noch den besten Ausdruck für das Verh. des Corycavidins. Hiermit steht auch das Verh. der Methinbase, wie sie von GADAMER dargestellt worden war, in Einklang. Ferner wird durch diese Formulierung eine Erklärung der Tatsache erreicht, daß Corycavidin der Umlagerung in die Isoverb. Widerstand entgegensetzt. Beim Corycavin, das sich leicht umlagern läßt, mußte aus opt. Gründen die Enolkonfiguration angenommen werden. Bei dieser Formulierung brauchte nur die OH-Gruppe an den Stickstoff überzutreten, um die Isoverb. zu liefern IX $\rightarrow$ X. Beim Corycavidin muß, gleichfalls aus opt. Gründen die Ketoform XI angenommen werden, bei der die Möglichkeit einer Umlagerung erst dann besteht, wenn die Verb. in die Enolform IX übergegangen ist. Das Reduktionsprod., *Dihydrocorycavidin*, mußte dann in seine Isoverb. umgelagert werden können. Unter dem Einfluß von CH_3COCl trat diese Umlagerung in eine quartäre Form (XII), die sich vom 4-Methyltetrahydroberberinchlormethylat nur durch die opt. Aktivität unterscheidet, in der Tat ein. Beim Verkochen mit NaOH entsteht aus beiden Prodd. die gleiche Des-Base vom F. 161° , der aus Analogieschlüssen u. aus opt. Gründen die Struktur XIII zuerteilt wird. Durch diese Identität findet die Formel VII für das Corycavidin ihre letzte Bestätigung. — *Corycavamin*, $C_{21}H_{21}N$. Das dritte Alkaloid der Corycavingruppe ist das von GADAMER (vgl. Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **240**. 81; C. **1902**. I. 819) entdeckte u. mit ZIEGENBEIN u. WAGNER untersuchte opt.-akt. *Corycavamin*. Es enthält 2 Dioxymethylengruppen. Der Stickstoff ist monomethyliert. Wegen der nahen Beziehung zum Corycavin wurde dem Corycavamin eine dem gleichfalls opt.-akt. Corycavidin analoge Struktur XIV zuerteilt, nach der es die desmotrope Form des Corycavins XV ist. Bewiesen wurde diese Formulierung durch Überführen des opt.-akt. Corycavamins beim Erhitzen im H_2 -Strom in das opt.-inakt. Corycavin. Ein weiterer Beweis wurde durch die Darst. der Methinbase erbracht, die ident. ist mit dem aus Corycavin analog abgeleiteten Prod.

Versuche. Trennung des Corycavidins vom Corycavin über die Chlorhydrate Corycavidin aus viel CH_3OH umkrystallisiert. Empir. Formel des Corycavidins:



Corycavamin (Ketoform)

Corycavin (Enolform)

$C_{22}H_{25}O_5N$ durch analyt. Daten des Vf. bestätigt. $[\alpha]_D^{20} = +210,8^\circ$ (CH_3OH ; $c = 1,5508$). — *Methosulfat*, aus W. zu Büscheln vereinigte Nadeln. F. $220-222^\circ$, unter vorherigem Sintern bei 208° . $[\alpha]_D^{20} = +16^\circ$ (50% ig. A.; $c = 1,732$). Daraus mit K.J. Jodmethylat. $[\alpha]_D^{20} = -11^\circ$ (50% ig. A.; $c = 1,816$). — Aus dem Methosulfat mit Na-Amalgam *Tetrahydromethylcorycavidin*, $C_{23}H_{31}O_5N$. Amorph. *Hydrochlorid*, aus Aceton Prismen, F. 190° . Für die Rohbase $[\alpha]_D^{20} = +36^\circ$ ($CHCl_3$; $c = 1,752$). Über das Chlorhydrat gereinigt $[\alpha]_D^{20} = +39,9$ ($CHCl_3$; $c = 6,428$). Pt.-Salz kugelförmige Gebilde, F. $164-165^\circ$ (Zers.). — *Anhydrotetrahydromethylcorycavidin*, $C_{23}H_{29}O_4N$. Durch Eindampfen einer salzsauren Lsg. von Tetrahydromethylcorycavidin auf dem

W.-Bad. Chlorhydrat der Anhydrobase aus W., Nadeln, F. 233—235°. Anhydrobase amorph. In Chlf. findet ohne HBr-Entwicklung Br-Aufnahme statt. Br-Additionsprod. aus Aceton Drusen, F. 213—214°. — *Nitrat*, $C_{23}H_{29}O_4N \cdot HNO_3$, gelblich schiefwürflige Krystalle. — *Methylacetoveratron* (2,3-Dimethoxy-6-acetotoluol) $C_6H_2CH_3(OCH_3)_2COCH_3$. Aus PAe. sechseckige Tafeln. F. 70—71°. Daraus durch Oxydation mit Hypojodit *Methylveratrumsäure*. Aus 50%ig. CH_3COOH , F. 182—183°. Sublimiert leicht bei 75°. *Semicarbazon* des Methylacetoveratrone $C_{12}H_{17}N_3O_3$. Während des Erhitzens auf dem W.-Bad Nadeln, F. 235—236°. Aus CH_3OH F. 203°, Sinter bei 198°. — *Methylveratrumsäure* (2-Methyl-3,4-dimethoxybenzoesäure), $C_{10}H_{12}O_4$. Aus 50%ig. CH_3COOH Nadelbüschel, F. 183°. — *Säure vom F. 243°*. Aus verd. E_2 schwach gelbliche Nadeln. — *N-Methylhydrastinin* (4,5-Dioxymethylen-2- β -dimethylaminoäthylbenzaldehyd). Nicht isoliert, sondern als Trimethylhydrastylammoniumjodid identifiziert. — *4,5-Dioxymethylen-2- β -dimethylaminoäthylbenzoesäure* (CH_2O_2 , $C_6H_2CH_2 \cdot CH_2 \cdot N(CH_3)_2COOH$). Hg-Doppelsalz aus 50%ig. A., F. 202°. Au-Salz aus wss. CH_3OH Flitter, F. 202—203°. — Zur synthet. Darst. der Methylveratrumsäure wurde — nach verglichenen Verss. mit Ψ -Mekonin — o-Kresol als Ausgangsmaterial benutzt. Aus dem trockenen Na-Salz des o-Nitrokresols mit Dimethylsulfat *o-Nitrokresolmethyläther*, $C_6H_3(CH_3)^1(OCH_3)^2(NO_2)^3$. Daraus durch Red. m. Sn u. konz. HCl *Amidokresolmethyläther*, $C_6H_3(CH_3)^1(OCH_3)^2(NH_2)^3$. — *3-Oxy-2-Methoxytoluol*, $C_6H_3(CH_3)(OCH_3)^2(OH)^3$. Destilliert bei 208—209°. — *2,3-Dimethoxytoluol*, $C_6H_3CH_3(OCH_3)_2$, Kp_{15} 115—117°. Aus 5-Nitro-2,3-dimethoxytoluol (vg. MAJIMA u. OKAZAKI, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **49**. 1482; C. **1916**. II. 175) durch weitere Nitrierung 5,6-Dinitroderiv. Partielle Red. zum 6-Nitro-2,3-dimethoxytoluol ergebnislos. — 2,3-Dimethoxytoluol liefert bei der Kondensation mit CH_3COCl und $AlCl_3$ nur *6-Aceto-2,3-dimethoxytoluol*. Aus PAe., F. 70°. Ident. mit dem durch Oxydation aus Corycavidin dargestellten Prod. Bei der Oxydation mit $KMnO_4$ aus beiden Methylketonen viel Säure vom F. 130—135°, wahrscheinlich die entsprechende α -Ketosäure; geht beim Erwärmen mit alkal. H_2O_2 in Methylveratrumsäure über. — Aus Corycavidin mit Chlorkohlensäureäthylester das *Urethan*, $C_{25}H_{20}O_7NCl$, aus verd. CH_3OH , F. 91°. $[\alpha]_D^{20} = -111^\circ$ (Chlf.; $c = 0,9765$). Das in gleicher Weise aus dem inakt. Corycavidin erhaltene *Urethan* bildet sternförmige Nadeln, F. 129°. — *Dihydrocorycavidin*, $C_{22}H_{22}O_5N$, durch Red. des Corycavidins mit Na-Amalgam in schwach saurer Lsg. Aus CH_3OH + W. Nadeln. F. 147—148° (unscharf) $[\alpha]_D^{20} = -44^\circ$ (Chlf.; $c = 0,7900$). Salze dieser Base sämtlich ll. — Daraus mit CH_3COCl *i-Dihydrocorycavidinchlorid*. Strahlig krystallisierende M. $[\alpha]_D^{20} = +ca. 104^\circ$ ($c = 2,95$). Durch Fällen des Chlorids mit KJ *Jodid*. Aus 50%ig. A. F. 152°. Aus dem Chlorid Des-N-methyl-4-methyltetrahydroberberin. Aus CH_3OH . F. 160—161°. Opt.-inakt. — Aus *Dihydroberberin*, F. 164°, *4-Methyldihydroberberin*. Aus Chlf.-A. F. 121—122° (Vgl. FREUND u. FLEISCHER, LIEBIGS Ann. **409**. 188; C. **1916**. I. 756.) Daraus *4-Methyltetrahydroberberin*. Aus Chlf.-A. Prismen. F. 211—212°. — *4-Methyltetrahydroberberinjodmethylat*. Aus verd. A. F. 245—247° (Zers.). — *Des-N-methyl-4-methyltetrahydroberberin*. Aus CH_3OH Prismen. F. 160—161°. — Die Base vom F. 191° aus *Corydalis cava* ist i-Corycavidin. Reinigung über das Chlorhydrat. Aus Ä. Prisme. F. 193—194°. Opt.-inakt. — *Corycavinin*. Durch Erhitzen des Corycavamins in H_2 -Strom auf 155° (5 Minuten) *Corycavin*. Aus Chlf. + A. Prismen. F. 216—218°. — *Methinbase*. Aus Chlf. + CH_3OH . F. 152—153°. Ident. mit dem von GAEBEL dargestellten Corycavinmethin. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **263**. 570—60 1925.)

BEREND.

H. HÉRISSEY und J. CHEYMOL, Über die aus Gein (Geosid) erhaltenen Zucker Gewinnung von Vicianose durch fermentative Spaltung dieses Glucosids. (Bull. Soc. Chim. Biol. **8**. 50—55. — C. **1926**. I. 2358.) LINDENBAUM.

A. W. van der Haar, *Untersuchungen über die Saponine und verwandte Körper*.
 XV. *Über das Aescigenin*. (XIV. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**. 740; C. **1925**. I. 571.) Die Saponine des Kastanienbaumes (*Aesculus Hippocastanum* L.), kurzweg *Aescin* genannt, sind ein Gemisch, das MASSON (Bull. Sciences Pharmacol. **20**. 65; C. **1918**. II. 40) in die W. l. Aesculininsäure u. die W. unl. Aesculinsäure getrennt hat. Vf. schlägt vor, besser von einem W. l. u. W. unl. *Aescin* zu sprechen. Die von MASSON bei der Hydrolyse erhaltenen Sapogenine sind infolge unvollständiger Hydrolyse keine reinen Verbb. Vf. erhielt aus dem unl. Aescin das *Aescigenin*. Er fand, ebenso wie WINTERSTEIN (Diss. Techn. Hochschule Zürich, 1923) das Sapogenin schwer hydrolysierbar, hält aber die von WINTERSTEIN geäußerte Ansicht, das Endsapogenin sei ein Tiglinsäureester für unwahrscheinlich. Das *Aescigenin* ist ein dreiwertiger Alkohol der Formel $C_{21}H_{36}O_4$ (aus den Analysen von ROCHLEDER, Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien **45**. 675 [1862] **56**. 39 [1867], berechnet sich die Formel $C_{22}H_{36}O_4$). n_D^{20} 310—311° (WINTERSTEIN fand 304°), $\alpha_D = 35,28^\circ$ in Eg. (WINTERSTEIN fand n_D^{20} 26,75°). Es gibt die Liebermannsche Cholestolprobe, die Salkowsky-Hessesche Rk. u. mit H_2SO_4 die violette Saponinrk.; mit Br ein Bromsubstitutionsprod. vom Smp. 167—175°. Die Zinkstaubdest. gab terpenartige Verbb., die nicht rein erhalten wurden. — Darst. des Saponingemisches: 13 kg entfetteter Samen werden dreimal mit 95%ig. A. ausgekocht, zur Trockne verdampft, Rückstand in CH_3OH gelöst, das Saponin mit Ä. gefällt. Seine wss. Lsg. gibt nach der Dialyse u. dem Eindampfen das Saponin. — Hydrolyse des Saponins: Saponin wird mit 2%ig. H_2SO_4 2 Stdn. gekocht, das ausgefallene Sapogenin mit 6%ig. H_2SO_4 6 Stdn., dann mit 4%ig. in 10%ig. A., weiter mit 5%ig. in 70%ig. A. u. schließlich mit 5%ig. HCl in 50%ig. A. gekocht. Das filtrierte, getrocknete Sapogenin wird in absol. A. gel., mit n. alkoh. KOH u. Ä. versetzt u. das Filtrat nach dem Ansäuern mit HCl verdampft. Rückstand gibt nach dem Umkrystallisieren aus 70—90%ig. A. Sapogenin in glänzenden Nadeln. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **45**. 271—77. Utrecht.) BRAUNS.

Helene Goldman, *Über das Tartarylhämin von Stefan Hajdu*. Neue Analysen an dem von HAJDU (S. 706) hergestellten Präparat nach Beseitigung eines Gebrechens an dem von jenem benutzten App. für Elementaranalyse. C entsprach jetzt annähernd dem früher von einem auswärtigen Analytiker erhaltenen u. auch dem theoret. Wert, N blieb unter, Fe über diesem. (Biochem. Ztschr. **168**. 456. Budapest, K. Ungar. Univ.) SPIEGEL.

Harold Ward Dudley und **Otto Rosenheim**, *Die chemische Konstitution des Spermins*. II. *Die Methylierung des Spermins*. (I. vgl. Biochemical Journ. **18**. 1263; C. **1925**. I. 1090.) Die Methylierung erfolgte mit CH_3J in CH_4O unter allmählichem Zusatz von methylalkoh. KOH. Die HJ-Salze wurden in HCl-Salze verwandelt, aus der wss. Lsg. das $HgCl_2$ -Doppelsalz des *Dekamethylspermins* abgeschieden u. mit H_2S zerlegt, aus der nun erhaltenen Lsg. das Pikrat abgeschieden, aus dem dann das HCl-Salz u. die anderen Salze bereitet wurden. — *Dekamethylspermin*, $C_{20}H_{50}O_4$. Chlorid, sehr hygroskop., gibt mit J-KJ-Lsg. schokoladenbraunen, krystallin. Nd., mit alkoh. Lsg. von $ZnCl_2$ ebenfalls krystallin. Nd. *Chloraurat*, $C_{20}H_{50}N_4(AuCl_4)_4$, prismat. Nadeln aus 15%ig. HCl, F. 278—280° (Zers.), wl. in W., ll. in wss. Aceton, woraus es in Nadeln krystallisiert. *Chloroplatinat*, $C_{20}H_{50}N_4(PtCl_6)_2$, stumpforangefarbene, in Form von NH_4Cl ähnliche Kryställchen aus 15%ig. HCl, F. 286—288° (Zers.), swl. in W. A. *Tetrapikrat*, $C_{20}H_{50}N_4(C_6H_2O_7N_3)_4$, Nadeln (aus W.), F. 272—274° (Zers.), swl. in W., bei Zimmertemp. ca. 1:6500. *HgCl₂-Doppelsalz*, sternförmige Gruppen von Kristallen (aus verd. HCl), swl. in k. W. (Biochemical Journ. **19**. 1032—33. 1925. Mount Vernon, Nat. Inst. f. med. res.) SPIEGEL.

Harold Ward Dudley und **Otto Rosenheim**, *Mitteilungen über Spermin*. (vgl. vorst. Ref.) Spermin hat sich als ident. erwiesen mit dem *Musculamin* von ÉTARD VILA (C. r. d. l'Acad. des sciences **135**. 698. **136**. 1285; C. **1902**. II. 1365. **1903**.

II. 127), mit dem *Neuridin* von BRIEGER (Ptomaine [1885]) u. dem *Gerontin* von GRANDIS (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma 6. 213 [1890]). — Unterss. über die Verteilung des Spermins in tier. Geweben u. Hefe ergaben, daß es in Bullensamen, Rinderblut, Kuhmilch u. Hühnereiern fehlt. Es kann danach weder für die Befruchtung allgemein, noch für Entw. u. Wachstum des jungen Tieres von wesentlicher Bedeutung sein. **J. C. Drummond** stellte fest, daß Spermin das Vitamin B nicht zu ersetzen vermag, **R. A. Peters**, daß es nicht antineurit. wirkt, **A. Harden**, daß es nicht als Coenzym bei der alkoh. Gärung fungiert. (Biochemical Journ. 19. 1034—36. 1925. Mount Vernon, Nat. Inst. f. med. res.)

SPIEGEL.

Rudolf Engeland, *Ein neues Hydrolysenprodukt aus Elastin*. Elastin enthält kein oder sehr wenig Tyrosin, trotz starker Millonscher Rk. Aus dem zum Sirup verdampften, dann mit W. bis zum 8-fachen Gewicht des angewandten luftgetrockneten Elastins verd. Hydrolysegemisch wurden die bas. Prodd. durch 50%ig. Phosphorwolframsäure gefällt u. mit 5%ig. H_2SO_4 gewaschen. Der Nd. wurde mit $Pb(OH)_2$ dann vorsichtig mit $Ba(OH)_2$ behandelt, aus der Lsg. Pb mit H_2S entfernt, das in Vakuum zu dünnem Sirup eingedampfte Filtrat mit $Cu(OH)_2$ gekocht. Aus dem wieder stark konz. Filtrat schied sich nach Zusatz von $CH_3 \cdot OH$ bis zu starker Trübung bei 0° ein tiefblaues Cu-Salz ab, das nach Wegwaschen nebenbei entstandener brauner Flocken in eiskaltem W. suspendiert u. mit H_2S zerlegt wurde. Die resultierende Lsg. gab nach Einengen lange weiße Nadeln. Diese, aus verd. $CH_3 \cdot OH$ umkristallisiert, als *Hyphasmin* bezeichnet, hatte Zus. $C_{15}H_{22}O_5N_2$ oder $C_{15}H_{20}O_5N_2$, wahrscheinlicher $C_{16}H_{24}O_5N_2$, wofür die Analyse des *Cu-Salzes*, $C_{16}H_{22}O_5N_2Cu$, dunkelblaue Nadeln, swl. in W., spricht. Die freie Substanz schmeckt etwas bitter, ist zl. in W. u. Eg., gibt bei Eindampfen der wss. Lsg. (Braunfärbung) oder bei Behandlung mit Oxydationsmitteln wie $NaClO_3 + HCl$ charakterist., blumenartigen Geruch, mit konz. HNO_3 bei Kochen leichte, mit NH_3 intensiver werdende Gelbfärbung, mit MILLONS Reagens schon in der Kälte Rosafärbung (weniger intensiv als bei Tyrosin) mit Diazobenzolsulfosäure in Na_2CO_3 -Lsg. Orangefärbung, mit Russulainfus in Ggw. von Luft Rotfärbung mit blauem Schein, nach Stdn. bläulichbraun werdend. Bei Erhitzen Verfärbung bei ca. 200°, Sintern ca. 220°. In Hühnereiermembran kommt dieser Stoff nicht nachgewiesen werden. (Biochemical Journ. 19. 850—51. 1925. München.)

SPIEGEL.

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

Marc Bridel, *Über das Vorkommen von zwei neuen Fermenten, der Primverosidas und Primverase im Emulsin aus Mandeln*. (Vgl. S. 1211.) Nachzutragen sind folgende experimentelle Angaben. Bei Einw. von 5 g Emulsin auf 5,0245 g *Monotropitosin* in 250 ccm dest. W. (+ Toluol) bei 30° wird nach 4 Wochen ein starker Geruch nach Salicylsäuremethylester bemerkt. Die Unters. der gebildeten Zucker ergab, daß die Spaltung nicht bei der Hydrolyse des Monotropitosides zu Salicylsäuremethylester-Primverose stehengeblieben war, sondern daß die Primverose weiter zu Xylose-Glucose gespalten wurde. (Bull. Soc. Chim. Biol. 8. 67—69.)

HESSE.

Mihovil Gračanin, *Ein Beitrag zur Kenntnis der Katalasewirkung bei autotroph pflanzlichen*. Untersucht wird die Tätigkeit der Katalase beim Keimen von *Pisum sativum*, *Avena sativa*, *Hordeum vulgare*, *Zea mays*, *Sinapis alba*, *Pisum arvense*. Von den auf feuchtem Filtrierpapier gekeimten Samen wurde jeden Tag eine Probe entnommen bei 40° getrocknet, gemahlen u. die Fähigkeit dieses Mehles zur Zers. von H_2O_2 in *Katalasometer* von DUCHOU (Zemědělský-Archiv 12. 399 [1925]) bestimmt. Der API, welcher im Original abgebildet ist, gestattet unter vollständigem Verschuß das Pe-
hydrol zu dem Mehl zu geben u. den gebildeten O_2 in einem Meßrohr aufzufangen

Die Wrkg. der Katalase steigt mit der Dauer des Keimens u. erreicht am fünften Tage ein Maximum. Die für die einzelnen Samen erhaltenen Kurven sind sehr ähnlich; nur bei *Pisum sativum* u. *Sinapis alba* beobachtet man nach einem Tage eine Abnahme, der dann ein rasches Steigen der Katalasewrkg. folgt. — Über die Verteilung der Katalase werden folgende Angaben gemacht. Bei den geprüften Dikotyledonen (*Pisum sativum*, *Lupinus angustifolius*, *Sinapis alba*, *Citrus nobilis*) findet man die Katalase hauptsächlich im Embryo u. in den Kotyledonen. Bei der monokotyledonen *Zea mays* findet sich das Enzym im Endosperm u. im Embryo. Die Testa hatten meist nur einen unbedeutenden Katalasegehalt. — In den Kotyledonen von *Pisum sativum* u. *Pisum arvense* steigt der Katalasegehalt bis zum 5. Tage u. fällt dann ab; in den Wurzeln steigt der Katalasegehalt sofort u. bleibt dann auf annähernd konstanter Höhe. In den Stengeln steigt der Katalasegehalt vom ersten Tage ab u. zwar rascher als in den Wurzeln. Vf. macht darauf aufmerksam, daß die Versuchsanordnung infolge der Veränderung, die die Katalase beim Trocknen erleiden kann, nicht ganz einwandfrei ist. Insbesondere kann der Gehalt an Katalase dabei erhöht werden, vgl. v. EULER u. BORGSTAMM, *Biochem. Ztschr.* **102**. 124; C. **1920**. I. 744. — Es wird dann noch über eine unveröffentlichte Arbeit von J. Válek berichtet. Danach findet man in völlig entwickelten Pflanzen von *Lupinus angustifolius*, *Medicago sativa* u. *Zea mays*, daß die Blätter u. Wurzeln mehr Katalase enthalten als die Stengel. (*Biochem. Ztschr.* **168**. 429—42. Prag, Pflanzenphysiol. Inst. von Dr. NĚMEC.) HE.

Pierre Girard, *Bemerkung über den Mechanismus der Wirkung von proteolytischen Fermenten*. Polemik gegen HUGOUNENQ u. LOISELEUR (S. 1665) u. Hinweis auf eine frühere Arbeit des Vfs. (vgl. *Bull. Soc. Chim. Biol.* **7**. 75; C. **1925**. I. 1757). (*Bull. Soc. Chim. Biol.* **8**. 30—34.) HESSE.

Ludwig Pincussen, *Fermente und Licht*. VIII. **Franz Seligsohn**, *Katalase*. I. (VII. vgl. *Biochem. Ztschr.* **152**. 416; C. **1925**. I. 675.) Die Einw. von Strahlen auf ungereinigte Blutkatalase verläuft nach den früher für andere Fermente gefundenen Gesetzen. Die Wrkg. der Strahlung ist um so größer, je verdünnter die Lsg.; sie ist am stärksten am Punkt der optimalen Fermentwrkg.; Salzzusatz zur Fermentlsg. bewirkt infolge Vergrößerung der Kolloidteilchen eine relative Minderung der Strahlenwrkg. Durch im Licht abgespaltenes J wird die Fermentwrkg. abgeschwächt; st jedoch Salz im Überschuß vorhanden, so kommt diese Schädigung nicht zur vollen Auswirkung. — Es wird darauf hingewiesen, daß die in der Arbeit angegebene Methodik, insbesondere die Zeiten, genau eingehalten werden müssen. (*Biochem. Ztschr.* **168**. 157—63.) HESSE.

Ludwig Pincussen, *Über Veränderungen des Fermentgehaltes des Blutes*. **Franz Seligsohn**, II. Mitt. *Die Beeinflussbarkeit der Katalase*. (I. vgl. *Biochem. Ztschr.* **168**. 157; C. **1925**. II. 1888; vgl. auch vorst. Ref.) Untersucht wurde der Einfluß von subcutan injizierten Pharmacia, deren Einfluß auf das vegetative System bekannt ist, auf Katalase. Durch Injektion von Pilocarpin wurde die Katalasemenge in der entnommenen Blutprobe vergrößert. Adrenalin schädigt dagegen das Ferment. Darauf folgende Injektion von Insulin steigerte in einem Falle die Schädigung, während in einem zweiten Beispiel das Insulin die durch Adrenalin bewirkte Schädigung aufhob. Wurde erst Insulin u. dann Adrenalin injiziert, so fand man eine Schädigung durch Insulin, die durch Adrenalin fast völlig ausgeglichen wurde. — Injektion von KCN-Lsg. führte zu nicht eindeutigen Ergebnissen. Meist wurde zunächst eine Vergrößerung der Katalasewrkg. beobachtet, die dann bald verschwand. (*Biochem. Ztschr.* **168**. 464—73. Berlin, Urbankrankenhaus.) HESSE.

Ludwig Pincussen, *Über Veränderungen des Fermentgehaltes des Blutes*. III. Mitt. *Die Beeinflussung der Katalase durch Strahlung*. (II. vgl. vorst. Ref.) Es wurden Verss. mit Kaninchen angestellt; die Bestrahlung erfolgte nicht mehr mit künstlichem Licht, sondern mit Sonnenlicht. — In allen Fällen fand man nach der Be-

strahlung eine deutliche Abnahme des Katalasegehaltes des Blutes. Es scheint, daß das Höhenklima keinen spezif. Einfluß hat. (Biochem. Ztschr. 168. 474—80. Davos, Schweizer. Inst. f. Hochgebirgsphysiologie.) HESSE.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

S. L. Jodidi, *Stickstoff-Stoffwechsel in Maissamen bei Ausschluß von Licht*. Durch den Keimungsvorgang — bei Ausschluß von Licht — werden in 8 Tagen bis zu 48% des Sameneiweiß in wasserlösliche N-Verbb. umgewandelt. Vom Keimbungsbeginn bis zum 8. Tage nehmen Säureamide u. Aminosäuren zu, Humin- u. Eiweiß-N dagegen ab. (Journ. Agricult. Research 31. 1149—64. 1925. Unit. Stat. Dep. of Agric.) TRÉNEL.

J. A. Larsen, *Methoden zur Stimulation von Samen der „western white-pine“*. Die verzögerte Keimung der genannten Samen kann lediglich durch die Undurchdringlichkeit der Samenhülle verursacht sein, weil sich die Erscheinung durch chem. Angriff (45 Min. in konz. H₂SO₄), durch mechan. Abschleifen u. durch niedere Temp. beseitigen ließ. (Journ. Agricult. Research 31. 889—99. 1925. Priest River Forest Exp. Stat.) TRÉNEL.

E. Petersohn, *Weitere Versuche über die Heranziehung der Katalysenwirkung von Samenkörnern zwecks Beurteilung der Keimfähigkeit und der Ursachen des Verlustes derselben*. Vf. benutzt die katalyt. Wrkg. der keimfähigen Samen auf die Zers. von H₂O₂ (etwa 2%ig.) ausüben, zur Erkennung der durch Hitze abgetöteten Samen von Rot- u. Weißkohl, Möhren. Bei Kümmel, Gurken u. Spinat versagte die Methode. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A 6. 291—94.) TRÉNEL.

Meirion Thomas, *Der einschränkende Einfluß von Kohlenstoffdioxyd. V. Eine quantitative Untersuchung über die Produktion von Äthylalkohol und Acetaldehyd durch Zellen der höheren Pflanzen in Beziehung zur Konzentration von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxyd. VI. hat mit der Neubergschen Methode die Anhäufung von A. u. Acetaldehyd in Äpfeln mit der Zeit unter verschiedenen Bedingungen untersucht. Keine dieser Verbb. häuft sich als Zwischen- oder Endprod. der Atmung von Apfelzellen in der Luft an oder wird durch das Apfelgewebe oxydiert. Bei Abwesenheit von O₂ ist die Atmung von zymas. Typus („anaerobe Zymasis“), indem sich A. u. Spuren Aldehyd in den Zellen anhäufen. CO₂ kann selbst in Ggw. von reichlichem O₂ die Atmung der Apfelzellen ebenfalls zu zymas. Typ umwandeln („CO₂-Zymasis“); bei CO₂-Konz. über 50% begann bei allen untersuchten Äpfeln diese Zymasis sofort, während sich bei Konz. von 10—30% sehr verschiedene Widerstandsfähigkeit ergab. Während bei anaerober Zymasis das Verhältnis A.:Aldehyd 50:1 ist, ist es bei CO₂-Zymasis in Ggw. von O₂ 2:1. Da der Aldehyd giftiger als A. ist, können Gemische von CO₂ u. O₂ schädlicher auf Äpfel wirken als anaerobe Bedingungen. (Biochemical Journ. 19. 927—47. Cambridge, Food Investigation Board; Low Temp. Res. Station.) SPIEGEL.*

C. G. Deuber, *Kaliumferrocyanid und Ferri-Ferrocyanid als eisenhaltige Pflanzennährstoffe*. K₄Fe(CN)₆ erzeugte bei Sojabohnen u. Spirodela polyrhiza bis Konz. von 0,066 p. p. m. Fe n. Wachstum, das durch höhere Konz. nur wenig verzögert wurde. Die Wachstumskurve von Sojabohne mit MERCK'S Ferri-Ferrocyanid als Eisenquelle zeigte zwei Maxima bei pH 5 u. pH 7,6 u. ein Minimum bei pH 6,4. (Soil Science 21. 23—26. Univ. of Missouri.) TRÉNEL.

Victor Henri, *Die spezifische photochemische Wirkung bei der Kohlensäureassimilation nach den Versuchen von Wurmser*. Vf. wendet sich gegen die Ausführungen von O. WARBURG (vgl. S. 1823) bzgl. Bemerkungen über die Verss. von WURMSE u. erläutert die Berechnungsmethoden der Absorption des Chlorophylls. Für die Assimilation im Rot ergibt sich eine Energieausbeute von 60%, im Grün nach WURMSE eine Energieausbeute von 70%, nach WARBURG u. NEGELEIN 44%. Die Kohlen-säureassimilation stellt eine Folge rein photochem. u. Dunkelrkk. dar u. unterscheidet

sich von den rein photochem. Rkk. dadurch, daß bei diesen stets die Energie eines Quants größer ist als die zur Rk. erforderliche Energie, während zur Assimilation 112 300 cal nötig sind u. die Energie eines Quants im Rot nur 43 200, im Grün 51 200 cal entspricht, womit die Frage nach der Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit des Einsteinschen Äquivalentgesetzes hinfällig wird. (Naturwissenschaften 14. 165—67. Zürich, Inst. f. physikal. Chemie.)

JOSEPHY.

Otto Warburg, *Erwiderung auf die Arbeit von Victor Henri: Die spezifische photochemische Wirkung bei der Kohlensäureassimilation nach den Versuchen von Wurmser.* (Vgl. HENRI, vorst. Ref.) Vf. bleibt der Ansicht, daß die Verss. von WURMSER keine sicheren Resultate liefern können. Den Ansichten HENRIS über die Kohlensäureassimilation stellt Vf. folgende Theorie gegenüber, die davon ausgeht, daß die Assimilation ein Vorgang ist, der sich an festen Grenzflächen abspielt. Vf. denkt sich das Chlorophyll an dem Chlorophyllkern in monomolekularer Schicht adsorbiert u. daran wieder die CO₂ adsorbiert. Durch Belichtung wird das Chlorophyll aktiviert, reduziert die CO₂ u. kehrt selbst wieder in den Ausgangszustand zurück. Dieser Vorgang muß sich mehrmals wiederholen, bis die CO₂ die Reduktionsstufe der Glucose erreicht hat. Nach vollendeter Assimilation löst sich das Endprod. ab u. wird durch ein neues CO₂-Mol. ersetzt. Nach dieser Auffassung reagieren die aktivierten Chlorophyllmoleküle, die zur vollständigen Red. der CO₂ nötig sind, nicht gleichzeitig mit der CO₂, sondern nacheinander u. red. die CO₂ stufenweise. Ferner schließt Vf. aus der roten Fluoreszenz des Lichts, die unabhängig von der Wellenlänge des erregenden Lichts ist, daß jeder Absorptionsvorgang, unabhängig von der Farbe des einstrahlenden Lichts, immer den gleichen aktivierten Zustand des Chlorophylls hervorbringt. Dann ist die Zahl der absorbierten Quanten, die zur Red. des CO₂-Mol. nötig ist, für alle Wellenlängen gleich, u. die spezif. photochem. Wrkg. muß sich mit der Wellenlänge so ändern, wie es das Einsteinsche Äquivalentgesetz verlangt. (Naturwissenschaften 14. 167—68. Berlin-Dahlem.)

JOSEPHY.

Elliot Q. Adams, *Die Energieausnutzung bei der Photosynthese durch Chlorella.* Vf. schreibt dem *b*-Chlorophyll die Formel C₅₅H₇₂O₆N₄Mg zu, die mit der Willstätterschen Formel innerhalb der Fehlergrenzen der organ. Elementaranalyse übereinstimmt, u. nimmt folgenden Reaktionscyclus bei der CO₂-Assimilation an: 1. *a*-Chlorophyll + H₂O + 2 Quanten ($\lambda = 666 \mu\mu$) $\rightarrow$ C₅₅H₇₂O₄N₄Mg + H₂O₂; 2. C₅₅H₇₂O₄N₄Mg + CO₂ $\rightarrow$ *b*-Chlorophyll; 3. *b*-Chlorophyll + H₂O + 2 Quanten ($\lambda = 640 \mu\mu$) $\rightarrow$ C₅₆H₇₂O₅N₄Mg + H₂O₂; 4. C₅₆H₇₂O₅N₄Mg + H₂O $\rightarrow$ *a*-Chlorophyll + Formaldehyd. Die Energie der absorbierten Quanten beträgt 174,4 Cal/mol, die Wärmetönung der Rk. CO₂ + 3H₂O = CH₂O₂ + HCHO ist -171,0 Cal/mol, woraus sich unter Benutzung der Daten von WARBURG u. NEGELEIN (Archives néerland. sc. exact. et nat. [3] 7. 415; C. 1923. I. 1130) über die Photosynthese durch die Alge Chlorella die Energieausnutzung in bezug auf die Formaldehydbildung im Rot im Mittel zu 91,6%, maximal zu 98,6% ergibt. Die Absorption von 2 Quanten durch das *a*- bzw. *b*-Chlorophyll wird mit der Ggw. von 2 konjugierten Ketten in ihren Moll. erklärt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 292—94. Cleveland [Ohio], Nela Research Labor.)

KRÜGER.

Maneck Merwanji Mehta, *Biochemische und histologische Studien über Holzbildung.* I. Teil. *Die Natur des Lignins: seine physiologische Bedeutung und seine Bestimmung in Stämmen.* Nach dem negativen Verh. bei der Xanthogenatrk. kann Lignocellulose weder eine esterartige noch eine Adsorptionsverb. sein. Auf Grund von Beobachtungen über die reaktiven Gruppen ihrer Konstituenten scheint das Lignin in hem. Bindung mit Cellulose u. anderen Polysacchariden zu einem arom. Glucosid getreten zu sein. Der arom. Bestandteil ist unmittelbar vor der Verholzung nicht von der Natur des „Hadromals“ (CZAPEK), da er nicht mit Phloroglucin, wohl aber mit Vanillin in konz. H₂SO₄ reagiert. Vanillin hat sich als empfindlichstes Reagens zur Lokalisierung der arom. Substanzen erwiesen, die später durch Oxydation in

Substanzen von Art des Hadromals verwandelt werden, die sich direkt mit Cellulose unter B. von Lignocellulose verbinden u. mit Phloroglucin positiv, mit Vanillin negativ reagieren. — Die Lignocellulose wird durch Erhitzen mit 4%ig. NaOH-Lsg. unter 10 at Druck in 1 Stde. vollständig in ihre Komponenten gespalten ohne radikale Spaltung des Lignins, das durch Säure aus der alkal. Lsg. gefällt u. durch Ausziehen mit A. quantitativ in reinem Zustande gewonnen werden kann. Im Holz findet sich Lignin zum Teil durch A. ausziehbar, hauptsächlich aber in durch Alkali spaltbarer Verb. mit Polysacchariden. Zum Nachweis des Lignins ist eine Lsg. von Phosphorwolframsäure u. Phosphormolybdänsäure in Phosphorsäure ein höchst empfindliches Reagens das mit ihm in Ggw. von Na_2CO_3 -Lsg. eine tiefblaue Färbung gibt. Unterss. über die Verteilung des Lignins in der schott. Tanne mit diesem Reagens ergaben die Ggw. von Lignin in jungen Zweigen wie auch in Blättern u. Knospen. — Das aus Holz isolierte Lignin ist braun, amorph, schwach sauer, von angenehm arom., zuweilen an Vanillin erinnernden Geruch, F. 170° , unl. in W., l. in verd. Alkalien u. A., J-Zahl 139, Säurewert 477. Mit alkal. Erdmetallen liefert es unl. Salze von unbestimmter Zus. — Bei der Spaltung der Lignocellulose durch Alkali bleibt ein Rückstand von reiner α -Cellulose (Biochemical Journ. 19. 958—78. 1925. Univ. of Birmingham.) SPIEGEL.

Maneck Merwanji Mehta, *Biochemische und histologische Studien über Holzbildung. II. Histologische Studien über die Polysaccharide und die aromatischen Bestandteile der Zellwand.* (I. vgl. vorst. Ref.) α -, β - u. γ -Cellulose, α -, β - u. γ -Hydrocellulose, Mannan, Galaktan, Pektin, Amylohemcellulose, Gummis, Stärke, Lichenin u. Chitin wurden in möglichst reiner Form hergestellt u. auf Färbbarkeit geprüft. β - u. γ -Cellulose zeigten größere Affinität gegen Farbstoffe als α -Cellulose, Oxycellulosen wurden in Gegensätze zu den Cellulosen u. zu Hydrocellulose durch Rutheniumrot gefärbt. Von Hydrocellulose konnten 2 Arten unterschieden werden, von denen sich nur eine mit J-KJ-Lsg. färbt. Die mikrochem. Struktur von Nadeln u. Stamm der Kiefer wurde durch Entfernung spezif. Bestandteile durch Behandlung mit Lösungsm., wie NH_3 , NH_4 -Oxalat, NaOH, HCl u. A. u. folgende Färbungen verschiedener Art untersucht. Die mittlere Lamelle junger Stämme zeigte sich aus neutraler Pektinsubstanz zusammengesetzt, während sie bei alten aus Lignin, Gummis u. Hemicellulose ohne Pektin besteht. Die Holzbildung beginnt sehr früh im Pflanzenleben u. findet sich in Grundgewebe, Fibrovaskulärbündeln, Mark u. Cuticularzellen. (Biochemical. Journ. 19. 979—97. 1925. Univ. of Birmingham.) SPIEGEL.

A. Lacassagne und A. Paulin, *Zerstörung des bakteriolytischen Prinzips durch die korpuskuläre Strahlung des Radiums.* Unter geeigneter Vers.-Anordnung wird das bakteriophag. Prinzip durch Ra-Em. wie die Toxine u. ultrafiltrierbare Vira zerstört (C. r. soc. de biologie 93. 1502—03. 1925.) OPPENHEIMER.

H. Bechhold und L. Villa, *Die Sichtbarmachung subvisibler Gebilde.* (Vgl. S. 2387.) Das zunächst durch eine dichte Chamberlandkerze filtrierte Virus wird durch ein Ultrafilter filtrierte, das den subvisiblen Erreger oder dergleichen zurückhält, feine disperse Bestandteile der Lsg. (Proteine u. dergleichen) aber durchläßt. Das so abgesonderte Virus wird durch AuCl_3 vergoldet, das überschüssige AuCl_3 auf einem Ultrafilter ausgewaschen, das vergoldete Virus auf Objektträger ausgestrichen, getrocknet u. verbrannt, dann durch Red. einer AuCl_3 -Lsg. zu kolloidalem Au in Ggw. von $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ verstärkt. Das Gebilde, eine Pseudomorphose des ursprünglichen Objekts, wird durch im Ultramikroskop für das Auge sichtbar. Pockenvirus bleibt auch hiernach unsichtbar, der d'Herellesche Bakteriophage wird, wenn in Haufen, gerade sichtbar. Dieser hat danach erheblich größeren Durchmesser als Hämoglobin u. Albuminteile u. als die kleinsten Kollargolteilchen (mittlerer Durchmesser $35 \mu\mu$). In der Größe zweier verschiedener Bakteriophagenstämme konnte trotz sehr verschiedener Phagie wrkg. kein Unterschied festgestellt werden. Die Bakteriophagen erscheinen nach diesem Verf. im Dunkelfeld als mäßig leuchtende, gelbliche bis rötliche Scheiben, d.

SPIEGEL.

SPIEGEL.

TRÉNEL.

SPIEGEL.

GUGGENHEIM.

E₄. Tierchemie.

OPPENHEIMER.

Ragnar Berg, *Das Vorkommen seltener Elemente in den Nahrungsmitteln und menschlichen Ausscheidungen*. (Vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **49**. 378; C. **1925**. II. 2112.) Vf. fand bei der genauen Unters. von Nahrungsmitteln eine Reihe von Metallen vor. Der früher als MnS angesprochene Nd. enthält Ni bis zu 2 mg auf 100 g Substanz, Spuren Co u. ziemlich viel Zn (in manchen Nahrungsmitteln, wie Spinat u. grünen Bohnen bis 20 mg ZnO in 100 g Substanz), Spuren von Thallium u. Pb, Cu bis zu Mengen von 1 mg in 100 g Substanz u. Spuren von Ti. Nach Unters. des Vfs. scheinen diese Schwermetalle auch in den menschl. Ausscheidungen vorzukommen. Über ihre Bedeutung für das Leben läßt sich noch nichts sagen. (Biochem. Ztschr. **165**. 461—62. 1925. Physiol. chem. Lab. Weißer Hirsch.) LASCH.

Emile André und **Th. François**, *Beitrag zur Kenntnis der Öle von Seetieren. Über das Pottwalöl und den Walrat*. (Vgl. S. 1827.) Die Angaben sowohl über das aus der Kopfhöhle als auch über das aus dem Unterhautfett (Speck) des Pottwals stammende Öl gehen auseinander. Nach den einen sollen es fl. Wachse, frei von Glyceriden, sein, nach anderen sollen sie bemerkenswerte Mengen letzterer enthalten. Vff. haben ein *Spermacetiöl* des Handels (I), ein *Specköl* (II) u. ein *Muskelfleischöl* (III), letztere beiden von einer Jagdexpedition stammend, untersucht. Ein Prod. letzterer Art ist bisher noch nie zur Unters. gekommen. In allen drei Prodd. wurde neben hochmolekularen Alkoholen Glycerin gefunden, u. zwar enthielten an Glycerin u. Alkoholen: I 1,8 u. 36,4, II 1,3 u. 40,0, III 5,5 u. 17,5%. Daraus folgt, daß I u. II zwar überwiegend Wachse darstellen, aber doch 13—18% Glyceride enthalten, während III zu mehr als der Hälfte aus letzteren besteht u. sich daher den gewöhnlichen Fetten nähert. — Im Anschluß hieran haben Vff. festgestellt, daß auch der feste Walrat des Handels Glycerin enthält, allerdings nur ca. 0,7%, entsprechend 7—8% Glyceriden. — Nach diesen Unterss. nehmen die aus dem Körper des Pottwals gewonnenen Fettstoffe eine Mittelstellung zwischen den n. Fetten u. den Wachsen ein. (C. r. l'Acad. des sciences **182**. 497—99.) LINDENBAUM.

A. Desgrez und **J. Meunier**, *Über die das Oxyhämoglobin des Pferdes begleitenden Mineralbestandteile*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 608. 1923; C. **1923**. III. 321.) Bei der ersten Krystallisation des Hämoglobins haften am Molekül: K, Na, Ca, L u. geringe Spuren Mr. Das Spektrum läßt das Überwiegen von K erkennen. Bei einer zweiten Krystallisation wird die Menge des letzteren vermindert ohne merkliche Abnahme des Ca. Bei Lufttrocknung des Prod. der 2. Krystallisation entstehen 2 Formen; die eine l. in W., ohne Li mit Ca, die andere unl. in W. mit dem gesamten Li K ist in keiner der beiden Typen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1029—31. 1925.) OP.

B. Moldawski, *Über Inosit im Pepsin*. Vf. extrahierte aus käuflichem Pepsin (von WITTE in Rostock) 85,3% Rohrzucker. Er macht wahrscheinlich, daß das vor RAKUSIN u. IWANOW (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **54**. 234; C. **1923**. III. 1038) aus Pepsin gewonnene Kohlehydrat gleichfalls Rohrzucker u. kein Inosit war. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 13—16. 1925. Charkow, Univ.) BIKERMAN.

Tamura Shizuaki, *Über den Gehalt des Muskels und Blutes an Fett und Lipoiden bei mit poliertem Reis gefütterten und bei unterernährten Hühnern*. Fütterung mit poliertem Reis hat Abnahme des Muskelfetts zur Folge. Cholesterin ist im Muskel weder bei Hunger- noch erkrankten Tieren vermindert. Fettgehalt des Blutes nur im Hunger etwas vermindert. Cholesterin hat im Blut sowohl beim Hunger wie in der Avitaminose gegen die Norm etwas zugenommen. (Acta scholae med. Kioto **6**. 461—65. 1924. Ber. ges. Physiol. **32**. 541. 1925. Kyoto, Med.-chem. Inst. Ref. H. LANGE.) OPP.

Willy Stamm, *Die Abspaltung freier Phosphorsäure aus überlebendem Gehirnbrei und ihre Beeinflussung durch Pharmaka*. Steriler Kalbsgehirnbrei bildet in Lockelsg bei 38° in einigen Stdn. pro 10 g Substanz ca. 7 mg anorgan. P₂O₅ u. ca. 5 mg N an nicht koagulabler Substanz. O₂ ist ohne Einfluß. Kälte hemmt diese Prozesse vollkommen. Da Lactacidogen nicht nachweisbar war, stammt P wahrscheinlich aus der

Phosphatiden. Die P_2O_5 -Abspaltung wird beschleunigt durch $CHCl_3$, Urethan, gehemmt durch Chinin, Kokain, Strychnin, Coffein, Scopolamin, Atropin. Morphin, NaBr ohne Wrkg.; bei Verwendung von isoton. NaF- u. $CaCl_2$ -Lsg. anstatt Lockelsg. Hemmung. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 133—48. Greifswald, Pharmakol. Inst.) MEIER.

E₆. Tierphysiologie.

P. Junkersdorf, *Tierexperimentelle Untersuchungen über die stoffwechselphysiologische Wirkung bestimmter Hormone*. I. Mitt. **P. Török**, *Die Wirkung des Adrenalins im Hungerzustande*. Der Verlauf der Adrenalinhyperglykämie, Glykosurie, Blut-N, Harn-N u. die Verteilung des Glykogens u. Fettes auf Leber u. Muskel werden bestimmt. Leberglykogen niedriger, Fettgehalt höher als bei reinem Hunger. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **211**. 414—32. Bonn, Physiolog. Inst.) MEIER.

P. Junkersdorf, *Tierexperimentelle Untersuchungen über die stoffwechselphysiologische Wirkung bestimmter Hormone*. II. Mitt. **Arno Kohl**, *Die Wirkung des Cholins im Hungerzustande*. (I. vgl. vorst. Ref.) Cholingabe beim hungernden Tier bewirkt Hypoglykämie u. Veränderung des Blut-N, des Wassergehaltes u. der Viscosität des Blutes. Leberglykogen höher als bei Hungertieren, Fettgehalt der Leber geringer als im Muskel, erst bei langdauerndem Hunger Glykogen vermindert u. Fett erhöht. Abhängigkeit des Grades u. Eintritts der Wrkg. vom Ernährungszustande. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **211**. 612—35.) MEIER.

Ernst Laqueur, P. C. Hart, S. E. de Jongh und I. A. Wysenbeek, *Über die Herstellung, die chemischen und pharmakologischen Eigenschaften des Hormons des Ovarialsystems*. Vff. konnten die Angaben von ALLEN u. Mitarbeitern (vgl. Am. Journ. Anat. **34**. 133; C. **1925**. II. 660) über ein solches Hormon bestätigen u. es aus einem Prod., das mit dem der Amerikaner ident. oder doch in der Wrkg. sehr nahe verwandt ist, in eiweißfreier, in W. l. Form gewinnen. Sie bezeichnen als „Menformon“ ein Präparat, das in 1 mg mindestens 10 Mäuseeinheiten enthält, d. h. kleinste Mengen, die bei mindestens 2 von 3 gleichzeitig gespritzten kastrierten Mäusen binnen 72 Stdn. eine unverkennbare Änderung des Vaginalepithels hervorzurufen vermögen. Die Herst. aus Follikelfl. beruht vor allem auf der Entfernung des Eiweißes, wofür verschiedene Verff. erprobt wurden.

Chemische Eigenschaften (mit Dingemans). Aus den gereinigten Präparaten war selbst bei 20 u. mehr Mäuseeinheiten keine wägbare Menge Trockensubstanz zu erhalten, aus weniger reinen von 10 ccm 2,2 mg, worin einzelne Krystalle. Eiweiß war selbst in ziemlich unreinen Präparaten nicht mehr nachzuweisen, N ein wenig vorhanden, aber kein P u. kein oder < 5% Cholesterin. Trikresol u. 0,9% NaCl ändern Aussehen u. Wrkg. der Lsg. nicht, die auch bei 3 Wochen langem Stehen bei 37° nicht abnahm.

Physiologische Wirkung. Bei Mäusen u. Kaninchen keine schädliche Wrkg., auch beim Menschen keine Allgemeinerscheinungen. Halbwegs reine Präparate sind ohne Einfluß auf Blutdruck, Herz, Blutgefäße, Atmung u. Blutzuckergehalt. In Mengen von 15 Mäuseeinheiten regt Menformon am isolierten jungfräulichen Uterus Kontraktionen an, an der Gebärmutter in situ war bisher ein Einfluß nicht festzustellen. Dagegen wird das Wachstum der Geschlechtsorgane bei jungen weiblichen Ratten u. Meerschweinchen deutlich gefördert. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **34**. 1270—80. 1925. Amsterdam, Univ.) SPIEGEL.

Robert E. Mark, *Hyperthyreoidisationsversuche an Hunden*. III. Mitt. *Schilddrüse und Kohlenhydrattoleranz*. (II. vgl. S. 970.) Bei Zuführung einer größeren Menge Zucker (10—20 g pro kg) steigt beim Hunde der Blutzucker höher u. schneller an, sinkt aber auch rascher zur Norm als beim n., wenn Schilddrüsensubstanz gefüttert wird, beim schilddrüsenlosen Hunde langsamer u. geringerer Anstieg als n. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **211**. 523—47. Wien, Physiol. Institut.) MEIER.

Robert K. S. Lim und A. C. Liu, *Ermüdung der Magensekretion*. Durch häufig wiederholte Histamininjektionen läßt sich weder die Magensaftsekretion, noch HCl- und Pepsingehalt des Saftes vollkommen zum Verschwinden bringen, trotzdem große Menge u. bis zu mehr als 20% Cl des Körpers ausgeschieden werden. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **211**. 647—62. Peking, Union med. College. Abt. f. Physiol.) MEIER.

Adam Cairns White, *Insulin und Blutfett*. Wenn beim n. Hunde durch Insulin deutliche Hypoglykämie hervorgerufen wird, findet sich in der Regel, im Grade u. in der Anfangszeit wechselnd, eine Zunahme des Blutfettes, die mehr die Fettsäuren als das Cholesterin betrifft, bei diesem auch nicht konstant ist. Darreichung von Glucose mit oder nach dem Insulin scheint in diesen Verhältnissen nichts zu ändern. (Biochemical Journ. **19**. 921—26. 1925. Univ. of Edinburgh.) SPIEGEL.

Liborio Gomez, *Der Kohlenstoff-Stickstoffquotient des Blutes unter normalen und unter experimentell gesetzten pathologischen Zuständen*. Das Verhältnis C : N im Gesamtblut ist bei n., Phlorrhizin, Phosphor vergifteten Hunden etwa das gleiche = 3,1. Rest-C (C im euteiweißten Blutfiltrat vermindert um Zucker-C) : Rest-N schwankt sowohl bei n. als vergifteten zwischen 2 u. 4. (Biochem. Ztschr. **167**. 424—32. Berlin Experiment. biol. Abt. d. path. Inst.) MEIER.

H. K. Barrenscheen, H. Kahler und H. Hechl, *Beiträge zum Problem des Blutzuckers*. I. Mitt. *Über das Verhalten von Reduktion und Polarisation des Blutzuckers nach peroraler und intravenöser Glucosezufuhr*. Die aus Polarisation u. Red. berechneten Zuckerwerte im Blut weichen beim nüchternen n. Menschen in der Weise voneinander ab: Reduktionswert > Polarisation, nach 50—100 g Glucose per os ebenso, bei 30 g Glucose intravenös Polarisation > Red., beim Diabetiker nüchtern: Polarisation = Red., bei 50—100 g Glucose per os Polarisation > Reduktionswert. (Biochem. Ztschr. **167**. 77—91. Wien, III. Med. Univ.-Klinik.) MEIER.

T. Seo, *Über experimentelle Erzeugung von chronischer Sympathicotomie beim Kaninchen*. Nach Unterbindung des Pankreasausführungsganges ist die Rk. des Blutzuckers auf Cholin, Acetylcholin, Physostigmin abgeschwächt. Das Verhältnis K : Ca ist größer als n. Anorgan. Phosphate im Blut vermindert, Adrenalingehalt vermehrt. Blutzucker höher als in Gewebssäften, n. umgekehrt. Die Erscheinungen werden als sympath. Reizung gedeutet. (Biochem. Ztschr. **163**. 271—91. 1925. Berlin, RUDOLPH VIRCHOW-Krankenhaus.) MEIER.

L. Berczeller und H. Wastl, *Über die Viscosität von Blutkörperchensuspensionen*. II. Die Viscosität von Blutkörperchenbrei (ca. 5% Plasma) zeigt bei verschiedenen Tierarten u. nach Gewinnungsweise erhebliche Unterschiede. (Biochem. Ztschr. **167**. 195—202. Wien, Physiolog. Inst.) MEIER.

Paul Szilárd, *Eine Methode zur isolierten Gewinnung der weißen Blutkörperchen*. Auflösung der roten Blutkörperchen u. Thrombocythen mit einem Gemisch Weinsäure u. Essigsäure 1 : 4, nach Neutralisation kurzdauerndes Zentrifugieren 1000 bis 1500 Touren unter möglichster Vermeidung von Abkühlung. Im Sediment sind nur wenig geschädigte Leukocyten. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **211**. 597—611. Budapest, II. Med. Klinik.) MEIER.

Josef Csapó, *Der Alkaligehalt des Blutserums gesunder und kranker Kinder*. Di. unter CO₂-Atmosphäre aus 1 ccm Kinderserum dialysierende Alkalimenge entspricht 4,8 ccm 1/100-n. Lauge, bestimmt aus Säurebindungsvermögen vor u. nach Dialyse. Es besteht zwischen dieser u. dem Eiweißgehalt n. Weise ein ziemlich konstantes Verhältnis, was bei Krankheiten (Tuberkulose, Appendicitis) geändert sein kann. (Biochem. Ztschr. **167**. 38—42. Budapest, Univ. Kinderklinik.) MEIER.

M. Dörle und H. v. Weiss, *Über den Zusammenhang von Fettsäurevermögen und Cholesterinspiegel im Blutserum bei Hypertonien*. Arteriosklerose u. Hypertonie haben bei hohem Cholesteringehalt geringes Fettsäurevermögen des Serums. Jodbehandl.

ung bewirkt dann, wenn klin. Besserung eintritt, Sinken des Cholesterins u. Steigerung des Fettspaltungsvermögens. (Biochem. Ztschr. **167**. 395—400. Freiburg, Med. Poliklinik.)

MEIER.

O. Arnd und **E. A. Hafner**, *Über die Refraktion der Serumeiweißkörper und die Individualität von Albumin und Globulin*. Die spezif. Refraktion des Gesamtserumeiweißes schwankt zwischen 0,00181 u. 0,00238. Bei der Best. muß die individuelle Restrefraktion stets berücksichtigt werden, da sie sogar bei demselben Individuum erheblichen Schwankungen unterworfen ist. Die spezif. Refraktion der Serumeiweißfraktionen (für die Trennung von Globulin u. Albumin wird als $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Trennung gleichwertig Halbsättigung mit Na_2SO_4 bei 37° angewandt, da dann N-Best. nach KJELDAHL möglich ist) schwankt ebenfalls erheblich, doch zeigen die Werte für Globulin u. Albumin desselben Serums deutlichen Unterschied. Bei Einw. von Substanzen auf Serum wurde aus der Änderung der Menge der Aussalzfraktionen eine Verschiebung zwischen Globulin u. Albumin geschlossen, doch ist dies nicht berechtigt, da sich unter solchen Umständen auch die spezif. Refraktion, d. h. die Eiweißkörper chem. ändern. Im Falle der Lecithinschutzwrkg. auf Globulin wird dies auf eine Komplexverb. bezogen. Die Trennung von Eiweißkörpern durch Aussalzen wird auf die Polarisierbarkeit der ausfallenden Körper zurückgeführt, da bei Einbringen einer großen Zahl von Ionen die Lsg. eines Nichtelektrolyten, dessen DE. geringer ist als die des Lösungsm., dieser leichter polarisiert wird u. zu Orten geringster Feldstärke wandert, was schließlich zur Zweiphasenbildung u. Aussalzung führt. Bei Anwendung gleicher Konz. desselben fallenden Ions werden also wahrscheinlich Stoffe derselben Polarisierbarkeit ausfallen, da diese von der Struktur des Moleküls abhängig ist, auch chem. ähnliche sein. Die Tatsachen, die in chem., physikalischchem., biochem. u. biolog. Hinsicht für die Ähnlichkeit der Körper in einer Fraktion bzw. der Ungleichheit von verschiedenen Fraktionen abgesehen von ihren Dispersitätsgrad sprechen, werden eingehend erörtert. (Biochem. Ztschr. **167**. 440—73. Basel, Physiol. chem. Anstalt.)

MEIER.

R. Ottenberg und **F. A. Stenbuck**, *Die isoelektrische Zone des Typhusagglutinins*. Durch Elektrophorese ergibt sich der isoelektr. Punkt des Typhusagglutinins zwischen pH = 4,4 u. 4,6. (Journ. Gen. Physiol. **9**. 345—50. New York, Mount Sinai Hospital.)

MEIER.

Adolf Hartwich, *Einfluß pharmakologisch wirksamer Substanzen auf die isolierte Nierenschniere*. I. Mitt. *Methodik, Einfluß des mechanischen und osmotischen Druckes, der Wasserstoffionenkonzentration, des Zuckers und des Magnesium- und Natriumsulfats*. Der Einfluß oben genannter Faktoren auf die Durchströmungsmenge, Harnmenge u. die Ausscheidung von Traubenzucker wird untersucht. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 81—98. Halle, Pharmakol. Inst.)

MEIER.

S. Hamano, *Photoaktivierung von Vitamin A, Cholesterin, von Fetten und anderen Substanzen durch Ultraviolettstrahlen*. Cholesterin, Lebertran, Butter, Ölsäure, Zimtsäure, Abietinsäure, Campher, Borneol, Menthol werden nach Ultraviolettbestrahlung photoaktiv. Cholesterin wird besonders stark aktiv, wenn die Bestrahlung im Quarzrohr in Luft erfolgt, viel weniger in H_2 oder im Vakuum oder im Glasrohr. Die Photoaktivität geht nach einigen Tagen im Dunkel verloren. Die antirachit. Wrkg. des Cholesterins geht mit der Aktivität fast parallel. (Biochem. Ztschr. **163**. 438—44. 1925. Tokio, Biochem. Abt. des physik.-chem. Inst.)

MEIER.

Wilhelm Stepp und **Ernst Woenckhaus**, *Untersuchungen zur Frage der antirachitischen Wirksamkeit der Lipoide*. Wird einem bei jungen Ratten schwere Rachitis hervorrufenden Futter Cephalin, Cerebron, Cholesterin u. Lecithin zugesetzt, so verschwindet diese Wrkg. Der Träger dieser antirachit. Wrkg. ist das Cerebron, Cephalin hat keine Bedeutung, Lecithin- u. Cholesterin-Fortlassung bewirkt starke Wachstumsstimmung bei n. Knochenwachstum. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 149—69. Gießen, Med. Klinik.)

MEIER.

William Robert Fearon, *Eine Untersuchung einiger biochemischer Farbenreaktionen. III. Farbenreaktionen im Zusammenhang mit Vitamin A.* (Vgl. Biochemica Journ. 12. 179; C. 1919. I. 369.) Bei der Drummondschen Rk. ist die Violettfärbung das wesentliche. Als Lösungsm. wird PAe. (Kp. 40—60°) bevorzugt, als Kondensationsmittel eignet sich statt H_2SO_4 u. a. sehr gut P_2O_5 , bei dessen Anwendung der Farbstoff nicht in das Lösungsm. geht, sondern sich als dunkel purpurner Nd. abscheidet u. s. abgetrennt werden kann. Hierfür wird am besten die Rk. in dem vitaminhaltigen ohne Lösungsm. ausgeführt, nach 7 Min. P_2O_5 nebst dem entstehenden Pigment abzentrifugiert, mit trockenem PAe. gewaschen bis zum Ausbleiben der Cholesterinrk. dann in solchem suspendiert u. in viel W. eingetragen, wobei das Pigment wieder in seine in PAe. l. Komponenten zerlegt wird. Das abzentrifugierte Öl ist frei von wachstumsfördernden Eigenschaften, das Vitamin geht also in das Pigment ein, das wahrscheinlich ein Kondensationsprod. mit einem Sterin ist, konnte aber aus den Spaltprodd. dieses Pigments nicht wiedergewonnen werden. Benutzt man 12%ig. Lsg. von Trichloressigsäure in trockenem PAe. als Kondensationsmittel, so werden mit vitaminhaltigem Öl u. Pyrogallol oder anderen Polyphenolen stabile, für colorimetr. Bes. geeignete Farbstoffe gebildet. (Biochemical Journ. 19. 888—95. 1925. Dublin, Triton Coll.) SPIEGEL.

Leon A. Tschermak, *Studien über B-Avitaminose. I. Bei Fehlen von Vitamin B.* zeigen Tauben bei reiner Fettdiät oder bei fettreicher Nahrung langsamer Krankheitserscheinungen als bei Eiweiß oder Kohlehydratdiät bei gleichem Kalor. Wert der Nahrung. Zufügung von Eiweiß oder Kohlehydrat zu diesem Wert bewirkt immer Zulage von Fett zu Eiweiß u. kohlehydratarmer Diät nicht immer Beschleunigung des Eintritts der Erkrankung. Fett stellt also die geringsten Anforderungen an Vitamin B. (Biochem. Ztschr. 167. 203—19. Odessa, Institut f. allgemeine u. exper. Pathologie.) MEIER.

Maurice Walter Goldblatt, *Beobachtungen über die Wirkung verschiedener Kohlenhydrate auf die Ketosis des Hungerns bei menschlichen Individuen.* Glucose, Fructose, Saccharose u. Maltose zeigten antiketogene Wrkg., Galaktose, Mannose, Lactose u. Glycerin nicht. Nach dem Hungern zeigte sich ein gewisser Mangel an Speichers- u. Oxydationsvermögen gegenüber Kohlenhydraten, die nach deren Einführung sich wieder herstellen. Die Erhöhung des Respirationsquotienten an Zuckerzufuhr tritt erst einige Zeit, nachdem der Blutzucker auf die Maximalhöhe gelangt ist, ein. Die höchste antiketogene Wrkg. des Zuckers, durch negative Nitritprussidrk. gekennzeichnet, findet sich in der Periode sinkenden Blutzuckers, während Speicherung u. Oxydation. (Biochemical Journ. 19. 948—57. 1925. London, St. Thomas's Hosp.) SPIEGEL.

Rudolf Schoen und Nicolaus Kaubisch, *Die Wirkung zentral erregender Mittel auf den respiratorischen Stoffwechsel.* Durch Kaffein wird der O_2 -Verbrauch des Menschen um ca. 15% gesteigert, durch Coramin, Cardiazol, Hexeton ca. 15—20%, durch Lobelin ca. 30%, durch Strychnin ca. 10%. Vorhergehende Morphingabe erhöht die Wrk. des Respirator. Quotient nimmt bei Camphogen, Cardiazol, Coramin ab, bei Lobelin, Hexeton, Strychnin zu; die Steigerung bei den letzteren ist aber zum Teil durch die bei der angeregten Atmung mehr ausgetriebene CO_2 bedingt. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 15. 251—65. Würzburg, Med. Klinik.) MEIER.

Otto Fürth und Josef Marian, *Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Kohlehydrat und Phosphorsäurestoffwechsel. I. Mitt. Über die Spaltung der Hexosediphosphorsäure im Säugetierorganismus.* Durch P-, Na-Best. u. Elementaranalyse wird die Formel für hexosediphosphorsaures Na als $C_6H_{10}O_4(PO_4Na)_2$ bestätigt. Bei Reduktionsvermögen vor u. nach Hydrolyse u. Oxydation des Zuckers mit Hehnerscher Dichromatlg. entspricht nur $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ der theoret. zu erwartenden Zuckermenge. Eine Erklärung hierfür wird in einer besonderen Struktur des Zuckers vermutet.

nutet. Tieren injiziert ist die Substanz wenig giftig u. bewirkt keine Reizerscheinungen, ein großer Teil des PO_4 wird retiniert, es tritt keine alimentäre Glykosurie ein. (Biochem. Ztschr. 167. 123—53. Wien, Chem. Abt. Physiol. Institut.) MEIER.

Rintaro Tateyama, *Über den Zuckerabbau in der menschlichen Plazenta*. Placentargewebe vermag aus Glucose, Glykogen, Rohrzucker, hexosephosphorsaurem Na, Milchsäure, Stärke *Acetaldehyd* zu bilden, aus Alanin in geringem Maße. (Biochem. Ztschr. 163. 292—96. 1925. Berlin, RUDOLF VIRCHOW-Krankenhaus.) MEIER.

David Paton Cuthbertson, *Die Verteilung von Phosphor und Fett im ruhenden und ermüdeten Muskel der Katze, mit einer Mitteilung über die Verteilung von Phosphor im Blut*. Im Muskel scheinen als Folge der Ermüdung folgende Veränderungen aufzutreten: Prakt. keine im Gesamt- P_2O_5 , Zunahme des anorgan. P_2O_5 im bewegten Muskel (I) bis zu 34% bei Abnahme im während der Reizperiode ruhig gebliebenen (II) bis zu 11%, Abnahme des Lactacidogen- P_2O_5 in I bis 60% bei Zunahme in II um 20—50%, geringe Zunahme der gesamten säurelöslichen Fraktion, keine oder sehr geringe Änderungen in der Summe von anorgan. u. Lactacidogen- P_2O_5 , im organ. säurelöslichen außer Lactacidogen u. im Phosphatid- P_2O_5 . Bzgl. der P-Verbb. im Blut fand sich bei Ermüdung Zunahme des anorgan. P_2O_5 bis 100%, des gesamten säurelöslichen um 12—37%, Abnahme des organ. säurelöslichen um 7—36%, Zunahme des W. bei längerer Reizung. — Die P-haltigen Eiweißstoffe des Skelettmuskels gehören zu den *Nucleoproteinen*. Ein Vers., die Frage der Ausnutzung von Fett u. Phosphatid bei Muskelarbeit zu lösen, scheiterte. Nach sorgfältiger Extraktion des Muskelgewebes mit A. u. Ä. fand sich kein „maskiertes Fett“. (Biochemical Journ. 19. 896 bis 910. 1925. Univ. of Glasgow.) SPIEGEL.

Masayuki Okagawa, *Das Verhalten der Milchsäure bei der künstlichen Durchströmung von Froschmuskeln*. Bei fortgesetzter Durchströmung von Froschmuskeln nimmt die abgegebene Menge Milchsäure mit der Zeit ab, dies geschieht auch, wenn die Muskeln gereizt werden, wobei anfangs höhere Werte vorhanden sind. Trotz der geringeren Abgabe ist die Arbeitsleistung gleich der anfänglichen. Da einer bestimmten Arbeit eine bestimmte Menge gebildeter Milchsäure entspricht, wird geschlossen, daß in den späteren Perioden die oxydative Synthese ausgiebiger Milchsäure in Glykogen zurückverwandelt. Bei Durchströmung unter Ausschaltung von Oxydation durch N_2 u. KCN bleibt die Ausscheidung hoch. Lactacidogen nur bei übermäßiger Reizung geringe Abnahme, dabei Zunahme der Milchsäure im Muskel, sonst nicht gegen den Ruhewert verändert. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 211. 577—96. Greifswald, Pharmakol. Inst.) MEIER.

Masayuki Okagawa, *Über Rhodanwirkungen am Muskel und gegenseitige Verstärkung von Kontrakturnsubstanzen*. Kombination verschiedener Kontrakturnsubstanzen verstärkt ihre Wrkg., z. B. NaSCN , NaJ oder Dimethylguanidin + HCl , NaOH , KCl , Acetylcholin, Na-Citrat oder Coffein. NaSCN , NaJ u. Dimethylguanidin verstärken sich in ihrer Wrkg. auf Muskelzuckungen, nicht auf die Kontraktur. In Ca -freier Lsg. ist die Kontrakturnwrkg. immer verstärkt. Novocain hemmt die NaSCN -Kontraktur nicht, nur die Zuckungen. NaSCN hebt die Narkose des Muskels auf. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 99—113. Greifswald, Pharmakol. Institut.) MEI.

Percival Walter Clutterbuck und **Henry Stanley Raper**, *Das Schicksal von Phenylbernsteinsäure und β -Phenylhexansäure im Tierkörper*. Auf Grund der Beobachtungen über Oxydation von NH_4 -Salzen von Fettsäuren durch H_2O_2 (Biochemical Journ. 19. 385; C. 1925. II. 1516) schien es möglich, daß Säuren mit 4 oder mehr C-Atomen in n. Kette u. einem C_6H_5 in β -Stellung durch γ -Oxydation im Tierkörper Phenylbernsteinsäure liefern könnten. Diese wird, wie der Vers. an einem Hunde zeigte, nicht leicht oxydiert, sondern nach subcutaner Injektion zu 61% durch den Harn ausgeschieden. Nach Einspritzung von β -Phenylhexansäure erschienen 45%

davon im Harn unverändert oder als Glucuronsäureverb., Phenylbernsteinsäure ließ sich nicht nachweisen. Es findet also hier keine γ -Oxydation statt. (Biochemical Journ. **19**. 911—14. 1925. Univ. of Manchester.) SPIEGEL.

Josef v. Kukuljevič, *Versuche mit Tophosanyl Richter*. Zusammenfassende Mitt. Bericht über günstige Ergebnisse mit Tophosanyl Richter, eine sterile Lsg. von phenylchinolincarbonsaurem Na u. Natrium salicylicum (Herst.: Chem. Fabrik A.-G. GEDEON RICHTER) an Menschen u. Tieren. (Fortschr. d. Landwirtschaft **1** 157—58. Kerzthely.) GROSZFELD.

Otto Krayer, *Die pharmakologischen Eigenschaften des reinen Apokodeins*. Reines Apokodein (amorph u. kristallisiert) ist ca. 5-mal so wirksam wie bisherige Handelspräparate, qualitativ ist seine Wrkg. von diesen nicht wesentlich verschieden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 60—67. Freiburg i. Br., Pharmakol. Institut.) MEIER.

Erich Hesse, *Beiträge zur Pharmakologie des Tetrophans*. Die durch Tetrophan bedingte Muskelstarre am Warmblüter hat eine zentral u. eine direkt im Muskel gelegene Komponente, die erstere die allgemeine, die zweite lokale Starre hervorrufend. Die Starre ist von Aktionsströmen, im glykogenreichen Muskel von einer Milchsäureanhäufung, im glykogenarmen Muskel des Hungertieres nicht von einer solchen gegenüber der Milchsäureanhäufung in n. Muskeln nach kurzem Tetanus begleitet. Die Starre kann durch *Novocain*, *Tutokain* u. *Papaverin* antagonist. beeinflusst werden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 68—80. Breslau, Pharmakol. Institut.) MEIER.

M. Masslow, *Zur Frage der krampfstillenden Wirkung von Adonis Vernalis und Digitalis*. Durch Adonidin u. schwächer durch Digitalisstoffe werden durch *Kokain*, *Campher* u. *Pikrotoxin* hervorgerufene Krämpfe abgeschwächt. Strychninkrämpfe u. fibrilläre Zuckungen nach Physostigmin werden nicht beeinflusst. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 114—25. St. Petersburg.) MEIER.

Chubyung Pak, *Versuche über den Übertritt chemischer Substanzen aus der Gefäßbahn in die Gewebe*. Werden der Durchströmungsfl. bei der Durchströmung von Froschschenkeln Substanzen zugesetzt, so kann aus der Zeit, in der in der ausströmenden Fl. die Konz. der einströmenden Fl. erreicht ist, auf den Durchtritt der Substanz ins Gewebe geschlossen werden. Alkaloide wie *Strychnin*, *Physostigmin*, *Chinin*, *Hydrastinin*, *Morphin*, *Pilocarpin*, *Atropin*, *Adrenalin* treten ebenso rasch aus wie etwa NH_4Cl , Traubenzucker u. Harnstoff. Bei Morphin, Atropin, Pilocarpin wird sogar in 20 Stdn. der Gehalt der einströmenden Fl. nicht erreicht, was auf einer Speicherung bzw. Zerstörung im Gewebe bezogen wird. Beim Adrenalin ist dies nicht bei der Durchströmung von Muskeln, dagegen aber in ausgesprochener Weise bei Durchströmung der Leber der Fall. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 42—59. Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst.) MEIER.

E. Geiger und **L. Orosz**, *Über die Wirkung von Strophantin auf die absolute Kraft des Froschherzens*. Strophantin erhöht die absol. Kraft des n. Herzens u. des durch Arbeit ermüdeten Herzens nicht, vermag aber die durch Urethan herabgesetzte absol. Kraft zu erhöhen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 32—37. Pécs, Elisabeth Univ., Pharmacol. Inst.) MEIER.

Felix Basch, *Über Schwefelwasserstoffvergiftung bei äußerlicher Applikation von elementarem Schwefel in Salbenform*. Mit Schwefelsalbe behandelte Kaninchen an mechan. gereizter Haut gehen durch Resorption von S unter den Erscheinungen einer chron. H_2S -Vergiftung zugrunde. Im Blut u. Harn läßt sich H_2S nachweisen. Nebenbefund: Bei Durchleitung von elektrolyt. H_2 durch n. Blut entsteht reichlich H_2S , nicht bei Durchleiten von CO_2 . (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 126—32. Wien, Pharmakol. Inst.) MEIER.

Paul Noether, *Tetania parathyreo-priva und Guanidinvergiftung*. Bei parathyreo-priver Tetanie von Katzen konnte im Harn keine Erhöhung der Guanidinbasen nachgewiesen werden. Guanidinbest. nach GREENWALD (Journ. Biol. Chem. **59**. 329;

C. 1924. II. 692). (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 38—41. Freiburg, Pharmakol. Inst.) MEIER.

Benj. H. Schlomovitz und **S. A. Machlis**, *Über den Einfluß der Temperatur auf den Krampfanfall bei Strychninvergiftung*. Die Zeit bis zum Eintritt des Krampfanfalls bei mit Strychnin vergifteten Fröschen nimmt mit Erhöhung der Temperatur ab. Der Temperaturkoeffizient liegt zwischen 2 u. 3. Die Erhöhung der Herzzeit u. die vermehrte Blutzirkulation bei steigender Temp. sind ohne wesentlichen Einfluß. Die Möglichkeiten, welche Rk. es ist, die diesem Gang folgt, werden erörtert. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 1—31. Wisconsin, Univ., Pharmacol. Lab.) MEI.

G. Analyse. Laboratorium.

Kurt Thormann, *Neue Porzellangeräte für unser Laboratorium*. (Vgl. S. 532.) Vf. beschreibt folgende Neuheiten der Porzellanfabrik PH. ROSENTHAL & Co., A. G., Marktredwitz: Heißwassernutsche nach MAYER, Porzellanplättchen für Farbenprüfung, ferner Fäschentiegel, Krystallisier- u. Abdampfschale u. Exsiccator-einsatz nach THORMANN. (Österr. Chem.-Ztg. **29**. 28—29. Leipzig.) JUNG.

M. S., *Ein praktischer Kälteerzeugungsapparat für das Laboratorium*. Der App. Herst.: CHERRYMAN Ice Vacuum Company, Berlin SW 68) stellt ein Glasgefäß mit doppelter Wandung dar, das in ein Dewargefäß eingeführt werden kann. Der äußere Raum nimmt eine $\text{NH}_4\text{NO}_3\text{-Na}_2\text{CO}_3$ -Kältemischung bezw. Eis auf. (Ztschr. medizin. Chemie **4**. 5.) JUNG.

I. Pastak, *Mikrokryoskopie. Bestimmung des Molekulargewichts in Trinitrotoluol*. Das 2,4,6-Trinitrotoluol ist infolge der Verwandtschaft der Formeln ein vortreffliches Lösungsm. für Polynitroverbb. u. kann daher zur kryoskop. Mol.-Gew.-Best. letzterer dienen, wenn man bei der relativ (gegenüber dem Campher) niedrigen Konstante (115) gewisse Vorsichtsmaßregeln beachtet. Man verschm. in einem großen Capillarrohr unter Rühren mit einem Glasfaden gewogene Mengen Substanz u. Trinitrotoluol miteinander bis zu völliger Lsg., wobei man zwischendurch mehrmals wieder erstarren läßt. Dann zerbricht man das Rohr, verreibt die M. u. füllt sie in 4—5 Capillarrohrchen. Ebensolche Röhrchen bereitet man mit reinem Trinitrotoluol, wählt von beiden Sorten zwei möglichst gleiche aus u. bestimmt unter Benutzung eines mindestens 0,2° anzeigenden Thermometers u. sehr langsamem Erhitzen mit einem Mikrobrenner den Unterschied der FF. Man nimmt das Mittel aus mehreren Bestst. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 82—83. Brünn, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

The Svedberg und **Robin Fahraeus**, *Eine neue Methode zur Molekulargewichtsbestimmung von Proteinen*. (Vgl. SYEDBERG, Kolloid-Ztschr. **36**. Erg.-Bd. 53—64; C. 1925. II. 531.) Vf. zeigt, wie man aus dem mit Hilfe der Ultrazentrifuge ermittelten Sedimentationsgewicht das Mol.-Gew. von Proteinen berechnen kann. Er gibt eine ausführliche Beschreibung der Apparatur, eine Ableitung der zur Berechnung dienenden Formel u. als Beispiel die Mol.-Gew.-Best. von Kohlenoxyd- u. von Methämoglobin aus Pferdeblut) an. Die Verss. deuten darauf hin, daß Hämoglobin aus 4 Molekülkomplexen mit dem Gew. 16 700 besteht, so daß das Mol.-Gew. des Hämoglobins in wss. Lsg. wahrscheinlich 66 800 ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 430—38. Upsalain Schweden, Univ.) WINKELMANN.

R. B. Mac Mullin, *Ein automatischer Apparat zur Schmelzpunktsbestimmung von organischen Verbindungen*. Vf. hat das Verf. zur Best. des F., welches DUBOSE (Rev. les produits chim. **28**. 115; C. 1925. I. 2097) angegeben hat, verbessert, indem er das Quecksilberbad elektr. erhitzt. Beim Schmelzen der Substanz ertönt nicht nur ein Läutewerk, sondern es wird gleichzeitig ein Relais bedient, das den Heizstromkreis ausschaltet. Der F. wird durch ein selbstregistrierendes Maximumthermometer angezeigt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 439—42. New York.) WINKELMANN.

Philip Drinker, R. M. Thomson und Jane L. Finn, *Photometrische Verfahren zur Untersuchung und Bestimmung von Suspensionen von Staub, Nebeln und Rauch.* (Journ. Chem. Metallurg. Mining. Soc. South Africa 26. 46—57. 1925. Boston. — C. 1926. I. 1675.) JUNG.

Joseph Kenyon, *Photoelektrische Polarimetrie.* Vf. beschreibt eine Vorr. zur photoelektr. Polarimetrie, die im wesentlichen aus einem Spektrometer besteht, dessen Collimator durch ein Polarimeter ersetzt ist. Als Photometer dient eine Selen- oder Alkalimetallzelle. Neu ist die Art, wie die Beobachtungen gemacht werden. (Nature 117. 304. London, Battersea Polytechnic.) JOSEPHY.

Aristides Kanitz, *Direkte Ablesung des p_H beim Kompensationsverfahren mit Meßdraht.* Wird an die Enden eines 1 m langen Meßdrahtes ein 20-faches des Spannungsabfalles, der zwischen zwei Zehnerpotenzen der $[H^+]$ liegt, angelegt, so ist die doppelte Länge des Meßdrahtes durch 100 dividiert in mm, bei Stromlosigkeit gemessen gegen eine n. H-Elektrode, gleich dem p_H . (Biochem. Ztschr. 167. 474—78.) MEIER.

B. Solowiew, *Eine Mikroelektrode zu gleichzeitiger p_H -Bestimmung in vielen und verschiedenen Objekten.* Glasglocke, in deren Deckel mehrere Platinelektroden eingelassen sind, wird über einen Paraffin überzogenen Klotz luftdicht gestülpt, so daß die Pt-Elektroden in Tropfen der Untersuchungsfl. eintauchen, die getrennt auf Glas-tischchen liegen. Die Tropfen sind durch Agarrröhrchen mit KCl-Lsg. verbunden die mit KCl-Elektrode verbunden ist. Durch den ganzen App. wird H_2 durchgeleitet. Soviel Elektroden u. Tischchen im Innern sind, soviel verschiedene Fl. können gemessen werden. (Biochem. Ztschr. 167. 54—57. Kiew, Patholog. anatom. Inst.) MEIER.

F. Arndt und P. Nachtwey, *Reinisolierung von Pyridin über das Perchlorat Pyridin, Ammoniak und Indicatoren.* Pyridinium-perchlorat als saure Ursubstanz Pyridiniumperchlorat bildet wasserfreie Krystalle, die in k. W. zwl. sind. 100 ccm der bei 16° gesätt. Lsg. in W. enthalten 9,49 g; bei Versetzen von Pyridin mit 20% $HClO_4$ schon weitgehende Ausscheidung. F. 288° ohne Zers. Kleinere Mengen besser aus A. krystallisierbar. Diese Schwerlöslichkeit u. Krystallisierbarkeit zeigt nur das Perchlorat des einfachen Pyridins, nicht die der Homologen. Man kann daher durch Ausfällung als Perchlorat Pyridin vollkommen selektiv von seinen Homologen trennen. Man versetzt das homologenhaltige Pyridin mit 6-n. HCl bis zum Verschwinden des bas. Geruches, fügt etwas mehr als das dem HCl-Vol. gleiche Vol. 6-n. Lsg. von techn. $NaClO_4$ zu, läßt k. stehen, saugt scharf ab, wäscht Nd. mit wenig W. von 0° u. trocknet bei 120°. Prod. ist reines Pyridiniumperchlorat, enthält nur etwas NaCl. Wird das Doppelte des HCl-Vol. an $NaClO_4$ -Lsg. verwendet, so ist Nd. chloridfrei. Hierbei beträgt die Ausbeute bei reinem Pyridin 93—95%, bei Basengemisch von 20% Pyridingehalt 42%. Man verwendet daher ein durch Fraktionierung angereichertes Pyridin oder von entwässertem rohen Basengemisch den bis 130° sd. Anteil. — Zu Freimachung des Pyridins aus dem Perchlorat wird dieses entweder mit der äquivalenten Menge 50% NaOH versetzt u. die entstandene homogene Fl. unter vermindertem Druck destilliert, wobei Pyridin u. W. gemeinsam übergehen; Destilla wird mit viel festem KOH entwässert. Oder man bringt das Perchlorat in eine Dest.-App., leitet unter Kühlung trockenes NH_3 hindurch, so daß nur ein langsame Strom unverbraucht austritt: B. von fl. Pyridin u. NH_4ClO_4 , das in der Fl. durchscheinend ist. Nach Aufarbeitung ist der Kp. des wasserfreien Prod. innerhalb $\frac{1}{10}$ konstant. Kp._{739,5} 114,2°; Kp.₇₅₅ 115,0°. D.₂₀ 0,9819, D.₂₅ 0,9765, F. —40 bis —39°.



Das so gewonnene Pyridin ist frei von NH_3 . Die Angaben von BARTHE (Bul. Soc. Chim. Paris [3] 33. 659; C. 1905. II. 259), daß reines Pyridin Lackmus nicht bläue, sich aber von NH_3 durch Dest. nicht befreien lasse, fanden Vf. nicht bestätigt. Eine Probe auf NH_3 in homologenfreiem Pyridin (Ausfällung des Pyridins mit $CdCl_2$ des Cd^{++} mit Na_2CO_3 , Prüfung des Filtrats mit NESSLERS Reagenz), die noch eine

Gehalt von 0,01—0,02% NH_3 sicher erkennen läßt, gab mit jedem Pyridin, das in wasserfreiem Zustand bei gewöhnlichem oder vermindertem Druck destilliert war, negativen Befund, auch wenn vorher bei 0° mit NH_3 gesätt. war (Durchleiten von Luft bei 60—70°). Wird dagegen wasserhaltiges Pyridin mit NH_3 gesätt. u. dest., so enthalten die wasserhaltigen Vorläufe viel NH_3 ; Kp. derselben z. T. niedriger (80—92°) als der Minimum-Kp. von Pyridin + W. (92—93°); der von 100—115° u. d. Teil gibt auch hier negative Probe auf NH_3 . — Auch Pyridin, dessen NH_3 -Probe negativ, bläut in wss. Lsg. Lackmustinktur (Lackmuspapier nicht mit voller Stärke). Diese Bläuung ist auch theoret. zu erwarten, denn aus den im Schrifttum angegebenen Werten für die Basenkonstante des Pyridins berechnet sich für $\frac{1}{10}$ -n. Lsg. von Pyridin in W. ein pH von 9,3—9,4, während das Umschlagsintervall von Lackmus zu pH 5—8 angegeben wird. Mit Puffergemischen nach SÖRENSEN finden Vff. die blaue Endfarbe der Lackmuslg. Kubel-Tiemann bei pH ca. 8,7, der Lackmuslg. May bei pH ca. 8,5. Dieselbe Farbe gibt $\frac{1}{10}$ -n. Pyridinlg., deren pH hier also $> 8,7$ angezeigt wird; potentiometr. finden Vff. Werte zwischen 9,4 u. 9,5. Dagegen wird von anderen Indicatoren dieser pH nicht angezeigt. Z. B. wird Phenolphthalein von $\frac{1}{10}$ -n. Pyridinlg. nur ganz schwach rosa gefärbt entsprechend pH von ca. 8,4; bei weiterem Zusatz von Pyridin geht die Farbe noch mehr zurück. Vff. nehmen hier einen durch Einw. von Pyridin auf den Indicator verursachten „Basenfehler“ an, ähnlich dem „Alkalifehler“ vieler Indicatoren. Dieser „Basenfehler“ macht sich aber nur innerhalb des Umschlagsintervalls des Phenolphthaleins geltend; wird durch eine Spur $\frac{1}{10}$ -n. NaOH der pH der Pyridinlg. über 10 gebracht, so tritt volle Rötung auf. Daher sind Pyridinalze starker Säuren mit Lauge u. Phenolphthalein scharf titrierbar. Pyridiniumverchlorat kann also als saure Ursubstanz dienen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 48—55. Breslau, Univ.)

ARNDT.

Karl Naegeli, *Über ein neues Indicatorprinzip in der Acidimetrie und Alkalimetrie. Trübungsindicatoren*. Das Prinzip der Trübungsindicatoren beruht auf der Fähigkeit kolloider Systeme, bei gewissen pH ihren Dispersitätsgrad derart zu verringern, daß eine Trübung oder Flockung entsteht. Es ist dabei gleichgültig, ob die Dispersitätsänderung von einem Farbumschlag begleitet ist oder nicht. Die kolloiden Systeme können in kolloide Ampholyte, kolloide Elektrolyte u. nichtionogene Kolloide eingeteilt werden. Die ersteren enthalten Körper, welche ein Flockungsoptimum zeigen, wie denaturiertes Albumin, Globuline. Diese eignen sich aber zur Titration schwacher Säuren u. Basen nicht, da ihr isoelekt. Punkt zu nahe beim Neutralpunkt liegt. Zu der zweiten Art gehören die hochmolekularen Säuren u. Basen (Halbkolloide), wie Kongorot, Palmitin- u. Stearinsäure, durch Lauge peptisierte Harnsäure, ferner Chol. u. Harzsäuren, Amylopektin u. Eiweißstoffe. Von den organ. Verb. gehören zu dieser Reihe Zinn-, Kiesel-, Wolfram-, Tellur-, Perjod-, Blei-, Borsäure u. andere. Es wird die Konstitution dieser Lsgg., ihre Dissoziation, das Massenwirkungsgesetz für kolloide Elektrolyte besprochen. Bei ihnen gibt es einen scharfen Punkt bei einer gewissen pH beim Zugabe von Säure zu einer alkal. Lsg. oder umgekehrt zu erkennen, bei welchem starke Teilchenvergrößerung ohne Änderung der pH eintritt, so daß eine Trübung oder Flockung mit oder ohne Farbänderung entsteht. Die nichtionogenen Kolloide (Sole von Au, Ag, Fe_2O_3 , Al_2O_3 , As_2S_3 , ZrOCl_2) lassen sich prinzipiell auch als Trübungsindicatoren verwenden. Es werden die einzelnen Titrationsfehler (Salz-, Alkoholfehler usw.) besprochen. Als Indicatoren wurden verwandt: *i*-Nitrosoacetyl-*p*-aminoazobenzol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}=\text{NC}_6\text{H}_4\text{NH}\cdot\text{O}\cdot\text{CH}=\text{NOH}$ (a), *i*-Nitrosoacetyl-*p*-toluolazo-*p*-toluidin (b) u. *i*-Nitrosoacetyl-*o*-toluolazo-*o*-toluidin (c), *o*-Aminobenzalrhodanin (d), Isatinrhodanin (e) u. Methylisatinrhodanin (f). d—f wurden nur auf ihren Umschlagpunkt hin untersucht. Die Umschlagspunkte wurden mit verschiedenen Pufferlsgg. bestimmt. Die Umschlagsintervalle sind sehr klein, fallen aber für die einzelnen Pufferlsgg. nicht zusammen.

Es wurden weiterhin die Einflüsse der Temp., Indicatorkonz., Reihenfolge der Zusätze, Konz. der Lsg. u. der Na-Ionen auf den Umschlagspunkt bestimmt. Praktisch spielt nur die Konz. des Indicators eine Rolle. Ein Verdünnen der Pufferlsg. hat eine geringe Änderung der pH zur Folge. Es wurden titriert $B(OH)_3$, As_2O_3 , *Phenol*



p-Chlorphenol, Glykokoll, Alanin, Leucin, Tyrosin, Asparagin u. Diäthylbarbitursäure. Die Ergebnisse sind für diese Stoffe nicht durchweg konstant, doch liegen sie in einem engen Streuungsgebiet. Bei weiterer Ausarbeitung hofft Vf. auch die Ausnahmefälle vollends in das Schema einzuordnen. Die Verfolgung der Flockung u. Mk. zeigt, daß die Indicatoren fast immer sofort krystallisiert zur Abscheidung kommen. Sie sind empfindlich gegen NH_4^+ u. CO_3^{--} -Ionen. Alkaliionen flocken entweder nicht oder nur in hohen Konz. Zweiwertige Ionen sind sehr stark wirksam. Die Flockungen, außer den durch NH_4^+ u. H^+ -Ionen erzeugten, lösen sich beim Verdünnen der Lsg. Nichtelektrolyte sind ohne Wrkg., Schutzkolloide beeinflussen nur die Art der Fällung, nicht aber den Flockung- bzw. Trübungspunkt. (Kolloidchem. Beihefte **21**. 30 bis 411. Zürich.)

ENZLIN.

Adalbert Elek und **Harry Sobotka**, *Die Kjeldahl-Pregl-Methode angewandt auf Nitroverbindungen*. Eine Kombination des Kjeldahlverf. zur N-Best. mit PREGL mikroanalyt. Methode wird beschrieben. Zum Aufschließen wurde konz. H_2SO_4 unter Zusatz von K_2SO_4 , etwas Glucose u. Kupfersulfat verwendet. Bei verschiedenen N-haltigen organ. Verbb. wurden gute Resultate erhalten. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 501—03. New York, ROCKEFELLER Inst.)

WINKELMANN.

Elemente und anorganische Verbindungen.

Kinichi Someya, *Anwendung flüssiger Amalgame in der volumetrischen Analyse*. III. *Die Bestimmung der Phosphorsäure unter Verwendung von Bleiamalgam* (The science reports of the Tôhoku imp. univ. **14**. 569—76. 1925. — C. **1926**. 446.)

LÜDER.

Robert Schwarz und **Adolf Schinzinger**, *Über eine neue Methode der Silicaanalyse*. Vff. arbeiten eine Methode aus, bei der der Aufschluß der Silicate mit Lithiumcarbonat erfolgt. 1 g Substanz wird mit 4 g Li_2CO_3 1 Stde. im geschlossenen Pt-Tiegel geglüht. Bei der Weiterarbeit erfolgt die Abscheidung des SiO_2 — danach Ausfällung des beim Aufschluß in Lsg. gegangenen Pt durch H_2S —, des Al_2O_3 u. CaO wie bei Sodaufschluß. Das Mg wird titrimetr. nach KLINGENFUSS (Ztschr. f. anorg. u. all. Ch. **138**. 195; C. **1924**. II. 1716) als $AsO_4Mg(NH_4)$ bestimmt. Aus der verbleibende stark salzsauer gemachten Lsg. wird das überschüssige As durch H_2S entfernt, die Lsg. mit 5 g $(NH_4)_2HPO_4$ versetzt u. eingengt. Der größte Teil des Li-Phosphats wird durch A. ausgefällt u. die Lsg. hernach bis zur Trockene eingedampft. Der geglühte Rückstand wird mit W. aufgenommen, filtriert, angesäuert, mit Ammoniumacetat versetzt, mit NH_3 neutralisiert, mit $FeCl_3$ versetzt, gekocht, filtriert u. eingengt. Der von Ammonsalzen befreite Glührückstand wird wiederum mit W. aufgenommen, mit Amylalkohol versetzt u. unter Durchleiten von Luft langsam eingengt. In dem Maße, wie das W. übergeht, scheidet sich $NaCl$ u. KCl aus, während $LiCl$ in Lsg. bleibt. Ersteres Salzgemisch wird, nachdem alles W. entfernt ist, in einem gewogenen Glasfiltertiegel filtriert, mit Amylalkohol gewaschen u. bei 140° getrocknet.

Sodann erfolgt die Best. des K als Perchlorat. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 214 bis 20. Freiburg i. B., Univ.)

ULMANN.

Mykola Wikul, *Eine rein empirische Methode für die quantitative Bestimmung des Kaliums*. Vf. arbeitet eine Modifikation der Kobaltinitritmethode zur gravimetr. Best. des K aus. Hierbei wird die zu bestimmende K-Lsg. mit so viel NaCl versetzt, daß auf 10 ccm Lsg. 3—4 g kommen, darauf bis fast zum Sd. erhitzt u. mit einem Überschuß des Kobaltinitritreagens gefällt. Nach erneutem Erhitzen zum Sd. wird durch in k. W. stellen abgekühlt, filtriert, der Nd. mit verd. Eg. u. A. gewaschen, getrocknet u. gewogen. Trotz Unkenntnis der genauen molekularen Zus. des Nd., welcher eine Adsorptionsverb. darstellt u. der die hypothet. Formel $C_4H_4O_6 \cdot CoO \cdot Na + 7K_2NaCo(NO_2)_6 \cdot H_2O$ entspricht, gelingt die Berechnung der vorhandenen K-Menge aus dem Gewicht des Nd. mit Hilfe des Faktors 0,1598. Die Resultate dieser Arbeitsweise sind, wie Bestst. an Lsgg. mit verschieden großem K-Gehalt zeigen, befriedigend. Zur Darst. des Reagens werden 180 g $NaNO_2$ in 250 ccm W. mit einer Lsg. von 90 g $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ in 250 ccm W. gemischt u. in kleinen Mengen 50 g Weinsäure eingetragen. Nach 48 Stdn. Stehen, bis zur „Reife“, im offenen Gefäß, wird vom ausgefallenen voluminösen Nd. abfiltriert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 338—42. Poděbrady bei Prag, Landw. Akad.)

ULMANN.

Kinichi Someya, *Ein Verfahren zur Bestimmung von Vanadium in Ferrovanadium*. Zur Best. des V im Ferrovanadium wird die Probe in H_2SO_4 gel., oxydiert u. titriert mit $K_2Cr_2O_7$ - u. $FeSO_4$ -Lsg. unter Verwendung von Diphenylamin als Indicator. Die Methode gibt im allgemeinen gute Resultate, es sei denn, daß der V-Gehalt geringer als 1% ist oder die Legierung Cr, W usw. enthält. (The science reports of the Tôhoku imp. univ. **14**. 577—91. 1925. Sendai, [Japan].)

LÜDER.

Swoboda, *Österreichische Normen der Analyse von Metallen. Analyse von Edelmetallen*. (Österr. Chem.-Ztg. **29**. 35—38.)

JUNG.

Alan Richard Powell und Walter Raymond Schoeller, *Über eine neue Methode zur Trennung von Tantal und Niob, sowie zum Nachweis und zur Bestimmung kleiner Tantalmengen in Niobverbindungen*. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 221—38. — **1926**. I. 738.)

ULMANN.

G. Tammann und K. Kollmann, *Zur Bestimmung des Goldes, gelöst in Quecksilber*. Vff. geben eine quantitative Methode zur Au-Best. in Hg an; anwendbar bei bis zu $2 \cdot 10^{-3}$ % Au. Werden zu einem Au-Amalgam elektrolyt. kleine wachsende Mengen von Zn zugefügt, wobei gut durchgeschüttelt werden muß, so erhöht sich das Potential des Amalgams nur wenig, da B. von AuZn eintritt. Wird dagegen die der Au-Menge äquivalente Zn-Menge überschritten, so findet ein Potentialsprung statt, wodurch die Berechnung der vorhandenen Au-Menge ermöglicht wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 269—70. Göttingen, Univ.)

ULMANN.

E. Duhme und A. Lotz, *Zur Frage des analytischen Nachweises von Gold in Quecksilber*. Bei dem Vers., sehr geringe in Hg gel. Au-Mengen durch Auflösen in HNO_3 u. Beobachtung des Rückstandes u. Mk. zu erkennen, entziehen sich diese Mengen längere Zeit nach dem Erhitzen des Hg dem Nachweis. Nach monatelangem Stehen des Hg gelingt dann der Nachweis von Au, ohne daß eine elektr. Behandlung des Hg stattgefunden hat. (Naturwissenschaften **14**. 165. Siemensstadt, SIEMENS & HALSKE A.-G. u. Siemens-Schuckertwerke.)

JOSEPHY.

Eugenio Saz, *Bestimmung des Zinns in einem Kassiterit mit einer eingestellten Lösung von Kaliumbichromat*. Der Kassiterit wird im Ni-Tiegel mit 5 Gew.-Teilen Na_2O u. 1 Teil Na_2CO_3 aufgeschlossen u. das Na-Stannat nach dem Lösen mit W. vom unl. Rückstand getrennt. Dieses wird mit Zn u. NaOH zum Metall reduziert, unter Abschluß der Luft. Vf. erreicht dies dadurch, daß er erst die Luft im Reaktionsgefäß durch den sich entwickelnden H_2 verdrängt u. dann beim Abkühlen durch gleichzeitiges Eintreten von $NaHCO_3$ -Lsg. u. konz. HCl eine CO_2 -Atmosphäre schafft. Die HCl löst

gleichzeitig das Sn als 2-wertiges Metall, das nach dem Abkühlen unter Zugabe von Diphenylamin als Indicator mit $\frac{1}{10}$ -n. $K_2Cr_2O_7$ titriert wird. Beim Endpunkt der Titration tritt ein Farbenumschlag von grün in blauviolett ein, der ziemlich scharf ist. Kontrollanalysen, bei denen Sn als Metazinnsäure bestimmt wurde, lieferten übereinstimmende Resultate mit den volumetr. Analysen, wenn bei diesen die Bedingungen, die Vf. näher angibt, innegehalten wurden. (Quimica e Industria 3. 33—36. Sarria Instituto Quimico.) HANTKE.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

R. Böhlig, *Neuzeitliche Bauweise von Säuretürmen*. Beschreibung des ganz aus säurefesten Materialien bestehenden Säureturms System BÖHLIG. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 14—16. Frankfurt a. M.) SÜ.

Paul Bornkessel, Berlin-Frohnau, *Glashähne oder Ventile für allerhand Glasapparate, Pumpen o. dgl.*, dad. gek., daß die beiden die Dichtungsflächen tragenden eingeschliffenen Körper aus Glassorten verschiedener Härtegrade bestehen, um das Einschleifen während der Benutzung zu erleichtern u. so Undichtigkeiten des App. zu verhindern. (D. R. P. 425 103 Kl. 67a vom 24/9. 1924, ausg. 10/2. 1926.) KAUSCH.

Elektrotechnische Werkstätten Witten Börnecke & Borchart, Witten, Ruhr *Mischen von Gasen oder Flüssigkeiten*, bei dem die Regelung der Gas- oder Flüssigkeitsmengen durch Druckregler bewirkt wird, dad. gek., daß die Einstellung der Regeldrucke der einzelnen Regler u. damit der Gas- oder Flüssigkeitsmengen in Abhängigkeit voneinander erfolgt. (D. R. P. 425 169 Kl. 12e vom 2/12. 1924, ausg. 12/2. 1926.) KA.

George Richard Schueler, Kingston-upon-Hull, Engl., *Vorrichtung zum Trennen von Flüssigkeiten und festen Stoffen mittels Schleuderkraft*, gek. durch zwei in einem Gehäuse angeordnete, sich in der gleichen Richtung, aber mit verschiedenen Geschwindigkeiten drehende Teile, zwischen welche das zu zerlegende Gemisch geführt wird, u. von denen der obere Teil den Umfang u. die obere Seite des unteren Teiles einschließt, wobei der obere Teil mit Öffnungen zum Auslassen der ausgeschiedenen Fl. versehen ist, während die festen Bestandteile zwischen dem Rande des oberen Teiles u. dem Umfang des unteren Teiles nach unten entweichen. — 2. dad. gek., daß die Auslaßöffnungen in dem oberen umlaufenden Teile von einer zwischen diesem u. dem unteren umlaufenden Teile gelegenen, gewölbten Kammer ausgehen, die das Gemisch durch in dem oberen Teile vorgesehene Kanäle zugeführt erhält u. sich nach unten in einen den Rand des unteren Teiles umgreifenden Flansch fortsetzt, der zwischen sich und dem Rand einen Ringraum frei läßt, durch den die von der Fl. befreiten, festen Bestandteile auf den Boden des Gehäuses fallen. — 3. dad. gek., daß in der gewölbten Kammer an dem unteren, sich drehenden Teile geneigte Flügel o. dgl. angebracht sind, welche die festen Bestandteile in den Ringraum drücken. — 4. dad. gek. daß an den übergreifenden Rand des oberen umlaufenden Teiles sich ein kegelförmiger Ring anschließt, der durch Flügel oder Schaber an dem unteren umlaufenden Teile von Stoffansatz frei gehalten wird u. die festen Bestandteile auf den Gehäuseboden beispielsweise in eine ringförmige Rinne fördert, aus der sie durch drehbare Arme der Austragöffnung zugeführt werden, während die Fl. in einer mit Auslässen versehenen Sammelrinne aufgefangen wird. (D. R. P. 425 796 Kl. 12d vom 17/6. 1924, ausg. 26/2. 1926. E. Prior. 4/7. 1923.) KAUSCH.

Laughlin Filter Corporation, New York, übert. von: **William C. Laughlin** Glendale, Californien, *Trennen fester Stoffe von Flüssigkeiten durch Zentrifugalkraft* Man verwendet ein rotierendes Gefäß, das am Umfange eine Trennkammer u. eine

ziale Austrittsöffnung hat. Außerdem sind rotierende Vorr. vorgesehen, die die ersten Stoffe von der Trennkammer einwärts nach der Austrittsöffnung leiten, sowie in diesen Vorr. solche, die die klare Fl. ablenken. (A. P. 1 572 611 vom 21/6. 1924, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Hermann Rohmann, Saarbrücken, und **Elektrische Gasreinigungs G. m. b. H.**, Charlottenburg, *Elektrische Gasreinigung mittels Wechselstromes* durch Aufladung der Staubeilchen usw. zwischen Sprühelektroden von hoher Spannung u. darauffolgender Niederschlagung der Staubeilchen an Abscheidungslektroden von niederer Spannung, dad. gek., daß zwischen den beiden Spannungen eine Phasenverschiebung hervorgerufen wird, deren Größe zur Erzielung einer möglichst guten Abscheidung eingestellt wird. (D. R. P. 425 026 Kl. 12e vom 30/10. 1921, ausg. 11/2. 1926.) KAUSCH.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: **Richard Reinrich**, Berlin-Südende), *Elektrische Reinigung von Gasen*, bei dem die Gase durch ein Rohr getrieben werden, 1. dad. gek., daß die Gase in schraubenförmiger Wirbelung durch das Rohr strömen u. bei der Einw. eines unter Hochspannung stehenden, vornehmlich als Sprühelektrode ausgebildeten Leiters, der in der Mitte des Rohres anebracht ist, ausgesetzt sind. — 2. dad. gek., daß die Rotationsrichtung des Gases gleichsinnig mit der den Leiter umgebenden elektr. Kraftlinienwirbelrichtung gewählt wird. — 3. dad. gek., daß abwechselnd auf jede Gasreinigungsperiode eine Rohrwandungsreinigungsperiode folgt, in welcher in den Gasstrom im gleichen Wirbelsinn Sand o. dgl. eingeblasen wird, der nach Art eines Sandstrahlgebläses die Rohrwandungen von den anhaftenden Staubeilchen säubert. — 4. dad. gek., daß dem Gas während der Reinigung trockener Sand oder ähnliche Stoffe beigemischt werden, welche die Rohrwand von den anhaftenden Abscheidungen säubern. (D. R. P. 425 039 Kl. 12e vom 5/10. 1922, ausg. 11/2. 1926.) KAUSCH.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: **Richard Reinrich**, Berlin-Südende), *Sprühelektrode für die elektrische Gasreinigung*, bei Gasen, die ätzende Bestandteile enthalten, 1. dad. gek., daß sie aus einem Schmelzfluß aus Glas, Porzellan, Quarz, Steingut oder ähnlichen Stoffen u. elektr. leitenden Stoffen (Metallen) besteht. — 2. dad. gek., daß ein Kern aus Nichtleitern mit einem Überzug aus einem Schmelzfluß nach 1. versehen ist. (D. R. P. 425 273 Kl. 12e vom 29/8. 1923, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: **Richard Reinrich**, Berlin-Südende), *Elektrische Niederschlagseinrichtung mit röhrenförmigen Niederschlagselektroden und linearen parallelen Sprühelektroden*, 1. dad. gek., daß die Niederschlagselektroden aus nebeneinander angeordneten, mit Öffnungen versehenen Rohren bestehen, u. daß diese Rohre gegen die Horizontale geneigt sind u. die Sprühelektroden oberhalb der oben offenen Röhren verlaufen. — 2. dad. gek., daß die Sprühelektroden so ausgebildet sind, daß sie nur in Richtung auf die oben offene Seite der Röhren eine Sprühwirkung ausüben, nach der entgegengesetzten Seite hin aber ein elektrost. Feld erzeugen. — 3. dad. gek., daß die Sprühelektrode mit U-förmigem Querschnitt ausgebildet ist. — 4. dad. gek., daß an den Niederschlagsröhren Klappen zur das Ablassen des in den Röhren liegenden Staubes in den Hauptsammelbehälter angebracht sind. — 5. dad. gek., daß der gemeinsame Sammelraum für das niederschlagene Gut mit einem die Verbrennung des Niederschlagsgutes unterbindendem Gas angefüllt ist. (D. R. P. 425 274 Kl. 12e vom 15/9. 1923, ausg. 15/2. 1926.) KA.

Kirchhoff & Co., Hannover, *Elektrodenreinigung bei elektrischen Gasreinigern*, dad. gek., daß die Sprühelektroden zwischen u. an den Niederschlagselektroden kreisend auf u. ab bewegt werden. (D. R. P. 425 025 Kl. 12e vom 9/10. 1923, ausg. 20/2. 1926.) KAUSCH.

Rudolf Holzer, Rotenbach, O.-A. Neuenbürg, *Verfahren und Vorrichtung zur Ausscheidung von Fremdbestandteilen aus Luft, Gas o. dgl. mit einer vom Staubträger in*

Bewegung gesetzten Filterfläche. 1. Verf. dad. gek., daß der Staubträger der Filterfläche eine seiner Geschwindigkeit angepaßte, durchaus gleichmäßige Bewegung erteilt, um die Durchgangsreibung zwischen dem zu reinigenden Staubträger u. der Filterfläche zu vermindern u. aufzuheben u. den Staubträger mit ausgeglichener Geschwindigkeit durch die Filterfläche gleiten zu lassen. — 2. Vorr. dad. gek., daß im Innern der Filtertrommel, die von einem in Form eines Löffelturbinenrades gehaltenen Windrad angetrieben wird, Ablenkflächen oder Leitschaufeln, z. B. Ablenkrollen, für die durch das Filter gleitende Luft o. dgl. angeordnet sind, die gleichzeitig durch die Hemmung des sich bildenden u. kreisenden Luftkegels widerstandsvermindernd wirken. (D. R. P. 425 542 Kl. 12e vom 21/3. 1924, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

J. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., *Verfahren und Vorrichtung zur ununterbrochenen Reinigung von mit löslichen, unlöslichen oder beiderlei fremden Bestandteilen behafteten Salzen.* 1. Verf. dad. gek., daß man das unreine Salz in einem Fallrohr durch einen aufsteigenden Strom der gesättigten Lsg. eines reinen Salzes gleicher Zusammensetzung hindurchrieseln läßt, worauf das gereinigte Salz nach dem Absetzer gegebenenfalls unter Zuführung von W. in gelöstem Zustande, weitergefördert wird während neue Mengen des unreinen Salzes, z. B. mit Hilfe der zur Reinigung benutzte Waschlsg., dem Fallrohr zugeleitet werden. — 2. Vorr. dad. gek., daß das Fallrohr wellenförmig gebogen ist. (D. R. P. 425 503 Kl. 12c vom 1/7. 1924, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

III. Elektrotechnik.

J. R. Partington und **N. L. Anfilogoff**, *Eine Verbesserung des elektrischen Vakuumofens.* Der Otto-Ruff-Typ ist für hohe Temp. geeignet umgeändert worden. Ein entsprechend feuerfester Tiegel u. die Möglichkeit der Analyse der entstandenen Gase ist vorgesehen. (Trans. Faraday Soc. 21. 360—70. 1925. Univ. London.) WILSON.

André Samuel, *Über einen neuen elektrischen Isolator.* Wird die Kondensation der Formaldehyd mit Kresol in dem Augenblick unterbrochen, wenn das Prod. viscos noch in A. u. Aceton ll. ist, so erhält man bei der Behandlung mit S_2Cl_2 einen Stoff, welcher dem Kondensationsprod. ohne S sehr ähnlich ist. Die Aufnahme an S_2Cl_2 beträgt etwa 12% der angewandten Menge Formaldehyd + Kresol. Auch muß für die Entfernung der entstandenen HCl gesorgt werden. Durch Lösen u. Wiederauffällen entsteht ein weißes Pulver der D. 1,18. Es wird „Thiolit“, entsprechend seiner Herkunft genannt. Derselbe ist geruchlos u. erweicht bei 80°. Beim raschen Erhitzen auf 150° unter Druck vollzieht sich die Polymerisation augenblicklich zu einer glasigen M. ohne jegliche Gasentw. Das Prod. ist dann sehr hart u. in allen Lösungsmitteln unlöslich. Es ist unschmelzbar u. nicht brennbar u. erweicht nicht in der Hitze. Das nicht polymerisierte Pulver löst sich in A., KW-stoffen, Aceton, Äthylacetat, Furfurol, Mesityloxyd, cyclo-Hexanol, Pyridin usw. Ein Stück Cu mit einer dünnen Schicht Thiolit überzogen zeigt Reibungselektrizität wie Bernstein. Der Widerstand des Thiolit beträgt ungefähr $300 \cdot 10^6$ Megohm/cm. Die spezif. Induktion ungefähr 4,5. Eine Scheibe von 4,1 mm Dicke wird von 58000 Volt eben durchschlagen, eine solche von 0,1 mm Dicke von 6500 Volt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 206—08.) ENSZLIN.

F. Trey, *Über Unipolaritätserscheinungen an gepressten Pulvern.* (Vgl. SCHMID Ann. der Physik [4] 75. 337; C. 1925. I. 196.) Vf. untersuchte künstliche Detektoren bestehend aus gefällten u. gepressten Metallsulfiden u. verglich dieselben mit den entsprechenden natürlichen Krystallen. Im ganzen wurden folgende 17 Krystalle (KRANTZ, Bonn) untersucht: *Silberglanz* (Freiberg i. Sa.), *Kupferglanz* (Butte, Montana), *Kupferglanz* (Eisenfeld, Siegen), *Kupferkies* (Moonto, Südaustralien), *Kupferkies* (Siegen), *Glanzkobalt* (Riddarhyttan, Schweden), *Glanzkobalt* (Koblenz, Ontario), *Kobaltnickelkies* (Littfeld, Westfalen), *Kobaltnickelkies* (Schwabengrund, Mäsen), *Zinnkies* (St. Agnes, Cornwall), *Bornit* (Afrika), *Bornit* (Butte, Montana).

Schwefelkies (U. S. A.), *Schwefelkies* (Schweiz), *Eisenpyrit*, *Wismutglanz* (Brasilien), *Bleiglanz*. Die Verss. zeigen, daß Silberglanz u. gepresstes Silbersulfidpulver elektrolyt. eiten; die Unipolarität wird durch die Polarisation bedingt. Ebenso verhalten sich Glanzkobalt, Kobaltsulfidpulver, Zinnsulfidpulver. Von den Haloidsalzen leitet das AgJ am besten. Auch hier ist wieder die Polarisation Ursache der Unipolarität. Die Schleifencharakteristiken beim Bleiglanz u. gepreßten PbS-Pulver werden durch eine Polarisation in einer oberflächlichen Feuchtigkeitsschicht hervorgerufen. Die eigentliche Detektorwrkg. kann nicht auf eine Polarisation zurückgeführt werden. — Gebulverter Bleiglanz u. gefälltes PbS lassen nach dem Pressen den Strom in beiden Richtungen gleich gut durch u. gehorchen dem Ohmschen Gesetz. Werden beide über 150° erhitzt, so tritt eine starke Unipolarität auf. Die Unipolarität rührt nicht daher, daß sich eine oberflächliche Schicht von PbSO₄ bzw. PbO bildet; sie ist überhaupt nicht an eine oberflächliche Schicht gebunden. Bleiglanzkrystalle leiten den Strom besser, wenn die Pt-Spitze + ist; werden dieselben gepulvert u. auf über 150° erhitzt oder verwendet man gefälltes PbS, das auf über 150° erhitzt ist, so ist die Leitfähigkeit größer, wenn die Pt-Spitze — ist. Schwefelkies, Eisenpyrit u. Eisensulfid verhalten sich wie Bleiglanz u. PbS. Kupferglanz, Kupferkies, Bornit u. Kupfersulfidpulver gehorchen dem Ohmschen Gesetz. Bei Wismutglanz u. Wismutsulfidpulver ist der Widerstand so groß, daß ihre Detektorwrkg. nicht untersucht werden konnte. Es wurde ferner die Tatsache bestätigt, daß ein spitzes Drahtende zur Erzielung einer Detektorwrkg. nicht unbedingt erforderlich ist. (Physikal. Ztschr. 26. 849—62. 1925.)

K. WOLF.

Alfred Soulier, Arcueil, Frankreich, *Elektrolytischer Kondensator*, bestehend aus einer Fl., die Pikrinsäure oder ein Salz dieser enthält. (E. P. 216 139 vom 14/5. 1924, ausg. 16/7. 1924. F. Prior. 14/5. 1923.)

KAUSCH.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: **August Weyl**, Charlottenburg), *Reinigung von Filterdiaphragmen bei elektrolytischen Prozessen*, dad. gek., daß von Zeit zu Zeit, zweckmäßig unter Herabsetzung der Stromstärke, vor das Diaphragma eine Reinigungslg. gebracht wird, welche die Elektrolytsg. u. eine zuzätzliche saure bzw. alkal. Lsg. enthält, deren Säure- bzw. Alkaligehalt so bemessen ist, daß dadurch die an der Kathode bzw. Anode entstehenden Alkali- bzw. Säurekonzentrationen neutralisiert werden oder ein geringer Überschuß an Säure bzw. Alkali vorhanden bleibt. (D. R. P. 425 275 Kl. 12h vom 3/12. 1924, ausg. 15/2. 1926.)

KAUSCH.

Western Electric Co., Inc., New York, übert. von: **Howard T. Reeve**, East Orange, V. St. A., *Kathoden für Vakuumröhren*. (A. P. 1 565 200 vom 12/10. 1920, ausg. 8/12. 1925. — C. 1924. II. 1382 [Oe. P. 96 439].)

KÜHLING.

Fritz Baudach, Aschersleben, *Trockenelement mit Eisen- und Kohlelektroden*, dad. gek., daß die durchlochte, innen mit einer Rostschicht überzogene Schwarzblechlektrode als Elementgefäß dient u. mit angefeuchtetem feinkörnigem Koks gefüllt ist. — Das Element kann sowohl als Trocken- wie als nasses Element verwendet werden u. zeichnet sich dadurch aus, daß es dauernd durch den O₂ der Luft, auch während des Betriebes regeneriert wird. (D. R. P. 424 740 Kl. 21b vom 20/7. 1924, ausg. 3/2. 1926.)

KÜHLING.

William H. Wood, South Euclid, V. St. A., *Sammlerplatten*. Die fertig formierten Platten werden gespült u. einige Zeit in h. konz. Lsgg. von krystallwasserhaltigen Salzen stark elektropositiver Elemente, besonders MgSO₄, eingehängt. Sie werden dadurch von überschüssiger H₂SO₄ befreit u. gehen in „knochentrockenen“ Zustand über, in dem sie sehr haltbar sind. (A. P. 1 570 115 vom 7/8. 1922, ausg. 19/1. 1926.)

KÜHLING.

Prest-O-Lite Co., Inc., New York, übert. von: **Raymond C. Benner**, Bayside, New York., *Masse für die positiven Elektroden von Sammelbatterien*. Man behandelt

PbO₂ im Gemisch mit einer Pb-Verb. geringerer D. als das PbO₂ (PbSO₄) mit einer Alkalilsg. (**A. P. 1 572 512** vom 6/11. 1923, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Prest-O-Lite Co., Inc., New York, übert. von: **Helene Gilette Weir**, Newark, N. J., *Sammlerbatterieelektroden*. Man stellt zunächst eine Paste her, die sulfatisierbares Pb u. eine Pb-Verb. enthält, deren D. geringer als die der herzustellenden aktiven M. ist. Das Gemisch wird auf einer Unterlage aktiviert. (**A. P. 1 572 586** vom 6/11. 1923, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Canadian National Carbon Co., Ltd., Toronto, Kanada, übert. von: **Union Carbide and Carbon Research Laboratories Inc.** und **George W. Heise**, New York, *Depolarisator*. (**Can. P. 248 855** vom 2/1. 1924, ausg. 21/4. 1925. — **C. 1924. II. 2198** [A. P. 1 484 782].) KÜHLING.

Thermo Electric Battery Co., Chicago, Ill., übert. von: **Otto Hermann**, Chicago, *Thermoelektrisches Element* bestehend aus einer Legierung aus 81% Ni, 17% Mo u. 2% V. (**A. P. 1 572 117** vom 4/5. 1925, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Canadian Westinghouse Comp., Ltd., Hamilton, Kanada, übert. von: **Leon McCulloch**, Wilkinsburg, V. St. A., *Elektronen aussendendes Element*. Wehneltkathoden werden mit einem Überzug von Ba(NO₃)₂ u. Sr(NO₃)₂ versehen, in einer Atm. von CO₂ erhitzt, um die Nitrate in Carbonate zu verwandeln u. das Erzeugnis in einer oxydierenden Atm. erhitzt. (**Can. P. 250 297** vom 9/12. 1922, ausg. 2/6. 1925.) KÜHLING.

Thomas Frederick Wall, Sheffield, *Einführung von Kapazitätseffekten in Wechselstromsysteme*. Man verwendet einen ein oxydierendes Agens enthaltenden Elektrolyten (Platten, die Pb₂O oder Pb₂O₃ oder Gemische dieser aufweisen u. in H₂SO₄ eingetaucht werden). (**E. P. 215 897** vom 14/3. 1923, ausg. 12/6. 1924.) KAUSCH.

Hans Weber, Berlin-Tempelhof, *Vorrichtung zur Verhütung der Korrosion an der Bleiauskleidung der Holzkästen für elektrische Bleisammler*, dad. gek., daß zwischen dem Holzkasten u. der Bleiauskleidung eine chem. nicht angreifbare u. elektr. isolierende Schicht aus Weich- oder Hartgummi angebracht ist. — Da erfahrungsgemäß die Korrosion nur am Boden u. dem untersten Teil der Seitenwände stattfindet, so wird die Schicht zweckmäßig nur dort angebracht. (**D. R. P. 424 856** Kl. 21b vom 15/6 1924, ausg. 6/2. 1926.) KÜHLING.

V. Anorganische Industrie.

Ferdinand Roth, *Über die Chloratbildung bei fabrikmäßiger Erzeugung von Elektrolytchlor*. Die verschiedenen bei der Elektrolyse von NaCl verlaufenden Rkk. werden besprochen. Will man Chloratbildung bei der Herst. von Hypochloritbleichlauge vermeiden, so muß stets ein Überschuß an CaO vorhanden sein u. die Temp. darf 37° nicht überschreiten. Chloratbildung macht sich durch Rotfärbung infolge Entstehung von HMnO₄ bemerkbar. (Zellstoff u. Papier **6. 71—72.**) SÜVERN.

J. A. Almquist und **R. L. Dodge**, *Ultra-Reinigung von Gasgemischen*. (Vgl. S. 199.) Es wird die vorübergehende u. die bleibende Vergiftung von Katalysatoren durch geringe Mengen von Giften in den Reaktionskomponenten u. ihre Verhinderung besprochen. Bei der Synthese des NH₃ aus N₂ u. H₂ bei 100 at u. erhöhter Temp. bei Anwesenheit von geschmolzenem Eisenoxyd mit 2,33% Al u. 0,60% K₂O als Katalysator treten als vorübergehende Gifte O₂, H₂O, CO u. CO₂, welche mit H₂ unter B. von W. reagieren u. ihrem Gehalt an O₂ entsprechend verzögernd wirken, auf. Als bleibende Gifte sind S, P u. Cl anzusehen. CO läßt sich nur sehr schwer entfernen. Es werden an Hand der Patente verschiedene Methoden aufgeführt, von denen die Entfernung durch ammoniakal. Cu⁺-Lsg. für die wirkungsvollste gehalten wird. CO₂ läßt sich durch Waschen mit W. u. alkal. Lsgg. zurückhalten. O₂ wird durch reduzierende Lsgg. oder Cu u. andere leicht oxydierbare Metalle zurückgehalten.

S wird mit Ausnahme des COS meist im Laufe der Entfernung der anderen Verunreinigungen unschädlich gemacht. COS kann durch Absorption an Koks mit wss. NH_3 zurückgehalten werden. Die freien Halogene reagieren mit geschmolzenem Na oder Lsgg. von NaOH. Die Entfernung des P kann durch h. Cu oder saure Cu_2Cl_2 -Lsgg. geschehen. Ebenso kann CrO_3 verwandt werden. In dem zur NH_3 -Synthese bis jetzt nach dem Boscchverf. hergestellten Wassergas kommt P kaum vor, doch ist in dem bei der Einw. von Wasserdampf auf P zur Herst von H_3PO_4 entstehenden H_2 vorhanden. W. wird am sichersten durch fl. Absorptionsmittel zurückgehalten. (Chem. Metallurg. Engineering 33. 89—92.) ENSZLIN.

W. Landgraeber, *Graphit, sein Vorkommen und seine Aufbereitung*. (Brennstoffchemie 6. 355—56. 1925.) BIELENBERG.

Ryziger, *Natürliche und gezüchtete Perlen*. Vf. beschreibt an Hand von Abbildungen die Unterschiede im Gefüge der natürlich gewachsenen u. der infolge eines künstlichen Eingriffs in der Muschel gezüchteten Perlen, die Unterscheidung der Perlen in natürliche u. gezüchtete nach verschiedenen Verff. (Best. der D., der opt. Eigenschaften, des Verh. gegen X-Strahlen u. a.), die sich in ihren Ergebnissen gegenseitig stützen, u. erläutert, warum der Verkauf der gezüchteten Perlen als „Perlen“ schlechthin als Betrug anzusehen ist. (Ann. des Falsifications 19. 5—15.) RÜHLE.

Friedrich Riedel, Essen, Ruhr, *Erzeugung von Schwefel aus schwefelhaltigen Gasen*, 1. dad. gek., daß die S-haltigen Gase als Verbrennungsluft — mit oder ohne Zusatz gewöhnlicher Luft — in einem Kohlenstaub- oder Ölbrenner — mit oder ohne Beimischung von Kontaktstoffen — verbrannt werden. — 2. dad. gek., daß für die Fortbewegung des Kohlenstaubes an Stelle von Luft O_2 -arme Gase, z. B. Verbrennungsgase, oder O_2 -freie Gase, z. B. N_2 verwendet werden. (D. R. P. 425 664 Kl. 12i vom 14/8. 1924, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

Adolf Bähr, Hamburg, *Herstellung von Nitriten aus nitrosen Gasen*, 1. dad. gek., daß man die getrockneten u. mit entkohlensäuerter u. getrockneter Luft verdünnten Gase durch ein Absorptionsmittel leitet. — 2. dad. gek., daß man die Abgase einem Reduktionsverf. unterwirft u. die entstandenen NO-Gase mit entkohlensäuerter u. zum mindesten vorgetrockneter Luft durch Absorptionsmittel leitet. (D. R. P. 424 950 Kl. 12c vom 2/5. 1925, ausg. 8/2. 1926.) KAUSCH.

Adolf Welter, Lothar Welter, Krefeld-Rheinhafen, und Anton Weindel, Essen-Ruhr, *Halbarmachung von kohlensaurem, doppeltkohlensaurem, carbaminsaurem Ammoniak u. dgl.*, dad. gek., daß man unter Benutzung des im Patent 336612 (C. 1921. V. 329) beschriebenen Verf. die möglichst trockenen feinpulverigen Ammoniaksalze für sich oder mit anderen organ. oder anorgan. Salzen gemischt in dem oberen Teil eines Turmes oder einer Kammer einsaugt oder einbläst, gegebenenfalls wss. Lsgg. von Salzen anorgan. Säuren, Zellstofflauge oder Gemischen solcher oder ähnlicher Stoffe in denselben Teil des Turmes hinein fein zerstäubt u. die MM. durch entgegengeführte, gegebenenfalls gasförmige Säuren enthaltende Luft so herunterfallen läßt, daß die eingehüllten Ammoniaksalzteilchen trocken u. nicht mehr backend im unteren Teil des Turmes anlangen. — Es können salzsäurehaltige Abgase verwendet werden. (D. R. P. 425 335 Kl. 16 vom 3/12. 1924, ausg. 16/2. 1926.) KÜHLING.

Emil Hene, Staßfurt, *Herstellung von Entfärbungskohle (aktiver Kohle) aus mineralischer Kohle*, z. B. Braunkohle o. dgl., mit Sulfaten, 1. dad. gek., daß ein mechan. Gemenge von Kohle u. einem ungel. Sulfat oder Bisulfat der Alkalien oder einem Bisulfat der Erdalkalien bei einer Temp. 600° C geglüht wird. — 2. dad. gek., daß die Bildungsgemische der Sulfate oder Bisulfate der Alkalien oder Erdalkalien mit der Kohle gemengt u. geglüht werden. — 3. dad. gek., daß an Stelle von Braunkohle entgaste Braunkohle, Grudekoks oder ein durch Auslaugen oder Erhitzen von Braunkohle

oder kohlenstoffhaltigen Stoffen gewonnenes Erzeugnis Verwendung findet. (D. R. P. 425 261 Kl. 12i vom 12/3. 1922, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Gesellschaft für chemische Produktion m. b. H., Mannheim-Waldhof, *Herstellung einer hochaktiven Adsorptionskohle*. (D. R. P. 425 702 Kl. 12i vom 23/2. 1924, ausg. 26/2. 1926. Tschechoslowak. Prior. 22/2. 1923. — C. 1924. II. 224.) KAUSCH.

Karl Swoboda, Kapfenberg, *Herstellung von Bügelkohle* aus Holzkohle unter Verwendung von Wasserglas als Bindemittel, dad. gek., daß man die Zusatzmenge des Wasserglases soweit erhöht, daß dessen verbrennungsverzögernde Wrkg. aus reichend zur Geltung gelangt, um die sonst notwendigen besonderen Zusätze zu vermeiden. (Oe. P. 96 790 vom 9/12. 1921, ausg. 25/4. 1924.) OELKER.

Celite Co., Los Angeles, Californ., übert. von: **Clark S. Teitsworth**, Lompoc Californ., *Absorptionsmaterial*. Man läßt SiO_2 sich zu einem Gel in Berührung mit einem porösen Stoff abscheiden. (A. P. 1 570 537 vom 27/3. 1924, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. *Herstellung von lagerbeständigen Alkalipercarbonaten*, dad. gek., daß man diesen Salzen während oder nach ihrer Erzeugung geringe Mengen von Stoffen zusetzt, welche, wie z. B. Alkalisilicate oder Magnesiansilicate, befähigt sind, das Alkalipercarbonat gegen Zers. zu schützen. (D. R. P. 425 598 Kl. 12i vom 16/11. 1915, ausg. 22/2. 1926.) KA.

Emil Hene, Staßfurt, *Herstellung von Sulfiten, Bisulfiten und Metabisulfiten der Alkalien*, insbesondere des Kaliums, durch Einwirkenlassen von $\text{CaH}_2(\text{SO}_3)_2$ auf Alkalisulfat, dad. gek., daß aus Lsgg. von $\text{CaH}_2(\text{SO}_3)_2$ für sich oder unter Zusatz von festen CaSO_3 bzw. dessen Bildungskomponenten mit Hilfe von K_2SO_4 in Lsg. oder in Form von Syngenit oder in fester Form KHSO_3 -Lsgg. mit relativ viel Ca-Ionen hergestellt die nach der Filtration erhaltenen Lsgg. mit K_2SO_4 in Lsgg. mit verhältnismäßig wenig Ca-Ionen umgewandelt u. die hierbei erhaltenen K-reichen Ndd. mit Hilfe einer Lsg. von $\text{CaH}_2(\text{SO}_3)_2$ oder deren Bildungskomponenten, gegebenenfalls unter neuem Zusatz von $\text{CaH}_2(\text{SO}_3)_2$ oder seinen Bildungskomponenten, in Lösungen mit verhältnismäßig viel Calcium umgewandelt werden, die von neuem in der angegebenen Weise zur Herstellung Ca-armer KHSO_3 -Lsgg. Verwendung finden können. — 2. dad. gek., daß die Rk. unter Kühlung, unter Druck oder unter Anwendung beider durchgeführt wird. — 3. dad. gek., daß als Zusatz zur Rk. ein CaSO_3 Anwendung findet, das aus $\text{CaH}_2(\text{SO}_3)_2$ -Lsgg. durch Austreiben der überschüssigen SO_2 erhalten wurde. — 4. dad. gek., daß die erhaltene KHSO_3 -Lsg. dadurch von Fe u. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ befreit wird, daß die Laugen erhitzt u. von dem ausgeschiedenen $\text{Ca}(\text{OH})_2$ u. Fe durch Absetzen oder Filtrieren befreit werden. (D. R. P. 424 949 Kl. 12i vom 2/3. 1924, ausg. 10/2. 1926.) KAUSCH.

Waldemar Recha, Gonzenheim b. Bad Homburg, *Kontinuierliche Herstellung von wasserfreiem Natriumsulfat*, dad. gek., daß $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ in einem Trog eines rotierenden Filters erhitzt wird oder diesem bei einer Temp. von über $32,4^\circ$ zugeführt wird u. das dabei sich ausscheidende wasserfreie Na_2SO_4 in bekannter Weise abgesaugt wird. (D. R. P. 424 983 Kl. 12i vom 4/10. 1924, ausg. 10/2. 1926.) KAUSCH.

Rumford Chemical Works, übert. von: **Ellery Lewis Wilson**, Providence V. St. A., *Entwässern von Calciumsulfat*. Als Nebenprod. chem. Verff. gewonnenes Calciumsulfatschlamm wird zentrifugiert u. dann vor dem Glühen einem Preßdruck ausgesetzt. Diese Druckbehandlung bewirkt die Entstehung eines Erzeugnisses von sehr gleichmäßiger Zus. (A. P. 1 570 583 vom 22/8. 1924, ausg. 19/1. 1926.) KÜHLING.

American Dressler Tunnel Kilns, Inc., New York, übert. von: **Conrad Dressler**, New York, *Trocknen und Calcinieren von Gips*. Der Gips wird in einem Strohdurch eine verlängerte Heizkammer mit 2 Heizzonen geführt, in deren erster das Gut mit einem Gleichstrom hoch erhitzter Gase, in der zweiten mit einem Strohdurch wenig hoch erhitzter Gase behandelt wird. (A. P. 1 571 189 vom 25/2. 1920, ausg. 2/2. 1926.) KAUSCH.

Karl Ebers, Deutschland, *Verbesserung der Farbe von rohem Schwerspat*. Der Schwerspat wird mit Flußspat u. gegebenenfalls Salpeter gemischt, die Mischung mit H_2SO_4 erhitzt u. dann ausgewaschen. (F. P. 600 847 vom 16/7. 1925, ausg. 16/2. 1926. D. Prior. 17/7. 1924.) KÜHLING.

Soc. Bournisien, Beau et Cie., Paris, *Füllstoff für die Wände von Geldschränken* u. dgl. Es werden Oxyde von Th, Zr, Ce, Y usw. oder diese Oxyde enthaltende Gemische verwendet. Die Stoffe sind schlechte Wärmeleiter u. leuchten bei hohen Temp. mit großem Glanz. (E. P. 244 720 vom 22/10. 1925, Auszug veröff. 10/2. 1926. Prior. 16/12. 1924.) KÜHLING.

S. J. P. Società Italiana Potassa, Rom, *Gewinnung von Kali und Tonerde* aus mit Kalk bei hoher Temp. bis zum Schmelzen des Gemisches behandeltem *Leucit*, dad. gek., daß das geschmolzene Erzeugnis zu möglichst großen Klumpen gegossen u. lerart langsam abgekühlt wird, daß es von selbst zu Pulver zerfällt. (D. R. P. 125 797 Kl. 121 vom 24/1. 1924, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH.

American Sheet and Tin Plate Co., Pittsburgh, übert. von: **Rudyard Porter** und **Joshua C. Whetzel**, Pittsburgh, *Gewinnung von Oxyden aus Eisenoxyd enthaltenden Metallen*. Die Metalle werden in h. konz. Ätzalkalilsgg. u. dann in h. Säurebäder HCl , HNO_3 eingebracht. (A. P. 1 572 848 vom 27/8. 1924, ausg. 9/2. 1926.) KA.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

P. Nicolardot, *Nomenklatur und Klassifikation optischer Gläser*. Vf. zeigt an Hand einiger Nomenklatorsysteme die Mangelhaftigkeit der Nomenklatur opt. Gläser. ZSCHIMMER teilt die Gläser nach ihrer Zus. in Silicate, Borate, Aluminoborate ein u. jede dieser Klassen wieder in 4 Untergruppen nach ihrem Alkaligehalt. ZSCHOCKE (Glasfabrik Sendling) nimmt die Klassifikation nach dem Bedarf der Optiker vor. Kron u. Flint werden als Gruppenbezeichnungen angewendet, dem werden noch die Bezeichnungen Barion u. Barint zur Seite gestellt. Barion ist schweres Baryt-Kronglas mit schwacher Dispersion u. hohem Brechungsindex, Barint ist Baryt-Flintglas mit schwacher Dispersion u. hohem Brechungsindex. — PEDDLE schlägt vor, die Namen Kron u. Flint beizubehalten u. die Bezeichnungen der näheren Zus. hinzuzufügen. z. B. Na-Ca-Silicat, Na-K-Zn-Borat. (Rev. gén. des Colloides 4. 9—13.) LASCH.

J. Bronn, *Geschmolzener Magnesit*. (Vgl. S. 1469.) Es wird der Einfluß anderer Stoffe (CaO , SiO_2 , Al_2O_3) auf den F. des MgO ($\sim 2800^\circ$) besprochen. Bei Anwesenheit von fein verteilter Kohle soll die Temp. bei Verwendung von geschmolzenem Magnesit nicht über 1900° gesteigert werden. Seine D. beträgt 3,5—3,6 u. seine Härte etwas weniger als 7. Bei Ofenausfütterungen ist er als Stampfmasse mit Teer oder Pech als Bindemittel zu verwenden. (Metall u. Erz 23. 91—95. Hannover, Rombacher Hüttenwerke.) ENSZLIN.

John Langbein, Hamburg, *Herstellung einer politurfähigen Glasur auf Zement, Stein oder Holz*, dad. gek., daß man das Casein ersetzt durch alkal. gel. bzw. gewechte natürliche oder künstliche Harze, Harzverbb. oder gel. Seifen, die mit Hydroxyden, Hydraten, Oxyden, Salzen, Erden, Säuren unter Zusatz von flüchtigen Ölen u. Schlacken als flockenartige M. ausgeschieden sind, oder durch mit Hydroxyden, Hydraten, Oxyden, Salzen, Erden unter Zusatz von flüchtigen Ölen u. Schlacken zusammengeschmolzene Harze oder Harzverbb., u. daß man das flüchtige Öl durch fette Öle, die in Ä., A., KW-stoff oder einem flüchtigen Öl gel. sind, ersetzt. — Die Glasuren binden besser mit Zement ab als mit Casein erzeugte. (D. R. P. 425 207 Kl. 80b vom 30/11. 1920, ausg. 13/2. 1926.) KÜHLING.

Corning Glass Works, Corning, N. Y., übert. von: **William Chittenden Taylor**. Corning, Glas enthaltend SiO_2 , Al_2O_3 , B_2O_3 , ein Halogen u. eine färbende Metallverb. (Co_2O_3). (A. P. 1 572 625 vom 7/1. 1921, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Fred M. Locke und Fred J. Locke, Victor, N. Y., *Keramisches Material* aus eine Mn-Verb. (MnO_2) u. verhältnismäßig viel Ton. (A. P. 1 572 730 vom 17/10. 1924 ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Wesley C. Pruitt, übert. von: **Herman C. Helmle**, Springfield, *Masse zum Ausbessern von Straßenpflaster aus Zement*. Man vermischt Rohkautschuk mit Harz dest. Öl von 37—40° Bé, TiO_2 , BaSO_4 u. Ruß; die Mischung wird auf 120—130° erwärmt u. in fl. Zustand in die Sprünge gegossen. (A. P. 1 570 219 vom 2/8. 1923, aus 19/1. 1926.) FRANZ.

Arno Andreas, Münster i. W., *Herstellung von Leichtsteinen und Leichtplatten* aus einer gepreßten Torf-, Kork- o. dgl. -platte u. einer Mörtelschicht für Bauzwecke insbesondere Dacheindeckungen nach Patent 423540, dad. gek., daß die Mörtelschicht durch mechan. Druck oder Schlag, z. B. durch Walzen, aufgepreßt wird. — Der große Verlust an Rohstoff, der beim Arbeiten nach dem Torkretverf. entsteht, wird vermieden (D. R. P. 425 206 Kl. 80b vom 19/4. 1925, ausg. 17/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 423540; C. 1926. I. 1695.) KÜHLING.

Williamsport Building Products Co., Williamsport, Pennsylvan., übert. von **Oscar Frosell**, Hackensack, N. J., *Plastische Masse* bestehend aus calcinierter M. W. unter Zusammenpressen u. Erhitzen hydratisierter MgO. Zweckmäßig wird die Herst. der M. in Ggw. geringer Mengen (NH_4)Cl durchgeführt. (A. P. 1 572 714 vom 25/3. 1921, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Earl Holley, übert. von: **Daniel H. Meloche**, Detroit, Michigan, *Schutzüberzug für Metallformen*, welcher aus einem indifferenten, feuerfesten Isoliermaterial z. B. gebranntem Ton, in Mischung mit Ruß u. einer kleinen Menge eines l., als Bindemittel dienenden Silicats zusammengesetzt ist. (A. P. 1 568 234 vom 12/1. 1924 ausg. 5/1. 1926.) OELKER.

Universal Rubber Paviers (Manchester 1923) Ltd. und **Arthur Edward Brown**, England, *Bituminöse, für den Bau, die Erhaltung und Ausbesserung von Straßen geeignete Mischungen*. Bitumen wird mit feingemahlenem Ton u. Kautschukabfällen o. dgl. gemischt. (F. P. 600 293 vom 3/7. 1925, ausg. 3/2. 1926. E. Prior. 3/7. 1924.) KÜHL.

Joseph Hay Amies, Philadelphia, *Bituminöse Straßenüberzugsmasse*. Erde wird auf etwa 2000° F erhitzt u. mit mit sd. W. macerierter Erde gemischt, dann werden zu 9 Kubikfuß der hochoerhitzten M. 20—30 Pfund feingekörnter Kalk sowie Bitumen hinzugesetzt. (A. P. 1 570 028 vom 1/4. 1924, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

Karl Rösler, Bochum, *Herstellung plastischer Massen, insbesondere zur Herstellung von Teermakadam*, in denen Teer, Pech, Öle, Cumaronharz u. ähnliche Stoffe sowie Schwefel enthalten sind, dad. gek., daß an Stelle des Schwefels ausgebrauchte Gasmasse in entsprechend größerer Menge benutzt u. die M. zwecks Vulkanisierung erhitzt wird. — Die keinen Schwefel enthaltenden Bestandteile der Gasmasse sind unschädlich, für viele Zwecke sogar sehr nützlich. (D. R. P. 425 216 Kl. 80 b vom 28/12. 1924, ausg. 17/2. 1926.) KÜHLING.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Dana G. Coe, *Bedeutung der verschiedenen Methoden des Düngerstreuens für den Ernteertrag bei bestimmten Bodenbedingungen*. Infolge steigenden Verbrauchs von künstlichen Düngemitteln gewinnt die Frage der geeignetsten Düngerunterbringung in Ackerboden auch für die Ver. Staaten von Amerika Bedeutung. Die Unterss. zeigen, daß alle Methoden, die die Düngesalze mit den Samen in direkte Berührung bringen nicht empfehlenswert sind, weil dadurch die Keimung verzögert, bei hohen Gaben sogar verhindert wird. (Soil Science 21. 7—21. Idoma State Coll.) TRÉNEL.

C. H. Arndt, *Der Salzbedarf von Lupinus albus*. Die günstigste Salzkonz. für das Wachstum von Lupinus albus in Gewächshausverss. ist 0,0084-n. (auf Kationen

berechnet). K, Ca, Mg sollen sich wie 5 : 3 : 4 u. NO_2' , HPO_4'' , SO_4'' wie 5 : 9 : 4 verhalten. Ein günstiges Wachstum wurde durch folgende Nährslg. erzielt: 0,0035-n. KNO_3 , 0,0021-n. $\text{CaH}_4(\text{PO}_4)_2$, 0,0028-n. MgSO_4 . Krit. $[\text{H}']$ bei pH 3,4—3,6. Hohe Phosphatkonzz. können leicht Chlorose verursachen. (Soil Science 21. 1—6. Univ. of Pennsylvania.)

TRÉNEL.

A. L. Prince und **H. W. Winsor**, *Der den Pflanzen zugängliche Stickstoff in Küchenabfällen und Harnstoff im Vergleich zu üblichen Düngemitteln*. Vegetationsverss. mit Sandkulturen von Gerste, Raps u. Zuckerrohr erweisen den geringen Düngerwert von Küchenabfällen. Harnstoff übertraf in seiner Wrkg. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ in allen Fällen u. in einigen selbst NaNO_3 . Nach 8 Tagen waren vom Harnstoff ammonifiziert: in Sandkulturen 6,9%, in Sand mit Boden zur Hälfte gemischt 87% u. im reinen Boden 92%. In einem sauren Boden, der in 15 Jahren hohe Gaben von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ u. keinen Kalk erhalten hatte (pH 4,8), wurde die Zers. des Harnstoffs erheblich verzögert (nach 11 Tagen waren erst 52% ammonifiziert); mit steigenden Kalkgaben stieg auch die Ammonifikation in diesem Boden wieder an. (Soil Science 21. 59—68. New Jersey, Ag. Exp. Stat.)

TRÉNEL.

Ray E. Neidig und **Robt. S. Snyder**, *Mineralische Bestandteile der Sonnenblume, die als Futtermittel angebaut wird*. Der analyt. Vergleich der Aschen von Sonnenblume u. Mais zeigt, daß erstere dem Boden erheblich mehr Nährstoffe — besonders K u. Ca — entzieht als letztere. (Journ. Agricult. Research 31. 1165—71. 1925. Univ. of Idaho.)

TRÉNEL.

J. Arlington Anderson, *Der Einfluß von verfügbarem Stickstoff auf die Zersetzung von Cellulose im Boden*. I. Vf. verfolgt die Zers. von fein zerteiltem Filtrierpapier (Munktell No. 10) in einem schweren Lehm Boden bis zu 98 Tagen unter Zusatz von steigenden N-Gaben in Form von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ u. NaNO_3 . Die Cellulosezers. ist den N-Gaben bis zu einem Maximum proportional. Unter den Bedingungen des Vers. wird dieser Punkt erreicht, wenn $\text{N} : (\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_x = 1 : 35$ ist. Die Kurve, die die Abhängigkeit der Cellulosezers. vom N-Bedarf der Mikroorganismen darstellt, biegt steil auf. NH_4 kann direkt N-Quelle für die Cellulose zersetzenden Mikroorganismen sein, ohne daß Nitrate gebildet werden; auch Nitrifikation u. Ammonifikation können in Ggw. von Cellulose vonstatten gehen. Die Mindererträge auf Böden, die Cellulose enthalten, erklären sich daraus, daß die Pflanze im Wettbewerb um den N den Mikroorganismen unterlegen ist. II. Eine weitere Versuchsreihe mit organ. N-Trägern wie Alanin, Asparagin, Tyrosin, Pepton, Casein, Stalldünger zeigt, daß der N organ. Verbb. für die Cellulosezers. in größerem Maßstabe in Frage kommt, als Vf. vorausgesehen hat. (Soil Science 21. 115—26. Central Swedish Agric. Exp. Stat.)

TRÉNEL.

Edmund Burke, *Der Einfluß von Nitratstickstoff auf den Eiweißgehalt und auf den Ernteertrag von Weizen*. Vf. hat von 1911—1917 den Feuchtigkeits- u. Nitratgehalt von Montanaböden untersucht, die — teils ununterbrochen, teils mit eingelegter Brache — mit Weizen bestellt worden waren. Die Brachfelder, die stets höhere Ernten u. Weizen mit höherem Eiweißgehalt brachten, zeigten auch den höheren Gehalt an Nitrat-N u. bis zur Tiefe von 3 Fuß auch höheren Feuchtigkeitsgehalt; Vf. mißt dem Nitratfaktor die größere Bedeutung bei. (Journ. Agricult. Research 31. 1189—99. 1925. Montana Agric. Exp. Stat.)

TRÉNEL.

C. H. Spurway und **R. H. Austin**, *Nachwirkungen einer Neutralsalzbehandlung auf die Bodenreaktion*. Je 20 g der Bodenproben, die in verschiedenen Tiefen entnommen waren, wurden 1 Stde. mit 50 ccm einer 2-n. CaCl_2 bzw. MgCl_2 , KCl , NaCl -slg. behandelt, auf einem Filter sorgfältig ausgewaschen u. in der wss. Suspension die $[\text{H}']$ mittels der H_2 -Elektrode bestimmt. Die $[\text{H}']$ aller Bodenproben, auch der sauren, wurde durch die angegebene Behandlung ins alkal. Gebiet — bis zu pH 10 bei den tiefsten Horizonten — verschoben. Den geringsten Einfluß hatte CaCl_2 , die

anderen Salze ordnen sich mit steigender Wrkg. in die Reihe Mg, K, Na. (Soil Science 21. 71—74. Michigan Ag. Exp. Stat.) TRÉNEL.

D. C. Parman, Benzol als „Larventod“ gegen den „Schraubenwurm“. Durch Benzol werden die Larven der *Cochliomyia macellaria* Fab. meistens in 40 Min. getötet. In die Wunde gebracht, wirkt es blutstillend u. hält die Fliegen ab. In keinem Falle von etwa 3000 behandelten verschiedenen Tieren wurde eine giftige Nebenwrkg. festgestellt. (Journ. Agricult. Research 31. 885—88. 1925. Unit. Stat. Dep. of Agric.) TRÉNEL.

E. B. Powell, Ein neuer Bodenprobenehmer. Beschreibung eines Geräts zur Entnahme von einwandfreien Bodenbohrkernen. (Soil Science 21. 53—56. Missouri Ag. Exp. Stat.) TRÉNEL.

Ercole Cerasoli, Italien, Düngemittel, bestehend aus Kieselgur, Melasseschlempe, Zellstoffablauge u. geringen Mengen Zement, Gips, hydrat. SiO₂ u. CaO. (F. P. 600 678 vom 10/7. 1925, ausg. 12/2. 1926.) KÜHLING.

Marcel Pierron, Frankreich, Behandlung von Rohphosphaten. An CaCO₃ reiche oder mit CaCO₃ vermischte Rohphosphate werden gebrannt, gemahlen u. mit W. abgelöscht. Die Erzeugnisse sind fein verteilt u. leicht assimilierbar. (F. P. 600 734 vom 11/10. 1924, ausg. 13/2. 1926.) KÜHLING.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Wilhelm Wild** und **Karl Eyer**) Ludwigshafen a. Rh., Überführung von Kalksalpeter in ein streufähiges Düngesalz (D. R. P. 423 958 Kl. 16 vom 4/7. 1924, ausg. 14/1. 1926. — C. 1926. I. 2139.) KÜ.

Emanuel David, New York, übert. von: **Howard Sanderson**, Baldwin, N. Y. Dünger bestehend aus Kakaobohnenschalen enthaltender (das Pflanzenwachstum fördernder) M. (A. P. 1 571 970 vom 24/1. 1924, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Giuseppe Traversari, Italien, Insektenvertilgungsmittel, bestehend aus einer Mischung von CCl₄, CS₂, C₆H₅NO₂, Kampher u. Kolophonium. (F. P. 581 697 vom 15/5. 1924, ausg. 3/12. 1924.) KÜHLING.

Leopold Gründl, Wien, Schädlingsvertilgungsmittel. Tabakauszug, ein wasserl. gemachtes Teeröl, Gallusgerbsäure oder eine pflanzliche Gerblsg. u. ein wss. Auszug aus Gallenpilz (*Boletus felleus* Bull.) werden gemischt u. dem Gemisch W. u. ein Konservierungsmittel, vorzugsweise Salicylsäure, zugesetzt. (Oe. P. 101 676 vom 14/2. 1924, ausg. 25/11. 1925.) KÜHLING.

Herbert Yeomans, Smethwick, England, Ungeziefervertilgungsmittel, bestehend aus C₁₀H₈, Mehl u. gegebenenfalls CaO oder C₁₀H₈, CaO, Stärke, Borsäure oder Borax (E. P. 228 293 vom 21/11. 1923, ausg. 26/2. 1925.) KÜHLING.

William Stakely Cox, College Park, V. St. A., Schädlingsbekämpfungsmittel bestehend aus einer Mischung von Ca(OCl)₂ u. Parisergrün. (A. P. 1 469 773 vom 25/4. 1921, ausg. 9/10. 1923.) KÜHLING.

Établissements Loyer und Soc. chim. de Massy-Palaiseau Réunis, Frankreich Unkrautvertilgungs- und Düngemittel, bestehend aus einer Mischung von NH₄ClO₄ u. einem Kalium- oder Natriumsalz bzw. einer Mischung von NaClO₃ u. NaNO₃. Das Mittel wird in wss. Lsg. verwendet u. kann auch durch eine Mischung von NaClO₄ u. einem Ammoniumsalz, z. B. (NH₄)₂SO₄ ersetzt werden. (F. P. 573 527 vom 15/2. 1923, ausg. 25/6. 1924 u. F. P. 29 455 [Zus.-Pat.] vom 13/2. 1924, ausg. 7/8. 1925.) KÜHLING.

Établissements Loyer u. Soc. chim. de Massy-Palaiseau Réunis, Frankreich Unkrautvertilgungsmittel. Zur Vertilgung von Unkraut werden Phenolsulfosäuren besonders Kresolsulfosäuren verwendet. (F. P. 572 888 vom 20/1. 1923, ausg. 14/1. 1924.) KÜHLING.

William Freeland Waddell, Glasgow, Mittel zur Tötung und Vertreibung von Ratten, Mäusen, Maulwürfen und anderen Nagetieren, bestehend aus einer Mischung von Casein, Kaliumphosphat, Calciumphosphat, Leim, Schmierseife, Alaun u. CaSO₄ (E. P. 228 292 vom 19/11. 1923, ausg. 26/2. 1925.) KÜHLING.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Wilhelm Herz, *Eine Kennziffer für den Erfolg einer Aufbereitung*. Mathemat. Ableitung einer neuen Kennziffer für die Aufbereitung. Diese Kennziffer geht dem ökonom. Erfolg parallel, erreicht daher ein Maximum. Es werden prakt. Beispiele mit ihr durchgerechnet. (Metall u. Erz 23. 81—91. Bochum.) ENSZLIN.

Charles E. Locke, *Erzzerkleinerung und Flotation*. Vf. hebt in seinem Fortschrittsbericht über das Jahr 1925 die große Bedeutung der Flotation für die Aufbereitung hervor. Während auf dem Gebiete der Erzzerkleinerung prinzipiell neue Vorrichtungen nicht erschienen sind, sind Verbesserungen einiger Siebe, Klassierer u. Eindicker erzielt worden. Hinsichtlich der Flotation u. der selektiven Schwimmaufbereitung werden insbesondere die Arbeiten von PARSONS, FAHRENWALD, KEYES, HEAD besprochen. Die Kohleaufbereitung hinkt noch stets der Erzaufbereitung nach; es liegen einige Verbesserungen der Rüttelsiebe vor, während eine Reihe von Unterss. im Gange sind bzgl. der Anwendung der Flotation auf Kohlen der U. S. A. (Engin. Mining Journ.-Press 121. 109—11. Cambridge [Mass.], Technol. Inst.) K. WOLF.

P. Geimer, *Messungen im Hochofenbetriebe vom Standpunkte des Hochofners*. Vf. zeigt an Hand von Diagrammen die Notwendigkeit, im Hochofenbetriebe jeden wichtigen Vorgang durch dauernde Messungen zu kontrollieren. Die heute üblichen Verff. zur Messung geben brauchbare Aufschlüsse zur Beurteilung des Hochofenganges. Am wichtigsten ist die Überwachung der Gichtgaszus., für die die Meßtechnik noch selbsttätige App. zu konstruieren hat. Auch Tiefenanzeiger u. Gichtgas-Temp.-Messger. sollten nirgends fehlen. (Stahl u. Eisen 46. 173—82. Troisdorf.) LÜDER.

George E. Lamb, *Ein konkurrenzfähiger elektrischer Ofen*. Vf. beschreibt einen elektr. Lichtbogenofen zum Schmelzen von Fe u. Stahl, der besonders rationell arbeitet. Foundry 54. 95—99. Cleveland [O.] LÜDER.

Seikichi Satō, *Dilatometrische Untersuchung der A_3 - und A_2 -Umwandlung in reinem Eisen*. Es wurde die Umwandlung von reinem Fe von β -Fe in γ -Fe u. von γ - δ -Fe dilatometr. verfolgt. Bei jener erfolgt eine Verkürzung, bei dieser wieder eine Verlängerung. Die Ausdehnungskurve innerhalb der δ -Modifikation stellt eine Fortsetzung der α -Kurve dar; was auch als Beweis dafür anzusehen ist, daß α -Fe u. δ -Fe die gleiche Modifikation darstellen. (The science reports of the Tōhoku imp. univ. 14. 13—27. 1925. Sendai [Japan].) LÜDER.

Seiji Kaya, *Die Soliduslinie im System Eisen-Kohlenstoff*. Es wurde die Soliduslinie des Systems Fe-C im Bereiche von 0,23—1,60% C sowie die γ -Mischkristallgrenze von 1,02—1,57% C durch Messung der elektr. Leitfähigkeit bestimmt. (The science reports of the Tōhoku imp. univ. 14. 529—36. 1925. Sendai [Japan].) LÜDER.

Heinz Bablik, *Das Beizen von Eisen mit Salz- und Schwefelsäure*. Das Beizen von Fe mit HCl u. H₂SO₄ setzt sich aus 2 Rkk. zusammen: Das FeO wird einerseits durch die Säure gel., andererseits durch den entwickelten H abgesprengt. HCl bewirkt in höherem Maße den ersten, H₂SO₄ den zweiten Vorgang. Die Beizgeschwindigkeit steigt im allgemeinen mit der Temp. u. Säurekonz., u. zwar bei HCl bis zum Verdampfen; bei H₂SO₄ liegt bei 25% H₂SO₄ ein Wirkungsmaximum. — Ferner wird die Wirkungsweise von VOGELS Beizzusatz beschrieben u. die Wirtschaftlichkeit seiner Anwendung nachgewiesen. Die günstige Wrkg. wird auf Capillarkräfte zurückgeführt. Stahl u. Eisen 46. 218—22. Brunn a. G. [Niederösterreich.] LÜDER.

W. E. Day, jr., *Kohlung durch feste Härtepulver*. Allgemeine Besprechung der Vorgänge dabei. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 240—58. International Motor Co., New Brunswick, N. J.) WILKE.

H. J. French und O. Z. Klopsch, *Anfangstemperatur und Massenwirkungen beim Abschrecken*. Die Abschreckverss. wurden mit hoch C-haltigem Fe (0,85—1,15%) ausgeführt. Beim Abschrecken von Eisenkugeln, -Stäben u. -Platten ist die Abkühl-

lungsgeschwindigkeit umgekehrt proportional der Dicke, größer als 1 u. weniger als 2. Für eine bestimmte Größe wird die höchste Abkühlungsgeschwindigkeit in Kugeln dann im Stabeisen u. Platten erreicht oder bei gleicher Abkühlungsgeschwindigkeit verhält sich der Durchmesser der Kugeln zu dem Durchmesser der Stäbe u. Stärke der Platten wie 4:3:2, vorausgesetzt, daß die Länge der Zylinder gleich dem 4-fachen Durchmesser u. die Länge u. Breite gleich der 4-fachen Stärke der Platten ist. Mit unbegrenzt langen Zylindern u. sehr langen u. breiten Platten ist dies Verhältnis 3:2. Die Abkühlungszeit ist umgekehrt proportional der gewählten Abkühlungsgeschwindigkeit, vorausgesetzt, daß sie in einem Zeitraum gemessen wird, in dem keine großwärm. durch Transformationen vorkommen. Die Beziehungen zwischen Größe u. Gestalt des abgeschreckten Stahles u. der Abkühlungsgeschwindigkeit oder -Zeit lassen sich durch folgende Formeln ausdrücken, in denen V die Geschwindigkeit in Grad/sek. sei, T die Zeit in Sek., D die festgestellte Dimension in inches, S die Oberfläche in sq. in., W das Vol. in cub. in. u. C, C_1, C_2 u. n Konstanten: $V D^n = C$, $T/D^n = C_1$, $T = C C_1/V$, $V = (S/W)^n \times C_2$. Die erhaltenen Abkühlungsgeschwindigkeiten, wenn jede der einfachen Formen unter bestimmten Bedingungen abgekühlt wurde, ist eine Funktion der Oberfläche bezogen auf die Volumeneinheit. Wenn zwei einfache Formen gleiche Oberflächen auf die Volumeneinheit bezogen haben, sind ihre Abkühlungsgeschwindigkeiten im Innern gleich. — Erhöhung der Anfangstemp. beim Abschrecken in gewöhnlichen Ölen u. W. von Raumtemp. erhöht die Abkühlungsgeschwindigkeit. Die Größe dieser Änderung ist zwischen 720 u. 800° beträchtlicher als über 800° bei gleicher Temperaturerhöhung. Anschließend ist die Aussprache angeführt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 33—74. 142—43. Bureau of Standards, Washington, D. C.).

WILKE.

Nikolaus Czako, *Die Industrie der Ferrolegierungen*. Vf. gibt eine Übersicht über die Industrie der Ferrolegierungen. Es werden besprochen: die Rohstoffbasis, die zur Herst. angewandten metallurg. Verff. u. die Verwendung von *Ferromangan, Ferrosilicium, Ferroaluminium, Ferrotitan, Ferrochrom, Ferrowolfram, Ferromolybdän, Ferrovandän, Ferronickel* u. *Ferrokobalt*. (Gießereiztg. 23. 89—94. Köln a. Rh.) LÜ.

E. C. Bain, *Die Natur der Eisen- und Chromlegierungen*. Es wird die B. u. E. haltung der festen δ -Eisenlsg. bei Raumtemp. beschrieben. Die Legierungen werden über den Bereich der Austenitbildung erhitzt, die Austenittransformation durch W. Abschreckung unterdrückt u. die feste δ -Eisenlsg. unverändert in einer beständigen Form festgehalten, die ident. mit α -Fe oder Ferrit ist. Der Name δ -Fe bezeichnet nur, daß das Material auf eine höhere Temp. erhitzt worden ist, als zum Bestehen von Austenit in Berührung mit α -Fe notwendig ist. Physikal. sind beide ident. α -Fe kann bis zu 60% Cr in fester Lsg. aufnehmen u. bildet wahrscheinlich auch mit höherem Cr-Gehalt feste Lsgg. Die festen Lsgg. von Cr in Fe, die weniger als rund 14% Cr enthalten, zeigen die α - γ - u. γ - δ -Transformationen beim Erhitzen. Die Temp. der α - γ -Transformation wird mit steigendem Cr-Gehalt höher, während die γ - δ -Transformation dabei fällt. Der Temperaturbereich für stabiles γ -Fe wird daher bei 10% Cr klein u. γ -Fe wird nicht bei keiner Temp. in Legierungen gebildet, die mehr als 14% Cr enthalten, außer durch Einw. von C. C ist für gewöhnlich in jeder Legierung dieser Art enthalten u. vergrößert den Bereich der Austenitbildung, in dem die γ -Temp. erhöht u. die α - γ -Temp. erniedrigt wird. C vermag sogar in Legierungen mit 30% Cr etwas γ -Fe zu erzeugen. In Legierungen mit höherem Cr-Gehalt (25% Cr) sind die festen α - u. δ -Fe-Lsgg. ident., es zeigt sich keine Transformation. Bei diesem Cr-Gehalt ist 0,40% C erforderlich, um merkbare Mengen Austenit zu bilden. Sowohl Cr als auch C machen den Austenit träge zur α -Fe-Bildung (Martensit) beim Abkühlen. Ungefähr 12% C sind nötig, um nach dem Wasserabschrecken jede merkliche Austenitbildung bei Raumtemp. zu verhindern, sogar wenn der C-Gehalt 0,35% beträgt. Die Fe-Cr-Legierungen mit weniger als 10% Cr verhalten sich also ähnlich wie niedrig C

schlotes Fe beim Abschrecken. Erst über 10% Cr erhält man genügend beständiges Fe. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 9—32. Union Carbide and Carbon Research Lab., Long Island City [N. Y.])

WILKE.

E. Bauer, *Schwindung und Spannung im Gußeisen*. Vf. beschreibt die verschiedenartige Auswirkung der Schwindung, die von der Art, Form u. Stärke der Gußstücke abhängig ist, sowie die Maßnahmen zur Vorbeugung u. Abwehr der Brucherscheinungen. An Hand von systemat. Verss. an verschiedenen Profilen lassen sich Schwindungskurven aufstellen, die eine ungefähre Vorausbest. der in einem Konstruktionsstück auftretenden Schwindungen ermöglichen. Auf einzelne Fälle geht Vf. näher ein u. bringt eine Reihe von Abbildungen. (Gießereiztg. 23. 61—73. 95—102. 21—28. Lünen a. d. Lippe.)

LÜDER.

Dan M. Avey, *Erhitze das Flußeisen stärker*. Vf. beschreibt einen Regenerativofen von BOSSHARDT für Flußeisen, mit dessen Hilfe das Bad auf Tempp. bis 2000° erhitzt werden kann. Es werden die Vorteile dieses Verf. u. der Arbeitsgang genau berichtet u. Analysen des Roh- u. des Fertigseisens angegeben. Der Arbeit sind ferner eine Reihe erläuternder Bilder beigelegt. (Foundry 54. 88—91. 124. Cleveland [O.] Lf.)

J. P. Gill und M. A. Frost, *Die chemische Zusammensetzung von Werkzeugstählen*. Bei C-Werkzeugstählen findet man einen Si-Gehalt von 0,10—0,35, 0,10—0,40% Mn, 0,02—0,035% S u. P. Si macht bei hoch C-haltigen Stählen brüchig u. vermindert die Schneidschärfe der Kanten, was bei 0,40% Si ungefähr bemerkbar ist. Mn vergrößert die Gefahr des Brechens beim Härten, 0,30% wird ungefähr der höchst zussige Gehalt sein, da 0,45% schon zerstörend wirken. Cr u. W sollte auf ein Gesamtgehalt von 0,10% u. tiefer gehalten werden. Soll Ni zugesetzt werden, so dürfen höchstens 0,10% angewandt werden. Nicht deformierbare, ölgehärtete Stähle enthalten 0,80—0,95% C, 1,01—1,65% Mn, 0,15—0,34% Si, höchstens 0,025% S u. P, außerdem C, W u. V. Anschließend werden die Zuss. von hoch C- u. niedrig W-haltigen Stählen, bei hohen Tempp. Arbeitenden, hoch C- u. hoch Cr-haltigen u. schnelldrehstählen besprochen. Trotzdem das vorliegende Material sehr umfangreich u. nicht einheitlich ist, halten Vff. eine Normierung auf diesem Gebiet in jetziger Zeit für verfrüht, da dies den Fortschritt hemmen würde. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 75—98. Vanadium-Alloys Steel Co., Latrobe, Pa.)

WILKE.

Howard Scott, *Längenänderungen, die beim Anlassen und Altern von Werkzeugstahl auftreten*. Von den benutzten Stählen hatten nur einige einen W-, Va-, Mo- oder Ni-Gehalt. Die bekannte Zunahme des spezif. Vol. beim Abschrecken konnte bestätigt die dabei auftretenden Breiten-, Längen- u. Höhenänderungen noch näher untersucht werden. Alle abgeschreckten u. nicht angelassenen Stähle zogen sich mit der Zeit etwas zusammen, u. zwar war die Kontraktion bei 100° bedeutend größer als bei Raumtemp. Nach 6 Monaten war sie bei gewöhnlicher Temp. so groß wie nach 1 Stde. bei 100°. Werkzeuge, die in der Luft abgekühlt waren, dehnten sich auch mit der Zeit aus, aber ohne großen Unterschied zwischen 100° u. Raumtemp. Es wird gezeigt, daß die Kontraktion mit längerer Zeit ident. mit der Anfangskontraktion beim Anlassen u. die Ausdehnung mit der Ausdehnung beim Anlassen, die der Anfangskontraktion folgt. Das die Praxis berührende Hauptproblem ist, Ausdehnung zu vermeiden, die in Öl gehärteten Stählen eine beträchtliche Größe erreichen kann; hiernach ist ein Weg zur Bearbeitung dieses Problems angezeigt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 277—304. Westinghouse Electric and Manufacturing Co., East Pittsburgh, Pa.)

WIL.

M. A. Grossmann und E. C. Bain, *Über die Natur einiger wenig Wolfram enthaltenden Werkzeugstähle*. 2 Stähle wurden auf mechan. u. physikal. Eigenschaften untersucht. Stahl 1 war in Öl gehärtet (1,08% C, 0,35% Mn, 0,36% Si, 2,66% W, 0,50% Cr u. 0,29% V), Stahl 2 mittels W. (1,23% C, 0,25% Mn, 0,14% Si, 2,46% W u. 0,14% Cr). Der mit Öl gehärtete Stahl bestand aus Martensit u. Austenit, während der mit W. gehärtete diese Struktur nur an der Oberfläche zeigte, das Innere bestand

zum größten Teile aus Troostit. Die Härtekurven des in Öl gehärteten Stahls zeige eine zweite Härte bei 260° u. eine geringe bei 600°. Die Kerbzähigkeitskurven lasse eine Anfangszähigkeit beim Anlassen des Stahles erkennen, dann bei 260° Brüchigkeit u. dann wieder ausgesprochene Zähigkeit. Die beste Vereinigung von Härte u. Zähigkeit wird man also erlangen, wenn man von 910—925° in Öl abschreckt u. bei 170° anläßt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 259—76. United Alloy Steel Co., Canton Ohio u. Carbon Research Laboratories, Long Island City, N. Y.) WILKE

H. Hanemann und A. Schrader, *Über Martensit*. Vff. geben eine Übersicht über frühere Unterss. betreffs der Struktur von *Martensit* u. *Austenit* im gehärteten Stahl, ihre therm. Ausdehnung u. krit. Punkte. Die bisher allgemein anerkannte Meinung, die sich auf diese Verss. stützt, ist, daß Martensit α -Fe sei, dessen Raumgitter durch eine unstabile Lsg. von C im Gitter gestreckt worden sei. Es wird nun gezeigt, daß die Tatsachen der Austenit-Martensittrk. sich nicht mit der α -Fe-Hypothese vereinigen lassen u. Vff. geben Verss. wieder, die zur ε - η -Hypothese führen. Es konnte erwiesen werden, daß die Martensitbildung in fl. Luft nicht den gesamten Austenit verbraucht, daß die dabei gebildeten Martensitnadeln an C ärmer sind als der umgebende Austenit. Daß Martensitnadeln von α -Fe verschieden sind, ergibt dann noch an folgendem: Wird Fe mit nur 0,05—0,20% C plötzlich stark geschreckt, so kann die Ferritbildung vollkommen unterdrückt werden. Für gewöhnlich sind neben den Martensitnadeln dann einige Ferritnadeln (α -Fe) vorhanden. Diese Ferritnadeln sind von Martensit deutlich in ihrer Härte u. ihrer Farbe nach dem Ätzen verschieden. Alle die Beobachtungen führten Vff. dazu, anzunehmen, daß der Martensit aus 2 bisher unbekannten Phasen des Fe-C-Diagramms besteht, die vom α - u. γ -Fe verschieden sind. Die neuen Phasen ε u. η sind im metastabilen Gleichgewicht mit dem Austenit, bilden ein peritektoides Gleichgewicht. Ein Martensitdiagramm oder metastabiles System II (das Zementitsystem ist metastabiles System I), das tiefer als Zementitsystem liegt — der höchste Punkt ist 685° — wird angegeben. Die Transformation dieses Martensitsystems können nur eintreten, wenn durch sehr schnelles Abkühlen das Zementitsystem nicht in Wirksamkeit gekommen ist; kein Troostit darf sich bei A' gebildet haben. Trifft dies alles zu, dann folgt die feste γ -Lsg. den Linien des metastabilen Systems II. Die Wärmeentw. bei diesen schnellen Abkühlungen wurde aufgenommen. Der Unterschied zwischen den α - u. ε -Fe liegt in dem Betrag, den jede Form an C in fester Lsg. halten kann, ε -Fe löst bis zu 0,10% C, α -Fe nur 0,006%. Außerdem hat ε -Fe eine andere Farbe beim Ätzen als α -Fe, u. es sind scharfe Grenzlinien zwischen den beiden Phasen vorhanden. Die Eigenschaften eines Fe mit 0,05% C, 0,37% Mn, 0,053% P u. 0,048% S sind: auf 950° angelassen u. langsam abgekühlt (α -Fe): 52,500 Zug, 30% Dehnung, Brinell 122; schnell von 950° abgeschreckt (ε -Fe): 85,000, 15%, 160.

Die Mikrostruktur ist wie folgt: Fe mit weniger als 10% C hat teilweise Nadeln u. teilweise polygonale Struktur, was aus dem unvollständigen Gleichgewicht zu erklären ist. Beim Anlassen der Fe mit 0,10—0,90% C lassen sich die Nadeln in 2 Arten teilen, solche mit niedrigem C-Gehalt u. solche mit hohem, die letztere Art nimmt mit dem C-Gehalt auf 0,90% hin zu. Wir haben eine Mischung von ε u. η mit einigen kleinen Austenitteilen. Im Stahl von mehr als 0,90% C bildet sich auch Austenit, das mit steigendem C-Gehalt zunimmt. Wir sind im η + γ -Bereich. Über 1,40% C haben wir nur Nadelstruktur, an Stelle der martensit., weil beim Abschrecken der Stahl das 3-Phasengleichgewicht des neuen Systems nicht mehr berührt, sondern gleich in das 2-Phasengebiet η + γ gelangt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 169—239. 364. Berlin-Charlottenburg.) WILKE

Masuo Kawakami, *Die Bestimmung der Niederschlagswärme von Zementit (α - und β -Martensiten)*. An 8 verschiedenen C-Stählen mit 0,30—1,32% C wurde

Reaktionswärme bei der Ausscheidung von Fe_3C aus α -Martensit gemessen. Die freiwerdende Wärme wächst mit dem C-Gehalt u. beträgt bei eutektoidem Stahl 3,7 Grammcalorien. Die entsprechende Wärmetönung sowohl in α - als auch in β -Martensit wurde an 5 Legierungen gemessen. Sie ist bei β -Martensit halb so groß wie bei α -Martensit. (The science reports of the Tôhoku imp. univ. **14**, 559—68. 1925. Sendai [Japan].) LÜ.

D. H. Miller, *Die Aluminiumschweißung nach zwei Methoden*. Das Schweißen von Al kann mit oder ohne Flußmittel vorgenommen werden. Im ersten Falle entfernt man die Al_2O_3 -Häutchen durch Rühren mit Fe-Stäben in der Schweiße. Beim zweiten Verf. sorgt das Flußmittel für die Entfernung des Oxydes u. das Zusammenfließen der zu schweißenden Teile. (Foundry **54**, 117—18. Cleveland [O.].) LÜDER.

Kurt Brauer, *Zinnfolie und Aluminiumfolie als Verpackungsmittel*. Vf. berichtet über frühere Unterss. WACKENRODERS. Hundefütterungsverss. ergaben die Ungiftigkeit von *Sn-Folien*; diese erwiesen sich als schmiegsamer als *Al-Folien*. Al-Folien wurden von schwach alkal. Fll., besonders NH_4OH , stark angegriffen, Sn-Folien nicht. Die Nachprüfung mit neueren Fabrikaten ergab, daß Al-Folien schmiegsamer geworden sind, ohne die Geschmeidigkeit der Sn-Folien zu erreichen; sie weisen noch feine Risse auf u. reißen an scharfen Kanten öfters ein. Weder Al- noch Sn-Folien verfärbten sich in H_2S -haltiger Luft. (Ztschr. f. mediz. Chemie **4**, 2—4. Cassel.) JUNG.

Ernest V. Pannell, *Die Aluminiumlegierungen gelangen zu größerer Anwendung*. Vf. gibt eine Zusammenstellung von Al-Legierungen mit Zusätzen von Cu, Zn, Si, Ni u. Mg unter Angabe der Bezeichnungen, unter denen sie im Handel vorkommen, u. ihrer hauptsächlichsten Eigenschaften. (Foundry **54**, 105—07, Cleveland [O.].) LÜ.

Hikojo Endo, *Die Beziehungen zwischen dem Gleichgewichtsdiagramm und der Magnetisierbarkeit von binären Legierungen*. Vf. untersuchte an den binären Systemen *Cu-Sn*, *Cu-Zn*, *Bi-Sn*, *Zn-Sn*, *Pb-Tl*, *Bi-Pb*, *Sb-Sn*, *Sb-Cu*, *Bi-Zn*, *Sb-Pb*, *Bi-Te* u. *Cu-Mn* die Beziehungen von Zustandsdiagramm u. Magnetisierbarkeit χ . Die Kurven von χ waren gerade Linien, wenn die Legierung ein heterogenes Gemenge zweier Kristallarten darstellte. Eine stetige Kurve deutet auf Mischkristalle. Chem. Verbb. werden durch scharfe Knickpunkte gekennzeichnet. Die Systeme Pb-Sb u. Bi-Te wurden auch therm. mkr. u. auf ihre elektr. Leitfähigkeit untersucht. (The science reports of the Tôhoku imp. univ. **14**, 479—512. 1925. Sendai [Japan].) LÜDER.

Paul Cebrat, *Verschiedene Arten von Maschinen zur Herstellung nahtloser Rohre*. Vf. beschreibt die verschiedenen Verff. zur Erzeugung nahtloser Fe-Rohre, MANNESMANN usw., ihre Vorzüge, Nachteile u. Wirtschaftlichkeit. (Iron Age **117**, 473—76. New York.) LÜDER.

H. A. Schwartz, *Die Temperaturen der langlebigen Gußformen bestimmen die Eigenschaften des Gusses*. Die Härte eines Gußstückes hängt von der Graphitausscheidung im Fe ab. Diese kann durch entsprechende Zus. beeinflusst werden u. vor allem durch die Abkühlungsgeschwindigkeit des gegossenen Stückes, u. zwar wird das Gußstück, das in der langlebigen Form länger belassen wird, härter, da sich weniger Kohlenstoff ausscheidet, entsprechend der längeren Zeit der schnellen Abkühlung, als ein kürzere Zeit in der Form belassenes. Um eine bestimmte Härte im Gußstück zu erhalten, ist es daher notwendig, bei einer vorherbestimmten Temp. des Gußstückes das Stück aus der Form zu entfernen. Diese Temp. liegt höher, wenn größere Weichheit u. niedriger, wenn höhere Härte gewünscht werden. Entsprechend dem Querschnitt u. der Materialverteilung, ob mehr oder weniger abgeschiedener C gewünscht wird, werden die aus der Form entfernten Gußstücke weiter abgekühlt. Es ist nun hierauf ein neues Verf. ausgearbeitet worden, das sich aber nur für Massenproduktion eignet u. ganz gleichartige Prodd. liefert. Es ist dabei eine sichere u. prakt. Einrichtung vorgesehen, durch die die Gußstücke, sobald eine bestimmte Temp. erreicht ist, aus der Form

entfernt werden. Auf diese Weise werden in größeren MM. Gußstücke mit derselben Härte u. allgemeinen Struktureigenschaften erreicht. Man hat es dann wieder in der Hand, durch geeignete Abänderungen eine neue Serie von Massenartikeln mit anderen Eigenschaften zu erzeugen. (Foundry 54. 147. 149—50.) WILKE.

Hans Rudolf Karg, *Das Aluminieren bzw. Chromalisieren von Roststäben mittels des Metallspritzverfahrens.* (Vgl. S. 1882.) Vf. beschreibt das Aluminieren von Roststäben durch das Spritzverf. u. die erhöhte Widerstandsfähigkeit dieser Stäbe. Gegenteilige Erfahrungen werden auf die Verschiedenartigkeit der Brennstoffe u. sonstiger örtlichen Bedingungen zurückgeführt. (Zentralbl. d. Hütten u. Walzw. 30. 57—61. Berlin-Neukölln.) LÜDER.

William E. Greenawalt, Denver, Colorado, *Metallurgisches Verfahren zur Extraktion von Kupfer aus seinen Erzen.* Man unterwirft die aus den Erzen extrahierter Cu-Lsgg. abwechselnd einem Reduktionsmittel u. der Elektrolyse zum Abscheiden des Cu u. zur Regenerierung der Säure u. wiederholt alle Operationen (Auslaugen, Reduzieren u. Elektrolysieren) bis die Lsg. durch die Verunreinigungen ganz unrein geworden ist. Hierauf wird ein Teil der Lsg. einer Elektrolyse ausgesetzt, die Säure reduziert u. dann dieser Teil wieder reduziert u. elektrolysiert. (A. P. 1 572 114 vom 2/9. 1924 ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Soc. Metallurgica Chilena „Cuprum“, Valparaiso, Chile, *Auslaugen oxydische Erze und sonstiger metallurgischer Produkte.* (D. R. P. 425 363 Kl. 40a vom 27/9. 1923, ausg. 16/2. 1926. — C. 1923. II. 32.) KÜHLING.

Adolf Barth, Frankfurt a. M., *Ausbringen von Metallen aus Gekräzten und Aschen* dad. gek., daß man das zerkleinerte oder in zerkleinerter Form vorliegende metallhaltige Gut zunächst auf mechan. Wege in Bestandteile von größerer u. geringerer Schwebefähigkeit zerlegt, worauf man durch chem. oder elektrochem. Lösungswrkg in den vorgetrennten beiden Sorten das Metall besonders herauslöst. — Das Verf. verläuft schnell u. gibt gute Ausbeuten. (D. R. P. 425 028 Kl. 40 a vom 9/11. 1923 ausg. 9/2. 1926.) KÜHLING.

Edward Livingston Ford, Youngstown, V. St. A., *Puddelverfahren.* (D. R. P. 425 277 Kl. 18 b vom 19/3. 1924, ausg. 15/2. 1926. A. Prior. 9/4. 1923. — C. 1924 II. 1021.) KÜHLING.

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., übert. von: **William J. Merten** Pittsburgh, V. St. A., *Härtungsbad*, bestehend aus 15—24% Alkalichlorid, 5—20% Alkalicyanid, 5—20% eines Erdalkalioxyds (CaO) u. W. (A. P. 1 571 290 vom 4/1. 1925, ausg. 2/2. 1926.) KÜHLING.

Georg Stig und Einar Stig, Odda, Norwegen. *Herstellung stickstoffarmer, chromhaltiger Eisen- und Stahllegierungen.* (D. R. P. 424 957 Kl. 18 b vom 13/3. 1924 ausg. 8/2. 1926. N. Prior. 27/3. 1923. — C. 1924. II. 756.) KÜHLING.

George Coleman Nixon, Syracuse, New York, V. St. A., *Mittel zur Oberflächenhärtung von Stahl und Eisen.* Es besteht aus einem Gemisch von Koks, Steinkohle usw. u. Alkaliphosphaten, man tränkt z. B. Koks mit etwa 10% Trinatriumphosphat (A. P. 1 566 766 vom 20/10. 1923, ausg. 22/12. 1925.) FRANZ.

Thomas J. Bray, jr., Youngstown, Ohio, *Stahlerzeugung.* Man desoxydiert den Stahl und führt in seine Schmelze eine geringe Menge Na₂CO₃ ein. (A. P. 1 572 17 vom 5/6. 1922, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Niels C. Christensen, Salt Lake City, Utah, *Gewinnung von Blei und Zink aus gemischten Blei-Zink-Sulfiderzen.* Man mischt die feingemahlenen Erze mit einer sauren, konz. Salzlauge, hierbei lösen sich das Pb u. ein Teil des Zn als Chloride u. das S wird als H₂S ausgetrieben. Letzterer wird mit Kalk behandelt u. das Ca(SH) zum Fälln zuerst des Pb u. dann des Zn benutzt. (A. P. 1 572 268 vom 31/12. 1923 ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Ernst Pokorny, Halle a. S., *Abscheiden von Kupfer und Wismut aus Molybdänlanz*, 1. dad. gek., daß der Molybdänlanz bis zur vollständigen Auflsg. der Kupfer- u. Wismutteilchen in Ggw. von W. der Einw. von Chlorgas ausgesetzt wird. — 2. dad. gek., daß der Molybdänlanz nur so lange mit Cl₂ behandelt wird, bis sich die Oberfläche der Kupfer- bzw. Wismutmineralteilchen verändert, u. dann flotiert wird. — Höhere Temp. begünstigt die Einw. des Cl₂. (D. R. P. 425 364 Kl. 40 a vom 16/6. 1923, ausg. 17/2. 1926.) KÜHLING.

William E. Greenawalt, Denver, Colorado, *Metallurgisches Verfahren der Kupfergewinnung*. Cu-Erze werden mit einer Säure ausgelaugt u. die erhaltenen Lsgg. in einer Reihe von elektrolyt. Einheiten, deren jede einen Reduktions- u. einen Elektrolysieraum enthält, unter Aufrechterhaltung eines konstanten Durchflusses elektrolysiert. (A. P. 1 572 115 vom 1/12. 1924, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Norske Molybdenprodukter A/S, Oslo, *Herstellung von Molybdänverbindungen*, 1. dad. gek., daß Molybdän-Schwefelverb. mit B, Ti, Zr einzeln oder beliebig kombiniert, reduziert u. B, Ti, Zr in solchem Überschuß verwendet werden, daß Molybdän-oxide, -titanide usw. entstehen; gleichzeitig können Th, V, die Metalle der Chrom-Eisengruppe mit ihren unmittelbaren Nachbarn zugesetzt werden, die Zusätze zu Molybdän-Schwefelverb. können elementar. oder in Verb. erfolgen. — 2. dad. gek., daß geringe Mengen C, Si, N₂ oder P rein oder in Verb. zugesetzt werden, um Härte u. Festigkeit zu erhöhen. — Die Erzeugnisse sind beständige, sehr harte Körper, welche als Schleifmittel u. dgl. verwendet werden können. (D. R. P. 424 990 Kl. 40 b vom 15/5. 1921, ausg. 9/2. 1926.) KÜHLING.

Harry Hey, Melbourne, Austral., *Gewinnung von Blei und Silber aus Schwefelerzen und metallurgischen Produkten*. Man erhitzt die Erze in Ggw. von HCl-Gas in nichtoxyd. atm., um das Pb u. das Ag zu chlorieren, dann laugt man die beiden Chloride aus. (A. P. 1 572 388 vom 20/1. 1921, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Fred. M. Ekert, Laubendorf b. Nürnberg, *Als Dampfdichtung geeignete Legierungen aus Nickel, Kupfer und Blei*, gek. durch eine Zus. von 15—40 Teilen Ni, 4 bis 5 Teilen Sn, 10—30 Teilen Cu, 30—65 Teilen Pb, 1—10 Teilen Zn u. 1—10 Teilen In, Cr, W, Co oder V. — Zur Herst. schm. man zunächst Ni, Cu u. Zn unter Luftabschluß zusammen u. setzt der Schmelze ebenfalls unter Luftabschluß die übrigen Bestandteile der Legierung zu. (D. R. P. 424 970 Kl. 40 b vom 22/2. 1924, ausg. 1/2. 1926.) KÜHLING.

Aluminium Die-Casting Corporation, New Jersey, übert. von: **Roderick Johnston**, Plainfield, N. J., *Legierung* bestehend aus 89% Al, 5—10% Sn u. —15% Si. (A. P. 1 572 357 vom 26/12. 1922, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Aluminium Manufacturers Inc., Cleveland, Ohio, übert. von: **Ernest Raymond Crosby**, Cleveland, *Metallierung* bestehend aus Al mit 3—8% Si u. etwa 3% Sn. (A. P. 1 572 382 vom 7/7. 1921, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, übert. von: **Aladar Pacz**, Cleveland, Ohio, *Aluminiumlegierung* bestehend aus 70 Teilen Al, 15—27,5 Teilen Cu u. 2,5 bis 5 Teilen Si. (A. P. 1 572 502 vom 12/9. 1919, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Aluminium Co. of America, Pennsylvania, übert. von: **Aladar Pacz**, Cleveland Heights, Ohio, *Aluminiumlegierung* enthaltend 2,5% Ni u. 10% Si. (A. P. 1 572 503 vom 31/5. 1921, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

De Bats Metals Co., Bloomfield, N. J., übert. von: **Jean H. L. de Bats**, East Orange, N. J., *Legierung* bestehend aus 15—30% (des Ganzen) Ni u. mindestens je 5% (des Ganzen) zweier Metalle der Cr-Gruppe (zusammen 70—85% des Ganzen). (A. P. 1 572 593 vom 24/1. 1924, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

International Nickel Co., New York, übert. von: **Paul D. Merica**, New York, *Nickellegierung*. Man desoxydiert geschmolzenes Ni oder Monelmetall, am besten mit

Mg, u. mischt die Schmelze dann mit geschmolzenem Al bzw. Al, Mn u. Cu. (A. P. 1 572 744 vom 26/6. 1923, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

José Sellés, Frankreich, *Lötmittel für Aluminium*. KCl, NaCl, LiCl u. KF werden zusammengeschmolzen u. die Schmelze gepulvert. In die M. wird ein erhitzter Aluminiumstab getaucht, der von der M. überzogen wird. Zum Löten bestreicht man die zu verbindenden Stellen mit dem Stabe, indem man sie gleichzeitig erhitzt. (F. P. 600 299 vom 3/7. 1925, ausg. 3/2. 1926.) KÜHLING.




César Parolini, Frankreich, *Überziehen von Gegenständen mit Metallen auf galvanoplastischem Wege*. Die Gegenstände werden zunächst mit Metall- oder Metall-oxypulvern eingestäubt, in ein Versilberungs- oder anderes Metallisierungsbad getaucht, mit W. gewaschen u. dann in üblicher Weise auf galvanoplast. Wege mit Metall überzogen. (F. P. 600 674 vom 10/7. 1925, ausg. 12/2. 1926.) KÜHLING.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

M. G. Kotibhashker, *Die Reduktionskraft von Sulfitablauge und ihre Verwendung beim Färben und Bleichen*. Das Färben von Indigo unter Verwendung der Sulfitablauge als Reduktionsmittel wird mit dem Färben unter Hydrosulfitzusatz verglichen, Angaben über Abziehen von Indigo u. anderen Küpenfarbstoffen u. Pararot. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 361—62. 1925.) SÜVERN.

Paul Pfeiffer und Olga Angern, *Zur Theorie des Anfärbens von Wolle und Seide*. Zur Aufklärung der Färbevorgänge haben Vff. mit einfachen chem. Verbb., die die wichtigsten Atomgruppierungen der Wolle u. Seide enthalten, Modellverss. angestellt, um so die chem. Kräfte kennen zu lernen, die für den Färbeprozess in Betracht kommen. Da in der Wolle u. Seide bas. NH₂-Gruppen, saure Carboxylgruppen u. Säureamidgruppierungen enthalten sind, wurde das Verh. von Aminosäuren u. Säureamiden gegen Farbstoffe untersucht (vgl. PFEIFFER u. WITKA, Chem.-Ztg. 40. 357; C. 1916. I. 1207) im Anschluß an frühere (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 265; C. 1925. II. 39; im Original steht fälschlich Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 98) Verss. — Als Farbstoffe wurden einfache Oxy- u. Aminoazobenzole, als Aminosäuren Phenylalanin u. Sarkosin gewählt. — Es wurden salzartige Mol.-Verbb. erhalten, in denen die phenol. OH-Gruppe des Farbstoffs die NH₂-Gruppe der Aminosäure absättigt. Das Sarkosinanhydrid gibt mit sauren wie mit bas. Azofarbstoffen gut charakterisierte Mol.-Verbb., die durch Aufnahme der F.-Kurven usw. sicher gestellt wurden. Die Verbb. aus Benzolazophenol, Benzolazoresorcin u. Benzolazosalicylsäure mit Sarkosinanhydrid sind nach dem Verhältnis 1 Anhydrid : 2 Farbstoff zusammengesetzt. Durch W. werden die 3 Additionsprodd. wieder in die Komponenten gespalten. Als Haftstellen im Sarkosinanhydridmolekül müssen die Carbonyl-O-Atome betrachtet werden, so daß sich für die Sarkosinanhydridverb. des p-Oxyazobenzols Formel I ergibt. — Von bas. Azofarbstoffen wurde p-Aminoazobenzol u. o-Toluolazo-o-toluidin untersucht; ihre Sarkosinanhydridverb. entsprechen II u. III, wonach der H der NH₂-Gruppe für die Additionsrkk. maßgebend ist. — Aus den Resultaten ziehen Vff. den Schluß, daß beim Anfärben der Seide u. Wolle mit bas. u. sauren Farbstoffen rein chem. Kräfte zum mindesten stark beteiligt sind, u. daß es ganz allgemein auf die Entstehung von Mol.-Verbb. zwischen Faser u. Farbstoff zurückzuführen ist, die salzartig sein können, es aber nicht immer zu sein brauchen. Mit der Adsorptionstheorie von GEORGIEVICS steht die chem. Auffassung nicht im Widerspruch; während jene aber die Frage nach der Natur der Affinität zwischen Faser u. Farbstoff offen läßt, zeigen die Modellverss., daß chem. Kräfte im Spiel sind, vergleichbar den sogenannten Nebenvalenzkräften, die zwischen den einzelnen Moll in den Verbb. höherer Ordnung tätig sind. — Besonders scharf tritt bei den Verss. de Vff. die Bedeutung der auxochromen OH-Gruppe hervor. Azobenzol, das Chromogen der Azofarbstoffe, ist eben deshalb kein Farbstoff, weil es keine chem. Affinität zu den wichtigsten anlagerungsfähigen Gruppen der Seide u. Wolle besitzt; erst der Eintritt

einer OH-Gruppe ruft diese Affinität hervor. — Die Existenz von Verb. aus Sarkosinanhydrid u. Aminoazokörpern zeigt, daß sich die NH₂-Gruppe weitgehend der OH-Gruppe anschließt, also bei den Färbeprozessen die Bindung zwischen Faser u. bas. Farbstoff bedingt. Die Dimethylamino-Gruppe kommt für Additionsvorgänge an Säureamidgruppen nicht in Betracht.



Versuche. Verb. C₂₁H₁₂O₂N₃, aus Phenylalanin + Benzolazophenol (1 : 1) in W. + 96^o/₁₀ig. A.; goldgelbe Nadeln, F. 188^o (Zers.), wenn man bis 170^o vorwärmt u. schnell erhitzt; wird durch W., Ä., Bzl. leicht gespalten. — Verb. aus Sarkosin + Benzolazophenol (1 : 1), B. in A. + wenig W.; goldgelbe Blättchen, Zers. 188^o (Vorwärmen auf 170^o; schnelles Erhitzen), wird durch W. gespalten. — Verb. aus Sarkosin + Benzolazoresorcin (2 : 1), B. in A. + wenig W.; goldgelbe Nadeln, Zers. 180—183^o (Vorwärmen bis 160^o, schnell weiter erhitzen); durch W. Spaltung. — Verb. aus Sarkosinanhydrid + Benzolazophenol (1 : 2) (I), B. in h. A.; orangefarbene Blättchen; die F.-Kurve ergibt bei 129^o, entsprechend einer Verb. mit dem Molekularverhältnis 1 : 2 in ausgesprochenes Maximum. — Sarkosinanhydrid + Azobenzol ergibt nach der F.-Kurve keine Verb., ebensowenig Sarkosinanhydrid + p-Methoxyazobenzol. — Verb. aus Sarkosinanhydrid + Benzolazoresorcin (1 : 2), B. in w. 96^o/₁₀ig. A.; bordeauxrote Blättchen, geben auf Ton braungelben Strich; F. 170^o (Vorwärmen auf 160^o); wird durch W. gespalten. — Verb. aus Sarkosinanhydrid + Benzolazosalicylsäure (1 : 2), B. in h. A.; bernsteinfarbene Krystalle, sintert bei 150^o; schm. klar bei 154^o; wird durch W. gespalten. — Verb. aus Sarkosinanhydrid + p-Aminoazobenzol (2 : 1) (II), B. in h. A.; orangefarbene Blättchen, werden bei 106^o weich, F. 110^o; wird durch W. zers. Die F.-Kurve besitzt einen starken Knick; aus der Lage desselben u. der Form der Auftaukurve ergibt sich, daß eine Verb. im molekularen Verhältnis 2 : 1 existiert. — Verb. aus Sarkosinanhydrid + o-Toluazo-o-toluidin (1 : 1) (III). B. in A.; orangefarbene Prismen, Strich auf Ton gelborange, F. 125^o, wird bei 124^o weich; W. spaltet sie auf. Die F.-Kurve zeigt bei dem Molekularverhältnis 1 : 1 ein deutliches Maximum. — Zwischen Sarkosinanhydrid u. p-Dimethylaminoazobenzol existiert keine Verb. (Ztschr. angew. Ch. 39. 253—59. Bonn, Univ.)

BUSCH.

Hans Wagner, Über die Lichteinheit der Körperfarben. (Farben-Ztg. 31. 1023 bis 26. 1073—76. Stuttgart. — C. 1926. I. 1886.)

SÜVERN.

E. Figg, Prüfungsergebnisse bei Anstrichen, die sich abwechselnd in Wasser und auf befinden. Besprechung einer größeren Reihe von Untersuchungsergebnissen. Bereits nach 18 Wochen war die Unbrauchbarkeit verschiedener Anstriche, welche Lacke als Bindemittel enthielten, zu erkennen. Bas. Pb-chromat scheint Vorzüge vor Fe₂O₃ nicht zu besitzen, Asphaltlacke erwiesen sich durchweg als schlecht. Guter Wertschutz kann durch einen Grundanstrich mit Mennige in rohem Leinöl, Überzug mit Pb-Weiß u. Rebschwarz (vegetable black) im gleichen Bindemittel oder durch zwei Anstriche von Zn-Weiß u. Zn-Staub in rohem Leinöl erhalten werden. Bis zu 6 Wochen erwiesen sich Zn-Weiß-Zn-Staub-Mischungen allen anderen Kombinationen als überlegen. Wesentlich ist, daß der Anstrich möglichst lange seine Elastizität

behält. (Journal of the Oil and Colour Chemists' Association **1925**. 314; Farbe u. Lack **1926**. 64—66.) SÜVERN.

Hans Wolff und **G. Zeidler**, *Über die Adsorption löslicher Salze durch Farbfilme*. Die Anstrichfarben stellen kolloidale Systeme dar, weshalb das Herauslösen wasserl. Salze aus Filmen nicht so leicht von statten geht. — NaCl wird mit dem Farbkörper u. Leinölfirnis angetrieben. Als Pigment dienten *Zinkweiß*, *Lithopone*, *Bleiweiß*, *Eisenglimmer* u. ein hochwertiges *Eisenoxydrot*. Es zeigte sich, daß das NaCl aus dem Eisenrot, dem Zinkweiß u. Lithoponefilm mit W. leicht völlig herausgelöst wurde. Bei Bleiweiß tritt eine erhebliche Verzögerung ein, noch stärker bei Eisenglimmer. Man könnte sich vorstellen, daß die Oberflächenspannung Eisenglimmer u. NaCl geringe ist im Verhältnis zu den Oberflächenspannungen der anderen Phasen (Öl-Glimmer, Glimmer-W., Öl-W.) als die entsprechenden Spannungen bei den anderen Farbkörpern so daß eine besonders starke Adsorption stattfindet. — Beim Einrühren konz. NaCl Lsgg. statt festes Salz geht das Auslaugen viel schneller vor sich. Es wird dies so erklärt, daß das gel. NaCl sofort in das W. diffundieren kann, während bei festem Salz das W. erst in den Film eindringen muß, oder durch die verschiedenen Oberflächenspannungen an den Phasengrenzflächen Farbkörper-Salzlsg. bzw. Farbkörper-NaCl. — Es wird geschlossen, daß ein völliges Herauslösen des NaCl etwa durch Regen im Fall des Glimmerfilms kaum möglich ist. (Korrosion u. Metallschutz **1**. 211—13. 1925 Berlin-Waidmannslust, Chem. Inst. d. chem. Fabriken Dr. JOACHIM WIERNIK u. Co. A.-G.) LASCH.

A. Eibner, *Beiträge zur Wertbestimmung weißer Farbstoffe, zum Vortrage P. Wolski*. Zu dem Vortrag von WOLSKI (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 834 [1925]) bemerkt Vf., daß für die *Best. der Deckfähigkeit von Ölfarben* nur der Naturvers. des mehrmaligen Überstreiches der streichfertig gestellten Farbe auf nicht saugender Unterlage bis zur erreichten Deckwrkg. maßgebend ist. Ein Kunstvers., wonach die Deckwrkg. oder die Durchsichtigkeitsgrenze mit einmaligem Anstrich zu erreichen gesucht wird, ist fehlerhaft. Es besteht kein Bedürfnis, ein Verf. einzuführen, das die bekannte Tatsache, daß *Zinkweiß* dem *Bleiweiß* an Deckfähigkeit unterlegen ist, nicht erkennen läßt. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 261—62. München, Vortr. auf der Hauptvers. des V. d. Chem. Nürnberg, 1925.) BUSCH.

W. Reglin, *Beurteilung der Verstreichbarkeit, der Dichtigkeit und der Körnung von Anstrichfarben*. Ungleichmäßigkeiten in der Dichtigkeit des Anstrichs, Deckfähigkeit, Verschiedenheiten in der Körnung des Farbkörpers lassen sich beim Durchleuchten eines Anstrichs auf gelatiniertem Papier erkennen u. beurteilen. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 334—35.) JUNG.

H. R. Hirst, *Ein vorgeschlagenes System von Prüfungen der Echtheit von Farbstoffen auf Wolle*. Für die einzelnen Echtheiten werden zum Vergleich heranzuziehende Farbstoffe angegeben. (Journ. Soc. Dyers Colourists **41**. 347—54. 1925.) SÜVERN.

George S. Bohart, Washington, District of Columbia, V. St. A., *Färbeverfahren*. Man tränkt das Gewebe mit einer alkal. Lsg. von *Azulminsäure* u. behandelt hierauf mit einer verd. Säure oder der sauren Lsg. eines Schwermetallsalzes (*Can. P.* **246 313** vom 15/11. 1923, ausg. 27/1. 1925.) FRANZ.

Gustav Digel, **Emil Makowski** und **Gustav Fritzsche**, Hamburg, *Herstellung von Färbungen auf harzgedeckten Flächen*. 1. dad. gek., daß auf die zu färbende, gegebenenfalls zuerst mit einem widerstandsfähigen Überzug versehene Fläche ein Harz oder Wachs aufgestrichen u. an den zu färbenden Teilen ein mit dem Harz oder Wachs eine Farbwirkg. erzeugender Stoff zur Einw. gebracht wird, während die nicht behandelten Teile den unveränderten Ton der harzgedeckten Flächen beibehalten. — 2. dad. gek., daß die durch Einw. eines zweiten Stoffes eine Färbung gebende Harz-

oder Wachsschicht zwischen zwei Schichten eingeschlossen wird, welche durch die Bestandteile der Harz- oder Wachsschicht u. die der farberzeugenden Stoffe nicht zerstört werden. (D. R. P. 425 204 Kl. 75c vom 24/1. 1925, ausg. 13/2. 1926.) KAUSCH.

Pierre Joseph François Souviron, Frankreich, *Herstellung roter Antimonsulfidfarbstoffe*. Die Fällung von Antimonsalzen mittels Thiosulfate erfolgt in Ggw. eines Aluminiumsalzes. Die Erzeugnisse zeichnen sich durch lebhaftes Färbung u. große Beständigkeit gegen Wärme u. Licht aus. (F. P. 600 894 vom 18/7. 1925, ausg. 17/2. 1926.) KÜHLING.

Shuck, Maclean & Co., Ltd. und **William Percy Price**, London, *Herstellung von Druckfarbe, die das Wischen oder Feuchten entbehrlich macht*. (D. R. P. 425 615 Kl. 151 vom 3/3. 1925, ausg. 22/2. 1926. E. Prior. 13/3. 1924. — C. 1925. II. 2327.) KAUSCH.

Harry T. Bennett, George B. Murphy und **Le Roy G. Story**, Tulsa, Oklahoma, *Überführung von Säureschlamm, der asphaltähnliche Stoffe enthält, in Anstrichmittel u. dgl.* durch Mischen des Schlammes mit einem Lösungsm., das A. enthält (z. B. Bzl. u. A.) u. einem Kohlenteerprod. (A. P. 1 568 261 vom 20/2. 1924, ausg. 5/1. 1926.) KAUSCH.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

Hans Weller, *Die Preglsche mikroanalytische Bestimmung des Stickstoffs im Kautschuk (Methode Dumas)*. Vf. schlägt zur Best. der Inhomogenität der Kautschukmischungen vor, die Preglsche Mikro-N-Best. anzuwenden. Durch Beispiele wird belegt, daß es gelingt, rasch u. mit großer Genauigkeit festzustellen, ob eine Kautschukmischung inhomogen ist. (Gummi-Ztg. 40. 1198—99.) EVERS.

K. D. P. Ltd., London, *Konzentrieren von Kautschukmilch*. Man setzt eine dünne Schicht von Kautschukmilch der Wärme aus u. führt die verdickte Schicht wieder in die ursprüngliche Kautschukmilch zurück. Man leitet z. B. durch eine drehbare, teilweise mit Kautschukmilch gefüllte Trommel erwärmte Luft. (E. P. 243 016 vom 13/11. 1925, Auszug veröff. 13/1. 1926. Prior. 14/11. 1924.) FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Waldemar Zieser**, Elberfeld), *Kautschuklösungen*, insbesondere zur Herstellung von Kautschuküberzügen und -waren, gek. durch einen Gehalt an *piperidindithiocarbaminsauren Salzen*, gegebenenfalls unter Zusatz von Zn-Verbb. — Nach dem Verdunsten des Lösungsm. hinterbleibt eine Kautschukschicht, die schon bei mäßiger Temperaturerhöhung vulkanisiert werden kann. (D. R. P. 413 470 Kl. 39b vom 5/2. 1921, ausg. 20/2. 1926.) FRANZ.

Thomas W. Miller, Ashland, Ohio, *Vulkanisieren von Kautschuk*. Man stellt zwei Teile Kautschukmischungen her, die die Vulkanisierungsmittel, Beschleuniger usw. in solchen Mengen enthalten, daß ein Anvulkanisieren beim Vermischen in den Knetvorr., Walzen usw. nicht eintreten kann; nach Beendigung des Mischens werden die beiden Teile zu Fellen ausgewalzt, dann durch abwechselndes Übereinanderlegen der Kautschukfelle die Gegenstände hergestellt; nach einiger Zeit wird bei gelinder Wärme vulkanisiert. (A. P. 1 569 662 vom 24/5. 1923, ausg. 12/1. 1926.) FRANZ.

E. I. du Pont de Nemours & Company, übert. von: **Winfield Scott**, Wilmington, Delaware, V. St. A., *Vulkanisationsbeschleuniger*. Man kondensiert 3 Moll. Acetaldehyd mit 2 Moll. Anilin etwa 2 Stdn. unter Rückfluß u. gibt dann $\frac{2}{3}$ —2 Moll. CH₂O als 40% ig. Lsg. zu; nach Beendigung der Rk. wird das W. im Vakuum entfernt u. das erhaltene gelbe harzähnliche Prod. pulverisiert. (A. P. 1 571 739 vom 19/12. 1922, ausg. 2/2. 1926.) FRANZ.

The Atlantic Dyestuff Company, Boston, übert. von: **Albert C. Burrage, jr.**, Hamilton, Massachusetts, V. St. A., *Vulkanisieren von Kautschuk*. Als Vulkanisations-

beschleuniger verwendet man *Diphenyl-o-tolylguanidin*. (Can. P. 245 929 vom 27/2. 1924, ausg. 6/1. 1925.) FRANZ.

The Atlantic Dyestuff Company, Boston, übert. von: **Albert C. Burrage, jr.**, Hamilton, Massachusetts, V. St. A., *Herstellung von Vulkanisationsbeschleunigern*. Man läßt auf diarylsubstituierte Thioharnstoffe PbO u. ein aromat. Amin einwirken; bei der Einw. von PbO u. o-Toluidin auf *Diphenylthioharnstoff* erhält man *Diphenyl-o-tolylguanidin*. (Can. P. 245 930 vom 27/2. 1924, ausg. 6/1. 1925.) FRANZ.

The Atlantic Dyestuff Company, Boston, übert. von: **Albert C. Burrage, jr.**, Hamilton, Massachusetts, V. St. A., *Vulkanisieren von Kautschuk*. Zum Vulkanisieren von Kautschuk verwendet man ein Gemisch von Vulkanisationsbeschleunigern, die bei verschiedenen Tempp. wirksam sind, z. B. ein Gemisch von aromat. Thioharnstoffen mit anderen Beschleunigern, oder ein Gemisch von Methylenparatoluidin u. Tri-o-tolylguanidin. (Can. P. 247 108 vom 19/2. 1923, ausg. 24/2. 1925.) FRANZ.

The Dovan Chemical Corporation, übert. von: **Morris L. Weiss**, New York, V. St. A., *Beschleunigung der Vulkanisation von Kautschuk*. Als Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man ein aryldisubstituiertes Guanidin, das in o-Stellung eine Alkylgruppe enthält. (Can. P. 247 133 vom 12/6. 1924, ausg. 24/2. 1925.) FRANZ.

S. J. Peachey, London, und **A. Skipsey**, Woking, Surrey, *Vulkanisieren von Kautschuk*. Der nach dem Verf. des E. P. 230 637; C. 1925. II. 1098, mit Hilfe von Phosphorsulfiden vulkanisierte Kautschuk wird einer Nachbehandlung mit gasförmigem NH₃ oder einer wss. Lsg. von NH₃ unterworfen. (E. P. 242 464 vom 9/12. 1924, ausg. 3/12. 1925.) FRANZ.

Gummiwaren-Fabrik M. Steinberg, Lindenthal b. Köln a. Rh., *Herstellung gefärbter Kautschukgegenstände nach dem Tauchverfahren*. Man taucht die Kautschukgegenstände in ein Bad, auf dessen Oberfläche sich die gemusterte oder marmorierte Farbschicht befindet; zum Glänzendmachen taucht man den Kautschukgegenstand zum Schluß in eine klare Lsg. (E. P. 242 900 vom 28/5. 1925, ausg. 10/12. 1925. Prior. 17/4. 1925.) FRANZ.

The B. F. Goodrich Co., New York, übert. von: **Allan B. Merrill**, Akron, Ohio, *Vereinigen von Kautschuk mit Metall*. Man überzieht das Gefäß aus Eisen, Stahl usw. mit einer Mischung von Rohkautschuk, gelöst in Gasolin, Kalk, Schwefel u. einem zur Erzeugung von Hartkautschuk geeigneten Vulkanisationsbeschleuniger, nach dem Verdunsten des Lösungsm. wird auf die klebrige Schicht die Weichkautschukmischung aufgebracht u. vulkanisiert; das Verf. eignet sich zum Überziehen von Gefäßen, Walzen usw. mit Kautschuk. (A. P. 1 570 445 vom 14/7. 1924, ausg. 19/1. 1926.) FR.

The Hevea Corporation, New York, übert. von: **F. R. Henderson & Co., Inc.**, New York, übert. von: **Chauncey C. Loomis**, Yonkers, und **Gerald E. Perry**, Brooklyn, New York, V. St. A., *Säumen von Geweben*. Man bringt zwischen die übereinander gelegten Kanten der Gewebe eine Kautschuklsg. oder Kautschukmilch u. preßt. (Can. P. 252 179 vom 8/6. 1923, ausg. 28/7. 1925.) FRANZ.

S. M. Kirkpatrick, Glasgow, *Kautschukmischungen*. Man vermischt rohe oder vulkanisierte Kautschukmilch mit einem Konservierungsmittel, Wasserglas, Kaliseife, W. u. gegebenenfalls Gummi arabicum; die M. eignet sich zum Vermischen mit Zement, Mörtel, Ton usw. (E. P. 242 345 vom 6/8. 1924, ausg. 3/12. 1925.) FRANZ.

H. Beckmann, Berlin-Zehlendorf, *Poröse Kautschukmassen*. Man verwandelt Kautschukmilch, die mit einem Vulkanisationsmittel vermischt ist, durch Zusatz von Mg- oder Erdalkalisalzen in ein zusammenhängendes Gel u. vulkanisiert unter solchen Bedingungen, daß ein Verdampfen der flüchtigen Anteile der Mischung vermieden wird; das erhaltene Vulkanisat enthält eine große Anzahl mkr. kleiner Poren. (E. P. 240 430 vom 1/9. 1925, Auszug veröff. 18/11. 1925. Prior. 27/9. 1924.) FRANZ.

C. Pickstone, Radcliffe, Lancashire, *Kautschukmassen*. Man vermischt Kautschuk mit gepulvertem Schiefer, Bitumen u. Vulkanisierungsmitteln, nach dem Vulkanisi-

eren erhält man hartkautschukähnliche Prodd. (E. P. 241 993 vom 31/7. 1924, ausg. 26/11. 1925.) FRANZ.

Paragon Rubber Manufacturing Co. Ltd. Hull, u. **W. A. M. Valon**, Hesse, Yorkshire, *Gegenstände aus Hart- und Weichkautschuk*. Man setzt der den Hartkautschuk bildenden Mischung einen Vulkanisationsbeschleuniger zu u. vulkanisiert dann die Hart- u. Weichkautschukschichten gleichzeitig; das Verf. eignet sich zur Verfert. von Rohren, Batteriegefäßen usw.; man stellt zunächst die innere Wandung eines Batteriegefäßes aus einer Hartkautschukmischung, die mit einem Vulkanisationsbeschleuniger versetzt ist, her, bringt dann die Weichkautschukmischung u. schließlich die äußere aus der gleichen Hartkautschukmischung bestehende Schicht auf, das Ganze wird dann gepreßt u. erhitzt. (E. P. 242 687 vom 12/7. 1924, ausg. 10/12. 1925.) FRANZ.

Taylorall, Inc., Cincinnati, übert. von: **Benjamin P. Taylor**, Wyoming, Ohio, U. S. A., *Kautschukklebemittel*. Man vermischt Kautschukmilch mit W. u. Furfurol u. setzt gegebenenfalls noch *Mono- oder Trichloronaphthalin* oder ihre Gemische zu, diesen Mischungen kann man erforderlichenfalls noch Schwefel, ZnO u. Vulkanisationsbeschleuniger zusetzen. (A. P. 1 566 566 vom 5/4. 1924, ausg. 22/12. 1925.) FRANZ.

General Rubber Co., übert. von: **M. C. Teague**, New York, *Kautschukklebemittel*. Man vermischt eine wss. Kautschukemulsion, z. B. Kautschukmilch, mit einer Emulsion eines Kunstharzes, z. B. Cumaronharz, in W.; man emulgiert das Harz mit Hilfe geringer Mengen eines tier., pflanzlichen oder mineral. Öles usw. oder Seife in W., gegebenenfalls unter Zusatz von Traganth, Agar-Agar, Irischmoos, Casein, Saponin u. Wasserglas. Der Mischung kann man Füllstoffe, Vulkanisierungsmittel oder Konservierungsmittel, wie NaF, Na-Benzoeat zusetzen. (E. P. 240 141 vom 19/8. 1925, auszug veröff. 11/11. 1925. Prior. 18/9. 1924.) FRANZ.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Miguel Masriera, *Eine neue Methode des Trocknens in der Technik*. Vf. schildert einen App. zur *Trocknung von Milch* u. ä., der auf der Verwendung einer Zerstäubereinrichtung beruht. Diese bringt die zu trocknende Substanz in eine derartige Verteilung, daß die einzelnen Partikeln Dimensionen von 10—50 μ erhalten. Die Trocknung selbst geschieht durch einen Strom von warmer Luft. (Quimica e Industria 3. 38—41. 1925. Zürich.) HANTKE.

Ralph Hoagland und **Wilmer C. Powick**, *Chemische Untersuchung des Fleisches von abgemagertem Vieh*. Das Fleisch wird durch hohen Wassergehalt u. geringen Nährwert gekennzeichnet. (Journ. Agricult. Research 31. 1001—13. 1925. Unit. St. Dep. Agric.) TRÉNEL.

Winifred Mary Clifford, *Die Wirkung kurzer Perioden von kalter Lagerung auf Hind- und Hammelfleisch*. Bei 25 u. 35° F. erschien das Fleisch bis zum 3. Tage im Aussehen noch wie frisch geschlachtetes. Bei 25° F. zeigte es am 6. Tage Eisnadeln u. das charakterist. Aussehen von Gefrierfleisch, bei 35° F. hielt es sich in w. engl. Außenemp. nicht so lange. Im 35°-Fleische nach 3 Tagen u. im 25°-Fleische nach 13 Tagen war keine Änderung des Gehaltes an Gesamt-N, l. N, Amino-N, Carnosin oder Kreatin festzustellen. (Biochemical Journ. 19. 998—1003. 1925. Kensington [London], Kings Coll. f. women.) SPIEGEL.

Alexander Torovil Robert Mattick und **Norman Charles Wright**, *Der Einfluß der Einnahme gewisser Salze auf die Ausbeute und Zusammensetzung der Milch*. Es wurde untersucht, durch Darreichung von CaCl₂, NH₄Cl, NaHCO₃ u. Na₂HPO₄ den Gehalt an Ca im Blutplasma einer Kuh u. die Zus. ihrer Milch zu verändern. Die erste Art der Änderung gelang sehr schwer, die zweite gar nicht. Im Falle des NH₄Cl verursachte die schwere Stoffwechselstörung in Gemeinschaft mit der W. entziehenden Wrkg. des

Salzes fast völlige Unterdrückung der Milchsekretion, in späteren Stadien von zeuweißer Zunahme der Konz. der Milchbestandteile begleitet. (Biochemical Journ. 1: 915—20. 1925. Reading, Univ. Coll.) SPIEGEL.

R. Herzner, *Über die Bestimmung wasserlöslicher Proteine in Getreidemehle*. Wegen der Wechselwrg. zwischen Lecithin u. Protein (vgl. FANTO u. HERZNER Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 49. 153; C. 1925. II. 619) u., weil n. freies Lecithin dafür in Frage kommt, empfiehlt sich folgende Arbeitsweise: 10. Mehl 12 Stdn. mit Ä. ausziehen, Rückstand mit 100 cem W. u. 4 cem Ä. schüttel- zentrifugieren u. aliquoten Teil eindampfen u. nach KJELDAHL den N bestimmen (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 151—52.) GROSZFELD.

J. Straub, *Laboratoriumsmittelungen über das Jahr 1925 vom Warenprüfungsamte in Amsterdam*. Besondere Verss. über den Nachweis von *Milch mastitis* kranker Kühe. Solche Milch kann außer verändertem auch vollständig n. Gefrierpunkt zeigen; die einzelnen Viertel des Euters ergeben bisweilen recht verschiedene Milch. *Reduktasprobe* u. *Bakterienzahl* drücken verschiedene Eigenschaften von Milch aus. *Milchfettbest.* mit dem Laktoskop ist nur auf etwa 0,15% genau u. bei pasteurisierter Milch unbrauchbar. — Zum Nachweise von *Milchfett in Margarine* erwies sich die Kirschsche Zahl als die beste. — Zur *Best. von Nitraten* bewährte sich die Allensche Methode (Dst. mit MgO + Devardas Legierung). — Weitere Einzelheiten über *Best. von HCl*, *Citronenöl*, *Kreatinin*, *Farbstoffen*, *Mehl*, *Brot*, *Zucker*, *Sirupen*, *Gewürzen*, *Kaffee*, *Tee* u. *Kakao*. (Chem. Weekblad 23. 142—45. Amsterdam, Warenprüfungsamt.) GROSZ.

Harry R. Fulton und **John J. Bowman**, Washington, Col., V. St. A., *Konservieren von frischen Früchten u. dgl.* Man behandelt die Früchte usw. oberflächlich mit einer Lsg., welche annähernd 5 Gewichtsteile Borax u. 1,39 Gewichtsteile wasserfreies Na₂CO₃ auf 100 Gewichtsteile W. enthält. (A. P. 1 571 938 vom 14/9. 1925, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Harry M. Heimerdinger, Blackfoot, Idaho, V. St. A., *Nährmittel*, welches aus einer gekochten, getrockneten, stärkeemehlhaltigen Substanz, z. B. getrocknete Kartoffelbrei, in feiner Verteilung besteht, welche eine verhältnismäßig große Menge Mineralsalze, Protein u. Stärkeumwandlungsprodd., sowie 5—8% W. enthält. (A. P. 1 571 945 vom 21/10. 1925, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Emma Rose Mc Sorley, Woodhaven, New York, *Teig zur Herstellung von Makaroni und Nudeln*, welcher aus Sojabohnenmehl, Weizenmehl, Eiern, S u. einem Alkali zusammengesetzt ist. (A. P. 1 570 443 vom 6/3. 1925, ausg. 19/6. 1926.) OELKER.

Ladislau Berczeller, Wien, *Herstellung von Mischbrot aus Sojabohnen*. Ein aus Sojabohnen ohne jede Vorbehandlung gewonnenes Sojabohnenmehl wird mit gewöhnlichen Brotrohstoffen zu einem Teig verarbeitet, der dann in Ggw. stärkeabbauender Enzyme insbesondere diastat. Zusätze bei niedriger Temp. langsam verbacken wird. Die Sauerteig-Rk. der Sojabohnen wird durch Zusatz von Alkalien zum Mehl oder Teig aufgehoben. (Oe. P. 97 252 vom 7/3. 1921, ausg. 25/6. 1924.) OELKER.

John A. Rice, Berkeley, Calif., *Herstellung von künstlichem Schnee*. Man vermischt ein in W. gewichtetes Protein, z. B. Casein in Ggw. von Lab mit einem schaum- erzeugenden Mittel, z. B. einer Harzseifenlg., schlägt die Mischung zu Schaum und setzt CaCl₂ oder ein anderes Ca-Salz hinzu. (A. P. 1 569 396 vom 31/12. 1923, ausg. 12/1. 1926.) OELKER.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Herstellung stark wirkender Süßstoffe aus o-Benzoesäuresulfimid und p-Phenetolcarbamid*, dad. gek., daß man beide Stoffe in solchen Mengenverhältnissen miteinander mischt, daß die Mischung von gleicher oder größerer Süßkraft ist als die Süßkraft der dem Gewichte der Mischung entsprechenden Menge o-Benzoesäuresulfimid. (D. R. P. 425 605 Kl. 53 k vom 11/12. 1920, ausg. 22/2. 1926.) OELKER.

Tobacco Treating Co., Inc., New York, übert. von: **Alfred Charles Buensod**, New York, *Behandlung von grünem Tabak*. Man unterwirft die grünen Tabakblätter Strömen von Luft von 95—110° F. u. einer Feuchtigkeit von 70—75%, bis das gesamte Fleisch der Zellen verzehrt ist. (**A. P. 1 568 316** vom 30/12. 1921, ausg. 5/1. 1926.) KAUSCH.

Eugen Spitalsky, Moskau, *Ununterbrochene Herstellung von Fleisch- oder Fischnehl*, gek. durch die Verb. folgender Teile in der angegebenen Reihenfolge: einer oder mehrerer untereinander verbundener, mit Förderschnecke versehener Gefriertrommeln, einer Mühle zum Zerkleinern des gefrorenen Gutes, eines dem Gefrierteil entsprechend ausgebildeten Auftauteiles u. einer Kühlanlage, deren Kühlmittel im Gegenstrom durch den Gefrierteil, den ersten Teil des Auftauteiles u. zurück zur Kühlanlage, u. deren Kühlwasser vom letzten Teil des Auftauteiles zum Kühler fließt. (**D. R. P. 124 851** Kl. 53 i vom 30/5. 1923, ausg. 23/1. 1926.) OELKER.

Bartol Plisic, Whitehall, Montana, *Herstellung von Butter*. Man erwärmt die zu verbutternde Milch auf Blutemp., kühlt sie dann in üblicher Weise, gießt die erhaltene cremartige M. in einen Kessel, läßt die Butter sich in diesem abscheiden, verläßt sie nach Abscheidung der Buttermilch u. bringt sie dann durch Abkühlung wieder zur Erstarrung. (**A. P. 1 572 123** vom 25/4. 1925, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

B. M. Margosches und **Karl Fuchs**, *Zur chemischen Natur der Fette*. III. *Beurteilung des Abstandes zwischen der Überjodzahl und der Jodzahl eines Fettes; die Differenz-Jodzahl*. (II. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1064; C. **1925**. II. 990.) Der Abstand zwischen Überjodzahl (P.-J.-Z.) u. Jodzahl (J.-Z.) ist bei den verschiedenen Sorten eines Fettes innerhalb enger Grenzen konstant, gleichgültig, ob die J.-Z. des betreffenden Fettes den niedersten, höchsten oder einen innerhalb des J.-Z.-Bereiches liegenden Wert ergibt. Die Differenz dieser 2 Werte, als *Differenz-Jodzahl* (D.-J.-Z.) bezeichnet, dürfte sich deshalb als besonders kennzeichnende *Fettkonstante* erweisen.

Versuche. Die D.-J.-Z. ist besonders charakterist. für die Gruppe der *Trane*. Sogenannte *Trane*, wie z. B. der *Döglingsstran*, werden durch diese Zahl als nicht in die Gruppe der *Trane* gehörend gekennzeichnet. — *Olivenöl*, J.-Z. 80,6; 82,6; 89,0; 94,3; P.-J.-Z. 111,9; 115,0; 124,1; 119,7; D.-J.-Z. 31,3; 32,4; 35,1; 35,4. — *Erdnußöl*, J.-Z. 91,7; 102,4; P.-J.-Z. 130,7; 141,2; D.-J.-Z. 39,0; 38,8. — *Rüböl*, J.-Z. 102,6; 99,7; P.-J.-Z. 142,6; 141,5; D.-J.-Z. 40,0; 41,8. — *Mandelöl*, J.-Z. 97,5; 101,5; P.-J.-Z. 143,3; 147,5; D.-J.-Z. 45,8; 46,0. — *Sesamöl*, J.-Z. 110,2; 108,0; P.-J.-Z. 155,4; 154,8; D.-J.-Z. 45,2; 46,8. — *Cottonöl*, J.-Z. 97,0; 108,3; P.-J.-Z. 146,8; 159,9; D.-J.-Z. 49,8; 51,6. — *Leinöl*, J.-Z. 165,9; 175,0; P.-J.-Z. 218,3; 229,1; D.-J.-Z. 52,4; 54,1. — *Holzöl*, J.-Z. 171,7; 178,8; P.-J.-Z. 224,9; 231,1; D.-J.-Z. 53,2; 52,3. — *Sojabohnenöl*, J.-Z. 134,7; 136,8; P.-J.-Z. 191,4; 193,5; D.-J.-Z. 56,7; 56,7. — *Sonnenblumenöl*, J.-Z. 134,0; 123,5; P.-J.-Z. 198,5; 187,0; D.-J.-Z. 64,5; 63,5. — *Mohnöl*, J.-Z. 133,6; 132,7; P.-J.-Z. 198,1; 196,5; D.-J.-Z. 64,5; 63,8. — *Ricinusöl*, J.-Z. 87,7; 90,3; P.-J.-Z. 162,2; 165,4; D.-J.-Z. 74,5; 75,1. — *Waltran*, J.-Z. 108,1; P.-J.-Z. 138,7; D.-J.-Z. 30,6. — *Lebertran*, J.-Z. 115,1; P.-J.-Z. 145,7; D.-J.-Z. 30,6. — *Fischtran*, J.-Z. 152,9; P.-J.-Z. 184,6; D.-J.-Z. 31,7. — *Sardinentrans*, J.-Z. 174,7; P.-J.-Z. 204,3; D.-J.-Z. 29,6. — *Döglingsstran*, J.-Z. 69,0; P.-J.-Z. 77,0; D.-J.-Z. 8,0. — *Cocosöl*, J.-Z. 7,1; 9,0; P.-J.-Z. 9,8; 11,5; D.-J.-Z. 2,7; 2,5. — *Palmkernöl*, J.-Z. 14,0; P.-J.-Z. 16,6; D.-J.-Z. 2,6. — Auch für die *Systematik der Fette* dürfte die D.-J.-Z. von Wert sein. — Die früher (I. c.) angeführten Werte für *Sesamöl*, *Baumwollsaamenöl* u. *Sonnenblumenöl* besitzen im Gegensatz zu obigen keine Bedeutung, da verunreinigte Prodd. vorlagen. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 375—76. Brunn, Dtsch. Techn. Hochsch.) BUSCH.

Douglas-Pectin Corporation, übert. von: **R. Douglas** und **H. G. Loesch** Rochester, N. Y., *Öl- und Fettemulsionen*. Als Emulgierungsmittel werden Pectinlösungen verwendet. (**E. P. 221 466** vom 27/2. 1924, ausg. 29/10. 1924. A. Prior. 4/9. 1923.) OELKER.

Kunserolwerke Emanuel Khuner & Sohn, A.-G., Wien, *Gleichzeitige Reinigung und Entsäuerung von Ölen und Fetten*. Man behandelt die Öle u. Fette mit neutralisierend wirkenden Oxydationsmitteln, vorzugsweise Na_2O_2 , wobei diese Oxydationsmittel in gel. Form verwendet werden. (**Oe. P. 96 831** vom 13/11. 1922, ausg. 10. 1924.) OELKER.

Willy Franke, Breslau, *Kühlvorrichtung zur Herstellung von Seifenpulver*, wobei die zu trocknende M. auf eine drehbare Walze oder Trommel mit Innenkühlung aufgetragen u. die trockene M. durch Abstreichmesser entfernt wird, dad. gek., daß ein Kühlluftstrom von einem Ventilator aus unmittelbar gegen die auf der Walze oder Trommel abgelagerte Seifenmasse geleitet u. dann durch die von der Walze oder Trommel abgenommene Seifenpulvermasse hindurchgeführt wird. (**D. R. P. 388 678** Kl. 23 f vom 26/6. 1922, ausg. 28/1. 1926.) OELKER.

Willy Franke, Breslau, *Kühlvorrichtung zur Herstellung von kristallisiertem Seifenpulver* nach Pat. 388 678, dad. gek., daß die Trommel etwa bis zur halben Höhe von einem Gehäuse umgeben wird, an dem der Kühlstrom entlang geführt u. dicht unterhalb des Schabers gegen die ihm entgegenfallende Seifenpulvermasse getrieben wird die dadurch seitlich auf eine Rutsche abgelenkt wird. (**D. R. P. 404 014** Kl. 23 vom 18/12. 1923, ausg. 27/1. 1926. **Zus. zu D. R. P. 388 678**; vorst. Ref.) OELKER.

Raymond Vidal, Frankreich, *Seifen und nichtkaustisches Reinigungsmittel*. Man führt freie Fettsäuren in Kali-, Natron- oder Ammoniakseifen ein u. gibt gegebenenfalls 5% Acetaldehyd zu. (**F. P. 29 885** vom 25/6. 1924, ausg. 10/8. 1925. **Zus. zu F. P. 577 389**; C. 1925. I. 1660.) KAUSCH.

David Raymond Kellogg, Edgewood, V. St. A., *Mittel zur Reinigung und zum Schutze der Haut vor Beschmutzung*, bestehend aus einer Mischung von Bentonit, W. u. Seife. (**E. P. 236 069** vom 26/8. 1924, ausg. 23/7. 1925.) KÜHLING.

Marie Edouard Joseph Cathala, Frankreich, *Haarwaschmittel*, bestehend aus einer Mischung von $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ u. $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3$. Als Verdünnungsmittel kann A. gebraucht werden u. es können Riechstoffe zugefügt werden. (**F. P. 598 518** vom 11/9. 1924, ausg. 18/12. 1925.) KÜHLING.

Marius Chevalier, Var, Frankreich, *Waschen von Leinen in der Kälte*. Man verwendet eine Seife, die mit einem in W. unl. Fettlösungsm., wie Bzn. vermischt worden ist. (**F. P. 600 541** vom 2/5. 1925, ausg. 9/2. 1926.) FRANZ.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Ernst Blau, *Neuzeitliche pneumatische Baumwolltransport-, Misch- und Entstaubungsanlagen*. Beschreibung verschiedener Anlagen der Firma PAUL POLLRICH & Co., G. m. b. H., Düsseldorf. (Melliands Textilber. 7. 122—24.) SÜVERN.

A. T. King, *Die spezifische Schwere von Wolle und ihre Beziehungen zum Schwellen und zur Sorption in Wasser und anderen Flüssigkeiten*. Angaben über die Wrkg. der Sorption auf die Best. der D., über Durchdringung durch Lösungsm. u. Öle, über den Einfluß von Salzen auf das Schwellen u. die Sorption u. über Dichtebest. zur Ermittlung der Wiederaufnahme von Lösungsmitteldämpfen u. der Zus. von Wollbaumwollgemischen. (Journ. Textile Inst. 17. T 53—67.) SÜVERN.

E. Belani, *Die Gasmaschine als Kraftquelle für die Zellstoff- und Papierindustrie*. Betriebswirtschaftlicher Vergleich von Betriebsmitteln, welche als Kraftquelle in Betracht kommen. Die Gaskraftanlagen mit Urteergewinnung u. Abwärmeverwertung.

ermöglichen eine so hohe Ausnützung der Brennstoffe, wie keine der heute bestehenden Dampf- oder Dieselmotorenanlagen. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 17—19. Villach.) SÜVERN.

Max Wintermeyer, *Die stetigen Schleifer*. Angaben über die Entw. der Voithschen stetigen Schleifer u. über ihre Wirkungsweise. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 65—73. Heidenheim a. d. Brenz.) SÜ.

E. Öman, *Theorie der Harzleimung*. Von Theorien über Harzleimung wird zunächst ILLIGS Auffassung, dann die Resinattheorie u. WURSTERS Freiharztheorie, weiter SCHWALBE u. ROBSAHMS Unterss. über die Einw. von Alaun auf Sulfittellstoff u. die kolloidchem. Auffassungen über den Verlauf der Leimung von STÖCKIGT, KLINGNER u. LORENZ besprochen. Vf. ist, da Harz von der Faser aufgenommen werden kann, ohne daß sich Al im W. vorfindet, der Ansicht, daß die Faser zunächst Al aufnimmt u. positive Ladung erhält, worauf sich das negativ geladene Harz mit der positiv geladenen Faser vereinigt. Die Fähigkeit der Faser, Harz aufzunehmen, ist unter wechselnden Bedingungen höchst verschieden. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 49—58.) SÜVERN.

H. Wenzl, *Bleichstudien an Holzzellstoffen*. (Vgl. auch S. 794.) Stärker hydrolysierte Hypochloritlsgg. vermögen wirksamer zu bleichen. Die Auflösfähigkeit für die Zellstoffinkrusten ist bei Alkalihypochloriten größer als bei Erdalkalihypochloriten. Neutralsalze vermögen die Löslichkeit der durch Oxydation abgebauten Inkrusten in der Bleichflotte zu beeinflussen, sie beeinflussen ferner die Löslichkeit von CO₂ im Bleichbad u. können damit den Bleichvorgang stören. Weißmessungen ergeben, daß Chlorkalksorten mit größerem Chloridgehalt bei gleichem Verbrauch an wirksamem Cl₂ schlechteren Effekt erzielen lassen. Größere Zusätze an Neutralsalzen verringern im allgemeinen bei gleichem Aufwand an wirksamem Cl₂ den Bleicheffekt. Die Stufenbleiche unter Einschaltung einer Zwischenwäsche mit W., Na₂CO₃ oder verd. HCl bedeutet bei gleichem Aufwand an wirksamem Cl₂ hinsichtlich der durchgehenden Bleiche in bezug auf das erzielte Weiß keinen Erfolg. Mit CaCO₃ beschwerte Faser ergibt mangelhaften Bleicheffekt. Die Chlorrückgangsquote gezählt, den Verlauf des Bleichvorgangs in jedem einzelnen Abschnitt zu beurteilen. Der Na₂CO₃-Gehalt der NaOCl-Lsgg. ist von ausschlaggebender Bedeutung für die Bleichgeschwindigkeit u. das Bleichergebnis. Die Wirksamkeit der CO₃''-Ionen wurde erneut geprüft u. bestätigt. Chloride u. Sulfate vermögen den Bleichvorgang nur verzögernd zu beeinflussen. Soweit durch sie eine Ausfällung des in Lsg. befindlichen Carbonats bewirkt wird, ergibt sich eine mäßige Beschleunigung des Bleichverlaufs. Zusatz von Nitrat u. Chlorat bewirkt Verzögerung. Ggw. von Acetat führt zu rascher I₂-Abnahme unter wesentlicher Verschlechterung des Bleicheffekts. Die Ggw. u. Wirksamkeit von Salzen niederer Fettsäuren in ausgebrauchten Bleichbädern u. deren Wirksamkeit im beschriebenen Sinne ist anzunehmen. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 81—88. Frankfurt a. M.) SÜVERN.

Chr. Lucke, *Ein Rückblick auf die alte Papiermacherkunst im Kurfürstentum Sachsen*. Geschichtliche Angaben auf Grund von Aufzeichnungen aus den Jahren 1330—1840. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 5—37.) SÜVERN.

H. Postl, *Nadelpapier*. Einzelheiten über Herst. des schwarzen, für die Verpackung der Nadeln dienenden Papiers. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 23. Biedermannsdorf b. Wien.) SÜVERN.

Curt Rühl, *Über die Verwendung von Wärme und Kraft in der Papierfabrikation*. Die Verwendung der Abgaswärme zur Speisewassererzeugung oder zum Trocknen der Fäden, Minderung der Wärmeverluste infolge Übergangs in die Luft durch geeignete Leitungsquerschnitte u. hohen Dampfdruck, genaue Betriebskontrolle, die verschiedenen Möglichkeiten der Dampfausnutzung ohne oder mit eigener Kraftanlage, die

Vorteile der Gegendruckanlagen, zentralisierte u. dezentralisierte Krafterzeugung der Wärmeverbrauch bei der Papiertrocknung, Kondensatverwertung, der Dampfbedarf zur Heizung u. Lüftung u. Wärmebilanzen werden besprochen. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 97—106. Charlottenburg.) SÜVERN.

K. J. Breuer, *Isolationsstoffe aus imprägniertem Hartpapier*. (Schluß zu Kunststoffe 15. 34; C. 1925. II. 1113.) Angaben über elektr. u. mechan. Festigkeit. (Kunststoffe 16. 23—24.) SÜVERN.

E. Zopf, *Elektrische Gasreinigung unter besonderer Berücksichtigung der Zellstoffindustrie*. (Vgl. S. 2224.) Beschreibung von Cottrell-Möller- u. Lurgianlagen u. Zusammenfassung der für die Zellstoffindustrie durch die elektr. Gasreinigung sich ergebenden Vorteile. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 38—43.) SÜVERN.

Arthur St. Klein, *Alkalibedarf bei der Erzeugung von Holzzellstoff*. Aus einer Reihe von Zahlen verschiedener Fabriken geht hervor, daß die Angabe, der Alkalibedarf sei 20% des Holzgewichts, wozu noch 25% dieser Alkalimenge benötigt werden um die Phenole u. Alkohole in Lsg. zu halten, viel zu hoch ist. Als Durchschnittsverbrauchszahl für den Aufschluß von Fichtenholz können etwa 16—18 kg je 100 kg trocknen Holzes angesehen werden. (Zellstoff u. Papier 6. 70—71. Dahlem.) SÜVERN.

Rudolf Sieber, *Über Alkaliverluste im Betriebe der Sulfatzellstofffabrikation*. Die Möglichkeiten von Verlusten in der Kaustizieranlage, beim Lösen der feuerfl. Schmelz durch den Schornstein u. in den Waschanlagen werden besprochen. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 6—7. Kramfors.) SÜVERN.

Carl Kullgren, *Die Veränderung der Alkalität der Lauge während der Kochung von Natron- und Sulfatzellstoff*. Die gewöhnlichen, für die Best. der freien Alkalimenge in den Kochlauge angewandten Methoden ergeben keine sicheren Resultate. Die einzig anwendbare Methode ist die von KOELICHEN (Ztschr. f. physik. C. 1900. 33. 129.) Die Ursachen der höheren Ausbeute an Zellstoff beim Kochen in Sulfatlauge gegenüber reiner NaOH-Lsg. werden besprochen. Dem NaSH kommt eine besondere Wrkg. im Kochprozeß nicht zu. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 20—23.) SÜVERN.

L. Wolkow, *Zellstoffherstellung aus minderwertigem Papierholz*. Beim Lager des Papierholzes entstandene Blau- u. Rotfäule, die mit 50% die Querschnittsfläche des Papierholzstammes ausfüllen, bilden kein Hindernis, einen Zellstoff zu gewinnen, der dem aus gesundem Papierholz oder einem guten finn. nicht nachsteht. Solcher Zellstoff ist vom chem. Standpunkt aus als n. zu betrachten. Auch aus dem Wipfel des Stammes läßt sich ein hinsichtlich Reinheit u. mechan. Beschaffenheit zufriedenstellender, ganz leidlicher Zellstoff ohne erhöhte Harzstörung gewinnen. (Zellstoff u. Papier 6. 75—76.) SÜVERN.

A. W. Allen, *Wirtschaftliche Ausnutzung von Sulfitalblauge*. (Vgl. S. 1738.) Ein Quadrupelleffekt-Verdampferanlage ist beschrieben. Die konz. Ablauge wird als Mischung mit Öl unter den Kesseln verbrannt. Von dem sauren Kondensat der Verdampfung wird ein Teil zur Bereitung der sauren Kochlauge verwendet. (Papierfabr. Journ. 82. 48—50.) SÜVERN.

H. Kirmreuther, E. Schlumberger und W. Nippe, *Über Fluoreszenzversuch an technischen Sulfitzellstoffen*. Die bei ultravioletter Bestrahlung von ungebleichte Sulfitzellstoff auftretende Fluoreszenz nimmt in ihrer Intensität mit steigenden C Verbrauchszahlen zu. Dasselbe Leuchten zeigt wss. Sulfitalblauge. Gebleichte Zellstoffe fluorescieren nur schwach grünlich. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 106—07.) SÜVERN.

von Laßberg, *Ablaugeneindampfung*. Nach Beschreibung verschiedener möglicher Eindampfverf. für Ablauge wird auf die Brühdampfkompressionseindampfung

besonders für das Eindampfen von Ablauge geeignet erscheinen, näher eingegangen. Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 58—61.) Sü.

H. Serger, *Cellophan, ein neuartiges Verpackungsmaterial*. Cellophan, ein durchsichtiger, aus reiner Cellulose bestehender Pergamentpapierersatz, dehnt sich wie letzteres mit W. aus, bildet eine halbdurchlässige Membran u. ist vorzüglich für Deckblätter in der Marmeladen- u. Konfitürenfabrikation geeignet, weniger gut als Verpackung für Brot u. Pflaumen, weil es eine Austrocknung derselben nicht verhindert. (Konserven-Ind. 13. 99—101.) GROSZFELD.

Benno Schmidt, *Aus der Frühzeit der Wachtuchherstellung*. Angaben über Wachtuchherst. in Frankfurt u. den Nachbarstädten, Leipzig u. ihre Ausdehnung auf andere Städte. (Kunststoffe 16. 28—29.) SÜVERN.

Robert George Fargher und **Maurice Ernest Probert**, *Die chemische Analyse von Baumwolle. Aschengehalt und Aschenalkalität typischer Baumwollen*. Mit Aschenalkalität bezeichnet Vf. die Anzahl Milliäquivalente Säure, die zum Neutralisieren der Asche von 100 g reiner Baumwolle erforderlich sind. Durch Dividieren der Aschenalkalität durch den Aschengehalt erhält man die Alkalität des Gramms Asche. Die Menge Mineralstoffe in nord- u. südamerikan., ägypt. u. Sea-Islandbaumwolle liegt zwischen 1 u. 1,3%, höhere Zahlen finden sich zuweilen bei amerikan. Saaten, die in anderen Ländern gezogen sind u. bei ind. Baumwolle. Die Alkalität im Gramm Asche ist für die verschiedenen Sorten Baumwolle konstant, sie liegt bei nord- u. südamerikan. Baumwolle im allgemeinen niedriger als bei ind., ägypt. u. Sea-Islandbaumwollen u. außerhalb Amerikas gezogenen. (Journ. Textile Inst. 17. T 46 S 52.) SÜVERN.

S. G. Barker und **A. T. King**, *Ein Vergleich von Messungen des Durchmessers von Wollfasern mittels der Mikrowage und des Projektionsmikroskops mit Anwendungen auf die Bestimmung der Dichte und Markzusammensetzung*. Die beiden Methoden geben für markfreie Wollen gut übereinstimmende Zahlen u. die gravimetr. Methode ist ein zweckmäßiges Mittel zur Best. des Faserdurchmessers. Bei markhaltigen Fasern ist der berechnete Durchmesser geringer als der beobachtete, die Differenz wächst mit dem Markgehalt. Angaben über Querschnittsberechnungen. (Journ. Textile Inst. 17. T 68—74.) SÜVERN.

E. Schülke, *Bestimmung statt Schätzung des Rendements bei Schweißwolle*. Vorschläge für rasch durchführbare Bestst. des Gehalts an absolut trockner u. reiner Wolle, die genauer sind als die meist angewendete einfache Handwäse. (Melliands Textilber. 7. 121.) SÜVERN.

Rudolf Lorenz, *Über Methoden zur Bestimmung der Korngröße von Füllstoffen*. (Vorts. u. Schluß von S. 1739.) Die opt. Meßmethoden, mkr. Ausmessung u. ultramkr. Auszählung werden nur als halbquantitativ angesehen. Siebmethode kommen gerade für Papierfüllstoffe weniger in Betracht, weil geeignete Siebgrößen fehlen. Schlammverff. sind ebenfalls nur für gröberes Material, als es in den Papierfüllstoffen vorliegt, zu empfehlen. Allen Anforderungen gerecht werden die Sedimentierverff., die vorteilhaftesten ist die photograph. Aufnahme u. graph. Wiedergabe nach GESSNER. Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 33—36. 74—76. —92. Tharandt i. Sa.) SÜVERN.

Fritz Rühlemann, *Über die Festigkeitsbestimmung von Zellstoff*. Das Arbeiten mit dem Festigkeitsprüfer „Deforten“ ist beschrieben. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 1—6. Wolfgrün.) SÜVERN.

Helmer Roschier, *Über die Trockengehaltsbestimmung des in der hydraulischen Presse gepreßten Holzschliffes*. Anweisung für zweckentsprechende Probeentnahme. Zellstoff u. Papier 6. 76—77.) SÜVERN.

O. S. Rhodes, *Eine Probe zur Unterscheidung von Viscose- und Kupferseide*. Tiefere Färbungen als mit der von K. GÖTZE (S. 1071) empfohlenen ammoniakal.

Ag-Lsg. erhält man, wenn man AgNO_3 mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ versetzt u. nach Verschwinden des zunächst auftretenden Nd. NaOH -Lsg. zugibt. Mit dem Reagens gibt auch Nitroseite Braunfärbung. (Journ. Textile Inst. 17. T 75—76.) SÜVERN.

Randal Thomas Mowbray Berkeley und **Ernest Stenhouse**, Foxcombe, England, *Schützen von Holz, Pelzen, Leder u. dgl. vor pflanzlichen und tierischen Schädlingen*. Die zu schützenden Gegenstände werden mit einer Lsg. von CH_2O in Kerosen oder Terpentin behandelt. (E. P. 221 599 vom 3/7. 1923, ausg. 9/10. 1924.) KÜHL.

Alfred Boothe Callaghan, New York, V. St. A., *Überzugsmasse*. Man vermischt Glimmer mit Ton, Casein, Alaun u. Weinstein. (Can. P. 246 616 vom 2/5. 1921, ausg. 3/2. 1925.) FRANZ.

Clarence D. Shaffer, Kalamazoo, Michigan, V. St. A., *Wasserdichtmachende Masse*. Man vermischt eine Lsg. von Kolophonium in Gasolin mit einer Lsg. von Paraffin in Gasolin u. Kautschuklsg. (Can. P. 250 249 vom 27/5. 1924, ausg. 2/6. 1925.) FR.

Grant Hammond, New Haven, Conn., V. St. A., *Entfernen von Druckerschwärze u. dgl. aus Papier*. Man behandelt das Papier in einem Holländer bei Temp. unter 110°F . mit NaOH , wäscht den so erhaltenen Papierbrei aus u. versetzt ihn bei gewöhnlicher Temp. mit einem geringen Überschuß eines sauren Alkalisulfits, wie NaHSO_3 , wodurch die M. gleichzeitig gebleicht u. neutralisiert wird. (A. P. 1 572 478 vom 12/3. 1925, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Grant Hammond, New Haven, Conn., V. St. A., *Entfernen von Druckerschwärze aus Altpapier*. Man behandelt das Papier mit einer Lsg., welche eine seifenartige Substanz, vorzugsweise Naphthaseife u. Glucose o. dgl. enthält, u. wäscht die M. hierauf mit W. aus. (A. P. 1 572 479 vom 24/5. 1922, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

U. S. Cartridge Company, übert. von: **James H. Carmichael**, Lowell, Massachusetts, V. St. A., *Wasserdichte Papierrohre*. Man überzieht das Papier bis auf einen schmalen Rand mit einem polymerisierbaren Öl, rollt das Papier mit der geölten Seite nach außen zu einem Rohr, trocknet u. erhitzt zur Polymerisation des Öles längere Zeit in einem Ofen. (A. P. 1 571 706 vom 18/2. 1925, ausg. 2/2. 1926.) FRANZ.

Otto Wild, Ebersberg, Oberbay., *Herstellung von mehrfarbigen Überzug- o. dgl. Papieren*, dad. gek., daß die für das Druckverf. notwendige positive Platte irgendeines Musters in irgendeiner Farbe gedruckt wird u. die negative Platte mit einer gewissen Registerdifferenz in abweichender Farbe u. gegebenenfalls entsprechender Musterung auf den Grunddruck aufgedruckt wird. — Es entstehen hierbei Drucke von plast. Wrkg. (D. R. P. 422 759 Kl. 15k vom 10/11. 1922, ausg. 9/1. 1926.) FRANZ.

U. S. Envelope Company, Springfield, Mass., übert. von: **Charles E. Swett**, West Roxbury, Mass., V. St. A., *Herstellung von transparentem Papier*. Das mit Harzen o. dgl. imprägnierte Papier wird einer wiederholten abwechselnden Erhitzung u. Kühlung unterworfen. (A. P. 1 570 098 vom 18/5. 1922, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

U. S. Envelope Company, Springfield, Mass., übert. von: **Charles E. Swett**, West Roxbury, Mass., V. St. A., *Herstellung von Transparentpapier*. Man behandelt Papier mit einer alkoh. Lsg. von Gerbsäure u. Terpentin. (A. P. 1 571 976 vom 11/8. 1924, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Gregg A. Russell und **Hugh C. Russell**, übert. von: **Robert Morgenier**, Oakland, Calif., *Herstellung von Papierstoff aus Reishülsen*. Man kocht die Hülsen in einer NaOH -Lsg. von 10°Bé etwa 2 Std., entfernt dann die Fl. u. bearbeitet die M. in einem Holländer. (A. P. 1 570 389 vom 7/12. 1920, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

Linn Bradley, Montclair, N. J., und **Edward P. Mc Keefe**, Plattsburgh, N. Y., *Herstellung von Zellstoff*. Man unterwirft zerkleinertes Holz der Einw. einer NaOH u. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ enthaltenden Kochlauge. (A. P. 1 572 840 vom 28/3. 1921, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Heinrich Renck, Hamburg, Deutschland, *Celluloiddruckplatten*. Die Celluloidplatte wird auf der Oberfläche durch Behandeln mit einem Lösungsm., Eg., erweicht, hierauf mit einer Lsg. von Gelatine, die Eg. enthält, überzogen u. dann die Dichromat-Gelatineschicht aufgebracht. (A. P. 1565815 vom 4/11. 1924, ausg. 15/12. 1925.) FR.

Leon Lilienfeld, Wien, Österreich, *Kunstfäden*. Man verwendet einen Cellulosealkyläther, der in W. über 16° unl., in W. unter 16° quellbar ist, in Mischung mit einem Weichmachungsmittel. (Can. P. 249 776 vom 21/6. 1923, ausg. 19/5. 1925.) FR.

Jean Robert Lavaud, Belgien, *Schwerverbrennlichmachen von Nitrocellulosefäden*. Man behandelt Nitrocellulosefäden mit einer 10% ig. Essigsäure oder einer 5% ig. Ameisensäurelsg. 30—40 Minuten bei einer Temp. von 30°, nach dem Spülen in einer Schleuder geht man in eine 10% ig. Lsg. von Na₂S + 9H₂O u. MgSO₄ + 7H₂O bei einer Temp. von 25—30°, nach 2½—3 Stdn. geht man in eine 5% ig. Lsg. von Na₂S₂O₄ und nach dem Spülen in ein viertes Bad aus 10% ig. Lsg. von AlCl₃ + 12H₂O, schließlich geht man durch ein Bad, das aus 8 Teilen (NH₄)₂SO₄, 2½ Teilen NH₄HCO₃, NH₄NH₂CO₂, 1 Teil H₃BO₃ und 1½ Teilen Na₂B₄O₇ + 10 H₂O besteht; nach 30 Minuten wird gespült u. getrocknet. (F. P. 600 852 vom 17/7. 1925, ausg. 17/2. 1926. Belg. Prior. 3/4. 1925.)

FRANZ.

Eastman Kodak Company, übert. von: **John I. Crabtree**, Rochester, New York, *Konservierungsmittel für Filme*. Um die Biegsamkeit der Filme zu erhalten, behandelt man sie mit einer Lsg. von Glycerin u. Glykol in W. (A. P. 1 568 658 vom 3/3. 1925, ausg. 5/1. 1926.)

FRANZ.

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, übert. von: **Marry J. Hoffman**, Stamford, Connecticut, V. St. A., *Elektrisch nicht erregbare Filme*. Man überzieht den nicht vollkommen trocknen Film mit der Lsg. von Elektrolyten, die die Leitfähigkeit des Filmes erhöhen, in einem Lösungsm., das auch Lösungsmittel für die zur Herst. des Filmes dienenden Celluloseester ist, man verwendet z. B. eine Lsg. von NH₄-Nitrat, -Acetat, -Jodid, -Sulfoeyanat, KJ, CdJ₂, Ca(NO₃)₂ usw. in A., H₂OH, Aceton. (A. P. 1 570 062 vom 12/10. 1921, ausg. 19/1. 1926.)

FRANZ.

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, übert. von: **Charles C. Pitman**, Parlin, New Jersey, V. St. A., *Elektrisch nicht erregbare Filme*. Der Cellulosenitratfilm, der aus einem Cellulosenitrat mit mehr als 11,5% N hergestellt ist, wird auf der Rückseite mit einem Film aus einem Cellulosenitrat mit geringerem N-Gehalt, Glycerin, Natriumacetat, Saponin überzogen. (A. P. 1 570 076 vom 16/9. 1920, ausg. 19/1. 1926.)

FRANZ.

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, übert. von: **Charles C. Pitman**, Parlin, New Jersey, V. St. A., *Elektrisch nicht erregbare Filme*. Der Film, der aus einem Celluloseacetat mit mehr als 55% gebundener Essigsäure besteht, wird auf der Rückseite mit einem Film aus Celluloseacetat mit weniger als 55% gebundener Essigsäure, Glycerin u. Ammoniumacetat überzogen. (A. P. 1 570 077 vom 16/9. 1920, ausg. 19/9. 1926.)

FRANZ.

Leon Lilienfeld, Wien, Österreich, *Plastische Massen*. Man verwendet eine Mischung von einem Cellulosealkyläther, einem Lösungsm. u. einem Phenolester. (Can. P. 249 773 vom 16/6. 1922, ausg. 19/5. 1925.)

FRANZ.

Earl E. Snook, Billings, Montana, V. St. A., *Plastische Massen*. Man vermischt ein Gemisch aus Gelatine mit W., gekochtem Leinöl, „Titanox“, Kreide, Chromgelb u. Salicyluremethylester. (A. P. 1 568 098 vom 16/2. 1925, ausg. 5/1. 1926.)

FRANZ.

Jean Paiseau, Paris, *Fischschuppentinktur*. Die Rohstoffe, Fischschuppen, Schwimmbalgen, Häute usw. werden mit Stoffen behandelt, welche die Krystalloide umhüllenden organ. Stoffe auf einmal entfernen; man behandelt die Rohstoffe z. B. mit einer wss. neutralen Seifenlsg., erwärmt 1—3 Stdn. auf 35—60°, läßt dann absitzen, wäscht dann mit dest. W., an Stelle der Seife kann man Saponin, Fermente, Pan-

kreatin, Diastase verwenden. (Oe. P. 97 113 vom 26/8. 1921, ausg. 10/6. 1924
Schwz. P. 98 796 vom 22/8. 1921, ausg. 16/4. 1923.) FRANZ.

Sydney Rauschenberg, San Diego, California, V. St. A., *Mittel zum Verzieren von Oberflächen*. Man erhitzt Muscheln, insbesondere Perlmuttermuschel, in einem Ofen bis die einzelnen Schichten abblättern, die glänzenden Teile werden ausgesucht u. durch Behandeln mit W., dem etwas Alkali zugesetzt sein kann, gereinigt; das erhaltene Prod. kann mit einem Lack vermischt zur Erzeugung von Überzügen usw. verwendet werden. (A. P. 1 570 183 vom 17/5. 1924, ausg. 19/1. 1926.) FRANZ.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

W. Steuer, *Die Untersuchung von Grubenwettern*. Zur Unters. von Grubenwettern auf CH₄ kann die vom Vf. früher (vgl. S. 800) vorgeschlagene Methode zur Best. von CH₄ in Leuchtgas verwendet werden. (Glückauf 62. 22—24. Breslau, Technische Hochschule.) BIELENBERG.

Hermann Becker, *Die Bewertung von heißen und kalten Braunkohlen- und Steinkohlengeneratorgasen auf Grund der Bezugzahl*. Die Bezugzahl ist der Quotient eingeführte Wärmemenge.

Dieser Wert ist für Kaltgas:

kg Abgas

Heizwert der in den Ofen eingeführten Gase;
kg Abgas

für Heißgas wird der Zähler durch vier Faktoren (Heizwert des Gases u. d. Teeres, fühlbare Wärme des Gases u. der Feuchtigkeit), der Nenner durch zwei Faktoren (Abgas u. Feuchtigkeit) beeinflusst. Vf. zeigt die Bewertung der Gase unter diesen Gesichtspunkten an verschiedenen prakt. Beispielen. (Braunkohle 2. 793—99. 1925. Köln.) BIEL.

E. Klapper, *Verschmelzung von Staubkohle*. Die Rohkohle wird gebrochen gemahlen, gelangt dann in den Oberteil eines Ofens, von wo sie als Staubwolke gegen einen von unten eingeleiteten Strom eines neutralen Heißgases herabsinkt. Wenn die Kohle auf den Boden des Ofens ankommt, ist sie bereits verkocht; der Vorgang ist kontinuierlich. Der staubförmige Halbkoks soll für Staubfeuerung sehr geeignet sein; die Teerausbeute soll besonders hoch, das Schmelgas sehr heizkräftig sein. (Asphalt u. Teerind.-Ztg. 26. 6—7.) BIELENBERG.

A. Thau, *Die Verschmelzung als Vorstufe zur Verkokung*. Vf. weist zunächst auf die verschiedenartige Verwendung des Wortes Bitumen hin u. bezeichnet im vorliegenden Falle als Bitumen die Bestandteile der Kohle, die bei der Erwärmung weichen u. die B. eines gebackenen Kokes bewirken. Die Anschauungen von ILLINGWORTH über den Einfluß der Temp. auf dieses Bitumen u. die Bedeutung des Bitumens gegenüber höheren Temp. auf die B. des Kokes werden besprochen. Weiter werden die Eingliederung einer Schwelanlage in den Kokereibetrieb u. mehrere Verff. für die mehrstufige therm. Behandlung der Kohle erörtert. Schließlich folgt eine Besprechung des Salerni-Schwelofens. (Glückauf 62. 1—11. Halle a. S.) BIEL.

Hans Broche und Theo Bahr, *Über das Ölbitumen und das Festbitumen der Steinkohle. Zugleich Bemerkungen zu der Arbeit von W. A. Bone, A. R. Pearson u. R. Quarendon: „Die Extraktion von Steinkohlen mit Benzol unter Druck.“* Vff. schildern zunächst noch einmal ihre bereits früher (Brennstoffchemie 5. 299; C. 1924. II. 27.) beschriebene Arbeitsweise u. stellen die Abweichungen derselben von der von BONE u. PEARSON u. QUARENDON (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 105. 608; C. 1924. 776) angewandten klar. Der Unterschied besteht wesentlich darin, daß BONE u. seine Mitarbeiter die erhaltenen Bitumina zu Kokspulver u. nicht zu den extrahierten Kohlen gaben. — Vff. machen weitere Mitteilungen über die Zerlegung von Öl- u. Festbitumen sowie über die Extraktion von Steinkohle mit PAe. bei 285°. Ferner wird der Einfluß

r Korngröße der extrahierten Kohle u. der Verkokungsmethode auf die Beschaffenheit des Kokes besprochen. (Brennstoffchemie **6**. 349—54. 1925. Mülheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Institut f. Kohlenforschung.) **BIELENBERG.**

Erich Stach, *Die Untersuchung des Clarains oder Anthraxylons in der Kohle.* mkr. Unters. von Dünnschliffen gibt keine sicheren Anhaltspunkte für das Ausgangsmaterial des Clarains. Besser geeignet ist das Veraschungsverf. nach GÜMBEL, er die von TURNER u. RANDALL angewandte Methode (oberflächliche Veraschung des Kohlenanschliffs u. Unters. desselben u. Mk. im auffallenden Licht). Mit den oben genannten Verff. hat Vf. zeigen können, daß die oberbayr. Pechkohle eine Torfkohle ist u. daß bei der B. des Clarains die verholzende Substanz eine herrschende Rolle gespielt hat. (Glückauf **61**. 1398—1402. 1925. Berlin, Preuß. Geol. Landesanstalt.) **BIELENBERG.**

A. R. Powell und J. H. Thompson, *Die Entschwefelung von Koks durch Wasserdampf.* Vers., Koks durch Behandeln mit W.-Dampf zu entschwefeln, waren von Anfang an gekrönt. Es gelingt zwar nicht, den S vollständig auszutreiben, jedoch lassen sich durch abwechselnde Behandlung mit Dampf unter Druck u. nachfolgendem Vakuum 20—25% des gesamten S entfernen. Vakuum gewechselt mit natürlichem Wasserdampfstrom gibt eine Umsetzung von 15—20% S, ein unterbrochener Dampfstrom eine solche von 10—15%. Die geeignetste Temp. liegt bei 750°, die Dauer des Prozesses beträgt 2—4 Stdn. (Stahl u. Eisen **46**. 226—28. Pittsburg [Pa.]) **LÜDER.**

André Duparque, *Über die mikroskopische Struktur der Steinkohlen.* Bei der Untersuchung der Steinkohlen mit dem Erzmikroskop konnten zweierlei Arten von Stoffen festgestellt werden. Einmal solche vegetabilen Ursprungs (I) (Ligninsubstanz, Algen, Sporen), dann eine teigige, strukturlöse M. (II), welche wahrscheinlich sekundärer Entstehung ist. Bei den *Bogheadkohlen* tritt II stark zurück. Ihr Gasgehalt beträgt etwa 400 cbm pro t. Die *Cannelkohlen* sind gasärmer (300—330 cbm pro t). Sie werden durch Mikrosporen gebildet u. II beträgt manchmal 25% ihrer M. Die *Gayetkohlen* sind mit ihnen verwandt. Bei ihnen treten II mehr hervor, auch sind sie gasreicher. Die *Glanzkohle* scheint aus Ligninsubstanz zu bestehen, welche durch II verfestet ist. Die *Durainkohle* hat eine ähnliche Zus. wie die Cannelkohle. Die gewöhnliche Steinkohle gibt etwa 230—255 cbm Gas pro t. Bemerkenswert ist die Proportionalität des Gasgehalts mit der M. der Substanz I. Der Gehalt an flüchtigen Bestandteilen ist nach der Ansicht des Vfs. wachsartigen oder ölartigen Stoffen, deren Zus. der aliphatisch. Körper ähnlich ist, zuzuschreiben. (C. r. d. l'Acad. des sciences **2**. 475—77.) **ENSZLIN.**

K. Deimler, *Zahlenmäßige Bestimmung der verschiedenen Größen bei der Aufbereitung, unter besonderer Berücksichtigung der Braunkohle.* Fortsetzung u. Schluß (S. 2269.) (Braunkohle **24**. 876—83. Halle a. S.) **BIELENBERG.**

H. I. Waterman und A. F. H. Blaauw, *Weitere Untersuchung der flüssigen Reaktionsprodukte, die bei der Einwirkung von Wasserstoff auf Paraffin unter hohem Druck bei 450° erhalten werden. Beitrag zur Kenntnis der Hydrierung nach Bergius.* (J. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **34**. 259; C. **1925**. 2301.) Vff. erhitzten Rangoon-paraffin (84,6% C, 14,8% H) im Autoklaven unter H₂ Min. auf 450°, wobei der Druck bis auf 290 at stieg, u. erhielten aus 400 g durchschnittlich 360 g fl. Prod. von D.¹⁹ 0,722—0,733, die durch Dest. bis 150° in eine Fraktion I (ca. 40%) u. in eine höher sd. Fraktion II getrennt wurden. II bestand aus nicht nur wenig zersetztem Paraffin u. erstarrte bei 12°. Durch sorgfältigste Fraktionierung konnten in I große Mengen aufeinanderfolgende Glieder aliphatisch. KW-stoffe (von Pentan bis Nonan), vermischt mit ca. 10% Olefinen nachgewiesen werden. Bzl. war auch Toluol nur in ganz geringer Menge nachweisbar. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **45**. 1—95. Delft, Techn. Hochschule.) **BRAUNS.**

E. O. Rasser, *Holzkonservierung*. Verschiedene für Holzkonservierung vorgeschlagene Mittel werden besprochen. (Kunststoffe 16. 26—28.) SÜVERN.

R. Kattwinkel, *Über die Untersuchung und Bewertung von Kokskohlen*. Die Methoden der Unters. von Kokskohlen — Tiegelprobe, Dest. u. Backfähigkeit — sowie von Koks — D., Porosität u. Zerreiblichkeit — werden erläutert. Abänderung der Methode zur Best. der Backfähigkeit nach MEURICE u. App. dazu. Ergebnisse der Unters. einer Anzahl westfäl. Normal-Kokskohlen u. Kokse, Ableitung einer Kennziffer für Kokskohlen daraus. Die zur Klassifizierung der Kohlen gut geeigneten Prüfmethode geben für die Koksbildung im Betriebsofen keine ausreichende Erklärung. Ebenso versagt die aus dem Verh. bei der Tiegelverkokung hergeleitete Bitumentheorie von FISCHER teilweise, weil die Bedingungen des prakt. Verkokungsprozesses im Tiegel nicht reproduzierbar sind. Beim Entstehen von stückfestem u. geschmolzenem Koks aus Sand- u. Sinterkohle entgegen der Theorie FISCHERS müssen experimentell schwer nachweisbare Kräfte einwirken, vielleicht beeinflussen — in Annäherung an die Anschauungen von SIMMERBACH — isomere Veränderungen des C-Moleküls während der Gärungszeit stark die Kokseigenschaften. (Gas- u. Wasserfach 69. 145—50. Gelsenkirchen.) WOLFFRAM.

F. Moll, *Untersuchung auf Imprägnierung von Holz mit Metallsalzen durch Röntgenstrahlen*. Entgegnung an SCHANTZ (S. 1079). SCHANTZ hat offenbar irrtümlicherweise die abweichende Farbtonstärke des Splintholzes für den Einfluß des HgCl₂ angesehen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 335—36. Berlin.) JUNG.

J. H. Steinkamp, *Das registrierende Gascalorimeter von „Fairweather“*. Die „Gasregulation Act. 1920“ verpflichtet die engl. Gaswerke mit einer jährlichen Gasabgabe von mehr als 28000 cbm zur Aufstellung eines registrierenden Calorimeters zwecks Nachweis, daß der vorgeschriebene Heizwert nie länger als 2 Stdn. um mehr als 5% unterschritten wird, da sonst in jedem Falle eine Buße von 5 £ verwirkt ist. Die infolgedessen offiziell eingeführte registrierende Calorimeter von „Fairweather“ wird ausführlich beschrieben. (Het Gas 46. 115—17.) WOLFFRAM.

Charles J. Hoover, New York, *Feueranzünder*. Er besteht aus etwa 8% Steinkohle, 60% Sägemehl, 2% Lycopodium u. 30% Rohterpentin. (A. P. 1 570 585 vom 18/3. 1925, ausg. 19/1. 1926.) FRANZ.

Walther & Cie. A.-G., Cöln-Delbrück, **Wilhelm Otte**, Essen, und **Max Birkne** Bergisch-Gladbach, *Zweistufige Verbrennungsverfahren, insbesondere für minderwertig wasserreiche, holzige und bituminöse Brennstoffe*, wobei in der ersten Verbrennungsstufe der Rohbrennstoff ganz oder teilweise entgast oder auch teilweise vergast und der so behandelte Brennstoff zur Vorbereitung für die zweite Verbrennungsstufe gemahlt wird, dad. gek., daß die Entgasung oder auch teilweise Vergasung des Brennstoffes unter sofortiger Nutzbarmachung der frei werdenden Wärme erfolgt und sich die Kohlenstaubverbrennung unmittelbar an den Mahlvorgang und damit an die erste Verbrennungsstufe anschließt, um so das Gesamtverfahren in kontinuierlichem Betrieb durchzuführen. (Schwz. P. 113 125 vom 13/5. 1924, ausg. 2/1. 1926.) OELKER.

Louis Chavanne, Frankreich, *Vergasung fester Brennstoffe*. Man führt die Brennstoffe in brikkettierter Form an einer u. die feinen Anteile an einer anderen Stelle in den Ofen ein u. gewinnt die Gase aus verschiedenen Regionen. (F. P. 597 096 vom 29/7. 1924, ausg. 12/11. 1925.) KAUSCH.

Koppers Co., V. St. A., *Vergasung von Kohle mit Zuführung von Wasserdampf*, wobei die Vergasung der Kohlenmasse im unteren Teile des Generators, wo der Dampf eingeführt wird, vollendet wird. (F. P. 597 415 vom 9/8. 1924, ausg. 20/1. 1925.) KAUSCH.

Société de Recherches et de Perfectionnements Industriels (Erfinder: **Georges Baume** und **Arnold Justin Rothen**), Frankreich, *Wässrige Emulsionen von Teer*.

Bitumen oder Ölen. Man setzt zu dem Emulsionswasser Saponit, Kali-, Natron- oder Ammoniakseifen. (F. P. 597 925 vom 14/8. 1924, ausg. 2/12. 1925.) KAUSCH.

Charles Ab-der-Halden, Frankreich, *Kontinuierliche Destillation von Teeren u. dgl.* Man führt zweckmäßig erhitzten Roh-Teer in den Rückstand von der Dest. ein, den man auf geeignete Temp. erhitzt u. lebhaft durch Wasserdampf oder Gas umrührt, worauf das Prod. unten in eine Rektifikationskolonne eingebracht wird, in der die Verdichtung der Dämpfe u. die Zurückführung des Kondensats durch Einführung von altem W. an einer oder verschiedenen Stellen der Kolonne bewirkt wird. Ferner wird eine chem. Umsetzung des Kondensats durch direkte Einführung des Reagens in die Kolonne herbeigeführt. (F. P. 598 531 vom 13/9. 1924, ausg. 18/12. 1925.) KA.

Alphonse Mailhe, Frankreich, *Entparaffinierung von primärem Teer.* Man behandelt den Teer mit CH₃OH in der Kälte oder bei 40–60°, um im ersten Fall die nicht gelösten Paraffine durch Filtration usw. abzuscheiden, im zweiten Fall läßt man die gesamte Lsg. des Teers abkühlen, bis sich die Paraffine vollständig abgeschieden haben. Der CH₃OH wird durch Dest. der von den Paraffinen abgetrennten alkohol. Lsg. zurückgewonnen. (F. P. 597 919 vom 13/8. 1924, ausg. 2/12. 1925.) KAUSCH.

Koppers Co., V. St. A., *Entfernung von Naphthalin u. dgl. aus Verbrennungsgasen.* Man benutzt ein Lösungsm. für das Naphthalin u. dgl., indem man es dem Gase in einem Turm entgegenrieseln läßt u. läßt es zirkulieren. Gleichzeitig führt man dem Turm frisches Lösungsm. zu. (F. P. 597 430 vom 6/4. 1925, ausg. 20/11. 1925.) KA.

Augustin Amédée Louis Joseph Damiens, Sèvres, Frankreich, *Abscheiden von Kohlenoxyd aus Industrie gasen* mittels einer Cu₂O-Verb. nach D. R. P. 422 621, dad. gek., daß man mit einer H₂SO₄ von unter 66° Bé bei einer Temp., die je nach dem Verdünnungsgrade bis 100° u. noch höher gehen kann, arbeitet, gegebenenfalls unter Anwendung eines erhöhten Druckes, worauf man gegebenenfalls die Cu₂O-Verb. sowie das CO aus den erhaltenen komplexen Verbb. durch Erhitzen in Ggw. von H₂SO₄ von unter 66° wiedergewinnt. (D. R. P. 425 418 Kl. 12i vom 26/11. 1924, ausg. 18/2. 1926. Prior. 12/4. 1924. Zus. zu D. R. P. 422 621; C. 1926. I. 1248.) KAUSCH.

Thermal Industrial & Chemical (T. I. C.) Research Company Ltd. und **Douglas Rider**, London, *Entwässerung und Destillation von Teeren oder Ölen.* Man leitet die Ausgangsstoffe durch ein Rohr, welches in einem Metallbade liegt und hält dabei die Temp. des Bades auf einem Grad, welcher den Kp. des am höchsten sd. Destillates, das gewonnen werden soll, nur um wenige Grade übersteigt, wodurch ein Cracken der Fl. vermieden wird. (E. P. 221 528 vom 10/4. 1923, ausg. 9/10. 1924.) OELKER.

Wilhelm Hartmann, Offenbach a. M., und **Adolf Dasbach**, Hermühlheim b. Möln a. Rh., *Verringerung des Feuchtigkeitsgehaltes der rohen (sogen. grünen) Braunkohle*, auf ihrem Wege zu den Trockenapp. durch Zusatz von bereits getrockneter Kohle, dad., gek., daß die von den Trockenapp. kommende getrocknete Kohle gegebenenfalls unter Absaugung des sich bildenden feinen Staubes derart gesiebt wird, daß die kleineren, im Ganzen auf den richtigen Feuchtigkeitsgehalt getrockneten Stückgrößen abgeschieden und unmittelbar zu den Briкетtpressen abgeleitet werden und nur die größeren, mit einer stark übertrockneten Kruste versehenen Stücke nach Bedarf der grünen Kohle wieder zugesetzt und auf ihrem Wege zu den Trockenapp. mit derselben innig gemischt werden. (D. R. P. 424 791 Kl. 10b vom 26/4. 1924, ausg. 28/1. 1926.) OELKER.

Georges Meunier und **Charles de Brisson de Laroche**, Frankreich, *Zerlegung von Torf.* Man behandelt kolloidalen Torf mit einer Fl. (Alkalilauge), um die Fasern die anderen feinen Bestandteile zu trennen. Letztere werden hydrolysiert, um die Umstusstoffe zu isolieren. (F. P. 597 387 vom 24/4. 1925, ausg. 19/11. 1925.) KA.

Herman de Meyer, Brüssel, *Verarbeitung von Torf, Braunkohlen und ähnlichen Stoffen.* Die Rohmasse wird, ohne einem wesentlichen Druck ausgesetzt zu werden,

allmählich so fein zerschnitten, daß prakt. alle Fasern offengelegt werden u. die M. die Zus. eines dünnen Breies erhält, welcher durch eine Strangpresse geführt u. in Stücke zerteilt wird, die an der Luft getrocknet werden. (Schw. P. 113 122 vom 13/3. 1925, ausg. 2/1. 1926.)

OELKER.

Cosden & Co., Tulsa, Oklahoma, übert. von: **Frederick B. Koontz**, Tulsa, *Cracken von Kohlenwasserstoffen*. Man führt einen Strom der KW-stoffe durch ein auf der Cracktemp. erhaltene Zone, dann in eine Trennkammer, wo sich die kohligen Rückstände absetzen. Diese letztere Kammer wird auf einer unter der Cracktemp. aber immerhin höheren Temp. gehalten. Die kohligen Rückstände werden beständig abgeführt. Die Gase werden mit solcher Geschwindigkeit, daß sie noch in ihnen enthaltenen Kohlenstoff absetzen können, gekühlt u. die hochsd. Fraktionen daraus verdichtet. (A. P. 1 567 062 vom 8/5. 1924, ausg. 29/12. 1925.)

KAUSCH.

David C. Collier, Santa Fe, Neu-Mexico, *Gewinnung von Öl aus ölhaltigen Sanden u. dgl.* Man vermischt den Sand mit W. u. fein verteiltem kohlenstoffhaltigem Material u. rührt die M. gut durch. Hierbei bildet sich ein auf dem W. schwimmendes Agglomerat von Kohle u. Öl, während sich der Sand am Boden des Mischgefäßes absetzt. Das Öl kann von der Kohle durch Dest. getrennt, oder mit dieser zusammen als Brennstoff benutzt werden. (A. P. 1 570 205 vom 8/4. 1921, ausg. 19/1. 1926.)

OELKER.

William F. Downs †, Chatham, N. J. (**Mary Gardner Downs**), *Behandlung von niedrigsiedenden Kohlenwasserstoffen* zwecks Steigerung der Güte (des Gasolins), darin bestehend, daß die Kondensation der Dämpfe der KW-stoffe in Ggw. poröser wasserfreier Metallchloride (AlCl_3) erfolgt, von denen die kondensierten Verbb. beständig abgezogen werden. (A. P. 1 568 812 vom 6/5. 1922, ausg. 5/1. 1926.)

KAUSCH.

William F. Downs †, Chatham, N. J. (**Mary Gardner Downs**), *Reinigen flüssiger Kohlenwasserstoffe* mittels eines ein unter dem Kp. des KW-stoffs erhitztes Metallchlorid (AlCl_3) enthaltenden Filters. (A. P. 1 568 813 vom 6/5. 1922, ausg. 5/1. 1926.)

KAUSCH.

Charles Russell Burke, Tusla, V. St. A., *Raffinieren und Spalten von schweren Kohlenwasserstoffölen*. (D. R. P. 424 250 Kl. 23b vom 27/8. 1921, ausg. 22/1. 1926. — C. 1923. II. 877.)

OELKER.

Standard Development Co., Delaware, übert. von: **Edgar M. Clark**, New York *Destillation von Petroleumölen*. Man verwendet die Hitze eines durch Feuer geheizter Kessels zur weiteren Dest. von Destillationsrückständen. (A. P. 1 566 828 vom 24/4. 1924, ausg. 22/12. 1925.)

KAUSCH.

Alfred R. Earl und **Thomas W. Reeves**, Toledo, Ohio, *Serientrennung von Roh petroleum*. Das Petroleum wird dabei mit gesättigtem u. überhitztem Dampf direkt oder indirekt erhitzt u. die Temp. nicht so hoch gewählt, sondern das Öl unter Minderdruck verdampft. (A. P. 1 567 429 vom 25/8. 1923, ausg. 29/12. 1925.)

KAUSCH.

Daniel L. Newton, Fullerton, Californ., *Destillieren von Kohlenwasserstoffen*. Man erhitzt das die KW-stoffe enthaltende Absorptionsmittel, indem man es vorerwärmt unter Druck in eine h. Destillationszone einstäubt, führt es alsdann durch eine Reihe erhitzter Kammern in einer Richtung, mischt mit den Destillationsgasen Dampf u. führt das Gemisch unter Druck in entgegengesetzter Richtung durch die erhitzten Kammern. (A. P. 1 567 457 vom 19/7. 1924, ausg. 29/12. 1925.)

KAUSCH.

Daniel L. Newton, Fullerton, Californien, *Destillation von Kohlenwasserstoffen*. Der hierbei verwendete App. besteht aus einem zylindr. Behälter mit einer oberen Destillationskammer u. einer unteren Dampfzuführungskammer, sowie mehreren zwischen beiden genannten Kammern angeordneten Destillationsräumen, deren jede einen Boden mit Öffnungen und Rohren mit seitlichen Öffnungen darüber besitzt. (A. P. 1 567 458 vom 19/7. 1924, ausg. 29/12. 1925.)

KAUSCH.

Barber Asphalt Co., Philadelphia, übert. von: **Charles N. Forrest**, Rahway und **Harold P. Hayden**, Perth Amboy, N. J., *Behandlung von Kohlenwasserstoffen*. Ma

läßt durch die Reaktionszone des Crackapp. Stücke von inertem widerstandsfähigem Material hindurchgehen u. unterwirft dieses nahe seinem Austritt einem begrenzten Gegenstrom des Verbrennungsmaterials. (A. P. 1 568 018 vom 15/6. 1920, ausg. 29/12. 1925.) KAUSCH.

Universal Oil Products Company, Chicago, übert. von: **Jacque C. Morrell**, Chicago, Ill., V. St. A., *Raffinieren von Kohlenwasserstoffölen*. Man unterwirft die Öle nacheinander der Einw. von H₂SO₄ u. Bleiglätte enthaltender NaOH u. behandelt sie hierauf mit SO₂. (A. P. 1 568 904 vom 27/4. 1923, ausg. 5/1. 1926.) OELKER.

Universal Oil Products Company, übert. von: **Jacque C. Morrell**, Chicago, Ill., V. St. A., *Raffinieren von Ölen, insbesondere gecrackten Kohlenwasserstoffölen*. Man unterwirft die Öle der Einw. eines in W. gel. Alkalimetallplumbits, trennt dann die Lsg. von dem Öl, behandelt letzteres mit einem Metallsulfid u. scheidet den entstandenen Nd. ab. (A. PP. 1 569 870 vom 28/8. 1922 und 1 569 872 vom 31/8. 1922, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

Universal Oil Products Company, übert. von: **Jacque C. Morrell**, Chicago, Ill., V. St. A., *Raffinieren von Kohlenwasserstoffölen*. Man behandelt die Öle mit einer wss. Lsg. von Natriumplumbit, trennt diese dann von dem Öl, unterwirft letzteres der Einw. von einer Metallsulfidlsg., trennt die dadurch ausgeschiedenen Prodd. von dem Öl und führt darauf in dieses ein Ausflockungsmittel ein, um die übrigen Verunreinigungen abzuschcheiden. (A. P. 1 569 871 vom 31/8. 1922, ausg. 19/1. 1926.) OE.

George W. Acheson, Caldwell, *Raffinieren von Kohlenwasserstoffölen*. Man vermischt die Öle mit aus einer kolloidalen Suspension ausgeflocktem, getrocknetem u. calciniertem Ton, säuert die Mischung mit H₂SO₄ an, gibt nochmals eine kleine Menge jenes Tones hinzu u. läßt nach gutem Durchrühren der M. absitzen. Es werden fast neutrale Öle erhalten, deren S-Gehalt wesentlich verringert ist. (A. P. 1 570 193 vom 14/8. 1924, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

Henri Léon Carroll, Frankreich, *Kontinuierliche Raffination von Petroleum o. dgl.* Rohes oder eines Teiles seiner leichten Bestandteile beraubtes Naphtha wird in ein Gefäß gebracht, in dem es schnell umläuft u. auf eine dem Kp. benachbarte Temp. der schwersten Fraktion, die man gewinnen will, erhitzt wird. Das h. Öl wird unten in eine Reaktionskolonne eingeführt, in der die Dämpfe der zu gewinnenden Fraktionen sich trennen von der schwereren Fl., um fraktioniert verdichtet zu werden. (F. P. 598 295 vom 2/9. 1924, ausg. 12/12. 1925.) KAUSCH.

Morduch Berko Trepel, Frankreich, *Aufarbeitung von Schwefelsäureschlammern der Kohlenwasserstoffreinigung* durch Erhitzen unter Zufügung von Kohle, inerten Stoffen u. Neutralisationsmitteln wie Schwefelalkalien oder Schwefelerdalkalien. (F. P. 29 881 vom 27/5. 1924, ausg. 10/11. 1925. Zus. zu F. P. 591 334; C. 1925. II. 1912.) KAUSCH.

Herman Reinbold und **Hugo Reinbold**, Omaha, Nebraska, V. St. A., *Mittel zum Bleichen, Spalten und Entschwefeln von Petroleum und anderen Kohlenwasserstoffölen*, welches aus einer kolloidalen Tonerde vom Bentonittyp besteht u. dadurch erhalten wird, daß man ein natürliches uncalciniertes Aluminiumsilicat mit HCl-Gas behandelt. (A. P. 1 570 005 vom 21/1. 1924, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, übert. von: **H. Jan Mackenzie** und **Alexander Wilhelmus Steenbergh**, Tjepoe, Java, *Gasolin aus Gasolin enthaltenden, natürlichen Gasen*. Man komprimiert die Gase, kühlt sie unter dem Kompressionsdruck auf gewöhnliche Temp., scheidet das Gasolin-Gas ab, mischt es mit Mischgasolin, kühlt das Gemisch in komprimiertem Zustande ab, hebt den Druck auf, trennt das Gas von der erhaltenen Fl., bringt dieses Gemisch auf gewöhnliche Temp. u. scheidet, sobald der Druck den atmosphärischen erreicht hat, das Gas von der Fl. (A. P. 1 569 433 vom 26/9. 1923, ausg. 12/1. 1926.) KAUSCH.

Frank Tinker, Sutton Coldfield, Engl., *Vorrichtung zur Herstellung von Gasolin*. Sie setzt sich zusammen aus einer Fraktionskolonne, einem Kondensator, einer Einrichtung zur Überführung der Dämpfe aus der Kolonne zum Kondensator, einem Sammelbehälter für das aus dem Kondensator kommende Fl.-Gasgemisch, einem Wäscher, dem das Gasgemisch aus dem Sammelbehälter zugeführt wird, einem Kühler für das in der Kolonne gewonnene Kondensat, einer Pumpe zur Überführung dieses Kondensats zum Wäscher u. einer zweiten Pumpe zur Rückführung der Fl. zur Kolonne. (A. P. 1 572 626 vom 7/6. 1923, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Joseph H. Adams, Brooklyn, N. J., *Überführung mehr oder weniger raffinierter Mineralöle in flüchtigere Produkte wie Gasolin* durch Erhitzen mittels eines eingebrachten elektr. Widerstandes unter Überdruck. (A. P. 1 568 016 vom 5/12. 1917, ausg. 29/12. 1925.) KAUSCH.

Asbury B. Hutton, Indian Head, Pa., *Schmiermittel*, welches aus Vaseline, Bleiweiß, Graphit, S, Leinöl u. Talg zusammengesetzt ist. (A. P. 1 568 606 vom 18/4. 1922, ausg. 5/1. 1926.) OELKER.

John C. Black, Destrehan, Louisiana, und **James W. Weir**, Fillmore, Calif., *Herstellung von Schmierölen*. Man behandelt KW-stofföle mit H₂SO₄, entfernt den hierbei entstehenden Schlamm, vermischt das Öl mit Neutralisations- u. Bleichmitteln, erhitzt die Mischung auf 180° F., filtriert u. kühlt das Filtrat ab. (A. P. 1 572 465 vom 19/10. 1922, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Robert Frederick Brown, Great Clacton, England, *Bekämpfung von Schwamm-schäden*. Das zu schützende Holz wird mittels einer Bürste mit einer Mischung von frisch gebrannter, fein gemahlener Holzkohle u. W. behandelt. (E. P. 224 043 vom 15/9. 1923, ausg. 27/11. 1924.) KÜHLING.

Albert Charles Holzapfel, New York, *Holzerhaltungsmittel*. Salze der hochmolekularen organ. Säuren, besonders der Ölsäure mit Hg, Cu oder Zn werden in KW-stoffen oder in Leinöl gel. u. eine Lsg. von Kautschuk in Cumaronharz o. dgl. zugefügt. (E. P. 231 029 vom 6/5. 1924, ausg. 16/4. 1925.) KÜHLING.

Hendrik Douwe Pieter Huizer, Amsterdam, *Holzerhaltung*. Das Holz wird gleichzeitig der Einw. von 200—300° u. einem Druck von 10—100 at. oder mehr ausgesetzt. (E. P. 233 778 vom 14/2. 1924, ausg. 11/6. 1925.) KÜHLING.

William André Audibert, Frankreich, *Behandlung von Holz*. Das Holz wird im geschlossenen Gefäß entlüftet, dann wird es der Einw. von Säuren oder sauren Salzen unter Druck ausgesetzt u. schließlich mit reinem W. ausgewaschen. Die Behandlung bezweckt die Zerstörung der lignosen Bestandteile u. der Fäulnisreger u. die Gewinnung von Harzen, Aceton, Essigsäure, A. usw. (F. P. 586 856 vom 4/10. 1924, ausg. 4/4. 1925.) KÜHLING.

Soc. Française des Glycérines, Frankreich, *Füllen der Poren von Hölzern*. Die Poren werden nach Entlüften, durch Druck oder in sonstiger, an sich bekannter Weise mit Formaldehyd- oder Dichromatgelatine oder (nacheinander) mit Lsgg. gefüllt, welche, wie die von BaS u. ZnSO₄, unter B. eines Nd. reagieren. (F. P. 589 829 vom 28/11. 1924, ausg. 5/6. 1925.) KÜHLING.

Léon Praillet und **Suzanne Praillet**, Belgien, *Mittel zum Imprägnieren von Holz*, bestehend aus einer Mischung von Kreosot, Bitumen u. Mineralöl. (F. P. 597 330 vom 26/3. 1925, ausg. 18/11. 1925.) KÜHLING.

Rudolf Ditmar, Graz, *Imprägnieren von Holz*. Kautschukmilch (Latex) wird mit 0,1—10% Glycerin innig gemischt u. das ausgetrocknete Holz in diese Mischung eingelegt. Das so behandelte Holz bildet eine schwingende elast., wasserfeste M. Das Verf. ist besonders für das Imprägnieren von Geigen-, Orgel-, Klavier- u. dgl. -holz geeignet. (Oe. P. 100 729 vom 27/11. 1923, ausg. 10/8. 1925.) KÜHLING.

Ralph H. Mc Kee, New York, *Motortreibmittel*, welches aus einer homogenen

Mischung von einer gasolinähnlichen Fraktion aus Schieferöl, A. u. Äthylen u. Bzl. besteht. (A. P. 1 570 161 vom 19/11. 1923, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

XX. Schieß- und Sprengstoffe; Zündwaren.

—, *Giftige Sprengstoffgase bei den Sprengmitteln der österreichischen Monopolverwaltung.* Abdruck von 2 Gutachten in einer Straf- u. Zivilprozesse Sache gegen die österreich. Monopolverwaltung für Pulver u. Sprengstoffe über ein von dieser geliefertes *Gelatinedynamit*, mit dem beim Sprengen Vergiftungen, zum Teil mit tödlichem Ausgang, vorgekommen waren. Das Hauptgutachten von BAMBERGER u. Böck (Techn. Hochsch. Wien) führt die Vergiftungen auf unvollständige Detonation infolge Wasseraufnahme des hygroskop. Sprengstoffs zurück. (Montan. Rundsch. 17. 737—44. 1925.) KAST.

B. Neuhoﬀ, *Verändert der Einschluss die Wirkung des Knallquecksilbers?* Verss. im kleinen Trauzschen Bleizylinder mit Sprengkapseln aus verschiedenem Werkstoff, Eisen, Messing, Cu, Zn, Al u. ohne Hülle, wobei die Aufbauchung in der angegebenen Reihenfolge steigt. Der Unterschied in der Wrkg. beruht darauf, daß zur Zerstörung der Hülle eine verschieden große Kraft nötig ist. Bestätigt wird dies durch die in derselben Reihenfolge steigenden, für die Detonation von 0,5 g Tetryl nötigen „Grenzladungen“. Diese wechseln auch, wie weitere Verss. zeigen, mit dem Widerstand, den die Schutzhülle je nach ihrer Größe u. Lochöffnung bildet. (Ztschr. f. d. ges. Schieß- u. Sprengstoffwesen 20. 186—87. 1925.) KAST.

Ernst Pungs, Troisdorf b. Köln, *Entfernung der Nitriersäuren aus Nitrocellulose.* Zwecks Entfernung der bei der Herst. von Nitrocellulose dem Nitriergut nach dem Abschleudern noch anhaftenden Nitriersäuren füllt man das Nitriergut in einen Zylinder, überschichtet es mit W. u. saugt dieses mit Hilfe eines Vakuums durch das Nitriergut in ein Sammelgefäß ab. — Es wird eine schnelle u. vollständige Entsäuerung der Nitrocellulose erzielt. (D. R. P. 424 941 Kl. 78c vom 19/4. 1923, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Norddeutsche Torf-Kokerei A.-G., Stade, *Herstellung von Sprengstoffen.* Zur Herst. von Schwarzpulver u. anderen Sprengstoffen wird Torfmehl benutzt, das gewonnen wird, indem der nach dem üblichen Verf. gewonnene Torfmüll plötzlich Temp. über 100° ausgesetzt, scharf getrocknet u. dann durch Raspeln auf Mehlfineinheit verkleinert wird. — Die Wrkg. der Sprengstoffe wird verbessert. (D. R. P. 424 379 Kl. 78c vom 16/10. 1924, ausg. 20/1. 1926.) OELKER.

Les Petits Fils de François de Wendel & Cie., Hayange, Moselle, Frankreich, *ibert.* von: Guillaume Weber, Hayange, *Sprengladungen mittels flüssiger Luft.* Man führt in die Bohrlöcher zuerst dichte Behälter ein u. beläd diese dann mit den mit fl. O₂ oder fl. Luft getränkten Stoffen. (A. P. 1 565 766 vom 11/10. 1923, ausg. 15/12. 1925.) KAUSCH.

William M. Dehn, Seattle, Washington, *Herstellung von Mischungen von Natrium- und Ammoniumnitrat für Sprengstoffzwecke.* Mischungen der beiden Salze werden erhitzt, bis sie teilweise geschmolzen sind, dann schnell abgekühlt u. pulverisiert. (A. P. 1 568 324 vom 13/10. 1924, ausg. 5/1. 1926.) OELKER.

Tenney L. Davis, Somerville, Mass., V. St. A., *Sprengstoff*, welcher als wesentlichen Bestandteil *Hexanitrodiphenylharnstoff* enthält. Der Sprengstoff soll zur Herst. von Zündsätzen für Sprengkapseln, Zündhütchen usw. dienen. (A. P. 1 568 502 vom 3/3. 1924, ausg. 5/1. 1926.) OELKER.

E. von Herz, Charlottenburg, *Sprengstoffe.* Die Salze der Isonitramine oder Nitrosohydroxylamine werden als Initialzündsätze verwendet. Die Salze werden erhalten durch Behandlung geeigneter Ketone oder Nitroparaffine in alkoh. Lsg.

mit N₂O in Ggw. von Natriumäthylat. (E. P. 241892 vom 15/10. 1925, Auszug veröff. 16/12. 1925. Prior. 23/10. 1924.) OELKER.

George Woywode, Deutschland, *Sprengpatrone*. In der Hülse ist ein weicher Metalldraht befestigt, dessen Länge so gewählt werden kann, daß er um die Zündschnur gewickelt werden kann. (F. P. 597 519 vom 1/5. 1925, ausg. 23/11. 1925.) KAUSCH.

Sprengstoffwerke Dr. R. Nahnsen & Co. A.-G., Hamburg, und **Gottfried Pyl**, Greifswald, *Herstellung von Initialzündmitteln*, insbesondere Zündsätzen, Sprengkapseln u. Detonatoren, gek. durch die Verwendung von *Acetonsuperoxyd* als Hauptladung, Aufsatzladung oder Beimengung. — Die neuen Zündmittel sind geeignet, Knallquecksilber zu ersetzen. (D. R. P. 423176 Kl. 78e vom 8/3. 1925, ausg. 21/12. 1925.) OELKER.

XXIV. Photographie.

A. Seyewetz, *Die Bedeutung der Farbstoffe bei der Entwicklung der Photographie*. (Vgl. S. 1352.) Zusammenfassender Bericht über die Anwendung von Farbstoffen zur Sensibilisation, Desensibilisation, Herstellung von orthochromat. u. lighthofreien Platten, Färbung von Diapositiven u. Filmen. Für verschiedene Bäder werden Rezepte gegeben. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 1197—1223. 1925.) KELL.

Walter Clark, *Die verschleiende Wirkung von Wasserstoffperoxyd*. Eine zusammenfassende Literaturübersicht über diesen Gegenstand haben SHEPPARD u. WIGHTMAN (Journ. Franklin Inst. 195. 337; C. 1923. IV. 555) u. Vf. (Brit. Journ. Phot. 70. 763 [1923]) gegeben. Vf. studiert die Verhältnisse an Einschießplatten; diese werden aus AgBr-Gelatineemulsion ohne Zusatz von AgJ gegossen. Die Operationen werden bei vollständiger Dunkelheit ausgeführt. Während des Ganges der Verss. wird auf genau gleiche Nachbehandlung geachtet. Von den mit H₂O₂ behandelten Platten werden Mikrophotogramme von 2500-facher Vergrößerung gemacht, die Körner ausgezählt u. in 10 Größenklassen eingeteilt. Der Prozentsatz der durch H₂O₂ beeinflussten Körner steigt mit der Einwirkungsdauer bis zu einem Maximum von ca. 60%, danach sinkt er wieder. Der Vergleich der einzelnen Größenklassen ergibt, daß die größeren Körner im allgemeinen stärker beeinflusst werden. Vf. bestreitet die von SHEPPARD für die Wrkg. des H₂O₂ aufgestellte Theorie, daß die bei der Zers. von H₂O₂ auftretende Chemilumineszenz die Ursache sei. Er weist darauf hin, daß die schleiernde Wrkg. in saurer Lsg. stärker sei als in alkal., während eine Zers. von H₂O₂ in alkal. Lsg. leichter vonstatten geht. Durch Zusatz von Kartoffel-extrakt steigert Vf. die Zers. von H₂O₂; wäre Chemilumineszenz die Ursache der Verschleierung, so müßte dadurch eine Verstärkung des Effektes eintreten, das Gegenteil wird aber beobachtet. Es scheint also eine rein chem. Wrkg. des H₂O₂ vorzuliegen. (Photogr. Journ. 66. 78—84.) KELLERMANN.

A. P. H. Trivelli und **S. E. Sheppard**, *Über die sichtbare Zersetzung von Halogen-silberkörnern durch Licht*. (Vgl. Journ. Franklin Inst. 200. 51; C. 1925. II. 1919.) Nach den Unterss. verschiedener Autoren kann als feststehend angesehen werden, daß die Prodd. der Ag-Halogenidphotolyse Ag u. freies Halogen sind. Eine einwandfreie Bestätigung des Einsteinschen Äquivalentgesetzes für diesen Vorgang liegt noch nicht vor. Vff. beobachten u. Mk. den Zerfall einzelner Körner; die Krystalle werden aus NH₃-Lsg. gezüchtet. Die auf dem Krystall anfänglich vorhandenen Flecken vergrößern sich bei Belichtung, außerdem entstehen neue. Die Zers. schreitet in bestimmten Richtungen fort, das entstehende Ag setzt sich längs der Linien des größten Wachstums ab, die Ecken bleiben auffälligerweise frei. — Statist. Messungen werden unternommen zur Feststellung der Beziehung zwischen sichtbarer Schwärzung u. Korngröße. Mikrophotogramme von 2500-facher Vergrößerung lassen erkennen, daß die Empfindlichkeit eines einzelnen Kornes um so größer ist, je größer sein Durchmesser ist. Durch Auszählen werden die Körner einer Emulsion in verschiedene

Größenklassen eingeteilt, von jeder Größenklasse wird der Prozentsatz der bei bestimmter Belichtungszeit geschwärzten Körner ermittelt. Die Prozentzahlen in Abhängigkeit von der Größe werden in Tabellen u. Kurven wiedergegeben. Oxydationsmittel setzen den Prozentsatz herunter, der Einfluß ist aber kleiner als beim entwickelbaren latenten Bild.

Vff. unternehmen den Vers. einer theoret. Erklärung des Vorgangs. Die Photo-lyse des Krystalls ist autokatalyt. orientiert, die wirksame Energie wird vom Ag-Halogenid absorbiert. Ausgangspunkte sind die Kerne, die durch Oxydationsmittel zerstört werden können. Bei weiter fortgeschrittener Belichtung u. Zers. haben diese Kerne nur noch geringe Bedeutung, die primär ausgeschiedenen Prodd. wirken als opt. Sensibilisatoren. Die Vorstellung von WEIGERT (Ztschr. f. Elektrochem. **23**. 367; C. **1918**. I. 259), wonach nur dann eine Umwandlung von Strahlungsenergie in andere Energieformen stattfinden kann, wenn die Elektronenhüllen durch Nachbar-eilchen deformiert sind, findet hier Anwendung. Im Krystall liegen deformierte Elektronenbahnen vor, das primär ausgeschiedene Ag wirkt als deformierendes Nachbar-eilchen. (Journ. Physical Chem. **29**. 1568—82. 1925.) KELLERMANN.

F. Weigert, *Zur Photochemie photographischer Schichten*. EGGERT u. NODDACK Ztschr. f. Physik **31**. 922; C. **1925**. II. 704) haben festgestellt, daß die Absorption der Gelatine in Halogen-Silber-Emulsionen stärker ist als in reiner Gelatine derselben Schichtdicke. Im Gegensatz hierzu findet Vf. bei Anfärbung mit Filtergelb (Höchst) in Halogen-Silber-Emulsionen eine geringere Verstärkung der Lichtabsorption als in reiner Gelatine. Vf. glaubt daher, den Verss. von EGGERT u. NODDACK den Boden entzogen zu haben. (Ztschr. f. Physik **34**. 907—17. 1925.) LESZYNSKI.

J. Eggert und **W. Noddack**, *Zur Photochemie photographischer Schichten*. *Be-merkungen zu der vorangehenden Arbeit von F. Weigert*. Die Verss. WEIGERTS (vorst. Ref.) bestätigen, daß für diffuse Medien durch besondere Rechnungsweise die Licht-absorption ermittelt werden muß. Da Gelatine eine 50mal schwächere Absorption zeigt als der von WEIGERT benutzte Farbstoff, ist die Rechnungsweise in den beiden Fällen eine andere. Die Berechtigung der von den Vff. benutzten Rechnungsweise ist experimentell erwiesen durch den Befund an Platten, die dasselbe Dispersions-mittel, aber statt des gefärbten AgBr das ungefärbte AgCl enthielten. (Ztschr. f. Physik **34**. 918—20. 1925.) LESZYNSKI.

E. L. Turner und **C. D. Hallam**, *Der Träger des Bildes beim Licht-Steindruck*. Vff. zeigen, daß das Eiweiß der wesentliche Bestandteil ist. Um vorzeitiger Abnutzung vorzubeugen, muß darauf geachtet werden, daß es vollständig koaguliert ist. Das läßt sich erreichen, wenn man die Platte nach dem Entwickeln etwas erwärmt. (Photogr. Journ. **64**. 85—86.) KELLERMANN.

René Rossignon, „Noxa“-Apparat zur Photographie von Gegenständen und zur Reproduktion, zur Vergrößerung und Verkleinerung ganzer Urkunden. Beschreibung u. Gebrauchsanweisung. (Bull. soc. encour. industrie nationale **1925**. 790—94.) KELL.

F. J. Tritton, *Über die Theorie des Carbroverfahrens*. Vf. studiert eingehend den Einfluß der Zus., der Temp. u. der Einwirkungs-dauer des Bades, dessen wirksame Bestandteile KBr, $K_3[Fe(CN)_6]$, $K_2Cr_2O_7$ u. HCl sind. Das Verh. der Gelatine wird ausführlich erörtert. (Photogr. Journ. **66**. 126—33.) KELLERMANN.

A. Ninck, *Übersensibilisation von Autochrom- und gewöhnlichen Platten*. Nach-teile sind die geringe Haltbarkeit, die erschwerte Behandlung beim Entwickeln u. der hohe Preis. Vorteile sind die erhöhte Empfindlichkeit u. damit die Möglichkeit, Moment-ufnahmen zu machen, u. die erzielte Verbesserung der Gradation. Für die Behandlung werden eingehende Vorschriften gegeben. (Rev. Française Photographie **7**. 49—51.) KEL.

R. Mauge, *Die Empfindlichkeit der photographischen Papiere und der Kontrast*. Vf. untersucht an verschiedenen photograph. Papieren die Abhängigkeit der Gradation vom Entwickler. Er findet, daß für manche die Art des Entwicklers gleichgültig ist,

für andere ergibt sich starke Abhängigkeit. Es wird festgestellt, daß die Empfindlichkeit ein u. derselben Papiermarke bis zu 15% schwankt. (Rev. Française Photographie 7. 17—19. 32—33.)

KELLERMANN.

George R. Harrison, *Eigenschaften des photographischen Materials im ultra violetten Licht*. Für genaue Intensitätsmessungen in der Spektroskopie erscheint es wünschenswert, eine Methode zu finden, um die Intensitäten der Linien verschiedener Wellenlänge miteinander zu vergleichen. Vf. untersucht die Empfindlichkeit der photograph. Platte für Wellenlängen $\lambda < 4000 \text{ \AA}$. Als Lichtquelle dient eine Quarzquecksilberlampe oder ein Cd-Funken zwischen rotierenden Scheiben, einfarbiges Licht wird durch einen Monochromator erzeugt. Alle Platten ergeben eine Abnahme des Kontrastes mit abnehmender Wellenlänge, ein Minimum liegt bei $2800 \text{ \AA}$, bei $2100 \text{ \AA}$ werden ganz geringe Werte erreicht. Mit abnehmender Wellenlänge ergibt sich ein auffallende Abnahme des Schwellenwertes. Für die kurzen Wellenlängen wird die Gültigkeit des Reziprozitätsgesetzes festgestellt. (Journ. Opt. Soc. America 11. 341—56. 1925.)

KELLERMANN.

A. Lumière, **L. Lumière** und **A. Seyewetz**, *Photographisches Verstärkungsverfahren durch Färben des Silbers*. Die Verstärkung mit Hilfe von Farbstoffen wurde von IVES entdeckt, der das Ag der Platte mit $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. CH_3COOH beizte u. dann mit einem Gemisch von Viktoriagrün u. Safranin, das eine neutrale Färbung gab, behandelte. Vff. schlagen eine Beize mit $\text{Cu}(\text{SCN})_2$ u. Färbung mit einem Gemisch von Methylblau, Rhodamin D u. Phosphin M vor. Die Verstärkung ist sehr regelmäßig u. ist in 15 Min. beendet. Ferner wird der Einfluß dieser Verstärkung auf den Gradationswinkel untersucht. Ein schwach entwickeltes u. verstärktes Negativ ergibt ein γ , das dem bei n. Entw. erhaltenen ähnlich ist; bei anfänglich längerer Entw. wird γ nach dem Verstärken kleiner. — Die verstärkten Platten können durch saure Lsg. von KMnO_4 abgeschwächt werden, durch Einw. von NH_3 erhält man ein blaues Bild, durch H_2SO_4 ein rotviolett. (Rev. Française Photographie 7. 1—2.)

KELL.

L. A. Jones und **E. Huse**, *Über die Beziehung zwischen Zeit und Intensität bei der photographischen Exposition*. (Vgl. Scient. Publicat. Res. Lab. EASTMAN Kodak Co. 1924. 22; C. 1925. II. 1004.) An verschiedenem Plattenmaterial wird festgestellt, daß der Gradationswinkel γ von der gewählten Lichtstärke unabhängig ist, selbst bei starken Unterschieden. Ordnet man die Werte von γ , die zu gleichen Prodd. an Lichtstärke u. Zeit gehören, als Funktionen der Intensität, so erhält man eine nahezu horizontale Linie. Die Entwicklungsdauer ist von Einfluß auf γ ; die geradlinigen Stücke der charakterist. Kurven bei verschiedener Entwicklungsdauer haben einen gemeinsamen Schnittpunkt unterhalb der Abscissenachse. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache werden die Werte für das Prod. aus Zeit u. Intensität korrigiert; die darauf erhaltenen Kurven zeigen eine leichte Krümmung, die auf eine Abweichung vom Reziprozitätsgesetz hindeutet. Die Schwarzschildsche Gleichung gilt nicht, es wird aber eine empir. Formel, ähnlich der von KRON (EDERS Jahrbuch 1914. S. 6) für die Kurven gleicher Schwärzung aufgestellten, gefunden, die sich den Beobachtungen sehr gut anschließt. Es existiert eine optimale Intensität, deren Größe jedoch noch unsicher zu bestimmen ist. (Journ. Opt. Soc. America 11. 319—40. 1925.)

KELL.

Raymond H. Lambert und **E. P. Wightman**, *Ein automatischer Registrierapparat für die Messung der Größe-Häufigkeitsverteilung von Silberkörnern*. Der Apparat beruht auf demselben Prinzip wie der von OSTWALD u. HAHN (Kolloid-Ztschr. 30. 62. 1922; C. 1922. IV. 345) angegebene. Die Verschiebung des Meniskus im Capillarrohr wird mit Hilfe von lichtempfindlichem Papier registriert; das Rohr wirkt dabei als Zylinderlinse. (Journ. Opt. Soc. America 11. 393—402. 1925.)

KELLERMANN.

Chemisches Zentralblatt.

1926 Band I.

Nr. 17.

28. April.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

I. Borcea, P. Poni. Überblick über den Lebenslauf u. die Publikationen des am 2. 4. 1925 verstorbenen Professors PONI, Begründers der Zeitschrift u. der chem. Fakultät in Jassy. (Ann. scient. Univ. Jassy **14**. 1—7.) FRANKENBURGER.

L. Barth, Eine vereinfachte Apparatur zur Veranschaulichung des Schwefelsäure-Kontaktverfahrens und anderer katalytischer Vorgänge. Durch den Pfropfen, der einen weithalsigen Kolben verschließt, reichen eine Zu- u. eine Ableitungsröhre für SO_2 zur Erzeugung des Gemisches von SO_2 u. Luft, ein Thermometer u. zwei Drähte, die mit den Enden einer Pt-Spirale verbunden sind, in deren Achse das Thermometer sich befindet. Wird das Pt durch den Strom erwärmt, so treten, noch ehe es glühend wird, an ihm weiße Nebel von SO_3 auf, die sich nicht mehr bilden, wenn es dunkelrot glühend wird. Die Oxydation der NH_3 , ebenso die des A. zu $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$, auch die herm. Dissoziation des W. läßt sich mittels derselben Vorr. dartun. (Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. **39**. 37. Gießen.) BÖTTGER.

R. Fischer, Die Umkehrung der Natriumlinie im Spektrum. Von einem elektr. Ofen, der aus einem vertikal verschiebbaren C-Stab u. einem auf einem Fußbrett stehenden Kohletiegel besteht, wird der letztere entfernt u. durch eine isoliert liegende Kohleplatte ersetzt, auf die man ein Häufchen NaCl schüttet. Wird dieses im Lichtbogen verdampft u. der Lichtbogen nunmehr durch ein geradsichtiges Spektroskop betrachtet, so bemerkt man im Gelb die starke schwarze Absorptionslinie. (Ztschr. physik.-chem. Unterr. **39**. 38. Oberhausen [Rhld.]). BÖTTGER.

J. Franck, Der Wirkungsquerschnitt bei atomaren Stoßprozessen. Zusammenfassende Darst. der Ergebnisse der Arbeiten, die Aussagen über den Wirkungsquerschnitt der Atome bei Stoßprozessen gestatten. Hierher gehören die Arbeiten über Übergangswahrscheinlichkeiten, Auslöschung der Fluoreszenz, Verbreiterung der Absorptions- u. Emissionslinien bei Steigerung des Druckes u. über Polarisation des Fluoreszenzlichtes. Es werden auch kurz die Ergebnisse einer demnächst erscheinenden Arbeit von DATTA über die Polarisation der Resonanzfluoreszenz des Na bei Anregung mit linear polarisiertem Licht der D_2 -Linie mitgeteilt. Alle Unters. haben bereinstimmend zu demselben Schluß geführt, daß der Wirkungsquerschnitt größer ist, als nach der kinet. Gastheorie zu erwarten ist. (Naturwissenschaften **14**. 211—14. Göttingen, Univ.) JOSEPHY.

Richard Anschütz, Über das Auftreten von Funken beim Krystallisieren von Schwefelkohlenstoff. Vf. hat mehrfach beobachtet, daß die Erstarrung von CS_2 , der in einem einwandigen Reagensglas mit fl. Luft abgekühlt wurde, unter Knistern u. B. kleiner Funken vor sich ging. Meist sprengte der erstarrende CS_2 das Reagensglas. Es konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob sich CS_2 beim Übergang vom fl. in den festen Aggregatzustand wie W. ausdehnt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 455. Darmstadt.) SCHUSTER.

G. Weissenberger, F. Schuster und O. Zack, Studien über binäre Flüssigkeitsmische. (Vgl. S. 2455.) Die Systeme Phenol-Trichloräthylen, Dichloräthylen, Äthylenchlorid u. Äthylidenchlorid zeigen positive Dampfdruckkurven, d. h. die liquidierten KW-Stoffe geben, wie auch ihre Muttersubstanzen, keine Molekülverb.

mit Phenol. Phenol-Essigsäuremethyl- u. -äthylester zeigen Molekülverb. von Typus 1:2, der Methylester spricht stärker an als der Äthylester. Das Restvalenzkraftfeld tritt einerseits am H der Hydroxylgruppe, andererseits am :O der Carboxylgruppe auf. Die Systeme *Tetrahydronaphthalin*-Trichloräthylen, Äthylidenchlorid, CCl_4 , Essigsäuremethyl- u. -äthylester geben durchweg positive Dampfdruckkurven. Dies ist insofern bemerkenswert, als *Tetrahydronaphthalin* mit der $-\text{CCl}_3$ -Gruppe Molekülverb. eingeht. Die Verss. mit Essigester bestätigen die Regel, daß zur B. von Molekülverb. mit ersterem nur arom. Stoffe befähigt sind, welche ein OH oder eine NH_2 -Gruppe tragen. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 270—71. Wien Univ.) TAUBE.

P. A. Bond und **Howard T. Beach**, *Die Systeme aus gewissen anorganischen Verbindungen und flüssigem Schwefeldioxyd*. Vff. untersuchen die Löslichkeit der Halogenide der vierwertigen Elemente in fl. Schwefeldioxyd. Dabei machte der Anschluß von Feuchtigkeit große Schwierigkeiten, die aber durch eine besondere Versuchsanordnung überwunden wurden. SnBr_4 , dargestellt aus Sn u. fl. Br_2 , durch fraktionierte Dest. gereinigt, F. $29,45^\circ$, Kp._{734} $205,05^\circ$, u. fl. SO_2 bilden bei $16,2^\circ$ beständige fl. Phasen. Die krit. Lösungstemp. liegt bei $48,6^\circ$. In der Umgebung dieser Temp. wurde Opaleszenz beobachtet. In Gemischen mit weniger als 20% SnF_4 konnten keine stabilen Systeme mit 2 fl. Phasen erhalten werden, bei sorgfältiger Kühlung waren nur metastabile zu erhalten. Mit CCl_4 wurde oberhalb dessen ($-24,8^\circ$) homogene Lsgg. gebildet. Die krit. Lösungstemp. beträgt $-29,3^\circ$, bis -45° bilden beide Fl. beständige Phasen. SnCl_4 , F. $-32,7^\circ$, Kp._{750} $112,1^\circ$ gab bei Mischen mit fl. SO_2 kein beständiges binäres Flüssigkeitssystem, sondern nur metastabiles. Die krit. Lösungstemp. von TiCl_4 in fl. SO_2 liegt bei $11,9^\circ$ mit $55,8^\circ$ TiCl_4 in der Lsg. — Von allen untersuchten Systemen sind Löslichkeitskurven gezeichnet. B. einer Verb. wurde bei Tempp. oberhalb des F. von SO_2 nicht beobachtet. Die relativen Lagen der Mischungstemp. entsprechen den aus der Polarität, d. inneren Drucken u. FF. der Verb. erwarteten Werten. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 348—56. Iowa City [Iowa], Univ.) JOSEPHY.

Armand R. Collett und **John Johnston**, *Löslichkeitsbeziehungen isomerer organischer Verbindungen*. VI. Löslichkeit der Nitroaniline in verschiedenen Flüssigkeiten (V. vgl. S. 298.) Die Löslichkeitsbest. wurden in einer von den in früheren Arbeiten beschriebenen Methoden abweichenden Art ausgeführt. In ein kleines Glaskölbchen wird eine bestimmte Menge des sehr gut gereinigten, trockenen Nitroanilins gegeben u. gewogen u. dazu eine ebenfalls abgewogene Menge des Lösungsm. hinzugefügt. Das Kölbchen wird nunmehr verschlossen u. in einem Thermostaten, dessen Heizung so eingerichtet ist, daß die Temp. desselben in jeder Min. um $0,1^\circ$ steigt, in schüttelnder Bewegung so lange gehalten, bis bei einer bestimmten Temp. der letzte Krystall verschwunden ist. Der Vers. wird dann noch einmal wiederholt, jedoch steigt nunmehr die Temp. in der Min. nur um $0,05^\circ$. Als Lösungsm. dienen in diesem Falle W., Bzl., Chlf., Ä., Tetrachlorkohlenstoff, Äthylacetat u. Aceton. Die Ergebnisse sind in Kurven u. zahlreichen Tafeln zusammengestellt, aus denen hervorgeht, daß die drei Nitroaniline in bezug auf ihre Löslichkeit ziemlich gleich verhalten, wenn man von der guten Löslichkeit des *o*-Nitroanilins in Bzl. u. CCl_4 mit zunehmender Temperatur absieht. Diese hohe Löslichkeit könnte man daher zur Abtrennung des *o*-Nitroanilins vom *p*- u. *m*-Nitroanilin benutzen. (Journ. Physical. Chem. **30**. 70—82. Yale Univ.)

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

J. A. Crowther, *Der Atomkern*. Vf. schildert die Grundzüge der modernen Anschauungen über die Atomstruktur, insoweit sie den Kern der Atome betrifft. Verss. über die Ablenkung von α -Teilchen beim Durchgang durch Materie werden nicht besprochen; sie führen zu dem Ergebnis, daß das Coulombsche Gesetz noch für Ladungen

abstände von etwa $5 \cdot 10^{-12}$ cm Gültigkeit besitzt. Ungültig wird dieses für den Bereich von etwa $1 \cdot 10^{-13}$ cm, was aus Verss. über das Bombardement von H_2 mit sehr rasch bewegten α -Teilchen hervorgeht. Letztere zeigen, daß das Kraftfeld der α -Teilchen sich wie ein Sphäroid mit den Achsen von $4 \cdot 10^{-13}$ u. $8 \cdot 10^{-13}$ cm verhält. In derselben Größenordnung liegt der Radius eines Elektrons, während der Durchmesser eines Protons (= Wasserstoffkerns) verschwindend klein ist. Der Radius eines U-Kerns ist sicher nicht größer als $6 \cdot 10^{-12}$ cm. Über die Kräfte, welche die zahlreichen H-Kerne, α -Teilchen u. Elektronen im Kern in stabiler Verkettung zusammenhalten, ist nichts bekannt; es scheint, daß rings um die Atomkerne eine Grenze (beim Al-Kern im Abstand $\approx 3,4 \cdot 10^{-13}$ cm von dessen Zentrum) liegt, außerhalb welcher das Coulombsche Gesetz gilt, innerhalb derer jedoch die elektrost. Grundgesetze nicht mehr gelten u. gleichnamige elektr. Ladungen sich vermutlich nicht mehr abstoßen. Dieser Grenzring entspricht etwa einem Maximalpotential von $3 \cdot 10^6$ Volt; nur α -Teilchen mit Geschwindigkeiten, die diesen Wert übersteigen, vermögen diesen Grenzbezirk zu überwinden u. in den Atomkern einzudringen; die bei der dann erfolgenden Zersplitterung des Kerns emittierten Protonen haben Geschwindigkeiten, die der Überwindung des Maximalpotentials entsprechen. (Scientia 39. 163—72. Reading Univ.) FRBU.

W. Herz, *Molekeln, Atome und Ionen und der Bau der Krystalle*. Zusammenfassender Bericht über den physikal.-chem. Sinn der verschiedenen Aggregatzustände u. Schilderung der Methodik u. Hauptergebnisse der röntgenograph. Best. der Krystallstruktur. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 263. 521—37. 1925.) FRBU.

Tom. Barth und Gulbrand Lunde, *Die Gitterkonstanten der Cupro- und Silberhalogenide*. DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen nach der Methode von WYCKOFF ergaben für Cuprochlorid $CuCl$, welches der Raumgruppe des ZnS angehört, den Abstand $a = 5,407$ Å, für Cuprobromid $CuBr$, $a = 5,681$ u. für Cuprojodid, CuJ , $a = 6,047$ Å. Die beiden letzteren gehören ihrer Atomanordnung nach ebenfalls zur ZnS -Gruppe. Im Silberchlorid, $AgCl$ haben die Atome gleiche Anordnung wie im $NaCl$, die Kantenlänge des Elementarwürfels beträgt $5,545$ Å. Zur gleichen Raumgruppe gehört das Silberbromid mit einer Kantenlänge $a = 5,755$ Å, während das Silberjodid zur Gruppe des Zinksulfids gehört mit $a = 6,493$ Å. (Norsk Geologisk Tidsskrift 8. 12 Seiten. 1925. Sep., Oslo, Univ.) ENSZLIN.

N. v. Raschevsky, *Prinzipielles zum Thermioneneffekt*. Die Arbeit behandelt die Unterschiede in der Behandlung des Thermioneneffektes durch Vf. (vgl. S. 13) u. durch SCHOTTKY (vgl. S. 1503). (Ztschr. f. Physik 35. 905—19. East Pittsburgh Pa.) HANTKE.

N. v. Raschevsky, *Über die kinetische Theorie des Thermioneneffektes*. (Physical Review [2] 26. 241—46. — C. 1926. I. 13.) FRANKENBURGER.

W. Orthmann und Peter Pringsheim, *Über die Auslöschung der Hg-Resonanzstrahlung in Quecksilberdampf von hohem Druck*. (Vgl. S. 1938.) Vff. weisen darauf hin, daß der wahre „Halbwertsdruck“, d. h. der Druck, bei welchem die Intensität der Resonanzstrahlung auf die Hälfte ihres Maximalwertes sinkt, für Hg-Dampf bedeutend niedriger als bei 3 mm Hg liegen muß. Bei Zumischung andrer Gase u. Dämpfe zum Hg-Dampf zeigt sich jedoch, daß die „sensibilisierte Fluoreszenz“ dieser Dämpfe bei bedeutend höheren Drucken des Hg-Dampfes noch zu beobachten ist. So erscheinen in einem Gemisch von Hg- u. Tl-Dampf bei Einstrahlung der Hg-Resonanzlinie 2536,7 Å auch dann noch Linien der sensibilisierten Tl-Fluoreszenz, wenn die Hg-Dampfdichte so weit erhöht wird, daß die Hg-Resonanz selbst nicht mehr zur Beobachtung gelangt. Daraus wird geschlossen, daß die Auslöschung der Hg-Resonanz infolge von Erhöhung der D.D. zum mindesten teilweise auf eine Überführung der erregten Atome in den metastabilen Zustand zurückzuführen ist. Da einige der Tl-Linien selbst bei Hg-D.D. von über 1 at noch merklich ihre volle Intensität besitzen, während der Tl-Druck nur etwa 0,01 mm beträgt, so müssen die metastabilen Hg-Atome mehr

als 10^4 Zusammenstöße mit andern Hg-Atomen überleben, ohne ihre Erregungsenergie abzugeben. Übergänge der zur Resonanzstrahlung angeregten Hg-Atome (4,9 V) in den metastabilen Zustand (4,7 V) scheinen durch Zumischung von Ar u. Ne begünstigt zu werden. (Ztschr. f. Physik **35**. 626—32. Berlin, Physik. Inst. d. Univ.) FRBU.

R. Whiddington, *Über die Zuckungen des positiven Leuchtens in Vakuum-Entladungsröhren*. Vf. bringt eine vorläufige Mitteilung über Untersrs., welche das regelmäßig sich wiederholende, period. Aufzucken der positiven Leuchterscheinung in mit konstanter Spannung betriebenen Entladungsröhren betreffen. Mittels rotierenden Spiegels wird diese Erscheinung für, mit Ar niedrigen Drucks, mit 300 V betriebene Entladungsröhren aufgenommen. Da kein Dopplereffekt auftritt, kann es sich nicht um rasch bewegte, die Strahlung emittierende Teilchen handeln. Vf. ist der Ansicht, daß positive Ar-Ionen intermittierend von der Anode ausgehen u. infolge von Emission die umgebenden Gasatome zur Strahlung anregen u. ionisieren; die dabei freiwerdenden Elektronen werden durch das Röhrenpotential beschleunigt, treffen auf die Anode u. rufen dort erneut die B. positiver Ionen hervor, worauf das Spiel sich wiederholt. (Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**. 574—76. Cambridge, St. Johns Coll.) FRANKENBURGER.

C. T. R. Wilson, *Die Beschleunigung von β -Teilchen in starken elektrischen Feldern wie beispielsweise von Gewitterwolken*. Vf. führt auf Grund der Messungen von Reichweiten, Energieverlusten usw. von β -Teilchen im näheren aus, daß β -Teilchen in elektr. Feldern der Größenordnung, wie sie in Gewitterwolken herrschen, sehr hoher Geschwindigkeitszuwachs erhalten, so daß ihre Energie mit derjenigen von H-Kerner u. α -Teilchen vergleichbar wird u. Zerstörungen von Atomkernen sowie Vereinigungen mit denselben vermutlich von ihnen ausgeführt zu werden vermögen. Es ist auch zu erwarten, daß von diesen hoch beschleunigten β -Teilchen extrem durchdringende β - u. γ -Strahlung hervorgerufen zu werden vermög. (Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**. 534—38. Cambridge, Sidney Sassek Coll.) FRANKENBURGER.

H. Mark und **L. Szilard**, *Die Polarisierung von Röntgenstrahlen durch Reflexion an Krystallen*. Die monochromat. K-Strahlung einer Cu-Antikathode wird auf einen Steinsalzkrystall, der als Polarisator dient, so reflektiert, daß der Ablenkungswinkel nahezu 90° beträgt, der reflektierte Strahl fällt dann auf ein Krystallpulver, das Debye Scherrerkegel erzeugt, von denen nur die unter 90° ausgehenden Kegel auf einen zylindr. Film aufgenommen werden. Die erhaltenen Linien weisen eine verschiedene große Intensität auf, Photographien von Verss. mit Pt, Al u. Cu-Folie als Analysator zeigen dies sehr deutlich. Diese Schwächung der Intensität tritt stets dann auf, wenn die Richtung des reflektierten Strahles in die Schwingungsrichtung des polarisierten einfallenden Strahles fällt. Gleichzeitig erfolgte auch eine spektrale Auflösung, die es erlaubte, die Polarisationsverhältnisse des abgebeugten, wie des Fluoreszenzlichtes getrennt zu betrachten. Letztere Verss. wurden an Eisen als Streustrahler ausgeführt u. ergaben, daß das Fluoreszenzlicht im Gegensatz zum abgebeugten Licht unter 90° zum primären Strahl unpolarisiert ist. (Ztschr. f. Physik. **35**. 743—47. Berlin-Dahlem Kaiser Wilhelm Inst. f. Faserstoffchemie und Univ. Berlin. Inst. f. theoret. Phys.) HAASE.

H. Seemann, *Bemerkungen zur Röntgenspektroskopie des Comptoneffektes und der Clarke-Duane-Pseudolinien*. Vf. erörtert, warum die von WALTER, WEBER u. KUHLENKAMPFF unternommenen Verss. zur Auffindung der Clark-Duaneschen Sekundärspektren selbst außerhalb des Primärspektrums mißlingen mußten. Die Intensität dieser Spektren ist viel zu schwach, u. nur bei großer Annäherung des Brennflecks an den Krystall ließe sich bei besonderer Blendenanordnung ein Sekundärspektrum erzielen, das frei von der Überlagerung durch nicht gespiegelte Fluoreszenzstrahlung wäre. Eine ähnliche Abhängigkeit des Intensitätsverhältnisses der verschobenen u. der unverschobenen Linien beim Comptoneffekt müßte auch bei ver-

chiedenen Abstandsverhältnissen der Anordnung zu beobachten sein, wenn die Primärstrahlung, wie bei einer Debye-Scherrer Aufnahme an den Mikrokrystallen gespiegelt wird. Die Möglichkeit einer Resonanzreflexion an erregten Krystallgittern wird erörtert. (Ztschr. f. Physik **35**. 732—42. Freiburg i. Br.)

HAASE.

A. Pontremoli, *Über die Emissionsdauer monochromatischer Strahlungen und die mittlere Lebensdauer der stationären Zustände*. Mathematisch. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **3**. 149—54. Mailand, Univ.)

LEHMANN.

E. Back, *Die experimentellen Grundlagen des Zeemaneffekts*. Vf. berichtet über die geschichtliche Entw. der Unters. des Zeemaneffekts. (Physikal. Ztschr. **26**. 833 bis 41. 1925.)

STEINER.

Arthur Bramley, *Zeemaneffekt und Multipllettstruktur*. Mathemat. (Journ. Franklin Inst. **201**. 3—16. Franklin Inst., Bartol Lab.)

HAASE.

R. Frerichs, *Zur Struktur der negativen Sauerstoffbanden*. Vf. untersucht fünf Gruppen des negativen Sauerstoffbandenspektrums im roten, gelben u. grünen Teil des Spektrums. Die Emission dieser Spektren erfolgt mittels Glimmentladung in verd. O₂ in unmittelbarer Nähe der aus einem Al-Klotz gebildeten, horizontal durchgeschlitzten u. wassergekühlten Kathode. Die Röhre wird bei 500—600 V Klemmenspannung mit 0,5—1,5 Amp. belastet. Die Spektren werden in der ersten Ordnung eines 6,4 m-Gitters photographiert. Vf. ordnet die aufgelösten Teile der linienreichen Banden in Serien u. stellt daraus auf Grund von Kombinationsbeziehungen ein Kantenchema auf. (Ztschr. f. Physik **35**. 683—88. Bonn, Univ.)

FRANKENBURGER.

K. W. Meißner, *Absorption in angeregten Gasen*. Im Anschluß an frühere Verss. an angeregtem Ar. Im blauen u. violetten Teil des Spektrums von Ar war mit bloßem Auge Absorption nicht zu beobachten, es wurden daher nur die roten Linien von Ar bis zu $0,9\mu$ untersucht. Weiter wurden mit Hilfe der Methode der intermittierenden Anregung u. Belichtung die Lebensdauern der s_3 - u. s_5 -Zustände an Ne gemessen. Für die Linien 6402 u. 6143 Å (s_5 -Zustand) wurden die Lebensdauern zu 0,004" bzw. 0,0035" bestimmt. Die Lebensdauer des s_3 -Zustandes ist kleiner als die des s_5 -Zustandes, sie ließ sich aber nicht genau bestimmen. (Physikal. Ztschr. **26**. 687—89. 1925.)

STEINER.

O. Jasse, *Über die Struktur der Banden 4511 und 4123 des Kohlenoxydspektrums*. (ULTHÉN (Ann. der Physik [4] **71**. 41; C. 1924. I. 131) konnte die Banden 4511 u. 4123 nicht nach den Regeln einordnen, denen die anderen Banden des CO-Spektrums gehorchen. Vf. zeigt aber, daß dieselben Serien P, Q u. R auch in diesen Banden verfolgt werden können, nur enthalten die Banden außerdem noch zwei kurze Serien R' u. finden sich im Kopf der Banden andere Serien, die nicht nach üblichen Regeln zu ordnen sind. Die Banden 4511 u. 4123 entsprechen demselben Endzustand, die Banden 4123 u. 4393 demselben Anfangszustand des Mol. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 692—94.)

BIKERMAN.

P. H. van Cittert, *Zur Messung der Feinstruktur der Wasserstofflinien mit der Lummer-Gehrcke-Platte*. Antwort zu den Bemerkungen von Gehrcke. Diskussion der Vor- u. Nachteile der Lummer-Gehrcke-Platte (vgl. GEHRCKE, S. 1939). (Ann. der Physik [4] **79**. 94—96. Utrecht, Univ.)

FRANKENBURGER.

P. M. S. Blackett und **J. Franck**, *Anregung von Spektren des Wasserstoffs durch Elektronenstoß*. H wird durch Elektronenstoß angeregt u. das emittierte Spektrum untersucht. Die Verss. werden in der Weise ausgeführt, daß die Intensität von H α mit der Intensität bestimmter Linien des Viellinienspektrums verglichen wird. Als Elektronenquelle dient eine oxydbedeckte Pt-Folie, der Elektronenstrom beträgt 10 Milliampere, die beschleunigende Spannung variierte zwischen 30 u. 100 Volt, der H-Druck zwischen 0,001 u. 1 mm Hg. Unter diesen Bedingungen bleibt bis zu den niedrigsten Drucken das Intensitätsverhältnis von H α u. H β zu den Linien des

Viellinienspektrums konstant. Vff. zeigen, daß nur der Zerfall eines H-Moleküls durch einen Elektronenstoß in ein angeregtes u. ein normales H-Atom in einem Elementarakt das geschilderte Verhalten erklären kann. Um diese Deutung sicherzustellen, wird noch die Feinstruktur von H_α u. H_β untersucht. Während die von freien Atomen emittierten Balmerlinien nur eine normale Dopplerverbreiterung durch die Temperaturbewegung aufweisen, zeigen die beim Zerfall angeregten Atome bei der Emission von H_α eine anomale Dopplerverbreiterung, die von der Geschwindigkeit der auseinanderfliegenden Atome herrührt. Das kontinuierliche H-Spektrum, das nicht mit der Seriengrenze zusammenhängt, wird ebenso in einem Elementarakt durch Elektronenstoß auf H-Moleküle angeregt u. für seine Entstehung unter allem Vorbehalt die folgende Deutung vorgeschlagen: Ist die Energie des stoßenden Elektrons so klein, daß nur ein Zerfall in ein normales u. ein niederquantiges Atom möglich wäre, so scheint es aus gewissen theoret. Überlegungen heraus wahrscheinlich, daß eine Dissoziation in normale Atome eintritt unter gleichzeitiger Ausstrahlung der überschüssigen Energie als kontinuierliches H-Spektrum. (Ztschr. f. Physik **34**. 389—401. 1925.) ST.

E. Gehrcke, *Neuere Ergebnisse der Feinstrukturforschung*. Vf. berichtet über einige neuere Messungen über die Feinstruktur von H_2 (gemeinsam mit **Lau**) und **He** (in Gemeinschaft mit **Leo**). (Physikal. Ztschr. **26**. 675—77. 1925.) STEINER.

G. Hansen, *Die Feinstruktur der Wasserstofflinien*. Vf. berichtet über seine mit Berücksichtigung aller möglichen Fehlerquellen vorgenommenen Unterss. über die Feinstruktur der Wasserstofflinien. Die Verss. sind mit drei verschiedener Lummer-Gehrcke-Platten u. einem mit Gleichstrom betriebenen Entladungsrohr ausgeführt worden bei der Temp. der fl. Luft. Die photograph. Aufnahmen wurden mit einem Kochschen Registrirophotometer ausgewertet, es wurden meist acht Ordnungen gemessen. — Bei H_α zeigt die kurzwellige Komponente eine deutliche Unsymmetrie. — Von H_α zu H_β u. zu H_γ zeigt $\Delta \nu$ des Doublets eine deutliche Zunahme wie die Theorie verlangt. — Das Intensitätsverhältnis der Doublettenkomponenten ist besonders bei H_α von Druck u. Stromdichte abhängig. (Physikal. Ztschr. **26**. 678 bis 680. 1925.) STEINER.

G. Hansen, *Die Feinstruktur der Balmerlinien*. Die Arbeit enthält die ausführliche Darst. der vorst. referierten Unterss. (Ann. der Physik [4] **78**. 558—600. 1925.) STEINER.

S. Piña de Rubies, *Neue Linien des Scandiums im Bogenspektrum bei Normaldruck*. II. (I. vgl. Anales soc. espanola Fis. Quim. **22**. 49; C. 1924. I. 2495.) Zusammen mit den früher (I. c.) gemessenen Linien des *Scandiums* im Bogenspektrum gibt Vf. in einer Tabelle ungefähr 60 neue Linien zwischen den Wellenlängen 380 u. 3200 Å., außerdem einige bisher noch nicht gemessene zwischen 3200 u. 2200 Å. Von einem von CATALAN (Anales soc. espanola Fis. Quim. **22**. 500; C. 1925. I. 1562) vorausgesagten Sextett kann Vf. nur 2 Linien bestätigen, die im übrigen schon in den Tabellen von EXNER u. HASCHKE vorhanden sind. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **24**. 41—46. Madrid, Lab. d. Investig. Fis.) HANTKE.

H. Gieseler und **W. Grotrian**, *Über die Vervollständigung der Serien im Bleibogenspektrum*. Mit Hilfe eines geeignet konstruierten Entladungsrohres, das besonders bei niederem Druck ($< 10^{-4}$ mm) die Anregung höherer Serienglieder gestattet, untersuchten die Vff. das Bogenspektrum des Pb. Zur Prüfung der Versuchsanordnung wurde zunächst das TI-Spektrum gemessen, hierbei konnten in der Serie $2p_1 - m s$ 5 neue Glieder u. in der Serie $2p_1 - m d$ 10 neue Glieder gemessen werden. Beim Pb-Bogenspektrum wurden zunächst die Messungen von THORSEN wiederholt u. die von ihm angegebenen Serien (Naturwissenschaften **11**. 78. **12**. 705; C. 1923. I. 1007. 1924. II. 2008) um einige Glieder vervollständigt u. schließlich die Termen neu berechnet. Weiter wurden eine Reihe von neuen Serien aufgefunden. Zwei von ihnen sind die zum P_0 -Term gehörige diffuse u. scharfe Nebenserie; zwei andere Kon-

binationen *pf.* Außerdem fanden sich auf den Platten eine Anzahl zum Teil starker Linien, die weder Verunreinigungen angehören, noch in den vorliegenden Wellenlängenstrahlen von Pb verzeichnet sind; eine Deutung dieser Linien, die nicht in Serien eingeordnet werden konnten, ist in Aussicht gestellt. Alle gemessenen Linien u. berechneten Terme sind in Tabellen zusammengestellt. (Ztschr. f. Physik **34**. 374—88. 1925.)

STEINER.

H. Ludloff, *Zur Termдарstellung der HgH-Banden.* Es wird gezeigt, daß die Termдарstellung der HgH-Banden von KRATZER (Ztschr. f. Physik **13**. 82; C. **1923**. III. 715) mit den neuen Messungen von HULTHÉN (Ztschr. f. Physik **32**. 32; C. **1925**. II. 267) verträglich ist entgegen der Meinung von HULTHÉN selbst. Die scheinbar einfachen Anfangsterme des kurzwelligen Systems sind aufgespalten. Die auftretenden Störungen werden als Termstörungen nachgewiesen. Die Vervollständigung des Vers.-Materials durch HULTHÉN gestattet es, nunmehr auch eine Vorstellung über den Bau des HgH-Mol. zu gewinnen. Vf. schlägt folgendes Bild vor, welches mit dem Bandenspektrum verträglich ist. Das Mol. besteht aus einem neutralen Hg-Atom, das in einer bestimmten Entfernung einen H-Kern angelagert hat. Um dieses positive Molekülion kreist in relativ großer Entfernung das Leuchtelektron des H. (Ztschr. f. Physik **34**. 485—95. 1925.)

STEINER.

W. F. Meggers, *Untersuchungen über die Platinmetalle.* VII. *Bogenspektren der Platinmetalle.* Vf. beschreibt App. u. Methode, die zur Unters. der Spektren der Metalle *Ru, Rh, Pd, Os, Ir u. Pt* angewandt wurden. Die Ergebnisse der Messungen fehlen. (Chem. News **132**. 6—10. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) JOS.

Wallace R. Brode, *Der Einfluß der Lösungsmittel auf das Absorptionsspektrum eines einfachen Azofarbstoffes.* Vf. untersuchte einerseits die Einw. des Lösungsm. auf das Absorptionsspektrum eines Farbstoffes u. andererseits die Gültigkeit des Kundtschen Gesetzes, welches besagt, daß die Absorptionsbanden eines Farbstoffes nach dem roten Ende des Spektrums verschoben werden mit zunehmendem Brechungsindex des Lösungsm. Als Farbstoff diente *Benzolazophenol*, als Lösungsmm.: Methylalkohol, A., i-Propylalkohol, n-Butylalkohol, Amylalkohol, Benzylalkohol, Äthylacetat, Butylacetat, Amylacetat, Äthylformiat, Äthylpropionat, Äthylloxalat, Äthylbenzoat, Äthyläther, Aceton, Äthyl-Methylketon, Ameisensäure, Eg., Chlf., Tetrachlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff, Glycerin, Lg., Gasolin, Petroleum, Bzl., Toluol, Xylol, Tetralin u. Pyridin. Die Sektor-Photometermethode von HILGER unter Anwendung eines Quarzspektrographen zur Aufnahme der ultravioletten Verschiebungen wurde benutzt. Als Strahlungsquelle diente ein Lichtbogen zwischen zwei Wolframelektroden unter W.; der Bogen selbst wurde durch hochgespannten Wechselstrom betrieben. Die Schichtdicke der Farbstofflsgg. betrug bei allen Verss. 1 cm, die Konz. 0,144 g/l. Aus den Verss. ergab sich, wie aus zahlreichen Kurven u. Tafeln hervorgeht, daß das Kundtsche Gesetz für diesen u. nach Ansicht des Vfs. auch für eine Reihe anderer einfacher Farbstoffe nicht gültig ist. Es konnte keine definierte Beziehung zwischen dem Brechungsindex oder der DE. der Lösungsmm. u. den Schwingungszahlen der Absorptionsbanden der in den betreffenden Lösungsmm. gel. Farbstoffe ermittelt werden. In Lösungsgemischen scheint der Farbstoff sich in bezug auf seine Absorption nach dem am meisten polaren Lösungsm. zu richten, u. zwar auch schon, wenn dieser nur in sehr kleinen Konz. vorhanden ist. Die Höhe der Absorptionsbanden scheint auch größer für polare als für nicht polare Lösungsmm. zu sein. (Journ. Physical Chem. **30**. 56—69. Illinois, Univ.)

HAASE.

Robert Pohl, *Zur quantenhaften Lichtabsorption in festen Körpern.* Zusammenfassende Darst. der Arbeiten über Photoeffekt an Metallen u. lichtelektr. Ströme in Krystallen, zu denen Vf. in Gemeinschaft mit GUDDEN zahlreiche Beiträge geliefert hat. Die Unterss. haben zu folgender Deutung des selektiven Photoeffekts geführt: die Elektronen des selektiven Photoeffekts entstammen nicht den Atomen oder Molekeln

des festen bzw. fl. Metalls. Sie entstammen vielmehr dem Metall im Zustande molekularer oder atomarer Verteilung. Die Gültigkeit des Einsteinschen Äquivalentgesetzes beim n. u. selektiven Photoeffekt u. bei den lichtelektr. Primärströmen in Krystallen wird erörtert. Am Schluß der Abhandlung finden sich zahlreiche Literaturangaben. (Naturwissenschaften **14**. 214—19. Göttingen.) JOSEPHY.

Abraham Lincoln Marshall, *Photosensibilisierung durch optisch angeregte Quecksilberatome; die Wasserstoff-Sauerstoffreaktion*. (Vgl. S. 1110.) Die Versuchsanordnung war so getroffen, daß die gesamte Strahlung des Quarzquecksilberlichtbogens ausgenutzt werden konnte. Der Lichtbogen wurde von außen gekühlt, ein schmaler Luftmantel gestattete Temp.-Messungen unabhängig von dem Lichtbogen. Nächste dieser Luftschicht umgab den Bogen ein 6 mm starkes Gefäß, das mit 2at. Cl₂ u. 60 mm Br₂ gefüllt war, um nur die Linie 2536 Å hindurch zu lassen. Um dieses Lichtfilter herum wurde nun das eigentliche Rk.-Gefäß angeordnet; es bestand aus einem Zylindermantel von 6 mm Wandstärke u. 55 mm innerer Weite, seine Länge betrug 100 mm; eine eingeschmolzene Capillare bildet die Verbindung mit den Gasvorratsflaschen u. dem Manometer. Der ganze App. wird in einem Thermostaten auf konstanter Temp. gehalten, u. zwar im Gebiet zwischen 25 u. 70°. Die zu den Verss. benutzten Gase wurden elektrol. gewonnen. Wasserstoff u. Sauerstoff wurden im Verhältnis von 2:1 gemischt u. bei verschiedenen Temp. der Belichtung ausgesetzt. Die Druckveränderungen wurden manometr. verfolgt. Die Geschwindigkeit der Druckabnahme blieb bis zum Ende der Rk. konstant, sie betrug im Maximum bei 120 cm 8 cm in der Min. — Aus Energiebetrachtungen schien es wahrscheinlich, daß man es mit einer Kettenrk. zu tun hat, dessen Schema von Vf. angegeben wird. (Journ. Physical Chem. **30**. 34—46. New York.) HAASE.

E. Rousseau, *Photochemische Aktivität der mit ultravioletten Strahlen bestrahlten Luft*. Die Teile der Luft, die bei der Bestrahlung photochem. aktiv werden, sind in abnehmender Reihe ihres Wertes: Staubteile, O₂, CO₂-Gas. Unwirksam sind N u. H. (C. r. soc. de biologie **93**. 26—27. Paris, Lab. de l'Ecole de puériculture.) OPP.

Jnanendra Chandra Ghosh und **Samarendra Gupta**, *Die isomere Umwandlung von allo-Cinnamylidenessigsäure in die normale Form mit Jod als Katalysator*. Die photochem. Umwandlung von allo-Cinnamylidenessigsäure in die n. Form wird in weißem Licht in Chlf.-Lsg. bei Ggw. von J₂ untersucht. Für die Geschwindigkeitskonstante k gilt der Ausdruck $k = 1/t \log [a/(a-x)]$; k ist unabhängig von der J₂-Konz., aber nicht von der Säurekonz. Wird der reziproke Wert der Reaktionsgeschwindigkeit $1/c$ gegen $1/p$ (p = osmot. Druck der allo-Cinnamylidenessigsäure) aufgetragen, so entsteht eine gerade Linie, entsprechend der Turnerschen Gleichung (Physical Review **23**. 464; C. **1924**. II. 276); für $p = \infty$ ist $c = 0,133$. Die mittlere Lebensdauer der aktivierten Molekeln berechnet sich nach derselben Gleichung zu 8×10^{-10} sec. Zur Umwandlung einer Säuremolekel sind je nach der Konz. 1,2—2,8 Quanten erforderlich. Der Temperaturkoeffizient zwischen 24 u. 34° ist 1,75; von dem Polarisationszustand des einfallenden Lichtes ist die Reaktionsgeschwindigkeit unabhängig. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. **2**. 241—52. 1925. Dacca [Indien], Univ.) KRÜ.

Jnanendra Chandra Ghosh und **Rukmini Mohan Purkayestha**, *Photochemische Reaktionen in zirkular polarisiertem, planpolarisiertem und gewöhnlichem Licht. Die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Brom und 1. Zimtsäure, 2. Stilben*. (Vgl. vorst. Ref. u. S. 1368.) Die Addition von Br₂ an Zimtsäure bzw. Stilben in CCl₄-Lsg. wird im Licht einer Pointolitelampe untersucht u. die unimolekularen Geschwindigkeitskoeffizienten k der Rkk. berechnet. Die k -Werte sind gut konstant, der Intensität des einfallenden Lichtes nicht proportional u. von der Anfangskonz. des Br₂ unabhängig; sie nehmen aber mit steigender Anfangskonz. der Zimtsäure bzw. des Stilbens zu. Da der Extinktionskoeffizient ϵ des Br₂ klein ist, ergibt sich mit Hilfe

der Turnerschen Gleichung bei konstanter Lichtintensität für k der Ausdruck: $k = C \tau / (T + \tau)$, worin C eine Konstante, τ die mittlere Lebensdauer der aktivierten Br_2 -Molekeln u. T die Zeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden Zusammenstößen einer aktivierten Br_2 -Molekel u. einer Acceptormolekel bedeutet; T ist dem osmot. Druck p der Acceptormolekeln umgekehrt proportional. Wird daher für Verss. bei gleicher Lichtintensität $1/k$ gegen $1/p$ aufgetragen, so entstehen bei beiden Rkk. gerade Linien; k beträgt in Ggw. von Zimtsäure $0,8 \cdot 10^{-9}$ sec., in Ggw. von Stilben $2,33 \cdot 10^{-9}$ sec. Bei gleicher Lichtintensität sind gewöhnliches u. linear polarisiertes Licht gleich wirksam, zirkular polarisiertes Licht scheint etwas weniger wirksam zu sein. Der Temperaturkoeffizient zwischen 23 u. 43° ist 2,6—2,8. Das Einsteinsche Äquivalentgesetz gilt nicht; bei 26° führt ein Energiequantum zur B. von 436 Molekeln Dibromzimtsäure u. 305 Molekeln Stilbendibromid. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 61—76. 1925. Dacca [Indien], Univ.)

KRÜGER.

B. K. Mukerji und N. R. Dhar, *Die Erscheinung der Nachwirkung in einigen photochemischen Reaktionen*. (Vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 31. 621, 1925; C. 1926. 1508.) Vff. untersuchen eine Reihe lichtempfindlicher Rkk. in wss. Lsgg. auf photochem. Nachwrg. Ein Teil der Reaktionsgemische wird unmittelbar nach der Herst. Min. dem Licht einer Pointolitlampe ausgesetzt u. dann ins Dunkle gebracht, ein anderer Teil dauernd im Dunkeln gehalten u. die unimolekularen Geschwindigkeitskoeffizienten k u. k_1 der Dunkelrkk. in beiden Anteilen bestimmt. Bei den Systemen *Äpfelsäure* + Br_2 , *Milchsäure* + Br_2 , *Äpfelsäure* + Br_2 , *Na-Citrat* + J_2 , *K-Oxalat* + J_2 , *Oxalsäure* + Br_2 , *Citronensäure* + Br_2 , *K-Formiat* + J_2 , *Oxalsäure* + *Chromsäure* + FeSO_4 , H_2SO_4 , KJ + $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, *Oxalsäure* + KMnO_4 + MnSO_4 + H_2SO_4 , FeCl_3 + $\text{H}_4\text{-Oxalat}$ ist photochem. Nachwrg. vorhanden; k/k_1 ist um so größer, je größer die im Licht eintretende Reaktionsbeschleunigung ist. Bei den Rkk. zwischen *K-Natriumacetat* u. Br_2 , HgCl_2 u. $\text{NH}_4\text{-Oxalat}$, CuSO_4 u. *Oxalat* u. bei der Zers. von *Fehlingscher Lsg.* war keine Nachwrg. festzustellen. Vff. erklären die Erscheinung damit, daß die durch das Licht aktivierten Molekeln durch Zusammenstoß mit inakt. Molekeln diese ebenfalls aktivieren u. letzte wiederum ihre Energie an andere Molekeln übertragen können, so daß noch eine längere Zeit, als der Lebensdauer der durch das Licht aktivierten Molekeln entspricht, nach Aufhören der Belichtung akt. Molekeln vorhanden sind. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 277—88. 1925. Allahabad [Indien] Univ.)

KRÜGER.

Nathaniel Sampson Lucas, *Die Natur der Wirkung von durch eine Quecksilber-Quecksilberlampe bestrahltem Sägestaub und Cholesterin auf die photographische Platte*. Die Verss. führen zu dem Schlusse, daß die Wrkg. nicht auf durch die bestrahlten Substanzen ausgesandten Sekundärstrahlungen beruht (sie geht durch eine Quarzplatte nicht hindurch), sondern wahrscheinlich auf B. u. folgender allmählicher Emanation von H_2O_2 oder O_3 . Ein über die bestrahlten Substanzen geleiteter Luftstrom wirkte auf die photograph. Platte u. machte aus KJ-Lsg. J frei. Pelz, Haut, Federn wirkten nach der Bestrahlung nicht auf die photograph. Platte, mit Wolle wurde ein trügerisches Ergebnis erhalten. (Biochemical Journ. 20. 23—25. London, LISTER Inst.)

SPIEGEL.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Robert Saxon, *Die Elektrolyse von Bleichlorid*. Zur elektrolyt. Abscheidung von Pb aus einer Lsg. von PbCl_2 mit Kohlenanode u. Fe-Kathode empfiehlt Vf., PbCl_2 in einer gesätt. Lsg. von Zucker zu lösen, u. diese Lsg. zu elektrolysieren. Der Erfolg dieser Methode besteht in einer guten Abscheidung des Metalls, u. die Zers. der Kohlenanode wird vermieden. (Chem. News 132. 102—03.)

JOSEPHY.

Philipp Gross und Otto Halpern, *Über Mischelektroden zweiter Art*. Polem. Auseinandersetzung mit HOROVITZ (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 424; C. 1925. II. 522)

u. einige Ergänzungen zur früheren Arbeit (Ztschr. f. physik. Ch. **115**. 54; C. **1925**. I 2146) der Vff. (Ztschr. f. physik. Ch. **118**. 255—56. 1925. Wien, Univ.) **ULMANN**.

E. L. Davies und **G. H. Livens**, *Die kinetische Theorie der metallischen Leitfähigkeit*. Vff. weisen mittels mathemat. Ansätze nach, daß bei zweckentsprechender Wahl der einzelnen, empir. nicht bekannten Funktionen die kinet. Theorie der metall. Leitfähigkeit zu Werten der therm. u. elektr. Leitfähigkeit in Metallen führt, welche in der gleichen Größenordnung wie die tatsächlich beobachteten liegen. Die Diskussion geht von dem Lorentz'schen Ansatz für diese beiden Größen aus; es werden gewisse Annahmen über das Gesetz gemacht, welches für die Zerstreung der im Metall sich bewegenden, freien Elektronen unter dem Einfluß der dispergierenden Zentren (Metallatome bzw. Ionen) maßgebend ist. Auch die Erscheinungen der Supraleitfähigkeit lassen sich in diese Theorie ohne prinzipielle Widersprüche einreihen, falls die Annahme gemacht wird, daß die mittlere kinet. Energie der Elektronen um einen kleinen Betrag geringer als deren mittlere therm. Energie ist. Eine physikal. Deutung des Kraftgesetzes für die Dispersion der freien Elektronen durch die Atome bzw. Ionen des Metalls, welches angenommen werden muß, um die mathemat. Ansätze mit den beobachteten Werten in Einklang zu bringen, kann noch nicht gegeben werden (Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**. 555—61.) **FRANKENBURGER**.

W. Geiss, *Totalstrahlung und spezifischer Widerstand des Wolframs bei Glühtemperaturen*. Zwischen 1700 u. 2700° K gilt für die Totalstrahlung η von W u. der spezif. Widerstand ρ die Beziehung $\eta = 1,425 \cdot 10^{-6} \cdot \rho^{4,14}$. (Ann. der Physik [4] **79**. 85—88. Eindhofen [Holland].) **LÜDER**.

W. Plotnikow, *Die elektrische Leitfähigkeit von Kaliumjodid in Brom-Jodlösungen* (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 135—42. 1925. — C. **1925**. II. 895.) **BIKERMAN**.

P. Vaillant, *Über den Einfluß einer elektrostatischen Ladung auf die Oberflächenleitfähigkeit eines Steinsalzplättchens*. Vf. benutzt zu seinen Verss. ein Steinsalzplättchen von 8 mm Dicke u. einer Kantenlänge von mehreren cm. Mit diesem Plättchen u. einigen Glimmerplatten von 0,03 mm Dicke, die zum Teil mit Stanniol belegt waren wird ein Kondensator hergestellt u. bei einer konstanten Temp. von 25° gehalten. Die Luftfeuchtigkeit, ein sehr wesentlicher Faktor, wurde durch konz. H_2SO_4 möglichst niedrig u. konstant gehalten. Waren die das Steinsalzplättchen umgebenden Schichten neutral, konnte ein Strom von 0,1322 Mikroamp. gemessen werden; bei positiver Aufladung 0,1430 u. bei negativer 0,1198. Diese Werte sind außerordentlich von der umgebenden Feuchtigkeit abhängig; mit stark zunehmender Feuchtigkeit fallen die gemessenen Unterschiede vollständig fort. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 915—17. 1925.) **HAASE**.

C. M. McCay und **Carl L. A. Schmidt**, *Die Dissoziationskonstanten von racemischem Prolin und gewisser verwandter Verbindungen*. Dissoziationskonstanten für Prolin $K_s = 2,5 \cdot 10^{-11}$, $K_b = 1 \cdot 10^{-12}$, Pyrrol- α -carbonsäure $K_s = 4,2 \cdot 10^{-5}$, $K_b = 3 \cdot 10^{-13}$, Pyrrolidon- α -carbonsäure $K_s = 5,6 \cdot 10^{-4}$, Tetrahydrobrenzschleimsäure $K_s = 1,4 \cdot 10^{-4}$. Es folgt, daß die Dissoziationskonstante sowohl durch Anwesenheit von (oder ungesätt. Bindungen im Ring beeinflusst wird. (Journ. Gen. Physiol. **9**. 333—39. Univ. of California. Div. of Biochem. and Pharm.) **MEIER**.

Pierre Weiss, *Über den von der Temperatur unabhängigen Paramagnetismus*. COLLET hat kürzlich im Luteokobaltochlorid ein 2. Beispiel einer in Lsg. befindlichen Substanz gefunden, die einen von der Temp. unabhängigen Magnetisierungskoeffizienten besitzt. Das 1. bildete das Kaliumdichromat. Man kann annehmen, daß im letzteren Fall jedem der beiden Cr-Atome eine Kraft innewohnt u. daß beide in entgegengesetzte Richtung hin gelenkt werden, so daß sie sich ausgleichen. Beim Luteokobaltochlorid dagegen besitzt das Molekül nur ein einziges Co-Atom. Man muß daher hier einen Ausgleich der elementaren Kräfte im Atominnern ablehnen. Infolgedessen

würde der Vorgang der konstanten Magnetisierung eine Richtung einnehmen, u. zwar nur eines Teiles des Atoms; der konstante Paramagnetismus wäre also eine inneratom. Erscheinung. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 105—106.) KALPERS.

Earle E. Schumacher, *Schmelzpunkte von Barium-, Strontium- und Calciumoxyd*. Vf. beschreibt Methode u. App. zur Best. von FF. von Erdalkalioxyden. Die so bestimmten FF. liegen für *CaO* bei 2849° K. in guter Übereinstimmung mit dem allgemein angenommenen Wert 2843° K., für *BaO* bei 2196° K. u. für *SrO* bei 2703° K. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 396—405. New York [N. Y.], Bell Telephone Lab.) JOSEPHY.

R. R. S. Cox, *Notiz über die chemische Konstante des Chlors*. Vf. stellt die Werte für die chem. Konstante des Chlors zusammen, soweit sie sich aus den von HENGLEIN (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **123**. 137; C. **1923**. III. 426), TRAUTZ (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **122**. 112; C. **1923**. III. 1593) u. von WOHL (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 36; C. **1924**. I. 1163) gemessenen Werten der Dissoziationswärmen (—54000, —71000 u. —57000 cal) errechnen u. vergleicht sie mit dem theoret. Wert. Das Mittel aus dem nach TRAUTZ u. dem nach WOHL erhaltenen Wert ist 0,64 gegenüber 0,9 (theoret.). (Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**. 491—92. Cambridge, Christs Coll.) FRANKENBURGER.

A. Sieverts und **A. Gotta**, *Bildungswärmen und Dichten von Hydriden*. Vorl. Mitt. (Vgl. S. 1782.) Von *La*-reichem Mischmetall werden die Lösungswärmen der Hydride (Q_1) beim Lösen in HCl bestimmt. Subtrahiert man von den so gefundenen Werten die Lösungswärmen des reinen Mischmetalls (Q_2), so erhält man die *Bildungswärme* der Hydride aus Metall u. gasförmigem H_2 . Je nach der Art der Darst. der Hydride ergaben sich verschiedene Kurven, welche auf eine verschiedene Art der Bindung des H_2 schließen lassen. Bei der Absorption des H_2 bei Zimmertemp. liegen die Werte für verschiedenen Sättigungsgrad annähernd auf einer Geraden. Es entsteht eine gesätt. feste Lsg. neben Metall, bei deren B. auf ein Mol. gebundenen H_2 berechnet 40 620 cal frei werden. Durch Erhitzen der gesätt. Lsg. mit festem Metall auf 600—900° entstehen homogene feste Lsgg. Die D. des Mischmetalls ist 6,69, die seiner bei 20° gesätt. festen Lsg. nur noch 5,85. Durch die Aufnahme von H_2 verringert sie sich also um beinahe 13%. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 105—09. Frankfurt a. M., Inst. der Univ.) ENSZLIN.

H. v. Wartenberg und **O. Fitzner**, *Zur Thermochemie des Fluors*. I. Vermitteltst einer Pt-Apparatur, welche sich in einem elektr. geheizten Calorimeter befand, durch welche Anordnung auch bei Zimmertemp. wesentlich übersteigenden Temp. calorimetriert werden kann, bestimmen Vff. die *Bildungswärme* der direkten Synthese von HF u. erhielten nach Abzug der Polymerisationswärme (vgl. SIMONS u. HILDEBRAND, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2183; C. **1925**. I. 25):



Metalle wie K, Na, Zn u. Mg bedecken sich, wie Vff. finden, im langsamen F_2 -Strom mit einer schützenden Haut, so daß ihre Rk. mit F_2 thermochem. nicht direkt gemessen werden kann, daher wird eine Umsetzungsrk. ausgewählt, deren Bildungswärme bekannt ist u. eine Umrechnung auf HF erlaubt. Vff. finden für die *Umsetzungswärme* mit NaCl: $\frac{1}{2}F_2 + NaCl_{\text{fest}} = NaF_{\text{fest}} + \frac{1}{2}Cl_2 + 39,30 \pm 0,1 \text{ Cal}$ u. für die *Lösungswärme* n. W.: $HF_{\text{gas}} = HF_{\text{gel}} (400 \text{ Mol aq.}) + 11,56 \pm 0,01 \text{ Cal}$. Aus den beiden letzten Bestst. berechnet sich für die Bildungswärme des HF 65,0 Cal, ein etwas höherer Wert, als der direkt gemessene. Als Grundlage der Thermochemie des F_2 ergibt sich nach Vff. der Mittelwert $64,0 \pm 1\%$ Cal u. nicht der sicher unrichtige Wert —38,9 Cal — von BERTHELOT u. MOISSAN (Ann. de Chimie [6] **23**. 570.) (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 313—25.) ULMANN.

Hans v. Wartenberg, *Zur Thermochemie des Fluors*. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Die neu bestimmten Werte für die Bildungswärme u. Lösungswärme von HF zwingen zu einer Neuberechnung sämtlicher thermochem. Rkk. der Fluoride. Es ist dabei zu setzen $\frac{1}{2}H_2 + \frac{1}{2}F_2 + aq = HF_{\text{gel}} + 75,6 \text{ Cal}$ anstatt früher 50,7 Cal. Auf

dieser neuen Grundlage berechnet Vf. verschiedene Rkk. von *F-Verbb.* u. findet an *Bildungswärmen* für: SbF_3 210,6, BF_3 258,1, HBf_4 aq 359,2, SiF_4 360,2, H_2SiF_6 aq 545,4; für die Metallfluoride: Li 144,7, Na 136,6, K 134,5, Rb 132,8, Cs 131,5, Ba 278,9, Tl 80,5, Ca 289,4, Sr 289,3, Mg 264,3, Zn 193, Cd , 173,7 (aq), Fe 177,2 (aq), Mn 206,1 (aq), Co 172,8 (aq), Ni 171,4 (aq); ferner: NH_4F 36,9, AlF_3 331,5, CrF_3 aq 171,3 + Hydratationswärme des Cr_2O_3 , welche noch unbekannt, FeF_3 aq 253,1, CuF_2 aq 129,8, AgF 50,1 u. PbF_2 156. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 326—30. Danzig, Techn. Hochsch.)

ULMANN.

George S. Parks und **Kenneth K. Kelley**, *Die Wärmekapazitäten einiger Metalloxyde*. Die Best. der Wärmekapazität einer Reihe von Metalloxyden wurde mit Hilfe der bereits früher (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 338; C. **1925**. I. 2059) beschriebenen Anordnung durchgeführt. Untersucht wurden die *Oxyde* des Mg , Ca , Al u. des Fe , von den Oxyden des Fe der *Hämatit* u. der *Magnetit*. Die Messungen wurden in einem Temp.-Gebiet zwischen 87 u. 293° absol. Temp. Bei dem Magnetit wurde zwischen 113 u. 117° ein Wärmeabsorptionsgebiet festgestellt. Vff. berechneten für eine Anzahl von Verbb. die Entropiewerte sowie die der freien Energie. (Journ. Physical Chem. **30**. 47—55. Stanford, Univ.)

HAASE.

H. Gregory und **C. T. Archer**, *Die Änderung der thermischen Leitfähigkeit von Gasen mit dem Druck*. (Vgl. S. 1946.) Mit einer Methode, die der in der früheren Arbeit (l. c.) benutzten ähnelt, messen Vff. die *therm. Leitfähigkeit von Luft* bei verschiedenen Gasdrucken (78 bis 0,1 mm). Die Verss. geben eine glänzende Bestätigung der schon von MAXWELL aus der kinet. Gastheorie gezogenen Konsequenz, daß die Leitfähigkeit von Gasen unabhängig vom Druck ist. Eine gewisse Abhängigkeit der Leitfähigkeit vom Gasdruck bei kleinen Drucken, die die Verss. anzudeuten scheinen, ist darauf zurückzuführen, daß die mittleren freien Weglängen bei diesen Drucken kommensurabel mit den Dimensionen des benutzten Gefäßes werden. (Philos. Magazine [7] **1**. 593 bis 606.)

HANTKE.

E. A. Milne, *Dissoziationsgleichgewicht in einem äußeren Kraftfeld*. Vf. entwickelt die thermodynam. Gleichungen für das Verh. eines dissoziierenden Gases in einem äußeren Gravitations- oder elektrost. Kraftfeld u. wendet sie auf die Verhältnisse in Sternatmosphären an. (Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**. 493—509. Cambridge, Trinity Coll.)

FRANKENBURGER.

Enrico Fermi, *Über die Quantelung des vollkommenen einatomigen Gases*. Mathematisch. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **3**. 145—49.)

LEHMANN.

Karl Jellinek und **Robert Uloth**, *Über die Jod- und Bromtensionen von Metalljodiden und Metallbromiden*. Es werden die Reduktionsgleichgewichte von AgJ , PbJ_2 , Cu_2J_2 , NiJ_2 , CoJ_2 ; $AgBr$, $PbBr_2$, Cu_2Br_2 , $NiBr_2$ u. $CdBr_2$ mit H_2 bei Tempp. zwischen 300 u. 750° u. 1 At. bestimmt. Die Tension des zweiatomigen J_2 bzw. Br_2 über den genannten Halogeniden, sowie über $ZnBr_2$, berechnen Vff. aus Reduktionsgleichgewichten u. elektromotor. Kräften von wss. Ketten u. Schmelzketten, sowie die Tensionen des einatomigen J u. Br mittels deren bekannten Dissoziationsgleichgewichten. Bei AgJ , PbJ_2 u. Cu_2J_2 überwiegen in dem untersuchten Temperaturintervall die Tensionen von J die des J_2 , bei NiJ_2 u. CoJ_2 ist das Umgekehrte der Fall; bei den Bromiden überwiegen die Tensionen des Br die von Br_2 . Für die Berechnung der chem. Konstanten von J_2 u. Br_2 fehlen im allgemeinen die Molekularwärmen der Jodide u. Bromide. Zahlreiche Tabellen erläutern die Ausführungen der Vff. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 157—84. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochsch.)

ULMANN.

H. Alterthum und **F. Koref**, *Über die Bestimmungen des Dampfdrucks von Kohlenstoff*. (Vgl. S. 1513.) Vff. besprechen die Dampfdruckbestst. von LANGMUIR nach der Methode der Messung der Verdampfungsgeschwindigkeit (Physikal. Ztschr. **14**. 1273; C. **1914**. I. 228) u. LUMMER (Verflüssg. der Kohle u. Herst. der Sonnentemp., Braunschweig 1914), ferner die von der Dampfdruckkurve von KOHN u. GUCKEL

(Ztschr. f. Physik **27**. 305; C. **1924**. II. 2233) etwas abweichende Dampfdruckkurve von RYSCHKEWITSCH (Ztschr. f. Elektrochem. **31**. 54; C. **1925**. II. 387) u. die Dampfdruckkurve von WERTENSTEIN u. JEDRZJEWSKI (C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 316; C. **1923**. III. 1141). Die Unterschiede beim Vergleich der Dampfdruckkurve des C nach der Lichtbogenmethode mit der nach dem Verf. der Messung der Verdampfungsgeschwindigkeit lassen sich zum Teil durch die verschiedenen Abbau-geschwindigkeiten der verschiedenen Kristallflächen erklären, zum größten Teil aber nur durch das Vorhandensein einer Adsorptionsschicht höherer Konz. als dem Dampfdruck entspricht. Auf das Bestehen einer solchen Schicht, auch bei hohen Temp. u. niedrigen Drucken, kann nämlich aus anderen Verss. geschlossen werden. Aus dieser Annahme heraus berechnen Vff. den Akkommodationskoeffizienten (vgl. KNUDSEN, Ann. d. Physik **28**. 75 [1909]. **37**. 593 [1911]), die Dampfdruckkurve der Adsorptionsschicht u. die Adsorptionswärme des C. (Ztschr. f. Elektrochem. **31**. 658—62. 1925. Studienges. f. elektr. Beleuchtung, Osram-Konzern.) SITTING.

Charles G. Maier, *Berichtete Dampfdrucke von Zink und Cadmium*. Vf. berechnet die besten in der Literatur angegebenen Dampfdruckwerte der fl. u. festen Metalle Zn u. Cd neu, u. stellt sie krit. zusammen. Dampfdruckkurven sind gezeichnet. Unter der Voraussetzung, daß sich Zn- u. Cd-Dampf wie ideale einatomige Gase verhalten, werden Gleichungen für die Änderung der freien Energie bei der Verflüchtigung, Sublimation u. beim Schmelzen abgeleitet. Als berichtete Dampfdruckgleichungen werden die folgenden Gleichungen angesehen:

$$\text{Zn (fl.): } \log p_{mm} = 12,0013 - (6670,0/T) - 1,1265 \log T.$$

$$\text{Zn (fest): } \log p_{mm} = 9,4181 - (6883,0/T) - 0,05029 \log T - 3,277 \cdot 10^{-4} T.$$

$$\text{Cd (fl.): } \log p_{mm} = 12,2870 - (5819,4/T) - 1,2572 \log T.$$

$$\text{Cd (fest): } \log p_{mm} = 9,7170 - (5907,8/T) - 0,4323 \log T - 2,840 \cdot 10^{-4} T.$$

(Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 356—64. Berkeley [Cal.], Bureau of Mines.) JOS.

Charles G. Maier und **Oliver C. Ralston**, *Reduktionsgleichgewichte von Zinkoxyd und Kohlenmonoxyd*. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmen das Gleichgewicht der Rk. $\text{ZnO} + \text{CO} \rightleftharpoons \text{Zn}_{\text{Dampf}} + \text{CO}_2$ zwischen 500 u. 850°, indem CO u. CO₂ analyt. bestimmt werden, während der Zn-Dampf in geschmolzenem Sn absorbiert wurde. App. u. Methode sind im Original eingehend beschrieben. Die Änderung der spezif. Wärme obiger Rk. läßt sich durch die Gleichung

$$\Delta C_p = -4,46 + 3,12 \cdot 10^{-3} T + 22,47 \cdot 10^{-7} T^2$$

ausdrücken, wenn für die spezif. Wärme von ZnO die von **Arthur L. Day** u. **W. P. White** gefundene Gleichung $C_p = 9,96 + 2,98 \cdot 10^{-3} T - 3,87 \cdot 10^{-7} T^2$ angesetzt wird. Die Änderung der freien Energie der Rk. wird durch die Gleichung

$$\Delta F_T = 47290 + 4,46 T \ln T - 1,56 \cdot 10^{-3} T^2 - 3,745 \cdot 10^{-7} T^3 - 59,703 T$$

viedergegeben. $\Delta F_{298} = +36920$. Für die Bildungswärme von ZnO nach $\text{Zn} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{ZnO}$ ergibt sich $\Delta H = -83285 + 1,61 T - 0,26 \cdot 10^{-3} T^2 - 1,29 \cdot 10^{-7} T^3$ u.

$$\Delta F_T = -83285 - 1,61 T \ln T + 0,26 \cdot 10^{-3} T^2 + 0,645 \cdot 10^{-7} T^3 + 34,23 T.$$

Die Entropie von ZnO ist $\Delta S_{298} = -23,62$ u. $S_{298} = 10,20$ Entropieeinheiten. Die Genauigkeit der Werte wird diskutiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 364—74. Berkeley [Cal.], Bureau of Mines.) JOSEPHY.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

R. Keller, *Über Kolloidladung*. Die Elektrizitätsladung eines Kolloids ist eine ursprüngliche, charakterist. Eigenschaft des Stoffes, die von seinem Aufbau, seinem Dispersitätsgrad u. möglicherweise auch von der Adsorption von Elektrizitätsträgern abhängt. Die Ionenadsorption als Ursache wird allgemein überschätzt; sie ist aus energet. Gründen überwiegend dahin gerichtet, die zwischen Dispersionsmittel u. disperser Phase bestehende elektr. Spannung herabzusetzen u. damit zur Koagulation zu bringen, nicht aber in ein Kolloid entgegengesetzter Oberflächenladung

umzuwandeln. — Die Umladung eines Kolloids ist meist nur eine Umladung des Dispersionsmittels bei gleichbleibender Elektroneutralität des Kolloids, des unveränderten gebliebenen Bezugssystems. — Die Definition des Säuregrades für Kolloidlsgg. nach den Formeln der für reines W. (DE. = 81,7) berechneten Ionenkonz. bei kolloider Lsgg., die nicht die DE. des W. haben, ist fehlerhaft u. irreführend. Die Definition des Säuregrades nach den direkt gemessenen Millivolt gegenüber einer Normalelektrode gestattet eine fehlerfreie Angabe der Negativität bzw. Positivität u. läßt die „Umladung“ der Neutralkolloide in Säure u. Alkali einfacher beschreiben als die herrschenden Vorstellungen. — Zwischen den Eigenschwingungszahlen der Valenzelektronen nach HEYDWEILLER (Physikal. Ztschr. 26. 553; C. 1925. II. 2241) u. der Hofmeisterschen Ionenreihen bei Kolloidfällungen besteht eine Proportionalität, die die Koagulation wahrscheinlich direkter beeinflußt, als die vielfach überschätzte $[H']$ (Kolloid-Ztschr. 38. 158—65. Prag.)

LASCH.

P. P. v. Weimarn und **T. Hagiwara**, *Amorphielehre ist Irrtum*. Vorl. Mitt. Nach der v. Weimarnschen Theorie von der Vektorialität der Materie unterscheiden sich alle reell existierenden, materiellen Systeme voneinander durch die Größe der in ihrem Innern aus kleineren Strukturelementen vektoriell aufgebauten Bereiche u. dann durch den Grad der Orientierung dieser Bereiche gegeneinander. — Die Substanzen, die einer röntgenoskop. Unters. nach der Debye-Scherrer-Hullschen Methode (Coolidgeöhre mit Mo-Antikathode) unterworfen wurden, waren hochdisperse, nach der physiko-chem. Methode durch Füllen wss. Lsgg. hergestellte $BaSO_4$ -Ndd., außer dem hochdisperse Pulver, die durch mechan. Zerkleinerung deutlicher Krystalle von Fe u. Al-Hydroxyden u. Oxyden erhalten worden waren. — Sämtliche $BaSO_4$ -Ndd. einschließlich der frisch gefällten, gallertigen waren krystallin, von der Struktur des Schwerspates. — Bei genügend starker Zerkleinerung des Goethits erfolgt die Umwandlung dieses Stoffes in Hämatit, was eine Bestätigung der v. Weimarnschen Theorie bedeutet. — Durch extrem starke mechan. Zerkleinerung wurde ein vollkommenes Verschwinden der Interferenzstreifen des Diaspors, Hydrargyllits, Goethits u. Korunds aus dem Debyeogramm erreicht. — Das Auftreten sogenannter „amorpher“ Debyeogramme für $BaSO_4$ u. andere Stoffe ist kein Beweis, daß die untersuchten dispersen Systeme auch wirklich absolut amorph sind, daß in demselben absolut keine Vektorialität vorhanden ist. (Kolloid-Ztschr. 38. 129—36. Physikal. chem. Inst. d. Kaiserl. Univ. Kyoto.)

LASCH.

Jnanendra Nath Mukherjee und **Subodh Gobinda Chaudhury**, *Veränderung der Ladung von Kolloidteilchen mit der Konzentration von Elektrolyten*. I. *Arsensulfid sol und Säuren*. (Vgl. MUKHERJEE, Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 2. 191. 1925; C. 1926. I. 1380.) Die kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit der kolloiden Teilchen von As_2S_3 -Solen verschiedener Herst. wird bei Ggw. von HCl , H_2SO_4 , Oxalsäure, Ameisensäure u. Essigsäure gemessen. Sole, die einige Zeit mit überschüssigem H_2S in Berührung waren, zeigen unregelmäßige Änderungen der Wanderungsgeschwindigkeit mit der Säurekonz., was Vff. durch Nebenrkk. zwischen H u. den Anionen von Polythionsäuren, die durch Oxydation des H_2S entstanden sind, erklären. Bei gleicher $[H']$ verringern Ameisensäure u. Essigsäure die Wanderungsgeschwindigkeit stärker als HCl u. H_2SO_4 , Oxalsäure ist bei kleinen $[H']$ wirksamer bei großen $[H']$ weniger wirksam als HCl u. H_2SO_4 ; das Flockungsvermögen fällt dagegen in der Reihenfolge Chlorid > Oxalat > Formiat > Acetat. Nach der Arbeit von MUKHERJEE (Trans. Faraday Soc. 16. 103. 1921; C. 1922. I. 842.) nimmt bei steigender DE. des Mediums die elektr. Adsorbierbarkeit des entgegengesetzt geladenen Ions zu u. damit die Wanderungsgeschwindigkeit der Kolloidteilchen ab; andererseits sinkt aber der prozentuelle Anteil der Zusammenstöße, die zum Zusammenwachsen der Partikeln führen, d. h. der Flockungswert wächst. Vff. nehmen an, daß nicht zu verdünnte Lsgg. von Ameisensäure u. Essigsäure wegen der Ggw. beträcht

licher Mengen undissoziierter Molekeln eine niedrigere DE. haben als wss. H_2SO_4 oder HCl , u. daß je nach den Bedingungen die die Stabilität erhöhende oder erniedrigende Wrkg. der kleineren DE. überwiegen kann. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. **2**. 296—309. 1925. Calcutta, Univ. Coll. of Science and Techn.)

KRÜGER.

P. C. L. Thorne und **E. W. Pates**, *Nickelsulfidsole*. I. Es werden die Bedingungen für die Beständigkeit der braunen *Ni-Sulfidsole*, die häufig in der analyt. Praxis erhalten werden, untersucht u. die Beobachtungen von THIEL u. OHL (Ztschr. f. angew. Ch. **61**. 396 [1909]) im allgemeinen bestätigt. Diese Autoren schreiben das allmähliche Auftreten der braunen Färbung einer Polymerisation des Ni-Sulfids zu, während Vf. das langsame Anwachsen der Teilchen dafür verantwortlich machen. Es wird eine Methode zur Darstellung. beständiger Sole aus *Nickelammonium-hydroxyd*lsgg. angegeben. (Kolloid-Ztschr. **38**. 155—58. London, Sir JOHN CASS Techn. Inst.)

LASCH.

Emil Hatschek, *Silberchromatschichtungen im Kieselsäure-Gel*. (Vgl. S. 1122.) Entgegen der Beobachtung u. Ansicht von DHAR u. CHATTERJI (Kolloid-Ztschr. **37**. 96; C. **1925**. II. 2251) erhielt Vf. schon vor längerer Zeit bei Verss. im *Kieselsäuregel* ausgezeichnete Schichtenbildung von *Silberchromat*. Bei Wiederholung der Verss. zeigte es sich, daß immer 5—8, manchmal sogar 10 Schichten in dem noch ganz gelb gefärbten Gel liegen, daß also die vollständige Erschöpfung der im Gel vorhandenen Reaktionskomponente unter der letzten Schichtung nicht die notwendige Bedingung für die B. einer weiteren Schicht ist. — Die Schichtungen bestehen durchweg aus 2 Modifikationen des Chromats, teils aus den bekannten, durchsichtigen gelben Nadeln, teils aus undurchsichtigen Krystallen, die im auffallenden Licht blauviolett erscheinen. — Weder die Theorie von BRADFORD (Kolloid-Ztschr. **30**. 364; C. **1923**. I. 486), noch die Theorien der „Membranbildung“ von M. H. FISCHER u. MC LAUGHLIN (Kolloid-Ztschr. **30**. 13; C. **1922**. III. 415) noch die von TRAUBE u. TAKEHARA (Kolloid-Ztschr. **35**. 245; C. **1925**. I. 940) sind mit den Ergebnissen vereinbar. Auch eine Übereinstimmung mit den Theorien von NOTBOOM (Kolloid-Ztschr. **32**. 247; C. **1923**. I. 1549) u. FRICKE (Ztschr. f. physik. Ch. **107**. 41; C. **1924**. I. 626) erscheint zweifelhaft. — Mit der neuesten Theorie von WO. OSTWALD (Kolloid-Ztschr. **36**. 380; C. **1925**. I. 2540) sind die Ergebnisse nicht unvereinbar. (Kolloid-Ztschr. **38**. 151—54. London.)

LASCH.

Lothar Wöhler, *Über die Glimmerscheinung beim Erhitzen der Oxyde von Cr, Fe, Zr, Ti und Magnesiumpyrophosphat*. Es werden die Glimmerscheinungen beim Erhitzen der Hydroxyde des *Cr, Fe, Zr, Ti* u. des *Magnesiumpyrophosphates* untersucht (vgl. Kolloid-Ztschr. **11**. 241; C. **1913**. I. 886). — Beim *Chromoxyd* wird die Glimmerscheinung behindert durch Fällung von sulfathaltiger Lsg. u. durch Fällen aus konz. Lsgg. Gut glimmende Ndd. sind grün, schlecht glimmende bläulich. Die umgebende Atmosphäre u. der W.-Gehalt sind ohne Einfluß auf die Erscheinung, die ohne Gewichtsverlust vor sich geht. — *Eisenoxyd* zeigt das Glimmen nur gut bei Fällung aus siedender Lsg. — *Zirkonoxyd* glimmt nicht, wenn es Verunreinigungen enthält. Metazirkonsäure verglimmt ebenfalls. — Titansäure verglimmt, gleichgültig ob sie heiß oder kalt gefällt wurde. — Die Glimmtemp. wird mit steigender Menge u. Schichthöhe erniedrigt. Sie liegt für 0,8 g Cr_2O_3 bei 530—550°, in Luft schon bei 425° wegen der exothermen Zers. des gebildeten CrO_2 . Fe_2O_3 verglimmt bei 538°, ZrO_2 bei 590° für 0,08 g, für 0,25 g schon bei 435°, TiO_2 bei 500°, $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ erst bei 700°. Die Temp.-Erhöhung durch das Verglimmen hängt von der Vorbehandlung u. Vers.-Anordnung, von der Menge u. spezif. Wärme ab. Sie kann 50—100° bei 0,1 g Substanz getragen. Vf. schätzt die Umwandlungswärme auf 10—20 cal/g. — Durch längeres Erhitzen dicht unter der Glimmtemp. auch schon durch langes Kochen oder Trocknen wird die Glimmerscheinung verhindert oder beschränkt, die Glimmtemp. erhöht. — Die Entwässerung der gelartigen Hydroxyde zeigt die Erscheinung konti-

nuierlicher Tensionserniedrigung mit konstantem W.-Gehalt für jede Erhitzung temp. — Die Adsorption organ. Säuren geht einigermaßen symbat der Intensität der Glimmerscheinung. Die verglimmte adsorbiert nichts mehr oder nur wenig im Vergleich zur Substanz vor dem Verglimmen. Nur bei Pyrophosphat ist kein Unterschied. — Vf. nimmt als Ursache der Erscheinung Oberflächenverbrennung an, während er den etwa nachgewiesenen Übergang amorph-krystallin (vgl. BÖHM, S. 841) nur als Folgeerscheinung der lokal hohen Temp. auffaßt. — Die Dunkelfärbung von Pyrophosphate bei starkem Glühen des Ammonmagnesiumorthophosphats ist vermutlich nur eine Erscheinung der rissigen größeren Oberfläche durch zu schnelle Verlust von H₂O u. NH₃. (Kolloid-Ztschr. 38. 97—111.) LASCH.

Lothar Wöhler und Mark Rabinowitsch, *Über die calorimetrische Oberflächenbestimmung verglimmender Oxyde*. Es wurde die beim Verglimmen von Chromoxyd frei werdende Reaktionswärme im Eis calorimeter gemessen u. ihre Abhängigkeit von der Oberflächenänderung durch Adsorption, als relatives Maß derselben, damit verglichen. Vff. fanden 8—11 cal/g Cr₂O₃ je nach der Fällung aus konz. oder verd. Lsg. — Das Oxyd mit größerer Wärmeentwicklung zeigte auch die stärkere Adsorption. Das verglimmte Oxyd adsorbiert fast gar nicht. Die aus den gefundenen Werte berechnete Oberfläche entspricht der Größenordnung nach den von anderen Autoren berechneten Werten oberflächenreicher Stoffe. (Kolloid-Ztschr. 38. 111—14. Darmstadt, Chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) LASCH.

Mona Spiegel-Adolf, *Hitzeveränderungen am Albumin*. (Vgl. Kolloidchem. Beihefte 20. 288. Kolloid-Ztschr. 35. 342; C. 1925. I. 1956. 2359). Reinstes Serumalbumin (durch Elektrodialyse gereinigt) koaguliert vollständig beim Erhitzen. Das so gewonnene Koagulat vermag durch Behandlung mit verd. Laugen oder Säuren ganz oder teilweise seine W.-Löslichkeit wiederzugewinnen u. ist dann weder auf physikal. noch auf biolog. Wege (Präzipitationsmethode) vom gemeinen Albumin zu unterscheiden. Beim Erhitzen von Albumin in Ggw. von Säuren oder Laugen kann je nach dem quantitativen Verhältnis derselben zueinander ein Teil oder selbst die Hauptmenge seine Löslichkeit in W. beibehalten. Wrkgg. von Neutralsalzzusatz auf das Verh. von Säuren oder Laugenalbumin beim Erhitzen können nur beobachtet werden, wenn der Salzzusatz vor dem Erhitzen erfolgt ist, unabhängig, ob das Albumin bereits denaturiert oder noch W. l. war. Die Ergebnisse scheinen auf die Annahme eines Ringschlusses endständiger Gruppen als Ursachen der Hitzeveränderung hinzu deuten. (Kolloid-Ztschr. 38. 127—29. Wien.) LASCH.

Joseph Lawrence Donnelly, *Die Wirkung bestimmter Zucker und Alkohole auf die Hydrolyse von Methylacetat*. Das Stabilisierungsvermögen u. die Schutzwirkung der Sirupe wird durch M. H. FISCHERS Theorie über das freie u. gebundene W. ausreichend erklärt. Sie gibt auch ein Schema für bestimmte Vorgänge im lebenden Körper. — Zur Prüfung dieser W.-Bindungstheorie wird die Wrkg. bestimmter Zucker u. Alkohole auf die Hydrolysegeschwindigkeit von Methylacetat untersucht. — Zugabe von Dextrose, Saccharose, Glycerin u. A. zu einer Lsg. von Methylacetat in W. vermindert die Hydrolysegeschwindigkeit des Esters. Dies wird dahin erklärt, daß die Zusatzkomponente verhindert, daß das W. unter Hydrolyse mit dem Ester reagieren kann. Die Verminderung ist am stärksten bei Glycerin, A. hat die geringste Wrkg. während Dextrose u. Saccharose eine mittlere Stellung einnehmen. Es hat demnach Glycerin die größte, A. die geringste W.-Bindungsvermögen der untersuchten Stoffe. Die Hydrolysenbeschränkung ist proportional der Menge des zugesetzten Stoffes. (Kolloid-Ztschr. 38. 165—68. Cincinnati U. S. A.) LASCH.

Otto Bartsch, *Über Schaumbildungsfähigkeit und Oberflächenspannung*. Wo OSTWALD u. A. STEINER (Kolloid-Ztschr. 36. 342; C. 1925. II. 1735) geben an, daß der Zusammenhang zwischen Oberflächenspannung u. Schaumbildung irrtümlich ist. Vf. weist dagegen auf seine Arbeit (Kolloidchem. Beihefte 20. 1; C. 1925. I. 2362) hin.

in der gezeigt wird, daß Schaumbildung u. Oberflächenspannung sich antipar verhalten, wenn eine gewisse Konz. überschritten ist. Ist die Sättigungskonz. überschritten, so verlieren die wss. Lsgg. der Schaumbildner ihr Schaumbildungsvermögen. Ein Optimum der Schaumbildung tritt ein, wenn die Grenzflächenschicht eine maximale Heterogenität aufweist, d. h., wenn vom Lösungsm. u. gel. Schaumbildner gleich viel Mole in der Grenzfläche vorhanden sind. Vf. untersucht das Schaumbildungsvermögen homologer Alkohole u. Fettsäuren u. fand, daß erst bei Berücksichtigung der Löslichkeit u. Aufstellung einer relativen, auf die Löslichkeit bezogenen Oberflächenaktivität sich ein Zusammenhang zwischen Oberflächenaktivität u. Schaumbildung herstellen läßt. — Bei lyophilen Kolloiden ist der Einfluß der Oberflächenspannung schwer festzustellen. Auch der von WO. OSTWALD u. STEINER angeführte Einfluß fester Partikelchen auf die Stabilität der Schäume wird in der Arbeit des Vfs. behandelt. (Kolloid-Ztschr. **38**. 177—79. Charlottenburg.) LASCH.

Ram Krishen Sharma, *Die Beziehung zwischen Oberflächenspannung und Viskosität von Flüssigkeiten*. Bestimmt man für 2 Flüssigkeiten solche absol. Temp. T u. T_0 , bei denen ihre Oberflächenspannungen gleich sind, so erhält man eine gerade Linie, wenn man T gegen T/T_0 aufträgt. An den Beispielen *W.*, *Methylalkohol*, *A.*, *Bz.* u. *Essigsäure* wird mit Hilfe der in der Literatur mitgeteilten Daten gezeigt, daß zwischen der Oberflächenspannung λ u. der Viskosität μ die Beziehung $\log \lambda = M \cdot \log \mu + C$ (M u. C Konstante) besteht; für *W.* ist $M = 0,2713$ u. $C = 0,5102$. Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. **2**. 310—11. 1925. Lahore [Indien], Forman Christian Coll.) KRÜGER.

Kshitish Chandra Sen, *Bemerkung über die Permeabilität von Membranen*. Vgl. Journ. Physical Chem. **29**. 517; C. 1925. 641.) *Ferrocyanpuffersole* werden durch Methylalkohol, *A.*, Propyl- u. Butylalkohol in Ggw. geringer Mengen von Elektrolyten gefällt; der Flockungswert ist um so geringer, je höher die Konz. des Sols u. das Mol.-Gew. des Alkohols ist. Diese Beobachtungen stützen die Ansicht von GURKHOT (S. 2308), daß die durch Alkohole bewirkte Permeabilität von Ferrocyanpfermembranen für Rohrzucker auf Koagulation beruht. Die verschiedene Permeabilität für BaCl_2 , CaCl_2 u. KCl läßt sich jedoch nicht auf ähnlicher Grundlage erklären. Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. **2**. 289—92. 1925. Allahabad, Univ.) KRÜ.

S. Gosh, **A. K. Bhattacharya** und **N. R. Dhar**, *Studien über die Adsorption*. XII. *Erklärung der positiven und negativen Gewöhnung, Einfluß der Hydrolyse und ändernder Elektrolyte auf die Koagulation von Arsensulfidol*. (XI. vgl. Journ. Physical Chem. **29**. 659; C. 1925. II. 1515.) Bei der Koagulation von Preußischblau u. As_2S_3 -Sol sind in Ggw. von starken Säuren wie HCl u. HNO_3 die zur Fällung verbrauchten Mengen einwertiger Elektrolyte wie KCl u. KNO_3 geringer als die berechneten. Diese Ergebnisse werden damit erklärt, daß in Ggw. dieser Säuren die Hydrolyse zurückgedrängt u. dadurch die Stabilisierung beeinträchtigt wird. Zur Stützung dieser Annahme wird die Koagulation von As_2S_3 -Sol durch Elektrolytgemische weiter untersucht. Die Hydrolyse der koagulierenden Elektrolyte hat einen weitgehenden Einfluß auf die Koagulation der Sole. Es sind deshalb in Ggw. von $\text{C}_2\text{H}_5\text{COONa}$, NaNO_2 , HCO_3 größere als die berechneten Mengen von KCl bzw. BaCl_2 zur Koagulation von As_2S_3 -Sol erforderlich. — Wird As_2S_3 mit Krystallviolett, Strychnin-, Chininhydrochlorid koaguliert, so sind bei langsamer Zugabe geringere Mengen dieser Elektrolyte erforderlich als bei schneller. Dies widerspricht den von FREUNDLICH (Ztschr. physik. Ch. **44**. 143 [1903]), BANCROFT u. WEISER (Journ. Physical Chem. **25**. 199; C. 1922. I. 164) angenommenen Gewöhnungserscheinungen. Vff. erklären die Gewöhnungserscheinungen durch Adsorption des mit dem Sol gleich bzw. ungleich geladenen Ions. Die Erscheinung wird im Gegensatz zu der von FREUNDLICH beobachteten negativen Gewöhnung genannt. — Vff. sind der Ansicht, daß abnormales erh. bei Verd., sowie gegenüber Elektrolytgemischen, ferner Geschwindigkeits-

zunahme der Kolloidteilchen im elektr. Feld bei Zugabe kleiner Mengen bestimmte Elektrolyte sowie auch die positive Gewöhnung im wesentlichen Zusammenhange miteinander stehen u. hauptsächlich der Stabilisierung des Sols durch Adsorption von gleich geladenen Ionen zuzuschreiben sind. (Kolloid-Ztschr. **38**. 141—51. Chem. Labor. d. Univ. Allahabad, Indien.) LASCH.

A. Magnus und M. Braner, *Über Adsorption*. Nr. 8. *Über die Wärmetönung bei der Adsorption von Kohlendioxyd an Holzkohle*. Es wird die *Adsorptionswärme* von CO₂ an *Holzkohle* in verschiedenen Druck- u. Temp.-Gebieten bestimmt. Die Apparatur, ein W.-Calorimeter, wird beschrieben. — Aus den Tabellen geht hervor, daß mit steigendem Gasdruck p das Verhältnis v/p ständig abnimmt, das Henrysche Gesetz für CO₂ also nicht erfüllt ist. Als Folge der hieraus erkennbaren Abnahme der Adsorptionskraft ist bei steigendem Druck eine Verminderung der Adsorptionswärme zu erwarten, die auch in Übereinstimmung mit TITOFF (Ztschr. f. physik. Chem. **74**. 641 [1910]) gefunden wurde. — Eine kleine Abnahme der Adsorptionswärme bei konstantem Druck u. steigender Temp. konnte nachgewiesen werden. Die Differenz scheint mit steigendem Druck zu wachsen. — Eine Berechnung der Adsorptionswärme aus den beobachteten Isothermen nach FREUNDLICH gab weder die gemessenen Wärmetönungen noch die Temp.-Abhängigkeit richtig wieder. — Es ließ sich zeigen, daß die Lorenz-Landésche Adsorptionstheorie (Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **125**. 47 C. 1923. II. 1102) den Messungsergebnissen etwas besser gerecht wird als die Euckensch (Verhandl. Dtsch. Physik. Ges. **16**. 349 [1914]). Doch sind die von der Theorie geforderten Unterschiede in dem engen, bei den Messungen benutzten Temp.-Intervall zu gering, um eine sichere Entscheidung zuzulassen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **151**. 140—52. Frankfurt, Inst. f. physikal. Chemie Univ.) LASCH.

Jean Effront, *Veränderungen des Adsorptionsvermögens*. (Vgl. S. 2013.) Zusammenfassender Bericht über das Adsorptionsvermögen von pflanzlichen, mineralischen u. tier. Substanzen, wie gekochten u. ungekochten Früchten, Karotten, Tierkohle, Blutkohle, Gelatine, Organbrei usw. Verss. über die Veränderlichkeit der Quellbarkeit, des Einflusses der Rk., der Temp., des Drucks, der Beziehungen zwischen Quellung u. Cholesterin- u. Fettsäuregehalt der Organe oder Adsorption u. Reife der Früchte. Studien über die Adsorption von Filterpapieren, von Bierhefen. (Moniteur scient. [5] **16**. 3—11. 29—36.) OPPENHEIMER.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

Frank R. van Horn, *Hinweis betreffs des Gebrauchs der Speziesnamen der Granatminerale: Amphibol-, Pyroxen- und Turmalingruppe*. (Auszug.) (Amer. Mineralogist **1**. 52—54.) ENSZLIN.

J. Savornin, *Entdeckung von gediegenem Gold bei Djebel Mekum, bei Berguel (Ost-Marokko)*. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 480—82.) ENSZLIN.

Luis Bernal-Granados, *Platin aus Kolumbien*. Kolumbien ist mit einer Jahresförderung (1924) von ca. 1538 kg der größte Platinlieferant der Welt. Vgl. gibt einen geschichtlichen Überblick von den Platinfunden. (Umschau **30**. 21 bis 210.) BRAUNS.

A. L. Hall, *Der Komplex der Bushveld Eruptivgesteine*. Diese Gesteine bilden in Südransvaal einen großen Komplex, welcher am Rande aus basischen Noritten u. im Innern aus Granit besteht. Die Norite sind die älteren Gesteine. In ihnen befinden sich die primären *Platinlagerstätten*, welche in zwei Arten vorkommen. Die erste ist der Dunityp, in dem das Pt in fein verteilter gediegener Form vorkommt. Die zweite der Norittyp liegt meist über dem Dunit u. ist von Anorthosit begleitet. (Journ. Chem. Metallurg. Mining Soc. South Africa **26**. 160—74.) ENSZLIN.

A. Roccati, *Der Kaolin von Bettola an der Westseite des Monte Fenera, Sesiala*. Der Kaolin stammt aus permocarbon. Porphyren. Er tritt zum Teil amorph, zum Teil kristallin mit amorpher Zwischenmasse auf. Die Art seiner Entstehung dürfte als hydrothermale B. anzusprechen sein, da pneumatolyt. Mineralien vollkommen fehlen. Boll. soc. geol. Zt. **41**. Fasc. 3. 180—99. 1922. N. Jahrb. f. Mineral. Abt. B **1926**. I 9—21. Ref. K. WILLMANN.)

ENSZLIN.

Lloyd T. Emory, *Bauxit an der Goldküste*. Die Bauxitlager liegen im Innern des Landes. Sie haben zum Teil ein sehr reines Erz, wie aus einer Durchschnittsanalyse zu ersehen ist. (Al_2O_3 60,55%, Fe_2O_3 9,75%, SiO_2 1,42%, TiO_2 2,21%, $\text{CaO} + \text{MgO}$ 72% u. H_2O 25,59%). Außerdem enthalten die Bauxite noch 0,003% V. Der Vorrat wird auf 4,36 Millionen Tonnen geschätzt. Daneben sind noch etwa 30 Millionen Tonnen ärmeren Erzes (55% Al_2O_3) vorhanden. (Eng. Mining Journ.-Press **121**. 193—46.)

ENSZLIN.

Erich Krenkel, *Die Eisenerze Europas*. Übersichtliche Zusammenstellung der Eisenerze Europas nach geolog. V., Gewinnungsverhältnissen u. Vorräten. (Naturwissenschaften **14**. 173—83. Leipzig.)

JOSEPHY.

Maxime Coutin, *Über eine Molybdänitlagerstätte in Marokko*. Bei Azegour im großen Atlas wurden im Kontakt von metamorphen Schiefern mit einem Granit Molybdänitlager entdeckt. Paragenetisch treten Quarz, Granat, Pyrit u. Pyrrholit auf. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 482—83.)

ENSZLIN.

C. A. Heiland, *Das Erdgasvorkommen von Neuengamme (bei Hamburg) im Lichte geologischer und geophysikalischer Forschung*. (Ein Beitrag zur Kritik der geophysikalischen Aufschlußverfahren im norddeutschen Flachlande.) Das Erdgasvorkommen wird an Hand von Schwere- u. erdmagnet. Messungen, welche eine deutliche Abhängigkeit von dem Grenzflächenverlauf zwischen Diluvium u. Tertiär erkennen lassen, verfolgt. Es handelt sich um einen abgeschlossenen Gasbehälter mit einem Raumhalt von etwa 26 Millionen cbm. Die Eruption des Gases dürfte auf Luftdruckwirkungen zurückzuführen sein, da die Instrumente der Hamburger Erdwarte nichts Auffälliges zeigten. (Geol. Arch. **3**. 205—80. 1924. N. Jahrb. f. Mineral. Abt. B **1926**. 4—5. Ref. E. TAMS.)

ENSZLIN.


G. Siadbei, *Die Radioaktivität des Wassers und Schlammes des Sees von Tékir östl.* Vf. untersucht W. u. Schlamm des 1124 ha großen, in nächster Nähe des schwarzen Meeres liegenden Sees von Tékir Ghoul auf seine Radioaktivität. Der See enthält gel. H_2S sowie freie NaCl u. MgSO_4 ; er scheint ein abgetrennter Teil des beherrschten Meeres zu sein. Die Radioaktivität seines W. ist sehr gering; sie dürfte etwa $7 \cdot 10^{-15}$ g radioaktiver Substanz (Emanation) pro 1 g W. betragen. Die Radioaktivität des Schlammes ist höher, sie wurde nach der Methode von H. W. SCHMIDT auf etwa 0,163 Millimikro-Curie pro 11 W. bestimmt. Vf. ist der Ansicht, daß die therapeut. Wrkg. der Heilwässer nicht ausschließlich auf deren radioaktive Eigenschaften zurückgeführt werden kann, sondern daneben auch ihr Gehalt an gel. Salzen u. kolloidalen Substanzen von Einfluß ist. (Ann. scient. Univ. Jassy **14**. 20—22.) FRBU.

Tutom Kasé, *Die Widmannstättenschen Figuren an Eisen-Kohlenstoff- und Eisen-Nickellegierungen und an Meteoriten*. Die Widmannstättenschen Figuren an Fe-C-Legierungen können erzeugt werden, wenn das Stück mäßig schnell von hoher Temp. abgekühlt wird. Langsame Abkühlung beseitigt diesen Effekt. Ein Meteorit, der bei der 4 c_3 -Temp. ausgeglüht wurde, verlor die bewußte Struktur. Das Auftreten der Widmannstättenschen Figuren an Meteoriten deutet somit darauf hin, daß die Stücke lange einer hohen Temp. ausgesetzt waren u. schnell abkühlten. Der Arbeit sind Kurvenblätter u. Mikrophotographien beigelegt. (The science reports of the Tohoku imp. univ. **14**. 537—58. 1925. Sendai [Japan].)

LÜDER.

D. Organische Chemie.

Gilbert T. Morgan und **Glyn Rees Davies**, *Antimonanaloga der Kakodylye*. (Vgl. S. 343.) Trimethylstibindibromid, $(\text{CH}_3)_3\text{SbBr}_2$, gibt bei 90 mm im CO_2 -Strom destilliert unter Abspaltung von Methylbromid *Dimethylstibinbromid*, $(\text{CH}_3)_2\text{SbBr}$. Analog zersetzt sich Trimethylstibindichlorid bei 600 mm zu *Dimethylstibinchlorid*. Die vorsichtige Oxydation liefert *Dimethylstibinoxyhalogenide*, $(\text{CH}_3)_2\text{SbOX}$. Verdrängt man aus den Dimethylhalogeniden das Halogen mit Zn, Mg, Fe oder Cu zu entfernen, so erhält man das Analogon des Kakodyls zu erhalten, schlugen fehl, indem es nicht gelang, einheitliches Reaktionsprod. zu fassen. Die Anwesenheit des Antimonkakodyls in den Reaktionsprodd. konnte jedoch mit CH_3J festgestellt werden, indem man



eine gelbe Molekülverb. entsteht. Dimethylstibinjodid liefert in CS_2 mit J_2 *Methylstibinjodid*, CH_3SbJ_2 , indem das zunächst entstehende Trijodid schon über -15° CH_3J abspaltet. Analog lassen sich *Dimethylstibintribromid*, *Methylstibindibromid* u. *Methylstibindichlorid* herstellen. Die Bromide lassen sich mit Br in CS_2 bis zum Antimontribromid entmethylieren.

Versuche. Trimethylstibindichlorid (aus Methyl-MgJ u. SbCl_3 u. nach folgender Umsetzung des Trimethylstibins mit Cl) gibt im CO_2 -Strom bei 600 mm destilliert *Dimethylstibinchlorid*, $\text{C}_2\text{H}_6\text{SbCl}$, Kp.₇₅₀ 155–160°, über 40° an der Luft selbstentzündlich. Durch vorsichtige Oxydation *Dimethylstibinoxychlorid*, $\text{C}_2\text{H}_6\text{OClSb}$, weiße, amorphe Masse. Das obige Chlorid liefert in CS_2 mit Cl unter heftiger Kühlung *Dimethylstibintrichlorid*, $\text{C}_2\text{H}_6\text{Cl}_3\text{Sb}$, F. 105–106° (Gasentw.) Trimethylstibindibromid liefert im CO_2 -Strom bei 80–100 mm destilliert *Dimethylstibinbromid*, $\text{C}_2\text{H}_6\text{BrSb}$, Kp.₇₅₀ 175–180°, F. 89°. Die Verb. ist außerordentlich leicht oxydabel u. oxydiert sich sogar unter PAe. Die Analyse wurde in einer eigens hierfür konstruierten Apparatur vorgenommen. Durch vorsichtige Oxydation *Dimethylstibinoxybromid*, $\text{C}_2\text{H}_6\text{OBrSb}$, weißes, amorphes Pulver, wl. in A. Beim Kochen mit W. entsteht *methylstibinsäure*, $\text{C}_2\text{H}_7\text{O}_2\text{Sb}$, weißes, amorphes Pulver. Das obige Bromid liefert bei -10° in CS_2 mit Br *Dimethylstibintribromid*, $\text{C}_2\text{H}_6\text{Br}_3\text{Sb}$, federförmige Nadeln. Aus dem Oxybromid entsteht in W. mit H_2S *Bisdimethylstibintrisulfid*, $[(\text{CH}_3)_2\text{Sb}]_3\text{S}_2$, l. in Bzl. u. Ammonsulfid, F. 76–78°. Trimethylstibinjodid liefert im CO_2 -Strom bei 60–80 mm destilliert *Dimethylstibinjodid*, $\text{C}_2\text{H}_6\text{JSb}$, F. 86°. Durch vorsichtige Oxydation *Dimethylstibinoxyjodid*, $\text{C}_2\text{H}_6\text{OJSb}$, gelbes, amorphes Pulver. Dimethylstibinbromid gibt mit wss. Alkali *Dimethylstibinoxyd*, $\text{C}_4\text{H}_{12}\text{OSb}_2 = [(\text{CH}_3)_2\text{Sb}]_2\text{O}$, an der Luft selbstentzündliches Öl. Dimethylstibinbromid liefert mit Zn erhitzt Antimonkakodyl neben Trimethylstibin, von welchem es nicht getrennt werden konnte. Der Nachweis gelingt mit CH_3J als *Additionsverb.* $[2(\text{CH}_3)_2\text{SbJ}, (\text{CH}_3)_4\text{SbJ}, \text{CH}_3\text{J}]$ (s. o.) = $\text{C}_9\text{H}_{27}\text{J}_4\text{Sb}_3$, aus A. gelbe Nadeln. (Sie läßt sich auch direkt aus den Komponenten herstellen.) Dimethylstibintrichlorid liefert bei 600 mm erhitzt u. resultierende Öl bei 60 mm destilliert *Methylstibindichlorid*, $\text{CH}_3\text{Cl}_2\text{Sb}$, Kp.₆₀ 115–120°. Dimethylstibintribromid verliert im Exsiccator CH_3Br u. gibt *Methylstibindibromid*, $\text{CH}_3\text{Br}_2\text{Sb}$, aus CS_2 u. Ä., F. 42°. Dimethylstibintribromid zersetzt sich spontan zu *Methylstibindijodid*, $\text{CH}_3\text{J}_2\text{Sb}$, aus CS_2 gelbe Nadeln vom F. 110°, l. in CS_2 , Ä. u. Bzl. Alle drei Verbb. geben mit H_2S *Methylstibinsulfid*, CH_3SSb , amorphes gelbes Pulver, F. ca. 70°, wl. in CS_2 u. Bzl. Methylstibindichlorid liefert in verd. gehaltener Lsg. (verd. Alkali) *Methylstibinoxyd*, CH_3SbO , doch ist die Verb. nicht analysenrein. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 110. 523–34.) TAUB.

Gilbert T. Morgan und **Victor E. Yarsley**, *Dimethylstibincyamid, ein Analogon des Kakodylcyanids*. (Vgl. vorst. Ref.) Trimethylstibin liefert in äth. Lsg. mit Br

van *Trimethylstibincyanbromid* u. dieses zersetzt sich beim Erhitzen im Vakuum auf 160—180° zu CH_3Br u. *Dimethylstibincyanid*. Mit feuchter Luft bildet das obige Cyanbromid unter HCN -Verlust *Trimethylstibinoxybromid*.

Versuche. Aus Trimethylstibindibromid mit Zn hergestelltes Trimethylstibin liefert in einer eigens hierfür zusammengestellten Apparatur mit CNBr *Trimethylstibincyanbromid*, $\text{C}_4\text{H}_9\text{NBrSb}$, farblose krystallinische Masse, unl. in k. wasser-eigen organ. Lösungsm. Bei 10 mm auf 160° erhitzt entsteht hieraus *Dimethylstibincyanid*, $\text{C}_3\text{H}_6\text{NSb}$, F. 113—114°, unl. in W., l. in Ä. u. A. Durch Oxydation der Luft entsteht *Dimethylstibinoxycyanid*, $\text{C}_3\text{H}_6\text{ONSb}$, Sintern bei 120°, Zers. oberhalb 120°. W. hydrolysiert das obige Cyanbromid zu *Trimethylstibinoxybromid*, H_4OBrSb , aus A. farblose Nadeln. Zers. ohne F. Hieraus mit Ag_2O *Trimethylstibindihydroxyd*, $\text{C}_3\text{H}_{11}\text{O}_2\text{Sb} = (\text{CH}_3)_3\text{Sb}(\text{OH})_2$ aus W. schwach hygroskopische Krystalle. Mit Pikrinsäure ein saures Pikrat, mit PCl_5 Trimethylstibindichlorid. Mit konz. HCl entsteht aus dem Dihydroxyd *Trimethylstibinoxychlorid*, $\text{C}_3\text{H}_9\text{OClSb}$, als Ä. Platten, aus A. Nadeln, l. in W. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **110**. 4—37.)

TAUBE.

Percival Walter Clutterbuck und Henry Stanley Raper, *Die Oxydation der Acetessigsäure und ihres Esters durch Wasserstoffsuperoxyd und ihre biochemische Bedeutung*. (Vgl. Biochemical Journ. **19**. 385; C. **1925**. II. 1516.) Die Oxydation von α -Acetessigestern oder dem Na-Salz der Acetessigsäure mit H_2O_2 führt in erster Linie zu einer reduzierenden Substanz, die als α -Oxyacetessigsäure oder α,β -Dioxyacetonure angesprochen wird u. leicht unter Verlust von CO_2 in Acetol übergeht. Außerdem werden durch subsidiäre Rkk. gebildet *Diacetylbernsteinsäure*, *Acetonylacetessigsäure* (in erheblichen Mengen), *Acetonylacetone*, *Essigsäure*, *Glyoxylsäure* u. *Oxalsäure*. Werden die Beziehungen dieses Vorganges zu den späteren Stadien der β -Oxydation, die mögliche B. von Kohlenhydraten aus Acetessigsäure u. eine Art der Enttätigung von substituierten Pyrrolen im lebenden Organismus erörtert. (Biochemical Journ. **20**. 59—68. Manchester, Univ.)

SPIEGEL.

Edmund O. von Lippmann, *Bericht (Nr. 84) über die wichtigsten im 2. Halbjahr 1925 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie*. Im vorliegenden Hefen werden Arbeiten aus dem Gebiete der *Monosaccharide* besprochen. (Dtsch. Zuckerind. **51**. 199—200.)


RÜHLE.

F. P. Phelps und C. S. Hudson, *Beziehungen zwischen Drehungsvermögen und Struktur in der Zuckergruppe. XII. Darstellung und Eigenschaften des reinen Methyl-d-lyxosids*. (XI. vgl. HUDSON, PRINGSHEIM u. LEIBOWITZ, S. 2568.) Die Autoren haben nach dem Verf. von BOURQUELOT durch 2,5-stdg. Kochen von 19 g α -Lyxose mit 0,7%ig. methylalkoh. HCl 13 g reinen α -Methyl-d-lyxosids dargestellt; mehrmals aus einem Gemisch von CH_3OH u. Essigestern umgelöst. Krystalle vom F. 108—109°, $[\alpha]_D^{20} = +59,4^\circ$, $[\alpha]_{578}^{20} = +61,9^\circ$, $[\alpha]_{546,1}^{20} = +59,9^\circ$, $[\alpha]_{435}^{20} = +117^\circ$ (W.). Die Werte liegen wesentlich höher als bei EKENSTEIN u. BLANKSMA (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. **58**. 114 [1908]) angegeben haben. $[\alpha]_D$ nähert sich den berechneten Werten. Diese sind: 66° (ber. aus der Drehung der α -d-Lyxose u. des α -Benzyl-d-lyxosids) u. 61° (ber. aus α -Methyl-lyxosid). Das Verhältnis der $[\alpha]$ -Werte für gelbes u. grünes Hg-Licht beträgt 497, ist also von nahezu gleicher Größe wie für Rohrzucker (0,8492) u. für Quarz (350 85). — α -Methyl-d-lyxosid wird sehr schnell hydrolysiert. $k_{98} = 0,0041$ (5-n. HCl). Zum Vergleich wurde unter denselben Bedingungen die Rk.-Geschwindigkeit gemessen bei Maltose (0,019), Lactose (0,0024) u. α -Methyl-d-mannosid (0,0089), Konz. 3 g Zucker in 100 ccm Lsg. Die von ARMSTRONG u. CALDWELL (Proc. Royal Soc. London Serie A. **73**. 530 [1904]) vorausgesagte Erscheinung, daß bei Temperaturen oberhalb von 77° die Lactose schneller hydrolysiert wird als die Maltose, wird durch diese Ergebnisse verifiziert. — Trotz der relativ guten Über-

einstimmung der gefundenen u. berechneten $[\alpha]_D$ -Werte für α -Methyl-d-lyxosi glauben Vff. nicht, daß in dieser Verb. eine 1,5-O-Brücke vorliegt, wie bei der Xylosi sondern eine 1,4-O-Brücke. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 503—07. Washington Bureau of Standards.)

OHLE.

Edmund Langley Hirst und **Alexander Killen Macbeth**, *Die Struktur der normalen Monosaccharide*. III. Rhamnose. (II. vgl. Journ. Chem. Soc. London **127**. 358; C. **1925**. I. 2371.) Vff. schlagen entgegen der Annahme von PRINGSHEIM (vgl. „Zuckerchemie“ **1925**. 102) für die l-Rhamnose u. ihre stabilen Derivv. die amylenoxyd. Struktur vor. — Bei der Methylierung liefert die Rhamnose in allen Fällen nur die n. Trimethylrhamnose (I) (vgl. PURDIE u. YOUNG, Journ. Chem. Soc. London **81**. 1194; C. **1906**. II. 1045), während sonst häufig ein Gemisch von amylen- u. butylenoxyd. Formen methylierter Zucker zu beobachten war (vgl. PRYDE, HIRST u. HUMPHREYS, Journ. Chem. Soc. London **127**. 348; C. **1925**. I. 2369). — Die Oxydation der Trimethylrhamnose mit HNO_3 führte zur l-Arabotrimethoxyglutarsäure (II), die ebenfalls bei der Oxydation von Trimethylarabinose oder bei der Methylierung der l-Trioxylglutarsäure entsteht. Als Zwischenprod. entsteht bei der Oxydation der Trimethylrhamnose Trimethylrhamnonsäure (III). Die Einw. von HNO_3 auf die endständige $-\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{CH}_3$ -Gruppe führt zu einer quantitativen B. von $-\text{COOH}$ u. CO_2 über das Keton $-\text{CO}\cdot\text{CH}_3$. Eine Methylwanderung wurde bei der Oxydation nicht beobachtet, daher konnte von der Konst. der Oxydationsprodd. auf die der methylierten Rhamnose geschlossen werden. Die B. der Arabotrimethoxyglutarsäure kann nur durch die Annahme einer amylenoxyd. Struktur für die n. Trimethylrhamnose erklärt werden, die ist auf die α - u. β -Methylrhamnoside übertragbar u. mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf die Rhamnose.




Versuche. Ein Gemisch von α - u. β -Methylrhamnosid lieferte bei der Methylierung Trimethyl- α -methylrhamnosid. $[\alpha]_D = -15^\circ$ (W.); $[\alpha]_D = -54^\circ$ (A.; c = 2,15). — Die Methylierung der Rhamnose ergab ein Gemisch der α - u. β -Form von Trimethylmethylrhamnosid. Sirup. Kp.₉ 100—101°, $n_D^{18} = 1,4415$, $[\alpha]_D = -11,3^\circ$ (A. c = 1,77), $[\alpha]_D = +11,5^\circ$ (W.; c = 2,001). Bei der Hydrolyse mit 8%ig. HCl steigte die Drehung, nach Durchgang durch ein Minimum (0°), bis auf +19,5° (c = 6,4). D. hierbei isolierte Trimethylrhamnose ist ident. mit der von PURDIE u. YOUNG beschriebenen. — Eine Lsg. von Trimethyl- α -methylrhamnosid (oder Trimethylrhamnosid) wurde mit HNO_3 (D. 1,2) bis zum Oxydationsbeginn vorsichtig auf 85° erhitzt. R. nach 4 Stdn. beendet. Danach noch 2½ Stdn. erhitzt. Das von HNO_3 befreite u. getrocknete Oxydationsprod. wurde mit saurem CH_3OH verestert u. ergab Dimethyl l-arabotrimethoxyglutarat. Sirup. Kp.₉ 135°, $n_D^{20} = 1,4350$, $[\alpha]_D = +47^\circ$ (CH_3OH ; c = 1,706). Für das entsprechende Na-Salz $[\alpha]_D = +25^\circ$. — Die Verseifung der Ester mit trockenem NH_3 gesätt. CH_3OH ergab das Diamid. Ausbeute 63%. Aus CH_3OH . F. 230°, $[\alpha]_D = +50,4^\circ$ (W.; c = 0,6942). (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 22—26. Durham, Univ.)

BEREND.

L. H. Dejust, *Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die wässerigen Lösungen einiger reduzierender Zucker. Wirkung auf die Glucose.* Im Gegensatz zu PINCUSSE (Ztschr. f. d. ges. exp. Med. **26**. 127; C. **1922**. I. 1082) kann ein Einfluß d.

Bestrahlung auf Lsgg. von Glucose nicht festgestellt werden. (C. r. soc. de biologie
 14. 123—24. Paris. Labor. du Prof. JEANSELME.) OPPENHEIMER.

William Robert Fearon und **Gerald Cecil Dockeray**, *Eine Mitteilung über die Hydrolyse der Cyansäure*. Verss., bei denen die Hydrolyse so weit fortgesetzt wurde, bis die Lsg. infolge B. von NH_3 deutlich alkal. geworden war, u. bei denen zur Fällung des Carbonats Überschuß von $\text{Ba}(\text{OH})_2$ verwendet wurde, ergaben eine größere Konz. an *Carbaminsäure*, als die B. aus Ammoniumcarbonat als Gleichgewichtskomponente erfordern würde. Es wird daraus gefolgert, daß die Carbaminsäure das erste Stadium bei der Hydrolyse der Cyansäure darstellt u. wahrscheinlich durch direkte Hydratation der Ketoform entsteht. Der Vorgang wird daher folgendermaßen formuliert:



Biochemical Journ. 20. 13—16. Dublin, Trinity Coll.)

SPIEGEL.

Alexander Hynd, *Untersuchungen über die Wechselwirkung von Aminoverbindungen und Kohlenhydraten*. I. *Die Wirkung von Harnstoff auf Glucose, Fructose und Mannose*. Zusatz von Harnstoff zu alkoh. oder wss. Lsg. von Glucose verursacht langsam bei gewöhnlicher Temp. u. bei 37°, etwas schneller bei 50°, in einigen Std. bei ca. 80° ein Herabgehen des Drehungsvermögens bei unveränderter Cu-Zahl. Es konnte festgestellt werden, daß die Abnahme von α nicht auf Wrkg. von Mikroorganismen u. wahrscheinlich auch nicht auf B. von *Ureid* beruht. Es geht mit ihr ein Wachsen des β u. positive Seliwanoffsche Rk. einher. Da auch *Fructose* u. *Mannose* ähnliche Resultate geben, die erste in stärkerem, die zweite in schwächerem Grade, dürfte es sich um Umlagerungen nach Art der von LOBRY DE BRUYN festgestellten handeln. Doch konnten im Falle der Glucose bisher keine Derivv. von Fructose u. Mannose aus der veränderten Lsg. isoliert werden u. ist auch die B. von Iminen nicht ausgeschlossen. Ob die Seliwanoffsche Rk. für Ketosen spezif. ist, erscheint zweifelhaft. Harn mit reichlichem Gehalt an Glucose geben sie, u. man kann nach obigem annehmen, daß hieran meist die Einw. des Harnstoffs schuld ist. Andererseits wurde gefunden, daß Zusatz von Harnstoff zu 0,1%ig. Lsg. von Fructose, die für sich deutlich reagiert, die Rk. völlig verdecken kann. Sie ist daher für *Nachweis von Fructose im Harn* von geringem Werte. (Biochemical Journ. 20. 195—204.)

SPIEGEL.

Alexander Hynd, *Untersuchungen über die Wechselwirkung von Aminoverbindungen und Kohlenhydraten*. II. *Die Darstellung von Glucoseureid*. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Darst. nach SCHOORL (Rec. trav. chim. Pays-Bas 22. 31; C. 1903. I. 1079) ist umständlich u. gibt schlechte Ausbeuten, an reinem Ureid nur ca. 10%. Die Übelstände wurden größtenteils beseitigt durch Anwendung eines Überschusses von Harnstoff, gleicher Mengen wie von Glucose, wobei das Ureid zunächst als Additionsverb. mit Harnstoff erhalten wird. Die Kondensation wird wie bei SCHOORL in Ggw. von H_2SO_4 bei 50° vorgenommen, die Säure wird dabei neutralisiert, so daß Anwendung von BaCO_3 vor der weiteren Verarbeitung sich erübrigt; auch von der Beseitigung überschüssiger Glucose durch Gärung konnte Abstand genommen werden. Die Lsg. wurde vielmehr direkt unter vermindertem Druck bei 37° zum dünnen Sirup verdampft, der bei Abkühlen bald zur Krystallmasse erstarrte. Der Glucoseureidharnstoff wurde durchschnittlich 66% Ausbeute (der theoret.) gewonnen u. liefert bei mehrtägigem Kochen mit wiederholt erneuerten Mengen absol. A. fast reines Glucoseureid in nahezu theoret. Ausbeute. — *Glucoseureidharnstoff*, $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_6\text{N}_2\cdot\text{CH}_4\text{ON}_2$, mkr. meist zu respitzte Prismen (aus W.), F. 171—172°, $[\alpha]_D = -18,18^\circ$ (c = 2,5856), ll. in W., wl. in A. oder CH_4O , fast unl. in Aceton, unl. in Ä., Chlf., usw. bei Kochen der wss. Lsg. unter Entw. von NH_3 zers. (Biochemical Journ. 20. 205—9. Univ. of St. Andrews.)


SPIEGEL.






R. F. Hunter, *Die Chemie der polycyclischen Systeme in ihrer Beziehung zu ihren homocyclischen, ungesättigten Isomeren*. III. *Die Vortäuschung benzolischer Eigenschaften durch den 5-Kohlenstoff-Intraannularkern*. (II. vgl. S. 2568.) Vf. diskutiert das Verh. der 5-cyclo-Hexanspirodicyclopentan-3-on-1,2-dicarbonensäure bei der Oxydation u. Bromierung, bei welchen Rkk. sich der Fünfring, welcher durch Auflösung der cyclo-Propan-Brückenbindung entstehen kann, wie ein Benzolderiv. verhält. (Chem. News **132**. 133—37. Highbury New Park.) TAUBE.

Georg Weißenberger, Richard Henke und Lazar Bregmann, *Zur Kenntnis organischer Molekülverbindungen*. XVI. *Zweiwertige Phenole und ihre Äther*. (XV. vgl. S. 2455.) Für die weiter unten angeführten Unterss. wurden die Konstanten a u. b der van der Waalschen Gleichung für *Guajacol* zu $a = 20,075$; $b = 0,0945$, *Veratrol* $a = 20,560$, $b = 0,1121$ u. *Salicylaldehyd* $a = 10,472$, $b = 0,0795$ bestimmt. Die Systeme *Brenzcatechin*-A., -Ä. u. -Aceton zeigen negative Dampfdruckkurven, im System mit A. liegt eine Molekülverb. 1:2 vor, mit Aceton eine solche 1:1. Dieselben Verhältnisse zeigen die Systeme *Resorcin*-A., -Ä. u. -Aceton. Die Systeme *Guajacol*-A., -Ä. u. -Aceton besitzen negative Dampfdruckkurven, das Guajacol bindet in ihnen genau halb so viele Moll. als seine Muttersubstanz, das Brenzcatechin, somit ist jedes phenol. Hydroxyl für sich wirksam. Dies erhellt ebenfalls aus der Tatsache, daß in den Molekülverbb. der Phenole auf je 2 Moll. eines Phenols so viel Moll. der zweiten Komponente (Ä. u. Aceton) kommen, als das Phenol freie Hydroxyle trägt. Die Systeme *Veratrol*-A., -Ä. u. -Aceton sind durchweg positiv, durch die Methylierung haben die Hydroxyle ihre Wirksamkeit vollkommen eingebüßt. Ebenfalls positiv sind die Systeme *Salicylaldehyd*-A., -Ä. u. -Aceton; durch die in o-Stellung zum OH stehende Aldehydgruppe wird die Wirksamkeit des Hydroxyls fast vollkommen ausgelöscht. In Bzl. zeigen sämtliche Verbb. positive Kurven, was die Tatsache bestätigt, daß phenol. Hydroxyle auf Bzl. nicht ansprechen. Ferner wurden die Viscositäten u. Oberflächenspannungen der genannten Systeme bestimmt. (Monatshefte f. Chemie **46**. 471—82. 1925. Wien, Univ.) TAUBE.

Peter Knudsen, *Notiz zur Frage der Benzoylierung des Methylendiacetamids*. In seiner Arbeit über Methylendiamin (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **47**. 2698 [1914]) glaubte Vf. beim Vers., Methylendiacetamid zu benzoylieren, *Methylendibenzooat* als öliges Prod. erhalten zu haben. Beim Erstarren des Körpers entstand eine Verb. vom F. 42—43°. Es stellt sich nun heraus, daß diese *Benzoessäureanhydrid* ist, u. die auf Methylendibenzooat gut stimmenden Analysenzahlen erklären sich höchstwahrscheinlich daraus, daß das ölige Prod. *Formaldehyd* enthielt, der noch in der 11 Jahre aufbewahrten festen Substanz nachweisbar war. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 367. Hörup b. Sonderburg.) SCHUSTER.

Herbert Greene, *4- und 4'-Methoxybenzoylbenzoin*. GREENE u. ROBINSON (Journ. Chem. Soc. London **121**. 2182; C. **1923**. I. 1454) haben gezeigt, daß Benzoyl-3,4-methylendioxymandelsäurenitril sich mit Benzaldehyd zu 3,4-Methylendioxybenzoylbenzoin (I), Benzoylmandelsäurenitril mit Piperonal zu 3',4'-Methylendioxybenzoylbenzoin (II) kondensiert. Analog können auch die Piperonylfurylisomeren III u. IV erhalten werden, ebenso liefert Anisaldehyd mit Benzoylmandelsäurenitril 4'-Methoxybenzoylbenzoin (V), während Benzoyl-p-methoxymandelsäurenitril u. Benzaldehyd 4-Methoxybenzoylbenzoin (VI) geben. Mit einer k. Lsg. von Na-Äthylat geben beide Isomeren p-Methoxybenzoin. Kondensationen von Benzoylmandelsäurenitril u. Furfurol einerseits u. Benzoylfurfurolcyanhydrin (VII) u. Benzaldehyd andererseits liefern beide Gemische von Benzoylbenzoin u. Benzoylfuroin, woraus Vf. Schlüsse über den Reaktionsmechanismus zieht.





Versuche. Furfural, Benzoylchlorid u. KCN liefern in W. miteinander geschüttelt Benzoylfurfuroleyanhydrin, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_3\text{N}$, aus 90% A., F. 49°. Hieraus mit Na-Äthylat in A. Benzoylfuroin, $\text{C}_{17}\text{H}_{12}\text{O}_5$, aus A., F. 92–93°, in konz. H_2SO_4 tief-rüne Färbung. (Als Nebenprod. entsteht wenig Furil, F. 164°.) Benzoyl-p-methoxy-nandelsäurenitril u. Benzaldehyd kondensieren sich mit NaOC_2H_5 zu 4-Methoxy-enzolbenzoin, $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{O}_4$ (VI), aus A., F. 119,5–120,5°. (Die Verb. wurde früher l. c.] als 4'-Methoxyderiv. angesprochen.) Benzoylmandelsäurenitril liefert mit Anis-
aldehyd u. NaOC_2H_5 kondensiert 4'-Methoxybenzoylbenzoin, $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{O}_4$ (V), aus 90% A., F. 127–128°, in konz. H_2SO_4 messinggelbe Färbung. Benzoylmethylenedioxy-mandel-
säurenitril kondensiert sich mit Furfural u. NaOC_2H_5 zu Piperonyl- α -furylcarbinyl-
enzoat, $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_6$ (III), aus Toluol, Eg. u. A., F. 132,5–133,5°. Piperonal kondensiert
sich mit Benzoylfurfuroleyanhydrin u. NaOC_2H_5 zu α -Furoylpiperonylcarbinylbenzoat,
 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_6$ (IV), aus Eg., Toluol u. 90% A., F. 140–141°, in konz. H_2SO_4 rote Färbung.
Für die 3,4- u. 3',4'-Methylenedioxybenzoylbenzoine I u. II werden verbesserte Her-
stellungsmethoden angegeben. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 328–36. Khartum,
Mudan, Wellcome Unters. Lab.)


TAUBE.

S. Danilow und E. Venus-Danilowa, Die Isomerisation der Aldehyde zu Ketonen
und ihr Zusammenhang mit der Dehydratation α -sekundär-tertiärer Hydrobenzoin-
lykole. Die Arbeit ergänzt frühere Unterss. (DANILOFF, Journ. Russ. Phys.-Chem.
tes. 49. 282. 51. 109; C. 1923. III. 1017. 760) über die Isomerisation von Triphenyl-
acetaldehyd zu Triphenyläthanon u. berichtet über die Umlagerung von Trimethyl-
acetaldehyd zu Methyl-*i*-propylketon u. von Diphenyl-cyclo-hexylacetaldehyd in Benz-
yldryl-cyclohexylketon. Es ist anzunehmen, daß die Umwandlung bei allen Aldehyden
auftritt, bei denen es gelingt, die Aldol- u. andere Kondensationsrkk. zu vermeiden.
Triphenylacetaldehyd geht beim Erwärmen mit einem Gemisch von Essigsäure u.
 PCl_5 oder mit 45%ig. H_2SO_4 teilweise in das Keton über. Bei Einw. von PCl_5 gewinnt
man in der Kälte ein Gemisch von Aldehyd u. Keton, beim Erwärmen das Triphenyl-
äthylketon. Beim Auflösen des Aldehyds in H_2SO_4 verwandelt er sich vollständig
in das Keton. Das Oxim des Triphenylacetaldehyds gibt beim Erwärmen mit 40%ig.
 H_2SO_4 ein Gemisch von Aldehyd u. Triphenyläthanon, ebenso das Semicarbazon
beim Erwärmen mit 50%ig. H_2SO_4 . — Der Triphenylacetaldehyd stellt eine gut kry-
stallisierbare Substanz dar. F. 105,5°. Er gibt ein Oxim (F. 190°), Semicarbazon
F. 223°, Mol.-Verb. mit A.), Phenylhydrazon (F. 142°). Er wird reduziert zu Tri-
phenyläthanol (F. 110,5°), charakterisiert durch ein Urethan (F. 205–206°), ein Acetat
F. 136°), oxydiert zu Triphenylessigsäure u. Triphenylcarbinol. Alkoh. KOH spaltet
in HCOOH u. Triphenylmethan. Beim Erwärmen mit Essigsäure ging Triphenyl-
acetaldoxim in Triphenylacetonitril über, das sich in Triphenylessigsäure überführen
ließ. — Die Umwandlung des Triphenylacetaldehyds in Triphenyläthanon wurde
zuerst bei der Dehydratation des Phenylhydrobenzoin beobachtet. Je nach
den Rk.-Bedingungen wird ein wechselndes Gemisch von CO-Verbb., Triphenyl-
acetaldehyd u. Triphenyläthanon oder nur das Keton erhalten, das Gemisch bei Einw.
von verd. H_2SO_4 , von P_2O_5 , das Keton mittels konz. H_2SO_4 , essigsaurer Lsg. von
Br oder PCl_3 in Chlf.-Lsg. Ebenso wirken verschiedene saure Reagenzien auf cyclo-
hexylhydrobenzoin, Oxalsäure u. verd. H_2SO_4 unter B. von cyclo-Hexyldiphenyl-
acetaldehyd u. der Ketone $(\text{C}_6\text{H}_5)_2(\text{C}_6\text{H}_{11}) \cdot \text{CH} \cdot \text{CO} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$ u. $(\text{C}_6\text{H}_5)_2 \cdot \text{CH} \cdot \text{CO} \cdot \text{C}_6\text{H}_{11}$.

konz. H_2SO_4 unter B. des letzteren Ketons. Dieses Verh. der Hydrobenzoine steht im Zusammenhang mit der Eigenschaft der Aldehyde, sich zu Ketonen zu isomerisieren u. veranlaßte die Unters. des Einflusses verschiedener saurer Reagenzien auf die Isomerisation des Triphenylacetaldehyds zum Keton. Die Ketone $\text{Ar} \cdot \text{R} \cdot \text{CH} \cdot \text{CO} \cdot \text{Ar}$ u. $(\text{Ar})_2\text{CH} \cdot \text{CO} \cdot \text{R}$ isomerisierten sich mittels konz. H_2SO_4 nicht mehr. Im allgemeinen läßt sich folgern: Entsteht bei Dehydratation von Hydrobenzoinglykolen ein Gemisch von Aldehyd u. Ketonen, so läßt sich — durch Isomerisation des Aldehyds — die relative Menge der entstandenen Ketone durch Anwendung von konz. Säure oder höherer Temp. verändern, entstehen aber nur Ketone, so läßt sich durch Änderung der gewöhnlichen Rk.-Bedingungen das Verhältnis der Ketone zueinander nicht ändern.

Versuche. *Trimethylacetaldehyd*, über N-Trimethyläthylidenanilin (neben geringen Mengen Methyl-i-propylketon); Kp.₇₅₈ 74°. Oxydation zu *Trimethyllessigsäure*; Semicarbazon, F. 190,5°. — *Polymerer Trimethylacetaldehyd*. Aus dem Monomeren mittels konz. oder 70%ig. H_2SO_4 oder durch Gemisch von Essigsäure u. HCl. Aus Ä. + A. seidenartige Krystalle, F. 82,5°. Unl. in W. u. Säuren, ll. in Ä., wl. in A. Reagiert weder mit fuchsinschwefliger Säure noch mit ammoniakal. AgO-Lsg. Gibt bei Dest. mit verd. H_2SO_4 Trimethylacetaldehyd. — Die Isomerisation des Trimethylacetaldehyds zu *Methyl-i-propylketon* wurde mit H_2SO_4 verschiedener Konz. u. mit Essigsäure + HCl vorgenommen. Die beste Ausbeute ergab konz. H_2SO_4 . — *Methyl-i-propylketonsemicarbazon*, F. 114°. Aus dem Keton oder durch Umlagerung des Trimethylacetaldehyds semicarbazons mittels alkoh.-wss. H_2SO_4 bei 130°. — *cyclo-Hexylhydrobenzoin* (*Diphenyl-1,2-cyclo-hexyl-1-äthandiol-1,2*), $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_2$, aus cyclo-Hexylmagnesiumbromid u. Benzoin. Krystalle aus CCl_4 , dann Bzl. + Lg., dann aus A., F. 159,5°. Wl. in Ä., ll. in A. — *Monoacetat*, $\text{C}_{22}\text{H}_{26}\text{O}_3$. Aus Bzl. + Bzn., F. 174°. — *Diphenyl-cyclo-hexylacetaldehyd*, $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}$. Durch Dehydratation des cyclo-Hexylbenzoin's mittels Oxalsäure oder verd. H_2SO_4 neben *cyclo-Hexyl-desoxybenzoin*, F. 120° u. *Benzhydrol-cyclo-hexylketon*, F. 56° (welches bei Dehydratation mit konz. H_2SO_4 unter 0° ausschließlich entsteht). Krystalle aus A. + Chlf., F. 124°. Spaltung in HCOOH u. in *Diphenyl-cyclo-hexylmethan*, F. 58,5°. — *Oxim*, $\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{ON}$. Aus A., F. 161°. — *Semicarbazon*, $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{ON}_3$ bzw. + $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ oder + C_6H_6 . Aus A. bzw. Bzl. F. im zugeschmolzenen Röhrchen 162–169° bzw. 140–170°, im offenen Röhrchen F. 183°. — Isomerisation des *Diphenyl-cyclo-hexyl-acetaldehyds* mittels konz. H_2SO_4 ergibt *Benzhydryl-cyclo-hexylketon* (*1,1-Diphenyl-2-cyclohexyläthanon-2*), $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}$. Aus Bzl. + PAe. F. 56°. Läßt sich durch alkoh. KOH in *Diphenylmethan* u. *cyclo-Hexancarbonsäure* überführen. — Isomerisation des *Triphenylacetaldehyds*. Durch Eintragen in H_2SO_4 ($d = 1,84$) von -10° wird aus dem Aldehyd reines *Triphenyläthanon*, F. 136°, erhalten. — *Triphenylacetylchlorid* ergab bei der katalyt. Red. in Ggw. von Pd-BaSO₄ nicht den Aldehyd, sondern nur Triphenylmethan. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 377–87. Leningrad, Univ.) SCHU

W. Borsche, *Studien über die Synthese von Phenolketonen nach Hoesch*
 I. W. Borsche und C. Walter, Über „Hydroxybenzile“. Nach Unterss. der Vff. bilden sich bei der Kondensation von Benzoylcyaniden mit mehrwertigen Phenolen keine „Hydroxybenzile“, die MARSH u. STEPHAN (Journ. Chem. Soc. London 127. 1633. C. 1925. II. 1847) erhalten zu haben glauben. Im Fall der Kondensation von Benzoylcyanid bzw. p-Methoxybenzoylcyanid mit Resorcin reagieren nach den Mol.-Gew. Bestst. 2 Moll des letzteren mit 1 Mol Arylglyoxyssäurenitril. Da zunächst leicht hydrolysierbare Ketonimide entstehen, die bei der Hydrolyse Prodd. ergeben, die nur noch 3OH-Gruppen, kein Ketoncarbonyl mehr enthalten, nehmen Vff. als am wahrscheinlichsten die Konst. von Anhydriden tetrahydroxylierter Diphenylbenzoylcarbinole (I) für sie an. Die Natur der Kondensationsprodd. von Arylglyoxyssäurenitrilen mit Phloroglucin konnte noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden.




Versuche: *Phenyl-2,4-dioxyphenyl-dioxybenzoylcarbinolanhydrid*, $C_{20}H_{14}O_5$. Aus Benzoylcyamid u. Resorcin in Ä. mittels $ZnCl_2$ u. HCl über das durch HCl zerlegbare salzsaure Salz des Ketimids. Farblose Nadeln aus 40%ig. A. F. 242°. Swl. in h. W., wl. in Bzl. u. Chlf., ll. in CH_3OH , A., Aceton u.

Essigester. Reagiert nicht mit NH_4OH , Semicarbazid, $C_6H_5-NH-NH_2$, läßt sich nicht zu 2,4-Dioxybenzilsäure umlagern. Kuppelt mit Diazobenzol unter B. eines roten Farbstoffs, wird von H_2 in Ggw. kolloidalen Pd in alkoh. Lsg. nicht verändert, während Benzil unter den gleichen Bedingungen zu Benzoin reduziert wird. Mol.-Gew. gef. 318, 337. — *Triacetylderiv.* $C_{26}H_{20}O_8$. Farblose Krystalle aus A. F. 159°. — *Tribenzoylderiv.*, $C_{41}H_{26}O_8$. Aus Aceton farblose Krystalle. F. 204°. — *Tetrabromderiv.*, $C_{20}H_{10}O_5Br_4 + 2C_2H_4O_2$. Krystalle, aus Eg. F. 246—247°, nach Sintern bei 125°. — *Trimethyläther*, $C_{20}H_{12}O_5Br_4(OCH_3)_3$. Mittels Diazomethan. Farblose Krystalle aus Ä. F. 177—178°. — *p-Methoxy-i-nitrosoacetophenon*, $C_9H_9O_3N$. Aus p-Methoxyacetophenon u. i-Amylnitrit durch Eintropfen in Na-Äthylat-Lsg.; farblose Nadeln aus Chlf. F. 120°. Daraus *p-Methoxybenzoylcyamid*, $C_9H_7O_2N$. Farbloses, schnell erstarrendes Öl. Kp.₁₂ 145—150°. — *p-Methoxyphenyl-2,4-dioxyphenyldioxybenzoylcarbinolanhydrid*, $C_{21}H_{16}O_6$. Farblose Blättchen aus verd. A. F. 229—230°. Lsg. in H_2SO_4 tiefblau. Lösungsverhältnisse wie beim OCH_3 -freien Stoff. — Aus Cinnamoylcyamid u. Resorcin konnte kein kristallisiertes Prod. erhalten werden, mit Phloroglucin ein Prod. vom F. 142—143°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 461—66. Göttingen, Univ.)

SCHUSTER.

Ernst Weitz und Kurt Fischer, Radikale und merichinoide Verbindungen. I. Die Dipyridinium-subhalogenide. (Zugleich 6. Mitteilung „Über freie Ammonium-Radikale“.) Mit vorliegenden Unterrss. bestätigen Vff. ihre schon in der letzten Abhandlung, die als 5. Mitteilung über freie Ammoniumradikale veröffentlicht wurde (vgl. WEITZ, KÖNIG u. VON WISTINGHAUSEN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 156; C. 1924. I. 777) dargelegte Anschauung, daß die von EMMERT, JUNGK u. HÄFFNER (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1792; C. 1925. I. 85) als dimere Chinhydrone (I) aus 1 Mol. Dipyridiniumdihalogenid + 1 Mol. Dihydropyridyl (IV) formulierten tieffarbigem Verbb. tatsächlich einfach-monomolekulare Mono- oder Subhalogenide (II) der zweiwertigen Dipyridiniumradikale (III) [valenztautomer zu IV] sind. Die Mol.-Gew.-Bestst. wurden in einem vervollkommeneten Siedeapp. ausgeführt. Als Mittelwert der Bestst. für das *Dibenzylidipyridiniumchlorür* wurde 197 u. für das *N,N'-Diphenyl-dipyridiniumchlorür* der Wert 174 gefunden. Hingegen hatten EMMERT u. Mitarbeiter gefunden, daß das Mol.-Gew. des *Dibenzylidipyridiniumchlorürs* in sd. CH_3OH erheblich mehr, nämlich 255 betrage, d. i. nahezu $\frac{1}{3}$ des Mol.-Gew. des dimeren Chinhydrons. Zur Begründung nehmen sie Dissoziation des Chinhydrons in sein dimeres Kation u. die $2Cl^-$ -Ionen an u. stützen damit ihre Formel I. Durch das Auftreten von 4 Bruchstücken bei den Verss. der Vff. ist der Dissoziationsgrad in vorliegenden Verss. eindeutig bestimmt. Die Ionisation ist so gut wie vollständig. Der Zerfall in 3 Bruchstücke kann auch anders als bei EMMERT (völlige Ionisation bei dimerem Kation) gedeutet werden, näm-




lich so, daß die Ionisation unvollständig u. dafür das Kation in seine Komponenten dissoziiert oder überhaupt monomolekular ist. Vff. haben dann auch nachweisen können, daß auch bei starkem Verdünnen das Dibenzylidipyridiniumsubchlorid dem Beerschen Gesetz folgt. Auch das chem. u. elektrochem. Verh. der Subhalogenide deutet darauf hin, daß diese eine ganz selbständige Oxydationsstufe u. nicht bloß eine lockere Komplexverb. aus Radikal u. Dihalogenid sind. Wichtig ist ferner, daß die Dibenzylidipyridiniumsubhalogenide sich in Eg. unzers. lösen, während das freie Radikal nur unter Zers. gel. wird.

Zur Struktur der Subhalogenide ist zunächst zu sagen, daß sie der Zus. nach einwertige Radikale u. zwar Ammoniumradikale sind. Man formuliert die Dipyridiniumsubhalogenide besser nicht so, daß die eine Molekülhälfte ein vollwertiges freies Ammonium, die andere ganz Ammoniumsalz ist (V), sondern man tut gut, die Auffassung der Subhalogenide als „intramolekulare Chinhydrone“ valenzchem. zu erweitern. Vff. formulieren dies folgendermaßen: „So wie jedes der beiden N-Atome gleichmäßig an der Bindung des Anions beteiligt ist, so verteilt sich auch die freie Affinität des einwertigen Ammoniumradikals auf die beiden Mol.-Hälften.“ Auf Grund der neuen Anschauungen über homöopolare Bindungen wird in diesem Falle die Affinitätsverteilung vorstellbar. Die durch das schwingende Elektron bewirkte Oszillation des Oxydationszustandes verursacht auch die tiefe Farbe der Subhalogenide. Die Oszillation bei diesen gewissermaßen intramolekularen Chinhydrone findet hier zwischen den beiden Hälften eines Einzelmoleküls statt. Die Anschauung von dem schwingenden Elektron kann man auch auf Farbstoffklassen, wie z. B. die Triphenylmethanreihe, übertragen. Gegenüber der alten Baeyerschen Oszillationstheorie sind es hier nicht Atome, sondern nur Elektronen, die schwingen. — Die Existenz des von EMMERT (l. c.) beschriebenen komplizierter zusammengesetzten Chinhydrone (1 Mol. Dibenzylidipyridinium + 2 Moll. Dijodid) u. ähnlichen polynuklearen Verbb. steht nach Darlegung der Vff. nicht im Widerspruch mit der experimentell begründeten monomolekularen Formulierung der Monohalogenide. Die von den Vff. am Beispiel der Dipyridiniumsubhalogenide entwickelten Anschauungen lassen sich auf alle merichinoiden Verbb. übertragen. Alle merichinoiden Salze sind monomolekular zu formulieren (als Radikale), die ihnen zugehörigen „Chinhydrone“ dagegen dimolekular. — Im Anschluß beschreiben Vff. eingehend ihre verbesserten Methoden, um die recht komplizierten Mol.-Gew.-Bestst. auszuführen. Es sei in diesem Zusammenhang auf die Zeichnungen der App. im Original hingewiesen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 432—45. Halle, Univ.)

HORST.

Gilbert T. Morgan, Wilfred John Hickinbottom und Thomas Vipond Barker, Stereoisomere Diaryl- β,γ -diamino-*n*-butane. *d,l*-Di-*p*-tolyl- β,γ -diamino-*n*-butan (I) (Journ. Chem. Soc. London 123. 97; C. 1923. I. 943) fällt, aus PAe. krystallisiert, zwischen -15° u. $+30^{\circ}$ als Konglomerat der *d*- u. *l*-Modifikationen aus. Diese lassen sich durch Auslesen u. Animpfen der unterkühlten Lsgg. trennen, sowie nach folgendem neuen Verf. Aus dem Konglomerat wird ein möglichst gut ausgebildeter, einheitlicher Krystall ausgesucht u. durch den Mischschmelzpunkt mit den zu untersuchenden Fraktionen festgestellt, ob sie einheitlich u. mit dem Standardkrystall identisch, bezw. verschieden sind. **I** reagiert mit Formaldehyd zu cyclo-Methylendi-*p*-tolyl- β,γ -diamino-*n*-butan (**II**), welche Verb., wenn aus der *d,l*-Form von **I** hergestellt, racemoid auskrystallisiert. Mit Äthylendibromid liefert **I** bei Ggw. von Alkali 1,4-Di-*p*-tolyl-2,3-dimethylpiperazin (**III**). Die Verb. ist als pseudoracemoid anzusprechen. Die Kondensation von Anilin an Stelle von Toluidin (l. c.) mit β,γ -Dibrombutan gibt Diphenyl- β,γ -diaminobutan (**IV**). Die *d,l*- u. meso-Formen sind Öle, die erstere kann jedoch in Form ihres Piperazins **V** krystallinisch erhalten werden u. erweist sich als racemoid. Wird obige Kondensation bei höheren Temp. u. einem Überschuß an Anilin ausgeführt, so entsteht in geringen Ausbeuten 5-Methylacridin.





Versuche. p-Toluidin u. β,γ -Dibrombutan liefern 36 Stdn. auf 150—160° erhitzt u. die resultierenden Diamine über die Hydrochloride u. Pikrate getrennt 36% d,l- u. 12% meso-Di-p-tolyl- β,γ -diamino-n-butan (I). Die Trennung der d,l-Form gelingt mit Hilfe von d, α -Bromcampher- π -sulfosäure sowie nach den oben beschriebenen Verff. Der F. der aufgelösten Verbb. (d- oder l-) liegt bei 87—88°. I kondensiert sich mit Formaldehyd zu cyclo-Methylendi-p-tolyl- β,γ -diamino-n-butan, $\text{C}_{19}\text{H}_{24}\text{N}_2$ (II). Die physikal. Konstanten sind: d,l-Verb. F. 107°; d-Verb. F. 65—66°, $[\text{M}]_{\text{D}} = -9,2^\circ$; l-Verb. F. 65—66°, $[\text{M}]_{\text{D}} = +11,2^\circ$; meso-Verb. F. 94°. I liefert mit Äthylenbromid u. wasserfreiem Na_2CO_3 10 Stdn. erhitzt (9 Stdn. auf 105—115°, 1 Stde. auf 130°) d,l-1,4-Di-p-tolyl-2,3-dimethylpiperazin, $\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{N}_2$ (III), aus A. F. 110—111°, Hydrochlorid, Pikrat, aus Essigester, Sintern unter Verfärbung bei 200°, Zers. bei 203—205°. Wie oben meso-1,4-Di-p-tolyl-2,3-dimethylpiperazin, aus A. F. 83—84°, Hydrochlorid, Pikrat, aus Aceton, F. 194—195° (Zers.). (Wird bei obiger Kondensation die Temp. 3—8 Stdn. auf 130—160° gehalten, so resultiert 1,4-Di-p-tolylpiperazin, aus Bzl. F. 185—186°.) Die d,l-Verb. läßt sich mit d, α -Bromcampher- π -sulfosäure auflösen. Es resultiert l-1,4-Di-p-tolyl-2,3-dimethylpiperazin, aus PAe. F. 138,5°, $[\text{M}]_{\text{D}} = -116,1^\circ$ u. d-1,4-Di-p-tolyl-2,3-dimethylpiperazin, aus PAe. F. 138,5°, $[\text{M}]_{\text{D}} = +114,4^\circ$. Die Synthese aus akt. Ausgangsmaterial liefert ident. Prodd. Anilin kondensiert sich mit β,γ -Dibrombutan bei 150—160° (8 Stdn.) zu d,l-Diphenyl- β,γ -diaminobutan, $\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{N}_2$ (IV), Hydrochlorid, F. 205—208°, Sulfat, Nitrat Zers. 170—173°, Pikrat, aus A. F. 136°, ll. in Aceton u. Chlf., wl. in Bzl. u. Ä. IV gibt als Sulfat mit NaNO_2 bei 0° d,l-n-Butylen- β,γ -diphenyldinitrosamin, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}_4$, aus PAe. F. 101°. Dieses gibt in Eg. gel. in der Wärme mit konz. HCl d,l-Di-p-nitrosodiphenyl- β,γ -diamino-n-butan, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}_4$, aus Aceton F. 205° (Zers.), wl. in Bzl. u. Ä., Hydrochlorid. IV gibt mit wss. Formaldehyd d,l-cyclo-Methylen-diphenyl- β,γ -diamino-n-butan, $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{N}_2$, aus A. F. 99—100°. Die Auflösung von IV gelingt nur unbefriedigend. Die meso-Form krystallisiert als meso-n-Butylen- β,γ -diphenyldinitrosamin, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}_4$, aus A. Ä. u. PAe. F. 125°, die Red. mit Sn u. HCl gibt meso-Diphenyl- β,γ -diaminobutan, Benzoylderiv. F. 250—251°, ll. in Chlf., wl. in A. u. Ä., Hydrochlorid. IV liefert mit Äthylenbromid u. wasserfreiem Na_2CO_3 18 Stdn. auf 115—120° erhitzt r-1,4-Diphenyl-2,3-dimethylpiperazin, $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{N}_2$ (V), aus PAe. F. 89 bis 90°, Pikrat, aus Aceton F. 202—205° (Zers.). Als Nebenprod. entsteht 1,4-Diphenylpiperazin, aus A. u. Bzl. F. 163°. Die Auflösung von V gibt rechtsdrehendes 1,4-Diphenyl-2,3-dimethylpiperazin, aus PAe. F. 87°, $[\alpha]_{\text{D}} = +44,8^\circ$ u. linksdrehendes 1,4-Diphenyl-2,3-dimethylpiperazin, F. 87°, $[\alpha]_{\text{D}} = -36,8^\circ$. Sämtliche Krystalle sind genau gemessen u. kristallograph. charakterisiert. (Proc. Royal. Soc. London. Serie A. 110. 502—23.)

TAUBE.













Ray Campbell, Robert Downs Haworth und William Henry Perkin, jun.,
 Synthetische Versuche in der iso-Chinolingruppe. VI. Eine Synthese von Paraberin-

derivaten. (V. vgl. Journ. Chem. Soc. London **127**. 1709; C. **1925**. II. 2274.) Vff. stellen ein Alkaloid vom *Paraberintypus* (vgl. die Formeln **XII**—**XIV**) dar, das im Gegensatz zu den natürlich vorkommenden Alkaloiden vom Typus I eine lineare Anordnung der Benzolkerne aufweist. — Es gelang nicht, vom ω -Aminoacetoveratron ausgehend, einen Isochinolinringschluß herbeizuführen, wohl infolge der Anwesenheit einer Carbonylgruppe, da der Ringschluß möglich wird, wenn diese Gruppe durch $>\text{CH}_2$ oder $>\text{CH}\cdot\text{OH}$ ersetzt wird (vgl. DECKER, LIEBIGS Ann. **395**. 299; C. **1913**. I. 1201). — 3,4-Dimethoxyphenyl-3,4-methylendioxystryrylketon (**II**), aus Acetoveratron u. Piperonal, wurde mit H_2 in Ggw. von kolloidem Pd zu 3,4-Dimethoxyphenyl-3,4-methylendioxy- β -phenyläthylketon reduziert; dieses ergab mit Methylnitrit u. Na-Äthylat das Isonitroso-Deriv. (**III**). — Die Red. dieses Prod. zum 3,4-Dimethoxyphenyl-3,4-methylendioxy- β -phenyl- α -aminoäthylketon (**IV**) führte in alkal. Lsg. zum Pyrazinderiv. (**V**), das durch Kondensation von 2 Moll. von **IV** u. folgender spontaner Oxydation entstanden war. Mit SnCl_2 als Reduktionsmittel wurde **IV** unter bestimmten Bedingungen in ziemlich guter Ausbeute erhalten. — **IV** kondensiert sich leicht mit Formalin u. HCl zu 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydro-i-chinolin (**VI**). Mit Jod oxydiert gibt dieses Prod. 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzoyl)-i-chinolin (**VII**), das dem Papaveralin sehr nahe verwandt ist. Die Salze dieser tertiären Base werden leicht durch W . dissoziiert. Durch Schmelzen der Base mit KOH wird Veratrumsäure abgespalten. Die bas. Restbestandteile konnten nicht identifiziert werden. Die B. der Veratrumsäure spricht für die in **VI** u. **VII** angenommene Struktur. Bei der Kondensation von **IV** mit Formalin ist es wieder die $>\text{CO}$ -Gruppe, die den Ringschluß verhindert. — **VII** gibt bei der Red. mit Zn-Staub u. CH_3COOH 6,7-Methylendioxy-3-(α -oxy-3',4'-dimethoxybenzoyl)-i-chinolin (**VIII**). Daraus entsteht mit HBr u. Zn-Staub eine ölige Base 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzoyl)-i-chinolin (**IX**), die infolge der geringen Ausbeuten nicht in reinem Zustande isoliert werden konnte. — Die Red. von **VI**, **VII** u. **VIII** mit Na-Amalgam, Zn u. H_2SO_4 ebenso wie die elektrolyt. Red. in der Kälte führte zu amorphen Basen vom Typus **X**, da aus Papaveralin u. Papaveran unter denselben Bedingungen eine gleichartige Substanzreihe erhalten wurde. — Vff. bestätigen die Angaben PYMANS (vgl. Journ. Chem. Soc. London **95**. 1610; C. **1909**. II. 2178) bzgl. der Identität der von FREUND u. BECK (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **37**. 3321; C. **1904**. II. 1155) erhaltenen u. fälschlicherweise mit „i-Tetrahydropapaverin“ bezeichneten Base mit Tetrahydropapaverin. Wurden die Bedingungen, die FREUND u. BECK angeben, bei der Elektrolyse von **VII** angewandt, so resultierte das amorphe 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydro-i-chinolin (**XI**). — Mit Formalin u. HCl ergab **XI** 2,3-Methylendioxy-11,12-dimethoxy-6,15,16,17-tetrahydroparaberin (**XII**). Die geringen Ausbeuten deuten auf eine vorzugsweise Neigung zu B. des Typus I hin. — **XII** ist, ebenso wie Tetrahydroberberin u. Tetrahydro- Ψ -berberin swl. u. gibt swl., schön krystallisierende Salze. Das Methyljodid ist ziemlich beständig; gegen sd. alkoh. KOH . Mit Jod gibt **XII** keine Verb., die der B. der quaternären Berberiniumsalze entspräche, sondern ein Hydrojodid, $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{O}_4\text{N}\cdot\text{HJ}$. Die entsprechende HCl -Verb. wird durch NH_3 gespalten unter B. von 2,3-Methylendioxy-11,12-dimethoxydihydroparaberin (6,17 oder 6,15) (**XIII**) oder (**XIV**), $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{O}_4\text{N}$.

Versuche. 50 g Styrylketon **II**, 500 ccm Eg., 3% PdCl_2 (15 ccm) u. 0,5 g Gummiarabikum in wenig W . wurden bei 50—60° (Wasserbad) 2 Std. unter Rühren im H_2 -Strom reduziert. 3,4-Dimethoxyphenyl-3,4-methylendioxy- β -phenyläthylketon aus CH_3OH verfilzte Nadeln. F. 102—103°. Oxim aus wss. A. Nadeln. F. 119—121° Isonitrosoderiv. **III**, $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_6\text{N}$. Aus wss. CH_3COOH Nadeln. F. 137°. — Eine Lsg. von SnCl_2 in absol. A. wurde bei —10° mit trockenem HCl gesätt., das gepulverte Isonitrosoderiv. dazu gegeben u. wieder bei derselben Temp. mit HCl gesätt. Aus dem ab geschiedenen SnCl_4 -Salz des 3,4-Dimethoxyphenyl-3,4-methylendioxy- β -phenyl- α -aminoäthylketons (**IV**) mit H_2S das Hydrochlorid, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}\cdot\text{HCl}$; aus A.-Ä. Nadeln. F. 21



III




is 219°. *Pikrat*, $C_{24}H_{22}O_{12}N_4$, aus A. gelbe Nadeln. F. 213°. — Eine Lsg. von III in NaOH mit Zn-Staub bei Zimmertemp. 3 Stdn. turbinert, gibt das *Pyrazinderiv.* V, $C_{36}H_{32}O_8N_2$, aus A.-Chlf. gelbliche Nadeln. F. 205°. — Eine methyllalkoh. Lsg. des Hydrochlorids von IV u. 40% Formalin wurde mit $NaHCO_3$ zerlegt, 20 Min. gekocht, verdünnt u. auf dem Dampfbad mit 20%ig. HCl gel. Aus dem abgeschiedenen Hydrochlorid des 6,7-Methyldioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydro-i-chinolins VI, $C_{18}H_{19}O_5N$, wurde die Base auf Zusatz von NH_3 gewonnen. Aus A. nadelförmige Rosetten. F. 137°. Ll. in Chlf., Aceton, h. A., h. Bzn. Die gelbliche, schwefelsaure Lsg. wird auf Zusatz eines Krystalls KNO_3 blutrot. *Hydrochlorid*. Aus sehr verd. HCl krystallwasserhaltige Nadeln; bei 115–120° wasserfrei. Sll. in A. Auf Zusatz von Ä. fällt es aus der alkoh. Lsg. das wasserfreie Hydrochlorid aus. Feine Nadeln. F. 232–234° (Zers.). Unl. in A. *Benzoyl-Deriv.*, $C_{26}H_{23}O_6N$. Aus A. lange Nadeln. F. 187–188°. *Pikrat*, $C_{25}H_{22}O_{12}N_4 \cdot H_2O$. Aus A. gelbe Nadeln mit Krystallwasser. F. 157–158° (Zers.). *Oxim*. Nadeln. F. 205–209° (Zers.). — Zu einer alkoh. Lsg. von VI wurde

unter $\frac{1}{2}$ -std. Kochen allmählich 2%ig. alkoh. Jodlsg. zugefügt. 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzoyl)-i-chinolin (VII), $C_{19}H_{15}O_5N$, aus 50%ig. alkoh. Eg. Nadeln. F. 222°. Swl. in A., ll. in Eg. u. Chlf. Unl. in W. Das Sulfat krystallisiert aus 20%ig. H_2SO_4 in gelben Platten. Oxim, Nadeln. F. 234—236° (Zers.). — VII in Eg. wurde während der Zugabe von Zn-Staub auf dem Wasserbad erwärmt. Nach 4 Stdn. R. beendet. 6,7-Methylendioxy-3-(α -oxy-3',4'-dimethoxybenzyl)-i-chinolin (VIII), $C_{19}H_{17}O_5$, Aus A. Nadeln. F. 153°. Unl. in W. Ll. in h. A., Aceton u. Chlf. Die rote konz. schwefelsaure Lsg. wird auf Zusatz eines Krystalls KNO_3 dunkelgrün. Pikrat, $C_{25}H_{20}O_{12}N$, Aus viel A. gelbe Nadeln. Dunkeln bei 183°. F. 195° (Zers.). — VIII wurde in mit H₂ gesätt. Eg. 12 Stdn. aufbewahrt, die Lsg. dann auf 300° erhitzt u. ein Überschuß von Zn-Staub unter Turbinieren langsam zugegeben. 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzyl)-i-chinolin (IX) Öl. Pikrat, $C_{25}H_{20}O_{11}N_4$, aus viel A. gelbe Nadeln. F. 206—207°. Eine Zerlegung des Pikrats gelang nicht. — Die Elektrolyse von VII bei 90—95° ergab einen roten Sirup, 6,7-Methylendioxy-3-(3',4'-dimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-i-chinolin (XI), dessen Hydrojodid, $C_{19}H_{21}O_4N$, HJ, aus A. krystallisierte, F. 226° (Zers. Hydrochlorid. Aus A. kleine Nadeln. F. 220—222° (Zers.). Nitrosamin, $C_{19}H_{20}O_5N$, Aus A. kurze Nadeln. F. 128°. — Das Hydrojodid von VI in CH_3OH wurde mit $NaHCO_3$ zerlegt u. einige Min. mit 40%ig. Formalinlsg. gekocht. 2,3-Methylendioxy-11,12-dimethoxy-6,15,16,17-tetrahydroparaberin (XII), $C_{20}H_{21}O_4N$. Aus Bzn. Prismen. F. 221—222°. Unl. in W., ll. in Chlf. Hydrochlorid aus W. Nadeln. F. 236—238°. Pikrat, $C_{26}H_{24}O_{11}N$, aus A. gelbe Klümpchen. F. 199—201° (Zers.). Methyljodid, $C_{22}H_{24}O_4NJ$, aus CH_3O große Prismen. F. 268°. Methylchlorid. Gallertartiger Nd. F. 260° (Zers.). — VII einer alkoh. Lsg. von VII wurde 1%ig. alkoh. Jodlsg. zugefügt. Nach $\frac{1}{2}$ -std. Kochen wurde das Perjodid mit H_2SO_4 in das gelbe Hydrojodid übergeführt. Das Hydrojodid $C_{20}H_{19}O_4N$, HCl , $\frac{1}{2}H_2O$, des 2,3-Methylendioxy-11,12-dimethoxy-6,17 oder -6,15-dihydroparaberins (XIII) oder (XIV), aus wenig W. gelbe Nadeln mit $\frac{1}{2}$ Mol. Krystallwasser. F. 120° unter Abgabe des Krystallwassers. Hydrojodid, $C_{20}H_{19}O_4N$, HJ, gelbe Nadeln. F. 225—226°. (XIII) oder (XIV) wurde aus dem Hydrochlorid nach Zugabe von N. als gelblicher, amorpher, gelatinöser Nd. erhalten. Nach Zugabe von Petroleum zu trocknen äther. Lsg. fiel die Base als amorphes Pulver aus, F. 180—190° (unscharf) (Journ. Chem. Soc. London 1926. 32—43. Oxford.) BEREND.

Costin Nenitzesco, Der gegenwärtige Stand der Untersuchungen über die Konstitution des Blutfarbstoffes. Zusammenfassende Übersicht der neueren Forschungen (Bulet. Soc. de Chim. din România 7. 102—16.) SPIEGEL.

Robert Downs Haworth, William Henry Perkin, jun., und John Rankin Die Spaltung von d,l-Dicentrin. (Vgl. S. 1202.) Vff. weisen die Identität der in der früheren Mitteilung beschriebenen, synthet. dargestellten d,l-Base (I), $C_{20}H_{21}O_4N$, nach d,l-Dicentrin nach. Sie kann nämlich leicht durch Weinsäure unter ähnlichen Bedingungen, wie GADAMER sie zur Trennung des d,l-Glaucins benutzte, in die d,l-Modifikation zerlegt werden. Beide krystallisieren gut aus Ä., F. 169°, $[\alpha]_D^{20} = +64$ u. —63,5°. Durch direkten Vergleich der d-Base mit d-Dicentrin wurde die Identität beider Prodd. nachgewiesen.

see errata p. 3977 Versuche: 6'-Nitroveratrylnorhydrohydrastinin, W., 40%ig. Formalinlösung erhitzt. Es resultierte 6-Nitrohomoveratrol, aus A. gelbe Nadeln. F. 119°. Die alkalisch gemachte Lsg. ergab Hydrohydrastinin, $C_{11}H_{13}O_2N$; aus Petroleum Platten. F. 119° bis 58°. — Zur Spaltung des d,l-Dicentrins wurde eine 2-n. absol. alkoh. Lsg. von d-Weinsäure zu einer Lsg. von d,l-Dicentrin in absol. A. bis zur schwach sauren Reaktion zugegeben. Nach Zugabe der gleichen Menge d-Weinsäure fiel ein amorpher Nd. ab, der sich beim vorsichtigen Erwärmen wieder löste. Beim Anreiben schied sich aus der warmen Lsg. saures d-Weinsäures l-Dicentrin ab. Das zur Trockne eingedampfte



ylalkoh. KOH zerlegt wird. — *l*-Dicentrin aus Ä. lange Prismen. F. 169°. Ein Gemisch mit *d*-Dicentrin erweicht bei 168°. F. ca. 178°. $[\alpha]_D^{17} = -63,5^{\circ}$ (Chlf.; $c = 1,700$). (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 29–32. Oxford.)

BEREND.

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

Ferdinand Lehr, *Über den Einfluß des Berylliums auf die Fermentbildung*. (Vgl. KOCHMANN, Biochem. Ztschr. **151**. 259; C. **1925**. I. 973.) BeCl_2 steigert bei $\text{pH} = 7,2$ in Ggw. von Phosphatpuffer die Ureasewrkg. der Proteusbakterien, wobei eine Menge von 0,1 cem „Berylliumchlorid fl.“ (KAHLBAUM) sich als optimal erwies; größere Mengen hemmen, kleinere Mengen sind unwirksam. Da die Rk. in Ggw. von Phosphatmischung nach SOERENSEN vorgenommen wird, entsteht ein Nd. Es wird nachgewiesen, daß die Wrkg. des Be von der B. dieses Nd. unabhängig ist; wirksam ist aber nur die nicht in dem Nd. befindliche Menge des Be. — In dest. W. hemmt Be die Proteus-Urease sehr stark. — Da die Urease der Jackbohnen von Be gehemmt wird, die der gepulverten Bakterien nicht gesteigert wird, nimmt Vf. an, daß die Wrkg. des Be in einer Anregung der Bakterienzelle zu vermehrter B. von Ferment besteht. — Auch die von KOCHMANN (l. c.) beobachtete Wrkg. des Ca wird durch etwa den fünften Teil des zugesetzten Ca bewirkt; es scheint keine direkte Beziehung zwischen der Menge Ca u. der Fermentwrkg. zu bestehen. (Biochem. Ztschr. **168**. 166–74. Berlin, Krankenhaus Moabit.)

HESSE.

A. Blagowestschenski, *Über die synthetische Wirkung der pflanzlichen Proteasen*. (Vgl. S. 1588.) Läßt man etwa 2 g *Leucin* in 40 g Glycerin zusammen mit etwa 9 g eines aus gekeimtem Samen von *Phaseolus Mungo* L. durch Trocknen u. Mahlen erhaltenen Pulvers 23 Tage stehen, so wird eine Abnahme des nach SOERENSEN bestimmten $\text{NH}_2\text{-N}$ (bezw. der Carboxylgruppen) beobachtet. Die gleiche Feststellung konnte auch bei anderen Verhältnissen der 3 Komponenten zueinander gemacht werden. Aus dem Reaktionsgemisch konnte *Leucinimid* isoliert werden. Da ermittelt wurde, daß *Leucin* allein in Glycerin dieser Rk. nicht unterliegt, u. daß beim Stehenlassen einer Mischung des Fermentpulvers mit Glycerin sogar eine Zunahme des $\text{NH}_2\text{-N}$ stattfindet, liegt hier eine enzymat. Synthese von Körpern vor, die den Diketopiperzinen nahestehen. (Biochem. Ztschr. **168**. 1–5.)

HESSE.

A. Blagowestschenski, *Über den Einfluß hoher Konzentrationen neutraler Stoffe auf die Wirkung der Peptase*. (Vgl. vorst. Ref.) Der Grad der Peptonspaltung durch Pankreatin wird durch nicht zu hohe Konz. von Saccharose oder Glycerin nicht beeinflusst, während diese Stoffe in hohen Konz. stark hemmend wirken. Weitere Hemmungswrkgg. wurden durch A., CH_3OH , Aceton, NaCl , KNO_3 erzielt. Die Hemmung ist so, daß ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen der Konz. des neutralen Zusatzes p u. der hemmenden Wrkg. ε des Zusatzes besteht, der durch die Formel $\varepsilon = k \cdot \sqrt{p^3}$ ausgedrückt wird. Die „eiweißersparende Wrkg. der Kohlenhydrate“ hängt also nicht mit spezif. Eigenschaften der Kohlenhydrate, sondern „mit den Ver-

änderungen zusammen, welche hohe Konz. der Zusätze im Reaktionsmilieu hervor rufen“. (Biochem. Ztschr. **168**. 6—13. Taschkent, Mittelasiat. Staatsuniv.) HESSE.

L. Rosenthaler, Über die Einwirkung von Emulsin auf Amygdalin. (Vgl. Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **245**. 684 [1907].) Zur Prüfung der Frage ob bei der Spaltung des Amygdalins unter Einfluß des Emulsins Gentiobiose entsteht (vgl. KUHN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 857; C. **1923**. I. 1459 [der Ref.]), wurde nach folgender Überlegung verfahren. Verläuft die Spaltung so, daß Amygdalin ohne intermediäre B. von Gentiobiose gespalten wird, so müßten in jeder Phase der Spaltung gleichzeitig 1 Mol HCN + 2 Mole Glucose + 1 Mol Benzaldehyd entstehen; andern falls müßte bei kurz dauernden Verss. auch dann, wenn die intermediär entstandene Gentiobiose weiter gespalten wird, weniger als 2 Mole Glucose auf 1 Mol HCN gefunden werden, was an dem geringeren Reduktionsvermögen der Lsg. erkannt werden kann. Die erhaltenen Zahlen geben jedoch Werte für das Reduktionsvermögen, welche höher sind als nach den obigen Annahmen aus der gebildeten Menge HCN berechnet werden. Diese Zahlen sind so, daß Vf. daraus die Folgerung zieht, daß die Spaltung von Amygdalin in erster Phase zu B. von Mandelnitrilglucosid + Glucose führt; das Glucosid wird dann weiter gespalten. Daneben scheint in geringer Menge auch Gentiobiose gebildet zu werden, da das nach Entfernung von HCN u. Benzaldehyd erhaltene Phenylsazon, F. 195° (statt 205° für Glucosephenylsazon) zeigte. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **263**. 563—66. 1925. Bern, Univ.) HESSE.

C. Sibilía, Wirkungen einiger Fusariumenzyme. Das Amylaseenzym aus Fusariumarten (F. echinosporum u. F. fuliginosporum) wirkt auf die Stärkekörner der lebenden Kartoffel auch bei Ggw. von 1%ig. Oxalsäure nur sehr wenig ein. Die Veränderung ist äußerlich auch u. Mk. nicht erkennbar, sondern wird nur durch einen schwachen rötlichen Stich der Färbung mit J-K-J-Lsg. bemerkt. Die pektinzerstörende Einwirkung der genannten Fusariumarten tritt, wie durch Verss. an Karotten gezeigt wird, nur bei Ggw. von 1%ig. Oxalsäurelsg. u. dann mit zunehmendem Säurezusatz in verstärktem Maße auf. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **3**. 165—67. Florenz, Inst. f. Land- u. Forstwirtschaft.) LEHMANN.

P. Petit und Richard, Einfluß der Auflösungsart von Amylase auf die Verzuckerung von Stärke. Es wird die Einw. der H-Ionen auf die Auflösung der Amylase untersucht u. gefunden, daß dieselbe sich in einem Gebiet von $pH = 3,0$ bis $8,0$ vollzieht, jedoch nach den beiden genannten Grenzwerten zu mit erheblich geringerer Geschwindigkeit. Auch bei $pH = 9,5$ geht die Rk. noch nach einigen Stdn. vor sich. Die Reduktionskraft ist zwar schwach, aber immer noch reell. Verss. über die Auflösung von Amylase mit Hilfe von sd. W., W., in welches ein Strom gasförmigen H_2 geleitet wird u. W., durch welches ein Luftstrom geschickt wird, ergaben, daß Luft für die Verzuckerung von Stärke nicht nur unnötig ist, ja sogar schädlich ist, wie an einer Tafel hervorgeht, in der die Ausbeuten an Maltose in mg angegeben sind. Am günstigsten in allen drei Fällen ist eine $[H^+]$ von $10^{-4,2}$. Es folgt eine theoret. Deutung der Verss. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 575—77. 1925.) HAASE.

D. Michlin, Über die Perhydridase des Kuhcolostrums und der Kuhmilch. (Vgl. SBARSKY u. MICHLIN, Biochem. Ztschr. **155**. 485; C. **1925**. I. 2232.) Das Colostrum von Kühen, welche bereits früher Milch gegeben hatten, enthält beträchtliche Menge Perhydridase, während das Enzym im Colostrum der erstmalig schwangeren Kühe erst 1—2 Wochen vor dem Kalben erscheint. Auch in der Milch frischmilchender Kühe kann die Perhydridase nachgewiesen werden, wenn man an Stelle des üblichen Schardingerreagens ($HCHO +$ Methylenblau) Acetaldehyd u. Methylenblau verwendet (5 ccm gesätt. Lsg. von Methylenblau in A. + 5 ccm Acetaldehyd + 190 cc W.; von dieser Lsg. wird 1 ccm zu 10 ccm Milch gegeben; als positiv wird die Rk. bezeichnet, wenn die Entfärbung bei 65° in 30 Min. erfolgt). Die Perhydridase kann so ausnahmslos in der Milch von mehreren 100 Kühen nachgewiesen werden. — E

Zusammenhang zwischen Fettgehalt u. Enzymmenge konnte nicht ermittelt werden. Biochem. Ztschr. **168**. 36—47. Moskau, Staatl. Inst. f. Veterinäre.) HESSE.

Emil Schall, *Das Vorkommen der Nadi-Oxydasen in den Gewebszellen des Auges in seinen verschiedenen Entwicklungsstufen*. (V. GRAEFES Arch. f. Ophth. **115**. 666—94. 1925. Düsseldorf, Akad. Augenklin. u. Marburg Augenklin.; Ber. ges. Physiol. **32**. 884. 1925. Ref. KIRCHNER.) OPPENHEIMER.

Henry Stanley Raper und **Horace Bradbury Speakman**, *Die Tyrosinase-Tyrosinreaktion*. IV. Mitteilung über die Identität von Tyrosinase aus verschiedenen Quellen. (III. vgl. HAPPOLD u. RAPER, Biochemical Journ. **19**. 92; C. **1925**. I. 2451.) Tyrosinasepräparate aus Kartoffel, dem Mehlwurm (*Tenebrio molitor*) u. *Agaricus ryophilus* erzeugen aus Tyrosin ein rotes Prod. von in allen Fällen gleichen Eigenschaften (vgl. RAPER u. WORMALL, Biochemical Journ. **17**. 454; C. **1923**. III. 1623). Auch in der Einw. von Kartoffel- u. Mehlwurmtirosinase auf Chinol, Phenol, p-Kresol, Resorcin u. Catechin u. in dem pH-Bereiche der Rk. besteht kein Unterschied. (Biochemical Journ. **20**. 69—72. Manchester, Univ.) SPIEGEL.

E₂. Pflanzenchemie.

H. Dieterle, *Beitrag zur Kenntnis der ölhaltigen Samen von Datura alba Nees*. In 100 g des Öles wurden gefunden Palmitinsäure u. andere feste Fettsäuren 6,18 g, Myristinsäure 1 g, α -Linolsäure 23,55 g, β -Linolsäure 2,92 g, Ölsäure 60,86 g, Unverseifbares 2,90 g, darin Phytosterin 1 g. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 40—64. Marburg, Univ. Kiel, Univ.) SPIEGEL.

Oscar Czerny, *Beitrag zum Studium der Zusammensetzung der Öle der Fichten von Bukowina*. (Vgl. Bulet. Soc. de Chimie din România **6**. 94; C. **1925**. I. 1499.) Aus dem durch Dest. des Colophanen aus eiserner Retorte gewonnenen Ölen wurde durch $\frac{1}{10}$ ig. Na₂CO₃-Lsg. Abietinsäure ausgezogen. Die so gereinigten Öle geben die Storchlorawskische Rk. Weitere Reinigung erfolgte durch KOH bei 50—60°, dann Dest. über Na. Der Hauptteil ging bei 250—350° über u. hatte D. 0,9682. Fraktionierung im Vakuum (9 mm) lieferte folgende Fraktionen: 1. Octohydroreten, Kp.₉ 195—198°, D.₁₅ 0,9647, gibt mit HNO₃ + H₂SO₄ Trimellitsäure. — 2. Fraktion von Kp.₉ 240 bis 350°, D. 0,9660. Das nach der Analyse vorliegende Styrol wurde durch Herst. des Diomids vom F. 74,5° bestätigt. — 3. Kp.₉ 310—315°, leicht blau durchscheinendes Öl, Zus. ca. C₅H₄. — 4. Fraktion vom Kp.₉ 340—348°, D.₁₅ 0,9686, grünlich, von arom. Geruch. Konz. H₂SO₄ extrahiert ein farbloses Öl von den Konstanten des Diterbentyls (LEONARD). Der Rückstand liefert bei Erhitzen mit S ein Öl, das als Reten (?) angesprochen wird, ein Pikrat vom F. 125° bildend. (Bulet. Soc. de Chimie din România **7**. 92.) SPIEGEL.

Friedrich Reinitzer, *Untersuchungen über Siambenzoe*. V. Das ganze Harz. (Vgl. Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **263**. 347; C. **1925**. II. 926.) Vf. schließt aus den bisherigen Veröffentlichungen die folgenden ungefähren Zuss. für das (u. erhärtetes) Harz: Krystallisiertes Coniferylbenzoat 77,8 (67,8), amorphes Coniferylbenzoat (10,0), freie Benzoessäure 11,7 (11,7), freie d-Siarsinolsäure 6,0 (6,0), Anisylbenzoat 2,3 (+ Vanillin 0,3), W. 2,2 (2,2), Gewebereste (2,0) %. Der weiße Rückst. der aus der klaren äth. Lsg. bei starkem Verd. mit Ä. fällt, hat alle Eigenschaften des polymeren Coniferylalkohols. Eine andere Ä.-Fällung, aus Mutterlaugen der Krystalle des Coniferylbenzoats gewonnen, ließ auf eine Beimengung von polymerisiertem Coniferylbenzoat schließen; sie ließ sich durch Benzoylierung in einen Körper mit allen Eigenschaften des aus amorphem Coniferylbenzoat hergestellten Dibenzos, aber vom 98° (statt 85°) überführen. Am Schlusse faßt Vf. die wichtigsten Ergebnisse seiner Untersuch. folgendermaßen zusammen: 1. Siambenzoe ist ursprünglich eine rein weiße, nicht krystallin. M., die amorphe Rindenschicht der Handelsware eine nachträgliche B., ebenso wahrscheinlich die eingesprengten dünnen amorphen Schichten. — 2. Sie be-


steht hauptsächlich aus krystallisiertem Coniferylbenzoat u. etwas freier Benzoe- u. freies d-Siarsesinolsäure, die ursprünglich mit wenig Cinnamylbenzoat einen dicken Krystallbrei bilden, der später durch Verdunsten des Lösungsm. fest u. hart wird. Durch Oxydation des Coniferylbenzoats entsteht beständig sehr wenig Vanillin. — 3. Die von LÜDY gefundenen Benzoate des *Benzoeresinols* u. des *Siarsesinotannols* sind zu streichen. — 4. Siambenzoe ist entgegen den Angaben von TSCHIRCH u. LÜDY ungemein leicht verseifbar. Eine kleine Menge freien Coniferylalkohols in Siambenzoe rührt offenbar von der freiwilligen Zers. des Coniferylbenzoats, vielleicht unter Mitwirkung von etwas Wasser. Bei trockenem Erhitzen auf 120–130° verliert dieses Benzoat die Hälfte der Benzoessäure. — 5. Die glasige gefärbte Rindenschicht der Handelsware entsteht durch Übergang des krystallisierten Coniferylbenzoats in amorphes unter gleichzeitiger Oxydation u. Polymerisation, was langsam schon bei gewöhnlicher Temp., schneller in erhöhter eintritt. — 6. Bei Behandlung der Siambenzoe mit Lösungsm. geht ein sehr großer Teil des krystallisierten Coniferylbenzoats in amorphem Zustand über. — 7. Siambenzoe entsteht durch krankhafte Tätigkeit des verwundeten Cambiumgewebes, der Verbb. des Coniferylalkohols enthält, die bei ungestörter Lebenstätigkeit bei Verholzung der Zellwände verwendet werden, nun aber ein großes Übermaß von Coniferylbenzoat kleinere Mengen der übrigen Harzbestandteile entstehen lassen. (Arch. der Pharm. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 131–40. Graz, Techn. Hochschule.) SPIEGEL.

Albert Charles Chibnall und **Cyril Ernest Grover**, *Eine chemische Untersuchung des Blattzelcytoplasmas*. I. Die löslichen Proteine. Aus nach dem mehrfach beschriebenen Verf. (vgl. CHIBNALL u. NOLAN, Journ. Biol. Chem. **62**. 179; C. 1922. I. 677) erhaltenen kolloidalen Eiweißlsgg. lassen sich mittels Filtration durch Papierbrei 2 Eiweißfraktionen voneinander trennen, ebenso aus dem direkt aus fein zerkleinertem Blätterbrei mittels der Buchnerpresse gewonnenen Extrakt. Die eine enthält die „kombinierten“ Proteine, lose an in A. l. Stoffe gebunden, die andere die „löslichen“, unkombinierten. Die letzteren wurden aus den Blättern von 12 Arten in fast die Analyse genügend reinem Zustande gewonnen (aus einigen anderen Arten gelang dies bisher nicht). Sie sind *Gluteline*, die zwar Gemische sein dürften, aber sehr ähnliche chem. Eigenschaften besitzen. Sie haben sämtlich einen isoelektr. Bereich von $pH = 4$ bis 5,0, in dem ihre Löslichkeit am geringsten ist. Die $[H^+]$ des Blattzellsaftes war in allen Fällen alkal. gegenüber diesem isoelektr. Bereich, so daß die Proteine in den analysierten u. wahrscheinlich auch in den lebenden Zellen als Anionen vorhanden waren. (Biochemical Journ. **20**. 108–18. London, Univ. Coll.) SPIEGEL.

Franz Stern und **Julius Zellner**, *Beiträge zur vergleichenden Pflanzenchemie*. XI. Über *Sonchus arvensis* L. (X. vgl. ZELLNER, S. 2368.) Untersucht wurde *Sonchus arvensis* L. als Repräsentant der milchsaftführenden Kompositen u. zwar sowohl die ganze Pflanze, wie auch der isolierte Milchsaft. I. Untersuchung der ganzen Pflanze. Im PAe.-Auszug, im nicht verseifbaren Teil-Ceryllalkohol (s. unten im PAe.-Auszug), zwei Verbb. vom F. 193–194° u. 152–153° (s. unten bei der Milchsaftunters.). Im verseifbaren Teil sind *Stearin-* u. *Palmitinsäure* enthalten. Der Ä.-Auszug enthält im wesentlichen *Ceryllalkohol*, $C_{26}H_{54}O$. Aus Trichloräthylen u. PAe. F. 80°; *Acetylderiv.* aus A. + wenig Trichloräthylen F. 63–64°, Kp.₂₄ 292°; Phlobaphene u. Gerbstoffe sind reichlich vorhanden. Auffallend ist, daß der Invertzucker überwiegend aus Glucose u. nicht, wie bei anderen Kompositen wegen ihres Inulingehaltes, aus Fructose besteht. Ferner lassen sich noch Cholin u. Weinsäure nachweisen. II. Unters. des Milchsaftes. Der Milchsaft reagiert schwach sauer u. zeigt Oxydasenrkk. Der PAe.-Auszug enthält nach der Verseifung des Rückstandes mit 10% KOH *Kautschuk*, *Nitrosat* vom Zersetzungspunkt 133–134° nachgewiesen. Ferner eine *Verb. vom F. 149 bis 194°* (s. o.), l. in A. u. Aceton, Liebermannsche Rk. schwach, Hesse-Salkowsky'sche Rk. deutlich, in Chlf. wird Br addiert, *Acetylderiv.*, aus A. F. 215°, sowie eine *Verb. vom F. 149–150°*, ll. in Chlf., wl. in A., Bzl. u. Aceton, swl. in Essigester, *Acetylderiv.*

rom F. 228° (wahrscheinlich nicht ganz rein). Die beiden Verbb. sind wahrscheinlich mit den α - u. β -Lactucerosen von HESSE (LIEBIGS Ann. **234**. 243 [1886] u. **244**. 268 [1888]) ident. Die Lactucone von LENOIR (LIEBIGS Ann. **60**. 83 [1846]) sind vermutlich die Essigsäureester dieser, den Amyrinen ähnlichen Alkohole. Endlich läßt sich noch eine schwache Säure vom F. 139—140°, vielleicht eine Dioxystearinsäure, isolieren. Der in PAe. unl. Rückstand enthält Mannit, ferner l-Inosit, aus verd. A. F. über 240° Zers.), Verfärbung bei 213°. Acetylderiv., amorph, F. 52°. Der Milchsafte enthält ferner einen Bitterstoff, Proteine, geringe Mengen Fettsäuren, nicht näher definierbare, tannoide nicht oxydable Stoffe u. eine Oxydase. (Monatshefte f. Chemie **46**. 459—69. 1925.) TA.

H. Kondo und T. Sanada, Über die Bestandteile der Wurzel von *Lindera strychnioides* Vill. Diese Wurzel, welche als Tonicum, Stomachicum, Diureticum usw. Anwendung findet, wurde mit 80%ig. A. perkoliert, Lsg. dick eingedampft, mit W. verführt u. mit Ä. extrahiert. Rückstand der äth. Lsg. lieferte reichlich Krystalle (I) ölige Substanz, letztere bei Dest. unter 5 mm die Fraktionen 66—100° (II), 100—140° (III), 140—170° (IV) u. Rückstand. I wurde mit PAe. zerlegt in Prismen, F. 187°, Nadeln, F. 145°. II gab bei Dest. über Na eine krystallin. Substanz vom F. 200—201°. Letztere entstand auch beim Verseifen von III neben einer Säure vom F. 205—208°. IV bestand hauptsächlich aus den Nadeln vom F. 145°. — Die Substanz vom F. 200 bis 201°, Linderol genannt, ist offenbar ein Alkohol, hat die Zus. $C_{11}H_{22}O$, bildet Prismen, riecht u. schmeckt campherartig, meist ll. $[\alpha]_D^{25} = -32^\circ 38'$ (in Chlf.). Durch H + Pt nicht reduzierbar. — Die Prismen vom F. 187°, Linderan genannt, haben die Zus. $C_{11}H_{20}O$, geruch- u. geschmacklos, wl. in k. A. H_2SO_4 -Lsg. farblos. $[\alpha]_D^{25} = -164^\circ 34'$. Gibt blaue Fichtenspanrk., wird durch k. Vanillin-HCl kirschrot, durch h. konz. HCl schiefrot gefärbt. Enthält kein OH oder OCH_3 , dagegen eine Doppelbindung. Reduziert weder ammoniakal. Ag- noch Fehlingsche Lsg. u. reagiert nicht mit CO-Reagenzien. Absorbiert mit Pt $2H_2$ unter B. eines amorphen, in Ä. wl. Prod. vom F. 135°, das grüne Fichtenspanrk. gibt. — Die Nadeln vom F. 145°, Linderen genannt, haben die Zus. $C_{11}H_{14}O_2$. Färbung durch Vanillin-HCl kirschrot. Enthält zwei Doppelbindungen u. absorbiert $3H_2$ unter B. der öligen Prodd. $C_{11}H_{18}O_2$ u. $C_{11}H_{18}O$. — Die Säure vom F. 205 bis 208°, Linderasäure genannt, hat die Zus. $C_{15}H_{18}O_3$, bildet Nadeln, unl. in W., ll. in A. Laugen, h. Sodalsg. Färbung durch Vanillin-HCl kirschrot, Fichtenspanrk. positiv. H_2SO_4 -Lsg. gelb. $FeCl_3$ färbt nicht. — In diesen Verbb. sollen Furanerivv. vorliegen.



Linderan würde eine der beiden nebenst. Formeln besitzen. Linderen könnte ein Allyl-, Propenyl- oder Methylvinylinderan sein. Bei der Hydrierung des Linderens würde ein Furankern aufgespalten, während der andere intakt bliebe. Linderol würde sich vom Linderen ableiten. (Journ. Pharm. Soc. Japan **1925**. No. 526. 1—3.) LB.

E₆. Tierphysiologie,

Lancelot T. Hogben, Studien über die Hypophyse. V. Die Blutdrucksenkungsaktion der Vögel. (IV. vgl. Quart. Journ. of exp. phys. **14**. 301. 1924; C. **1925**. II. 937.) Die Hypophysenhinterlappensubstanz, die bei der Ente Blutdrucksenkung hervorruft, ist in A. unl., in W. ll., durch Trypsin u. Alkali nicht, dagegen durch Kochen zerstörbar. Sie teilt diese Eigenschaften mit Uterus erregenden, Blutdruck steigernden, Melanophoren reizenden Substanzen der Hypophyse. (Quart. Journ. of exp. physiol. **15**. 155—61. 1925. Edinburgh, Dep. of physiol.; Ber. ges. Physiol. **32**. 881. 1925. Ref. HEYMANN.) OPP.

Lancelot T. Hogben und Gavin R. de Beer, Studien über die Hypophyse. I. Die Lokalisation der wirksamen Substanzen und ihr Vorkommen in der Tierreihe. (vgl. vorst. Ref.) Die wirksamen Extrakte aus der Hypophyse lassen sich auch aus den Drüsen der Knorpelfische gewinnen. (Quart. Journ. of exp. physiol. **15**. 163—76.

1925. Edinburg Dep. of physiol. Oxford dep. of comp. anat.; Ber. ges. Physiol. **32**. 8; bis 882. 1925. Ref. HEYMANN.) OPPENHEIMER.

Fritz Rothschild, *Magensekretion und duodenaler Rückfluß vor und nach der Behandlung des ulcus ventriculi und duodeni mit Novoprotin*. Die fraktionierte Unterdes Magensaftes mit Best. des duodenalen Rückflusses ist ein Mittel, den Erfolg der Behandlung objektiv zu kontrollieren. (Klin. Wchschr. **5**. 102—04. Berlin, II. mediz. Klinik der Charité.) HÜCKEL.

M. L. Muller, *Fünfzehn Jahre Pituitrin in der Geburtshilfe*. Zusammenfassender Bericht über die Erfahrungen in der Praxis. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde **70**. 945—56. Utrecht.) SPIEGEL.

Else Bucka, *Die Notwendigkeit der Kohlenhydratzufuhr bei der Behandlung der diabetischen Coma mit Insulin*. An Hand von Fällen wird gezeigt, daß in sicheren Fällen von vorgeschrittenem Coma, wo der Patient bei tiefster Atmung ganz ohne Bewußtsein ist, ohne Beeinträchtigung der Heilungsmöglichkeit u. ohne die Gefahr, daß eine hypoglykämische Rk. eintritt, in den ersten Std., so lange Zucker im Urin auftritt, jegliche Zuckerzufuhr unterbleiben u. trotzdem reichlich Insulin injiziert werden kann. (Klin. Wchschr. **5**. 254—60. Breslau, Medizin. Klinik.) HÜCKEL.

Alexander Hynd, *Das Schicksal des Blutzuckers nach Insulininjektion bei normalen Tieren*. Die verhältnismäßig geringe reduzierende Kraft der Blutkörperchen von n. Kaninchen wird durch Injektion von Insulin nicht beeinflusst, die erhebliche des Plasmas fällt dagegen bis zu der der Körperchen ab. Hydrolyse ändert den Blutzucker sowohl in n. Zustände wie nach Insulin nur wenig, steigert aber das Reduktionsvermögen der Körperchen in beiden Fällen. Diese Steigerung ist zwar teilweise auf die Einw. von bei der Hydrolyse entstandenem Pepton zurückzuführen, aber der Umstand, daß sie nach Insulin erheblicher ist als vorher, läßt auf B. eines nichtreduzierenden irgendwie an die Gewebe sich bindenden Glucosekomplexes schließen. Man kann annehmen, daß ca. $\frac{1}{6}$ des nach Insulin aus dem Plasma verschwindenden Zuckers durch derartige Bindung seitens der Körperchen in Anspruch genommen wird. Derartige Schlüsse werden aber dadurch unsicher, daß die Zuckerbest. in den Hydrolysaten nach den üblichen Methoden nicht zuverlässig sind. (Biochemical Journ. **19**. 10 bis 1100. 1925. Univ. of St. Andrews.) SPIEGEL.

X. Chahovitch, *Wirkung des Zinksulfats auf die Glykolyse des Blutzuckers in vitro*. ZnSO_4 (0,5%) hemmt die Koagulation, aber läßt die Hämolyse unbeeinflusst. Wird aber ZnSO_4 defibriniertem Blut zugesetzt, so zeigt es eine ausgesprochene antiglykolyt. Wrkg. (C. r. soc. de biologie **94**. 229—30. Belgrad, Labor. de physiologie.) OPPENHEIMER.

Erik Gottlieb, *Über das Vorkommen von Cyanat im Blut*. Vf. berichtet über Vers., die entgegen den Befunden von MONTGOMERY (Biochemical Journ. **19**. 7 C. 1925. I. 2102) die Ggw. von $> 0,1$ mg Cyanat in 100 ccm Blutplasma ausgeschlossen erscheinen lassen. Cyanat, per os oder intravenös gegeben, ist giftig. Man kann daher in ihm nicht die Vorstufe des im Organismus gebildeten Harnstoffs sehen. (Biochemical Journ. **20**. 1—5. Kopenhagen, Univ.) SPIEGEL.

Lucien Dautrebande, *Übereinstimmung der nach der Formel von Hasselbalch und nach der colorimetrischen Methode von Cullen bestimmten p_{H} -Werte*. Für menschliches Blut (unter den üblichen Kautelen entnommen u. behandelt) erhielt Vf. nach HASSELBACH $p_{\text{H}} = 7,388$, nach CULLEN 7,387. Zwischen p_{H} des Gesamtblutes des Serums ergab sich eine mittlere Differenz von 0,03. (C. r. soc. de biologie **9** 131—32. Brüssel, Fondat. Reine Elisabeth Hôpit. Brugmann.) OPPENHEIMER.

Auguste Lumière und Henri Couturier, *Giftigkeit des mit Stärke versetzten Serums*. Wird 0,1 g Reisstärke zu 10 ccm Meerschweinchenserum gebracht, das Serum geschüttelt, in den Brutschrank gebracht u. gewisse Zeiten lang zentrifugiert, so ruft das ungenügend zentrifugierte Serum bei intravenöser Injektion am Meerschweinchen

schweinchen Symptome des anaphylakt. Schocks hervor. Bei ausreichendem Abzentrifugieren (30 Min., 9000 Touren) dagegen verliert das Serum seine Giftigkeit wieder. Es ist also anzunehmen, daß die Giftbildung mit sehr feinen Ndd. zusammenhängt, die bei der Einw. von Stärke im Serum entstehen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 89—91.)

OPPENHEIMER.

A. Lumière und **H. Couturier**, *Wirkung des Kaolins auf das mit Agar-Agar versetzte Serum*. Die von JAUMAIN (C. r. soc. de biologie 89. 91; C. 1923. III. 1581) aufgeworfene Frage, warum das mit Agar-Agar versetzte Serum durch Kaolin entgiftet werde, während einerseits n. Serum, mit Kaolin vorbehandelt, seine Fähigkeit, mit Agar-Agar giftig zu werden, nicht verliert, u. andererseits das Kaolin durch den Kontakt mit Agar-Agar seine Entgiftungskraft nicht einbüßt, wohl aber, wenn es mit frischem Serum in Berührung war, sei sehr einfach dadurch zu erklären, daß das Kaolin im Agar-Agar-Serum die Suspension der sehr feinen giftigen Ndd. in sich reiße, den Substanzen aber, die im n. Serum mit dem Agar-Agar die giftigen Substanzen bilden, nichts anhaben könne, trotzdem es sich mit einigen Serumeiweißsubstanzen beladet u. dadurch sein Entgiftungsvermögen verliert. (C. r. soc. de biologie 94. 195—97. Lyon.)

OPPENHEIMER.

Paul Nélis, *Wirkung des Ozons auf Diphtherietoxin*. Unter der Einw. von Ozon gehen verschiedene Farbänderungen im Toxin vor sich, u. das wirksame Gift wird nach u. nach zerstört. Da eine indirekte Einw. (Hypochlorite, Nitrite) ausgeschlossen werden kann, muß eine unmittelbare angenommen werden. (C. r. soc. de biologie 94. 139—41. Gent, Inst. d'hyg.)

OPPENHEIMER.

F. Piccininni und **E. Lombardi**, *Über den Ursprung der Oxalsäure*. (Beitrag zur Pathogenese der Oxalurie.) Unterss., aus denen hervorgeht, daß in der Darmflora von chron. Oxaluriekranken sich eine spezielle Rasse des B. coli findet, die imstande ist, Oxalsäure zu bilden, daß dieses oxalogene B. coli bei richtiger Isolierung u. Züchtung in vitro reichlich Oxalsäure bildet u., an nicht oxalur. Individuen per os verabreicht, eine Oxalurie erzeugen kann. (Klin. Wechschr. 5. 260—63. Neapel, Inst. f. allgem. Medizin.)

HÜCKEL.

C. N. Myers, *Einfluß von Farben auf das Eindringen von Arsen in das Zentralnervensystem und die Cerebrospinalflüssigkeit*. Nach Injektion verschiedener Salvarsanpräparate wurden sehr verschiedene Mengen As im Gehirn gefunden. Wurde gleichzeitig Trypanrot, oder Bismarckbraun R, oder Pyronin S, oder Methylenblau oder Trypanblau injiziert, so änderte sich der As-Wert des Gehirns nicht, dagegen wurde der Liquor As-reicher. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 22. 441—45. 1925. New York, Columbia univ. Dep. of dermatol. a syphilol., coll. of physic. a surg.; Ber. ges. Physiol. 32. 106. 1925. Ref. BRAUN.)

OPPENHEIMER.

Piéry, **Bonnamour** und **Milhaud**, *Neue Untersuchungen über die Wirkung schwefelhaltiger Substanzen und schwefelhaltiger Mineralwässer auf die Atmung*. Nur die Schwefelsubstanzen bewirken Atmungsregung, die imstande sind, H₂S abzuspalten bezw. zu bilden. (C. r. soc. de biologie 94. 69—70. Lyon, Inst. d'hyg.)

OPPENHEIMER.

L. Randoïn, **J. Alquier**, **Asselin** und **Charles**, *Fortpflanzung, Wachstum und Nahrungsgleichgewicht*. (Vgl. S. 155.) Fortsetzung der früheren Verss. mit Kleie als Grundnahrung. Die für das Wachstum optimalen Mischungsverhältnisse der Nahrung sind nicht immer die optimalen für die Fortpflanzungsfähigkeit u. umgekehrt. Auch genügt die Nahrung, die für die männlichen Tiere (Ratte) in bezug auf Qualität ausreicht, nicht immer für die weiblichen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 82. 94—96.)

OPPENHEIMER.

G. Mouriquand, **P. Michel** und **Milhaud**, *Vergleich der Wirkung des Wassers von Vichy (Grande Grille) mit der einer Lösung von Bicarbonat mit entsprechendem Gehalt auf das partiell ernährungsgestörte Meerschweinchen*. Die Verzögerung im Auf-

treten avitaminot. Symptome nach Applikation von Vichy-W. bewirkt das künstlich Mineralwasser mit dem gleichen CO₂-Gehalt nicht. (C. r. soc. de biologie **94**. 65—66 Lyon, Inst. d'hydrolog.) OPPENHEIMER.

Jack Cecil Drummond, Harold John Channon und Katherine Hope Coward *Studien über die chemische Natur von Vitamin A.* (Vgl. DRUMMOND, ROSENHEIM u. COWARD, Journ. Soc. Chem. Ind. **44**. T. 123; C. **1925**. II. 738.) Die bereits mehrfach gemachte Angabe, daß Vitamin A in der unverseifbaren Fraktion des Lebertrans konz. werden kann, wenn bei der Herst. Oxydation verhindert wird, wird durch neue Verss. bestätigt. Im Konzentrat fanden sich keine nachweisbaren Mengen I oder N. Aus dem Unverseifbaren kann das Cholesterin (ca. 50%) ohne Verlust an Vitamin A entfernt werden. Dieses ist mit überhitztem Dampf flüchtig, bei Destillat im Vakuum geht es hauptsächlich zwischen 180 u. 220° bei 2—3 mm Hg über, ohne daß hierbei eine befriedigende Trennung der Komponenten des cholesterinfreien Rückstandes erreicht wird. In den akt. Destillaten wurden ein gesätt. Alkohol vor F. ca. 60° (I), der ungesätt. KW-stoff *Spinacen* (II) u. ein oder mehrere ungesätt. Alkohole vom Kp.₂₋₃ ca. 200° (III) gefunden. I u. II sind ohne Vitaminwrkg.; o III damit ident. ist, konnte nicht festgestellt werden. Die in anderen Leberölen festgestellten ungesätt. Alkohole *Oleylalkohol*, C₁₈H₃₆O, u. *Selachylalkohol*, C₂₀H₄₀O₂, sowie *Phytol* sind es jedenfalls nicht. Die Ansprache TAKAHASHIS, das Vitamin A isoliert u. mit einem ungesätt. Alkohol C₂₇H₄₆O₂ (*Biosterin*) identifiziert zu haben, wurde einer Kritik unterzogen. Möglicherweise besteht eine Beziehung zu dem Lipocholesterol des Lebertrans. (Biochemical Journ. **19**. 1047—67. 1925. London, Univ. Coll.) SPIEGEL.

Gladys Annie Hartwell, Brustdrüsensekretion. VI. *Vitamin B und die Nahrung der säugenden Ratte.* 1. *Die quantitative Beziehung des Vitamins B zum Eiweiß.* 2. *Vitamin-B-Erfordernis der säugenden und der nicht säugenden Ratte.* (Vorläufige Mitteilung.) (Vgl. Biochemical Journ. **18**. 785; C. **1925**. I. 2574.) Um ihre Jungen mit Erfolg aufzuziehen, braucht die säugende Ratte viermal so viel Vitamin B als das junge, wachsende Tier. Einige Junge können auch bei von Vitamin B freier synthet. Kost mit 20% Caseinogen aufgezogen werden, die Mutter verliert dabei aber an Gewicht, u. die Jungen bleiben schwächlich. Ähnliches ist der Fall, wenn die synthet. Kost nur 10% Caseinogen enthält. (Biochemical Journ. **19**. 1075—81. 1925. London, King's Coll. f. women.) SPIEGEL.

J. Smorodinzew und N. Riabouschinsky, Zur Frage des Einflusses von Arsen- und Antimonverbindungen auf die fermentativen Funktionen des Organismus. III. *Mit Änderung sich die Wasserstoffzahl des Milieus während der Verdauung des Caseins durch Pepsin in Anwesenheit von Arsen- und Antimonverbindungen?* (II. vgl. S. 2008.) Bei der Caseinmethode nach GROSS ändert der Zusatz der untersuchten As- u. Sb-Verbind. das pH nicht. Die Best. des pH kann colorimetr. mit Methylviolet durchgeföhrt werden. — Die hemmende Wrkg. der As-Verbb. ist ausschließlich durch das Anion bedingt. (Biochem. Ztschr. **168**. 73—76. Moskau, Tropeninst. d. Volkskommis. f. Gesundheit.) HESSE.

Harry Ellis Charter Wilson, Studien über Stickstoff- und Schwefelstoffwechsel. (Vgl. Biochemical Journ. **19**. 322; C. **1925**. II. 1062.) Ein Eiweißmaterial wie Gelatine, dem Körper während sonstigen Fastens zugeführt, kann teilweise mindestens 6 Tage zurückgehalten werden, wahrscheinlich in irgendeiner komplexen Form nicht in Form freier Aminosäuren. — Fleischextraktstoffe, während N-Hungers zugeführt, werden teilweise zurückgehalten; das retinierte Material entspricht in der Zus. nicht dem Muskelgewebe. Die Extraktstoffe scheinen dabei auch eine An hindernden Einflusses auf den N-Stoffwechsel auszuüben. — Überschüssige Zufuhr von W. steigert die Ausscheidung von N im Harn, indem sie die Umwandlung des N-Anteils des Eiweißmol. anregt. — Die Abhandlung enthält weiteres Material zu

unsten der Ansicht, daß bei Speicherung von Eiweiß zunächst der S zurückgehalten wird. (Biochemical Journ. 20. 76—83. Glasgow, Univ.) SPIEGEL.

A. W. Hewlett, G. D. Barnett und J. L. Lewis, *Der Einfluß der Einatmung von sauerstoffreicher Luft auf die Milchsäureausscheidung im Harn*. Die Milchsäureausscheidung im Harn während Muskelarbeit ist bei Einatmung eines Luftgemisches mit 40% O₂ um 39—67% höher als bei Einatmung atmosphärischer Luft. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 22. 538—39. 1925. S. Franzisko, Dep. of med. Stanford med. school; Ber. ges. Physiol. 32. 873. 1925. Ref. HERBST.) OPPENHEIMER.

Otto Meyerhof, *Über die Abtrennung des Milchsäure bildenden Ferments vom Muskel und einige seiner Eigenschaften*. (Vgl. S. 2119.) Vorl. Mitt. Das „glykolyt.“ Ferment kann, ähnlich wie das Gärungsferment Zymase u. das Atmungsferment, vom Leben u. der Struktur der Zelle getrennt werden. Bisher hergestellte Muskelsäfte wiesen spontane Milchsäurebildung u. die Fähigkeit auf, zugesetzte Hexosediphosphorsäure zu spalten, verhielten sich aber gegenüber Glykogen u. Traubenzucker unwirksam. Durch Extraktion vorsichtig zerkleinerter Frostmuskulatur mit isoton. Cl-Lsg. bei —1 bis —2° u. scharfes Zentrifugieren erhielt Vf. einen durchsichtigen, kanulafreien Muskelsaft, der die die energieliefernden Rkk. im Organismus katalysierenden Fermente in hohem Grade enthielt. Der Saft ist nahezu frei von spaltbaren Kohlenhydraten u. bildet daher spontan fast keine Milchsäure. Die abnehmende Wirksamkeit der Muskelsäfte nach mehrfacher Extraktion, durch die der Muskel doch nicht an Ferment erschöpft wird, beruht hauptsächlich auf dem Mangel an solcher auslaugbarem, kochbeständigem Coferment. Bei Zusatz von diesem, aus Muskel- oder Hefekochsaft, werden in Summa von den Extrakten mehr Kohlenhydrate gespalten als direkt von der Muskulatur, in der also die Glykolysegeschwindigkeit nicht durch den Enzym-, vielleicht aber durch den Cofermentgehalt begrenzt wird. Das Enzym ist ll. in W.; es kann mit Aceton u. Ä. als Pulver erhalten werden, das doch nur noch etwa 20% der vorherigen Wirksamkeit besitzt. Die Wirksamkeit des Saftes geht bei 37° fast momentan, in Eis nach 1/2 Tag verloren. Das Ferment wird durch Berkefeldkerzen filtrierbar; auf dem Ultrafilter läßt sich das Coferment abtrennen, das den selbst unwirksamen Rückstand wieder zu aktivieren vermag. Die Fähigkeit zur Kohlenhydratspaltung ist spezif. Die Hexosen, darunter der Traubenzucker, ebenso die Disaccharide Maltose, Amylobiose werden nur ganz wenig gespalten. Die Geschwindigkeit der Milchsäurebildung ist gleich aus Glykogen, Stärke u. deren Abbauprodukten. Amylopectin, Amylose u. Trihexosan (aus Amylopectin; PRINGSHEIM); es fällt nach mehreren Stdn. langsam ab u. beträgt (bezogen auf das Frischgewicht Muskulatur), bei 20° und p_H 7,4 0,15—0,2% Milchsäure pro Stde., die ungefähr 2/3 der Geschwindigkeit der spontanen Milchsäurebildung in zerschnittener Muskulatur entsprechen. Außer diesen höheren Kohlenhydraten werden in etwas geringerem Maße glykolytisch Hexosediphosphorsäure (aus Hefe), Fructosemonophosphorsäure u. die Ribbonsche Hexosemonophosphorsäure. Phosphatzusatz zum Extrakt erhöht den Gesamtumsatz von Glykogen. Nach den Verss. ist es zweifellos, daß bei der Spaltung der Hexosane eine aktive Hexosemodifikation entsteht, die unter Mitwirkung der Phosphorsäure in Milchsäure zerfällt. (Naturwissenschaften 14. 96—98. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biologie.) LOHMANN.

Charles Lovatt Evans, *Studien über die Physiologie des glatten Muskels*. IV. *Der Milchsäuregehalt des glatten Muskels unter verschiedenen Bedingungen*. (Vgl. Journ. Physiol. 58. 22; C. 1924. I. 1226.) Der Milchsäuregehalt von Muskeln in Ruhe, bei Arbeit, bei Starre u. in verschiedenen Lsgg. wurde bestimmt. Ob die Milchsäure aus Glykogen oder überhaupt aus einem Kohlenhydrat entsteht, konnte bisher mit Sicherheit nicht festgestellt werden. (Biochemical Journ. 19. 1115—27. 1925. London, St. Bartholomew's med. coll.) SPIEGEL.

Ernst Mangold und Constanze Schmitt-Krahmer, *Über die Milchsäurebildung bei der Totenstarre glatter Muskeln*. II. (I. vgl. S. 2119.) Es war gezeigt, daß bei Taubenmagen die postmortale Zunahme der Milchsäure ein Maximum nach etw. 3 Stdn. post mortem hat, das mit den mechan. Veränderungen bei der Totenstarre des Muskels zeitlich zusammenfällt. Daß die Milchsäurebildung auch für die glatte Muskulatur Bedingung für die Entw. der Totenstarre ist, wird dadurch zur Gewißheit erhoben, daß die postmortale Milchsäurebildung beim Muskelmagen von Hühnern erst nach 5 Stdn. ihr Maximum erreicht, wo Totenstarreverkürzung u. Härtezunahme (nach POTONIE) ebenfalls erst maximale Werte haben. Der Milchsäuregehalt in Ruhe beträgt beim Hühnermagen im Mittel 0,093%, das Maximum der Totenstarre nach 5 Stdn. 0,145%. Der allmähliche Abfall des Milchsäuregehalts ist beim Hühnermagen weniger ausgeprägt, er geht nicht wie bei der Taube nach 20 Stdn. auf den Anfangswert zurück. (Biochem. Ztschr. **169**. 186—91. Berlin, Tierphysiol. Inst. der Landw. Hochschule.) LOHMANN

S. A. Holboell, *Untersuchungen über die Verminderung der Monosaccharide im Blut in vitro. Studien über den Kohlehydratstoffwechsel*. XV. Das Reduktionsvermögen von Blut, dem Glucose, Fructose, Mannose u. Galaktose zugesetzt wurde, ist laufend 12 Stdn. lang geprüft worden. Mit Ausnahme von Galaktose verschwinden sämtliche Zucker mit der gleichen Geschwindigkeit. (C. r. soc. de biologie **94**. 125—126. Kopenhagen, Clin. med. du Pr. Lundsgaard.) OPPENHEIMER

C. Lundsgaard und S. A. Holboell, *Untersuchungen über die Eigenschaften des im Muskelgewebe aufgefundenen Insulinkomplements. Studien über den Kohlehydratstoffwechsel*. XVI. (Unter Mitarbeit von A. Gottschalk.) (XV. vgl. vorst. Bericht.) Das im Muskelgewebe vorhandene Prinzip, Insulinkomplement genannt, das in Gegenwart von Insulin die Transformation von α - β -Glucose in „Neoglucose“ veranlaßt, ist nicht ident. mit dem Meyerhofschen Coferment, ist nicht mit W. extrahierbar, verträgt nicht eine Temp. von 70° (2 Min. lang). Da es auch im Muskelpreßsaft nicht zu finden ist, wird vermutet, daß es an die Unversehrtheit der Muskelzellen gebunden ist. (C. r. soc. de biologie **94**. 127—28. Kopenhagen, Clin. med.) OPPENHEIMER

Corbet Page Stewart, *Studien über Arginin- und Histidinstoffwechsel*. II. *Arginin und Histidin als Vorläufer von Purinen*. (I. vgl. Biochemical Journ. **19**. 261. C. **1925**. II. 413.) Junge Ratten verlieren bei einer von Histidin u. Arginin freien Kost an Gewicht, u. es fällt dabei die Allantoinausscheidung, nicht aber der Gesamtstickstoff auf $\frac{1}{2}$ des n. Wertes. Wird dann Histidin der Kost zugesetzt, so tritt wieder Wachstum ein u. steigt die Allantoinausscheidung. Es können danach mit ACKROYD u. HOPKINS (Biochemical Journ. **10**. 551; C. **1917**. I. 888) die Histidinfunktion als Vorläufer der Purine im Tierkörper angesehen werden. Dagegen zeigte Wiederaufzuführung von Arginin nicht die gleiche Wrkg. auf Wachstum u. Allantoinausscheidung, wohl aber brachte sie die Abnahme des Gewichts u. des Allantoins zum Stillstand. Arginin kann sonach das Histidin nicht völlig vertreten, u. es bleibt zweifelhaft, ob es überhaupt im Purinstoffwechsel eine Rolle spielt. — Erwachsene Ratten konnten bei einer Nahrung, die nur Spuren von Arginin u. Histidin enthielt, 28 Tage am Leben bleiben, ohne daß Verlust an Gewicht oder Verminderung der Allantoinausscheidung eintrat. (Biochemical Journ. **19**. 1101—10. 1925. Univ. of Edinburgh.) SPIEGEL

Ede Brouwer, *Mitteilung über Anämie, Urobilinurie und Darmhämorrhagie bei Kaninchen im Gefolge ausschließlicher Ernährung mit Kuh- und Ziegenmilch*. Auf Grund der experimentellen Milchanämie ist nicht nur Abnahme der B. von Hämoglobin anzunehmen, da die Urobilinurie u. die bei Autopsie nachgewiesene Darmhämorrhagie auch vermehrten Verlust an roten Blutkörperchen anzeigen. (Biochemical Journ. **20**. 105—07. Hoorn [Holland], Staatl. Landwirtschaftl. Vers.-Station.) SPIEGEL

Roger S. Hubbard und Samuel A. Munford, *Alkaliausscheidung bei Achlorhydrie*. Die Beziehungen zwischen HCl-Sekretion u. Alkaliausscheidung sind nicht

streng gesetzmäßig, denn es spielen Faktoren, wie die Beziehung von Urinalalkalität u. Atmung usw. auch eine mehr oder weniger große Rolle. Im allgemeinen fehlt eine größere Alkaliausscheidung bei Achlorhydrie oder bei geringen HCl-Werten, u. umgekehrt ist bei Patienten mit HCl nach dem Probefrühstück die Harnalkaliausscheidung deutlich. Jedoch finden sich auch Fälle mit Alkaliausscheidung bei Achlorhydrie, wie solche mit höheren HCl-Werten ohne Alkaliexkretion. (Arch. of internal med. **35**. 76—85. 1925. Ber. ges. Physiol. **32**. 866—67. 1925. Ref. BLOCH.) OPPENHEIMER.

Roger S. Hubbard und **Ellery G. Allen**, *Gleichzeitige Bestimmung von Magensäure und Alkaliausscheidung im Harn*. Ergänzende Verss. zu vorst. Arbeit mit Variation der Nahrung. (Arch. of internal med. **35**. 586—93. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 67. 1925. Ref. BLOCH.) OPPENHEIMER.

J. E. Abelous und **L. C. Soula**, *Über die cholesterinogene Funktion der Milz; Einfluß der inneren Sekretion der Milz auf die Cholesterinbildung in den Muskeln*. C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 98—100. — C. **1926**. I. 2118.) OPPENHEIMER.

J. Kolda, *Einfluß der Galle auf die Resorption gewisser Arzneimittel*. Tierverss. mit Ca-Lactat, Strychnin-HCl, Chinin-HCl, Phenacetin, Pyramidon, Salicylaten u. mit P-Öl, die gleichzeitig mit Galle oder an Tieren mit Gallenfisteln dargereicht werden, zeigen, daß die Galle einen Einfluß auf die Resorption von Arzneien hat, der sich aber gesetzmäßig noch nicht fassen läßt, obwohl die Beeinflussung meist sehr deutlich ist. C. r. soc. de biologie **94**. 216—28. Tschechoslowakei.) OPPENHEIMER.

W. Blair Bell, **R. A. Hendry** und **H. E. Annett**, *Die spezifische Wirkung des Kupfers auf das choriale Epithel beim Kaninchen im Gegensatz zur Wirkung von Kupfer, Thallium und Thorium*. (Journ. of obstetr. a gynaecol. of the Brit. Empire **32**. 1—16. 1925. Liverpool, Dep. of gynaecol. a. obstetr.; Ber. ges. Physiol. **32**. 905—06. 1925. Ref. ASCHHEIM.) OPPENHEIMER.

N. Okunew, *Studien über parenterale Resorption*. IV. Mitt. *Die Beeinflussung der intraperitonealen Resorption von Trypanblau durch einige adsorptionsfähige Substanzen*. (II. vgl. S. 161.) Die Verzögerung der intraperitonealen Resorption von Trypanblau ist durch Tierkohle > Casein > Bolus alba > Gelatine, Gummi arabicum. Die Beeinflussung der Resorption besteht auch noch, allerdings in geringerem Maße, wenn das Adsorbens 30 Min. nach der Injektion des Farbstoffs in die Bauchhöhle eingeführt wird. Die Wrkg. von Tierkohle u. Bolus alba beruht sehr wahrscheinlich auf Adsorption, die der anderen Substanzen auf der verlangsamten Diffusion des Farbstoffs in deren Lsgg., die z. B. in vitro bei der Diffusion von Trypanblau in Gelatinegg. gefunden wird, u. die vielleicht auf die wasserentziehenden u. adsorptiven Eigenschaften dieser Substanzen zurückzuführen ist. Bei der Adsorption des Trypanblaus durch Kolloide handelt es sich vor allem um die Adsorption der blauen Farbkomponente. — Die Verss. bestätigen die Berechtigung der Adsorptionstherapie bei Peritonitis. Biochem. Ztschr. **168**. 251—62. Leningrad, Militär-Medizin. Akad.) LOHMANN.

Maurice Lane Tainter, *Verhinderung des Paraphenylendiaminödems durch verschiedene Arzneimittel und die Beziehungen dieses Phänomens zu den Nebennieren*. Durch Nikotin, Strychnin, Pikrotoxin u. Santonin konnte das Auftreten des p-Phenylendiaminödems verhindert werden. Die Ursache dieser Erscheinung liegt in der Behinderung der Blutzufuhr, die durch Gefäßkontraktion, also Sympathikusreiz, vielleicht durch Adrenalinausschüttung bedingt ist. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. **2**. 544—45. 1925. S. Franzisko, Dep. of pharmacol. school of med. Stanford; Ber. ges. Physiol. **32**. 907—08. 1925. Ref. KRAUSPE.) OPPENHEIMER.

D. Michail und **P. Vancea**, *Untersuchungen über die Wirkung von Atropin und Pilocarpin bei Injektion in der Carotis*. Bei intraarterieller Injektion in die Carotis erhält man andere Wrkgg. als bei intravenöser Injektion. Hinweis auf die therapeut. Nutzbarkeit dieser Tatsache, speziell wenn man eine relativ isolierte Einw. auf

die bulbären Zentren erreichen will. (C. r. soc. de biologie **94**. 151—53. Cluj, Cl. ophthalm.)

OPPENHEIMER.

J. Froment, P. Delore und Juillard, *Dynamische Wirkung von Hyoscin (oc Parkinsonzuständen*. Dynamometerverss. nach Injektion von 0,5 mg *Hyoscin* (oc *Scopolamin*) ergeben eine Zunahme der Muskelkräfte bei Parkinsonkranken. (C. r. soc. de biologie **94**. 57—59. Lyon.)

OPPENHEIMER.

L. Mitrovitch, I. *Wirkung von Pilocarpin auf die Sekretion und die Motilität des menschlichen Magens*. II. *Wirkung des Atropins auf die Funktionen des menschlichen Magens*. Pilocarpin verursacht keine Hyperazidität; es wirkt auf die Sekretion der Schleimdrüsen des Magens wie auf die der Bronchien u. Nasenschleimhaut. I. Motilität ist vermindert, Spasmen treten nicht auf. Da Vagusreizung eine Hypersekretion u. gesteigerte Motilität veranlassen müßte, kann die Pilocarpinwrkg. nicht in einer typ. Vagusreizung bestehen. II. Atropin verändert die Magensaftsekretion durch Verminderung der Azidität u. des Pepsins. Das Wrkg.-Ergebnis ist individuell sehr verschieden. Ein Antagonismus zwischen Pilocarpin u. Atropin am Magen besteht nicht, im Gegenteil, der Einfluß auf die Motilität verläuft gleichsinnig, was auch wahrscheinlich mit verschiedenem Mechanismus. (C. r. soc. de biologie **94**. 221—22. 223—24. Belgrad, Clin. méd. Univ.)

OPPENHEIMER.

Joaquim Fontes, *Die Wirkung des Veratrins und der funktionelle Dualismus der muskulären Elemente*. Die sarkoplasmareichen Muskeln werden von Veratrin stärker beeinflusst als die sarkoplasmaarmen. (Journ. de physiol. et de pathol. gén. **23**. 292—301. 1925. Lissabon, Inst. de physiol.; Ber. ges. Physiol. **32**. 858. 1925. Ref. SIMONSON.)

William R. Meeker, *Untersuchungen über Lokalanästhesie*. IV. *Die Pharmakologie einiger Verbindungen der p-Aminobenzoesäureester*. Lokalanästhetische Wirkung auf die Schleimhäute und die Haut beim Menschen. (Vgl. MEEKER u. FRAZER, Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics **22**. 375; C. **1924**. I. 1965.) Es wurden eine Anzahl von Dialkylaminoderivv. der p-Aminobenzoesäureäthyl- u. -propylester, hergestellt von ROGER ADAMS, in Form der HCl-Salze, bzgl. der genannten Wrkgg. mit Cocain u. Butyn verglichen. Die Dimethylaminoderivv. u. der Diäthylaminoäthylester haben ungenügende Wrkg. Die Di-i-butylaminoderivv. bewirken ausgesprochene lokale Reizung der Gewebe. Für Oberflächenanästhesie der Schleimhäute sind Di-n-propyl-, Di-n-butyl- u. Di-sek.-butylaminoäthylester sowie Di-i-sek.-butylaminoderivv. mindestens so wirksam wie Cocain, für Infiltrationsanästhesie Di-n-propyl-, Di-i-propylaminoäthylester u. die entsprechenden Propylester ebenso wirksam wie Cocain, Di-n-butyl-, Di-sek.-butylaminoäthylester u. die entsprechenden Propylester stärker, so daß sie vorbehaltlich näherer Prüfung Erfolg versprechen. (Journ. Lab. Clin. Medicine **11**. 468—78. Chicago [Ill.], Univ. of Illinois.)

SPIEGEL.

H. Mc Guigan und Glenn A. Brough, *Untersuchungen über Lokalanästhesie*. V. *Die Giftigkeit von Verbindungen der p-Aminobenzoesäureester*. (IV. vgl. vorst. Ref.) Trotz einiger Abweichungen läßt sich für die Reihe der von MEEKER untersuchten Verbb. die Regel bestätigen, daß innerhalb der homologen Reihe die Giftwirkung mit zunehmendem Mol.-Gew. steigt. Bei Injektion in die Peritonealhöhle ist die Giftigkeit dieser Verbb. geringer als die des Cocains u. etwas größer als die des Novocains. Ihr Anwachsen mit dem Mol.-Gew. ist geringer als dasjenige der anästhesisierenden Wrkg. (Journ. Lab. Clin. Medicine **11**. 479—82. Chicago [Ill.].)

SPIEGEL.

M. B. Burns und N. Bullock, *Der Phenolkoeffizient*. Es wurden die Phenolkoeffizienten der in den vorst. Ref. behandelten Abkömmlinge der p-Aminobenzoesäureester gegenüber Typhusbacillen bestimmt. (Journ. Lab. Clin. Medicine **11**. 482—8. Chicago.)

SPIEGEL.

E. Bardier und A. Stillmunkès, *Empfindlichkeitserhöhung der bulbären Zentren für Cocain durch Chloroform*. Mit Chlf. narkotisierte Hunde sind außerordentlich viel empfindlicher gegen Cocain-HCl als n. oder mit Chloralose behandelte. (Vgl.

änderung der minimal tödlichen Dosis. (C. r. soc. de biologie **94**. 118—20. Toulouse, Lab. de path. gén. et exp.) **OPPENHEIMER.**

M. Nechkovitch, *Einige physiologische Beweise gegen die Möglichkeit einer chemischen Neutralisation von Narkotika durch Glucose*. Gleichzeitige Einw. von Glucose u. Chloralhydrat oder A. auf Kalt- u. Warmblüter ändert an der Narkotikum-rkg. nichts. (C. r. soc. de biologie **94**. 219—20. Belgrad.) **OPPENHEIMER.**

Friedrich Munter und **Hermann Steinitz**, *Hämoglobinurie und Nephritis bei Neosalvarsan-Wismutkur*. Während einer Neosalvarsan-Wismutkur trat im Anschluß eine Neosalvarsaninjektion Hämoglobinurie mit Spasmen in den unteren Extremitäten, u. wenige Tage darauf eine akute Glomerulonephritis auf, die in kurzer Zeit unter den Zeichen eines uräm. Herztodes zum Exitus führte. (Berl. klin. Wchschr. **1923**. 263—65. Berlin, Krankenhaus der jüd. Gemeinde.) **HÜCKEL.**

N. Scheinfinkel, *Studien über antagonistische Nerven*. Nr. 28. *Über die sympathischen und parasympathischen Gifte als Beeinflusser physikalisch-chemischer Zeitaktionen. Untersuchungen am Herzen*. Fortsetzung der Unterss. von BENTELI (Ztschr. f. Biologie **82**. 311; C. **1925**. I. 1224) über die Einw. der genannten Pharmaka auf die Muskeln, wie sie sich in der Dauer des elektr. Reizstromstoßes, der gerade zu einer Erregung erforderlich ist, ausdrückt. *Atropin* verlängert, *Acetylcholin* u. *Pilocarpin* verkürzen die Zeitdauer des Stromstoßes. (Ztschr. f. Biologie **1925**. 239—48. Bern, Physiol. Inst.) **OPPENHEIMER.**

Kurt Immenhauser, *Studien über antagonistische Nerven*. Nr. 29. *Über die Abhängigkeit der zeitlichen Verhältnisse im Nerven vom Oxydationsvermögen desselben*. (8. vgl. vorst. Ref.) Die Grundfrage war: die Bedingungen der refraktären Periode in ihrer Beziehung zum O_2 -Mangel zu prüfen. Mit einer entsprechend ausgearbeiteten Methodik wurde die Dauer der refraktären Periode eines in *Cyanid-* bzw. *arseniger* *Lsg.* befindlichen Nerven festgestellt. Durch die beiden Gifte wird das Aufnahmevermögen für O_2 aufgehoben, was prakt. mit O_2 -Mangel gleichzusetzen ist. Es fand sich stets eine (reversible) Verlängerung der refraktären Periode. Entsprechende Schlüsse für die Grundfrage. (Ztschr. f. Biologie **84**. 249—60. Bern, Physiol. Inst.) **OPP.**

Adolfo Matossi, *Studien über antagonistische Nerven*. Nr. 30. *Untersuchungen über den Einfluß autonomer Gifte auf die Erregungsvorgänge im motorischen, markhaltigen Nerven*. (29. vgl. vorst. Ref.) *Atropin* verlängert, *Pilocarpin*, *Acetylcholin* u. *Physostigmin* verkürzt die Summationszeit von 2 Reizen, sowohl bei Applikation an der Erregungsstelle, als auch an einer von dieser entfernt liegenden Stelle. (Ztschr. f. Biologie **84**. 261—70. Bern, Physiol. Inst.) **OPPENHEIMER.**

Albert Blum, *Studien über antagonistische Nerven*. Nr. 31. *Prüfung des Einflusses von sympathischen und parasympathischen Giften auf den Erregungsprozeß im Nerven vermittelt Kondensatorenladung*. (30. vgl. vorst. Ref.) Erregung n. u. durch *Atropin*, *Acetylcholin*, *Physostigmin*, *Pilocarpin*, *Adrenalin*, hyper- u. hypoton. Einsisse vergifteter Nerven durch Kondensatorenladungen u. Feststellung, in welchem Umfang die Kapazität des Kondensators jeweils geändert werden mußte. (Ztschr. f. Biologie **84**. 271—80. Bern, physiol. Inst.) **OPPENHEIMER.**

René Lorétan, *Studien über antagonistische Nerven*. Nr. 32. *Untersuchungen über die physikalisch-chemische Beeinflussung eines Atmungsmodells durch sympathische und parasympathische Gifte*. (31. vgl. vorst. Ref.) Verss. nach dem Vorgang **WARBURGS** mit Bluttierkohle als Atmungsmodell. Bestimmt wurde die Oxydation von *Leucin* unter n. Bedingungen u. unter dem Einfluß von Giften. *Atropin*, *Pilocarpin*, *Physostigmin* u. *Acetylcholin* wirken zweiphas.; in starker Konz. vermindern, in mittleren vermehren sie den O_2 -Verbrauch. *Skopolamin* wirkt nur hemmend. (Ztschr. f. Biologie **84**. 281—96. Bern, physiol. Inst.) **OPPENHEIMER.**

C. de Lind van Wyngaarden, *Die Zuverlässigkeit physiologischer Eichungen, der Digitalis ausgearbeitet, nebst Untersuchungen über das Trocknen und Aufbewahren*

der *Digitalisblätter*. Sehr umfangreiche Unterss. an der Katze nach HATCHER, die die Überlegenheit u. Zuverlässigkeit dieser Methode zeigen. Bei niedriger Temp. getrocknete Blätter u. die Digitalistinktur behalten ihren Wirksamkeitstitel 2 Jahre unverändert. (Ber. ges. Physiol. 32. 910—11. 1925. Utrecht 1925. Dissertation. Ref. ZEEHUISEN.) OPPENHEIMER.

Raymond-Hamet, *Wirkung des Yohimbin und der wirksamen Mutterkornalkaloide auf die sympathische Vasomotoreninnervation der Niere*. Yohimbin, Ergotamin, Ergotoxin u. Ergotinin lähmen die Vasokonstriktoren der Niere. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 170—73.) OPPENHEIMER.

J. Cluzet, Piéry, Bonnamour, Milhaud und Kofman, *Wirkung von schwefelhaltigen Stoffen auf das Herz. Elektrokardiogramme*. Auf Injektion kolloidalen Schwefels lassen sich elektrokardiograph. Veränderungen der Herztätigkeit nachweisen. Unterschiedliche Rkk. bei nichttox. u. tox. Dosen. (C. r. soc. de biologie 94. 51—52. Lyon, Lab. de physiother. et de radiol. clin. de l'inst. d'hydropath.) OPPENHEIMER.

Et. Maigre, *Wirkung von Natriumdisulfid auf die Warzen und Condylome*. Günstige Wrgk. bei Benutzung von Bädern. (C. r. soc. de biologie 94. 118.) OPPENHEIMER.

Heinrich Ruge, *Eine Nahrungsmittelvergiftung durch Sauerkraut*. Es werden die Gründe angeführt, die für die ursächliche Bedeutung des Sauerkrauts in den beobachteten, übrigens leicht verlaufenden Vergiftungsfällen sprechen. Chem. u. bakteriolog. Unterss. derselben gaben keinen Anhalt, serolog. Unterss. der Erkrankten nach WIDAL gaben teilweise positive, aber nicht völlig klare Befunde. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. 98. 18—20. Kiel.) SPIEGEL.

Alexis Carrel, *Ein Spindelzellensarkom, hervorgerufen durch Indol und übertragbar durch filtrierbares Agens*. (Vgl. S. 2218.) Durch Injektion von embryonalem Gewebe, das 10^{-6} Indol enthielt, konnte an Hühnern ein Tumor mit allen Zeichen der Malignität erzeugt werden. Ein wss. Auszug der Geschwülste, der durch Berkefeldfilter filtriert war, behielt die tumorerzeugende Eigenschaft in voller Stärke. (C. r. soc. de biologie 93. 1278—80. 1925. New York, Labor. de l'inst. Rockefeller.) OPPENHEIMER.

Edward C. Mason und Edward C. Davidson, *Untersuchungen über die Gewebeatolyse während des Lebens. II. Physikalische und chemische Veränderungen*. Wie ein exstirpiertes Stück Leber in die Bauchhöhle zurückgebracht, dann macht sich im Blut eine Abnahme des Plasma- u. Serumvol., eine geringe Zunahme der Fibrinmenge, eine geringe Verzögerung der Gerinnungszeit, eine anfängliche Ab-, dann Zunahme der Aminosäuren, eine Abnahme des Zuckers, ein Anstieg der Harnsäure, eine Abnahme der späteren Zunahme des Harnstoff-N u. Rest-N bemerkbar. (Journ. of laborat. a. clin. med. 10. 622—30. 1925.; Ber. ges. Physiol. 32. 877—78. 1925. Detroit, Henry Ford hospital. Ref. MISLOWITZER.) OPPENHEIMER.

G. Analyse. Laboratorium.

J. Duclaux und J. Errera, *Einige Bemerkungen über die Zähigkeitsmessung bei reinen Flüssigkeiten. Mitteilung über ein Viscosimeter*. (Vgl. S. 173.) Vff. beschreiben ein Viscosimeter mit einer großen Anzahl gleichzeitig nebeneinander wirkender Capillaren, wodurch die Mängel des Ostwaldschen Viscosimeters ausgeschaltet werden. Es dient hierzu eine unglasierte Chamberlandkerze, die durch ein Glasrohr verlängert u. entsprechend adaptiert ist. In diesem App. folgt das Durchfließen der reinen Fl. dem Poiseuilleschen Gesetz. Der Porendurchmesser beträgt ungefähr 2μ . — Es wird an Vers.-Ergebnissen gezeigt, daß die mit derselben Fl. erhaltenen Werte konstant sind u. daß die Durchlaufszeit dem Druck umgekehrt proportional ist. Bei Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Xylol, Amylalkohol ist die Durchlaufszeit proportional der Viscosität. (Kolloid-Ztschr. 38. 138—41. Brüssel, Technische Hochschule d. Univ.) LASCH.

C. J. J. Fox und **C. L. Mankodi**, *Eine Bemerkung über eine verbesserte Vorrichtung zum Betrieb eines Thermostaten bei niedrigen Temperaturen.* Der von den ff. für Arbeiten bei 25° konstruierte App. (Beschreibung u. Abbildung im Original) unterscheidet sich von dem Hiekmannschen (Journ. Chem. Soc. London **123**. 3416; **1924**. I. 1237) dadurch, daß das Kühlwasser in einer außerhalb des Thermostaten gebrachten, in Eis gepackten Spirale hergestellt u. ein Hilfswasserbad vermieden wird. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. **2**. 292—95. 1925. Bombay, Roy. Inst. Science.)

KRÜGER.

Rudolf Lorenz, *Quantitative Adsorptionsanalyse nach H. Wislicenus.* In der Adsorptiometrie hat man Schüttel- u. Filtriermethoden zur Verfügung, erstere für Messungen am Adsorbens, letztere für Messungen am Adsorbendum. — Es wird ein von H. WISLICENUS konstruierter Filteradsorptionsapp. beschrieben u. erläutert. Als Adsorbens wird mit Vorteil Fasertonerde verwendet, die zu untersuchende Lsg. in 1—0,4% zur Analyse gebracht. — Der Anwendungsbereich der Adsorptiometrie ist sehr groß, besonders durchgebildet die Gerbstoffanalyse. Auf Grund adsorptiometrischer Untersuchungen gelangt WISLICENUS zu einer kolloidchem. Holzbildungstheorie, welche den Verholzungsvorgang als eine Kolloidabsorptionssynthese beschreibt. (Kolloid-Ztschr. **124**—26. Tharandt i. Sa.)

LASCH.

Hermann Geßner, *Der Wiegnersche Schlämmapparat und seine praktische Anwendung.* Es wird eine allgemeine Orientierung über den Wiegnerschen Schlämmapparat mit der photograph. Registrierung der Fallkurven nach GESSNER gegeben. Die Handhabung des App. u. die Auswertung der Kurven auf graph. Wege wird ausführlich besprochen. Hierauf wird die Genauigkeit der Methode diskutiert. Hierbei steht bei allen Schlämmanalysen die Hauptschwierigkeit in der Beschaffung einer vollkommen elektrolytfreien Probe, da Elektrolyte die Sedimentation stark beeinflussen. Einige Verss. von GALLAY u. BARNETTE über die Vorbehandlung der Proben werden referiert. Es werden einige Beispiele für die Anwendungsmöglichkeiten der Apparatur für Bodenkunde u. Technik beschrieben. (Kolloid-Ztschr. **38**. 115—23. Leipzig, Agrikulturchem. Labor. der Techn. Hochschule.)

LASCH.

I. O. Griffith, *Messung von Strahlungsintensitäten nach photographischen Methoden.* Nach Vfs. Ansicht ist die von HOUSTON (S. 2021) empfohlene Methode zur Messung von Strahlungsintensitäten ungenau bei großen Intensitätsunterschieden. Vf. benutzt eine Keile zur Änderung der Intensität (vgl. S. 1856). (Nature **117**. 344. Oxford,arendon Labor.)

JOSEPHY.

William Ringrose Gelston Atkins und **Carl Frederic Abel Pantin**, *Eine Verfahrensmischung für die alkalische Seite bei Wasserstoffionenkonzentrationsbestimmungen.* Für die pH-Werte von 7,8—10,8 werden Gemische von $\frac{1}{5}$ -molarer Borsäurelsg. u. $\frac{1}{5}$ -molarer Na_2CO_3 -Lsg. empfohlen. (Biochemical Journ. **20**. 102—04. Plymouth, Marine Biol. Lab.)

SPIEGEL.

Organische Substanzen.

F. Arndt und **P. Nachtwey**, *Bestimmung der Überchlorsäure in organischen Perchloraten.* Zur bequemen direkten Best. der HClO_4 (vgl. WEINLAND u. STROH, Z. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 2713; C. **1923**. I. 407) wird die Einwage des organ. Perchlorats mit einem Überschuß einer filtrierten kaltgesätt. Lsg. von K-Acetat in abs. Ethanol behandelt, wobei quantitative B. eines Nd. von KClO_4 erfolgt. In A. gut l. Perchlorat löst man zunächst in abs. A. u. gibt erst dann einen Überschuß der Acetat-Lsg. hinzu. In jedem Falle erwärmt man ca. 1 Stde. (bei swl. Perchloraten länger) fast zum Sieden, läßt ca. 1 Stde. k. stehen, saugt den Nd. auf Gooch- oder Glasfaserfilter ab, wäscht mit abs. A., trocknet bei 120° u. wägt. Im Original Umrechnungskoeffizienten. Voraussetzung ist, daß die organ. Komponente des Perchlorats, oder ihr mit K-Acetat entstehendes Umwandlungsprod., in k. A. einigermaßen l. ist oder

sich mit einer anderen Fl., z. B. CHCl_3 , welche KClO_4 nicht löst, aus dem Nd. herauswaschen läßt. Unter den Beleganalysen folgende neue Perchlorate: Pyridiniumperchlorat (siehe S. 2722). — *s. Diphenylguanidiniumperchlorat*, F. 161—163°. J. 14,5° gesätt. Lsg. in W. ca. $\frac{1}{20}$ -n. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 446—48.) ARNI

E. v. Somogyi, *Bestimmung von kleinen Mengen Alkohol und Ätherdampf nebeneinander*. Vf. beschreibt ein Verf. zur gleichzeitigen quantitativen Best. von A. u. in einem Gemisch derselben. Das Gemisch der zu bestimmenden Substanzen wird einem Luftstrome durch ein Gefäß mit verd. H_2SO_4 (1 Vol. konz. H_2SO_4 1,835 u. 3 Vol. W.) geleitet, welches den A. quantitativ absorbiert, den Ä. jedoch passieren läßt. Letzterer wird in eine Lsg. von n. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. konz. H_2SO_4 (1:1) geleitet u. zu Eg. oxydiert. Desgleichen wird der Inhalt der ersten Vorlage nach Beendigung der Absorption mit saurem $\frac{1}{10}$ -n. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ oxydiert. Die verbrauchten Mengen $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ergeben die Mengen A. u. Ä., wenn 1 ccm $\frac{1}{10}$ -n. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0,001126 g A. u. 0,0009256 g Ä. entspricht. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 280—81. Budapest, Hochsch.) TAUBE

E. Bissinger, *Über Fällung des Traubenzuckers nach Salkowski-van Slyke*. Bei der Fällung von (20—34 mg) Traubenzucker nach SALKOWSKI-VAN SLYKE mit CuSO_4 u. Kalk wird nach Lösen des Nd. mit Essigsäure u. Entfernung des Cu -u. Ca -Acetats durch Fällung mit H_2S u. K-Oxalat der Traubenzucker bei der Best. nach BERTRAND zu 96—100%, Lävulose zu 97—98% wiedergefunden. Das Verf. erübrigt gegebenfalls die Best. der „Restreduktion“ durch Nicht-Kohlenhydrate, z. B. nach Vergärung mit Hefe. Es ist nötig, die Lsgg. des Traubenzuckers mit Cu stets bei 0° zu halten. (Biochem. Ztschr. **168**. 421—22. Mannheim, Städt. Krankenanstalten.) LOHMANN

S. Venkateswaran, *Kritische Untersuchung der Methoden für die Analyse der Lignins*. Von den zur Bestimmung der Lignins in Lignocellulose vorgeschlagenen Verff. werden die auf der Hydrolyse durch Säuren beruhenden das Phloroglucinverf. von CROSS, BEVAN u. BRIGGS (Chem.-Ztg. **31**. 725 [1900]) einer krit. Unters. unterzogen. Das letztgenannte Verf. hat sich als gänzlich unbrauchbar erwiesen, denn es liefert viel zu hohe Werte, da das Phloroglucin nicht nur mit dem Lignin, sondern auch mit den Furfurol erzeugenden Bestandteilen der Lignocellulose reagiert. Von den säurehydrolyt. Verff. ist das H_2SO_4 -Verf. das beste, es liefert die höchste Ausbeute an Lignin, letzteres hinterläßt nach zweimaliger Chlorierung keinen Rückstand, enthält also keine Pentosane. Das HCl -Verf. hat gewisse Mängel, ist aber noch brauchbar. Ungeeignet ist das Verf. von WENZL (Papierfabr. **22**. 101; C. 1910 I. 2757), da das Reagens das Ligninmol. angreift. — Das H_2SO_4 -Verf. wird wie folgt ausgeführt: 1 g lufttrockenes Material wird zur Entfernung von Fetten u. Harzen mit Ä. extrahiert, mit 15 ccm 72%ig. H_2SO_4 unter häufigem Durcharbeiten 20 Stdn. bei Zimmertemp. behandelt, auf eine Konz. von 3% verd. u. 1 Stde. unter Rückfluß gekocht. Nun wird das Lignin über Asbest filtriert, gewaschen, bei 105° getrocknet, gewogen u. verascht, woraus sich der %-Gehalt an aschefreiem Lignin ergibt. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. **2**. 253—60. 1925. Indian Assoc. for the Cultivat. of Science.) LINDENBAUM

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Edna Uys-Smith, *Über den Mechanismus der Guajakreaktion*. Durch Versuche, welche ergaben, daß das aus p-Kresol unter Einw. der Oxydase entstandene Brauncatechinderiv. in einer zur Erklärung der Guajakrk. genügenden Menge entsteht, werden die Ansichten von ONSLOW u. ROBINSON (Biochemical Journ. **19**. 481. 1925. C. 1925. II. 1685) gestützt. (Biochem. Ztschr. **168**. 448—50. Groningen, Reissch. univ.) HESS

Ernest Walker, *Eine Farbreaktion für Disulfide*. Die zu untersuchende Lsg. wird mit einigen Tropfen 5%ig. Nitroprussidnatriumlsg., dann mit 3—5 Tropfen 10%ig. wass. KCN-Lsg. versetzt, wobei die Endrk. alkal. sein muß. Je nach Kon-

rirt die Rk. (tief magentarot) sofort oder erst nach einigen Min. ein. Es ergibt sich, daß die Vorstufe der Sulfhydrylgruppe, die bei Denaturierung des Ovalbumins entsteht, keine Disulfidbindung ist. Blut gab im ursprünglichen Zustande die Disulfidrk. nicht, wohl aber nach der Gerinnung. (Biochemical Journ. **19**. 1082—84. 1925. Oxford, Dep. of biochem.)

SPIEGEL.

Ernest Walker, *Die Sulfhydrylreaktion der Haut*. Die Nitroprussidrk. der Haut vgl. Journ. of Physiol. **59**. 32 [1924]) konnte nicht auf Ggw. von Glutathion zurückgeführt werden. Vermutlich beruht sie auf einer Substanz, die dem thermostabilen Sulfhydrylbestandteil des Muskels ähnlich oder damit ident. ist. Die Haut verliert die Rk. schnell unter Einw. von Allyl-i-thiocyanat. (Biochemical Journ. **19**. 1085—87. 1925. Oxford, Dep. of biochem.)

SPIEGEL.

Jack Cecil Drummond, **Katherine Hope Coward** und **James Handy**, *Über die Technik der Prüfung auf Vorhandensein von Vitamin A*. Die übliche Technik des Tiervers., die leicht zu unregelmäßigen Ergebnissen führt, wurde modifiziert, wobei in der Grundnahrung das Fett völlig ausgeschlossen u. als Quelle von Vitamin Destrahltes Cholesterin benutzt wird. Diese Modifikation verlängert aber noch die Versuchszeit. Es wurde deshalb untersucht, wie weit die Farbbrkk. von ROSENHEIM DRUMMOND (S. 1678) zur Grundlage quantitativer Bestst. gemacht werden können. Die Empfindlichkeit der Rkk. mit *Trichloressigsäure* oder *Dimethylsulfat* scheint ungefähr gleich der des Tiervers. zu sein, diejenige der Rk. mit $AsCl_3$ größer. (Biochemical Journ. **19**. 1068—74. 1925. London, Univ. Coll.)

SPIEGEL.

Charles James Martin und **Elizabeth Herdman Lepper**, *Eine Mikromethode zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration von Capillarblut*. Die sehr eingehend beschriebene Methode gestattet die Best. mit nur einem Tropfen Blut bei Normtemp. Der Fehler soll nicht $> \pm 0,03$ betragen. Die Berechnung auf pH bei 37° wird erörtert. (Biochemical Journ. **20**. 37—44. London, LISTER Inst.)

SPIEGEL.

Rudolf Schaefer, *Die Messung der aktuellen Reaktion des Capillarblutes mittels Sauerstoffelektrode*. Beschreibung einer Mikroelektrode, um in einigen Tropfen mit Kalat ungerinnbar gemachten Blutes unter der n. CO_2 -Spannung die $[H^+]$ zu bestimmen. (Biochem. Ztschr. **167**. 433—39. Königsberg, med. Klinik.)

MEIER.

Robert Emlyn Havard und **George Adam Reay**, *Normale Veränderungen der anorganischen Phosphate des Blutes*. Die Modifikation des Verf. von BELL u. BRIGGS durch BRIGGS (Journ. Biol. Chem. **53**. 13; C. **1922**. IV. 739) wird zu einer Mikromethode ausgearbeitet, die mit 0,5 ccm Blut auszukommen gestattet. Mittels dieses Verf. wird die schon früher angegebene Erhöhung der anorgan. Phosphate während des Schlafes (auch bei Tage) bestätigt u. wurden jahreszeitliche Schwankungen zwischen 2,9 mg P in 100 ccm im Januar u. 4,0 mg im August festgestellt. (Biochemical Journ. **19**. 882—87. 1925. Cambridge, Biochem. Lab.)

SPIEGEL.

A. Kowarski, *Zur Methodik der Milchzuckerbestimmung im Blute*. (Vgl. auch BERNHEIM u. SCHLEYER, S. 2375.) Best. des im Blute vorhandenen Zuckers nach u. ohne Hydrolyse (mit abgeänderter Bertrandscher Methode). Differenz ergibt den Milchzucker. (Ztschr. f. klin. Med. **102**. 382—87. 1925. Berlin, Inst. f. med. Diagnostik.)

MEI.

Wilhelm Starlinger, *Über die Gewichtsanalyse der Eiweißkörpergruppen des menschlichen Blutplasmas bei erlaubter Verarbeitung von Salzplasma*. Es wird ein Verf. zur gleichzeitigen gravimetr. Best. des „Fibrinogens“, der „Globuline“ u. der „Albumine“ des menschlichen Blutplasmas beschrieben. In einem Hämatokritröhrchen mit flach geschliffenem Boden u. gleichmäßiger lichter Weite, das Marken bei 0,25, 2,25, u. 10 ccm hat, werden 0,25 ccm 3,6%ig. Na-Citratlsg. gegeben u. das Röhrchen bis zur obersten Marke mit Blut aufgefüllt. Nach dem Zentrifugieren wird das Vol. der festen Blutbestandteile bestimmt, das Plasma in gemessener, möglichst vollständiger Menge abgehoben u. mit 0,3 ccm 1,28%ig. $CaCl_2$ -Lsg. vermischt. Das koagulierte Fibrinogen wird nach Waschen mit W., A., Ä. u. Trocknen gewogen. Die Best. der

Globuline erfolgt entsprechend in 1 cem des recalcifizierten Citratserums nach Versetzen mit 2 cem W. u. 3 cem gesätt. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg., die der Albumine durch Essigsäurefällung im Globulinfiltrat. Diese (gravimetr.) Verarbeitung ist erlaubt, da, z. B. in früheren Unters., nachgewiesen wurde, daß der Salzzusatz keine Verschiebung der Eiweißfraktionen gegenüber dem nativen Serum bewirkt. (Biochem. Ztschr. **163**: 423—28. Wien, II. Med. Univ.-Klinik.) LOHMANN.

Piero Benedetti, *Änderung der Proteinzusammensetzung des Blutes. Über die Bestimmung des Fibrins im Blut für klinische Zwecke. Zusammenfassende Übersicht meiner eigenen Untersuchungen.* Best. des Fibrins refraktometr. (Differenz des Index von Plasma u. Serum). Verschiedene Krankheiten gehen einher mit Steigerung, auch mit Verminderung des Fibrins. (Arch. di patol. e clin. med. **4**: 213—38. 1925.; Ber. ges. Physiol. **32**: 876. 1925. Bologna, Clin. med. Ref. JASTROWITZ.) OPPENHEIMER.

L. Beltz und **E. Kaufmann**, *Interferometrische Untersuchungen. III. Über die Bestimmung des Eiweißgehaltes und der Restrefraktion des Blutserums mit dem Interferometer (gleichzeitig ein Vergleich interferometrischer und refraktometrischer Eiweißbestimmungsmethoden).* (Vgl. S. 186.) Die verschiedenen Bestimmungsarten geben nach den Methoden der Vff. befriedigende Übereinstimmung. (Ztschr. f. klin. Med. **10**: 671—83. 1925. Ber. ges. Physiol. **32**: 874—75. 1925. Köln, Med. Klin. Ref. SCHMITZ.) OPPENHEIMER.

Leo Lorber, *Einfache und schnelle nephelometrische Bestimmung der verschiedenen Substanzen. Zugleich einfache Sulfatbestimmung im Harn.* (Vgl. auch S. 1242.) Zwei gleichkalibrige, gleichhohe Meßzylinder werden mit der gleichen Menge zu untersuchender Fl. beschickt, der einen eine bestimmte Menge SO_4 zugesetzt, nach Aufguss mit BaCl_2 (salzsauer) so lange verd., bis eine gleiche an beiden Zylindern angebrachte Schrift gleich deutlich lesbar ist. (Biochem. Ztschr. **163**: 476—79. 1925. Budapest, Zentrallabor. der jüd. Krankenhäuser.) MEIER.

F. V. v. Hahn, *Beobachtungen zur Kolloidchemie des Harnes, als Beispiel einer klinischen Dispersoidanalyse.* (Vgl. S. 1852.) Vf. hat aus der Unters. von ca. 200 Harnen eine lineare Beziehung zwischen der Oberflächenspannung u. dem spezifischen Gewicht des n. Harnes gefunden u. zwar nach folgender Formel $Gh = 0,69$ (D. 1,00). Gh = Oberflächenaktivität, die eine Herabsetzung der Oberflächenspannung durch Lösungsm. um 1% bewirkt. — Es ist ferner ein Anstieg der Farbenintensität u. eine Zunahme der Linksdrehung mit zunehmender Oberflächenaktivität zu bemerken; dagegen keine Beziehung zum Harnstoffgehalt u. der Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen (Fahraeus) festzustellen. Die von LICHTWITZ geäußerte Beziehung zwischen Kolloidgehalt u. Oberflächenspannung u. Viscosität erwies sich als irrtümlich. Ultrafiltrationsverss. ergaben, daß, wenn überhaupt, nur ein geringer Teil der oberflächenaktiven Körper sich in kolloidem Zustande befindet. (Kolloid Ztschr. **38**: 136—38. Hamburg.) LASCH.

Pietro Saccardi, *Über eine mit der Entstehung der Melanine zusammenhängende Farbreaktion der Haut.* Durch Ausführung der Ehrlichschen Diazork. an frischer Haut mit dem Gefriermikrotom ausgeführten Schnitten von Kaninchenhaut mittels wässriger Lsg. von Phenylazoxycarbonamid wird nachgewiesen, daß in der Nähe der Haarwurzeln u. in der Keimschicht ein melaninbildendes Chromogen existiert; dieses Chromogen ist nicht Pyrrol, sondern eine Pyrrolverb. Die Herkunft des Hautfarbstoffes aus der Epidermis ist damit erwiesen. Die B. des farblosen Protopigments, aus dem weiterhin Melanin entsteht, würde demnach eine Spezialeigenschaft der Mammigepigmentgefäße sein. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **3**: 155—59. Camerin Univ.) LEHMANN.

W. H. Treuter, *Eine bequeme Methode zur Prüfung von Hypophysenpräparaten.* Die Methode beruht auf der bekannten Tatsache, daß die Haut von Fröschen, die Hypo-

ysenpräparate erhalten haben, dunkler wird. Aus dem Dunklerwerden lassen sich i Vergleich mit einem ehemals gleichfarbigen Tier entsprechende Schlüsse ziehen. urteil gegenüber den Bestst. um Uterus: *Histamin* kommt nicht zur Geltung. (Zentral- att f. Gynäkol. **49**. 831—35. 1925; Ber. ges. Physiol. **32**. 881. 1925. Hamburg, Physiol. ist. Eppendorf. Ref. Binz.)

OPPENHEIMER.

Eleeza Ablahadian, *Ein Filtrierzylinder und ein Kulturröhrchen für bakterio- gisches Arbeiten*. Um Verunreinigungen durch hineinfallende Watteteilchen vor- beugen, wird um den Hals des Kolbens oder des Kulturröhrchens ein Ring von Watte- festigt u. ein Becherglas bzw. eine Glaskappe als Bedeckung darüber geschoben. er Filtrierzylinder (Abb. im Original) soll gewisse Unbequemlichkeiten bei Saug- tern beseitigen. (Journ. Lab. Clin. Medicine **11**. 483—84. Glendale [Cal.]) SPIEGEL.

Thomas Thorne-Baker, London, *Herstellung praktisch unlöslicher Metallsalze für erleuchtungs Zwecke*. Prakt. unl. u. für Röntgenstrahlen undurchlässige Salze, wie SO_4 , werden in Ggw. von Gelatine u. gegebenenfalls anderen Schutzkolloiden aus n Lsgg. anderer Salze desselben Metalls, z. B. BaCl_2 , mittels solcher Salze, z. B. H_2SO_4 niedergeschlagen, welche zwar das Metallsalz, aber nicht die Gelatine fällen. **P. 241 968** vom 23/6. 1924; ausg. 26/11. 1925.)

KÜHLING.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

Giuseppe Guadagni, Turin, *Hebevorrichtung für Ätzflüssigkeiten und -schlämme*. Mit einem Flüssigkeitsheber bzw. Pulsometer, in dem ein Schwimmerventil an- ordnet ist, dad. gek., daß der Flüssigkeitsheber mit einem eine in bezug auf die fl. bzw. den Schlamm inerte, unter Druck gehaltene Fl. enthaltenden Gefäß kom- iert ist. — 2. dad. gek., daß der Flüssigkeitsheber durch einen Dreiweghahn mit n Gefäß der inerten Druckfl. u. mit dem Behälter, aus dem die inerte Fl. von der mpe in das Gefäß zurückgeleitet wird, abwechselnd verbunden werden kann. — lad. gek., daß zwischen dem Flüssigkeitsheber u. dem Dreiweghahn ein Rohr von artiger Länge vorgesehen ist, daß die gegebenenfalls durch das Schwimmerventil weichende Ätzfl. bzw. der Schlamm nicht an den Hahn gelangen kann. — 4. dad. ., daß das Schwimmerventil in seiner Bewegung in einem durchlochten Rohre iehrt wird u. eine solche Länge besitzt, daß die inerte Fl. verhindert wird, durch den eren Sitz des Schwimmerventils zu entweichen, bevor der Flüssigkeitsheber mit n Behälter in Verb. gesetzt worden ist. — 5. gek. durch mehrere mit einem einzigen älter für die inerte Druckfl. kombinierte Flüssigkeitsheber zur aufeinanderfolgenden w. gleichzeitigen Hebung von Fl. gleicher bzw. verschiedener Art. (**D. R. P.** **294** Kl. 12f vom 28/2. 1925, ausg. 5/3. 1926. It. Prior. 23/12. 1924.) KAUSCH.

Ferdinand Wreesmann, München, *Verdampfen der flüchtigen Bestandteile von ungen, Emulsionen und Suspensionen*. Die Fl. werden durch eine wagerechte oder ähernd wagerechte Zentrifugalvorr. nach allen Seiten in einer Verdampfungs- mer zerstäubt. (**Aust. P. 17 816** vom 19/5. 1924, ausg. 9/4. 1925.) KAUSCH.

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Barmen, *Filtrieren von Flüssigkeiten*. Man benutzt Filtrieren von Fl., insbesondere bei der Kunstseidefabrikation einen App., der einer Vielzahl von Filtern auf einer rotierenden Vorr., die auf einem stehenden ger vorgesehen ist. Beide letzteren weisen Kanäle auf, so daß sie in Verb. mit den u. Auslaßleitungen des Trägers kommen können. (**E. P. 246 102** vom 16/10. 1925, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 15/1. 1925.)

KAUSCH.

Celite Co., Delaware, übert. von: **Harry S. Thatcher**, Los Angeles, Californ., merierung von anorganischen Filtern, darin bestehend, daß man den Filterkuchen

fein zerteilt u. bei einer Temp. glüht, die hoch genug ist, um einen Teil der aufgenommenen anorgan. Verunreinigungen zu entfernen (etwa 1800° F.). (A. P. 1 571 077 vom 24/1. 1923, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH.

Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H., Charlottenburg. (Erfinder: **Oskar Waldau**, Gelsenkirchen), *Vorrichtung zur elektrischen Reinigung von Gasen*. 1. gek. durch eine umlaufende Band-Sprühelektrode, welche nach Art einer Kette in einzelnen Stücke zerlegt ist u. mit ihrer Kante über den Rollen liegt. — 2. dad. gek., daß die Rollen eckig sind. — 3. dad. gek., daß die untere Rolle lose gelagert ist u. durch ihr Gewicht die Bandlektrode gespannt hält. — 4. gek. durch eine Signaleinrichtung, die im Falle eines Reißens der Kette in Tätigkeit gesetzt wird. (D. R. P. 426 066 Kl. 12 vom 3/9. 1924, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt. (Erfinder: **Reinhold Rüdenberg**, Berlin-Grunewald), *Elektrische Gasreinigungsanlage*, die mit pulsierender Gleichspannung gespeist wird u. einen zu den Elektroden parallel geschalteten Kondensator besitzt, 1. dad. gek., daß die Kapazität des Kondensators derart bemessen ist, daß die Spannung an den Elektroden die Ionisierungsspannung nicht oder nicht wesentlich unterschreitet. — 2. dad. gek., daß die Spannungsschwankungen zwischen den Elektroden nicht mehr wie 10% der Gesamtspannung betragen. (D. R. P. 426 149 Kl. 12e vom 10/12. 1924, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH.

Lodge-Cottrell Ltd., Birmingham (**Lurgi Apparatebau-Ges.**, Frankfurt a. M.), *Elektrische Staubabscheider*. Die Entlade- u. Sammelelektroden sind wagerecht angeordnet u. die Sammelelektrode wird aus einer Fl. gebildet. Die Geschwindigkeit des Fließens der Fl. wird so geregelt, daß sie gleich oder annähernd gleich der Geschwindigkeit des Stromes des zu reinigenden Gases ist. (E. P. 246 046 vom 5/8. 1925, ausg. 11/3. 1926.) KAUSCH.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt, *Gewellte Blechelektrode für elektrische Gasreiniger*, bestehend aus zwei parallel zueinander angeordnete Blechen (Niederschlagselektroden), die ein oder mehrere Hohlräume bilden u. durchlocht sind. (F. P. 602 071 vom 12/8. 1925, ausg. 12/3. 1926. D. Prior. 16/8. 1924.) KAUSCH.

M. Franke, Augsburg, Deutschland, *Trennen von Gasgemischen durch Verflüssigung*. Man verwendet hierbei 2 Kälteauswechsler oder Rekuperatoren in Verbindung mit einem Verflüssigungs- u. Rektifikationsapp. Luft wird teils komprimiert auf hohen Druck, teils bei niedrigem Druck durch getrennte Abteile jedes der Austauschergeblasen, während die getrennten Gase durch den anderen Rekuperator strömen. (E. P. 246 172 vom 18/1. 1926, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 16/1. 1925.) KAUSCH.

Albert Friedrich Herrmann, Nordhausen, *Trockenschrank*, 1. dad. gek., daß unten einen Dekapierraum u. oben einen Trockenraum enthält, die beide durch einen Herd beheizt werden. — 2. dad. gek., daß seine Türen so verriegelt sind, daß sich entweder nur der Trockenraum bzw. nur der Dekapierraum öffnen läßt. — 3. dad. gek., daß die Bedienungstüren der beiden Räume an entgegengesetzten Seiten angeordnet sind. — Die zum Dekapieren notwendige Wärme wird in wirtschaftlicher Weise ausgenutzt. (D. R. P. 425 845 Kl. 82a vom 27/5. 1924, ausg. 1/3. 1926.) OELKER.

G. Polysius, Eisengießerei und Maschinenfabrik, Dessau, *Vorrichtung zum Trocknen von Schlamm aller Art*. Die Vorr. besteht aus einer Trockentrommel, bei welcher der zu trocknende Schlamm mittels Zerstäuberdüsen o. dgl. in die Trommel eingespritzt wird. Letztere ist an der Stelle der Zerstäubung erweitert, wodurch eine schädliche Beeinflussung des Gutes durch die Trockengase vermieden wird. (D. R. P. 425 846 Kl. 82a vom 1/2. 1924, ausg. 2/3. 1926.) OELKER.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt, *Trockenanlage für Brennstoffe mit elektrischer Staubbiederschlageinrichtung*, gek. durch einen zwischen Trockner u. elektr. Niederschlagkammer eingeschalteten Flügelradlüfter, der durch d

abkühlende u. bremsende Wrkg. der Ventilatorflügel das Fortschreiten von Entzündungen aus der Niederschlagkammer in den Trockner verhütet. (D. R. P. 425 499 Kl. 82a vom 27/11. 1921, ausg. 20/2. 1926.) OELKER.

Celite Co., Delaware, übert. von: **Arthur S. Elsenbast**, New York, *Entwässern von Flüssigkeiten*. Man bringt wenig W. enthaltende Fl. (Öle, Firnisse usw.) in Berührung mit getrockneter Kieselgur u. trennt dann letztere mit dem W. durch Filtration von den Fl. (A. P. 1 570 626 vom 14/3. 1922, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH.

Société Générale d'Évaporation Procédé Prache et Bouillon, Frankreich, *Verdampfungsverfahren mittels eines Gasstromes*. Den zum Verdampfen der jeweiligen Fl. verwendeten Gasstrom läßt man durch die zweckmäßig vorher erhitzte Fl. zirkulieren u. bringt ihn dann mit Kondenswasser in Berührung. (F. P. 601 554 vom 31/10. 1924, ausg. 4/3. 1926.) KAUSCH.

Isidor Traube, Deutschland, *Fällung von in einer wässrigen Lösung suspendierten Stoffen* durch einen Extrakt von Pflanzen wie isländ. Moos. (F. P. 601 573 vom 7/7. 1925, ausg. 4/3. 1926.) KAUSCH.

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, *Behandeln von Flüssigkeiten, Gasen und Lösungen* zwecks Entfernung von Verunreinigungen oder Bestandteilen oder zur Durchführung katalyt. Rkk. unter Verwendung von Kohle von einer D. nicht unter 2,0 u. einer Absorptionswärme (für Bzl.) nicht unter 40 Calor. (E. P. 45 912 vom 22/2. 1924, ausg. 11/2. 1926.) KAUSCH.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Fr. Börner, *Bericht über das Undichtwerden eines Chlorkessels der Zinnwerke Wilhelmsburg G. m. b. H.* Vf. beschreibt eine Bohrvorrichtung zum gefahrlosen Anzapfen eines gefüllten Kessels. Aus den Erfahrungen bei Undichtwerden einer Packung zieht Vf. folgende Schlüsse: Zur Bekämpfung eines Cl-Ausbruches sind gewöhnliche Rauchhelme untauglich. Die Drägerschen Respiratoren mit Industriensatz B haben sich bewährt. Nötigenfalls lassen sich die Gase mit Regenschleimern einkreisen. (Chem.-Ztg. 50. 85—86. Wilhelmsburg-Elbe.) JUNG.

Georges Claude, *Über die Explosion von Boulogne-sur-Seine*. Beschreibung der möglichen Ursachen der Explosion bei der Aufarbeitung von Xe u. Kr-haltigen Rückständen der Herst. von fl. O₂. Vf. ist der Ansicht, daß die Explosion, welcher sein Mitarbeiter A. RIBAUD zum Opfer fiel, durch eine Anreicherung von Acetylen oder ähnlicher KW-stoffe, welche durch Ozon entzündet wurden, entstanden ist. (C. r. d. Acad. des sciences 182. 356—58.) ENSZLIN.

R. Lincke, *Wärmeschutz für die Augen*. Vf. weist auf die Schäden hin, die das Auge durch Wärmestrahlen erleidet u. empfiehlt die Verwendung einer Brille, deren Gläser Strahlen von der Wellenlänge 700—1500 μ in hohem Maße absorbieren, die Lichtstrahlen jedoch ungehindert durchlassen. In einem Diagramm wird das Absorptionsvermögen dieser Gläser im Vergleich zu gewöhnlichem weißen Glas gezeigt. (Stahl u. Eisen 46. 192—93. Düsseldorf.) LÜDER.

Kurt Noack, *Die Rauchgasschäden der Vegetation im Licht der Stoffwechseltheologie*. (Vgl. S. 699.) Verss. an dem Moos Fontinalis zeigen, daß eine Störung der CO₂-Assimilation mit NaHSO₃ auch eintritt, wenn die Behandlung im Dunkeln die anschließende Assimilationsunters. in reinem, CO₂-haltigem W. stattfinden. Methylurethan, das nach WARBURG lediglich hemmend auf die Assimilation wirkt, wirkt bei längerer Belichtung ebenfalls Abtötung u. Ausbleichung. Die eigentliche Wrkg. der SO₂ besteht daher in der Hemmung der CO₂-Assimilation; dadurch wird die photooxydative Wrkg. des Chlorophylls, die normalerweise in der CO₂ ihren Akceptor findet, auf das Protoplasma u. auf das Chlorophyll selbst abgelenkt. (Ztschr. angew. Ch. 39. 302—04. Erlangen, Univ.) JUNG.

Biesalski, Bicarbonat und Trockenlöscher. Kritik an den Ausführungen von GENTSCH (S. 752). Vf. verweist auf ein Gutachten BAHRTS, nach dem das Trockeneuerlöschsystem $\text{NaHCO}_3 + \text{CO}_2$ die größten Löschmöglichkeiten bietet. Bei den angeführten Vers. GENTSCHS fehlen Angaben über Temp., Zeitdauer, Holzmenge usw. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 198—99. Berlin.) JUNG.

K. Haerting, Womit verhindert man Brände am besten? Antwort an GENTSCH (S. 752). Vf. ergänzt die Aufstellung der Feuerlöschtypen entsprechend den Neuerscheinungen. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 199—200. Berlin.) JUNG.

Robert Lemuel Mc Elroy und John Eldon Shepherd, Charlotteville, Virginia, V. St. A., Feuerlöschen. Man treibt schaubildende Stoffe durch einen Wasserstrom unter Druck auf die Feuerstätte, wobei sich in dem Strom gegebenenfalls gasentwickelnde Stoffe befinden. Gegebenenfalls werden dem Wasserstrom noch Zementstoffe zugesetzt. (E. P. 218340 vom 5/1. 1923, ausg. 31/7. 1924.) KAUSCH.

IV. Wasser; Abwasser.


Fr. Wilh. Meyer, Steinansatz und Kesselstein. Zum Unterschiede von „Kesselstein“ versteht man unter „Steinansatz“ die sich in Verdampfapp. u. Vorwärmer bildenden Ansätze. Vf. teilt nach seinen Erfahrungen mit, wie ein solcher Ansatz vermindert u. entfernt wird u. regt Mitteilung anderer Erfahrungen an. (Dtsc. Zuckerind. **51**. 197—98. Wismar.) RÜHLE.

Casimiro Affonso, Die sogenannte oligodynamische Wirkung der Metalle in ihre Verwendung zur Wassersterilisierung. Prakt. kommt die oligodynam. Metallwirkung für die Sterilisation von W. nicht in Frage. (Arqu. do inst. bacteriol. **5**. 257—65. 1924. Ber. ges. Physiol. **32**. 905. 1925. Camara Pestana. Ref. v. GUTFELD.) OPPENH.


F. Gerlach, Über eine neue Methode zur Herstellung von destilliertem Wasser auf elektroosmotischem Wege. Die Reinigung des W. durch Elektroosmose nach den Patenten der Elektro-Osmose A.-G. statt durch Dest. wird beschrieben u. empfohlen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. **98**. 125—28. Mödling. Tierimpfstoffgewinnungsanst.) SPIEGEL.

S. Stroganow, Der gegenwärtige Zustand der Reinigung von Abwässern mit Hilfe der künstlichen Aeration und des aktiven Schlammes. Ausführlicher krit. zusammenfassender Bericht. (Travaux de la Commission de recherches sur l'épuration des eaux d'égout du service d'assainissement de la ville de Moscou [russ.] Lief. **6**. 177—311. 1925. Sep.) BIKERMAN.

J. Golse, Volumetrische Bestimmung des Ammoniaks im Brunnenwasser. (Vgl. Bul. Soc. Chim. Biol. **7**. 167; C. 1925. I. 2102.) Die titrimetr. Best. von NH_3 in Menge von $\frac{1}{100}$ mg ist möglich nach folgenden Umsetzungen:



Das überschüssige NaOBr wird nach dem Ansäuern zerstört nach:



NH_3 ist also 3J äquivalent. Um direkt $\frac{1}{100}$ mg NH_3 ablesen zu können, empfiehlt sich der Gebrauch folgender $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -Lsg. zur Titration des freigemachten Jodes: 176,5 cc $\frac{1}{10}$ -n. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ auf 1 l aufgefüllt. Davon zeigt 0,1 cc 0,01 mg NH_3 an. Die Hypobromitlsg. wird durch Zusatz von 1 cc Br zur Mischung von 10 cc Natronlauge in viel W. erhalten u. auf 500 cc aufgefüllt. Sorgfältige Kühlung ist angezeigt, um Bromabildung zu unterdrücken. 10 cc dieser Lsg. reichen zur Zers. von ca. 4,5 mg NH_3 an. Da sich die B. von Bromat nie völlig verhindern läßt, wird neben der eigentlichen Best. ein Blindvers. gemacht mit 10 cc Hypobromitlsg., 100 cc NH_3 -freiem dest. W. 5 cc 20%ig. KJ-Lsg., 5 cc 10%ig. Essigsäure u. 1 cc Stärkelsg. Die Differenz der $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -Lsgg. ausgedrückt in 0,1 cc gibt NH_3 in $\frac{1}{100}$ mg/100 cc an. Eventuell

werden wie üblich von 500 ccm 2-mal je 100 ccm abdest. u. diese auf NH₃ geprüft. (Bull. soc. pharm. Bordeaux 63. 10—14. 1925.)

HARMS.

Arthur Lumsden-Bedingfeld, *Eine Bemerkung zur Bestimmung der permanenten Härte eines Wassers nach dem Verfahren von Pfeifer und Wartha*. Bei der Unters. CaO- u. MgO-haltiger Wässer hiernach verursacht die Filtration, wenn sie durch Papierfilter geschieht, erhebliche Fehler infolge der Absorption kaus. Alkalis durch die Cellulose. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 36. Wooburn Green.)

RÜHLE.

H. E. Kersten, *Zur Arbeit von H. Kapeller-Marburg „Über einen gelungenen Nachweis von Paratyphus B-Bacillen im Leitungswasser“*. Vf. ergänzt die Mitteilung von KAPELLER (S. 462) durch Angaben über die einwandfreie Wasserversorgung des betreffenden Ortes. Der positive Bacillenbefund bezieht sich auf eine nicht für menschlichen Gebrauch bestimmte Quelle. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. 98. 7—8. Gelnhausen.)

SPIEGEL.

Akt.-Ges. für Stickstoff-Dünger, Cöln a. Rh., *Entfernen von Gasen aus Flüssigkeiten*. Um O₂ oder andere schädliche Gase aus Dampfkesselspeisewasser auszutreiben, bringt man Wasserdampf damit in Berührung, indem man die Temp. des W. über der Kondensationstemp. des Dampfes hält. (E. P. 245 784 vom 7/1. 1926, Auszug veröff. 7/3. 1926. Prior. 7/1. 1925.)

KAUSCH.

A. Docter, Helder, Holland, *Schmier- und Kesselsteinmittel*, welches aus einer Mischung von 7,5 Pfund reinem Zinkweiß, 4,5 Pfund Ruß, 33 Pfund Graphit, 7,5 Pfund ferdefett, 18 Pfund Tran u. 7,5 Pfund konsistentem Fett, wie es z. B. durch Verühren von Talg mit Kalk- oder Al-Seife erhalten wird, besteht. (E. P. 241 678 vom 3/9. 1924, ausg. 19/11. 1925.)

OELKER.

Permutit Akt.-Ges., Berlin, *Herstellung eines basenaustauschenden Materials aus Ton für die Enthärtung von Wasser* gemäß Pat. 423224, dad. gek., daß der Ton vor dem Brennen u. Brennen mit anderen austauschenden Stoffen angereichert wird. — 2. dad., daß der Ton allein oder mit dem Zusatz anderer basenaustauschender Stoffe nach dem Brennen in der Hitze mit Alkalilösungen nachbehandelt wird. Das Austauschvermögen der Tone wird gesteigert. (D. R. P. 426 083 Kl. 85b vom 12/10. 1919, ausg. 7/3. 1926. Zus. zu D. R. P. 423 224; C. 1926. I. 1687.)

OELKER.

Permutit Co., New York, übert. von: **Roy G. Tellier**, Chicago, Hights, *Weichmachen von Wasser*. Man unterwirft das W. großen Flächen eines Reagens, das wie oben zusammengesetzt und eine bestimmte Menge Alkalisilicat enthält. (A. P. 1 571 891 vom 27/5. 1916, ausg. 2/2. 1926.)

KAUSCH.

W. B. Scaife & Sons Co., Oakmont, Pa., übert. von: **Martin F. Newman**, Oakmont, V. St. A., *Weichmachen von Wasser*. Man reduziert zunächst die Alkalität des W. durch Zusatz geeigneter Reagentien u. gibt dann NaHSO₄ u. Gerbsäure hinzu, um die Löslichkeit des noch vorhandenen Ca zu fördern. (A. P. 1 572 944 vom 19/4. 1924, ausg. 16/2. 1926.)

OELKER.

Städtehygiene- und Wasserbaugesellschaft m. b. H., Wiesbaden (Erfinder: **Emens Delkeskamp** und **Wilhelm Radermacher**, Wiesbaden), *Behandlung von Abwasser und Ablagen in Klär- und Faulräumen mit Gasen unter Druck*, dad. gek., daß an Stelle oder neben Druckluft solche anderen Gase oder Gasgemische unter Druck in den Halskanal zwischen Klär- u. Faulraum eingeführt werden, welche verunreinigende Bestandteile der Abwässer auszufällen vermögen. — Die Wahl der Gase oder Gasgemische richtet sich nach der Zus. der Abwässer. (D. R. P. 425 794 Kl. 85c vom 7/3. 1921, ausg. 25/2. 1926.)

OELKER.

Deutsche Abwasser-Reinigungs G. m. b. H., Deutschland, *Behandlung frischen oder vergorenen Schlammes in den häuslichen Klärapparaten* „O. M. S.“ Man führt in der Schlammkammer eine Bewegung des Inhalts herbei, damit die Gärung des

Schlammes die automatische Lsg. beschleunigt u. die Abtötung der Bakterien energisch herbeigeführt wird. (F. P. 596 571 vom 11/4. 1925, ausg. 27/10. 1925.) KAUSCH.

V. Anorganische Industrie.

C. P. van Hoek, *Bariumsulfat (Schwerspat und Blanc fixe)*. BaSO_4 wirkt ungünstig auf Gummi, was auf bestimmten Eigenschaften des BaSO_4 beruht, die sich wahrscheinlich auch in Ölfarben geltend machen. (Farben-Ztg. 31. 1136—37. H. verum, Holland.) SÜVERN.

Paul Dolch, *Zur Technologie des Kalkstickstoffs*. Vermeintlich bei der Mahlung des CaC_2 entstandene Gehaltsminderungen ließen sich auf eine unzuverlässige Analysenmethode des Feincarbids zurückführen. Wird nämlich die zur Entw. des C_2H_2 dienende konz. NaCl -Lsg. zum CaC_2 hinzugegeben — anstatt umgekehrt —, so treten infolge lokaler Überhitzungen C_2H_2 -Verluste durch Polymerisation auf. Bei dem entsprechend verbesserten Verfahren (v. DRATHEN, Chem.-Ztg. 45. 447; C. 1921. IV. 91) wurden keine Verluste beim Mahlprozeß bemerkt. Die schlechte Ausnutzung des CaC_2 bei der Azotierung war somit nicht auf Mahlverluste, sondern auf Vorgänge in Azotieröfen zurückzuführen. Bericht über entsprechende Betriebsvers., die zu der D. R. P. 388184 der Bayerischen Stickstoffwerke A.-G. (C. 1924. I. 1086) geführt haben. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 68—70.) HEIMANN.

A. Schweitzer, *Stickstoffbindung durch Bariumcarbonat und Kohle im elektrischen Ofen. Ein technischer Versuch*. Bericht über Verss. aus den Jahren 1911—16, die N_2 -Bindung an BaCO_3 -Kohle-Gemische nach MARGUERITTE & SOURDEVAL zu einer techn. Verf. zu entwickeln. In Laboratoriumsverss. wurden bei 1300—1350° Gemisch mit bis zu 6,6% N — davon durchschnittlich $\frac{3}{4}$ Cyanamid- u. $\frac{1}{4}$ Cyanid-N — erzielt. In einem 30 KW-Lichtbogenofen erhaltenes Prod. hatte etwa 4—5% N gebunden. Hierbei bewegte sich der Energiebedarf um 20 KWh für 1 kg N. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 98—105.) HEIMANN.

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., und Walter Schaffner, Berlin, *Einrichtung zur Herstellung von Ozon*, 1. dad. gek., daß als Hochspannungsquelle ein zur Erzeugung ungedämpfter Schwingungen geeigneter Generator (Röhrengenerator, Bogenlampengenerator oder Hochfrequenzmaschine verwendet wird, mit der direkt oder indirekt ein auf die Schwingungswelle abgestimmter Kreis gekoppelt wird, in dem ein als Schwingungskapazität wirkender O_3 -Erzeuger liegt. — 2. dad. gek., daß im Schwingungskreis noch ein veränderliches Abstimmittel liegt. (D. R. P. 367 84 Kl. 12i vom 5/6. 1921, ausg. 20/2. 1926.) KAUSCH.

Willard C. Averill jr., Houston, Texas, *Schwefelgewinnung*. Man bohrt das S-Lager an u. führt W. in die den S führenden Kanäle u. Höhlungen, der sich mit Sand mischt, worauf das Gemisch mit eingepreßter Luft gerührt wird. (A. P. 1 573 026 vom 30/12. 1924, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln, *Schwefelsäure*. SO_2 wird zum Teil zu SO_3 unter Verwendung von $\frac{1}{10}$ der gewöhnlich verwendeten Katalysatormenge oxydiert u. der Rest der SO_2 in Bleikammern u. dgl. weiter verarbeitet. (E. P. 245 903 vom 5/12. 1924, ausg. 11/2. 1926.) KAUSCH.

Harold William Blackburn und Walter Thomas, England, *Ammoniak*. Man läßt in der Hitze (200—800°) ein Gemisch von N_2 u. Wasserdampf über einen Katalysator wie Fe, Fe_2O_3 , Ni, Ni_2O_3 , $\text{F}(\text{OH})_2$ oder $\text{Ni}(\text{OH})_2$ strömen. (F. P. 601 733 vom 7/8. 1924, ausg. 6/3. 1926. Engl. Priorr. 19/8. u. 18/12. 1924.) KAUSCH.

Gewerkschaft Sachsen-Weimar, Unterbreizbach an der Rhone, Deutschland, *Cyanide und Ammoniak*. Man läßt N_2 gegebenenfalls im Gemisch mit anderen Gasen (Generatorgas) auf eine Mischung von Alkali- oder Erdalkalisulfat, Kalkstein u. einem Reduktionsmittel oder CaS u. einem Reduktionsmittel gegebenenfalls in Ggw. von

oder einer Fe-Verb. bei 800—1000° einwirken. (**E. P. 246 177** vom 18/1. 1926, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 17/1. 1925.) KAUSCH.

James Simpson Island, Canada, *Stickoxyde auf elektrischem Wege*. Man verbindet die Elektroden mit einem industriellen Wechselstromnetz u. liefert ihnen einen Hochspannungshilfsstrom, wobei der Hilfsstromkreis auf das Hauptstromnetz verzweigt u. mit Vorr. ausgestattet ist, um einen Hochfrequenzstrom zu erzeugen. (**P. 601 740** vom 8/8. 1925, ausg. 6/3. 1926.) KAUSCH.

J. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., übert. von: **Chemische Fabrik Griesheim-Elektron**, Frankfurt a. M., *Phosphorsäure*. Die Wände der Kammer, in der P oder solchen enthaltende Gase verbrannt werden, werden mit PO_4 -Lsg. bespült. (**E. P. 246 128** vom 5/1. 1926, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 1/1. 1925.) KAUSCH.

J. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Gustav Pistor**, Griesheim a. M.), *Herstellung von Phosphorsäureanhydrid* durch Verbrennung von P oder P-haltigen Gasgemischen mittels Luft, dad. gek., daß man die Verbrennungsluft vorher mittels P_2O_5 bezw. starker H_3PO_4 trocknet, welche im Verf. selbst erzeugt werden sind, u. die bei der Verbrennung auftretende Wärme zur Beheizung eines Kesselwerks oder ähnlicher Vorr. zur Ausnutzung von Abhitze verwertet. (**D. R. P. 638 888** Kl. 12i vom 31/12. 1924, ausg. 8/3. 1926.) KAUSCH.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., *Herstellung von Phosphorsäureanhydrid*. (**E. P. 245 430** vom 8/12. 1925, Auszug veröff. 24/2. 1926. Prior. 30/12. 1924. — vorst. Ref.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Lösung von gelbem Arsenik*. Man läßt Dämpfe eines Lösungsm. (CS_2) auf stark erhitztes As_2O_3 einwirken und verdichtet sie alsdann. (**F. P. 601 499** vom 5/6. 1925, ausg. 21/7. 1924.) KAUSCH.

Siemens & Halske A.-G., Siemensstadt-Berlin, übert. von: **Martin Hosenfeld**, Siemensstadt, *Gewinnung von Kieselsäure aus Erzlaugen*. Man setzt ein gepulvertes, saure unl. Sulfat (BaSO_4 , CaSO_4 o. dgl.) zu der ausgefällten, kolloidalen SiO_2 u. entfernt dann das W. aus der M. (**A. P. 1 571 054** vom 26/1. 1925, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH.

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, übert. von: **L. B. Miller**, Lynn, Mass., *Geschmolzene Kieselsäure*. Durch einen Kolben wird die geschmolzene SiO_2 durch eine Öffnung herausgepreßt. (**E. P. 246 157** vom 15/1. 1926, Auszug veröff. 13. 1926. Prior. 19/1. 1925.) KAUSCH.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. **E. Schering**), Berlin, *Kieselsäure-Gel*. Man wäscht das Gel so lange aus, bis sein Gehalt an Salzen nur noch 2% (der Trockenstanz) beträgt. (**F. P. 601 130** vom 21/7. 1925, ausg. 23/2. 1926. D. Prior. 3/11. 1924.) KAUSCH.

Celite Co., Delaware, übert. von: **Percy A. Boeck**, Los Angeles, Californ., *Herstellung von Kieselgurfiltern*. Man trocknet die Filter zusammen mit den Verunreinigungen u. erhitzt sie nach Zerkleinerung der MM. (**A. P. 1 571 042** vom 19/1. 1925, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH.

United States of America, übert. von: **Ernest Bateman**, Madison, Wisconsin, *Wasser absorbierende Kohle*. Zerkleinerte Kohle wird mit CO_2 bei 650—1000° behandelt. (**P. 1 573 509** vom 5/8. 1919, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

J. G. Aarts, Dongen, Holland, *Aktive Kohle*. Komplexe C-enthaltende Stoffe (Aunkohle usw.) werden dest. u. das gebildete CO wird gegebenenfalls mit Hilfe von Katalysatoren in feinverteilte Kohle übergeführt. (**E. P. 246 130** vom 7/1. 1926, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 14/1. 1925.) KAUSCH.

Edouard Goutal und **Henri Hennebutte**, Frankreich, *Geformte aktive Kohlen*. Man mischt natürlich oder künstlich oxydierte Teere mit hydrogenisierten oder wenig oxydierten Teeren u. erhitzt das Gemisch auf 180—250° mit oder ohne Zuleiten eines

oxydierenden Gases u. in Ggw. eines Katalysators. (F. P. 601 203 vom 24/10. 19 ausg. 25/2. 1926.) KAUSCH

Jean Henry Bregeat, Frankreich, *Adsorptionskohle*. Körner von Holzkohle o. dgl. werden mit einer Alkalisilicatlsg. gegebenenfalls im Gemisch mit Lsgg. von Case Gummi o. dgl. zu Körnern agglomeriert, die getrocknet, mit HCl-Lsg. imprägniert, ausgewaschen, bei 600—1000° geglüht, abgekühlt, gewaschen, geglüht, mit HCl behandelt u. mit W. endlich ausgewaschen u. getrocknet. (F. P. 601 989 vom 12/1924, ausg. 10/3. 1926.) KAUSCH

American Lurgi Corporation, New York, übert. von: **Hans Siegens**, Bad Homburg v. d. H., *Wiederbelebung von Adsorptionsstoffen* durch Erhitzen des Innern d. Adsorptionsstoffmassen durch den elektr. Strom. (Can. P. 252 354 vom 2/4. 19 ausg. 4/8. 1925.) KAUSCH

Félix Jourdan und **Jean Gall**, Frankreich, *Kohlenoxyd*. Man verbrennt überschüssige Kohle in Ggw. überoxydierter Luft bei unter 1000°. (F. P. 601 998 vom 13/11. 1924, ausg. 10/3. 1926.) KAUSCH

Henri Marie René Barjot, Frankreich, *Abscheidung des Wasserstoffs aus dem Wassergas, Koksofengas u. dgl.* Die zu behandelnden Gase läßt man unter Druck mit einer bestimmten Geschwindigkeit längs einer porösen Wand zirkulieren. Auf der anderen Seite der Wand evakuiert man den Behälter u. kann hier N₂ zirkulieren lassen, der den durch die Wand diffundierenden H₂ aufnimmt. (F. P. 601 774 vom 7/5. 19 ausg. 8/3. 1926.) KAUSCH

Félix Jourdan und **Jean Gall**, Frankreich, *Wasserstoff*. Man katalysiert CO unter Druck in Ggw. großer Mengen Wasserdampf. (F. P. 601 997 vom 13/11. 1924, ausg. 10/3. 1926.) KAUSCH

André Lucien Nouvelle, Frankreich, *Wasserzersetzung* mittels pulverisierter Kohle bei Rotglut. (F. P. 601 939 vom 5/8. 1925, ausg. 10/3. 1926.) KAUSCH

Grasselli Chemical Co., Cleveland, übert. von: **Clayton M. Hoff**, Cleveland, *Alkaliphosphate*. Man elektrolysiert in Diaphragmazellen Dialkaliphosphatlsgg. u. gewinnt aus den Anoden- u. Kathodenfl. Mono- u. Trialkaliphosphate. (A. P. 1 572 8 vom 17/7. 1924, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH

H. Harris, London, *Alkalihydrate, -arsenate, -antimonate und -stannate*. Geschmolzenes Ätzalkali wird gegebenenfalls mit Alkalichlorid u. einem Oxydationsmittel zum Raffinieren von Pb verwendet u. das erhaltene Ätzalkali enthaltende Arsen wird zu solcher Konz. gel., daß das Alkalistannat beim Erkalten der Lsg. oder der h. Lsg. sich ausscheidet. Die verd. Lsg. wird abgekühlt, worauf sich das Arsen u. das restliche Stannat ausscheidet. (E. P. 245 479 vom 8/8. 1924, ausg. 4/1926.) KAUSCH

B. Roos & Co., Berlin, *Überführung von Schwefelnatrium und ähnlichen Chemikalien in Grießform*, dad. gek., daß das geschmolzene Material in ununterbrochenem oder intermittierendem Strom in geeigneter Fallhöhe in eine Fl. eingeführt wird, die mit den betreffenden Chemikalien chem. nicht reagiert u. die einen geringeren Kp. hat als die betreffenden Chemikalien selbst. Als Fl. wird im Beispiel Trichloräthylen angegeben. (D. R. P. 426 052 Kl. 12i vom 19/1. 1924, ausg. 10/3. 1926.) KAUSCH

West End Chemical Co., Oakland, Californ., übert. von: **Morris V. Lowry**, Santa Maria, Californ., *Borax und Natriumdicarbonat aus Salzlaugen*. Man dampft eine Salzlauge ein, carbonisiert sie, kühlt das Gemisch ab, wobei kristallisierter Borax NaHCO₃ als Schlamm ausfallen, der mit Colemanit gemischt u. auf Siedetemp. erhitzt wird. (A. P. 1 573 259 vom 10/4. 1923, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH

Burnham Chemical Co., Reno, Nevada, übert. von: **Alfred W. Gauger** und **Henry Herman Storch**, Westend, Californ., *Borax aus solchen enthaltenden Salzlaugen*. Man dampft die Laugen so weit ein, daß die anderen Salze auskristallisieren u. die Konz. des Metas- u. Tetraborats steigt; dann trennt man die Fl. von den Kristallen

brecht die Lsg. ab u. bringt sie in Berührung mit fein verteiltem Material (Borax, NaCl, SiO₂, BaSO₄, Glaswolle usw.), wobei der Borax auskrystallisiert. (A. P. 1 571 002 vom 21/2. 1925, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH.

J. T. Conroy, A. Lamble, J. J. Latham und United Alkali Co. Ltd., Liverpool, Chloralkali. Man entwässert Chlorkalk durch Überleiten h. Luft oder h. Gas im Gegenstrom über das in einem (Etagen-) App. heruntergeführte Material. (E. P. 246 000 vom 15/5. 1925, ausg. 11/2. 1926.) KAUSCH.

Albert F. Meyerhofer, Zürich, Schweiz, Herstellung von Bariumsuperoxyd aus Triumphosphaten beliebiger Zus., dad. gek., daß man Ba₃(PO₄)₂ mit H₂SiF₆ umsetzt, das gefällte BaSiF₆ von der H₃PO₄ trennt, durch Wärme in BaF₂ u. SiF₄ zerlegt, das SiF₄ zur Rückgewinnung der H₂SiF₆ benutzt, das BaF₂ andererseits mit Ca(OH)₂ zu BaF₂ u. Ba(OH)₂ umsetzt u. letzteres in bekannter Weise in BaO₂ überführt. (D. R. P. 3 034 Kl. 12i vom 20/10. 1923, ausg. 8/3. 1926.) KAUSCH.

Iwan Bachiloff, Rußland, Trennung von Barium- und Radiumsalzen. Man krystallisiert die Lsgg. der Doppelsalze des Ba u. Ra unter Zusatz von Salzen vom gleichen Typus, wie die zu krystallisierende Lsg., die mit den Salzen des Ba u. Ra keine in der Lsg. vorhandenen Lösungsmittel l. Verbb. geben. (F. P. 601 938 vom 7/8. 1925, ausg. 10/3. 1926.) KAUSCH.

Jean Gohin, Frankreich, Wasserfreie Chloride. Zu ihrer Herst. verwendet man eine Kammer mit gegen h. Cl₂ beständigem Futter ausgestattete Kammer u. sublimiert das Chlorid in ein oder zwei Stufen ohne Kondensation, die erst am Ende der Apparatur in beliebiger Weise herbeigeführt wird. (F. P. 601 612 vom 4/11. 1924, ausg. 5/3. 1926.) KAUSCH.

Fernand Parentani, Belgien, Enteisung von Erden und Gesteinen. Man behandelt Erden u. Gesteine mit einer geeigneten Säure (HCl) in Ggw. einer kleinen Menge eines FeCl₃-Salzes (FeCl₃). (F. P. 601 761 vom 10/8. 1925, ausg. 8/3. 1926. Belg. Priorr. 4. u. 16/5. 1925.) KAUSCH.

Bertrand B. Grunwald, Alameda, Californ., Leichtes basisches Magnesiumcarbonat. Man erhitzt ein Gemisch von schwerem bas. MgCO₃ u. W. auf eine Temp. über 100° F., wobei das MgCO₃ das W. unter Volumenvergrößerung aufnimmt. (A. P. 1 573 604 vom 30/6. 1924, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Western Industries Co., Agnew, Californ., übert. von: Russell B. Crowell, Agnew, Leichtes basisches Magnesiumcarbonat. Man läßt CO₂ auf MgO in einer wss. Fl. bei einer Temp. nicht über 120° F. einwirken, bis das Verhältnis des CO₂ zum MgO zwischen 1:1 bis 1:9 liegt. (A. P. 1 573 632 vom 26/6. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Bertrand B. Grunwald, Alameda, Californ., Schweres basisches Magnesiumcarbonat. Man leitet CO₂ in ein Gemisch von calciniertem Magnesit u. W. (A. P. 1 573 603 vom 30/6. 1924, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Max Buchner, Hannover-Kleefeld, Herstellung von Tonerde und Tonerdeverbindungen aus tonerdehaltigen Materialien aller Art unter Behandlung mit Sulfaten, 1. dad. gek., daß (NH₄)₂SO₄ durch Erhitzen zunächst in NH₄HSO₄ u. NH₃ gespalten, mit dem NH₃ das Tonerdematerial aufgeschlossen, abfiltriert, das Filtrat unter Zuhilfenahme des abgespaltenen NH₃ mit NH₃ gefällt u. aus der Mutterlauge der Tonerdefällung (NH₄)₂SO₄ zurückgewonnen wird. — 2. dad. gek., daß die Spaltung des Sulfats bei gewöhnlichem Druck oder im Vakuum ausgeführt wird. — 3. dad. gek., daß der Aufschluß mit dem Bisulfat im Autoklaven vorgenommen wird. — 4. dad. gek., daß der Aufschluß mit dem Bisulfat in Ggw. von neutralem (NH₄)₂SO₄ vorgenommen wird. (R. P. 425 222 Kl. 12m vom 8/2. 1921, ausg. 13/2. 1926.) KAUSCH.

Robert B. Eldridge, Denver, Colorado, Behandeln von Zinksulfatlösungen. Man reinigt die organ. Verunreinigungen mittels eines l. Hydrosulfits u. trennt den Nd. von der Lsg. (A. P. 1 573 233 vom 13/10. 1924, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

United States Radium Corporation, New York, übert. von: **Victor F. Hes** Orange, und **Edwin D. Leman**, East Orange, N. J., *Reinigen von Radiumemanation*. Man entfernt einen Teil der gasigen Verunreinigungen aus der Emanation u. oxydiert den Rückstand mit Hilfe eines festen Oxydationsmittels (h. CuO). (**A. P. 1 570 8** vom 14/6. 1923, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Carborundum Co., Niagara Falls, N. Y., übert. von: **Miner L. Hartman** Niagara Falls, *Schleifgegenstände*. Man mischt einer rohen Mischung von schleifenden wirkenden Körnern u. einem Bindemittel, zerkleinerte organ. Stoffe (Holz) bei, presst das Ganze u. brennt die Gegenstände. (**A. P. 1 573 400** vom 13/7. 1923, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Carl Zeiss, Jena, *Linse aus krystallisiertem Natriumfluorid*. (**D. R. P. 426 4** Kl. 42h vom 13/9. 1922, ausg. 9/3. 1926. — C. 1925. II. 1889.) KAUSCH.

J. G. Farbenindustrie Akt. Ges., Frankfurt a. M., übert. von: **Chemische Fabrik Griesheim-Elektron**, Frankfurt a. M., *Glas*. Man verwendet KHCO_3 an Stelle von K_2CO_3 bei der Herst. K-haltiger Gläser. (**E. P. 245 785** vom 8/1. 1926, Ausz. veröff. 10/3. 1926. Prior. 8/1. 1925.) KAUSCH.

André Gesnel, Frankreich, *Beseitigung der Eisenhaut von Glasfabrikationsabfällen* mittels eines Bades von verd. k. Mineralsäure (HCl , H_2SO_4 , HNO_3) oder Gemisch solcher Säuren u. HF oder einem F oder HF liefernden Mineral (Flußspat, Kryolith). (**F. P. 601 440** vom 31/7. 1925, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH.

Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, und **Wilhelm Hesse**, Essen, Ruhr, *Herstellung von Steinzeugen aus Kesselschlacken, Mullschlacken, Aschen* nach D. R. P. 407154, dad. gek., daß den Schlacken vor der Sinterung solche Zuschläge gegeben werden, die die Sintertemp. herabdrücken (z. B. Flußspat, niedrig sintern. Tone, Fe-haltige Stoffe). (**D. R. P. 426 108** Kl. 80b vom 21/5. 1925, ausg. 5/3. 1926. Zus. zu D. R. P. 407154; C. 1925. I. 888.) KAUSCH.

William Feldenheimer, London, *Reinigung von Ton u. dgl.*, Ton u. dgl. wird in wss. Suspension mit einem sauren Salz der H_2SO_3 in Ggw. eines SO_2 reduzierenden Metalles (Zn) behandelt. (**A. P. 1 573 385** vom 26/5. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Sebastian Gaum, Tanna, Ruß, *Trockenanlage für Tonwaren*, bestehend aus mehreren nebeneinanderliegenden Trockenkammern mit Feuchtluftsammlern u. Heißluftkanal sowie Naßluftabfuhrkanal, dad. gek., daß die die Verb. mit den Kammern herstellenden Ventile auf der Decke des Feuchtluftsammlers innerhalb der Trockenkammer angeordnet sind u. die Verb. mit dem Sohlkanal durch Ventile im Boden des Feuchtluftsammlers hergestellt ist. — Es wird hierdurch ermöglicht, daß die Feuchtluft aus dem inneren Feuchtluftsammler in die Sohle jeder beliebigen Kammer oder auch mehrerer anderer Kammern zugleich zur Vortrocknung eingeführt werden kann. (**D. R. P. 426 286** Kl. 82a vom 11/3. 1923, ausg. 9/3. 1926.) OELKER.

José Comerma, Frankreich, *Kunstmarmor*, bestehend aus einem Gemisch von Teerfarbstoffen u. sehr fein verteiltem Gips. (**F. P. 601 482** vom 14/4. 1925, ausg. 3/3. 1926.) KAUSCH.

Edouard Valéry Georges Jourdain, Frankreich, *Kunstmarmor*. Man mischt in polierten Formen Magnesiumoxydchlorid u. Gips u. färbt das Ganze mit mineral. Farbstoffen. (**F. P. 602 070** vom 12/8. 1925, ausg. 12/3. 1926.) KAUSCH.

Gewerkschaft Lutz III, Berlin, *Direkte Herstellung von Zementen im Abstrichgenerator*, der mit O_2 oder an O_2 angereicherter Luft betrieben wird, 1. dad. gek., daß im Generator Waschberge, Kohlenschlämme u. ähnliche Abfallprodd. verarbeitet werden. — 2. dad. gek., daß bei der Verarbeitung bituminöser Brennstoffe die Schweltemp. u. die Höhe der Schwelzone in an sich bekannter Weise durch Dampfzusatz beeinflusst werden. (**D. R. P. 425 861** Kl. 80b vom 23/1. 1924, ausg. 25/2. 1926.) KAUSCH.

Louis Emilio Woodbridge Pioda, San Francisco, Calif., *Zement*. Man schöpft Gemisch von tonigem u. kalkigem Material u. hebt ein Gemisch von W. u. der ge-
nuesten Stoffe empor, läßt das W. abfließen u. mahlt die M., worauf sie gebrannt wird.
(**P. 17 584** vom 3/5. 1924, ausg. 12/2. 1925. A. Prior. 4/5. 1923.) KAUSCH.

N. V. S. Knibbs, London, *Zementmaterialien*. Kalk, Magnesiakalk oder MgO
teilweise carbonisiert oder hydratisiert bei erhöhter, unter der Dissoziationstemp.
Carbonats oder Hydrats liegender Temp. (**E. P. 245 935** vom 13/1. 1925, ausg.
2. 1926.) KAUSCH.

Thomas Rigby, England, *Zement*. Fein zerteilte fl. Zementmasse wird in Ofen-
zerstäubt. (**F. P. 602 197** vom 15/7. 1925, ausg. 13/3. 1926. E. Prior. 28/7., 22/10.,
u. 5/12. 1924.) KAUSCH.

Maxime Antoine Minot, Frankreich, *Gefärbte Zemente*. Man mischt z. B. aus
alkern oder Schlacke erhaltenes Zementpulver mit feinstem BaCl₂-Pulver u. eben-
hem wasserfreien Na₂SO₄, dann mit W., worauf man die M. formt u. trocknet. Auch
n man organ. Farbstoffe, in W. l. Lackbildner u. Metallsalze hierbei verwenden.
(**P. 601 561** vom 3/11. 1924, ausg. 4/3. 1926.) KAUSCH.

Peter P. Budnikow und Morduch E. Lewin, Iwanowo-Wosnessensk, Rußl., *Her-
ung einer Zementart aus übergebranntem Gips, übergebrannten Gipsabfällen oder Natur-
ydrit* mit Benutzung von Sulfatzuschlägen, 1. dad. gek., daß die Rohstoffe durch
einsames Vermahlen mit entsprechenden Mengen saurer Alkalisulfate (wie NaHSO₄
· KHSO₄) oder neutraler Alkalisalze mit Zusatz entsprechender Mengen H₂SO₄ ohne
zeitige oder nachträgliche Wärmebehandlung abbinde- u. hochhärtungsfähig ge-
ht werden. — 2. dad. gek., daß die Zusätze in wss. Lsg. beim Gebrauch den fein-
ahlenen Rohstoffen zugesetzt werden können. (**D. R. P. 420 957** Kl. 80b vom
. 1924, ausg. 5/3. 1926.) KAUSCH.

F. T. Walker, Sheffield, *Kunststein*. Oolit. Stein wird so zerkleinert, daß die
tkörner sich von dem Bindemittel ohne Brechung scheiden, dann mischt man beide
enenfalls nach Zusatz von Zement u. W. oder Öl u. formt die M. zu Steinen, Blöcken
oder bringt sie auf Metall oder Leder auf. (**E. P. 246 202** vom 17/10. 1924, ausg.
. 1926.) KAUSCH.

G. Polysius Eisengießerei und Maschinenfabrik, Dessau, *Herstellung von
telbildnern*, dad. gek., daß dem Schmelzzement einige Prozente hochkalkige Binde-
el, wie z. B. Portlandzement, hydraul. Kalk, Ca(OH)₂ o. dgl. beigemischt werden.
(**R. P. 425 860** Kl. 80b vom 6/9. 1924, ausg. 25/2. 1926.) KAUSCH.

Ernst Moyat, Neubabelsberg, *Herstellung hochfeuerfester Formstücke* aus hoch-
festen Stoffen ohne Bindemittel, dad. gek., daß das hochfeuerfeste Material in
rntem Zustand durch Einstreuen in feuerfeste Formen u. gleichzeitiges Bestreichen
einer h. Stichflamme oberflächlich zum Schmelzen gebracht, zusammengebacken
auf diese Weise zur gewünschten Form aufgebaut wird. Zwei weitere Ansprüche
effen die Verwendung von hochfeuerfestem Material der gleichen M., als ver-
itet werden soll, u. die Anwendung wassergekühlter Kupferformen im Verf.
(**R. P. 425 862** Kl. 80b vom 6/9. 1924, ausg. 25/2. 1926.) KAUSCH.

Michael William Milner, Coburg, Victoria, Austr., *Keramische Mischungen*,
hend aus tonigen Stoffen, Magnesit, gegebenenfalls SiO₂ u. Feldspat. Diese
nimmt man z. B. zur Herst. von *Kochkesseln* u. dgl. (**Aust. P. 17 365** vom 16/4.
, ausg. 8/1. 1925.) KAUSCH.

Cyril Edward Ramsden, England, *Pflastermaterial*. Das Material (Steinmasse)
zt eine durch Hitze (1000°) aufgebrachte (grüne) Farbschicht. (**F. P. 602 131** vom
1925, ausg. 12/3. 1926.) KAUSCH.

Victor Wintsch, Schweiz, *Staubbindemittel für Straßen*, bestehend aus Emul-
n von Teer, Bitumen, Pech usw., die einen Zusatz organ. oder anorgan. Säuren

(insbesondere H₂SO₄) erhalten haben. (F. P. 601 124 vom 21/7. 1925, ausg. 23/1926. Schwz. Prior. 13/11. 1924.). KAUSCH.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

August Rippel, *Kohlensäure und Pflanzenertrag*. Krit. Übersicht über d. Literatur die „CO₂-Frage“ betreffend. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. Abt. B. 5. 49—64.) TRÉNEL.

Gerlach, *Über Kohlensäuredüngung*. Vf. hat in ummauerten Parzellen gelb. Lupinen u. Kartoffeln mit CO₂ aus einer Bombe — 14,64 l auf je 4 qm in der Zeit v. 28. 6. bis 25. 8. — begast. Eine ertragsteigernde Wrkg. der CO₂-Begasung trat nicht ein; die Erträge an Knollen waren auf den begasten Flächen um 17% herabgesetzt. Verss. mit einem künstlichen CO₂-Dünger aus München fielen ebenfalls negativ aus. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. Abt. B. 5. 65—69.) TRÉNEL.

O. Lemmermann, *Untersuchungen über die Bedeutung der Bodenkohlensäure für die Ernährung der Pflanzen, und über die Wirkung einiger Humus- bzw. Kohlensäuredünger*. Durch die Düngung mit Gründünger u. Stalldung wurden täglich auf d. 1,5 Morgen großen Versuchsfeld 15,1 kg CO₂ mehr an die Luft abgegeben; doch entsprach die Ertragssteigerung in keiner Weise der daraus theoret. zu berechnenden Mehrproduktion von organ. Subst. Unter experimenteller Ausschaltung der Nebenwrkgg. organ. Düngemittel wurde nachgewiesen, daß die bodenbürtige CO₂ auf d. Ertrag ohne Einfluß ist. — Polemik gegen REINAU. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. Abt. B. 5. 70—84.) TRÉNEL.

P. Ehrenberg, *Bemerkungen zur Kohlensäurefrage*. Bestätigung der Verss. GERLACHS u. LEMMERMANNs; Hinweis auf Schädigung der Pflanzen durch Erhöhung des CO₂-Drucks bei der Atmung. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. Abt. B. 5. 85—86.) TRÉNEL.

Gehring, *Die Bedeutung der Kalkdüngung*. Anschließend an die Verss. von KAPPEN berichtet Vf. über die Ergebnisse seiner Kalkdüngungsverss., nach denen die physikal.-chem. Zustände der Böden, darunter die Durchlässigkeit u. Acidität durch die Kalkdüngung wesentlich beeinflußt werden, so daß bei gewissen Verhältnissen erhebliche Ernteertragssteigerungen eintreten können. Wegen aller Einzelheiten vgl. Original. (Dtsch. Zuckerind. 51. 193—97. Braunschweig.) RÜHLE.

F. Z. Hartzell, *Empfindlichkeit der Birnenpsylla (Psylla pyricola Förster) gegen Zerstäubungs- und Spritzmittel*. Ausführlicher Bericht über die Bekämpfung des Birnenschädlings. Folgende Mischung wird empfohlen: 2½ Gallons Kalkschwefel, 40 Pf. gelöschter Kalk, 3 Pfd. Bleiarseniat, 1 Pint Nikotinsulfat auf 100 Gallons W. Ebenfalls sehr wirksam war Kalkstaub mit 2% Nikotin, wenn trocknes Wetter herrschte. (New York State Agricult. Exp. Station. Bull. 527. 119 Seiten. 1925.) TRÉNEL.

F. G. Mündinger, *Untersuchungen über die Bekämpfung der Birnenpsylla*. Die Schwierigkeiten in der Bekämpfung des Schädlings liegen darin, daß das Insekt zu gleichen Zeit in verschiedenen Entwicklungsstadien vorkommt. Die Fliegen wurden am besten mit Calciumcyanid- u. Kalknikotinstaub bekämpft; die Puppen waren am empfindlichsten gegen Nikotinsulfat u. Bordeauxlsg., Kalkschwefel tötete die Eier ab. Die besten Ergebnisse wurden an ruhigen Tagen bei hoher Lufttemp. erzielt. Bei sorgfältiger Anwendung wurde das Laub nicht geschädigt, sofern es nicht ganz jung war. (New York State Agricult. Exp. Station. Bull. 529. 34 Seiten. 1925.) TRÉNEL.

Gustav Gassner und Herbert Rabien, *Untersuchungen über die Bedeutung von Beiztemperatur und Beizdauer für die Wirkung verschiedener Beizmittel*. Uspulung Germisan verhalten sich in ihrer chemotherapeut. Abhängigkeit von Beizdauer u. Beiztemp. gegensinnig. Die Wrkg. des Germisans steigt mit Beizdauer u. Temp. Segeta Neu ist bzgl. der dosis curativa unabhängig von beiden Faktoren. Beim Formaldehyd...

nen niedrige Temp. weitgehend durch Verlängerung der Beizdauer ausgeglichen werden. Für die prakt. Tauchbeize ist die Temperaturfrage ohne Bedeutung. (Arb. l. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft **14**. 367—410.) TRÉNEL.

Max Trénel, *Kann aus der Reaktion chlorkaliumhaltiger Bodensuspensionen auf „Kalkbedarf“ des Bodens geschlossen werden?* In Ergänzung früherer Unters. (vgl. Mitt. f. Bodenkunde **14**. 27 u. 137; C. **1924**. I. 2736. **1925**. I. 1439) bzgl. der Beziehung zwischen der $[H^+]$ KCl-haltiger Bodensuspensionen u. der sogenannten „Gesamt-tätigkeit“ wird der Vers. gemacht, aus der pH des Bodenbreis auf seinen „Kalkbedarf“ schließen. Da in „austauschsauren“ Mineralböden die $[H^+]$ eine Funktion des „aus-tauschten“ Al^{+++} ist, läßt sich die Beziehung zwischen „Kalkbedarf“ u. der $[H^+]$ graph. stellen. Die Kurve der humosen Böden unterscheidet sich deutlich von den Mineralen u. gibt für diese einen höheren „Kalkbedarf“ an als für jene. (Mitt. Internat. landkundlichen Ges. **1**. 215—21. **1925**.) TRÉNEL.

H. Niklas und **F. Vogel**, *Wie weit besteht die Berechtigung, die Reaktion und den Zustand im Boden von dessen geologischer Entstehungsweise abzuleiten?* Vff. machen Vers., aus der $[H^+]$ KCl-haltiger Bodensuspensionen auf die geolog. Zugehörigkeit untersuchten Bodens zu schließen u. diskutieren die Bedeutung der Bodenrk. für geolog. agronom. Bodenkartierung. Im übrigen vgl. S. 473. (Mitt. Internat. Boden-dlichen Ges. **1**. 222—41.) TRÉNEL.

Densch, *Erfahrungen mit der Methode Neubauer*. Aus Gefäß- u. Feldverss. zieht den Schluß, daß die „Neubauer-Methode“ zur Best. des wurzellösl. Nährstoffs eine quantitative Beurteilung des Bodens erlaubt. Böden, in denen so gut wie kein N durch die Keimpflanzenmethode gefunden wurde, ergaben Ernten bis zu 84% Höchstertages, während andere mit 6—7 mg P_2O_5 nur 63% erreichten. Ein Boden mit nur 1,5 mg K brachte gleichwohl 96% der durch K-Düngung erzielten Ernte. Vf. untersucht ferner die Fehlerquellen der Methode. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. **B. 5**. 97—104.) TRÉNEL.

O. Lemmermann, *Die Bestimmung des Düngungsbedürfnisses der Böden durch Laboratoriumsversuche*. Kritik der Methode NEUBAUER im Sinne vorst. Referats. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. Abt. B. **5**. 105—17.) TRÉNEL.

E. Blanck, *Beiträge zur Bestimmung des Düngungsbedürfnisses des Bodens*. (Vgl. S. 613.) Vf. gibt der Best. der P_2O_5 mit Hilfe einer $\frac{1}{2}\%$ ig. Citronensäurelsg. vor der Neubauer-Methode den Vorzug. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. Abt. B. **5**. 105—25.) TRÉNEL.

H. Neubauer, *Die Bestimmung des Düngerbedürfnisses des Bodens durch Laboratoriumsversuche*. Bemerkungen zu den Angriffen von DENSCH u. LEMMERMAN (vgl. S. 613. Ref.) mit Erwiderungen der letztgenannten. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung. Abt. B. **5**. 126—43.) TRÉNEL.

Walter Trappmann, *Methoden zur Prüfung von Pflanzenschutzmitteln. I. Benetzungsfähigkeit*. Vf. untersucht die Benetzungsfähigkeit von Spritzlsg. in ihrer Abhängigkeit von der Oberflächenspannung. Aus der Tropfenzahl, die mit den Stalagmomen von J. TRAUBE bestimmt wurde, kann auf die Benetzbarkeit verschiedener Unterlagen geschlossen werden. (Arb. Biol. Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft **14**. 1—66.) TRÉNEL.

Société des Établissements P. Linet, Frankreich, *Dünger*, bestehend im wesentlichen aus H_3PO_4 , $CaCO_3$ u. K_2CO_3 . (F. P. **601 194** vom 24/10. **1924**, ausg. 24/2. **1925**.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Düngemittel*. Man stellt eine h. konz. Lsg. von $Ca(NO_3)_2$ u. Harnstoff (1:4) in einen Luftstrom o. dgl. (F. P. **246 377** vom 22/6. **1925**, ausg. 18/2. **1926**.) KAUSCH.

Charles Cornelius Paltridge, Mile End, Austral., *Düngemittel*. Holz bei Abfallprodd. der Holzbearbeitungsmaschinen werden in faserige MM. unter Erhit. übergeführt. (**Aust. P. 17 833** vom 20/5. 1924, ausg. 6/11. 1924.) KAUSCH

Oderberger Chemische Werke A.-G., Oderberg, Tschechoslowakei, übert. v. **August Chwala**, Wien, *Herstellung von als Pflanzenschutzmittel dienenden kolloidalen Arsenverbindungen*. Man dispergiert die betreffende As-Verb. in Ggw. eines Schkolloids u. von solchen hochmolekularen Verbb., die mit der As-Verb. *Komplex-Adsorptionsverbb.* zu bilden vermögen. — Von letzteren eignen sich besonders Salze von Metallsäuren, wie Ca-Plumbat, anorgan. Verbb. des Si, As u. Sb, K-Stannat, Molybdate der Metazinnsäure, sowie Metallsalze aliphat. u. aromat. Säuren, u. Succinimid-Na, malonsaures Zn. Z. B. wird eine 50% W. enthaltende Paste v. *Pb-Arsenat* in einer mechan. Dispergiervorr. mit einer wss. Suspension von Ca-Plumbat u. einer 20%ig. wss. Lsg. von protalbinsaurem Na oder von Sulfitcelluloseabfall dispergiert. Nach weiterer langsamer Zugabe von Ca-Plumbat u. kräftigem Umrühren wird das Gemisch mit Na-Antimoniat versetzt u. solange weiter gerührt, bis eine Probe beim Eingießen in W. eine völlig homogene, beständige Emulsion liefert. I. Prod. enthält 57% oder mehr an kolloidalem Pb-Arsenat. Durch vollständige Emulsifizierung wässert es seinen kolloidalen Zustand ein, während es bei vorsichtigem Abdampfen unterhalb 40°, bis nur noch ein geringer Rest W. vorhanden ist, in W. kolloidal l. bleibt. Analog läßt sich, unter Zusatz von Fehlingscher Lsg., *Schweinfurtergrün* in den kolloidalen Zustand überführen. Die kolloidalen As-Verbb. benetzen die Pflanzen sehr leicht u. vollständig u. haften gut an den Blättern u. anderen Teilen der Pflanzen. Selbst Lsgg. mit einem Gehalt von nur 0,25% kolloidalem Pb-Arsenat zeigen starke *insekticide Wrkg.* (**A. P. 1573 375** vom 20/8. 1924, ausg. 16/2. 1925.) **F. P. 595 425** vom 23/2. 1925, ausg. 2/10. 1925.) SCHOTTLÄNDER

Dr. Edwin Strickler, **Chemisches Laboratorium**, Kreuzlingen, Schweiz, *Mittel zum Vertilgen von tierischen und pflanzlichen Schädlingen*, 1. dad. gek., daß es aus Amylacetat besteht. — 2. dad. gek., daß das Amylacetat mit Fetten, Ölen, Wachsen, Harzen, Seifen, Paraffin, Vaseline, KW-Stoffen, Alkoholen usw. gemischt oder zu Tränken von porösen Körpern, wie Bimsstein, Kohle, Koks, Infusorienerde usw. verwendet wird. — Durch die Bindemittel wird die Verdunstung des Amylacetats verlangsamt. Es tötet selbst in kleinen Mengen alle mit ihm in Berührung kommende tier. Schädlinge, wie *Insekten, Weichtiere, Spinnen, Würmer*, in kürzester Zeit ab. Schwer ausrottbares Unkraut, wie *Wegerich*, geht beim Besprengen mit einer 2% verd. Lsg. von Amylacetat in 2—3 Wochen zugrunde. (**D. R. P. 421 833** Kl. 1 vom 10/4. 1923, ausg. 19/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER

Johann Heinrich Horst, Bingen a. Rh., *Verfahren zur Vernichtung der Reblaus*, bestehend aus einer Winterbehandlung der Stöcke mit einem Gemisch von Nitrobenzol u. Anilin bzw. Benzonitril, kombiniert mit einer darauffolgenden Sommerbehandlung der Stöcke mit reinem CS₂. — Das Verf. ermöglicht eine vollständige Vernichtung der Reblaus bei voller Erhaltung des Weinstocks. Ein Ersticken der Stöcke durch zu langes Festhalten des CS₂ im Boden kann nicht eintreten, da der CS₂ bei w. Witterung viel schneller verdunstet. Man benötigt so auch viel geringere Mengen an CS₂, da die Mehrzahl der Läuse bereits bei der Winterbehandlung mit Nitrobenzol u. Anilin abgetötet wird. (**D. R. P. 421 241** Kl. 451 vom 23/12. 1924, ausg. 7/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER

Dr. Alexander Wacker, **Gesellschaft für elektrochemische Industrie**, München, (Erfinder: **Felix Kauffler**), *Verfahren zur Bekämpfung von Pflanzkrankheiten*, dad. gek., daß Cu in Form von Cuprohalogeniden, insbesondere als Cu₂Cl₂ angewendet wird. — Abgesehen von der wirtschaftlichen Herst. der Cuprohalogenide u. der höheren Konz. bzgl. des Cu-Gehaltes gegenüber derjenigen der Cuprisalze sind das Cu₂Cl₂ u. Cu₂Br₂ swl., so daß sie keine Ätzwirkg. auf die Blätter hervorrufen. Der Regler ist also keine oder nur eine unbedeutende Neutralisation durch alkal. Stoffe.

wendig. Es ist daher möglich, die Konz. der Brühen gegenüber den Cuprisalzen nach Wunsch viel höher zu wählen. (D. R. P. 422 912 Kl. 451 vom 5/5. 1922, ausg. 12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Henning Foding, *Neues direktes Verfahren für die Herstellung von Stahl*. Das Verf., die unmittelbare Herst. von Stahl aus dem Erz bezweckt, arbeitet unter Luftschluß u. mit einem leichten Überdruck. Die ersten Verss. fanden im elektrochem. Laboratorium der techn. Hochschule Stockholm an einem elektr. Sonderofen von 30 kw statt. Der Laboratoriumserfolg war so ermutigend, daß man beschloß, dieses Verf. industrieller Grundlage in den Hüttenwerken zu Hagfors (Schweden) zu versuchen. Versuchs- und analytische Analysen wurden erzielt: *C* 0,02—1,32%, *P* 0,003—0,017%, *S* 0,009 bis 0,017%. An Festigkeitswerten wurden verzeichnet:

Nr. der Schmelze	Elastizitätsgrenze in kg/mm ²	Zerreifestigkeit in kg/mm ²	Dehnung in %
19	24,3	32,4	34
26	22,2	32,5	30
27	25,4	35,2	28,5
41	—	40,8	29,5
42	—	45,8	12
42,1	—	37,7	29
56	31,8	45,8	25
16	36,2	47,2	24,7
60	45,8	89,8	8,5

Der *C*-Gehalt wurde während der Betriebsperiode in aufeinanderfolgenden Schmelzen gewechselt mit dem Ergebnis:

verlangt	erhalten
0,40%	0,42%
0,20 „	0,23 „
0,80 „	0,78 „

Ofen arbeitet im Dauerbetrieb, u. Unterbrechungen finden nur im Augenblick Gießens statt, wenn das Aufgeben der Gichten aufhört. Als Rohstoffe werden in Hagfors schwed. Hämatite u. gewöhnliche engl. Kohle mit schwed. Holzkohle verwendet. Eine Feinerung des Erzeugnisses in einem Sonderofen zur Erniedrigung des *S*-Gehaltes ist nicht erforderlich. (Moniteur scient. [5] 16. 13—15.) KALPERS.

Georges Delbart, *Untersuchung über die Sprödigkeit kaltgezogener Stähle*. Die Untersuchung erstreckt sich auf 4 Stähle mit Gehalten an *C* von 0,115—0,48% u. an *Si* von 0,06—0,178%. Bei der Prüfung der Einschnürung erfolgte das Glühen von 100 bis 1000°. Wie anzunehmen war, wurde für weichen Stahl ein Maximum der Sprödigkeit für die Glühungen von 300—400° u. ein Minimum zwischen 800—900° festgestellt, während das Sprödigkeitsminimum an halbharten Stählen für die Glühungen von 700° beobachtet wurde. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 131—133.) KALPERS.

George J. Young, *Methoden des Kupferbergbaus in Arizona*. I. u. II. Beschreibung der Art der Lagerstätten u. ihres Abbaus. (Eng. Mining Journ.-Press 437—41. 476—83.) ENSZLIN.

B. Scheifele, *Einige Bemerkungen zum Rostschutzproblem*. Auf die hohe Durchlässigkeit von Anstrichen für W. u. O₂ wird hingewiesen. Der rostschützende Farb- anstrich ändert durch die dauernd wechselnde Witterungslage fortgesetzt seinen Zustand. fortwährenden Schwankungen im Quellungsgrad führen allmählich zu einer irreversibeln Änderung der Filmstruktur. (Farben-Ztg. 31. 1298.) SÜVERN.

Wilhelm Buddëus, Berlin, *Brikettieren und Vergießen von feinen Erzen, Erzste u. dgl. besonders S-haltigen Hüttenerzeugnissen* vermittelt Salzen, z. B. den Sulfat der Schwermetalle, behufs Totröstung oder sulfatisierender Röstung, dad. gek., d. den Erzen usw. die Salze in entwässerter Form oder in Form von solche entwässerte Salze enthaltenden Rösterzen oder Röstbriketts oder in Form von beiden Bindemitteln beigemischt u. das Gemisch behufs Brikettierung oder Vergießung auf Pressen, Walzen oder anderen geeigneten App. mit W. oder Lsgg. obiger Salze angefeuchtet wird. (D. R. P. 426 139 Kl. 40a vom 22/8. 1924, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH

Robert D. Pike, San Francisco, Californien, *Behandeln von Schwefelerzen*. Die Erze oder Konzentrate werden mit einer FeCl_3 - oder $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ -Lsg. bei einer dem S gleichen Temp. im Autoklaven behandelt, wobei Metall in Lsg. geht. (A. P. 1 570 777 vom 13/6. 1923, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvan., übert. von: **John Wesley Marden** u. **Cletus Clinton van Voorhis**, East Orange, N. J., *Metallerzeugung*. Metalloxyde werden in Ggw. eines Alkalimetalls, -halogenids oder eines Erdalkalihalogenisids erhitzt. (A. P. 1 573 083 vom 13/6. 1921, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH

Metals Production Co. of North America, Inc., New York, übert. von: **Walton George Perkins**, London, *Auslaugeverfahren zur Metallextraktion*. Erze o. dgl. werden mit ammoniakal. Lsgg. ausgelaugt u. dann mit Gemischen von Dampf, NH_3 -Gas, CO_2 behandelt. (A. P. 1 570 858 vom 25/7. 1925, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH

Robert Denis Lance, Frankreich, *Betriebsverfahren für Hochöfen*. Man ersetzt einen Teil oder den ganzen festen Brennstoff durch gasförmigen Brennstoff u. reichert das Ofengas bei seinem Eintritt in die Recuperatoren mit einem geeigneten Brennstoff an. (F. P. 601 159 vom 20/10. 1924, ausg. 24/2. 1926.) KAUSCH

Halbergerhütte G. m. b. H., Saargebiet, *Überhitzung von zu reinigenden Brenngasen, insbesondere von Hochofengasen*. Man läßt in die Rohgasleitung die Verbrennungsgase einer besonderen Flamme eintreten. (F. P. 601 308 vom 25/7. 1925, ausg. 24/2. 1926.) KAUSCH

Eugen Assar Alexis Grönwall, Schweden, *Herstellung von Metallen und Legierungen in elektrischen Öfen* mit einer oder mehreren senkrechten Elektroden unter Beförderung der darin zu erhitzenden Ausgangsstoffe in fein zerteilter Form durch Öffnungen in den Wänden nahe dem unteren Ende der Elektroden. (F. P. 601 350 vom 27/7. 1925, ausg. 27/2. 1926.) KAUSCH

William Clyde Bassett, Long Beach, Californ., *Mittel zur Einsatzhärtung* von Stahl, bestehend aus festem, kohlenstoffhaltigem Material (Sägemehl u. Holzkohle 20 Teile) u. einem Alkalidicarbonat (1 Teil). (A. P. 1 571 084 vom 14/5. 1925, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH

James W. van Meter, San Rafael, Californien, *Tempern von Metallen usw.* Das Werkstück wird in einer nichtoxydierenden Atmosphäre u. unterwirft es sich dem Einw. des Reaktionsprod. eines Gemisches von Holzmehl, Eisenspänen, NaCN u. Wasser oder KW-stoffl. (A. P. 1 573 784 vom 9/6. 1922, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH

J. E. Fletcher, Dudley, und **H. J. Young**, Witley Bay, England, *Behandeln von Gußeisen*. Gußeisen von vorwiegend perlit. Zus. wird mit soviel Ni, Cr, Co, W, V oder B legiert, daß das Erzeugnis den gewünschten Graubruach besitzt. Hierfür wird es auf eine Temp. oberhalb des A_{c1} -Punktes erhitzt u. dann in W., Öl oder Luft rasch abgekühlt, wobei das Metall ganz oder teilweise in den austenit. Zustand übergeht. Hierauf wird erneut, aber nicht über den A_{c1} -Punkt erhitzt, um Martensit, Sorbit, oder Troostit zu erhalten. (E. P. 245 196 vom 1/10. 1924, ausg. 28/1. 1926.) KAUSCH

Friedrich Schaffer, Budapest, *Erzeugung von vergüteten Formstücken aus austenitischen Manganstählen*. (D. R. P. 426 124 Kl. 18c vom 20/8. 1921, ausg. 5/3. 1926.) KAUSCH

Holl. Prior. 27/9. 1918. — C. 1925. I. 1009.)

Studebaker Corporation, South Bend, Indiana, übert. von: **William P. Wood-**
le und **Charles Neuman Dawe**, Detroit, Michigan, *Stahllegierung*, bestehend aus
 —23% C, 30—60% Mn, 1,40—1,75% Ni, 20—30% Mo u. 97—98,1% Fe. (**A. P.**
572 458 vom 24/8. 1923, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Poldihütte, Prag, *Stahllegierungen*, enthaltend Cr, mindestens 3% W oder Mo
 oder beide, ferner Ni oder Co oder beide. (**E. P. 245 792** vom 8/1. 1926, Auszug veröff.
 1/3. 1926. Prior. 8/1. 1925.) KAUSCH.

Electro Metallurgical Co., V. St. A., *Stahllegierungen*, die Zr u. Cr enthalten.
 Diese Legierungen sind sehr duktil. (**F. P. 601 299** vom 24/7. 1925, ausg. 26/2.
 1926.) KAUSCH.

William A. Ogg, Newton, Mass., *Schmelzen von Erzen flüchtiger Metalle*. Zn-Erze
 werden im Gemisch mit Brennstoff in solcher Menge, daß Metaldämpfe im Überschuß
 die Kapazität des Kondensators entstehen, in die Retorte eingeführt u. die Dämpfe
 kondensiert. (**A. P. 1 573 013** vom 7/2. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

William A. Ogg, Newton, Mass., *Schmelzen flüchtiger Metalle*. Man verflüchtigt
 den Metallgehalt von Zn-Erzen in Ggw. von Cl₂, kondensiert das Metall zum größten
 Teil, sammelt einen Teil des die größte Menge des Cl₂ enthaltenden Rauches u. mischt
 das Cl₂ mit frischem Rohmaterial u. Kohle. (**A. P. 1 573 014** vom 18/5. 1925, ausg.
 2. 1926.) KAUSCH.

William A. Ogg, Newton, Mass., *Schmelzen flüchtiger Metalle*. Man verflüchtigt
 den Metallgehalt von rohen Zn-Erzen in Ggw. von Cl₂, kondensiert als Metall einen
 größeren Teil der Dämpfe, sammelt einen das Cl₂ enthaltenden Teil des Rauches, ent-
 zieht daraus das Zn mittels eines Oxyds u. mischt das Cl₂ mit frischem Rohmaterial
 u. Kohle. (**A. P. 1 573 015** vom 25/5. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Jacob Neurath, Wien, *Elektrolytische Gewinnung von Zinn aus zinnhaltigen*
Legierungen unter Zufügung eines besonderen Anions (z. B. SO₄-Ion oder J-Ion) zu
 salzsauren Elektrolyten. Dadurch wird die kathod. Abscheidung des Pb fast voll-
 ständig verhindert. (**Oe. P. 102 289** vom 19/9. 1924, ausg. 11/1. 1926.) KAUSCH.

Guido Horn, Berlin-Weißensee, *Vermeidung des Übergangs von Blei in die*
Metalle beim Bleilöten oder bei der sonstigen Bearbeitung von Pb oder Pb-Legierungen
 durch Erhitzung von deren Oberfläche mittels Gebläseflammen, dad. gek., daß den
 Gebläseflammen oder den diese speisenden Gasen gasförmige oder verdampfbare KW-
 flüssigk. zugesetzt oder zugeführt werden. (**D. R. P. 417 541** Kl. 49f vom 28/5.
 1924, ausg. 25/2. 1926.) KAUSCH.

Georges Croulard und **Henry Braid** Paris, *Wiedergewinnung des Chroms aus*
chrom- oder dichromathaltigen Abwässern oder Laugen. (**D. R. P. 426 081** Kl. 12m
 vom 19/10. 1922, ausg. 5/3. 1926. — C. 1923. IV. 416.) KAUSCH.

Oesterreichische Bamag-Büttner-Werke A. G. und **Rudolf Jahn**, Wien, *Ver-*
fahren von Antimon-, Arsen- und Quecksilbererzen. Die vermahlenden Erze (bis 20%
 Fe) werden von außen beheizt, geröstet, die entstandenen flüchtigen Metalloxyde
 in einem Staubabscheider, der über der Niederschlagstemp. der Oxyde gehalten wird,
 von den Verunreinigungen getrennt u. die gereinigten Metalloxyddämpfe werden un-
 mittelbar einer Reduktionsflamme zugeführt. Die erhaltenen Metalle werden durch
 Fraktionierung fraktioniert abgeschieden. (**Oe. P. 102 293** vom 11/2. 1925, ausg. 11/1.
 1926.) KAUSCH.

Ronald Wild und **Bessie Delafield Wild**, Sheffield, Engl., *Kohlenstoffarme*
nickel- oder chrom-Legierungen. (**D. R. P. 426 123** Kl. 18b vom 16/2. 1923, ausg. 6/3.
 1926. Prior. 16/2. 1922. — C. 1925. I. 1450 [Aust. P. 11087].) KAUSCH.

Hermann Fischer, Zehlendorf, Wannseebahn, *Herstellung von säurefesten Eisen-*
legierungen, gek. durch den Zusatz von Cu zum Zweck der Herabminderung ihres
 Korrosionsvermögens. (**D. R. P. 426 113** Kl. 18b vom 26/11. 1919, ausg. 1/3. 1926.) KAUSCH.

Adolph Miller, Kirkwood, Missouri, *Metallgemische*, bestehend aus etwa 90% u. 10% Hg. (A. P. 1 570 763 vom 19/7. 1924, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH

Aluminium Co. of America, Pennsylvan., übert. von: **Douglas B. Hobbs**, Cleveland, Ohio, *Aluminium-Silicium-Legierungsguß*. Man füllt eine nicht abschmelzende Form mit geschmolzener Al-Si-Legierung, entfernt den Behälter von der geschmolzenen M. nach anfänglicher Erstarrung u. schreckt den Guß rasch ab. (A. P. 1 570 893 vom 29/4. 1925, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH

Société anon. de Commentry Fourchambault & Decazeville, Paris, übert. von: **Pierre Girin**, Paris, *Legierung* aus Fe, Cr, Ni, W u. Mn mit 50—80% Ni, 8—25% Cr, 0,5—8% W, 1—5% Mn u. 0,3—1% C. (A. P. 1 572 996 vom 9/12. 1924, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Zweigniederlassung Wien. (Erfinder: **Bruckner**, Reinickendorf-West.) *Hartlegierungen, die u. a. Kohlenstoff und Silicium enthalten*. In die Metallschmelze werden Stäbe eingetaucht, die SiC₂ enthalten, u. die Schmelze wird so lange erhitzt, bis der gewünschte Gehalt an Si u. C erreicht ist. (Oe. P. 102 286 vom 18/6. 1924, ausg. 11/1. 1926. D. Prior. 18/6. 1923.) KAUSCH

G. A. Scheid'sche Affinerie, Wien, *Hochsilberhaltige Silberkupferlegierungen*. Legierungen enthalten zur Erreichung des gewünschten Geschmeidigkeitsgrades oder Sn oder Sn-Si oder Si-Bronze. (Oe. P. 102 287 vom 28/7. 1924, ausg. 1/1. 1926.) KAUSCH

Friedrich Mayer, Solingen, *Herstellung eines Überzuges für permanente Metallformen*. Eine Mineralsubstanz, insbesondere Graphit wird in kolloidale Lsg. gebracht, d. mit W. verd. u. auf die Formwände gespritzt, auf denen dann nach Verdampfung des W. eine ganz dünne Schicht des kolloidalen Graphits zurückbleibt. (A. P. 1 570 894 vom 20/10. 1924, ausg. 26/1. 1926.) OELKE

Société des Produits Metallurgiques Constant-Bruzac, Frankreich, *Schmelzen von Metallen und Erzen* unter Einwirkenlassen des aus dem Brennstoff entstehenden CO₂ auf das in einem Ofen zu schmelzende Material. (F. P. 601 187 vom 23/10. 1924, ausg. 24/2. 1926.) KAUSCH

Erich Schmid, Solingen, *Behandlung von Leichtmetallen*. 1. dad. g. daß das Leichtmetall (Legierung) in fein verteilter Form mit einer (oder mehreren) pulverförmigen Verb. (Oxyd, Nitrid) des gleichen oder eines anderen Leichtmetalls innig vermischt, das Gemisch unter Anwendung von Druck gepreßt u. sodann in einer differenter Atm. gesintert wird. — 2. Anwendung des Verf. zur Herst. von Überzügen auf Metallen oder nichtmetall. Materialien. (D. R. P. 425 452 Kl. 40b vom 1/1. 1924, ausg. 25/2. 1926.) KAUSCH

Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, Frankreich, *Nichtoxydierbarmachen von Metallen*. Man überzieht das Metall mit einer Schicht von Cr u. Si. (F. P. 601 103 vom 7/7. 1925, ausg. 23/2. 1926. A. Prior. 1/1. 1925.) KAUSCH

George W. Blair, Wabash, Indiana, *Entfernungsmittel für auf Metall befindliche Emaille*, bestehend aus einer Schellack, Lack, Paraffinwachs u. NH₃-W. enthaltender Fl. (A. P. 1 572 839 vom 26/3. 1924, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH

Georges Bossière, Paris, *Niederschlagung des Kupfers aus unreinen Kupferlösungen durch Elektrolyse* unter Trennung von anwesenden Metallen in Ggw. von Bismut. dad. gek., daß die Elektrolyse in zwei Stufen ausgeführt wird, wobei in der ersten Stufe bei stärkerem Cu-Gehalt der Lsg. auf Abscheidung reinen Cu an der Kathode, in der zweiten bei an Cu verarmter Lsg. auf Red. des SO₂ an der Kathode unter B. von Wasserstoff hingearbeitet wird, welches letztere den Rest des Cu u. anderer Metalle, wie As, Sb, S-Metall fällt. (D. R. P. 426 448 Kl. 40c vom 30/8. 1924, ausg. 10/3. 1926. F. P. 601 104 vom 4/3. 1924.) KAUSCH

International Copperclad Co., Wilmington, V. St. A., *Herstellung von Dach-Deckungsmaterial durch elektrolytisches Auftragen eines Kupferüberzuges auf eine Grundlage von Nichtmetall*, dad. gek., daß Rohkupfer als Elektrolytmetall verwendet wird. (D. R. P. 426 427 Kl. 48a vom 17/2. 1924, ausg. 9/3. 1926. A. Prior. 17/2. 1923.) KA.

Ludwig Loewe & Co. Akt.-Ges., Berlin, *Herstellung von Hohlkörpern aus stark schwindenden Legierungen*, namentlich aluminiumreichen, mittels Spritzguß, dad. gek., daß die Gießform nach dem Gusse so lange durch regelbare Heiz- u. Kühlvorr. bei einer bestimmten, für das Herausziehen der Kerne günstigsten Temp. gehalten wird, bis das Gußstück diese Temp. angenommen hat u. so weit erstarrt ist, daß die Kerne entfernt werden können, worauf das Gußstück in der Form, falls erforderlich, unter Verteilung der Heiz- u. Kühlvorr. so lange weiter erkaltet, bis es die zum Auswerfen erforderliche Festigkeit angenommen hat. (D. R. P. 425 133 Kl. 31c vom 3/10. 1923, ausg. 10/2. 1926.) OELKER.

James H. Gravell, Elkins Park, Pennsylvan., *Rostschutzmittel für Eisen und Stahl*, bestehend aus W., H_3PO_4 u. NaH_2PO_4 . (A. P. 1 572 354 vom 9/5. 1922, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

IX. Organische Präparate.

G. Durocher, *Darstellung des Chlorals*. Einer kurzen Beschreibung der fabrikmäßigen Darst. von Chloral sind 3 Photographien beigegeben, die das Einleiten von Cl (Bomben mit fl. Cl entnommen) in die Gefäße mit A., die Absorption des entwickelten Cl u. die Dest. des Rohprod. zeigen. (La Nature 1926. 81—83.) HARMS.

P. Brun, *Die Industrie der Cyanide*. Herst. u. Verwendung der Cyanide. Rev. chimie ind. 35. 6—10. 43—47. Montpellier.) JUNG.

Walther Herzog, *Über die Verwertung der Nebenprodukte der Saccharinfabrikation in der analytischen Chemie*. (Vgl. S. 2626.) Die Herst. des p-Toluolsulfonchloramidtriums aus dem bei der Saccharinfabrikation als Nebenprod. anfallenden p-Toluolsulfonchlorid, seine Verwendung als Bleich- u. Desinfektionsmittel u. als J-Ersatz in der analyt. Chemie. (Österr. Chem.-Ztg. 29. 26—27. Wien.) JUNG.

Pétrole Synthetic, übert. von: **Charles Henry Andry-Bourgeois**, Paris, *Synthese von Kohlenwasserstoffen*. Gemische von gasförmigen oder dampfförmigen Kohlenstoffverb., z. B., CO, mit überschüssigem H_2 werden nacheinander durch eine Reihe von Lichtbögen geleitet. Zweckmäßig verwendet man zur Leitung Metallröhren, welche zugleich als Elektroden der Lichtbögen dienen. Es entsteht zunächst CH_4 , H_2 , C_2H_4 , C_3H_6 , C_4H_{10} usw. Verwendet man als Ausgangsstoff ein Gemisch von Bzl., O u. H_2 , so entstehen homologe aromat. KW-stoffe. (E. P. 223 543 vom 22/9. 1924, ausg. 10/12. 1924. F. Prior. 19/10. 1923 u. F. P. 574 173 vom 19/10. 1923, ausg. 7/7. 1924.) KÜHLING.

Soc. d'Études Minières et Industrielles, Frankreich, *Herstellung von Methan*. Gemische von CO u. H_2 werden unter anfänglicher Erhitzung über, gegebenenfalls auf Asbest, Bimsstein u. dgl. niedergeschlagenes Rhodiumschwarz geleitet. (F. P. 570 744 vom 15/2. 1924, ausg. 22/6. 1925.) KÜHLING.

Deutsche Gold- & Silber-Scheide-Anstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., *Herstellung von Chlorierungsprodukten des Methans*, dad. gek., daß einer Mischung des CH_4 mit einem Teil des anzuwendenden CH_4 die erforderliche Wärme durch den übrigen Teil des anzuwendenden CH_4 zugeführt wird. — Durch diese Arbeitsweise wird die B. von C entsprechend der Gleichung: $CH_4 + 2Cl_2 = C + 4HCl$ vermieden, ferner die Benutzung verhältnismäßig großer Cl_2 -beständiger Reaktionsgefäße aus Quarz oder Porzellan. Vielmehr wird das CH_4 in billigen, gut leitenden Metallapp. vorerhitzt u. dann in säurebeständigen Gefäßen kleiner Abmessung dem k. hergestellten Gemisch von Cl_2 u. einem Teil des CH_4 gefahrlos zugefügt u. in CH_3Cl bzw. CH_3Cl u. CH_2Cl_2

umgewandelt. Man leitet z. B. in das Reaktionsgefäß ein Gemisch von 5 Voll. CH_4 u. 1 Vol. Cl_2 u. dann soviel auf 470° erhitztes CH_4 , daß das Gesamtverhältnis von CH_4 u. Cl_2 dauernd ca. 15 Voll. CH_4 auf 1 Vol. Cl_2 beträgt. Auch CH_4 -haltige Gasgemische, besonders stark CH_4 -haltige Erdgase, lassen sich nach dem Verf. mit Erfolg chlorieren. (D. R. P. 422 350 Kl. 12o vom 7/7. 1916, ausg. 28/11. 1925. A. Prior. 6/10. 1915.) SCHOTTLÄNDER.

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, übert. von: **Carnie B. Carter** und **Albe E. Coxe**, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von höheren Chlorderivaten des Methans*. Man leitet ein Gemisch von CH_3Cl , CH_4 u. Cl_2 bei erhöhter Temp. durch eine Röhre, hierauf durch einen Gaswäscher zur Entfernung der entstandenen HCl u. schließlich zur Entfernung der gebildeten höheren Chlorierungsprodd. durch CH_4 durch einen Kompressor. Die Restgase, CH_3Cl u. CH_4 enthaltend, werden nach Zugabe neuer Mengen CH_4 u. Cl_2 wieder verwendet. — Z. B. erhält man beim schnellen Durchleiten eines Gemisches aus 100 Voll. Cl_2 , 100 Voll. CH_3Cl u. 200 Voll. CH_4 durch ein auf 400—500° erhitztes Steingut- oder Quarzrohr ca. 80% CH_2Cl_2 , 15% $CHCl_3$ u. 5% CCl_4 nach Komprimierung der aus dem Rohr entweichenden Chlorierungsprodd. (A. P. 1572 513 vom 9/8. 1923, ausg. 9/2. 1926. E. P. 245 991 vom 27/11. 1925, ausg. 11/9. 1926. F. P. 597 678 vom 5/5. 1925, ausg. 26/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. Baden, *Herstellung von mittelbar weiterverarbeitbarer Chlormethylösungen*. (D. R. P. 425 610 Kl. 12o vom 2/8. 1922, ausg. 25/2. 1926. — C. 1925. II. 759.) SCHOTTLÄNDER.

Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke Akt.-Ges., Völklingen a. Saar, V. St. A., *Fahren zum Hydratisieren von Olefinen*. Man erhitzt die Olefine mit W. unter hohem Druck. — Z. B. werden die Olefine mit zweckmäßig angesäuertem W. unter 70—200 Atmosph. Druck auf 150—150° erhitzt. (E. P. 238 900 vom 24/8. 1925, ausg. 14/10. 1925. D. Prior. 23/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Berlin, und **Richard Hessen**, Erkner b. Berlin, *Herstellung von Methylalkohol und Formaldehyd aus Methan* durch katalyt. Oxydation mittels O_2 oder O_2 -haltiger Gase bei höherer Temp., 1. dad. gek., daß CH_4 in Gegenwart überschüssigen O_2 bei Rotglut kurze Zeit unter Überdruck mit porösen anorganischen nicht metall. Kontaktstoffen, denen W. bindende Mittel zugesetzt sein können, in Berührung gebracht wird u. darauf die Reaktionsprodd. nach der Umsetzung unter unmittelbarer Aufhebung des Druckes sofort abgekühlt u. kondensiert werden. 2. dad. gek., daß die gebildeten Reaktionsprodd. nach ihrem Austritt aus dem Katalysator durch einen in anderer Richtung wie der Gasstrom vorbeistreichenden Luft- oder Gas- oder Dampfstrom gekühlt oder abgeleitet werden. — 3. dad. gek., daß zu dem Zweck, das Reaktionsgemisch unter Druck der Einw. des erhitzten Kontaktmittels auszusetzen, der Reaktionsraum mit einer porösen oder durchlocherten Platte abgeschlossen wird, deren Poren oder Öffnungen im Verhältnis zu dem lichten Durchmesser des Kontaktraumes klein sind. — Als Katalysatoren können Bimsstein, Ziegelsbrocken, hochporöse Schlacke, Tonscherben, gebrannter Ton, Asbest, Quarzsand, Schlackenwolle verwendet werden. Zweckmäßig setzt man zu den Katalysatoren gewöhnlicher oder mäßig erhöhter Temp. W. aufnehmende u. dieses bei höheren Temp. wieder abgebende Stoffe, wie Oxyde oder Hydroxyde der Alkalien oder alkal. Erdsalze, $MgCl_2$, $CaCl_2$ oder wasserfreies $CuSO_4$, zu, indem man den Katalysator mit ihm tränkt oder sie auf ihm als Schicht anordnet oder sie hinter dem erhitzten Katalysator anbringt. Die Katalysatoren können auch zum Kühlen der Reaktionsgase benutzt werden. An Stelle von O_2 oder Luft kann man auch ozonisierte Luft als Oxydationsmittel benutzen. Z. B. wird ein Rohr aus Porzellan mit Tonscherben, die mit verd. $NaOH$ -Lsg. getränkt u. getrocknet wurden, gefüllt u. in geeigneter Weise gewaschen oder teilweise erhitzt. Hierauf leitet man unter einem Druck von $1/4$ — $1/2$ at u. einer Geschwindigkeit von ca. 1—2 l pro Min. ein trockenes oder feuchtes Gemisch

Teil CH_4 u. 20 Teilen Luft durch das Rohr. Dieses ist gegen ein offenes Rohr durch eine durchlochte Platte verschlossen. Das letztere ragt in eine mit W. oder einem anderen Absorptionsmittel gefüllte Vorlage. Aus dem offenen Rohr wird mit Hilfe einer Vakuumpumpe durch die Vorlage ein lebhafter Luftstrom durchgesaugt, der die aus der durchlochten Platte austretenden gasförmigen Reaktionsprodd. mitführt. Es entsteht so ein mit wenig CH_3OH verunreinigter CH_2O . Aus einem Gemisch von 6 l CH_4 u. 95 l Luft erhält man 30% CH_2O u. 10% CH_3OH , aus 6 l CH_4 u. 90 l Luft 15% CH_2O u. 15% CH_3OH . (D. R. P. 421 215 Kl. 12o vom 9/12. 1922, ausg. 9/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. (Erfinder: **Otto Nicodemus und Otto Wulff**), Höchst a. M., *Herstellung von Methylalkohol durch Verseifung von Methylchlorid*, dad. gek., daß man dem Verseifungsmittel bei Ggw. von W. Katalysatoren, insbesondere Cu-Salze, zusetzt. — Die Geschwindigkeit der Umsetzung des H_2Cl wird so auf das 4—5-fache erhöht, so daß man bei niedrigerer Temp. u. geringerem Druck arbeiten kann. Man erhitzt z. B. in einem rotierenden Kessel ein Gemisch von W., CaO u. etwas Cu_2Cl_2 auf 120°, wobei der Druck auf 2 at steigt u. rückt allmählich CH_3Cl ein. Hierbei steigt der Druck schließlich auf 7—8 at. Nach $\frac{1}{2}$ Std. ist die Umsetzung vollständig. Bei 140° steigt der Druck auf ca. 10 at u. die Rk. ist dann bereits in $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Stde. beendet. Die Ausbeute beträgt 95% der Theorie an CH_3OH . (D. R. P. 421 789 Kl. 12o vom 27/7. 1920, ausg. 17/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. B., *Darstellung von Acetaldehyd aus Äthylalkohol* durch Überleiten von dampfförmigem A. u. oxydierenden Gasen, z. B. Luft, über Ag-haltige Kontaktstoffe, dad. gek., daß das Ag in Form von Drahtnetzen u. ähnlichen Gebilden verwendet wird. — Gegenüber der Verwendung von Asbest niedergeschlagenem, fein verteiltem Ag wird nicht nur die Lebensdauer des Katalysators erhöht, sondern auch eine beträchtliche Steigerung der Aldehydausbeute, von sonst höchstens 70,4 bis zu 93,6% der Theorie erzielt. Ferner kann man einstufig, d. h. unter Anwendung nur eines Kontaktrohrs, arbeiten, während mit Ag-Asbest infolge des heftigen Verlaufs der Rk. das Arbeiten in zwei hintereinanderschalteten Kontaktrohren unerlässlich ist. Z. B. werden durch ein Quarzrohr von 3 mm, das auf 60 mm Länge mit aufeinanderliegenden Ag-Drahtscheiben besickt ist, pro Stde. ca. 20 g A. u. 25 l Luft geleitet. Durch kurzes Erwärmen des Katalysators auf eben sichtbare Rotglut wird die Rk. eingeleitet, worauf sie ohne jede weitere äußere Wärmezufuhr verläuft. Der gebildete *Acetaldehyd* wird in bekannter Weise aufgefangen, z. B. aus den Reaktionsgasen herausgewaschen. Die Ausbeute beträgt 92,3% der Theorie. (D. R. P. 422 729 Kl. 12o vom 19/12. 1923, ausg. 10/12. 1925.) SCHOTTL.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. (Erfinder: **Otto Ernst und Kurt Sponzel**), Höchst a. M., *Darstellung von Ameisensäureestern*, dad. gek., daß man CO in Ggw. von W. bei erhöhter Temp., mit oder ohne Anwendung von Druck u. Katalysatoren auf Alkohole einwirken läßt. — Beim Überleiten von CO u. CH_3OH -Dampf in Ggw. von Wasserdampf über Kontakte der verschiedensten Art, auch solche, die die Anlagerung u. Abspaltung von W. begünstigen, findet eine B. von *Ameisensäuremethylester* nach der Gleichung $\text{CO} + \text{CH}_3\cdot\text{OH} = \text{H}\cdot\text{CO}_2\cdot\text{CH}_3$ schon unter gewöhnlichem Druck bei weniger als 200° statt. Bedeutend beschleunigt wird diese Rk. aber durch Anwendung von Druck. Da zwischen Esterbildung u. -verseifung ein Gleichgewichtszustand besteht, so kann man gegebenenfalls durch Anwendung von überschüssigem Alkohol die Esterausbeute verbessern. Die Reinigung des Esters kann nachfolgend durch abgestufte Dest. erreicht werden. Z. B. werden beim einmaligen Überleiten von CO u. CH_3OH -Dampf im Verhältnis von 1:2 in Ggw. von ca. $\frac{1}{10}$ Vol. Wasserdampf über Ti- oder Th-Oxyd unter gewöhnlichem Druck bei 175° 0,7% *ameisensäuremethylester* gebildet. — Bei Verwendung von Zn u. Mn als Kontakt u.

von hochakt. Kohle als Kontaktträger u. bei 260° steigt die Ausbeute an *Ameisensäuremethylester* auf 10%. — Leitet man CO u. CH₃OH-Dampf im Verhältnis von 1:2 durch einen Kontakt aus akt. Kohle bei 200° unter 200 at Druck, so werden 12% des CO in *Methylformiat* umgewandelt. Die Rk. verläuft bei Verwendung anderer Alkohole analog. (D. R. P. 422 500 Kl. 12o vom 9/3. 1923, ausg. 2/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER

American Cyanid Co., New York, übert. von: **Kenneth Farra Cooper**, New York, *Cyanidlösungen*. Man löst in W. eine rohe Cyanidmasse, die CaC₂ u. Sulfid-schwefel enthält, worauf man durch die Lsg. einen Luftstrom gehen läßt, der den Sulfidschwefel in Thiocyanat überführt. (Aust. P. 17 631 vom 6/5. 1924, ausg. 20/12. 1924.) KAUSCH

Pacific R. & H. Chemical Corporation, El Monte, Californ., übert. von: **M. Walker**, Los Angeles, Californ., *Reinigung von Cyanwasserstoffsäure*, die H₂S enthält, mittels fl. SO₂. (A. P. 1 571 982 vom 26/10. 1925, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH

California Cyanide Co., Inc., New York, übert. von: **Floyd J. Metzger**, New York, *Calciumcyanid*. Man behandelt CaC₂ mit HCN. (A. P. 1 573 732 vom 28/10. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH

Badische Anilin- & Soda-Fabrik. (Erfinder: **Wilhelm Meiser**), Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung von Harnstoff* aus NH₃ u. CO oder deren Verbb. unter Druck, darin bestehend, daß man mit Pb ausgekleidete App. oder Apparateile verwendet, bei denen die äußere druckfeste Wandung mit einer oder zweckmäßig mehreren kleineren Öffnungen versehen ist. — Die zwischen dem Pb u. der druckfesten Außenwandung befindliche Luft, die beim Erwärmen zu Faltenbildung des Pb führen würde, kann durch diese Öffnungen entweichen. Etwa entstandene Undichtigkeiten der Pb-Wandungen können sich so durch Zischen oder den Geruch der ausströmenden Gase sofort bemerkbar machen u. beseitigt werden. Andernfalls würde die h. Schmelze nach Zerstörung der Pb-Futters zunächst unbemerkt zwischen Pb u. Außenwandung gelangen u. letztere so lange anfressen, bis sie dem Innendruck nicht mehr widerstehen könnte u. gegebenenfalls mit großer Gewalt aufgerissen würde. Z. B. wird ein Eisenrohr, dessen lichte Weite 48 mm beträgt, mit mehreren Löchern unter 1 mm Durchmesser versehen u. in dieses ein Pb-Rohr von 32 mm lichter Weite eingezogen u. mit Druck angepreßt. Die Herst. der Öffnungen kann am einfachsten erfolgen, indem man die weiteren Löcher durch nicht völlig passende Gewindestopfen zuschraubt. (D. R. P. 422 525 Kl. 12o vom 26/4. 1922, ausg. 3/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER

Alexander Schönberg, Charlottenburg, *Darstellung von Diphenylsulfid*, dadurch gek., daß man Diphenylsulfoxyd mit W. entziehenden, halogenfreien Mitteln behandelt. — Z. B. wird *Diphenylsulfoxyd* mit P₂O₅ bis zum Eintritt der Rk. erwärmt, die Temperatur jedoch alsdann nicht mehr gesteigert. Man läßt erkalten, extrahiert die Schmelze mit Bzl. u. dest. aus der Lsg. das Bzl. ab, wobei das *Diphenylsulfid* zurückbleibt. Die Ausbeute ist schlechter als bei Verwendung von NaNH₂ oder KNH₂. (Hitz. vgl. auch Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2275; C. 1924. I. 663.) Das *Diphenylsulfid* findet zur Herst. von Farbstoffen sowie für pharmazeut. Zwecke Verwendung. (D. R. P. 426 476 Kl. 12q vom 17/7. 1923, ausg. 9/3. 1926.) SCHOTTLÄNDER

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden, *Herstellung von Salzen stickstoffhalogensubstituierter Arylsulfonamide*, dad. gek., daß man Lsgg. von Alkali- oder Erdalkalisalzen N-halogensubstituierter Arylsulfonamide mit l. Mg-Salzen behandelt. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von *p-Toluolsulfonchloramid-Ca* (vgl. D. R. P. 390 658; C. 1924. II. 888) mit einer wss. MgCl₂-Lsg. unter Rühren versetzt, wobei das Mg-Salz des *p-Toluolsulfonchloramids* krystallin abscheidet. Es enthält 23% akt. Cl₂, ist völlig neutral gegen Phenolphthalein, dauernd haltbar u. besitzt eine desinfizierende Lsgg. genügende Löslichkeit in W. — Analog erhält man u. *β-Naphthalinsulfonchloramid-Na* u. MgCl₂ das Mg-Salz des *β-Naphthalinsulfonchloramids*.

mids — sowie aus *Tetrahydronaphthalinsulfonchloramid-Na* (vgl. D. R. P. 377367; . 1923. IV. 626) u. MgSO_4 das *Mg-Salz* des *Tetrahydronaphthalinsulfonchloramids*. Die Prodd. finden als *Desinfektionsmittel* u. für andere Zwecke Verwendung. (D. R. P. 22 076 Kl. 12o vom 24/5. 1924, ausg. 23/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

E. Merck, Darmstadt, *Herstellung einer in Öl löslichen Wismutverbindung*. Man läßt Naphthensäure oder naphthensaure Salze unter solchen Bedingungen auf eine i-Verb. einwirken, daß höchstens eine ganz schwache Hydrolyse eintreten kann. — . B. wird eine wss. Lsg. von *Na-Naphthenat* mit einer wss. $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ -Mannitlsg. ersetzt, das entstandene *Bi-Naphthenat* sofort in Chlf. oder Ä. aufgenommen, diese Lsg. getrocknet u. das flüchtige Lösungsm. nach Zusatz von *Olivöl*, durch Erwärmen im Vakuum entfernt, wobei eine klare Lsg. des Salzes im Olivöl erhalten wird. — Der man suspendiert frisch gefälltes u. sorgfältig getrocknetes $\text{Bi}(\text{OH})_3$ in fl. Paraffin, läßt *Naphthensäure* hinzu u. erhitzt unter Durchleiten eines getrockneten Luftstromes einige Stdn. auf 150° . Es entsteht eine klare Lsg. von *Bi-Naphthenat* in Paraffinöl. (Schwz. P. 113 456 vom 11/11. 1924, ausg. 2/1. 1926. D. Prior. 13/12. 1923.) SCHOTTL.

Leon Darrasse, **Etienne Darrasse**, Paris, und **Lucien Dupont**, Vincennes, Frankreich, *Darstellung von Bornyloxalat*. (D. R. P. 425 789 Kl. 12o vom 28/5. 1921, ausg. 27/2. 1926. F. Prior. 9/6. 1920. — C. 1922. IV. 248.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Walter Kropp**, Elberfeld), *Darstellung von C-Benzylloxynaphthalinen*, dad. gek., daß man Benzylhalogenide auf Naphthole bei Ggw. von Salzen schwacher Säuren einwirken läßt. — Die B. von Nebenprodd., wie Naphtholbenzyläther, Dibenzyläther, Benzylalkohol, wird bei dem Verf. stark zurückgedrängt. Die Ausbeuten an Benzylloxynaphthalinen sind erheblich besser als bei Verwendung der Alkalisalze der Naphthole. Die Umsetzung kann in wss. Lsg. oder in organ. Lösungsmm. erfolgen. Man kann auch Katalysatoren, wie Fe-, Cu- oder Zn-Salze, zusetzen. Die abgespaltene Salogenwasserstoffsäure wird von den Salzen neutralisiert. Die *Benzylloxynaphthaline* dienen therapeut. Verwendung, z. B. als *Mittel gegen Darmparasiten*. Beispiele für die Herst. des *1-Benzyl-2-oxynaphthalins*, Krystalle, F. 115° , ll. in verd. Alkali, durch Einw. von Benzylchlorid auf β -Naphthol in wss. Lsg. in Ggw. von Na_2CO_3 , bzw. CaCO_3 , bzw. von $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, sowie in Xylollsg. in Ggw. von Na_2CO_3 u. FeCl_3 , — ferner von *Oxy-4-benzyl-naphthalin*, Krystalle, F. 124° , durch Umsetzung von α -Naphthol mit Benzylchlorid in wss. Lsg. in Ggw. von Na_2CO_3 sind angegeben. (D. R. P. 422 948 Kl. 12q vom 7/3. 1924, ausg. 16/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Darstellung von substituierten Ketopolyhydronaphthalinen*, dad. gek., daß man Ketopolyhydronaphthaline mit Aldehyden kondensiert u. an die entstehenden Prodd. mit Hilfe eines beliebigen Reduktionsmittels Mol. H_2 anlagert. — Es entstehen zunächst α, β -ungesätt. Ketone u. aus diesen bei Red. gesätt. Ketone. Beide Körperklassen zeichnen sich durch eine auffallend starke Wrkg. auf die glatte Muskulatur aus, so daß sie, unterstützt durch ihre langsame Resorbierbarkeit therapeut., z. B. als *Wurmmittel*, Verwendung finden können. Folgende Beispiele sind angegeben: Bei der Einw. von Benzaldehyd u. NaOCH_3 -Lsg. auf α -Tetrahydronaphthalinketon entsteht unter Erwärmung u. Violettfärbung das Benzyliden- α -tetrahydronaphthalinketon, aus A. schwach grüngelbe Tafeln, F. 108 — 110° , aus diesem bei der Red. in Eg.-Lsg. mit H_2 in Ggw. von Pd-Mohr das Benzyl- α -tetrahydronaphthalinketon, aus CH_3OH Krystalle, F. 55 — 56° . — Analog erhält man aus *Methoxy- α -tetrahydronaphthalinketon* u. Benzaldehyd das Benzyliden-ar-methoxy- α -tetrahydronaphthalin, aus CH_3OH schwach rosa gefärbte Tafeln, F. 99 — 101° , u. bei Red. des letzteren mit Pt-Mohr u. H_2 das Benzyl-ar-methoxy- α -tetrahydronaphthalinketon, F. 53 — 55° . — Kondensiert man β -Dekahydronaphthalinketon mit Salicylaldehyd in alkoh. Lsg. in Ggw. von 50% ig. NaOH , so geht es in o-Oxybenzal- β -dekahydronaphthalinketon, aus CH_3OH gelbe Nadelchen, F. 166° , über. Dieses gibt bei


see
erata
p. 3977

der Red. mit Zn-Staub in Eg.-Lsg. das *o*-Oxybenzyl- β -dekahydronaphthalinketon, *CH*₃OH Krystalle, F. 110°, ll. in den gebräuchlichen organ. Lösungsm. (D. R. P. 422 036 Kl. 12o vom 30/9. 1923, ausg. 23/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Georg Kalisch**, Frankfurt a. M., **Rudolf Müller** und **Fritz Frister**, Fechenheim a. M.), *Aminobenzanthronderivate*. (D. R. P. 426 347 Kl. 12q vom 13/12. 1923, ausg. 9/3. 1926.) C. 1926. I. 2248. 2249.) SCHOTTLÄNDER

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. (Erfinder: **Friedrich St** und **Karl Böttcher**), Höchst a. M., *Darstellung eines Derivats des 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolons*, dad. gek., daß man 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-methylamino-5-pyrazolon mit benzylierenden oder 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-benzylamino-5-pyrazolon mit methylierenden Mitteln behandelt. — Man behandelt z. B. in Bzl. gel. 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-methylamino-5-pyrazolon, F. 60°, mit Benzylbromid — oder erhitzt es in Bzl. gel. 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-benzylamino-5-pyrazolon mit *CH*₃J im geschlossenen Gefäß mehrere Std. auf 100°. Das 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-methylbenzylamino-5-pyrazolon aus Hexahydrobzl. oder aus PAe. + Essigester oder aus Lg. Krysta, F. 68—70°, gibt in verd. HCl gel. mit FeCl₃ eine violette Färbung. Das 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-benzylamino-5-pyrazolon, in W. wl., in den meisten organ. Lösungsm., Krystalle, F. 73°, gibt in verd. alkoh. Lsg. mit FeCl₃ eine rotbraune Färbung, kann durch Red. von 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-benzylidenamino-5-pyrazolon mit Na-Amalgam erhalten werden. Das *tert. Amin* ist sehr wenig tox. u. hat starke *antipyret.* W. (D. R. P. 423 028 Kl. 12p vom 16/5. 1923, ausg. 18/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER

Robert Stollé, Heidelberg, und **Emil Schick**, Mannheim, *Darstellung von Aminotetrazol*, dad. gek., daß man Dicyandiamid in wss. Lsg. auf N₃H einwirken läßt. Die Rk. verläuft im Sinne der nachst. Gleichung:



Z. B. wird eine w. gesätt. wss. Lsg. von Dicyandiamid mit einer 15%ig. wss. Lsg. v. N₃H zusammengebracht. Aminotetrazol scheidet sich nach längerem Stehen krystall ab, der Rest wird durch Eindampfen der Lsg. unter Zurückgewinnung der überschüssigen N₃H erhalten. Die Ausbeute ist quantitativ. (D. R. P. 426 343 Kl. 12p vom 12/7. 1924, ausg. 6/3. 1926.) SCHOTTLÄNDER

C. Mannich, Frankfurt a. M., *Darstellung von Aminoketonen*, darin besteht, daß man in Abänderung des D. R. P. 422 098 an Stelle der Mono- oder Dialkylamine solche sek. Amine, die, wie Piperidin oder hydrierte Chinoline, die NH-Gruppe ringförmig gebunden enthalten, verwendet. — Z. B. erhält man aus salzsaurem Piperidin 35%ig. *CH*₂O-Lsg. u. cyclo-Hexanon das Chlorhydrat des Piperidinomethyl-cyclohexanons, aus i-Propylalkohol Krystalle, F. 161°; die freie Base ist ein farbloses, amartig riechendes Öl, Kp.₂₀ 145°. — Piperidinchlorhydrat, *CH*₂O u. cyclo-Pentanon geben das salzsaure Piperidinomethyl-cyclo-pentanon, aus i-Propylalkohol Krystall, F. 145°, — während durch Kondensation von Tetrahydro-i-chinolinhydrochlorid u. 30%ig. *CH*₂O-Lsg. u. cyclo-Hexanon das Chlorhydrat des Tetrahydro-i-chinolinmethyl-cyclo-hexanons, aus A. u. Aceton Krystalle, F. 161°, entsteht. Die Aminoketone finden zur Herst. pharmazeut. Prodd. Verwendung. (D. R. P. 422 916 Kl. 12p vom 26. 1922, ausg. 15/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 422 098; C. 1926. I. 1293.) SCHOTTLÄNDER

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Darstellung eines Bz-Tetrahydrooxychinolins*, dad. gek., daß man 2,4-Dimethyl-6-oxychinolin in Ggw. eines Ni-haltigen Katalysators mit molekularem H₂ behandelt. — Man läßt z. B. auf in Dekahydronaphthalin gel. 2,4-Dimethyl-6-oxychinolin bei 180—190° in Ggw. eines Ni-haltigen Katalysators unter Druck einwirken, verd. mit A., filtriert u. dest. den A. u. das Dekalin ab, wöl

in Alkali unl. krystallin. M. zurückbleibt. Das 5,6,7,8-Tetrahydro-6-oxy-2,4-dimethylchinolin der empir. Zus. $C_{11}H_{15}ON$, aus A. Krystalle F. 162°, Kp.₁₅ 181—183°, mit HNO_2 keine Rk.; Chlorhydrat, F. 134°; Pikrat F. 150°; Jodmethylat, $C_{12}H_{18}ONJ$, 140°, 39,92% J enthaltend. Erwärmt man die Base in Chlf.-Lsg. $\frac{1}{2}$ Stde. mit Benzoylchlorid u. setzt Ä. zu, so fällt das Chlorhydrat der O-Benzoylverb., Krystalle, 199—200°, aus. Dieses ist ein stark wirksames Anästheticum. (D. R. P. 423 026 vom 10/8. 1923, ausg. 18/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., Herstellung von unsymmetrisch disubstituierten Barbitursäuren. Durch einen ungesätt. cycl. u. einen gesätt. oder ungesätt. Alkylrest a. disubstituierte Malonsäuren oder Cyanessigsäuren oder deren Derivv. werden in üblicher Weise in die entsprechenden Barbitursäuren übergeführt. — Man kann auch in durch einen der genannten Substituenten substituierte Barbitursäuren oder ihre Vorprodd. den zweiten Substituenten einführen u. gegebenenfalls die entstandenen Zwischenprodd. in Barbitursäuren umwandeln. — Beispiele sind angegeben für die Herst.: der Δ -2,3-cyclo-Hexenyläthylbarbitursäure, Krystalle, F. 172°, durch Kondensation von Harnstoff mit Δ -2,3-cyclo-Hexenyläthylmalonsäureester, Kp.₁₂ 149—151°, in Ggw. von $NaOC_2H_5$. Der disubstituierte Malonester wird durch Einw. von 1-Brom- Δ -2,3-cyclo-hexen auf Natriumäthylmalonsäureester erhalten — der Δ -2,3-cyclo-Hexenyläthylbarbitursäure, Krystalle, F. 149°, aus dem durch Einw. von 1-Brom- Δ -2,3-cyclo-hexen auf Natriumäthylmalonsäureester erhältlichen Δ -2,3-cyclo-Hexenyläthylmalonsäureester, Kp.₈ 150—152°, u. Harnstoff in Ggw. von $NaOC_2H_5$, — sowie der Δ -1,2-cyclo-Hexenyläthylbarbitursäure, aus h. W. Krystalle, F. 170°, durch Kondensation des Δ -1,2-cyclo-Hexenyläthylcyanessigsäureesters, Kp.₄ 125°, mit Guanidinsulfat in Ggw. von $NaOC_2H_5$. Verseifung der intermediär entstandenen Diiminobarbitursäure mit verd. H_2SO_4 . Der disubstituierte Cyanessigsäureester läßt sich durch Behandeln des Natrium- Δ -2,3-cyclo-Hexenylcyanessigsäureesters mit C_2H_5J gewinnen. In ihrer therapeut. Wrkg. sind die Prodd. der cyclo-Hexenyläthylbarbitursäure u. deren Analogen durch geringere Wirksamkeit, bessere Schlafwrkg. u. das Fehlen von Rausch- u. Aufregungszuständen vorteilhaft. (E. P. 231 150 vom 27/2. 1925, ausg. 13/5. 1925. D. Prior. 21/3. 1924. D. R. P. 101 982 vom 4/2. 1925, ausg. 10/12. 1925. D. Prior. 21/3. 1924.) SCHOTTL.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Karl Reinking, Die älteste Erwähnung des Zeugdruckes in der Literatur. Berechnung einer Stelle aus Herodot, Buch I, CCIII, nach der ein im Kaukasus lebendes Volk mit einer Farbe aus zerriebenen Blättern u. W. Kleider bemalte. (Melliands Textilber. 7. 230—31.) SÜVERN.

A. Lottermoser, Physikalisch-chemisches zu den Färbetheorien. Die Arbeiten zur Erforschung des Wesens der verschiedenen Farbstoffklassen, der Natur der Gespinnstfärbung u. zum Studium des Färbevorgangs sind besprochen. (Melliands Textilber. 7. 146—47. 225—26.) SÜVERN.

Robert Mohr, Von der Kochbleiche zur Kaltbleiche. Bei der Kaltbleiche fällt die sonst übliche Hochdruckkochung weg. Die Ware wird mit k. Flotten behandelt, für besondere Wrkgg. wird die O_2 -Flotte leicht angewärmt. Die Gewichtsverluste der Ware werden geringer, man erhält ein volles dickes Gewebe mit natürlichem Baumwollglanz. Fast während der ganzen Bleiche ruht das Gut im Bleichkessel, es wechselt von der Cl_2 -Säure-, O_2 - u. Waschflotte durchströmt zu werden. Die Ware wird dadurch geschont, Breitereverluste u. Zerrungen auf das Mindestmaß beschränkt. Die wirksamen Gase werden abgesaugt u. dem Bleichgut wieder zugeleitet. Die benutzten Flotten werden unter hydraul. Druck von 2—3 Atm. im Bleichgut in Umlauf gehalten, schädliche Druckunterschiede zwischen Saug- u. Druckseite sind unmöglich. (Melliands Textilber. 6. 909—12. 1925. 7. 64. Eibergen.) SÜ.

M. Freiburger, *Kochbleiche und Mohrbleiche*. Widerspruch gegen MOHR (v. vorst. Ref.). Unter vergleichender Darstellung beider Systeme wird bestritten, daß die Mohrbleiche der Kochbleiche für Weiß-, Färbe- u. Druckware mindestens ebenbürtig ist. (Melliands Textilber. 7. 148. 226—27.) SÜVERN.

Haller und A. Hohmann, *Untersuchungen über die Wirkung von Stärkeaufschließungsmitteln*. Die analyt. Ermittlung des Entschlichtungsgrades der verschiedenen im Handel befindlichen Stärkeaufschließungsmittel erfolgte auf Grund von Viscositätsmessungen. Der Einfluß der Fermente ist verschieden u. wird auch von dem der oxydierend wirkenden Mittel ab. Beim Aufschließen mit Aktiv wirken Cu- u. Ni-Salze beschleunigend. Auch zunehmender Zusatz von Na₂CO₃ senkt die Viscosität außerordentlich herab, bewirkt aber zunehmende Gelbfärbung der aufgeschlossenen Stärke. Beim Aufschließen mit Degoma zeigte sich abweichend von anderen Aufschließungsmitteln stets ein weißer Bodensatz von nicht völlig aufgebauten Stärkekörnern. Die J₂-Rkk. der erhaltenen Stärkeabbauprodd. stehen in gewissen Beziehungen zu den gefundenen Zuckermengen. Organ. oxydierende Körper, die auf Stärkekleister verflüssigend wirken, gibt es nur wenige, meist ergeben sie gefärbte Prodd. (Melliands Textilber. 7. 239—42.) SÜVERN.

R. Roestel, *Der Einfluß des Dispersitätsgrades von Farbstoffen in Färbebädern*. Verss. mit direkten, Küpen-, S-, Alizarin-, sauren u. bas. Farbstoffen u. wasserl. Farbstoffbasen auf pflanzlichen u. tier. Fasern u. Kunstseide, leicht u. schwer durchfärbbarem Material, ergaben, daß es für die Erzielung guter Färbungen u. die Ausnutzung der Farbstoffe im Farbbade notwendig ist, daß die Farbstoffe in optimal dispergierter Form vorhanden sind. Die erforderlichen Eigenschaften können den Färbbade durch ein geeignetes Lösungsm. für den Farbstoff oder den verküpten Farbstoff (z. B. Tetracarnit) erteilt werden. (Melliands Textilber. 7. 228—30.) SÜVERN.

Karl Reik, *Färbeapparate für Naphthol AS*. Die Wirkungsweise der App. nach dem Packsystem mit herausnehmbarem, schleuderbarem Materialträger der Firma OBERMAIER & Cie., Neustadt/Haardt u. die Kettbaumschleuder derselben Firma ist beschrieben. (Melliands Textilber. 7. 234—37.) SÜVERN.

H. D. Mudford, *Das Färben naturseidener Strumpfwaren, die Baumwolle enthalten*. Einzelheiten über verschiedene Färbeweisen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 44—46.) SÜVERN.

Robert Maxheimer, *Ein neues Färbereihilfsmittel*. Die vielseitige Anwendbarkeit des Flerhenol M der Firma CARL FLESCHE jr., Frankfurt a. M., ist beschrieben. (Melliands Textilber. 7. 143—44.) SÜVERN.

E. Täuber, *Einiges über Zinkweißunechtheit*. (Vgl. H. WAGNER, Farben-Ztg. 31. 1074.) Zn-Weißunechtheit zeigte sich besonders deutlich bei Eilidoblau, Indigo, Eilido- u. Indischgelb, Pflanzengrün, Sepia u. Cd-Gelb. Aquarellzinkweiß, das bei der Belichtung auch unter aufliegendem Glase die Echtheit bunter Farbstoffe nicht beeinflußt, läßt sich durch Abänderung des Bindemittels aus Gummi arabicum u. Glycerin oder durch Vorbehandeln des Zn-Weiß mit kaulflichem H₂O₂ unter Beibehaltung des üblichen Bindemittels herstellen. Schwierigkeiten bei Ausführung dieser Verff. können wohl überwunden werden. (Farben-Ztg. 31. 1239. Charlottenburg.) SÜVERN.

Paul Kraus, *Neue Farbstoffe und Musterkarten*. Die seit Dezember 1925 im September 1926 erschienenen Musterkarten u. neuen Farbstoffe werden besprochen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 143—46. 196. Dresden.) SÜVERN.

—, *Neue Farbstoffe und Musterkarten*. Musterkarten der Firma LEOPOLD CASSELLA & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M., zeigen walkechte Färbungen auf Wolle u. Haarmelangen, Gewebe aus Baumwolle u. Viscoseseide mit Diamin- u. Diamin-echt-farben gefärbt u. weiß u. bunt geätzt, ferner Hydronfarben für Frottierstoffe u. auf Seide u. Muster aus der Praxis mit Hydronblau pat. Die Firma veröffentlicht

ner Echtheitstabellen der wichtigsten Farbstoffe für Baumwolle, Wolle u. Halble. — Neue Farbstoffe der Farbenfabriken vorm. FRIEDR. BAYER Co., Leverkusen, sind *Benzollichtblau 8GL*, *Benzoekhtkupferblau B* u. *Benzoekhtperviolett B*. Eine Karte zeigt Baumwolldrucke mit *Serikose LC extra* u. *Enodrin*, e weitere Beizen- u. Nuancierungsfarbstoffe auf Stückware u. eine andere Resistf. für Seide. — Eine Musterkarte der Badischen Anilin- & Soda-fabrik, Ludwigshafen a. Rh., veranschaulicht möglichst lichtechte substantive Farbstoffe auf Baumwollstückware. — Lichtechte Farben für Strickgarn zeigt eine Karte der Firma CARL JÄGER, G. m. b. H., Düsseldorf. — Eine reichhaltige Kollektion von Ausfärbungen auf gebleichtem u. ungebleichtem Jutegarn mit bas., Säure-, mil- u. Thiogenfarbstoffen zeigen die Farbwerke vorm. MEISTER LUCIUS BRÜNING, Höchst a. M.; die Firma gab ferner eine erweiterte Auflage ihres Rat-büchers für das Färben von Baumwolle u. anderen Fasern pflanzlichen Ursprungs heraus. — WÜLFING, DAHL & Co. A.-G. brachte eine neue Musterkarte mit 56 verschiedenen Tönen auf Halbwolle, ferner eine Karte mit Teppichgarnen sowie eine Karte diazotierbaren u. nachbehandelten substantiven Farbstoffen auf Baumwoll-n. — Die Gesellschaft für Chemische Industrie, Basel, zeigt auf einer Musterkarte ihre bas. Farbstoffe auf Tannin-Sb-gebeiztem Stück. Ein neuer Kupferfarbstoff der Cibanonreihe ist *Cibanonblau GCD-Teig* u. *GCDN Pulver*, neue Echtfarbstoffe derselben Firma sind *Chromekhtbraun EB* u. *EG. Kitonekhtrot BL*. *GL* der Firma werden als lichtechte, sauer färbende Egalisierfarbstoffe besonders den Stückfärber empfohlen, satte Marineblau sind mit *Echtkhromblau IB* u. *IR* zu erzielen. (Melliands Textilber. 7. 177—78. 244. 259.) SÜVERN.

Ludwig Löschner, *Über die Lichtechtigkeit der Naphtholkombinationen*. Verss. mit verschiedenen Kombinationen u. verschiedenen Nachbehandlungen ergaben ein- deutig, daß die Höhe der Lichtechtigkeit eine reine Funktion der mehr oder weniger intensiven h. Nachbehandlung ist u. unabhängig von freiem Naphthol u. Basenresten ist. (Melliands Textilber. 7. 243—44.) SÜVERN.

Jacob Richter, *Benutzung von Zinkstaub beim Färben mit synthetischem Indigo*. Bei Ansetzen der Zn-Staubküpe, Herst. der Stammlsg., die Mengen von Indigo, $(\text{OH})_2$ u. Zn-Staub, das Färben besonders in tiefen Tönen ist beschrieben. (Chemicals 25. No. 5. 19—20.) SÜVERN.

Joseph Pokorný, *Weiß-Rot auf dunklem Indigo*. Verwendet man als Ätze für mercerisierte, dunkel mit Indigo gefärbte u. mit Naphtholat präparierte Gewebe die Farbe aus MnO_2 , PbCrO_4 u. NaClO_3 , der gegebenenfalls noch diazotiertes p-Nitro-lin zugesetzt ist, so muß man durch den kleinen Mather-Platt gehen, Behandeln mit w. HCl ohne Dämpfen wirkt zu stark. NaClO_3 u. MnO_2 können in der Ätze fehlen. Vorschriften werden mitgeteilt. (Bull. Soc. ind. Mulhouse 91. 759—61. 1925.) SÜ.

Ch. Sunder und **R. Solbach**, *Echte farbige Ätzen auf Indigo*. Zur Erzielung scharfer Ätzen mittels Küpenfarbstoffe wird empfohlen, in zwei Phasen zu arbeiten, zunächst den Indigo mittels Hydrosulfit CL zu reduzieren u. dann den Küpenfarbstoff. Man weiß, daß ZnO die Kondensation von Indigweiß mit der Ammoniumbase günstigst, man kann es durch $\text{Sn}(\text{OH})_2$ ersetzen, dieses wirkt auch noch reduzierend bei der Kondensation. Geht man mit der gedämpften Ware in NaOH -Lsg., so reduziert sich der Küpenfarbstoff u. fixiert sich zugleich. Die Konz. der NaOH -Lsg. muß der Stärke des Tons angepaßt sein. Vorschriften werden mitgeteilt. (Bull. Soc. ind. Mulhouse 91. 755—56. 1925.) SÜVERN.

Wilhelm Sieber, *Über Indanthrendämpfdruckfarben*. Der Ersatz von Na_2CO_3 durch K_2CO_3 in Indanthrendämpfdruckfarben ergab lebhaftere, sattere Farben u. eine sich bleibend sichere Fabrikation. Erhitzt man gut mit Glycerin angeteigte u. verdünnte Stärke auf 120—130°, so erhält man eine klare, gut fließende Verdickung. Wird in sie k. erst NaOH -Lsg. eingerührt, so erhält man nach dem Lösen des erforder-

lichen Hydrosulfits u. von Indanthren- u. anderen Küpenfarbstoffen zusammen mit etwas Glycerin eine homogene gleichmäßig fließende Druckfarbe. Verschiedene Vorschriften werden mitgeteilt. Auch Äthylenglykol gibt mit Stärke eine klare Verdickung, dasselbe Verh. zeigen Gummi arabicum, Dextrin u. gebrannte Stärkesorte. Beim Dämpfen von Indanthrendruckfarben mit Ätzalkalien u. K_2CO_3 gibt auch nicht luftfreier Dampf guten Farbensausfall, feuchter Dampf von in der Zuleitung gleichbleibender Spannung ist erforderlich. (Melliands Textilber. 7. 141—43. Reichberg.)

SÜVERN.

H. Kölln, *Rohlelnöl als Anstrichmittel*. Auf die allgemein übliche Verwendung von rohem Leinöl in Nordwestdeutschland wird hingewiesen. Es ist nicht immer richtig, daß gekochte Firnisse besser sind als auf k. Wege bereitete, sofern nicht junges Öl verwendet ist. Es kommt vor, daß mit Siccativ versetztes rohes Öl bestrocknet als ein aus ihm gekochter Firnis. Die Gefahr der Überladung mit Siccativ durch den Maler liegt vor. (Farben-Ztg. 31. 1297.)

SÜVERN.

Curt Kühn, *Einfluß der Teilchenzahl und der Teilchengröße auf die Deckkraft*. Die Best. der Teilchenzahl von Terra di Siena ist beschrieben. Bei derselben mit angeriebenen Farbe nimmt die Deckkraft proportional der Menge der Teilchen der Volumeinheit zu, gleichgültig, ob die Teilchen der verglichenen Proben fein oder grob sind. Nur die Teilchenzahl, nicht die Korngröße hat Einfluß auf die Deckkraft. (Farben-Ztg. 31. 1131—33. Graz-Göding.)

SÜVERN.

A. K. Light, *Einige chemische und physikalische Kennzeichen von Farben*. Angaben über Farbpigmente, Öle, Binde- u. Trockenmittel, Ölaufnahmefähigkeit der Pigmente, Untersuchungsmethoden. Die New Jersey Zinc Company Research Laboratories haben einen App. zur Messung der Festigkeit von Farbfilmern u. ein Cryptometer zur Best. der Deckfähigkeit von Anstrichen angegeben. (Chemistry and Ind. 45. 101—03. 122—23.)

SÜVERN.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Finder: **Walther Duisberg**, Leverkusen, **Winfried Hentrich** und **Ludwig Ziesendorf-Eigenheim**), *Färben von künstlicher Seide aus Acidylcellulosen, Celluloseäthern oder ihren Umwandlungsprodukten*, dad. gek., daß man an Stelle der Azofarbstoffe aus diazotierten Aminen oder ihren Substitutionsprodd. u. Alkylaralkylanilinsulfosäuren hier Azofarbstoffe aus diazotierten Aminen oder ihren Substitutionsprodd. u. sulfierten oder carboxylierten Alkylaralkylaminen oder ihren Substitutionsprodd. verwendet. Der Farbstoff aus 5-Nitro-2-anisidin u. Benzyl-o-sulfanilsäure färbt Acetatseide gelb, der Farbstoff aus 2,4-Dinitranilin u. 4-Sulfobenzyl-2-toluidin bordeaux, der aus 2,4-Dinitranilin u. Benzylanthranilsäure orangerot. (D. R. P. 423 601 Kl. 8m vom 25/1 1923, Zus. zu D. R. P. 418 940; C. 1926. I. 1044.)

FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Finder: **Georg Rudolph**, Köln-Mülheim), *Herstellung von Effektfäden*. Das Verfahren des D. R. P. 407 834 u. des Zus.-Pat. 422 464 wird auf Seide angewendet. — Man behandelt den entbasteten Seidenstrang 2 Stdn. mit Tannin u. dann 1 Stde. mit Zinnsalz-Formaldehyd; zur Erzielung von Bunteeffekten wird das Seidengarn im Gerbstoffbad gefärbt u. dann mit Zinnsalz-Formaldehyd nachbehandelt u. gespült; das so vorbehandelte Seidengarn wird mit unbehandeltem entbasteten Garn verwebt, dann gefärbt, hierbei nimmt die nicht vorbehandelte Seide den Farbstoff auf, während die vorbehandelte Seide völlig abstößt. (D. R. P. 423 602 Kl. 8m vom 27/3. 1923, ausg. 7/1. 1926, Zus. zu D. R. P. 407 834; C. 1925. I. 1016.)

FRANZ.

Standard Silk Dyeing Co., übert. von: **Joseph Seyer**, Hawthorne, New Jersey. *Färben von Seide*. Man färbt zinnerschwere Seide aus schwach alkal. Natriumphosphat enthaltendem Bade mit direkt ziehenden Farbstoffen. (A. P. 1 565 51 vom 15/3. 1923, ausg. 15/12. 1925.)

FRANZ.

Dip-It Inc., New York, übert. von: **Albert David**, Chicago Heights, Illinois, St. A., *Färbemittel*. Die Fl. oder Paste besteht aus einer Mischung von Seife, einer Farbstofflsg. u. Glycerin, die Mischung wird beim Stehen an der Luft nicht hart. (E. P. 1 569 915 vom 21/5. 1921, ausg. 19/1. 1926.) FRANZ.

British Area Regulators Limited und **Thomas Lindsay**, London, *Entwickeln von Färbungen, Drucken, Ätzen usw. auf Gewebe, Papier usw. durch Dämpfen*. Um eine möglichst gleichmäßige Wrkg. des Dämpfens zu erzielen, wird der Dampf in dem Dämpfraum ständig in Umlauf gehalten; der für die verschiedenen Verf. erforderliche Dampftrockenheitsgehalt des Dampfes wird selbsttätig geregelt; das Verf. kann bei der Färbung von Anilinschwarz, Indigodruck, Ätzen von Färbungen, Fixieren von Albinen usw. angewendet werden. (E. P. 233 030 vom 29/1. 1924, ausg. 28/5. 1925.) FRANZ.

Two-Tone Corporation, übert. von: **P. Mijer**, New York, *Färben von Geweben*. Beim Färben mittels Farbstoffnebel wird die Stärke der Färbung geregelt durch die Färbeschwindigkeit, mit der das Stück durch die Kammer geführt wird, u. durch die Dampftrockenheit des Farbstoffnebels. (E. P. 236 194 vom 9/6. 1925. Auszug veröff. 8. 1925. Prior. 30/6. 1924.) FRANZ.

Ernest Cadgène und **George Dupont**, V. St. A., *Waschen, Bleichen und Färben von Gewebe*. Das Gewebe wird über durchlöchernte Rohre aufgehängt, die über dem Behälter, in dem sich die Behandlungslsg. befindet, angeordnet sind, die Fl. wird durch eine Pumpe in die durchlöchernten Rohre gepumpt, die Fl. dringt hierbei durch die Rohre u. gelangt dann wieder in den darunter befindlichen Behälter, das Gewebe wird ständig um die Rohre bewegt. (F. P. 595 938 vom 30/3. 1925, ausg. 12/10. 1925. Prior. 22/1. 1925.) FRANZ.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: **Gustav Zold** und **Heinrich Rittner**, Offenbach a. M.), *Herstellung von Mischfärbungen auf vegetabilischen Faser*. (D. R. P. 423 229 Kl. 8m vom 26/2. 1924, ausg. 29/12. 1925. Pat. u. D. R. P. 418 943; C. 1926. I. 1043. — C. 1925. II. 857.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen, *Farbstoffe und Färbeverfahren*. Man behandelt substantive oder nicht substantive chromierbare Gruppen enthaltende Farbstoffe mit Chromverb. Der Azofarbstoff aus Diaminostilbendisulfosäure u. Salicylsäure liefert eine Chromverb., die Baumwolle unter Zusatz von Na₂SO₄ oder Cl in echten Tönen färbt; die Chromverb. des Azofarbstoffes aus dem Gemisch der - u. 2,8-Naphthylaminsulfosäure u. Salicylsäure färbt Baumwolle gelb, die Chromverb. des Azofarbstoffes aus m-Aminobenzoyl-p-aminosulfosalicylsäure u. 1,8-Acetylnaphthol-4,6-disulfonsäure färbt rot, die Chromverb. des Triphenylmethanfarbstoffes Chromoxanblau R färbt blau, die Chromverb. der Azofarbstoffe aus Benzidin, 4-Dianisidin u. Diaminodiphenylharnstoff u. Salicylsäure färben goldgelb bis gelblich, die Farbstoffe eignen sich auch zum Färben von Kunstseide, mit Ausnahme der Celluloseacetatseide; die Färbungen zeichnen sich durch große Echtheit aus, die Färbungen können noch mit ZnCl₂, Bleiacetate usw. nachbehandelt werden. Man kann die Färbungen auch durch Färben mit den Farbstoffen in Ggw. von l. Chromsalzen, Fluorid, Acetat, Oxalat, Formiat, erzeugen. (F. P. 599 566 vom 8/5. 1925, ausg. 1. 1926. D. Prior. 30/6. 1924, 24/7. 1924 und 21/1. 1925.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Braune Dis- und Azofarbstoffe zum Färben von Leder*. Man vereinigt die Diazoverb. eines Amins, einer Substitutionsprodd. oder Sulfosäuren mit einem zweimal kuppelnden Phenol u. läßt auf den so erhaltenen Monoazofarbstoff die Diazoverb. einer Amino-naphtholsulfosäure einwirken, erforderlichenfalls läßt man hierauf noch die Diazoverb. eines Amins einwirken. Man kuppelt z. B. diazotierte Sulfanilsäure mit Resorcin u. läßt hierauf die Diazoverb. der 1-Amino-8-naphthol-4-sulfosäure einwirken; der Farb-

stoff färbt Leder gelbbraun. Läßt man auf diesen Farbstoff diazotiertes p-Nitranilin einwirken, so entsteht ein Leder tief gelbbraun färbender Farbstoff, an Stelle der Sulfanilsäure kann man ihre Substitutionsprodd. oder Picraminsäure, an Stelle des Resorcins 1-Naphthol-2,7-Dioxynaphthalin, an Stelle der 1-Amino-8-naphthol-4-sulfosäure die 1-Amino-8-naphthol-3,6- oder -4,6-disulfosäure, 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosäure, 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosäure usw. anwenden. (F. P. 599 511 vom 12/6. 1925, ausg. 14/1. 1926.) FRANZ.

Stein Fur Dyeing Co. Inc., New York, übert. von: **Hyman Stein**, Averte, **William E. Austin**, New York, und **Irving Liebowitz**, Brooklyn, New York, V. St. A., *Bleichen und Färben von Pelzen oder dergl.* Das durch Behandeln mit Sodalg. getötete u. gewaschene Fell wird zum Schutz gegen die schädigende Wrkg. der Bleichmittel mit einer Lsg. von FeSO₄, der man noch NH₄Cl zusetzen kann, getränkt, das so vorbehandelte Fell kann dann mit H₂O₂, Natriumsuperoxyd, -perborat usw. gebleicht werden, ohne daß eine Schädigung des Leders eintritt, nach dem Bleichen wird gefärbt. (A. P. 1 564 378 vom 3/5. 1924, ausg. 8/12. 1925.) FRANZ.

Harold M. Becher, Brooklyn, New York, V. St. A., *Nachahmen von Pelzen.* Das vorbereitete Fell wird mit Hilfe von Schablonen mit den Zeichnungen des nachzunehmenden Pelzes versehen, man färbt zunächst die hellen Töne u. zum Schluß den dunklen Rücken. (A. P. 1 566 066 vom 10/8. 1925, ausg. 15/12. 1925.) FRANZ.

Joseph Blumenfeld, England, *Titanfarbstoffe.* Man führt eine Mischung von TiO₂ mit kolloidalen Stoffen (kolloidale Oxyde oder Hydroxyde der seltenen Erden Th, Zr, Ti, SiO₂, Porzellanerde, Kaolin) in saurer Atm. herbei. (F. P. 602 053 vom 11/8. 1925, ausg. 12/3. 1926. D. Prior. 11/8. 1924.) KAUSCH.

Joseph Blumenfeld, England, *Titanfarbstoffe.* Man mischt TiO₂ mit einer feuchten Substanz (Oxyd, Hydroxyd des Th o. dgl.) u. erhitzt das Gemisch auf Rotglut. (F. P. 602 054 vom 11/8. 1925, ausg. 12/3. 1926. D. Prior. 11/8. 1924.) KAUSCH.

Coty (Société Anonyme), Seine, Frankreich, *Extraktion des Farbstoffes aus den Hennablättern.* Die fein pulverisierten Hennablätter werden mit einer alkal. Erdalkalisalzlsg. bei höchstens 60° extrahiert, die Extraktionsfl. wird mit HCl angesäuert, filtriert u. das Filtrat mit einem mit W. nicht mischbaren flüchtigen Lösungsm., Trichloräthylen, extrahiert; dieser Extrakt wird mit einer wss. Lsg. eines alkal. Erdalkalisalzes ausgelaugt u. die erhaltene Lsg. nach dem Dekantieren zur Fällung des Farbstoffes mit Säuren, HCl, angesäuert. (F. P. 596 133 vom 2/7. 1924, ausg. 16/10. 1925.) FRANZ.

Coty (Société Anonyme), Seine, Frankreich, *Extraktion des Farbstoffes aus Hennablättern.* Die fein gepulverten Hennablätter werden mit verd. Salzsäure extrahiert, die erhaltene Extraktionsfl. mit Trichloräthylen ausgeschüttelt u. die erhaltene Lsg. durch Extrahieren mit alkal. Erdalkalisalzlsg. u. darauffolgendes Ansäuern auf den Farbstoff verarbeitet. (F. P. 596 134 vom 2/7. 1924, ausg. 16/10. 1925.) FRANZ.

Coty (Société Anonyme), Seine, Frankreich, *Extraktion des Farbstoffes aus den Hennablättern.* Die fein pulverisierten Hennablätter werden mit 60° w. W. ausgelaugt, die erhaltene Fl. wird durch ein Erdalkalisalz schwach alkal. gemacht, angesäuert, filtriert, mit einem flüchtigen, in W. unl. Lösungsm. extrahiert; nach dem Auslaugen mit alkal. Erdalkalisalzlsg. wird der Farbstoff durch Ansäuern gefällt. (F. P. 596 135 vom 2/7. 1924, ausg. 16/10. 1925.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. (Erfinder: **Georg Kränzlein** und **Robert Sedlmayr**), *Darstellung von Kondensationsprodukten der Anthrachinonreihe*, darin bestehend, daß man die Kondensation von Benzanthron oder seinen Substitutionsprodd. mit aromat. Säurechloriden unter Zufuhr von Luft oder O₂ vornimmt u. das erhaltene Rohprod. gegebenenfalls mit Hypochloriten oder anderen Oxydationsmitteln behandelt. Es wird hierdurch die Ausbeute erhöht


D. R. P. 423 720 Kl. 22 b vom 31/1. 1924, ausg. 8/1. 1926. **Zus. zu D. R. P. 412053;**
P. 1925. I. 2663.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: **Filip Kačer**, Mannheim), *Darstellung von Küpenfarbstoffen der Anthrachinonreihe*, nach D. R. P. 384 674, dad. gek., daß man an Stelle von 1-Mercapto-2-aminoanthrachinon hier -Halogen-2-aminoanthrachinon oder dessen Derivv. verwendet u. die zunächst entstehenden Prodd. mit Schwefel abgebenden Substanzen in Ggw. oder Abwesenheit von Kondensationsmitteln behandelt; statt der Halogenide von aromat. Dicarbonsäuren kann man hier die Halogenide der Dicarbonsäuren der Fettreihe oder ihre Derivv. verwenden. — Das Einwirkungsprod. von 1 Mol. *Terephthaloylchlorid* auf 1 Mol. *1-Chloraminoanthrachinon* gibt, beim Erhitzen mit Schwefel u. Schwefelnatrium 1 verd. A. auf 180—200° einen Farbstoff, der ident. ist mit dem aus 1-Mercaptoaminoanthrachinon u. Terephthaloylchlorid erhaltenen Farbstoff. Ähnliche Farbstoffe erhält man aus dem Einwirkungsprod. aus *Oxalylchlorid* u. *1-Chlor-2-aminoanthrachinon*. (**D. R. P. 424 030** Kl. 22 b vom 12/5. 1923, ausg. 21/1. 1926. **Zus. zu D. R. P. 384 674; C. 1924. I. 1449.)** FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Kondensationsprodukte der Anthrachinonreihe*. (**D. R. P. 424 882** Kl. 22 b vom 7/10. 1924, ausg. 12. 1926. Schwz. Prior. 26/10. 1923. **Zus. zu D. R. P. 390201; C. 1924. I. 1013.** — **P. 1925. I. 1657.)** FRANZ.


Grasselli Dyestuff Corp., New York, übert. von: **Walter Mieg**, Vohwinkel, und **Heinrich Raeder**, Leverkusen b. Köln a. Rh., *Oxydianthrachinonylaminosulfonfarbstoffe*. Man behandelt Dianthrachinonylamine mit oxydierend u. sulfoferend wirkenden Mitteln, wie Oleum. *1,1'-Dianthrachinonylamin* gibt beim Erhitzen mit 20%ig. Oleum auf 120—125° einen Farbstoff, braunrote Krystalle, der Wolle aus saurem Bade in echten braunvioletten Tönen färbt, die durch Nachchromieren nicht verändert werden; beim Erhitzen des Farbstoffes mit 95%ig. H₂SO₄ auf 140° werden die Sulfogruppen unter B. des *1,1'-Dianthrachinonyloxazins* abgespalten. Der Farbstoff aus *1,2'-Dianthrachinonylamin* beim Erwärmen mit 20%ig. Oleum färbt Wolle in saurem Bade in rötlich violetten Tönen, die beim Nachchromieren blauschwarz werden. (**A. P. 1 564 091** vom 17/8. 1925, ausg. 1/12. 1925.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, übert. von: **Bertram Mayer** und **Wilhelm Moser**, Basel, Schweiz, *Indigoide Farbstoffe der Anthrachinonreihe*. Man behandelt das Kondensationsprod. aus 2-Chloranthrachinon-3-carbonsäure u. Glycin mit ringschließenden Mitteln u. läßt auf das Indoxylderiv. oxydierend wirkende Mittel oder Isatine der Benzol-, Naphthalin oder Anthrachinonreihe, Acenaphthenchinon usw. einwirken. *Anthrachinon-2-glycin-3-carbonsäure*, erhalten aus 2-Chloranthrachinon-3-carbonsäure, Glycin, MgO, Cu-Pulver u. W. beim Erhitzen auf 120 bis 130°, orange Pulver, swl. in Nitrobenzol oder Xylidin, gibt beim Erhitzen mit Essigsäureanhydrid u. wasserfreiem Na-Acetat *Diacetyl-2,3-anthrachinonindoxyl*, bräunlich gelbe Krystalle, l. in Nitrobenzol; beim Kochen mit 5%ig. NaOH u. Durchleiten von Luft erhält man den symmetr. *2,3-Indigo der Anthrachinonreihe (I)*, er färbt Baum-



Wolle aus der Küpe in blaugrünen, waschechten Tönen. Beim Kochen der Diacetyl-*farb.* mit Isatin, Monohydrat u. Eg. entsteht ein Farbstoff, der Baumwolle in blauen Tönen färbt; mit Acenaphthenchinon entsteht ein rotstichigblau färbender Farbstoff. Die Farbstoffe können nachträglich halogeniert werden. (**A. P. 1 567 158** vom 18/11. 1924, ausg. 29/12 1925.) FRANZ.

The Chemical Foundation, Inc., New York, übert. von: **Asa Willard Joyce**, Newark, New Jersey, V. St. A., *Thioindigofarbstoffe*. Man kondensiert 2-Derivv. des 4-Methyl-6-chlor-3-oxythionaphthen mit einem Alkoxy- oder Alkoxyhalogen-substitutionsprod. des 3-Oxythionaphthens; die Farbstoffe können weiter halogeniert werden, sie färben die pflanzliche u. tier. Faser aus der Hydrosulfitküpe in orangefarbenen bis blauen Tönen an. Durch Kondensation von 4-Methyl-6-chlor-2,3-diketodihydro-1-thionaphthen-2-oxim mit 4-Brom-6-äthoxy-3-oxy-1-thionaphthen in Eg. erhält



man einen Baumwolle aus der Küpe in lebhaften orangefarbenen, licht-, chlor- u. waschechten Tönen färbenden Farbstoff, den gleichen Farbstoff erhält man auch durch Kondensation von *p*-Dimethylamino-6-äthoxy-2,3-diketodihydro-1-thionaphthen-2-anil mit 4-Methyl-6-chlor-3-oxy-1-thionaphthen; ähnliche Farbstoffe erhält man aus 4-Methyl-6-chlor-2,3-diketodihydro-1-thionaphthen-2-oxim u. 5-Methyl-6-chlor-2-dibrom-2,3-diketodihydro-1-thionaphthen, 4-Brom-6-äthoxy-3-oxy-1-thionaphthen u. 4-Methoxy-3-oxy-1-thionaphthen. (A. P. 1 568 458 vom 28/1. 1925, ausg. 5/1. 1926.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: **Pau Nawiaskey** und **Emil Krauch**), *Darstellung von grauen bis schwarzen Küpenfarbstoffen* darin bestehend, daß man die Schwefelung der Nitrierungsprodd. des Dibenzanthron in Ggw. von Lösungs- oder Suspensionsmitteln vornimmt. — Die Farbstoffe stimmen mit denen des Hauptpatents überein. (D. R. P. 423 878 Kl. 22 d vom 29/6. 192; ausg. 13/1. 1926. Zus. zu D. R. P. 411 693; C. 1925. II. 352.) FRANZ.

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: **Maximilian Schmidt** und **Wilhelm Neugebauer**), *Darstellung von Küpenfarbstoffen* nach D. R. P. 412 121; dad. gek., daß man hier Chlor-, Brom- oder Nitrosubstitutionsprodd. von Ketoperylenfarbstoffen mit Verbb. mit austauschbaren H-Atomen umsetzt. — *Chlordibenzanthron* gibt beim Erhitzen mit Phenol u. Ätzkali einen Farbstoff, der Baumwolle aus der Küpe in grünlichblauen Tönen anfärbt; *Chlorisodibenzanthron* liefert mit Phenol u. Ätzkali einen rötlichblau färbenden Küpenfarbstoff; mit *p*-Toluidin gibt Chlordibenzanthron einen blau, mit *Nitrodibenzanthron* einen grauschwarz färbenden Küpenfarbstoff. (D. R. P. 424 881 Kl. 22 b vom 19/9. 1923, ausg. 6/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 412 122; C. 1925. I. 2666.) FRANZ.

Marcel Bader, Charles Sunder, Mulhouse, Ht. Rhin, Frankreich, und **Durand & Huguenin A.-G.**, Basel, Schweiz, *Darstellung von festen, beständigen, wasserlöslichen Abkömmlingen von Küpenfarbstoffen*. (D. R. P. 424 981 Kl. 8 m vom 4/10. 192; ausg. 11/2. 1926. — C. 1923. II. 577.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Herstellung von indigoiden Farbstoffen und deren Zwischenprodukten*. (D. R. P. 425 352 Kl. 22 vom 18/1. 1924, ausg. 17/2. 1926. Schwz. Prior. 24/1. 1923. — C. 1924. II. 1027.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Küpenfarbstoffe der Naphthanthrachinonreihe*. Man erhitzt *Naphthanthrachinon* oder seine Derivv. mit wasserfreiem AlCl₃ auf Temp. unterhalb 250° in Abwesenheit oder in Ggw. von wasserfreien Halogenverbb. anderer Metalle, wie NaCl, FeCl₃, bei Anwendung von Lösungsm., wie Phthalsäureanhydrid, geht die Farbstoffbildung schon bei 170° vor sich. Die Farbstoffe färben Baumwolle aus der Küpe in sehr echten blauen bis violetten Tönen an. Der Farbstoff aus *Chlornaphthanthrachinon*, erhältlich durch Kondensation von β -Chlorphthalsäure mit Naphthalin, färbt Baumwolle violettblau. (F. P. 599 038 vom 30/5. 1925, ausg. 31/12. 1925. D. Priorr. 4/7. u. 17/12. 1924.) FRANZ.

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, *Darstellung von beizenziehenden Farbstoffen.* (D. R. P. 423 610 Kl. 22 e vom 4/3. 1924, ausg. 7/1. 1926. A. Prior. 7/5. 1923. Zus. zu D. R. P. 402 643; C. 1924. II. 2559. — C. 1925. I. 1021.) FR.

Eastman Kodak Co., übert. von: **Gurney O. Gutekunst**, Rochester, New York, 7. St. A., *Carbocyaninfarbstoffe.* Man läßt auf β -Naphthochinaldinalkylhalide starke Basen in Ggw. eines geeigneten Kondensationsmittels einwirken; man behandelt B. eine Lsg. von β -Naphthochinaldinäthojodid in sd. A. mit einem Gemisch einer lkh. Lsg. von KOH u. Jodoform, es scheiden sich grüne Nadeln ab, die aus A. oder H_2O umkrystallisiert werden können; an Stelle des Jodoform kann man andere trihalogenmethane oder CH_2O verwenden, die Farbstoffe sensibilisieren die photograph. Emulsion für rote u. infrarote Strahlen (Wellenlänge 700 μm bis 740 μm . (A. P. 568 667 vom 29/9. 1921, ausg. 5/1. 1926.) FRANZ.

Léonard Erzinger, Frankreich, *Rostschutzanstrich.* Man verwendet einen Pigment-) Farbstoff, dessen Körner in einen Mantel aus Pb, PbO oder PbO_2 eingehüllt sind. (F. P. 601 183 vom 23/10. 1924, ausg. 24/2. 1926.) KAUSCH.

Léon Bernardon, Frankreich, *Weißer Anstrichmasse*, bestehend aus einem Gemisch von CaSO_4 , ZnO, TiO_2 , Leinöl u. etwas Ultramarin. (F. P. 601 609 vom 4/11. 1924, ausg. 5/3. 1926.) KAUSCH.

Otto L. Fluegel, Birmingham, Michigan, *Anstrichentfernungsmittel*, bestehend aus 1 Pfund KOH, $\frac{1}{2}$ Pfund Na_3PO_4 , $\frac{1}{2}$ Pfund Oxalsäure, 1 Pfund $\text{Ca}(\text{OH})_2$, 3 Unzen Stärke u. etwa 1 Gallone W. (A. P. 1 570 957 vom 24/1. 1925, ausg. 26/1. 1926.) KA.

Proofing Laboratories, Inc., New York, übert. von: **Guido Blenio**, New York, *Lack- und Anstrichentfernungsmittel*, bestehend aus Lack- u. Antriehlösungsmmm., von denen eines Mirbanöl ist u. gel. Kautschuk, wobei das Mirbanöl 10—15% beträgt. (A. P. 1 573 537 vom 23/4. 1920, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

XI. Harze; Lacke; Firnis.

Edmund Knecht und **Norman B. Maurice**, *Die unverseifbaren Bestandteile von Handelsharzen, mit Angaben über Harzöl und die Polymerisation von Terpentin.* Aus den unverseifbaren Teilen untersuchter Handelsharze wurden isoliert: a) *Pinen*, ein KW-stoff, Kp. 270—278°, von der Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{32}$, c) ein KW-stoff, Kp. 315 bis 320° von der Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{32}$, d) ein KW-stoff, Kp. 335—340°, von der Formel $\text{C}_{18}\text{H}_{30}$, identisch mit Colophen, dem aus Abietinsäure $\text{C}_{19}\text{H}_{29}\text{COOH}$ erhaltenen KW-stoff, e) ein KW-stoff, Kp. 360—370°, von der Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{32}$. Ester oder O-haltige Verbb. wurden nicht gefunden. In dem Harz, das von dem Baume kommt, ist viel mehr Terpentin enthalten als im Handelsharz, Colophen ist dort nicht vorhanden. Nur im Yaryanharz, welches bei der Herst. einer drastischeren Dest. unterworfen wird, wurde der KW-stoff $\text{C}_{20}\text{H}_{32}$, Kp. 360—370°, gefunden. Die erwähnten drei KW-stoffe sind identisch mit Diterpenen desselben Kp., die durch Polymerisieren von Terpentin durch Hitze erhalten wurden. Terpentin, das unter Druck 24 Stdn. auf 295° erhitzt wird, gibt Dipenten, ein Diterpen Kp. 268—275°, ein Diterpen Kp. 315—320° u. ein Diterpen Kp. 360—368°. Behandelt man Terpentin bei 0° mit 5%ig. H_2SO_4 , so wird es polymerisiert u. gibt Dipenten, ein Diterpen Kp. 268—275° u. ein Diterpen Kp. 315—320°. Diese zwei Diterpene waren ident. mit denen, die durch Polymerisieren durch Hitze erhalten wurden. Das chem. Verhalten der drei Diterpene ist beschrieben, ein Vergleich mit den Harzen aus Kohle wird angestellt. Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 356—61. 1925. Manchester.) SÜVERN.

Charles Coffignier, *Bleiresinate.* (Rev. gén. des Colloides 4. 1—8. — C. 1926. 248.) LASCH.

Joh. Scheiber, *Über natürliche und künstliche Harze.* Besprechung der Literatur über die natürlichen Harze u. Angaben über die durch Polymerisation oder Kon-

densation erhaltenen Kunstharze, Cumaronharz, Phenol-Aldehydharze, Harns kondensationsprodd. (Farbe u. Lack 1926. 76—78. 87—89. 99—101. 113—14.)

Hans Wolff, *Zur Normung der Trockenstoffe*. Die Art der Bindung des Me in den Trocknern, z. B. die Art der sauren Komponente, ist nicht belanglos, so was Trockenzeit wie Trocknungsart betrifft. Die Verschiedenheit, durch Art Bindung hervorgerufen, kommt aber nicht unter allen atmosphär. Bedingungen Ausdruck. Bei verschiedenen Bedingungen ergeben sich deutliche Verschiebung in der Trockenbeschleunigung. Firnisse mit gleicher Trockenfähigkeit u. -art können sich sehr verschieden erweisen, wenn sie als Bindemittel in Ölfarben zur Anwendung gelangen. Es wäre verfrüht, die Zahl der Trockner willkürlich zu beschränken. In genau definierten Trocknern würde es genügen, einen bestimmten Mindestgehalt Metall aufzustellen, was bei Trocknerlsgg. nicht empfehlenswert ist. (Farben- 31. 1133—34. Berlin.) SÜVER.

—, *Verschiedene Fällungsvorschriften und Ausbeuten aus der Praxis*. L. fällungen für verschiedene Zwecke sind beschrieben. (Farbe u. Lack 1926. 102—111—12.) SÜVER.

—, *Verschiedene Emaillacke*. Angaben über Öl- u. Spritlacke, die verwendet Harze u. Farben. (Farbe u. Lack 1926. 79—80.) SÜVER.

E. O. Rasser, *Rostschutzanstriche — Eisenlack — Asphaltlack*. Verschiede Rostschutzanstriche, Fe-Lacke u. Asphaltlacke werden beschrieben. (Kunststoffe 49—53.) SÜVER.

A. L. Abonyi, *Gehaltsbestimmung von Bakelitlösungen*. Bakelit „A“-Harz kondensiert sich bei längerem Erhitzen auf 100°. Zur Best. des Gehalts von Bakelit darf nicht bis zur Gewichtskonstanz getrocknet werden, vielmehr muß das Trock nach 1½ Stdn. unterbrochen werden. Am einfachsten ermittelt man den Gehalt Lsgg. aus der D. Eine Tabelle ist beigelegt. (Kunststoffe 16. 30—31.) SÜVER.

Ellis-Foster Co., übert. von: **Carleton Ellis**, Montclair, New Jersey, V. St. *Härten von Cumaronharzen*. Rohe Sulfosäuren aromat. KW-stoffe enthalten Cumaronharze werden mit bas. Verbb., wie NaOH, Ca(OH)₂, MgO, ZnO, verschmolzen — Z. B. wird rohes Cumaronharz, F. 75°, mit 5% Ca(OH)₂ auf 200° erhitzt, wodurch der F. auf 98° erhöht wird. Erhitzt man nur auf 170°, so schm. das Endprod. 88—89°. Die gehärteten Harze sind in Bzl., Toluol, Solventnaphtha l. Ihre Lsg. finden zur Herst. von Lacken u. Firnissen Verwendung. Sie können auch mit ro oder gekochtem Leinöl, chines. Holzöl oder Terpentinöl gemischt werden oder mit anderen Harzen, wie Kopal, zu Anstrichzwecken Verwendung finden. (A. P. 1 570 8 vom 12/11. 1917, ausg. 19/1. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Güstrow Dr. Hillringhaus & Dr. Heilmann, Güstrow i. *Darstellung von Kondensationsprodukten aus Phenolen oder Phenolderivaten und aldehyd*, 1. dad. gek., daß man durch Einw. von C₂H₂ auf Phenol oder Phenolder in Ggw. von Hg-Salzlsgg. die B. des CH₃CHO mit derjenigen der Phenolacetaldehyd kondensationsprodd. verbindet. — 2. darin bestehend, daß man in ein Gemisch aus einem Phenol, einem Hg-Salz u. einer starken Säure C₂H₂ einleitet. — 3. darin bestehend, daß man das C₂H₂ in ein aus einer Phenolsulfosäure u. Hg-Salz bestehendes Gemisch einleitet. — Man löst z. B. HgO in 30%ig. H₂SO₄, setzt Rohphenol oder Kopal zu u. leitet unter kräftigem Rühren C₂H₂ ein. Nach Beendigung der Absorption wird das zähfl. Reaktionsprod. von der wss. Lsg. getrennt, gewaschen u. die überschüssigen Phenole mit Wasserdampf abgetrieben. Das Hg ganz oder zum Teil, wahrscheinlich organ. gebunden enthaltende harzartige Kondensationsprod. kann durch Umkochen aus A. oder Bzl. vom Hg befreit werden. Es ist hell gefärbt, auch in dicker Schicht durchsichtig, schm. bei 100° unter vorhergehender Erweichung u. ist in A., Ä., Acetylen, tetrachlorid, Chlf. u. Leinöl ll., in Bzl. u. Terpentinöl in der Hitze l., in Bzn., Petrol-

Cl₄ nahezu unl., in NaOH u. KOH l., in Alkalicarbonaten unl. u. wird aus der alkal. Lsg. durch Säuren wieder gefällt. An Stelle von H₂SO₄ lassen sich andere Säuren, wie HCl, HF, H₃PO₄ oder CH₃CO₂H, anwenden, an Stelle von Phenolen auch deren Deriv., wie die Sulfosäuren. Bei der Einw. von C₂H₂ auf Phenolsulfosäure ist ein Zusatz anorgan. Säuren unnötig bzw. schädlich. Bei Verwendung von Phenolsulfosäure allein entstehen in W. ll. Kondensationsprodd., bei derjenigen eines Gemisches von Phenol u. Phenolsulfosäure auch die in W. unl. Harze. — Z. B. wird *Phenol* mit konz. H₂SO₄ auf 100—110° längere Zeit erhitzt, ein Teil des Sulfosäuregemisches mit verd. u. darin HgO gel., die Hauptmenge der *Phenolsulfosäure* mit der Hg-Salzlsg. gereinigt u. unter kräftigem Rühren C₂H₂ eingeleitet. Nach beendeter Absorption wird von der ausgeschiedenen Hg-Verb. u. Verunreinigungen abfiltriert u. durch Neutralisieren mit Na₂CO₃ das Na-Salz der *kondensierten Sulfosäure* dargestellt. Das in W. l., FeCl₃ blaviolett färbende Prod. hat gerbende Eigenschaften. Will man es vollständig vom Katalysator befreien, so leitet man in die verd. wss. Lsg. H₂S u. filtriert den HgS-Nd. ab. Die Prodd. finden als *Ersatz für natürliche Harze* bzw. als *Gerbmittel* Verwendung. (Hierzu vgl. auch Melamid, E. P. 163679; C. 1921. IV. 838 u. E. P. 527112; C. 1922. II. 660.) (D. R. P. 422 904 Kl. 12q vom 21/2. 1914, ausg. 1/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Grigori Petrow, Moskau, *Herstellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd*, dad. gek., daß man die Kondensation bei Ggw. saurer Katalysatoren u. Essigestern des Glycerins, der Cellulose oder ähnlicher mehrwertiger Alkohole bewirkt. — Z. B. wird *Kresol* mit *Diacetin*, 40%ig. CH₂O u. 30%ig. HCl im Sieden erhitzt, das W. von der teerartigen M. abgeschieden u. unter weiterem Erhitzen W. u. CH₃CO₂H abgetrieben. Nach dem Abkühlen setzt man 1% Benzolsulfosäure u. 30 Teile CH₂O-Lsg. hinzu, gießt die M. in Formen u. erhitzt, worauf sie der Form erhärtet. — In analoger Weise erhält man *harzartige Kondensationsprodd.* aus *Phenol*, *Triacetin*, Naphthasulfosäure bzw. H₃PO₄ u. 40%ig. CH₂O, — aus *Phenol*, *Kresol*, sulfoniertem Ricinusöl bzw. Benzolsulfosäure, *Diacetin*, 37%ig. HCl u. 40%ig. CH₂O, — sowie aus *techn. Kresol*, einer 20%ig. Lsg. von *Acetylcellulose* in Aceton, Benzolsulfosäure u. 40%ig. wss. CH₂O-Lsg. Zur Herst. von *Lacken* werden die fl. Kondensationsprodd., nach weiterer Zugabe von CH₂O-Lsg. u. eines sauren Katalysators, mit Alkoholen oder Aceton vermischt. Die auf Gegenstände aufgetragenen Lacke erhärten beim Erwärmen auf 50—70°. Die weiß bis gelb gefärbten *Harze* lassen sich gut verarbeiten, nehmen beim Eingießen in Formen, da sie noch genügend dünnfl. sind, große Mengen Füllstoffe auf u. können im Anfang des Erhärtungsvorganges leicht gepreßt werden. (D. R. P. 424 951 Kl. 12q vom 23/7. 1921, ausg. 10/2. 1926. Aust. P. 23 vom 24/8. 1922, ausg. 28/8. 1923. E. P. 203 124 vom 7/7. 1922, ausg. 27/9. 1923. F. P. 553 756 vom 7/7. 1922, ausg. 30/5. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Darstellung von Derivaten der schwefelhaltigen Kondensationsprodukte von Phenolen*, darin bestehend, daß man in Abänderung des D. R. P. 418498 Phenole oder Naphthole, gegebenenfalls in Ggw. von W., wss. Alkalien oder anderen Lösungs- u. Verdünnungsmitteln, gleichzeitig mit S-Halogeniden u. Acylierungsmitteln oder mit Gemischen dieser behandelt. — Es entstehen so dieselben S-haltigen Esterharze wie nach dem D. R. P. des Hauptpatents. Beispiele sind angegeben für die Herst. S-haltiger Esterharze: *Phenol*, CH₃COCl bzw. *Essigsäureanhydrid* u. S₂Cl₂, — *Phenol*, *Benzoylchlorid* u. S₂Cl₂, — *Triakresol*, CH₃COCl u. S₂Cl₂, — Gemisch von *Phenol* u. *Triakresol*, CH₃COCl u. S₂Cl₂, — *Resorcin*, *Essigsäureanhydrid* u. S₂Cl₂, — *Phenol* + *Kresol*, *Benzoylchlorid* u. S₂Cl₂, — *Triakresol*, *Benzoylchlorid* u. S₂Cl₂, — *Resorcin*, *Benzoylchlorid* u. S₂Cl₂, — *Vaphthol*, *Essigsäureanhydrid* u. S₂Cl₂, sowie α -Naphthol, *Benzoylchlorid* u. S₂Cl₂. Nach beendeter HCl-Entw. werden die letzten Reste der Säure u. sonstige flüchtige Stoffe im Vakuum entfernt, oder man wäscht die Harze mit W. bis zur neutralen

Rk. aus. Bei Verwendung größerer Mengen S_2Cl_2 werden härtere Harze erhalten. (D. R. P. 425 798 Kl. 12q vom 7/8. 1924, ausg. 26/2. 1926. Schwz. Prior. 31/10. 1923. Zus. zu D. R. P. 418 498; C. 1926. I. 251. Schwz. PP. 109 068 vom 31/10. 1923, ausg. 16/2. 1925. 109 651, 109 652, 109 653, 109 654, 109 655, 109 656, 109 657 vom 31/10. 1923, ausg. 1/4. 1925. Zus. zu Schwz. P. 103 432; C. 1924. II. 1280.) SCHOTTL.

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, übert. von: **Carnie B. Carter**, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd*. Phenole werden mit einer Lsg. von $C_6H_{12}N_4$ u. NH_4Cl entstanden durch Einw. von NH_3 auf CH_2Cl_2 , erhitzt. — Wesentlich für die B. l., schmelzbarer Harze ist, daß gegenüber dem $C_6H_{12}N_4$ eine größere als die molekulare Menge eines Phenols zur Anwendung gelangt. Z. B. wird *Phenol* (9 Moll.) mit einer wss. Lsg. von $C_6H_{12}N_4$ (1 Mol.) u. NH_4Cl 1 Stde. unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die viscose, harzige M. mit W. ausgewaschen u. durchknetet. Das NH_4Cl enthaltende Waschwasser wird mit $Ca(OH)_2$ behandelt, das NH_3 -Gas in W. geleitet u. zur B. von $C_6H_{12}N_4$ wieder verwendet. Hierauf wird das Harz zur Entfernung von freiem Phenol u. W. dest. Es kann in geeigneten Lösungsmm. gel. als *Firnis* Verwendung finden u. geht bei der Einw. weiterer Mengen CH_2O oder $C_6H_{12}N_4$ in unl. u. nicht schm. MM. über. (A. P. 1 566 823 vom 26/7. 1924, ausg. 22/12 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Carleton Ellis, Montclair, übert. von: **Trevor S. Huxham**, Bloomfield, New Jersey. *Plastische Massen aus Kunstharzen*. Kunstharze, die leicht kleben, wie die Kondensationsprodd. aus Furfurol u. Phenol, werden mit unl. Metallseifen vermischt die so erhaltenen Mischungen kleben nicht mehr in den Formen. Ein Kunstharz, das z. B. durch 3-std. Erhitzen von 10 Teilen Phenol, 7,5 Teilen Furfurol und 1 Teil K_2CO_3 aus 145—155° erhalten werden kann, wird mit A., Hexamethylenetetramin, Stearinsäure, Nigrosin u. Holzmehl vermischt; nach dem Trocknen u. Mahlen der Mischung vermischt man mit Zinkstearat oder Aluminiumpalmitat. (A. P. 1 571 447 vom 2/10. 1922, ausg. 2/2. 1926.) FRANZ.

Adolf Bamberger, Bamberg, *Vorbereiten von Gegenständen für die Endlackierung* dad. gek., daß die als Grundlage für die äußere Lackschicht dienende Grundierschicht in geschmolzenem Zustande auf den zu lackierenden Gegenstand aufgetragen wird (D. R. P. 425 203 Kl. 75c vom 20/5. 1924, ausg. 10/2. 1926.) KAUSCH.

Standard Varnish Works, New York, übert. von: **Reme A. Beausejour**, Port Richmond, N. Y., *Anwendung von Celluloseesterlacken*. Man taucht die zu lackierenden Gegenstände in eine Fl. (z. B. $NaCl$ -Lsg.), die eine größere Dichte als die Lacke hat sich nicht mit ihnen mischt u. auf deren Oberfläche eine dünne Lackschicht schwimmt (A. P. 1 572 461 vom 19/8. 1925, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

Hans Wolff, *Zum Trockenprozeß der „trocknenden Öle“*. Leinölfirnisanstrich trockneten, wenn auch langsam, in einer Atmosphäre, die so wenig O_2 enthält, daß er noch nicht einmal zum zehnten Teile die durchschnittliche O_2 -Zahl erreichen konnte. Trocknen in CO_2 oder SO_2 war nur bei starker Lichtwrkg. zu beobachten. Leinölfirnis trocknet nicht durch Oxydation, sondern durch kolloidale Vorgänge, bei denen die Oxydationsvorgänge höchstens eine anregende Rolle spielen. Bei normaler Trocknen haben wir eine zeitliche Koincidenz von Oxydations- u. Kolloidrkk. vor uns, die verleitet hat, diese beiden Prozesse in unbedingt ursächliche Verb. miteinander zu bringen. (Farben-Ztg. 31. 1239—40. Berlin.) SÜVERN.

L. Auer, *Der Trockenvorgang fetter Öle*. Vorl. Mitt. Die Autoxydationsform der Oxydationstheorie wurde als unrichtig erwiesen, wobei die Möglichkeit noch offer gelassen wurde, daß nach dem eigentlichen Trockenvorgang der atmosphär. O_2 eben spaltend oder oxydierend wirken kann. Das Steigen der Verseifungszahlen verläuf

fast parallel dem Steigen der Säurezahlen, so daß eine stufenweise Verseifung während des Trockenvorgangs kaum eine Rolle spielt. Verss. mit frischen Ölanstrichen in gut dichtenden Glasseccatoren über CaCl_2 oder in CO_2 oder Vakuum ergaben nach einigen Tagen trockne Ölfilme, die eine beträchtliche Gewichtszunahme aufwiesen. Die während der Versuchsdauer gut dichtenden Exsiccatoren zeigten eine Innen- drucksteigerung durch Mengen von abgegebenem Gas, die auf keinen Fall von Spalt- prodd. herrühren können, welche man bisher allgemein beim Trockenvorgang annahm. Trotz dieser Stoffabgabe zeigten die Anstriche sofort nach Herausnehmen aus den Exsiccatoren so hohe Gewichtszunahmen, wie wenn sie an der Luft getrocknet wären. Eine Gaskoagulationstheorie des Trockenvorgangs wird entwickelt. Der Trocken- vorgang findet immer statt, wenn der Schwellenwert der Gaskonz. nicht unterschritten wird. Er liegt zwischen der Gaskonz. der Luftverdünnung von 1 mm u. der von 10^{-6} mm. (Farben-Ztg. 31. 1240—41. Budapest.) SÜVERN.

Continentale Aktiengesellschaft für Chemie und Reichsverkehrsbank e. G. n. b. H., Berlin, *Apparat zur Destillation von Ölen und Fetten* in einem Arbeitsgang, lad. gek., daß von drei miteinander gekuppelten, heizbaren Vakuumkesseln der erste u. der zweite zur Dest. in Ggw. von überhitztem Wasserdampf, u. der dritte zum Absaugen des Destillationsprod. aus dem zweiten Kessel u. gleichzeitig zum Kühlen des Prod. auf n., eine Oxydation ausschließende Temp. dient, u. daß ein mit diesen Vakuumkesseln verbundener Kataraktkondensator mit Luftpumpe die Entfernung der leichtflüchtigen Bestandteile aus den Vakuumkesseln besorgt. — Die B. von Emulsionen u. das Nachdunkeln der Destillate wird vermieden. (D. R. P. 426 233 Kl. 23d vom 12/12. 1924, ausg. 6/3. 1926.) OELKER.

Eugène Foray, Frankreich (Alpes-Maritimes), *Entsäuern, Desodorieren und Klären von Ölen, Fetten und Wachsen*. Man vermischt die Öle oder verflüssigten Fette u. Wachse mit pulverisierter, poröser Kohle, z. B. Holzkohle, erhitzt die Mischung auf $100\text{--}150^\circ$ und filtriert danach die Kohle wieder ab. — Die Kohle kann evtl. mit einem Katalysator (1%) versetzt werden. (F. P. 600 948 vom 20/7. 1925, ausg. 8/2. 1926.) OELKER.

Einar Viggo Schou, Pasgaard b. Juelsminde, Dänemark, *Margarine und essbare Fette*. Man verteilt W. in einem Ölprod. (z. B. aus Sojaöl gewonnen), das ein Öl enthält, durch Dispersion. (A. P. 1570 529 vom 14/10. 1921, ausg. 19/1. 1926.) KA.

O. Mustad & Søn, Norwegen, *Herstellung von Vitamine enthaltender Margarine u. dgl.* Nachdem die vitaminhaltigen Extrakte o. dgl. der Margarineemulsion hinzugefügt sind, wird die Weiterverarbeitung der Emulsion auf fertige Margarine unter vollkommenem Abschluß der Luft, z. B. im Vakuum oder einer CO_2 -Atmosphäre, durchgeführt. (F. P. 600 688 vom 11/7. 1925, ausg. 12/2. 1926. Norw. Prior. 16/7. 1924.) OELKER.

Société G. Clabaut & Cie., Lumbres, Frankreich, *Vorrichtung zum mechanischen Rühren von dicken Massen, wie flüssige Seife*. Die Vorr. ist dad. gek., daß jeder Rührhaken durch von Federn unterbrochene Stangen mit einem ortsfesten Punkt in der Weise verbunden ist, daß, wenn der eine Stangenteil gegen eine Querleiste des Behälters stößt, die Rührbahn der Arme verändert wird. Die Rührhaken sind an einer Doppelkurbel angelenkt, die sich auf den Seitenwänden des Behälters abstützt. (D. R. P. 425 353 Kl. 23f vom 26/11. 1924, ausg. 18/2. 1926. F. Prior. 6/12. 1923.) OEL.

George F. Dawes, La Crosse, Wisconsin, V. St. A., *Herstellung von Seifenpulver, flocken u. dgl.* Man unterwirft Seife mit einem hohen Wassergehalt der Einw. von rockener Hitze bei Tempp. von $250\text{--}400^\circ$ F. u. gewöhnlichem Druck, so daß eine plötzliche Verdampfung des W. erfolgt. Die Seife wird dadurch porös u. kann leicht in Flocken oder Pulver übergeführt werden. (A. P. 1571 625 vom 26/2. 1921, ausg. 2/2. 1926.) OELKER.

Robert Fallnicht, Eidelstädt b. Hamburg, *Wasch- und Bleichmittel*, bestehen aus 125 g Kernseife in Nudelform, 125 g mit Wasserglas versetztem Seifenpulver u. 25 g einer aus Kernseife, alkalibeständigem, blauen Farbstoff, Cholesterin, Bilrubin, Biliverdin, Terpentin, Borax, Salmiak u. Spiritus bestehenden Seife in Nudelform. (D. R. P. 425 942 Kl. 23e vom 12/12. 1923, ausg. 2/3. 1926.) OELKER.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Hugo Jaeger, *Die Herstellung wasserdichter Gewebe (Imprägnierungen)*. Vorschriften für verschiedene Imprägnierungen mit Beschreibung der verwendeten Vorrichtungen. Auf die Vorteile kontinuierlichen Arbeitens ist besonders hingewiesen. (Melliand Textilber. 7. 149—56.) SÜVERN.

P. Heermann und **H. Sommer**, *Der Einfluß ultravioletter Strahlen auf die Festigkeitseigenschaften von Faserstoffen*. (Mitt. Materialprüfungs-Amt Berlin-Dahlem 1926. 17—20. — C. 1925. I. 442.) SÜVERN.

A. Bodmer, *Beitrag zur Geschichte der Entwicklung der chemischen Hochveredelungsverfahren auf dem Gebiete der Baumwollindustrie*. Angaben über die von der Firma HEBERLEIN & Co. durch Behandeln mit Säure erzielten Effekte, Universa- u. Waschorgandistoffe, Opal-, Transparent- u. Imagotransparenteffekte u. Hexolanausrüstung (Melliand Textilber. 7. 232—34.) SÜVERN.

J. Millot, *Die Sekretion der Seide bei den Spinnen*. Histochem. Unters., an denen hervorgeht, daß der Faden aus der Seidendrüse der Spinnen abgesehen von der morpholog. Konstruktion auch chem. Abweichungen zeigt. Er scheint einheitlich aus einer dem Fibroin analogen, aber mit diesem nicht ident. Substanz zu bestehen, die gegenüber Lösungsm. sehr resistent ist. Der seidenbildende Stoff in der Drüse verhält sich ebenso u. muß den Seidenfaden im Augenblick des Austritts aus der Drüse entstehen lassen. (C. r. soc. de biologie 94. 10—11. Paris, Lab. d'histol. de la Fac. de méd.) OPPENHEIMER.


Max Speter, *Die Idioelektrisierbarkeit des Papiers*. Die beim Reiben von Papier auftretenden elektr. Erscheinungen werden besprochen. (Papierfabr. 24. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 119—20. Wehlen, Sächs. Schweiz.) SÜVERN.

Maurice Deschiens, *Die künstlichen Seiden*. Angaben hauptsächlich auf Grund älterer Veröffentlichungen. (Rev. gén. des Matières plastiques 2. 30—34.) SÜVERN.

P. Karrer, *Cellulose und Kunstseide*. Vortrag. (Umschau 30. 205—08.) BRAUN.

Emil Heuser und **Max Schuster**, *Die wissenschaftlichen Grundlagen des Viscoseprozesses*. Zur Entscheidung der Frage, ob der Viscoseprozeß ein rein chem. oder kolloidchem. ist, haben Vff. die wissenschaftlichen Grundlagen desselben in seine einzelnen Phasen eingehendst untersucht. — 1. *Der Reifungsprozeß der Viscose*. Bei der Darst. der natronhaltigen Xanthogenate ist es nicht gelungen, so eindeutige Verbb. wie sie CROSS, BEVAN u. BEADLE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 26. 1090 [1893]; 34. 1513 [1901]) beschreiben, zu erhalten. Auch war es nicht zu entscheiden, ob das an Celluloseerest haftende NaOH chem. oder was wahrscheinlicher ist, adsorptiv gebunden ist. Deshalb wurde mit CH₃COOH u. NaCl das natronfreie Reinxanthogenat ausgefällt u. durch Lösen in H₂O die Reinxanthogenatlsg. hergestellt. An dieser wurde der Reifungsvorgang verfolgt. Er verläuft schneller als bei Anwesenheit von NaOH. Durch Best. des Na durch Titration mit J-Lsg. konnten die Übergangsstufen scharf gefaßt werden, wobei sich zeigte, daß beim Reifen sich im Sinne der Cross-Bevansche Theorie cellulosereichere Verbb. bilden, jedoch nicht von dem Xanthogenat mit einem Mol C₆H₁₀O₅, sondern vom C₁₂-Prod. ab, über C₁₈ usw. bis zur reinen Cellulose. Dabei wurde gefunden, daß schon ein Xanthogenat als solches koaguliert u. in dieser

stand weiter reift. Bei der reinen Xanthogenatlsg. tritt stets eine geringe hydrolyt. Spaltung ein, wobei sich kleine Mengen Na_2CS_3 bilden, die beim Ansäuern in SH_2 u. S_2 zerfallen. Letzteres wurde durch Überführung in das Cuproxanthogenat u. Best. des Cu bestimmt. Die Zers. des Cellulosexanthogenats mit Säure ist eine Hydrolyse, die verläuft nach der Gleichung:



Bei der freiwilligen Zers. zeigt sich eine Abnahme des CS_2 u. dementsprechend eine Zunahme des SH_2 , durch den immer größer werdenden Gehalt an Na_2CS_3 . LEUCHS (chem.-Ztg. 47. 801; C. 1924. I. 263) findet das Verhältnis CS_2 :Cellulose konstant und hält infolgedessen den Reifungsvorgang für einen kolloidchem. Auch BERNHARDT (Z. 793) hat übersehen, daß das Trithiocarbonat beim Ansäuern CS_2 gibt. Durch CO_2 wird die Viscose nur sehr langsam zersetzt. Wie schon WESTHOF (Diss. Hannover 1911) gefunden hat, koaguliert Reinxanthogenatlsg. rascher als bei Alkalizusatz. Vff. fanden, daß zwischen dem Alkaligehalt einerseits u. der Haltbarkeit u. Viscosität andererseits in Xanthogenatlsgg. eindeutige Beziehungen bestehen, wobei eine 8% alkalihaltige die niedrigste Viscosität besitzt u. am längsten haltbar ist. Sie glauben, daß in diesem Falle die sonst kolloiden Teilchen dem kristalloiden Zustand am nächsten sind.

2. Die chem. Verb. zwischen Cellulose u. Alkali als Grundlage der Xanthogenatbildung. In den aus den NaOH-haltigen Xanthogenatlsgg. mit A. gefällten Verbb. schwankt der Na-Gehalt je nach der Konz. des in der Viscose vorhandenen Alkalis. Gleich in dem Xanthogenat noch freie Hydroxylgruppen vorhanden sind, ist eine chem. Bindung unwahrscheinlich, denn es war auch bei Aktivierung der OH-Gruppen Gegensatz zu WOLFENSTEIN u. OESER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 785; C. 1923. 1570) nicht möglich, ein Di- oder Trixanthogenat zu erhalten. Nach HEUSER u. MARTONEK (noch unveröffentlicht) bildet Dimethylcellulose keine Alkaliverb., infolgedessen auch kein Xanthogenat. Da Xanthogenatbildung nur nach B. von Alkalicellulosen im Verhältnis $1\text{NaOH}:2\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ entsteht, so müssen zur Alkalisierung auch Xanthogenatlsgg. von solcher Konz. verwandt werden, daß diese B. der Alkalicellulose entsprechen kann. Bei NaOH liegt dieser Punkt bei 16%ig. Lauge. Auch Li, K, Rb u. Cs geben Xanthogenate u. lösen diese, wobei sich zeigt, daß die Lösekraft mit steigendem Alkaligew. abnimmt. — 3. Die Abhängigkeit der Zus. der Xanthogenate von der angewandten Menge Schwefelkohlenstoff. Vff. haben vergeblich versucht, das C_6 -Prod. zu isolieren. Zu diesem Zweck Alkalicellulosen mit einem Überschuß von CS_2 7 Stdn. stehen lassen. Das daraus isolierte Natriumxanthogenat enthielt Cellulose:Na:S wie 2:3:2. Auch bei Anwendung von weniger CS_2 bildete sich stets das C_{12} -Prod. Bei Anwendung von noch weniger CS_2 als zur B. der C_6 -Verb. nötig ist, bildeten sich immer chem. Verbb., aus denen Cellulose, Na u. S in einem stöchiometr. Verhältnis stehen, dabei ist jedoch die Viscosierung keine quantitative. Die bei der Reifung entstehenden Nebenprod. spielen bei derselben keine Rolle; ihre Zunahme setzt nur die Haltbarkeit der Viscose herab.

4. Die Einw. von Trithiocarbonat auf Cellulose. Es ist nicht gelungen, Trithiocarbonat mit Cellulose in Rk. zu bringen. — 5. Über die Veränderungen der Cellulose während der Vorreife, der Sulfidierung u. des Reifungsprozesses. Während des Reifens von Alkalicellulose vollzieht sich ein Abbau der Cellulose, der nur physikal. Natur ist; es entsteht β - u. γ -Cellulose. Dieser Abbau wurde in der Weise bestimmt, daß die regenerierte Cellulose zu 2% in Kupferoxydammoniak gel. wurde u. die Viscosität dieser Lsgg. bestimmt wurde. Dabei zeigte sich, daß besonders in den ersten Stdn. ein starker Abbau erfolgt. Ein zweiter starker Abbau erfolgt während der ersten Stdn. der Sulfidierung, während bei der Reifung der Viscose das Cellulosemolekül kaum eine Veränderung erfährt. — 6. Die Änderungen der Viscosität der Viscose während der Reifung. Die Änderung wurde an 2%ig. Viscoselsg. studiert. Es zeigte sich, daß die Viscosität in den ersten 2 Tagen rasch fällt, d. i. die Zeit während der das Cellulose-

xanthogenat in Lsg. geht. Der Abfall beruht auf kolloidchem. Veränderungen. Na dieser Zeit steigt sie infolge der Zunahme der Nebenprodd. (Na_2CO_3 , Na_2CS_3) bis kurz vor der Koagulation an. (Cellulosechemie 7. 17—55. Beil. zu Papierfabr. 24. Telto Seehof, Forschungsinst. der Glanzstoff-Fabriken Elberfeld.) BRAUNS.

Aage Christian Thaysen und **Henry James Bunker**, *Untersuchung über den bakteriellen Zerfall von Textilfasern. II. Eine vorläufige Untersuchung der Verschlechterung von Mustern künstlicher Seide durch die Wirkung von Mikroorganismen.* Kunstseidengewebe aus Viscose, Nitroside, Kupferammoniakseide u. Celluloseacetat wurde der Einw. anaerober cellulosezerstörender Bakterien unterworfen, in Gartenerde oder unter Seewasser gehalten. Zur Beurteilung des eingetretenen Angriffs dienten makroskop. u. mikr. Veränderungen. Die größte Widerstandsfähigkeit zeigten Celluloseacetatproben. Von den anderen folgten Nitro-, Viscose- u. Kupferammoniakseide in dieser Reihenfolge. (Biochemical Journ. 19. 1088—94. 1925. Holton Heat Royal Naval Cordite Factory.) SPIEGEL.

Julius Obermiller, *Untersuchungen nach verbesserter Methode über die Resistenzfestigkeit von Textilfasern in trockenem und nassem Zustande.* Mitbearbeitet von **Mart. Goertz**. Eine neue Art des Einspannens der zu untersuchenden Fasern wird beschrieben, die als sicherer hingestellt wird als die von KRAIS (Textilber. üb. Wissensch. Ind. u. Handel 3. 86; C. 1921. IV. 758). Zu einer richtigen Bewertung der Festkeitszahlen kann nur eine größere Anzahl von Einzelvers. führen. Die Festigkeit der Fasern nimmt durchweg in einem bestimmten Verhältnis zu ihrem wachsenden Feuchtigkeitsgehalt stets zu oder stets ab, je nach der Art der Fasern. Fasern, die zu Unterss. über die Best. des exakten Trockengewichts u. der Abhängigkeit ihres Feuchtigkeitsgehalts von dem Grade der herrschenden Luftfeuchtigkeit gedient hatten, zeigten einen Rückgang in der Trockenfestigkeit u. in der relativen Naßfestigkeit (Melliands Textilber. 7. 163—68. 245—46. M.-Gladbach.) SÜVERN.

Franz Pichler, *Anwendung der Mikrophotographie bei textiltechnischen Untersuchungen.* Angaben über die verschiedenen Schafrassen, die Kräuselung auf 1 engl. Zoll, die verschiedenen Wollsorten, Best. der Dicke der Wollfaser mittels des Dollondschen Eriometers, Schilderung eines durch ein Gutachten entschieden Falles, Nachweis von Fehlern in kunstseidenen Strümpfen. (Melliands Textilber. 7. 79—80. 157—63.) SÜVERN.

Les Papeteries Navarre, Rhône, Frankreich, *Wasserdichtmachen von Papier.* Man trägt auf das Papier eine Mischung von Kolophonium, Paraffin u. Stearinsäure mittels einer Walze, die in das geschmolzene Gemisch taucht, auf. (F. P. 599 8 vom 23/9. 1924, ausg. 22/1. 1926.) FRANZ.

Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, *Gewinnung von Fasern aus faserhaltigen Pflanzenteilen von tropischen Saftpflanzen, wie Musen, Agave, Bromeliaceen und ähnlichen Pflanzen*, dad. gek., daß man die Pflanzenteile zunächst durchfrieren läßt, darauf in Luft, fl., dampf- oder gasförmigen Mitteln auf die Temperatur des Entfleischungsraumes erwärmt u. sie gegebenenfalls unter Wiederholung des Durchfrierenlassens oder Erwärmens in beliebiger Weise entfleischt. (D. R. P. 425 8 Kl. 29b vom 22/3. 1924, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH.

J. & J. M. Worral Limited und **Harry Livsey**, Salford, Manchester, *Veredeln von Gewebe.* Man bedruckt Gewebe, insbesondere Florgewebe, wie Samt, Velours mit einer Lsg. von Celluloseestern, z. B. eine Lsg. von Celluloseacetat in Aceton, die erforderlichenfalls gefärbt sein kann. (E. P. 229 914 vom 5/6. 1924, ausg. 26. 1925.) FRANZ.

Leon Lilienfeld, Wien, *Veredeln von Baumwolle.* (D. R. P. 425 330 Kl. 8 vom 3/5. 1924, ausg. 16/2. 1926. Oe. Prior. 23/5. 1923. — C. 1924. II. 2714.) FRANZ.

Anthony Pepper, Paterson, New Jersey, V. St. A., *Erschweren von Seide*. Man handelt die Seide mit einer Lsg. von $SnCl_4$ von 20° Bé u. nach dem Waschen mit einer Lsg. von Natriumphosphat von 7° Bé, nach einer Behandlung mit 3%ig. Essigsäure u. Waschen mit k. W. behandelt man mit einer Lsg. von *Bleiacetat* von 3° Bé einer k. Lsg. von Natriumphosphat. (A. P. 1 565 390 vom 14/8. 1925, ausg. 15/12. 25.) FRANZ.

R. H. Comey Brooklyn Company übert. von: **Edgar W. Geisler**, Brooklyn, New York, V. St. A., *Bleichen von Stroh*. Man behandelt mit Seifenlsg. u. einem neuartigen, oxydierend wirkenden Bade, dann wird das Stroh in einer geschlossenen Kammer unter geringem Überdruck mit gasförmigem Cl_2 behandelt u. hierauf mit H_2O_2 oder deren Oxydationsmitteln gebleicht. (A. P. 1568 664 vom 15/6. 1925, ausg. 5/1. 1926.) FZ.

Carl Bücking, Oberleschen, Kr. Sprottau, Schles., *Herstellung von Papier, wobei in Stoffwasser vor oder während der Ablagerung der Fasern auf dem Maschinensieb eine besondere Bewegung gegeben wird*, dad. gek., daß in dem verd. Papierstoff vor oder während der Ablagerung auf dem Maschinensieb eine Mehrzahl von Wirbeln erzeugt wird im wesentlichen senkrecht zur Strömungsebene des Papierstoffs stehenden Achsen erzeugt wird. — Es wird eine große Festigkeit u. gute Verfilzung des Papiers erzielt u. gleichzeitiger Schonung der Siebpartie der Maschine infolge geringer Schüttelung. (R. P. 424 355 Kl. 55d vom 26/7. 1924, ausg. 21/1. 1926.) OELKER.

Lurgi Apparatebau-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a. M., *Herstellung von Nitrostoffen*, dad. gek., daß während der Verwendung von S-Öfen u. Kühlung der Ofengase, dad. gek., daß die Ofengase zwecks Se- u. As-Abscheidung durch eine an sich bekannte elektr. Vorrichtung geleitet werden. (D. R. P. 426 386 Kl. 12i vom 8/2. 1925, ausg. 1. 1926.) KAUSCH.

Matthew Barrett Moore, England, *Polieren von Celluloidoberflächen*. Man verwendet ein Gemisch eines Lösungsm. für Celluloid, wie A., Terpentinöl, eines Poliermittels u. eines Schmiermittels, wie Paraffinöl, Leinöl; man erhält hochglänzende Oberflächen. (F. P. 600 373 vom 6/7. 1925, ausg. 5/2. 1926.) FRANZ.

Jacques Coenrad Hartogs, Arnheim, Holland, *Verspinnen von Viscose* mittels eines mit einem Fe-Salz ($Fe[SO_4]_3$) versetzten Bades, wodurch die B. von H_2S verhindert werden soll. (A. P. 1 573 062 vom 30/6. 1924, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

W. P. Dreaper, London, *Kunstseide*. Die Viscosefäden werden durch ein Bad einer Alkali- oder Metallsalzlsg., die nicht weniger als 40% des Sättigungswertes an diesem Salz ($NaCl$) enthält, entschweifelt. — Eine solche Lsg. kann auch den Farbstoffen usw. -bädern zugesetzt werden. (E. P. 245 815 vom 17/9. 1924, ausg. 11/2. 1926.) KAUSCH.

Viscose Co., Marcus Hook, Pennsylvan., übert. von: **Frank H. Griffin**, Wawa, Pennsylvan., *Diffusionsapparat für Flüssigkeiten*. Man befreit Ätzalkalien aus Abfallfl. der Kunstseideherst. oder Garnmercerisation u. aus Schwarzlauge von Pülpemühlen durch eine dialyt. Membran. (E. P. 246 355 vom 23/10. 1924, ausg. 18/2. 1926. A. P. 1 573 703 vom 27/6. 1923, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Erste Böhmisches Kunstseidefabrik A.-G., Tschechoslowakei, *Viscosekunstseide*. Man verwendet als Fällbad eine wss. Lsg. von Melasse oder Schlempe u. nicht-äquivalenten Mengen H_2SO_4 u. Na_2SO_4 . (F. P. 602 061 vom 12/8. 1925, ausg. 12/3. 1926.) KAUSCH.

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, übert. von: **Charles C. Pitman**, Parlin, New Jersey, V. St. A., *Elektrisch nicht erregbare Filme*. Der Film, der aus einem Cellulosenitrat mit mehr als 11,5% N besteht, wird auf der Rückseite mit einem Film aus Celluloseacetat mit weniger als 55% gebundener Essigsäure, Glycerin u. Saponin überzogen. (A. P. 1 570 078 vom 16/9. 1920, ausg. 1. 1926.) FRANZ.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, übert. von: **Ed. C. Pitman**, Parlin, New Jersey, V. St. A., *Elektrisch nicht erregbare Filme*. Der aus Cellulosenitrat bestehende Film wird auf der Rückseite mit einem Film aus Stärkeacetat und Glycerin überzogen. (A. P. 1 570 079 vom 16/9. 1920, ausg. 19/1. 1926.) FRANZ

Société pour la Transformation et l'Application des Produits Plastiques, Seine, Frankreich, *Caseinmassen*. Man vermischt Casein mit den Füllstoffen und im Zusatz so geringer Mengen W., 6%, in dem 0,2% Harnstoff gel. ist, daß ein Abdampfen von W. nach Formen der Gegenstände nicht erfolgt, u. einer Lsg. von Vaselineöl, Glycerin in CH₃OH; man erhält hiernach Gegenstände, die ebenso wie Cellulosemassen standsfähig sind, wie die mit CH₂O behandelten Caseinmassen. (F. P. 599 892 vom 26/9. 1924, ausg. 22/1. 1926.) FRANZ

Jean Pisseau, Seine, Frankreich, *Gegenstände aus plastischen Massen*. Man schneidet aus verschieden gefärbten plast. MM., wie Cellulosesediment, dünne Schichten u. befestigt diese auf die anders gefärbten oder nicht gefärbten Stücke mit Hilfe einer Lösungsm., die eingelegten Stücke können durch Walzen in der Wärme oder durch h. Pressen befestigt werden. (F. P. 599 834 vom 16/9. 1924, ausg. 21/1. 1926.) FRANZ

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

M. Dolch, *Entwicklungstendenzen unserer Brennstoffwirtschaft*. Vf. sieht die Entwicklungstendenzen unserer Brennstoffwirtschaft durch zwei Richtungen gekennzeichnet: 1. Die Gewinnung von fl. Betriebsstoffen u. Rohstoffen aus Kohle, 2. die Umwandlung des rohen Brennstoffes in der Form u. dem Inhalte nach hochwertigeren Energieträger. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 63—67.) HEIMANN

William A. Bone und **R. Quarendon**, *Untersuchungen in der Kohlenchemie*. IV. *Die Oxydation des Rückstandes der benzolischen Extraktion unter Druck*. (Vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 291. Proc. Royal Soc. London. Serie A. 110. 16; C. 1925. 2191. 1926. I. 1926.) Nach der Extraktion der Kohle mit Bzl. unter Druck (l. c.) verbleibt ein Rückstand, welcher 90% des Gesamtgewichtes ausmacht. Dieser Rückstand läßt sich mit alkal. KMnO₄ im Autoklaven bei 70° zu 25—40% zu einer Reihe von organ. Säuren oxydieren. 260 g des rohen Oxydationsgutes liefern 10 g reine Mellesäure (weitere 20 g entziehen sich der Reinigung), wenig 1,2,3,4-Benzoltetracarbonsäure sowie 25 g eines noch nicht getrennten, krystallin. Säuregemisches. Wahrscheinlich ist die Anwesenheit von Propan- α,α,β -tricarbonsäure, F. 144° (Zers.). Die Isolierung der Mellitsäure unter Bedingungen, welche eine Neubildung von 6-Ringen unwahrscheinlich machen, spricht für das ursprüngliche Vorhandensein derselben in der Kohlenstoffsubstanz. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 110. 537—42.) TAUBE

Gg. Illert, *Die Benzolfabrik*. Vf. beschreibt eine Bzl.-Fabrik der Firma HEINRICH HIRZEL, Leipzig-Plagwitz. (Chem.-Ztg. 50. 153—54. Allg. Öl- u. Fett-Ztg. 23. 172—73.) JUNG

Udo von Porten, St. Louis, Missouri, *Künstlicher Brennstoff*, welcher aus animalischen oder vegetabil. Abfallstoffen, einem KW-stoffdestillat (Teeröl), einem brennbaren Bindemittel (Pech) u. einem anorgan. Verdünnungsmittel (Ton) zusammengesetzt ist. — Die Mischung kann zu Briketts o. dgl. geformt u. dann getrocknet werden. (A. P. 1 572 909 vom 24/2. 1925, ausg. 16/2. 1926.) OELKER

Johann Scheibner, Gleiwitz, *Mischen des Brikettiergutes mit flüssigem Bindemittel*, bei dem das (mit Bindemittel versehene) Brikettiergut zwischen zwei einander zueinanderarbeitende, einen Spalt freilassende Walzen gelangt u. das Mischgut in ein Fördermittel abfällt, dad. gek., daß das Brikettiergut vor der Mischung mit dem Bindemittel gleichzeitig u. gleichmäßig auf die beiden Walzen gelangt u. über dem Spalt derselben der Bindemittelaustritt angeordnet ist, so daß das zwischen die Walzen gelangende Brikettiergut beiderseitig sicher vom Bindemittel getroffen wird. — 3

rd in ganz zuverlässiger Weise eine gleichmäßige Mischung erzielt. (D. R. P. 423 639 Kl. 10b vom 5/3. 1924, ausg. 8/1. 1926.) OELKER.

Koks- und Halbkoks-Brikettierungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Wilmersdorf (Erfinder: **Ludwig Weber**, Berlin-Wilmersdorf), *Erzeugen von Koks- oder Halbkoks-Briketten* nach Pat. 409 550 mit hoher Druckfestigkeit für Schmelz-, insbesondere Schmelzofenprozesse, dad. gek., daß dem Brikettiergut Bestandteile der Ofenbeschickung zugesetzt werden, die härtend wirken. (D. R. P. 425 541 Kl. 10b vom 31/3. 1925, ausg. 26/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 409 550; C. 1925. II. 371.) OEL.

Koks- und Halbkoks-Brikettierungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Wilmersdorf (Erfinder: **Ludwig Weber**, Berlin-Wilmersdorf), *Erzeugen von Koks-Briketten mit Zusatz anorganischer Bindemittel* nach Pat. 409 550, dad. gek., daß die festen Bestandteile der Tieftemperaturverkokung (Halbkoks) der Brikettierung unterworfen werden. — 2. dad. gek., daß nur solche Preßdrucke verwendet werden, die zur Formgebung eben hinreichen, jedoch zum Austreiben der Luft aus dem Formling u. zum Austreiben des Bindemittels in die Brennstoffporen unzureichend sind. — Die wertvollen Eigenschaften des Halbkoks (rauchschwache Verbrennung usw.) bleiben erhalten. (D. R. P. 424 631 Kl. 10b vom 21/12. 1924, ausg. 22/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 409 550; C. 1925. II. 371.) OELKER.

Minerals Separation Ltd. und Louis Albert Wood, London, *Behandlung von Brennstoffbriketten*. Die unter Verwendung von kohlenwasserstoffhaltigen Bindemitteln hergestellten Brikette werden unter Vermeidung einer Oxydation der Einwirkung überhitztem Dampf bei einer Temp. zwischen 100 u. 300° unterworfen. Die dabei sich entwickelnden Dämpfe werden kondensiert u. aus dem Kondensat KW-Stoffe abgewonnen. — Es werden rauchlos verbrennende u. gegen W. unempfindliche Briketts erhalten. (E. P. 242 352 vom 6/8. 1924, ausg. 3/12. 1925.) OELKER.

Eugène Albert Prudhomme, Frankreich (Alpes-Maritimes), *Herstellung eines gasigen Brennstoffs*. Man erhitzt Teere auf eine Temp. von etwa 500° u. unterwirft dabei entstehende Gasgemisch der Katalyse unter Verwendung eines Nickelkatalysators. (F. P. 599 826 vom 19/5. 1924, ausg. 21/1. 1926.) OELKER.

Eugène Albert Prudhomme, Frankreich (Alpes-Maritimes), *Herstellung eines gasigen Brennstoffs*. Man leitet einen h. Gasstrom, welcher seinerseits durch Verwertung von Brennstoffen oder Dest. erzeugt sein kann, durch einen erhitzten Brennstoff, z. B. Torf oder Lignit, u. unterwirft das dadurch erzeugte Gasgemisch der Katalyse. (F. P. 599 825 vom 19/5. 1924, ausg. 21/1. 1926.) OELKER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Deutschland, *Behandlung der bei der trockenen Destillation von bituminösen Brennstoffen entstehenden Kondenswässer*. Bei der bekannten Verdampfung der Kondenswässer durch Lüftung, gegebenenfalls unter Mitverwendung von Feuerungsabgasen, setzt man den Wässern vor jener Behandlung eine dem Phenolgehalt entsprechende Menge NaOH zu. (F. P. 599 654 vom 17/6. 1925, ausg. 18/1. 1926. D. Prior. 10/11. 1924.) OELKER.

Gas Research Company, Dayton, Ohio, V. St. A., *Gaserzeugungsanlage*, bestehend aus einem Generator u. einer Pumpe o. dgl., welche dauernd einen Dampfstrom durch die Brennstoffschicht des Generators veranlaßt, dad. gek., daß die Pumpe durch eine Heißluftmaschine angetrieben wird, deren wärmeaufnehmender Teil in die Generatorwand eingebettet ist. — Hierdurch wird ermöglicht, daß man den kleinen Generator dauernd betriebsbereit halten kann, u. zwar mittels des nicht ins Gewicht fallenden Bruchteils der in dem Generator erzeugten Wärmeenergie. (D. R. P. 426 189 Kl. 24e vom 2/7. 1922, ausg. 3/3. 1926. A. Prior. 30/7. 1921.) OELKER.

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges., Abteilung Schalke, und Fritz Castelli, Gelsenkirchen, *Gewinnung der leicht siedenden Kohlenwasserstoffe aus Schwel- en*, die beim Schwelen von Brennstoffen mittels indirekter Beheizung entstehen

u. außerhalb des Schwelraumes einem Crackprozeß unterworfen werden, dad. gek., daß das Cracken der Schwelgase mittels der zum Beheizen der Schwelvorr. verwendeten Heizgase erfolgt. — Es werden in wirtschaftlicher Weise reine Crackprodd. erhalten. (D. R. P. 424 724 Kl. 10a vom 18/10. 1924, ausg. 1/2. 1926.) OELKER

Rudolf Drawe, Charlottenburg, *Trocknen und Schwelen von Brennstoffen* einem durch versetzt liegende dachförmige Querstege unterteilten Schacht, dad. gek., daß das Heizmittel an einem Ende der unter den dachförmigen Stegen gebildeten Kanäle zu- u. am anderen Ende je desselben Kanals abgeführt u. die Zugverhältnisse u. dgl. im Ofen so eingestellt werden, daß das Heizmittel das Gut praktisch nicht durchdringt, vielmehr das durch die Querstege in Schichten unterteilte Gut praktisch lediglich überstreicht u. die daraus entwickelten Gase u. Dämpfe daher unmittelbar u. praktisch staubfrei abführt. (D. R. P. 425 316 Kl. 10a vom 15/11. 1921, ausg. 18/2. 1926.) OELKER

Max Klötzer, Dresden, *Ofen zur Verarbeitung bitumenhaltiger Stoffe*. Der Ofen nach dem Hauptpat. wird derart ausgebildet, daß der Hub des für sich in dem Ofen bewegten Herdes kleiner als die Länge der Profilzähne u. die Schütthöhe des Gutes auf dem Herde niedriger als die Zahnhöhe gehalten ist. — Es wird dadurch erreicht, daß die dem Gute durch die Schüttelbewegung erteilte Voranbewegung verzögert wird, um dem Gute bei ständiger Bewegung die erforderliche Zeitdauer zur Einwirkung der Wärme in den verschiedenen Wärmezonen zu bieten. (D. R. P. 425 597 Kl. 10a vom 28/4. 1922, ausg. 20/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 422 391; C. 1926. I. 1751.) OELKER

Hans Wiedemann, Berlin, *Schwelanlage für feinkörnige Güter* mit einem unten beheizten Teller, der oben mit einer Gasabführungskappe luftdicht abgedeckt ist, das Gut trägt u. von einem Rührwerk bestrichen wird, dad. gek., daß Gutzuführung u. Gutabführung in zwei einander möglichst benachbarten Sektoren des flachen Tellers vorgesehen sind u. Rührwerksarme zu tangentialem Weiterführen des Gutes von der Zuführung zur Abführung vorgesehen sind. — Hierdurch wird auf verhältnismäßig kleinem Raume u. mit geringen Wärmestrahlungsverlusten eine sehr leistungsfähige Destillationsanlage geschaffen. (D. R. P. 426 088 Kl. 10a vom 19/2. 1923, ausg. 1/3. 1926.) OELKER

Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H., Berlin, *Entstaubung der Destillationsgase bei Tieftemperaturverkokung* u. ähnlichen Prozessen, dad. gek., daß durch Luft- oder andere Kühlung die zwischen Destillationsvorr. u. Kondensationsgefaßen eingebauten mechan. Filter u. deren Füllkörper auf eine solche Temp. erniedrigt werden, darin erhalten werden, daß ein Teil des durchstreichenden Destillates auf ihnen kondensiert wird, so daß sie dadurch fortwährend u. selbsttätig feucht erhalten u. hierdurch zu einer restlosen Staubaufnahme geeignet gemacht werden, sowie, daß das im Filter zusammengeballte Sammelschicht in die Destillationsvorr. wieder selbsttätig zurückgelangt oder zurückgebracht wird. — Verluste an Teer u. eine Verlegung der Heizflächen der Destillationsvorr. durch Staub werden vermieden. (D. R. P. 426 284 Kl. 26d vom 13/3. 1923, ausg. 6/3. 1926.) OELKER

Gustav Hilger, Gleiwitz, *Stückigmachung von Feinkohle unter Verwendung einer Strangpresse*, deren einzelne Behälter heizbar sind u. zwecks Verdichtung des Brennstoffes sich allmählich verengen, dad. gek., daß der Brennstoff kurz vor der engsten Stelle des Verdichtungsbehälters auf den ganzen Querschnitt gleichmäßig eine elektr. artige elektr. Erwärmung erfährt, daß die bituminösen Bestandteile der Kohle gleichmäßig wirksam gemacht u. an der engsten Stelle des Verdichtungsbehälters gleichmäßig das Gut durchdringen, worauf das verdichtete Gut in eine Erweiterung des Verdichtungsbehälters übertritt u. abfällt. (D. R. P. 423 800 Kl. 10b vom 9/10. 1924, ausg. 11/1. 1926.) OELKER

George Baume, Frankreich, *Koks aus Gemischen fester und flüssig wenig flüchtiger rennstoffe*. Man unterwirft die Gemische mit Katalysatoren vermenget der Dest. im oksofen. (F. P. 596 191 vom 11/7. 1924, ausg. 17/10. 1925.) KAUSCH.

L'Air Liquide (Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Produits Georges Claude), Frankreich (Seine), *Verbesserung von Koks*. Nach dem erkoken der Kohle leitet man über den noch glühenden Koks einen an CH₄ oder anderen dissoziierbaren KW-stoffen reichen Gasstrom. (F. P. 597 150 vom 6/8. 1924, ausg. 13/11. 1925.) OELKER.

Société de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Paris, *Aufbereitung von Staubkohle nach Trent zur Gewinnung einer aschearmen Kohle in Form ster Körner*. Bei der bekannten Aufbereitung unter Ölzusatz in der Größenordnung von 20% des Gewichtes der Kohle wird ein Öl verwendet, das während des Rührorganges verhältnismäßig fl. ist, später aber sehr zähfl. wird, derart, daß das sich gebende Kohle-Öl-Konglomerat ungefähr 1/5 des Gewichtes der Kohle an Öl enthält die Form von einzelnen, scharf voneinander getrennten Körnern annimmt, die ungefähr die Größe u. die Härte von Getreidekörnern besitzen u. beim gegenseitigen reiben wenig Staub geben. (D. R. P. 425 701 Kl. 1c vom 1/4. 1923, ausg. 24/2. 1926.) OELKER.

Julien Pieters, Paris, *Apparat zur kontinuierlichen Destillation von Teer und Kohlenwasserstoffölen*. Eine mit horizontalen Platten oder Segmenten ausgestattete Kolonne besitzt im Innern (in der Mitte) einen Schacht für Flammen u. Heizgase. (F. P. 229 306 vom 11/2. 1925, ausg. 16/4. 1925. F. Prior. 12/2. 1924.) KAUSCH.

Société en commandite Thoumyre fils, Frankreich, *Trennung der Destillate aus chemischen Komplexen*. Der Komplex (Steinkohlenteer) wird in eine Kolonne eingeführt, in der überhitzter Wasserdampf zirkuliert. (F. P. 602 024 vom 18/11. 1924, ausg. 11/3. 1926.) KAUSCH.

Oberschlesische Kokswerke & Chemische Fabriken A. G., Berlin, und **Friedrich Rußig**, Berlin-Halensee, *Reinigung von Rohbenzol*. Die die schlechte SO₄-Rk. verursachenden Bestandteile werden durch fraktionierte Dest. mit starker Dephlegmierung entfernt, worauf die Hauptmenge des Bzl. mit oder ohne Dephlegmierung abfraktioniert wird. Um die Entstehung eines Nachlaufes mit schlechter SO₄-Rk. zu vermeiden, wird die Fraktionierung unterbrochen, bevor die Heizhlange freiliegt, worauf dann entweder durch Nachfüllen von neuem Rohbz. die Dest., wie oben angegeben, wieder vorgenommen wird, oder durch Einfüllung mehrerer sammelter Rückstände der Rest des Bzl. u. seiner nächsten Homologen mit guter SO₄-Rk. abgetrieben werden kann, u. zwar soweit, bis der Blasenrückstand etwa 145° zu sieden beginnt. (D. R. P. 423 787 Kl. 12r vom 4/12. 1920, ausg. 1/1. 1926.) OELKER.

Oberschlesische Kokswerke & Chemische Fabriken Akt.-Ges., Berlin, und **Alexander Supan**, Hindenburg, Oberschlesien, *Herstellung von Kohlenwasserstoffen der niederen Phenole aus Urteerphenolen* oder diese enthaltenden Urteerölen, dad. k., daß man die Ausgangsstoffe mit Wasserdampf bei höheren Temp. über solche Stoffe, z. B. Fe oder Koks, dest., die imstande sind, aus Wasserdampf H₂ abzuspalten. — Je bei der Umsetzung entstehenden Prodd. sind zum größten Teil aus Bzl. u. dessen Abkömmlingen bestehende KW-stoffe. Will man hauptsächlich leichtsd. Benzole erhalten, so sind hohe Temp. anzuwenden. Bei niedrigeren Temp. gewinnt man der Hauptsache höher sd. Abkömmlinge. Arbeitet man so, daß nur eine unvollkommene Zers. eintritt, so erhält man aus den höheren Phenolen mit guter Ausbeute Phenol selbst. Z. B. werden Urteerphenole mit überhitztem Wasserdampf über auf 100° erhitzten Fe-Drehspänen dest. Die Ausbeute an neutralen Ölen (KW-stoffen) beträgt ca. 60—65%, während der Gehalt des Destillats an Phenolen auf 7% gesunken

ist. Die letzteren bestehen zum größten Teil aus *Phenol*. (D. R. P. 422 035 Kl. 1 vom 16/7. 1921, ausg. 23/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Harald Nielsen, London, und **Bryan Laing**, Hatfield b. London, *Erzeugung eines kohlenoxydhaltigen Stadt- und Haushaltgases*, wobei h. Wassergas durch Retorten geleitet wird, dad. gek., daß das Heißblasen des Wassergaserzeugers ausgeführt wird, daß Heißblasegas mit reduzierenden Eigenschaften entsteht, so daß mit diesem Heißblasegas im Wechsel mit Wasserdampf Metall reduziert u. um Gewinnung von H₂ wieder oxydiert wird u. so fort, welcher H₂ dem Mischgase z. gesetzt wird. — Es wird auf diese Weise das für gewöhnlich verloren gehende Blasegas zur Erzeugung einer großen Menge H₂ ausgenutzt, welcher eine wertvolle Zugabe bei der Leuchtgasерzeugung bildet, wobei gleichzeitig der Gehalt des giftigen CO im Mischgas auf die Hälfte herabgedrückt wird. (D. R. P. 425 944 Kl. 26a vom 28. 1924, ausg. 2/3. 1926.) OELKER.

Joseph Newell Reeson, Melbourne, und **William Lancelot Moss**, Camberwell, Victoria, Austr., *Reinigen von Kohlen- oder anderen Gasen*. Zu dem Ref. über F. P. 595 28 C. 1926. I. 1083 ist nachzutragen: Man verwendet dabei eine Fe(OH)₃-Lsg., die Stox enthält, die eine lösende Wrkg. auf das Hydroxyd in neutraler oder alkal. Lsg. ausübt (*Salicylsäure*, *Oxybenzoesäure*, *Phthalsäure* u. ihre Alkalisalze, vielatomige Alkohole u. ihre Derivv., einschließlich *Glykole*, *Citronensäure*, *Citrate*, *Weinsäure*, ihre Isomere u. Alkalisalze). (Aust. P. 17 509 vom 30/4. 1924, ausg. 21/5. 1925.) KAUSCH.

Woodall Duckham (1920) Ltd., **E. W. Smith** und **T. C. Finlayson**, London, *Regenerieren von Gaswaschablaugen*. Die eine Fe-Verb. in Suspension haltende Lsg. wird mit Luft unter Druck behandelt, so daß die regenerierte Lsg. in den Kopf eines Absorptionsturmes steigt. (E. P. 245 575 vom 10/12. 1924, ausg. 4/2. 1926.) KAUSCH.

Otto Misch, Frankfurt a. M., *Erzeugung leuchtgasartiger Starkgase mit Hilfe von Wassergas*, das in erhitztem Zustand durch die Schwelretorte bewegt wird, dad. gek., daß der bis zur Grenze des Backens mit Hilfe des erwärmten Wassergases abgeschwelte Brennstoff unmittelbar aus der Schwelretorte außer in den zur Erzeugung des Wassergases notwendigen Generator in einen Schwachgasgenerator übergeleitet wird, der außer dem für den Wärmebedarf des Verf. u. des Werkes erforderlichen gasförmigen Brennstoff noch über eine Gaskraftmaschine den elektr. Strombedarf des Verf. u. des Werkes deckt u. entsprechend dem durch die Wertigkeit des erzeugten leuchtgasartigen Starkgases bedingten Anfall an angekoktem Brennstoff elektrische Energie verfügbar macht. — Der Hauptvorteil des Verf. besteht darin, daß die Erzeugungswärme des Wassergases ausgenutzt werden kann, u. ferner, daß der angekokte Brennstoff nicht abgelöscht zu werden braucht, sondern mit den aufgenommenen großen Wärmemengen in den Wassergasgenerator hineingeführt wird. (D. R. P. 425 945 Kl. 26a vom 3/1. 1925, ausg. 2/3. 1926.) OELKER.

Heinrich Niebaum, Herford, *Gasreiniger, insbesondere für Generatorgas*, gebildet durch abwechselnd in einem Behälter aufeinanderfolgende Kammern mit Reinigungsmasse u. leere Kammern, die durch hohle, in den Behälter einschiebbare Ringe gebildet sind, in deren Hohlraum das hindurchziehende Gas an Prallwänden o. d. Richtungswechsel erfährt. — Die Einrichtung bietet Gewähr für eine gründliche Reinigung des Gases u. dessen Befreiung von allen schädlichen Nebenbestandteilen. (D. R. P. 426 159 Kl. 26d vom 8/11. 1924, ausg. 4/3. 1926.) OELKER.

James R. Rose, Edgeworth, Pennsylvan., und **John Harris**, Cleveland, Ohio, *Brenngas*. Man erzeugt Blau-(Wasser-) Gas, kühlt es ab u. leitet es durch einen Mischkammer oder -kammer, indem man ihm ein verflüssigtes KW-stoffgas, das eine Dampftension von nicht weniger als 25 Pfund auf den Quadratzoll u. nicht mehr als 500 Pfund auf den Quadratzoll bei atmosphär. Druck u. gewöhnlicher Temp. hat, in geregelter Menge zuführt. (A. P. 1 573 524 vom 28/5. 1923, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Hans Seeger, Stettin, *Gefäß zur Entwicklung von Gasen aus brennbaren Flüssigkeiten*, dad. gek., daß im Gefäß ein oder mehrere Heizelemente für flammenlose Oberflächenverbrennung angeordnet sind, die aus doppelwandigen Rippen oder Spiralrohren bestehen, deren Innenrohrmantel zu einer Rippenkammer ausgestaltet u. zur Aufnahme der zerstäubt eingeblasenen Fl. dient, während durch Kanäle am unteren Ende der Kammer die Dämpfe das äußere Rippenrohr umströmen in Kammern, die aus den Rippen sowie einem die Rippen unten u. am Umfang umschließenden Mantel gebildet werden, bevor sie in den Aufspeicherraum des Gefäßes gelangen. (**D. R. P. 23 556** Kl. 26a vom 10/6. 1925, ausg. 7/1. 1926.)

OELKER.

Alphonse Mailhe, Frankr., *Extraktion von Lignitwachs*. Man unterwirft den fein pulverisierten Lignit den Dämpfen bestimmter organ. Lösungsm. oder diesen selbst *Dimethylanilin, Methylanilin, Methyltoluidin, Methylxylidin, Äthylxylidin, Anilin, Toluoluidin, Xylidin, Anilinöl, Pyridin, Chinolin, Phenol, Kresol* u. Gemische dieser), indem man den Lignit beständig in dem Lösungsm. bewegt. (**F. P. 598 502** vom 2/8. 1924, ausg. 18/12. 1925.)

KAUSCH.

Jura-Oelschiefer-Werke A.-G. und Kurt Nagel, Stuttgart, *Abschwelen von Oelschiefer u. dgl.* mittels eines im Kreislauf über eine Verdichtungsanlage für die Schwelzeugnisse befindlichen Stromes h., aus dem Verf. selbst stammender Gase, dad. gek., daß die aus dem Schwelraum abziehenden Gase u. Dämpfe, bevor sie in die Verdichtungsanlage eintreten, durch eine Wärmeaustauschvorr. hindurchgeführt werden, in der sie einen Teil ihrer Wärme an das in den Schwelraum zurückkehrende, von Teer u. Öl befreite Gas abgeben, dessen an sich bekannte Erhitzung auf die Schweltemp. in einem Vorwärmer bewirkt wird, der durch die bei dem Ausbrennen der Schieferrückstände anfallenden h. Gase beheizt wird. (**D. R. P. 424 183** Kl. 10a vom 20/11. 1921, ausg. 1/1. 1926.)

OELKER.

Universal Oil Products Co., Chicago, übertr. von: **Gustav Egloff und Harry Benner**, Independence Kansas, *Behandlung von Öl*. Man führt Öl in eine Blase, durch die diese, läßt die entwickelten Gase in der Blase durch ein Filterbett hindurchströmen, was sich im Dampfraum der Blase über dem Ölspiegel befindet u. unterwirft die Dämpfe der Dephlegmation, indem man die unverdichteten Gase abströmen läßt, das Kondensat in die Blase unterhalb des Filters zurückfließen läßt. (**A. P. 1 569 855** vom 20/8. 1920, ausg. 19/1. 1926.)

KAUSCH.

Texas Company, New York, übertr. von: **Frank W. Hall**, Port Arthur, Texas, *Behandlung von Kohlenwasserstoffölen*. Man leitet das von W. befreite Öl von unten durch oben durch einen mit einem absorbierend wirkenden Mineralstoff (Fullererde dgl.) gefüllten Zylinder. — Es soll dadurch die Farbe des Öles verbessert u. die Viskosität herabgesetzt werden. (**A. P. 1 570 890** vom 20/9. 1921, aus. 26/1. 1926.)

OEL.

Standard Oil Co., San Francisco, übertr. von: **Leroy G. Gates**, Bakersfield, *Herstellung von Emulsionen*. Man bringt die Teilchen der Emulsion (Öl u. W.) in innige Mischung mit einem Stoff, der ein Leiter der stat. Elektrizität ist u. beide Phasen der Emulsion auf gleiche elektr. (z. B. negative) Ladung zu bringen vermag. (**A. P. 1 573 389** vom 14/5. 1925, ausg. 16/2. 1926.)

KAUSCH.

Sinclair Refining Co., Chicago, übertr. von: **John E. Bell**, Brooklyn, N. Y., *Destillation*. Die zu verdichtenden Dämpfe werden zum Wärmeaustausch mit einem kalten Medium gebracht, das man im geschlossenen Kreislauf bewegt u. teilweise durch frisches Kühlmedium ersetzt. (**A. P. 1 573 129** vom 23/3. 1922, ausg. 1/2. 1926.)

KAUSCH.

Fritz Schwarz, Berlin-Zehlendorf, *Reinigung von aus Kohlenwasserstoffen bestehenden Ölen*. Man behandelt die Öle mit Basen u. Seifen. Hierbei können auch Salze oder salzartige Verbb., insbesondere Salze organ. Säuren, Phthalsäure, Sulfanilure u. a. mitverwendet werden. (**Schwz. P. 113 351** vom 14/4. 1924, ausg. 2/1. 1926.)

OELKER.

Zeche Mathias Stinnes, Essen, Ruhr, *Herstellung von Leichtölen aus Urteer* oder schweren Ölen unter Anwendung von überhitztem Wasserdampf, mit oder ohne Benutzung von Gasen u. Massen, die dem Reaktionsgemisch eine möglichst große Oberfläche darbieten, dad. gek., daß man als Ausgangsmaterial Urteer oder seine Destillationsprodd. verwendet u. bei relativ niedriger Temp. (600—700°) arbeitet, wobei der Wasserdampf in zur Erzielung einer Vakuumwrkg. unzureichenden Mengen Verwendung findet. (**D. R. P. 426 111** Kl. 12r vom 12/8. 1921, ausg. 5/3. 1926.) OELKER.

Carbide & Carbon Chemicals Corporation, New York, *Abscheiden von Gasolinen aus Naturgasen u. dgl.* Die durch Kompression aus den Gasen erhaltene Fl. wird unter reduziertem Druck rektifiziert u. zwar wird die Fl. unten in die Rektifikationskolonne unter atmosphär. Temp. eingeführt. (**E. P. 245 860** vom 18/10. 1924, ausg. 11/2. 1926.) KAUSCH.

Aktiebolaget Separator, Schweden, *Durchführung einer Reaktion zwischen Flüssigkeiten, die schwache Emulsionen zu bilden vermögen.* Man mischt u. trennt die Fl. (zu reinigendes Öl u. Ölsäurelsg. u. Na₂CO₃-Lsg.) so oft, bis die gewünschte Rk. beendet ist. (**F. P. 601 452** vom 1/8. 1925, ausg. 3/3. 1926. A. Prior. 16/8. 1924.) KA.

Fritz Hansgirk, Steeg (Oberösterr.), *Fraktionierte Destillation mittels elektrischer Widerstandsheizung*, dad. gek., daß durch die Verwendung von Heizwiderständen mit großer Oberfläche, welche den Flüssigkeitsraum der Destillierblase erfüllen, große Wärmemengen bei geringer Temperaturdifferenz zwischen Destillationsgut u. Heizkörper übertragen werden. — 2. dad. gek., daß eine elektr. geheizte, nicht leitende Fl. im Destillationsgut liegende Heizkörper oder Wandungen des Behälters für das Destillationsgut (Schlangenrohre oder sonstige Wärmeübertragungswandungen) durchläuft, wobei die auf bestimmte Temp. erhitzten Wandungen der Heizorgane die von der Fl. erhaltene Wärme an das Destillationsgut abgeben oder daß die nicht leitende elektr. geheizte Fl. in fl. oder gasförmiger Phase unmittelbar die zu behandelnde Fl. dest. — 3. dad. gek., daß man das aus Flüssigkeitsgemischen verschiedener Kpp. bestehende Destillationsgut über elektr. geheizte, auf ganz bestimmte Temp. gehaltene Flächen bezw. Widerstandskörper fließen läßt, derart, daß auf jeder Fläche eine bestimmte Fraktionsstufe verdampft, wobei man durch beliebig genaue Unterteilung des gesamten Siedebereiches des Destillationsgutes in einzelne Temperaturstufen kompliziert zusammengesetzte Fl. in scharf voneinander geschiedene Fraktionen trennen kann. (**Oe. P. 90 467** vom 28/5. 1916, ausg. 27/12. 1922.) OELKER.

Fritz Hansgirk, Steeg (Oberösterr.), *Herstellung wasserfreier Mineralölprodukte* durch Dest. bei Ggw. wasserentziehender Mittel, dad. gek., daß die Wärmezuführung auf elektr. Wege gemäß Stamppat. Nr. 90 467 erfolgt. — Es werden säure- u. phenolfreie Öle erhalten, die selbst bei hohen Viscositäten von heller Farbe sind u. keiner nachträglichen Raffination mittels H₂SO₄ u. NaOH bedürfen. (**Oe. P. 97 25** vom 5/10. 1916, ausg. 25/6. 1924. **Zus. zu Oe. P. 90 467; vorst. Ref.**) OELKER.

A. Riebeck'sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., *Raffination von Mineralölen*, 1. dad. gek., daß man dieselben mit Titanhalogeniden behandelt. — 2. dad. gek., daß man die Titanhalogenide in fein verteilter bezw. verd. Form auf die Mineralöle einwirken läßt. — Man kann die Titanhalogenide auch auf festen, fein verteilten Trägern niederschlagen u. in dieser Form zur Anwendung bringen oder sie in organ. nicht an der Rk. teilnehmenden Lösungsm. lösen. (**D. R. P. 426 157** Kl. 23b vom 29/1. 1925, ausg. 5/3. 1926. **Zus. zu D. R. P. 421 858; C. 1926. I. 1343.**) OEL.

R. Birkbeck, **E. Birkbeck** und **G. E. Webster**, Darwen, Lancashire, Engl. *Schmiermittel*, welches aus einem Gemisch von Schmieröl u. einer Zubereitung auf festen Fetten, Quecksilber, S u. Ricinusöl besteht. (**E. P. 242 520** vom 31/3. 1924, ausg. 3/12. 1925.) OELKER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: **Ka. Immerheiser**, Ludwigshafen a. Rh., und **Karl Neubauer**, Mannheim), *Verfahren zu*

färben von Holz, 1. dad. gek., daß man Lsgg. verwendet, die gleichzeitig saure u. bas. Farbstoffe von verschiedener Farbe enthalten. — 2. dad. gek., daß man Lsgg. verwendet, die neben W. noch organ., mit W. mischbare Lösungsm. enthalten. — Die organ. Lösungsm., wie A., Aceton, Äthylenchlorhydrin, Acetin oder Mischungen dieser Stoffe verhindern häufig das bei alleiniger Ggw. von W. eintretende gegenseitige Ausfällen der bas. u. sauren Farbstoffe. Das Holz wird nicht etwa in der Mischfarbe gleichmäßig gefärbt, sondern nebeneinander in verschiedenen Farben, wodurch schöne Mehrfarbeneffekte erzielt werden. Durch Einw. einer wss. Lsg. von Naphtholgelb S u. einer Lsg. von Methylviolett in Äthylenchlorhydrin unter Druck auf Holz wird dieses B. teils gelb, teils rötlichviolett angefärbt. — Mit Lsgg. von Grün PLX u. Naphtholgelb S in W., sowie von Pulverfuchsin in Aceton behandeltes Holz zeigt teils gelbe, teils rötliche, teils schwärzliche Färbung. — Lsgg. von Ponceau in W. u. Diamantgrün in Acetin verleihen dem Holz eine teils rötliche, teils schwärzliche Maserung. — Durch Behandeln von Holz unter Druck mit einer grünen Mischlsg. von Wasserblau IN in W. Auramin II in Äthylenchlorhydrin wird es teils gelb, teils blau angefärbt. (D. R. P. 212 124 Kl. 38h vom 27/6. 1924, ausg. 24/11. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Octave Gatineau und Lucien Levallois, Seine, Frankreich, Mittel zum gleichzeitigen Färben und Wachsen von Holz. Man erhitzt Wachs mit Alkalilauge u. W. u. versetzt mit Casslerbraunextrakt, einer Farbstofflsg. u. gibt schließlich CH₂O zu; oder man löst Wachs in Bzn., gibt eine alkoh. Lsg. von Schellack, Harz zu u. versetzt dann mit einer alkoh. Lsg. von Fuchsin. (F. P. 597 308 vom 3/3. 1925, ausg. 18/11. 1925.) Fz.

Cremon-Geigen Co. Müller & Schneiberg, Ges. m. b. H., Schönbach (Bez. Oberösterreich), Verfahren zur Hervorbringung künstlicher Maserung, dad. gek., daß nach einer photograph. Aufnahme des Maserungsbildes ein anderes Bild (Klischee) z. B. auf Holz ausgestochen u. hierbei die Maserungsstruktur so vergrößert wird, d. h. die Bildpunkte in solche Entfernung voneinander gerückt werden, daß bei der Rückübertragung die ursprüngliche Bildwirkg. durch Verfließen bezw. Aneinanderrücken der Bildpunkte in sauberer Ausführung wieder entsteht. (Oe. P. 96 682 vom 4/4. 1922, ausg. 25/4. 1924.) OELKER.

F. Aubert, Rolle, Schweiz, Verfahren zum Konservieren von Holz. Man imprägniert das Holz mit einer wss. Lsg., enthaltend ein Hg-Salz, ein F-Salz u. ein l. Chromat. — Zur Herst. des Imprägnierungsmittels werden z. B. HgCl₂, NaF u. Cr₂O₇ in weichem W., zweckmäßig Regenwasser, gel. Das zu behandelnde Holz taucht vor der Imprägnierung gut getrocknet sein, da andernfalls das Mittel nicht völlig in die Holzporen eindringen kann. (Schwz. P. 113 402 vom 3/12. 1924, ausg. 2/1. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Verein für chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trockene Destillation von Holz, dad. gek., daß die Hölzer planmäßig seitlich so eingeschnitten werden, daß ihre Faserkanäle zur Erleichterung des Gas- u. Dämpfeaustrittes beim Erhitzen wirksam geöffnet sind. — Der Austritt der Gase u. Dämpfe aus dem Holzinnern wird beschleunigt u. dadurch eine starke Druckverminderung im Holz u. eine gleichmäßigere Druckverteilung im ganzen Verkohlungsraum erreicht. (D. R. P. 426 434 Kl. 10a vom 6/6. 1924, ausg. 10/3. 1926.) OELKER.

Wilhelm Schneek sen., Siegen, Befuerung von Wärmöfen mit Kohlenstaub, dad. gek., daß in der Verbrennungskammer der Kohlenstaubfuehrung zunächst eine leuchtende Flamme unter B. von CO erzeugt wird, das dann an einer oder mehreren in Beschickungsende des Ofens näher liegenden Stellen durch an sich bekannte schmelzbare Einführung von gegebenenfalls vorgewärmter Luft verbrannt wird. (D. R. P. 426 114 Kl. 18b vom 9/3. 1923, ausg. 5/3. 1926.) KAUSCH.

John C. Tate, Oakland, Californ., Mittel zum Absorbieren und Reinigen der Verbrennungsprodukte der Verbrennung mittels einer harten, porösen M. aus Kalk, vegetabil. Asche u. gebranntem Gips. (A. P. 1 573 284 vom 16/11. 1922, ausg. 16/2. 1926.) KA.

Frank L. Dietz, Brooklyn, New York, *Motortreibmittel*, welches aus Tieftemperatur u. einer Mischung von A. u. einem KW-stoff, dessen Kp. etwa dem des A. gleich ist, z. B. Bzl., besteht. (**A. P. 1 573 307** vom 16/11. 1921, ausg. 16/2. 1926.) OELKER.

Frank L. Dietz, Brooklyn, N. Y., *Motortreibmittel*, welches aus durch Dest. von Kohle bei Temp. bis zu 600° erhaltenem Teer u. A. oder einer Mischung dieses Teers mit A. u. i-Propylalkohol besteht. (**A. P. 1 573 308** vom 2/2. 1922, ausg. 16/2. 1926.) OELKER.

J. G. Aarts, Dongen, Holland, *Brennstoff*. Man verwendet voluminöse Kohle, die sehr fein verteilt ist u. durch Zers. C-enthaltender Verbb. entstanden ist, als Brennstoff, am besten in Verbrennungsmotoren. (**E. P. 246 132** vom 8/1. 1926, Ausz. veröff. 17/3. 1926. Prior. 14/1. 1925.) KAUSCH.

Leonard Goulding, England, *Motortreibmittel*, welches aus A. (88 Teile), B. (10 Teile) u. Olefinen (2 Teile) zusammengesetzt ist. (**F. P. 600 946** vom 20/7. 1924, ausg. 18/2. 1926. E. Prior. 26/5. 1925.) OELKER.

XXIV. Photographie.

P. E. Henry, *Die Empfindlichkeitskeime der Bromsilbergelatineplatten*. Vf. untersucht die Frage, ob die Anwesenheit der Empfindlichkeitskerne so wirkt, daß das AgBr labiler wird gegen den Einfluß einer Strahlung, oder ob diese das bestrahlte AgBr für den Entwickler leichter reduzierbar machen. Für beide Ansichten lassen sich Stützen finden. Vf. kommt zu der Ansicht, daß durch photograph. Unterss. keine Entscheidung getroffen werden kann, es müssen andere lichtempfindliche Systeme zu Hilfe genommen werden. — S. E. SHEPPARD stimmt den Ausführungen des Vfs. zu u. verweist auf eine demnächst erscheinende Veröffentlichung von WIGHTMAN u. QUIRK. (*Revue Française Photographie* 7. 51.) KELLERMANN.

F. W. Aston, *Photographische Platten zur Auffindung von Massenstrahlen*. Vf. verweist auf die Wichtigkeit des Auffindens empfindlicher photograph. Platten für die Zwecke der Massenspektroskopie. Es zeigt sich, daß die Empfindlichkeit von Platten gegen Einw. von Kanalstrahlen sowie gegen Licht in keinerlei gegenseitige Beziehung zueinander stehen. Vf. schildert kurz seine bisherigen Erfahrungen über die bestgeeigneten Handelsplatten u. ihre individuellen Vorzüge für die Analyse der positiven Strahlen. Besonders günstig ist die Herstellung von „Schumannplatten“, d. h. die Entfernung der Gelatine von gewöhnlichen Platten durch Säuren; ein daz. geeignetes Verf. wird näher beschrieben. Trotz gleichmäßiger Durchführung dieses Prozesses bei Platten gleicher Lieferung lassen sich gut arbeitende Platten nicht jedesmal mit Sicherheit erzielen. (*Proc. Cambridge Philos. Soc.* 22. 548—54. Cambridge Trinity Coll.) FRANKENBURGER.

A. Steigmann, *Silberbestimmung in photographischen Emulsionen*. (Vgl. MEYER-DINGER, S. 292). Vf. stellt fest, daß er als erster das cyanometr. Verf. zur Ag-Best. in photograph. Emulsionen angewendet hat. (*Ztschr. f. wiss. Photographie, Photochemie* 24. 15—16.) KELLERMANN.

W. Meidinger, *Erweiterung zur Arbeit von A. Steigmann: Silberbestimmung in photographischen Emulsionen*. Vf. bemerkt an Hand von histor. Feststellungen, daß die Prioritätsansprüche von STEIGMANN (vgl. vorst. Ref.) nicht zu Recht bestehen. (*Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie* 24. 16—17.) KELL.

Ernst Buri, Zürich, *Lichtempfindliche Schicht für photographische Negativkopierverfahren unter Verwendung einer quellfähigen Schicht aus Gelatine, Albumin, Gummi*. Stärke o. dgl. (**D. R. P. 425 095** Kl. 57 b vom 10/5. 1925, ausg. 12/2. 1926. — C. 1924. I. 2524.) KÜHLING.

Chemisches Zentralblatt.

1926 Band I.

Nr. 18.

5. Mai.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Edgar F. Smith, *Vergessene Chemiker*. Vf. beschäftigt sich kurz mit STEPHEN FRANZ GEOFFROY, 1672—1731, WILHELM FRANZ ROUELLE, 1703—1770; ANDREAS SIGISMUND MARGGRAF, 1709—1782; JOHANN GOTTSCHALK WALLERIUS, 1709 bis 1735; JEAN A. DE LUC, 1727—1817; JOHAN INGENHOUSZ, 1730—1799; JOHN CRISTIAN WIEGLEB, 1732—1800, RICHARD KIRWAN, 1733—1812; TORBERN BERGMANN, 1735—1784; VON DIEMANN, 1743—1807 (?); JOHANN FRIEDRICH MELIN, 1748—1804; FRANZ CARL ACHARD, 1753—1821, SIGISMUND FRIEDRICH ERNSTAEDT, 1760—1833; JOSEPH VON JACQUIN, 1766—1839; JOHANN BAROLOMÄUS TROMMSDORFF, 1770—1837 u. AMBROSE GODFREY, 1669 (?)—1756 reproduziert bisher unbekannt gebliebene Bilder von ihnen. (Journ. Chem. Education 3. 29—40. Philadelphia, Univ. of Penn.) BEHRLE.

Karl Goldschmidt †, *Nochmals „Die Entdeckung des Aluminiums“*. Antwort BJERRUM (S. 2645) u. an MATIGNON auf die dem Aufsatz des Vfs. angefügten Bemerkungen (S. 293). (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 375—76. Seeheim a. d. Bergstr.) JUNG.

Elliot Q. Adams, *Der Gebrauch von tief- und hochgestellten Exponenten in der Chemie*. Vf. weist auf die Bedeutung von tief- u. hochgestellten Exponenten in der thematik hin, analog müßte $H_2O \equiv HHO$ u. Li_6 u. Li_7 verschiedene Atomarten des selben Elements Li bedeuten. Vf. meint, daß die danach unkorrekte Anwendung von Exponenten in der Chemie Verwirrung anrichten könnte, zumal da man auch in der Lage kommen könnte, Formeln der Art $PCl_{35}Cl_{37}$ schreiben zu müssen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 708—09. Cleveland [O.], NELA Research Labor.) JOS.

Linus Pauling und **Sterling B. Hendricks**, *Die Voraussage der relativen Stabilitäten isosterer isomerer Ionen und Moleküle*. Moleküle oder Ionen, welche dieselbe Kern- u. Elektronenanordnung besitzen, wie z. B. N_2 , CO, CN^- u. das Acetylid- C_2^- werden isoster genannt (vgl. LANGMUIR, Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 3; C. 1920. I. 356). In einigen Fällen sind isostere Moll. oder Ionen auch isomer, d. h. aus denselben Atomen zusammengesetzt, u. unterscheiden sich nur in der Rumpfanordnung, wie z. B. das Cyanation u. der Knallsäurerest (NCO^- u. $(CNO)^-$). Die relativen Stabilitäten solcher isosteren Isomeren hängen von ihren freien Energien ab, die wie ihre Energieinhalte Funktionen ihrer intramolekularen Energien sind. Aus den relativen Werten der potentiellen Energie des Kerns u. der K-Elektronen lassen sich die relativen Stabilitäten aller möglichen isosteren Isomeren voraussagen. Die größere Stabilität kommt jeweils der Verb. mit der kleineren potentiellen Energie zu. Aus solchen Betrachtungen ergibt sich, daß CO_2 die Konfiguration OCO hat und nicht COO, N_2O NON u. nicht NNO. Danach müßten N_2O -Moll. ein permanentes Dipolmoment besitzen; die dielektr. Daten dieser Substanz lassen noch keine Bestätigung dieser Voraussage zu. Aus den Energiewerten folgt, daß das Cyanation die Konfiguration NCO^- u. das weniger beständige Knallsäureion die Formel CNO^- hat; die Konfiguration CON^- existiert wegen ihrer großen Instabilität nicht. — Theoret. lassen die *i-Cyanate* mit der Konfiguration $RNCO$ beständiger sein als die Cyanate mit der Konfiguration $ROCN$, was auch mit dem chem. Verh. in Einklang steht, z. B. n. Ester der Cyansäure sind bisher wahrscheinlich wegen der Leichtigkeit, mit sich in Ester der Cyanursäure umwandeln, nicht isoliert worden. Weiter folgt,

daß die Knallsäure u. ihre anorgan. Salze die Formeln HCNO u. MCNO haben nicht die häufig angenommenen Formeln HONC u. MONC . Die *Nitriloxyde* werden als Ester der Knallsäure angesehen, ihnen kommt die Formel RCNO zu. Die gewöhnlich angenommene Struktur $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$ erscheint nach den Energiebetrachtungen



als sehr unwahrscheinlich. Verbb. mit den am wenigsten beständigen Strukturen RONC , RCON u. RNOC sind nicht bekannt. Auch die Beobachtung, daß die *Nitrile* RCN beständiger sind als die *i-Cyanide* RNC wird durch die energet. Berechnung erklärt. Die Struktur HCN für *Cyanwasserstoffsäure*, $(\text{M}^+)(\text{CN}^-)$ für ihre Alkalisalze u. MCN für die Schwermetallsalze stehen im Einklang mit ihren chem. Eigenschaften. Für *Cyan* ergibt sich die Formel NCCN , für die *Cyanhalogenide* NCX u. nicht allgemein übliche CNX , die nicht bewiesen, sondern aus dem analogen Verh. der Verbb. zu denen, die Halogen an N gebunden enthalten, aufgestellt worden ist. In sämtlichen vorausgesagten Konfigurationen werden durch chem. Rkk. bestätigt, was noch durch Elektronenschreibweise der Rk.-Gleichungen veranschaulicht wird (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 641—51. Pasadena [Cal.], Inst. of Technology.) J.

Ernst Jänecke, *Etwas über Phasengleichgewichte bei Sulfaten*. Vf. wendet sich gegen eine Arbeit von SCHENK über chem. Gleichgewichte zwischen PbS u. seinen Röstprodd. (vgl. S. 806). Im Gegensatz zu SCHENK, der annimmt, daß der Dampf, der im Gleichgewicht mit festem PbS u. Sulfaten ist, lediglich aus PbS u. SO_2 , oder bei Sauerstoffüberschuß nur aus SO_2 u. O_2 besteht, nimmt Vf. auf Grund der Dampfdrucke von PbS u. Pb an, daß Pb neben PbS in dem System Pb-S-O im Dampf nicht vernachlässigt werden darf. Anschließend setzt Vf. für einen einfachen Fall das System M-S-O ($\text{M} = \text{Metall}$) die Gleichgewichte zwischen Dampf, dem Metall M und den Verbb. MO , MS u. MSO_4 unter Benutzung graph. Darst. auseinander. Zu Schluß erklärt Vf. das Verh. beim Rösten eines Sulfids u. weist auf die Übertragung der Betrachtungen auf kompliziertere Fälle hin. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **18**. 289—308. Heidelberg.)

GOTTFRIED.

A. Schidlof, *Die Entartung der Gase und die Eigenschaften der Flüssigkeiten bei tiefen Temperaturen*. (Vgl. Arch. Sc. phys. et nat. Genève [5] **6**. 381; C. **1925**. I. 157) Ein quantenstatist. Aufbau der Zustandsgleichung führt in erster Annäherung zu Gleichung $p v = R T$, in zweiter Annäherung zur Gleichung $p v = R T - a/v$, worin $a = N^3 h^3 / 4 \sqrt{2} R (2 \pi M)^{3/2}$ ist. Die Größe a , die dem van der Waals'schen formal analog ist, aber eine ganz andere Bedeutung hat (die Kohäsionskräfte werden in Vfs. Theorie überhaupt nicht berücksichtigt), beträgt für He $5,76 \cdot 10^{-3}$ Liter ^{2} Grad $^{1/2}$. — Für den Ausdruck $N h^3 / V (2 \pi k m T)^{3/2}$ leitet Vf. eine Reihenentwicklung ab, die im Konvergenzbereich ihrer Abgeleiteten höchstens den Wert 2,62 erreichen kann, der also die obere Grenze des Ausdrucks darstellt. Daraus ergibt sich für die Größe $V \cdot T^{3/2}$ ein Mindestwert. Im Falle des He wird er bei $2,9^\circ$ absolut erreicht; bei noch tieferen Tempp. muß also V wachsen, was mit der Erfahrung (Dichtemaximum des He) übereinstimmt. (Arch. Sc. phys. et nat. Genève [5] **8**. 5—22.) BIKERMA

A. W. Francis, *Die relativen Geschwindigkeiten gewisser Ionenreaktionen*. Vf. beschreibt eine Methode zur Best. der relativen Geschwindigkeiten von sehr schnell verlaufenden, sog. „momentanen“ Ionenrkk. Die Methode besteht darin, die Vergleichsverss. angestellt werden, indem zu einem Gemisch zweier Verbb. eine zureichende Menge eines Reagenses, das mit beiden reagiert, zugegeben wird. Durch Analyse wird die Rk. jeder der beiden Substanzen verfolgt u. daraus das Verhältnis der beiden Rk.-Geschwindigkeiten berechnet. Vf. untersucht die Rk.-Geschwindigkeiten der Oxydation einiger anorgan. Red.-Mittel durch Br_2 in wss. Lsg. durch Vergleich mit der Bromierungsgeschwindigkeit organ. Verbb. (vgl. FRANCIS, HILL u. JOHNSTON, S. 61). Die relativen Geschwindigkeiten der Rk. mit Br_2 wurden von f.

nden Substanzen bestimmt: $TiCl_3$, $FeSO_4$, $FeCl_2$, HJ , $NaAsO_2$, $K_4Fe(CN)_6$, $SnCl_2$, aH_2SO_3 , $Na_2S_2O_3$, $NaNO_2$, *p*-, *m*- u. *o*-Toluidin, Zimtsäure, Acetanilid, Resorcin, nilin, *o*-, *m*- u. *p*-Kresol, *p*-Nitrophenol, *m*-Hydrobenzoesäure, *p*-Phenolsulfonsäure, Aminophenyllessigsäure, 1,2-Xylidin-4, Thiocarbamilid, Diäthylanilin, Dimethylanilin, *p*-Kresotinsäure, Formanilid, Salicylsäuremethylester, Salicylsäureäthylester, Benoldisulfonsäure, Zimtaldehyd, Phenylacetanilid, Acetyl-*o*-toluidin, Phenacetin, Acetyl-*p*-toluidin, Salicylsäurephenylester, Bromacetanilid, Diphenylguanidin, Benzilid, Zimtsäuremethylester, Triphenylguanidin, *o*- u. *p*-Chloranilin, Metanilsäure, Aminobenzoessäure, *p*-Oxybenzaldehyd, Äthylmetanilsäure, *m*-Oxybenzoesäure, Ananilsäure, *m*-Bromanilin, 2,4-Dichloranilin, 2,4-Dibromanilin. Die Verhältnisse der Geschwindigkeiten der anorgan. u. organ. Rkk. erweisen sich als prakt. unabhängig von der Temp. u. der Konz. Wird als Lösungsm. statt W. A. genommen, so zeigt sich, daß die Reaktionsfähigkeit der gel. Substanz zunimmt, wenn die Löslichkeit nimmt, u. wie die thermodynam. Aktivität in gesätt. Lsg. am größten ist. Die Geschwindigkeitskonstanten der 10 anorgan. Verbb. in wss. Lsg. variieren in der Größenordnung von 10^4 bis 10^8 . — Vf. vergleicht auch die Rk.-Geschwindigkeiten in $Na_2S_2O_3$ u. $NaHSO_3$ mit *Jod*, wobei sich im Gegensatz zu den Angaben von HERTZ (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 501; C. 1925. I. 628) die Rk.-Geschwindigkeit in $Na_2S_2O_3$ größer als die von $NaHSO_3$ ergibt. — Für die Analyse der gebildeten Säure mußte wegen der Ggw. der organ. Substanzen eine neue Methode ausgearbeitet werden, da bei der jodometr. Methode in schwach alkal. Lsg. die organ. Substanzen jodiert würden. Die Arsensäure wird durch 10 Min. langes Kochen mit einem großen Überschuß von $TiCl_3$ in CO_2 -Atm. u. Rücktitration des Überschusses mit Ferrialaunlg. bestimmt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 655—72. Cambridge Mass.), Inst. of Technol.)

JOSEPHY.

Antoni Galecki und Teofil Orlowski, *Kinetische Untersuchungen über die Wirkung metallisches Zink bewirkte Abscheidung des Kupfers aus Salzlösungen*. Man tauchte ein Zn-Stäbchen in eine Cu-Salzlsg. ein u. bestimmte die $[Cu^{++}]$ der Lsg. zu verschiedenen Zeiten. Daraus wurde die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k

aus der Formel berechnet: $k = \frac{v}{0,4343 \cdot t \cdot O} \log \frac{a}{a-x}$ (v = Vol. der Lsg., O =

Oberfläche des Zn-Stäbchens, a die ursprüngliche, x die zur Zeit t herrschende Konz., vgl. NERNST, Theor. Chemie, 8—10 Aufl., S. 658). — 1. In einer Versuchsreihe wurde der Elektrolyt dauernd gerührt, wodurch das Haften vom abgetrennten Cu am Zn vermieden wurde. k erwies sich ca. proportional der Umdrehungszahl des Rührers ($k = 0,193$ bei 160 Umdrehungen/Minute, $k = 0,667$ bei 100 Umdrehungen/Minute; 0,5-n. $CuSO_4$; 25°), sie fällt mit steigender a u. ist vom Ionen (SO_4^{--} , Cl^+) unabhängig. Der Temperaturkoeffizient von k ist zwischen 25 u. 35° 1,89 in 0,5-n. $CuSO_4$, 1,16 in $\frac{1}{8}$ -n. $CuSO_4$. Die Konstanz von k ist nur mäßig; selbst in den besten Verss. schwankt sie um 30% u. mehr. 2. In einer anderen Versuchsreihe wurde k bestimmt, indem man 6 gleiche Zn-Stäbchen in 6 Reagenzgläser derselben Cu-Salzlsg. gleichzeitig eintauchte u. die Konz. des Elektrolyten in 6 Proben nacheinander in bestimmten Zeitabständen maß; jede k wurde also mit Hilfe von 6 verschiedenen Zn-Stäbchen gemessen. Eine Rührung fand nicht statt, dennoch waren die k nicht weniger konstant, als im bewegten Elektrolyten. Auch wiederholte Benutzung derselben Zn-Stäbchen ist — in nicht zu konzentrierten Lsg. — statthaft. k wuchs mit steigender a ; sie war bei gleicher a in $CuCl_2$ -Lsgg. 2,4-mal so groß, wie in $CuSO_4$ -Lsgg. (25°). Der Temperaturkoeffizient zwischen 25 u. 35° u. zwischen 25 u. 35° betrug unabhängig von der Konz. 1,31. — Da das Verhältniß der Reaktionsgeschwindigkeit in $CuCl_2$ u. $CuSO_4$ (ohne Rühren) dem Verhältniß der betreffenden Diffusionskoeffizienten ungefähr gleich ist, so kann als sicher gelten, daß der Reaktionsverlauf vornehmlich durch Diffusionsgeschwindigkeit bedingt wird.

In diesem Falle kann aus den k -Werten im bewegten Elektrolyten die Dicke der Diffusionsschicht berechnet werden (vgl. BRUNNER, Ztschr. f. physik. Ch. **47**, C. **1904**. I. 911.) Sie ergab sich zu 11μ in $\frac{1}{8}$ -n. CuSO_4 bei 500 Umdrehungen/Minute bis 108μ in 0,5-n. CuSO_4 bei 100 Umdrehungen pro Minute. (Bull. internat. Acad. polonaise des Sciences et des Lettres **1925**. A. 303—32. Inst. f. physikal. Chemie Univ. Posen.)

BIKERMANN

N. Parravano und **G. Malquori**, *Reduktionsgleichgewichte des Kupferchlorids und Bleichlorids mit Wasserstoff*. Die Red. eines Halogens mittels H_2 ist eine umkehrbare Rk. u. führt zu bestimmten Gleichgewichtszuständen je nach Temp. u. Druck. Die Beziehung, die zwischen der Gleichgewichtszusammensetzung der Gasphase, Druck u. Temp. besteht, lautet $\lg U/RT + \lg p + \lg K = C$, wo U die Wärmetönung der Rk., p der Druck, dem das System unterworfen ist, K die Konstante des Massenwirkungsgesetzes u. C die Gleichgewichtskonstante bedeutet. Zum Studium der Rk. gehört die Kenntnis von $Kp = p\alpha^2/(100 - \alpha)$ bei verschiedenen Temp., wo α die Volumprocente Säure in der im Gleichgewicht befindlichen Gasphase u. p der Gesamtdruck bedeuten. Vf. bestimmt diese Größen experimentell, u. zwar ausgehend einerseits von den Systemen $\text{Cu}_2\text{Cl}_2 + \text{H}_2$, $\text{PbCl}_2 + \text{H}_2$ u. andererseits von $\text{Cu} + 2\text{HCl}$, $\text{Pb} + 2\text{HCl}$. Die so gefundenen Werte für Kp stehen in ziemlich guter Übereinstimmung mit den nach der Nernstschen Näherungsformel für Kp errechneten Werten. Für das System $\text{Cu}_2\text{Cl}_2 + \text{H}_2$ errechnen sich Werte von 1,86, 1,20, 0,57 bei 500, 400°, während die entsprechenden gefundenen Werte 2,18, 1,53 u. 1,21 sind. (Gazz. chim. ital. **56**. 3—13. Rom.)

GOTTFRIED

N. Parravano und **G. Malquori**, *Über thermische Dissoziation einiger Chloraurate*. Vf. bestimmen die Tensionen von 1. AgAuCl_4 , 2. KAuCl_4 u. 3. CsAuCl_4 bei verschiedenen Temp. zwischen 100 u. 213° bei 1., 250—322° bei 2. u. 302—400° bei 3. Die Drucke können durch folgende Gleichungen errechnet werden:

$$\lg p = 0,01171 t - 0,550 \text{ für } \text{AgAuCl}_4$$

$$\lg p = 0,01122 t - 1,773 \text{ für } \text{KAuCl}_4$$

$$\lg p = 0,00956 t - 1,770 \text{ für } \text{CsAuCl}_4$$

Aus p errechnen Vf. nach der Nernstschen Näherungsformel Q ; ferner errechnen V die Temp., bei denen die Tension 1 at beträgt u. finden für 1. 294°, 2. 414,9°, 3. 486,0°. Das Verhältnis Q/T ist für 1. 0,033 u. für 2. u. 3. 0,034. (Gazz. chim. ital. **56**. 13—19. Rom.)

GOTTFRIED

Georges Boitard, *Korrespondierende Zustände und Oberflächenerscheinung* (Vgl. Journ. de Chim. physique **22**. 349; C. **1925**. II. 1938.) Vf. nennt die Größe $W/p_c v_c$ (W die innere Verdampfungswärme, p_c bzw. v_c der krit. Druck bzw. der krit. Vol.) reduzierte Oberflächenenergie, die Größe $\gamma/p_c v_c^{1/3}$ reduzierte Oberflächenspannung (γ = die Oberflächenspannung). Statt der Eötvösschen Regel findet $\gamma \cdot v_c^{2/3} = k \cdot p_c \cdot v_c (T_0 - T)/T_c$, worin k u. T_0 für eine Körperklasse charakter. Konstanten sind, T_c die krit. Temp. darstellt. Der Eötvössche Koeffizient hängt ab von den krit. Daten ab. (Journ. de Chim. physique **23**. 205—08. Saint-Contest.)

Carlos del Fresno, *Eine Beziehung zwischen Atomvolumen und Ordnungszahl*. Aus einigen Betrachtungen über die Änderung des Atomvolumens bei wechselnder Kernladung u. Elektronenzahl kommt Vf. zu einigen Schlüssen, die er folgendermaßen zusammenfaßt: „Innerhalb derselben Gruppe des period. Systems sind die mit zunehmender Ordnungszahl die At.-Vol.-Differenzen zwischen den zu fortlaufend Perioden gehörenden Elementen größer für Perioden höherer Ordnung bei gleich Ordnungszahldifferenzen. Bei Ungleichheit der letzteren entspricht der größeren die kleinere Atomvolumendifferenz u. umgekehrt.“ Es wird dann gezeigt, daß die Regel allgemeine Gültigkeit besitzt. Ausnahmen sind Ba u. Ra in der 2. Gruppe u. As in der 5. Daß Ba der Regel nicht folgt, indem es ein zu geringes Atomvolumen besitzt, wird dadurch zu erklären gesucht, daß in diesem zwei innere Elektronen

chalen nicht aufgefüllt sind. Aus dieser Anomalität des Ba erklärt sich das anscheinend enorme At.-Vol. des Ra, das in Wirklichkeit normal ist. Ähnlich steht es mit dem Cs, bei dem die Regel infolge des großen At.-Vol. des N nicht erfüllt ist. Die Minima der At.-Voll. finden sich in der 3. Gruppe, wie eine entsprechende Figur zeigt. In den Nebengruppen liegen diese Minima in der 8. Spalte (des Panethschen period. Systems), die Regel des Vfs. hat auch hier Gültigkeit im Gegensatz zu den Elementen der seltenen Erden, von denen sie nicht befolgt wird. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **47**. 47—61. Oviedo, Lab. de Quim. Inorg. d. l. Univ.) HANTKE.

Gregory Paul Baxter, *Zweihunddreißigster Jahresbericht des Komitees für Atomgewichte. 1925 veröffentlichte Bestimmungen.* (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 541—552. Cambridge [Mass.], HARVARD Univ.) JOSEPHY.

Carl Wagner, *Zur Theorie der Molekulargewichtsbestimmung in Lösungsmittelmischen.* Ausgehend von der durch LEWIS erweiterten Beziehung für Systeme mit beliebig vielen Komponenten berechnet Vf. die Siedepunktsänderung eines binären Lösungsmittelgemisches durch den Zusatz einer geringen Menge eines dritten Stoffes. Die durch eine thermodynam. Ableitung erhaltene Gleichung wird diskutiert. Sie wird durch die Verss. von DRUCKER u. WEISSBACH (Ztschr. f. physik. Ch. **117**. 209; **1925**. II. 899) u. von CARROLL, ROLLEFSON u. MATHEWS (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 1785; C. **1925**. II. 2245) qualitativ bestätigt. (Ztschr. f. physik. Ch. **119**. 1—58. München, Univ., Lab. f. angew. Chemie.) HANTKE.

Michel-Samsoen, *Über die Änderung des Ausdehnungskoeffizienten der Körper in amorphen Zustände.* Untersucht wurden ein Gemisch von KW-stoffen, der Teer, Alkohol, das Glycerin, ein Kohlehydrat, die Saccharose, Harze, u. zwar Kolophonium, Gummilack, ein Gel, u. zwar polymerisiertes Acrolein. Bei den Unterss. wurde je nach der Beschaffenheit des Stoffes der kub. oder der lineare Ausdehnungskoeffizient bestimmt. Es konnte festgestellt werden, daß es für die genannten Stoffe je eine Temp. gibt, bei der sich der Ausdehnungskoeffizient sprunghaft ändert, u. zwar steigt er im Durchschnitt auf das Doppelte. Zu erklären versucht wird es mit der Annahme des plötzlichen Überganges vom festen in den zähfl. Zustand. (C. r. d. l'Acad. des sciences **2**. 517—19.) HAASE.

Jean Dubief, *Über das Gesetz der Zähigkeit der Flüssigkeiten als Funktion ihrer Dichte stellende Gesetz. Seine Beziehungen zur Zustandsgleichung.* Für das in Vfs. Formel C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1164; C. **1925**. II. 128) vorkommende Covolumen findet er den Ausdruck $b = b_0 - d^2/(v^2 + c)$ (v das spezif. Vol., c u. d Konstanten; vgl. BOLTZMANN u. MACHE, Ann. der Physik [3] **68**. 350 [1899]). Die Größe $b_0 = 208 \cdot 10^{-4} \cdot M/\delta_c$, M das Mol.-Gew., δ_c die krit. Dichte, ist in Übereinstimmung mit der Regel NADEJDINS (Rech. physiques, Kiew, 1887), wonach das krit. Vol. b_0 beträgt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 688—89.) BIKERMAN.

P. Mondain-Monval, *Über das Gesetz des Tangentenverhältnisses von Löslichkeitskurven.* Vf. verteidigt seine Verss. (Ann. de Chimie [10] **3**. 72; C. **1925**. II. 129) gegen die Angriffe von COHEN u. BREDÉE (Ztschr. f. physik. Ch. **117**. 143; C. **1925**. II. 32), die ja dieselben Ergebnisse bekommen haben. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**—40. Paris, Sorbonne.) BIKERMAN.

Heinrich Rheinboldt und Mariette Kircheisen, *Eine Methode zur Untersuchung binärer Systeme. 2. Mitt.: Das „Auftau-Schmelzdiagramm“ von Systemen mit Mischungslücken.* (1. vgl. S. 2069.) In vorliegender Arbeit handelt es sich um Systeme, die im festen Zustand ineinander unl., deren Schmelzen aber nur begrenzt mischbar sind. Man erhält hier Zustandsdiagramme mit mehr oder weniger ausgeprägten „Mischungslücken“. — 1. Fall: Die Komponenten bilden keine Verb. miteinander. Die 3 Punkte mit scharfem F. u. die „Auftau-kurve“ entsprechen dem Fall der vorigen Mitt. Die „Schmelzkurve“ weist ein horizontales Stück auf, gekennzeichnet durch die Temp., bei der beim Aufschmelzen die letzten festen Teile

verschwinden u. zwei fl. Schichten entstehen, die sich erst bei höherer Temp. zu ein homogenen Schmelze lösen. Das Maximum der Löslichkeitskurve beider Schmelze entspricht der „krit. Lösungstemp.“ Sind beide Komponenten ganz unl. ineinander so ergeben sich zwei über fast das ganze Diagramm verlaufende Horizontalen, d. „Auftaukurve“ in Höhe des „Auftaupunktes“ der tiefer schm. u. die „Schmelzkurve“ in Höhe des „Schmelzpunktes“ der höher schm. Komponente. — 2. Fall: Die Komponenten bilden eine Verb. miteinander. Liegt diese außerhalb der „Mischungslücke“ so hat man einfach eine Kombination des vorigen Falles mit Fall 2 oder 3 der vorige Mitt. Fällt die Verb. in den Bereich der „Mischungslücke“, so weist die „Schmelzkurve“ zwei Eutektika auf. Die „Auftaukurve“ verläuft entsprechend dem 2. Fall der vorigen Mitt., sie berührt die „Schmelzkurve“ bei der Konz. der reinen Komponenten, in den beiden eutekt. Punkten u. bei der Lage der Verb., so daß sich theoretisch 5 Punkte mit scharfem F. ergeben.

Versuche. 1. Fall: *Pikrinsäure-Triphenylmethan*. Mischungslücke von 8,5–75% Triphenylmethan bei 114°. Krit. Lösungstemp. 144,5°. Eutektikum (abweichend von KREMANN) bei 91,5% Triphenylmethan u. 86°. — *2,4-Dinitrotoluol-Harnstoff*. Beispiel für nahezu völlige Unlöslichkeit ineinander. „Auftaukurve“ bei 68,5°, „Schmelzkurve“ bei ca. 130,5°. — 2. Fall: *m-Phenylendiamin-Triphenylmethan*. KREMANN konnte nicht sicher entscheiden, ob eine Verb. vorliegt. Aber das Verf. der Vff. weist durch das Auftreten zweier Eutektika — das eine ist wenig ausgeprägt — auf die Existenz einer Verb. hin, die nach dem Verlauf der „Auftaukurve“ äquimolekular ist. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 187–95. Bonn, Univ.) LB.

G. Malquori, *Doppelchloride des Cäsiums und dreiwertigen Thalliums*. Vf. untersucht das System $\text{TiCl}_3\text{-CsCl-H}_2\text{O}$ bei 15° u. findet folgende Doppelsalze: 1. $2\text{TiCl}_3\cdot 3\text{CsCl}$, 2. $\text{TiCl}_3\cdot 2\text{CsCl}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 3. $\text{TiCl}_3\cdot 3\text{CsCl}\cdot \text{H}_2\text{O}$ u. 4. $\text{TiCl}_3\cdot 3\text{CsCl}$. 1. ist stabil in einer gesätt. Lsg. von TiCl_3 mit einer Lsg. von CsCl bis zu 3,27% CsCl . Bei Erhöhung der CsCl -Konz. geht Salz 1 in $2\text{TiCl}_3\cdot 3\text{CsCl}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ über, das stabil ist in einer Lsg. die 3,27–27,19% CsCl enthält. In Lsgg. von 27,19–45,21% CsCl ist Salz 3 stabil während Salz 4 bei noch höheren CsCl -Konz. beständig ist. (Gazz. chim. ital. 56. 37–41. Rom.)

GOTTFRIED.

G. Carobbi, *Doppelchromate der seltenen Erden mit Alkalimetallen*. II. *Doppelchromate von Lanthan und Ammonium*. (I. vgl. Atti R. Acad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 416; C. 1925. I. 1576.) Vf. untersucht das System $\text{La}_2(\text{CrO}_4)_3\text{-(NH}_4)_2\text{CrO}_4\text{-H}_2\text{O}$ bei 25°. Es wurde nur ein Doppelsalz erhalten: $\text{La}_2(\text{CrO}_4)_3\text{-(NH}_4)_2\text{CrO}_4\cdot \text{H}_2\text{O} = 1:3:5$. Es ist ein gelbes, krystallin. Pulver, ll. in W. u. innerhalb großer Konzentrationsgrenzen beständig. (Gazz. chim. ital. 56. 76–81. Neapel.)

GOTTFRIED.

G. Carobbi, *Untersuchungen über Beziehungen des Isomorphismus zwischen Verbindungen des Samariums mit den entsprechenden des Calciums, Strontiums, Bariums und Bleis*. Die Arbeit des Vf.s ist eine Erweiterung der Arbeiten ZAMBONINIS (vgl. S. 573, 1357, 1499, 1757, 1924) u. der Arbeit des Vf.s (C. 1925. II. 1504) über dasselbe Thema. Die Unterss. ergaben, daß auch Verbb. des Sm mit den entsprechenden Verbb. des Ca, Sr, Pb homogene Mischkrystalle bilden. Untersucht wurden die entsprechenden Molybdate. Während zwischen PbMoO_4 u. $\text{Sm}_2(\text{MoO}_4)_3$ vollkommene Mischbarkeit im festen Zustand besteht, ist zwischen CaMoO_4 u. $\text{Sm}_2(\text{MoO}_4)_3$ die Löslichkeit in festen Zustand auf Mischkrystalle bis zu einem Gehalt von 68% Sm beschränkt. — Anschließend stellt Vf. einen Samariumhaltigen *Chlorapatit* mit einem Sm-Gehalt von 13,63% SmPO_4 dar. (Rendiconto Accad. Scienze Fisiche e Mat. (Napoli) [3] 31. 83–95. 1925.)

GOTTFRIED.

G. Carobbi und A. Marcolongo, *Beiträge zum Studium der Beziehungen des Isomorphismus zwischen Quecksilber und der isomorphen Gruppe des Magnesiums*. I. *Isomorphismus zwischen Quecksilber und Magnesium*. Vorl. Mitt. Verss. der Vff. erwiesen die Existenz von festen Lsgg. zwischen 1. $\text{Hg}_3\text{La}_2(\text{NO}_3)_{12}\cdot 24\text{H}_2\text{O}$ u. $\text{Mg}_3\text{La}_2\cdot$

$\text{NO}_3)_{12} \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ bis zu einem Gehalt von 10% des Hg-Salzes u. 2. $\text{Hg}_3\text{Bi}_2(\text{NO}_3)_{12} \cdot 24\text{H}_2\text{O}$. $\text{Mg}_3\text{Bi}_2(\text{NO}_3)_{12} \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ bis zu einem Gehalt von 25% des Hg-Salzes. (Gazz. chim. ital. 56. 69—76. Neapel.)

GOTTTRIED.

B. Mereshkowski, *Über die Theorie der katalytischen Erscheinungen*. Nach Vf. besteht jede chem. Rk. grundsätzlich in einer Änderung der Valenz reagierender Atome. In Katalysator ist jeder Körper, der diese Valenzänderung bewirken kann, wobei er mit den reagierenden Substanzen reversible Rkk. eingeht. Dazu ist nötig, daß er selbst in verschiedenen Valenzstufen vorkommen könne; so sind Elemente konstanter Valenz (H, Na usw.) keine Katalysatoren, die Elemente der variablen Valenz (O, Cu, Ni usw.) dagegen katalyt. wirksam. Die Katalyse ist positiv (negativ), wenn die Umwandlungsgeschwindigkeit des vom Katalysator gebildeten Komplexes groß (klein) ist. Da die Umwandlungsgeschwindigkeit von der Temp., u. zwar von der Nähe der Gleichgewichtstemp. abhängt, so kann durch Temperaturänderung eine negative Katalyse in eine positive u. umgekehrt umgewandelt werden. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 41—43.)

BIKERMAN.

Arthur F. Benton und Paul H. Emmett, *Die katalytische Synthese von Wasserstoff bei Berührung mit metallischem Nickel*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1924. C. 1925. I. 2355.) Zweck der Unters. war, sichere Daten über die Oxydations- u. Red.-Hypothese zu erhalten, besonders die B. von NiO u. dessen Red. durch H_2 bei der Katalyse sicherzustellen, was den Vff. auch gelungen ist. Methode u. App. waren dieselben wie in der früheren Arbeit (l. c.). Als Katalysator diente durch Red. bei 100° hergest. Ni. Durch die lose Katalysatormasse wurde ein konstanter Strom von H_2 geleitet, dem bis zu 5% O_2 beigemischt wurden. Bei 100° u. höheren Temp. reagierte H_2 quantitativ unter B. von W. mit geringer oder gar keiner bleibenden Oxydation an der Katalysatoroberfläche. Bei 35° wurde fast gar kein W. aber große Mengen Ni-Oxyd gebildet. Die Ergebnisse von Verss. zwischen 65 u. 82° sind durch Kurven veranschaulicht. Bei allen Temp., bei denen W.-B. nachgewiesen werden konnte, war auch oberflächliche Oxydation des Ni eingetreten. Bei niederen Temp. war zuweilen die ganze Oberfläche oxydiert, dann sank die Geschwindigkeit der Katalyse plötzlich. Wenn über einer derart oxydierten Katalysator reiner H_2 geleitet wurde, wurde die Red.-Geschwindigkeit autokatalyt. beschleunigt. Das ist eine Bestätigung der früheren Beobachtung, daß die Red. von gewöhnlichem Ni-Oxyd eine Grenzflächenrk., d. h. abhängig von der Berührungsfläche der beiden festen Phasen ist. Die so erhaltenen maximalen Red.-Geschwindigkeiten waren jedoch klein im Verhältnis zu den bei der H_2 - O_2 -Katalyse bei der gleichen Temp. erhaltenen. Die Berührungsfläche zwischen Ni-Oxyd u. Ni ist daher auch die Red.-Geschwindigkeit ist bei der H_2 - O_2 -Katalyse viel größer als bei der Red. einer vollständig oxydierten Ni-Fläche durch H_2 allein. Wie auch aus den Verss. von BONE u. WHEELER (Philos. Transact. Roy. Soc. London 206. A. 1 [1906]) folgt, spielt bei der Katalyse nicht die Aktivierung des H_2 eine herrschende Rolle, sondern die des O_2 . Aus diesen Ergebnissen folgt, daß die Hypothese der successiven Oxydation u. Red. des Katalysators der katalyt. B. des W. vollkommen gerecht wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 632—40. Virginia [Cal.], Univ.)

JOSEPHY.

Wilbur A. Lazier und Homer Adkins, *Adsorption von Äthylen und Wasserstoff durch Zinkoxyd, Eisenoxyd, Nickel und Kupfer*. Der zur Unters. benutzte App. war nach dem von PEASE (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1239; C. 1925. II. 707) beschriebenen. Er bestand aus einem Glasrohr von 1—3 cm Weite u. 6—10 cm Länge, welches der Katalysator eingefüllt wurde; das Rohr war elektr. heizbar u. durch eine Glascapillare mit einem Manometer verbunden, hieran anschließend befand sich eine Gasbürette u. ein Gasvorratsgefäß. Der gesamte App. konnte evakuiert werden. Als zu den Verss. dienende Äthylen u. der Wasserstoff waren von größtmöglicher Reinheit. Als Absorbentien dienten Kupferoxyd (aus Nitrat hergestellt), Kupferoxyd (MERC), Eisenoxyd (gefällt), Nickeloxyd (Ni_2O_3), Zinkoxyd (aus Hydroxyd

hergestellt), Zinkoxyd (aus Zink-i-propyloxyd). Diese Oxyde wurden durch vorsichtig Erhitzen im Wasserstoffstrom zu den betreffenden Metallen reduziert. Das Nickoxyd wurde auch noch durch Alkohol reduziert. Aus einer Tafel sind die Mengen (absorbierten Gase zu ersehen. Das granuliertes Kupfer absorbierte beide Gase besser als das aus Kupfernitrat hergestellte, ebenso das mit A. reduzierte Nickel war wirksamer als das mit Wasserstoff reduzierte. Das Zink aus Zink-i-propyloxyd wirkte besser als das aus Hydroxyd hergestellte. Während schon bei dem Zink die Absorption des Wasserstoffes um ein wesentliches hinter der Äthylenabsorption zurückblieb, war von dem Eisen kein Wasserstoff mehr absorbiert. Die Möglichkeiten, die für die Erklärung des so abweichenden Verh. in Frage kommen, werden diskutiert. Der sehr große Unterschied in der Absorptionsfähigkeit der beiden Nickelsorten wird nur in einer gleichzeitigen Anwesenheit von akt. Kohle erklärt. (Journ. Physical Chem. 30, 353—58. Madison, Wisc.)

HAASE.

N. Zelinsky, *Die Dehydrogenisationskatalyse als Untersuchungsmethode der Naphtalene*. Deckt sich mit der Abhandlung in Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1718; C. 1923. III. 435. (Bull. Acad. St. Petersbourg [6] 1923. 183—90. Moskau, Univ.) BIKERMAN.

N. Zelinsky und **G. Pawlow**, *Die Kinetik der Dehydrogenisationskatalyse*. (Bull. Acad. St. Petersbourg [6] 1923. 191—202. — C. 1923. III. 181.) BIKERMAN.

N. Zelinsky, *Über Dekahydronaphthalin und sein Verhalten gegenüber der Dehydrogenisationskatalyse*. (Bull. Acad. St. Petersbourg [6] 1923. 203—04. — C. 1923. III. 435.) BIKERMAN.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

Raymond T. Birge, *Die Struktur der Moleküle*. (Vgl. S. 2651.) Auf Grund der Daten über Elektronenenergieniveaus der zweiatomigen Moll. CO, CO⁺, N₂, N₂⁺, NO, CN u. BO kommt Vf. nach allgemeinen Betrachtungen zu folgender Verallgemeinerung: die zu den Valenzelektronen von Moll. gehörigen Energieniveaus stimmen in allen wesentlichen Punkten mit den zu den Valenzelektronen von Atomen gehörigen Energieniveaus überein. Dann muß auch die Elektronenstruktur eines Moll. im wesentlichen mit der des „entsprechenden“ Atoms übereinstimmen, was auch mit den Bandenspektren im Einklang steht. Die Gesamtarbeit, die nötig ist, bei der Valenzelektronen aus dem CO- oder N₂-Mol. zu entfernen, ist innerhalb weiter Fehlergrenzen gleich der Arbeit, die nötig ist, beide Elektronen aus dem Mg-Atom zu entfernen; aber die Arbeit, die zur Entfernung des 1. (folglich auch des 2.) Elektrons aus dem Mol. nötig ist, ist von der für das Atom verschieden. (Nature 117. 300—01. Univ. of Cal.)

JOSEPHY.

C. H. Johansson und **J. O. Linde**, *Röntgenographische Bestimmung der Atomanordnung in den Mischkrystallreihen Au-Cu und Pd-Cu*. (Vgl. Ann. der Physik [4] 76. 445; C. 1925. II. 446.) Vff. untersuchen nach dem Debye-Scherrer-Verf. die Verbl. Cu₃Au, CuAu u. PdCu. Cu₃Au besitzt ein reguläres Gitter, bei welchem die Eckpunkte des Würfels von Au-Atomen, die Flächenmitten von Cu-Atomen besetzt sind. CuAu bildet ein tetragonales, flächenzentriertes Gitter mit dem Achsenverhältnis $a:c = 1,028$ bis $1,07$. Die Eckpunkte u. Basisflächenmitten sind mit Cu, die Seitenflächenmitten mit Au-Atomen besetzt. Mit langem Tempern dieser Legierung, welche ein Einordnen der Atome im Raumgitter fördert, nimmt das Achsenverhältnis zu. Bei idealer s. Einordnung der Atome wird es nach der Berechnung aus den Atomradien $1,133$ betragen. PdCu bildet ein reguläres Gitter, dessen Endpunkte von Cu u. dessen Raummitte von Pd-Atomen besetzt sind (Gitter vom CsCl-Typ). Diese Verbl. sind durch eine Anzahl von besonderen Maxima gegenüber von Legierungen dieser beiden Reihen in anderem Mischungsverhältnis ausgezeichnet, deren Eingehen in den Strukturfaktor für die angenommenen Atomanordnungen spricht. Andere Legierungen dieser beiden Systeme, welche außerhalb der Spitzengebiete des Zustands

agramms liegen, zeigen im Röntgenbild gegenüber den reinen Komponenten keine Extramaxima, so daß man hier auf statist. Atomverteilung der Mischkrystalle schließen kann. Auch Mischkrystalle in einfachem Mengenverhältnis, wie 75% Au + 25% Cu, zeigen trotz intensiver Wärmebehandlung keine Andeutung einer s. Atomverteilung. Durch diese Verss. ist bewiesen, daß die Erhöhung der elektr. Leitfähigkeit bei Legierungen mit einer Ordnung der Atome im Gitter zusammenfällt. Der Gittertypus ändert aber dabei nicht geändert zu werden, wie z. B. bei Cu₃Au. (Ann. der Physik [78. 439—60. 1925. Stockholm.)

BECKER.

I. Nitta, *Die Krystallstruktur des Jodoforms*. Nach dem Laue- und dem Spektroterverf. wird die Krystallstruktur des CHJ₃ untersucht u. festgestellt, daß eine niedrigere Symmetrie vorliegt als kristallograph. bestimmt ist. CHJ₃ ist hexagonal pyramidal u. gehört der Raumgruppe C₆^h an. Das Elementarparallelepiped enthält 6 Moll. u. besitzt die Abmessungen $a = 6,87$, $c = 7,61$ Å. $D_{\text{ber.}} = 4,19$. Die Koordinaten der 6 J-Atome sind: $(x, y, 0)$, $(y - x, -x, 0)$, $(-y, x - y, 0)$, $(-x, -y, \frac{1}{2})$, $(-y, x, \frac{1}{2})$, $(y, y - x, \frac{1}{2})$. Parameter $x = 0,352$, $y = 0,047$. Mit einem H-Atom C-Atom bildet ein CHJ₃-Mol. eine trigonale Pyramide von der Symmetrie C₃. (Scient. Papers Inst. Phys. Chem. Res. 4. 49—58.)

BECKER.

W. G. Burgers, *Eine Röntgenstrahlenuntersuchung des i-Erythrits*. Der tetrahedral bipyramidale inakt. Erythrit CH₂OH·CHOH·CHOH·CH₂OH gehört der Raumgruppe C_{4h}⁵ an. Das Elementarparallelepiped ist raumzentriert u. enthält 8 Moll. Die Kanten sind $a = 12,76$, $c = 6,83$ Å. Das Einzelmolekül muß eine zweizählige Symmetrie besitzen, entweder ein Symmetriezentrum oder eine zweizählige Symmetriehse. (Philos. Magazine [7] 1. 289—303.)

BECKER.

Kathleen Yardley, *Drei Beispiele zur Darstellung der Röntgenmethode als Erzeugung und Berichtigung kristallographischer Daten*. (Vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A. 108. 542; C. 1925. II. 1252.) *Saures K-Salz der Chlormaleinsäure* ist rhomb. pyramidal u. gehört der Raumgruppe Q_h¹⁶ an. $a = 7,62$, $b = 15,74$, $c = 10,95$ Å. Das Elementarparallelepiped enthält 8 as. Moll. *Di-NH₄-Salz der Chlorfumarsäure* ist monoklin prismat. u. gehört der Raumgruppe C₂² an. $a = 9,30$, $b = 6,70$, $c = 6,73$ Å., $\beta = 108^\circ 25'$. Das Elementarparallelepiped enthält 2 Moll. *Saures NH₄-Salz der Fumarsäure* kristallisiert triklin pinakoidal u. besitzt die Raumgruppe C_i¹. $a = 7,00$, $b = 7,44$, $c = 6,56$ Å., $\alpha = 107^\circ 1'$, $\beta = 117^\circ 58'$, $\gamma = 69^\circ 16'$. Das Elementarparallelepiped enthält 2 Moll. In allen diesen drei Fällen wurden die goniometr. gemessenen Achsenverhältnisse berichtigt. (Philos. Magazine [6] 50. 864—78. 1925.)

BE.

Pierre Bricout, *Erzeugung des ultravioletten Lichtes durch Anprall der langsamen Elektronen auf die Oberfläche eines Metalls*. In einem evakuierten Quarzrohr wird ein mit Erdalkalien bedeckter Pt-Draht angespannt; in einer den Draht einschließenden Ebene wird nahe vom Draht ein Pt-Blech befestigt, das also von den Ausstrahlungen des Drahtes nicht getroffen wird; coaxial um den Draht in größerer Entfernung befindet sich ein Mo-Zylinder; das Rohr wird von einer durch Strom durchflossenen Spule umsponnen. Bei Stromerhitzung des Drahtes sendet er Elektronen aus, die durch das elektr. Feld des aufgeladenen Mo-Zylinders u. das magnet. Feld der Spule auf das Pt-Blech gerichtet werden. Die daselbst erzeugten ultravioletten Strahlen werden durch einen Spalt im Zylinder u. eine außerhalb des Rohres befindliche Flußlinse u. werden in einem Spektrographen aufgenommen. Vf. beobachtete Strahlung zwischen 2100—2300 Å, wenn das Pt-Blech auf +6 V relativ zum Draht geladen wurde. Ein Elektronenstrom von der Stärke 1 Milliampère pro 10 qmm bekam. Diese Strahlung rührt nicht von Gasspuren im Rohr her. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 13—15.)

BIKERMAN.

A. Dauvillier, *Untersuchungen über die elektrische Entladung in Gasen und die Vorgänge, die sie begleiten*. Die nach Vf.s Theorie (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1 [1925]) bestehende Verschiedenheit der Gasdrucke im Entladungsrohr sollte nun

experimentell bestätigt werden. Man ließ senkrecht zur Entladungsrichtung ein enges Bündel Röntgenstrahlen passieren u. bestimmte die von den Strahlen erlittene Absorption, die der Gasdichte proportional ist, wenn sie verschiedene Entladungsbereiche durchdrang. Eine unzweideutige Anhäufung der positiven Ionen wurde nur am kathod. Rand der negativen Lichtsäule in einer ca. 0,5 mm dicken Schicht beobachtet. — Es wurde die durchdringende Strahlung des Rohres untersucht. Die positive Lichtsäule emittiert die Schumannstrahlen, deren Intensität von der Spannung unabhängig u. der Stromstärke proportional ist. Die positive Lichtsäule sendet bei höherem Druck Schumann-, bei geringerem Röntgenstrahlen aus. Die Wellenlänge der Strahlung aus dem Crookeschen Dunkelraum nimmt von der Kathode zur negativen Lichtsäule ab; die Intensität der Strahlung nimmt beim Übergang in die negative Säule sprunghaft zu. — Im Spektrum der weichen Röntgenstrahlen, die von der Röhre emittiert werden, treten die Linien der Antikathoden auf (Kohle, Wo). Die charakteristischen Linien verschwinden aber (Wo-Antikathode), wenn der Gasdruck 1 Barye erreicht, wohl wegen der Gasadsorption an der Antikathode. (C. r. d. l'Acad. des sciences 18. 575—77.)

BIKERMAN.

A. M. Tyndall und G. C. Grindley, *Die Ionenbeweglichkeit in Luft. I. Negative Ionen in feuchter Luft*. Die Methode der Unters. beruht auf der Herst. von Ionen durch α -Strahlen u. der Unterwerfung dieser Ionen einem veränderlichen elektr. Feld besonderer Art. Für die Ionenbeweglichkeit in trockener Luft wird der Wert 2,15 cm/sec/Volt/cm, u. zwar in Feldern von 50—100 Volt/cm angegeben. Mit steigender Feuchtigkeit nimmt der Wert ab, um bei mit W. gesätt. Luft 1,60 zu erreichen. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 110. 341—58. Bristol, Univ.)

HAASE.

A. M. Tyndall und G. C. Grindley, *Die Ionenbeweglichkeit in Luft. II. Positive Ionen von kurzer Lebensdauer*. (I. vgl. vorst. Ref.) Zum Zwecke der Messung der Beweglichkeit kurzlebiger Ionen in trockener u. in feuchter Luft wurde der in den früheren Mitt. mitgeteilte Weg eingeschlagen u. derselbe App. benutzt. Es zeigte sich, daß es zwei Arten von positiven Ionen in Luft gibt, nämlich solche, die die Vff. mit Ionen im Anfangszustand u. Ionen im Endzustand bezeichnen. Die erstere Art ist in bezug auf ihre Beweglichkeit in keiner Weise von den negativen Ionen zu unterscheiden; sie wird auch gleich jenen von der Feuchtigkeit der Luft in derselben Weise beeinflusst. Die Vff. finden jedoch einen retardierenden Einfluß des W.-Dampfes auf die Umwandlungsgeschwindigkeit der Ionen der einen Art in Ionen der anderen. Diese Umwandlung vollzieht sich in trockener Luft innerhalb 0,007 sec., während in feuchter Luft eine doppelt so lange Zeit benötigt wird. Theoret. Deutungen der Verss. geben die Vff. nicht. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 110. 358—64. Bristol, Univ.)

HAASE.

Arnaldo Piutti, *Über Beziehungen zwischen Radioaktivität und Dichte, Gehalt an Helium und Hafnium in einigen Zirkonen*. Vff. untersucht eine große Reihe von Zirkonen verschiedener Herkunft auf ihre Radioaktivität, Hafnium- u. Heliumgehalt u. ihre D. Daraus geht hervor, daß keine Beziehung zwischen Hafniumgehalt u. I. besteht, daß aber eine gewisse Beziehung zwischen dem Hafniumgehalt u. der Radioaktivität der Mineralien zu erkennen ist. (Rendiconto Accad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 31. 72—73. 1925.)

GOTTFRIED.

Theodore W. Richards und Lawrence P. Hall, *Das Atomgewicht von Uranblei und das Alter eines besonders alten Uraninits*. Das At.-Gew. eines Uranbleis aus einer Uraninit aus den Black Hills, South Dakota, wurde zu 206,07 gefunden. Wegen eines Th.-Gehalts des Uraninits von 2,15% ist eine Korrektur von 0,05 anzubringen, so daß das At.-Gew. des reinen Uranbleis 206,02 ist. Das Pb wurde in PbCl₂ übergeführt, für besondere Reinheit wurde gesorgt, u. eine Lsg. von reinem Ag zugegeben u. der Endpunkt nephelometr. bestimmt. — Da das Verhältnis Pb:U im Uraninit 0,23 beträgt, wurde unter der Voraussetzung, daß alles Pb aus dem U stammt, das Alter des

erals zu mindestens 1500000000 Jahren berechnet. Diese Zahl übertrifft die früheren Best. des Alters der Erdkruste. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 704—08. Cambridge Mass.], HARVARD Univ.) JOSEPHY.

Duc de Broglie, *Die Röntgenstrahlen und die Konstitution der Materie*. Kurze populäre Übersicht. (Bull. Soc. ind. Mulhouse **91**. 663—70. 1925.) BECKER.

O. W. Richardson und **F. C. Chalklin**, *Die Anregung weicher Röntgenstrahlen*. Es wurden zwischen 40 u. 600 Volt photoelektr. Röntgenstrahlen an *C*, *Ni*, *Fe* u. *W* ausgelöst u. für jedes dieser Elemente eine Anzahl charakterist. Punkte festgestellt, welche zum Teil auf Anregung der Eigenstrahlung, zum Teil auf Diskontinuitäten bei Anregung der Bremsstrahlung zurückzuführen sind. Die gesamte ausgelöste Röntgenstrahlung pro Elektronenstoß ist annähernd der Quadratwurzel der Ordnungszahl des emittierenden Elements proportional. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **10**. 247—82. London.) BECKER.

A. Joffé und **N. Dobronrawow**, *Beobachtungen über die Ausbreitung von Röntgenpulsen*. Es wurden durch schwache Photoströme Röntgenimpulse erzeugt, welche in Intervallen von 10^{-3} Sekunden einander folgen. Dann werden von einem Bildchen die Sekundärelektronen gemessen u. aus Energiebetrachtungen der Schluß gezogen, daß die Gesamtenergie eines Röntgenimpulses sich innerhalb eines Raumwinkels ausbreitet, der kleiner als 10^{-5} ist. (Ztschr. f. Physik **34**. 889—92. 1925. Petersburg, Physikal.-Techn. Röntgeninstitut.) BECKER.

Bergen Davis und **C. M. Slack**, *Bestimmung der Brechung von Röntgenstrahlen in einem Prisma mittels eines doppelten Röntgenspektrometers*. (Vgl. Physical Review **26**. 232; C. 1925. II. 1933.) Mittels eines Al-Prismas wird die Brechung von K_{α} -Strahlung, welche an zwei Kalkspatkrystallen reflektiert worden war, bestimmt. Der Wert $1 - \mu$ ergab sich in Übereinstimmung mit den nach der Lorentzen Dispersionsformel berechneten Werten für Mo-Strahlung zu $1,68 \cdot 10^{-6}$, für γ -Strahlung zu $8,4 \cdot 10^{-6}$. (Physical Review [2] **27**. 18—22. Columbia, Univ.) BECKER.

M. Siegbahn, *Die Reflexion und Brechung von Röntgenstrahlen*. Zusammenfassende Übersicht der diesbezüglichen Arbeiten des Vfs. (Journ. de Physique et Radium [6] **6**. 228—31. 1925. Upsala, Univ.) BECKER.

G. K. Rollefson und **E. J. Poth**, *Eine neue Methode, um weiche Röntgenstrahlen zu untersuchen*. Es werden die krit. Absorptionsgrenzen von jenen Elementen bestimmt, welche in der photograph. Emulsion vorkommen, wie *C*, *N*, *O*, *Ag*, *Br*. Die Untersuchung erstreckt sich über ein Intervall von 100—750 Volt. (Science **62**. 497—98. 1925. Univ. of California.) BECKER.

W. Bothe, *Der Streukoeffizient für harte Röntgenstrahlen*. (Vgl. Ztschr. f. Physik **63**. 639; C. 1925. II. 1584.) Es wird der Koeffizient der Comptonstreuung korrespondenzbig abgeleitet. (Ztschr. f. Physik **34**. 819—23. 1925. Charlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) BECKER.

F. K. Richtmyer, *Die Größe der K-Absorptionsunregelmäßigkeiten*. Es werden die Absorptionskoeffizienten von *Mo*, *Ag*, *Sn*, *W*, *Au* u. *Pb* beiderseits der K-Absorptionsgrenze dieser Metalle bestimmt u. das Resultat im Sinne der verschiedenen Theorien besprochen. Mit zunehmender Ordnungszahl nimmt das Verhältnis der Absorptionskoeffizienten beiderseits der K-Grenze ab. (Physical Review [2] **27**. 1—17. Cornell Univ.) BECKER.

Katherine Chamberlain, *Die Feinstruktur einiger Röntgenstrahlenabsorptionsgrenzen*. Vf. bestimmt die K-Absorptionsgrenzen von *Ti*, *V*, *Co*, *Mn*, die L_{III} -Grenze von *Sn*, *Sb*, *Te*, *J*, unter Verwendung folgender Verbind.: TiO_2 , Ti_2O_3 , V_2O_5 , $V_2(SO_4)_3$, Cr_2O_7 , K_2CrO_4 , Cr_2O_3 , $[Cr(NH_3)_6](NO_3)_3$, $CrCl_3$, $KMnO_4$, Mn_3O_4 , Mn -Acetat, $SnSO_4$, SnO_2 , $KSbO_3$, Sb_2O_3 , H_2TeO_4 , H_2TeO_3 , *Te*, HSO_4 , HSO_3 , *KJ*, *J*. Die gemessenen Bandkanten sind in gutem Einklang mit den früher von COSTER (Ztschr. f. Physik **25**. 83; C. 1924. II. 1437) bestimmten Werten. Bei den höherwertigen

Verbb. macht sich noch eine Feinstruktur der Bande bemerkbar, indem hier u. der Bandkante noch eine Linie auftritt. Diese rührt von dem aus der Verb. d. Einw. der Röntgenstrahlen reduzierten Element her. HJO_3 u. KMnO_4 werden reduziert, SO_2 oxydiert. Sulfide u. Sulfite werden teilweise zu Sulfaten oxydiert. Vom Standpunkt der Bohrschen Theorie wird die Möglichkeit einer Valenzänderung bei der Absorption von Röntgenstrahlen erörtert. (Physical Review [2] **26**. 525—1925. Univ. of Michigan.)

BECKE

Léon Bloch, Eugène Bloch und Georges Déjardin, *Über ein zweites Neonspektrum des Neons*. Bei Verss. in Quarzröhren, die mit reinem Neon verschiedener hohen Drucks gefüllt waren, gelang es den Vff., wie bei dem Ar, Kr, X Funkenspektrum höherer Ordnung aufzufinden. Dieses neue Neonspektrum sei nach Ansicht der Vff. dem Spektrum zweiter Ordnung des Neon III zuzuschreiben. Dieses Spektrum liegt wie das der anderen Edelgase vollständig im Ultraviolett, dessen stärkste Linien sich zwischen 3000 u. 2600 Å. befinden. In einer Tafel sind sämtlichen gefundenen Linien verzeichnet; die Meßgenauigkeit betrug 0,05 Å. (Compt. rend. l'Acad. des sciences **182**. 451—52.)

HAAS

Georges Déjardin, *Anregung des zweiten Neonspektrums durch Elektronen*. Vff. untersuchte die Anregungsbedingungen für das Neonspektrum zweiter Ordnung durch Elektronenstoß, wobei er sich folgender Versuchsanordnung bediente. Ein Rohr, welches reines Neon von sehr geringem Druck enthielt, wurden drei Elektroden eingeschmolzen, u. zwar ein W-Drahtnetz, ein Pt-Gitter u. eine Pt-Platte. Bei genügender Spannung ist in der Elektronenbahn ein Leuchten zu beobachten, das sich durch ein magnet. Feld verdichten läßt. Bei einem Druck von $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{100}$ mm Hg u. einer Spannung von 48—50 V konnten folgende Linien erhalten werden: 3727,09; 3713,07; 3709,66; 3694,19; 3664,05; 3334,89 Å. u. erst bei etwas höherem Druck u. einer Spannung von 52—53 V konnten noch weitere Linien aufgefunden werden: 3574,65; 3568,47; 3232,38 u. 3230,13. Bis zu 60 V nimmt die Intensität u. die Anzahl der Linien noch etwas zu. Im folgenden versucht der Vf. auf theoret. Wege Beziehungen zu finden zwischen der Anregungsenergie, die für die Anregung des zweiten Spektrums nötig ist, u. der Ionisationsenergie des betreffenden Atoms. Es scheint aus den angeführten Zahlen für die anderen Edelgase hervorzugehen, daß das Verhältnis dieser beiden Energien prakt. konstant ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 452—54.)

HAASE

Toshi Inoue, *Über die Absorptionsspektren von Salzlösungen einiger seltener Elemente*. Es wurden nach HARTLEY u. BALY die Absorptionsspektren wss. Lösungen von LaCl_3 , CeCl_3 , PrCl_3 , NdCl_3 , SmCl_3 u. ErCl_3 gemessen. Im sichtbaren Gebiet stimmen die Beobachtungen mit denen früherer Forscher überein, im ultravioletten Gebiet fand Vf. in CeCl_3 - (3350 u. 2469 Å), SmCl_3 - (2600 Å) u. ErCl_3 -Lsgg. (2470 Å) Absorptionsmaxima bei den in Klammern angegebenen Wellenlängen. Die Absorption der Chloride von La, Pr u. Nd ist im Ultraviolett stetig. Das Spektrum wird durch Ggw. von Salzen anderer seltener Erden nicht beeinflußt, weshalb eine spektroskop. Analyse der Gemische seltener Erden möglich ist. Das ultraviolette Spektrum ist geeigneter als das sichtbare. Man kann spektroskop. Ce-Salz in fünffacher Menge von Sm- oder Nd-Salz oder in hundertfacher Menge von La- oder Nd-Salz nachweisen, u. nach dem Beerschen Gesetz quantitativ bestimmen. (Bull. chem. Soc. of Japan **9**—13. Tokyo, Univ.)

BIKERMAN

Wilfred Taylor, *Die Photoaktivierung des Chlors*. (Proc. Univ. Durham **67**—71. 1925. — C. **1925**. II. 1010.)

KRÜGER

H. Austin Taylor, *Die Zersetzung von Stickstoffpentoxyd und infrarote Strahlung*. DANIELS u. JOHNSTON (Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 53; C. **1921**. III. 89) haben gefunden, daß das krit. Inkrement der Zers. von N_2O_5 24700 cal beträgt, was einer Wellenlänge von $1,16 \mu$ im Infraroten entspricht. Da indessen Strahlung dieser Wellenlänge

ge keine Zers. bewirkt, nahm Vf. an, daß vielleicht durch Absorption von 3 oder Quanten bei entsprechend niederen Frequenzen, bei $3,39\mu$ oder $5,81\mu$, wo N_2O_5 rke Absorptionsbanden besitzt, Zers. eintreten wird, u. untersuchte die Rk. bei Ggw. infraroter Strahlung zwischen $2\text{ u. }8\mu$. Dieses Spektralgebiet wurde aus einem Kohle- gen durch ein Biotitblättchen von $0,12\text{ mm}$ Dicke erhalten, das, um auch das blaue ht abzublenden, mit p-Nitrosodimethylanilin bedeckt war. Die Temp. des Rk.- fäßes betrug $20\text{--}30^\circ$. Durch die infrarote Strahlung erfuhr die Rk.-Geschwindigkeit um eine Beschleunigung, während indessen nach der Strahlungstheorie die Zers. 1 Sek. hätte vollständig sein müssen. — Die Anwendung der Strahlungshypothese monomolekularen Rkk. wird diskutiert, wobei Vf. die Beobachtung mitteilt, daß einem Gemisch von H_2 u. C_2H_4 bei Bestrahlung mit dem vollen Spektrum einer rnstlampe nach 48 Stdn. bei 300° nur eine leichte Zers. des C_2H_4 eintritt, aber kein I_2 gebildet wird. Vf. neigt dazu, eine monomolekulare Zers. so zu deuten, daß er lich wie TOLMAN mit höherer Temp. eine so große Vibration der Atome im Mol. nimmt, daß die Bindung aufhört u. so Zers. eintritt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 7—82. New York [N. Y.], Univ.)

JOSEPHY.

Farrington Daniels, *Die photochemische Inaktivität von infraroter Strahlung: besonderer Berücksichtigung der Zersetzung von Stickstoffpentoxyd*. (Vgl. DANIELS JOHNSTON, Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 55. 72; C. **1921**. III. 89.) Da Strahlung $1,16\mu$, welche dem krit. Inkrement der Zers. von N_2O_5 entspricht, photochem. akt. gegen die Rk. ist, u. da die Multipla dieser Wellenlänge, $3,4\text{ u. }5,8\mu$ vom N_2O_5 rk absorbiert werden, wurde untersucht, ob vielleicht diese Wellenlängen sich photochem. akt. bei der Rk. verhalten. Ein Gemisch von N_2 u. N_2O_5 , der Partialdruck des O_5 betrug 51 mm (Krystalle bei 0°), wurde in einem dünnen Quarzgefäß mit einer m entfernten Nernstlampe bestrahlt. Zers. durch blaues Licht wurde durch Niedrig- ten der Konz. von NO_2 verhindert, welches ein Photokatalysator für dieses Licht Die Zers. wurde mit Hilfe von Titrationsmethoden (l. c.) bestimmt. Die absorbierte ahlungsenergie wurde durch calorimetr. Messung der eingestrahnten Gesamtenergie, st. der Verteilung der Energie aus dem Nernststift u. Best. des Absorptionsspektrums N_2O_5 gemessen. — Die infrarote Strahlung verursachte keine photochem. Zers., ndestens $99,5\%$ der wirklich absorbierten Strahlung erwiesen sich als chem. inaktiv. ie etwas erhöhte Zers. bei Zimmertemp. beruht auf therm. Einfluß, denn der Effekt schwand bei 0° , wo die therm. Zers. zu vernachlässigen ist. — Infrarote Strahlung ries sich auch inakt. bei der Zers. von CO_2 , bei der Zers. von HCl -Gas u. bei der ydation von A.-Dämpfen. — Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß die Ver- eibung von Atomen im Mol., die nach den gegenwärtigen Theorien bei infraroter sorption auftritt, im Mechanismus fundamental verschieden ist von der bei ultra- letter Absorption eintretenden Verschiebung der Elektronen, u. daß Atome im Mol. ch Verschiebung von Elektronen gel. werden können, aber nicht durch direkte rschiebung der Atome. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 607—15. Madison [Wisc.], iv.)

JOSEPHY.

J. Plotnikow, *Über die Photo-Oxydation der organischen Verbindungen durch Chromatsalze*. (Vgl. Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **19**. C. **1919**. III. 999.) Bei Photooxydationen organ. Verb. durch Chromate u. Di- omate verhinderten die sich bildenden unl. Zerfallsprod. der Chromate das Ein- engen akt. Lichts in das Reaktionsgemisch in solchem Maße, daß die Ausbeute an ydationsprod. stark verringert wurde. Durch Änderung der Apparatur wurde ser Fehler korrigiert. Bei der Prüfung einer Anzahl von Farbstoffen auf ihre Licht- pfindlichkeit in Ggw. von Dichromat ergab sich, daß sehr viele Farbstoffe, mit einer s. Dichromatlg. gemischt u. mit einer 35 Amp. Kohlenbogenlampe stark belichtet ne Veränderung erleiden. Äthylgrün, Cyanin, Naphthylenblau verändern sich im hte u. Dunkeln, besonders beim Kochen sehr rasch. Wasserblau bleicht im Lichte

aus. *Nilblau* u. *Kresylblau* 2BS. sind im Dunkeln auch beim Kochen beständig. Lichte verwandeln sie sich in rote fluoreszierende Farbstoffe. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 13—15. Zagreb, Techn. Hochschule.) KAHN

Miroslav Schwarz, *Über die photochemische Oxydation von Methyl- und Äthylalkohol durch Kaliumdichromat*. (Vgl. vorst. Ref.) Es wurde die Oxydation von *Methyl- u. Äthylalkohol* durch *Kaliumdichromat* im Sonnenlicht untersucht. Bei beiden R ging die Oxydation nur bis zum *Aldehyd* vor sich. Nebenprodd. wurden nicht gebildet. Der *Aldehyd* wurde von der *Dichromatlsg.* durch Dest. in besonderem App. getrennt (Abbildung). Der gebildete *Aldehyd* wurde nach der Methode von TIEMANN (B Dtsch. Chem. Ges. **31**. 3315 [1899]. Monatshefte f. Chemie **26**. 1548) bestimmt. 1 *Aldehydausbeute* wächst mit der *Belichtungszeit* fast auf das Doppelte an, bei *Methylalkohol* sprungweise, bei *Äthylalkohol* allmählich. Bei stärkeren *Dichromatkonz.* nimmt die *Ausbeute* ab. Bei *Methylalkohol* zerfällt das *Dichromat* bis $\text{Cr}(\text{OH})_3$, *Äthylalkohol* bildet sich ein braunes Pulver unbekannter Zus. Die *Reaktionsgeschwindigkeit* im *Methylalkohol* ist größer als im *Äthylalkohol*, besonders bei größerer *Konz.* von *Dichromat*. Die *Resultate* der *Messungen* der *Konz.-Änderung* des *Dichromats* u. des gebildeten *Aldehyds* sind in 8 Tabellen u. einem Kurvenschema wiedergegeben. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 15—17. Zagreb, Techn. Hochschule.) KAHN

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

A. Hollard, *Elektrolyse wässriger Salzsäurelösungen*. Bei der *Elektrolyse* r Pt-Elektroden wird O_2 neben Cl_2 nur bei Spannungen über 3,6 Volt entwickelt. 1 O_2 -Entw. ist um so stärker, je geringer die $[\text{HCl}]$ ist. In keinem Falle wird HOCl gebildet. Unterhalb 1,10 V wird weder O_2 noch Cl_2 entwickelt, sondern nur die $[\text{H}^+]$ an Anode u. Kathode verändert. Zwischen 1,10 u. 3,6 V entsteht nur Cl_2 . Bei 8,2 V wurden in $3\frac{1}{2}$ Std. 1,278 g Cl_2 (entsprechend 81% Ausbeute) u. 2,5 ccm O_2 gebildet. O_2 entsteht dabei aus den OH^- des W. Durch die große anod. $[\text{Cl}^-]$ wird das Gleichgewicht $[\text{H}^+]\cdot[\text{OH}^-] = K\cdot[\text{H}_2\text{O}]$ gestört, so daß dauernd OH^- aus dem nicht dissoziierten W. nachgebildet werden. — An Hg- u. Ag-Anoden wird Cl_2 u. O_2 nur dann entwickelt, wenn die Anodenoberflächen sehr klein sind u. sich infolgedessen r einer dichten Schicht von Chlorid u. Oxyd bedecken, die jeden weiteren Angriff d. Metalle verhindert. (Journ. de Physique et le Radium [6] **7**. 25—32. Paris, Ecole de Physique et de Chimie.) R. SCHMIDT.

J. T. Burt-Gerrans, *Die Elektrolyse saurer Kupfersulfatlösungen*. II. *Gleichstrom*. Vf. setzte die Verss. von REDMAN (S. 1511) mit fast der gleichen App., den gleichen Meßmethoden u. Untersuchungsbedingungen wie Vorsichtsmaßregeln fort. 1 *Elektrolysen* wurden bei 18° u. mit Lsgg. von CuSO_4 in maximalleitender H_2SO_4 d. h. etwa 7,6-n., ausgeführt. Die in gleicher Weise, wie bei REDMAN, ausgeführten Bestst. der Diffusionskonstanten k ergaben einen von der CuSO_4 -Konz. unabhängigen Wert von $k = (4,00 \pm 0,07) \cdot 10^{-6}$. Zum Experimentellen ist noch hinzuzufügen, daß bei der *Elektrolyse* drei Elektroden angewandt wurden, um ein möglichst gleichmäßiges Feld zu erzielen, von denen jedoch nur die mittelste Elektrode mit dem Oszillographen verbunden wurde. (Journ. Physical Chem. **30**. 396—413. Toronto Univ., Electrochem. Lab.) HAASE.

Warren P. Baxter, *Die interionische Anziehungstheorie ionisierter Lösungen*. V. *Prüfung der Theorie durch Löslichkeitsversuche bei höheren Temperaturen*. (IV. v. DEBYE u. PAULING, Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 2129; C. 1925. II. 2197.) Es wird die *Löslichkeit* von *Silberjodat* bei 75° in reinem W. u. in Ggw. von KClO_4 , KNO_3 , K_2SO_4 , MgSO_4 u. BaNO_3 , deren Konz. von 0,0002 bis 0,1 Mol pro 1000 g W. variiert wurden. In 1000 g reinem W. lösen sich 0,000840 Mol AgJO_3 . Bis zu einer Ionenstärke von 0,01 Mol auf 1 l W. bestätigen die Ergebnisse das Grenzgesetz von DEBYE u. HÜCKEL fast vollständig u. verifizieren die interion. Anziehungstheorie bei sehr kleinen Konz.

ht nur die funktionale Beziehung zwischen Aktivitätskoeffizienten u. Konz. erweist h als genau, sondern auch der numer. Koeffizient der Gleichung ist gleich dem theoret. i höheren Konz. treten auch hier die üblichen Abweichungen auf, es ergeben sich große mittlere Aktivitätskoeffizienten, die Abweichungen vom theoret. Wert 0,701 einer Ionenstärke von 0,08 Mol betragen bei Ggw. von KClO_4 8,7%, von KNO_3 0%, von K_2SO_4 —0,3% u. bei Ggw. von MgSO_4 6,0%. Auch der Einfluß der Temp. der nach der Theorie zu erwartende. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 615—21. Pasadena [Cal.], Inst. of Technology.)

JOSEPHY.

Elliot Q. Adams, *Das elektrostatische Virial starker Elektrolyte*. (Vgl. NOYES, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 1080. 1098; C. **1924**. II. 2001. 2002.) Da die gebräuchlichen Methoden zur Messung der DE. von W. Messungen der elektr. Arbeit einschließen, durch Entladen eines mit W. gefüllten elektr. Kondensators erhalten wird, so müßte h Vf. ein Virialausdruck für die Energie starker Elektrolyte in wss. Lsgg., der aus DE. des W. κ abgeleitet wird, mit ΔF (freie Energie bei konstantem Druck) u. ht wie in verschiedenen Arbeiten geschehen mit ΔU (innere Gesamtenergie) berechnet werden. Diese beiden thermodynam. Funktionen sind nur dann gleich, wenn DE. von der Temp. unabhängig ist, im allgemeinen müssen die Ausdrücke für ΔU ebenso für ΔH mit dem Faktor $(1 + d \ln \kappa / d \ln T)$ multipliziert werden. Für W. rägt dieser Faktor zwischen 10 u. 100° —0,5. Es wird wahrscheinlich gemacht, n auch nicht bewiesen, daß bei der Methode von MILNER (Philos. Magazine [6] **23**. . **25**. 742; C. **1912**. I. 1954. **1913**. II. 205) bei der Berechnung des Virials sich weder ΔU noch ΔF , sondern ΔA (Arbeitsinhalt = HELMHOLTZ' freie Energie) ergibt. $\Delta A = 2/3 \Delta F$. Damit würde auch die Beobachtung von NOYES (l. c.) übereinstimmen, ß das Virial von MILNER nur $2/3$ des nach DEBYE u. HÜCKEL zu erwartenden beträgt. Der osmot. Druck kann aus ΔA u. somit auch aus ΔF ohne Kenntnis des Temp.-koeffizienten der DE. des W. berechnet werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. —26. Cleveland [O.], Nela Research Labor.)

JOSEPHY.

Walter W. Lucasse, *Die Aktivitätskoeffizienten von Chlorwasserstoffsäure in cerin-Wasser-Gemischen*. Die EKK. von Ketten vom Typus $\text{H}_2 | \text{HCl} (m) | \text{AgCl} | \text{Ag}$ den bei 25° gemessen. Als Lösungsm. dienten 1 u. 5 Mol-% Glycerin. Die Säurekonz. wurde zwischen 0,001-mol. u. 4-mol. variiert. Die Aktivitätskoeffizienten von l wurden nach der Methode von HÜCKEL (Physikal. Ztschr. **26**. 93; C. **1925**. I. 1684), Extrapolation auf die Nullkonz. zuläßt, berechnet. Die Werte sind tabellar. aneben. Die Übereinstimmung zwischen beobachteten u. berechneten Werten ist schen 0,01- u. 1-mol. gut u. zwar etwas besser in 1 Mol-%ig. Glycerinlsgg. als in 10 Mol-%ig. Bei großen Verdünnungen treten Abweichungen vom theoret. Wert auf. 0,002-mol. in 1 Mol-%ig. Glycerin u. unter 0,005-mol. in 5 Mol-%ig. Glycerin te nicht mehr auf die Nullkonz. extrapoliert werden. Bei höheren Konz. fallen beobachteten Werte größer aus als die berechneten. Diese Abweichungen werden a Vf. nicht auf eine Rk. zwischen Säure u. Lösungsm. zurückgeführt, sondern auf Unsicherheit der Werte für die DE. oder auf Ursachen, die bei der Berechnung er acht gelassen sind. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 626—31. Philadelphia [Penns.], iv.)

JOSEPHY.

W. H. Rodebush, *Die aus Gefrierpunktsdaten berechneten Aktivitätskoeffizienten der Typen von Elektrolyten*. Aus den von HOVORKA u. RODEBUSH (Journ. Americ. m. Soc. **47**. 614; C. **1925**. II. 898) gefundenen Gefrierpunktsdaten berechnet Vf. Aktivitätskoeffizienten für 0,001-, 0,005- u. 0,01-mol. Lsgg. für KCl zu 0,966; 0,928; 0,92; CsNO_3 0,966; 0,928; 0,902; K_2SO_4 0,889; 0,781; 0,715; $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 0,889; 0,778; 0,70; MgSO_4 0,765; 0,572; 0,471; CuSO_4 0,762; 0,560; 0,444; $\text{La}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,477; 0,232; 0,10. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 709. Urbana [Ill.].)

JOSEPHY.

G. Tammann und **G. Veszi**, *Die elektrische Leitfähigkeit von Salzen in Ein- und Mehrkristallen und Krystallitenkonglomeraten*. Vff. messen die Leitfähigkeit von NaNO_3 ,

NaCl, NaBr, KCl u. KCl-KBr mit 5,3 Gew. % KBr. Die untersuchten Salze la teils als Einkrystall, teils als Krystallitenkonglomerat (Pastille) vor. Gemessen w die Leitfähigkeit bei fallender Temp.; die Anfangstemp. lag dicht unter dem Schm punkt des betreffenden Salzes. Die Messungen wurden mit Wechselstrom nach Kohrauschschen Brückenmethode ausgeführt. Die so gefundenen Werte wurden den Werten aus Messungen anderer Beobachter verglichen. Bzgl. der Gründe für Differenz zwischen dem Leitvermögen des Einkrystalls u. des Konglomerats (die fähigkeit des Konglomerates ist größer als die des Einkrystalls) schließen sich der Ansicht von V. HEVESY an, der den Unterschied in der Leitfähigkeit dahin deu daß auf der Oberfläche der Krystallite eines Konglomerates die Zonen lockerer bunden sind u. daher hier ein Platzwechsel häufiger eintreten kann. Ferner könn auf den Unterschied des Leitvermögens noch von Einfluß sein 1. die Verschieden der Orientierung des Einkrystalles gegenüber der der Krystallite im Konglome u. 2. die verschiedene Verteilung von Beimengungen im Einkrystall u. im Kong merat. Zum Schluß berichten Vff. noch kurz über den Einfluß geringer Mengen ni mischkristallbildender Zusätze auf die Leitfähigkeit von Krystallitenkonglomerat (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **150**. 355—80. Göttingen, Univ.) GOTTFRIED

Heinrich Goldschmidt und Harald Aarflot, *Leitfähigkeitsmessungen in Gemis von Methyl- und Äthylalkohol*. (Vgl. S. 315.) Es wurde experimentell untersuc ob u. in welcher Weise der Zusatz von Methylalkohol zu äthylalkohol. Lsgg. von Sä u. Salzen auf die Leitfähigkeit dieser einwirkt. Bei geringen CH₃OH-Zusätzen einer äthylalkohol. Lsg. von HCl wird die Leitfähigkeit wenig geändert; erst Konzz. von über 0,5-n. Methylalkohol steigt die Leitfähigkeit mit der zugesetz Menge CH₃OH. Beim NaBr erhöht CH₃OH-Zusatz die Leitfähigkeit. Bei meth alkohol. Lsgg. von HCl u. NaBr wirkt Zusatz von C₂H₅OH auf die Leitfähigkeit niedrigend ein. Im Gegensatz zu den Fällen, bei denen zu alkohol. Lsgg. von Sä u. Salzen W. zugesetzt wird u. Säure u. Salze ganz verschieden beeinflußt werd verschwindet bei einer Mischung zweier Alkohole der Unterschied zwischen d Verhalten von Säure u. Salz. Die Leitfähigkeitszunahme der HCl in äthylalk Lsg. mit CH₃OH-Zusätzen u. die Abnahme der Leitfähigkeit in CH₃OH mit C₂H₅O Zusätzen ist proportional der Zunahme bezw. Abnahme der Leitfähigkeit der e sprechenden NaBr-Lsgg. (Ztschr. f. physik. Ch. **119**. 1—7. Oslo, Chem. Univ sitätslab.) HANTKE

Millicent Taylor, *Die Überführungszahlen von Natrium und Wasserstoff gemischter Chloridlösung*. Vf. mißt die Überführungszahlen von Na⁺ u. H⁺ in Gemisch von NaCl u. HCl, die 0,15-n. für HCl u. 0,05-n. für NaCl waren. In der Analyse w NaCl durch Eindampfen eines Teils der Lsg. u. direkte Wägung bestimmt. Der Gesa Cl-Gehalt wurde gravimetr. als AgCl bestimmt. Für die Überführungszahlen w folgende Werte gefunden: Na⁺ 0,0333, Cl⁻ 0,197, H⁺ 0,770. Aus den Zahlen, die r den theoret. in Gemischen zu erwartenden gut übereinstimmen, geht hervor, daß den Lsgg. nur einfache Ionen vorhanden sind u. keine Komplexionen, wie SCHNEID u. BRALEY (Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 1121; C. **1923**. III. 989) zur Erklärung ihrer experimentellen Ergebnisse in gemischten NaCl-KCl-Lsgg. annahmen. (Jou Americ. Chem. Soc. **48**. 599—603. Bristol [Engl.], Univ.) JOSEPHY

Tadeusz Nayder, *Über die dielektrische Konstante schwacher Elektrolyte*. V bestimmt nach der Resonanzmethode (vgl. JEZEWSKI, Bull. internat. Acad. polona des Sciences et des Lettres **1920**. A. 88) die DE. (für Wellenlänge von 500 m) v Lsgg. in Bzl. u. Nitrobenzol. Die DE. von Bzl. wird durch organ. Säuren nur we erhöht: von 2,284 (15°) auf 2,363 in 8,59°/ig. Lsg. von Benzoesäure, auf 2,311 0,86°/ig. Lsg. von Salicylsäure, auf 2,418 in 6,80°/ig. Lsg. von Pikrinsäure. — I DE. von Nitrobenzol wurde zu 36,05 bei 17,00° bezw. 30,74 bei 44,50° bestimmt. I DE. der Lsgg. in Nitrobenzol nimmt mit steigender Temp. u. steigender Konz. gera

ig ab. Die extremen Werte: 1. Benzoesäure, als gel. Stoff. 2,13⁰/₀ig. Lsg.: DE. = 59 bei 17,40°, 30,60 bei 40,10°. 3,03⁰/₀ig. Lsg.: DE. = 33,46 bei 20,25°, 29,73 bei 30°, 4,07⁰/₀ig. Lsg.: DE. = 32,12 bei 18,25°, 29,62 bei 40,75°. 5,26⁰/₀ig. Lsg.: E. = 31,80 bei 20,40°, 28,84 bei 38,30°. 2. Pikrinsäure, als gel. Stoff. 1,65⁰/₀ig. Lsg.: E. = 34,87 bei 17,30°, 32,42 bei 30,65°. 2,74⁰/₀ig. Lsg.: DE. = 34,19 bei 17,60°, 30,00 bei 30,00°. 4,82⁰/₀ig. Lsg.: DE. = 33,57 bei 17,90°, 31,47 bei 29,30°. 9,00⁰/₀ig. g.: 31,41 bei 18,00°, 29,27 bei 30,20°. Die „molekularen Erniedrigungen“ von DE. in beiden Fällen (Benzoe- bzw. Pikrinsäure) verschieden, wodurch die Theorie LATTEYS (Philos. Magazine [6] 41. 829; C. 1922. I. 81) widerlegt wird. Das Material rügt nicht, um die Ansichten von BLÜH (Ztschr. f. Physik 25. 224; C. 1924. II. 37) u. HÜCKEL (Physikal. Ztschr. 26. 93; C. 1925. I. 1684) zu prüfen. (Bull. internat. ad. polonaise des Sciences et des Lettres 1925. A. 247—58.) BIKERMAN.

R. T. Lattey, *Über Dielektrizitätskonstanten von Elektrolytlösungen. Antwort auf Bemerkungen in einer Arbeit von Walden, Ulich und Werner.* Vf. verwahrt sich gegen die Bemerkung von WALDEN, ULICH u. WERNER (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 180; 1925. II. 582), die sich gegen die Berechnung seiner Verss. wendet, u. macht seinerseits auf einen Fehler in der Rechnung der zitierten Autoren aufmerksam. (Ztschr. physik. Ch. 119. 104—06.) HANTKE.

Walden, Ulich und Werner, *Erwiderung auf die vorstehende Mitteilung von Lattey.* Die von LATTEY (vorst. Ref.) vorgeschlagene Korrektur ist von ganz minimalem Einfluß auf die Resultate der Unterss. der Vff., wie an einigen Beispielen gezeigt wird. (Ztschr. f. physik. Ch. 119. 107—10.) HANTKE.

R. de Mallemann, *Über die Berechnung der Verdetschen Konstante in der Molekulartheorie.* (Vgl. S. 591.) Die Theorie der statist. Orientierung der Moll. im magnet. Feld ergibt eine Beziehung zwischen der magnet. Drehung der Polarisationssebene, den Kerrschen Konstanten u. der Zahl der zur magnet. Drehung beitragenden Elektronen p . Unter entsprechenden Vernachlässigungen erhält man für p verschiedener Verbind. (Werte der magnet. Drehung nach PERKIN) Zahlen, die stets um 4 kleiner sind als die Zahl der Valenzelektronen in der Verb., wenn man dem C vier, H eine, den Halogenen 7, dem O zwei Valenzelektronen usw. zuschreibt. So trägt z. B. für Chlf. p 22. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1139—41. 1925.) BKM.

P. Pascal, *Magnetische Eigenschaften der Carbonylgruppe.* Die Additivitätsregeln gelten für die (diamagnet.) Suszeptibilität der CO-Gruppe verschiedene Werte, je nach Funktion, deren Teil die CO-Gruppe darstellt; so hat -CO- in Aldehyden $\chi = 2,5 \cdot 10^{-7}$, in Säureamiden $-75 \cdot 10^{-7}$, in Säuren $-93,5 \cdot 10^{-7}$, im Harnstoff $-107,5 \cdot 10^{-7}$, in Carbaminaten $-128,5 \cdot 10^{-7}$, in Carbonaten $-130 \cdot 10^{-7}$. Daraus folgt, daß die Nachbarschaft von NH_2 den Diamagnetismus um $32,5 \cdot 10^{-7}$ erhöht, die von einfach gebundenem O um $51 \cdot 10^{-7}$, die von einem zweiten einfach gebundenem O um $36,5 \cdot 10^{-7}$. Substituierten Amiden hat die Suszeptibilität von -CO- folgende Werte: im Methylharnstoff $-76 \cdot 10^{-7}$, Tetraäthylharnstoff $+69 \cdot 10^{-7}$, in Äthylcarbaminaten $-37 \cdot 10^{-7}$, Äthylcarbaminaten $-41 \cdot 10^{-7}$, Phenylcarbaminaten $-120 \cdot 10^{-7}$, Phenylharnstoff $-130 \cdot 10^{-7}$, α, β -Diphenylharnstoff $-195 \cdot 10^{-7}$, α -Methyl- β -phenylharnstoff $-164,5 \cdot 10^{-7}$, α, α -Diäthyl- β -phenylharnstoff $-139 \cdot 10^{-7}$, Biuret $-124,5 \cdot 10^{-7}$. Der Einfluß von -NH_2 wird also von negativen Radikalen verstärkt, von positiven abgeschwächt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 215—17.) BIKERMAN.

E. D. Eastman, *Thermoelektrische Effekte und die Wärmekapazität von Elektronen in Metallen.* (Vgl. EASTMAN, WILLIAMS u. YOUNG, Journ. Americ. Chem. Soc. 1914; C. 1924. II. 593.) Die „scheinbare“ Wärmekapazität c der Elektronen eines Metalls wird definiert durch die Gleichung $c = C_v - C_n$, worin C_v die Molekularwärme des Metalls bei konstantem Vol. u. C_n die Wärmekapazität des Kerns ist, unter wird die Wärmemenge verstanden, die das System absorbieren würde, wenn die Elektronen fest an ihre Lage gebunden wären. Die so definierte Wärmekapazität

c bezieht sich auf ein Mol eines Metalls, aber nicht notwendig auch auf 1 Elektron. Die sogenannte mittlere „mol.“ Wärmekapazität wird durch die Gleichung $C = \frac{cm}{n}$ bestimmt, worin m die kleinste ganze Zahl der Elektronen ist, die Wärme vom 1. trug c absorbieren. C ist immer positiv u. kleiner als C_v . Die mol. Partialwärmekapazität $\bar{C}$ der Elektronen ergibt sich zu $\bar{C} = (\partial c_v / \partial n)_T$, wenn c_v die Wärmekapazität bei konstantem Vol. eines Systems aus n_1 Mol Metallion u. n Mol Elektronen ist. $\bar{C}$ ist nie wie C im Wert begrenzt. Durch einen Vergleich von C u. $\bar{C}$ unter verschiedenen Bedingungen wird ihre Bedeutung erläutert. — Der *Thomson-Effekt*, d. i. die von einem Metall absorbierte Wärme, in dem ein Temp.-Gradient vorherrscht, wenn Elektronen in dem Metall reversibel von einer Temp. T auf die Temp. $T + dT$ gebracht werden, σ wird ausgedrückt pro Mol auf $T + dT$ gebrachter Elektronen u. 1 Grad Temp.-Differenz. — Vf. stellt die oben definierten Größen u. σ einander gegenüber u. kommt zu dem Schluß, daß σ u. C im allgemeinen nicht gleich sein werden. Wenn das Soret-Phänomen nicht ohne Bedeutung für den Thomson-Effekt ist, können auch σ u. $\bar{C}$ nicht als ident. angenommen werden. Bei den Alkalimetallen u. bei Au, Zn, Ca u. Cd sind σ u. $\bar{C}$ kleiner als C , bei Mg sind C u. $\bar{C}$ scheinbar gleich u. Al, Pb u. Pt ist $\bar{C}$ größer als C . Diese Unterschiede können so gedeutet werden, daß bei der ersten Gruppe eine Vergrößerung im Verhältnis von Elektronen zu Atomen eine Vergrößerung des interatomaren Zusammenhalts bewirkt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 552—62. Berkeley [Cal.], Univ.) JOSEPHY

Irving Langmuir, *Flammen von atomarem Wasserstoff*. (Vgl. S. 1119.) Aus Beobachtung, daß H_2 bei hohen Temp. eine anomal hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt, z. B. bei 3400° abs. etwa 23-mal größer als N_2 , schließt Vf., daß H_2 mit steigender Temp. in atomaren H zerfällt. Nimmt man die Reaktionswärme der Rk. $H_2 \rightarrow H + H$ zu 98 000 cal an, dann wären bei 1000°, 2000°, 3000°, 4000° u. 5000° abs. $3,71 \cdot 10^{-1}$, 1,22 $\cdot 10^{-1}$, 9,03, 62,5 u. 94,7% des Wasserstoffs dissoziiert. Vf. gibt zur Darst. größerer Mengen des atomaren H folgende Methode an: Zwischen zwei Wolframelektroden läßt man einen Lichtbogen von hoher Stromdichte (etwa 300—800 Volt bei 20 Amperen) übergehen u. bläst einen H_2 -Strom dagegen. Dadurch wird der im Lichtbogen gebildete atomare H weggeblasen. Läßt man den abgeblasenen atomaren H enthaltenden Gasstrom auf eine Metalloberfläche auftreffen, dann wird infolge der katalyt. Oberflächenwrkg. der atomare H wieder in molekularen H_2 zurückverwandelt, wobei 98 000 cal für 2 g H_2 frei werden. Es gelingt auf diese Weise, die höchstschmelzenden Stoffe, wie W, Ta, ThO_2 , zu schmelzen u. die Temp. des C_2H_2 - O_2 -Gebläses zu übertreffen. (General Electric Review 29. 153—59.) BECKER

R. A. Weiman und **Irving Langmuir**, *Schweißbögen mit atomaren Wasserstoff*. Vf. benutzen den nach dem Verf. von LANGMUIR (vgl. vorst. Ref.) hergestellten atomaren H zum Schweißen von Metallen. Es lassen sich die verschiedensten, schwer schweißbaren Legierungen miteinander verbinden, ohne daß die Fäheigkeitseigenschaften der verschweißten Stücke leiden. (General Electric Review 29. 160—68.) BECKER

P. Alexander, *Bogenschweißung in Wasserstoff und anderen Gasen*. Statt eines Stromes von reinem H_2 bei der Herstellung des atomaren H kann man auch Gemische von H_2 mit N_2 , CO oder NH_3 verwenden. Auch organ. Verb., wie CH_3OH , finden Verwendung. (General Electric Review 29. 169—74.) BECKER

L. Gay, *Destillation und Rektifikation*. Vf. untersucht mit Hilfe graph. Berechnungen, in welcher verschiedenen Weise ein Gemisch von mehr als drei Bestandteilen durch Dest. u. Rektifikation in seine Bestandteile zerlegt werden kann, u. auf welchem Verf. mit dem kleinsten Wärmeaufwand zu rechnen ist. (Chimie et Industrie 15. 3—13.) NEIDHARDT

E. W. Blair und **R. Taylor**, *Notiz über die Destillation wässriger Formaldehyd-Lösungen*. Eine ca. 30% wss. Lsg. besitzt einen konstanten tiefsten Kp. Bei der Dest.

von Lsgg. geringerer Konz. ist die Konz. des Destillats stets größer als die des Rückstandes, dagegen kleiner bei der Dest. konzentrierter Lsgg. (Journ. Soc. Chem. Ind. 5. T 65—66. Dorset, Cordite Factory.) R. SCHMIDT.

Harold L. Maxwell und **Anson Hayes**, *Die freie Energie und Bildungswärme von Eisencarbid für das Temperaturintervall von 650—700°*. Vff. untersuchen das Gleichgewicht $3\alpha\text{-Fe} + 2\text{CO} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{C} + \text{CO}_2$ bei 650—700° u. einem Gesamtdruck von 1 atm. Die Verss. wurden mit 2 verschiedenen Fe-C-Legierungen gemacht, eine enthielt 0,5% C, die andere 1,55% C. Bei 650° wurden für beide befriedigend übereinstimmende Gleichgewichtsdaten erhalten, bei 700° trat bei der C-haltigeren Graphitausscheidung ein Umschlag ein, u. CO nahm in dem Gleichgewichtsgemisch ab. Die Gleichgewichtsdaten sind in Tabellen angegeben. Die Änderung der freien Energie bei der genannten Rk. ist ΔF_1 , bei der Rk. $2\text{CO} = \text{C (Graphit)} + \text{CO}_2$ ist ΔF_2 , dann ist die freie Energie bei der Bildung von Eisencarbid $3\text{Fe} (\alpha) + \text{C (Graphit)} = \text{Fe}_3\text{C}$ $\Delta F_3 = \Delta F_1 - \Delta F_2$. ΔF_3 wird bei 650° zu 3138 cal u. bei 700° zu 2281 cal in beiden Fällen positiv gefunden. Daraus berechnet sich die Bildungswärme von Fe_3C bei 650° zu 19163 u. bei 700° zu 19161 cal. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 584—93. Iowa State Coll.) JOSEPHY.

J. H. Mathews, *Die genaue Messung der Verdampfungswärmen von Flüssigkeiten*. Vff. beschreiben eine neue Methode u. einen App. zur direkten elektr. Messung von Verdampfungswärmen von Fll. Eine kurze Wiedergabe des rein experimentellen Verfahrens, der von **Guy Ramsdell** u. **B. M. Thompson** ausgeführt wurde, ist nicht möglich, muß daher bzgl. der Einzelheiten der Methode, die auf 0,1 cal genaue Werte liefert, auf das Original verwiesen werden. Die zu den Unterss. benutzten Fll. waren sämtlich vorher gereinigt u. der Reinheitsgrad durch Refraktionsdaten u. Kpp. kontrolliert. Die folgenden seien kurz die bei den jeweiligen Meßtemp. gefundenen Werte der Verdampfungswärmen in cal pro g angegeben: *Bzl.* 80° 94,35; *Äthylbenzol* 135,17° 81,08; *Isopentan* 97,23° 76,35; *4-Methylheptan* 117,20° 70,86; *cyclo-Hexan* 80,00° 85,62; *Methylcyclohexan* 99,90° 76,92; *cyclo-Hexen* 81,60° 88,70; *Toluol* 109,66° 86,50; *o-Xylol* 141,41° 89; *m-Xylol* 138,30° 81,85; *p-Xylol* 137,12° 81,03; *Methylenchlorid* 40,48° 78,74; *Äthylenchlorid* 82,21° 77,34; *Äthylenbromid* 130,80° 46,24; *Äthyljodid* 71,16° 45,62; *Butyljodid* 129,50° 45,93; *Trichloräthylen* 85,69° 57,24; *Tetrachloräthylen* 120,69° 40,04; *sym. Tetrachloräthan* 145,03° 55,02; *Äthylenchlorhydrin* 126,55° 122,97; *Chlorzol* 130,56° 77,61; *Brombenzol* 154,79° 57,63; *o-Chlortoluol* 158,07° 72,61; *p-Chlortoluol* 160,38° 73,14; *Chlf.* 60,14° 58,80; CCl_4 75,40° 46,55; CS_2 45,29° 84,07; *Nitromethan* 90° 134,94; *Pyridin* 114,13° 107,38; *Methylalkohol* 63,81° 263,31; *A.* 77,42° 201,88; *Propylalkohol* 81,25° 159,23; *n-Butylalkohol* 116,78° 141,31; *i-Butylalkohol* 106,84° 125,25; *sek-Butylalkohol* 98,13° 134,41; *i-Amylalkohol* 130,17° 119,84; *Benzylalkohol* 125,25° 111,58; *Aceton* 56,00° 122,09; *Methyläthylketon* 78,20° 105,95; *Furfurol* 160,55° 105,51; *A.* 33,99° 86,08; *Propionsäure* 139,30° 98,83; *Methylformiat* 31,32° 112,38; *Ethylformiat* 53,33° 97,21; *Propylformiat* 80,01° 88,15; *n-Butylformiat* 105,12° 86,76; *Ethylacetat* 97,03° 78,51; *Methylacetat* 56,34° 98,11; *Äthylacetat* 76,00° 87,63; *Propylacetat* 100,42° 80,29; *i-Butylacetat* 115,47° 73,76; *Methylpropionat* 79,00° 87,59; *Äthylpropionat* 97,64° 80,07; *Propylpropionat* 120,62° 73,18; *n-Butylpropionat* 144,87° 71,75; *Buttersäuremethylester* 91,05° 78,15; *n-Buttersäureäthylester* 118,90° 74,72; *i-Buttersäureäthylester* 109,22° 72,08; β -*Chloräthylacetat* 141,50° 80,84; für eine Anzahl dieser Substanzen waren bisher noch gar keine Werte für Verdampfungswärmen bekannt. Die direkte Messung der Verdampfungswärme nach seiner neuen Methode für die oben genannten Substanzen ist der Berechnung aus den genauesten Dampfdruckdaten. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 562—76. Madison [Wisc.], Univ.) JOSEPHY.

Ernst Schneider, *Über die Wärmeleitung von Luft und Wasserstoff*. Vff. bestimmen die Wärmeleitung nach der Methode von SCHLEIERMACHER bzw. WEBER (Ann. der Physik [4] 54. 437; C. 1918. I. 805. II. 5), welche durch Anwendung dünner Sonden verfeinert ist, die Wärmeleitfähigkeit für Luft u. H_2 , wie auch ihre Temperaturkoeffizienten.

Für H₂ ergibt sich die Wärmeleitfähigkeit: $17,52 \cdot 10^{-4}$; Temperaturkoeffizient: 0,00267 für Luft: $2,477 \cdot 10^{-4}$ u. 0,00390. Diese Werte bestätigen die Angaben von WEBER für H₂, während die Werte des Vf. für Luft um ca. 4% höher liegen. (Ann. der Physik [4] **79**. 177—203. Jena, Univ.)

ULMANN.

Jitsusaburo Sameshima, Über die Strömungsgeschwindigkeit verschiedener Gase durch eine poröse Wand. Ein mit Hg abgeschlossenes Gasvol. stand mittels eines mit einer unglasierten Tonplatte verschlossenen Rohres mit einer ununterbrochen arbeitenden Vakuumpumpe in Verb., die jenseits der Platte den konstanten Druck von 0,1 mm aufrecht hielt. Der Druck diesseits der Platte wurde mittels eines Hg-Manometers gemessen, u. war auch während eines jeden Vers. konstant. Es wurde die Zeit bestimmt, die ein gegebenes Gasvol. braucht, um durch die Platte durchzuströmen. In einer anderen Versuchsreihe wurde statt der Ton- eine Pt-Platte benutzt. Während die Effusion v durch die gelöcherte Pt-Platte dem Gesetz $v = k/\sqrt{M}$ (M = das Mol. Gew.) gehorchte, war die Strömungsgeschwindigkeit durch die Tonplatte für O₂ geringer als für CO₂ < Luft < Äthylen < Acetylen < Methan < NH₃. Selbst die Reihenfolge der Mol.-Geww. wurde also nicht eingehalten. Dagegen findet sich die Formel

$$t = k \cdot \eta^n \cdot M^{\frac{1-n}{2}}$$

(η die Zähigkeit der Gase, k u. n zwei von der Platte u. vom Druck, aber nicht vom Gas abhängige Konstanten, $t = 1/v$) angenähert bestätigt. Mit wachsendem Druck (diesseits der Platte) wächst sowohl k wie auch n . (Bull. chem. Soc. of Japan **1** 5—8. Tokyo, Univ.)

BIKERMANN.

Berthold Block, Die Temperatur des aus einer Lösung entwickelten Dampfes. Die Verss. REISZMANN'S (vgl. S. 1121) sind nicht einwandfrei; so lange bei einem Blindvers. mit reinem W. die Temp. der Dämpfe höher sind als die des sd. W. Unmöglich erscheint der Fall, daß bei gleicher Temp. des Ölbadens u. der Lsg. der Dampf kälter sein soll. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 376—77. Berlin-Charlottenburg.)

JUNG.

Ludwik Chrobak, Die Abhängigkeit der Wasserdampfspannung des Desmins vom Wassergehalt und von der Temperatur. Der untersuchte Desmin hatte die Zus.: 56, bis 56,5% SiO₂, 15,7—15,9% Al₂O₃, 0,05—0,09% Fe₂O₃, 7,67—7,74% CaO, 1,03 bis 1,12% Na₂O, 0,22—0,34% K₂O u. 19,1—19,4% W. Der Wassergehalt schwankte übrigens mit der durchschnittlichen Korngröße. — Es wurde in einem im Original abgebildeten App. die Wasserdampfspannung über Desmin von verschiedenem Wassergehalt bei verschiedenen Temp. gemessen. Die Druck-Temp.-Kurven verlaufen parallel der von reinem W., sind nur zu höheren Temp. verschoben u. zwar um so weiter, je geringer der Wassergehalt ist. So wurde der Druck von 10 mm über einem Desmin mit 18,19% W. bei ca. 48° erreicht, über einem Desmin mit 14,94% W. bei ca. 118°, über einem Desmin mit 6,05% W. bei ca. 220°. Trägt man im Koordinatennetz Isobare bezw. Isotherme gegen den Wassergehalt des Desmins auf, so wird ein Knick bei der Zus. CaO·Al₂O₃·6SiO₂·4H₂O sichtbar. — Die Prozesse der Entwässerung u. Wiederwässerung scheinen nicht genau umkehrbar zu verlaufen. (Bull. internationale Acad. polonaise des Sciences et des Lettres **1925**. A. 333—45. Krakau, Univ.)

BKA

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

James Fitton Couch, Die Entwicklung der chemischen Terminologie. IX. *Pectisation und Peptisation*. (VIII. vgl. Amer. Journ. Pharm. **96**. 746; C. **1925**. I. 398) Der Ausdruck „*Pectisation*“ ist veraltet u. sollte nicht mehr gebraucht werden. Für wird der Ausdruck „*Peptisation*“ in seiner Entw. u. Anwendung besprochen. (Amer. Journ. Pharm. **97**. 858—61. 1925.)

HÜCKEL.

René Gallay, Beitrag zur Kenntnis der Tonkoagulation. Es wird die Tonkoagulation u. ihre Abhängigkeit vom Dispersitätsgrad, vom Basenaustausch u. von der Natur

es Tones u. der koagulierenden Elektrolyte untersucht. Dabei wird die Koagulation es Tones u. des Bodens unter demselben Gesichtspunkt betrachtet. Im ersten Teil werden die angewendeten Methoden (mechan. Analyse nach WIEGNER, Ultramikroskopie, Viscosimetrie) diskutiert. Die mechan. Analyse nach WIEGNER wird ausführlich besprochen u. die für diese Analyse nötigen Vorbereitungsmethoden wie Schütteln, Reiben, Kochen in Parallelverss. geprüft. Die verschiedenen Böden verhalten sich den verschiedenen Methoden gegenüber sehr ungleich, doch wird im allgemeinen das Schütteln dem Kochen vorgezogen. — Die zahlreichen Verss., die den Einfluß des Dispersitätsgrades auf den Verlauf der Koagulation prüften, gaben folgende Resultate: In einem polydispersen System, wie es eine Tonsuspension bildet, fördern die gröberen Teilchen die Koagulation der feineren. Wenn die gröberen Teilchen koagulieren, so klären sie die Suspension. — Die minimale Flockungskonz. wächst mit zunehmender Dispersität der Suspension. — Die Suspension feiner Tone u. ausgewaschene Suspensionen sind gegen eine Konz.-Steigerung des fällenden Elektrolyten unempfindlicher als die groben u. konz. Suspensionen. — Während der Koagulation einer Tonsuspension ändert sich die Viscosität sprunghaft, was daher rührt, daß die gröberen Teilchen schneller auf den Einfluß eines Elektrolyten reagieren als die feineren. Die gröberen Teilchen können schon sedimentiert sein, wenn die feinsten noch keine Agglomeration zeigen. — Die B. von Schichten in koagulierten Suspensionen wird nicht durch Anwesenheit gleich großer Teilchen bedingt. Die koagulierenden Teilchen fallen nicht, weil sie gleich groß sind, mit gleicher Geschwindigkeit, sondern weil sie sich gegenseitig in der Fallbewegung beeinflussen. — Interessant ist der Einfluß des Basenaustausches auf die Koagulation lieferten folgende Ergebnisse: Der Calciumboden (Boden, der längere Zeit mit CaCl₂-Lsg. behandelt ist) ist elektrolytempfindlicher als NH₄-, K- oder Na-Böden. Der Ca-Boden ist gegen einwertige Salze empfindlicher als NH₄-, K- u. Na-Böden. — Bei demselben Boden u. der gleichen Konz. haben die zweiwertigen Ionen stets das größere Flockungsvermögen als die einwertigen Kationen. Der Unterschied wird um so deutlicher, je verdünnter die Suspension ist, je weniger sich daher der Einfluß des Basenaustausches geltend macht. — Aus vorst. Vers.-Ergebnissen wird gefolgert, daß Ca-Salze u. andere zweiwertige Metalle durch Basenaustausch einen Teil ihrer spezif. Wrkg. verlieren, wenn am Ton einwertige Basen angereichert sind. Wenn umgekehrt 2-wertige Metalle an der Tonoberfläche sitzen, können die Na oder K-Salze einen Teil ihres Flockungsvermögens den ausgetauschten 2-wertigen Ionen verdanken.

Schließlich wird noch der Einfluß der Hydratation untersucht: Das Flockungsvermögen der einwertigen u. 2-wertigen Kationen wächst in der lyotropen Reihe $\text{Na} < \text{NH}_4 < \text{K} < \text{Rb} < \text{Cs}$ u. $\text{Mg} < \text{Ca} < \text{Ba}$. Die Viscosität des Kollidiums u. dieser parallel die Hydratation der ausgeflockten Teilchen ist um so kleiner, je weniger die adsorbierten u. je mehr die Ionen der Außenfl. hydratisiert sind. — Der Na-Boden gibt eine bedeutend visköse Flockung als der K- u. NH₄-Boden. — Die größte ist die Viscosität, wenn der Na-Boden mit dem am wenigsten hydratisierten Kation koaguliert wird. Die Flockung des Ca-Bodens zeigt die kleinste Viscosität. Er adsorbiert die Hälfte Kationen. — Aus der Hydratationstheorie wird der günstige bzw. ungünstige Einfluß gewisser Salzlsg. auf die physikal. Struktur des Bodens erklärt. (Kolloidchem. Beihefte 21. 431—89. Agrikulturchem. Labor. Eidgen. Techn. Hochschule.)

LASCH.

A. Lottermoser und **S. Bausch**, *Versuche über die Darstellung kolloiden Silbers durch Elektrolyse*. Durch Elektrolyse unmittelbar vom Ag⁺-Ion zu kolloidalem Ag gelangen, wird durch Verss. als unmöglich erwiesen. Bei dem von BILLITZER (Ber. deutsch. Chem. Ges. 35. 1929; C. 1902. II. 250) vermeintlich beobachteten *Silbersol* handelte es sich in Wirklichkeit um ein *Silberoxydsol*. Tritt bei einer Elektrolyse dennoch ein wahres Silbersol auf, so ist seine B. auf Sekundärprozesse zurückzuführen.

Als solche kommen z. B. in Betracht: Bei Anwendung von Wechselstrom Zerstäubung der Ag-Elektroden infolge eines Wehnelt-effektes oder bei Anwendung von Gleichstrom höherer Spannung (12 u. 72 V) Red. anod. gebildeten Silbersuperoxyds durch d. kathod. H₂-Entw. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 87—92.) HEIMANN.

Leopold Fuchs und **Wo. Pauli**, *Beiträge zur allgemeinen Kolloidchemie*. XVII. *Zur Analyse und Konstitution des kolloiden Goldes*. IV. *Die Wanderungsgeschwindigkeit*. (XVII. vgl. S. 1376.) Es wird eine Reihe von Bestst. der Wanderungsgeschwindigkeit genau definierter Au-Sole im elektr. Feld u. ihre Änderung bei Elektrolytzusätzen mitgeteilt, da die Angaben hierüber in der Literatur sehr widersprechend sind. — Es wird der Überführungsapp. von LANDSTEINER u. PAULI verwendet, der gut reproduzierbare Werte liefert. Die Wanderungsgeschwindigkeit der Formolsole bewegt sich zwischen 35 u. $25,5 \cdot 10^{-5}$, die der H₂-Sole zwischen 25,2 u. $27,3 \cdot 10^{-5}$. Versetzt man ein gut dialysiertes Sol mit K₂CO₃, so tritt eine erhebliche Steigerung der Wanderungsgeschwindigkeit ein, beim Zusatz von Barytlauge bis zum Neutralpunkt dagegen keine erhebliche Änderung. Wichtig ist, daß die Überschiebungsfähigkeit dieselbe Leitfähigkeit besitzt wie das Sol. — Bei Zusatz von Al-Salzen fanden Vf. im Gegensatz zu den Beobachtungen von BURTON nur eine stetige Abnahme, aber keine Umkehr der Wanderungsgeschwindigkeit eines reinen Au-Sols. Erst infolge von Alkalizusatz gewinnt ein hochdialysiertes Goldsol die Fähigkeit, durch steigenden Al-Zugabe unter B. eines stabilen positiven Soles umgeladen zu werden. Dadurch erst wird das Verh. undialysierter Sole verständlich, die sich bei Al-Zusatz genau so verhalten wie mit K₂CO₃ versetzte hochdialysierte Sole. Sie gehen durch einen Inflectionspunkt der Wanderung, um dann kathod. zu wandern. Die Umladung erfolgt durch Al₂(SO₄)₃ ebenso wie durch AlCl₃. Es liegt daher nahe, die Eigenschaften der undialysierten Sole mit ihrem Alkaligehalt in Verbindung zu bringen. Das durch die alkal. Rk. entstehende Al(OH)₃, das leicht unter Komplexbildung reagiert, wird als Ursache der Teilchenumladung angenommen. — Vf. halten für wahrscheinlich, daß auch beim kolloiden Au inaktive neben aktiven ionogenen Oberflächenkomplexe vorhanden sind. Damit könnte die größere Beweglichkeit undialysierter Sole im Zusammenhang stehen. Möglicherweise wird durch Dialyse ein Teil der ionogenen Oberflächenkomplexe irreversibel verändert oder entfernt. (Kolloidchem. Beihefte **21**. 412—30. Wien, Univ. Lab. f. physikal.-chem. Biologie.) LASCH.

W. M. Bendien, *Verfahren zur Bereitung eines reinen Goldsols*. Man verstäubt in einer Fl., die 0,0001-n. HCl enthält, das Au tunlichst weit, verd. darauf 1:6 mit Leitfähigkeitswasser u. neutralisiert die Spur HCl genau mit KOH. Die Lsg. enthält dann höchstens 0,000015 n. KCl u. hat keine größere Leitfähigkeit als gut dest. W. (K = etwa $3,5 \times 10^{-6}$). Die Farbe des Sols ist eben purpurrot. (Chem. Weekblad **23**. 168.) GROSZFELD.

André Marcelin, *Die flüssigen zweidimensionalen Oberflächenlösungen*. Ausführliche Wiedergabe der früheren Unterss. (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 33 **180**. 2022; C. **1924**. II. 1658. **1925**. II. 1662 u. frühere Mitteilungen). (Ann. de Physique [10] **4**. 459—527. 1925. Paris, Sorbonne.) BIKERMAN.

René Dubrisay, *Über einige Erscheinungen der Capillarchemie*. (Vgl. S. 2610.) Vf. bestimmte nach der früheren (stalagmometr.) Methode die Grenzflächenspannung der 1%ig. benzol. Lsgg. von Fettsäuren gegen W. bzw. verd. NaOH bei verschiedenen Temp. Die Grenzflächenspannung gegen W. nimmt mit steigender Temp. ab, die gegen verd. NaOH-Lsgg. zu, so daß die Differenz zwischen den beiden Größen mit steigender Temp. andauernd fällt. Den Grund für diese Abnahme der Capillaraktivität von NaOH-Lsgg. erblickt Vf. im raschen Anstieg der Löslichkeit fettsaurer Na-Salze bei Temperaturerhöhung, weil im allgemeinen eine Substanz um so aktiver ist, je weniger l. sie ist (vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] **37**. 996; C. **1925**. II. 2250 (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1142—43. 1925.)) BIKERMAN.

William D. Harkins und **E. C. Gilbert**, *Die Struktur von Wasserfilmen auf Lösungen. II. Die Oberflächenspannung von Calciumchloridlösungen bei 25°.* (I. vgl. ARKINS u. MC LAUGHLIN, Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 2083; C. **1925**. II. 1663.) f. bestimmen die Oberflächenspannung von W. u. von wss. CaCl_2 -Lsgg. bis zu Konz. von 7 Mol Salz pro 1 W. bei 25° nach der Tropfengewichtsmethode (vgl. HARKINS u. ROWN, Journ. Americ. Chem. Soc. **41**. 419; C. **1919**. IV. 857). Die Oberflächenspannung des W. wurde zu 72,03 Dyn/cm gefunden. Für CaCl_2 sind die Werte tabellar. zusammengestellt, die Oberflächenspannung beträgt für 0,100-mol. Lsgg. 72,39, für 500-mol. Lsgg. 73,54 für 1,00-mol. Lsgg. 75,22, für 5,00-mol. Lsgg. 90,79 u. für 7,00-mol. Lsgg. 97,17 Dyn/cm. Aus den Oberflächenspannungsdaten u. den Aktivitätskoeffizienten in CaCl_2 -Lsgg. wird die mittlere Dicke des Wasserfilms auf den CaCl_2 -Lsgg. berechnet. Die Dicke des Films beträgt bei 1,25 Mol auf 1000 g W. 3,1 Å, ist also genau gleich der Wurzel aus dem Vol. eines Mol. H_2O . Bis zu 3 oder 4 Mol CaCl_2 im 1 W. ist der W.-film im wesentlichen monomolekular, bei niederen Konz. ist die Oberflächenhaut was dicker, bei höheren Konz. dünner. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 604—07. Chicago [Ill.], Univ.) JOSEPHY.

E. Heymann, *Ein Vergleich zwischen Dialyse und Ultrafiltration, Elektrodialyse und Elektroultrafiltration.* (Kolloid-Ztschr. **38**. 58—59. — C. **1926**. I. 1378.) GOTTF.

John C. Krantz, jr. und **Neil E. Gordon**, *Über den Einfluß der Wasserstoffnenkonzentration auf Emulsionen.* Vf. studieren den Einfluß von pH auf die Bändigkeit von Emulsionen u. finden, daß die größte Stabilität von Pflanzen- oder Mineralölemulsionen, mit Akaziengummi bereitet bei pH = 2—10 u. mit Traganth bereitet bei pH = 1,9—2,3 liegt. Die Teilchengröße 1, die Oberflächenspannung 2 u. die Viskosität 3 wurde bei verschiedenen Punkten der pH-Skala bestimmt. Bei Emulsionen mit Traganth bewirkt Veränderung von pH Veränderung von 1 u. 3. Bei Emulsionen mit Akaziengummi wird hierdurch 3 nicht geändert, 1 jedoch wächst beim Übergang auf die alkal. Seite der pH-Skala. FISCHERS „Hydrattheorie“ hat Gültigkeit für Emulsionen mit Traganth. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **15**. 83—94. School of Pharmacy, Univ. of Maryland.) ROJAHN.

G. Testoni, *Über einige Adsorptionsphänomene.* Aus seinen zahlreichen Verss. mit den verschiedensten Farbstoffen zieht Vf. folgende Schlüsse: SiO_2 adsorbiert vorwiegend bas. Farbstoffe, $\text{Al}(\text{OH})_3$ dagegen saure, wobei jedoch auch einige Ausnahmen vorkommen. Neben der kolloidalen Adsorption kommt oftmals auch Festung durch Salzbildung in Frage. Kaolin adsorbiert einmal Farbstoffe, das andere Mal nicht ohne jede Beziehung zur chem. Zus. Vielleicht fehlt hierbei die Salzbildung. SiO_2 u. $\text{Al}(\text{OH})_3$ adsorbieren sehr stark NH_3 -Metallverbb., aber nicht die entsprechenden anderen Metallsalze. Ist die Adsorptionskonz. sehr gering, so bildet $\text{Al}(\text{OH})_3$ Metallhydrate u. kolloidale $\text{Al}(\text{OH})_3$. Bei der Adsorption von Metallverbb. trifft die Ostwaldsche Regel meistens nicht ein. (Annali Chim. Appl. **16**. 45—52. Bologna.) GRIMME.

H. Chaumat, *Die aktiven Kohlen nach Edouard Urbain.* Das Absorptionsvermögen der Kohle ist um so größer, je reiner sie von gewissen H-Verbb. ist; die Kohle absorbiert die verschiedenen Substanzen um so stärker, je größer die mit der Adsorption verbundene Wärmeentw. ist. Die Adsorption folgt nicht dem Henryschen Gesetz. Die Aktivierung kann durch Behandlung mit H_2SO_4 , ZnCl_2 oder H_3PO_4 erreicht werden. Am besten wirkt H_3PO_4 ; bei 600° bildet sich P, der auf die in der Kohle enthaltenen H₂-Verbb. unter B. von PH_3 einwirkt. Nach dem Erhitzen auf 600° wird die überschüssige H_3PO_4 durch Waschen entfernt, getrocknet u. bei 1200° calciniert; dann wird mit HCl gewaschen u. bei 300° getrocknet. Die so behandelte Kohle enthält nur noch 0,2 statt 4,5% H_2 u. kann 65—70% ihres Gewichts an Bzl. absorbieren. — Verschiedene Verwendungen der akt. Kohle werden besprochen. (La Nature **926**. 149—55. Paris.) R. SCHMIDT.

H. Rowe, *Über die Adsorption von Kohlendioxyd durch aktivierte Kokosnußkohle* (Vgl. S. 2179.) Verschiedene Theorien der Adsorption — wie Lsg. u. Kondensation — werden beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, daß bei der Adsorption die für diese Theorien charakterist. Erscheinungen meist zusammenwirken u. Adsorptions- u. Absorptionsvorgänge nicht streng zu trennen sind. Bei Verss. über die von aktivierter Kokosnußkohle adsorbierte CO_2 -Menge wurde gefunden, daß bei sehr niedrigen Drucken die Gleichgewichtseinstellung längere Zeit erfordert, während reine Adsorption theore. fast momentan stattfindet. Schnelle Adsorption fand während der ersten 5 Min. statt, dann folgte 24 Stdn. lang Absorption. Die Hauptgasmenge wurde in der ersten Phase adsorbiert, aber der sich schließlich einstellende Gleichgewichtsdruck hing in erster Linie von der Berührungsdauer von Gas u. Kohle ab. Die Vers.-Anordnung wird beschrieben, ebenso die Art der Kohlepräparierung (vgl. l. c.). — 6 Verss. wurden angestellt mit Anfangsdrucken von $2 \cdot 10^{-2}$ bis $1,5 \cdot 10^{-1}$ mm. Wenn q die pro Gramm Holzkohle adsorbierte Gasmenge, V das Vol. des Hochvakuumraumes, m die angewandte Menge Holzkohle, p_0 der Anfangsdruck u. p der Gleichgewichtsdruck in mm ist, so gilt: $q = V/m (p_0 - p)$. Die graph. Darst. der Ergebnisse, — Zeit als Abszisse, Druck als Ordinate — zeigt, daß die zur Gleichgewichtseinstellung erforderliche Zeit mit den Anfangs- u. Gleichgewichtsdrucken zunimmt. Die Kurven bestehen aus einem fast vertikalen u. einem ziemlich horizontalen Ast; ersterer, das schnelle Sinken des Druckes veranschaulichend, entspricht der Adsorption, der andere der Absorption. Diese hängt außer vom Druck auch von der Gaskonz. innerhalb der Kohle ab u. besteht im Eindringen des Gases in die feineren Capillaren der Kohle, nachdem die größeren durch die Adsorption gefüllt sind. Bei Drucken unterhalb $0,70 \cdot 10^{-3}$ mm findet keine Absorption, sondern nur Adsorption statt. Die Adsorptionsdauer hängt von den Dimensionen der Apparatur ab, da diese bei den sehr niedrigen Drucken der mittleren freien Weglängen der Gasmoll. vergleichbar sind. In dem gegebenen Fall war die Adsorption nach ca. 1 Stde. vollständig. — Verss. über das Adsorptionsvermögen von Holzkohle für CO_2 , die schon etwas adsorbiertes Gas enthielt, ergaben ein stärkeres Hervortreten des Absorptionsvorganges. Die adsorbierte Gasmenge war geringer, u. die Adsorption ging nach 15 Min. in Absorption über. (Philos. Magazine [7] 1. 659—70. Exeter, Univ. College.)

R. SCHMIDT.

Harry N. Holmes und **Melvin A. Dietrich**, *Die Adsorption von Sulfiden durch kolloidales Chromhydroxyd*. Die Fällung einiger Sulfide durch H_2S aus 0,5-n. HCl-Lsg. die auch Chromchlorid enthält, kann durch Adsorption der Sulfide an kolloidalen Cr-Hydroxyd, das durch Hydrolyse des Chlorids entsteht, verhindert werden. Dies tritt in einer frisch bereiteten Lsg. ein, die Chromchlorid u. Mercurichlorid im Überschuß im Verhältnis 2 : 1 enthält. Beim Stehen nimmt die Hydrolyse zu, u. nach 48 Stdn. tritt auch keine Fällung mehr ein, wenn das Verhältnis nur 1 : 3,5 beträgt. Die Hydrolyse des Chlorids kann indessen durch hinreichend große Konz. der H^- u. SO_4 -Ionen zurückgehalten werden. Beim Chromsulfat ist die Hydrolyse so gering, daß in Chromsulfat enthaltenden Lsgg. Sulfide ohne weiteres gefällt werden können. Die Adsorption in stark hydrolysierten Lsgg. kann umgekehrt werden, wenn die Lsg. 3-n. an HCl gemacht u. 2 Min. lang gekocht wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 678—82. Oberlin [O. Coll.])

JOSEPHY.

B. Anorganische Chemie.

C. Mazzetti und **F. de Carli**, *Ammoniakate des Ammoniumperchlorats*. Zuerst bestimmten Vf. den Beginn der Verflüssigung für Mischungen von NH_3 u. NH_4ClO_4 bei den verschiedensten Konz. Ferner bestimmten Vff. die Erniedrigung des F. von NH_3 durch Zugabe von NH_4ClO_4 . Den F. des NH_3 fanden Vff. bei $-76,2^\circ$. Ein erstes Eutektikum wurde bei -97° gefunden entsprechend einem NH_3 -Gehalt von 51%

ei Zugabe weiterer Mengen NH_4ClO_4 steigt die Schmelzpunktskurve scharf an u. zeigt zwei Knickpunkte entsprechend den Verb. $\text{NH}_4\text{ClO}_4 \cdot 6\text{NH}_3$ u. $\text{NH}_4\text{ClO}_4 \cdot 4\text{NH}_3$. (Rend. chim. ital. 56. 29—33. Rom.) GOTTFRIED.

S. Glixelli und Deniszczukowna, *Herstellung und Eigenschaften von Lösungen der Antimonsäure*. Um Lsgg. von *Antimonsäure* herzustellen, muß man eine konz. Lsg. von SbCl_5 (1:1) mit großen Mengen W. bei 0° hydrolysieren, die erhaltene Fällung gut auf dem Ultrafilter mit W. von 0° auswaschen, bis die letzte Spur Salzsäure entfernt ist. Nun wird der Nd. schnell auf 100° erhitzt, um ihn zu peptisieren, was einige Min. in Anspruch nimmt, darauf kühlt man wieder schnell auf 0° ab. Eine solche Lsg. kann bis zu Konz. von 294 g Sb_2O_5 /l hergestellt werden, u. dieselbe bleibt auch bei 0° lange Zeit unverändert beständig. In so hohen Konz. stellt diese Lsg. ein sehr dickes Gel dar, bis zu 150 g/l ist es noch eine schwach opalisierende Fl. Wurden die genannten Operationen langsam u. bei höherer Temp. ausgeführt, so verlor der Nd. die Fähigkeit, sich zu peptisieren. Aus Bestst. der Gefrierpunktniedrigung ergab sich ein Mol.-Gew. von ungefähr 10 000. Bei Bestst. der mol. Leitfähigkeit ergab sich, daß dieselbe mit der Zeit zunimmt, u. zwar in ausgeprägterem Maße bei den verdünnteren Lsgg., was durch eine Aufspaltung der Micellen in Körper von mol. Durchmesser erklärt wird, Kationen koagulieren die Lsg. der Antimonsäure nach den Regeln des Hardy-Schultzeschen Gesetzes. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 521—25.) HAASE.

Albert F. O. Germann und Harold Simmons Booth, *Thermische Analyse des Systems Bortrifluorid-Schwefelwasserstoff*. Vff. beschreiben eingehend die Darst. des Bortrifluorids u. des Schwefelwasserstoffes, wobei von den aller reinsten Ausgangsstoffen ausgegangen wurde. Großer Wert wurde darauf gelegt, daß die zur Darst. benutzte H_2SO_4 absolut NO -frei war, was daran zu erkennen war, daß das kondensierte Bortrifluorid keine rötliche Färbung aufwies. — Aus einer Kurve u. einer Tafel, in der die Ergebnisse der F.-Bestst. zusammengetragen sind, ergibt sich, daß es in dem System Bortrifluorid-Schwefelwasserstoff zunächst ein Maximum bei -137° gibt, in dem beide Komponenten in gleichen Mengen vorhanden sind, was auf die Existenz einer Verb. von der Formel $\text{BF}_3 \cdot \text{H}_2\text{S}$ hinweist. Diese Verb. ist bereits an ihrem F.-Punkt dissoziiert, was daraus hervorgeht, daß man kleine Mengen der einen oder der anderen Komponenten hinzufügen kann, ohne daß der F. wesentlich geändert wird; man erhält so ein abgerundetes Maximum. Die Kurve zeigt ferner auf beiden Seiten zwei Maxima noch zwei Eutektika, u. zwar das eine bei -148° u. 22% Schwefelwasserstoff, das andere bei annähernd 140° u. 53% Schwefelwasserstoff. — Bei einer Temp. von -99° u. 87½% Schwefelwasserstoff nehmen Vff. auf Grund des Kurvenverlaufes einen Umwandlungspunkt der krystallinen Additionsverb. $\text{BF}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{S}$ an, welche bei dieser Temp. in Bortrifluorid u. Schwefelwasserstoff dissoziieren soll. — Infolge der Flachheit des Maximums nehmen die Vff. an, daß es ohne Schwierigkeit möglich sein muß, das Bortrifluorid vom verunreinigten Schwefelwasserstoff durch fraktionierte Dest. zu reinigen. (Journ. Physical Chem. 30. 369—77. Cleveland, Ohio.) HAASE.

Reece H. Vallance, *Caros Reagens*. Die besten Ausbeuten an KHSO_5 wurden durch Verreiben von 20 g gepulvertem $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ mit 13 ccm konz. H_2SO_4 in einer durch Eiskältemischung gekühlten Schale während 15 Min. erreicht. Nach 50 Min. wurde die Mischung auf 50 g frisch zerkleinerten Eises gegossen, das sich in einem tief in die Kältemischung getauchten Becherglas befand. Dann wurde langsam neutralisiert durch Zugabe einer Lsg. von K_2CO_3 (äquivalent der angewandten H_2SO_4) in einer möglichst kleinen Menge W. im Verlauf von 30 Min. Die Mischung wurde filtriert im Vakuum über H_2SO_4 auf 50 ccm konz. — Der durchschnittliche Gehalt an ISO_5 betrug 100—110 g pro l. — Bei Umsetzung größerer Mengen sind die Resultate günstiger. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T 66.) R. SCHMIDT.

E. W. Guernsey und **M. S. Sherman**, *Die thermische Dissoziation von Natriumcarbid*. Vff. beschreiben App. u. Methode zur Darst. von Natriumcarbid, Na_2C_2 , durch Einleiten von C_2H_2 in geschmolzenes metall. Na u. untersuchen die therm. Zers. dieser Verb. Das Gleichgewichtssystem, daß beim Erhitzen von Na_2C_2 in geschlossenen Behälter gebildet wird, enthält 2 feste Phasen, Na_2C_2 u. C, u. eine Gasphase, in der sich Na-Dampf u. Na_2C_2 befinden, letzteres ist im Verhältnis zu Na zu vernachlässigen. Vff. verfolgen daher den Verlauf der Rk. an der Druckänderung des Na-Dampfes bei 600, 650 u. 700°. Der Druck des Na-Dampfes folgt angenähert der Gleichung $\log p = 9059 - 6609/T$. Bei etwa 800°, also unterhalb der Temp., bei welcher die techn. Darst. von NaCN (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 1932; C. **1925**. II. 1786) vorgenommen wird, beträgt der Dissoziationsdruck 1 at. Daraus folgt, daß, wenn Na_2C_2 bei der Bindung von N_2 zu NaCN gebildet wird, dieses nur in der Gasphase existieren kann. Bei 700° ist Na_2C_2 in der Gasphase weitgehend dissoziiert; der Partialdruck von gasförmigem Na über festem Na_2C_2 beträgt etwa 0,6 mm Hg verglichen mit 191 mm Dissoziationsdruck des Na. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 140—46. Washington [D. C.], Fix Nitrogen Res. Labor.) JOSEPHY

K. Alb. Vesterberg und **C. U. Willers**, *Über Thalliummeta- und Orthosilicat*. Durch Zutropfen einer verd. (ca. 4%ig.) Lsg. von Na-Metasilicat, das nach K. VESTERBERG (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **88**. 341 [1914]) hergestellt war, zu einer Lsg., die 2% Thalliumnitrat u. 4% Thalliumhydroxyd enthielt, bildete sich ein feinkörniger Nd., dessen Zus. der Formel $\text{Th}_2\text{SiO}_3 = \text{Thalliummetasilicat}$ entspricht. Das Thalliumorthosilicat wurde als gelblichweißer Nd. aus einer 11%ig. TIOH-Lsg. durch Zusatz von 4%ig. Na-Metasilicat erhalten, doch zeigte eine Analyse, daß es mit Metasilicat verunreinigt war. Anwendung von noch stärkerer TIOH-Lsg. führte aber zu einem kanariengelben Salz, das nahezu der theoret. Zus. von Th_4SiO_4 entsprach. Durch Schütteln von Th_2SiO_3 mit konz. TIOH-Lsg. u. Kochen läßt sich ebenfalls Th_4SiO_4 herstellen. Ein anderer Weg zur Darst. des Orthosilicats besteht darin, daß eine 11%ig. TIOH-Lsg. mit reaktionsfähiger, wasserhaltiger SiO_2 geschüttelt wird. Die Umsetzung ist nicht vollständig. Durch Erhöhung der TIOH-Konz. bestmögliches Verreiben des SiO_2 ließ sich ein Präparat herstellen, das eine Zus. von 7,28% SiO_2 u. 92,58% Th_2O besaß (berechnet nach der Formel Th_4SiO_4 : 6,61% SiO_2 , 93,39% Th_2O). (Arkiv för Kemi, Min. och Geol. **9**. No. 26. 1—8. Stockholm, Högskola.) HANTKE

G. Malquori, *Thermisches Verhalten der Puzzolane und ihre Reaktionsfähigkeit im festen Zustand mit einigen Oxyden und Carbonaten der Erdalkalien*. Vff. bestimmen von 3 verschiedenen Sorten von Puzzolanen die Erhitzungskurve. Während bis 900° die Kurven gleichmäßig ansteigen, zeigt das Kurvenstück zwischen 900 u. 1000° ein stark beschleunigtes Ansteigen der Temp. Dieselbe Erscheinung zeigen Kaolin, gefälltes Al_2O_3 ; Vff. nimmt an, daß das Verh. zwischen 900 u. 1000° auf einer Umwandlung des Zustandes der Tonerde beruht. — Mit BaO reagieren die Puzzolane bei denselben Temp., bei der auch Tonerde u. Kaolin von dem Oxyd angegriffen werden. Ebenso wird die Tonerde der auf verschiedene Temp. erhitzten Puzzolane von verd. HCl u. von Kalkwasser genau so angegriffen, wie die auf dieselben Temp. erhitzte künstliche Tonerde u. Kaolin. In allen Fällen wächst die Menge des sich in HCl lösenden Al_2O_3 bei Erhitzungstemp. bis zu 700°, um bei noch stärkerem Erhitzen sich sofort stark zu vermindern. (Gazz. chim. ital. **56**. 42—51. Rom.) GOTTFRIED

G. Malquori, *Die Aluminate des Barythydrates*. Das System $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-BaO-H}_2\text{O}$ bei 20°. In dem System $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-BaO-H}_2\text{O}$ weist Vff. bei 20° zwei Verbb. nach, u. zwar $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{BaO} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, die beständig ist in Lsgg. mit 3,5—2,1% BaO u. $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{BaO} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, stabil in Lsgg. mit 2,1—1,2% BaO. (Gazz. chim. ital. **56**. 51—55. Rom.) GOTTFRIED

H. Copaux und C. Matignon, *Über verschiedene Zustandsformen des Beryllium-oxids*. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 550—52. 1925. — C. **1926**. I. 1633.) ENSZLIN.

S. Einhorn, *Die Wirkung der organischen Säuren auf das Berylliumcarbonat*. Stütze der Ansicht von GLASSMANN (Chem.-Ztg. **31**. 8; C. **1907**. I. 707), daß organ. Salze des Be sich von kondensierten Säuren ableiten, kann ein vom Vf. dargestelltes Salz der *Acetylsalicylsäure* dienen, das durch Sättigen der w. wss. Lsg. der Säure mit BeCO_3 unter Dunkelfärbung der Lsg. entsteht, aus W. in W.-freien Krystallen erhalten werden kann u. nach den Analysen der Zus. $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_9\text{Be}_2$ entspricht, D. ¹⁶ 1,0978, l. in W. u. A., unl. in Ä., Bzl., Toluol, Lg., CS_2 , Chlf., NH_3 usw., in W. erst in Wärme l., in HCl unl. — Wss. Lsgg. von *Phenyllessigsäure*, *Gallussäure* u. *Essigsäure* lösen nur kleine Mengen BeCO_3 beim Kochen unter Entw. von CO_2 , *Sebacinsäure*, *Schleimsäure* u. *Hippursäure* greifen es nicht an. Dagegen lösen *Thioessigsäure* *Sulfosalicylsäure* große Mengen, die erste liefert dabei aber, indem zugleich H_2S entwickelt wird, das Acetat, die zweite einen unkrystallisierbaren Sirup. (Bulet. de Chim. din România **7**. 100—101. Cernăuți.) SPIEGEL.



H. Bredemeier, *Beitrag zur Polymorphie des Eisens*. Die röntgenograph. festgestellte Identität von α -Fe u. δ -Fe wird durch das thermodynam. Verh. des Fe bestätigt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 109—12. Düsseldorf.) LÜDER.

Th. Meierling und W. Denecke, *Über das Dreistoffsystem Eisen-Chrom-Kohlenstoff*. Vff. haben die Löslichkeitsgrenze u. die Lage des Perlitpunktes bei steigendem Gehalt bestimmt. Im übrigen wurden 2 Schnitte mit konst. C-Gehalt (0,7% C u. 2,5% C) bis zu 20% Cr untersucht. Dabei wurden die Annahmen von FISCHBECK u. v. Eisen **44**. 715; C. **1924**. II. 2132) bestätigt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 113—20. Mannheim.) LÜDER.

Franz Wever und Walter Reinecken, *Beiträge zur Kenntnis des Systems Eisen-Sinn*. (Vgl. S. 1633.) Das System Fe-Sn wurde therm., magnetometr. u. mkr. untersucht. Fe nimmt bis 18% Sn in fester Lsg. auf. Die Temp. der α/γ -Umwandlung des Fe wird mit zunehmendem Sn-Gehalt erhöht, die der γ/δ -Umwandlung erniedrigt. Mehr als 1,9% Sn tritt die γ -Phase nicht mehr auf. — Bei höheren Sn-Gehalten stabilisiert die Verb. Fe_3Sn aus, die bei 890° unter B. der Verb. FeSn_2 zerfällt. FeSn_2 zerfällt bei 780, 755 u. 490° polymorphe Umwandlungen. Die Erstarrungskurve der Legierungen von 48—75% Sn verläuft nahezu horizontal; eine Mischungslücke ist noch nicht vorhanden. — Vers., Fe-Sn-Legierungen mit mehr als 50% Sn auf reines Sn zu verarbeiten, waren erfolgreich. Durch Filtration der Legierungen oberhalb 890° erhält man neben Fe_3Sn -Krystallen eine Mutterlauge von 97% Sn. Diese läßt man bei 240° abkühlen, wobei sich FeSn_2 -Krystalle ausscheiden u. reines Sn abfiltriert werden kann. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 349—72. Düsseldorf.) LÜDER.

R. Weinland und O. Loebich, *Über die Ferrisalze substituierter Essigsäuren und der Malonsäure und ihre Konstitution*. Es wurden folgende Verbb. neu dargestellt: 1. *Hexamono-chloracetatodihydroxotriferriperchlorat*, $[\text{Fe}_3(\text{CH}_2\text{Cl}\cdot\text{COO})_6(\text{OH})_2]\text{ClO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$, ziegelrote Kryställchen. 2. *Hexamono-chloracetatodihydroxotriferrinitrat*, $[\text{Fe}_3(\text{CH}_2\text{Cl}\cdot\text{COO})_6(\text{OH})_2]\text{NO}_3\cdot 4\text{H}_2\text{O}$, rote glitzernde Blättchen, l. W., ll. A. 3. *Ferritrichloracetat mit 7 Säureresten*, $[\text{Fe}_3(\text{CCl}_3\cdot\text{COOH})_6(\text{OH})_2](\text{CCl}_3\cdot\text{COO})\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, rote Blättchen, l. W., ll. A., Aceton u. Ä. 4. *Ferritrichloracetat mit 8 Säureresten*, a) mit $4\text{H}_2\text{O}$, $[\text{Fe}_3(\text{CCl}_3\text{COO})_6(\text{OH})]\cdot(\text{CCl}_3\cdot\text{COO})\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, rote Blättchen, l. W., ll. A., Ä. b) Wasserfrei als Prismen. 5. *Ferritrichloracetat mit 6 Säureresten*, $\text{Fe}_3(\text{CCl}_3\cdot\text{COO})_6(\text{OH})_3\cdot 7\text{H}_2\text{O}$, rote Krystalle, l. W., ll. A., Ä., Aceton. 6. *Bas. Ferriiodacetat*, $\text{Fe}_3(\text{CH}_2\text{J}\cdot\text{COO})_6(\text{OH})_2\cdot 2\text{J}\cdot\text{COO}$, hellorangenes Pulver, wl. W., l. A. unter Zers. 7. *Hexacyanacetatodihydroxotriferriperchlorat*, $[\text{Fe}_3(\text{CH}_2\text{CN}\cdot\text{COO})_6(\text{OH})_2]\text{ClO}_4\cdot 8\text{H}_2\text{O}$, rote Säulchen, l. W., ll. A. 8. *Trimalonatodihydroxotriferriperchlorat*, $[\text{Fe}_3(\text{OCO}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{COO})_3(\text{OH})_2]\text{ClO}_4$, rosafarbenes Pulver, swl. W. u. A. 9. *Doppelsalz von Hexaglykolatodihydroxotriferriperchlorat Natriumperchlorat*, $[\text{Fe}_3(\text{CH}_2\text{OH}\cdot\text{COO})_6(\text{OH})_2]\text{ClO}_4\cdot \text{NaClO}_4\cdot 4\text{H}_2\text{O}$, braunrotes Pul-

ver, I. W. 10. *Pyridintriglykolatoferriat* (I.), hellgrünes Pulver, II. W., unl. A. 11. *Pyridindiglykolatoferriat* (II.), grünes Pulver, II. W., unl. A. 12. *Ferriperchloratneunhydrat*.



$\text{Fe}(\text{ClO}_4)_3 \cdot \text{ClH}_2\text{O}$, gelb verfilzte Nadeln. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 271—8 Würzburg, Univ.)

GOTTFRIED

R. Weinland und Ludwig Engel, Über pyridinhaltige Ferriformiate. (Neu einem Anhang über ein Ferrichlorid-(bromid-)Formiat.) Während den Ferrisalzen der Fettsäuren u. vieler anderer Mono- u. Dicarbonsäuren eigentümliche dreikernige Kationen zugrunde liegen, entstehen beim Eintritt von Pyridin in Ferriacetate in der Regel vierkernige Verbb., was sich rein äußerlich schon durch andere Farbe erkennen läßt. Beim Eintritt von Pyridin in die analog gebauten Chromiacetate tritt keine Änderung des Kernes ein, während die pyridinhaltigen Manganiacetatokationen sämtlich vierkernig sind. Da diese Kernänderung etwas Auffallendes ist, haben wir Ferriformiate u. Ferribenzoate daraufhin untersucht. Im Verlauf dieser Untersuchungen wurden folgende Salze dargestellt: 1. *Rotes pyridinhaltiges Ferriformiat*, $\text{Fe}_3(\text{HCOO})(\text{OH})\text{Pyr} + 2\text{H}_2\text{O}$; 2. *Formiatopyridintetraferriichlorid*, $\text{Fe}_4(\text{HCOO})_6(\text{OH})_4\text{Cl}_2\text{Pyr}$, gelbgraugrüne krystallin. Aggregate; 3. *Formiatopyridintetraferriperchloratformiat*, $\text{Fe}_8(\text{HCOO})_{16}(\text{OH})_8(\text{ClO}_4)_3\text{Pyr}$, 10, schwarze, glänzende Krystalle; 4. *Benzoatopyridintetraferriperchloratbenzoat*, $\text{Fe}_8(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO})_{16}(\text{OH})_8(\text{ClO}_4)_3\text{Pyr}_{12}$, graugrünes mikrokrySTALLIN. Pulver; 5. *Benzoatopyridintriferriperchlorat*, $\text{Fe}_6(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO})_{12}(\text{OH})_4(\text{ClO}_4)_2\text{Pyr}$, dunkelbraunrotes Pulver; 6. *Benzoatopyridintriferrirhodanid*, $\text{Fe}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO})_6(\text{OH})_3(\text{CNS})\text{Pyr}$, dunkelorange-rotes, glitzerndes Pulver; 7. *Diformiatochloroäqueoeisen*, $\text{Fe}(\text{HCOO})_2\text{Cl} \cdot \text{H}_2\text{O}$, leuchtend gelbgrünes Pulver; 8. *Diformiatobromoäqueoeisen*, $\text{Fe}(\text{HCOO})_2\text{Br} \cdot \text{H}_2\text{O}$, dunkelbraunrotes Pulver. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 33—45.)

GOTTFRIED

André Job und André Samuel, Bei Oxydation von Nickelcyaniden in Gegenwart von Hydroxylamin entstehende Komplexe. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 18 C. **1923**. III. 1151.) Es wird die aus $\text{KNi}(\text{CN})_4$ u. *Hydroxylamin* durch Luftoxydation gewonnene violette Lsg. untersucht. Sie enthält 3CN auf 1 Ni-Atom. Durch Neutralisation u. Behandlung mit HgCl_2 wird die violette Substanz in eine blaue, in Ä. l. Ver. übergeführt, die kein K u. auf 1 Ni nur 2 CN enthält, durch Einw. von KCN wieder in den violetten Körper umgewandelt wird u. beim Kochen mit angesäuertem W. N. u. N_2O in der Menge entwickelt, die die Anwesenheit von 1 NH_2OH auf 2 Ni beweist. In entsprechender Menge werden N_2O , N_2 u. NO bei Einw. von HgCl_2 auf die violette Verb. in stark alkal. Lsg. entwickelt. Die Wertigkeit des Ni in der violetten Verb. (u. somit auch in der blauen) ergibt sich daraus, daß sie mit 1 Mol. $\text{K}_2\text{Ni}(\text{CN})_4$ quantitativ unter B. von $\text{K}_2\text{Ni}(\text{CN})_4$ u. *Hydroxylamin* reagiert. Vff. schreiben daher der blauen Verb. folgendermaßen: $[(\text{CN})_2(\text{OH})\text{Ni}^{\text{III}} \cdot \text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{Ni}^{\text{III}}(\text{OH})(\text{CN})_2]$, das Analog der violetten: $[(\text{CN})_3(\text{OH})\text{Ni}^{\text{III}} \cdot \text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{Ni}^{\text{III}}(\text{OH})(\text{CN})_3]$. Im violetten Körper besitzt also, wenn die Verb. wirklich so gebaut wird, das Ni die Koordinationszahl 6. Es ist aber für die blaue Verb. auch die Formel denkbar: $(\text{H}_2\text{O})(\text{CN})_2\text{Ni}^{\text{III}}-\text{N}(\text{OH})\text{Ni}^{\text{III}}(\text{CN})_2(\text{H}_2\text{O})$, worin Ni mit N durch eine Kovalenz verbunden erscheint. Vff. erwägen auch die Möglichkeit, daß in der *Dimethylglyoximverb.* des Ni u. den Komplexen von Hofmann u. Ehrhardt (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **46**. 1457; C. **1913**. II. 29) gleichfalls mit N verbunden ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 579—81.) BKM.

J. F. Goggin, J. J. Cronin, H. C. Fogg und C. James, Metallisches Uranium. Nachdem die Red. von Uraniumoxyd mittels metall. Ca nur ein unreines Pulver ergeben hatte, wurde die Red. von Uraniumchlorid, das mittels Cl_2 u. Schwefelchlor aus dem Oxyd hergestellt worden war, versucht. Zu diesem Zwecke wurde das Chlor mit einem 10%ig. Überschuß an Ca-Spänen gemischt, in den Red.-Behälter gebracht

einen Alundumtiegel mit gleichem Deckel enthielt (damit kein Fe in das U geht); das Ganze kam in den Vakuumbehälter. Es wurde elektr. geheizt u. die Temp. dem Pyrometer verfolgt. Am Ende der Rk. wurde die CaCl_2 -Schlacke mit W. entfernt u. die zusammengeschmolzene M. analysiert: 99,31% U, 0,57% Fe, 0,09% C, 0,03% O_2 . Es zeigte sich dann, daß Ca die Ursache dieser Verunreinigungen war. In der darauf folgenden Anwendung von sorgfältig sublimiertem Ca ließ sich der Gehalt des gewonnenen U auf weniger als 0,01% herabdrücken. Dasselbe Verf. mit Erfolg zur Herst. von Zr, Be u. Th angewandt worden u. Verss. werden unternehmen, es auch bei V, Hf usw. zu verwenden. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 114—16. iv. New Hampshire, Durham, N. H.)

WILKE.

F. de Carli, *Reaktionen zwischen Bleidioxid und anderen Oxyden in festem Zustand*. untersucht bei molekularen Gemischen von PbO_2 mit anderen Oxyden, die Einw. PbO_2 auf die betreffenden Oxyde u. stellt von einigen die Erhitzungskurven graph. Folgende Oxyde wurden untersucht: $\text{PbO}_2 + \text{BaO}, \text{CaO}, \text{Cu}_2\text{O}, \text{SnO}, \text{FeO}, \text{MnO}, \text{NiO}, \text{As}_2\text{O}_3, \text{Sb}_2\text{O}_3, \text{Cr}_2\text{O}_3, \text{MoO}_3, \text{WO}_3, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{TiO}_2$ u. SiO_2 . BaO u. CaO bilden entsprechenden Plumbate, Cu_2O , SnO , FeO , MnO werden zu CuO , SnO_2 , Fe_2O_3 , As_2O_3 oxydiert, Sb_2O_3 bilden Bleiarsenate, bezw. -antimoniate, Cr_2O_3 gibt Chromat. MoO_3 u. WO_3 bilden Molybdate bezw. Wolframate. Al_2O_3 , TiO_2 , ebenso ZnO , MgO , CuO werden nicht angegriffen. SiO_2 beschleunigt lediglich die Zers. PbO_2 . (Gazz. chim. ital. **56**. 55—58. Rom.)

GOTTFRIED.

A. Eilert, *Das Zustandsdiagramm Calcium/Quecksilber*. Es wurde das System Hg therm. u. mkr. untersucht. Aus Amalgamen mit mehr als 2,15 Gewichts-% Ca kristallisiert primär die Verb. CaHg_3 . Diese reagiert bei 265° mit einer Schmelze u. 2,15% Ca unter B. der Krystallart CaHg_5 . Diese ihrerseits wird bei + 84° von der Schmelze von 0,8% Ca unter B. von CaHg_{10} zersetzt. Die erste Rk. verläuft nämlich schnell, die zweite bei gewöhnlicher Abkühlungsgeschwindigkeit nicht vollständig. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 96—104. Braunschweig.)

LÜDER.

George T. Britton und **James W. Mc Bain**, *Amalgame von Gold und Quecksilber*. Das binäre System Au-Hg wird untersucht durch direkte Analyse der mit festen Phase in Berührung stehenden Fl. Zwei Analysenmethoden wurden angewandt: 1. die Red. von AuCl_3 durch Eisenammoniumsulfat; 2. die Verdampfung Hg aus dem Amalgam in einem Kohlen gasstrom durch elektr. Heizung auf 350°. Dem Wägen wurde der Au-Rückstand auf Rotglut erhitzt. Die Unterss. wurden verschiedenen Temp. zwischen 18 u. 410° vorgenommen, der im Amalgam gegebene Au-Gehalt ist in Abhängigkeit von der Temp. tabellar. u. graph. wiederzugeben. Die Ausgangskonzz. des Au wurden zwischen 0 u. 60 At.-% variiert. Die Löslichkeit des Au im Hg wächst bis zu 300° langsam, von da ab schneller mit der Temp. Die Löslichkeitskurve hat ein Maximum bei 342° u. 14,6% Au, dann folgt ein Minimum bei 320° u. 22% Au, von hier ab nimmt die Löslichkeit des Au sehr rasch mit der Temp. zu. Das flache Maximum der Kurve scheint die B. der Verb. Hg_6 mit 14,3% Au anzudeuten. Die von Vff. gefundenen Werte weichen von denen von BRALEY u. SCHNEIDER (Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 740; C. **1922**. 120) vollkommen ab. Nach den Befunden der Vff. beträgt die Löslichkeit von Au in Hg bei Zimmertemp. 0,2%, während sie nach BRALEY u. SCHNEIDER 15% betragen soll. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 593—98. Bristol [Engl.], Univ.)

C. Mazzetti und **F. de Carli**, *Borate des Lithiums, Cadmiums, Bleis und Mangans*. folgende Borate wurden festgestellt: $\text{Li}_2\text{O} \cdot \text{B}_2\text{O}_3$, $\text{Li}_2\text{O} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3$, $\text{Li}_2\text{O} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3$, $\text{Li}_2\text{O}_3 \cdot \text{B}_2\text{O}_3$, $\text{Li}_2\text{O} \cdot 5\text{B}_2\text{O}_3$, $\text{CdO} \cdot \text{B}_2\text{O}_3$, $2\text{CdO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3$, $\text{PbO} \cdot \text{B}_2\text{O}_3$, $\text{PbO} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3$, $2\text{PbO} \cdot 5\text{B}_2\text{O}_3$, $\text{MnO} \cdot \text{B}_2\text{O}_3$, $\text{MnO} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3$, $\text{MnO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3$. Die Versuchsanordnung war folgende: Das Gemisch von Metalloxyd u. B_2O_3 wurde in einem Platintiegel zum Schmelzen gebracht u. einige Zeit im Schmelzfluß erhalten. Die Schmelze wurde auf in ein Platinschiffchen u. dieses in einen eigens konstruierten elektr. Ofen ge-

bracht. Sowie in der M. die ersten Krystalle auftraten, wurde die Temp. an der Gr. fläche zwischen Schmelze u. Krystall gemessen. Diese Zone rückt mit Fortschreiten der Krystallisation ebenfalls weiter u. alle 2 Stdn. wurden die Temp.-Messung wiederholt, bis die krystalline Zone nicht mehr weiter vorrückte. Die zuletzt gemessene Temp. wurde als Gleichgewichtstemp. zwischen Krystall u. fl. Schmelze angenommen. Der krystallisierte Teil wurde dann analysiert. (Gazz. chim. ital. **56**. 19—28. Rom.)

T. Karantassis, *Untersuchungen über die Komplexe des Zinnjodids*. (S. 1957.) Es wurden folgende Verbb. dargestellt: $\text{SnJ}_2 + (\text{CH}_3)_4\text{NJ}$. B.: Man mischt die Komponenten in h. wss. HJ mit einem Zusatz von HCl auf, setzt einige Sn-Stückchen zu u. läßt erkalten. Gelbe Nadeln. Geht an der Luft in $\text{SnJ}_4 + 2(\text{CH}_3)_4\text{NJ}$ über. — $\text{SnJ}_2 + (\text{CH}_3)_4\text{AsJ}$, die Lsg. darf nicht mit Sn reduziert werden, weil dabei auch Sn reduziert wird; gelbe Nadeln. — $\text{SnJ}_2 + \text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{NH}_2 \cdot \text{HJ}$. Gelbe Nadeln. — Salz in Pyridin: $\text{SnJ}_2 + \text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HJ}$. Gelbe Nadeln. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **43**—**44**.)

BIKERMAN

Stanislaw Holyński, *Über das Regenerieren von Molybdatresten*. Die spezifischen Gewichte der wässrig-ammoniakalischen und wässrigen Lösungen des „gewöhnlichen Ammoniummolybdats. Vgl. gibt eine ausführliche Vorschrift zur Darst. von Ammoniummolybdat aus den Molybdänrückständen nach der Best. der Phosphorsäure, die Fällung der Molybdänsäure mittels HNO_3 , Auflösung in wss. NH_3 u. Krystallisieren lassen des Ammoniummolybdats beruht. Außerdem werden die DD. von Ammoniummolybdatlsgg. in 0,51—6,35%ig. NH_3 u. in reinem W. angegeben. Die 15%ig. Lsg. in W. hat die D.¹⁹₁₈ 1,109, die 30%ig. 1,205, die 55%ig. 1,375. (Memoires de l'Institut national polonais d'économie rurale à Pulawy **6**. A. 213—19. 1925. Sep. [poln.]) B.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

Reginald E. Gibbs, *Struktur des α -Quarzes*. (Vgl. BRAGG u. GIBBS, S. 8.) Mit Hilfe des Laueverf., von Drehaufnahmen u. eines Ionisationsspektrometers wurde festgestellt, daß die O-Atome nicht in derselben, zur Basis parallelen Ebene wie die Si-Atome liegen. Beim Übergang des β -Quarzes in den α -Quarz kann nur eine geringe Strukturänderung eintreten, welche wahrscheinlich darin besteht, daß die tetraedische Atomanordnung des β -Quarzes verloren geht. Die vollständige Struktur konnte nicht bestimmt werden, da hierzu zuviel Parameter notwendig sind. (Proc. Roy. Soc. London Serie A. **110**. 443—55.)

BECKE

Ralph W. G. Wyckoff, *Die Krystallstruktur der bei höherer Temperatur stattfindenden (β -)Quarzmodifikation*. Es werden Pulver u. Spektralaufnahmen von β -Quarzen u. Laueaufnahmen des α - u. β -Quarzes gemacht u. festgestellt, daß zwischen beiden Modifikationen nur geringfügige Unterschiede bestehen können. Beide haben die gleiche 3 Moll. im Elementarparallelepiped u. besitzen annähernd die gleichen Abmessungen derselben. Für den β -Quarz sind die Kantenlängen des hexagonalen Elementarparallelepipeds $a = 5,01$, $c = 5,47$ Å. Die Raumgruppe ist $6 D_4$ oder $6 D_5$. B. sind enantiomorph. Atomkoordinaten für $6 D_4$: O (u , u , $\frac{5}{6}$), ($2u$, u , $\frac{1}{2}$), (u , $2u$, $\frac{5}{6}$), ($2u$, u , $\frac{1}{2}$), (u , $2u$, $\frac{1}{6}$); Si ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$), (0 , $\frac{1}{2}$, 0), ($\frac{1}{2}$, 0 , $\frac{2}{3}$); für $6 D_5$: O (u , u , $\frac{1}{6}$), ($2u$, u , $\frac{1}{2}$), (u , $2u$, $\frac{5}{6}$), (u , u , $\frac{1}{6}$), ($2u$, u , $\frac{1}{2}$), (u , $2u$, $\frac{5}{6}$); Si ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$), (0 , $\frac{1}{2}$, 0), ($\frac{1}{2}$, 0 , $\frac{2}{3}$). Parameter $u = 0,197 \pm 0,004$. Jedes Si-Atom ist tetraedisch von 4 O-Atomen u. jedes O-Atom in gleichem Abstand von 2 Si-Atomen umgeben. Im Komplex läßt sich kein definiertes SiO_2 -Mol. abgrenzen. (Amer. Journ. Sci. **SILLIMAN** [5] **11**. 101—12. Science **62**. 496—97. Washington, Geophysic. Lab.) BE

E. Bonstedt, *Über den Columbit aus dem Dorf Lipowka (Ural)*. Die in der Lipowka-gegend sehr seltenen Columbitkrystalle zeigten das Achsenverhältnis $a:b:c = 0,96:1:0,35248$. Eine chem. Analyse konnte wegen Mangel am Material nicht ausgeführt werden; es wurde nur ein hoher Mn-Gehalt festgestellt. Das Mineral tritt mit Qu.

solit, Turmalin, Worobjewit u. Apatit auf. (Bull. Acad. St. Petersburg 1925.

—18. St. Petersburg, Akad. d. Wiss.)

BIKERMAN.

S. Kurbatow und **L. Ssolodownikowa**, *Vesuvianite der russischen Lagerstätten.*

(S. 1128.) Krystallograph. Beschreibung. (Bull. Acad. St. Petersburg [6] 1923.

—28. Tomsk, Univ.)

BIKERMAN.

G. Carobbi und **S. Restaino**, *Beitrag zum Studium der synthetischen Pyromorphite, Mimetesite und Vanadinite, in denen das Blei teilweise durch eine Lanthanerde*

ersetzt ist. Die natürlich vorkommenden Pyromorphite, Mimetesite u. Vanadinite

enthalten die Zus. $\text{PbCl}_2 \cdot 3\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{PbCl}_2 \cdot 3\text{Pb}_3(\text{AsO}_4)_2$ u. $\text{PbCl}_2 \cdot 3\text{Pb}_3(\text{VO}_4)_2$. Vff. ver-

suchen in den synthet. dargestellten Mineralien das Pb teilweise durch Lanthan,

Praseodym, Neodym u. Cer zu ersetzen. Bei den Pyromorphiten gelang es Vff., Verbb.

mit einem Gehalt von 14% an Seltenenerdphosphat darzustellen; bei den Vanad-

initen waren die Grenzen noch niedriger. Es gelang Vff. nicht, Vanadinite mit mehr

als 5% an Phosphat der seltenen Erden zu bekommen. Bei den Mimetesiten erhielten

die Vff. keine zur Analyse ausreichende Menge der gesuchten Verbb. (Gazz. chim. ital.

59—68. Neapel.)

GOTTFRIED.

Massimo Fenoglio, *Neuer Beitrag zum Studium der vererzten Zone von Cogné*

(Elatolite). Vff. berichtet über das bis jetzt nicht bekannte V. von *Brugnatellit*, $\text{MgCO}_3 \cdot$

$(\text{OH})_2 \cdot \text{Fe}(\text{OH})_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ in den Gruben von Cogné u. ferner über das V. von kry-

stallisiertem Kalkstein in Gemeinschaft von *Brucit* u. *Humit* in den Magnetitlagern

von Cogné. (Atti della Reale Accad. Scienze di Torino 61. 114—22.) GOTTFRIED.

A. Fersman, *Über die Mineralassoziationen in der Chibinsk-Tundra im Russisch-*

Lappland. Allgemeine Beschreibung u. Geschichte der Lagerstätten von Chibinsk-

Lappland-Tundra, die Zr, Ti, seltene Erden usw. enthalten (vgl. BONSTEDT, Bull.

St. Petersburg [6] 1924. 105; S. 1128.) (Bull. Acad. St. Petersburg [6] 1923.

80.)

BIKERMAN.

A. Fersman, *Über die Krystallite des magmatischen Calciumcarbonats aus der*

Chibinsk- und Lujawrurt-Tundra. (Vgl. vorst. Ref.) In verschiedenen Gesteinen in

der Chibinsk- u. Lujawrurt-Tundra wurden tannenzweigartige Höhlen (bis 8 cm lang)

gefunden, die nach Vff.s Annahme einst vom CaCO_3 ausgefüllt waren, u. zwar in einer

Modifikation als *Elatolit*. Der *Elatolit* ist über $970 \pm 5^\circ$ beständig u. bildet

verschiedene morphosen nach Calcit. (Bull. Acad. St. Petersburg [6] 1923. 251—73.) BKM.

A. Fersman, *Über das gesetzmäßige Zusammenwachsen der Mineralien in der*

Chibinsk- und Lujawrurt-Tundra. (Vgl. vorst. Ref.) (Bull. Acad. St. Petersburg [6]

1923. 275—90. St. Petersburg.)

BIKERMAN.

P. Lasareff, *Über die Ergebnisse der geophysikalischen Arbeiten im Gebiete der*

Chibinsk magnetischen Anomalie. (Vgl. Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 180;

1924. II. 1573.) Die magnet. Anomalie im Gouvernement Kursk hat zwei durch

ein Minimum getrennte Maxima, während die Schwereanomalie im ganzen Gebiet

derselben Größenordnung ist. Der daraus gezogene Schluß, daß in der Nähe des

Maximums die magnet. Eisenerze in die unmagnet. verwandelt sind, ist durch Bohr-

ungen bestätigt worden. Man fand in 167 m Tiefe hämatithaltige Quarzite, die bis

zu 10% Fe enthalten. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1150—51. 1925.) BIKERMAN.

D. Beljankin, *Zur Petrographie des Bergpasses Schtulu-Wzek im Zentral-Kaukasus.*

(Bull. Acad. St. Petersburg [6] 1923. 95—102. St. Petersburg, Ssosnowka.) BKM.

E. Mathias, *Beitrag zur Kenntnis der Materie des Kugelblitzes. Farbe. Chemische*

Unheillichkeit. Die kugelförmigen Blitze sind manchmal blau. Vff. glaubt, daß

die blaue Farbe vom brennenden S herrührt, da die Anwesenheit von S im Blitz mehr-

fach festgestellt wurde. Der Ggw. von S ist auch der unter Umständen wahrnehmbare

Bestandteil des Blitzes zuzuschreiben. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1111—14.

1925.)

BIKERMAN.

D. Organische Chemie.

Raymond Delaby und Georges Morel, Über Methylalkylglycerine, ($[CH(OH)]_3 \cdot R$. (Vgl. S. 2687.) Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 112. II. 390. Nachzutragen ist: *Allophanat des Methylpropenylcarbinols*, $C_7H_{12}O_3N_2$, sei Nadeln, F. 158—159°. — Auch die Addition von $HOBr$ nach dem Verf. von FOURN. u. PUYAL (Bull. Soc. Chim. de France [4] 31. 424; C. 1923. I. 34) an die Propenylcarbinole u. Verseifung der gebildeten Bromhydrine wurde versucht. Die Resultate waren jedoch nur unwesentlich besser als mit den Chlorhydrinen. — Die *Methylalkylglycerine* sind, frisch dargestellt, viscose, brennend u. schwach bitter schmeckend. Im Vakuum über H_2SO_4 krystallisieren sie teilweise sehr langsam, was verständlich ist, da infolge der zwei u. drei asymm. C-Atome wahrscheinlich Gemische von fest u. fl. Isomeren vorliegen. Die aus *Methyläthylglycerin* isolierten Krystalle bes. F. ca. 47°. — Wie im kurzen Ref. bemerkt, entstehen bei der Umsetzung der Dibromhydrine mit K-Acetat infolge teilweiser HBr -Abspaltung Monobromverb. Diese befinden sich im Vorlauf der Methylalkylglycerine u. wurden in zwei Fällen isoliert. Es dürfte sich um Gemische der Verb. $CH_3 \cdot CH \cdot CBr \cdot CH(OH) \cdot R$ u. $CH_3 \cdot CBr \cdot CH(OH) \cdot R$ handeln. Verb. C_5H_9OBr ($R = CH_3$), Kp.₂₀ 86—88°. Daraus mit Br in Verb. $C_5H_9OBr_3$, rötliche Fl., Kp.₁₀ 137—140°, wenig haltbar. — Verb. $C_6H_{11}OBr$ ($R = C_2H_5$), Kp.₂₀ 90—95° u. 100—105°. — *Methylpropyltriacetin*, $C_{13}H_{22}O_6$. Aus dem bei der Darst. des *Methylpropylglycerins* erhaltenen Acetingemisch mit sd. Ac_2O anhydrid + Na-Acetat. Kp.₂₀ 156—158°. — Die Dibromhydrine, welche für die Darstellung der Glycerine nicht isoliert werden, wurden aus den Propenylalkylcarbinolen mit Br_2 in Ä. dargestellt. *Dimethyldibromhydrin* oder *2,3-Dibrompentanol-(4)*, $C_5H_{10}O_2$, Kp.₂₄ 112—114°. — *Methyläthyldibromhydrin* oder *2,3-Dibromhexanol-(4)*, $C_6H_{12}O_2$, Kp.₁₅ 116—118°. — *Methylpropyldibromhydrin* oder *2,3-Dibromheptanol-(4)*, $C_7H_{14}O_2$, Kp.₁₃ 126—128°. — Benzoylierung der Methylalkylglycerine nach LIPP u. MIL. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 88. 361 [1913]) ergab ölige Prodd. der ungefähren Zus. $C_{10}H_{18}O_2$. Dibenzooaten. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 220—30. Paris, Faculté de Pharmacie.)

LINDENBAUM

G. Lejeune, Beitrag zur Kenntnis der Oxydierbarkeit organischer Substanzen. Die benutzten organ. Substanzen wurden durch $KMnO_4$ oder $K_2Cr_2O_7$ (0,01-mol. Lsgg.) in molaren wss. Lsgg. von K_2CO_3 , $KHCO_3$ oder H_2SO_4 oxydiert. Die Oxydation der primären Alkohole (Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Butyl-, Amylalkohol) ist monomolekular u. hängt nur von der Konz. des Alkohols ab in alkal. Lsg., ist bimolekular auch von der Konz. des Dichromats abhängig in essigsaurer Lsg., verläuft anor. (mit einem Geschwindigkeitsmaximum) in mineralsauren Lsgg. Die Oxydation der sekundären Alkohole (*i*-Propyl-, *i*-Butyl- u. *i*-Amylalkohol) ist monomolekular in alkal. Lsg., bimolekular in saurer Lsg. Die Aldehyde (Acet-, Propion- u. Butyraldehyd) werden in saurer Lsg. durch Dichromat in einer bimolekularen Rk. oxydiert. Die Reihenfolge der Oxydation von Ketonen (Aceton, Methyläthyl-, Methylpropyl- u. Dipropylketon) liegt zwischen 0 u. 1 in sauren u. alkal. Medien. — Zur Erklärung nimmt man, daß die Oxydation sich in 3 Stadien vollzieht: 1. Organ. Substanz + Lösungsmittel $\rightleftharpoons$ Komplex; 2. Komplex $\rightleftharpoons$ akt., direkt oxydierbare Form; 3. akt. Form + Oxydationsmittel $\rightarrow$ Oxydationsprodd. Die Rk. 2 ist die langsamste u. bedingt den Reaktionsverlauf im Falle der primären u. sekundären Alkohole in alkal. Lsg. Die Vorgänge 1 u. 2 vollziehen sich mit ähnlichen Geschwindigkeiten u. viel langsamer als der Vorgang 3; verwirklicht im Falle der primären Alkohole in saurer Lsg. u. der Ketone. Wenn schließlich der 3. Vorgang ausschlaggebend ist, so ist die Rk. bimolekular (sekundäre Alkohole u. Aldehyde in sauren Medien, primäre Alkohole in essigsaurer Lsg.). — Der Temperaturkoeffizient zwischen 25 u. 35° ergab sich in den untersuchten Rkk. zu 1,6—2,6. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 694—96.)

BIKERMAN

V. Vesely und **H. Majtl**, *Über Iso-Ölsäure und die anderen bei der Destillation 10-Oxystearinsäure entstehenden ungesättigten Fettsäuren*. Die von SAYTZEW (Journ. f. prakt. Ch. [2] **37**, 269 [1888]) zuerst erhaltene, von JEGOROW (Journ. f. prakt. Ch. [2] **539** [1912]) als *Octadecen-(10)-säure-(1)* erkannte *i-Ölsäure* vom F. 43—45 bezw. 42° nach ARNAUD u. POSTERNAK (C. r. d. l'Acad. des sciences **150**, 1525 [1910]) einmisch mehrerer Säuren sein. Übrigens versteht man unter der Bezeichnung *i-Öl-* jede von der Δ^9 -Elaidinsäure verschiedene feste ungesätt. Säure mit C_{18} . — Darst. der *i-Ölsäure* haben Vff. nach den Angaben von SAYTZEW gearbeitet. Um einer Säure von der richtigen Jodzahl zu gelangen, muß man von einer von gesätt. freien Ölsäure ausgehen. Letztere wurde daher nach dem Verf. von TWITCHELL (d. and Engin. Chem. **13**, 805) gereinigt, mit konz. H_2SO_4 (Temp. nicht über 100°) in *10-Oxystearinsäure* übergeführt u. diese nach Umkrystallisieren aus A. u. Ä. in einem mittleren Vakuum dest. Bei kleineren Mengen erhitzt man erst ca. $\frac{1}{2}$ Stde. über 160—200 mm auf 300° u. dest. dann unter 100 mm über, bei größeren Mengen (10 g) ist das Vorerhitzen unnötig. Das so erhaltene Prod. konnte, da die Dehydratierung der 10-Oxystearinsäure sowohl zwischen dem 9. u. 10. als auch zwischen dem 10. u. 11. C-Atom erfolgen u. jede der ungesätt. Säuren in zwei stereoisomeren Formen auftreten kann, enthalten: Ölsäure, Elaidinsäure, cis- u. trans-*i-Ölsäure*. Es wurde durch Abpressen in einen festen u. fl. Teil zerlegt. Ersterer besaß nach Umkrystallisieren aus PAe. u. Ä. F. 35—36°, Jodzahl 89,80. Ihm wurde nach ARNAUD u. POSTERNAK in alkoh. Lsg. durch fraktionierte Fällung mit $\frac{1}{10}$ -n. alkoh. NaOH ein Teil der *Elaidinsäure*, F. 44—44,6°, entzogen, diese durch Überführung in das Anhydrid die beiden Dioxystearinsäuren identifiziert. Die weitere Zerlegung des Rückstandes (F. 37—38°, Jodzahl 89,4) gelang durch Füllen der w. alkoh. Lsg. mit Zn-Acetat, krystallisieren des Zn-Salzes aus A. (+ einigen Tropfen Eg.) u. Zerlegen mit verd. H_2O_4 . Die so erhaltene feste *i-Ölsäure*, $C_{18}H_{34}O_2$, die Vff. (vgl. Bemerkung am Schluß) *i-Elaidinsäure* nennen, bildete nach mehrmaligem Umkrystallisieren aus A., dann Ä. Rhomben, F. 43,5—44°, Jodzahl 89,20. F.-Depression mit Δ^9 -Elaidinsäure 7°. — *Anhydrid*, $C_{36}H_{66}O_3$. Mit sd. Acetanhydrid. Rhomben aus A., F. 34,5°, also tiefer als die reine, entgegen der Regel von HOLDE (vgl. HOLDE u. RIETZ, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**, 1200 [1924] I. 751), Jodzahl 92,03. — *Amid*, $C_{18}H_{35}ON$. Durch Überführen der Säure in PCl_3 in das Chlorid u. Umsetzen desselben mit NH_4OH . Krystalle aus A. (+ Spur H_2O), F. 83°, Jodzahl 90,04. — *10,11-Dioxystearinsäuren* aus Δ^{10} -Elaidinsäure. 1. Mit alkal. $KMnO_4$ -Lsg. Aus Ä., F. 84,5°. 2. Mit Caroscher Säure bei 40—50°, dann abdestillieren bei Zimmertemp., in W. gießen, mit alkoh. KOH verseifen. Aus Ä., F. 99,5—100°. — *11-Oxystearinsäure*. Zu geschmolzener Δ^{10} -Elaidinsäure gibt man konz. H_2O_4 , läßt 12 Stdn. stehen, kocht mit W. u. verseift das Öl mit alkoh. KOH. Rhomben aus Ä., A., PAe., wieder Ä., F. 75—76°. Enthält vielleicht 10-Oxystearinsäure, mit der sie keine F.-Depression gibt. — Um festzustellen, ob in dem ursprünglichen festen Säuregemisch (F. 35—36°) noch andere Säuren enthalten sind, wurde das Gemisch mit Caroscher Säure oxydiert. Aus dem bei 106—109° schm. Gemisch von 10-Oxystearinsäuren konnten durch Krystallisation aus Ä. nur zwei Säuren mit den Jodzahlen 99 u. 99—100° isoliert werden. Erstere (wl. in Ä.) entspricht der Δ^9 -, letztere der Δ^{10} -Elaidinsäure (Darst. aus der reinen Säure vgl. oben). Zur Bestätigung wurde die Säure vom F. 99—100° nach ALBITZKY (Journ. f. prakt. Ch. [2] **67**, 289 [1913]) mit HBr in Dibromstearinsäure übergeführt u. letzterer mit Zn-Staub u. HCl das Br entzogen. Die resultierende Säure war ident. mit der Δ^{10} -Elaidinsäure. Der feste Teil des Destillates aus 10-Oxystearinsäure besteht somit nur aus Δ^9 - u. Δ^{10} -Elaidinsäure u. stellt, da er bei weiterem Umkrystallisieren Zus. u. F. nicht ändert, ein Gemisch beider dar. — JEGOROW hat für seine *i-Ölsäure* vom F. 42° nachgeprüft, daß sich die Doppelbindung zwischen dem 10. u. 11. C-Atom befindet. — Nach dem gleichen Verf. gelangten Vff. für ihre reine Δ^{10} -Elaidinsäure zu demselben

Resultat, obwohl sie nur die Sebacinsäure, nicht jedoch (wegen zu geringer Menge) die Caprylsäure isolieren konnten. — Daß die Δ^{10} -Elaidinsäure die *trans*-Form stellt, folgt daraus, daß sie von N_2O_3 nicht verändert wird.

Bestätigt wurde der letztere Befund durch die Unters. des fl. Teils des Destillates aus 10-Oxystearinsäure. Wenn es auch nicht gelang, die der Δ^{10} -Elaidinsäure sprechende *cis*-Form, also die Δ^{10} -Ölsäure, daraus in Substanz zu isolieren, so wurde doch ihre Ggw. mit aller Sicherheit erwiesen. Zunächst wurde das Gemisch zur Entfernung von noch vorhandenen festen Säuren mehrmals mit Pb-Acetat in A. gegeben, bis statt der erst festen eine ölige Fällung resultierte, die festen Ndd. verworfen, Säuren mit HNO_3 abgeschieden, unverseifbare Stoffe mit alkoh. KOH u. PAe. entfernt u. die Säuren nun einer ähnlichen Fällung mit Zn-Acetat unterworfen. So wurde ein Säuregemisch vom E. 30° u. F. 130° (wie reine Ölsäure) erhalten, das in die Ätherester übergeführt wurde. Hauptfraktion Kp.₆₀ $270-272^\circ$, dann Kp.₂₅ $241,5-243^\circ$. Die daraus freigemachten Säuren lieferten unter 20 mm fünf Fraktionen zwischen 239 u. 245° , sämtlich E. 30° , F. 120° , Jodzahl 90,6. Diese Fraktionen wurden mit alkal. $KMnO_4$ -Lsg. oxydiert u. gaben übereinstimmend bei $109-113^\circ$ schmelzende Gemische von Dioxystearinsäuren, die mittels Ä. in dieselben Säuren von FF. 131 u. 99,5—100 zerlegt werden konnten, wie sie oben aus dem festen Säuregemisch mit Carosäure erhalten worden waren. — Die Oxydation derselben Fraktionen mit Carosäure lieferte ein Prod. vom F. 76° , zweifellos ein Gemisch der Dioxystearinsäuren von FF. 95,5⁰ (aus Δ^9 -Ölsäure) u. 84,5⁰ (aus Δ^{10} -Ölsäure), aber wegen Leichtlöslichkeit nicht zerlegbar. — Bei der Einw. von $HNO_3 + NaNO_2$ auf die fl. Säuren wurde bei 35° schmelz. eutekt. Gemisch von Δ^9 - u. Δ^{10} -Elaidinsäure erhalten. — Nach diesen Resultaten bestehen die fl. Säuren aus Δ^9 - u. Δ^{10} -Ölsäure. — Weiter läßt sich folgen, daß durch H_2SO_4 -Verseifung u. Dest. gewonnenes Stearin außer Palmitin- u. Stearinsäure auch Δ^9 - u. Δ^{10} -Elaidinsäure, ebenso Olein außer Δ^9 - auch Δ^{10} -Ölsäure enthält. Vff. halten die Bezeichnung „i-Ölsäure“ für schlecht gewählt. Besser ist es, sämtliche möglichen *cis*-Formen als „Ölsäuren“, die *trans*-Formen als „Elaidinsäuren“ zu bezeichnen u. den Ort der Doppelbindung beizufügen. (Bull. Soc. Chim. de France **39**. 230—48. Brünn, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM

E. Darmais, Über einen Fall der Mutarotation. Anwendung zur Untersuchung der Verseifung von Äthylloxalat durch Wasser und verdünnte Säuren. Vff. benutzen schon früher das Ammoniumdimolybdomalat als Reagenz auf Substanzen, die Molybdänsäure binden können (vgl. Journ. de Physique et le Radium [6] **5**. 1917; C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 921; C. **1925**. I. 39. II. 158; DARMAIS u. HONORE LAITRE, C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 629; C. **1925**. I. 218). Eine von diesen Substanzen ist die Oxalsäure, während ihre Diester mit MoO_3 nicht reagieren u. die Drehung des Ammoniumdimolybdomalats nicht beeinflussen. Setzt man einen Diester einer Ammoniumdimolybdomalatlsg. zu, die stets etwas sauer reagiert ($pH = 4$), so wird er allmählich hydrolysiert. Die gebildete Oxalsäure ändert die Drehung der Lsg., die also als Maß der Rk. benutzt werden kann. Man kann auch die Hydrolyse in reinem W. verfolgen, indem man aus einer wss. Diäthylloxalatlsg. zu verschiedenen Zeiten Proben nimmt u. mit Ammoniumdimolybdomalat versetzt. In 0,05-n. Lsg. ist die Hydrolyse ca. doppelt so rasch als in W. Monoäthylloxalat wird viel rascher hydrolysiert als der Diäthylester. Er kann übrigens nicht unzersetzt aufbewahrt werden, weil er freiwillig in Oxalsäure u. Diäthylester zerfällt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1137—39. 1925.) BIKERMAN

E. Darmais, Untersuchungen über den Einfluß der Borsäure auf das Drehvermögen der Äpfel- und Weinsäure. I. Allgemeines und Bor-Äpfelsäurekomplex. Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 921; vgl. C. **1925**. II. 158. Nachzutragen ist, daß die gegenseitige Wrkg. von Bor- u. Äpfelsäure auch potentiometrisch ($[H^+]$ wurde mit einer Chinhydronelektrode gemessen) untersucht wurde. Das isolierte

H_4 -Salz des Bor-Äpfelsäurekomplexes hat die Formel $B_2O_3(NH_4 \cdot C_4H_5O_5)_6$ oder $O_3(NH_4 \cdot C_4H_5O_5)_4$. (Journ. de Chim. physique **23**. 130—56. Nancy, Univ.) BKM.


E. Darmais, *Mutarotation von Gemischen der Molybdate und des Äpfelsäure-äthylesters. Wahrscheinliche Konstitution der Abkömmlinge der Molybdänäpfelsäure*. Einw. von MoO_3 oder von Molybdaten auf Äpfelsäurediäthylester ist bei 0° un-
deutend, sehr stark dagegen bei 100° , wo die Lsg. sich infolge der Red. der Molyb-
te blau färbt u. die genaue polarimetr. Unters. unsicher macht. Es wurde daher
e Temp. von 80° gewählt, bei der zwar die Umwandlung langsamer vor sich geht,
er dennoch als Funktion der Zeit aufgenommen werden konnte. Bei den Tartraten
rd die Mutarotation nur bei den stärker bas. Molybdaten bemerkenswert; sie ist
n abhängig von dem Verhältnis Ester zu MoO_3 u. der Gesamtkonz. In Tafeln
rden die Drehwerte folgender bas. Molybdate im Gemisch mit $C_4H_4O_5(C_2H_5)_2$ an-
gegeben: $(MoO_4)_2H_3Na$; $(MoO_4)_2H_2Na_2$; MoO_4Na_2 ; $MoO_4Na_2 + NaOH$; — im Ver-
hältnis 2 MoO_3 — $C_4H_4O_5(C_2H_5)_2$ u. im Verhältnis 1 MoO_3 —2 $C_4H_4O_5(C_2H_5)_2$. Die
ts negative Drehung geht durch ein Maximum u. kommt dann auf Null zurück,
s mit einer B. einer später entstehenden rechtsdrehenden Komponente durch Ver-
fung erklärt wird. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 455—57.) HAASE.

E. W. Guernsey und **M. S. Sherman**, *Die thermische Dissoziation von Natrium-
imid*. (Vgl. S. 2894 u. Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 1932; C. **1925**. II. 1786.)
wird eine Methode zur Darst. von $NaCN$ von hoher Reinheit angegeben. Reiner
 HCN wird nach WADE u. PANTING (Journ. Chem. Soc. London **73**. 255 [1898])
rgest. u. zu einer Lsg. von reinem $NaOH$ in absol. A. gegeben. Das Rk.-Gefäß
rd fest verschlossen einige Stdn. im Eisbad gekühlt. $NaCN$ krystallisiert aus der
oh. Lsg., es wird abfiltriert, mit A. gewaschen, im Vakuumexsiccator über P_2O_5
rocknet, dann bei 110° getrocknet u. in H_2 - oder He-Atm. geschmolzen. Die
erm. Zers. von $NaCN$ wurde durch langsames Überleiten eines bekannten Vol.
s, meistens He, über $NaCN$ bei einer bestimmten Temp. u. Analyse des austretenden
ses gemessen. Bei der Dissoziation von $NaCN$ entstehen Na_2C_2 , N_2 , Na u. C .
e Partialdrucke von $NaCN$, N_2 u. Na_2C_2 in He-Atm. sind bei 600° , 1000° u. 1050°
in N_2 -Atm. bei 1050° , 1100° , 1200° , 1220° u. 1255° angegeben, u. Gleichgewichts-
stanten sind daraus berechnet. Der Dampfdruck über $NaCN$ rührt zum größten
il von der Zers.-Prodd. her, so sind z. B. für 1050° in He-Atm. folgende Partial-
rücke in mm Hg angegeben: Na 117, Na_2C_2 21,0, N_2 108 u. $NaCN$ 21. Bei allen
rsuchstemp. war Na_2C_2 weitgehend in Na u. C dissoziiert. (Journ. Americ. Chem.
e. **48**. 695—704. Washington [D. C.], Fixed Nitrogen Research Labor.) JOS.

F. M. Litterscheid, *Über die „neue“ rote Kupferrhodanverbindung M. Speters
l deren angebliche Umwandlung in das bekannte gelbe Cuprocuprirhodanid*. In der
en $CuCNS$ -Verb. SPETERS (Ztschr. f. mediz. Chemie **3**. 14; C. **1925**. I. 2069) liegt
ne neue Verb. vor, sondern dunkelziegelrotes $CuOH$ unter Umständen gemengt
t unverändertem $CuCNS$. Das durch Lösen in HCl u. Ausfällen mit Na_2CO_3 angeblich
altene Cuprocuprirhodanid ist Cuprocarbonat, das beim Kochen in $CuOH$ über-
t. (Ztschr. f. medizin. Chemie **3**. 46—47. 1925. Hamm.) JUNG.


Max Speter, *Berichtigung zu meiner Notiz „Über eine neue rote Cu-Rhodan-
bindung und deren Umwandlung in das bekannte gelbe Cuprocuprirhodanid“*. Vf.
lt seinen Irrtum entsprechend den Ausführungen LITTERSCHEIDS (vorst. Ref.)
tig. (Ztschr. f. medizin. Chemie **3**. 47. 1925. Wehlen, Sächs. Schweiz.) JUNG.

Stanley J. C. Snedker, *Der Bildungsmechanismus von Triphenylguanidin und
nlythiocarbimid aus Thiocarbanilid*. (Vgl. S. 902.) Vf. gibt hierfür folgende Er-
rung: Da Thiocarbanilid in tautomerer Form:




treten kann, so entsteht bei der Abspaltung von 1 Mol. H_2S aus 2 Moll. Thiccarb-

anilid (wobei 1 Mol in der tautomeren aci-Form vorliegt) eine instabile Verb., die in Triphenylguanidin u. Phenylthiocarbimid zerfällt.





Durch diese Formulierung werden ferner die Verss. von WEITH erklärt (vgl. B. Dtsch. Chem. Ges. **9**. 810 [1876]).



Verss. ergaben, daß sich in einer Lsg. von Thiocarbanilid in 15%ig. NaOH beim Stehen *Diphenylcarbamid* abscheidet. — Die Methylierung des Thiocarbanilids mit Methylsulfat ergab *S-Methylthiocarbamilid*. Aus Hexan F. 109° (vgl. WILL, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **14**. 1489 [1881]). — Thiocarbanilid in CS₂-Lsg. u. Na-Acetanilid ergab *Na-Thiocarbamilid*, C₁₃H₁₁N₂SNa. In Berührung mit der Haut gibt diese Substanz ein böses Ekzem. (Journ. Soc. Chem. Ind. **44**. T 547—48. 1925. Liverpool Univ.) BEREND.

C. Mazzetti und **F. de Carli**, *Additionsprodukte von Schwefeldioxyd an Benzol*. Der Krystallisationsbeginn von Mischungen verschiedener Konz. von fl. SO₂ u. C₆H₆ wurde bestimmt. Das Diagramm zeigt drei Maxima: bei —15° u. 54,5% C₆H₆, bei —40° u. 37,5% C₆H₆ u. bei —52° u. 28,5% C₆H₆. Das erste Maximum entspricht einem Verb. C₆H₆·SO₂, das zweite C₆H₆·2SO₂ u. das dritte C₆H₆·3SO₂. (Gazz. chim. ital. **56**. 34—36.) GOTTFRIED.

E. Bamberger, *Über die Reduktion von Nitroarylen und die Einwirkung von alkoholischem Kali auf Arylhydroxylamine*. Bei der Red. von Nitroarylen mit Zn-Staub entstehen in neutraler (oder ganz schwach saurer oder alk.) Lsg. vorwiegend *Arylhydroxylamine* (Schema A), während in ätzalkal. Lsg. gewisse Phasen unter der Wirkung von OH' sekundäre Veränderungen erleiden (Schema B). A bezeichnet Vf. als „g



radlinige“, B als „verzweigte“ Red. In der Vermutung, daß antireaktive Gruppen der Red. nach B erschweren würden, wurden folgende Nitroaryle der Red. mit Zn-Staub u. sd. alkoh. KOH unterworfen: *Nitrobenzol* (I.), die drei *Nitrotoluole* (II.—IV.), die drei *Nitroxylole* (NO₂ = 1) 1,2,3 (V.), 1,2,4 (VI.), 1,2,5 (VII.), 1,3,4 (VIII.), 1,2,6 (IX.) u. *Nitromesitylen* (X.). Die von **Ernest Ormerod** † ausgeführten Verss. haben folgendes ergeben: I.—VIII. werden überwiegend zu *Azoxy*-, bei stärkerer Red. zu *Azo* u. *Hydrazoverbb.* reduziert, während *Amine* nicht oder ganz untergeordnet entstehen. Zusatz von W. befördert die Red. IX. u. X. liefern dagegen hauptsächlich die *Amine*, außerdem die *Hydroxylamine* u. *Nitroverbb.* (X. nur Spuren), dagegen nur wenig oder keine *Azoxyverbb.* Schema B wird demnach nur bei IX. u. X. von Schema A erheblich überdeckt. — Zur Bestätigung wurde auch das Verh. der *Azoxyaryle* gegen Zn-Staub u. sd. alkoh. KOH untersucht u. gefunden, daß sie glatt zu *Azo*- u. *Hydrazoverbb.* reduziert werden. Das IX. entsprechende *Azoxyxylyl* macht auch hier eine Ausnahme, indem es reichlich *Amin* liefert. *Azoxyesitylen* wurde nicht untersucht. — Parallel zu diesen Verss. wurde (mit **Emil Reber**) die Einw. von 10%ig. alkoh. KOH bei Zimmertemp. auf die obigen Nitroverbb. entsprechenden *Arylhydroxylamine* untersucht. Es entstehen überwiegend *Azoxy*-, in einzelnen Fällen mehr *Azo*-, zuweilen wenig *Nitro*- u. *Aminoaryle*, letztere wieder reichlich aus den IX. u. X. entsprechend *Hydroxylaminen*. Die B. so großer Mengen *Azoxyaryle* ohne gleichzeitige Auffindung entsprechender Mengen Red.-Prodd. ist unaufgeklärt. Das Vorwalten der *Azoxyaryle*

i den zwei di-o-methylierten Hydroxylaminen ist bemerkenswert gegenüber ihrem Auftreten bei obiger Red. von IX. u. X. Das bisher unbekannte *Azoxyimesitylen*, $C_{10}H_{12}ON_2$, wurde auf diese Weise entdeckt. Es bildet blaßgelbe Nadelchen aus A., 87—87,5°, l. in A., Bzl., Gasolin, mit Dampf sehr schwer flüchtig. H_2SO_4 -Lsg. orangef. — Vf. hält es auch nach vorliegenden Verss. für wahrscheinlich, daß die ed. aromat. Nitroverb. in neutralen, sauren u. alkal. Mitteln grundsätzlich gleichartig verläuft. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 418—31. Zürich, Techn. Hochschule.) LB.

Emile Votoček, V. Ettel und B. Koppova, Über 2,4-Dibromphenylhydrazin, drei Jodphenylhydrazine und ihre Verbindungen mit Aldehyden und Ketonen. III. (vgl. VOTOČEK u. LUKES, Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 868; C. 1924. II. 82.) Die folgenden 2,4-Dibromphenylhydrazone der Zucker werden meist gewonnen, indem man den in möglichst wenig W. gel. Zucker mit einer h. gesätt. alkoh. Lsg. von 2,4-Dibromphenylhydrazin erhitzt. Manchmal arbeitet man auch in essigsaurer Lsg. — Aus *Arabinose*. $C_{11}H_{14}O_4N_2Br_2$, aus A., F. 161°, ll. in CH_3OH , Aceton, wl. in Ä., Bzl. — Aus *Xylose*. $C_{11}H_{14}O_4N_2Br_2$, aus Toluol, F. 127—128°, sonst wie das vorige. — Aus *Rhamnose*. $C_{12}H_{16}O_4N_2Br_2$, aus Toluol, F. 150°, ll. in h. W., sonst wie die vorigen. — Aus *Glucose*, *Fructose*, *Maltose* u. *Lactose* gaben keine krystallisierten Prodd. — Aus *Galaktose*. $C_{12}H_{16}O_5N_2Br_2$, mkr. Nadeln aus verd. A., F. 191°. Läßt man die Komponenten in k. 30%ig. Essigsäure aufeinander wirken, so erhält man das *Monohydrat* desselben Hydrazons, rhomb. Krystalle, F. 178°. Dasselbe ist zur quantitativen Best. der Galaktose u. zu ihrer Trennung von Xylose, Rhamnose, Glykose, Fructose, Maltose u. Lactose, jedoch nicht von Arabinose geeignet, wenn man die h. wss. Lsg. der Zucker mit h. verd. essigsaurer Hydrazinlsg. vermischt u. 3 Stdn. bei Zimmertemp. stehen läßt. — *o-Jodphenylhydrazin*, $C_6H_7N_2J$. Darst.: *o*-Nitroanilin $\rightarrow$ *o*-Jodnitrobenzol $\rightarrow$ *o*-Jodanilin. Das Hydrochlorid des letzteren wird in wenig H_2SO_4 gel., in eisgekühlte Lsg. eingegossen, diazotiert, mit $SnCl_2$ reduziert, Doppelsalz mit Alkali zerlegt. Nadeln aus PAe., F. 29—30°, wenig haltbar. — *o-Jodphenylhydrazone*: Aus *Benzaldehyd*. $C_{11}H_{11}N_2J$, Krystalle aus verd. A., F. 66°. — Aus *Galaktose*. $C_{12}H_{17}O_5N_2J$, aus A., F. 196°. — Aus *Glykose*. $C_{12}H_{17}O_5N_2J$, aus W., F. 125°, meist ll. — *Fructose* u. *Rhamnose* gaben keine krystallisierten Prodd. — *Glykose-o-jodphenylosazon*, $C_{13}H_{20}O_4N_4J_2$, b, krystallin., F. 169°, scheidet sich aus Lsgg. gelatinös aus. — *Galaktose* u. *Rhamnose* gaben ölige Osazone. — *m-Jodphenylhydrazin*, $C_6H_7N_2J$. Darst. wie oben. Reinigung über das Sulfat, das aus W. krystallisiert wird. Ölig. — *m-Jodphenylhydrazone*: Aus *Benzaldehyd*. $C_{13}H_{11}N_2J$, gelbe Krystalle aus A., F. 146—147°. — Aus *Salicylaldehyd*. $C_{13}H_{11}ON_2J$, gelbe Krystalle aus A., F. 133°. — Aus *Galaktose*. Sirupöses Hydrat, erstarrt mit Ä. $C_{12}H_{17}O_5N_2J$, aus W., F. 148°. — Aus *Glykose*. $C_{12}H_{17}O_5N_2J$, aus A., F. 162—163°. — Aus *Rhamnose*. $C_{12}H_{17}O_4N_2J$, aus A., F. 161°. — *Fructose* gibt kein krystallisiertes Prod. — Aus *Furfurol*. $C_{11}H_9ON_2J$, aus A., F. 74°. — *m-Jodphenylosazone*: Aus *Glykose* oder *Fructose*. $C_{18}H_{20}O_4N_4J_2$, gelbe Krystalle, F. 198—199°, scheidet sich aus Lsgg. gelatinös aus. — Aus *Galaktose*. $C_{18}H_{20}O_4N_4J_2$, b, 168°, sll. — Aus *Rhamnose*. $C_{18}H_{20}O_3N_4J_2$, gelbe Nadeln aus A., F. 142°. — *p-Jodphenylhydrazone*: Aus *Benzaldehyd*. $C_{13}H_{11}N_2J$, aus A., F. 118°, ll. in Ä. — Aus *Salicylaldehyd*. $C_{13}H_{11}ON_2J$, aus A., F. 181°. — Aus *Glykose*. $C_{12}H_{17}O_5N_2J$, aus A., F. 169°. — Aus *Fructosederiv.* ist ölig. — Aus *Galaktose*. $C_{12}H_{17}O_5N_2J$, F. 179°. — Aus *Rhamnose*. $C_{12}H_{17}O_4N_2J$, aus A., F. 167°. — Das bekannte Deriv. des *Acetons* wird am besten in essigsaurer Lsg. dargestellt. Es zers. sich schon bei mäßigem Erhitzen. — *p-Jodphenylosazone*: Aus *Galaktose*. $C_{18}H_{20}O_4N_4J_2$, aus verd. A., F. 154—156°, ll. in Ä., Aceton. — Die Derivv. der Glykose u. Fructose sind gelatinös. — Aus *Rhamnose*. $C_{18}H_{20}O_3N_4J_2$, b, 190°. — Von den Zuckerderivv. der Jodphenylhydrazine sind brauchbar nur das Galaktose-o-jodphenylhydrazon u. das Rhamnose-p-jodphenylhydrazon, jedoch ist letzteres zur quantitativen Best. noch zu ll. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 278—85. Prag, Techn. Hochschule.)

LINDENBAUM.

Stanley Peat, *Anwendung der Methode der thermischen Analyse zur Bestimmung der Fünfwertigkeit in aromatischen Arsenverbindungen*. Best. der FF. u. Aufnahme d. Abkühlungskurven von Gemischen von *Tri-p-tolylarsin* u. *p-Jodtoluol* ergibt die Existenz eines Eutektikums mit 7,7 Mol-% *Tri-p-tolylarsin* u. dem F. 29°, aber kein Anzeichen für die B. einer Verb. Tetraarylarsoniumsalze scheinen nicht möglich zu sein. (Proc. Univ. Durham 7. 72—78. 1925.) KRÜGER

James Allan und Robert Robinson, *Die relative Direktionskraft von Gruppen der Form RO und RR'N in aromatischer Substitution*. I. Veratrol liefert bei der Nitrierung leicht 4-Nitro- u. weiter 4,5-Dinitroveratrol. Ein vom Veratrol verschiedener Äther des Guajacols sollte bei der Nitrierung zwei Nitroderiv. im Verhältnis d. Direktionskräfte der Gruppen RO u. CH₃O geben. Die Direktionskraft der CH₃-Gruppe wird zu 100 angenommen, dann errechnet sich aus den Verss. die Reihe CH₃O = 100; C₂H₅O = 135; C₃H₇O = 128; i-C₃H₇O = 150; n-C₄H₉O = 123; C₆H₅CH₂O = 113. Die Nitrierungen werden in k. Eg. ausgeführt u. die Resultate aus d. vorher bestimmten Schmelzpunktskurven der Gemische errechnet (therm. Analyse).

Versuche. Die Schmelzpunktskurve von 4- u. 5-Nitroäthoxyanisol zeigt folgende Werte (%/o-5-Nitroderiv.) 31,5°/o — 83,7°; 37,8°/o — 79,5°; 42,4°/o — 75,5°; 50,9°/o — 66,3°; 54,1°/o — 62,6°; 55,6°/o — 60,1°. Die Nitrierung von Äthoxyanisol in Eg. bei 12° liefert ein Gemisch von 4- u. 5-Nitroäthoxyanisolen mit 42,5°/o d. 4-Nitroderiv. Das Gemisch der Mononitroäthoxyanisole gibt in k. konz. HNO₃ g 4,5-Dinitro-2-äthoxyanisol, C₉H₁₀O₅N₂, aus A. F. 150°. Hieraus durch Red. mit Fe u. HCl u. Fällen in alkal. Lsg. mit Phenanthrachinon in Na-Bisulfit 3-Methoxy-äthoxyphenanthraphenazin, C₂₃H₁₈O₂N₂, aus Xylol, F. 231°, in Bzl. violette Fluoreszenz in konz. H₂SO₄ rote Lsg. Mit H₂S in wss. NH₃ aus 4,5-Dinitro-2-äthoxyanisol 6'-Nitro-3'(4')-methoxy-4'(3')-äthoxyphenyl-4,5-thiotriazobrenzcatechinmethyläthyläther, C₁₈H₂₀C₄N₄S, aus Nitrobenz. mit A. gefällt, F. 175°, wl. in A. u. Ä., l. in Bzl. u. Chlf. Aus 5-Nitroguajacol mit Propyljodid u. KOH 5-Nitro-2-propyloxyanisol, C₁₀H₁₃O₄N, F. 7 u. 4-Nitro-2-propyloxyanisol, F. 106°. Schmelzpunktskurve: (%/o-4-Nitroderiv.) 31,5°/o — 55,5°; 34,2°/o — 59,9°; 36,7°/o — 63,5°; 41,0°/o — 69,6°; 44,2°/o — 73,4°; 50,5°/o — 79,3°; 53,6°/o — 82,4°; 57,0°/o — 84,6°. Die Nitrierung von 2-Propyloxyanisol in F. liefert bei 9° 43,9°/o des 4-Nitroderiv. Das Gemisch der Mononitroderiv. gibt in konz. HNO₃ 4,5-Dinitro-2-propyloxyanisol, C₁₀H₁₂O₆N₂, aus A., F. 143°. Wie oben 4-Nitro-2-i-propyloxyanisol, C₁₀H₁₃O₄N, F. 83° u. 5-Nitro-2-i-propyloxyanisol, F. 53°. Schmelzpunktskurve: (%/o-5-Nitroderiv.) 24,6°/o — 69,7°; 30,4°/o — 66,7°; 35,0°/o — 63,7°; 39,5°/o — 60,2°; 48,1°/o — 53,8°. 2-i-Propyloxyguajacol, C₁₀H₁₄O₂, Kp. 210—211° gibt in Eg. nitriert ein Gemisch mit 40,0°/o des 4-Nitroderiv. Analog wie oben 4,5-Dinitro-2-i-propyloxyanisol, C₁₀H₁₂O₆N₂, aus A., F. 129°. Wie oben 4-Nitro-2-n-butoxyanisol, C₁₁H₁₅O₄N, aus A., F. 74° u. 5-Nitro-2-n-butoxyanisol, F. 56°. Schmelzpunktskurve: (%/o-4-Nitroderiv.) 25,5°/o — 39,8°; 28,3°/o — 37,5°; 33,2°/o — 32,6°; 36,5°/o — 30,4°; 39,6°/o — 33,2°; 42,7°/o — 35,3°; 45,1°/o — 35,7°; 46,9°/o — 35,5°; 50,7°/o — 39,5°; 52,2°/o — 41,8°; 53,8°/o — 44,1°. — 2-n-Butoxyanisol, C₁₁H₁₆O₂, Kp. 236—239°, gibt in Eg. nitriert ein Gemisch mit 44,8°/o des 4-Nitroderiv. 4,5-Dinitro-2-n-butoxyanisol, C₁₁H₁₄O₆N₂, aus A., F. 97°. Aus Benzylchlorid, KOH u. 4- u. 5-Nitroguajacol 4-Nitrobenzyloxyanisol, C₁₄H₁₃O₄N, aus A. zwei Formen vom F. 93° u. 98°. 5-Nitro-2-benzyloxyanisol, F. 82°. Schmelzpunktskurve: (%/o-5-Nitroderiv.) 17,1°/o — 85,0°; 23,7°/o — 80,0°; 33,6°/o — 72,9°; 37,2°/o — 69,2°; 41,3°/o — 65,2°; 46,0°/o — 57,2°. Die Nitrierung von 2-Benzyloxyanisol in Eg. liefert ein Gemisch mit 47,0°/o des 4-Nitroderiv. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 376—83.) TAUBE.

Albert Edward Oxford und Robert Robinson, *Die relative Direktionskraft von Gruppen der Form RO und RR'N in aromatischer Substitution*. II. Die Nitrierung einiger in der Benzylgruppe substituierter 2-Benzyloxyanisole. (I. vgl. vorst. Ref. Die im vorst. Ref. beschriebene Methode der therm. Analyse von Nitroderiv.

See
Litt.
V. 973
P. 3438

mischen wird zur Best. der Direktionskraft von m- u. p-Nitrobenzyloxy- u. m-Methoxybenzyloxygruppen angewandt. 2-m(p)-Nitrobenzyloxyanisol läßt sich wesentlich schwieriger nitrieren als 2-Benzyloxyanisol, die Nitrogruppe verringert offenbar die Aktivität des Gesamtmol. Die Direktionskraft der CH_3O -Gruppe wird (l. c.) zu 100 genommen, für die m- u. p-Nitrobenzyloxygruppe ergibt sich aus dem Experiment die Direktionskraft von 67. Da die m- u. p-Stellung denselben Wert zeigen, ist es wahrscheinlich, daß ein allgemeiner Polaritätseffekt vorliegt. Die Direktionskraft der m-Methoxybenzyloxygruppe ist gleich 92 zu setzen.

Versuche. Guajacol, m-Nitrobenzylbromid u. NaOC_2H_5 geben $1\frac{1}{2}$ Stde. A. rückfließend erhitzt, 2-m-Nitrobenzyloxyanisol, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}$, aus A. u. PAe., 47,5—48,5°. 5-Nitroguajacol (aus Acetylguajacol durch Nitrieren u. nachfolgendes Verseifen) liefert wie oben mit m-Nitrobenzylbromid umgesetzt 4-Nitro-2-m-nitrobenzyloxyanisol, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_6\text{N}_2$, aus Eg. u. A., F. 164,5—165°. Das K-Salz des 4-Nitroguajacols (aus 4-Nitroveratrol durch Verseifen) gibt mit m-Nitrobenzylbromid 5-Nitro-2-m-nitrobenzyloxyanisol, aus A., F. 140,5—141,5°. 2-m-Nitrobenzyloxyanisol liefert bei 14° mit konz. HNO_3 nitriert ein Gemisch der Nitroderiv. mit 39,6% des 5-Nitroderiv., d. h. die Direktionskraft ist gleich 67 zu setzen. Analog wie oben wurden erhalten u. die Schmelzpunktskurven aufgenommen: 4-Nitro-2-p-nitrobenzyloxyanisol, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_6\text{N}_2$, aus Bzl., F. 167—168° u. 5-Nitro-2-p-nitrobenzyloxyanisol, aus Bzl., 163,5—164,5°. 2-p-Nitrobenzyloxyanisol, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}$, aus A., F. 63,5° (ll. in Ä., l. Chlf. u. Eg., wl. in k. A. u. h. PAe.) gibt in Eg. bei 14° mit konz. HNO_3 nitriert ein Gemisch der Nitroderiv. mit 39,5% des 5-Nitroderiv., d. h. die Direktionskraft ist gleich 67 zu setzen. Guajacol, m-Methoxybenzylbromid u. NaOC_2H_5 geben in A. Min. auf dem Wasserbade erwärmt 2-m-Methoxybenzyloxyanisol, $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{O}_3$, aus PAe., 31,5°, Kp.₂₂ 220°. Hieraus analog wie oben 4-Nitro-2-m-methoxybenzyloxyanisol, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_5\text{N}$, aus A., F. 116—117° u. 5-Nitro-2-m-methoxybenzyloxyanisol, aus A., F. 98,5—99,5°. Die Nitrierung des 2-m-Methoxybenzyloxyanisols bei 0° liefert ein Gemisch der Nitroderiv. mit 48,0% des 5-Nitroderiv., d. h. die Direktionskraft ist gleich 92 zu setzen. Nisylalkohol liefert in Bzl. mit HCl gesätt., die trockene Lsg. nach dem Erhitzen des HCl durch Luft mit Guajacol u. NaOC_2H_5 in A. $1\frac{1}{2}$ Stde. rückfließend erhitzt 2-p-Methoxybenzyloxyanisol, $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{O}_3$, aus PAe., F. 94—96°. Wie oben 4-Nitro-2-p-methoxybenzyloxyanisol, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_5\text{N}$, aus A. u. PAe., F. 129—130°. Aus Nisylalkohol über das Chlorid (s. o.) u. Umsetzung mit dem K-Salz des 4-Nitroguajacols 5-Nitro-2-p-methoxybenzyloxyanisol, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_5\text{N}$, aus A. u. PAe., F. 109°. Verss., 2-m-Methoxybenzyloxyanisol in befriedigender Weise zu nitrieren, schlugen fehl. Journ. Chem. Soc. London 1926. 383—91.)

TAUBE.

Robert Robinson und John Charles Smith, Die relative Direktionskraft von Gruppen der Form RO und $\text{RR}'\text{N}$ in aromatischer Substitution. III. Die Nitrierung einiger p-Alkyloxyanisole. (II. vgl. vorst. Ref.) Die Nitrierung von Hydrochinon-alkyläthern in k. Eg. liefert in theoret. Ausbeuten das reine Mononitroderiv., so B, wie oben, die relative Direktionskraft einzelner Gruppen durch therm. Analyse stimmt werden kann. Die Direktionskraft von Äthoxyl u. Propoxyl, auf Methoxyl bezogen, ist größer, diejenige der p-Nitrobenzyloxygruppe schwächer als in der Brenzcatechinreihe. Ferner, während Propoxyl in der Brenzcatechinreihe schwächer ist als Äthoxyl, ist es in der Hydrochinonreihe stärker.


Versuche. Hydrochinondimethyläther gibt nitriert das Mononitroderiv. u. dieses alkal. verseift 2-Nitro-4-methoxyphenol, aus PAe., F. 79—80°. (Die Verb. entsteht auch durch saure Verseifung mit HBr.) Der Einfluß der NO_2 -Gruppe auf die Verseifung ist: alkal. — o,p > m; sauer — o > m > p. Hydrochinonmonomethyläther nach einem eingehend beschriebenen Verf. hergestellt) liefert mit Chlorkohlensäure-ester u. NaOH geschüttelt Carboäthoxy-p-methoxyphenol, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_4$, F. 21°, Kp.₁₇ 157°. Hieraus durch Nitrierung in Eg. Carboäthoxy-3-nitro-4-methoxyphenol, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{N}$,

aus PAe., F. 66,5°. Durch Verseifen mit Na-Bicarbonat 3-Nitro-4-methoxyphenol aus Bzl., F. 98—100°; die Verb. ist dimorph, die Schmelze erstarrt, plötzlich abgekühlt, zu einer rotgelben M., welche nach wenigen Min. unter Temperaturerhöhung die ursprünglichen gelben Nadeln zurückbildet. Das K-Salz ist sofort nach dem Trocknen violett u. ll. in Aceton, nach einigen Tagen oder nach dem Verreiben im Mörser wieder rot u. ist in sd. Aceton swl. Aus 2-Nitro-4-methoxyphenol mit KOC_2H_5 3-Nitro-äthoxyanisol, $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}$, aus Methylalkohol u. PAe., F. 39,5°. 3-Nitro-4-methoxyphenol gibt in A. mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$ u. KOC_2H_5 1 Stde. gekocht 2-Nitro-4-äthoxyanisol, aus Methylalkohol u. PAe., F. 37—39°. 4-Äthoxyanisol (aus Hydrochinonmonomethyläther u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$) vom F. 36—37°, Kp.₇₅₄ 216—217° gibt in Eg. mit konz. HN zwischen 0 u. 10° nitriert ein Gemisch der Nitroderiv. mit 62,2% des 3-Nitroderiv. d. h. die relative Direktionskraft (Methoxyl = 100) der Äthoxylgruppe ist in der Hydrochinonreihe gleich 163 zu setzen. Aus 2-Nitro-4-methoxyphenol, K-Propylpropyljodid u. Propylalkohol entsteht beim rückfließenden Erhitzen (11 Stdr.) 3-Nitro-4-propyloxyanisol, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}$, F. 10,7°, Kp.₁ 127°. Analog wie oben 2-Nitro-propyloxyanisol, aus Methylalkohol u. PAe., F. 32,0°. 4-Propyloxyanisol, F. 26—27° Kp.₁₅ 135° liefert wie oben nitriert ein Gemisch der Nitroderiv. mit 64,35% des 3-Nitroderiv., d. h. die Direktionskraft der n-Propyloxygruppe ist gleich 180 zu setzen. 2-Nitro-4-methoxyphenol liefert mit K-Propylat, Propylalkohol u. p-Nitrobenzylbromid 3-Nitro-4-p-nitrobenzyloxyanisol, $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_6\text{N}_2$, aus Bzl., F. 153°. Analog wie oben 2-Nitro-4-p-nitrobenzyloxyanisol, aus Bzl. mit C_6H_6 , F. analysenrein 123,5°. Aus p-Methoxyphenol u. p-Nitrobenzylbromid bei Ggw. von KOH 4-p-Nitrobenzyloxyanisol, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}$, aus A., gelbe Prismen vom F. 87,5°. (Die Farbe der Verb. ist intensiver als diejenige des Nitrohydrochinonmethyl-p-nitrobenzyläthers, so daß die Farbe der Nitrohydrochinondimethyläther kaum auf chinoide Umlagerung zurückzuführen ist.) Die Nitrierung des 4-p-Nitrobenzyloxyanisols in Eg. bei 22—25° liefert ein Gemisch der Nitroderiv. mit 27,6% des 3-Nitroderiv., d. h. die Direktionskraft ist gleich 38 zu setzen. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 392—401.) TAUBE.

James Allan, Albert Edward Oxford, Robert Robinson und John Charles Smith, Die relative Direktionskraft von Gruppen der Form RO und $\text{RR}'\text{N}$ in aromatischer Substitution. IV. Diskussion der in I, II u. III mitgeteilten Beobachtungen (III. vgl. vorst. Ref.) Die Substitutionsverhältnisse am Äthyläther des Guajacols lassen sich durch I veranschaulichen: Die Methylgruppe besitzt eine größere abstoßende Kraft auf Elektronen als das H-Atom, d. h. die Polarisation des „croteneroiden


($\text{C}=\text{C}-\text{O}-$; Polarisation $\rightarrow \text{C}=\text{C}-\text{O}- \leftarrow +$) Systems, einschließlich des O der Äthoxylgruppe ist im Verhältnis zum System einschließlich des H der Methoxylgruppe (nicht dargestellt) erleichtert. Hieraus folgt, daß $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ eine größere Direktionskraft ausüben muß als CH_3 (Gef. 135 u. 100). Die Substitution

des Methyls durch ein zweites H-Atom erhöht die Direktionskraft weiter ($i\text{-C}_3\text{H}_7\text{O} = 150$). Auffallend ist, daß die Direktionskraft der $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ -Gruppe von allen n-Alkylgruppen am stärksten ist ($\text{C}_2\text{H}_5\text{O} = 135$, $n\text{-C}_3\text{H}_7\text{O} = 128$, $n\text{-C}_4\text{H}_9\text{O} = 123$). Wir erklären dies aus der Annahme, daß mit Verlängerung der Kette ein größerer Teil des Gesamteffekts über das ganze Mol. wirksam wird u. deshalb ein kleinerer Teil durch die Atome der Kette. Das Verhältnis Direktionskraft RO / Direktionskraft CH_3 kann durch $y + a/x + a$ ausgedrückt werden, wo R eine höhere Alkylgruppe, y ihre Direktionskraft abgesehen von a, x die Direktionskraft der CH_3O -Gruppe abgesehen von a u. a eine Größe ist, welche vom Gesamtpolaritätseffekt der überschüssigen M





lengruppen von $R\cdot CH_3$ abhängig ist. a ist demnach der Teil des Gesamteffekts, welcher wegen seiner Ausbreitung über das Gesamtmol. die Polarisation des crotenoiden teils einschließlich des O der CH_3O -Gruppe fördert. Mit wachsendem a erreicht obige Verhältnis einen Minimalwert > 1 . In ähnlicher Weise erklären Vff. auch Beobachtungen in der Hydrochinonreihe sowie an den Benzyläthern des Guajacols Hydrochinonmonomethyläthers. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 401—11.) TAU.

Thomas Russell Lea und **Robert Robinson**, *Die relative Direktionskraft von Gruppen der Form RO und RR'N in aromatischer Substitution. V. Die Nitrierung des Methoxydiphenyläthers.* (IV. vgl. vorst. Ref.) *p*-Methoxydiphenyläther gibt bei Nitrierung ein einziges Nitroderiv. I, dessen Konst. aus der Hydrolyse zu *o*-Nitro-*p*-oxyphenol (II) folgt. Hieraus geht hervor, daß die Direktionskraft von Phenoxy *p*-Methoxyphenoxy klein ist im Verhältnis zu derjenigen der Methoxygruppe.



Versuche. *m*-Methoxyphenol, Brombenzol, KOH u. Cu-Bronze geben Stdn. auf 240° rückfließend erhitzt *m*-Methoxydiphenyläther, $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{O}_2$, Kp_{20} 175°. Analog *p*-Methoxydiphenyläther, Kp_{32} 186°, krystallisiert bei -10° . Hieraus durch Nitrierung in Eg. mit konz. HNO_3 bei 15° 3-Nitro-4-methoxydiphenyläther, $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}$ aus A., F. 73—74°. *o*-Methoxydiphenyläther gibt analog nitriert neben einem Öl Nitro-6-methoxydiphenyläther, aus A., F. 70—71°, I liefert mit KOH hydrolysiert (Stdn.) 2-Nitro-4-phenoxyphenol, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$ (II), aus PAe., F. 51—52°, rotes K-Salz. Journ. Chem. Soc. London 1926. 411—13. Manchester, Univ.) TAUBE.

Walter Dulière, *Über Aminoäther der Ephedringruppe. Alkyl- α -phenylpropyläther.* (Vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 584; C. 1924. II. 635.) Die l. c. beschriebenen Alkyl-[α -phenyl- γ -chlorpropyl]-äther (I.) wurden mit einigen aliphatischen sekundären Aminen umgesetzt. Dabei entstehen außer den Hydrochloriden der anwesenden Amine die freien Alkyl-[α -phenyl- γ -dialkylaminopropyl]-äther (II.). Die Rkk. verlaufen also nach der Gleichung: $\text{I.} + 2\text{NHR}'_2 = \text{II.} + \text{NHR}'_2\text{HCl}$. Die Erklärungen sind denkbar: Entweder es bilden sich zuerst durch Addition der Aminen an die Hydrochloride von II., die durch ein zweites Mol. Amin zerlegt




werden, oder es wird zuerst HCl abgespalten unter B. von III., an welches sich das Amin anlagert. In diesem Falle könnte sich der Aminrest auch in β befinden. Die beste Erklärung ist aus folgenden Gründen sehr unwahrscheinlich: Die Hydrochloride von II. werden von den sekundären Aminen in der Tat leicht zerlegt; eine Zersetzung konnte bei keiner Umsetzung beobachtet werden; die Verbb. I. können mit KOH dest. werden, ohne daß sie HCl verlieren; Methylallyläther (Muttersubstanz III.) addiert keine sekundären Amine. — Die Verbb. II. sind stark riechende, farblos, unl., in A. u. Ä. ll. Öle, die in W. allein schwer, in W. + A. leicht neutralisiert werden können. Die Hydrochloride, mit HCl-Gas in Ä. erhitzt, sind ll. in W., A., unl. in Ä., mehr oder weniger gut krystallisiert, besonders die $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ -Verbb., oder sirupös.

Versuche. Man erhitzt die Verbb. I. mit 2 Moll. Amin ohne Lösungsm. im Wasserbad für mehr oder weniger lange auf nicht über 125°, saugt die Krystalle ab, wäscht sie mit Ä. u. dest. das Filtrat im Vakuum. — Methyl-[α -phenyl- γ -dimethylaminopropyl]-äther, $\text{C}_{12}\text{H}_{19}\text{ON}$. Muß über das Hydrochlorid, F. 112—115° (boc MAQUENNE) gegossen werden. — Methyl-[α -phenyl- γ -diäthylaminopropyl]-äther, $\text{C}_{14}\text{H}_{23}\text{ON}$, Kp_{12} 170°, d_4^{20} 0,971. Hydrochlorid sirupös. — Methyl-[α -phenyl- γ -dipropylaminopropyl]-äther, $\text{C}_{16}\text{H}_{27}\text{ON}$, Kp. 180° im Vakuum, D_4^{20} 0,942. Hydrochlorid hygroskop. — Äthyl-[α -phenyl- γ -diäthylaminopropyl]-äther, $\text{C}_{15}\text{H}_{25}\text{ON}$, Kp. 155° im Vakuum, D_4^{20} 0,921.

Hydrochlorid sirupös. *Chloroaurat*, goldgelbe Nadeln, F. 74° (b. M.). *Hydrobromid* hygroskop. Krystalle. — *Propyl*-[α -phenyl- γ -diäthylaminopropyl]-äther, C₁₆H₂₂. *Hydrochlorid*, aus A. + Ä., F. 94° (b. M.). — *i*-Butyl-[α -phenyl- γ -diäthylaminopropyl]-äther, C₁₇H₂₉ON, D.²⁰ 0,927. *Hydrochlorid*, Blättchen aus A. + Ä., F. 125° (b. M.). — *i*-Amyl-[α -phenyl- γ -dimethylaminopropyl]-äther, C₁₆H₂₇ON, Kp. ca. 270° im Vak. D.²⁰ 1,011, sehr viscos. *Hydrochlorid*, Pyramiden, hygroskop. (Bull. Soc. Chim. France [4] **39**. 285—92. Löwen, Univ.) LINDENBAUM

Al. Faworski, *Über molekulare Umlagerungen von α -Ketoalkoholen*. (Vgl. S. 2.) Diese Umlagerungen vollziehen sich, wenn alkoh. Lsgg. von α -Ketoalkoholen mit ein Tropfen konz. H₂SO₄ im Rohr auf 120—130° erhitzt werden. Folgende Beispiele wurden bisher verwirklicht: *Äthylbutyrylcarbinol*, C₂H₅·CH(OH)·CO·C₃H₇, $\rightarrow$ *Propionylcarbinol*, C₂H₅·CO·CH(OH)·C₃H₇. — *Methylpropionylcarbinol*, CH₃·CH(OH)·CO·C₂H₅, $\rightarrow$ *Äthylacetylcarbinol*, CH₃·CO·CH(OH)·C₂H₅. — *Methyltrimethylacetylcarbinol*, CH₃·CH(OH)·CO·C(CH₃)₃, $\rightarrow$ *tert. Butylacetylcarbinol*, CH₃·CO·CH(OH)·C(CH₃)₃. — *Dimethyl-i-butylcarbinol*, (CH₃)₂C(OH)·CO·CH(CH₃)₂, $\rightarrow$ *Methyl-tert. butylacetylcarbinol*, (CH₃)₂C(OH)·CO·CH(CH₃)₂.


i-propylacetylcarbinol, CH₃·CO·C(CH₃)(OH)·CH(CH₃)₂. — *Octenoloxyl*, (CH₃)₂C(OH)·C(CH₃)₃, $\rightarrow$ *Methyl-tert. butylacetylcarbinol*, CH₃·CO·C(CH₃)(OH)·C(CH₃)₃. Struktur der Umwandlungsprodd. wurde in den ersten drei Fällen durch Überführung in die Glykole mittels CH₃MgJ u. nachfolgende Oxydation, in den beiden letzten Fällen durch direkte Oxydation ermittelt. — Diese Umlagerungen stellen intramolekulare Oxydationen u. Redd. zu gleicher Zeit vor. Aus dem letzten Beispiel glaubt Vf. schließen zu dürfen, daß allgemein labile Alkoholoxyde als Zwischenprodd. auftreten:



Das CO hat offenbar das Bestreben, ans Ende der Kette zu wandern, d. h. Acetylgruppe zu bilden, ein Umstand, der auch bei der Dehydratisierung der α -Glykole zu berücksichtigen ist. — *Methylbenzoylcarbinol*, C₆H₅·CO·CH(OH)·CH₃, erleidet unter gleichen Bedingungen Umlagerung in *Phenylacetylcarbinol*, C₆H₅·CH(OH)·CO·CH₃. Diesem Fall kommt besonderes Interesse zu, da letzteres Carbinol von NEUBERGER u. OHLE (Biochem. Ztschr. **128**. 611; C. **1922**. III. 275) auf phytochem. Wege erhalten worden ist. Als daraufhin Vf. zu einer durch Bierhefe in Gärung versetzten Zuckerlösung *Methylbenzoylcarbinol* gab u. nach beendeter Gärung ausätherte, erhielt er aus der Rk.-Prod. eine Fraktion, die als *Phenylacetylcarbinol* erkannt wurde. Es tritt also auch unter biolog. Bedingungen Umlagerung ein. Vf. ist der Ansicht, daß letztere die ganze Umwandlung der Glucose während der alkoh. Gärung auf ein einziges Ferment zurückzuführen ist, das man „Oxydoreduktase“ nennen könnte. (Bull. Soc. Chim. France [4] **39**. 216—20. Leningrad, Univ.) LINDENBAUM

Pierre Bedos, *Beitrag zur Kenntnis der geometrischen Stereoisomerie in der cyclo-Hexanreihe*. IV. *Einwirkung von Phenylmagnesiumbromid auf cyclo-Hexenol*. *o*-Phenyl-cyclo-hexanol; cyclo-Hexandiol-(1,2)-bromhydrin; Δ^2 -cyclo-Hexenol. (III. GODCHOT u. BEDOS, S. 2688). Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences. C. **1923**. III. 1219. Nachzutragen ist: Die Einw. von C₆H₅MgBr auf cyclo-Hexenol verläuft ebenso wie die von CH₃MgJ (1. Mitt., S. 1159) in zwei Phasen. — Das aus der Einw. von C₆H₅MgBr erhaltene fl. *o*-Phenyl-cyclo-hexanol muß nach seiner B. aus cyclo-Hexenol als die *cis*-Form angesehen werden, so daß das Isomere vom F. 54—55° die *trans*-Form repräsentiert. Die aus beiden Formen gewonnenen Phenylurethane u. sauren Phenylurethane

eester sind ident. Es ist anzunehmen, daß sich bei der hohen Temp., bei der diese vv. dargestellt werden, eine der beiden Formen in die andere umgelagert hat. — Angabe im kurzen Ref., daß das *cyclo-Hexandiol-(1,2)-bromhydrin* „aus dem Phenyl-o-hexanol durch Einw. von W.“ entstehen soll, ist natürlich falsch. Man erhält wenn man nach der ersten Phase der Einw. von C_6H_5MgBr auf *cyclo-Hexenoxyd* Eis u. W. zerlegt u. mit HCl neutralisiert. Behandelt man das Bromhydrin in Ä. festem KOH (48 Stdn.), so entsteht *cyclo-Hexenoxyd*. — Vf. nimmt mit BRUNEL daß das erhaltene *cyclo-Hexenol* das Δ^2 -*cyclo-Hexenol* ist, da es sich nicht in Alkali also kein phenolartig gebundenes OH enthalten kann, u. da das Δ^1 -*cyclo-Hexenol* in den Erfahrungen von MANNICH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **39**. 1594 [1906]) eine labile Verb. zu sein scheint. Es gelang Vf. nicht, irgendeine Umwandlung zu wirklichem, welche zur Best. der Konst. hätte dienen können, er konnte nur feststellen, daß die Verb. ca. 1 Br_2 addiert, nicht aber das Bromid in Substanz isolieren. B. des *cyclo-Hexenols* stellt sich Vf. wie folgt vor:




s., aus dem Bromhydrin selbst in dieser Richtung HBr abzuspalten, waren erfolglos. l. Soc. Chim. de France [4] **39**. 292—305. Fac. des Sciences de Montpellier.) LB.

Bennosuke Kubota und **Taro Hayashi**, *Über die katalytische Hydrierung der Arylgruppe in aromatischen Verbindungen unter Druck in Gegenwart von Kupfer*. I. untersuchten die Hydrierung von *Mono-* u. *Diketonen* in Ggw. von Cu unter Vak. u. bei Erhitzung. — *Benzil* lieferte bei 100° u. 60—92 at 43% *Benzoin* u. 23% *hydrobenzoin*. u. *i-Hydrobenzoin*, bei 130° u. 64—80 at 74% *Hydrobenzoin* u. 14% *drobenzoin*. — *Benzoylacetone*, $C_6H_5 \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_3$, gab bei 83—87° u. 68—79 at 4% *Phenyl-[\beta-oxypropyl]-keton*, $C_6H_5 \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CH(OH) \cdot CH_3$ (vgl. STAUDER u. KON, LIEBIGS Ann. **384**. 124; C. **1911**. II. 1686) u. 30% *Methyl-[\beta-oxy-\beta-phenyläthyl]-keton*, $C_6H_5 \cdot CH(OH) \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_3$ (s. unten) in Übereinstimmung mit Beobachtung von STRAUS u. GRINDEL (LIEBIGS Ann. **439**. 276; C. **1924**. II. 1093; C. **1912**. I. 1984). — *Phthalsäureanhydrid* wurde bei 120° u. 67—82 at zu (70%) *Hydrodiphthalylactonsäure* von WISNUS $HOOC^2 \cdot C_6H^1_4 \cdot CH_2 \cdot CH^1 \cdot C_6H^4_4 \cdot CO$, F. 197—198°, u. (12%) *Dioxyphthalan*

(nebenstehende Formel) reduziert. — *Acetophenon* ergab bei 140° u. 66—86 at *Methylphenylcarbinol*, bei 160° u. 66—96 at *Äthylbenzol*, aus *Benzophenon* entstanden bei 120° u. 50—61 at *Methylphenylcarbinol* u. *Diphenylmethan*, bei 190° u. 52—67 at *Diphenylmethan* u. s. *Phenyläthyl*, aus *Campher* bei 120—150° u. 10—101 at *Borneol* u. *i-Borneol*. Einzelheiten über die Red. der Monoketone sollen in der nächsten Mitt. folgen. —


Neue Verbb.: *Methyl-[\beta-oxy-\beta-phenyläthyl]-keton*, $C_{10}H_{12}O_2$, Kp. 134—136°. *Phenylhydrazon*, $C_{16}H_{18}ON_2$, orangefarbene Kristalle (aus A.), F. 120—122° (teilweise Zers.). — *Dioxyphthalan* (nebenstehende Formel), farblose Fl. *Dibenzoat*, zähe, widerlich




riechende Fl. (Bull. chem. Soc. of Japan 1. 14—19. Inst. of phys. and chem. I Hongo, Tokyo.)

BIKERMA


V. Grignard und H. Perrichon, Über 1-Halogenacetylene. Das anfängl Ziel dieser Unters., die Überführung von 1-Halogenacetylenen in Ketene:



wurde wegen zu fester Bindung der Halogene nicht erreicht. — Vff. haben nur 1-Br u. 1-Jodacetylene untersucht. Die notwendigen Acetylene wurden nach dem von BOURGUEL (Ann. de Chimie [10] 3. 325; C. 1925. II. 715) gewonnen. Neu gestellt wurde: *as. m-Xylylacetylen*, $C_{10}H_{10}$, Kp.₂₂ 85°, Kp.₇₅₆ 184—186°, D.₄¹² 0,9 n_D¹² = 1,5438. Aus *m-Xylylmethylketon* u. PCl_5 in der Kälte erhält man *as. m-Xylylchloräthylen*, $(CH_3)_2C_6H_3 \cdot CCl : CH_2$, Kp.₁₉ 104—105°, D.₄¹³ 1,044, n_D¹³ = 1,5446, mit NH_2Na behandelt wird. — Zur Darst. der 1-Bromacetylene eignet sich das V von GRIGNARD u. COURTOT (Bull. Soc. Chim. de France [4] 17. 228; C. 1915. 1097), ausgedrückt durch die Gleichung:



Man bereitet aus Acetylenen u. C_2H_5MgBr die Organomagnesiumverb. ersterer, sie unter Eiskühlung in eine äth. Lsg. von $BrCN$ (Darst. vgl. GRIGNARD u. CROUZ Bull. Soc. Chim. de France [4] 29. 214; C. 1921. III. 300) tropfen, zerlegt mit Eisw u. säuert mit Essigsäure an. Ausbeuten 72—78% an aliph., 64—68% an arom. Bromacetylenen. Erstere sind recht beständig, letztere bräunen sich bald. — 1-Brpentin, C_5H_7Br , Kp.₅₃ 44—46°, D.₄¹³ 1,281, n_D¹³ = 1,4579. — 1-Bromheptin, C_7H_7Br , Kp.₁₉ 64°, D.₄¹⁷ 1,1969, n_D¹⁷ = 1,4694. — 1-Bromundecin, $C_{11}H_{19}Br$, Kp.₁₆ 1 D.₄¹² 1,1015, n_D¹² = 1,4714. — 1-Brom-2-cyclo-hexylacetylen, $C_8H_{11}Br$, Kp.₂₀ 83— D.₄¹² 1,2989, n_D¹² = 1,5124. — 1-Brom-3-phenylpropin, C_9H_7Br , Kp.₁₅ 106— D.₄^{11,5} 1,377, n_D^{11,5} = 1,5693. — 1-Brom-4-phenylbutin, $C_{10}H_9Br$, Kp.₇ 110— D.₄^{11,5} 1,3354, n_D^{11,5} = 1,5636. — 1-Brom-2-p-kresylacetylen, C_9H_7Br , Kp.₆ 93— D.₄¹³ 1,3326, n_D¹³ = 1,5985. — 1-Brom-2-*as. m*-xylylacetylen, $C_{10}H_9Br$, Kp.₆ 100 101°, D.₄¹² 1,2969, n_D¹² = 1,5927. — 1-Brom-2-p-anisylacetylen, C_9H_7OBr , Kp.₁₀ bis 123°, D.₄¹² 1,352, n_D¹² = 1,599. — 1-Brom-2- α -naphthylacetylen konnte nicht isoliert werden, doch wurde seine B. durch Hydrolyse des Rohprod. mit konz. H_2 zu α -Naphthylbrommethylketon (Kp.₁₂ 225—230°) erwiesen. — Zur Darst. der 1-acetylene ist obiges Verf. weniger geeignet, da das $MgBr(CN)$ scheinbar eine sta Verb. mit JCN bildet, so daß 2 Moll. des letzteren erforderlich wären. Gute Reate erhält man nach dem Verf. von BODROUX (C. r. d. l'Acad. des sciences 136. 1 [1903]), wenn man in dieselben Organomagnesiumverb. unter Eiskühlung eine J-Lsg. (1 Mol.) einfließen läßt u. dann wie oben verfährt. Ausbeuten 69—76% aliph., 66—68% an aromat. Jodacetylenen. Letztere bräunen sich auch im Dunk — 1-Jodpentin, C_5H_7J , Kp.₂₃ 54°, D.₄¹⁹ 1,6127, n_D¹⁹ = 1,5148. — 1-Jodheptin, C_7H_7J , Kp.₁₇ 90—92°, D.₄¹⁹ 1,4701, n_D¹⁹ = 1,5123. — 1-Jodundecin, $C_{11}H_{19}J$, Kp.₁₄ 143°, I 1,2725, n_D¹⁹ = 1,4975. — 1-Jod-2-cyclo-hexylacetylen, $C_8H_{11}J$, Kp.₅ 85—86°, K 125—126°, D.₄¹¹ 1,5779, n_D¹¹ = 1,559. — 1-Jod-3-phenylpropin, C_9H_7J , Kp.₁₉ bis 140°, D.₄^{11,5} 1,6397, n_D^{11,5} = 1,6129. — 1-Jod-4-phenylbutin, $C_{10}H_9J$, Kp.₉ bis 143°, Kp.₂₈ 170—171°, D.₄¹³ 1,5814, n_D¹³ = 1,601. — 1-Jod-2-p-kresylacetylen, C_9H_7J , Kp.₁₄ 126—127°, D.₄¹⁴ 1,6249, n_D¹⁴ = 1,6494. — 1-Jod-2-*as. m*-xylylacetylen, $C_{10}H_9J$, Kp.₅ 122—123°, D.₄¹³ 1,5657, n_D¹³ = 1,6396. — 1-Jod-2- α -naphthylacetylen bildet sich ebenfalls, konnte aber nicht rein isoliert werden. — Wendet man bei ob Synthese nur 0,5 Mol. J an u. kocht noch ca. 1 Stde., so erhält man mit vorzügl Ausbeute disubstituierte Diacetylene, indem die 1-Jodacetylene mit überschüss Organomagnesiumverb. reagieren:



Natürlich kann man die Verb. auch aus den isolierten Jodacetylenen darstell — *Di-[as. m-xylyl]-diacetylen*, $C_{20}H_{18}$, Nadeln aus A.-Bzl., F. 138°; fällt alkoh. Hg


. Mol.-Refr. (in Bzl. bestimmt) = 101,10 statt 83,35. — *Di-[α -naphthyl]-diacetylen*, 171°, wl. in A., ll. in Bzl., Chlf.

Eigenschaften der 1-Halogenacetylene. Um die eingangs er-
 nte B. von Ketenen zu erreichen, wurden die Halogenacetylene zuerst mit trockenen
 allhydroxyden in indifferenten Lösungsm. gekocht, ohne daß eine Einw. zu
 erken war. Auch Leiten der Dämpfe über trockenes KOH bei 150—200° ließ die
 bb. im wesentlichen unverändert. Mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$ bei 300—320° wurde ein Teil
 tört, der Rest war intakt u. schien reiner zu sein als vorher. — Darauf wurde die
 w. von sd. alkoh. KOH untersucht. Nach NEF (LIEBIGS Ann. 308. 314 [1899])
 rt 1-Brom-2-phenylacetylen damit hauptsächlich Phenylelessigsäure u. wenig
 nylacetylen, entstanden durch Addition von $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ einmal an die dreifache
 lung, das andere Mal an die Restaffinitäten des Br (darauf Abspaltung von
 C_2H_5). Vff. fanden, daß aromat. 1-Bromacetylene hauptsächlich Säure u. wenig
 es Acetylen, aliph. u. hydrocycl. u. fettaromat. 1-Bromacetylene dieselben Prodd.
 umgekehrten Verhältnis u. alle 1-Jodacetylene ausschließlich echtes Acetylen
 rn (nur Phenylpropin lagert sich in Phenylmethylacetylen um). Die Restaffi-
 n des J sind so kräftig, daß sich an ihm allein der Additionsvorgang vollzieht.
 den Br-Verbb. addiert sich ein um so größerer Teil $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ an die dreifache Bin-
 g, je mehr Affinität das in 2 haftende Radikal beansprucht. — Die Hydratisierung
 1-Halogenacetylene hat folgendes ergeben: 1. Die aromat. Verbb. liefern bei
 3std. Behandlung mit k. konz. $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Eg.}$ (1 : 1 Vol.) *Brom- u. Jodmethyl-*
re. Ausbeuten 60—70 (Br) u. 50—60% (J). Es wurden erhalten: *p-Kresyl-*
-Xylyl- u. *p-Anisylbrommethylketon*, *p-Kresyl-* u. das noch unbekannte *as.m-Xylyl-*
methylketon, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{OJ}$, F. 32—33°, Kp. 140—142°; *Semicarbazon*, sublimiert bei
 150°, F. ca. 160° (Zers.). Die aliph. 1-Halogenacetylene werden von demselben
 gens nicht hydratisiert. — 2. Mit alkoh. HgCl_2 -Lsg. geben die 1-Bromacetylene
 ., die von sd. verd. HCl zerlegt werden, aber die Reingewinnung der Ketone ist
 ierig. Besser gelingt dies mit dem Reagens von DENIGÈS (50 g HgO , 200 g H_2SO_4 ,
 V.), wenn man das Bromacetylen in das sd. Reagens eintropfen läßt, noch $\frac{1}{2}$ Stde.
 it u. mit Dampf dest. Mit diesem Verf. werden auch die aliph. Verbb. zu 80 bis
 , hydratisiert. Ausbeuten ca. 70%. Bisher unbekannt sind: *Pentylbrommethyl-*
-keton, $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{OBr}$, Kp. 95—97°, D_4^{12} 1,2507, $n_D^{12} = 1,4653$, stechend riechend,
 enreizend. *Semicarbazon*, F. 245—248° (Zers.). — *Nonylbrommethylketon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{OBr}$,
 147—150°, F. 25—26°. *Semicarbazon*, F. 235—238° (Zers.) — *cyclo-Hexylbrom-*
ylketon, $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{OBr}$, Kp. 124—125°, D_4^{12} 1,3616, $n_D^{12} = 1,5072$, stechend riechend,
 enreizend. *Semicarbazon*, F. 181—182° unter Sublimation. — *Benzylbrommethyl-*
-keton, $\text{C}_9\text{H}_9\text{OBr}$, F. 58°. *Semicarbazon*, F. 225—230° unter Sublimation. — Die 1-Jod-
 ylene liefern mit HgCl_2 unter Verdrängung des J durch Cl J-freie Ndd. u. aus
 n *Chlormethylketone*, wl. in Lg., dadurch rein isolierbar. Erhalten wurden: *as. m-*
yl-, *Benzyl-* u. das noch unbekannte *Nonylchlormethylketon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{OCl}$, F. 44—45°;
icarbazon, F. 155—157° (Zers.). Durch das Reagens von DENIGÈS werden die
 dacetylene zwar glatt hydratisiert, aber gleichzeitig wird die Gruppe CH_2J zu
 reduziert (zweifelloso durch Hg^{I} -Salze). — Die 1-Halogenacetylene addieren leicht
 2 in k. Chlf., schwerer 1 J_2 in Ä. (Zimmertemp., dann kochen). Die J-Verbb. ver-
 n bei der Vakuumdest. kleine Mengen J. — *1,1,2-Triiodundecen-(I)*, $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{J}_3$,
 168—173°. — *cyclo-Hexyljoddibromäthylen*, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{Br}_2\text{J}$, Kp. 140—145°. —
yljoddibromäthylen, $\text{C}_9\text{H}_7\text{Br}_2\text{J}$, Kp. 150—160°. — *p-Kresyltriiodäthylen*, $\text{C}_9\text{H}_7\text{OJ}_3$,
 71°. — Mit Na in Ä. oder Bzl. wird das Halogen der 1-Halogenacetylene durch
 ersetzt. Die 1-Jodacetylene liefern mit Mg in Ä. (+ Spur J) Organomagnesium-
 b., nicht jedoch die 1-Bromacetylene.

Anhang: *Synthese einiger Nitrile u. Ketone der Acetylenreihe*. Vff. haben auf
 e der vorst. benutzten Acetylene das Verf. von GRIGNARD (C. r. d. l'Acad. des

see
 errata
 1.99.2
 P3494



sciences 152. 388 [1911]) zur Synthese von Nitrilen u. Ketonen übertragen, das folgende Schemata gekennzeichnet ist:



Das $\text{Cl} \cdot \text{CN}$ wird nach MAUGUIN u. SIMON (C. r. d. l'Acad. des sciences 383; C. 1919. III. 861) dargestellt, aus der wss. Fl. durch Erwärmen auf 60° ausgetrieben, mit CaCl_2 getrocknet u. in gekühltem Ä. absorbiert. In diese Lsg. läßt die Lsg. der Acetylen-Organomagnesiumverb. eintropfen u. zerlegt nach 12 Stdn. *Nonylpropioisäurenitril*, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{N}$, Kp.₈ 121—122°, $\text{D}_{11.5}^{20}$ 0,8596, $\text{n}_{\text{D}}^{11.5} = 1,4$, stark riechend. Gibt mit H_2SO_4 -Eg. das Amid, $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{ON}_2$, perlmutterglänz. Blättchen, F. 78—79°; fällt HgCl_2 in A. — *cyclo-Hexylpropioisäurenitril*, $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{N}$, Kp.₂₁ 96°, D_{11}^{20} 0,9468, $\text{n}_{\text{D}}^{11} = 1,4947$, unangenehm riechend. Amid, $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{N}$, Nadeln, F. 103—104°; fällt HgCl_2 in A. — *Phenäthylpropioisäurenitril*, $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{N}$, 125—126°, $\text{D}_{11.5}^{20}$ 1,0103, $\text{n}_{\text{D}}^{11.5} = 1,5487$, fade riechend. — *p-Kresylpropioisäurenitril*, $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{ON}$, Kp.₂₀ 127°, Nadeln, F. 44—45°, D_{16}^{20} 1,006, $\text{n}_{\text{D}}^{16} = 1,5755$. A. $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$, Nadeln, F. 91°. — *as-m-Xylpropioisäurenitril*, $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{N}$, Kp.₂₅ 140°, D_{11}^{20} 1,0059, $\text{n}_{\text{D}}^{11} = 1,5910$, unangenehm riechend. Amid, $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ON}$, Nadeln, F. 72°. — *α-decinylamylketon*, $\text{C}_{17}\text{H}_{30}\text{O}$. Man läßt Undecynyl-MgBr u. $\text{Cl} \cdot \text{CN}$ wie oben aufeinander wirken, dest. einen Teil des Ä. u. überschüssiges $\text{Cl} \cdot \text{CN}$ ab, gibt $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{MgBr}$ -Lsg. Toluol zu, dest. den Rest des Ä. ab, kocht 3 Stdn. u. zerlegt mit HCl . Gelbliche Kp.₇ 175—180°, D_{12}^{20} 0,8585, $\text{n}_{\text{D}}^{12} = 1,4612$. — *Di-α,α'-undecynylketon*, $\text{C}_{22}\text{H}_{40}\text{O}$. Man wendet gleich 3 Moll. Undecynyl-MgBr auf 1 Mol. $\text{Cl} \cdot \text{CN}$ an u. verfährt wie oben. Gelbliche Fl., Kp.₆ 215—220°, F. 14°, D_{12}^{20} 0,8660, $\text{n}_{\text{D}}^{12} = 1,4860$ (st. Exaltation der Mol.-Refr.). (Ann. de Chimie [10] 5. 5—36. Lyon, Univ.) LINDENBAU.

Erich Benary, Berichtigung. (Vgl. BENARY, MEYER u. CHARISIUS, S. 10) Das Oxymethylenmethyläthylketon besitzt nicht die l. c. angegebene, sondern folgende Formel: $\text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{CH} \cdot \text{OH}$ (vgl. CLAISEN, LIEBIGS Ann. 278. 270 [1868] ferner DIELS u. ILBERG, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49. 160; C. 1916. I. 287). Die Formel der Derivv. sind entsprechend zu ändern. Dagegen ist die Formel des Oxymethylenmethylpropylketons richtig, da es mit NH_3 das 2-Propyl-5-butyrylpyridin liefert BENARY u. PSILLE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 828; C. 1924. II. 45). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 600.)

Eglantine Peytral, Über die pyrogene Zersetzung des Äthylenoxyds und die mit dieser Temperatur, bei welcher die Zersetzungsreaktionen stattfinden. (Vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 562; C. 1925. II. 462.) Die Dämpfe von Äthylenoxyd wurden in früherer Weise durch ein auf 1150° erhitztes Pt-Rohr geleitet. Die geringe Menge wss. Kondensat enthielt Acetaldehyd. Das Gas (ca. 2500 ccm) bestand in Vol. aus 45,2 CO , 27,1 H , 16,4 CH_4 , 4,6 C_2H_2 , 6,7 C_4H_8 (Mittel aus zwei Verss.). Fe fanden sich Spuren Äthylen u. Polybutene. Danach haben sich folgende Rkk. gespielt:



Die Rkk. 1 u. 3, bei denen der O doppelt gebunden am C bleibt, sind die Hauptreaktionen des Äthylenoxyds werden ca. 54% nach 1, 36% nach 3, der Rest nach 2 zers. 4 ist die sekundären Haupttrkk., 6 ist ganz untergeordneter Natur. — Die Gase

see
errata
p. 3977

see
errata
v. 99' 2
p. 3494

sen das Rohr mit einer Temp. von ca. 1200°. Eine Berechnung, die hier nicht vorgegeben werden kann, hat zu dem Resultat geführt, daß die Dämpfe des Äthylens bei einer mittleren Temp. von ca. 571° zur Zers. gelangen. (Bull. Soc. Chim. France [4] 39. 206—14.)



LINDENBAUM.

Eglantine Peytral, Über die Art der plötzlichen pyrogenen Zersetzung des Zimtaldehyds bei hoher Temperatur. (Vgl. vorst. Ref.) Die Arbeitsweise war die übliche. Es sich hier jedoch Kohle oder hochkondensierte kohlige Prodd. bilden, die das Rohr stopfen würden, so müssen die Dämpfe das Rohr schneller als sonst passieren. 51 g Zimtaldehyd wurden in 5 Min. durchgeleitet u. lieferten 1100 ccm = 1,31 g u. 9,53 g fl. Kondensat; der Rest ist von den schwarzen Dämpfen mitgerissen. Das Gas bestand in Vol.-% aus 73,0 CO, 9,0 H, 3,1 C₆H₆, 3,6 C₂H₄, 8,7 C₂H₂, CH₄. Aus der Fl. wurden außer unverändertem Zimtaldehyd C₆H₆, Styrol (Hauptd.) u. etwas Distyrol isoliert. Danach haben sich folgende Rkk. abgespielt:

1. C₆H₅·CH : CH·CHO = CO + C₆H₅·CH : CH₂ (primäre Hauptrk.)
2. C₆H₅·CH : CH₂ = C₂H₂ + C₆H₆ (sekundäre Hauptrk.)

Zum Teil hat sich Styrol polymerisiert, C₂H₂ zu C₂H₄ hydriert. Ca. 27% Zimtaldehyd sind nach 1 zers. worden. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 214—16.) LB.

William Henry Perkin, jr. und **Leon Rubenstein**, 3,4- und 2,5-Dimethoxyphenylhydrazin. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 1158. 2275; C. 1925. II. 1981. 1926. 907.) Versucht wurde, Dimethoxyderivv. des Indols u. Tetrahydrocarbazols herzustellen, um auf diesem Wege Aufschlüsse über die Stellung der Methoxyle im Brucin erhalten. 3,4-Dimethoxyanilin gibt diazotiert 3,4-Dimethoxybenzoldiazoniumchlorid, hieraus mit Ammoniumsulfid 3,4-Dimethoxydiazobenzolsulfosaures NH₄ u. nach Red. mit Zn 3,4-Dimethoxyphenylhydrazinsulfonat u. schließlich 3,4-Dimethoxyphenylhydrazin. Brenztraubensäureäthylester-3,4-dimethoxyphenylhydrazon gibt in der schlechten Ausbeute mit alkoh. HCl 5,6-Dimethoxyindol-2-carbonsäure. Analog oben entsteht aus 2,5-Dimethoxyanilin 2,5-Dimethoxyphenylhydrazin. Ferner werden aus o- u. p-Methoxyphenylhydrazin mit α-Ketoglutaräure u. alkoh. HCl Carboxy-7-methoxyindol-3-essigsäure (I) u. 2-Carboxy-5-methoxyindol-3-essigsäure (II) erhalten. 6,7-Dimethoxytetrahydrocarbazol u. 5,6-Dimethoxyindol-2-carbonsäure geben in Eg. gel. mit HNO₃ Färbungen, welche der bekannten Brucinrk. ähnlich sind, was die o-Stellung der Brucinmethoxyle spricht.



Versuche. 3,4-Dimethoxyanilinhydrochlorid gibt in Eg. mit Methylnitrit 10—15° diazotiert 3,4-Dimethoxybenzoldiazoniumchlorid, welches sofort bei 0° ammoniakal. Ammoniumsulfid umgesetzt wird. 3,4-Dimethoxydiazobenzolsulfosaures-NH₄, C₈H₁₃O₅N₃S. In Eg. mit Zn reduziert entsteht hieraus 3,4-Dimethoxyphenylhydrazinsulfosaures-NH₄, C₈H₁₅O₅N₃S. Mit alkoh. HCl über das Hydrochlorid 3,4-Dimethoxyphenylhydrazin, F. 81° (schnelle Zers. an der Luft). Hydrochlorid, C₈H₁₃O₅N₃Cl, aus A. F. 162° (Zers.). 3,4-Dimethoxyphenylhydrazin kondensiert sich mit cyclo-Hexanon zum Hydrazon u. dieses liefert mit alkoh. HCl 6,7-Dimethoxytetrahydrocarbazol, C₁₄H₁₇O₂N, aus verd. A. F. 98°. 3,4-Dimethoxyphenylhydrazin gibt Brenztraubensäureäthylester kondensiert u. das Hydrazon mit alkoh. HCl verestert. 5,6-Dimethoxyindol-2-carbonsäureäthylester, C₁₃H₁₅O₄N, aus A. F. 172°. 2,5-Dimethoxyanilinhydrochlorid liefert in Eg. mit Methylnitrit diazotiert u. das Diazoniumz mit ammoniakal. Ammoniumsulfid umgesetzt 2,5-Dimethoxydiazobenzolsulfosaures-NH₄, C₈H₁₃O₅N₃S. Mit Zn reduziert hieraus 2,5-Dimethoxyphenylhydrazinsulfosaures-NH₄, C₈H₁₅O₅N₃S u. weiter mit HCl 2,5-Dimethoxyphenylhydrazin, F. 84°. Hydrochlorid, C₈H₁₃O₅N₃Cl, Verfärbung oberhalb 250°. o-Methoxyphenylhydrazin

kondensiert sich mit α -Ketoglutar säure zum Methoxyphenylhydrazon vom F. (Zers.) u. dieses liefert mit alkoh. HCl 2-Carboäthoxy-7-methoxyindol-3-essigsäureäthylester, $C_{16}H_{19}O_5N$, aus A. F. 106°, Kp.₁₁ 245—255°. Mit NaOH verseift 2-Carboäthoxy-7-methoxyindol-3-essigsäure, $C_{12}H_{11}O_5N$ (I), aus A. F. 253° (Zers.). Analog ließe sich p-Methoxyphenylhydrazin u. α -Ketoglutar säure 2-Carboxy-5-methoxyindol-3-essigsäure, $C_{12}H_{11}O_5N$ (II), aus A. F. 265°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 357—62. Oxford Univ. Perrins Lab.)

K. v. Auwers und P. Strödter, *Vermischte Beobachtungen über Indazolderivate*. 1. Während die Diazoverbb. von o-Aminoketonen, $C_6H_4(NH_2)(CO \cdot R)$, von Na₂ bei R = Alkyl glatt in 3-Alkylindazole übergeführt werden, erhielt v. AUWERS (Dtsch. Chem. Ges. 29. 1265 [1896]) bei R = C_6H_5 hauptsächlich 2-Oxy-3-phenylindazol, das einerseits von sd. Laugen in 3-Oxy-2-phenylindazol umgelagert (v. AUWERS u. HÜTTENES, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1113; C. 1922. III. 2) andererseits glatt zu 3-Phenylindazol reduziert werden konnte. Letzteres trat in zwei Formen auf. Um zu erfahren, ob diese Erscheinungen Ausnahmefälle darstellen, haben Vff. dieselben Verss. auf das 2-Amino-4'-methyl- u. 2-Amino-4'-methoxybenzophenon übertragen. Auch hier entstehen die 2-Oxy-3-arylindazole, die wie die Phenylindazole verb. zersetzlich u. sauer sind, beim Erhitzen über den F. in N u. p-Methyl- u. p-Methoxybenzophenon zerfallen, von sd. Laugen in 3-Oxy-2-arylindazole umgelagert u. von SnCl₂ zu 3-Arylindazolen reduziert werden. Letztere konnten zwar nicht in zwei Formen gefaßt werden, doch ist die Existenz solcher wahrscheinlich, da die Indazole auch nach häufigem Umkrystallisieren mehr oder weniger unscharf bleiben.

Versuche. 2-Oxy-3-p-tolyindazol, $C_{14}H_{12}ON_2$. Aminomethylbenzophenon wird mit konz. HCl bis zur Lsg. verrieben, der darauf ausfallende Brei des Hydrochlorids mit etwas W. verdünnt, diazotiert u. die Lsg. unter Kühlung in Na₂SO₃-Lösung eingetropft. Der Nd. wird abgepreßt, im Vakuum getrocknet u. aus Bzl. umkrystallisiert (nur kurz kochen!). Prismen, F. 119° unter Gasentw., ll. in A., Ä., Eg., Lsg. in h. Bzl., wl. in h. W. u. Schwerbzn., auch rein nicht sehr lange haltbar. — 3-Oxy-2-p-tolyindazol, $C_{14}H_{12}ON_2$. Man leitet durch die Lsg. des vorigen in 2%ig. Natronlsg., bis kein Öl (p-Tolylphenylketon, F. 59°) mehr übergeht, u. säuert die alkal. Lsg. an. Nadeln aus A., F. 215° (Zers.) nach Bräunung von ca. 190° an, ll. in h. W., swl. in Bzl., h. W., fast unl. in Ä. H₂SO₄-Lsg. gelb. — Acetylderiv., $C_{16}H_{14}O_2N_2$, Nadeln aus Lg., F. 98°, ll. außer in Lg. — Benzoylderiv., $C_{21}H_{16}O_2N_2$, Nadeln aus Lg., F. 154—155°, ll. in CH₃OH, Bzl., zl. in A., wl. in Ä. — 3-p-Tolyindazol, $C_{14}H_{12}ON_2$. Aus der 2-Oxyverb. mit SnCl₂ in alkoh. HCl. Nach Vakuumdest. diamantglänzende Prismen aus Bzn., F. 97—98° nach Erweichen bei 91°, ll. Pikrat, gelbe Prismen aus A., F. 147—148°. — Acetylderiv., $C_{16}H_{14}ON_2$, Nadeln aus Lg., F. 79,5—80,5°, ll. — 2-Oxy-3-p-anisylindazol, $C_{14}H_{12}O_2N_2$. Darst. analog. Reinigung aus verd. NaOH u. Essigsäure, da beim Umkrystallisieren Zers. eintritt. F. 132° unter Gasentw., ll. in A., Ä., Laugen, wl. in Bzl., Bzn. — 3-Oxy-2-p-anisylindazol, $C_{14}H_{12}O_2N_2$. Darst. analog. Das Destillat liefert p-Methoxybenzophenon (F. 61°). Nadeln u. Blättchen aus verd. A., F. unscharf 163° (Zers.) nach Dunkelfärbung bei 153°. Mit Chloroform in A. Gelbfärbung. H₂SO₄-Lsg. orangegeb. — Acetylderiv., $C_{16}H_{14}O_3N_2$, Krystalle aus Schwerbzn., F. 110°, ll. in A., Bzl., zl. in Ä., Bzn. — Benzoylderiv., $C_{21}H_{16}O_3$, Spieße aus verd. A., F. 139,5—140°, ll. in Bzl., zl. in A., wl. in Ä. — 3-p-Anisylindazol, $C_{14}H_{12}ON_2$. Da das Rohprod. auch nach Dest. (Kp.₁₀ ca. 205°) nicht krystallisiert, wird es in das Acetylderiv. übergeführt u. dieses mit alkoh. KOH verseift. Warzen aus Schwerbzn., Nadeln aus viel W., F. 110—111°, ll. Pikrat, gelbe Blättchen aus A., F. 147—148° wie das Pikrat des 3-p-Tolyindazols. Da das Gemisch keine Färbung zeigt, sind beide offenbar isomorph. — Acetylderiv., $C_{16}H_{14}O_2N_2$, Nadeln aus CH₃OH, F. 105—106°, ll. in Ä., Eg. Bzl. wl. in A., CH₃OH.

2. Nach PAAL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24. 959 [1891]) soll 2-Phenylindazol








Red. mit Na u. A. nicht mehr als 2 H unter B. des 1,3-Dihydroderiv. aufnehmen. erhielten jedoch bei mehreren Verss. *N*-[*o*-Aminobenzyl]-anilin, $\text{NH}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_2 \cdot [\text{C}_6\text{H}_5]$, F. 87° (Diacetylderiv., F. 121—122°; Dibenzoylderiv., F. 208°). Andere Verss. lieferten hingegen Verb. mit den unscharfen FF. 153 u. 136°, die nach Analysen Eigenschaften — abgesehen vom F., den PAAL zu 98° angibt — nicht ganz reines Dihydro-2-phenylindazol waren, auch bei kurzem Erwärmen an der Luft wieder 2-Phenylindazol übergingen. Es handelt sich offenbar in allen drei Fällen um verschiedene Reinheitsgrade derselben Verb. Überraschend ist die Leichtigkeit, mit welcher der sonst so widerstandsfähige Pyrazolring des 2-Phenylindazols bei energ. H. aufgespalten wird, u. deren Gegenstück die von PAAL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48 [1894]) ausgeführte oxydative Aufspaltung zu Azobenzol-o-carbonsäure bildet. Es abweichende Verh. ist so zu erklären, daß das C_6H_5 einen großen Teil der Valenz 2-N-Atoms beansprucht u. dadurch die Festigkeit des Ringes schwächt.

3. Indazol-1-carbonsäureester zerfallen beim Erhitzen in CO_2 u. ein Gemisch 1- u. 2-Alkylindazolen (v. AUWERS u. SCHAICH, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 7; C. 1921. III. 1240; die Ester sind hier noch als 2-Deriv. bezeichnet). Um zu sehen, ob ein umfangreicher negativer Substituent in 3 den Rk.-Verlauf beeinflusst, haben einige Indazol-1,3-dicarbonsäureester untersucht, die aus Indazol-3-carbonsäuremethylester (jedoch nicht aus der freien Säure) durch Kochen mit Chlorameisensäureestern erhältlich sind. Bei ihrer Spaltung entstehen ausschließlich 1-Alkylindazole. Das CO_2CH_3 verhindert also den Übertritt des Alkyls zum 2-N-Atom, während 2-Phenylindazol-1-carbonsäureester 1- u. 2-Alkylindazole liefern (v. AUWERS u. LINDENBAUM, l. c.). Diesen Befunden entspricht die Allylierung. Während aus Indazol-2-Deriv., aus 3-Phenylindazol 1- u. 2-Deriv. entstehen (l. c.), liefert der Indazol-3-carbonsäureester nur 1-Deriv., allerdings bei etwas höherer Temp. Ebenso läßt man mit *o*-Nitrobenzoylchlorid nur ein 1-Deriv.

Versuche. Indazol-1,3-dicarbonsäuredimethylester, $\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2$, Schüppchen Bzl. + PAe., F. 174—175° unter Gasentw., zl. in h. Bzl., Aceton, wl. in A., Bzn. 1 von KOH in k. Aceton zu Indazol-3-carbonsäuremethylester verseift. Gibt Dest. unter 12 mm 1-Methylindazol-3-carbonsäuremethylester, aus Bzn., F. 77—78°. Indazol-1,3-dicarbonsäure-1-äthyl-3-methylester, $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{O}_4\text{N}_2$, gelbliche Kryställchen CH_3OH , F. 116°, Kp.₁₃ 218° ohne Zers., ll. in h. Bzl., zl. in h. A., sd. Bzn. Gibt Dest. unter at.-Druck unter teilweiser Verharzung ein Öl u. dieses mit alkoh. KOH mit A. + H_2SO_4 wieder völlig veresterbare, also vom 2-Isomeren freie 1-Äthylindazol-3-carbonsäure, F. 159°. — 1-Allylindazol-3-carbonsäure, $\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$. Aus Indazol-3-carbonsäuremethylester u. Allylbromid (Rohr, 120—130°, 6 Stdn.), Rohprod. reinigen. Säure erstarrt sehr langsam, ist völlig veresterbar. F. roh ca. 147°. Krysmehl aus Bzl., Spieße aus W., ll. in A., Eg., zl. in Ä. — 1-[*o*-Nitrobenzoyl]-indazol-3-carbonsäureäthylester, $\text{C}_{17}\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_3$. Durch Erhitzen der Komponenten ohne Lösungsm. 1 Auskochen mit CH_3OH Säulen aus Bzl., F. 182—183°, ll. in Aceton, Chlf., zl. in Bzl., swl. in A., Ä. Wird von HCl in Ä. nicht angegriffen (1-Deriv.). — Aus Ag-Salz des Indazolcarbonsäureesters u. *o*-Nitrobenzoylchlorid entsteht eine Verb. vom F. 132,5—133,5° (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 529—38.) LINDENBAUM.

K. v. Auwers und E. Frese, Über 5-Methyl-7-aminoindazol und 2-Methylaminobenzimidazol. Aus *o*-Amino-Py-tetrahydrochinaldin erhielten BAMBERGER u. ULZ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24. 2051 [1891]) mit acetylierenden Agenzien eine el. Anhydrobase. Vff. haben untersucht, ob sich in der Indazolreihe eine analoge vom Typus II. synthetisieren läßt. Sie gingen aus vom 5-Methyl-7-aminoindazol (I). Mit sd. Acetanhydrid (10 Stdn.) liefert dasselbe ein Triacetylderiv., auf Wasserbad (1/2 Stde.), mit Acetylchlorid in Pyridin + Ä. oder auch bei Umwandlung seines Ag-Salzes mit Acetylchlorid in Ä. bei -10° ein Diacetylderiv. vom F. 151°, das sich bei der Vakuumdest. in ein Isomeres vom F. 126° umwandelt.

Die Verb. vom F. 151⁰ wird zu einem *Monoacetylderiv.* vom F. 135⁰ verseift, w man sie mit konz. HCl über Nacht stehen läßt oder in die äth. Suspension HCl leitet oder in die h. alkoh. Lsg. $\frac{1}{10}$ -n. NaOH tropfen läßt. Dasselbe Monoacetylde entsteht aus I u. k. Acetanhydrid ($\frac{1}{2}$ Stde.). Da es sich nicht mit p-Nitrobenzaldehyd kondensiert, so befindet sich das Acetyl am NH₂ des Benzolkerns. Als seine F. Lsg. zufällig auf freier Flamme gekocht wurde, erfolgte Umlagerung in ein *Isom.* vom F. 199⁰, welches später auch durch eintägiges Kochen von I mit Eg. erh. wurde. Nachdem dieses einmal vorlag, konnte das Isomere vom F. 135⁰ nicht wieder gewonnen werden. Es gelang auf keine Weise, das Acetylderiv. vom F. 199⁰ in eine Anhydrobase überzuführen. Aus dem Ausbleiben dieses Ringschlusses Folgerungen bzgl. der Konst. der verschiedenen Acetyllderiv. ziehen zu wollen, würde zu falschen Schlüssen führen, denn dieselbe ergibt sich einwandfrei aus den Beobachtungen, zur Aufklärung der Isomerie der Acylindazole geführt haben (vgl. v. AUWERS, S. 60). Danach besitzt das labile Diacetylderiv. vom F. 151⁰ Formel III., das Isomere Formel IV., durchaus im Einklang mit ihrem verschiedenen Verh. gegen HCl in Ä., welchem Agens III. verseift, IV. nicht angegriffen wird. Daraus ergeben sich ungezwungen die Formeln der Monoacetyllderiv. Der labilen Verb. vom F. 135⁰ kommt Formel V., der anderen Formel VI. zu. Weshalb Verbb. vom Typus V. solche vom Typus VI. überzugehen suchen, wurde l. c. begründet. Daß VI. (in Pyridin) bzw. sein Ag-Salz mit Acetylchlorid III. liefern, entspricht sonstigen Beobachtungen. Auffallend ist, daß VI. auch bei kurzem Kochen mit Acetanhydrid, wobei sonst stabile 1-Deriv. entstehen, in III. übergeht, u. auf den durch den Substituenten in 7 verursachten erschwerten Übertritt des Acetyls von 2 nach 1 zurückzuführen. Ganz ähnliche Verhältnisse finden sich bei den *Benzoylderiv.* von I. Hier wurde ein Monoderiv. beobachtet. Eine Anhydrobase konnte auf keine Weise gewonnen werden. Bemerkenswert ist die mehr oder weniger gelbe Farbe von III. u. dem entsprechenden Benzoylderiv. (vgl. dazu v. AUWERS u. ALLARDT, LIEBIGS Ann. 400, 15; C. 1924. II. 970). — Zur Prüfung der Frage, ob die Abneigung zur B. von Anhydrobasen bei ähnlichen Körperklassen wiederkehrt, wurden das 2-Methyl-7(4)-amino-1-benzimidazol (VII. oder VIII.) u. sein Acetylderiv. untersucht. Auch hier waren die Ringschlußverss. erfolglos. Ebensovienig wurde aus vic. Triaminobenzol mit sd. oder Acetanhydrid eine Anhydrobase von gewünschter Konst. erhalten. — Indazole o-Diamine mit sd. Eg. Anhydrobasen, mit Acetanhydrid Diacetyllderiv. liefern. sollten, trifft nicht allgemein zu. Bei längerer Einw. erhält man auch mit Acetanhydrid mehr oder weniger Anhydrobasen. — Veranlaßt durch die Arbeit von LINDEMAN u. MÜHLHAUS (S. 947) haben Vff. noch versucht, an I mittels der Chloracetyllderiv. einen Sechsring anzugliedern, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. — Zusammenfassend scheint man folgern zu dürfen, daß das starre System des Indazols, Benzimidazols u. Carbazols die Angliederung eines Fünfrings nicht gestattet, wohl aber in gewissen Fällen die eines biegsameren hydrierten Sechsrings. Ebenso ist im Tetrahydroindol die hydrierte Hälfte beweglicher als die andere zu denken.



5-Methyl-7-aminoindazol (I). Die Darst. nach GABRIEL u. STELZNER (Ber. Dts. Chem. Ges. 29. 303 [1896]) wurde verbessert. — 1-Acetyl-5-methyl-7-diacetam-

Indazol, $C_{14}H_{15}O_3N_3$, Nadelchen aus CH_3OH , F. 147,5—148,5°, ll. in Ä., Bzl., wl. in E. — 2-Acetyl-5-methyl-7-acetaminoindazol, $C_{12}H_{13}O_2N_3$ (III.), gelbliche Nadeln aus $CH_3OH + h. W.$ oder Bzn., F. 149—150° oder 152—153° (je nach Art des Erhitzens), in CH_3OH , Eg., zl. in A., Bzl., fast unl. in Ä., l. in konz. HCl, fällt mit W., soweit nicht verseift, wieder aus. — 1-Acetyl-5-methyl-7-acetaminoindazol, $C_{12}H_{13}O_2N_3$ (IV.), nach 5 Min. langem Kochen von III. im Vakuum Kp.₁₃ ca. 250°, Nadeln aus verd. A., F. 126—127°, ll. in A., Eg., Bzl., wl. in Ä., Bzn. Entsteht auch durch eintägiges Kochen von I mit 4 Teilen Acetanhydrid + 1 Teil Eg. — Labiles 5-Methyl-7-acetaminoindazol, $H_{11}ON_3$ (V.), Nadeln u. Plättchen aus W. oder Bzl., F. 135°, ll. in A., Ä., fast unl. in PAe., l. in verd. HCl, unl. in Laugen. — Stabiles 5-Methyl-7-acetaminoindazol, $H_{11}ON_3$ (VI.), Nadelchen aus Xylol, F. 199°, Kp.₁₃ 250° ohne Zers., zl. in A., Eg., in Toluol, Xylol, swl. in Bzl., unl. in Ä., l. in verd. Säuren. Pikrat, Spieße aus A., F. 167—168°. — 5-Methyl-7-[p-nitrobenzalamino]-indazol, $C_{15}H_{12}O_2N_4$. Aus I u. p-nitrobenzaldehyd in sd. A. Orangefarbige Nadeln aus wss. Aceton, F. 247—248°, fast wl. — Acetylderiv., $C_{17}H_{14}O_3N_4$, goldgelbe Nadelchen aus Pyridin, F. unscharf — 234°, swl. oder unl. Es gelang nicht, ausschließlich den Aldehydrest abzuspalten. — Benzoyl-5-methyl-7-benzaminoindazol. Darst. mittels Pyridin. Gelbe Nadelchen aus Aceton oder Schwerbzn., F. 186—187°, meist wl. (GABRIEL u. STELZNER). — 1-Benzoyl-5-methyl-7-benzaminoindazol, $C_{22}H_{17}O_2N_3$. Durch Erhitzen des vorigen im Vakuum, in Dest. Kp.₁₆ ca. 245°. Kleine Rhomben aus A., F. 139—140°, ll. in Aceton, Bzl., zl. in A., Ä., wl. in Bzn. Wird von HCl-Gas in Ä. nicht angegriffen. — 5-Methyl-7-benzaminoindazol, $C_{15}H_{13}ON_3$ (analog VI.). Aus dem 2-Benzoylderiv. mit HCl-Gas in Ä., einigen Tropfen HCl in h. Eg. oder besser wenig $\frac{1}{10}$ -n. NaOH in k. A., nach anderem Verf. auch aus dem 1-Benzoylderiv. Nadelbüschel aus hochsd. Lg., F. 164—165°, ll. in A., Aceton, Eg., wl. in Ä., Bzl., Lg., unl. in Säuren u. Laugen. Dest. im Vakuum fast unzersetzt. Gibt bei der Benzoylierung das hochschm. Dibenzoylderiv. Dichlorid, F. 199—202°. Pikrat, Nadeln aus A., F. 189°. — 5-Methyl-7-indazyloxy-stoff, $C_9H_{10}ON_4$. Aus I u. Harnstoff bei 145° ($\frac{3}{4}$ Stde.). Mikrokristallin. Pulver aus A., F. 216—218° (Bad 210°) unter NH_3 -Entw., zl. in Eg., wl. in A., Aceton, unl. in Ä., Bzl., l. in starker HCl, mit W. fällbar. — 5-Methyl-7-aminoindazol-1-carbonsäureäthylester, $C_{11}H_{13}O_2N_3$. Aus dem entsprechenden NO_2 -Deriv. (vgl. unten) mit Amalgam in h. A. Flocken aus verd. HCl + NH_4OH , schm. bei üblichem Erhitzen (Bad bei 300°, wohl aber bei Eintauchen in ein Bad von 235°. — 5-Methyl-7-chloraminoindazol, $C_{10}H_{10}ON_3Cl$. Aus I u. Chloracetylchlorid in sd. Ä. + geglühtem CaO , äth. Lsg. teilweise eindunsten, ausgeschiedenes Salz mit A. u. W. zerlegen. Nadeln aus verd. A. oder Bzl., F. 168°, ll. in A., Eg., Aceton, wl. in Bzl., swl. in Ä., Schwerbzn., zugleich sauer u. schwach bas. — 5-Methyl-N-chloracetyl-7-chloracetaminoindazol, $C_{12}H_{11}O_2N_3Cl_2$. Durch weiteres Eindampfen obiger äth. Lsg. Seidige Nadeln aus A., F. 146—147°, ll. in Aceton, Bzl., wl. in A., unl. in Bzn., Säuren u. Laugen. Wird von wss.-alkoh. NaOH erst zum vorigen, dann zu I verseift.

Um vielleicht zu einem nur im Pyrazolring benzoylierten Aminoindazol zu gelangen, gingen Vff. vom 5-Methyl-7-nitroindazol aus. Die Benzoylierung desselben ist schwierig, da einerseits das 2-Benzoylderiv. ungewöhnlich leicht verseift wird, andererseits das NO_2 die Wanderung des Benzoyls von 2 nach 1 hemmt. Schließlich gelang es das 2-Benzoyl-5-methyl-7-nitroindazol, $C_{15}H_{11}O_3N_3$, nach dem etwas abgeänderten Verfahren zu erhalten. Gelbe Stäbchen aus Aceton, F. 200—201° (vorerhitztes Bad), unl. in Aceton, Eg., Bzl., swl. in A., unl. in Ä., Bzn. Wird von HCl-Gas in Bzl. sofort verseift. — 1-Benzoyl-5-methyl-7-nitroindazol, $C_{15}H_{11}O_3N_3$. Aus dem vorigen in sd. A. (Benzol (2 Stdn.)). Blättchen aus Bzl. + PAe., dann verd. CH_3OH , F. 151—152°, unl. in Ä., Aceton, Eg., Bzl., zl. in A., unl. in Bzn. Wird von HCl-Gas in Ä. oder konz. in sd. A. nicht, wohl aber von alkoh. NaOH verseift. Red. mit Al-Amalgam in A. zu nichts Brauchbares. — 5-Methyl-7-nitroindazol-1-carbonsäureäthylester, $C_{11}H_{11}O_4N_3$.

Mit sd. Chlorameisenester (6—7 Stdn.). Gelbe Nadeln aus wss. Aceton oder CH_3O . F. 143—145°, meist wl. — *N*-Chloracetyl-*o*-aminophenol, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2\text{NCl}$. Zur wss. Lsg. *o*-Aminophenolhydrochlorid gibt man 2-n. NaOH u. läßt Chloracetylchlorid eintropfen (stets alkal. Rk.!). Aus Bzl. wurden zuerst Nadelchen, F. 113,5—114,5°, später schillernde Blättchen oder stumpfe Nadeln, F. 137—138°, erhalten. Letztere stellen die stabile Form dar, in welche die andere beim Umkrystallisieren aus A. oder CH_3OH , aber auch aus Bzl. bei Impfen mit der hochschm. Form, übergeht. Ll. in Aceton, Eg., zl. in CH_3OH , zwl. in Bzl., unl. in Bzn. Geht mit w. NaOH glatt über in Phenmorphol aus A., F. 169°. — *N*-Chloracetyl-*o*-amino-*s. m.*-xylol, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{NCl}$, Nadelchen verd. CH_3OH , F. 145—146°. — 5,7-Dimethylphenmorpholon, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}$. Aus dem vorigen mit k. verd. NaOH. Nadelchen aus CH_3OH , F. 203—204°, ll. in Aceton, wl. in A., Bzl., unl. in Ä., Bzn. — 2,6-Dinitroanilin. Durch Einleiten von NH_3 in sd. alkoh. Lsg. von 2,6-Dinitrochlorbenzol (6—8 Stdn.). — 2-Methyl-7(4)-nitrobenzimidazol. Aus dem vorigen nach BORSCHKE (LIEBIGS Ann. **379**. 162 [1911]). 2-Methyl-7(4)-aminobenzimidazolhydrochlorid, $\text{C}_8\text{H}_9\text{N}_3\cdot\text{HCl}$ (nach VII. oder VII. Aus dem vorigen mit SnCl_2 u. HCl über das Sn-Salz. Nadelbüschel aus A., F. über 210°, ll. in W., wl. in A. [SALKOWSKI hat ein Salz der Zus. $\text{C}_8\text{H}_9\text{N}_3\cdot 2\text{HCl} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ beschrieben.] — *vic.* Triaminobenzoldihydrochlorid, $\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_3\cdot 2\text{HCl}$. Aus 2,6-Dinitroanilin mit SnCl_2 u. HCl über das Sn-Salz. Aus verd. HCl, F. über 300°. — *vic.* Triacetaminobenzol, $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}_3$. Aus dem vorigen wie üblich. Nadeln aus A., F. 252—254°, ll. in W., wl. in k. W., A., fast unl. in Ä., Bzl. — 2-Methyl-7(4)-acetaminobenzimidazol, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ON}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ (SALKOWSKI). 1. Aus dem vorigen mit sd. Eg. 2. Aus dem vorigen mit sd. Eg. + Na-Acetat (6 Stdn.) oder mit sd. Acetanhydrid (8 Stdn.). 3. Durch Acetylieren obiger Stammsubstanz. Nadelchen aus W., F. 97—98° (h. Bad), beim weiterem Erhitzen H_2O -Abgabe, Wiedererstarren u. zweiter F. 200—202°, ll. in verd. Säuren u. Laugen, wl. in Bzl., im Vakuum unzersetzt destillierbar. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 539—55. Marburg, Univ.)

LINDENBAUM


James Ernest Humphries, Kondensationen an der aktiven Methylgruppe heterocyclischer Basen. 4,4'-Tetramethyldiaminobenzhydrol kondensiert sich bei Ggw. von Eg. mit Chinaldin u. α -Picolin zu den Verbb. $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{N}[\text{CH}_3]_2)_2$ oder $\text{C}_9\text{H}_4\text{N}\cdot\text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{N}[\text{CH}_3]_2)_2$. Leichter als die Basen selbst reagieren ihre Jodmethylate. Die Verbb. ähneln den Leukobasen der Triphenylmethanfarbstoffe, lassen sich mit PbO_2 zu roten Farbstoffen oxydieren. Die quaternären Salze der Basen reagieren mit p-Nitrophenylnitrosamin u. geben Phenylhydrazone $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}(\text{CH}_3)_2\text{CH}:\text{N}\cdot\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{NO}_2$.

Versuche. I. Kondensationen mit 4,4'-Tetramethylaminobenzhydrol: aus Chinaldin Verb. $\text{C}_{27}\text{H}_{29}\text{N}_3$, aus Ä. F. 131°, durch Oxydation mit PbO_2 , ein roter amorpher Farbstoff, Oxalat, $\text{C}_{30}\text{H}_{32}\text{O}_6\text{N}_3$ (1 Mol. auf $1\frac{1}{2}$ Mol. Oxalsäure). Der Farbstoff färbt Seide violett, die Pseudobase $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}\cdot\text{CH}:\text{C}(\text{C}_6\text{H}_4[\text{CH}_3]_2)_2$ ist braun. Aus p-Toluchinaldin Verb. $\text{C}_{28}\text{H}_{31}\text{N}_3$, F. 152°. Aus α -Picolin Verb. $\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{N}_3$, F. 187°. Aus p-Toluchinaldinjodmethylat Verb. $\text{C}_{25}\text{H}_{34}\text{N}_3\text{J}$, F. 171° (Zers.). II. Kondensationen mit p-Nitrophenylnitrosamin. Aus p-Toluchinaldinjodmethylat 2-Formyl-6-methylchinolinjodmethylat-p-nitrophenylhydrazon, $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_4\text{J}$, aus Methylalkohol F. 244°. Aus Chinaldinjodmethylat Verb. $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}_4\text{J}$, rote Nadeln vom F. 250°. Aus Chinaldinjodäthylat Verb. $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_4$, rote Nadeln vom F. 262°. Aus α -Picolinjodmethylat Verb. $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}_4\text{J}$, gelbe Nadeln vom F. 260°. Mit Benzoldiazoniumsulfat liefert p-Toluchinaldinjodmethylat in alkalischer Lsg. p-Toluchinaldinjodmethylatperjodid, $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{NJ}_3$, F. 133°. (Die Verb. entstehen auch aus dem Jodmethylat u. J in Eg.) (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 376. Aberdeen, Univ.)

TAUBE

J. Tröger und E. Dunker, Über die Kondensation von γ -Methoxychinaldin mit aromatischen Aldehyden. (Vgl. Journ. f. prakt. Ch. [2] **109**. 88; C. **1925**. I. 13.)


hat sich gezeigt, daß die l. c. beschriebenen, unter Druck dargestellten Kondensprodd. aus γ -Methoxychinaldin u. Benzaldehyd bzw. Anisaldehyd nicht die gegebene Formel I. besitzen, sondern die isomeren *N*-Methylchinaldone (II.) sind. Ist also Wanderung des CH_3 vom O zum N eingetreten. Die Verbb. I. entstehen erst, wenn man bei tieferer Temp. u. unter vermindertem Druck arbeitet. Als Kondensationsmittel ist KHSO_4 dem ZnCl_2 vorzuziehen. Bei Verss. mit o- u. m-Methoxybenzaldehyd wurde allerdings auch unter Minderdruck gelegentlich Chinaldonlagerung festgestellt. Mit Piperonal erhielten Vff. sowohl nach dem Verf. von RATH u. BRUNNER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1243; C. **1924**. II. 2044) als nach dem Vakuumverf. das *Dehydrocusparin*. Während das daraus gewonnene Cusparin genannten Autoren bei der OCH_3 -Best. richtige Werte für 2OCH_3 geliefert hatte, haben Vff. in mehreren Fällen festgestellt, daß das γ -ständige OCH_3 nicht nach ZEISEL, sondern erst nach HERZIG-MEYER aufgefunden wird, daß somit im Verlaufe der Best. Wanderung des CH_3 vom O zum N eintritt. — Um die Chinaldonlagerung experimentell zu beweisen, wurden von den beiden Verbb. I. u. II. aus Anisaldehyd die Jodmethylate u. Jodäthylate dargestellt. Erstere sind ident. (III.), letztere verschieden (IV. u. V.). Mit feuchtem Ag_2O werden III. u. IV. in I., V. in II. zurückverwandelt; die beiden ersten Rkkt. sind auffallend, da die Umsetzung von Alkoxychinolinjodalkylaten mit Ag_2O im allgemeinen zu Chinaldonen führt. — Gleichzeitig mit diesen Verss. gedachten Vff., die Frage nach der Konst. des Alkaloids Cusparin, das neben dem Cusparin u. Galipin in der Angosturarinde vorkommt u. wahrscheinlich ein Chinaldinderiv. der Formel $\text{C}_{17}\text{H}_{13}\text{N}(\text{OCH}_3)_2$ ist, zu lösen. Inzwischen hat sich keine der unten beschriebenen Verbb. dieser Zus. als ident. mit dem Cusparin erwiesen.



p-Methoxybenzyliden- γ -methoxychinaldin, $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$ (nach I.). Aus den Komponenten mit ZnCl_2 , besser KHSO_4 oder ohne Zusatz (125° , 20 mm, $1\frac{1}{2}$ Stdn.), in alkoh. HCl lösen, ausgeschiedenes Salz mit w. NH_4OH zerlegen. Blaßgelbe Blättchen aus A., F. 144° . Nach ZEISEL ist nur 1 OCH_3 nachweisbar. Hydrochlorid, $\text{I}_{18}\text{O}_2\text{NCl} + 2\text{H}_2\text{O}$, gelbe Nadeln aus alkoh. HCl. — Jodmethylat, $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{NJ}$ (nach III.). Darst. in CH_3OH (Druckflasche, 100° , 4 Stdn.). Gelbe Nadeln, F. 168° (s.), ident. mit dem l. c. beschriebenen Prod. — Jodäthylat, $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{NJ}$ (nach IV.). St. analog. Goldgelbe Nadeln, F. 246° nach Sintern bei 236° . — *p*-Methoxybenzyliden-*N*-methyl-Py- γ -ketodihydrochinaldin, $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$ (nach II.). Darst. besser l. c. mit KHSO_4 (Rohr, 185 – 190° , 2 Stdn.). Weiter wie oben. Nach Lösen in A. u. Einengen hellgelbe, silberglänzende Blättchen, F. 283° . Nach ZEISEL ist 1 CH_3 nachweisbar. Mol.-Gew.-Best. in Phenol gab richtige Werte. Entsteht durch Einleiten von CH_3J -Dampf in geschm. I. Gibt ebenfalls das oben beschriebene Jodmethylat. — Äthyljodidadditionsprod., $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{NJ}$ (nach V.). Darst. oben (8 Stdn.). Gelbe Krystalle aus A., F. 219° . — Um die Frage zu entscheiden, ob I. u. II. möglicherweise cis-trans-Isomere vorliegen, wurden beide an der äußeren Doppelbindung hydriert. Da hierbei verschiedene Verbb. entstehen, so ist diese Annahme widerlegt. — *p*-Methoxybenzyl- γ -methoxychinaldin, $\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}$. Aus I. in

verd. Essigsäure (+ Pd-Tierkohle), mit Soda fällen. Krystalle, F. 92°. *Hydrochlorid*, $C_{19}H_{20}O_2NCl + 1\frac{1}{2}H_2O$, blaßgelbe Nadeln. — *p-Methoxybenzyl-N-methyl-Py-γ-ketodihydrochinaldin*, $C_{19}H_{19}O_2N$. Ebenso in Eg., mit KOH fällen. Nadelchen aus A., F. 214°. *Hydrochlorid*, Nadeln, F. 197°. — *Benzyliden-γ-methoxychinaldin*, $C_{18}H_{15}ON$ (nach I.), Nadelchen aus A., F. 142°. Das OCH_3 ist nach ZEISEL nicht nachweisbar. *Hydrochlorid*, gelbe Nadelchen. Die l. c. unter gleichem Namen beschriebene Verb. ist *Benzyliden-N-methyl-Py-γ-ketodihydrochinaldin*. — *o-Methoxybenzyliden-γ-methoxychinaldin*, $C_{19}H_{17}O_2N$ (nach I.). Temp. bei der Darst. bis 165°. Gelbe Nadeln aus A., F. 130°. *Hydrochlorid*, citronengelbe Nadeln, F. 191°. *Pikrat*, gelbe Nadelchen, F. 208°. — *o-Methoxybenzyl-γ-methoxychinaldin*, $C_{19}H_{19}O_2N$, Krystall aus verd. A., F. 108°. *Pikrat*, $C_{25}H_{22}O_9N_4$, gelbe Nadeln, F. 176°. — *o-Methoxybenzyliden-N-methyl-Py-γ-ketodihydrochinaldin*, $C_{19}H_{17}O_2N$ (nach II.). Entstand gelegentlich unter denselben Bedingungen wie I. Mkr. schwefelgelbe Krystalle aus A., F. 268°. *Hydrochlorid*, gelbe Nadelchen. — *m-Methoxybenzyliden-γ-methoxychinaldin*, $C_{19}H_{17}O_2N$ (nach I.). Nicht ganz rein schon früher erhalten (l. c.). Die letzten Spuren Zn wurden mit H_2S in essigsaurer Lsg. entfernt. Gelbliche Rhomben aus A., F. 134,5°. *Hydrochlorid*, hellcitronengelbe Nadelchen, F. 207°. — Beim Arbeiten mit $KHSO_4$ wurde gelegentlich ein Prod. vom F. 231° (gelbliche Nadelchen) erhalten, zweifellos das isomere II. — *m-Methoxybenzyl-γ-methoxychinaldin*, $C_{19}H_{19}O_2N$, Drusen, F. 49°. *Chloroplatinat*, $(C_{19}H_{20}O_2N)_2PtCl_6$, gelbe Prismen aus alkoh. HCl. *Pikrat*, $C_{25}H_{22}O_9N_4$, gelbe Nadeln, F. 154°. — *3',4'-Dimethoxybenzylidenchinaldin*, $C_{19}H_{17}O_2N$. Aus Chinaldin u. Veratrumaldehyd nach dem Vakuumverf. (+ $KHSO_4$). Krystalle aus A., F. 109–110°. *Hydrochlorid*, rote Krystalle. — *3',4'-Dimethoxybenzylchinaldin*, $C_{19}H_{19}O_2N$, Drusen, F. 52°. *Chloroplatinat*, $(C_{19}H_{20}O_2N)_2PtCl_6$, orangefarbige Blättchen aus alkoh. HCl. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 196–220.) LINDENBAUM.

J. Tröger und **G. Pahlé**, Über die Synthese von β -Arylsulfonchinaldin- α -arylsulfonmethanen, ihre Spaltung durch Reduktion und Säure, sowie über ihre Konstitutionsbestimmung. Nach dem Verf. von TRÖGER u. v. SEELEN (Journ. f. prakt. Ch. [2] 105. 208; C. 1923. III. 147) wurde eine Anzahl weiterer β -Arylsulfonchinaldin- α -arylsulfonmethane (nebenst.) dargestellt. Die Kondensationen gelingen auch, wenn man die Komponenten im siedenden Wasserbad genügend lange erhitzt. Auch die neuen Verbindungen sind gegen schw. KOH u. alkal. Reduktionsmittel beständig. Bei der Einw. von Sn u. HCl nach



TRÖGER u. BROHM (S. 673) werden beide Sulfonreste als Thiophenole abgespalten. Es ist nicht gelungen, durch schwächere Red. die Abspaltung nur eines Restes zu erreichen, so daß man zur Ortsbest. von R u. R' nach wie vor auf das Säureverf. (TRÖGER u. v. SEELEN) angewiesen ist. Vff. benutzen jetzt rauchende an Stelle von konz. HCl. — Weiter wurde bewiesen, daß bei der reduktiven Spaltung nicht nur, wie bisher angenommen, *Py-Tetrahydrochinaldin*, sondern auch *Bz-Tetrahydrochinaldin* entsteht, daß Chinaldin demnach von Sn u. HCl in derselben Weise hydriert wird wie mit Ni unter Druck (vgl. v. BRAUN, GMELIN u. SCHULTHEISS, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1338; C. 1923. III. 307). Zur Trennung der Isomeren haben sich Vff. auch des Benzoylierungsverf. genannter Autoren bedient. Das in der Literatur als *Py-Tetrahydrochinaldin* beschriebene Prod. ist also ein Gemisch beider Verbindungen.

Versuche. Die Gewinnung der Ausgangsmaterialien geschah in der früheren Weise. Bei der Bromierung der Arylsulfonacetone, $R \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_3$, entstehen manchmal *Arylsulfondibromacetone*, $R \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CHBr_2$, die aber zur Umsetzung mit Arylsulfinat ohne weiteres geeignet sind, da nur das eine Br durch SO_2R , das andere durch H ersetzt wird. In den *Arylsulfonbromacetonen*, $R \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_2Br$, läßt sich das Br zwar leicht gegen Cl oder J, nicht aber gegen andere Reste austauschen, entweder erfolgt keine Rk. oder Spaltung, z. B. mit NaOH oder Na_2CO_3 in $R \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH_2OH$.

Glykolsäure. — *p*-Toluolsulfonchloraceton, $C_{10}H_{11}O_3ClS$. Aus der Br-Verb. in h. durch Schütteln mit $AgCl$. Blättchen, F. 140° . — *p*-Toluolsulfonjodaceton, $H_{11}O_3JS$, Nadeln, F. 102° , l. in w. Eg. — *o*-Anisolsulfonbromaceton, $C_{10}H_{11}O_4BrS$. Aus *o*-Anisolsulfonaceton (TRÖGER u. BECK, Journ. f. prakt. Ch. [2] **87**, 293 [1913]) + Br in k. Bzl. Prismen aus A., F. 115° , l. in A., Essigester, unl. in W., Ä. — *o*-Anisolsulfon-*p*-toluolsulfonaceton, $C_{17}H_{18}O_6S_2$. Aus dem vorigen u. Na-*p*-Toluolsulfonat oder *p*-Toluolsulfonbromaceton u. *o*-Anisolsulfinat in sd. A. Blättchen aus A., F. 177° , l. in k. W., A. — Phenylhydrazon, $C_{23}H_{24}O_5N_2S_2$, gelbe Rhomboeder aus A., F. 113° , l. in A., ll. in Eg. — β -*o*-Anisolsulfonchinolyl- α -*p*-toluolsulfonmethan, $C_{24}H_{21}O_5NS_2$. Aus dem vorigen Keton u. *o*-Aminobenzaldehyd (Rohr, 160° , 1 Stde.). Mkr. hexagonale Krystalle aus A., F. 208° , unl. in W., Säuren, l. in h. A., Eg. Liefert mit rauchendem HCl (Rohr, 210 — 220° , 4 Stdn.) β -*o*-Anisolsulfonchinaldin (TRÖGER u. BROHM), $C_{23}H_{20}O_5N_2S_2$, Sn u. HCl *o*-Methoxythiophenol + *p*-Thiokresol u. Tetrahydrochinaldin. — *p*-Anisolsulfonbromaceton, $C_{10}H_{11}O_4BrS$, Nadelbüschel, F. 104° . — *p*-Anisolsulfon-*p*-toluolsulfonaceton, $C_{17}H_{18}O_6S_2$, Rhomboeder, F. 140° . — β -*p*-Anisolsulfonchinolyl- α -*p*-toluolsulfonmethan, $C_{24}H_{21}O_5NS_2$. Aus dem vorigen (150° , 2 Stdn.). Mkr. graugrüne Nadeln, F. 187° . — *o*-Phenetolsulfonbromaceton, $C_{11}H_{13}O_4BrS$. Aus *o*-Phenetolsulfonaceton (TRÖGER u. BROHM) wie oben. Krystallbüschel aus A., F. 125° , l. in w. Eg., unl. in W., Ä. — *o*-Phenetolsulfon-*p*-toluolsulfonaceton, $C_{18}H_{20}O_6S_2$, Prismen aus A., F. 144° , swl. in k. A., unl. in W., Ä. — Phenylhydrazon, $C_{24}H_{26}O_5N_2S_2$, gelbes Pulver, F. 80° , ll. in Bzl., Chlf., wl. in A., unl. in W., Ä. — β -*o*-Phenetolsulfonchinolyl-*p*-toluolsulfonmethan, $C_{25}H_{23}O_5NS_2$. Aus dem vorigen Keton (150° , 20 Min.). Mkr. graugrüne Rhomboeder aus A., F. 194° , ll. in Eg., l. in A., unl. in W. Säurespaltung: *o*-Phenetolsulfonchinaldin (TRÖGER u. BROHM). Reduzierende Spaltung: *o*-Äthoxythiophenol + *p*-Thiokresol. — *p*-Phenetolsulfonbromaceton, $C_{11}H_{13}O_4BrS$. Aus *p*-Phenetolsulfonaceton (TRÖGER u. BECK) in Eg. Nadeln, F. 108° , l. in A., Eg., unl. in W., Ä. — *p*-Phenetolsulfon-*p*-toluolsulfonaceton, $C_{18}H_{20}O_6S_2$, Rhomboeder, F. 116° . — *p*-Phenetolsulfonchinolyl- α -*p*-toluolsulfonmethan, $C_{25}H_{23}O_5NS_2$. Aus dem vorigen (100° , $\frac{1}{2}$ Stde.). Graue Blättchen, F. 182° . — *o*-Anisolsulfondibromaceton, $C_{10}H_{10}O_4Br_2S$. Durch Bromieren in k. Eg., mit W. fällen. Nadeln aus Bzl., F. 160° , unl. in W., Ä., n. A., Eg. — *Di-o*-anisolsulfonaceton, $C_{17}H_{18}O_7S_2$. Aus dem vorigen oder obiger Dibromverb. Nadeln aus A., F. 165° . — β -*o*-Anisolsulfonchinolyl- α -*o*-anisolsulfonmethan, $C_{24}H_{21}O_6NS_2$. Aus dem vorigen (180° , 2 Stdn.). Würfel aus Eg., F. 188° . l. liefert *o*-Methoxythiophenol. — *p*-Brombenzolsulfonaceton, $C_6H_5O_3BrS$. Aus *p*-Brombenzolsulfonaceton u. Na-*p*-Brombenzolsulfinat in verd. A. (Wasserbad, $\frac{3}{4}$ Stdn.). Blättchen oder Prismen aus A. oder Eg., F. 103° . — *p*-Brombenzolsulfonbromaceton, $C_6H_5O_3Br_2S$, Krystallbüschel aus A., F. 150° . — *Di-p*-brombenzolsulfonaceton, $C_{15}H_{12}O_5Br_2S_2$, Blättchen aus A., F. 195° . — β -*p*-Brombenzolsulfonchinolyl- α -*p*-brombenzolsulfonmethan, $C_{15}H_{10}O_5NBr_2S_2$. Aus dem vorigen (Rohr, sd. Wasserbad, 3 Tage). Würfel, F. 132° . l. liefert *p*-Bromthiophenol. — *p*-Brombenzolsulfon-*o*-anisolsulfonaceton, $C_{16}H_{15}O_6BrS_2$, Blättchen aus A., F. 160° . — β -*p*-Brombenzolsulfonchinolyl- α -*o*-anisolsulfonmethan, $C_{16}H_{15}O_6NBrS_2$. Aus dem vorigen (sd. Wasserbad, 2 Tage). Nadeln, F. 191° . Säurespaltung liefert β -*p*-Brombenzolsulfonchinaldin, F. 167° (nachst. Ref.). — *p*-Brombenzolsulfon-*p*-toluolsulfonaceton, $C_{16}H_{15}O_6BrS_2$, Blättchen aus A., F. 163° , wl. in A. — β -*p*-Brombenzolsulfonchinolyl- α -*p*-toluolsulfonmethan, $C_{23}H_{18}O_4NBrS_2$. Aus dem vorigen (100° , 25 Min.). Krystallsand, F. 193° . Säurespaltung wie vorstehend. — *p*-Brombenzolsulfon- β -naphthalinsulfonaceton, $C_{19}H_{15}O_5BrS_2$, Krystallkrusten aus A., F. 165° . — *p*-Brombenzolsulfonchinolyl- α - β -naphthalinsulfonmethan, $C_{26}H_{18}O_4NBrS_2$. Aus dem vorigen (200° , 2 Stdn.). Graugrünes Pulver, F. 195° , unl. in A., Eg., Chlf., Bzl., l. in Anilin. Säurespaltung wie vorsteh. — Aus den bisherigen Verss. scheint hervorzugehen, daß bei ungleichen Radikalen R u. R' der schwerere Rest in die β -Stellung wandert. — Das bei den reduzierenden Spaltungen erhaltene Tetrahydrochinaldin-

hydrochlorid wurde benzoyleiert, der im Benzolkern hydrierte Anteil mit Dampf abgeblasen u. in äth. Lsg. übergeführt in *Bz-Tetrahydrochinaldinhydrochlorid*, F. 164°. Das *Benzoylderiv. des Py-Tetrahydrochinaldins* zeigte F. 117° u. lieferte bei der Verseifung *Py-Tetrahydrochinaldinhydrochlorid*, F. 191°. Der von v. BRAUN u. Mitarbeitern angegebene F. 128—130° muß auf einem Irrtum beruhen. Auch der F. 191° ist auffallend, da das Gemisch beider Salze bei 195—196° schm. (Journ. f. prakt. Chem. [2] 112. 221—42.)

LINDENBAUM

J. Tröger und A. Ungar, Über die Reduktion von β -arylsulfonierten Chinolinderivaten. Vorliegende Arbeit bringt weitere Beiträge zu der von TRÖGER u. Mitarbeitern (S. 673, 938 u. vorst. Ref.) untersuchten reduzierenden Spaltung der α -substituierten β -Arylsulfonchinoline. Dabei hat sich von neuem gezeigt, daß die gute Beschaffenheit des Sn von ausschlaggebender Bedeutung ist. — β -Arylsulfonchinaldine werden ohne Ausnahme in der von TRÖGER u. BROHM (S. 673) mitgeteilten Weise gespalten. — Tritt an Stelle des α -ständigen CH_3 eine ungesätt. Seitenkette, so erhält man bei der Red. ein Tetrahydrochinolin mit gesätt. Seitenkette. Man kann auch stufenweise vorgehen, indem man erst die ungesätt. Seitenkette hydriert u. dann die reduzierende Spaltung vornimmt. — Die aus den β -Arylsulfonchinaldinen hervorgehenden *Chinophthalone* verlieren bei der Red. auch den Phthalsäurerest. — α -Ständige NH_2 oder N(Alk)_2 wird abgespalten, nicht aber OH. Allerdings konnten bisher nur sehr kleine Mengen *Dihydrocarbostyryl* mit einiger Sicherheit erkannt werden. Zu Vergleich ausgeführte Verss. mit Carbostyryl selbst ergaben, daß dieses weder von sauren Reduktionsmitteln noch elektrolyt. hydriert wird. Wahrscheinlich hängt diese Erscheinung mit der Tautomerie des Carbostyryls zusammen. — Von neuem wurde festgestellt, daß das aus der reduzierenden Spaltung hervorgehende Tetrahydrochinaldin ein Gemisch von Py- u. Bz-Tetrahydroverb. ist (vorst. Ref.). In einem einzigen Falle wurde aus unbekannten Ursachen ein mit Dampf flüchtiges festes, bei 58° schm., hygroskop. Prod. erhalten, dessen F. mit dem des α -Methylindols übereinstimmt, dessen Analyse aber ein Dekahydrochinaldin vermuten läßt. Letzteres ist in der Literatur allerdings als widerlich riechende Fl. beschrieben. In die Substanz nie wieder erhalten wurde, konnte ihre Natur nicht ermittelt werden. — *Jodalkylate* von β -Arylsulfonchinaldinen u. β -Arylsulfon- α -aminochinolinen liefern bei der Red. *N-Alkyl-Py-tetrahydrochinaldine* u. *N-Alkyl-Py-tetrahydrochinoline*. Eine Hydrierung im Benzolkern tritt hier nicht ein, da die Red. offenbar am N beginnt, u. ein hydrierter Pyridinkern auf die weitere Hydrierung des Benzolkerns störend wirkt.

Versuche. Der Red. wurden zunächst die von TRÖGER u. MENZEL (Journ. f. prakt. Chem. [2] 103. 188; C. 1922. I. 1239) dargestellten β -Benzol-, β -p-Toluol-, β -p-Chlorbenzolsulfonchinaldine u. das unten beschriebene β -p-Brombenzolsulfonchinaldin unter gleichen Bedingungen unterworfen u. das abgespaltene Thiophen als Disulfid quantitativ bestimmt. Es zeigte sich, daß die Ausbeute an Disulfid mit dem Gewicht der SO_2R -Gruppe steigt. Bei genügender Dauer u. Wirksamkeit des Sn erfolgt aber die Spaltung immer fast quantitativ. — β -p-Brombenzolsulfonchinaldin $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{NBrS}$. Aus p-Brombenzolsulfonaceton u. o-Aminobenzaldehyd in sd. A. mit etwas NaOH (3—4 Stdn.). Rhomb. Säulen aus verd. A., F. 168°. — β -p-Brombenzolsulfonchinophthalon, $\text{C}_{24}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{NBrS}$. Aus dem vorigen mit Phthalsäureanhydrid u. ZnCl_2 (150—160°, 2 Stdn.). Gelbe Blätter aus A. Liefert bei der Red. Tetrahydrochinaldin. Was hierbei aus dem Phthalsäurerest wird, konnte nicht ermittelt werden. — α -Propenyl- β -p-brombenzolsulfonchinaldin, $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{NBrS}$. Aus dem vorigen mit Paraldehyd u. ZnCl_2 (160°, 2 Stdn.). Reinigung über das Hydrochlorid (F. 132°). Prismen aus A., F. 173°. — α -Propenyl- β -p-toluolsulfonchinaldin wurde schon von TRÖGER u. MENZEL als Äthylidenderiv. des betreffenden Chinaldins beschrieben. — Die beiden ungesätt. Verbb. liefern bei der Red. *Tetrahydro- α -propyl-*

nolin, dessen Hydrochlorid (F. 216°) sehr zerfließlich ist. Die Zerlegung der Base erfolgte durch Benzoylierung. *Benzoylderiv. des Py-Tetrahydro- α -propylchinolins*, $H_{21}ON$, Nadeln aus A., F. 97°. *Bz-Tetrahydro- α -propylchinolinhydrochlorid*, zers. bei ca. 100°, wurde in sehr geringer Menge erhalten. — α -Propyl- β -p-toluolsulfonolin, $C_{18}H_{19}O_2NS$. Durch Hydrierung obiger Propenylverb. in A. (+ Pd-Tierle) unter geringem Überdruck. Amorph, hoher F., l. in A., Ä. Das Hydrochlorid von W. hydrolysiert. Red. liefert Tetrahydro- α -propylchinolin. — β -p-Bromzolsulfonchinaldinjodmethylat, $C_{17}H_{15}O_2NBrJS$. Aus den Komponenten in CH_3OH (0°, 4 Stdn.). Gelbe Nadeln, F. 157°. Gibt bei der Red. *N-Methyl-Py-tetrahydro-naldin* (Pikrat, F. 178°). — Bei der Red. der β -p-Toluol-, β -p-Chlorbenzol-, β -p-Bromzol- u. β - β -Naphthalinsulfon- α -aminochinoline (Darst. nach TRÖGER, KÖPPENSTROP u. MEINECKE, Journ. f. prakt. Ch. [2] **104**. 335. 203; C. **1923**. I. 846. 24. I. 1526) ergab sich wieder, daß die Spaltung um so leichter erfolgt, je schwerer SO_2R -Gruppe ist. Man erhält reines *Py-Tetrahydrochinolin* (Hydrochlorid, 180°; Chloroplatinat, F. 203°), frei von Bz-Isomerem, wie die Benzoylierung gezeigt. — α -Amino- β -p-toluolsulfonchinolinjodmethylat, $C_{17}H_{17}O_2N_2JS$. Darst. wie oben. Gelbe Nadeln, F. 185°, ll. in A., wl. in W. — α -Amino- β -p-brombenzolsulfonchinolinmethylat, $C_{16}H_{14}O_2N_2BrJS$, gelbe Nadeln, F. 192°. — Beide Jodmethylate liefern bei der Red. *N-Methyl-Py-tetrahydrochinolin* (Hydrochlorid, F. 100°; Chloroplatinat, 177°). — α -Amino- β -p-toluolsulfonchinolinjodäthylat, $C_{18}H_{19}O_2N_2JS$, gelbbraune Nadeln, F. 194°. — α -Amino- β -p-brombenzolsulfonchinolinjodäthylat, $C_{17}H_{16}O_2N_2BrJS$, gelbe Prismen, F. 204°. — Beide Jodäthylate liefern bei der Red. *N-Äthyl-Py-tetrahydrochinolin*. — α -Dimethylamino- β -p-toluolsulfonchinolin, $C_{18}H_{18}O_2N_2S$. Aus der entsprechenden α -Aminoverb. mit CH_3J u. $NaOCH_3$ (100°, 8 Stdn.). Gelbe Prismen, F. 132°. — α -Dibenzylamino- β -p-toluolsulfonchinolin, $C_{30}H_{26}O_2N_2S$. Mit Äthylchlorid u. $NaOC_2H_5$ (100°, 12 Stdn.). Gelbliche Nadeln, F. 164°. — Die letzten beiden Verbb. geben bei der Red. *Py-Tetrahydrochinolin*. — β -p-Toluol- u. β -p-Bromzolsulfoncarbostyryl (Darst. l. c.) werden wegen ihrer Schwerlöslichkeit in HCl erst mit Zn -Staub in $Et_2O + HCl$ reduziert. Nach dem Abblasen des Thiophenols wird alkal. gemacht, Lsg. u. getrockneter Nd. für sich mit Ä. extrahiert. Der Ä.-Extrakt liefert aus HCl , dann A.-Ä. wenig Blättchen, F. 161°, wahrscheinlich *Hydrocarbostyryl* (F. 163°). (Journ. f. prakt. Ch. [2] **112**. 243—67. Braunschweig, G. LINDENBAUM.)

W. Rodionow, Über den Wert der Alkylester der aromatischen Sulfosäuren für die Alkylierung organischer Verbindungen. Vf. hat gefunden, daß das *Methyl-p-toluolsulfonat des Dimethylanilins*, $C_6H_5 \cdot N(CH_3)_3 \cdot O \cdot SO_2 \cdot C_6H_4 \cdot CH_3$ (I), das aus den Komponenten leicht erhältlich ist u. bereits im D. R. P. 112 177 kurz erwähnt wird, ein ausgezeichnetes Methylierungsmittel ist, u. zwar besonders für Verbb., die außer OH noch die Gruppe $>NR$ enthalten (viele Alkaloide), da es diese im Gegensatz zu den anderen Alkylierungsmitteln intakt läßt. I gleicht darin dem Trimethylphenylammoniumchlorid (D. R. P. 247 180), besitzt aber vor diesem den Vorzug leichter Gewinnbarkeit. Der notwendige *p-Toluolsulfonsäuremethylester* (II) wird durch Einwirkung von 30%ig. $NaOH$ in das Gemisch von p-Toluolsulfonchlorid u. CH_3OH bis zum alkal. Rk. bei nicht über 30° dargestellt (vgl. auch FÖLDI, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **1836**; C. **1920**. III. 915). — Die methylierende Wrkg. von I beruht auf seiner Umsetzung in alkal. Medium in die Ammoniumbase $C_6H_5 \cdot N(CH_3)_3 \cdot OH$, das eigentliche methylierende Agens, u. Toluolsulfonat. Es war daher erwünscht, letzteres wieder in Toluolsulfonchlorid überzuführen, was mittels Chlorsulfonsäure befriedigend gelang: $SO_2 \cdot ONa + Cl \cdot SO_3H = R \cdot SO_2Cl + NaHSO_4$. Das Verf. arbeitet demnach nur mit den billigen Materialien CH_3OH u. $ClSO_3H$. — Man kann auch vorteilhaft I durch das *Methylbenzolsulfonat des Dimethylanilins* ersetzen, weil Toluol mit $ClSO_3H$ ein Gemisch von Isomeren, Bzl. aber nur ein Prod. liefert. — Das CH_3 u. C_2H_5 gleich-

pyrin über, reduziert dieses in W. mit H_2S , gibt HCl zu u. verdampft das Filtrat. A., F. 230—231°. — *Pyramidon*. Aus dem vorigen u. II in sd. verd. $NaOH$. äthern, über das Hydrochlorid reinigen. F. 108°. Ausbeute 70%. — *Kaffein*. Theobromin u. II in sd. alkoh. $NaOH$. Eindampfen, mit Chl . extrahieren. W., F. 233°. Ausbeute 81%. — *Äthyltheobromin*. Ebenso mit p-Toluolsulfon-äthylester. F. 161—162°. Ausbeute 55%. — *Methylkotarninjodmethylat*. Man kocht Kotarnin mit II in W. bis zur Lsg., filtriert (beim Verdampfen hinterbleibt ein krystallisierendes Öl) u. gibt KJ zu. Prismen aus W., F. 219—220°. Ausbeute 40%. — *Papaverinjodmethylat*, F. 195°, u. *Brucinjodmethylat* wurden analog hergestellt. — Zur Darst. der Alkylhalogenide kocht man je 1 Mol. Benzol- oder Toluolsulfonsäureester u. $KHal$ in wenig W. am absteigenden Kühler. Ausbeuten: *Methyljodid* ca. 80%, *Äthyljodid* u. *Äthylbromid* ca. 70%. Fettaromat. Ester geben schlechte Ausbeuten, arom. Ester reagieren nicht. — *Nitromethan* u. *Nitroäthan*. Ebenso mit $NaNO_2$. Ausbeute an Nitroäthan schlecht. — *Acetonitril*. Aus CH_3COCH_3 u. KCN . Die Temp. muß sehr langsam gesteigert werden, da sonst die Rk. plötzlich heftig erfolgt. Etwas i-Nitril wird mit HCl zers. Ausbeute 62,5%. Die Ausbeuten an *Propio*- u. *Butyronitril* sind ein wenig niedriger. Bzgl. fettaromat. u. arom. Ester gilt das oben Gesagte. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 305—25. 1910.)

LINDENBAUM.

E. R. Schulz, *Berberin in der gemeinen Berberitze (Berberis vulgaris L.)*. Vf. geben einen histor. Überblick über Isolierung, chem. Zus., medicin. Anwendung u. Synthese von Berberin. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **15**. 33—39.)

ROJAHN.

Keita Shibata, *Über die Anhydrierung von Aminosäuren und Peptiden. Eine Fortsetzung an Abderhalden*. Polemik gegen ABDERHALDEN u. SCHWAB (S. 1192.) — Bei Erhitzen eines Aminosäuregemisches mit wenig *Glycerin* entsteht eine aus der Glycerinlsg. mit Erdalkalisalzen fällbare Substanz (vgl. Acta phytochim. **2**. 1925. II. 1281), die keine freie Aminosäure enthält, Proteinrk. gibt, in W. l. ist. Zus. ist je nach der Zus. des Aminosäuregemisches verschieden. Durch Fällung mit Erdalkalimetallen mit NH_3 u. CO_2 erhält man eine beinahe aschefreie Substanz. (Journ. chem. Soc. of Japan **1**. 19—21. Tokyo, Univ., Botan. Inst.)

BIKERMAN.

E. Biochemie.

S. Loewe, *Ionen-Dyskrasie. Ein graphisches Hilfsmittel zum Studium der Folgen der Gleichgewichtsstörungen in der Ionenzusammensetzung biologischer Salzlösungen. Anwendung eines Drei-Koordinatensystems auf die Beziehungen der Mengenverhältnisse der drei Ionen des Organismus*. (Biochem. Ztschr. **167**. 92—99. Dorpat, Pharm. Institut.)

MEIER.

Herrera, *Über neue Versuche, welche lebende Wesen vortäuschen*. Man gibt zu 100 ccm Gasolin u. 50 ccm Olivenöl einige Tropfen einer Lsg. aus 14 g CH_2 , 1 g Rhodamin u. 100 g W. Diese teilen sich u. geben Formen von Amöben, Infusorien, welche sich von der Mitte aus verlängern, kriechen u. ihre Gestalt verändern. Einige Tröpfchen täuschen Infusorien vor, welche in der Fl. auf- u. absteigen. Das Phänomen dauert ungefähr 1 Stde. Vf. führt die Bewegungen auf Diffusionserscheinungen, Änderungen des osmot. Drucks u. der Oberflächenspannung zurück. (C. r. Acad. des sciences **182**. 462.)

ENSLIN.

N. R. Dhar, *Alter und Tod vom chemischen Standpunkt*. Vf. betrachtet die Lebensvorgänge, indem er sie mit kolloidchem. Vorgängen vergleicht. Als Beispiel für den abnehmenden W.-Gehalt des Menschen vom Fötus bis zum erwachsenen Menschen führt er damit verbundenen Energieabnahme, zieht er die abnehmende Absorptionsfähigkeit der Gele beim Altern heran. Ferner findet er Beziehungen zwischen der Zers. des Wasserstoffperoxydes durch frisches u. gealtertes, d. h. W.-ärmeres,

MnO₂ u. den Oxydationsvorgängen im menschlichen Körper in verschiedenen A. stufen. Parallel mit dieser katalyt. Wirksamkeit der Körperenzyme läuft die haltung der zum Lebensvorgang notwendigen Temp. Nimmt die katalyt. Wirksamkeit der Enzyme ab, so sinkt die Temp. u. das betreffende Lebewesen stirbt. (J. Physical Chem. **30**. 378—82. Allahabad, Indien, Univ.) HAA

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Th. Sabalitschka und **C. Jungermann**, *Der absolute und prozentuale Alkaloidgehalt der einzelnen Teile der Keimlinge und der jungen Pflanze von Strychnos vomica L. während der Keimung*. Vff. untersuchten den absol. wie den prozent. Alkaloidgehalt in den Samen, jungen Wurzeln, älteren Wurzeln, jungen gelben Keimblättern, grünen ausgewachsenen Keimblättern, abgeworfenen Samenrückständen im Hypokotyl. Sie kamen zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen wie TUNMANN, nur im Hypokotyl u. in den jungen Keimblättern fanden die Vff. etwas mehr. Die Annahme, daß die anfängliche Verminderung des Alkaloidgehaltes während der ersten Wochen des Wachstums mit einem Übergehen in den Boden u. damit verbundener Auswaschung zu erklären, weisen die Vff. entschieden zurück. (Biochem. Ztschr. **167**. 479—90.)

R. Cerighelli, *Einfluß des Lichtes und der Temperatur auf die Keimung von Strychnos in Abwesenheit von Calcium*. (Vgl. S. 1821.) Durch zahlreiche Verss. konnte festgestellt werden, daß die Ggw. von Licht kein ausschlaggebender Faktor bei der Keimung ist, wenigstens konnte nie eine Steigerung des Wachstums in Ggw. oder in Abwesenheit von Kalk beobachtet werden. Die Temp. dagegen ist von großer Bedeutung, es zeigte sich, daß in reinem W. das Wachstum der Wurzeln stets gleich blieb, während in Temp. auch herrschte, anders dagegen in Ggw. von Kalk. Hier tritt ein ungünstiges Wachstum auf, dessen maximale Geschwindigkeit bei 21° liegt. Das Wachstum des Stengels wird aber dadurch in keiner Weise beeinflusst. Im Gegenteil entwickelt sich der Stengel bei Temp. von 10—11° wesentlich besser als bei höheren Temperaturen. Was Vff. auf den ursprünglichen Kalkgehalt des Samens zurückführt. Die Verss. wurden an Erbsen ausgeführt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 483—85.) HAA

G. Klein und **K. Pirschle**, *Acetaldehyd als Zwischenprodukt der Pflanzenatmung*. Die Vff. beweisen den Zusammenhang von aerober, anaerober Atmung u. Gärung durch den Nachweis von *Acetaldehyd* (I) als Zwischenprod. bei der Atmung von Blättern, Keimlingen, Blättern, Wurzeln sowie Maceraten von verschiedenen Pflanzen. Als Abfangmittel wurden nach NEUBERG Dimedon (Dimethylhydroresorcin) in 0,1—0,4% bezw. Na₂SO₃ in 1%ig. Lsg. verwendet. Die Pflanzenteile, die chlorophyllhaltig sind, wurden unter Dunkelsturz, u. die Macerate vom Keimlingen, Blütengereibsel wurden in 1%ig. Lsg. mit dem Abfangmittel gebracht u. nach einigen Tagen, die Macerate nach 7 Std., verarbeitet. I wurde quantitativ bestimmt, indem das Versuchsmaterial zumeist 40 g, mit Quarzsand fein zerrieben u. mit 200—300 ccm 5%ig. Sodaslg. der das gebildete *Acetaldehyd* (II) l. ist, nach Stehen über Nacht durch Glaswolle filtriert u. das Filtrat samt Waschwasser mit 4—5 g CaCO₃ versetzt, dest. wird. Der übergelassene I wird in 1/100-n. Bisulfitslg. aufgefangen, der Überschuß mit Jod zurücktitriert. Als Blindwert für jodbindende Substanzen diente ein Kontrollvers. mit Pflanzenmaterial ohne Abfangmittel. Zur Isolierung von I als II wurde nach KLEIN WERNER (vgl. nachst. Ref.) das Atmungsmaterial mit h. A. extrahiert u. filtriert. Nach dem völligen Vertreiben des A. unterhalb 40° im Vakuum wird mit PAE. geschüttelt, etwas alkal. W. zugesetzt, der PAE. vertrieben u. die neutralisierte PAE. in eine wss. Dimedonlsg. dest., aus der *Acetaldehyd* in kurzen Nadelbüscheln kristallisiert. F. 138—140°. — Die Menge des abgefangenen I betrug zwischen 0,3—23 mg pro 100 g Frischgewicht. Am meisten I wurde bei den stark atmenden Pflanzorganen, den Blüten u. Keimlingen erhalten. Die Atmungsgröße ist auch von der Menge der verwertbaren Atmungssubstanzen abhängig; sie wird durch Zusatz

case gesteigert. In bei 10° gehaltenen Pflanzen wurde weniger **I** abgefangen als 20° . (Biochem. Ztschr. 168. 340—60.)

LOHMANN.

G. Klein und **O. Werner**, *Formaldehyd als Zwischenprodukt bei der Kohlensäure-assimilation*. Es wird der Nachweis erbracht, daß *Formaldehyd (I)* als Zwischenprod. der CO_2 -Assimilation der Pflanze auftritt. Zur Isolierung von **I** erwies sich am stigsten die Verwendung von $0,1\%$ ig. *Dimedonlsg. (II)* als Abfangmittel, weniger Na_2SO_3 . Das geeignetste Versuchsmaterial sind submerse Wasserpflanzen, wie *Elodea*, die direkt in die *Dimedonlsg.* eingelegt werden können; einzellige u. Faden-pflanzen ergaben weniger an **I**. Das gebildete *Formaldomedon (III)* tritt hier völlig in die *Lsg.* über. Bei den verschiedenen Landpflanzen wurden die Blätter glatt abgeschnitten u. in die Nährlsg. gestellt, der $0,1\%$ NaCl zur Offenhaltung der Spalten zugesetzt war, mit genügend **II** mit dem Transpirationsstrom in das Blatt nachgesaugt werden konnte. In einzelnen Fällen wurde **II** auch in das Interzellularsystem injiziert. **II** wirkt schon in $0,1\%$ ig. *Lsg.* infolge Narkose leicht schädigend auf die Assimilation. Als Lichtquelle diente eine 2000-MK-Metallfadenlampe (40000—100000 Lux) bei 6—8-stünd. Belichtung. Zur Isolierung von **III** wird in den Verss. mit Wasserpflanzen die Nährlsg. filtriert, angesäuert u. mit der halben Menge PAe. 1 Stde. geschüttelt. Der PAe. wird nach dem Waschen mit gesätt. NaCl-*Lsg.* im Vakuum unterhalb 40° eingedampft. Nach Aufnehmen des Rückstandes mit wenig K_2CO_3 wird mit H_3PO_4 überneutralisiert u. **I** sowie der bei der Atmung gebildete *Acetaldehyd (IV)* in einem Mikrokollisionskölbchen in eine gesätt. *Dimedonlsg. dest.* Das zuerst ausfallende **III** wird vom *Acetaldomedon (V)* durch fraktionierte Krystallisation oder nach der Methode von VOLKHOLZ getrennt werden, die auf der Löslichkeit des Anhydrids von **V** in Soda-*Lsg.* beruht. Dazu wird das Krystallgemisch in 40% ig. H_2SO_4 gel., nach 24 Stdn. mit W. gefällt u. der Nd. mit 2% ig. Sodalsg. gewaschen, die *Lsg.* mit HCl neutralisiert, was ausgefällt **III** fraktioniert bei 110° u. 130° sublimiert. Bis 140° erfolgt vollständige Umlagerung des Sublimats in gröbere Krystalle, die bei 187° schmelzen; von **III** (feine Nadeln) 139° ; F. des Anhydrids von **V** 173° . Die Landpflanzen werden mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ verrieben, mit W. verd., nach 24 Stdn. filtriert, das Filtrat angesäuert, das wie die Nährlsg. weiter aufgearbeitet wird. Mit Sulfat als Abfangmittel wurden aus den *Lsgg.* oder den zerkleinerten Pflanzen nach Ansäuern die *Aldehyde* mittels Makrodest. in **II** isoliert. — Zum Beweis der Zwischenproduktnatur des isolierten **I** wurde seine B. aus H_2O_2 u. bei der Dest. von in den Pflanzen enthaltenen *Aldehydenhydraten*, sowie infolge photolyt. Abspaltung aus organ. Säuren oder Zuckern geschlossen. Bei Zuckerzusatz (unter 1%) zur Nährlsg. traten allerdings größere Mengen **I** u. **IV** auf, die auf eine Verlangsamung des Assimilationsmechanismus zurückgeführt werden. Narcotica, die die Assimilation hemmen, aber nicht oder nur wenig die Atmung, wie **II** in $0,5\%$ ig. *Lsg.*, Phenylurethan, HCN, unterdrücken völlig die B. von **I**, auch in den Nährlsgg., denen Glucose (1—2%) sowie $0,1\%$ ig. *Lsgg.* der Ammonie von Oxal-, Äpfel- u. Weinsäure zugesetzt waren; **IV** wurde in allen Fällen gebildet. Dunkel- u. CO_2 -freie Belichtungsverss. ergaben ebenfalls nur **IV**, bei den letzteren trat **I**, aus der Atmungs- CO_2 stammend, in Spuren auf. SO_2 hemmt Assimilation u. Atmung völlig, so daß weder **I** noch **IV** erhalten wurden. — Die Menge des abgefangenen **I** betrug z. B. bei *Elodea canadensis* nach 8 Stdn. etwa 4—12 mg **III**. (Biochem. Ztschr. 168. 361—86. Wien, Pflanzenphysiol. Inst. Univ.) LOHMANN.

S. H. Collins und **R. Gill**, *Über die Veränderung des Gehalts an einzelnen Zuckern in der Erdbirne (Helianthus tuberosus) während des Wachstums*. Proben von Wurzeln u. Knollen der Pflanze wurden in monatlichen Abständen in lufttrockenem Zustand auf Gesamtzucker, freie reduzierende Zucker u. freie *Fructose* untersucht, um den Anteil der verschiedenen Zuckerarten am Wachstum der Pflanze in verschiedenen Stadien festzustellen. Der Gesamtzuckergehalt der Stengel steigt auf ein Maximum und fällt dann ab; der Gehalt an freier *Lävulose* variiert ähnlich. Die Differenz aus

„freien reduzierenden Zuckern“ u. „freier Lävulose“ wird als freie Dextrose bezeichnet deren Menge mit dem Alter der Pflanze zunächst zunimmt, dann plötzlich abfiel u. zuletzt ein Maximum erreicht. Diese Verhältnisse deuten darauf hin, daß Dextrose u. Lävulose durch Hydrolyse aus der ursprünglichen vorhandenen Saccharose entstehen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T 63—65.) R. SCHMIDT.

F. Cavara und **A. Chistoni**, *Die Bastardierung bei „Papaver somniferum“ in Beziehung zum Morphingehalt des Opiums*. Kreuzungsverss. zwischen weißem Mohn, dessen Opium einen Morphingehalt von 7,95—12,04% aufweist, u. schwarzem Mohn mit einem Morphingehalt von 12,4—14,0% im Opium, aber mit sehr kleinen Fruchtkapseln im Vergleich zum weißen Mohn, ergaben Bastarde mit Fruchtkapseln mittlerer Größe u. im Verein mit einer größeren Ausbeute ein Opium mit 9,4—17,6% Morphine, wobei die meisten dieser Werte über 14% also über dem Morphingehalt des Opiums aus schwarzem Mohn lagen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 113—18. Neapel, R. Istit. d'Incoraggiamento.) LEHMANN.

Michel-Durand, *Einfluß des Lichtes auf die Tanninbildung*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 586; C. 1924. I. 1807.) Die im Dunkeln erwachsenen Kastanien enthalten weniger Tannin als die am Licht gewachsenen. Der acetonlösliche Anteil der Tannine ist in allen Organen belichteter Pflanzen größer als in den unbelichteten; die Differenz zwischen den wasserlöslichen Tanninen in belichteten u. unbelichteten Pflanzen ist groß in unterird. Organen, gering in den Stengeln, negativ in den Blättern, so daß die gesamte Tanninmenge in den Blättern der Lichtexemplare geringer ist als in den Blättern der unbelichteten Pflanzen. — Ähnliche Ergebnisse wurden mit Eichen im Dunkeln u. am Licht erwachsenen gefunden, nur sind hier die Unterschiede durchweg geringer, was wohl dadurch erklärt wird, daß alle — un- u. belichteten Pflanzen — viel Tannin aus den Eicheln bekommen haben. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1171—73. 1925.) BIKERMAN.

R. Bieling, *Versuche über die Bildung von Vitamin durch Bakterien*. Versuche ergaben, daß Bakterien jedenfalls nicht generell imstande sind, bei ihrer Lebertätigkeit auf den einfachsten Nährböden B-Vitamin zu bilden u. daß sie für die Bildung von A- u. C-Vitamin an sich nicht in Betracht kommen. (Ztschr. f. Hyg. u. Infektkrankh. 104. 347—57.) BORINSKI.

R. Bieling, *Die Wirkung von Bakteriengiften auf unterernährte Tiere*. (Tuberkulin, Diphtherietoxin). Das an Skorbut erkrankte Meerschweinchen ist im allgemeinen 2—3-mal empfindlicher gegen Diphtherietoxin als n. ernährte Tiere. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 104. 518—25.) BORINSKI.

E. Aubel, *Über den Ursprung der Energie, die das Bacterium coli auf Kosten von Glucose entwickelt*. Wie in früheren Arbeiten gezeigt wurde, zersetzt B. coli Glucose einerseits zu Milchsäure u. andererseits zu Brenztraubensäure. Diese letztere Reaktion ist endotherm u. verläuft nach der Gleichung $C_6H_{12}O_6 = 2CH_3COCOOH + 2H_2$ mit 10400 cal.; diese Reaktion kann somit nicht als Energiequelle angesehen werden. Auch die Oxydation von Acetaldehyd, sowie auch dessen Reduktion, können nicht in Betracht kommen, obwohl die Reaktion an sich exotherm verläuft, aber die notwendige Spaltung des Acetaldehyds stark endotherm ist. Es blieb daher nur noch übrig, als Energiequelle die exotherm verlaufende B. von Milchsäure anzunehmen. Es werden hierbei 29000 cal. frei, daß, wenn Glucose sowohl in Milchsäure als auch in Brenztraubensäure gleichzeitig zersetzt wird, immer noch ein Energieüberschuß verbleibt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 571—73. 1925.) HAASE.

Alfred Gottschalk, *Biochemische Synthese von Fumarsäure aus Brenztraubensäure*. Die angestellten Versuche bezwecken einen Einblick in den Mechanismus der Synthese von Fumarsäure aus Kohlenhydraten. Es wurde so vorgegangen, daß Rhizopus nigricans auf einen anorgan. Nährboden überimpft wurde, dem als einzige C-Quelle Brenztraubensäure (als vermutliches Zwischenglied des Abbaues der Kohlenhydrate)

setzt wurde; nach längerem Wachstum wurde das Nährsubstrat auf die Stoffiselsprodd. untersucht. Als regelmäßige Prodd. konnten *Fumarsäure* (32% der ret. möglichen Menge) u. *Essigsäure* nachgewiesen u. Milchsäure wahrscheinlich nicht werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 136—43. Berlin, Univ.) HESSE.

Josef Schumacher, *Zur Gramschen Färbung. Hat das der Grampositivität zugehörige Lipoproteid der Hefezelle seinen Sitz in der Zellmembran oder im Protocytosol?* Es werden Beweise erbracht, daß das grampositive Verh. an den Zellinhalt geknüpft ist. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. **98**. 104—12. 1 Tafel. Leipzig, Univ.) SPIEGEL.

Ryuzo Iwatsuru, *Über die Vergärung der α -Ketoglutarinsäure durch das Bacterium rum.* Im Anschluß an die Verss. von NEUBERG u. WINDISCH (S. 1667) wird gezeigt, daß auch α -Ketoglutarinsäure durch die *Carboxylase* der Essigbakterien angeschlossen wird u. dabei wie durch Hefencarboxylase (NEUBERG u. RINGER, Biochem. Ztschr. **71**. 226; C. **1915**. II. 911) in Bernsteinsäure übergeführt wird. (Biochem. Ztschr. **168**. 34—35. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) HESSE.

A. Lebedew, *Zur Frage der Zymasebildung und der Co-Enzymwirkung.* Vgl. seine Arbeit auf eine frühere Arbeit (Bull. Soc. Chim. de France [4] **9**. 672; C. **1911**. II 631) aufmerksam, in der er zu gleichen Ergebnissen wie EULER u. NILSSON (S. 705) gekommen ist. Jedoch scheint es dem Vf. im Gegensatz zu EULER als wahrscheinlich, daß im Hefemacerationssaft sich eine *Prozymase* findet. Den Befund von EULER u. NILSSON, daß Kochsaft aus Oberhefe reich an Co-Enzym sei, hält Vf. für falsch. Er hat im Gegenteil gefunden, daß derartige Kochsäfte keinen Einfluß auf die Gärung von akt. Unterhefemacerationssaft hat. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 146. Berlin, Univ.) HESSE.

Alfred Gottschalk, *Aufbau und Vergärung von Glykogen durch maltasefreie Hefe.* Wird gezeigt, daß *Saccharomyces Ludwigii*, welcher auf glucosehaltigen Salzsgg. in dem Lüftungsverf. gezüchtet war, befähigt ist, Glykogen aus Glucose aufzunehmen, sowie das Polysaccharid zu vergären. Der Hefepilz war frei von *Maltase* u. *Maltosylase*. Die Maltose ist also hier kein Zwischenglied des fermentativen Glykogenabbaues. Da allein durch kombinierte Wrkg. der α - u. β -Amylase (vgl. KUHN, Ztschr. **126**; C. **1925**. II. 403 bzw. PRINGSHEIM, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **1925**. II. 1363) desselben Pilzes die glucosid. Bindungen im Glykogen geknüpft u. gel. werden, kann auf das Fehlen von Maltosebindungen in diesem Polysaccharid geschlossen werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 132—35. Berlin, Univ.) HESSE.

E₅. Tierphysiologie.

Franz Delhougne, *Untersuchungen über die Magensaftsekretion.* III. *Über den Einfluß elektrischer und mechanischer Reize auf die Magensaftsekretion.* (II. vgl. Ztschr. **131**.) (Dtsch. Arch. f. klin. Med. **150**. 170—76. Bonn, Med. Poliklin.) PFLÜCKE.

J. A. Collazo und Minko Dobreff, *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Insulin auf die äußere Sekretion der Verdauungsdrüsen.* III. Mitt. *Die Beeinflussung der äußeren Sekretion des Pankreas durch Insulin.* (II. vgl. DOBREFF, Biochem. Ztschr. **154**. 364; C. **1925**. I. 2703.) Im akuten Vers. mit temporärer Pankreasfistel zeigte man beim Hunde nach intravenöser Injektion von Insulinhydrochlorid (C. FUNK, Chem. Ztschr.) sofort innerhalb der ersten 10—30 Minuten deutliche Zunahme der Sekretion. (Biochem. Ztschr. **165**. 352—57. 1925. Berlin.) MÜLLER.

G. J. Cassidy, S. Dworkin und W. H. Finney, *Die Wirkung von Insulin auf das Verhalten des Blutzuckerspiegels.* (Vgl. Amer. Journ. Physiol. **73**. 413; C. **1925**. II. 1610.) 4—130 mg Insulin pro kg senken den n. Blutzuckerspiegel (200 mg% reduzierender Substanz, der 15% nicht vergären) bis nahe an 100 mg%, gelegentlich auch bis etwa 60 mg%, worauf Krämpfe auftreten. — Der Zucker steigt von selbst wieder an. — Zugleich

mit der Senkung sinkt die Körpertemp. ohne Schauern, selbst nicht in k. Umgebung. Bis 27,5° abgekühlt bleiben die Hühner noch bei Bewußtsein u. erholen sich sponta. Wenn die Körpertemp. sinkt, fällt auch der Blutzucker. (Amer. Journ. Physiol. 609—15. McGill-Univ., Montreal.)

MÜLLER

E. Gorter und F. Grendel, *Die Ausbreitung des Oxyhämoglobins*. Mit Hämoglobin aus Pferdeblut wurde gefunden, daß dasselbe an der Wasseroberf. drei Formen eines Films bildet. Der eine, die größte Ausbreitung (etwa 3200 A.E.) ist leichter einzudrücken u. entsteht durch Erhöhung der $[H^+]$ oder der Temp. andere ist halb so weit ausgebreitet, entsteht bei $pH = 5,5-8$ u. bei niedriger Temp. Der dritte ist sehr unbeständig, hält sich nur auf einer 0,001-n. HCl-Lsg. einigerm. auf neutralen Fl. kurze Zeit bei Beginn der Probe. Hinweis auf eine *nadelartige Gestalt der Hämoglobinemoleküle* mit dem Hämatinteil an den Enden u. dem wirkss. Fe in der Mitte, so daß alle Fe-Atome in einer Fläche stehen. Denkt man sich Fe-Atome frei an der Oberfläche eines Blutkörperchens, so folgt aus Berechnung, daß es sich um eine Doppellage von Hämoglobinemolekülen handeln muß. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1257—69. 1925.)

GROZSFELD

Yoshikane Kawashima, *Über die glykolytische Kraft des Blutes*. V. Mitt. *Adsorptionsversuche des Traubenzuckers durch Tierkohle und Erythrozyten, besonders mit Berücksichtigung von der Glykolyse*. (IV. vgl. Journ. Biochemistry 4. 429; C. 12. II. 1060.) Tierkohle adsorbiert bei Zimmertemp. von 9—13° den Traubenzucker prof. u. reichlich, bei 37° aber nicht mehr. Der Traubenzucker wird durch die katalyt. W. der Kohlenoberfläche nicht oxydiert. Die Erythrocyten nehmen bei Zimmertemp. eine geringe Menge Zucker aus dem Medium, bei 37° aber eine erhebliche Menge ziemlich schnell auf. Veraltete Erythrocyten weisen auch eine deutliche Aufnahmefähigkeit von Zucker auf, auch wenn sie nicht mehr glykolyt. wirken. Bei der Glykolyse nimmt muß diese Adsorbierbarkeit des Zuckers immer berücksichtigt werden, wenn dabei zum Versuchsmaterial nur ein Medium oder ein von gefällttem Eiweiß befreites Filtrat verwendet. (Journ. Biochemistry 5. 113—30. 1925. Tokio, Inst. f. Infektionskrankheiten.)

HÜCKE

T. Shirakawa, *Über die anatoxische Wirkung von Pferde-, Esel- und Mausserum im Tierversuch*. Maultierserum erwies sich sowohl in anaphylaktisierenden als auch in schockauslösender Wrkg. dem Pferdeserum überlegen. Eselserum bewirkte die stärkste schockauslösende Wrkg., während Maultierserum am besten präpariert. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 104. 436—40.)

BORINSKY

C. B. Morison und R. H. Shaw, *Wo liegt der Sättigungspunkt? Einige Fütterungsergebnisse mit Brot als Nahrungsbestandteil*. Fütterungsverss. an weißen Ratten, deren Nahrungs-calorien zu 75% aus Milchbrot bestanden, zeigten noch ein verhältnismäßig gutes Wachstum, aber nicht so gut wie bei Tieren mit 25 oder 50% Milchbrotnahrung. Die Gefahr einer Überernährung oder von Schäden durch einseitigen Brotverbrauch erscheint gering. (Baking Technology 5. 49—52.)

GROZSFELD

Arthur D. Holmes und Madeleine G. Pigott, *Vitamingehalt von Lebertran*. XVIII. *Einfluß auf den Vitamingehalt bei kaltegepressten Lebertranen*. Die Verss. zeigten, daß Rohtrane u. durch Ausfrieren u. Abpressen von Stearin befreite Tranen beim Tiervers. kaum einen Unterschied in der Wrkg. bzgl. Vitamin A gaben. (Ind. Engin. Chem. 18. 188—89. Boston [Mass.].)

GRIMM

Wilmer C. Powick, *Inaktivierung von Vitamin A durch ranziges Fett*. 16% ranzigen Specks in A-haltiger Nahrung verminderten das Wachstum von Ratten beträchtlich gegenüber derselben Nahrung mit frischem Speck. Es scheint, also daß Vitamin A durch die Peroxyde des ranzigen Specks zerstört wird. (Journ. Agricult. Res. 31. 1017—26. 1925. Washington, Bureau of Animal Industry.)

HELLE

E. B. Hart, H. Steenbock und S. Lepkovsky, *Wird der antirachitische Faktor des mit gemahlenem Korn gemischten Lebertrans durch Lagerung zerstört? Lebert*

mit gemahlenem Korn vermischte bei Zimmertemp. in verschlossenen Kannen aufbewahrt wird, behält seine antirachit. Wrkg. mindestens 6 Monate lang. (Journ. Biol. Chem. **65**. 571—78. 1925. Madison, Wisconsin Univ.) HIRSCH-KAUFFMANN.

Eiichiro Kodama, Über den Gehalt von fettartigen Substanzen in mit Vitamin B ernährten Hühnern. Bei den Verss. nahm im allgemeinen die Lecithinmenge in den Organen ab, während das Cholesterin u. die Gesamtfettsäuren zunahmen. (Journ. Biochemistry **5**. 185—91. 1925.) HÜCKEL.

L. A. Maynard, S. A. Goldberg und R. C. Miller, Der Einfluß des Sonnenlichtes auf die Knochenentwicklung beim Schwein. Die günstige Wrkg. des Sonnenlichtes auf die Knochenentw. wird bei Schweinen chem. u. histolog. nachgewiesen. (Journ. Biol. Chem. **65**. 643—55. 1925. Ithaca, Cornell Univ.) HIRSCH-K.

Margaret B. Mac Donald, Vorschlag zur Beibehaltung des Ausdrucks „Bios“. Eine Änderung der Bezeichnung „Bios“ in Vitamin D wird abgelehnt. (Science **63**. 1925. Tennessee, Univ.) HIRSCH-KAUFFMANN.

H. G. Miller, W. W. Yates, R. C. Jones und P. M. Brandt, Mineralstoffwechselversuche bei tragenden Kühen. Mineralstoffgleichgewicht während der Milchperiode. (Vgl. Amer. Journ. Physiol. **72**. 647; C. **1925**. II. 943.) Wiederholung der Verss. an den gleichen Tieren wie 1924 u. 1925. Bestätigung der früheren Befunde: Die P-Bilanz positiv, die Ca wurde positiv. — Bei einem Futter aus Klee, „Silage“ u. Getreide wurde der Körper nicht demineralisiert. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 696—703. Corvallis, Oregon Univ. Stat.) MÜLLER.

Emil J. Baumann und O. M. Holly, Cholesterin- und Phosphatid-Stoffwechsel bei der Schwangerschaft. Anders als beim Menschen nehmen das Blutcholesterin u. die Phosphatide beim Kaninchen auf 50% der Norm in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft ab. Beim Hunde sieht man kaum Veränderungen. — Bei Kaninchen steigen beim Menschen Cholesterin u. Phosphatide des Blutes, wenn Schilddrüseninsuffizienz vorliegt. Diese Zunahme wird bei Schwangerschaft überlagert durch die stärkere Fütterung. — Kaninchenembryonen haben höhere Werte als die Muttertiere, entsprechend den n. Zahlen, u. zeigen Steigerung bei Schilddrüseninsuffizienz. — In der Leber findet sich während der Schwangerschaft beim Kaninchen weniger Cholesterin u. wechselnde Mengen von Phosphatiden. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 618—32. New York.) MÜLLER.

Emil J. Baumann und O. M. Holly, Cholesterin- und Phosphatidverteilung in verschiedenen Geweben schwangerer und nicht tragender Kaninchen. Der Gehalt des Blutes an Cholesterin u. Phosphatiden im Blut nimmt in der Schwangerschaft ab, da er in den Brustdrüsen, auch in Uterus, Ovarien u. anderen Organen zunimmt. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 633—39. New York.) MÜLLER.

Ko Yamada, Studie über die Nierenfunktion während der Schwangerschaft. Verss. über die renale Ausscheidung der verschiedensten Stoffe durch die Nieren bei trächtigen und nichtträchtigen Kaninchen, die ergeben, daß die Nierenschädigung, welche in der Schwangerschaft eintreten kann, auf einer Ammoniaküberladung des Blutes u. der Niere beruht. (Journ. Biochemistry **5**. 245—85. 1925. Tokio, Biochem. Laboratorium.) HÜCKEL.

Margarete Zuelzer und Ernst Philipp, Beeinflussung des kolloidalen Zustandes der Zellinhalte von Protozoen durch Radiumstrahlen. Die Beschleunigung der Plasmamembran in den Amöben, die bei Radiumbestrahlung eintritt, beruht auf einer Veränderung des kolloidalen Zustandes der Zelle unter dem Einfluß der Radiumstrahlen. (Zellphysiologie **56**. 589—622. Berlin, Bakteriolog. Abteilung des Reichsgesundheitsamtes.) HÜCKEL.

Josef Zeltner, *Über die sogenannte „oligodynamische“ Wirkung von Schwermetallen*. Kurze Beschreibung der bisherigen Verss. zur Ermittlung der keimtötenden Wrkg. kleinster Metallmengen. (Metallbörse **16**. 201—02.) BEHRLE

E. C. White, *Verwendung von organischen Quecksilbersalzen, vor allem von Mercurochrom*. Mercurochrom erwies sich als brauchbar gegen Gonorrhoe, intravenöse Kindbettfieber, perniziöse Anämie u. Pneumonie. (Amer. Journ. Publ. Health **153**—55. Baltimore [Md.].) GRIMM

E. Le Blanc, *Über die Wirkung des Sanocrysin*. Die nach Sanocrysin-Injektion beobachteten Symptome, wie Fieber, Conjunctivitis, Iritis, Bronchitis, Erbrechen, Durchfälle u. andere unerwünschte Nebenerscheinungen führt Vf. auf eine Aufgiftung zurück. Eine nachweisbare spezif. Wrkg. des Sanocrysin auf die Tuberkulose wurde vermisst. (Münch. med. Wchschr. **73**. 313—15. Hamburg, Univ.) FRANKE

Antonio Celata, *Über einige Tatsachen, welche die biologische Wirkung des Chinins beeinflussen*. (Vgl. S. 720.) Chinin beeinflusst die Lebensfunktionen des Protoplasmas außerdem wohl rein mechan. die Verdauungsvorgänge; vor allem wirksam ist es bei gewissen Arten von Dispepsie. (Boll. Chim. Farm. **65**. 99—100.) GRIMM

L. Schwarz und **A. Otto**, *Ist Cadmium ein gewerbliches Gift?* Nach der vorliegenden Literatur u. den Verss. der Vff. können Cd-Verbb. auch bei chron. Aufnahme in verhältnismäßig geringen Dosen giftig wirken. Cd kommt, wenn auch selbst als gewerbliches Gift in Frage. Schutzmaßnahmen, die erforderlich erscheinen, stehen in der Verhinderung der Aufnahme von Cd als Dampf oder Staub. Die Symptome der Cd-Vergiftung werden beschrieben. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. **1364**—69.) BORINSKY

Franz Schütz und **Hugo Bernhardt**, *Die Verteilung des Bleies im Körper bei chronischer Bleivergiftung*. An Kaninchen angestellte Verss. ergaben, daß bei jedem Tier eine Speicherung von Pb in irgend einem Organ auftritt. Diese Speicherung erwies sich für jedes Tier u. für jedes Organ verschieden. In der Regel wurde in der Gallenblase u. Gehirn verhältnismäßig viel, dagegen in Lunge u. Leber auffallend wenig Pb gefunden. Die übrigen Organe verhielten sich wechselnd. Bei chron. Vergiftungen fand sich in Röhrenknochen niemals Pb, dagegen bei akuten Vergiftungen in nicht unbeträchtlichen Mengen u. im Plattenknochen sehr viel. Die Ausscheidung des Pb erfolgt in der Hauptsache mit der Galle u. durch die Wand des Dickdarms. Die Nieren sind bei jeder Vergiftungsform weniger beteiligt. Nach 2 Monaten nach der letzten Pb-Gabe waren Pb-Depots im Körper nachweisbar. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. **104**. 441—64.) BORINSKY

Albert Farine, *Die Bedeutung des Ionenstudiums*. Vf. zeigt an Beispielen von Ag-, Hg-Salzlsgg. u. einigen Basen die Abhängigkeit der tox. Wrkg. von der elekt. lyt. Dissoziation u. weist auf die Wichtigkeit der Kenntnis der Ionentheorie für das Verständnis physiologischer Erscheinungen hin. (Technik u. Ind. **1926**. 1 bis 31.) ASCHE

F. Pharmazie. Desinfektion.

Max Speter, *Über die Brennbarkeit der „nicht entzündbaren und nicht brennbaren organischen Lösungs- und Extraktionsmittel*. Gemische von Äthan- u. Äthylendichlorid mit brennbaren Fll., z. B. A., brennen unter Entw. von HCl-Dämpfen. Vf. empfiehlt den Zusatz von 0,75—0,8 Vol.-% eines organ. Cl-Deriv. zu unversteuerten A. für kosmet. Zwecke als Erkennungsmittel. (Ztschr. f. medicin. Chemie **3**. 49—50. 1925. Wehlen, Sächs. Schweiz.) JUNG

Kurt Mentzel, *Über die Aufbewahrung leicht zersetzlicher medizinischer chemischer Präparate*. Vf. beschreibt die „Isoampulle“ nach HEUBLEIN (Pharm. Zentralhalle **66**. 483; C. **1925**. II. 1469) u. ihre Verwendung. (Chem.-Ztg. **50**. 193.) JUNG

Ernst Iselin, *Emulsionen und ihre Herstellung. Eine kolloidchemische Studie.* untersucht die Bedingungen, unter denen Oleum Olivarum, Oleum Jecoris u. um Ricini mit W. unter Zusatz von Emulgatoren, wie NaOH, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂, Glycerin, Gelatine, Gummi arabicum, Tragant oder Sirup. simplex stabile, möglichst hochprozentige Emulsionen zu bilden vermögen. (Pharm. Acta Helvetiae 1. 45—55. Berl. Pharmakolog. Univ.-Inst.) ROJAHN.

J. J. Blackie, *Notiz über die Belladonnawurzel.* Vf. stellt den Alkaloidgehalt der Wurzeln von 1- bis 4-jährigen Tollkirschenpflanzen fest u. findet 0,72, 0,65, 0,66, 0,67, 0,68, 0,69, 0,70, 0,71, 0,72, 0,73, 0,74, 0,75, 0,76, 0,77, 0,78, 0,79, 0,80, 0,81, 0,82, 0,83, 0,84, 0,85, 0,86, 0,87, 0,88, 0,89, 0,90, 0,91, 0,92, 0,93, 0,94, 0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99, 1,00. Da die Wurzeln der jüngeren Pflanze gute Größe besitzen, sind sie zur Extraktbereitung am brauchbarsten. (Pharmaceutical Journ. 116. 231.) ROJAHN.

P. Balduzzi, *Über die Herstellung alkoholischer Tinkturen.* Bei der Herstellung von Tinkturen durch Perkolation mittels Alkohol bestimmter Konz. ist es von Vorteil, zunächst mit stärkeren Konzz. zu arbeiten u. das Lösungsm. später abzuschwächen, da die Ausbeuten besser u. die Verluste an A. geringer werden. Vf. hat daher eine Verdünnungstabelle für Konzz. zwischen 30 u. 90% A. (Boll. Chim. Farm. 65. 37—38. Turin.) GRIMME.

—, *Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften.* Borocain (British Drug Houses Ltd.), Cocainborat, das 10-mal wirksamer als Cocain hydrochloricum sein soll. — *Calcimintpulver* (Münchener pharm. Werke, München), verbessertes Calciminttablettenpräparat, gut l., ohne Geschmack u. Geruch, enthält neben milchphosphorsäuren Kalksalzen Eigelb u. Lezithinalbumin. Zur Kalktherapie. — *Stutus-Gurgeltabletten* (Dr. H. SANDER u. Co., A.-G., Emden), laut Angabe Calciumhydrochlorit. — *Ergotol* (Extract. Secalis cornuti liquid. S. u. D.) (SHARP u. DOHME, London), enthält die W. l. Bestandteile des Mutterkorns angeblich in größerer Menge als andere bzgl. Präparate. — *Fellap* (Fellap-Gesellschaft, München, Lustenstraße 40), enthält angeblich Yatren, Salicyl, Menthol, Crocin u. Seife. Als Abtrocknungsmittel für Gallensteine. — *Finarthrin* (Dr. KARL THOMÄ, Winnenden [Württembg.]), Phenylcinchoninsäure. — *Glutinkupfer*, 1%ig. Lsg. Intravenös 20 ccm täglich bei Syphilis. — *Masern-Tierenserum* (Farbwerke vorm. MEISTER LUCIUS u. BRÜNING, Höchst a. M.), von Schafen gewonnen, als Masernschutz des tuberkulösen Menschen. — *Otreon* (LUITPOLD-Werk, München), Tabletten mit Mg- u. Bi-Carbonat, enthält Papaverin. hydrochlor. u. schaumzeugende Basis. Zur Neutralisation des sauren Magensaftes. — *Perkuramin* („Essef“ chem. Industrie- u. Handels-A.-G., Linz a. D.), organ. Chlorpräparat, das bei Berührung mit organ. Substanzen Cl in Form von HOCl abgibt, die durch Abspaltung von O₂ in statu nascendi desinfizierend wirkt. (Chloramin oder Aktivin? Berichterstatte). — *Physioin* (Chemosan A.-G., Wien I, Helfferstorferstr. 11/13), feinstverteiltes raffiniertes Paraffinöl in sirupartiger Grundsubstanz. Physiolog. Laxativum (Gleitmittel). — *Pharmacao* (Chem. Werke Marienfelde, Berlin-Marienfelde), Kombination von Calcium mit reinem Kakao. Sedativum u. Schlafmittel. — *Stryptopyrin* (Dr. KARL THOMÄ, Winnenden [Württbg.]), Aminoantipyrin u. Cotarnin. Als blutstillendes Mittel. — *Urgon*, Antihydrotikum, besteht im wesentlichen aus 5 Teilen A., 30 Teilen Maisstärke, 10 Teilen ZnO, 1,7 Teil Salicylsäuremethylester u. 0,5 Teil Formaldehyd. Gegen Schweißfuß. (Pharm. Zentralhalle 67. 167—68.) ROJ.

F. Zernik, *Die neuen Arzneimittel und pharmazeutischen Spezialitäten des Jahres 1915.* *Resorcin-Percutol*, 1 Teil Resorcin u. 2 Teile Salicylsäureester. Bei übermäßiger Schweißabsonderung. *Thermulsion* (Embrocation, Berlin-Wilmersdorf), beschrieben als „Gallerte, die in statu nascendi Terpentinöl zu binden vermag, und nunmehr jede Reizwrg. auf die Nieren verliert“. Bei Gicht, Rheumatismus, Neuralgien. — *Kohlegranulat Merck*, an Stelle der Carbo medicinalis pulv. hat gleiche Adsorptionskraft. Als gastrointestinales Antiseptikum. — *Intestinal* (Dr. G. HEN-

NING, Berlin), dragierte Tabletten aus Pankreatin, Sekretin, Tierkohle u. gallensauren Salzen, zur Beförderung der Darmverdauung. — *Imbak Nr. 6* (Deutsche Imbak G. m. b. H., Frankfurt a. M.), enthält Yoghurtbakterien an „schwer verdauliche Stoffe“ derart adsorbiert, daß sie ihre milchsäureabspaltende Wrkg. erst im Darm entfalten können. — *Aluphen*, Tabletten aus Knoblauchpulver u. Salol. Darminficiens. — *Brotella* (WILH. HILLER, Chem. Fabrik, Hannover), laut Deklaration „aus teils gebackenem, teils gekeimtem Vollweizen u. Vollkorn, aus schleimbildenden Samenfrüchten, Kolloiden (Membranschleim), aus säurebildenden Süßfrüchten, Obst, Mineralstoffe u. Vitamin“. Abführmittel. — *Boeson-Brausesalz* (BOESON G. m. b. H., Hamburg), Brausepulver ohne Zucker aus 47,6 Teilen Weinsäure 52,4 Teilen Natriumdicarbonat. Mildes Abführmittel. — *Cholecystetten* (H. WELT Kassel), sollen je Cholecystin 0,5 u. Papaverinhydrochlorid 0,02 g enthalten. Cholecystin wird als „an Alkali gebundener Salicylsäurephenylester“ deklariert. — *Rensan* (Biologische Werke, Brackwede), als Bestandteile angegeben „Kalium Kieselsäure u. Arbutin“. Gegen Nierenleiden. — *Cystochrom* (Chemosan A. G. Wien), intravenös anzuwendende Lsg. von Indigokarmin-Hexamethylentetramin. Zur Prüfung der Nierenfunktionen. — *Alloformin*, Salz des Hexamethylentetramins mit Phosphorsäure. — *Potencin Wittkop* (WITTKOP und Co., Münster), Ampullen mit je 0,015 des bisher unbekannten milchsauren Yohimbins. — *Uterosan* (WITTKOP u. Co., Münster), Ampullen mit je 5 mg Yohimbinlactat, 0,2 g Ovarienextrakt 2 mg Codeinphosphat. Gegen klimakterische u. amenorrhöische Zustände. — *Melysin compos.* enthält nur Yohimbin u. Codein. — *Tetraphorin* (Dr. FREUND u. RILICH, Adlershof), polyhormonales Organpräparat aus Uterus, Placenta, Hypophyse u. Nebenniere, in Ampullen. — *Triazolon* (Dr. GILLIG u. WEGENER, Mainz), Tabletten aus Dimethylphenylpyrazolon salicyl., Lactylphenetidin u. Papaverinhydrochlor. — *Owovop* (Tetewop A.-G., Berlin), Tabletten aus besonders schonend trockneter Ovarialsubstanz; im Ausland führt das Präparat den Namen: *Ovarin*. — *Caedoverm* (Efeke-Neopharm, Hannover), Tabletten mit angeblich: 0,05 g Chininsulfosäureester (?), 0,01 g Santonin u. 0,5 g Flores Tanacetii u. Zäpfel mit je 0,1 g Sulfonaphthalin (?). Wurmmittel. (Pharm. Ztg. 71. 314—16.) ROJAHN.


G. Malcolm Dyson, *Moderne Untersuchungen in der Chemotherapie*. I.—V. Mit Übersicht mit beigegebenen Strukturformeln. (Pharmaceutical Journ. 116. 3—4. 32—101—03. 170—71. 261—62.) BEHRLE.

N. Schoorl, *Narkoseäther*. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Ä. für Narkose unter Bedingungen aufzubewahren, die der B. von Peroxyd u. Aldehyden vorbeugen, vor allem also unter Ausschluß von Luft u. Licht. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 70. I. 964. Utrecht, Univ.) SPIEGEL.

C. A. Rojahn und F. Struffmann, *Igarsan*. Hersteller: HELLMUTH SCHMITZ, Chem. pharmaz. Präpar. Berlin W. 35 Magdeburgerplatz. Als Rheumatismussmittel angeboten. 1. Zum äußerlichen Gebrauch: 9—10%ig. Lsg. von Salicylsäure in 80—85%ig. 2. Zum innerlichen Gebrauch: aromatisierte etwa 1,3%ig. Salicylsäurelsg. in ve. A. (Apoth.-Ztg. 41. 273. Braunschweig, Technische Hochschule.) ROJAHN.

C. Mannich und Sze Yih, *Untersuchung des chinesischen Geheimmittels „Po-Lin-Gie“*. Hersteller: KIU-FU Company, Shanghai. Die Tabletten enthalten etwa 3% Phenolphthalein, 5% Calciumhypophosphit, 25% Stärke, 50% Milchsucker ferner ein Silicat als anorgan. Füllmittel. Wird als Universalmittel angepriesen. (Apoth.-Ztg. 41. 318—19. Frankfurt a. M., Universität.) ROJAHN.

Marcellus Rix, *Tricarbin*. *Tricarbin*, fester Kohlensäureester des Glycerins $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_9$ (I), fast unl. in k. W., l. Eg., F. 140—150° nach Sintern ab 128°, kann als medizin. Hauptbestandteil in Pulver Verwendung finden, (Ztschr. f. mediz. Chem. 4. 4—5.) JUNG.



F. Falk, *Über Chloramin-Heyden*. Vf. berichtet über die vielseitige Anwendungsmöglichkeit des *Chloramins* in der Medizin, Chirurgie, zur Desodorierung u. Desinfektion. (Der prakt. Desinfektor **17**. 1—8. München, Chirurg. Heil-Anstalt Johannum.) ROJAHN.

C. A. Rojahn und **F. Struffmann**, *Desinfex*. Darsteller: Merz-Werke, Frankfurt a. M.-Rödelheim. Enthält etwa: 12,5% Glycerin, 1% Kaliseife, K_2CO_3 , 0,3% eines Chlorkresols (F. 72—73°) in 58 gewichts-%ig. oder 65,5 volum-%ig. A. (Apoth.-Ztg. **41**. 298—99. Braunschweig, Techn. Hochschule.) ROJAHN.

Alexander Winter & Söhne, Pistyan, und **Paul Meyersberg**, Preßburg, *Konservern von Heilschlamm*. Der nasse Schlamm wird mit neutralen hygroskop. Salzen, z. B. $CaCl_2$, $Ca(NO_3)_2$, Na_2SO_4 , $NaCl$, $MgCl_2$ oder mit Glycerin vermischt. Er läßt sich dann versenden, ohne seine kolloide Beschaffenheit u. seinen Radiumgehalt zu verlieren. (Oe. P. **101 037** vom 8/1. 1924, ausg. 25/9. 1925.) KÜHLING.

H. K. Mulford Co., übert. von: **John Reichel**, Philadelphia und **Frank McCoy Huntoon**, Swarthmore, V. St. A., *Gewinnung von Antikörpern*. Durch Injektion von Bakterien gewonnenes Antikörper enthaltendes tier. Serum wird mit Emulsionen anderer Bakterien versetzt, die Mischung bei mäßig erhöhter Temp. bebrütet u. zentrifugiert. Das hierbei erhaltene Sediment wird bis zur Freiheit von tier. Serum mit Wasser gewaschen, in einer 0,25% $NaHCO_3$ enthaltenden Salzlg. verteilt, $\frac{1}{2}$ —1 Stde. bei 55° erhitzt, wiederholt zentrifugiert u. schließlich durch eine Filterkerze gefiltert. Das Filtrat ist nahezu frei von Eiweißstoffen. (E. P. **210 762** vom 23/1. 1924, Ausz. Off. 26/3. 1924. A. Prior. 1/2. 1923. Austr. P. **16 552** vom 22/2. 1924, ausg. 7. 1924.) KÜHLING.

Albert Furrer und **Paul Eggimann**, Schweiz, *Entwesungsmittel*, bestehend aus einer Mischung von gepulverter Holzkohle, Schwefel u. CaO (zum Trockenhalten). Im Gebrauch wird die Mischung entzündet. Sie wirkt durch Entw. von SO_2 . (F. P. **204** vom 19/1. 1923, ausg. 27/2. 1924.) KÜHLING.

Auguste Magistry, Frankreich, *Ungeziefervertilgungs- und Desinfektionsmittel*, bestehend aus $Ca(OH)_2$, besonders dem bei der Zersetzung von CaC_2 hinterbleibenden. (F. P. **598 108** vom 23/4. 1925, ausg. 7/12. 1925.) KÜHLING.

Hermann Suida, Mödling b. Wien, *Desinfektionsmittel*. Die rohen, mit chem. Mitteln noch nicht behandelten, aber vom Pech befreiten schweren Buchenholzteeröle werden vor ihrer Vermischung mit Seife einer aufeinanderfolgenden Reinigung mit wässrigen Alkalien u. mit verd. H_2SO_4 bei gewöhnlicher Temp. unterworfen. (Oe. P. **297** vom 29/11. 1922, ausg. 11/1. 1926.) KAUSCH.

Bertram K. Hollister, Chicago, *Zur Aufbewahrung von chirurgischem Nähezug geeignete Flüssigkeit*. Die Fl. besteht aus einer Mischung von im wesentlichen oberhalb 184° sd. Kerosen, welches mit etwas in $CHCl_3$ o. dgl. gel. $HgCl_2$ versetzt ist u. als antisept. Öle, wie Eukalyptusöl u. dgl. enthalten kann. (A. P. **1 495 180** vom 1. 1919, ausg. 27/5. 1924.) KÜHLING.

G. Analyse. Laboratorium.

F. Lehmann, *Wirtschaftliche Tiegeldreiecke*. 3 Eisendrähte biegt man zu einem Dreieck von 65° u. schiebt die Enden mit einiger Spannung in 3 Porzellanröhrchen. (Chem.-Ztg. **50**. 193—94. Berlin.) JUNG.

C. M. Bible, *Pipetten für Kaliwerke*. Um die Umrechnung bei K_2O -Best. nach der K_2PtCl_6 -Methode zu erleichtern, schlägt Vf. vor, Pipetten mit einem Fassungsvermögen von 19,38 cm oder einem Vielfachen derselben zu benutzen. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 143. Nastsville [Tenn.].) GRIMME.

R. Zsigmondy, *Über feinporige Filter und neue Ultrafilter*. Die Anwend. der Membran- u. Ultrafilter (mit Literaturübersicht). Es gelang Vf. (Unt. gemeinsam mit **Kratz, Carius, Kuhmichel u. Behre**), Filter zum Filtrieren Lsgg. in organ. Lösungsm. herzustellen. Diese „Zellfilter“ sind auch gegen Alk. u. starke Säuren widerstandsfähiger. Sie können in verschiedenen Porenweiten gestellt werden. Ein sehr dichtes Filter hielt aus einer Lsg. von *Nitrocellulose* in A. den gel. Anteil weitgehend zurück, ein Beweis für die kolloide Natur derartigen Systeme. Auch für *Osmometer* lassen sich Membranen u. Säckchen herstellen, die Dialyse. Best. des osmot. Drucks kolloider Lsgg. in organ. Solventien ermöglichen, was für Unt. von *Kautschuk* lsgg. von Bedeutung ist. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 398—Göttingen, Univ.) JUN

H. Bechhold, *Zur Geschichte der Kolloidfilter*. Bemerkung zu einem Prospekt der Firma ZAHRADNIK, Prag. Die Herst. von Kolloidfiltern auf porösen Porzellan-erdeggeräten stammt zuerst vom Vf. Die Modifikation von ZAKARIAS ist keine Vereinfachung. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 402.) JUN

R. M. Hixon, *Laboratoriumsmischmaschine für feste Körper*. Eine behelfsmäßige Einrichtung. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 138. Ames, Ja., Iowa State Coll.) WILK

Aubrey C. Grubb, *Die Dewarsche Flasche in den Laboratoriumsübungen für physikalische Chemie*. Bei der Best. der Neutralisationswärme von Säuren u. Basen in v. Lsgg. ist mit großem Vorteil die Dewarsche Flasche als Calorimeter angewandt worden. In der Mitte der Flasche wird eine Glasröhre befestigt, die am Ende zu einer dünnwandigen Kugel ausgeblasen ist u. die zweite Fl. enthält. Nach dem Temperaturausgleich zwischen den beiden Fl. wird dann die Kugel durch leichten Schlag zertrümmert u. die entwickelte Wärme ohne jede Schwierigkeit gemessen. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 163. Saskatchewan, Saskatoon, Kanada.) WILK

J. W. Mc Bain und **A. M. Bakr**, *Eine neue Sorptionswaage*. (Vgl. BAKR MC BAIN, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2718; C. **1925**. I. 1964.) Es wird ein Apparat der im wesentlichen aus einer Federwaage mit Quarzspiralen besteht, zur Messung der Sorption von Gasen u. Dämpfen an festen Oberflächen beschrieben, der innerhalb weiterer Bedingungen betreffs Druck u. Temp. anwendbar ist. Kalibrierung der Meßmethode sind im Original eingehend beschrieben. Die Sorptionswaage ist zur Best. der Sorption von Dämpfen u. Gasen an Holzkohle, an krystallinen Oberflächen, von Feuchtigkeit an Baustoffen verschiedener Art, von verschiedenen flüchtigen Fl. an Schießbaumwolle angewandt worden. Sie wird sich auch bei Hydratationsphänomenen u. auch zu Mol.-Gew.-Bestst. in kleinen Mengen Lsg. benutzen lassen. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 690—95. Bristol [Engl.], Univ.) JOSEPH

F. A. Mason, *Mitteilung über die Molekulargewichtsbestimmung nach Rast's Campbells Methode*. Nach einer Mitteilung CALLANS (Chemistry and Ind. **43**) eignet sich die elektr. geheizte Schmelzpunktsapp. vorzüglich (MASON, Chemistry and Ind. **44**. 5. C. **1925**. II. 1073) zur Mol.-Gew.-Best. nach RAST (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 10. C. **1922**. II. 1069). (Chemistry and Ind. **45**. 199.) JUN

George H. Needham, *Eine einfache Methode zur Demonstration kolloider Teilchen*. Vf. gibt Anleitung, durch Anbringung einer schwarzen Blende jedes Mikroskop für Unt. von Kolloiden brauchbar zu machen. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **15**. 45.) R

Pierre Fourment und **Henry Roques**, *Das Diphenylendiaminacetat (Benzidinacetat) zum mikrochemischen Nachweis und zur Färbung pflanzlicher Gewebe, die Färbetansane enthalten*. Vff. lösen durch Aufkochen 1 g Benzidin in 10 cm Eg. u. 30 cm W. u. verdünnen auf 50 cm. Dieses Reagens färbt die in mikroskopischen pflanzlichen Schnitten oder Pflanzenpulvern enthaltenen Lignin-, Skelett-, Cutikularsubstanzen, Korkelemente, Pektinstoffe, Gummi u. Pflanzenschleime gelb bis orange. Einwirkungszeitdauer 5—10 Min. oder länger. Färbungen sind l. in A., unl. in W. u. Glycerin. Die färbten Präparate sind ohne Verzerrung lange haltbar. Die Rk. wird auf eine chem.

b. der Pentosane mit Benzidin zurückgeführt. Cellulosebestandteile können durch Färbung mit Methylenblaulsg. (1:1000), Benzoazurin (gesätt. Lsg.), Hämatoxylin abgesondert hervorgehoben werden. (Bull. soc. pharm. Bordeaux **64**. 22—27.) ROJ

Hugo Maria Kellner, *Photographische Photometrie mit intermittierender Belichtung vom Standpunkt eines neuen Schwärzungsgesetzes*. In der Literatur ist die Ansicht darüber geteilt, ob intermittierende Belichtung gegenüber der kontinuierlichen Abweichung der Wrkg. zeigt oder nicht. Vf. studiert die Abhängigkeit des Schwarzwärzungs Exponenten von der wirkenden Lichtmenge; für p wird gefunden:

$$p = a + be^{-c[\log(it)]^2}$$

bei a , b u. c Konstanten sind. Für die Schwärzung folgt eine Gleichung:

$$S = me \frac{g}{\sqrt[3]{it^p}}$$

bei m , g u. p Konstanten. Die mit dieser Formel berechneten Werte stimmen mit den experimentell gefundenen vollkommen überein. Über die Solarisation gibt die Gleichung keine Auskunft. Für die prakt. photograph. Photometrie ergibt sich, daß 5 Bestst. gemacht werden müssen, weil 5 Variable vorhanden sind. Bei intermittierender Belichtung müssen die Tourenzahl des rotierenden Sektors, der Öffnungswinkel u. die Variabilität des Exponenten p in Betracht gezogen werden. Das neue Schwärzungsgesetz erfüllt den Zweck, die Photographie als exaktes photometr. Meßprinzip einzuführen. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **24**. 62.)

KELLERMANN.

Karl Schaum und **Hugo Maria Kellner**, *Photometrische und spektralphotometrische Studien*. V. *Ein Röhrenphotometer für die Spektralphotometrie im Ultraviolett*. Vgl. Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **23**. 73; C. **1925**. 1477.) Vff. rüsten das von SCHAUM u. HENS (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **23**. 7; C. **1924**. II. 789) angegebene Photometer mit Quarzglas aus. Als Lichtquelle dient ein Al-Funke unter W. Zur Prüfung der Genauigkeit der Methode wurde die Absorption von KNO_3 -Lsg. mit älteren Messungen verglichen, bei sich gute Übereinstimmung ergibt. Gemessen wurde ferner die Absorption von Rohrzucker, die Werte sind in einer Tabelle zusammengestellt. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **24**. 85—90.)

KELLERMANN.

Chr. Winther und **E. H. Mynster**, *Ein neues Ultraviolettfilter*. Vff. verwenden eine Lsg. von $\text{Cu}(\text{OH})_2$ in der 6-fachen Menge NH_3 , die zur vollständigen Lsg. notwendig ist; sie gehen aus von 2,6%ig. CuSO_4 -Lsg. Das zweite Filter besteht aus einer 0,046%ig. Lsg. von Diamantfuchsin in W. Beide Filter werden in 1 cm Schichtdicke angewendet. Die maximale Transparenz liegt bei $375 \mu\mu$, die Durchlässigkeit erstreckt sich von etwa 405 bis $320 \mu\mu$. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **24**. 96.)

KELLERMANN.

Hugo Freund, *Ein neues Colorimeter*. Das Colorimeter (ERNST LEITZ, Wetzlar) unterscheidet sich im wesentlichen an die Bauart von DUBOSCQ an u. zeichnet sich durch die einfache Ausrüstung aus. (Chem.-Ztg. **50**. 194.)

JUNG.

Jean A. Athanasiu, *Über die Anwendung von Wasser-Alkoholgemischen in der photometrischen Untersuchung der Fällungsreaktionen*. Um bei der potentiometrischen Fällungsanalyse die vielen Fehler u. Unzuträglichkeiten zu vermeiden, die durch Absorption, unscharfes Einstellen des Potentials, allmähliches Wandern des Potentials usw. entstehen, hat Vf. Verss. angestellt, um die Brauchbarkeit von W.-A.-Gemischen zu prüfen. Zu den Verss. dienten 30% A. u. Lsgg. von Ce-, Ba-, Hg- u. -Salzen, die teils mit Kaliumferrocyanid, teils mit Kaliumchromat titriert wurden. Aus den Tafeln ist zu ersehen, daß durch den Zusatz des A.-W.-Gemisches eine erhebliche Verschärfung des Umschlagspotentials erzielt wurde. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 519—21.)

HAASE.

J. C. M. Sauerbier, *Die Bereitung des Katalysators zur Elementaranalyse Heslinga*. Es empfiehlt sich unter Vermeidung des MnCO_3 wie folgt zu verfahren. Durch Zusammengeben äquivalenter Mengen MnSO_4 u. KMnO_4 fällt man MnO_2 .
 $2\text{KMnO}_4 + 3\text{MnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{K}_2\text{SO}_4 + 5\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$, dekantiert h. mit trockenet u. erhitzt $\frac{1}{2}$ Stde. auf 300° . Die Verbrennung erfolgt am besten mit einem Gemisch von O_2 u. Luft. Man kann dann 100 mg Substanz mit sehr wenig Katalys. verwenden. (Chem. Weekblad 23. 168—69. Delft, Techn. Hochschule.) GROSZFE

P. E. Verkade und J. Coops jr., *Der Vorschlag, eine zweite thermochemische Eichsubstanz aufzustellen*. (Antwort an W. SWIETOSLAWSKI.) Die Vff. wenden gegen die Darst. von SWIETOSLAWSKI (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 84; C. R. I. 2713); sie halten ihre histor. Darst. der Entw. der Frage voll aufrecht u. we. SWIETOSLAWSKI Inkonsistenz nach, da er selbst vorgeschlagen hat, die Werte Benzoesäure mit Verss. mit anderen Eichsubstanzen, z. B. Rohrzucker, Naphth. u. Salicylsäure, zu kontrollieren. Von diesen Eichsubstanzen ist nur Salicylsäure eignet, die die Vff. als sekundäre Eichsubstanz vorgeschlagen haben. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 1536—40. 1925. Rotterdam, Handelshochsch.) W. A. ROT

Ernst Cohen, P. E. Verkade, Saburo Miyake, J. Coops jr. und J. A. der Hoeve, *Die Verwendung von Salicylsäure als Eichsubstanz in der Calorimetrie*. Nachdem COHEN u. S. MIYAKE (vgl. S. 1757) nachgewiesen hatten, daß Salicylsäure beim Umkrystallisieren aus W. merkbare Mengen Vakuolen-Wasser einschließt, mußte die Verbrennungswärme von verschiedenen gereinigten Salicylsäurepräparaten bestimmt werden. Nur aus W. umkrystallisierte Säure gibt inkonstante Zahlen (5 bis 5238 cal. pro g); krystallisiert man sie nochmals aus trockenem Ä. um, so erhält man die früher von VERKADE u. anderen angegebenen Werte (5242 cal. pro g Luft gewogen). Von jedem Präparat wird vor u. nach der Verbrennung die Löslichkeit in trockenem Bzl. bei $30,00^\circ$ bestimmt: bei der reinen wasserfreien Säure 0,98 g/100 g Lsg. Erhitzen auf $100\text{--}105^\circ$ i. vac. über P_2O_5 treibt das W. nicht aus, feines Pulvern u. Erhitzen nähert die Verbrennungswärme dem richtigen Wert. — Man muß die Eichsubstanz Salicylsäure also schärfer als bisher definieren; welche Lösungen außer trockenem Ä. noch in Frage kommen, wird untersucht werden. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 35. 48—53. Utrecht-Rotterdam.) W. A. ROT

Erich König, *Eine Verbesserung der Hempelpipette für die Gasanalyse*. In der Absorptionskugel ist ein Röhrchen mit 2 Schwimmerventilen ähnlich wie beim Orsat-Kleiner-App. eingebaut. Beim Hin- u. Zurücksaugen wird das Gas durch die Absorptionsfl. gezwungen, so daß Schütteln nicht notwendig ist. Die Pipette wird von der Firma STRÖHLEIN Co., Düsseldorf, geliefert. (Chem.-Ztg. 50. 194.) JUNG

Gilbert E. Seil, *Bestimmung von Blausäure in Gasgemischen*. Eine Tutwiler-Gaspipette beschickt man bis zur Marke mit Stärkelsg., läßt 500 ccm HCN -Gasgemisch dazu u. versetzt durch den oberen Einlauf unter ständigem Schütteln mit $\frac{1}{10}$ -n. Jodlsg. bis zur bleibenden Bläuung. Blaue Lsg. ausgießen, mit W. nachwaschen u. mit Thiosulfatlsg. (1 ccm = 0,2288 mg HCN) titrieren. Ansäuern mit HCl , 1 M stehen lassen u. abermals titrieren. 1 ccm Titrationsdifferenz = 0,2288 mg HCN in 1 l Gasgemisch. — Die Thiosulfatlsg. wird hergestellt durch Verdünnen von 84,75 g 0,1-n. Lsg. auf 1 l, die Stärkelsg. durch Sättigung von verd. Stärkelsg. mit NaHCO_3 . Zur Feststellung der zum Ansäuern nötigen HCl -Menge wird im Vorvers. eine Tutwiler abgemessene Menge mit HCl 1:8 titriert. (Ind. and Engin. Chem. 18. 1 bis 43. Pittsburgh [Pt. J.]) GRIMME

Hans Tropsch, *Über Kochsalzlösung als gasanalytische Sperrflüssigkeit*. In der Bemerkung zu der Arbeit von FRITZ G. HOFFMANN. (Vgl. S. 1857.) Das Ansäuern der NaCl -Lsg. hat den Zweck, ein alkal. Werden beim Eindringen von alkal. Absorptionsfl. zu verhindern. Es genügt ein Zusatz geringer Mengen H_2SO_4 , die

sorptionsfähigkeit für CO_2 nicht erhöht. Zweckmäßig ist es, die NaCl -Lsg. mit zu sättigen. Es empfiehlt sich der Zusatz von Phenolphthaleinlsg. zum Sichtbarwerden eines etwaigen alkal. Werdens. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 401. Mülheim.)

JUNG.

Wilh. Gumz, *Die Verbrennungstemperatur und ihre graphische Ermittlung*. Vff. verschiedene graph. Zusammenstellungen, aus denen die Verbrennungstemp. unter Berücksichtigung der verschiedenen Beeinflussungsfaktoren, wie Luftüberschuß, Vorwärmung u. Abstrahlung berechnet werden kann. (Feuerungstechnik **14**. —12.)

NEIDHARDT.

Marcel Jacob, *Über die Ausnutzung der Messungen der magnetischen Drehung der Analyse von Gemischen*. Die magnet. Drehung ist zur Charakterisierung eines Stoffes sehr geeignet, ihre Messung ist aber zu umständlich, weil sie ein konstantes magnet. Feld bezw. einen konstanten elektr. Strom zur Voraussetzung hat. Diese größere Schwierigkeit wird dadurch aufgehoben, daß man neben der zu untersuchenden Substanz eine Bezugssubstanz in das Feld einbringt u. gleichzeitig beobachtet; da die Abhängigkeit der Drehung von der Feldstärke für alle Körper die gleiche ist, so ist das einmal erreichte Verhältnis der Drehungen durch Stromschwankungen nicht stört. — In Vffs. Verss. wurde das Feld in einer 60 cm langen Spule aus 6 mm Cu-Rohr (1250 Umwickelungen) erzeugt; durch das Cu-Rohr floß W.; die Feldstärke betrug ca. 250 Amp. Die Untersuchungsfl. befand sich zwischen der Elektrode u. der Bezugsfl., in welcher eine in der Lichtrichtung verschiebbare Halbleitungsplatte angebracht wurde. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 573—74.) BKM.

Elemente und anorganische Verbindungen.

H. B. Mc Donnell, *Schnellmethode zur Bestimmung von Ozon*. Beschreibung einer Testmethode für O_3 -haltige Luft aus Ozonisierungsanlagen. Einen 60 ccm-Meßzylinder beschickt man mit je 30 ccm Thiosulfatlsg. (5 ccm = 5 ccm 0,01%ig. Jodlsg.) u. 10 ccm 1%ig. KJ-Lsg., gibt 5 Tropfen 2%ig. Stärkelsg. hinzu u. leitet die O_3 -haltige Luft durch die Mischung u. beobachtet die Zeit, in welcher die Fl. beginnt, sich zu entfärben. O_3 -Konz. = proportional der Zeit. Die Methode kann auch zur Best. von O_3 in Luftgemischen benutzt werden. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 135. College Park, Md.)

GRIMME.

H. Gille, *Über Absorption chemischer Nebel. Zugleich Vorschlag einer Methode zur Bestimmung von Schwefeltrioxyd in feuchten Röstgasen*. Für die Betriebskontrolle der Herst. von SO_2 für die Sulfitzellstofffabrikation ist die Best. des in den Röstgasen enthaltenen SO_3 wichtig. Meist wird SO_2 in J-Lsg., $\text{SO}_2 + \text{SO}_3$ durch Absorption in NaOH bestimmt, was bei trockenem Gas ohne weiteres möglich ist. In feuchten Gasen wird aber das SO_3 nicht restlos absorbiert. Es gelang, den Nebel mit Watte zurückzuhalten; die Watte wurde ausgewaschen u. in der Lsg. SO_2 u. SO_3 durch Titration mit J u. NaOH bestimmt. Ein Vers., mit dem trocknen Gas vor den Wäschern so vorzugehen, verlief negativ. Die Verss. REMYS (S. 2178) erklären dieses Resultat. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 401—02. Naumburg a. Saale.)

JUNG.

George W. Pucher und Harold A. Day, *Eine colorimetrische Methode zur Bestimmung von Hydroxylamin*. Die von Vff. beschriebene Methode zur colorimetrischen Bestimmung von Hydroxylamin beruht auf der Rk. mit Benzoylchlorid u. FeCl_3 (vgl. BAMBERGER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **32**. 1805 [1895]). Zu 4 ccm Lsg., die 0,8—3,5 mg Hydroxylaminhydrochlorid enthalten, werden 2 Tropfen Benzoylchlorid, 4 ccm A. u. 2 ccm Na-Acetylsg. (2 g in 100 ccm) gegeben, 20—30 sec. geschüttelt, 2—3 Min. stehen gelassen, dann 2 ccm FeCl_3 -Lsg. (0,5 g $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ u. 2 ccm konz. HCl auf 10 ccm) zugegeben u. auf 25—50 ccm verd. Nach Absetzen des Benzoylchlorids wird im Colorimeter abgelesen. Die Ausgangslsg. muß neutral oder wenig sauer sein, Wärme u. ein Überschuß von Alkali beim Neutralisieren sind zu vermeiden.

Die Best. kann auch in Ggw. von *Glucose* ausgeführt werden, wenn das Verhältn. Hydroxylamin: *Glucose* nicht größer als 1:20 ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 672—76. Buffalo [N. Y.], Medical School u. General Hospital.) JOSEPH

Ludwig Moser und **Erich Ritschel**, *Die Bestimmung und die Trennung selt. Metalle von anderen Metallen*. VI. *Die Bestimmung der Löslichkeit und Empfindlichkeit analytisch verwertbarer Caesium- und Rubidiumkomplexverbindungen*. (V. Monatshefte f. Chemie 45. 323; C. 1925. I. 2396.) Von den weiter unten angeführten Komplexverbind. des *Cs* u. *Rb* kommen für quantitative Zwecke nur die *Perchlorpikrate* u. *Bitartrate* in Frage. Zur Trennung von *Rb* u. *Cs* kann der Sprung der Löslichkeiten der Bitartrate benutzt werden. Als sicherster qualitativer Nachweis von *Rb* u. *Cs* bei Ggw. von *K* ist derjenige mit Silicomolybdänsäure anzusprechen, durch wel. *K*-Ion nicht gefällt wird. Desgleichen empfiehlt sich auch die Rk. mit Zinnbromwasserstoffsäure. Für den Nachweis von *Rb* u. *Cs* allein ist die Rk. mit Phosphorwolframsäure u. mit Na-Kobaltinitrit am geeignetsten.

Versuche. Sämtliche Rkk. sind genau bei 20° ausgeführt, die Rk.-Zeiten betragen 5 u. 10 Min. Die Löslichkeiten *L* beziehen sich auf 20°, die Empfindlichkeit ist bei 20° auf das Metall bezogen. 1. *Perchlorat*, ($n\text{-HClO}_4$ -Lsg.) *L* für $\text{CsClO}_4 = 15$, $\text{RbClO}_4 = 10,04$; *E* für *Cs* = 1:256, *Rb* = 1:585. Bei Fällung mit NaClO_4 ansatz mit der freien Säure fällt die Empfindlichkeit. 2. *Natriumpikrat* (5% Na-Pikratlsg.) *L* für $\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\cdot\text{OCs} = 3,08$, $\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\cdot\text{ORb} = 3,80$, $\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\cdot\text{OK} = 5,06$. *E* für *Cs* = 1:1581, *Rb* = 1:1475. 3. *Natriumkobaltinitrit* (30 g Kobaltinitrat, 60 ccm 100 ccm 60%ig. NaNO_2 u. 3 ccm Eg. Zu je 20 ccm der Lsg. vor der Verwendung 1 ccm Eg.). Die Ndd. enthalten 1—2% Na, weshalb sie als Wägungsform nicht in Betracht kommen. *E* für *Cs* = 1:25300, *Rb* = 1:29500. 4. *Natriumbitartrat* (10%ig. Lsg.) *L* für $\text{CsHC}_4\text{H}_4\text{O}_6 = 71,13$, $\text{RbHC}_4\text{H}_4\text{O}_6 = 8,520$, $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6 = 5,415$. *E* für *Cs* = 1:3,52, *Rb* = 1:246. 5. *Antimontrichlorid* (20% Lsg. in konz. HCl). Die Fällung SbCl_3 liefert beim Vorwiegen des *Cs*-Ions eine Cs-reiche Verb. (vielleicht $\text{SbCl}_3\cdot 6\text{CsCl}$), die durch überschüssiges SbCl_3 die stabile Form $2\text{SbCl}_3\cdot 3\text{CsCl}$ liefert. Die Verb. in konz. HCl beträchtlich l.; durch W. wird Hydrolyse hervorgerufen, *E* für *Cs* = 1:5, *Rb* = 1:8,18, *K* = 1:10,23. 6. *Zinntetrachlorid* (50% Lsg. von SnCl_4 in konz. HCl) *E* für *Cs* = 1:2741, *Rb* = 1:363. 7. *Zinntetrabromid* (20 g SnBr_4 in 100 ccm HBr d = 1,38). Die Ndd. haben die Zus. $2\text{CsCl}\cdot\text{SnBr}_4$ u. $2\text{RbCl}\cdot\text{SnBr}_4$, l. in verd. H_2SO_4 unl. in konz. HCl . *E* für *Cs* = 1:4518, *Rb* = 1:140. 8. *Wismutchlorid*. Die mit B. entstehenden Ndd. zeigen in der, wegen Zurückdrängung der Hydrolyse notwendigen hohen Ionenkonz. zu große Löslichkeiten, als daß sie für analyt. Zwecke zu verwenden wären. 9. *Natriumsilicomolybdat*. (Eine sd. Lsg. von Natriumsilicat wird nach u. n. mit einer Aufschlammung von 20 g Molybdänsäure in W. versetzt, der ausfallende voluminöse Kieselsäure mit NaOH gel., dann mit HNO_3 bis zur starken Gelbfärbung versetzt, filtriert u. auf dem Wasserbad auf ein Vol. von ca. 300 ccm eingeengt.) *L* für *Cs*-Silicomolybdat = 0,4, *Rb*-Silicomolybdat = 4,1. *E* für *Cs* = 1:6325, *Rb* = 1:199. 10. *Phosphorwolframsäure* (10% Lsg. von P_2O_5 20 $\text{WO}_3\cdot 11\text{H}_2\text{O} + 16\text{H}_2\text{O}$). Die Ndd. sind als Wägungsform wegen wechselnder Zus. ungeeignet, die Löslichkeiten haben mangels definierter Phasen nur bedingten Wert. *L* für *Cs*-Phosphorwolframat = 0,04, *Rb*-Phosphorwolframat = 0,075, *K*-Phosphorwolframat = 0,135. *E* für *Cs* = 1:202400, *Rb* = 1:29490. (Monatshefte f. Chemie 46. 9—22. 1925.) TAUBER

H. W. Foote und **W. M. Bradley**, *Die Bestimmung des Calciums durch Umwandlung des Oxalats in das Carbonat*. *Ca* kann genau als Carbonat bestimmt werden, wenn das Oxalat zwischen 675° u. 800° in einem Strom von trockenem CO_2 gegl. wird. Diese Methode liefert ebenso gute oder bessere Ergebnisse als die Umwandlung des Oxalats in Oxyd. Sie hat vor der Oxydmethode den Vorteil, daß das Carbonat ohne Gefahr, daß Feuchtigkeit oder CO_2 aufgenommen wird, gewogen werden kann.

laß Zeit beim Filtrieren gespart wird, da CaCO_3 durch einen Goochtiiegel filtriert l. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 676—78. New Haven [Conn.], YALE Univ.) JOS.

M. L. Nichols und **O. J. Thies, jr.**, *Der Einfluß von Citraten auf die Fällung von Bariumsulfat*. Lsgg. von Na_2SO_4 u. Na-Citrat wurden gemischt u. verd., beim Zusatz $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ schied sich ein gelatinöser Nd. von Ba-Citrat ab u. bei Ggw. einer großen Menge Na-Citrat wurde für Augenblicke der ganze Inhalt des Reagensrohres fest. Nach Schütteln des Gemisches wandelte sich der gelatinöse Nd. unter geringer Wärmerückwirkung in einen milchigen Nd. wahrscheinlich von BaSO_4 um, die Trübung verschwand nach wenigen Augenblicken, u. eine klare oder schwach opaleszierende „Lsg.“ blieb zurück. Die klarste „Lsg.“ wurde erhalten, wenn die Konz. des Na-Citrats doppelt so hoch war wie die des BaSO_4 . Ein Überschuß des Citrats hat keine nachteilige Wirkung. Die Konz. „Lsgg.“ von BaSO_4 nimmt die Stabilität der Lsg. mit zunehmender Konz. ab, die Trübung zu. Wesentlich für eine klare „Lsg.“ ist, daß das BaSO_4 zuletzt zugegeben wird. Die Verss. wurden auch mit K_2SO_4 , BaCl_2 u. Na-Citrat u. andern Salzen gemacht. Es zeigt sich, daß für eine BaSO_4 -„Lsg.“ nicht eine spezif. Substanz nötig ist, sondern eine „Ba“-„ SO_4 “ u. Citrationen. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, wenn keine freie Ionen in der Lsg. ist. Die Trübung nimmt mit der Temp. zu. Die klarsten „Lsgg.“ wurden nach dem Dialysieren durch Kollodiummembran unterworfen, nach einigen Tagen konnte in der dialysierenden Fl. kein BaSO_4 nachgewiesen werden. Durch Elektrolyse wird das BaSO_4 zum Teil ausgeflockt. Durch Elektroendosmose konnte nicht sicher festgestellt werden, zu welchem Pol das Kolloid wandert. Die gegenseitige Ausflockung von BaSO_4 u. kolloidalem Fe_2O_3 u. die negative Wirkung des kolloiden As_2O_3 sprechen dafür, daß die „Lsgg.“ negativ geladene kolloidale Dispersionen von BaSO_4 sind, in denen sich die Teilchen in außerordentlich fein verteiltem Zustand befinden. — Bei der Bestimmung von BaSO_4 in Ggw. von Citraten werden befriedigende Ergebnisse erzielt, wenn die Fällung mit BaCl_2 etwas mehr HCl zugefügt wird, als zur vollständigen Umdwandlung der Citrate in Citronensäure nötig ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 302—09. Ithaca [N. Y.], Cornell Univ.) JOSEPHY:

A. Cobenzl, *Bariumsulfat und dessen Verbindung mit Schwefelsäure*. Zu den Beobachtungen von KRAUSS (S. 1859) weist Vf. darauf hin, daß Cl-frei gewaschenes BaSO_4 nach dem Trocknen bei höherer Temp. wieder starken Cl-Gehalt zeigte; beim Erhitzen entweichen Cl- u. H_2SO_4 -Dämpfe. Die Grünfärbung der Flamme könnte demnach durch flüchtiges BaCl_2 oder $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ bedingt sein. (Chem.-Ztg. **50**. 168.) JUNG.

Hugo Freund, *Beiträge zur colorimetrischen Analyse einiger Metalle*. Die Beschreibung von einigen weiteren Beispielen aus der Praxis (s. S. 734) wird fortgesetzt. Es werden die Bestst. von Mo, W, Cr, P, Fe u. Co, wie sie im Eisenhütten- u. Stahlwerkslaboratorium ausgeführt werden, angegeben. (Zentralbl. d. Hütten u. Walzwerk. **94**—97. Wetzlar.) WILKE.


Ed. Donath, *Bestimmung kleiner Mengen von Silber neben Blei*. Die Trennung von Ag u. Pb, auch in Ggw. von Cu, beruht auf der Fällung des Ag als Metall durch Zn in ammoniakal. Lsg. mit Glycerin (vgl. Sitzungsber. [K.] Akad. Wiss. Wien **82**. [1882] u. S. 2048). (Chem.-Ztg. **50**. 222.) JUNG.

Theo. F. Buehrer und **O. E. Schupp, jr.**, *Aufeinanderfolgende potentiometrische Titration von Kupfer und Eisen in metallurgischen Produkten*. Die Titration mit Kaliumdichromat nach Red. mit SnCl_2 - HgCl_2 , TiCl_3 u. CrCl_2 wurde untersucht. Es gab nur die Red. mit CrCl_2 befriedigende Ergebnisse mit Cu-, Cu-Fe-Lsgg. u. mit Fe-Prodd. CrCl_2 reduziert das CuCl_2 zu CuCl u. schließlich zu feinverteiltem metall. Cu. Es wird dann anschließend mit Dichromat titriert, so erhält man in der Titrationskurve typische Richtungsänderungen bei der Oxydation von Cr^{II} zu Cr^{III} , Cu^0 zu Cu^{I} , Cu^{I} zu Cu^{II} u. Fe^{II} zu Fe^{III} . Dabei hat sich folgendes Verf. bewährt: 0,3—0,4 g des Cu- oder Fe-Pröbchens werden in 10 cem Königswasser gel. u. mit einem Überschuß an konz. HCl versetzt. Nach Überführung der Nitrate in Chloride zur Trockne eingedampft. Hierauf wird

mit möglichst wenig W. wieder aufgenommen, 1—2 ccm konz. HCl zugesetzt u. ein Min. zwecks in Lsg. bringen der bas. Salze digeriert, die Gangart abfiltriert u. das Filtrat in ein 200 ccm-Gefäß gebracht. Zum Filtrat werden nun 5—10 ccm konz. HCl gesetzt, mit einer etwa 2,5 cm dicken, vorher gereinigten Kerosinschicht überdeckt. CrCl₂-Lsg. bis die Lsg. durch das entstandene feine Cu rot gefärbt wird u. dann n 10—15 ccm überschüssige CrCl₂-Lsg. zugegeben. Bei der Red. muß der elektr. Rührer stets gehen; die Flüssigkeitsmenge hält man am besten zwischen 50—70 ccm, d. Titrationspunkte bei größerem Vol. nicht so scharf ausfallen. Die potentiometrische Titration wird dann bei Raumtemp. ausgeführt. Mg, Al, Ca, Mn, Zn, Ag, Pb, Na u. stören nicht, auch kann die Titration ruhig ohne Abfiltration der Gangart ausgeführt werden. As u. Sb können durch Kochen mit granuliertem Zn entfernt werden. Die direkte Titration von Cu u. Fe mit SnCl₂ u. TiCl₃ gelingt nicht, bessere Ergebnisse werden schon mit CrCl₂ erzielt, aber am besten ist die oben wiedergegebene Methode zur Best. der beiden Metalle. (Ind. and Engin. Chem. 18. 121—24. Univ. Arizona Tucson [Ariz.].) WILKE

Alexander Smith Russell, *Volumetrische Bestimmung von Uran, Vanadium, Kupfer und Eisen in Uranerzen*. Bei Ggw. von As₂O₃, Mo u. CaWO₄ wird das Erz Königswasser gel., zur Trockne verdampft u. SiO₂ u. WO₃ abgeschieden. Die Lösung wird dann mit H₂SO₄ bis zum Auftreten von Dämpfen abgeraucht u. nach Verdünnung werden Pb u. Ba als Sulfate, Cu, As₂O₃ u. Mo mit H₂S abgeschieden. Nach Austreiben des H₂S wird mit KMnO₄ bis zur blaßroten Färbung behandelt. Wenn das Erz frei von diesen Beimengungen ist, können die übrigen Bestandteile, auch Cu, ohne Titration bestimmt werden. — Die Best. beruht auf 3 Operationen: 1. Die Lsg. von V, Fe u. Cu in 6-n. H₂SO₄ wird mit 3% Zn-Amalgam geschüttelt, bis die violette Farbe von V^{IV} bestehen bleibt; folgende Umwandlungen treten dabei ein: U^{VI} → U^V, V^V → V^{II}, Cu^{II} → Cu u. Fe^{III} → Fe^{II}. Cu löst sich im Amalgam. Dann wird die Lsg. in überschüssige 1/10-n. KMnO₄-Lsg. gegossen; Umsetzung: U^{IV} → U^V, V^{II} → V^V, u. Fe^{II} → Fe^{III}. Dann wird auf 80° erwärmt u. mit 1/10-n. Uransulfatlsg. in 4-n. H₂SO₄ titriert bis zum Verschwinden der Violettfärbung. — 2a. Die mit KMnO₄ völlig oxydierte h. Lsg. wird mit NH₄OH versetzt, bis gerade kein Niederschlag entsteht, abgekühlt, mit 5 g KJ u. einer Paste von frisch bereitetem CuJ als Katalysator versetzt; das entstandene J₂ wird mit 1/10-n. Thiosulfat titriert; der Verbrauch zeigt die Umwandlungen V^V → V^{IV}, u. Fe^{III} → Fe^{II} an. — 2b. Ein Teil der ursprünglichen Lsg. wird in derselben Weise mit KJ behandelt; das dann verbrauchte Thiosulfat entspricht den Umwandlungen V^V → V^{IV}, Cu^{II} → Cu^I u. Fe^{III} → Fe^{II}. 3. Ein 3. Teil der Lsg. wird wie unter 1. behandelt, zu der h. völlig oxydierten Lösung H₃PO₄ u. einige Tropfen gesätt. Diphenylaminlsg. in konz. H₂SO₄ zugegeben u. mit 1/10-n. FeSO₄-Lsg. in 2-n. H₂SO₄ titriert bis zum Verschwinden der blauen Färbung. Umsetzung: V^V → V^{IV}. Aus 2. u. 3. läßt sich der Cu- u. V-Gehalt, aus 2a. u. 3. der Fe- u. U-Gehalt berechnen. Bei Abwesenheit von V vereinfacht sich die Unter- 3. fällt weg. — Die Überred. zu U^{III} bei Operation 1. wird vermieden, indem die Lösung im Zn-Amalgam reduzierte Fl. 1/2 Min. der Luft ausgesetzt wird, bevor sie in die KMnO₄-Lsg. gegossen wird. Die Luftoxydation von Vanadin(2)- u. Uran(4)-sulfat wird durch genügende H₂SO₄-Konz. u. Arbeiten bei gewöhnlicher Temp. vermieden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T 57—60. Christ Church, Oxford.) R. SCHMIDT

H. B. Dunncliff und Kanshi Ram, *Die Theorie des Zeitfaktors bei der De-Haen-Low-Bestimmung von Kupferspuren*. Die de Haen-Lowsche Best. von Cu-Spuren hängt von der Rk. zwischen CuSO₄ u. KJ ab:



Das freigemachte J färbt eine Stärkelslg. blau. Empfindlichkeit: 1 Teil Cu auf 5 Millionen. Die Rk. zwischen freiem J u. Stärke erfolgt augenblicklich. (Grenzfall: J = 1,5 · 10⁻⁵ g/ccm, Stärke = 5,10⁻⁵ g/ccm.) Die Beobachtung, daß bei gegebener

erke- u. J-Konz. u. zunehmender KJ-Konz. die Farbe schneller erscheint u. intensiver ist, wird bestätigt. Die Ggw. der Stärke u. des gebildeten CuJ sind die hauptsächlichsten Ursachen für den Zeitfaktor (Periode vor der Entw. der blauen Farbe). Rk. Eine geringe Acidität u. das entstehende K_2SO_4 beeinflussen den Zeitfaktor nicht. Der Zeitfaktor nimmt zwischen 0 u. 30° ab, oberhalb 30° wieder zu. Oberhalb wird in verd. Lsgg. keine Farbe hervorgerufen. (Kolloid-Ztschr. **38**. 168—74. 1925.)

LASCH.

R. Biazzo, *Über die Bestimmung des Kupfers in Kupfersulfat des Handels*. Das Verfahren des Vf.s beruht auf einer Abänderung der bekannten Methode von VOLHARD. Es stützt sich auf die Tatsache, daß Rhodankalium in schwefelsaurer Lsg. von KMnO_4 quantitativ oxydiert wird nach der Gleichung: $\text{HCNS} + 3\text{O} = \text{SO}_3 + \text{HCN}$. Man löst 5,4938 CuSO_4 in 250 ccm W., oxydiert Ferrosalz mittels Chlorwasser, entfernt Cl_2 durch Kochen u. fällt das Fe mittels NH_3 . Nach Abkühlen füllt man 50 ccm vom Fe abfiltrierten Fl. in einen Kolben von 220 ccm, gibt so viel KCN-Lsg. hinzu, die Fl. zu entfärben, darauf 44 ccm $\frac{1}{10}$ -n. KCNS-Lsg., säuert mit verd. H_2SO_4 zur Marke auf, gibt nochmals 0,3 ccm W. zum Ausgleich für das Vol. des ausfallenden Cuprorhodanids hinzu, filtriert u. titriert 200 ccm mittels $\frac{1}{10}$ -n. KMnO_4 -Lsg. bis zur schwachen Rotfärbung; jetzt gibt man dieselbe Menge KMnO_4 -Lsg., die zur Titration verbraucht war, nochmals hinzu u. titriert den Überschuß an KMnO_4 mittels $\frac{1}{10}$ -n. KCNS-Lsg. zurück. Ist n die Anzahl der bei der letzten Titration verbrauchten $\frac{1}{10}$ -n. KCNS-Lsg., so ist $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \% = 100 - 2,5n$. Kleine Mengen Oxide haben keinen Einfluß auf die Genauigkeit der Best. (Rendiconto Accad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] **31**. 69—71. 1925.)

GOTTFRIED.

Denton J. Brown, *Eine neue Methode zur elektrolytischen Trennung von Metallen*. Bei einer Hilfselektrode taucht Vf. einen Draht aus dem abzuscheidenden Metall in eine zu elektrolysierende Lsg., der mit der Zelle u. dem Voltmeter ebenso verbunden wie eine Hilfselektrode. Das Potential der Kathode in bezug auf den Draht wird auf $-0,1$ bis $-0,2$ V gehalten; bei Bi, das Neigung zur Abscheidung in pulverförmiger Form hat, wird ein etwas weniger negatives Potential gewählt. Draht u. Kathode werden zusammen gewogen. Nach Abscheidung eines Metalls wird der Draht durch den eines anderen abzuscheidenden Metalls ersetzt. Belegdaten für die Abscheidung von Cu aus einer noch HCl, Hydroxylamin u. SnCl_2 enthaltenden Lsg., von Cd aus einer noch HCl, Hydroxylamin u. PbCl_2 enthaltenden Lsg., von Sb aus einer noch HCl, Hydroxylamin u. SnCl_2 enthaltenden Lsg. u. von Sn aus einer noch Hydroxylamin u. CdCl_2 enthaltenden Lsg. sind angegeben. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 582—83. Lincoln [Nebr.], Univ.)

JOSEPHY.

Edwin A. Hill, *Unter dem Mikroskop gemessene Krystallwinkel*. Vf. beschreibt eine Methode zur Messung sämtlicher Winkel fester Krystalle u. Mk. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 651—54. Washington [D. C.], Univ.)

JOSEPHY.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Stanley G. Willimott und **Frank Wokes**, *Untersuchung des Lebertrans auf Vitamin A-Gehalt*. Es wird versucht, eine Einheit des Vitamin A-Gehaltes im Lebertran festzustellen. Die von der „United States Pharmacopoeia“ aufgestellte Einheit ist diejenige Gewichtsmenge Lebertran, die täglich einer weißen Ratte gegeben werden muß, um die experimentell hervorgerufenen Symptome des Vitamin A-Mangels zu heilen u. einen Gewichtsanstieg von 10—20 g in fünf Wochen zu erzielen. In einem Gramm Öl sollen mindestens 50 Einheiten enthalten sein, d. h. 20 mg Öl entsprechen einer Einheit. Andere Autoren fanden, daß 1,7—5 mg Öl genügen, um in 4 Wochen ein merkliches Wachstum hervorzurufen. Als minimalste Dosis für den Wachstumsunterhalt junger Ratten beanspruchen die Vff. 1—2 mg Lebertran. (Pharmaceutical Journ. **115**. 718—20. 1925.)

HIRSCH-KAUFFMANN.

Carlos Ghigliotto, *Über den Nachweis sehr kleiner Formaldehydmengen in Vergiftungsfällen und in Nahrungsmittelkonserven.* Es wird gefunden, daß Eiweiß den Nachweis selbst sehr geringer Mengen HCHO nicht stören, u. daß dieser durch Erhitzen des Untersuchungsmaterials mit eisenhaltiger H₂SO₄ oder Voisenets Reaktion erbracht werden kann. Die Schiffsche Rk. jedoch bleibt aus. (Bull. soc. pharm. Bordeaux **64**. 36.) ROJAH

A. Schamelhout, *Die fünfte Ergänzung zum französischen Arzneibuch.* (S. 744.) Vf. bespricht die neu aufgenommenen chem. u. galen. Präparate. (Journ. Pharm. de Belgique **8**. 147—51.) ROJAH

Arthur W. Lupton, *Pharmazeutische Berechnungen. Prozentuale Lsgg.* Vf. gibt Formeln an zur Umrechnung des in engl. Gewicht angegebenen Gehaltes pharmazeutischer Zubereitungen in den %-Gehalt u. umgekehrt, sowie Anweisung zu anderen pharmazeut. Berechnungen. (Pharmaceutical Journ. **116**. 331—33.) ROJAH

L. Rosenthaler, *Mikrochemische Reaktionen des Tutocains.* Vf. gibt mikrochem. Rk. des *Tutocains* (Elberfelder Farbwerke vorm. FRIEDR. BAYER & Co.), *Novocains* u. *Cocains* mit Platinchlorid, Goldchlorid [Diammino-Tetraammin-Kobalt] Kalium, KJ, Trinitroresorcin u. HgCl₂ an, die wegen der abweichenden Krystallformen der Rk.-Prodd. die mkr. Identifizierung obiger Anästhetica gestattet. (Abbildungen im Original.) (Pharm. Zentralhalle **67**. 177—79.) ROJAH

W. B. Forbes, *Vergleichende Untersuchungen von Handelsgerbsäuren.* Handelt es sich um chem. Konst. u. die Methoden zur Gehaltsbest. werden besprochen. Am brauchbarsten sind nach Verss. des Vf. die Cinchoninmethode von HOOPERS u. die nitro-fizierte Antipyrinmethode von CRONZEL. Handelsgerbsäure enthielt neben 6,42% 6,9% Gallussäure u. 8,0—9,38% W. 82,65—85,46% Gerbsäure. (Pharmaceutical Journ. **116**. 225—29.) ROJAH

Elisa Mosso, *Über die Bestimmung von Filicin im ätherischen Farnwurzelextrakt.* Vergleichende Unterss. nach den Methoden von SCHMIDT, welche von der italien. Pharmacopoe aufgenommen ist, u. von GORIS ergaben die absol. Überlegenheit der ersteren. Des weiteren wurde festgestellt, daß der Filicingehalt der Wurzel, derselbe sich um einen Reservestoff handelt, im Frühjahr, vor Erwachen der Vegetation am höchsten ist. (Giorn. Farm. Chim. **75**. 8—13. Turin.) GRIMM

H. Angewandte Chemie.

III. Elektrotechnik.

Fr. Vogel, *Der heutige Stand der elektrolytischen Metallgewinnung.* (Metallurg. **16**. 313—14. 341—42.) BEHRL

Francesco Giordani, *Über die Leistungsfähigkeit von Diaphragmenelektrolysen mit Kreislauf für Chloralkalien.* IV. u. V. Mitt. (III. vgl. Rendiconto Accad. Scie. Fisiche e Mat. [Napoli] **3** **28**. 142 [1922].) Rein theoret. Arbeiten über die Theorie der Diaphragmenkatalysatoren mit Kreislauf für Chloralkalien, in denen Vf. die Richtigkeit einer früher angegebenen Formel nachweist, die die Stromausbeute als Funktion der Alkalikonz. der ausfließenden Kathoden-Fl. darstellt. Die Formel lautet:

$$R = 1 - \frac{n}{1 + \frac{K_1}{K_2}} + \frac{0,0103 K_{1,2}}{(U_{OH} + U_M) \left(1 + \frac{K_1}{K_2}\right) C_2};$$

es bedeuten n die Überföhrungszahl des Kations im Alkali, K_1 die Partialleitfähigkeit des Chlorids im Katholyt, K_2 die Partialleitfähigkeit des Alkalis im Katholyt, $K_{1,2}$ die Gesamtleitfähigkeit des Katholyten, U_{OH} die effektive Geschwindigkeit des [OH] für 1 Volt Potentialdifferenz, U_M die effektive Geschwindigkeit des [K] für 1 Volt

R. SCHMIDT.

BIKERMAN.

SCHOTTLÄNDER.

KAUSCH.

Franz Skaupy, Berlin, *Entladungsröhre, insbesondere Glimmlampe*, dad. gek., die üblich aus einem gewöhnlichen Metall, etwa Fe, bestehenden Elektroden auf wirksamen Oberfläche mit einer in bekannter Weise zur Herabsetzung der Be-

triebsspannung dienenden dünnen Schicht eines der Erdalkalimetalle, Ba, Sr oder bedeckt oder in der Oberflächenschicht mit demselben legiert sind. (D. R. P. 425 Kl. 21f vom 3/5. 1922, ausg. 1/3. 1926.) KAUSC

Rütgerswerke Akt.-Ges., Abteilung Planiawerke, Berlin. (Erfinder: **Leo Kahl**, Berlin-Wilmersdorf), *Imprägnierungsmittel mit hoher Verkokungszahl für Bo lichtelektroden*, dad. gek., daß es aus mit kolloidalem C angereichertem u. gesch zenenem Pech besteht. (D. R. P. 425 940 Kl. 21f vom 13/6. 1922, ausg. 1/3. 1926.)

Köln-Rottweil Akt.-Ges., Berlin, *Alkalischer Elektrolyt für galvanische Pri elemente und Sammler, insbesondere Lalande-Elemente*, dad. gek., daß er aus All cellulose besteht. (D. R. P. 426 186 Kl. 21b vom 13/11. 1924, ausg. 3/3. 1926.)

Friedrich Schäffer, Hagen i. W., *Säureabscheider für Batterieräume elektris Bleisammler*, welcher aus einer Mehrzahl dünner, gelochter, mit zueinander verset Löchern in gewissem Abstand parallel zueinander angeordneter Bleiblechen best dad. gek., daß die Zwischenräume der Bleche mit einem säurebeständigen Stoff h entwickelter Oberfläche, der dem Durchgang der Luft nur geringen Widerstand bi gefüllt wird. (D. R. P. 426 394 Kl. 21b vom 6/9. 1925, ausg. 10/3. 1926.) KAUSC

Prest-O-Lite Co., Inc., New York, übert. von: **Raymond C. Benner**, Bay N. Y., *Sammelbatteriescheidewand* aus einer Platte aus Sulfitholzfasern, die mit ei l-Silicat oder gelatinöser H₂SiO₃ imprägniert ist. (A. P. 1 573 369 vom 21/1. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSC

IV. Wasser; Abwasser.

G. Elkeles, *Die Bedeutung der gleichmäßigen Verteilung des Chlors im Ba wasser der Badeanstalten*. Die Art des Zu- u. Abflusses des Badewassers in sol Badeanstalten, die das Umwälzverf. anwenden, bietet alle Voraussetzungen für ungleiche Verteilung des Cl₂ im Bassin u. als Folge davon für eine Überdosier Als Abhilfe wird gleichmäßige Verteilung des zufließenden chlorierten W. durc die ganze Breite des Bassins einnehmendes, am Boden liegendes durchlöcherter empfohlen. Das Ergebnis einer solchen Anordnung ist die Verminderung der S stoffe, die Vermeidung der toten Ecken u. infolgedessen auch eine Verminderung Cl₂-Zusatzes. Die Erklärung für letztgenannte Erscheinung dürfte darin zu su sein, daß beim alten Verf. außerhalb der Strömungszone in dem zu schwach gechl Teil des W. eine Anreicherung von organ. Substanzen, Algen, Bakterien usw., s fand, die ihrerseits wieder einen entsprechend größeren Teil des zugesetzten banden u. so zur Verstärkung des Cl₂-Zusatzes über das gewünschte Maß hi zwangen. (Gesundheitsingenieur 49. 151—52. Charlottenburg-Westend, Städt. Ua suchungsamt.) SPLITTGERBE

E. Awe, *Kesselsteinverhütung mittels Kespurit*. Verss. haben ergeben, Kespurit ein brauchbares Mittel zur Verhütung von Kesselsteinbildung ist. S Wrkg. beruht nicht auf chem., sondern auf physikal. Vorgängen. (Arch. f. Wä wirtsch. 7. 85—87. Bielefeld.) NEIDHART

H. Bechhold, *Keimsichere Filter*. Bei allen bisher bekannten keimsich Filtern, auch bei den für besonders sicher gehaltenen Kieselgurfilterkerzen, wack nach 3—5 Tagen Keime durch das Filter u. verunreinigen das filtrierte W. Vm durch Forschungen über die bakterizide Wrkg. von Metallen u. Metallkompositio Hinweise für die Möglichkeit erhalten, Hauswasserfilter gegen das Durchwack von Keimen auch monatelang zu sichern. Theoret. Gründe sprechen dafür, daß d neue, nicht näher beschriebene Verf. sich auch für andere MM. von ähnlicher Porö eignen dürfte. (Gesundheitsingenieur 49. 113—15. Frankfurt a. M., Inst. f. Kol forschung.) SPLITTGERBE

R. D. Leitch, *Flußverunreinigung durch saure Grubenabwässer*. Nach kurzen legungen über den Schaden, den saure Grubenwässer insbesondere in Lokom

seln verursachen, bespricht Vf. die Neutralisation solcher Wässer durch Kalkstein oder Barytsalze. Im Gegensatz zu den europ. Bergwerken entlassen die amerikanischen Wässer mit weit stärkeren Säuregehalten. (Chem. Age **14**. 266—67. Pittsburgh.)

SPLITTGERBER.

F. Egger, *Die Überwachung der Aluminiumsulfat-Trinkwasserreinigung*. Am nächsten läßt sich die Kontrolle des $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ -Zusatzes bei Schnellfilteranlagen durch Best. der H_2SO_4 im Roh- u. Reinwasser ausführen. Die Entw. freier CO_2 kann in W. leicht aggressive Eigenschaften erteilen; daher ist auf die Errechnung der aggregierten CO_2 aus der Best. der freien u. gebundenen CO_2 Wert zu legen. Bei einem etwa erforderlichen Kalkzusatz wird das Schnellfiltrat mit Phenolphthalein geprüft. Die SO_4 -Best. gibt dann nur Aufschluß über die Höhe des Sulfatzusatzes. Durch Best. $[\text{H}^+]$ gewinnt man Anhaltspunkte über die durch den Fällmittelzusatz hervorgerufenen Veränderungen. Der Reinigungseffekt wird durch Prüfung des W. auf Durchlässigkeit ermittelt. (Chem.-Ztg. **50**. 167. Stuttgart.)

JUNG.

Geo. W. Burke, *Nitratbestimmungen*. Die vorgeschriebene Methode zur quantitativen Nitratbest. in W. u. Abw. beruht auf dem Vergleich der Färbung des mit Natriumdisulfosäure befeuchteten Abdampfrückstandes mit derjenigen von Nitratgleichsals. Bei Ggw. von größeren Mengen von organ. Substanzen ist obiges Verfahren unbrauchbar, so daß für solche Fälle die Red. der Nitrate (+ Nitrite) des Nitrats vorher vom NH_3 befreiten W. u. die colorimetr. Best. nach NESSLER empfohlen wird. Bei gleichzeitiger Ggw. von Nitriten müssen diese nach anderen Methoden bestimmt u. nach der Umrechnung auf NH_3 von dem Gesamtwert abgezogen werden. (Journ. Amer. Water Works Assoc. **15**. 169—70. Ames [Iowa], Engineering Experiment Station, Iowa State College.)

SPLITTGERBER.

B. H. Butcher, *Verwendung der Chinasäure zur Unterscheidung von Bakterien der aerogenen und Aerogenesgruppen*. Nachdem man durch Neutralisation der Chinasäure (Hexahydrodrotetraoxybenzoesäure) mit CaO das chinasaure Calcium hergestellt hat, versetzt man folgendes Reagens: 0,5 g K_2HPO_4 + 0,5 g NH_4Cl (oder anstatt dessen NaCl) + 0,1 g FeCl_3 + 10,0 g chinasaures Calcium werden mit W. auf 1 l aufgefällt. Dieses Reagens erlaubt eine Unterteilung der aus 4 Familien bestehenden Gruppe der Aerogenesbakterien; u. zwar verursachen die beiden Familien *Bact. aerogenes* im engeren Sinne u. *Bact. oxytocolum* eine Rot- bis Schwarzfärbung der Lsg., während die beiden anderen Familien, *Bact. cloacae* u. *Bact. levans*, desgleichen sämtlichen Familien der Coligruppe nicht reagieren. (Journ. Amer. Water Works Assoc. **17**. 171—73. Ames [Iowa], Department of Bacteriology and Agricultural Experiment Station.)

SPLITTGERBER.

N. A. Roozendaal, *Moderne bakteriologische Wasseruntersuchung*. Besprechung früherer Arbeiten, besonders von DE GRAAFF (vgl. Chem. Weekblad **21**. 511; C. **1925**. 1001). (Pharm. Tijdschrift voor Nederlandsch Indie **2**. 430—33. 1925. **3**. 58—62.)

GROSZFELD.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Th. Wolff, *Vorgeschichtliche und antike Keramik*. Kulturgeschichtliche Beschreibung. (Sprechsaal **59**. 154—56.)

SALMANG.

A. Otremba, *Fluor in Emailschemelzen*. (Vgl. S. 2405.) Betrachtungen an eigenen Versuchs. an Hand der Theorie VIELHABERS. (Keram. Rdsch. **34**. 158—60. Wien.)

WECKE.

Frederick G. Jackson, *Eine chemische Studie über die Absorption von Schwefelwasserstoff aus Ofengasen durch keramische Waren*. 2 Tone, die reich an schlackenbildenden Stoffen waren u. von denen der eine fast keinen S, der andere 5% S enthielt, wurden geprüft. Selbst unter ungünstigsten Bedingungen (viel SO_2 in den Ofengasen) wurde wenig von den Basen (Fe, Al, Mg, Ca, K) in Sulfate verwandelt. Bei 500° nahm die

Ware aus den Feuergasen einer 5% S enthaltenden Kohle nur wenig S mehr auf bei einer Kohle von 0,5% S. Unter denselben Bedingungen wurde in 87 Stdn. wenig mehr S aufgenommen wie in 29 Stdn. Durch Berechnung wurde gefunden, daß bei 50° in 29 Stdn. aus den Feuergasen einer 0,5% S enthaltenden Kohle weniger als 8% des S der Feuergase von der bestrichenen Oberfläche der Ware absorbiert wurde. Bei der Kohle mit 5% S u. 87 Stdn. Brennzeit wurde bei derselben Temp. ein geringerer Prozentsatz des S der Feuergase absorbiert. Die absol. Menge aufgenommene S war nur wenig größer als im Erstfalle. Bei höherer Temp. war die Zerlegung Sulfate in allen Fällen in gleicher Weise von der Temp. abhängig. Das Massenwirkungsgesetz konnte auf die Zerlegung der Sulfate nicht angewandt werden, weil die V. des S im Gase zu groß war. Die Verss. können nicht ohne weiteres auf glasierte Ware übertragen werden. (Journ. Amer. Ceram. Soc. **9**. 154—73. Columbus, Ohio. Bur. Mines.) SALMAN

H. G. Fisk, *Ein praktischer, gasbeheizter Versuchsofen für den Bedarf des Betriebs* (Journ. Amer. Ceram. Soc. **9**. 151—53. New Cumberland [W. Ka.], Cres. Brick Co.) SALMAN

W. Friedmann, *Gasdruckschwankungen und Gasdruckregelung in Glashütten* (Metallbörse **15**. 2605—07. 2633—34. 2661—62 [1925]. Polytechnikum Frankfurt a. M., H. H. BEHRL)

A. N. Otis, *Anwendung elektrischer Beheizung zur Glaskühlung*. Vorteile: Saubere, wenig Wartung, genaue Temp.-Regelung. (Glass Industry **7**. 62—63. Scheideberg, N. Y.) SALMAN

Bureau of Standards, *Fortschritte in der Technologie des Glases. Übersicht über neuere Untersuchungen über Eigenschaften und Herstellung*. Angaben über Festigkeit von Glas. Die „Steine“ im Glas bestehen aus Quarz, Tridymit, Christobalit, Wollastonit, Diopsid, Mullit, Korund, Nephelit u. einem Natron-Kalksilicat unbekannter Zusammensetzung. Sie werden erzeugt durch Entglasung, unvollständige Lsg. von Materialien des Glases u. Einschlüssen von feuerfestem Material aus den Wandungen u. der Decke des Ofens. Messungen der Viscosität wurden mit genauester Berücksichtigung der Temp.-Messungen vorgenommen. In Bleigläsern mit $n_D = 1,620$ konnte die Dispersion durch Ersatz von 2% CaO durch SiO₂ von 37,5 auf 36,6 herabgesetzt werden. Durch Herabsetzung des ZnO-Gehaltes von Borosilicatgläsern von 2,5% auf weniger als 0,5% wird die Dispersion bei ähnlichem Brechungsindex reduziert, wodurch sie für optische Zwecke brauchbarer werden. Zur B-Best. wurde die Methode von SARGENT bevorzugt. Über Eigenschaften von Glasplatten vgl. Bur. of Stand. Circular Nr. 164 u. U. S. Government Master Specification Nr. 123. Aus einer Abb. eines Wannenofens geht hervor, daß die Wannensteine ausgewechselt werden können, ohne die Ofendeckung zu beschädigen. (Chem. Metallurg. Engineering **33**. 93—94.) SALMAN

—, *Lagerfolgen für Tafelgläser*. Bei feuchter Lagerung kann W. Tafelgläser fressen. (Sprechsaal **59**. 156—59.) SALMAN

Vaughan H. Stott, *Die Viscosität von Glas*. An einem weichen Laboratoriumsglase wurde festgestellt, daß die $\log \eta$ -Temp.-Kurve u. die Erhitzungskurve bei etwa 500° eine Einbuchtung haben. Die Viscosität beträgt dabei $10^{13,7}$ Poisen, ist also viel größer als bei den früher beobachteten Umwandlungspunkten. Ebenso wird durch Auswertung der von A. A. MICHELSON (Journ. Geology **25**. 405 [1917]) angegebenen Gleichung für Verdrängung einer viscosen M. durch eine Last:

$$S = S_0 + A (1 - e^{-\lambda V/t}) + Bt,$$

eine Änderung der Konstanten bei etwa 500° gefunden. An Hand von 12 Kurven, die im $\log \eta$ -Temperaturfelde eingetragen sind, wird gezeigt, daß die Kurve in der Nähe des Wertes $\eta = 10^{13,7}$ Poisen gestört ist. Aus den Viscositätsmessungen von WASHBURN u. SHELTON (Bull. 140 Engin. Exper. Stat. Univ. of Illin.) an Natron-

Kieselsäuregläsern läßt sich das Verhältnis von $\log \eta$ zu verschiedenen Kieselsäuregehalten u. bei verschiedenen Temp. graph. darstellen. Alle Kurven haben bei 66% SiO_2 entsprechend der Verb. $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$ einen Wendepunkt, woraus man schließen konnte, daß diese Verb. im Glase gel. vorkommt. Die mangelhafte Übereinstimmung früher veröffentlichten Messungen wird nachgewiesen u. einige eigene Messungen geführt. (Journ. Soc. Glass. Technology 9. 207—26. 1925. Teddington, National Physical Laboratory.) SALMANG.

A. Q. Tool und **E. E. Hill**, *Über die Konstitution und Dichte von Glas*. Vff. stellen folgende Hypothese auf, die die beim Kühlen des Glases beobachteten Erscheinungen erklären soll: Unter gewissen Kühlbedingungen sollen sich gewisse prakt. umkehrbare Vorgänge, die einige oder alle das Glas bildenden Moleküle umfassen, so abspielen, daß andere mit der Kühlung verbundene Vorgänge, wie Absonderungen u. Krystallisation verhindert werden, wodurch der glasige Charakter bewahrt wird. Die durch Kühlung gestörten Vorgänge können außer Krystallisationen auch solcher Art sein, wie sie zur B. des n. glasigen Zustandes erforderlich sind. Die Erscheinungen beim Kühlen der Gläser u. einige ihrer Eigenschaften können durch Änderung der Wärmebehandlung verschoben u. rückläufig gemacht werden. (Journ. Soc. Glass. Technology 185—206. 1925. Washington, Bureau of Standards.) SALMANG.

W. E. S. Turner, *Natur und Konstitution von Glas*. Vf. zählt die in den letzten Jahren neu entdeckten Eigenschaften des Glases auf. In seinem Laboratorium wurde festgestellt, daß wieder erschmolzenes Glas andere Formbarkeit hat als aus Rohstoffen geschmolzenes bei gleicher Zus. Feuchtigkeit in den Rohstoffen beeinflusst ebenfalls die Formbarkeit. Solche Gläser erhalten durch Einschmelzen mit sehr geringen Mengen Alkalisalzen ihre ursprüngliche Formbarkeit zurück ohne Änderung der Zus. *Molekularkomplexität des Glases*: Durch Auswertung der Messungen der Oberflächenspannung geschmolzenen Gläsern von E. W. WASHBURN, G. R. SHELTON u. E. E. LIBMAN (Univ. of Illin. Bull. Nr. 140. 21. 1 [1924]) findet er, daß das Mol.-Gew. viel größer als 500 sein muß. Da Molekülassoziationen eines Elektrolyten in solchen Lsgg. vorkommen, in denen das Lösungsm. eine niedrige dielektr. Konstante hat u. Dissoziationen desselben Stoffes in solchen Lösungsm., die hohe dielektr. Konstanten haben, vorherrschen, wird gefolgert, daß die Silicate des Glases hoch polymerisiert sind. Das Lösungsm., Kieselsäure, hat die niedrige dielektr. Konstante 4,35. *V. chem. Eigenschaften in Glas*: Trotz vieler Bemühungen, solche, bes. $\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ im Glase nachzuweisen, ist nichts sicheres bekannt. *Konst. des Glases*: Beim Soda-Kalkglas kann man annehmen, daß die Verb. $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$, $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$, $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ u. CaOSiO_3 , deren Beständigkeit in diesen worden ist, in Glasflüssen gel. vorkommen. Wegen des Kieselsäureüberschusses überwiegen $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$ u. CaSiO_3 . Diese Körper sind in W. oder Säuren l. unlöslich. Die Unlöslichkeit im Glase ist vielleicht durch ihre komplexe Natur bedingt. Haupt- sächlich ist aber die Kieselsäure Ursache der Stabilität. Ein Silicatglas kann als ein Netzwerk von Kieselsäure aufgefaßt werden, dessen Hohlräume durch Silicate oder anderen Dissoziationsprodd. erfüllt sind. Ähnliches kann man vielleicht bei Silicagel u. Schutzkolloiden annehmen, deren Schutzwirkg. auf die Umhüllung anderer Kolloide zurückzuführen wäre. Glas u. Silicagel haben gemeinsam folgende Kolloideigenschaften: Adsorptionskraft, Durchlässigkeit für Gase sogar bei tiefen Temp., besonders für H₂ u. He. (Journ. Soc. Glass. Technology 9. 147—65. 1925. Sheffield, Univ.) SALMANG.

G. Tammann, *Gläser als unterkühlte Flüssigkeiten*. (Journ. Soc. Glass. Technology 166—84. 1925. — C. 1925. II. 1379.) SALMANG.

Ralph W. G. Wyckoff und **W. Morey**, *Messung der Röntgenstrahlenbeugung bei Soda-Kalk-Silicatgläsern*. (Vorl. Mitt.) Gläser weisen bekanntlich sehr breite Beugungsbanden auf. Bei Unters. von Gläsern verschiedener Zus. wurden breite u. enge Banden, d. h. scharfe Linien beobachtet. Diese Gläser zeigten keine Spur von Entglasung u. die dickere Schicht keine milchige Trübung. Gläser, die schwer krystallisieren, geben

die breiten Banden, leicht krystallisierende Gläser geben Linien. (Journ. Soc. Gl Technology 9. 265—67. 1925. Washington, Carnegie Inst. Geophysic. Lab.) SALMANC

B. Strauß, *Werkstoffe für die Glasformen*. (Glastechn. Berichte 3. 407—Essen.) SALMANC

Ludwig Springer, *Erfahrungen und Untersuchungen über Glasfehler*. Zusammenstellung von Glasfehlern mit vielen Abbildungen. (Glastechn. Berichte 3. 395—Zwiesel, Bay.) SALMANC

H. Thiene, *Nachkriegsgerätegläser*. Bei den Gerätegläsern *Pyrex*, *Sylex*, *Vulka Resista* ist die Ausdehnung auf Kosten der Widerstandsfähigkeit gegen Alka herabgesetzt. Das Jenaer Glaswerk hat solche Gläser schon früher hergestellt, jedoch von ihrer Verwendung als Geräteglas wieder abgesehen. (Ztschr. f. ang Ch. 39. 193—94. Jena.) WECKF

A. Brass, *Phonolith in der Glasfabrikation*. Petrograph. über das zweckmäßige Untersuchungsverf. bei Anwendung von Phonolith. (Sprechsaal 59. 145.) WECKF

Hugo Hermann, *Kann die Beobachtung von Entglasungen zu technologischen Kenntnissen führen?* Entglasungen können über die Temperaturverhältnisse im C Aufschluß geben. Auffallend sind Cristobalitausscheidungen, die nach dem vielleicht auf mangelhafte Läuterung hindeuten. Manche Entglasungen sind n dem Zustandsdiagramm überhaupt nicht zu deuten, wenn nicht die chemische homogenität in Betracht gezogen wird. (Sprechsaal 59. 142—44.) WECKF

D. J. Mc Swiney, *Der Einfluß der Korngröße des Sandes auf das Schmelzen und Läutern von Natrium-Kalkglas*. Es ist zweckmäßig, den Schmelzvorgang durch Verwendung von Sand in geeigneten Korngrößen so zu leiten, daß die Schaumbildung möglichst beschleunigt wird, ohne daß die Viscositätssteigerung zu schnell erfolgt. Bei gleichzeitiger Verwendung von Scherben erreicht man das am besten mit einem nicht zu feinen Sande gleichmäßiger Körnung. (The Glass Industry 1925. 211—Keram. Rdsch. 34. 161—62.) WECKF

E. Berger, *Eigenschaften des Glases als Werkstoff*. Forts. u. Schluß (vgl. S. 21) (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 70. 129—32. Jena.) WECKF

Oskar Lecher, *Moderne Glasgemenge*. (Vgl. S. 1469.) (Metallbörse 16. 91—146. 370—71. 594. Cottbus.) BEHRL

G. W. Morey und N. L. Bowen, *Das ternäre System Natrium-Metasilicat, Calcium-Metasilicat, Kieselsäure*. Das für die Glasindustrie wichtige System $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ ist noch nicht untersucht worden. Vff. haben es z. T. bearbeitet, ebenfalls das entsprechende K_2O -System. Hier sind nur Umsetzungen fertiger Silicate mit Kieselsäure berücksichtigt. Die Unters. wurde nach der Abschreckmethode durchgeführt: In bekannter Stoffmenge von bekannter Zus. wird bei einer bestimmten Temp. im Gleichgewicht erhalten u. abgeschreckt. Bei schwer krystallisierenden Mischungen gerät es, sie aus dem Ofen zu entfernen. Leicht krystallisierende Massen wurden mit größter Geschwindigkeit abgeschreckt: Das mit einem Pt-Gewicht beschwerte Gefäß wurde durch elektr. Auslösung in k. Hg fallen gelassen. Wegen der langsamen Krystallisation ist die Methode der therm. Analyse nicht anwendbar. Die Ausgangssilicate wurden aus reinsten Rohmaterialien durch 3-maliges Mischen, Schmelzen u. Pulvern auf völlige Homogenität gebracht. Die Analysen wurden immer an den Gläsern selbst vorgenommen, nicht aus den Ausgangsmaterialien errechnet. Es wurde im bedeckten Pt-Tiegel gearbeitet. Mischungen mit weniger als 45% SiO_2 wurden nicht untersucht.

An Hand eines sehr umfangreichen zahlenmäßigen u. graph. Materials wird belegt, daß 7 krystallin. Verbb. in diesem Bereiche beständig sind. Eine von diesen ist SiO_2 kommt in allen 3 Modifikationen Quarz, Tridymit u. Cristobalit vor. CaSi_2O_6 kommt in 2 Formen vor, ferner $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$ u. $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$. Alle diese Verbb. waren schon bekannt. Nicht bekannt waren 3 neue: $2\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$, $\text{NaO} \cdot 2\text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$ u. $\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$.

$2\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$, das auch $2\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot \text{CaSiO}_3$ geschrieben werden kann, nimmt nur kleines Feld ein u. lag in Krystallen der pyritoedr. Gruppe des isometr. Systems vor. kann als Oktaeder vorkommen, das meist durch Würfel gestört wird. Brech.-Ind. $71 \pm 0,002$. F. 1141° ist inkongruent. Die Zerstörung erfolgt unter B. von Krystallen $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$ u. einer Fl. von $11,5\%$ CaO-Gehalt. Die Unterscheidung des Gangs- u. des Zersetzungsprod. war schwierig. Die Verb. $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$ kann $2\text{SiO}_3 \cdot 2\text{CaSiO}_3$ geschrieben werden. Sie nimmt das größte Feld der 10 festen Phasen ein. Sie kann in Kontakt mit 5 festen Phasen bestehen. Wegen Zwillingsbildung konnte die Symmetrie nicht bestimmt werden. Brech.-Ind. $\gamma = 1,599$, $\alpha = 1,596$. Die Krystalle bildeten sich in höherer Reinheit beim Abschrecken. F. kongruent 1284° . Die Verb. ist offenbar stark dissoziiert.

$\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$ scheidet sich als erste Phase in großen Mengen aus techn. Gläsern aus, obwohl das Stabilitätsfeld klein ist. Kryst. von orthorhomb. Symmetrie mit der Form 4-, 6- oder 8-seitiger Prismen. Brech.-Index $\gamma = 1,579$, $\alpha = 1,564$. Der Achsenwinkel $2V$ ungefähr 75° . Diese Verb. ist in Entglasungsprodd. mehrfach festgestellt worden. Bei 1045° findet Zers. in Wollastonit u. Fl. statt. Der Zerfall erfolgt so schnell, daß man zur Darst. von $\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$ das geschmolzene Glas in Hg abschrecken muß. Im binären System $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$ — $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ sinkt die Schmelzkurve bei 3% CaO auf 1060° , bei CaO·SiO₂-Zusatz steigt die Temp. bis zu 141° , der Zers.-Temp. von $2\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$ bei $11,5\%$ CaO. Bei weiterer CaO·SiO₂-Zufuhr wird $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$ gebildet bis zu einem flachen Maximum bei 1284° , am F. dieser Verb. Bei weiterer Zufuhr von CaO·SiO₂ fällt die Temp. auf 1282° , im binären Eutektikum zwischen $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$ u. Pseudowollastonit, dann steigt sie schnell zum F. des Wollastonits bei 1540° an. Im binären System $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$ — $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$ fällt die Temp. bei Zufügung des ersteren zum letzteren auf 862° bei 3% CaO u. steigt dann wenig an. Die fl. Phase enthält wahrscheinlich nicht die beiden Verbb., sondern Dissoziationsprodd. Krystallisationen der ternären Mischungen siehe Original.

Jede Mischung, die innerhalb eines Dreiecks zwischen den 3 Phasen $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$ — $\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$ — SiO_2 liegt, mußte sich bei dem ternären Eutektikum CaO 5,2, SiO₂ 73,5 bei 725° verfestigen. Gemische dieser Zus. sind schwer zu krystallisieren. Die leichtere Krystallisation bei höherer Temp. ist wahrscheinlich auf die kleinere Viskosität zurückzuführen. Dieses Eutektikum ist von größtem glastechn. Interesse, weil es alle techn. wichtigen Gläser umfaßt. Diese Gläser befinden sich während der Verarbeitung oberhalb ihres F., also oberhalb ihres Krystallisationsbereiches. Gläser mit 15% CaO würden wenig unterhalb 1050° zur Entglasung neigen, bei 10% CaO erst unterhalb 1000° , bei 5% CaO erst unterhalb 750° . Geringfügige Abweichungen in irgendeiner Richtung äußern sich in starken Krystallisationen von Kieselsäure, Wollastonit u. $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot 3\text{SiO}_2$, obwohl das Feld dieser Verb. bei so niederem SiO₂-Gehalt liegt, wie sie in Soda-Kalkgläsern nicht vorkommen. Die in bezug auf die Entglasung günstigste Zus. $5\text{—}6\%$ CaO, $71\text{—}73\%$ SiO₂ ist gegen W. unbeständig. Die Entglasung der gebräuchlichen Soda-Kalkgläser wird durch den Gehalt an Fe_2O_3 , Al_2O_3 , MgO u. K_2O hintangehalten. Es liegt also in der Praxis nie ein reines ternäres System vor, da auch die reinsten Sätze durch den Hafenton verunreinigt werden. Bei geringem SiO₂-Gehalt sind die experimentellen Schwierigkeiten groß, sich Na_2O leichter als SiO₂ verflüchtigt. Na-Orthosilicat konnte in solchen Schmelzen festgestellt werden, ebenfalls eine neue Verb. $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$. Sie hat isotrope Krystalle, Brechungsindex wenig unter 1,60, u. wahrscheinlich einen hohen F. Zwischen Viskosität u. der Oberflächenspannung einerseits u. der Krystallisationstemperatur andererseits besteht keine Beziehung. Über die neben den beschriebenen Krystallphasen bestehenden Glasphasen kann nichts ausgesagt werden. Alle krystallisierten Gläser sind in der fl. Phase stark dissoziiert, wodurch die Molekularkonst. des Glases

sehr komplex wird. (Journ. Soc. Glass. Technology 9. 226—64. 1925. Washing Carnegie Institution.) SALMANG


Erwin Urbschat, *Neue Untersuchungen über Porzellan*. Zusammenfassung Bericht über Vorträge von KEPPELER, die Erweichung der Tone, HIRSCH, die verschiedenen Formen von SiO₂ in Porzellanmm., HACKELOER-KOEBBINGHOFF, Verunreinigung des gebrannten Porzellans, FUNK, Muffelfarben u. DORFNER, gemäßige Herst. von Schamottekapseln. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 365—68. Berlin.)

C. Stürmer, *Porzellanbrand und Porosität*. Während des reduzierenden Bräunens lagert sich in den Poren der Kohlenstoff ab, der vor dem Glattbrennen, in dem Poren geschlossen werden, entfernt werden muß. Die günstigste Entkohlungstemperatur liegt zwischen 900 u. 1000°, weil dann die Porosität am größten ist u. kein von der Zerstörung der Tonsubstanz herrührendes W. mehr entweicht. (Sprechsaal 153—54.) SALMANG

C. Stürmer, *Kölnisch-braunes Steinzeug*. Die alte Technik des „Kölnischbraunes“ u. Ableitung ihrer Wiederbelebung nach modernen keram. Grundsätzen. (Keram. Rdsch. 34. 139—42.) WECKE

G. A. Kall, *Über die Konstitution des Kaolins*. Vf. stellt für die Bruttoformel 2 SiO₂·Al₂O₃·2H₂O nebenst. Konstitutionsformel auf. (Sprechsaal 59. 127—28. Karlsruhe.)

WECKE.



R. A. Heindl, *Bericht über die Fortschritte in der Erforschung von Kapselton*. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 131—44. Bur. of Stand.) SALMANG

A. T. Goldbeck, *Anforderungen an Zement für modernen Straßenbau*. Als Straßenpflaster sind diejenigen Betons unbrauchbar, die durch Eintrocknung der Feuchtigkeit schwinden, durch Temp.-Abnahme schwinden, durch Änderung der Temp. der Feuchtigkeit Verwerfungen der Platten zeigen, sich unter dem Einfluß schwerer oft getragener Wagenlasten verbiegen u. unter dem Frost leiden. Infolgedessen würden sich diejenigen Mörtel am besten eignen, die innerhalb weniger Tage hohe Festigkeiten aufweisen, unter dem Einfluß von Feuchtigkeit u. Temp. wenig schwinden, u. in größeren Zeiträumen Frost u. Tauwetter, Feuchtigkeit u. Trockenheit, Wärme u. Belastung ertragen. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 169—92. 1925. Nat. Crush-Stone Assoc. Washington.) SALMANG

H. S. Mattimore, *Studium der Temperaturen in Tonerdezementen und Methoden des Anmachens*. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 192—203. 1925. Harrisburg [Pa.].) SALMANG

G. Agde und R. Klemm, *Beiträge zur Kenntnis der Aluminatzemente*. Die Bauxite des Vogelsbergs sind ebenso wie die französischen zur Herst. von Schmelzzement verwendbar. Als Feld dieser Zemente im Gibbschen Dreieck ist das Feld von ENDELL (1919) angegebene anzunehmen. Die Schmelze besteht aus Kristallen eines melilithähnlichen Körpers u. einer glasigen Grundmasse. Optische Unterss., Lage u. Verlauf der Grenzen lassen auf nahe Verwandtschaft der Portland- u. Aluminatzemente schließen; auch die Abbindevorgänge sind einander ähnlich. Die Säurebeständigkeit der Aluminatzemente ist im allgemeinen recht hoch, jedoch bei Eisenreichtum abträglich beeinflusst. Die Druckfestigkeit der Aluminatzemente läßt bei Wasserlagerung nach. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 175—86. Darmstadt.)

Fritz Schott, *Die Einwirkung des Zementstaubes auf die Lunge und die Frage der Tuberkulose bei Zementarbeitern*. Nach des Vf. Unterss. führt selbst jahrzehntelange Beschäftigung in der Zementarbeit zu keiner lebensgefährlichen Erkrankung der Lungen, sondern höchstens zu katarrhalischen Erscheinungen mit Neigung zur Lungenerweiterung oder zu Staublunge. Mit Sicherheit ist auszuschließen, daß Beschäftigung im Zementgewerbe besondere tuberkulöse Gefahren in sich birgt.

nehr verlaufen tuberkulöse Erscheinungen bei Zementarbeitern günstig. (Zement 126—28. 146—48. Rohrbach.) WECKE.

Calame, *Verhalten des Hochofenzementes in Seewasser*. Bericht über gute Erfahrungen mit Hochofenzementbeton bei Bauten bei Helgoland u. Wesermünde. (Tonind.-Ztg. 50. 239—41. Wilhelmshaven.) WECKE.

O. Kallauner, *Die Prüfung von Asbestzementschiefer*. Über die Eigenschaften in der Tschechoslowakei erzeugten Asbestzementschieferplatten. Platten, die Füllstoff neben Asbest auch Cellulose enthalten, erreichen in ihren verschiedenen Eigenschaften, besonders in den Festigkeiten, nicht die Güte der nur Asbest enthaltenden Platten. (Tonind.-Ztg. 50. 348—52. Brünn.) WECKE.

Fr. Kubik, *Der Einfluß des Kieselsäuregehaltes auf die Luftbeständigkeit des erhärteten Portlandzements*. Erhärteter kieselsäurereicher Portlandzement ist nicht nur Meeresbauten widerstandsfähiger als tonerdereicher, sondern auch an der Luft. (Tonind.-Ztg. 50. 299.) WECKE.

Paul Hänsel, *Die Entwicklung der Portlandzementfabrikation seit dem Kriege*. Die erst. behandelt folgende Kapitel: Konstitutionsforschung, Fabrikationstechnik, Qualität des Portlandzements. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 81—88. Lobositz.) WE.

A. Guttman, *Über die Kornfeinheit der Zemente, besonders der Eisenportlandzemente*. feinen Zementanteile haben meist einen höheren Gehalt an CaO u. Gipsstein als gröberen. Von 2 Eisenportlandzementen hatte der nach dem Siebbefund feinere engere Festigkeit; jedoch zeigte der gröbere u. Mk. im Durchgang durchs 10000-er b erheblich höheren Gehalt an feinem Korn. Für die quantitative Best. des Feinsins ist die Sedimentation unter Benutzung der Stokesschen Fallgeschwindigkeitsformel mit der Bauerschen Apparatur zweckmäßig. Das feinste Korn im Eisenportlandzement besitzt annähernd den gleichen Schlackensandgehalt wie das grobe. (Zement 15. 164—68. 185—87. 200—03. Düsseldorf.) WECKE.

R. Ewert, *Der Einfluß des Zementstaubes auf die Vegetation*. Zement- bzw. Kalkste schwächt die Assimilationstätigkeit der Blätter ein wenig ab, hilft jedoch andererseits über Durstperioden hinweg. Eine Verstopfung der Poren findet nicht statt. Ein ungünstiger Einfluß des Zementstaubes auf die Befruchtung der Blüte ist nicht festzustellen. Der Zementstaub hemmt das Auftreten von Schädlingen (Schmarotzerpilzen u. wirkt günstig auf den Boden u. dessen nützliche Bakterienfauna. (Zement 15. 39—42. 61—64. 83—85. 103—06. 128—30. 148—50. 168—70. 185—06.) WECKE.

Otto Gaßner, *Zement und Seewasserbau: Dieses und Jenes als Beitrag zum Problem*. Zusammenfassende krit. Betrachtung der bedeutenderen Unterss. u. Auffassungen über 79 Literaturbelegen. (Zement 15. 86—88. 106—08. 130—31.) WECKE.

Horst Laeger, *Neuzeitliche Sackkalkherstellung*. Beschreibung der von C. v. GRUEBER errichteten Sackkalkanlage der Berginspektion Rüdersdorf. (Tonind.-Ztg. 50. 257—58.) WECKE.

Chas. M. Pease, *Tunnelöfen zum Brennen von Kalk*. Der Ofen gliedert sich in Zonen, die Einfuhr-, Absauge-, Vorfeuer-, Feuer-, langsame Kühl- u. schnelle Kühlzone, die in folgendem Längenverhältnis zueinander stehen: 1,8: 2,8: 2,8: 4,2: 3,5: 1,7. (Zement 15. 126—28. 146—48. Rohrbach.) WECKE.

A. Schack, *Wirkungsgrad und Brennstoffverbrauch von Kalkbrennöfen mit Gasfeuerung*. Vf. stellt die Wärmeabfuhr für einen gasgefeuerten Kalkbrennofen auf und untersucht die entstehenden Wärmeverluste: Strahlungsverlust, Verlust durch Luftüberschuß u. Abgasverlust. Aus der Summe der Verluste u. dem Gesamtwärmeverbrauch wird der Gesamtwirkungsgrad berechnet. (Arch. f. Wärmewirtsch. 7. 65—69. Düsseldorf.) NEIDHARDT.

S. H. Ingberg, *Die Hitzebeständigkeit von Gipswänden*. Gipswände können Feuer zurückhalten. An der Brandseite wird der Gips durch Entwässerung bröckelig,

hält aber an der kälteren Seite stand. Das bröckelige Material wurde von der Feinspritze leicht gewegewaschen. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 299—314. 1925. Bur. of Stand.) SALMANG.

D. Knickerbacker Boyd, *Ziegel*. Die Beurteilung von Ziegeln sollte nicht einzelnen Steinen, sondern an ganzen Wänden durchgeführt werden. Eingehende Erörterung der Prüfung von Ziegeln. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. Techn. Papers. 315—34. 1925. Philadelphia [Pa.].) SALMAN.

A. J. Dale, *Beziehung zwischen der Feuerfestigkeit, der Erweichung unter Belastung und der physikalischen und chemischen Beschaffenheit eines feuerfesten Stoffes*. 5 verschiedene Tone wurden mit Schamotte, die aus denselben Tonen gebrannt worden war, gemischt, daß die Massen 20, 40 u. 60% Schamotte enthielten. Der KSP wurde mit 3 kieselsäurearmen Tonen durch Schamottezusatz nicht verändert, bei einem T mit 50,25% SiO₂ u. 5,63% flußmittelbildenden Oxyden um 0,5—1 SK erhöht bei einem Tone mit 64,30% SiO₂ u. 3,83% flußmittelbildenden Oxyden um 1 erniedrigt. Aus den Erweichungsversuchen unter Belastung folgt: Der Beginn der Erweichung ist unabhängig vom Schamottegehalt, das Temp.-Intervall zwischen Beginn u. Ende der Erweichung ist wechselnd, mit einer Ausnahme liegt die Temperatur des Zusammensinkens bei Schamottesteinen tiefer als bei den reinen Tonen, die Erweichung nimmt zu mit steigendem Schamottegehalt. Der KSP u. der Beginn der Erweichung stehen in keiner Beziehung. Alle untersuchten Steine begannen unterhalb 1350° zu erweichen, die meisten bei 1200°, einige bei 1000°. (Céramique 1925. 53—59.) SALMANG.

F. H. Norton, *Die Wärmedehnung feuerfester Stoffe*. Die Wärmedehnung wurde bis zu 1700° in neutraler oder schwach saurer Atmosphäre gemessen. Die Verfolgung der Ausdehnungskurven bis zum Erweichungspunkt gibt wertvolle Hinweise für die Verwendungsfähigkeit feuerfesten Materials. Auf den Kurven kommen die Umwandlungspunkte der einzelnen Gemengteile, die Erweichung usw. klar zum Ausdruck.

	Mittl. Ausdehnungskoeffizient	Höchster Koeffizient zwischen 300 u. 700°	Beginn der Schwindung
Zirkon (braun) (55,77% ZrO ₂)	0,0000042	0,0000048	1550
Kaolin	43	67	1610
Siliciumcarbid	43	48	1700 +
Feuerfester Ton	51	99	1220
Mullit	53	82	1700 +
Zirkonoxyd (60,44% ZrO ₂)	59	87	1600
Zirkon (weiß) (66,43% ZrO ₂)	64	92	1510
Isolierstein	74	480	1050
Spinell	76	110	1600
Tonerde	77	82	1580
Silicastein	83	1000	1550
Chromitstein	114	124	1540
Kalk	138	145	1700 +
Magnesit (griechisch)	142	151	1700 +
Magnesit (Handelsware)	147	210	1440

Überraschende Abweichungen wurden bei Tonen verschiedener Herkunft gefunden. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 799—815. 1925.) SALMANG.

P. B. Robinson, *Die Verwendung von Silicasteinen*. Besprechung der Eigenschaften der Silicasteine u. ihrer Eignung für Koksöfenbau. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T 29—33.) SALMANG.

R. Clauß, *Grundsätzliches zum Bau und Betrieb von künstlichen Ziegeltrockenanlagen*. (Tonind.-Ztg. 50. 345—47.) WECKE.

Wilhelm Propper, *Welche Wärmemengen werden in einer künstlichen Trockenanlage zucht?* Krit. Nachprüfung der Berechnungen BURGHARDTS (vgl. S. 1611). (ind.-Ztg. **50**. 331—32. Budapest.) WECKE.

H. Burchartz, *Dichtigkeit und Festigkeit von Kiesbeton im Vergleich zu Kiessplitt.* Splittzusatz übt eine günstige Wrkg. auf die Festigkeit aus, ebenso wie er die Dichtigkeit günstig beeinflusst. Voraussetzung ist natürlich die zweckentsprechende Zusammensetzung. (Zement **15**. 151—54. Berlin-Dahlem.) WECKE.

Bach, *Ein Beitrag zur Kenntnis des Si-Stoffes.* Verss. mit 8 verschiedenen Si-Stoffen, deren traßähnliche Wrkg. im Zementmörtel; jedoch sind die Trasse geeigneter, gleichmäßiger zusammengesetzt. (Tonind.-Ztg. **50**. 253—55. Essen.) WECKE.

H. Bach, *Ist Lehmgehalt im Sand für Mörtel und Beton schädlich?* Zusätze von feinem Lehm zu Normsand bis zu 8% gaben bei Zementmörteln (Mischung) eine Erhöhung der Zugfestigkeit. (Tonind.-Ztg. **50**. 294—95. Essen.) WE.

Duff A. Abrams, *Studie über den Verband zwischen Beton und Stahl.* Ein mit einem Griff versehener Stab wurde in einen Betonzylinder eingebettet u. die zum Ausziehen des Stabes nötige Kraft gemessen. Die Zuss. u. Bindezeit des Betons ändern sich in weiten Grenzen geändert. Die Adhäsion zwischen Stab u. Beton ist groß. Der Stab beginnt sich zu lösen, wenn zur Trennung 10—15% der Druckfestigkeit aufgewendet wird, doch ist noch größerer Kraftaufwand zur völligen Trennung erforderlich. Eine Gleitung um 0,012 mm trat bei 55—60% der Abbindefestigkeit ein. Bei Mischungen, die magerer als 1:1 waren, betrug der Verband 24% der Druckfestigkeit des Betons. Verband u. Druckfestigkeit wuchsen mit dem Alter des Betons. Nach 7 Tagen bis zu 1 Jahr. Für 1 Beton (1:5) zu 0,88 W. betrug der Verband nach 1 Jahr 134% des 28-Tagewertes, die Druckfestigkeit 148%. Änderungen im W.-Gehalt wirken auf Druckfestigkeit u. Verband in gleicher Weise ein. Vermehrung des W.-Gehaltes durch Verwendung nasseren Betons, weniger Zement oder Übermaß an feinem Korn ergaben schlechteren Verband u. schlechtere Druckfestigkeiten. Dasselbe galt für den Elastizitätsmodul des Betons, Undurchlässigkeit, zerstörende Einflüsse wie Wetter, See- u. Sulfatwasser usw. Bei Mischungen, die reicher als 1:1 waren, war der Verband geringer, wahrscheinlich wegen der größeren Volumveränderungen während des Erhärtens, die solchen Mischungen eigentümlich sind. Die vom Test Committee als Norm für den Verband eingesetzte Festigkeit von 4% der Druckfestigkeit des 28 Tage gebundenen Betons ist berechtigt. Das gibt eine $2\frac{1}{2}$ —3-fache Sicherheit gegen Gleitung. Rohöl wirkte auf Verband u. Druckfestigkeit ungünstig. 5% Rohöl verminderten den Verband für 28 Tage um ungefähr 20%, bei 1 Jahr 30%. Die Druckfestigkeit für 28 Tage u. 1 Jahr wurde um ungefähr 3% erniedrigt. In jedem Vol.-% zugesetzten gelöschten Kalkes erniedrigt sich die Druckfestigkeit des Verbandes um ungefähr 1,2% oder um ungefähr 2% für jedes Gewichts-%. (c. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers. 256—82. 1925. Chicago, Test. Inst.) SALMAG.

A. Kleinlogel, *Wasserdichter Mörtel.* Mitteilungen über erfolgreiche Verss. mit Zusatzmitteln „Tricosal“. (Zement **15**. 133—34. Darmstadt.) WECKE.

Albrecht von Skopnik, *Die Rolle des Chemikers beim Bau von bituminösen Belagungen.* Vf. beschreibt den Bau bituminöser Belagungen von Straßen u. anderen Aufgaben, die dem Chemiker dabei zufallen. (Chem.-Ztg. **50**. 209—10. Castrop.) JU.

Hugo Vierheller, *Die Schlammzubereitung von Elektrokorund.* Die weitere Zubereitung von Korundstaub, der durch das Sieb von 0,09 mm Maschenweite gegangen ist, muß durch Schlamm geschehen. Dies ist mit W. nicht möglich, da Korund zusammen mit den hydrophoben Stoffen gehört u. seine Einzelteilchen sich im W. zu Flocken vereinigen. Es ist Vf. gelungen, durch Zusatz von etwa 0,04% einer Sulfitalblauge (33—35° Bé. diese Flockenbildung aufzuheben u. eine vollkommene Suspension

von Korundstaub in W. zu erreichen. (Vgl. hierzu D. R. P. 399 725 u. 414 C. 1924. II. 1844 u. 1925. II. 684.) (Sprechsaal 59. 113—14. 128—30.) WECK

Ernst Buß, *Beispiele aus der Praxis für keramisches Rechnen*. (Keram. Rdsch. 70. 86—88. 145—47.) WECK

Wilhelm Hannich, *Prüfung der Glasgefäße zu chemischem Gebrauche*. Über Prüfung der Widerstandsfähigkeit der Glasmasse gegen W. (Glas u. Apparat 7. Friedrichswald.) WECK

Hans Backe, *Zur rationellen Analyse*. Erwiderung an KALL (vgl. S. 2137); d stellt zu große Anforderungen an die Genauigkeit der rationellen Analyse. (Ker. Rdsch. 34. 127—28. Breslau.) WECK

Hans Kühl und **Fritz Klasse**, *Die Schnellbestimmung des Kalkes in Zement und Zementrohstoffen*. 0,3 g geglähtes Material werden im Porzellantiegel (50 c mit 5 cem rauch. HNO₃ auf dem Wasserbade behandelt. Überschüssige H größtenteils verdampfen, großen Überschuß pulverisierter kryst. Oxalsäure zuset langsam steigend erhitzen, zuletzt 20—30 Min. im elektr. Ofen bei 500—550° hal nach Erkalten M. aus Tiegel in Zersetzungsglas des Calcemeters überführen. (Zem 15. 181—84. Berlin.) WECK

Haegermann, *Die Normen für Hochofenzement*. Krit. Betrachtungen zu den schlägen des Vereins Deutscher Hochofenzementwerke für Änderung der Norm (Tonind.-Ztg. 50. 297—98. Karlshorst.) WECK

Spindel, *Normen für gewöhnlichen und früh hochfesten Portlandzement*. Über Notwendigkeit von Normen für hochwertigen Spezialportlandzement. (Tonind.-Ztg. 50. 314—17. Innsbruck.) WECK

H. Eisenbeck, *Versuche über Abbinde- und Erhärtungsfähigkeit von Betonwürfeln in der Kälte*. Probekörper von kleinem Ausmaß geben für Frostvers. richtiges Bild. Die Einw. der Kälte auf Abbindung u. Erhärtung von Zement l nur an großen Betonklötzen zahlenmäßig einwandfrei erfaßt werden. (Zement 111—12.) WECK

Harrison F. Gonnerman, *Einfluß von Form und Umfang von Prüfkörpern auf die Druckfestigkeit von Beton*. Die 6×12-Zylinder sind am geeignetsten für F unterhalb 5 cm. Der Durchmesser des Zylinders soll mindestens 3-mal so groß das Korn des Zuschlags sein. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 237—50. 1925. Chicago, Lewis Inst.) SALMAN

John W. Gowen und **H. Walter Leavitt**, *Die Bedeutung der gewöhnlichen Prüfmethoden zur Bestimmung der Festigkeit von Mörteln*. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 218—36. 1925. Orono Maine, Univ.) SALMAN

E. E. Butterfield, *Analytische Eigenschaften erhärteter Mörtel*. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 283—98. 1925. N. Y. City.) SALMAN

Prévost Hubbard und **F. C. Field**, *Eine praktische Methode zur Bestimmung der relativen Festigkeit feinkörniger Asphaltpflastermischungen*. Ein Brikkett der h. Misch wird erkalten u. lagern gelassen, dann auf 60° erwärmt, in ein Prüfrohr eingef u. die Belastung bestimmt, die nötig ist, um die Mischung durch eine runde Öffn zu pressen. Die verschiedenen mineral. Füllmittel haben verschiedenen Einfluß die Festigkeit. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 335—35. 1925. N. Y. City.) SALMAN

H. M. Milburn, *Eine Formprüfung von Asphaltmischungen*. Eine Probe wird gleichbleibender Temp. u. gleicher Belastung für eine bestimmte Zeit einem D ausgesetzt u. die Stauchung gemessen. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 356—64. 1925. Washington, Bur. of Publ. Roads.) SALMAN

F. H. Jackson und **George Werner**, *Eine neue Prüfmethode der Konsistenz von Pflasterbeton*. Der auf einer runden Platte verbleibende Anteil des angemachten Mö wird gewogen, wobei der Mörtel in normalisierter Art aufgetragen wird. Die F

nz entspricht der Festigkeit des erhärteten Betons. (Proc. Amer. Soc. Testing
Materials **25**. II. Techn. Papers. 204—12. 1925. Washington U. S. Bur. of Publ.
ls.) SALMANG.

W. J. Emmons und **B. A. Anderton**, *Ein Festigkeitsprüfer für bituminöse Pflaster-
hungen*. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers. 346—55.
Bur. of Publ. Roads Washington.) SALMANG.

P. B. Robinson, *Mitteilung über eine neue Methode zur Bestimmung der Porosität*.
poröse Stein wird gewogen u. lückenlos in eine Hülle von Plastizin eingeknetet.
wird dann in W. u. Luft gewogen. Aus den Gewichten, denen des verwendeten
s u. Plastizins u. deren D. wird die Porosität errechnet. (Journ. Soc. Chem. Ind.
T 33—34.) SALMANG.

K. Werner, Dresden, *Magnesiazement*. MgO u. MgCl₂ werden bei Ggw. eines
mittels zusammengebracht, welches wenigstens 30% SiO₂ enthält u. mit über-
sichtigem MgCl₂ reagiert. Geeignete Füllmittel sind die bei der Gewinnung des
ns bezw. Al₂(SO₄)₃ verbleibenden Rückstände. (**E. P. 243 197** vom 24/1. 1925,
17/12. 1925.) KÜHLING.

E. I. Lindman, Rute, Schweden, *Porige Bindemittel*. Zement wird mit so-
nnem „fermenting powder“ versetzt, das z. B. aus Al besteht, dem nicht mehr
0% von gekörnter Kohle- oder Koksschlacke, Asche, Kohle, Koks, Lava, CaO, Bims-
Ton, Holz oder Mischungen dieser Stoffe, sämtlich ziemlich fein zerkleinert,
setzt sind. (**E. P. 243 308** vom 9/6. 1925, Auszug veröff. 13/1. 1926. Prior.
1. 1924.) KÜHLING.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Kühlwein, *Technische und wirtschaftliche Betriebsvorteile bei Anwendung von
eisen in der Aufbereitung*. (Metall u. Erz **23**. 67—72. Mülheim, Ruhr.) BEHRLE.
—, *Zur Abröstung arsenhaltiger Eisenerze*. (Metallbörse **16**. 118—19. 174
75.) BEHRLE.

E. Herzog, *Das Vorschmelzen von Roheisen für nach dem Schrott-Roheisen-Ver-
betriebene Siemens-Martinöfen*. Vf. berichtet über die Erfahrungen, die mit
Roheisenvorschmelzen im Kupolofen für den Siemens-Martinbetrieb gemacht
en sind u. fügt Zahlen über die Wirtschaftlichkeit bei. (Stahl u. Eisen **46**. 357—61.
born.) LÜDER.

—, *Die Reaktionen zwischen Mangan und Schwefeleisen*. Durch Verss. an Elektrolyt-
u. Mangan im elektr. Widerstandsofen wird bestätigt, daß die Rk.



ehrbar ist. Es wird der S-Gehalt des Metalles gegenüber dem der Schlacke um
geringer, je größer der Überschuß an Mn ist. (Metallbörse **16**. 174.) BEHRLE.

D. P. Ross van Lennep, *Unterbrenner-Regenerativ-Koksöfen mit Zwillingsheizzügen*.
al u. Eisen **46**. 294—99. Heerlen [Holland].) LÜDER.

Arthur Sprenger, *Siemens-Regenerativ-Stoßofen mit Hochofengasfeuerung und
umteilung*. Beschreibung eines Regenerativstoßofens mit Gichtgasbeheizung.
al u. Eisen **46**. 361—68. Berlin.) LÜDER.

Bernhard Osann, *Gießereiflammöfen*. Vf. beschreibt eine Reihe von Flamm-
Berechnung der Abmessungen, Beschickungseinrichtungen u. Abhitzeverwertung.
a die Verwendung der Flammöfen als Mischer für Hochofeneisen wird betrachtet.
al u. Eisen **46**. 389—93. Clausthal.) LÜDER.

Carl Rein, *Verwendung von Flußspat im Kupolofenschmelzbetrieb*. Vf. wendet
gegen die Ansicht, daß die Verwendung von CaF₂ im Kupolofenbetrieb so große
eile habe, als mehrfach behauptet worden ist. (Gießereiztg. **23**. 160—61. Han-
r.) LÜDER.

R. Durrer, *Verhüttungsversuche mit Fricktaler und Gonzen-Erz*. Vf. berichtet über Verss. zur Verhüttung der Fricktaler u. Gonzenzerze im elektr. Ofen. (Stahl u. Eisen **46**. 328—32. Berlin.) LÜDI

E. Richards, *Das Schmelzen von Grauguß im elektrischen Ofen*. (Stahl u. Eisen **46**. 249—54. — C. 1926. I. 1614.) LÜDI

Thomas Metzger, *Der Elektroofen in der Metallindustrie*. Das Wesen, die Vor- u. die verschiedenen Bauarten der Elektroöfen in der Metallindustrie werden beschrieben. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **70**. 349—56. Eberswalde.) NEIDHARDT

G. Tammann und G. Bätz, *Über die Gewinnung von Eisen aus Silicaten und Pyrit*. Die Arbeit befaßt sich mit den physikal.-chem. Möglichkeiten, Fe aus Basalt, Hornblende u. Pyrit zu gewinnen. Aus einem Gemisch von Basalt, bezw. Hornblende und Holzkohle lassen sich durch Erhitzen auf 1400° etwa 90% des Fe gewinnen. Zusatz von 5% CaO steigert das Ausbringen bis auf 99,1%. — Die Fe-Oxyde reagieren mit Quarz bei 950°, mit gefällter, geglühter SiO₂ bei 800° exotherm. — Fe₂SiO₄ läßt sich bei 850° durch H₂ leicht, FeSiO₃ dagegen schwer reduzieren. — Pyrit gibt mit CaO u. Kohle nur geringe Ausbeute an metall. Fe, da nur wenig FeO, dagegen Calcium-Eisen-Oxysulfid gebildet wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 129—130. Göttingen.) LÜDI

Ad. Fry, *Das Nitrierhärtungsverfahren der Fried.-Krupp-Aktiengesellschaft*. Das Nitrierhärtungsverf. wird Stickstoff im Entstehungszustand als härtendes Element verwendet, der schon bei 250° in das Eisen diffundiert. Der Vorteil besteht darin, das Verf. bei niedriger Temp., ohne Abschrecken u. ohne Formänderung der Werkstücke durchgeführt werden kann. Es werden eine Reihe von Werkstücken aufgeführt, welche mit Vorteil eine Oberflächenhärtung durch Nitrieren erhalten haben. (Kruppsche Monatshefte **7**. 17—24.) NEIDHARDT

E. Lepeyre, *Die Roheisenmischer*. Vf. beschreibt die verschiedenen Typen von Roheisenmischern u. ihre Zweckmäßigkeit. Allgemein haben die Mischer eine zylindrische Form, elektr. Antrieb, Heizung mit Gas u. erhitzter Luft, Temp. 1280—1300°. (Revue de Métallurgie **23**. 82—91. Paris.) LÜDI

George S. Evans, *Eisenraffination mit Hilfe von Alkalischlacke*. Vf. hat Kupolofen Verss. gemacht, das Gußeisen unter Zusatz von Na₂CO₃ zu raffinieren. Erzielte damit eine Verminderung des S-Gehaltes u. gleichzeitige Desoxydation. In den verschiedenen Chargen wurden 32—49% des vorhandenen S entfernt. (Foundry **180**—83. Cleveland [O.].) LÜDI

J. E. Hurst, *Das Graphiteutektikum im Gußeisen*. Vf. wendet sich gegen die allgemein geltende Ansicht über das stabile u. metastabile System Fe-C. Im Gegensatz zu HEYN usw. hält er Fe₃C für die stabile Phase. (Stahl u. Eisen **46**. 259—60. Düsseldorf.) LÜDI

L. Thibaudier und H. Viteaux, *Die Frage des Schienenstahles und seine thermische Behandlung auf dem Hüttenwerk Neuves-Maisons*. Vff. haben eingehende Verss. über die mechan. Eigenschaften des Schienenstahles in den verschiedenen Teilen des Profils angestellt. Es wird ein Verf. beschrieben, um für die an Eisenbahnschienen zu stellenden Beanspruchungen die günstigsten mechan. Eigenschaften zu erhalten. (Revue de Métallurgie **23**. 65—81. Paris.) LÜDI

A. Grützner, *Werkzeugstähle, ihre Auswahl und Verwendung*. (Metallbörse **2581**—82 [1925]. **16**. 61—62. 173—74.) BEHRL

T. Mc Lean Jasper, *Typische statische und Ermüdungsuntersuchungen des Stahls bei höheren Temperaturen*. Zuerst wird der Einfluß von Legierungszusätzen auf die Festigkeit von Schweißstählen bei höheren Temp. besprochen. Stat. Verss. über eine kurze Zeit an sehr festem Stahl u. an wenig C enthaltenden normalisierten Fe bei höheren Temp. werden dann mit langandauernden Verss. unter gleichen Bedingungen verglichen. Dabei zeigte sich besonders, daß von 205—315° die stat. Unt

lange Zeit Zugfestigkeiten ergaben, die bedeutend tiefer lagen als diejenigen, bei sonst üblichen Laboratoriumsunterss. erhalten werden. (Proc. Amer. Soc. Eng. Materials **25**. II. Techn. Papers. 27—32. 1925. Illinois, Univ.) WILKE.

Kurt Poppe, *Chrom-Nickel-Elektrostahl*. An Hand erfahrungsmäßiger Aufnahmen verschiedener Schmelzungen u. chem. u. Wärmebilanzen wird versucht, befriedigendes Verf. zur Herst. von hochprozentigem Cr-Ni-Stahl für ein Blocklicht von etwa 4,5 t zu finden. Dabei ergibt sich neben anderem: Die Länge Blöcke soll etwa gleich dem 3—5-fachen des größten Querschnittsmaßes sein; Dicke soll oben etwa 15—20% mehr betragen als unten. Als Blockquerschnitt fehlen sich regel- oder unregelmäßige Vielecke. Die Gußtemp. liegen etwa 100—1250° über dem F. des geschmolzenen Stahls. Elektro-Chrom-Ni-Stahl wird gewöhnlich zu kleinen Blöcken vergossen, so daß die radiale u. achsiale Ausscheidung von P, S u. C prakt. zu vernachlässigen ist. (Zentralbl. d. Hütten u. Walzw. **30**. 91—94. Duisburg.) WILKE.

G. Mars, *Fortschritte im Elektrostahlschmelzen*. Vf. gibt einen wirtschaftl. Vergleich Elektrostahlschmelzens mit dem Tiegelofen, dem Siemens-Martinverf. u. der Kleinemere, u. kommt zu dem Schlusse der Überlegenheit des Elektrostahles. (Gießerei-Zeitung **23**. 117—20. 154—59. Csepel-Budapest.) LÜDER.

Albert Müller-Hauff, *Die qualitative und wirtschaftliche Bedeutung des sauren Elektrostahles*. Vf. gibt einen Überblick über die metallurg. Vorgänge im sauren Elektrofluß, ihren Einfluß auf das Gefüge des Stahles, den Verlauf einer Schmelzung, Wirtschaftlichkeit u. Anwendungsgebiet. (Stahl u. Eisen **46**. 213—18. 289—94. Bismarck-O.S.) LÜDER.

Richard Thews, *Die Bleientsilberung*. (Metallbörse **16**. 62—63. 119—20. 175—31.) BEHRLE.

Richard Thews, *Das Kupfersteinschmelzen im Flammofen*. (Metallbörse **15**. 34. 2189—90. 2246—47. 2301 [1925].) BEHRLE.

W. Krey, *Beiträge zur elektrolytischen Raffination von Kupfer mit 1—2% Silber*. (Metallbörse **16**. 397—98. 453—54. 510—11. 566—67. Frankfurt a. M.) BEHRLE.

Glynne Lobley und Douglas Jepson, *Einfluß der Gase auf Kupfer bei hohen Temperaturen*. Elektrolyt. Cu wurde in einem besonderen Ofen in N₂-, H₂- u. CO-Atmosphäre auf verschiedene Temp. zwischen dem F. 1084° u. dem Kp. 2310° erhitzt u. 30 Min. auf dieser bestimmten Temp. dann gehalten. Das Metall wurde dann schnell abgekühlt u. auf Gasblasen, Härte u. Makrostruktur untersucht. Es zeigte sich, daß N₂ u. CO durch geschmolzenes Cu bis zu Temp. von 1900° u. 1700° nicht absorbiert werden, H₂ dagegen wird in verschieden starkem Maße bei allen Temp. bis 2200° herauf absorbiert u. beim Abkühlen u. Erstarren des Cu ausgeschieden, so daß sich Gashohlräume bilden. Der Betrag an H₂, der in den Hohlräumen zurückbleibt, scheint in Beziehung zu stehen zur Menge H₂, die beim Erstarren des Metalls frei wird. Die Gasblasenraum-Temperaturkurve fällt vom F. bis zu einem Minimum bei etwa 1350°, steigt dann auf ein Maximum bei 1750° u. fällt dann bei weiterem Temperaturanstieg. Die Makrostruktur zeigt einige Änderungen in der Korngröße, so daß die Ursachen ersichtlich wären. Die Brinellhärte weist keine Schwankungen auf, die größer wären als der Versuchsfehler, ganz gleich, welche Temp. oder welches Gas angewandt wurde. (Metal Ind. [London] **28**. 251.) WILKE.

Norman B. Pilling und George P. Halliwell, *Erweichen von stark gewalztem elektrolytischem Kupfer*. Die Erweichung von Cu (0,066% O₂, 0,003% Fe u. 0,002% S), wurde bei verschiedenen stark gewalzt u. dann auf Temp. unter 500° erhitzt worden war, ermittelt u. die quantitative Wrkg. dieser Veränderlichen festgelegt. Cu hat nach Pilling keine Minimaltemp. der Rekrystallisation, sondern erweicht wahrscheinlich bei einem sehr geringen Betrage bei gewöhnlicher Temp. Erweichung, wie sie bei dem Fall der Festigkeit angezeigt wird, geht sichtbar der Rekrystallisation

voran u. wird nicht durch eine Erhöhung der Härte hervorgerufen. Die Wrkg. sehr langen Erwärmens über die zur Erweichung notwendige Zeit hinaus ist niedrigen Temp. gering. Zum Schluß wird die bestmögliche Kombination Stärke der Kaltwalzung, Anlaßtemp. u. Anlaßdauer besprochen, die ein hochdu. Cu ergibt. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers. 97—119. Bayonne [N. J.], Internat. Nickel Co., East Pittsburgh [Pa.], Westinghouse Electric and Manufacturing Co.)

Landgraeber, *Molybdän, sein Vorkommen und seine Gewinnung.* (Metallbörse **15**. 2862 [1925].)

A. Sulfrian, *Die Veredelung des Aluminiums.* (Metallbörse **16**. 342—43 bis 99. 455—56. 567—68. 622—24.)

—, *Aluminium-Transportkessel.* Es wird empfohlen, Al als Baustoff für L. u. Transportgefäße zu verwenden. (Apparatebau **38**. 39—40.)

—, *Die Herstellung von Gold- und Silberflitter.* (Metallbörse **16**. 568—69.)

H. Serger, *Konservendosen-Weißblech.* Vf. erörtert die Beurteilung von *servendosenweißblech* u. die Normen dafür. Einwalzen von Sand, Ziegelstaub verursacht Porigkeit; die Narbigkeit beruht auf ungenügendem Beizen. Vf. teilt eine Tabelle die günstigste Zus. des Eisens für Dosenweißblech an u. teilt die schrift für die Ferricyankaliumgelatineprobe auf Porigkeit mit. (Chem.-Ztg. **50**. bis 202. Braunschweig.)

E. H. Dix, jr., *Eine Bemerkung über die Mikrostruktur von Aluminium-Legierungen hoher Reinheit.* Als Zwischenlegierung wurde eine Legierung mit 5,01% 0,03% Cu u. 0,01% Si hergestellt. Das Al bestand aus: 0,016% Cu, 0,020% 0,009% Si, kein Mn u. Zn. Die Mikrostruktur von langsam abgekühltem u. Schalenguß wird in Abbildungen wiedergegeben u. einige Beispiele von Saig. gezeigt, die in kleinen Schalengußstücken mit 0,8 cm Durchmesser erhalten wurden. In der Al-Ecke des Al-Fe-Systems bildet der Bestandteil FeAl₃ mit dem Al ein Eutektikum, das nur wenige % Fe enthält u. dessen Temp. dicht beim F. des Al liegt. bedeutender Unterschied in dieser eutekt. Konz. wird durch langsame Abkühlung u. durch Schalengußabkühlung bewirkt — eingehendere Verss. darüber werden ausgeführt. Die eutekt. Schalengußstruktur ist außerordentlich fein u. kann nur hohen Vergrößerungen gut festgestellt werden. — Außerdem wird die Wrkg. 1-wöchentlichen Anlassens bei einer der eutekt. Temp. nahen Temp. beschrieben. Beim Ätzen der Schiffe hat sich 1%ig. HF-Lsg. sehr gut bewährt; arbeitet man starken Vergrößerungen, so muß man noch verdünntere Lsgg. nehmen. Durch Ätzfl. wird die feste Lsg. der Metalle gel. u. FeAl₃ allmählich angefärbt. Weniger hat sich 1%ig. NaOH-Lsg. bewährt. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers 120—36. 1925. New Kensington [Pa.], Aluminium Co. of America.)

O. Bauer und **H. Arndt**, *Das Verhalten einiger Metalle und Legierungen über Plastilin und freiem Schwefel.* Vff. untersuchten den Einfluß von Plastilin, f. u. fl. S auf die Metalle Cu, Pb, Zn, Sn, Al, Mn u. Legierungen von Cu-Zn, Cu-Sn, u. Cu-Mn. Cu wird am stärksten angegriffen, Pb schwächer, Al, Sn u. Zn kaum verbar. Der Angriff auf Cu wird abgeschwächt durch Zusatz von Sn, in höherem Maße durch Al u. Zn, am kräftigsten durch Mn. Die geringe Affinität des Mn zum S noch leichter verbindet als Cu. (Ztschr. f. Metallkunde **18**. 85—88. P. Dahlem.)

R. R. Moore, *Einige Ermüdungsversuche an Nichteisenmetallen.* Es wurden untersucht: Schiffmessing (61,20% Cu, Rest Zn, 0,10% Pb, 0,43% Sn), Mg-Al-Leg. (0,026% Cu, 8,68% Al, 0,041% Fe, 0,023% Si, Rest Mg), Al (0,12% Cu, 0,49% 0,15% Si, Rest Mg) u. Mg (0,02% Fe, 0,02% Si, Rest Mg). Dabei ergab sich folgendes: Das Verhältnis der Ermüdungsgrenze zur Proportionalitätsgrenze u. der Zug-

ist für Nichteisenmetalle vollständig unbestimmt. Einige Leichtlegierungen (Duralumin, Mg-Al-Legierungen) haben bessere Ermüdungseigenschaften als gewalzter C-Stahl oder Legierungsstahl, aber nicht so gute wie die wärmebehandelten Erzeugnisse. Die gegossenen Mg-Al-Legierungen geben eine relativ hohe Ermüdungsgrenze im Vergleich zum geschmiedeten Material (nur 16,5% niedriger). Herabsetzung der Ermüdungsgrenze, die durch Einkerbungen verursacht wird, ist so stark bei den gegossenen Leichtmetallen wie bei den geschmiedeten; Probe aus reinem Mg u. Al wurden dabei stärker beeinflußt als die Legierung beider. Korbwrgk. scheint unabhängig von der Dehnung zu sein. Über längere Zeit ausgetestete Prüfungen lassen als sicher erscheinen, daß auch einige Mg-Al-Legierungen eine ausgesprochene Ermüdungsgrenze haben entsprechend den Stählen. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers. 66—96. 1925. U. S. Air Service, Dayton Field, Dayton, O.)

WILKE.

Richard Thews, *Beiträge zur Herstellung von Bronzelegierungen*. (Metallbörse) 1924—44. 456. 511—12. 568.)

BEHRLE.

F. D. Lynch, N. L. Mochel und P. G. Mc Vetty, *Die Zugfestigkeiten von Metallen bei hohen Temperaturen*. Die Zugfestigkeiten einiger Materialien, wie mittlerer C-Stahl (0,25% C, 0,63% Mn, 0,012% P, 0,037% S u. 0,11% Si), Ni-Stahl (0,09% C, 0,32 bis 0,45% Mn, 0,010% P, 0,027% S, 0,127% Si, 4,57% Ni u. 0,07% Cr), korrosionsbeständiges Fe (0,09% C, 0,52% Mn, 0,010% P, 0,017% S, 0,47% Si, 0,52% Ni u. 0,07% Cr) u. gegossene Mn-Bronze (58,4% Cu, 0,79% Sn, 0,68% Fe, 0,38% Mn, 0,031% Pb u. 0,71% Al) wurden nach verschiedener Wärmebehandlung bei 0 u. 500° untersucht. Neben den üblichen Zugunterss. innerhalb kurzer Zeit werden die Ergebnisse mit konstant gehaltenem Druck u. Temp. über eine längere Zeit gebracht. Die Verss. über eine lange Zeit lassen erkennen, daß der C-Stahl bei einer Belastung, die der der Fließgrenze entspricht, sich über rund 10 Tage mit einem gleichzeitigen Anwachsen der Zugfestigkeit u. Vermindern der Dehnbarkeit. Ähnliche Unterss. gerade über der Proportionalitätsgrenze zeigen eine zunehmende Dehnung während 50 Tage, dagegen gerade unterhalb dieser Grenze keine weitere Streckung zwischen dem 6. u. 40. Tage. Hieraus folgt, daß die Proportionalitätsgrenze beim Fe, so wie sie mittels des üblichen Zugverss. über kurze Zeit ermittelt wird, derjenige krit. Zug ist, unterhalb dem ein langsames Fließen nicht zu erwarten ist. Vorläufige Verss. bei Nichteisenmetallen zeigen im Gegensatz hierzu, daß diese krit. Grenze beträchtlich unterhalb der Proportionalitätsgrenze liegt. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers 5—26. 33—52. 1925. Westinghouse, Electric and Manufacturing Co., East Pittsburgh [Pa.])

WILKE.

Paul L. Irwin, *Ermüdung von Metallen durch direkten Zug*. Ein neuer App. wird beschrieben mit einer neuen Form der Zerreißstäbe. Aus den einander gegenübergestellten Ergebnissen folgt in allen Fällen, daß die Ermüdungsgrenze, die durch den Zug ermittelt worden ist, mit der durch Beugung ermittelten übereinstimmt. Es wurde bei folgenden Materialien gefunden: angelassener Stahl mit 0,15% C u. 0,68% Cr—2,93% Ni, 0,84% Cr u. 3,33% Ni-Stahl u. geschmiedete Mn-Bronze. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers 53—65. 1925. Westinghouse, Electric and Manufacturing Co., East Pittsburgh [Pa.])

WILKE.

F. Lucas, *Mikroskop und ultraviolettes Licht*. Eine neue ultraviolette mkr. Vorrichtung, die mit 275 $\mu\mu$ arbeitet, wird beschrieben u. Photographien gezeigt, die bekannten Strukturen erhalten werden. Hiernach kann man bessere Bilder erhalten als nach dem apochromat. System, doch soll noch weiteres Material später zur Verfügung gestellt werden. Günstig ist, daß das ultraviolette Licht selektive Eigenschaften über den einzelnen Bestandteilen in den Metallen hat, so wurde beim Fe folgendes festgestellt: Austenit reflektiert, Troostit absorbiert stark, Sorbit zeigt geringere Absorption als Troostit, aber mehr als Perlit, Perlit reflektiert, ebenso scheinen freie

Carbide u. Ferrit vollkommen zu reflektieren. (Iron Age **117**. 555—57. Bell Telephone Laboratories, Inc., New York.) WILKE

G. Tammann und **A. Müller**, *Über Verfahren zur Bestimmung der Orientierung der Krystallite in metallischen Konglomeraten*. (Vgl. S. 774.) Vff. besprechen die Verfahren zur Best. der Orientierung der Krystallite in Metallstücken, nämlich 1. die Best. des Winkels maximalen Glanzes der Krystallite einer polierten u. geätzten Schlißfläche, 2. die Erzeugung von Ätzfiguren u. 3. das Hervorrufen von Anlauffarben. Diese Verfahren werden bei den Metallen *Cu*, *Fe* u. *Zn* angewendet. (Ztschr. f. Metallkunde **18**. 69—71. Göttingen.) LÜDER

Friedrich Rinne, *Vorbilder für die Metallmechanik*. An Mineralien (Steinsalz, Graphit) die den Metallen physikal. nahe stehen, aber den Vorzug haben, durchsichtig zu sein, studierte Vf. die Erscheinungen der Spannung, der plast. Umformung u. des Bruchs durch opt. u. röntgenograph. Verss. (Ztschr. f. Metallkunde **18**. 37—42. 81—82. Leipzig.) LÜDER

P. Chevenard, *Differentialdilatometer mit mechanischer Registrierung*. (Rev. de Me. S. 216.) Vf. beschreibt ein Differentialdilatometer mit mechan. Registriervorrichtung. Eine Reihe von damit aufgenommenen Kurven sind der Arbeit beigelegt. (Rev. de Metallurgie **23**. 92—99. Paris.) LÜDER

U. Lohse, *Amerikas Gießereiwesen*. Es wird auf die weitgehende Mechanisierung der amerikanischen Gießereibetriebe in Fördereinrichtungen, Sandaufbereitung, Formmaschinen u. Putzerei hingewiesen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **70**. 357—60. Hamburg.) NEIDHARDT

Henry S. Rawdon, *Bemerkung über die Schutzwirkung des Cadmiums auf Eisen*. Einfache qualitative Unterss. zeigen deutlich, daß Cd zum Fe in denselben Beziehung steht wie Zn, sie verhindern also gleich stark den Korrosionsangriff auf Fe. Aus Potentialdifferenzen zwischen diesen 3 Metallen darf nicht ohne weiteres auf ihre Schutzwirkg. geschlossen werden. (Trans. Amer. Electr. Soc. **49**. 10 Seiten. Bureau of Standards.) WILKE

A. Kaufmann, *Spritzgußverfahren und Spritzgießmaschinen*. Das Wesen des Spritzgußverf. besteht darin, daß Weichmetalllegierungen in Dauerformen aus Sand gedrückt werden. Es werden eine Reihe von Spritzgußmaschinen durch Abbildungen u. Beschreibung erläutert u. die an sie zu stellenden Anforderungen besprochen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **70**. 285—90. Berlin-Tempelhof.) NEIDHARDT

E. Lüder, *Das Löten von Aluminium*. Bei Verwendung niedrig fließender Legierungen bewirkt der große elektrische Spannungsunterschied des Lots gegenüber Al, daß die Lötstelle bei Ggw. von Luft, Feuchtigkeit oder Salzslgg. sich leicht zersetzt (B. eines galvanischen Elements). Dieser Nachteil wird behoben durch dem Al in elektrolyt. Sinne ähnliche Lote, wie das *Edellot* „*Firinit*“ der Metallo-chem. Fabrik Dr. L. L. STOSKY, Berlin NW 87. Die Oxydhaut wird durch ein auf der Lötstelle in der Flamme zum Schmelzen gebrachtes Flußmittel entfernt. Nach diesem Hartlötverf. lassen sich auch Gußstücke reparieren, deren Gießfehler erst bei der nachfolgenden Bearbeitung zutage traten. (Apparatebau **38**. 57—58.) ASCHER

L. H. Marshall, *Brüchigkeit im Weichguß*. Der Guß zeigt oft nach Heißverzinkung Brüchigkeit. Es werden nun die Ergebnisse einiger Unterss. mitgeteilt, die diese Schwierigkeit überwinden lassen. Es zeigte sich, daß allein die Abschreckung nach der Verzinkungstemp. (das Zn-Bad wurde fortgelassen) die Brüchigkeit verursacht u. zwar liegt ein bestimmtes Temperaturintervall vor (300—550°), von dem das Abschrecken Brüchigkeit ergibt. Schreckt man aber von 600—750° ab, so erhält man weit bessere Eigenschaften als mit dem nicht abgeschreckten Material. Auch als das Material im Zn-Bad von einer Verzinkungstemp. von 600—750° abschreckte, war das Material einwandfrei u. zeigte keine Neigung zum Brüchigwerden. — In der Praxis hat sich dieses Verf. bewährt. (Iron Age **117**. 558—60. Ohio, Brass Co., Mansfield, Ohio.) WILKE

Lany J. Barton, *Das elektrische Raffinieren von Metallen*. VIII. u. IX. Mitt. II. vgl. Foundry **53**. 612; C. **1925**. II. 1559.) Gießpraxis. — Herst. von Stangen, haufen usw. — Kostenberechnung. (Foundry **53**. 657—60. 697—700. 708. 796—98. 25.)

BEHRLE.

Otto Haehnel, *Was versteht man unter Korrosion?* Gegen die Einführung der atakrystallinen Korrosion“ des Vf., wie sie beim Sn u. Pb beobachtet worden ist, 4. Untergruppe bei der Fraenkelschen Definition der Korrosion ist von verschiedenen Seiten Einspruch erhoben worden. Es wird gebeten, den Korrosionsbegriff neu festzulegen u. dementsprechend eine Aussprache hierüber einzuleiten. (Korrosion Metallschutz **2**. 42—43. Telegraphentechn. Reichsanst.)

WILKE.

Robert Stumper, *Über eigenartige Korrosionserscheinungen an Dampfkesselteilen*. (gl. S. 2405.) Die Korrosion eines kupfernen Verschlußstopfens an der Außenseite der Überhitzerdampfkammer wird auf die Wrkg. von Wasserdampf, tropfbar fl. W. Verbrennungsgasen zurückgeführt. (Feuerungstechnik **14**. 121—23. Burbacher-Stein, Saarbrücken.)

NEIDHARDT.

Frank F. Fowler, *Beschleunigte Korrosionsversuche an elektrischen Oberleitungen*. Die Laboratoriumsmethode wird beschrieben, die die korrodierenden Einflüsse der Atmosphäre, so wie sie in Stadt- u. Industriebezirken vorhanden ist, nachahmt, daß eine etwas beschleunigte Korrosion stattfindet. Der Untersuchungsapparat besteht aus einem geschlossenen Behälter mit einer Einrichtung zur Einführung von feuchter warmer Luft, feuchter Luft, verd. Rauch von bituminöser Kohle u. feinem Wassersprühregen. Diese 4 Sachen läßt man nacheinander (3, 1,5, 3 u. 0,5 Stdn.) aufeinander folgen. Die Proben bestehen aus 8 Stdn. einwirken u. wiederholt dies ungefähr 800-mal. Die Proben, bestehend aus: Cu, Al, mit Cu überzogenem Fe, verzinktem Fe u. einem neuartigen Leiter, der aus 6 verzinkten Fe-Drähten außen u. einem reinen Fe inneren Cu-Draht bestand. Die Proben wurden zuerst auf Festigkeit, Dehnung, chem. Zus., Gewicht des Zn-Überzuges usw. untersucht u. dann auf 100 Einwirkungen dasselbe wiederholt. Die Ergebnisse der Arbeit sind wie folgt: Cu- u. Al-Drähte u. -Stränge zeigen bis zu 302 Wiederholungen keinen stärkeren Korrosionsangriff. Es ist wenig Unterschied, zwischen der Korrosion von massivem Draht desselben Materials. Der oben erwähnte neuartige Leiter widersteht der Korrosion sehr gut. Die Korrosion beim verzinkten Fe u. Stahl ist umgekehrt, je höher der C-Gehalt ist. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers 137—55. 1925. Chicago, Ill.)

WILKE.

E. Blough, *Die Bewertung von Korrosionsuntersuchungen*. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials **25**. II. Techn. Papers 156—68. 1925. — C. **1925**. II. 2230.)

WILKE.

Julius Swoboda, *Über Rostschutzmittel*. (Seifensieder-Ztg. **53**. 141—42, 160—61, 173—77. 195—96. — C. **1926**. I. 1032.)

HELLER.

Erik Liebreich, *Deckschichten bei kathodischer Polarisation der Metalle*. Die Versuche an Cr, Fe u. Hg, die zeigten, daß bei schwacher kathod. Polarisation eine Periode des Spannungsbereichs auftritt, während welcher die Metalle die Neigung haben, verkorrodiert in Lsg. zu gehen, wurden erweitert u. auch auf Al u. Ni ausgedehnt. Dabei wurde die Salzbildung an den Metallen beobachtet u. in Mikrophotographien festgehalten. Es scheint, daß die im Laboratorium gemachten Beobachtungen zeitlich verkürzt, die selben Vorgänge zeigen, die sich in wesentlich längerer Zeit bei Stromlosigkeit an der Oberfläche der Metalle beim natürlichen Korrosionsvorgang abspielen. In engem Zusammenhang mit der beobachteten Salzbildung scheint der Befund von WURSTENBERGERS zu stehen, daß die Umgebung eines korrodierenden Metalles schwach alkalisch ist. Die oben erwähnte Periode des verstärkten Inlösungsgehens während der kathod. Polarisation kann man sich wie folgt erklären: Der erste entladene H₂ verschwindet durch Absorption im Elektrolyten oder noch wahrscheinlicher durch das Metall u. die zweite Periode dieser Weise an der Grenzfläche Metall-Elektrolyt im Überschuß vorhandenen

OH-Ionen reagieren mit dem Metall unter B. von Hydroxyden oder bas. Salzen, bei der mit steigender Polarisierung zunehmende H_2 diese Metallsalze wieder reduziert u. dann als Gasblase sichtbar wird. (Korrosion u. Metallschutz 2. 38—41. Berlin.) WIL

W. G. Perkins und Metals Production Ltd., London, *Behandlung von Erzen* Cu, Zn oder ähnliche Metalle enthaltende Erze werden mit Lsgg. ausgelaugt, welche NH_3 u. etwas CO_2 enthalten, die Fl. abgezogen u. der Rückstand mit NH_3 u. gegebenenfalls CO_2 enthaltendem Dampf behandelt, wobei die dem Erz anhaftende Lauge ohne Fällung von Metalloxyd ausgewaschen wird. Das Kondensat dient zum Auslaugen neuer Erzmengen. Oxyd. Erze, welche nicht in NH_3 l. Cu enthalten, werden zunächst durch Erhitzen auf 400° entwässert, dann bei 340° in einem reduzierenden Gas erhitzt Sulfid. Kupfererze werden bei 400 — 500° abgeröstet u. dann bei 300 — 355° reduzierend erhitzt. (E. P. 243 075 vom 22/8. 1924, ausg. 17/12. 1925.) KÜHLING.

Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf, *Härten von Stahlwaren*. Die Härtung erfolgt nur oberflächlich durch Eintauchen der Waren in hoch erhitztes Blei oder Salzbad. (E. P. 242 978 vom 5/11. 1925, Auszug veröff. 13/1. 1926. Prior. 17/11. 1924.) KÜHLING.

R. H. M. L. Tournié, Paris, *Herstellung von Stahl und Eisen*. Gewaschenes oder ungewaschenes Erz wird mit Flußmitteln u. gegebenenfalls kohlenstoffhaltigen Stoffen in einer oxydierenden Atm. geschmolzen u. die entstehende Schlacke zeitweilig entfernt. Das aus Fe u. Eisenoxyd bestehende Bad wird dann bis zur völligen Red. in einer reduzierenden Atm. erhitzt. (E. P. 245 223 vom 13/10. 1924, ausg. 28/1. 1926.) KÜHL.

Frederick Morton Murdoch, Sydney, *Kupfer aus Erzen u. dgl.* Die fein zer kleinerten, gegebenenfalls abgerösteten Erze, Konzentrate, Abfälle u. dgl. werden mittels einer gegebenenfalls NaCl enthaltenden Lsg. von $CaCl_2$, $MgCl_2$ oder $FeCl_3$ unter Einleiten von SO_2 ausgelaugt, wobei der gesamte Gehalt an Cu gel. wird. Die Lsg. wird gefiltert u. mittels einer Base, $Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$ o. dgl., gefällt. (Austr. P. 16 878 vom 14/3. 1924, ausg. 24/3. 1925.) KÜHLING.

T. R. Haglund, Stockholm, *Aluminiumgewinnung*. Ein geschmolzenes Gemisch von kristallin. u. amorphem Al_2O_3 wird elektrolysiert. Es wird die B. einer festen Kruste auf dem Bade vermieden. (E. P. 242 958 vom 5/10. 1925, Auszug veröff. 13/1. 1926. Prior. 5/11. 1924.) KÜHLING.

Metal Research Corp., übert. von: **C. E. Parsons**, New York, und **S. Peacock** Wheeling, V. St. A., *Herstellung von Aluminium*. Gemische von Al_2O_3 , Koks oder Holzkohle u. Alkalicarbonat oder -aluminat werden im Hochofen verschmolzen. (E. P. 245 421 vom 13/11. 1925, Auszug veröff. 24/2. 1926. Prior. 30/12. 1924.) KÜHLING.

Leopold Radó, Wien, *Verfahren, um Aluminiumblech zum Beschreiben und Bedrucken geeignet zu machen*. Das Blech wird sorgfältig gereinigt u. gebürstet u. dann mit einem Überzuge von Eiweiß (Hühnereiweiß, Bluteiweiß, Casein usw.) versehen. (Oe. P. 101 948 vom 5/12. 1923, ausg. 10/12. 1925.) KÜHLING.

Y. L. La Cour und F. O. M. Lindh, Helsingborg, Schweden, *Glühen von Legierungen*. Das Ausglühen der aus Cu, Zn, Sn, Pb u. Al oder einigen dieser Metalle bestehende Legierungen erfolgt in luftdicht verschlossenen u. gegebenenfalls mit inerten Gasen oder Stoffen, welche, wie Holzkohle, den O_2 der Luft aufnehmen, gefüllten elektr. Öfen. Es wird zunächst auf Glüh-temp. erhitzt, dann teilweise in demselben Ofen schließlich an der Luft gekühlt. (E. P. 243 006 vom 13/11. 1925, Auszug veröff. 13/1. 1926. Prior. 13/11. 1924.) KÜHLING.

Molybdenum Corp. of America, Pittsburg, übert. von: **E. A. Lucas**, Washington, V. St. A., *Molybdänlegierungen*. Gemische eines Flußmittels mit einer geeigneten Molybdänverb., vorzugsweise Mo_2O_3 , werden in das Bad des Metalles, vornehmlich geschmolzenes Fe oder Stahl, eingetragen, mit dem das Mo legiert werden soll, u. d

d. der Molybdänverb. mittels Kohle, Mn, Si o. dgl. bewirkt. (**E. P. 245 422** vom 11. 1925, Auszug veröff. 24/2. 1926. Prior. 30/12. 1924.) KÜHLING.

Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl, Heller & Co., Wien, *Trüben von Email*. r Vermeidung des Aufkochens beim Überbrennen werden den Trübungsmitteln f der Mühle außer dem üblichen Emaillierton noch wasserfreie oder wasserarme, rk aluminiumhaltige Stoffe, wie Feldspat, Ton, Kaolin usw. zugesetzt, welche zweck- ßig vor der Verwendung einem mäßigen Glühen bei unterhalb 1000° liegenden Temp. terworfen werden. (**Oe. P. 102 118** vom 13/5 1923, ausg. 28/12. 1925. D. Prior. 5. u. 18/5. 1922.) KÜHLING.

E. Liebreich, Halensee-Berlin, *Elektrolytische Herstellung von Chrombelägen*. Als Elektrolyt wird CrO₃ verwendet, welches höchstens 1,2% freie H₂SO₄ enthält u. durch hitzen auf 170—200° teilweise reduziert worden ist. Zur Erzielung grauer Chrom- äge werden Elektrolyte verwendet, welche 0,6—0,8% Säure enthalten u. auf 40—50° itzt werden, glänzende Beläge werden mit 0,8—1,2% Säure enthaltenden Elektro- en bei 15° erhalten. (**E. P. 243 046** vom 13/8. 1924, ausg. 17/12. 1925.) KÜHLING.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Karl Miescher, *Beiträge zur Farbenlehre*. Der erste Teil der Arbeit behandelt die nnzeichnung der Körperfarben, die Kennzeichnung farbiger Lichter, die Mischung biger Lichter u. Farbsysteme u. die Relativität der Farben. Der zweite Teil, der h mit der Messung der Farben beschäftigt, behandelt die Gegenfarbenlehre, die eifarbsonlehre, die Messung der Körperfarben u. die Messung farbiger Lichter. (Schr. f. Sinnesphysiologie **57**. 81 Seiten. 1925. Basel. Sep.) SÜVERN.

Friedrich Freude, *Bleifarben und ihre Herstellung*. (Metallbörse **16**. 538—39. 3—94. 649—50.) BEHRLE.

William C. Arsem, *Bodensatz und Verpackung gemischter Farben*. Ausflocken a Farben aus Farbmischungen u. Absetzen wird vor allem durch Säuregehalt des hervorgerufen. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 157—60. Schenectady [N. Y.].) GRI.

F. H. Rhodes und **J. S. Fonda**, *Faktoren zur Bestimmung der Klarheit und durchsichtigkeit von weißen Farben*. Mitteilung einer Formel zur Berechnung des ertes von weißen Farben unter Berücksichtigung von Klarheit u. Dicke des Filmes, f die bekannte Erscheinung, daß geringe Zusätze von Schwarz die Deckkraft weißer rben erhöht, wurde ebenfalls Rücksicht genommen, desgleichen auf den Einfluß er rauen Oberfläche. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 130—35. Ithaka [N. Y.].) GRI.

Compagnie Générale des Industries Textiles und **E. C. Duhamel**, Roubaix, ankreich, *Waschen und Bleichen von Faserstoffen*. Das Waschen erfolgt in einer ihe von Bädern; das erste Bad wird durch Zufluß von reinem W. auf konstantem veau gehalten, die schmutzigen Waschwässer des ersten Bades läßt man weglaufen, läßt dann den Inhalt des zweiten Bades in das erste Gefäß laufen usw. (**E. P. 3 360** vom 8/9. 1924, ausg. 20/1. 1925. Prior. 7/9. 1923.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Reinigungsmittel*. Das ttel besteht aus Sulfosäuren von arom. KW-stoffen mit mehr als 10 C-Atomen Mol., die im Kern nicht hydriert sind, u. höheren aliph. Alkoholen; falls e Sulfonsäuren gerbende oder leimfällende Eigenschaften besitzen, ersetzt man e höheren aliph. Alkohole ganz oder teilweise durch einen oder mehrere droaromat. Alkohole, der Mischung kann man W., KW-stoffe oder andere organ. W. wl. Stoffe zusetzen; als höhere aliph. Alkohole verwendet man Butyl-, Butyl-, Heptyl-, Octylalkohol oder ihre Homologen oder das bei der katalyt. Red. n CO mit H₂ u. darauffolgende fraktionierte Dest. erhältliche Gemisch; man ver- ischt z. B. die durch Kondensation von CH₂O u. Kresolsulfosäure oder Naphthalin- flosäure erhältlichen gerbenden Stoffe mit W. u. Cyclohexanol. Die Reinigungs-

mittel werden durch hartes W. oder durch Säuren nicht zersetzt, sie eignen sich besonders zum Behandeln von *Textilstoffen*. (E. P. 244 104 vom 3/12. 1925, Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 5/12. 1924.)

FRANZ.

Charles Samuel Bedford, Leeds, *Beizen und Färben von Wolle*. Man beizt Wolle mit der erforderlichen Menge Dichromat in Ggw. von Reduktionsmitteln, v. Glycerin, Glucose, Stärke, Invertzucker, Dextrin, Urin, Gerbstoffextrakte, u. e. Säure, wie Essig-, Ameisen-, Milchsäure, HCl, H₂SO₄; man verwendet etwa 1—1¹/₂ Dichromat, berechnet auf das Gewicht der Wolle, man beizt aus kochender Flüssigkeit nach Beendigung des Beizens neutralisiert man mit Alkalien oder macht schwach alkal., gibt den Farbstoff, Blauholz, Hämatin, Gelbholz usw., Alizarin, Gallocyanine oder andere Chrombeizenfarbstoffe zu; die so erhaltenen Färbungen zeichnen sich durch ihre Licht-, Walk- u. Pottingechtheit aus. (E. P. 236 388 vom 19/7. 1925, Auszug veröff. 30/7. 25.)

FRANZ.

Charles Samuel Bedford, Leeds, *Beizen und Färben von Wolle*. Man beizt Wolle mit 1—2% Na- oder K-Dichromat, berechnet auf das Gewicht der Wolle um Zusatz eines geringen Überschusses eines Gemisches von 1 Teil HCl, 32° Tw. u. 1,5 Teil Milchsäure (50%ig) auf je 1 Teil Dichromat, nach Beendigung des Beizens wird Soda schwach alkal. gemacht u. der Farbstoff, Blauholz, Hämatin, Gelbholz oder andere natürliche Farbstoffe, Alizarin, Gallocyanine usw. zugesetzt, nach einiger Zeit wird das Bad durch Zusatz von Essigsäure oder einer anderen Säure angesäuert, 3/4 Stdn. gefärbt, die hiernach erhaltenen Färbungen zeichnen sich durch ihre Licht-, Walk- u. Pottingechtheit aus. (E. P. 237 054 vom 22/5. 1924, ausg. 14/8. 1925.)

Action-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, *Färben von Jute-, Kokosnußfaser und dergl.* Um ein möglichst gleichmäßiges Durchfärben der Faser zu erzielen, setzt man dem Färbebad oder dem Netzbade Sulfitecelluloseablaugen zu, an Stelle der Sulfitablauge kann man auch ihre wirksamen Bestandteile, wie Salze der Ligninsulfosäure, oder ihre Chlorierungs-, Oxydations-, Dialysierungs- oder Gärungsprodd. verwenden. (E. P. 236 525 vom 5/5. 1925, ausg. 26/8. 1925. D. Prior. 4/7. 1924.)

FRANZ.

Two-Tone Corporation, übert. von: **P. Mijer**, New York, V. St. A., *Färben von Geweben*. Man färbt das Gewebe in einer geschlossenen Kammer mit Hilfe eines nebelartig zerstäubten Farbstofflsg., Nebel werden vor dem Eintritt in die Kammer von allen gröberen Teilen befreit, das Gewebe wird durch den unteren Teil der Kammer bewegt, nach dem Verlassen der Kammer gelangt das Gewebe in eine Trockenvorrichtung durch Teilen der Kammer u. Einblasen verschiedener Farbstoffnebel kann man verschiedene Färbungen erhalten, das Gewebe kann einseitig mit einem Farbstoff u. oder der Rückseite mit einem anderen Farbstoff gefärbt werden; durch Falten des Gewebes kann man verschiedene Muster erzeugen. Zur Verhütung von Tropfenbildung sind in der Decke der Kammer Heizröhren angebracht. (E. P. 236 539 vom 22. 1925, Auszug veröff. 26/8. 1925. Prior. 5/7. 1924.)

FRANZ.

Textilwerk Horn Akt.-Ges., Horn, Schweiz, *Färben*. Man behandelt eine substantiven Farbstoffen gefärbte pflanzliche Faser mit aromatisierten Sulfochloriden, so behandelte Faser wird dann nicht mehr von substantiven Farbstoffen angefärbt, sie kann mit sauren, bas. oder Beizenfarbstoffen gefärbt werden. (E. P. 236 511 vom 30/6. 1925, Auszug veröff. 26/8. 1925. Prior. 3/7. 1924. Zus. zu E. P. 1956; C. 1923. IV. 330.)

FRANZ.

Jeanne Marie Escaich und **Jean Paul Worms**, Paris, *Färbverfahren*. Man färbt die tier. Faser oder tannierte pflanzliche Faser aus einem Bade, das Nitrite-Metallsalze gelöst enthält, man färbt z. B. Wolle aus einer Lsg. von Natriumnitrit u. Kupfersulfat, oder tannierte Baumwolle aus einer Lsg. von NaNO₂ u. ZnSO₄. (E. P. 237 157 vom 19/1. 1925, ausg. 14/8. 1925.)

FRANZ.

Two-Tone Corporation, übert. von: **P. Mijer**, New York, *Färben von Geweben*. Die Gewebe werden in gespanntem Zustande der Einw. von nebelförmig zerstäubten Farbstofflsgg. ausgesetzt. (E. P. 237 230 vom 23/6. 1925, Auszug veröff. 9/9. 1925. Prior. 16/7. 1924.) FRANZ.

Scottish Dyes Limited, Ernest George Beckett und John Thomas, Carlisle, Cumberland, *Färben von Celluloseacetat*. Man färbt mit Lsgg. oder Suspensionen von Oxyanthrachinonen, die außerdem noch eine oder mehrere Oxygruppen, aber nicht o-Stellung zueinander, oder ein Halogenatom, aber keine Aminogruppe enthalten. 5-Dioxyanthrachinon, 1-Oxy-4-chloranthrachinon, 1,6-Dioxyanthrachinon, 1,6-Dioxychloranthrachinon färben Celluloseacetatseide gelb, 1,4-Dioxyanthrachinon orange, 5-Oxy-1,4-dioxyanthrachinon, 1,4,6-Trioxyanthrachinon u. 1,4,6-Trioxy-2-chloranthrachinon rötlichgelb, die Färbungen sind sehr lichtecht. (E. P. 238 936 vom 26/5. 1924, Ausg. 18/9. 1925.) FRANZ.

Ernest Haefely, Creil, Oise, Frankreich, *Erzeugung von Färbungen auf der pflanzlichen Faser*. Man tränkt die Baumwolle mit den *Kondensationsprodd.*, die man durch Einw. von Aldehyden auf *unsulfonierte Amine* der Bzl.- oder Naphthalinreihe oder deren Substitutionsprodd. in Ggw. von Säuren erhält, diazotiert auf der Faser u. entwickelt mit β -Naphthol oder dergl. Das Kondensationsprod. aus o-Anisidin u. H_2O liefert nach dem Diazotieren auf der Faser u. Entwickeln mit β -Naphthol bläulich-rote Färbungen; das Kondensationsprod. aus Diaminodiphenylmethan u. H_2O liefert mit β -Naphthol lebhaft orange Färbungen. (E. P. 239 634 vom 27/6. 1924, ausg. 8/10. 1925.) FRANZ.

British Dyestuffs Corp. Ltd., Leslie Gordon Lawrie und Harald Blackshaw, Manchester, *Beizen und Färben von Celluloseacetat*. Zum Beizen der Celluloseacetatseide verwendet man die Metallsalze der Sulfocycansäure, aromatis. Carbon- oder Oxy-carbonsäuren, wie z. B. die Al-, Fe- oder Cr-Salze der Sulfocycansäure, Salicyl-, Benzoe-, Phthalsäure. Man behandelt die Celluloseacetatseide mit einer Lsg. von *Aluminiumsulfocyanat* bei 75°, hierauf bei 35° mit Sodalsg., nach dem Spülen färbt man mit Alizarin unter Zusatz von Kalk u. seift, an Stelle des Alizarins kann man andere Beizenfarbstoffe, Anthracenblau, Hämatin verwenden. (E. P. 240 293 vom 23/9. 1924, ausg. 22/10. 1925.) FRANZ.

Burgess, Ledward & Co. Ltd., Fred Scholefield und Norman Denner, Manchester, *Färben von Viscosekunstseide*. Die Viscosekunstseide wird während des Färbens, meistens entschwefelt; zum Färben mit substantiven Farbstoffen setzt man der Farbflotte Natriumsulfit zu; um die Viscoseseide mit bas. Farbstoffen zu färben, wird die Kunstseide zunächst mit Tannin unter Zusatz von Natriumsulfit gebeizt u. dann entweder mit Brechweinstein behandelt u. gefärbt oder erst gefärbt u. dann mit Brechweinstein behandelt, bei Entwicklerfarbstoffen setzt man das Entschwefelungsmittel dem diazotierbaren Amin, z. B. Primulin zu, spült, diazotiert u. entwickelt mit β -Naphthol, zur Erzeugung von Eisfarben setzt man das Natriumsulfit nach der Erzeugung des Farbstoffes dem Seifenbade zu, Schwefelfarbstoffe färbt man in üblicher Weise unter Zusatz von Alkalisulfiden, beim Färben von Viscoseseide mit Küpenfarbstoffen setzt man nach dem Färben mit der Hydrosulfitküpe der Küpe Alkalisulfid zu. (E. P. 239 981 vom 1/8. 1924, ausg. 15/10. 1925.) FRANZ.

Samuel Wright Wilkinson, Westminster, London, *Färben von Wolle, Leder, Pelzen und anderen tierischen Fasern*. Man behandelt die tier. Faser vor dem Färben mit NH_3 u. ozonisierter Luft; hierdurch wird Aufnahmefähigkeit der tier. Faser für Farbstoffe erhöht. (E. P. 242 027 vom 25/6. 1925, ausg. 26/11. 1925.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Färbeverfahren*. Man setzt der Farbflotte oder den Netzbädern propylierte oder butylierte aromatis. Sulfonuren oder ihre Salze oder solche Derivv. anderer cyclischer KW-stoffe in Anwesenheit höherer aliphatischer Alkohole zu. Der Zusatz der Stoffe erhöht die Gleich-

mäßigkeit u. Reibechtheit der Färbungen. Man färbt z. B. Wolle im Stück mit sa Wollfarbstoffen unter Zusatz des Na-Salzes der *i*-Propylnaphthalinsulfonsäure; unreine Wolle wird vor dem Färben mit der Lsg. des genannten Salzes genetzt. Färben von roher unabgekochter Baumwolle mit Küpenfarbstoffen setzt man Küpe das Na-Salz der Butylnaphthalinsulfonsäure zu. Die Zusätze können auch Färben von Baumwollgarn mit substantiven Farbstoffen oder beim Färben mit wicklerfarbstoffen gemacht werden. (E. P. 242 233 vom 8/8. 1925, Auszug vom 23/12. 1925. Prior. vom 30/10. 1924.) FRAN

British Celanese Limited, London, **George Holland Ellis** und **William C. land Goldthorpe**, Spondon b. Derby, Färben und Bedrucken von Celluloseacetat. färbt Celluloseacetat mit unl. oder nahezu unl. Farbstoffen unter Zusatz von fonierten höheren Fettsäuren, wie Ricinusölsulfonsäure, u. Lösungsmm., wie Trichloräthan, Trichloräthylen, Kresole, Alkylaniline, Toluidine, Chlorphenole, C. benzole, Hexahydrophenole, -kresole, -benzol, Dekahydronaphthalin, Tetrahydronaphthalin. Man behandelt z. B. einen unl. Farbstoff mit Ricinusölsulfonsäure u. einer der genannten Lösungsm. in beliebiger Reihenfolge oder gleichzeitig u. gießt die haltene Lsg. in W. Zum Färben kann man unl. Azofarbstoffe, Aminoanthrachinderiv., Dinitrodiphenylaminderiv., indigoide Farbstoffe usw. verwenden. (E. P. 242 711 vom 14/8. 1924, ausg. 10/12. 1925.) FRAN

British Celanese Ltd., London, **George Holland Ellis** und **Ernest Greenha** Spondon b. Derby, Bedrucken von Celluloseacetat. Die Druckpasten enthalten n einem unl. Farbstoff Quellungsmittel für Celluloseacetat, wie Alkalithiocyanat, $Zn(NO_3)_2$, $ZnCl_2$ oder Salze von organ. Sulfonsäuren; man vermischt den Farbstoff mit 2,4-Dinitrobenzol-1-azodimethylanilin mit einem Dispersionsmittel, wie ricinsäurem Na, Soda, Ammoniumthiocyanat, W. u. einem Verdickungsmittel; als Quellungsmittel kann man auch Benzol-, Naphthalin-, Anthracen-, Phenol-, Naphthol-, Amino-naphtholsulfonsäuren verwenden. (E. P. 244 143 vom 28/7. 1924, ausg. 1926.) FRAN

British Dyestuffs Corp. Ltd., **William Henry Perkin** und **Cecil Hollins**, Manchester, Färben von Celluloseacetat. Man färbt mit den völlig mit nicht aromat. Säuren acidylierten Amino-, Diamino-, Polyaminoanthrachinonen oder ihren Substituten prodd. und darauffolgende Nitrierung erhältlichen Prodd., die gegebenenfalls hydrolysiert u. reduziert werden können. Diacetyl-1,8-diaminoanthrachinon liefert in H₂SO₄ mit HNO₃ ein Mononitrodiaacetyldiaminoanthrachinon, Krystalle aus Chlorbenzol, Celluloseacetatseide in braunen Tönen anfärbt. Nach der Red. mit SnCl₂ u. HCl erhält man Diacetyltriaminoanthrachinon, das Celluloseacetatseide karmin färbt. Die Hydrolyse von Mononitrodiaacetyl-1,8-diaminoanthrachinon mit konz. H₂SO₄ ergibt man Mononitrodiaminoanthrachinon, das Celluloseacetatseide rot färbt, Dinitrodiaminoanthrachinon liefert braune Töne; ebenso sind die 2- u. 4-Nitroanthrachinonylurethane Farbstoffe für Celluloseacetatseide. (E. P. 244 267 vom 16/12. 1924, ausg. 7/1. 1926.) FRAN

British Celanese Ltd., London, und **George Holland Ellis**, Spondon b. Derby, Färben und Bedrucken von Celluloseacetat. Man färbt Celluloseacetat mit unl. oder swl. Farbstoffen oder Farbstoffe liefernden Verbb., unter Verwendung von Sulfonbenzolfettsäuren (Twitchell-Spalter) oder deren Deriv., wie Sulfophenolstearinsäure, Sulfonaphthalinstearinsäure usw. als Verteilungsmittel. Man erwärmt z. B. 25 kg Naphthalin mit 25 kg Ölsäure auf 80° u. trägt die Mischung nach dem Abkühlen unter heftigem Rühren langsam in 100 kg 20%iges Oleum bei Temp. unter 40° ein, u. Beendigung des Eintragens erwärmt man 3 Stdn. auf etwa 100°, nach dem Abkühlen gießt man in 250 Liter W., gibt 50 kg NaCl zu, trennt vom W. u. wäscht das Produkt mit 20%iger Salzlg. Mit diesem Prod. werden die unl. Farbstoffe vermischt, dann mit sd. W. verd. Zum Färben verwendet man unl. Azofarbstoffe, nichtreduzier-

phenole, wie Arylbenzo- oder -naphthochinonimine, Oxazine, Azine, Thiazine, Igoide Farbstoffe usw. (E. P. 242 393 vom 19/9. 1924, ausg. 3/12. 1925. **Zus. zu P. 219349; C. 1924. II. 2703.)** FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Färben von Celluloseestern und -äthern*. Man färbt mit bas. Monoazofarbstoffen, die eine Sulfamino-Gruppe in der Diazokomponente enthalten; das Hydrochlorid des Monoazofarbstoffes aus diazotiertem 4-Aminobenzol-1-sulfamid u. Aminokresol färbt Celluloseacetatseide 70° nach Zusatz von Ammoniumacetat in echten goldgelben Tönen an; der Farbstoff aus diazotiertem 2-Nitranilin-4-sulfamid u. m-Toluidin färbt orange, der aus diazotiertem 4-Aminobenzol-1-sulfonamid u. a-Naphthylamin rötlich orange. (E. P. 243 737 vom 25/11. 1925, Auszug veröff. 27/1. 1926. Prior. 25/11. 1924.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Färben von Celluloseestern und -äthern*. Man färbt mit Monoazofarbstoffen aus unsulfonierten Diazoverbb. arom. Aminen der Benzol- oder Naphthalinreihe, die wenigstens eine Nitrogruppe enthalten, u. Diäthylanilin-m-sulfosäure oder ihren Derivv.; der Monoazofarbstoff aus diazotiertem 3-Nitro-2-methyl-1-aminobenzol u. Diäthylanilin-m-sulfosäure färbt Celluloseacetatseide in echten goldgelben Tönen, der Farbstoff aus diazotiertem Chlor-2-nitranilin oder 3-Nitranilin-6-carbonsäureester färbt orange, der aus diazotiertem 2,4-Dinitranilin rötlich violett. (E. P. 243 738 vom 25/11. 1925, Auszug veröff. 27/1. 1926. Prior. 25/11. 1924.) FRANZ.

British Celanese Ltd., London, und **George Holland Ellis**, Spondon b. Derby, *Färben und Bedrucken von Celluloseacetat*. Die Lichtechtheit von Celluloseacetatfärbungen wird durch Nachbehandeln mit Aminen oder ihren Substitutionsprodd., Anilin, Alkylaniline, Alkylphenylendiamine usw. verbessert; die Amine können als solche oder als l. Salze verwendet werden. (E. P. 243 841 vom 23/9. 1924, ausg. 12. 1925.) FRANZ.

British Enka Artificial Silk Co. Ltd., London, übert. von: **Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Kunstzijdefabriek**, Arnhem, Holland, *Färben von Viskosekunstseide*. Die färber. Eigenschaften der Viskosekunstseide werden von der Menge an Nichtcellulosestoffen beeinflusst; die Absorptionsfähigkeit für Farbstoffe wird durch Erhöhung des Gehaltes an Oxycellulose erhöht, der Gehalt an Oxycellulose kann durch Erhitzen der Kunstseide an der Luft, oder durch Behandeln mit NaOCl-Lsg. erhöht werden, das Aufnahmevermögen für Farbstoffe wird durch Entfernen der Oxycellulose, Hemi- oder Hydrocellulose vermindert, es kann dies durch Erhitzen mit Glycerin auf 150° geschehen. (E. P. 244 496 vom 15/12. 1925, Auszug veröff. 2. 1926. Prior. 15/12. 1924.) FRANZ.

L. B. Holliday & Co., Ltd. und **Alexander Young**, Huddersfield, York, *Färben von Celluloseacetat*. Zum Färben verwendet man die Kondensationsprodd. aus 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol-6-sulfosäure oder 1-Chlor-2,6-dinitrobenzol-4-sulfosäure mit einem arom. Amin oder einer Oxyverb.; durch Kondensation von 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol-6-sulfosäure mit Anilin in Ggw. von Na-Acetat erhält man 2,4-Dinitro-6-sulfodiphenylamin. (E. P. 244 936 vom 24/1. 1924, ausg. 21/1. 1926.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Färben von plastischen Massen*. Plast. Massen, mit Ausnahme solcher aus Cellulosederivv., werden mit dem Farbstoff auf mechan. Wege so lange vermischt, bis der Farbstoff nahezu kolloidal in der plast. M. verteilt ist u. sich beim Lösen der plast. M. nicht mehr absetzt; man kann auf diesem Wege Kautschuk, Wachse, Harze, wie Schellack usw. färben. (E. P. 245 274 vom 26/10. 1925, Auszug veröff. 23/12. 1925. Prior. 3/11. 1924.) FR.

Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques Nord Réunis, Établissement Kuhlmann, Seine, Frankreich, *Braune Färbungen* auf der Faser. Man behandelt die aus CH₂O u. Anilin, seinen Homologen oder ihren Derivv. in saurer Lsg. erhältlichen Kondensationsprodd. mit Oxydationsmitteln; man

tränkt z. B. Baumwolle mit einer Lsg. des Kondensationsprod. aus CH_2O u. Ammoniak geht nötigenfalls durch ein Bad von NaOH oder Soda, wäscht u. oxydiert mit einer verd. schwefelsauren Lsg. von Dichromat oder Persulfat, hierauf wird gespült u. abge- seift, man erhält wasch-, alkali-, chlor- u. lichtechte braune Färbungen, der Farbstoff kann durch Diazotieren u. Entwickeln auf der Faser mit β -Naphthol usw. oder durch Nachbehandeln mit Diazoverbb. verändert werden; man kann die Baumwolle auch mit einer milchsauren Lsg. des Kondensationsprod., Natriumchlorat, Natriumacetat, Kupfersulfat oder Vanadinsalz tränken, 6 Stdn. bei 40° oxydieren u. mit Bismut- matlsg. entwickeln, durch Aufdrucken von Reduktionsmitteln, Sulfite, Disulfid, Hydrosulfite usw. erhält man Weißreserven, bei Zusatz von Farbstoffen zu den Reduktionsmitteln entstehen Buntreserven. Zum Bedrucken vermischt man das Kondensations- prod. mit Traganthverdickung, druckt, trocknet, fixiert erforderlichenfalls durch Be- handeln mit Alkalilsg. u. entwickelt mit Persulfat, man kann das Kondensationsprod. auch gleichzeitig mit Alizarin- oder Küpenfarbstoffen aufdrucken u. dann mit einem Oxydationsmittel entwickeln. (F. P. 595 705 vom 27/6. 1924, ausg. 8/10. 1925. I.)

C. A. Klein, Brimsdown und **R. S. Brown**, London, *Titanhaltige Farbstoffe*. Titanerz wird mit BaCO_3 bei Ggw. eines Flußmittels, wie Flußspat u. einem Reduktionsmittel geschmolzen, oder mit BaSO_4 geglüht, wobei SO_3 entweicht, u. der Rückstand mit Kohle verschmolzen wird. Die Erzeugnisse werden gemahlen, magnet. geschied., der nicht vom Magneten zurückgehaltene Anteil mit H_2SO_4 zum Brei angerührt u. in sd. W. eingetragen, welches Aldehyde, Zucker, Stärke o. dgl. enthält, welche in Lsg. halten. Der von der Lsg. getrennte Nd. besteht aus TiO_2 u. BaSO_4 . (E. P. 243 081 vom 25/8. 1924, ausg. 17/12. 1925.) KÜHLING.

Leopold Cassella & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Georg Kalischer**, Fechenheim a. M. und **Karl Keller**, Frankfurt a. M.), *Herstellung von unlöslichen Azofarbstoffen auf der pflanzlichen Faser*, darin bestehend, daß man Azobenzol bzw. Azoderivv. der 2,3-Oxynaphthoesäurearylide in alkal. Lsg. auffärbt, spült u. mit Diazoverbb. entwickelt. — Die Azoxy- bzw. Azoderivv. der 2,3-Oxynaphthoesäurearylide besitzen eine ausgezeichnete Verwandtschaft zur pflanzl. Faser, die erhaltenen Färbungen sind sehr farbstark u. reibecht; das Verf. eignet sich auch für die Apparatenfärberei. Die Azoxy- bzw. Azoderivv. erhält man durch alkal. Reduktion der 2,3-Oxynaphthoesäurenitrilanilide. (D. R. P. 422 467 Kl. 8m vom 12/4. 1924, ausg. 2/12. 1925.) FRANZ.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., übert. von: **Farbwerke I. G. fabrikanten vorm. Friedr. Bayer & Co.**, Leverkusen b. Köln a. Rh., *Wasserunlösliche Azofarbstoffe*. Man vereinigt die Tetrazoverb. eines Diamins, das keine Sulfogruppe enthält, mit einem weiterdiazotierbaren Amin, tetrazotiert u. kuppelt mit 2,3-Oxynaphthoesäurearyliden; die Herst. der Farbstoffe kann in Substanz oder auf der Faser erfolgen. Man vereinigt z. B. die Tetrazoverb. des Dianisidins mit 1-Naphthylamin tetrazotiert u. kuppelt mit 2,3-Oxynaphthoesäureanilid, auf der Faser erhält man schwarze Färbungen; an Stelle des Dianisidins kann man Tolidin, p,p-Diaminodiphenylamin usw. verwenden. (E. P. 216 527 vom 22/5. 1924, ausg. 16/7. 1925. D. Prior. 22/5. 1923. Zus. zu E. P. 211 752; C. 1925. I. 3027.) FRANZ.

British Dyestuffs Corp., Ltd., **James Baddiley**, **James Hill** und **Albert Rile**, Manchester, *Azofarbstoffe für Wolle*. Man läßt 1 Mol. CH_2O auf 1 Mol. des Hydrochlorides einer aromat. Base einwirken, diazotiert die erhaltenen Basen u. kuppelt mit Sulfonsäuren von Kupplungskomponenten, wie Pyrazolon-, Naphthol-, Naphthylamin- oder Aminonaphtholsulfonsäuren. Die Farbstoffe färben Wolle in walkechten Tönen. (E. P. 243 115 vom 17/9. 1924, ausg. 17/12. 1925.) FRANZ.

British Dyestuffs Corp., Ltd., **Kenneth Herbert Saunders** und **Harold Goodwin**, Manchester, *Azofarbstoffe*. Man vereinigt die Diazoverb. von 1-Amino-2-oxi-3-carboxynaphthalin-6-sulfonsäure mit Pyrazoloncarbonsäuren; die so erhaltenen

stoffe eignen sich zum Chromdruck für Baumwolle. Der Farbstoff aus diazotierter *ino-2-oxy-3-carboxynaphthalin-6-sulfonsäure* und 1-3'-Carboxyphenyl-3-methyl-pyrazolon liefert mit Chrombeize auf Baumwolle rosa Töne, mit 1-3'-Carboxyphenyl-pyrazolon-3-carbonsäure erhält man einen Farbstoff, der mit Chrombeize auf Baumwolle blaurote Drucke liefert, mit 1-3'-Oxaminophenyl-3-methyl-5-pyrazolon entsteht ein Farbstoff, der mit Chrombeize auf Baumwolle gedruckt blaurote Töne gibt; die *ino-2-oxy-3-carboxynaphthalin-6-sulfosäure* erhält man durch Sulfonieren der *xynaphthoesäure*, Vereinigen der so erhaltenen Sulfonsäure mit Diazobenzol, des Azofarbstoffes. (E. P. 242 061 vom 22/10. 1924, ausg. 26/11. 1925.) FRANZ. **Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning**, Höchst a. M., *Azofarbstoffe*. Man diazotiert Diazoverbb. mit den 1-Sulfoaryl-5-pyrazolon-3-carbonsäurealkylestern man verestert die Farbstoffe aus Diazoverbb. u. 1-Sulfophenyl-5-pyrazolon-3-carbonsäure. Die Farbstoffe färben Wolle in gleichmäßigen gelben bis roten Tönen; aus den Diazoverbb. der Anthranilsäure oder o-Aminophenolen hergestellten Farbstoffen können auf der Faser nachchromiert werden. Als Diazokomponente kann man verwenden die Toluidine, Chloraniline, Chlortoluidine, Xylidine, Aminobenzoesäureester, Nitroaminobenzoesäureester, m-Aminobenzoesäureanilid, m-Aminoanisilid, o-Aminophenol u. seine Substitutionsprodd., Anilinsulfosäuren u. ihre Substitutionsprodd., Mono- u. Diaminotriphenylmethan, Diaminodiphenyldimethylen, 2,2'-Tolidin, 2,2'-Dichlorbenzidin. Die Pyrazoloncarbonsäureester erhält man durch Kondensation der Sulfoarylhydrazinsulfosäuren u. Oxalessigester in wss. schwacher Lsg., man erhält so den 1-(4'-Sulfophenyl)-5-pyrazolon-3-carbonsäureäthyl- oder -methyl-ester, 1-(2'-Methyl-6'-chlor-4'-sulfophenyl)-5-pyrazolon-3-carbonsäureäthylester, 1-(2'-Dichlorphenyl)-, 1-(2'-Chlor-5'-sulfophenyl)-, 1-(2'-Oxy-3'-carboxy-5'-sulfophenyl)-pyrazolon-3-carbonsäureester. (E. P. 243 758 vom 27/11. 1925, Auszug veröff. 27/11. 1924.)

FRANZ.

G. Farbenindustrie A.-G., übert. von: **Farbenfabriken vorm. Friedr. & Co.**, Leverkusen b. Köln a. Rh., *Azofarbstoffe und deren lösliche Metallverbindungen*. Die Azofarbstoffe aus diazotiertem o-Aminobenzaldehyd oder seinen Substitutionsprodd. werden mit *Hydroxylamin* behandelt, die so erhaltenen Farbstoffe können in Substanz oder auf der Faser mit Metallverbb. behandelt werden. Die Farbstoffe aus o-Aminobenzaldehyd u. 2-Phenylamino-8-naphthol-6-sulfosäure, 1-Äthyl-8-naphthol-3,6-disulfosäure oder 4-Sulfophenylmethylpyrazolon liefern nach Behandeln mit Hydroxylaminchlorhydrat in Ggw. von Na-Acetat Farbstoffe, die in braunen, gelben u. roten Tönen färben; die Färbungen können mit Chrom-Kupferverbb. nachbehandelt werden; die primären Disazofarbstoffe aus 1 Mol. 2-Oxy-2,2'-dinaphthylamin-7,7'-disulfosäure u. 2 Moll. diazotiertem o-Aminobenzaldehyd oder einem Mol. o-Aminobenzaldehyd u. 1 Mol. Anthranilsäure geben nach Behandeln mit Hydroxylaminhydrochlorid u. Na-Acetat Farbstoffe, die in roten u. braunen Tönen liefern, die Baumwolle direkt in violetten u. bräunlich roten anfarben. (E. P. 245 128 vom 21/12. 1925, Auszug veröff. 17/2. 1926. Prior. 1924.)

FRANZ.

G. Farbenindustrie A.-G., Leverkusen, übert. von: **Farbenfabriken vorm. Bayer & Co.**, Leverkusen b. Köln a. Rh., *Azofarbstoffe*. Man vereinigt Diazobenzol mit Methylpyrazolonen oder Pyrazoloncarbonsäuren, die aus Aminodiarylen oder ihren Derivv., wie Sulfonsäuren, Carbonsäuren, oder Oxy-carbonsäuren entstehen werden; die Farbstoffe färben Wolle in gelben licht- u. walkechten Tönen, können auch zur Herst. von Farblacken dienen; die sich von Pyrazolonen, die eine Oxy-carboxygruppe enthalten, ableitenden Farbstoffe sind Chrombeizenfarbstoffe, die in gelben bis roten Tönen färben. Zur Herst. der Pyrazolonderivv. verwendet man 4'-Methyl-2-aminodiphenylsulfon oder die 4-sulfosäure, erhältlich aus Naphtholsulfinsäure u. 2-Nitro-1-chlorbenzol oder seiner 4-sulfosäure u. Red., 4'-Methyl-

4-aminodiphenylsulfon-2-sulfonsäure, aus p-Toluolsulfinsäure u. 4-Nitro-1-chlor-2-sulfonsäure u. Red., 4'-Oxy-3'-carboxy-2-aminodiphenylsulfon-4-sulfonsäure Salicylsulfinsäure u. 2-Nitro-1-chlorbenzol-4-sulfonsäure u. Red.; die gen. Aminodiarylsulfone werden in die Hydrazine übergeführt u. dann mit Acetess oder Oxalessigester kondensiert. (E. P. 245 765 vom 2/1. 1926, Auszug veröff. 1926. Prior. 8/1. 1925.)

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Herstellung von Farbstoffen. Man läßt auf die Azo- oder Azoxyderiv. der 2,3-Oxynaphthoesäure Diazoverbb. einwirken, die genannten Verb. besitzen eine sehr starke Ver-schaft zur pflanzlichen Faser, sie ziehen direkt auf Baumwolle u. werden durch nicht entfernt, die auf der Faser erzeugten Färbungen zeichnen sich durch Reib- u. Farbstärke aus. Das Chlorid der 2,3-Oxynaphthoesäure liefert bei der Kondens. mit p,p'-Diaminoazobenzol in Aceton Di-2,3-oxynaphthoyl-p,p'-diaminoazo-F. über 360°, unl. in organ. Fl., l. in verd. NaOH mit gelblicher Fluorescenz. Red. des m-Nitranilids der 2,3-Oxynaphthoesäure mit alkal. Reduktionsm. wie NaOH u. Glucose, erhält man Di-2,3-oxynaphthoyl-m,m'-diaminoazoxybenzol in den meisten organ. Fl., swl. in Eg. u. Monochlorbenzol, Krystalle aus Nitrobenz. sich bei 285° ohne zu schmelzen. An Stelle des m-Nitranilids der 2,3-Oxynaphthoesäure kann man auch das Nitrotoluidid, m-Nitro-o-anisidid, o-Chlor-m-nitro-p-Nitranilid, m-Nitro-o-toluidid, o-Chlor-p-nitranilid, p-Nitro-o-anisidid, Chl.-o-anisidide, Nitroresidine, Nitroaminohydrochinondimethyläther usw. der 2,3-Oxynaphthoesäure verwenden. Zum Entwickeln der Färbungen auf der Faser kann man Diazoverbb. von aromat. Aminen oder Aminoazoverbb., die keine Sulfogruppen enthalten. (F. P. 596 252 vom 3/4. 1925, ausg. 20/10. 1925.)

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Azofarbstoffe. Farbstoffe enthalten eine oder mehrere Monoxyäthylaminogruppen, aber keine Sulfogruppe. Man vereinigt diazotiertes p-Nitranilin oder 3-Nitro-4-toluid mit Oxyäthylanilin in essigsaurer Lsg. Die Farbstoffe färben Celluloseacetatseide in wss. Lsg. oder Suspension in echten Tönen an. (F. P. 600 106 vom 26/6. 1925, ausg. 30/1. 1926, D. Prior. 4/9. 1924.)

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., Disazofarbstoffe. Man vereinigt die Diazoverb. eines sulfonierten, unsulfonierten oder carboxylierten Monoacyldiphenylendiamins oder -naphthylendiamins mit einem naphtholäther oder seiner Sulfosäure u. kuppelt nach dem Diazotieren mit 1,8-Naphtholsulfosäure oder 1,8-Naphthol-6-sulfosäure. Verwendet man als Monoacyldiphenylendiamin die Harnstoffderiv., z. B. p,p'-Diaminodiphenylharnstoff, so erhält man Tetrazofarbstoffe. Man vereinigt z. B. die Diazoverb. von 4-Acetyl-amino-1-anilin-2-sulfosäure mit 1-Amino-2-äthoxynaphthalin-6-sulfonsäure u. nach dem Diazotieren mit 1,8-aminonaphthol-4-sulfonsäure; als Anfangskomponente kann man auch naphthyl-p-Aminoacetanilid, 3-Acetyl-amino-1-anilin-6-sulfonsäure, Benzoyl-p-phenylendiamin, 4-Acetyl-naphthylendiamin oder seine 2-, 6- oder 7-monosulfosäuren verwenden; die Farbstoffe geben auf Seide echte, leicht ätzbare Färbungen. (E. P. 245 765 vom 29/8. 1925, Auszug veröff. 9/12. 1925. Prior. 20/10. 1924.)

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Disazofarbstoffe. Man vereinigt die Tetrazoverb. von chloresubstituierten 4,4'-Diaminodiphenyl- oder seinen Homologen mit Kupplungskomponenten, einige der Farbstoffe können weiter diazotiert werden u. mit anderen Komponenten gekuppelt werden können mit Diazoverbb. vereinigt werden. Man vereinigt die Tetrazoverb. von 4-Amino-3,3'-dichlordiphenylmethan mit 2-Naphthol-4-, -6- oder -8-sulfosäure, 1-Naphthol-4- oder -5-sulfosäure, 1-Naphthol-3,6-, -3,8- oder -4,8-disulfosäure, 2-Naphthol-3,6-disulfosäure, Chromotropsäure, Äthylchromotropsäure, 1-Amino-8-naphthol-4-sulfosäure, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolonsulfosäure, oder die Tetrazoverb. von 4,4'-D-

6'-tetrachlordiphenylmethan oder *4,4'-Diamino-3,3'-dimethyl-2,2'-dichlordiphenyl-* mit 1-(2'-Chlor-5'-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon, die Farbstoffe färben in wash-, walk- u. schwefelechten Tönen; Baumwollfarbstoffe erhält man durch Tetrazoverb. *4,4'-Diamino-3,3'-dichlordiphenylmethan* mit 2 Moll. *no-8-naphthol-3,6-disulfosäure* oder 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosäure; oder man lt die Tetrazoverb. in saurer Lsg. mit 1 Mol. 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfosäure. 2-Naphthol in alkal. Lsg.; durch Vereinigen der Tetrazoverb. mit 2-Amino-*naphthol-7-sulfosäure* weiterdiazotieren u. Kuppeln mit Phenyl-2-amino-5-naphthol-*säure* erhält man Tetrakisazofarbstoffe; man kann die Tetrazoverb. auch mit *no-8-naphthol-3,6-disulfosäure* sauer oder alkal. kuppeln u. dann diazotiertes anilin darauf einwirken lassen. Durch Vereinigen der Tetrazoverb. des *4,4'-Di-3,3'-dichlordiphenylmethan* mit 2-Naphthol, 2-Naphthol-3-carbonsäure oder Arylide, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon usw. erhält man Lackfarbstoffe. Die *4,4'-diaminodiphenylmethane* erhält man durch Kondensation von Chloranilinen H_2O u. Umwandlung der Kondensationsprodd. (E. P. 244 782 vom 16/12. 1925, g veröff. 10/2. 1926. Prior. 16/12. 1924.)

FRANZ.

adische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Disazofarbstoffe*. Man in den Disazofarbstoff aus der Tetrazoverb. des Diaminodiarylarnstoffes u. Salicylsäure oder ihren Homologen oder Derivv. eine oder mehrere Sulfogruppen entweder durch Sulfonieren des Farbstoffes oder durch Verwendung der *Diamino-harnstoffsulfosäuren*; die Farbstoffe färben die pflanzliche u. tier. Faser in gelben, sie eignen sich daher besonders zum Färben von gemischten Geweben; zur des Farbstoffes reduziert man den Monoazofarbstoff aus diazotierter p-Nitranilin-*nsäure* u. Salicylsäure mit einer Lsg. von Natriumsulfid u. leitet in die sodaalkal. es Aminoazofarbstoffes $COCl_2$ ein; oder man diazotiert die durch Sulfonieren des *nodiphenylharnstoffes* erhältliche Sulfosäure u. vereinigt mit Salicylsäure. 245 674 vom 13/7. 1925, ausg. 4/2. 1926.)

FRANZ.

arbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *uchinonfarbstoffe für Wolle*. Man behandelt unsubstituierte Dianthrachinonyl- mit sulfonierenden Mitteln. Die Farbstoffe färben Wolle aus saurem Bade in angen bis gelbbraunen Tönen; *1,1-Dianthrachinonylamin* gibt mit rauchender bei niedriger Temp. eine Monosulfonsäure u. bei höherer Temp. die *4,4'-Di-säure*, die beim Behandeln mit Br in wss. Lsg. in *4,4'-Dibrom-1,1'-dianthrachinonyl-* übergeht. (E. P. 240 492 vom 28/9 1925, Auszug veröff. 18/11. 1925. Prior. 1924. Zus. zu E. P. 201 575; C. 1923. IV. 949.)

FRANZ.

. Zinke, Graz, Österreich, *Perylenfarbstoffe*. Man behandelt Diaroylhalogen- ne mit bas. Alkali- oder Erdalkaliverbb. bei erhöhter Temp., vorzugsweise in von organ. Lösungsm. *Dibenzoyldibromperylene* liefert beim Kochen mit fein risiertem KOH in Anilin oder beim Erhitzen mit geschmolzenem KOH einen arbstoff, der Baumwolle aus der Küpe in blauen Tönen färbt; *Dibenzoyldichlor-*, erhalten aus Dichlorperylene, Benzoylchlorid u. $AlCl_3$ in CS_2 , braungelbe Nadeln itrobenzol, liefert beim Kochen mit festen Ätzalkalien in Chinolin einen Küpen- off; *Di-p-chlorbenzoyldichlorperylene*, F. 355°, gibt mit Ätzalkalien in Chinolin violettblauen Küpenfarbstoff; *Di-p-toluyldichlorperylene*, aus Dichlorperylene, —281°, p-Toluylsäurechlorid, $AlCl_3$ in CS_2 , gibt mit KOH in Chinolin beim en einen violett färbenden Küpenfarbstoff, der entsprechende Farbstoff aus oder -*m-toluyldichlorperylene* färbt blauviolett, der Farbstoff aus *Di- α -naphthoyl-* rperylene färbt blau. (E. P. 242 306 vom 30/10. 1925, Auszug veröff. 31/12. 1925. 3/11. 1924.)

FRANZ.

adische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Isodibenzanthronfarbstoffe*. behandelt *Benzanthron-Bz.1-thioäther*, ihre Substitutionsprodd. oder Derivv. mit 2-Stellung mit alkal. Kondensationsmitteln in An- oder Abwesenheit von in-

dige wss. oder verd. alkal. Lsgg.; die mit diesen Lsgg. gefärbten oder bedruckten Stoffe, wie Baumwolle, Wolle, Seide oder Kunstseide, liefern nach dem Behandeln mit einem sauren Oxydationsmittel, wie eine saure Lsg. von FeCl_3 , die Färbung des Farbstoffes; zum Drucken verwendet man die ätzalkal. verdickte Lsg. der Alkyl-elsäureester, dämpft u. behandelt mit saurer Eisenchloridlsg. (**E. P. 245 587** 2/7. 1924, ausg. 4/2. 1926.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Schwefelfarbstoffe*. Naphthophenole aus Carbazolen u. p-Nitrosophenol werden an Stelle von Benzidin u. anderer organ. Basen geschwefelt, z. B. Anilin, Toluidine, Chloraniline, p-Tolendiamine, Naphthylamine, Nitriline, Acetanilid, Acetyl-o-toluidin, Acetyl-p-tolendiamin, Diacetylbenzidin. Die Schwefelung kann in Ggw. von Flußmitteln, wie Naphthol, oder von Verdünnungsmitteln, wie Kochsalz, vorgenommen werden. (**E. P. 243 739** vom 25/11. 1925, Auszug veröff. 27/1. 1926. Prior. 28/11. 1924. **E. P. 199360**; **C. 1923. IV. 772**.) FRANZ.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

D. Porritt, *Die frühe Geschichte der Gummiindustrie*. Vf. beschreibt kurz die Geschichte der Gummiindustrie. Er behandelt zuerst die Einführung des Kautschuks in Europa, dann die Entdeckung der Verwendung von Kautschuk für imprägnierte u. medizin. Artikel. Daran schließt sich eine Besprechung der Entdeckung der Vulkanisation, der Bereitung von Luftschläuchen u. den Beschluß macht eine Geschichte der Entw. der Plantagenindustrie. (*India Rubber Journ.* **71**. 405—46. 1924.) EVERS.

Praetorius, *Wärmewirtschaft in mittleren und kleinen Betrieben mit besonderer Berücksichtigung der Gummiindustrie*. (Kautschuk **1926**. 43—48.) EVERS.

Paul Alexander, *Chemie und Technik des Kautschuks*. Vortrag. (Metallbörse **1925**. 426—27.) BEHRLE.

van Rossem und **H. van der Meyden**, *Einfluß hoher Temperaturen auf die Vulkanisation von vulkanisiertem Kautschuk*. Gummiringe wurden auf die gewünschte Zugfestigkeit gebracht u. dann im Schopperschen Dynamometer rasch auf Zugfestigkeit geprüft. Mit steigender Temp. wird der Kautschuk immer geschmeidiger. Die Dehnung beim Abreißen merklich zu, besonders bei Ringen mit niedrigem Vulkanisationsgrad. Bei längerem Erhitzen sinken Zugfestigkeit u. Dehnung auf einen niedrigen Wert, der Kautschuk wird spröde. Beim Vulkanisationsgrade 3,2 tritt dieser Zustand bei 70° erst nach 48 Stdn., bei 100° nach 15 Min., bei 130° u. 147° bereits nach 5 Min. ein, bei anderen Vulkanisationsgraden andere, aber entsprechende Erscheinungen; z. B. sind Ringe mit dem Vulkanisationskoeffizienten 4,2 bereits nach 5 Min. spröde; Zumischung von 10% ZnO verlängerte diese Zeit auf 30 Min. Das Verhalten beim Erhitzen ist nicht wie die gleiche Erscheinung bei Zimmertemp., sondern Folge von Übervulkanisation, sondern hängt wahrscheinlich mit Plastizitätsänderungen zusammen. (*Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk.* **1925**. 1290—302. 1925.) GROSZFELD.

W. H. Jones, *Über freien Schwefel*. Bei stark überschwefelten oder ungaren Faktisen ist ein Teil des S nicht in Aceton l. Vf. regt an, diese Erscheinung zu untersuchen u. festzustellen, daß ein Teil des S, der nicht vom Öl fest gebunden wird, in Aceton unl. ist, aber nicht als sog. freier S mitbestimmt wird. Vielleicht stellt der in Aceton unl. S eine neue Modifikation dar. (Kautschuk **1926**. 33—34.) EVERS.

A. H., *Das Vultexverfahren*. Vf. schildert das in sämtlichen Kulturländern bekannte Verf. von P. SCHIDROWITZ, das darin besteht, Latex, d. h. Kautschuk mit einem sauren Oxydationsmittel zu vulkanisieren. Der Kautschuk wird bei diesem Verf. wirklich vulkanisiert; bei der mechan. Prüfung bessere Werte als auf n. Wege hergestellter Gummi. Die vulkanisierte Lsg. zu allen Zwecken gebrauchen, wo man früher Kaut-

schuk plastizieren u. mit S u. Füllstoffen mischen mußte. Außerdem ist die Anwendung von Farben u. Füllstoffen möglich, die sich früher nicht verwenden ließen. Der Kautschuk wird bei dem Vultexverf. nicht geschädigt u. zeigt daher günstige Alterungserscheinungen. (Gummi-Ztg. 40. 1357—58.) EVERS.

W. Spoon, *Untersuchungen über Eingeborenenkautschuk in Beziehung zur Frage des Native Rubber Investigation Committee*. Kautschuksorten genannter Aus Djambi, dem Westen, Süden u. Osten Borneos, Palembang, der Ost- u. Westküste von Sumatra enthielten bis zu 50% Waschverlust (W., Erde, Sand, Rinde, Teile usw.); als Verfälschungen wurden Kaolin, Sand, selbst ein Stein im Innern der Ballen beobachtet. Zugfestigkeit, Vulkanisationszeit, Kurvenverlauf u. Viscosität waren n. Sogenannte *Lumpballen* enthielten 49—55%, *Scrapballen* 26—29% Kautschuk. Letztere beiden Sorten werden meist an Ort u. Stelle zu schwarzem, ziemlich weichen Blanketcrepe verarbeitet. (Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 10. bis 83. 84—106. Buitenzorg.) GROSZFELD.

W. Greinert und J. Behre, *Eine neue Methode zur Bestimmung der Qualität von Rohgummi*. Um zu einer einwandfreien Best. der Qualität von Kautschuk zu gelangen, versuchen Vff. die Steighöhe von Bzl.-Kautschukquellen auszunutzen. Die Verss. ergeben, daß eine Beziehung zwischen diesen Faktoren besteht. Man kann also mit einer einfachen Längenmessung sehr rasch eine Qualitätsbest. verschiedener Kautschuksorten ausführen. (Kautschuk 1926. 29—31.) EVERS.

R. Houwink, *Neue Hilfsvorrichtungen für den Schopperschen Festigkeitsprüfapparat*. (Gummi-Ztg. 40. 1256—57. — C. 1926. I. 2517.) EVERS.

H. Loewen, *Die Berechnung des spezifischen Gewichts von Gummimischungen*. Vff. weist auf die Vorteile der Rechnung mit dem Vol. der Füllstoffe u. des Kautschuk bei der Mischung hin u. erläutert, wie man die D. einer Mischung berechnen kann. Die berechneten Werte stimmen gut mit den experimentell erhaltenen überein. (Kautschuk 1926. 35—36.) EVERS.

T. W. K. Clarke, Lindley, Hampshire, *Konservieren von Kautschuk*. Man zieht die Kautschukgegenstände, insbesondere Reifen, mit einer Mischung aus Seife u. einem die chem. wirksamen Strahlen zurückhaltenden Farbstoff, Füllstoffen, u. einem Kautschuklösendem.; man vermischt z. B. Ton mit Seife u. Chromgelb u. W. zu einer Paste. (E. P. 242 096 vom 1/12. 1924, ausg. 26/11. 1925.) FRANKE.

K. D. P. Ltd., London, *Konzentrieren von Kautschukmilch*. Eine drehbare Trommel oder Walze taucht in die Kautschukmilch, die sich beim Drehen der Trommel auf der Oberfläche bildende dünne Schicht wird einem Trockenmittel ausgesetzt; die konzentrierte Kautschukmilchschicht wird durch einen Schaber von der Trommel entfernt u. mit der Kautschukmilch wieder vereinigt; als Schaber kann man eine exzentrisch zur Hauptwalze angeordnete heizbare Walze verwenden, die gleichzeitig zum Verdampfen der Fl. dienen kann. (E. P. 244 727 vom 13/11. 1925, Ausg. veröff. 10/2. 1926. Prior. 20/12. 1924.) FRANKE.

Herbert Lindemann, Hamburg, Deutschland, *Färben von Schwammkautschuk*. Zum Färben von feinporigem Schwammkautschuk verwendet man viscose Farblösungen wie gefärbte Kautschuklsg., gefärbte Kautschukmilch oder wss. Emulsionen von Kautschuk; die Farblsg. wird zweckmäßig nach dem Spritzverf. aufgebracht. (J. 243 605 vom 21/4. 1925, ausg. 24/12. 1925.) FRANKE.

Barrett Co., New York, übert. von: **A. B. Cowdery**, Needham, Massachusetts, *Kautschukmassen*. Als Zusatzmittel für Kautschuk verwendet man Destillationsrückstände des Steinkohlenteers; die Rückstände erhält man durch Destillieren der flüchtigen Bestandteile, indem man ein neutrales Gas durch den Teer leitet, die mitgerissenen Anteile aus dem Gas entfernt u. das Gas wieder durch ein Teer leitet, die Rückstände, F. 350—400° F., D. 1,30—1,35, enthalten etwa

en C. Von dem feinst pulverisierten Rückstand kann dem Kautschuk bis zu 15%
gesetzt werden. (E. P. 243 384 vom 21/11. 1925, Auszug veröff. 20/1. 1926. Prior.
1. 1924.)

FRANZ.

André Delarue, Seine, Frankreich, *Überziehen von Gewebe mit Kautschuk*. Man
zieht das getrocknete u. von flüchtigen Stoffen befreite Gewebe wiederholt mit
Kautschuklsg. u. preßt unter hohem Druck durch Walzen, hierauf überzieht
mit einer Lsg. von Kautschuk, die mit einem Farbstoff u. einem oxydierend
enden Metallsalz vermischt worden ist; nach dem Behandeln mit einer Lsg. von
Schwefel u. Bariumsuperoxyd wird in einem geschlossenen Raum mit Schwefel-
dämpfen vulkanisiert, man erhält hierbei einen glänzenden, lederähnlichen
Kautschuküberzug. (F. P. 596 748 vom 17/7. 1924, ausg. 30/10. 1925.)

FRANZ.

XIII. Ätherische Öle; Riechstoffe.

Otto Gerhardt, Die „Charakteristik“ von Düften. Zum Zustandekommen eines
Gemisches ist erforderlich das Zusammenwirken von Hauptbestandteilen u. der
„Charakteristik“, das sind Stoffe von besonderer Wrkg., die selbst den zu er-
kennenden Duft nicht aufweisen. Als Beispiel wird gezeigt, daß ein Gemisch der Haupt-
bestandteile des Rosenöles erst nach Zusatz von Nonylaldehyd (Charakteristik) einen
natürlichen Öl entsprechenden Geruch hat. (Dtsch. Parfümerieztg. 12. Werbe-
1—3. Leipzig, SLONEK & Co. A.-G.)

HESSE.

E. J. Parry, Einige ätherische Öle aus Indien. Öl aus *Cyperus rotundus*:
untersuchte Öle hatten folgende Kennzahlen:

D. ^{18°}	0,991	0,991	0,986	0,988	0,983
[α]	+42,8°	+42,8°	+33°	+33,7°	+20,1°
n _D ²⁰	1,5140	1,5140	1,5156	1,5140	1,5126
SZ.	2,1	2,1	2,1	3,4	2,4
VZ.	11,7	11,7	11,7	12,7	16,1
VZ. nach Actlg.	97	98,1	66,5	82,5	72,8

Dest. wurden unbekannte Sesquiterpene u. mehrere Alkohole C₁₅H₂₄O erhalten.
Alkohole reagierten nicht mit Phthalsäureanhydrid; eine nähere Charakterisierung
vermutlich tertiären Alkohole konnte nicht erfolgen. Öle aus „Bode de Mysore“
(a grass oil) gaben folgende Zahlen:

	Travancore	Madras	Mysore
	0,920	0,904	0,923
	1,4849	1,4748	1,4831
	—40°	—39,3°	—24,7°
	—	—	1,3
	5,9	44,7	45,5
nach Actlg.	98,9	120,7	112,7
Öle als C ₁₀ H ₁₈ O	29,2°/o	36,5°/o	34,4°/o

Parfümerie moderne 19. 21—22.)

HESSE.

A. de Dominicis und **C. La Rotonda**, Untersuchungen über eine junge Campher-
pflanze aus dem botanischen Garten zu Neapel. Bericht über systemat. Unterss. auf
Campher- u. Ölgehalt. Im Mittel aller Unterss. ergaben die jungen Spitzenblätter
% Rohcampher u. 0,12% Öl, vollkommen ausgebildete Blätter 1,16% bzw. 0,15%,
um je Spuren Campher u. Öl, Wurzel Spuren Campher u. 0,70% Öl. Das Blattöl
D.¹⁵₁₅ 0,923, n_D¹⁷ = 1,4370. Das Wurzelöl D.¹⁵₁₅ 1,0664, [α]_D²⁰ + 8,9°, n_D¹⁷ =
1,5, Kp. 185—240°, E. unter —12°, Löslichkeit bei 20° in 90%ig. A. 1:0,33, in
ig. A. 1:7, in 70%ig. A. 1:17, SZ. 0,54, VZ. 1,96, EZ. 1,42, Acetyl-VZ. 9,66,
Aldehyd 5,21%, Phenole nicht vorhanden. (Annali Chim. Appl. 16. 7—20. Por-

GRIMME.

V. Morani, *Das ätherische Öl von Laurus nobilis L.* 20 kg trockne Blätter lieferten bei der Dest. mit W.-Dampf 256 g = 1,28% kanariengelbes, nach Lörz riechendes, jedoch etwas an Eukalyptus erinnerndes Öl mit $D_{15}^{20} = 0,92073$, $n_D^{20} = 1,350$, $n_D^{18} = 1,4712$, Löslichkeit bei 20° in 70%ig. A. 1:10,5, in 80%ig. A. 1:SZ. 2,1, EZ. 37,2, EZ. nach dem Acetylieren 82,7, Ester (als $C_{10}H_{17}O-COCH_3$) 13,0%, Gesamtalkohole (als $C_{10}H_{18}O$) 23,19%, freie Alkohole (als $C_{10}H_{18}O$) 12,95%. An Verunreinigungen konnten identifiziert werden 0,53% Eugenol, 1,1% Acetyleneugenol, 3% Mentheugenol, 12% Terpen-KW-stoffe, vor allem β -Pinen u. Phellandren u. 3–4% neue Sesquiterpene, welches sich von α -Pinen durch die erhöhte Drehung, erhöhen u. bei der Pinonoxydation eine fl. Säure liefernd unterscheidet. Das Öl kann in Pharmazie, Parfümerie u. Seifenfabrikation Verwendung finden. (Annali Chim. A. 16. 21–28. Rom.) GRIMM

W. Peyer und F. Diepenbrock, *Vergleichende Untersuchungen über die Bestimmung ätherischer Öle in Drogen*. Vff. besprechen 12 Verff. zur Best. äth. Öle in Drogen, empfehlen als besonders brauchbar das *Tailameter-Verf.* von P. C. Chattopadhyay u. das *Verf.* von O. Dafert. Beide beruhen auf der Volummessung der durch Dampf übergetriebenen Öle in graduierten App. Der durch Lsg. einzelner Bestandteile der Öle in dem unter der Ölschicht befindlichen W. entstehende Fehler lassen vernachlässigt werden. Es wurde der Gehalt an äth. Ölen von 32 der wichtigsten Drogen nach obigen Verff. ermittelt. Tabellen u. Abbildungen im Original. (Ap. Ztg. 41. 201–03. 219–22. Halle a. S.) ROJAH

Percy May, *Bestimmung des Wassergehaltes in Gewürznelken*. Der im Original beschriebene App. von DEAN u. STARK ist dem von BROWN u. DUVEL beschrieben vorzuziehen. Die Methode von DEAN u. STARK besteht darin, daß die zu untersuchende Substanz mit sd. PAe. in einem Kolben behandelt wird. Die Dämpfe, mit denen W. übergeht, werden in einem seitlich angebrachten Rückflußkühler kondensiert. Dieser Rückflußkühler ist über einem graduierten Rohr angebracht, an dessen Ende sich das W. sammelt, während der PAe. wieder in den Kolben zurückfließt. In $\frac{3}{4}$ des Rohrs ist das W. in dem graduierten Rohr gesammelt u. sein Vol. kann abgelesen werden. (Perfumery Essent. Oil Record. 17. 65. London, King William Street, E. C. 4.) HE

Chemische Fabrik Flora, Dübendorf b. Zürich, Schweiz, übert. von: **Ar. Corti**, Winterthur, Schweiz, *Nach Ambra riechender Stoff*. (A. P. 1 565 796) 26/1. 1923, ausg. 15/12. 1925. — C. 1924. I. 2215. 1925. II. 93.) OELEK

Camillo Faust, Wien, und **Alexander Czerkinsky**, Baden bei Wien, *Konservierung von frischen Blumen*. Die Blumen oder deren Knospen werden in einer schwachen Kochsalzlsg. der Einw. eines Dampfbades ausgesetzt u. dann unter Erwärmung einer wss. Lsg. von Benzoesäure u. salpetersaurem Cocain behandelt. (Oe. P. 100 000) vom 27/9. 1923, ausg. 25/6. 1925.) KÜHL

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

Karl Schiebl, *Der Ruths-Speicher in der Zuckerfabrik*. Betriebstechn. Erörterung an Hand von Skizzen u. Schaubildern, der Vorteile des Ruthsspeichers bei schwankendem Dampfverbrauche. (Die Wärme 49. 183–88. Magdeburg.) RÜH

W. Pape und A. Graf, *Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie in Zuckerfabriken*. Vf. empfiehlt Energieerzeugung in einer Zentrale mittels Dampfmaschinen, elektr. Antriebe für die Arbeitsmaschinen u. untersucht im besonderen die Frage, ob für den Antrieb der Walzenstraßen Drehstrom oder Gleichstrom zu wählen ist. Jede Stromart hat ihre Vorteile. (Elektrotechn. Ztschr. 47. 303–08.) N

Wenzel Kohn, *Über die Scheidung des Diffusionsaftes mit Dolomitkalk und durch Saturation des Mittelsaftes mit Dolomitkalk gewonnenem Schlamm*. Die durchgeführten Verss. ergeben, daß Dolomitkalk allein in zahlreichen Fällen eine Rein

ein schnelles Absitzen des Schlammes bewirkte bei Säften, die unter Zugabe von 35—0,4% Dolomitmalk, bezogen auf das Saftvol., erwärmt wurden. Der Saturaschlamm des Mittelsaftes nach der Saturation mit Dolomitmalk bewirkte eine ungenügende Scheidung der Diffusionssäfte. Die nach dieser Scheidung mit Dolomitmalk saturierten Diffusionssäfte lieferten zwar hinsichtlich Reinheit u. Menge befriedigende Saturasäfte, die aber immer stärker verfärbt waren als die Säfte von der üblichen Saturation mit gewöhnlichem u. auch mit Dolomitmalk. Eine Zugabe des Saturaschlammes des Mittelsaftes nach der 1. Saturation hatte keine schädigende Wrkg. auf den Saft der 2. Saturation. Es zeigte sich wieder, daß die mit Dolomitmalk geschiedenen u. vom Schlamm befreiten Säfte nach einem weiteren Zusatz des Dolomitalkes u. nach der Saturation mehr verfärbte u. weniger reine Säfte lieferten als diejenigen, bei denen die Saturation in üblicher Weise, u. zwar ohne Trennung des Nd., mit derselben Zugabe von Dolomitmalk erfolgte. (Listy Cukrovarnické 42. 297; Ztschr. f. Zuckerind. d. čechoslovak. Rep. 50. 209—15. 217—21.) RÜHLE.

Ferdinand Kryž, *Über die noch zulässige Markenüberschreitung bei der Digestionsführung.* Bei der h. wss. Digestion von Zuckerrüben u. Rübenschnitten nach HERLES geschieht es häufig, daß die Marke bei der Einfüllung des h. W. mehr oder weniger überschritten wird. Vom Vf. angestellte Verss. ergeben, daß man die Auffüllungsstärke höchstens um 5 cm überschreiten darf, wenn man nach dem Abkühlen keinen überfüllt gebliebenen Kolbeninhalt erhalten will. (Ztschr. f. Zuckerind. d. čechoslovak. Rep. 50. 216.) RÜHLE.

Franz Janák, *Ein Beitrag zur Theorie der Melassebildung.* Nach kurzer Erörterung der bisherigen erfolglosen Arbeiten auf diesem Gebiete bespricht Vf. seine eigenen Erfahrungen hierauf. Auf Grund der physikal. Unters. (Verschwinden des Tyndallkegels beim Drehen des Polarisationsnikols, Erhöhung der inneren Reibung) über, schwer filtrierender Säfte schließt Vf. auf Kolloide in der Trübung, die besonders stets nach Waschung des Filters mit CH₃OH auftraten. Die B. der Kolloide wird darauf zurückgeführt, einerseits, daß die Rübe schon viel Emulseide (Eiweiß) enthält, die auch durch die Saturation hindurchgehen u. andererseits auf den üblichen Verarbeitungsvorgang, der Anlaß zur B. von Kolloiden mittels des in der Rübe u. in Rohsaften enthaltenen CH₃OH u. seiner katalyt. Umwandlung des krystallin. CaCO₃ in den kolloidalen Zustand gibt. CH₃OH ist in der Rübe als Zwischenprod. in Mengen, die der Sonnenbestrahlung während der Wachstumszeit der Rübe amittelbar entsprechen. In n. Rüben wird der CH₃OH stets durch die Oxydase schädlich gemacht; in unreifen u. faulenden Rüben dagegen kann die Oxydase den Überschusse vorhandenen CH₃OH nicht mehr völlig in Säuren überführen. Entsteht nun in einer Zuckerlsg. durch katalyt. Wrkg. des CH₃OH auf CaCO₃ eine disperse Phase, die durch das Schlammpreßtuch wandert, so ist mit der Erhöhung der oberflächenspannung dieser Lsg. zu rechnen. Mit steigender Konz. erhöht sich auch die innere Reibung u. verhindert oder verlangsamt die Krystallisation. Eine zweite Möglichkeit der B. von Kolloiden besteht noch in der Kondensation aus organ. Verbb. während der Verarbeitung der Zuckerlsgg.; hierdurch u. durch Steigerung der Konz. während der Fabrikation wird der große Teil des Zuckers, der in die Melasse wandert, an der Krystallisation gehemmt. Neue Wege für die Abscheidung des Zuckers aus der Melasse eröffnen sich neuerdings durch Heranziehung der kurzwelligen Strahlen. (Ztschr. f. Zuckerind. d. čechoslovak. Rep. 50. 221—24. Abs.) RÜHLE.

F. R. Bachler, *Weiterverarbeitung von mit Zeolithen behandelten Melassen nach dem Steffens-Prozeß.* Zeolithbehandlung gibt Melassen, welche bei der Weiterverarbeitung beste Ausbeuten gewährleisten. Dies ist besonders zurückzuführen auf Veränderung des K₂O-Gehaltes u. der Rk. (Ind. and Engin. Chem. 18. 180—82. Stanford [Calif.], Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 193—201.) GRIMME.

Carl L. Alsberg, *Untersuchungen über Stärke*. Wird Stärke bis zur Zertrümmerung des Korns fein gemahlen, so zeigt sie eine erhöhte Löslichkeit in k. W. u. wird unbrauchbar zur Kleisterherst. in der üblichen Konz. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 19 bis 93. Stanford University [Calif.]) GRIMME.

Evaristo Gambetta, *Beitrag zur Kenntnis der Jodgerbsäure in Beziehung zur Herstellung des Sirups*. Man mischt eine Lsg. von 4 g Gerbsäure in 50 ccm W. mit einer Lsg. von 2 g Jod u. 2 g KJ in 50 ccm W. u. gibt je 2 g Na- u. Ca-Hypophosphat hinzu. Auf dem Wasserbade kurze Zeit auf 60° erwärmen, bis zum Farbumschlag in Kaffeebraun. Die J₂-Verluste sind hierbei sehr gering, da die Analyse einen Gehalt von 30,40% gegenüber 33,33% der Theorie ergab. (Boll. Chim. Farm. **65**. 33—34 Mantua.) GRIMME.

Alice Mabel Emmett und Marjorie Harriotte Carré, *Eine Modifikation der Calciumpectatmethode zur Bestimmung von Pektin*. In Bestätigung der Angaben von CARRÉ u. HAYNES (Biochemical Journ. **15**. 60; C. **1922**. IV. 615) wird die Unzuverlässigkeit der Fällung von Pectin durch neutralen 95%ig. A. festgestellt. Es ergab sich aber, daß angesäuerter A. das Pectin prakt. in allen Konz. vollständig fällt. Der Nd. kann nicht direkt für die Best. des Pectins dienen, weil er nicht frei von H₂O-gewaschen werden kann, ohne daß wieder Pectin gel. wird. Er kann aber dazu dienen, das Pectin im Gegensatz zur bisherigen Methode (l. c.) auch dann einwandfrei als Calciumsalz zu bestimmen, wenn in der Fl. andere durch Ca fällbare Substanzen, wie Oxalate zugegen sind. Man fällt dann erst durch sauren A., wäscht den Nd. mit solchem A. aus u. fällt nach Lsg. des Nd. das Ca-Pectinat. (Biochemical Journ. **20**. 6—12. London Imp. Coll. of Science and Technol.) SPIEGEL.

Wilhelm Scheermesser, Dessau, *Verfahren zur Zerlegung von Bariumsaccharaten* durch Behandeln der Lsg. mit CO₂, dad. gek., daß man zum Schluß der Behandlung unter Fortsetzung des Einführens von CO₂ zweckmäßig bei erhöhtem Atmosphärendruck elektr. Gleich- oder Wechselstrom durch die Lsg. hindurchleitet. (D. R. P. **425 170** Kl. 12m vom 27/1. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

Sugar Research Syndicate Ltd., Detroit, V. St. A., *Wiedergewinnung von Bleiglätte aus Zuckerrückständen*. (D. R. P. **425 040** Kl. 12n vom 19/3. 1922, ausg. 11/3. 1926. — C. **1923**. II. 414.) KAUSCH.

Société Anonyme des Distilleries de Moeres, de Rexpoede et d'Allennes les-Marais, Frankreich, *Zuckersaftextraktion aus zuckerhaltigen Pflanzen*. Man verwendet hierbei einen Diffuseur, der aus einem Trog mit einer Vorr. zur seitlichen Abführung der behandelten Stoffe besteht, einen durchbrochenen doppelten Boden aufweist u. seitlich der eine gleiche Einrichtung ohne durchbrochenen Boden aufweisende Knetvorr. angebracht ist. (F. P. **597 100** vom 30/7. 1924, ausg. 12/11. 1925.) KAUSCH.

United States Syrup Company, Salt Lake, V. St. A., *Raffinieren von Melasse*. (D. R. P. **426 110** Kl. 89i vom 10/11. 1920, ausg. 8/3. 1926. — C. **1922**. II. 275.) OEI.

International Patents Development Co., Del., übert. von: **William B. Newkirk**, Riverside, Illinois, *Fruchtzucker*. Man konz. eine Stärkelsg. bis zur Übersättigung durch Erhitzen, kühlt sie u. erhält sie auf einer für die B. wasserfreier Krystalle günstigen Temp., trennt die Mutterlauge von den Dextrosekrystallen, ermäßigt die Temp. der Mutterlauge, um das Wachsen wasserhaltiger Krystalle herbeizuführen u. trennt die Mutterlauge von diesen. (A. P. **1 571 212** vom 16/11. 1922, ausg. 2/2. 1926.) KAUSCH.

Elektro-Osmose, Akt.-Ges. (Graf Schwerin Gesellschaft) und Meiere C. Bolle, Akt.-Ges., Berlin, (Erfinder: **Wilh. Ruppel**, Berlin, **Walter Dietrich**, Berlin-Friedenau, und **Hermann Nilges**, Berlin), *Gewinnung von Milchzucker aus Molke*, dad. gek., daß man die bis fast zum wahren Neutralpunkt neutralisierte Molke ganz kurze Zeit aufkocht, hierauf mit einer starken Säure, wie z. B. HCl, H₂SO₄, ansäuert, das Koagulat abfiltriert u. das Filtrat mit einem Adsorptionsmittel, wie z. E.

on, Kaolin, behandelt u. nach erfolgter Filtration das Filtrat, nachdem es zwischen aphyragmen in einer in der Richtung des elektr. Stromes dünnen Schicht der Einw. elektr. Gleichstromes bis zur prakt. Salzfreiheit ausgesetzt wurde, nach bekanntem erf. zur Trockne verdampft. — Als Anodendiaphragma werden tier. Membranen, wie B. Haut, Blasen, Därme, als Kathodendiaphragma vegetabil. Stoffe, wie Baumwollwebe, verwendet. (**D. R. P. 423 695** Kl. 89i vom 20/3. 1923, ausg. 8/1. 1926.) OEL.

Herman A. Metz, New York, übert. von: **Harry E. Dubin**, New York, *Herstellung von Malzsirup*. Man behandelt eine diastasehaltige Würze mit einem festen, entfärbend wirkenden Adsorptionsmittel, indem man sie z. B. durch ein aus Entbungskohle bestehendes Filterbett hindurchleitet, wobei man dafür Sorge trägt, daß die Enzymwrkg. nicht geschädigt wird. — Das Filtrat wird dann zu Sirup eindampft. (**A. P. 1573 687** vom 16/4. 1923, ausg. 16/2. 1926.) OELKER.

The Keever Starch Company, übert. von: **Edgar Newton Mc Veigh**, Columbus, Ohio, V. St. A., *Wäschestärke*. Man vermischt zwei oder mehr verschiedene Stärketen in fl. Zustand u. gibt dann ein l. Öl zu. (**Can. P. 246 416** vom 13/3. 1924, ausg. 1. 1925.) FRANZ.

Josef Prükl, Wien, *Abbau von Stärke zu gärungsfähigem Zucker*. Der Abbau wird durch einen Rhyzopilz der thermophilen Gruppe bewirkt, der sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet: Seine Sporen zeigen ganz leichte Verdickungen; sie sind rund u. vereinzelt oval, zeigen eine Größe von ungefähr 5,4—8,1 μ , sind anfangs l. u. werden in einem späteren Vegetationsstadium braun. — Mittels dieses Pilzes tritt die Verzuckerung wesentlich schneller als durch andere bekannte Pilze (Elemar oder Amylopilze) erreichen. (**Oe. P. 101 963** vom 23/2. 1925, ausg. 10/12. 1925.) OELKER.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

D. B. Dill und **P. B. Clark**, *Formaldehyd in gewissen Hochseekonserven*. Formaldehyd entwickelt sich in Krebskonserven, ohne daß freier O₂ anwesend ist. Die Entw. unabhängig vom Inhalt u. von der Schwärzung des Konservenblechs. (Journ. Soc. Official Agricult. Chemists **9**. 117—22.) TRÉNEL.

Ernst Stern und **Heinrich Becker**, *Über ein neues Hefepreparat*. Zur Herst. Hefepreparates „Katazyman“ (Nährmittelfabrik München G. m. b. H.) wird Hefe Zimmertemp. durch Soxhletischen Nährzucker plasmolysiert. Nach Verflüssigung d. das Prod. zur Abtötung des Gärferments 1 Stde. auf 45—50° erwärmt u. dann Vakuum getrocknet. (Chem.-Ztg. **50**. 185—86. Charlottenburg 2.) JUNG.

Walter H. Eddy, *Der Vitamingehalt von Nahrungsmitteln*. Die verschiedenen Methoden zur biolog. Best. der einzelnen Vitamine werden eingehend besprochen, Werte für die wichtigsten Obstarten sind in Tabellen mitgeteilt. Bananen erwiesen sich hoch in Vitamin B u. C. (Amer. Journ. Publ. Health **16**. 109—15. New York 1926.) GRIMME.

H. Serger und **H. Kirchhof**, *Tomatenmark und Tomatenpüree. Vorschläge zur einheitlichen Bezeichnung*. Vorgeschlagen wird: I. Tomatenmark, einfachpassiertes p; II. Tomatenmark, zweifach bzw. doppelt konz. = I auf $\frac{1}{2}$ eingedickt; III. Tomatenmark, dreifach bzw. dreifach konz. = I auf $\frac{1}{3}$ eingedickt; IV. Tomatenmark, vierfach = Tomatenpüree = I auf $\frac{1}{4}$ eingedickt. (Konserven-Ind. **13**. 144—46. Braunschweig, Konserven-Versuchstation.) GROSZFELD.

P. Wiegand, *Was ist bei der Herstellung und Lagerung von Fruchtsäften zu beachten?* Prakt. Angaben über Herst. u. Frischhaltung. (Konserven-Ind. **13**. 146—48.) GROSZFELD.

G. Pecori, *Der Wert des rationellen Auftauens bei der Verwendung von Gefrierfleisch zur Ernährung*. Wird Gefrierfleisch plötzlich bei erhöhter Temp. (16—18°) aufgetaut, so wird es unansehnlich u. leidet im Geschmack. Außerdem tritt durch aus-

tretenden Saft Gewichtsverminderung von ca. 10% ein. Diese Übelstände lassen sich durch langsames Auftauen bei 4° vermeiden. In der chem. Zus. lassen sich kaum Unterschiede feststellen. Das langsame Auftauen gewährleistet auch eine bessere Verdaulichkeit. (Annali d'Igiene 36. 39—52. Rom.) GRIMME.

Charles Krumwiede, William H. Park, Georgia Cooper, Marie Grun Charles Tyler und Carolyn Rosenstein, *Chlorbehandlung von verunreinigten Austern*. Die Chlorbehandlung von Austern aus verunreinigten Gewässern ergab wohl eine gewisse Abnahme der pathogenen Keime, jedoch keine sichere Sterilisation. Bis weiteres muß daran festgehalten werden, daß Austerngärten nur in Wässern angelegt werden dürfen, die keiner Verunreinigung mit menschlichen Faeces ausgesetzt sind. (Amer. Journ. Publ. Health 16. 142—49. New York City.) GRIMME.

A. C. Dahlberg und J. C. Hening, *Viscosität, Oberflächenspannung und Schlagbarkeit von Milch und Sahne*. Die Viscosität steigt durch Bewegung u. Erhöhung d. Fettgehalts (über 20%); Pasteurisierung vermindert sie bei Milch etwas, bei Rahm viel. Die Viscosität des Rahmes konnte durch die Art der Rahmgewinnung beeinflusst werden: War das Fett bei der Abrahmung in halbfestem Zustande, so glich die Viscosität von Rahm aus pasteurisierter Milch solcher von Rohrahm, die von Rahm aus Rohmilch war wesentlich größer. Rahm nach dem Melken oder Pasteurisierung aus nicht gekühlter Milch hatte gegenüber n. Rahm eine niedrigere Viscosität. D. Einfluß von Zentrifuge u. Bewegung war ebenfalls merklich, nicht der von Fett-Trockensubstanzgehalt. Die Oberflächenspannung fällt mit dem Fettgehalte u. durch Bewegung u. steigt durch Pasteurisation. Die Schlagbarkeit wird durch Erhöhung des Fettgehaltes u. Bewegung verbessert. Gut schlagbarer Rahm lieferte eine kleine Raummenge Schlagrahm als schlecht schlagbarer. Gut geschlagener Rahm sonder bei k. Aufbewahren keine Fl. ab u. blieb gut steif. Im allgemeinen entsprachen erhöhte Viscosität u. verminderte Oberflächenspannung guter Schlagbarkeit. Abnorm viscoser Rahm ließ sich gut, aber nicht besser als n. schlagen. Die Bereitung von Schlagsahne bedingt eine Einverleibung von Luft u. darauf folgendes Steifschlagen. Die Proteine ermöglichen die Einführung der Luft, halten aber den Rahm nicht steif, was durch die beim weiteren Schlagen erfolgende B. von größeren Fettklumpchen erreicht wird. (New York State Agricult. Exp. Station. Techn. Bull. 113. 38 Seite 1925.) GROSZFELD.

I. I. Nitzescu, *Insulin und anorganischer Phosphor der Milch*. P-Abnahme der Milch am Tag der Insulininjektion u. am folgenden, während im Blut der n. Status am folgenden Tag bereits erreicht ist. Dafür tritt die Verminderung in der Milch langsamer ein u. ist im Ausmaß kleiner. (C. r. soc. de biologie 94. 156—57. Ch. Inst. de physiol.) OPPENHEIMER.

Raymond Hertwig und L. H. Bailey, *Die quantitative Bestimmung der nicht verdaulichen Stoffe in Weizenmehl, Brotteigen und Eiern*. Krit. Vergleich verschiedener Methoden u. Arbeitsvorschrift. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 9. 122—124.) TRÉNEL.

Jacq. Ph. Peper, *Bestimmung des Brotalters*. Die Methode von J. R. KAUFMANN beruht darauf, daß beim Brotbacken teilweise Verkleisterung der Weizenstärkekörner, beim Altbackenwerden umgekehrt Synhaeresis eintritt. Sie wird wie folgt durchgeführt: 20 g Brotkrume werden sofort bzw. nach 12 (I) 24 (II) 36 (III) Stdn. in 1 l der Kleberbest. durch Seidengaze geknetet u. die Sedimenthöhe der ausgewaschenen Stärke nach 24 Stdn. bei Zusatz von 0,5 ccm Toluol u. 0,5 ccm Acetaldehyd gemessen. Eine Sedimenthöhe über 96 ccm zeigt frisches, unter 85 ccm altbackenes Brot. Bei 85—96 ccm beweist ein Unterschied zwischen I u. III von mehr als 15 frischen von weniger als 15 altbackenes Brot. (Chem. Weekblad 23. 163—68. Amsterdam.) Keuringsdienst van Waren.) GROSZFELD.

Hanns Eckart und **Albert Diem**, *Die Bestimmung von Stärke in Pektin- und pfelsäften auf sedrimetrischem Wege*. (Vgl. Konserven-Ind. 12. 409; C. 1925. II. 06.) Ebenso wie nach WEISZ (Ztschr. f. ges. Brauwesen 45. 122; C. 1922. IV. 1019) wird die mit CaCl_2 in Lsg. gebrachte Stärke mit J ausgefällt, abgeschleudert u. Vol. in N. d. in geeigneten Röhrchen (Vergleich mit reiner Stärke) abgelesen. Ergebnisse wandfrei. (Konserven-Ind. 13. 148. München, Konservenfabrik JOHS. ECKART.) GR.

H. C. Troy, *Vergleich der Methylenblaureduktionsprobe mit der direkten mikroskopischen Keimzählung zur Beurteilung der Milch*. Beide Proben ergaben in 86% Übereinstimmung. In den restlichen Fällen schien die Milch bei der Keimzählung weniger rein als nach der Methylenblaumethode angenommen werden mußte, wobei die Reduktionszeit unter 2 Stdn. mit einer Keimzahl von über $1,5 \cdot 10^6$, 2—3 Stdn. mit $3 \cdot 10^5$ bis $1,5 \cdot 10^6$, über 3 Stdn. mit weniger als $3 \cdot 10^5$ gleichgesetzt wurde. (Journ. dairy science 8. 282—85. 1925; Ber. ges. Physiol. 32. 848. 1925. Ithaca, N. Y., Dep. dairy industry, Cornell univ. Ref. Spitta.)

OPPENHEIMER.

R. Girard, *Mikrobiologische Analyse der Milch*. Vf. bespricht die Eigenschaften des mkr. Bild der n. u. der patholog. Milch sowie die Methoden der quantitativen qualitativen mikrobiologischen Analyse. (Bull. soc. pharm. Bordeaux 64. 29 35.)

ROJAHN.

Oskar Adolf Mendelsohn und **William Jones Allen**, Melbourne, Australien, *Konservieren von Nahrungsmitteln und anderen verderblichen Substanzen*. Die Nahrungsmittel o. dgl. werden in einem ganz oder teilweise evakuierten Behälter aufbewahrt, dem ein Absorptionsmittel für CO_2 oder sonstige aus den Nahrungsmitteln sich entwickelnde Gase so angeordnet ist, daß es nicht mit den ersteren in Berührung kommt. — Als Absorptionsmittel kann z. B. eine Mischung aus 3 Teilen ungelöschtem Kalk u. 1 Teil aktivierter Kohle dienen. (Austr. P. 16 776 vom 10/3. 1924, ausg. 12. 1925.)

OELKER.

H. Steenbock, Madison, Wisconsin, V. St. A., *Nährmittel u. dgl.* Zwecks Anreicherung von Nähr- u. Futtermitteln mit Vitaminen unterwirft man erstere der Einw. von ultravioletten u. ähnlichen Strahlen. — Hefe, Cerealien, Milch, Butter u. andere Fette u. Öle können in dieser Weise mit Vitaminen angereichert werden. (P. 236 197 vom 12/6 1925, Auszug veröff. 19/8. 1925. Prior. 30/6. 1924.) OELKER.

William Thomas Ryle, Thornton Heath, Surrey, Engl., *Herstellung von braunem Mehl für die Brotbereitung*. Weizenkorn wird teilweise vermahlen u. dann von den Schalen getrennt. Letztere werden geröstet u. dann mit den abgetrennten Bestandteilen vermischt, worauf man diese Mischung nochmals fein vermahlt. (Austr. P. 16 094 vom 24/1. 1924, ausg. 12/6. 1924.)

OELKER.

Paul Barrielle, Apt, Vaucluse, Frankr., *Herstellung von eingemachten (gezuckerten) Früchten*, bei der die ablaufende, durch das aus den blanchierten Früchten aufgenommene Zuckerlsg. in einem Verdampfer auf die ursprüngliche Konz. gebracht u. dann wieder zur Behandlung der Früchte verwendet wird, dad. gek., daß man eine Zuckerlsg. nach Art des in der Zuckerindustrie üblichen Diffusionsverf. durch eine Reihe, z. B. 20, die blanchierten Früchte enthaltende Behälter (Tröge) leitet, die Zuckerlsg. aus dem Behälter mit der jeweils geringsten Konz. der Zuckerlsg. in den Verdampfer zuführt u. dann wieder in den Kreislauf einschaltet. (D. R. P. 6323 Kl. 53c vom 20/3. 1923, ausg. 6/3. 1926.)

OELKER.

Paul Grandmont, Algier, und **Placide Oscar Isidor Navarre**, Frankreich (Seine), *Konservieren von Fruchtsäften und anderen verderblichen Substanzen*. Man unterwirft Säfte o. dgl. in der Hitze der Einw. von SO_2 . (F. P. 599 831 vom 11/9. 1924, ausg. 1. 1926.)

OELKER.

Margaret McLeod, **Alexander C. Mac Kenzie** und **Robert Prosser Adams**, Winnipeg, Canada, übert. von: **David Sweeney**, Winnipeg, Manitoba, Canada, *Carbo-*

nisieren von Milch oder Sahne. Ein geschlossener, mit Rührwerk ausgestatteter Behälter wird mit der Milch oder Sahne gefüllt, derart, daß noch ein gewisser Luftraum in dem Behälter verbleibt. Dann wird die Luft ausgetrieben u. eine bestimmte Menge CO₂ unter einem bestimmten Druck in das Gefäß eingeführt, wobei nach jedesmaliger Einleiten der CO₂ die Milch oder Sahne umgerührt wird. (A. P. 1 570 975 vom 11/1 1922, ausg. 26/1. 1926.) OELKER.

De Laval Separator Company, New York, übert. von: **Cyrus H. Hapgood**, Nutley, N. J., V. St. A., *Gewinnung von Milchköhl.* Man unterwirft Sahne in Zentrifuge im kontinuierlichen Strome einer Waschung mit W., wobei gleichzeitig eine Trennung der Sahne vom W., Casein u. sonstigen festen Bestandteilen erfolgt. Die gewaschene Sahne wird dann geschlagen, mit W. verdünnt u. dann nochmals zentrifugiert, u. das W. u. die letzten Spuren von Casein usw. auszuschcheiden. (Can. P. 251 503 vom 7/5. 1924, ausg. 7/7. 1925.) OELKER.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

R. O. Herzog und H. W. Gonell, *Zur Kenntnis der Seidenbeschwerung.* V. berichtet über die Unters. beschwerter Seide mit Röntgenstrahlen. Bei niedriger Beschwerungsgrad mit Zinnphosphat u. Wasserglas (5—20%) macht sich das Beschwerungsmittel im Diagramm nicht bemerkbar. Bei stärkerer Beschwerung überlagert das Faserdiagramm Interferenzringen. War ein Tonerdebad eingeschoben, so zeigt das Diagramm einen starken Hof um den Durchstoßpunkt des Röntgenstrahls (amorphe Abscheidung). Bei Seide, die mit Eisenbeize, Ferrocyanidkalium, Katechu behandelt war, wurde ein Ringdiagramm erhalten. Die Beschwerungsmittel scheiden sich also kryptokrystallin ab. Das ursprüngliche Punktdiagramm der Seide blieb erhalten. Es entsteht keine chem. Verb. mit der Hauptmenge der Seiden substanz. Am wahrscheinlichsten ist, daß das Beschwerungsmittel sich in die intermicellare Substanz u. die entstehenden Abbauprodukte der Faser einbettet. (Ztschr. angew. Ch. 39. 380—81. Berlin-Dahlem.) JUNG.

A. Schamelhout, *Die Cellulose und ihre industrielle Anwendung.* Vf. bespricht V., Eigenschaften u. Umwandlungen der Cellulose, ihre anorgan., organ. u. gemischten Ester, deren Analyse, sowie ihre techn. Verarbeitung zu Schießpulver, Celluloid, Lacken, Kunstleder, Kunstseide usw. (Journ. Pharm. de Belgique 8. 163—66. 1 bis 187.) ROJAHN.

S. E. Sheppard, E. K. Carver und S. S. Sweet, *Der Zeitfaktor und der Schwellenwert (yield value) der Elastizität von Celluloseestern.* Die Beobachtung der Vf. (v. S. 1096), daß Celluloseester nicht vollkommen elastisch sind, sondern auch unter geringer Belastung anfangen zu fließen, wird durch neue Unters. bestätigt. Dabei werden die mit den gewöhnlichen Prüfinstrumenten erhaltenen Schwellenwerte der Elastizität relativ, d. h. sie sind abhängig von der Geschwindigkeit, mit der die Instrumente durch Motoren o. ä. betrieben werden. Hierfür geben Vf. eine Anzahl von Verss. zum Beleg. (Ind. and Engin. Chem. 18. 76—77. Rochester [N. Y.], Eastman Kodak Co.) HANTKE.

G. Durocher, *Die neuzeitliche Fabrikation von Perlenimitationen.* Zusammenfassende Darst. (La Nature 1926. 161—66.) JUNG.

W. Lepper, *Einfaches Mittel zur Verhinderung des Stoßens bei der Rohfasergewinnung.* Zur Verhinderung des Stoßens beim Kochen mit KOH bei der Rohfasergewinnung best. wird der Boden des Becherglases mit Glasperlen bedeckt. (Chem.-Ztg. 50. 21 Augustenberg.) JUNG.

Charles S. Reeve und Frank W. Yeager, *Maschine zur Bestimmung der Biegsamkeit von Dachpappe und der Punkt des Bruches von Bitumen.* Das Probestück wird

über einen 5-mm-Dorn gezogen u. der Winkel gemessen, bei dem Bruch der Oberflächenschicht auftritt. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. Papers. 85—91. 1925. Barrett Co. Grantwood N. J.)
SALMANG.

Robert Stevenson und **Fredric William Wakefield**, Tyrone, England. *Verfälschen und Mercerisieren von Geweben*. Gewebe aus Garnen tier. u. pflanzlichen Ursprungs, z. B. aus Wollgarn u. Baumwoll-, Leinen- usw. -garn, werden wiederholt durch eine Ätzalkalisch. geführt, gewaschen, mit verd. Säuren behandelt, gewaschen u. getrocknet; hierbei wird die tier. Faser zerstört u. aus dem Gewebe entfernt, gleichzeitig wird die Baumwolle gereinigt u. mercerisiert. (E. P. 240 378 vom 28/3. 1925, ausg. 22/10. 1925.)
FRANZ.

C. M. Taylor, Elizabeth, New Jersey, V. St. A., *Überziehen von Geweben*. Man tränkt einen Filz mit Asphalt, Bitumen oder einer Celluloseesterlsg., bringt dann den auf Verzierungen dienenden Anstrich auf u. überzieht hierauf mit einem durchsichtigen Lack, der aus einer Lsg. von Acetyl- oder Nitrocellulose in Butylalkohol, Amylacetat u. einem Weichhaltungsmittel, wie Phthalsäuredibutylester, Ricinusöl, Tricresylphosphat usw. bestehen kann. (E. P. 243 614 vom 16/5. 1925, ausg. 24/12. 1925.) FR.

P. Spence & Sons, Limited, und **T. J. I. Craig**, Manchester. *Feuersichermachen von Faserstoffen*. Man tränkt die Faser mit einer sd. Lsg. von Alkalialuminaten u. behandelt dann mit gasförmiger CO₂ oder mit Alkalidicarbonaten. (E. P. 244 503 vom 18/8. 1924, ausg. 14/1. 1926.)
FRANZ.

The Know Mill Printing Co. Ltd., **Thomas Livesey Mort** und **Frederick William Weeks**, Entwistle b. Bolton, Lancaster, *Woll- oder Leinenähnlichmachen der Cellulosefaser*. Man behandelt die Cellulosefaser mit starker Schwefelsäure unter Zusatz von CH₃OH, Aceton, Essigsäure oder deren Homologen oder ihren Gemischen; durch den Zusatz der genannten Stoffe wird die Einwirkungsgeschwindigkeit der H₂SO₄ vermindert; man behandelt z. B. ein Baumwollgewebe 30 Sek. mit einem Gemisch von 25 g Essigsäure u. 75 g H₂SO₄ oder mit einem Gemisch von 46 g A. u. 196 g H₂SO₄. Das Gemisch kann auch auf die Faser aufgedruckt werden. (E. P. 241 246 vom 20/5. 1924, ausg. 12/11. 1925.)
FRANZ.

H. Matt, Bregenz, Österreich, *Leinenähnlichmachen von Baumwolle*. Baumwolle von einer Garnnummer nicht über 60 oder daraus hergestellte Gewebe werden mit H₂SO₄ nicht über 50,5° Bé 4 Min. behandelt, gewaschen u. dann unter Spannung mit NaOH von 15° Bé bei 0° mercerisiert; um die Einwirkungsdauer zu verlängern, kann die Schwefelsäure gekühlt werden. (E. P. 244 485 vom 11/12. 1925, Auszug veröff. 10/2. 1926. Prior. vom 11/12. 1924.)
FRANZ.

Alphonse Vergé, Seine, Frankreich, *Leinenähnlichmachen von Baumwolle*. Das Baumwollgewebe wird nach dem Sengen mit einer 1% ig. Sodalsg. abgekocht, leicht mit Chlor gebleicht u. getrocknet, das Gewebe gelangt dann in ein Schwefelsäurebad von 53—53,5° Bé, die Temp. muß unterhalb 15° sein, die Behandlung dauert 14 bis 16 Sek., hierauf wird die Säure durch Spülen mit W. vollständig entfernt, mit Lauge mercerisiert, mit Soda behandelt, mit Chlor gebleicht, mit Seife u. wenig Glycerin gewaschen u. kalandert. (F. P. 595 348 vom 11/6. 1924, ausg. 30/9. 1925.) FRANZ.

Linn Bradley, Montclair, N. J., und **Edward P. Mc Keefe**, Plattsburg, N. Y., *Papier*, welches aus durch Vermahlen von langfaserigem Holz u. durch Kochen von kurzfasrigem Holz mittels einer Alkalisulfitlauge hergestellten Stoffen zusammengesetzt ist. (Can. P. 252 454 vom 2/9. 1924, ausg. 11/8. 1925.)
OELKER.

Brown Company, übert. von: **George Alvin Richter**, Berlin, New Hampshire, V. St. A., *Zellstoff*. Zur Gewinnung von Zellstoff aus cellulosehaltigen Stoffen verwendet man eine Kochlauge, welche aus Lsgg. von Na₂S, Na₂SO₃ u. NaOH zusammengesetzt ist. (Can. P. 252 584 vom 2/7. 1924, ausg. 11/8. 1925.)
OELKER.

West Virginia Pulp and Paper Company, New York, übert von: **Vig Drewsen**, Larchmont, N. Y., V. St. A., *Behandlung von Sulfitablauge*. Man versetzt die eingedampfte Sulfitablauge mit einer Mischung von gelöschtem Kalk u. rohe Salpetersäurefabrikationsrückstand, dessen Gehalt an saurem Na_2SO_4 durch Kautschukfizieren mit Kalk in Na_2SO_4 u. CaSO_4 umgesetzt worden ist, brennt diese Mischung in einem rotierenden Ofen zwecks Red. der Sulfate u. B. einer geschmolzenen Mischung von CaS u. Na_2CO_3 , laugt letzteres aus der Mischung aus, behandelt das CaS in einer Suspension mit CO_2 , verbrennt den sich dabei entwickelnden H_2S zu SO_2 u. benutzt dieses zur Umwandlung der gewonnenen Na_2CO_3 -Lsg. in Na_2SO_3 -Lauge. (*Can. Ind. 252 011* vom 11/6. 1923, ausg. 21/7. 1925.) OELKER.

I. G. Farbenindustrie A.-G., übert. von: **Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning**, Höchst a. M., *Plastische Massen und Lacke aus Cellulosederivaten*. Als Lösungs- u. Gelatinierungsmittel für Nitrocellulose oder andere Cellulosederiv. verwendet man den *Di-n. butylester der Phthalsäure*; die Lsg., die mit Füllmitteln, Farbstoffen usw. versetzt werden kann, dient zur Herst. von *Lacken, plast. MM., Filmen, Kunstleder* usw. (**E. P. 245 469** vom 2/1. 1926, Auszug veröff. 24/2. 1926. *Pract. 2/1. 1925.*) FRANZ.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

A. C. Fieldner, *Verkokung von Kohle bei niedriger Temperatur*. Beschreibung der „Parker“-Anlage zu Barugh in Yorkshire, der letzten Abänderung des „Coalite“ Verf. der „Low Temperature Carbonization Co., Ltd.“ u. der erzielten Ergebnisse des in Deutschland nur für Braunkohle verwendeten „Rolle“-Ofens u. des „Piro Caracristi“-Verf. der „Ford Motor Co.“ zu Walkerville, Ontario, welches auf ganz neuem, viel beachteten Wege gemahlene Kohle in dünner Schicht in gußeisernen flachen Tiegeln oder Pfannen in kaum 5 Min. entgast, die schwimmend über die Oberfläche eines mit geschmolzenem Blei gefüllten Bottichs geführt werden. Die Schmelzwärme wird durch Verbrennung des erzeugten Gases gewonnen u. durch in das Bleibad tauchende Feuerrohre übertragen. Der erhaltene Halbkoks wird in einer Staubfeuerungsanlage verwendet. (*Amer. Gas Light Journ. 124. 179—80. 182.*) WFM.

Geoffrey Weyman, *Prüfung und Bewertung von Kohlen für Verkokungszwecke*. Ausführliche Beschreibung einer von Vf. gemeinsam mit E. W. SMITH u. T. F. L. RHEAD konstruierten kleinen Versuchsgasanstalt für $\frac{1}{1000}$ t Kohle mit Ni-Cr-Stahlretorte, flammenlos beheizt mit Gas-Preßluft-Gemisch, mit Reinigern, Behältern u. allem Zubehör. Arbeitsweise u. Unters.-Methoden werden unter Beifügung von Ergebnissen eingehend geschildert. (*Gas Journ. 173. 601—03. 677—79.*) WFM.

Hermann Koschmieder, *Das städtische Müll als Brennstoff*. Trotz der Verminderung des Heizwertes von 1000—1500 W.-E. vor dem Kriege auf 800—500 W.-E. in der Jetztzeit ist Hausmüll ein durchaus verwertbarer Brennstoff, wenn ein geeignetes Verbrennungssystem (DÖRR, HERBERTZ, HUMBOLDT) zur Verfügung steht u. wenn eine einwandfreie zweckmäßige Schlackenverwertung möglich ist. (*Die Wärme 49. 207—10. Berlin-Friedenau.*) SPLITTGERBER.

D. J. W. Kreulen, *Zusammenfassung der Untersuchungen über Kohle aus den Jahren 1923, 1924 und 1925*. (Vgl. *Chem. Weekblad 22. 560; C. 1926. I. 1339* u. *Brennstoffchemie 6. 6; C. 1925. I. 1541.*) Kurze Übersicht. (*Bull. Fédération Industr. Chim. de Belgique 1925. 533—46. Rotterdam.*) GROSZFELD.

C. Arnemann und F. Plenz, *Die Zentralgeneratorenanlage des Gaswerkes Lichterberg II bei Berlin*. Ausführliche Beschreibung der Generatoren, der Rohgasleitung, Teereinigungsanlage, Gaskühlung, Luftleitung, Regulierung u. der Nebenapparate. - Genauer Bericht über die vom Gasinstitut Karlsruhe ausgeführten Abnahmeversuche an der Anlage, bei welchen der Vergasungswirkungsgrad, der therm. Wirkungsgrad einschl. des Kraftbedarfs der Antriebsmaschine, die Wärmebilanz u. die Kohlenstoff-

nz festgestellt wurde. (Gas- u. Wasserfach **69**. 205—210. Halle a. S. u. Gas-Institut Karlsruhe i. B.)

WOLFFRAM.

H. Lininger, *Retortenöfen für kontinuierliche Destillation System Glover West*. Ausführliche Beschreibung der von der West's Gas Improvement Co. Ltd., Manchester, gebauten Glover-West-Öfen mit senkrechten, halbkontinuierlich betriebenen Retorten, der Regel 8 Stück, von denen je 2 oder 4 gemeinsam beheizt werden. Abweichend von der Bauart der Woodall-Duckham-Kammeröfen ist kein eigentlicher Rekuperator vorhanden, sondern der untere Retortenteil wirkt als solcher, auch sind die Heizzüge gleichmäßig über die ganze Retortenhöhe verteilt. Ergebnisse von Garantieverss. (Sch. Ver. Gas- u. Wasserfachmänner Öst. **66**. 26—29.)

WOLFFRAM.

B. Nerreter, *Über die Verwertung von Faulschlammgasen für die Gasversorgung von Essen*. Ausführlicher Bericht über die von der „Emscher-Genossenschaft“ u. dem Ruhrverband“ aus den Kläranlagen Essen-Nord u. -Rellinghausen bezogenen u. für die Gasversorgung der Stadt Essen nutzbar gemachten Mengen von Faulschlammgasen, ihre Zus., ihr Verh. in Gaskochern u. Glühlichtbrennern u. den Einfluß des Gases auf die Beschaffenheit des abgegebenen Gases. (Gas- u. Wasserfach **69**. 189—189. Essen.)

WOLFFRAM.

—, *Das Blutlaugensalz*. Gewinnung von $K_4Fe(CN)_6$ aus Gasreinigungsmasse, techn. Verwendung u. Nebenbetriebe. (Metallbörse **15**. 2723—24. 2780—81. 2835—36. 25). **16**. 36—37.)

BEHRLE.

—, *Das Berlinerblau*. Gewinnung aus Gasreinigungsmasse, techn. Verwendung, techn. Verwertung. (Metallbörse **16**. 89—90. 145—46.)

BEHRLE.

Alfred Faber, *Die energiewirtschaftliche und technische Verwertung der Braunkohle*. Bedeutung der Braunkohle in der Weltwirtschaft u. im besonderen ihre Bedeutung in der Energiewirtschaft Deutschlands. (Gewerbefleiß **105**. 21—31. Leipzig.)

NEIDHARDT.

F. Fischer, *Elektrische Reinigung von Brüden in Braunkohlen-Brikettfabriken*. Beschreibung der elektr. Brüdenentstaubung in den Brikettfabriken der „Ilse Bergbau-Gesellschaft, Grube Ilse N. L.“ Es wird der Nachweis erbracht, daß mit der elektr. Entstaubung gegenüber dem bisherigen Entstaubungsverf. große wirtschaftliche Vorteile erzielt worden sind. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **70**. 253—60. Grube Ilse, N. L.)

NEIDHARDT.

A. E. Miller, *Zeitgemäße Behandlung von Petroleumölen*. Vf. beschreibt ausführlich die Reinigung von Benzin, Leuchtölen (Kerosin), Schmierölen u. Paraffin. Raffinerien u. erörtert die verschiedenen Verf.: die Anwendung von SO_2 u. $NaOCl$ -Verf., die schott. Säurebehandlung, sowie die Reinigung mit Adsorptionsmitteln u. Filtern. (Gas Journ. **24**. No. 41. 86. 130. 132.)

ASCHER.

C. K. Francis, *Schwefel als Korrosionsfaktor*. Ohioöl blieb infolge seines hohen Schwefelgehalts unverwertbar bis zur Einführung des Verf., S in der Destillierblase an Cu zu binden. S reichert sich besonders in den letzten Fraktionen u. im Rückstand an, tritt er in kleinen Mengen schon am Ende der Gasolinfraktion auf; dies dürfte mit dem B. von H_2S zusammenhängen, der seinerseits durch Einw. von HCl, durch S, der oft im Öl enthaltenen Ca- u. Mg-Chloride entstanden, auf den im Öl oder in der Apparaturmetallen vorhandenen S entsteht. Die Korrosion wird an den Stellen der Apparatur, wo sich Fe mit S gebildet haben, besonders gefördert durch Einw. von HCl in verd. Form; um etwaige HCl-Dämpfe möglichst wenig zu lösen, wird daher das W. aus dem Kondensersystem frühzeitig abgeleitet werden. In den ersten Fraktionen bildet S auch S-Oxyde oder -Säuren mit korrodierenden Eigenschaften, nicht minder schädlich wirkt elementarer S auf heißes Fe. — Die Reinigung mittelkontinentalen Öle wird zweckmäßig so betrieben, daß das Rohöl alkalisch gemacht bzw. in die Blasen oder den Turm Neutralisiersubstanzen, besonders

NH₃, gegeben werden. — Schließlich verweist Vf. auf WILSON u. BÄHLKE (Ind. Engin. Chem. **17**. 355; C. **1925**. II. 983) bzgl. besonders korrosionsbeständiger Legierungen, wie hoch-nickelchromierter Stahlsorten. (Oil Gas. Journ. **24**. No. 70. 146.)

ASCHEI

A. E. Wood, Clyde Sheely und A. W. Trusty, *Wirkung von Petroleumraffineriemitteln auf die Lösung reiner organischer Schwefelverbindungen in Naphthalin* (Vgl. S. 218.) Als S-Verbb. wurden bei den Verss. verwandt freier S, i-Amlycaptan, H₂S, Dimethylsulfat, Methyl-p-Toluolsulfonat, CS₂, n-Butylsulfid, Thiophen, Diphenylsulfoxyd u. n-Butylsulfon, als Raffineriemittel alkal. Natriumplumbit (DOKTOR-Lsg.), NaOH, Silicagel, Fullererde, Al₂O₃ u. H₂SO₄ (rauchend, 66° B ϕ 53° B ϕ). Aus den Tabellen des Originals sind die Wrkgg. der einzelnen Raffineriemittel zu ersehen. Freier S u. CS₂ werden von keinem angegriffen, sonst wirkten besten H₂SO₄ u. Silicagel. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 169—71. Clinton [Miss.])

K. Kostrin, *Die nahe Zukunft der Naphthenerdöle*. Infolge der Giftigkeit Tetraäthylbleis wendet sich die Aufmerksamkeit auf die Verwendung von Naphthalin (oder Bzl., aber Bzl. brennt mit Rußbildung), als Antidetontatoren. Da die Antidetontatorwrkg. im allgemeinen mit der relativen C-Menge im Moll. steigt u. da wasserstoffärmeren KW-stoffe bei gleichem Kp. höhere D. haben als die wasserstoffreicheren, so gibt der Brennstoff die höchste Explosionstemp., dessen D. bei gleichem Kp. die größte ist. In dieser Hinsicht ist das Bakuer Bzn. allen amerikan. überlegen. (Neftjanoe Chozjajstwo **9**. 754—56. 1925.)

BIKERMAN

L. Sselski, *Über die Kerosine von Grosnyi*. Aus wirtschaftlichen Gründen werden neuerdings den Kerosinen alle bis 200°, manchmal sogar alle bis 225° sd. Fraktionen abgezogen u. als Bestandteil von Bzn. verwertet. Vf. untersucht den Einfluß dieser Veränderung auf die Brennbarkeit u. Leuchtstärke des Kerosins. Um das letztere noch als Leuchtöl verwenden zu können, müssen gleichzeitig mit den leicht sd. Fraktionen die über 270° sd. Fraktionen entfernt werden. Das so enger ausgeschnittene Petroleum hat den Flammpunkt bei ca. 60° u. eine lange „latente“ Periode, bis die Leuchtstärke ihr Maximum erreicht hat. Sind die schwereren Fraktionen (über 270°) nicht entfernt, so muß ein spezieller Brenner mit Vorerwärmung des Kerosins in der Lampe benutzt werden. — Zum Schluß wird eine Zusammenstellung der Daten über den Kerosingehalt der Erdöle von Grosnyi angeführt. (Neftjanoe Chozjajstwo **9**. 742—1925. Grosnyi, „Grosneft“.)

BIKERMAN

K. Markow, *Ozokerit*. Zusammenfassender Bericht über die Nomenklatur, chem. u. physikal. Eigenschaften, Verwendung, V., Gewinnung u. Verarbeitung des Ozokerits sowie über Ceresin u. seine Ersatzstoffe. (Neftjanoe Chozjajstwo **9**. 767—88. 1925.)

T. H. Rogers, F. V. Grimm und N. E. Lemmon, *Adsorptionsuntersuchungen bei der Entfärbung von Mineralölen*. Nachprüfungen ergaben die Brauchbarkeit der Methode von PARSONS u. WILSON zur Messung der Farbtiefe, desgl. die Gültigkeit der Freundlichschen Adsorptionsgleichung. Die in Crackdestillaten auftretenden starken Färbungen beruhen auf Oxydationserscheinungen. Sie lassen sich leicht durch Behandlung mit Fullererde entfernen. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 164—69. White [Ind.].)

GRIMME

W. C. Luckow, *Schmieröle. Deren Prüfung und Einkauf*. Besprochen werden D., Viskosität, Entflammungspunkt, Brennpunkt, Unverseifbares, Mineralsäure-Kälteprüfung, Conradsons Kohlerückstand, prakt. Verss. Tabellar. Zahlenangaben. (Baking Technology **5**. 40—43.)

GROSZFEELD

Wa. Ostwald, *Deutsche Kraftstoffe*. Vortrag. (Metallbörse **16**. 34—Bochum.)

BEHRLE

Surgeon General Committee, *Bericht des Surgeon-Generalcommittees über Tetraäthylblei*. Es gelang nicht der Nachweis, daß Verwendung von Motorbetriebsstoffen

GRIMME.

NEIDHARDT.

NEIDHARDT.

BEHRLE.

ASCHER.

ACH KÖNNEN.

9.) ВКМ.

HELLER.

lunch Over

schnittserweiterung. Im Steigrohr wird durch Stoßbleche die Strömungsrichtung mehrfach geändert, im erweiterten Filterkörper wird durch rechteckige Waben Wirbelbildung verhindert. Die letzten Staubschichten bleiben in Sieben hängen. (Zentralblatt d. Hütten u. Walzw. **30**. 108.) JUN

Walter E. Trent, Washington, Col., *Herstellung von Koks*. Man vermischt KW-stofföl mit einer fein verteilten Substanz, welche geeignet ist, sich mit S zu binden, verarbeitet diese Mischung mit pulverisierter Kohle zu einer homogenen und unterwirft diese der Verkokungstemp., wobei die flüchtigen Bestandteile destillieren u. der in der Kohle enthaltene S sich mit der oben erwähnten Substanz verbindet. (**Can. P. 252 558** vom 4/10. 1924, ausg. 11/8. 1925.) OELKER

Walter E. Trent, Washington, Col., V. St. A., *Herstellung von Koks*. Man beschickt einen Behälter mit zerkleinerter Kohle, versieht die M. mit durchgehenden Kanälen, bringt sie in einen Ofen u. leitet durch die Kanäle h. Gase, durch welche flüchtigen Bestandteile aus der Kohlenmasse ausgetrieben werden u. letztere zu einem zusammenhängenden M. zusammengeschmolzen wird. (**Can. P. 252 557** vom 7/4. 1924, ausg. 11/8. 1925.) OELKER

De Bataafsche Petroleum Maatschappij, s'Gravenhage, *Herstellung von Handbenzin aus Gas- oder Kompressionsbenzin*. Nach starker Abkühlung des Bzn. wird der Druck bis auf ungefähr 1 Atm. verringert u. alsdann nach u. nach auf gewöhnlichen Druck gebracht, während die Temp. allmählich auf die der Umgebung um Entweichenlassen der Gase u. Dämpfe gebracht wird. (**Holl. P. 14 022** vom 30. 1922, ausg. 15/12. 1925.) OELKER

XXI. Leder; Gerbstoffe.

Antonio Campins, *Die Chromgerberei*. Vf. behandelt den Mechanismus des Gerbens beim Einbadverf. im allgemeinen u. die Wirksamkeit der bas. Chromsulfate im besonderen. (*Quimica e Industria* **3**. 36—38.) HANTKE

Ch. Groud, *Die Fermente in der Gerberei*. Beschreibung der fermentativen Vorgänge beim Enthaaren, Beizen u. bei der vegetabil. Gerbung. (*Le Cuir Technique* **313—14**. 1925.) GERNGROSZ

P. Pawlowitsch, *Über die unlöslichen Stoffe im Eichenholzextrakt*. Vers. ergab, daß das Unlösliche von Eichenholzextrakten (durch Absitzenlassen) bei 8—90° starken Brühen am größten ist. Die Menge des Unlöslichen ist wesentlich größer, wenn die Brühe durch Verdünnen, als wenn sie durch Eindampfen auf diese Konzentration gebracht wurde. Erwärmen der Brühe von 20 auf 40° verringert das Unlösliche auf die Hälfte. (*Collegium* **1926**. 78—81.) RIESS

O. Fernández und **J. M. Fernández**, *Die Acetylierung des Tannins und Analyse der Handels-Acetyltannine*. 50 g Tannin wurden mit 200 g Essigsäureanhydrid gemischt u. einige Tropfen H₂SO₄ hinzugefügt. Das Gemisch wurde gekühlt an der Pumpe getrocknet und analysiert. Die von Vf. benutzte Methode war von PERKIN (*Journ. Chem. Soc. London* **85**. 1462 [1904]); sie ergab das Resultat, daß 25 Acetylreste im Mol. vorhanden waren. In Ggw. von Essigsäureester u. we. H₂SO₄ werden jedoch nur 19—20 Acetylgruppen eingeführt. Des weiteren beschäftigte sich Vf. mit der Analyse einiger Handels-Acetyltannine, von denen das Acetyltannin von ARCHETTI ca. 14, das Tannin von BAYER 19—20 u. das Diacetyltannin von BUBECK u. DOLDER 10 Acetylene enthalten. (*Anales soc. espanola Fis. Quim.* **62—67**. Madrid, Fac. de Farmacia.) HANTKE

—, *Industrielle Verwertung von Lederabfällen*. (Metallbörse **16**. 652. 708.) BEHR

G. Hugonin, *Bemerkungen zu den Kritiken, welche an dem vorgeschlagenen Verfahren für die Methode der quantitativen Gerbstoffanalyse gemacht wurden*. (Vgl. S. 162.) Erwiderungen u. Erörterungen der von engl. u. französ. Gerbereichemikern gemacht

wände gegen den in der Märznummer des J. S. L. T. C. publizierten Text der
ziellen Gerbstoffbestimmungsmethode. (Le Cuir Technique 17. 188—94. 1925.) Gg.

James Stuart Burns, London (Erfinder: **Charles Joseph Michel Marie Le Petit**,
is), *Beizen von Häuten und Fellen*. Die in üblicher Weise geweichten u. enthaarten
ute oder Felle werden der Wrkg. von lipolyt. Fermenten, ausschließlich vegetabil.
rkunft, in einer sauren Fl. u. in Ggw. eines Aktivators für die lipolyt. Fermente
erworfen. — Das Verf. liefert bei nachfolgender Gerbung der gebeizten Häute ein
kes u. festes Leder. Die Durchgerbung erfolgt wesentlich schneller als bei Ver-
dung mit trypt. u. anderen tier. Fermenten gebeizter Häute. Z. B. werden die mit
Na₂S u. Alkalihydroxyd enthaarten Häute mit in W. gel. NaHSO₃ behandelt u.
m in ein Bad gelegt, das eine wss. Lsg. einer organ. Säure, wie HCO₂H, Buttersäure,
CO₂H, mit oder ohne Zusatz von NaF oder NaCl, enthält. Hierauf legt man die
ute in ein *Lipasebad*, das durch Mischen von W., *Ricinussamenfleisch*, Na-Sulfo-
nat, MnSO₄ u. einer *Milchsäurebakterienkultur* erhalten wurde u. beläßt sie 2 Tage
einer Temp. von 26—28° in dem Bade. Während der ganzen Behandlungsdauer
d das Bad mit einer organ. Säure schwach sauer gehalten. Die Häute werden schließ-
mit verd. Alkali, dann mit W. oder verd. Säure gewaschen u. sind dann zum Gerben
eit. Hierzu verwendet man Gerbfl. von 0,5—12° Bé. u. hält die Temp. bei der
bung auf 36°. Bei Verwendung eines nicht mehr als 9° Bé. starken Gerbextraktes
rt man zweckmäßig in die Gerbtrommel ein Gemisch von 1. sulfoniertem Mineralöl,
Sulforicinat u. Terpentinöl ein, um die Haut weich u. für die Gerbextrakte empfäng-
er zu machen. Außerdem kann die Gerbfl. noch NaCl u. fl. KW-stoffe oder deren
Derivv., wie Petroleum, CCl₄, Acetyltetrachlorid, oder auch CS₂ enthalten. Die
Milchsäurebakterienkultur gewinnt man durch Züchtung von Milchsäurebakterien in
m *Ricinussamenfleisch* u. Na-Sulforicinat enthaltenden wss. Medium bei ca. 28°
rend 3 Tagen. (Aust. P. 16 527 vom 21/2. 1924, ausg. 22/7. 1924. F. P. 575009
26/12. 1923, ausg. 23/7. 1924. E. Prior. 1/1. 1923. Schwz. P. 112 000 vom 26/1.
4, ausg. 1/10. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Charles Joseph Michel Marie Le Petit, Paris, **James Stuart Burns**, London,
Christian Andrew Blanke, Paris, *Beizen von Häuten und Fellen*. (E. P. 216 546
r 1/1. 1923, ausg. 26/6. 1924. — vorst. Ref.)

SCHOTTLÄNDER.

British Leather Manufacturers Research Association, **Dorothy Jordan Lloyd**
Robert Howson Pickard, London, *Einweichungsflüssigkeit für trockene Häute u. dgl.*,
ehend aus verd. Lsgg. von Natriumcitrat, Na₄Fe(CN)₆, K₄Fe(CN)₆, Na₂P₂O₇ u. dgl.
P. 221 058 vom 27/7. 1923, ausg. 25/9. 1924.)

KÜHLING.

Kandidus Harlacher, Schöfflisdorf (Zürich, Schweiz), *Verfahren zum Gerben von*
Häuten, Fellen, Bälgen, dad. gek., daß zur Gerbung *Rhabarber* verwendet wird. —
benutzt besonders die ähnlich wie Tabakblätter getrockneten u. gemahlenen
ter der *Rhabarberpflanze*. Diese werden mit h. W. versetzt u. die k. Lsg. in ein
bgefäß gefüllt. In die Lsg. wird die vorbereitete Haut eingebracht. Je nach der
tdicke ist die Gerbung in einigen oder mehreren Stdn. beendet. Die Gerblsg. kann
ach Verbrauch in 5—10 Tagen erneuert werden. Das Verf. ermöglicht unter An-
dung eines billigen Abfallprod. die rasche B. von gutem Leder. (Schwz. P. 113 352
2/2. 1925, ausg. 2/1. 1926.)

SCHOTTLÄNDER.

H. Th. Böhme A.-G. Chem. Fabrik, Deutschland, *Entfetten von Häuten und*
er. Zum Entfetten werden chlorierte KW-stoffe in Mischung mit hydrierten Naph-
inen oder ähnlichen hochsd. KW-stoffen verwendet, welche die Wrkg. der chlorier-
KW-stoffe regeln. (F. P. 592 025 vom 22/1. 1925, ausg. 22/7. 1925. D. Prior.
1924.)

KÜHLING.

J. Mayer & Sohn, Deutschland, *Wiedergewinnung von Chrom aus Chromleder-*
ellen. Man mischt die Abfälle, nachdem man etwa darin enthaltenes Cr in Chromat

übergeführt hat, mit Salzen (Ba-Salze). (F. P. 601 579 vom 7/7. 1925, ausg. 4 1926.)

KAUSCH

XXIV. Photographie.

G. Kögel und A. Steigmann, *Über das Wesen der optischen Sensibilisierung u. der Desensibilisierung.* Um das Wesen der Sensibilisation u. Desensibilisation zu studieren, machen Vff. Verss. mit Ag-freien Farbstoffsystemen. Chinondiazide spalten sich in Ggw. von Feuchtigkeitsspuren in N_2 u. Phenole, die bei Anwesenheit von N_2 u. anderen Alkalien zu bilderzeugenden Farbstoffen gekoppelt werden. Es lassen sich auch latente Lichteindrücke erhalten, die mit $AgNO_3$ u. Metol entwickelbar sind. Vff. kommen zu der Anschauung, daß bei der Belichtung von Farbstoffsensibilisationssystemen der Farbstoff hydriert, der Sensibilisator (Gelatine) dehydriert wird. Ein Methylenblaugelatinestreifen wird belichtet, einem $AgNO_3$ -Bad ausgesetzt u. dann mit Ag-freier Metolsulfitslg. entwickelt: es erscheinen ca. 40 Eder-Hechtgrade. Weitere Verss. zeigen, daß bei den mit *Methylenblau* desensibilisierten Halogen-Ag-Emulsionen im Gelb u. Rot nur der Farbstoff, nicht das Halogen-Ag verändert wird. In Ggw. von AgBr wird *Methylenblau* schneller ausgebleicht, der Einfluß beschränkt sich hauptsächlich auf kurzwelliges Licht, wo der Farbstoff allein nicht lichtempfindlich ist. Die opt. Sensibilisierung dagegen ist eine primäre Lichttrk. der Farbstoffe allein ohne Mitwirkung des Halogen-Ag. Vff. stellen die Theorie auf, daß unter dem Einfluß des Lichts labiler H_2 eines Sensibilisators photochem. aktiviert wird, der Farbstoff wasserstoffhydriert. Im kurzwelligen Licht aktiviert auch AgBr den H_2 , der aus der Gelatine stammt. Desensibilisatoren, die sehr leicht hydrierbar sind, fangen diesen H_2 ab und verhindern damit die Red. des Halogen-Ag. Im Einklang damit steht die Tatsache, daß die Leukobasen der Desensibilisatoren unwirksam sind. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **24**. 18—31.)

KELLERMANN

Hugo Maria Kellner, *Der Einfluß starker Erhitzung auf die Eigenschaften photographischer Trockenplatten.* Erhitzen einer photograph. Platte hat einen Einfluß auf die Beziehung zwischen wirksamer Lichtmenge u. Schwärzung. Im allgemeinen wird eine Erhöhung der Schwärzung der entwickelten Platte erzielt. Erhitzen während der Belichtung wirkt besonders stark, Erhitzen vor der Belichtung steigert die Empfindlichkeit wenig empfindlicher Platten, Erhitzen nach der Belichtung ist weniger wirksam. Bei 90° liegt ein Optimum der Empfindlichkeitssteigerung, höhere Temp. geben Anlaß zu Schleierbildung; der Effekt steigt mit der Dauer der Erhitzung, bei Nacherhitzung wird ein Optimum durchschritten. Scharf getrocknete Emulsionen unterliegen einer geringeren Beeinflussung. Es wird festgestellt, daß die latente Bildsubstanz durch das Erhitzen zunimmt; mikrophograph. Unterss. ergeben, daß die Änderung der Korngröße gering ist. Mit Hilfe von Mikrotomschnitten durch die Schicht wird gefunden, daß bei unerhitzten Platten die Hauptanzahl der Körner an der Glasseite liegen, bei vorerhitzten Platten findet eine Ansammlung an der Luftseite statt. Vff. faßt die bei Erhitzung auftretenden Erscheinungen als Endstadium eines Reifungsprozesses auf. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **24**. 63—78.)

Fritz Wentzel, *Die Herstellung der photographischen Trockenplatten und der Filme.* Beschreibung u. Abbildung der maschinellen Einrichtung zur Herst. von photograph. Trockenplatten u. der Filme. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **70**. 277—83. 3 bis 30.)

NEIDHARDT

Lüppo-Cramer, *Topographische Verhältnisse bei der Entwicklung.* Mit einem sauren Amidolentwickler kann man bei einer stark belichteten Platte eine Schichttiefenentfaltung erhalten, die Red. des AgBr beginnt an der Glasseite, an der Schichtseite wird das AgBr später abgesetzt. Vff. erklärt die Erscheinung durch das Adsorptionsvermögen der Gelatine. Das salzsaure Amidol ist hydrolysiert, HCl wird adsorbiert, in der Tiefe der Schicht daher die Lsg. weniger sauer u. das Reduktionsvermögen größer. Entwickelt man

n Sensitometerstreifen schnell, so beobachtet man, daß die schwächer belichteten
 ler auf der Glasseite eher erscheinen als die stark belichteten; der Entwickler wird
 der Oberfläche zu rasch verbraucht u. das Reduktionsvermögen verschwindet beim
 dringen in die Tiefe, wenn starke Belichtung vorliegt. Entwickelt man langsam
 Glycin bei Ggw. von KBr, so erfolgt die Schwärzung nach Maßgabe der Licht-
 nsität. Diese Erscheinungen sind nach LIESEGANG bei der Abstimbarkeit des
 wicklers für überexponierte Platten wichtig; in einem mit Bromid versetzten Ent-
 wickler werden die Schatten so lange zurückgehalten, bis die Lichter genügende
 kung haben. Nach Ansicht des Vf. spielt dabei auch die Tatsache eine gewisse
 e, daß infolge der Lichtabsorption in der AgBr-Gelatine eine lokale Differenzierung
 latenten Bildes auftritt, derart, daß schwächer belichtete Bildteile hauptsächlich
 der Oberfläche liegen, während bei starker Belichtung das latente Bild bis auf die
 seite reicht. Verss. des Vfs. mit stark überexponierten Platten, die von der Glas-
 e oder von der Bildseite belichtet werden, zeigen, daß in diesem Gebiet die lokale
 eilung des latenten Bildes keinen Unterschied in der Wrkg. zwischen Rapid- u.
 entwickler mehr bedingt. — Bei der physikal. Entw. von AgJ entsteht der Ag-Nd.
 tsächlich außen auf der Schicht. Der Nd. ist sehr kompakt; Vf. findet, daß das
 te Bild bei AgJ im Gegensatz zu dem von AgBr u. AgCl aus kleineren, aber zahl-
 eren Amikronen besteht; infolgedessen werden an der Oberfläche größere Mengen
 ierendes Ag verbraucht, so daß in der Tiefe nur wenig Ag zur Ablagerung kommt. —
 Frage, ob das primär fixierte latente Bild der Solarisation zugänglich ist, ergeben
 Verss. des Vfs., daß das Prod. der solarisierenden Belichtung vom Fixiermittel
 merklich angegriffen wird. Bei grobkörnigen Schichten befinden sich im Innern
 Korns noch Keime, die durch Fixierung bloßgelegt werden u. Entwickelbarkeit
 rsachen, bei feinkörnigen ist das nicht möglich. Bei der n. Solarisation ist die
 re Struktur des Korns maßgebend; die Entw. ist in diesen Fällen vorwiegend auf
 Kornoberfläche beschränkt, an der sich das Solarisationsbild befindet. — Die Be-
 stungen lehren, daß man bei photograph. Vorgängen auch die räumlichen Ver-
 isse beachten muß. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie
 —12.)

KELLERMANN.

Lüppo-Cramer, *Entwicklungsparadoxien*. Verss. des Vfs. zeigen, daß entgegen der
 rtung ein 0,005%iger *Amidolentwickler* sehr viel rascher entwickelt als ein
 iger. Im Sinne der obigen Ausführungen (vgl. vorst. Ref.) wird das so gedeutet,
 das salzsaure Amidol in verd. Lsg. stärker hydrolysiert ist u. deshalb intensiver
 . Ähnlich verhalten sich *Triaminobenzol*, *Triaminotoluol* u. *Diaminoresorcin*.
 Zusatz von Na₂SO₃, der bei der üblichen Konz. das Entwicklungsvermögen des
 ols erst auslöst, wirkt bei stark verd. Lsg. der Entw. entgegen. Paradox erscheint
 ide Tatsache: Eine 1%ige Amidollsg. mit 1% KBr wird im Verhältnis 1:100
 Die dünne Lsg. entwickelt ein latentes Bild schnell, die konz. liefert kein Bild,
 rn zerstört es, auch für nachfolgende n. Entw. mit anderen Entwicklern. (Ztschr.
 s. Photographie, Photophysik u. Photochemie 24. 13—15.)

KELLERMANN.

Alessandro Michetti, Rom, *Neutralisieren des Körnigwerdens oder anderer*
an durchsichtigen oder halbdurchsichtigen Stoffen, insbesondere für photograph.
 ke. Man überzieht das Material auf der einen Seite mit einer lichtempfindlichen
 ht, setzt es dem Licht an der nicht lichtempfindlichen Seite aus. Dann wird
 chicht entwickelt u. fixiert. (E. P. 213 270 vom 20/3. 1924, ausg. 21/5. 1924. Prior.
 1923.)

KAUSCH.

Kino-Film Co. m. b. H. (Erfinder: **Eduard Schoemann**), Düren, Rhld., *Her-*
g barytierten photographischen Rohpapiers, dad. gek., daß das Rohpapier mit
 Emulsion von BaSO₄ in Gelatine oder einem anderen Bindemittel (Leim,
 o. dgl.) überzogen wird, die dadurch gewonnen ist, daß das BaSO₄ durch Zu-

sammenbringen von Ba- u. SO₄-Ionen in der ganzen Menge oder in einem Teil Bindemittels selbst hergestellt wurde. — Die ausgewaschene Emulsion wird in schmolzenem Zustande auf das Papier aufgetragen. (D. R. P. 424 938 Kl. 57 b v. 26/9. 1922, ausg. 8/2. 1926.) KÜHLING

Pierre Schestakoff und **Boris Merejkovsky**, Frankreich, *Photographische Entwickler*. Den Entwicklern werden Salze stickstoffhaltiger Säuren, Hydroxylam-Salze der Sulfosäuren des Hydroxylamins o. dgl. zugesetzt. Die Zusätze wirken Über-, der Unterbelichtung, der Schleierung u. ähnlichen Schäden entgegen. (F. 600 532 vom 21/4. 1925, ausg. 9/2. 1926.) KÜHLING

Karl Binder, Deutschland, *Entwickeln photographischer Bilder bei beliebiger Belichtung, auch mit Tageslicht*. Dem Entwickler werden komplexe Eisenphenolverbindungen vorzugsweise Alkalisalze des Ferritribrenzcatechins zugesetzt. Die Einführung des Bildes geschieht bei Rotlicht, ist das Bild einmal mit dem erwähnten Entwickler in Berührung gekommen, so kann es beliebigen Lichtquellen ausgesetzt werden. (F. 600 801 vom 15/7. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KÜHLING

Carl Blecher, Berlin-Dahlem, *Herstellung mehrfarbiger Papierbilder durch Zusammenbringen eines blauen, roten, gelben u. event. schwarzen Teilbildes*, dadurch daß eine Vereinigung des auf einem provisor. Träger als Pigmentrelief erzeugten Teilbildes mit einem anderen verbundenen blauen u. roten Teilbildes oder daß die auf 2 provisor. Trägern als Pigmentreliefs erzeugten blauen u. roten Teilbilder nacheinander mittels des auf Papier als gelb getontes Silberbild oder als gelbes Absaugebild gewonnenen gelben Teilbildes oder mittels einer Vereinigung des auf Papier als graues Silberbild u. eines gelbes Absaugebild erzeugten grauen u. gelben Teilbildes abgehoben werden. — Verf. liefert schärfere Bilder als die bekannten Verf. u. es wird das leichte Auseinanderfallen der Teilbilder vermieden. (D. R. P. 425 096 Kl. 57 b vom 21/9. 1925, ausg. 11/2. 1926.) KÜHLING

Wadsworth Watch Case Co., Dayton, Kentucky, übert. von: **Murray C. Beale** und **Alexander Murray**, Cincinnati, Ohio, *Photographisches Mittel*, bestehend aus einem hydrophoben gelartigen Körper (gelatiniertes Öl), der einen Beschleuniger (Katalysator) enthält. (A. P. 1 574 357 vom 31/8. 1922, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH

Wadsworth Watch Case Co., Dayton, Kentucky, übert. von: **Murray C. Beale** und **Alexander Murray**, Cincinnati, Ohio, *Photographisches Mittel*, bestehend aus einem hydrophoben Kolloid u. einem Bleitriäthyljodid enthaltenden Anreger. (A. P. 1 574 359 vom 18/11. 1922, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH

Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y., übert. von: **Samuel E. Sheppard**, Rochester, *Photographisches lichtempfindliches Material*, bestehend aus einer Emulsion von photograph. Ag-Salz in einem Kolloid mit einem Zusatz einer Verb., die ein wertiges Atom der S-Gruppe direkt verbunden mit einem einzelnen Metalloidelement (z. B. Isoselenocyanat) enthält. (A. P. 1 574 944 vom 6/6. 1924, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH

S. de Procoudine-Gorsky und **N. Pozniakow**, Nizza, *Photographie*. Man benutzt eine Ag-Halogenid-Gelatinieremulsion, red. das Ag-Salz ganz oder z. T. durch Li-Salz u. Entwickeln u. wäscht die ungehärtete Gelatine aus. (E. P. 243 338 vom 10/11. 1924, Auszug veröff. 20/1. 1926. Prior. 19/11. 1924.) KAUSCH

S. de Procoudine-Gorsky und **N. Pozniakow**, Nizza, *Photographie*. Man benutzt zu der für die Herst. eines unl. Gelatinebildes erforderlichen Gelatine-Silberhalogenemulsion einen Farbstoff, der auf das Silbersalz chem. nicht einwirkt. (E. P. 246 338 vom 25/1. 1926, Auszug veröff. 24/3. 1926. Zus. zu E. P. 243 338; vorst. Ref.) KAUSCH

Chemisches Zentralblatt.

1926 Band I.

Nr. 19.

12. Mai.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

R. J. Meyer, *Die Deutsche Nomenklatur-Kommission*. Vf. gibt einen histor. Überblick über die moderne chem. Nomenklatur u. weist auf einige allgemeine Grundsätze der anorgan. Abteilung der Deutschen Nomenklatur-Kommission hin. (Naturwissenschaften **14**. 269—71. Berlin.) JOSEPHY.

C. G. Bedreag, *Physikalisches System der Elemente*. II. Im Anschluß an frühere Arbeiten (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 766. Ann. scient. Univ. Jassy **13**. 62; C. **1924**. I. 1877. **1925**. I. 2141. 325) gibt Vf. eine diskutierende Darst. der Periodizität der chem. Elemente unter besonderer Berücksichtigung der modernen Theorien der Atomstruktur u. der Spektren. Er zählt die nach dem von ihm vorgeschlagenen Schema in 6 Perioden, sowie 18 Kolonnen u. 18 Familien eingeteilten Elemente auf u. entwirft ein Schema der Verteilung ihrer Elektronenhülle je nach der Valenz, mit der sie sich betätigen. Die Variationsmöglichkeiten der Valenzbetätigung werden mit entsprechenden Abweichungen numer. Größen bei der Entw. Fourierscher Reihen in Analogie gesetzt. Die bei verschiedener Valenzbetätigung eines Elementes vor sich gehenden Umordnungen in seiner Elektronenhülle sind mit Energieänderungen verknüpft, deren Größen Vf. auf andere Weise aus thermochem. Daten gewinnt; auch sollen die mit diesen Energieänderungen äquivalenten $h\nu$ -Werte mit den Absorptionsbanden der betr. Verb. in enger Beziehung stehen. Weiterhin wird die Möglichkeit einer elektrost. Berechnung der verschiedenen Energieniveaus der Elemente diskutiert, mit den Diskontinuitäten der K- u. L-Absorption in Parallele gesetzt; im übrigen die von BOHR, SOMMERFELD u. a. entwickelten Anschauungen geschildert. Ferner glaubt Vf. im Voltaeffekt ein Mittel zu finden, mit dessen Hilfe die Elektronenanordnungen in den äußersten Niveaus sich präzisieren lassen. (Ann. scient. Univ. Jassy **13**. 15—45.) FRANKENBURGER.

C. G. Bedreag, *Der Volta-Effekt*. Vf. stellt Beziehungen zwischen dem Voltaeffekt u. dem „physikal. System der Elemente“ (vgl. vorst. Ref.) her, indem er einen Parallelismus zwischen dessen Größe u. der Stellung der betreffenden Elemente in diesem System konstatiert. Andererseits hängt er aber auch noch in komplizierter Weise von der molekularen Bindung der Atome u. dem Vorhandensein einer monoder multimolekularen Adsorptionsschicht von Gasen ab. Der Voltaeffekt ist eine komplexe Funktion der Energie, welche beim Elektrizitätsübergang aus einer Oberfläche in eine andere geleistet werden muß; ein eindeutigeres Bild der dabei vor sich gehenden Energieumsetzungen gibt der photoelektr. bzw. der mit X-Strahlung hervorgerufene lichtelektr. Effekt. (Ann. scient. Univ. Jassy **13**. 346—59. Univ. Jassy.) FRBU.


Kurt Hess, *Zur Raumchemie der Stickstoffverbindungen*. Vf. gibt einen geschichtlichen Überblick über die Stereochemie der Stickstoffverb., die für das fünfwertige, also koordinativ vierwertige N-Atom zu demselben Modell wie beim C-Atom führt. Die Existenz von Isomeren besteht auch hier nur dann, wenn alle vier Valenzen im Kation mit verschiedenen Radikalen besetzt sind. Schwieriger ist es, ein Modell für ein koordinativ dreiwertigen Stickstoff aufzustellen. Auf Grund eigener Verss. über d,l-Methyl-i-pelletierin u. d,l-Methylconhydrinon (vgl. HESS u. GRAU, LIEBIGS Ann. **41**. 101; C. **1925**. I. 1319) kommt Vf. zu der Ansicht, daß das abweichende Verh. des koordinativ ungesätt. N-Atoms nicht so aufzufassen ist, daß in koordinativ ungesätt.

N-Verbb. die Valenzen in einer Ebene liegen. Für diese Verbb. müssen besondere dynam. Verhältnisse berücksichtigt werden. Eine Prüfung durch Spaltungsversuche infolge Autoracemisierung ist hier nicht möglich. Die räumliche Wirkungsweise kann aber in Verb. mit dem räumlich starren C in doppelter Bindung oder in besonder Ringanordnungen mit ihm in Erscheinung treten. (Naturwissenschaften **14**. 183—8 Berlin-Dahlem.) JOSEPHY.

F. A. H. Schreinemakers, *Gleichgewichte in Systemen mit Phasen, die durch eine halbdurchlässige Wand getrennt sind*. XIV. (XIII. vgl. S. 2281.) Es werden einige Eigenschaften der isoton. Kurven in Dreistoffsystemen mit zwei fl. Phasen abgeleitet. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 3 **36**—47.) SAHMEN.

Hermann Mayer, *Die Größe der Energiequanten im Vergleich zu den bei chemischen Reaktionen freiwerdenden Energiemengen*. Es werden die Energiequanten für die einzelnen Wellenlängen des Spektrums in Gramcalorien umgerechnet u. mit der Avogadro'schen Zahl multipliziert. Aus einer Tabelle des Originals kann ersehen werden, daß im ultravioletten Gebiet die Wärmetönungen geringer sind, als die sonst bei chem. Rkk. pro Mol. auftretenden. Im sichtbaren Gebiet entsprechen sie etwa denselben, während sie im Ultraviolett bedeutend größer werden u. für Röntgenstrahlen das 10^8 -fache derselben betragen. Nach dem Einsteinschen Quantenäquivalentgesetz gehen nur Vorgänge vor sich, bei denen das aufgenommene oder abgegebene Energiequantum mindestens der Anregung eines Mol. entspricht. Bei photochem. Rkk. muß ein primärer Energieaufnehmender Prozeß angenommen werden, welcher häufig in einer endothermen Rk. wie $\text{Br}_2 = 2\text{Br} - 46000 \text{ cal}$ sich äußert, u. diese Rkk. können nur durch Strahlung ausgelöst werden, deren Energie groß genug ist; d. h. $Nh\nu$ muß, in Gramcalorien ausgedrückt, größer sein als die Wärmetönung der Rk. Voraussetzung dabei ist, daß das Licht absorbiert wird. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 306—08. Düsseldorf.) ENSZLIN.

S. C. Roy, *Über das Gesetz und den Mechanismus einer monomolekularen Reaktion*. Vf. weist auf die Analogie zwischen photoelektr. Elektronenemission u. photochem. Rk. einerseits u. thermochem. Rk. u. therm. Elektronenemission andererseits hin u. zeigt, daß die Wrkg. einer Strahlung hoher Temp. auf ein kaltes System nicht dieselbe sein kann wie die Wrkg. einer Strahlung, die mit einem System im Temperaturgleichgewicht steht. Vf. betrachtet dann den *Mechanismus einer photochem. monomolekularen Rk.*: $[A B] \rightleftharpoons A + B$, in der die einzelnen Glieder aktiviert sind. Die Gleichung, die er hierfür ansetzt, lautet: $h\nu \rightleftharpoons \frac{1}{2}\mu v^2 + \Phi$, worin μ die reduzierte M. der reagierenden Bestandteile, v die Geschwindigkeit, mit der bei einer Dissoziation die Molekülkomponenten auseinanderfliegen, u. Φ die Trennungsarbeit bedeuten. Die Strahlung, die diese Dissoziation hervorruft, besteht, wie Vf. auseinandersetzt, nicht aus einer bestimmten $h\nu$, sondern alle $h\nu$, die innerhalb eines bestimmten Bereiches liegen, ein gewisses $h\nu_0$ überschreiten, sind an der Rk. beteiligt. Für die Reaktionsgeschwindigkeit, die nur von der Energiedifferenz des n. u. aktivierten Zustandes abhängt, leitet Vf. eine Gleichung ab. Diese wird an einigen Rkk.:



sowie einigen Rkk. von Estern in Lsg. geprüft u. in guter Übereinstimmung mit den experimentell bestimmten Geschwindigkeiten gefunden. Eine neuere Unters. von D. SMITH (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 1862; C. **1925**. II. 2194) über den Zerfall von SO_2Cl_2 in SO_2 u. Cl_2 schließt sich gut an die Berechnungen des Vfs. an. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **110**. 543—60. London, King's Coll., Phys. Research Lab.) HANTKE.

Alfons Klemenc, *Metalle und Salpetersäure. Ein Beitrag zur Kenntnis heterogener Reaktionen*. In früheren Arbeiten hat Vf. gefunden, daß die reine HNO_3 bei Nitrierung u. Oxydation unwirksam ist. (KLEMENC u. SCHOELLER, Ztschr. f. angew. u. allg. Ch. **141**. 231; C. **1925**. I. 942.) Sie empfängt ihre Reaktionsfähigkeit erst

rch Zusammentreten mit HNO_2 zur sogenannten E-Säure. Auf Grund dieser Auffassung versucht Vf., die Kinetik der Auflösung von Metallen in HNO_3 quantitativ zu erfassen. Es wird die Nernst-Brunnersche Formel für heterogene Rkk. mit der Erweiterung benutzt, deren Zulässigkeit an dem Beispiel der Auflösung von Cu in KJ nachgewiesen wird. Es gelingt so dem Vf., den Vers. von DRAPIER (Bull. c. Chim. Belgique 27. 142; C. r. d. l'Acad. des sciences 158. 338 [1914]) betreffend s. Verh. von HNO_3 gegen Cu zu deuten. Der genannte Autor hatte feststellen können, daß die Auflösungsgeschwindigkeit eines in HNO_3 rotierenden Cu -Zylinders mit wachsender Rotationsgeschwindigkeit abnimmt. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 10—55. Washington D. C., Nat. Research Council.)

HEIMANN.

P. W. Bridgman, *Einige physikalische Eigenschaften von Einkristallen von W, Bi, Te, Cd, Zn und Sn*. (Vgl. S. 1513.) Es wird ein Verf. zur Darst. von Einkristallen beschrieben, wobei ein besonderes Schmelzgefäß verwendet wird. Vf. hat dann die physikal. Konstanten, nämlich die lineare Kompressibilität, die elast. Konstante, den linearen Ausdehnungskoeffizienten, spezif. elektr. Widerstand, Temp.- u. Druckkoeffizienten des Widerstandes von Einkristallen der Metalle Zn, Cd, Bi, Sb, Te, Sn bestimmt. (Ztschr. f. Metallkunde 18. 90—91. Berlin.)

LÜDER.

K. Spangenberg, *Neuere Untersuchungen zum Wachstum und zur Auflösung von Einkristallen*. (Vgl. Ztschr. f. Kristallogr. 61. 189; C. 1925. I. 2282.) Zusammenfassender Vortrag über die Unterss. des Vfs., von VALETON u. anderen über das Wachstum u. die Auflösung von Kristallen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 304—06. Kiel.)

ENSZ.

R. Macheleidt, *Die Dichten wäßriger Lösungen in graphischer Darstellung*. (Vgl. S. 18. 238; C. 1924. II. 1960.) Ausbau der in einer früheren Abhandlung geäußerten Überlegungen. Der Einfluß der Konz. auf die D. wird rechner. erfaßt. Für die einzelnen Lsg. werden auf der einen Seite einer Geraden die Konz. u. auf der anderen die dazu gehörigen Werte der D.D. aufgetragen, so daß es möglich ist, mit Hilfe dieser Einteilung, welche für jeden Stoff verschieden ist, bei Kenntnis der einen Größe die andere sofort abzulesen. Der Einfluß der Temp. wird durch die Projektion von räumlichen Koordinaten in die Ebene wiedergegeben. (Kali 20. 74—78. 88—92. Wiesbeck bei Berlin.)

ENSZLIN.

S. K. Tweedy, *Theorien der Katalyse*. Literaturzusammenstellung. (Chemistry Ind. 45. 77—80. 157—59.)

HAASE.

G. R. Levi, *Verschiedene Arten Thoriumoxyd und deren katalytische Wirkung bei Dehydratation des Alkohols*. (Vgl. S. 2529.) Die von den Vff. untersuchten Präparate waren: 1. Thoriumhydrat, lufttrocken, 2. Thoriumhydrat, bei 80° getrocknet, 3. Thoriumhydrat, bei 120° getrocknet, 4. Thoriumoxyd aus dem Hydrat, bei 340° getrocknet, 5. Thoriumoxyd, aus dem Hydrat, bei 1050° getrocknet, 6. Thoriummetaoxyd, aus dem Oxalat durch Erhitzen auf 750° , 7. Thoriummetaoxyd, aus dem Nitrat durch Erhitzen auf 750° . — Das Thoriumhydrat wurde durch Fällen einer Lsg. von $(\text{SO}_4)_2$ mit Ammoniak erhalten. Die durch Erhitzen auf niedrigere Tempp. erhaltenen Präparate enthielten aus diesem Grunde noch Ammoniumsalze (bis $2,4\%$). Die Wirklichkeiten der Katalysatoren wurden bei 340° bestimmt. Die Überleitung des A. durch CO_2 -Strom, ebenso die Überführung des gebildeten *Athylens* in das Azometeter. Aus den Versuchsergebnissen ergeben sich folgende Beziehungen über die verschiedenen Präparate: Das n. Thoriumoxyd u. das Metaoxyd sind kristallin u. unlöslich. Das sogenannte Metaoxyd ist demnach keine besondere Form. Es existiert eine amorphe Form des ThO_2 , die auch über 300° beständig ist. Das nach den üblichen Darstellungsmethoden erhaltene Thoriumhydrat ist amorph u. geht beim Erhitzen auf 300° in die amorphe Form des ThO_2 über. Die kristalline oder kristalline Struktur des Thoriumoxyds hat keinen bemerkenswerten Einfluß auf die hydratisierende Wrkg. der betreffenden Katalysatoren. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 2. 419—22. 1925. Mailand, Politecnico.)

ZANDER.

C. Sandonnini, *Reaktionen in Gegenwart von Kohle*. Die zu den Verss. verwandte Kohle war aus kanad. Pappelholz durch Tieftemperaturdest. gewonnen, bei 850° Wasserdampf gewaschen, mit sd. HCl behandelt u. danach wieder mit Wasserdampf bis zum Verschwinden der Chlorrk. gewaschen. Die so erhaltene Kohle enthielt Spuren Kieselsäure. Zu den Verss. wurde sie fein gepulvert. — Eine in einem Qu. gefäß befindliche schwach sd. $\frac{1}{10}$ -n. Lsg. von Oxalsäure wurde 3 Stdn. lang der Einwirkung einer Bogenlampe ausgesetzt, wobei keine merkbare Veränderung eintrat. Nach Zusatz verschiedener Mengen Kohle erfolgte auch nur geringe Zers., die hauptsächlich der Adsorption durch die Kohle zuzuschreiben war. Der Zusatz von Uranylsulfat verursachte dagegen erhebliche Zers., die aber bei gleichzeitigem Zusatz von Kalium u. Uranylsulfat bis auf ungefähr die Hälfte zurückging. — Weiterhin wurde die Wirkung zwischen *p*-brombenzolsulfonsaurem Kalium u. KOH für sich u. in Ggw. von Cu untersucht. Die Kohle unter Belichtung u. im Dunkeln untersucht. Die Wirksamkeiten von Cu u. Licht, jedes für sich, sind nur gering; ebenso übt die Kombination von beiden keine besondere Beschleunigung auf die Rk. aus. Cu allein wirkt ziemlich beschleunigend, die Wrkg. wird durch die Ggw. von Licht stark erhöht. Die Wrkg. der Kombination von Kohle u. Cu ist schon im Dunkeln viel intensiver als die Summe der Einzelwirkungen beider Komponenten. Die Kohle wirkt hierbei nicht katalyt., sondern durch ihre große Oberfläche indirekt (auf die Verteilung des katalyt. wirksamen Cu). Von verschiedenen dargestellten Cu-Präparaten erwies sich Picardkupfer als dem durch Iod mit Hyposulfit erhaltenen Cu überlegen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 427—32. 1925. Padua, Univ.)

ZANDE

L. Andrussow, *Über die katalytische Ammoniakoxydation*. (Vgl. S. 2677.) werden die Einflüsse der Temp. u. der Strömungsgeschwindigkeit auf die katalytische Oxydation des NH_3 untersucht, u. das Verh. der reinen Komponenten (NO , NH_3 , $\text{NO} + \text{NH}_3$) an derselben Kontaktsubstanz geprüft. Die Wrkg. des Katalysators ist von seiner Oberfläche abhängig u. erreicht ihr Maximum erst nach einigen Verweilzeiten. Bei der Verbrennung des NH_3 mit Luft tritt schon bei 160° eine Rk. ein. Bei 160° beträgt die Ausbeute an NO 9% N_2 . Bei 550—600° tritt eine Abhängigkeit der Ausbeute von der Verweilzeit am Kontakt ein. Die Ausbeuten an NO fallen nach Erreichen eines Maximums bei einer Temp., welche um so höher ist, je kleiner die Verweilzeit ist. Bei 1000° konnten so noch Ausbeuten von 90% erreicht werden. Bei niedrigeren Temp. bildet sich fast ausschließlich N_2 . Bei 400° ist die Menge unzersetzten NO schon sehr klein u. über 550° ist das Hauptprod. der Umsetzung NO . Der Zerfall von NH_3 am Pt ist insofern stark von der Kontaktsubstanz abhängig, als die Netze, welche eine schlechte Ausbeute bei der Verbrennung geben, eine hohe Zers. des NH_3 geben. Diese tritt schon etwas unter 480° ein, dann steigt der Dissoziationsgrad rasch an. NO zers. sich an Platinkontakten schon unterhalb 500°. Treffen nun NH_3 u. NO bei diesen Temp. zusammen, so findet unter Erhöhung des Zersetzungsgrads beider Substanzen eine Verbrennung statt. Der Grad der Zers. in % wurde berechnet. Er beträgt bei 450° 45%. Als Verbrennungsprodd. des NH_3 mit Luft konnten NO u. NO_2 bestimmt werden. Eine Red. leicht oxydierender Lsgg. tritt nicht ein. Hydroxamsäure konnte nicht nachgewiesen werden. Der Mechanismus der Oxydation geht stufenweise wahrscheinlich über das Nitroxyl HNO . Die Ergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt u. graphisch aufgezeichnet. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 321—32. Berlin, Physikal.-chem. Inst. Univ.)

ENSZL

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

H. G. Grimm und A. Sommerfeld, *Über den Zusammenhang des Abschlusses der Elektronengruppen im Atom mit den chemischen Valenzzahlen*. Vff. stellen Beziehungen zwischen den spektroskop. ermittelten Anordnungen der Außenelektronen, der Struktur der darunter befindlichen „Rümpfe“ der Atome der einzelnen Elemente

der chem. Valenzbetätigung derselben auf. Die spektroskop. Darlegungen gründen auf einer, näher ausgeführten Klassifizierung der Serienbezeichnungen, bei welcher ähnliche, für die Energieniveaus der betreffenden Atome maßgebenden Terme Berücksichtigung finden. In Verfolg der von STONER gegebenen Theorie läßt sich der schluß einer Untergruppe des period. Systems durch die Quantenzahl $j = 0$, d. h. des magnet. Impulsmoment des Atoms $= 0$ kennzeichnen; auch für die einem solchen schluß unmittelbar folgenden oder vorangehenden Elemente läßt sich der j -Wert der Systematik des period. Systems bestimmen. Die diese Sätze bestätigenden spektroskop. Tatsachen werden ergänzt. Das verschiedene spektroskop. u. chem. Verhalten von Ag einerseits, Cu u. Au andererseits wird durch den spektroskop. Charakter Grundterms der vorhergehenden Elemente erklärt: im Anschluß an die Verschiedenheit des spektroskop. Verhaltens der vorhergehenden Elemente Ni u. Pt einerseits, andererseits neigen Cu u. Au zu „unabgeschlossenen Zuständen“ mit $j = 3$ oder 4, Ag⁺-Ion zu der bei ihm stabilsten Anordnung mit $j = 0$. Eine weitere, eingehend tabellar. Material gestützte Betrachtung des chem. Verhaltens der einzelnen Elemente läßt erkennen, daß neben der Tendenz zur B. der „Edelgaskonfiguration“ 8 u. 18 Außenelektronen auch die B. von „Zweier-“ u. „Viererschalen“ angestrebt wird, deren bevorzugte Stabilität aus der Stonerschen Untergruppeneinteilung (die spektroskop. Daten beruht) ebenfalls hervorgeht. So tritt die Tendenz zur B. von Viererschalen neben der, bei maximaler Valenzbetätigung sich kundtuenden Erstrebung der Acht- bzw. Achtzehnerschale bei der Valenzbetätigung der Elemente der sogenannten Nebenreihen hervor; in manchen Fällen scheint sie stabiler als die Edelgaskonfiguration zu sein. Die Unterschiede, die zwischen analogen Verbb. chem. verschiedener Elemente bestehen, können oftmals auf die Verschiedenheit des Atomrumpfes zurückgeführt werden, der unter den analog gebauten Außenelektronenschalen liegt. Die Tendenz zur B. von Viererschalen sprechen die scharfen Unterschiede zwischen 4. u. folgenden Gruppe des period. Systems, sowie die Tatsache, daß diejenigen Verbb., in deren Moll. die Gesamtzahl der Valenzelektronen $= 8$ ist, in einer analog dem Diamanten gebaute Krystallstruktur sich aufbauen u. nicht mittels heteropolarer, sondern „homöopolarer“ Bindung zusammenhalten; die Deformation der Elektronenbahnen scheint bei ihnen zum Umklappen des Ionen- in ein Molekülgitter zu führen. So scheint in Verbb. wie AlN, BeO, ZnS dieselbe Elektronenkonfiguration wie beim Diamanten vorzuliegen. Endlich wird noch mittels energet. Überlegungen, allem auf Grund von Kreisprozessen gezeigt, daß das Zustandekommen polarer u. nichtpolarer Bindungsart quantitativ vom Energiegehalt insofern abhängt, als stets diejenige dieser beiden Möglichkeiten einstellt, bei der die freie Energie entstehenden Gebildes den kleineren Wert besitzt. (Ztschr. f. Physik **36**. 36—59. Leipzig, Univ. München, Inst. f. theor. Physik, Univ.) FRANKENBURGER.

P. A. M. Dirac, *Quantenmechanik und eine vorläufige Untersuchung des Wasserstoffatoms*. Mathematisch. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **110**. 561—79.) HANT.

Viktor Trkal, *Zur Dynamik des Heliumatoms*. Vf. leitet eine Gleichung für die Ionisierungsenergie des neutralen Heliumatoms ab, indem er vom singulären Fall des Körperproblems ausgeht, der dadurch gekennzeichnet ist, daß die Summe der kinet. Energie der beiden Elektronen der Entfernung vom Kern zu jeder Zeit konstant bleibt. Der erhaltene Ausdruck könnte einen mit den experimentellen Ergebnissen übereinstimmenden Wert liefern, doch bestehen noch einige rechnerische Schwierigkeiten. (Ztschr. f. Physik **36**. 194—214. Prag, Inst. f. theoret. Physik d. tschechischen Univ.) HANTKE.

Hawksworth Collins, *Die Struktur von Jod*. Aus Werten über relative Voll- u. Ionisierungsenergien wird die atomare Zus. des Jods zu Na₄Cl berechnet. (Chem. News **165**—70.) JOSEPHY.

Erich Regener, *Beitrag zur Aufklärung der „Subelektronen“*. Unter Benutzung von Versuchen von **R. Sanzenbacher**. Der Übergang aus dem „Elementarquantengebiet“ mit n Ladungen in das „Gebiet der Subelektronen“, den sog. krit. Teilchenradius, wird durch Ladungsmessungen an einzelnen verdampfenden Hg-Teilchen, denen sich dieser Übergang automat. vollzieht, verfolgt. Je nachdem ob ein kleines Hg-Vorrat vorsichtig oder etwas stärker erhitzt wird, werden stabile oder stark verdampfende Hg-Teilchen erhalten. Die Ladungsmessungen ergaben, daß die stabilen Teilchen, wenn sie genügend klein sind, die Elementarladung unterschreiten, während die stark verdampfenden Teilchen die Elementarladung meist behalten, auch wenn sie durch Verdampfen in das Subelektronengebiet der kleinen Radien gelangt sind. Die Verss. wurden in CO_2 , Luft u. H_2 ausgeführt. Während in CO_2 u. Luft die Ladung bei kleiner werdendem Teilchenradius konstant blieb, trat in H_2 bisweilen der Fall ein, daß die Ladung mit sinkendem Radius abnahm, was Vf. auf Störung der Ladungsmessungen in der Oberflächenschicht des Teilchens zurückführt. Da der Verdampfungsprozeß auf den Ladungswert der Teilchen keinen Einfluß hat, so können diese Messungen zum Beweis für die Nichtexistenz der Subelektronen dienen. (Naturwissenschaften **14**. 219—23. Stuttgart.)

JOSEPH

Hertha Sponer, *Zur Frage der Dissoziationsarbeit von Stickstoff und Sauerstoff*. HOGNESS u. LUNN (Physical Review [2] **26**. 786 [1925]) fanden, daß bei 17 V N_2^+ -Ionen u. von 24 V ab daneben auch N^+ -Ionen auftreten. Vf. nimmt an, daß die Differenz von 24—17 V (16,5 V nach neueren Messungen der Vf. [vgl. S. 1106]) Anregung des Molekülions verwandt wird. Unterhalb 24 V kann das Molekülion nicht so dissoziieren, daß ein Atomion dabei auftritt, denn das Molekülion muß Energie mindestens die Dissoziationsenergie u. die Ionisierungsenergie eines N-Atomion enthalten, um bei einem Zusammenstoß mit einem N_2 ein Atomion liefern zu können. Die Differenzenergie $24 - 16,5 = 7,5$ V würde die Dissoziationsarbeit des Molekülions bestimmen. Die entsprechende Betrachtung wird für das Molekülion des O_2 angestellt u. die verschiedenen Werte der Dissoziationsarbeit einiger Forscher werden diskutiert. (Naturwissenschaften **14**. 275. Berkeley [Cal.], Univ.)

JOSEPH

Dragolioub K. Yovanovitch, *Untersuchungen über Mesothor 2*. Vf. gibt eine umfassende Zusammenstellung bekannter u. (seit 1921) selbst ausgeführter neuer Untersuchungen über Mesothor 2. Chem. Darst. von Mesothor 2. Vf. benutzt zur Vermeidung einer Ansammlung von Ammonsalzen, die bei der von O. HAHN angegebenen Methode stattfindet, die bekannte Unlöslichkeit von Ra u. MsTh 1 bzw. Löslichkeit ihrer Folgeprodd. (außer ThX) in konz. HCl. Unter ständigem Erhitzen auf dem Wasserbad wird das Gemisch Ba, Ra u. MsTh 1 (evtl. auch Ac) in sehr wenig reinem W. verdünnt u. durch Zutropfen von reiner konz. HCl die B. von großen BaCl_2 -Krystallen einschließend Ra, MsTh 1 u. ThX bewirkt. Unterbrechung des Erhitzens beim Absinken der Fl. infolge HCl-Entw., Zufügung von HCl bis zum doppelten Vol. u. Entfernung der überstehenden Fl. nach Absitzen (15 Min.) der Krystalle mittels Pipette. In den Krystallen MsTh 1 mit noch 40—50% MsTh 2. Durch dreimalige Wiederholung des Prozesses mit den getrockneten Krystallen wird das gesamte MsTh 2 in RdTh, akt. Nd. von Ra u. Th, wenig BaCl_2 u. Spuren von Ra u. MsTh 1 herausgelöst. Erneuerung der Fällung alle 2 Tage (MsTh 2 wieder mit MsTh 1 im Gleichgewicht) während eines Monats führt prakt. zur Entfernung von RdTh, der langlebigen Tochtersubstanz des MsTh 2. (Das in den Krystallen befindliche ThX zerfällt infolge Trennung von RdTh ganz.) Die zuletzt erhaltene Lsg. wird nach Zufügen von 0,5 mg seltener Erden der Ce-Gruppe (oder Al, Fe) als Träger fast zur Trockne eingedampft u. in H_2O aufgenommen in h. W. das gesamte MsTh 2 mit reinem NH_3 in der Wärme gefällt, Spuren BaCl_2 , Ra u. MsTh 1 bleiben in der filtrierten Lsg. (Bei Unterlassung oben angeführten öfteren Umkrystallisierens wird RdTh hier durch Auflösung Nd. in verd. HNO_3 , Neutralisation mit NH_3 , Zufügen von wenig Th u. Fällung

(H_2O_2 bei 60° abgetrennt.) Schließlich wird der akt. Nd. des Ra nach Zufügen von cem einer 5%ig. Bi- u. Pb-Lsg. durch Fällung mit H_2S entfernt u. aus dem Filtrat die seltenen Erden mit *MsTh 2* als Oxalate gefällt. Gesamtdauer der Darst. ca. 1,5 Stdn. Die Best. der Halbwertszeit von *MsTh 2* durch den Vf. ergibt $T = 6,18^h$ in guter Übereinstimmung mit O. HAHN $T = 6,2^h$ (vgl. Physikal. Ztschr. **9**. 246 [1908]) u. Mc COY u. VIOL $T = 6,14^h$ (vgl. Philos. Magazine [6] **25**. 350; C. **1913**. I. 291.)

Vf. gibt sodann eine zusammenfassende Darst. der chem. Eigenschaften von *MsTh 2* u. berichtet über ausgeführte Adsorptionsverss. Die durch Überschuß von NH_3 in der Wärme gefällten Hydroxyde von Fe, Al, Ce, La, Pr, Nd, Sm, Er u. die durch Oxalsäure aus schwach saurer Lsg. in der Wärme gefällten Oxalate von La, Ce, Pr, Nd, u. Sm adsorbieren das gesamte in der Lsg. enthaltene *MsTh 2*; in schwach salpetersaurer Lsg. durch H_2O_2 gefällte $\text{Th}(\text{OH})_4$ u. die durch H_2S in saurer Lsg. gefällten Sulfide von Hg, Pb u. Bi adsorbieren *MsTh 2* nicht (vgl. Mc COY u. VIOL, l. c.). Bei Abtrennung des Ce von den seltenen Erden La, Nd, Pr, Sm aus der Lsg. der Nitrats sowohl durch Fällung mit Ammoniumpersulfat als auch durch Auflösen aller mit schwachem Überschuß von KOH gefällten Hydroxyde außer Ce mittels Einleiten von Chlor erfolgt keine Adsorption von *MsTh 2* an das Ce. Verss. über fraktionierte Fällungen der seltenen Erden La, Pr, Nd u. Sm durch NH_3 sowie durch Oxalsäure in schwach salpetersaurer Lsg. bei Ggw. von *MsTh 2* ergeben dessen Anreicherung in den letzten Fraktionen (mit dem La) u. zeigen Nichtvorliegen einer Isotopie u. noch stärkere Basizität des *MsTh 2* gegenüber den angewandten Trägern. Bekanntlich wird durch konz. K_2SO_4 -Lsg. aus der Lsg. der Nitrats von La, Pr, Nd u. Sm der größte Teil von La u. Pr gefällt. Bei fraktionierter Fällung in Ggw. von *MsTh 2* enthält die erste Fraktion die Hauptmenge des *MsTh 2*. Bei fraktionierter Kristallisierung der Doppelsalze vom Typ $\text{M}(\text{NO}_3)_3 \cdot 2 \text{NH}_4\text{NO}_3 + 4 \text{H}_2\text{O}$ durch Einengen des in konz. HNO_3 gel. Gemisches von La mit Pr oder Nd oder mit beiden u. zu noch Sm bei Ggw. von Ammonnitrat enthalten die entsprechenden Fraktionen immer einen annähernd gleich großen mit steigender Fraktionierung langsam abnehmenden Anteil von *MsTh 2*. Eine Isomorphie des *MsTh 2* mit den Salzen der seltenen Erden besteht also nicht.

Im 3. Kapitel beschreibt Vf. eingehend die von ihm u. J. d'Espine angestellten Verss. über das β -Strahlenspektrum des *MsTh 2* (C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 11. **179**. 1162; C. **1924**. II. 1311. **1925**. I. 1046) u. gibt insbesondere eine ausführliche Darst. der verwandten App. Das von BLACK (Proc. Royal Soc. London Serie A **106**. 2; C. **1925**. I. 466) mitgeteilte Spektrum von 31 Linien weist für die schnellsten Linien einen H_Q -Wert von 6842 entsprechend einer Energie von $1\,537\,000\text{ V}$ auf. Für die vom Vf. gefundenen noch schnelleren β -Strahlen werden jetzt folgende H_Q -Werte angegeben: $10\,060$, $16\,668$, $21\,276$ u. $28\,200$ entsprechend Energien von $2,6 \cdot 10^6$, $2 \cdot 10^6$, $5,9 \cdot 10^6$ u. $8 \cdot 10^6$ Volt. Der kontinuierliche Untergrund beginnt erst von $H_Q = 42$ an abwärts. Die Entstehung der außerordentlich schnellen β -Strahlen sucht Vf. in Anknüpfung an die auf den Comptoneffekt beruhende Meitnersche Deutung des kontinuierlichen β -Strahlenspektrums (Ztschr. f. Physik **19**. 307; C. **1924**. I. 663) durch die weitere Annahme zu erklären, daß die Comptonsche Streuung nur in einer oder mehreren ausgezeichneten Richtungen erfolgt. (Journ. de Chim. physique **23**. 1—37.)

ERBACHER.

Victor F. Hess, Über den Ursprung der Höhenstrahlung. Vf. wendet sich gegen die Einwände, die HOFFMANN gegen die übliche Berechnungsart der ionisierenden Wirkung einer gleichmäßig verteilten radioaktiven Substanz aus der Eveschen Zahl u. dem Absorptionskoeffizienten vorgebracht hat, ferner auch gegen die Auffassungen in Bezug auf die Ionisation in geschlossenen Gefäßen. Aus den Ausführungen HOFFMANNs ergibt sich kein bündiges Argument gegen die Existenz einer Höhenstrahlung hervor, sondern nur, daß die Bestst. des Absorptionskoeffizienten dieser Strahlung noch unsicher sind.

Der Unterschied im Durchdringungsvermögen der Strahlungen in Erdnähe u. in größerer Höhe wird mit einem Vorgang, ähnlich dem des Comptoneffektes, erklärt, indem angenommen wird, daß die harte Primärstrahlung in weiche γ -Strahlung umgewandelt wird. Die in Erdnähe vorgenommenen Absorptionsverss. konnten keine abweichenden Resultate liefern, da der Anteil an harter Primärstrahlung zu gering ist, um ausschlaggebend die Kurven zu beeinflussen. Vf. schlägt für diese noch wenig erforschte Strahlung den Namen „Ultra - Gammastrahlung“ vor. (Physikal. Ztschr. **27**. 159-160. Graz, Univ. Phys. Inst.)

E. Rupp, *Interferenzuntersuchungen an Kanalstrahlen*. Vf. sucht über die Zeit, während welcher ein opt. angeregtes Atom im Anregungszustand verbleibt (Verweilzeit) u. über seine Abklingzeit näheres festzustellen, indem er die Interferenzfähigkeit von abklingenden Kanalstrahlen beobachtet. Mittels der Michelsonschen Interferenzanordnung, die näher beschrieben wird, werden Wasserstoff- u. Quecksilberkanalstrahlen untersucht. Es werden sowohl die apparativen, als auch die spektralen Gründe für das Verschwinden der Interferenzstreifen im einzelnen diskutiert. Als größtmögliche Interferenzlänge werden für $H\beta$ 15,2 cm, für Hg 546 μ 62 cm gefunden. Diese größtmögliche Interferenzweglänge bleibt im Abklingleuchten während einer längeren Kanalstrahlstrecke l unverändert erhalten. Das Verhältnis dieser Kanalstrahlänge l zur Strahlgeschwindigkeit v $l/v = 2 \cdot 10^{-8}$ sec für Hg 546 μ u. $l/v = 2,8 \cdot 10^{-8}$ sec für $H\beta$ gibt unter der Annahme, daß Interferenz nur möglich ist zwischen Lichtquantenstücken aus ein u. demselben Atom den Wert einer Mindestabklingzeit. Eine Verweilzeit konnte aus den Interferenzbeobachtungen nicht festgestellt werden, ohne dadurch die Frage nach dem Bestehen zweier Zeiten — Abklingzeit u. Verweilzeit — entschieden wäre. Im weiteren bestimmt Vf. die Kohärenzlänge des Lichtes im Umlaufleuchten in Abhängigkeit vom Gasdruck im Beobachtungsraum u. von der Strahlgeschwindigkeit. Im 3. Abschnitt wird nachgewiesen, daß die Wellenfläche des Lichtes bewegter Atome um weniger als $1/120$ für $H\beta$ u. $1/260$ für Hg 546 μ von der Wellenfläche ruhender lichtemittierender Atome abweicht. Ferner befaßt sich Vf. kurz mit dem Polarisationszustand des Kanalstrahllichtes. (Ann. der Physik [4] **79**. 1—34. Heidelberg.)

FRANKENBURGER

Helmuth Kulenkampff, *Vergleichende Untersuchungen über die Energie der luftionisierende Wirkung von Röntgenstrahlen verschiedener Wellenlängen*. Vf. stellt gleichzeitige Messungen der Energie von Röntgenstrahlen verschiedener Härte u. von ihnen in einer definierten Luftstrecke bewirkten Ionisierung an, um die Größe des Energiebetrags ϵ zu bestimmen, der zur Bildung je eines Ionenpaares erforderlich ist u. festzustellen, ob ϵ mit der Wellenlänge der X-Strahlung variiert. Die Messung der Strahlungsenergie erfolgen mittels einer empfindlichen, mit einem Panzergalvanometer verbundenen Thermosäule; Theorie u. Ausführung derselben sind eingehend behandelt. Die Strahlung ist aus Gründen der Intensitätsverhältnisse nicht streng monochromat.; es wird die Gesamtstrahlung verschiedener Antikathodenmetalle in Verbindung mit passenden Filtern benutzt, wobei jeweils die betreffende $K\alpha$ -Linie vorwiegend ausgesondert wird. Die spektrale Zus. dieser Strahlungen wird jeweils mit einem Ionisationsspektrometer ermittelt. Hierdurch lassen sich die Abweichungen von einem mit monochromat. Strahlung arbeitenden Verf. rechner. berücksichtigen vor allem feststellen, welcher Bruchteil der auffallenden Strahlung bei der Erwärmung der Thermosäule bzw. bei der Ionisierung der Luftstrecke wirksam ist. Es zeigt sich, daß ϵ im Bereich von 0,56—2 Å von der Wellenlänge (auf 5% Genauigkeit) unabhängig ist u. 35 ± 5 Volt/Ionenpaar beträgt. (Ann. der Physik [4] **79**. 97—142. München, Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.)

FRANKENBURGER

Hartmut Kallmann und **Hermann Mark**, *Über einige Eigenschaften der Comptonstrahlung*. (Vgl. S. 1366.) Eine Unters. des Schwingungszustandes, der Interferenzfähigkeit u. der Intensität der Comptonstrahlung führte zu den Ergebnissen, daß

wingungsrichtung des sekundären Strahls durch die der einfallenden Welle bestimmt ist, d. h. beide sind gleich. Verss. über die Interferenzfähigkeit zeigten, daß Gegensatz zu der gewöhnlichen Streustrahlung zwischen der einfallenden Welle und von den Krystallatomen ausgehenden Streuwellen bei Comptonstrahlung die Kohärenz existiert. In Übereinstimmung mit COMPTON (Philos. Magazine 41. 749; C. 1921. III. 919) finden Vff., daß bei der Bestrahlung von *Li* mit ZnK_{α} -Strahlung die Intensität bei Streuung von über 90° wieder ansteigt. (Ztschr. f. Physik 120—42. Berlin-Dahlem, K.-W.-I. f. phys. Chemie u. Elektrochemie u. f. Faserchemie.)

HANTKE.

C. G. Barkla und S. R. Khastgir, *Das J-Phänomen in Röntgenstrahlen*. II. *Andung auf gestreute Röntgenstrahlen*. (I. vgl. Philos. Magazine [6] 49. 1033; C. 1925. 886. u. S. 2649.) Vff. versuchen den Comptoneffekt durch das J-Phänomen zu erklären. (Philos. Magazine [6] 50. 1115—34. 1925.)

BECKER.

C. G. Barkla und Gladys I. Mackenzie, *Notiz über die Überlagerung von Röntgenstrahlen und über die Streuung. Das J-Phänomen*. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei der Überlagerung zweier Streustrahlungen resultiert nicht als Aktivität die Summe der Aktivitäten beider Einzelstrahlungen. An Hand dieser Erscheinungen wird das sogenannte J-Phänomen diskutiert. (Philos. Magazine [7] 1. 542—53. Edinburgh, v.)

BECKER.

H. Stumpen, *Über die Intensität von Röntgenspektrallinien in Abhängigkeit von Erregungsspannung*. Vf. untersucht die Abhängigkeit der Intensität von Röntgenspektrallinien (K_{α} des *Mo*, K_{α} u. K_{β} des *Cu*, L_{β} u. L_{γ} des *W*) von der Erregungsspannung im Bereich hoher Spannungen, indem er die, mittels eines näher beschriebenen Stein-Spektrographen gewonnenen, zur Orientierung photograph. festgelegten monochromat. Linien bzgl. ihrer Ionisierungsfähigkeit vergleicht. Bei niederen Spannungen nimmt etwa $4^{1/2}$ -fachen Betrag der Anregungsspannung der betreffenden Linien hat die Linienintensität mit dem Quadrat der Spannung an; der Anstieg wird dann allmählich langsamer, was vermutlich auf die Absorption der entstehenden Strahlung am Antikathodenmaterial zurückzuführen ist. Die Intensität der Linien der *L*-Serie steigt bei einem erneuten stärkeren Anstieg, wenn die Anregungsspannung der Linien der *L*-Serie des betreffenden Materials überschritten wird; dies läßt gewisse Rückschlüsse über den Mechanismus der Anregung der X-Strahlung im Einzelatom ziehen. (Ztschr. Physik 36. 1—17. Bonn, Univ.)

FRANKENBURGER.

Ivar Waller, *Zur Theorie der Röntgenreflexion*. Vf. untersucht den Übergang von einem bei einem kleinen Krystallstück gültigen Gesetz für die reflektierte Intensität zu dem entsprechenden Gesetz bei einem großen, ideal regelmäßigen Krystall. Reflexionsformeln eines idealen Krystalls werden vom Vf. für verschiedene Fälle aufgestellt. (Ann. der Physik [4] 79. 261—72.)

ULMANN.

Walter Heitler, *Zur Thermodynamik und Statistik der Quantenprozesse*. (Beitrag zur Intensitätsfrage der Spektrallinien.) Bei der thermodynam. Behandlung der Strahlungsgleichgewichte wird die Strahlung als selbständiger chem. Stoff angesehen, das Massenwirkungsgesetz angewandt, dabei wird für die Konzz. der Begriff der Aktivität eingeführt („aktive Phasendichte“); die statist. Behandlung der Prozesse führt zu einem Ausdruck für die „thermodynam. Wahrscheinlichkeit“ eines Prozesses. Dieser wird auf die Intensitäten zweier verschiedener Serien angewandt. (Ztschr. Physik 36. 101—19. München, Inst. f. theoret. Physik.)

HANTKE.

Helmuth Hönl, *Zum Intensitätsproblem der Spektrallinien*. Nach der Annahme, daß die Intensitäten der Einzellinien nicht nur in rationalen Zahlenverhältnissen zueinander stehen, sondern sich auch durch rationale Funktionen der Quantenzahlen ausdrücken lassen, konnte die Eindeutigkeit der Intensitätsformeln für Multipletts u. Einzelstrahlen bewiesen werden. (Ann. der Physik [4] 79. 273—323. München, Inst. f. theoret. Physik.)

ENSZLIN.

Albrecht Unsöld, *Über die Termgrößen der Serienspektren.* (Vgl. S. 15.) I Termgröße von nicht in den Atomrumpf eindringenden Bahnen ist abhängig v der Polarisierbarkeit des Atomrumpfes. Diese wird unter Voraussetzung einer v einfachenden Annahme berechnet u. auf die Spektren von He, der Alkalien u. E alkalien angewandt. (Ztschr. f. Physik **36**. 92—100. München, Inst. f. theor Phys.) HANTKE

Charles E. Deppermann, *Einige Studien über den Stark-Effekt.* Vf. benut eine dünne 10 cm lange Kathode u. läßt die Entladung zwischen 2 Silicapplatten v sich gehen. Der Effekt ist von derselben Größenordnung wie bei Anwendung ein Lo Surdo-Röhre, deren Durchmesser gleich dem Plattenabstand ist. Zur Beobac tung des Effektes an Kanalstrahlen empfiehlt Vf. eine Anordnung, bei der sich d Hilfselektrode in der Achse einer langen, hohlzylinderförmigen, durchlochten Katho befindet. Für das Zn-Triplett $1s - 1p$ findet Vf. keinen Effekt im Gegensatz dem Befund von NAGAOKA u. SUGIURA (Japanese Journal of Physics. **3**. 45; C. 1919 II. 1477.) (Astrophys. Journ. **63**. 33—47.) LESZYNSKI

F. Reiche, *Über Beziehungen zwischen den Übergangswahrscheinlichkeiten bei Zeemaneffekt (magnetischer f-Summensatz).* (Naturwissenschaften **14**. 275— Breslau.) JOSEPHY

A. Fowler, *Das Spektrum des ionisierten Sauerstoffs (O II).* Im Bereich v λ 6750 bis λ 1950 wurde das Spektrum des ionisierten Sauerstoffs in Entladungsröhr (Capillaren) untersucht, die aufgefundenen Linien (ca. 400), die dem einfach io sierten Sauerstoff zugeschrieben wurden, sind tabellarisch zusammengestellt. I Spektrum besteht zum großen Teil aus Dubletts u. Quartetts, (möglicherweise au Sextetts), deren Terme bestimmt wurden. Für die Ionisierungsspannung des Sau stoffs erhält Vf. 30 Volt, während sich aus den Sternspektren ein Wert von 31 V herleitet. Ein Vergleich mit dem Spektrum des Stickstoffs (N I) zeigt eine we gehende Ähnlichkeit zwischen beiden. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **11**. 476—501. South Kensington, Imperial Coll.) HANTKE

William W. Watson und Philip Rudnick, *Das Bandenspektrum des Magnesium hydrids.* Vff. arbeiten mit einem Mg-Bogen in H. Vff. bestätigen u. ergänzen d von A. FOWLER (Philosophical Transactions of the Royal Soc. of London **209**. 447; C. 1910. I. 1217) gefundenen Wellenlängen. Die Banden sind nicht a MgH_2 , sondern auf das MgH -Ion zurückzuführen, da die allgemeine Struktur v auch der Isotopeneffekt auf einen dipolaren Körper schließen läßt. (Astrophys. Journ. **63**. 20—32.) LESZYNSKI

C. C. Kiess und O. Laporte, *Verschobene Serien im Spektrum des Chroms.* I Bogenspektrum des Chroms muß nach den Überlegungen der Vff. ein ^6S -Term v handen sein, der sich jedoch aus den bekannten Linien des Cr II nicht ermitteln läß Eine Rechnung zeigt, daß die vermuteten Linien in der Gegend von 2035 Å. lieg müssen. Eine Unters. des Spektrums in diesem Bereich bestätigte die Vermutu u. ergab die Existenz eines Triplets, dessen Grundterm ein ^6S -Term ist. Hieru schließen Vff., daß der normale Zustand des Cr^+ ^6S ist (fünf 3_s Elektronen). Zu Schluß geben Vff. eine Zusammenstellung der Normalzustände der Elemente der u. 2. langen Periode des period. Systems. (Science **63**. 234—36. Washington, Bureau of Standards.) HANTKE

Frederick K. Bell, *Die infraroten Absorptionsspektren von organischen Derivaten des Ammoniaks.* II. α -Naphthylamin und einige Mono- und $\frac{1}{2}$ -Dialkyl- α -naphthylamine (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 2192; C. 1925. II. 1931.) wurden die Absorptionsspektren von geschmolzenem α -Naphthylamin bei 60°, v Methyl- α -naphthylamin, Dimethyl- α -naphthylamin, Äthyl- α -naphthylamin u. Diäthyl- α -naphthylamin im Bereich von 2—12 μ aufgenommen, ferner von β -Naphthylamin bei 125°. Kurventafeln vgl. im Original, die Kurve für β -Naphthylamin ist nic

iedergegeben. — α -Naphthylamin zeigt Banden bei 2,9, 3,2, 5,1, 5,4, 6,1, 6,8, 7,1, 7, 8,5, 8,9, 9,1, 9,8 μ , was gegenüber Naphthalin Verringerung der Strahlenurchlässigkeit erweist. Im übrigen besteht weitgehender Parallelismus zu den Verhältnissen bei Benzol u. Anilin. — Die Kurven der alkylierten α -Naphthylamine zeigen geringe Abweichungen hauptsächlich um 2,8–3,4 μ u. um 6,1 μ ; die Differenzen sind ebenfalls den Erscheinungen bei den Alkylanilinen analog. — Die Kurve des β -Naphthylamins ist der des α -Naphthylamins auffallend ähnlich, so daß in Messungen der Alkyl- β -naphthylamine abgesehen wurde. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 3039–45. 1925. Baltimore [Maryland], JOHNS HOPKINS Univ.) OG.

Clyde W. Mason, Strukturelle Farben der Insekten. I. Was die Farben der Insekten betrifft, so wird von dem Vf. festgestellt, daß alle weißen Farben bei Insekten strukturelle Farben sind; perlenartiger oder metallartiger Lüster wird durch partielle durchscheinende Häute hervorgerufen; ein Tyndallblau konnte nur bei einigen wenigen Insekten festgestellt werden, blaue Pigmentfarben dagegen scheint es überhaupt bei Insekten nicht zu geben. Ferner können strukturelle Bedingungen das Aussehen von Pigmentfarben sehr wesentlich ändern. (Journ. Physical Chem. 30. 3–95. Cornell Univ.)

HAASE.

Helene Rieth, Über die künstliche Doppelbrechung in zylindrischen Glaskörpern unter Einwirkung äußerer Drucke. Mathemat. Behandlung des Problems der räumlichen quantitativen Verteilung der in zylindr. Glaskörpern durch verschieden wirkenden äußeren Druck bewirkten Doppelbrechung; entsprechende, mit opt. Methoden ausgeführte Verss. erweisen Übereinstimmung mit der Theorie. (Ann. der Physik [4] 79. 5–76. Gießen.)

FRANKENBURGER.

Y. Rocard, Diffusion des Lichtes in Flüssigkeiten. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 1. 212; C. 1925. II. 1657.) Die Messungen des Depolarisationsgrades ρ des durch Licht zerstreuten Lichtes können aus opt. Gründen beträchtliche Fehler aufweisen. Bei Ausschaltung dieser Fehlerquellen fand Vf. (weißes Licht) für CCl_4 $\rho = 0,106$, für Bzl. $\rho = 0,438$. — Bedeutet θ eine vom Molekularfeld abhängige u. mit Hilfe der krit. Wellenlängenz ermittelbare Größe, so ist $\rho = \rho_0 + \theta (2 - \rho_0 - \rho_0^2)$. Man kann ρ_0 , die Depolarisation in Abwesenheit des molekularen Feldes, aus der Kerrkonstante oder der Elektrostriktion berechnen. Die Übereinstimmung mit der Erfahrung ist gut. — Für das Verhältnis der Lichtzerstreuung in zwei Fll. wird gleichfalls eine Formel abgeleitet. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 690–91.)

BIKEMAN.

R. Ladenburg, Die diamagnetische und paramagnetische Drehung der Polarisationsebene. Vf. bespricht die Unterschiede zwischen der diamagnet. u. paramagnet. Drehung der Polarisationsebene. Bedeutet ν die Frequenz der einfallenden Lichtwelle u. ν_i die Eigenfrequenz der schwingenden Elektronen, so ist die diamagnet. Drehung (gewöhnlicher Faradayeffekt) proportional $1/(\nu_i^2 - \nu^2)^2$, also s. zu ν_i u. stets von gleichem Vorzeichen, die paramagnet. Drehung dagegen ist proportional zu $1/(\nu_i^2 - \nu^2)$, also a. zu ν_i u. negativ, wenn $\nu > \nu_i$. Die letztere Erscheinung ist als anomale Rotationsdispersion an fl. O_2 u. an paramagnet. Salzen wie z. B. an Ca-Salzen beobachtet worden. Die paramagnet. Drehung ist ferner wie die diamagnet. Suszeptibilität umgekehrt proportional der absol. Temp. (Physikal. Ztschr. 26. 685–86. 1925.)

STEINER.

M. Travníček, Beiträge zur Kenntnis der Samariumphosphore. Von Samariumphosphoren stellt Vf. Erdalkalisulfidphosphore u. solche von Mg her. Zur Darst. ersterer wird für möglichst gleichmäßige Verteilung des Sm im Gemisch der verschiedenen Komponenten gesorgt u. im elektr. Ofen bei ca. 800–900° geglüht. Die besten Prodd. erhalten die Zus.: 3,2 g $\text{CaO} + 1,85$ g S + 0,08 g LiF + 0,3 g Stärke + 0,03 mg Sm, Min. Gelbglut; 3,0 g $\text{SrO} + 1,2$ g S + 0,08 g LiF + 0,3 g Stärke + 0,2 mg Sm, Min. helle Rotglut; 5,4 g $\text{BaO} + 1,16$ g S + 0,1 g NaF + 0,05 g KF + 0,5 mg Sm, Min. Rotglut. Die Darst. der Magnesiumsulfidphosphore erfolgte nach TIEDE u. HLEEDE (Ann. der Physik [4] 67. 573; C. 1922. III. 905), nur wurde statt Anwendung

eines $\text{CS}_2\text{-N}_2$ -Stromes vollständig wasserfreier CS_2 -Dampf in einer Quarzröhre über glühendes MgSO_4 geleitet. In Glasröhren eingeschmolzen zeigten die Präparate auch nach Jahren keine Verminderung ihrer Leuchtfähigkeit.

Die Beobachtung des Phosphoreszenzspektrums nimmt Vf. immer während dauernder Belichtung, wozu konvergent gemachtes u. entsprechend filtriertes Licht einer Bogenlampe oder Quarz-Hg-Dampflampe diente, vor. Ein kleiner, innen versilberter Hohlkegel konzentriert als Lichtsammelröhre alle für die Erregung wirksamen Strahlen auf eine kleine Phosphorfläche. — Die Unterss. des Vfs. zeigen, daß alle Sulfidphosphore im Emissionsspektrum eine typ. dreiteilige Gruppierung besitzen. Die erst langwelligste Teilgruppe α_a besteht aus zwei bzw. drei Doppelbanden, die mittlere Gruppe α_b bildet eine Dublette im Orangerot, die Gruppe α_c im Grün gelb ist von ähnlicher Struktur. Die einzelnen gemessenen Linien, wie auch andere Beobachtungsdaten werden tabellar. gebracht. — Wenn mit Licht verschiedener Beschaffenheit erregt wird, so fallen besonders bei den Ca- u. Sr-Phosphoren große Unterschiede in der Intensitäten der einzelnen Linien auf. Auch beobachtet Vf. relative Helligkeitsänderungen einzelner Linien beim Erhitzen. Es ergibt sich, daß den einzelnen Linien trotz ihrer Zusammengehörigkeit doch eine gewisse Selbständigkeit zukommt. Eine Erklärung für dieses merkwürdige Verh. der untersuchten Phosphore wird versucht.

Neu stellt Vf. von *Samariumoxydphosphoren* die des Mg u. Be dar, u. zwar durch Glühen der entsprechenden mit Sm versetzten Chloride (1 g MgCl_2 bzw. BeCl_2 , 0,8 mg Sm). Es sind weiße, krümelige Massen, welche grünlichgelb nachleuchten. Das Spektrum der Sauerstoffphosphore zeigt im allgemeinen ähnlichen Charakter wie die Sulfidphosphore. Die beobachteten Banden werden gebracht. — Einen durch die M.-V.-Bogenlampe erregbaren *BaOSm-Phosphor* erhielt Vf. durch Glühen von $3 \text{ BaCO}_3 + 1 \text{ g Ba(NO}_3)_2 + 0,05 \text{ g Li}_2\text{CO}_3 + 0,25 \text{ mg Sm}$, 20 Min. Rotglut. — In bezug auf Richtung, Regelmäßigkeit u. Größe der Lageänderungen der untersuchten Phosphoreszenzbanden konnte mit anderen Schwermetallen kein Analogon gefunden werden. Die Diskontinuität des Spektrums liegt zweifellos in der besonderen Beschaffenheit des Sm-Atomes, denn dieses besitzt mit anderen seltenen Erden auch die Eigenschaft, in Lsg. u. als festes Salz ein charakterist., aus sehr schmalen Banden bestehendes Absorptionsspektrum zu zeigen. Die Lage der Banden ist sehr wesentlich durch das Mol.-Gew. der Grundsubstanz bedingt, wobei der Sinn der Verschiebung ob gegen längere oder kürzere Wellenlängen, durch das Gattungsatom bestimmt wird.

Die Frage nach dem Zentrum der Träger des Lumineszenzvorganges sucht Vf. durch Unterss. an *Sm-Mischphosphoren* zu klären. Darunter werden Phosphore verstanden, die aus verschiedenen Kombinationen verschiedener Metalle der Grundsubstanz der Gattungsatome u. des wirksamen Metalles bestehen. Eine einfache, eindeutige Schreibweise für diese Mischphosphore wird vorgeschlagen, z. B. $\left[\begin{smallmatrix} \text{CaSr} \\ n \text{ m} \end{smallmatrix} \right] \text{SSm} + \text{Li}$ (30)

Im Phosphoreszenzspektrum dieser Phosphore erscheinen nicht z. B. die Banden des CaSSm- u. SrSSm-Phosphors gleichzeitig nebeneinander, sondern es wird nur ein einfaches Spektrum emittiert, im Aussehen u. dem Charakter nach ganz gleich beschaffen wie die der einfachen Phosphore, nur etwas verschoben. Vermengt man dagegen CaSSm- u. SrSSm-Phosphore in fein pulverisiertem Zustande, so zeigen diese „Gemengphosphore“, wie zu erwarten, die Spektren der Einzelphosphore und beeinflussen voneinander in voller Reinheit. Die Intensität u. Dauer des Nachleuchtens ist bei den Mischphosphoren größer.

Aus Unterss. an Phosphoren, die größere Mengen inaktives Füllmaterial (MgO , ThO_2 usw.) enthielten, wo aber trotzdem die Lage der Banden unverändert blieb, folgert Vf., daß die spektrale Lage der analogen Phosphoreszenzbanden den Zusammenhang mit der chem. Konst. zum Ausdruck bringt, u. zwar auch derart, daß z. B. der Ersatz eines jeden Ca-Atomes im wirksamen Zentrum eines CaSSm-Phosphors durch

Ein Sr-Atom sich durch eine Änderung des Emissionsspektrums bemerkbar macht, diese um so stärker wird, je größer die mögliche Zahl der Substituenten wird. Weiter ergibt auch die Aufnahme der Lumineszenzspektren von Sm in den Sulfaten von Mg, u. Ba, CaF₂ u. ZnS, daß nur durch die Bindung des Sm-Atoms an das Gattungsmetall die typische Form der Emission entsteht. Als Träger der Emission kommt also nur jener Teil des Zentralmol. in Frage, welcher die chem. Verb.: wirksames Zentral-Gattungsatom enthält. Durch die Größe der Bindungsenergie: Gattungsmetall-Grundmetall u. der Form des Feldes wird die Konfiguration der Elektronen im Inneren des Sm-Atomes bestimmt u. ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt, was sich sowohl in der Verschiebung der Hauptdoublette wie auch in kleinen Änderungen des Spektrums zu erkennen gibt. Vf. kommt zum Schluß, daß eine gewisse Anzahl Moll. der Grundsatz substanz direkt mit dem Zentralatom verbunden sind. Diese Zone ist für die Lage der Emissionsbanden bestimmend. Weitere Anlagerungen werden nur für die Aufspeicherung jener lichtelektr. Quanten Bedeutung gewinnen, welche bei Erregung aus der ersten Zone entweichen. Diese entfernteren Zonen bestimmen dann wesentlich nur die Dauer der Phosphoreszenz u. sind die Ursache der verschiedenen äußeren Energieisolation.

Auf einen bemerkenswerten Zusammenhang zwischen der Phosphoreszenzintensität bei den CaSrSSm-Mischphosphoren u. den einfachen Phosphoren gegenüber der therm. Emission von elektr. geladenen Teilchen (vgl. SPANNER, Ann. der Physik [4] 75. 609; C. 1925. I. 607) aus einfachen Erdalkalioxyden u. von Gemengen macht Vf. aufmerksam. Es erweist sich, daß ein Atom bei Anlagerung fremder Ionen unter Umständen mehr Elektronen emittieren u. besser zur lichtelektr. Erregung u. Lichtemission veranlaßt werden kann, als wenn es sich unter gleichartigen Umständen befindet. (Ann. der Physik [4] 79. 237—60. Graz, Physikal. Inst.) UL.
Antonio Carrelli, Über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der strahlenden Energie in einem fluorezierenden Dampf. Rein theoret. Abhandlung. (Rendiconto Accad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] 31. 50—55. 1925.) GOTTFRIED.

S. Valentiner und **M. Rössiger**, Die Energieausbeute der Fluoreszenzstrahlung bei Fluoresceinlösungen bei antistokesscher Erregung. (Vgl. S. 1455.) An Lsgg. von Fluorescein (10^{-5} g/ccm) wurde mit monochromat. Erregung (Quecksilberlampe 365 m μ u. 436 m μ) die Energieausbeute der Fluoreszenzstrahlung bestimmt. Das Ergebnis der Unterss. ist eine volle Bestätigung des früher gefundenen starken Energieausbeute-Abfalls, wenn Teile des erregten Fluoreszenzspektrums kurzwelliger sind als die erregende Strahlung. Vff. suchen diesen Befund zu deuten u. kommen dabei zu einer Verwerfung der Hypothese, daß für die Emission der „antistokesschen“ Strahlung die Wärmeenergie des Mol. als Energiequelle in Betracht käme. Sie zeigen vielmehr, daß die Ausstrahlung der kürzeren Wellen der Fluoreszenzbande durch eine rezessive Aufnahme zweier Quanten (deren ν innerhalb der Bande liegt) erfolgt. Hierdurch erklärt sich auch die Verringerung der Energieausbeute, die noch durch andere Überlegungen plausibel gemacht wird. (Ztschr. f. Physik 36. 81—91. Clausen, Phys. Inst. d. Bergakademie.) HANTKE.

E. Gaviola, Die Abklingungszeiten der Fluoreszenz von Farbstofflösungen. Vf. hat eine Abänderung der Versuchsanordnung von ABRAHAM-LEMOINE an, bei der ein elektr. Feld in der Kerrzelle durch ungedämpfte elektr. Schwingungen erzeugt wird; als Lichtquelle dient eine Kohlenbogenlampe. Mit Hilfe dieses modifizierten Apparats wird die Abklingungszeit τ der Fluoreszenz der Lsgg. von Uranin u. Rhodamin B in W. u. Glycerin unter verschiedenen Bedingungen untersucht. τ ist von der Konzentration u. der Temp. ziemlich unabhängig, aber bei Rhodamin B in W. erheblich kleiner als in Glycerin. Die vom Vf. gefundenen τ -Werte liegen zwischen 1 u. $5 \cdot 10^{-9}$ sec, sind also erheblich kürzer als diejenigen von GOTTLING (Physical Review. [2] 22. 566; C. 1924. I. 2568); die Unterschiede sind vielleicht durch die verschiedene Farbe der

erregenden Strahlung zu erklären. — Die Anwendungsmöglichkeit der gleichen Anordnung zur Messung der Lichtgeschwindigkeit wird diskutiert. (Ztschr. f. Physik **35**. 748—56. Berlin, Univ.)

KRÜGER.

D. M. Nelson, *Photographische Spektren der Tribolumineszenz*. In einen besonders angegebenen App. gelang es dem Vf., Tribolumineszenzspektren zu photographieren. Es wurden so die Spektren von *Sphalerit* (ZnS) von der Horn Silver Mine, Utah, welche schon beim Berühren mit dem Finger diese Erscheinung zeigt, von Flußspat von Hadd Neck, Conn. u. von künstlichem ZnS aufgenommen u. mit dem Spektrum des He verglichen. Die erhaltenen Spektren sind kontinuierlich. Das Spektrum des Sphalerit geht von 6100—5700 Å, das des Flußspats von 5900—5600 Å u. das des künstlichen ZnS von 6500—5225 Å. Danach ist die Farbe des Lichts bei der Tribolumineszenz immer dieselbe, d. h., die Art der Anregung hat keinen Einfluß auf die Farbe, was aber auf die Intensität des Lichts. Außerdem ist in einer Tabelle die Art der Tribolumineszenz von *Dolomit*, *Fluorit*, *Hexagonit*, *Pekolit*, *Talk*, *Tremolit*, *Willimit* u. *Wollastonit* verschiedener Herkunft angegeben. (Journ. Opt. Soc. America **12**. 207—Bloomington, Indiana. Univ.)

ENZLIN

A. Predwoditilew und **A. Witt**, *Zur Frage nach der photoelektrischen Ermüdung*. Unter der Annahme, daß die photoelektr. Ermüdung im wesentlichen auf der Adsorption u. Absorption von Gasmolekeln u. Gasionen auf der Oberfläche des photoakt. Metalls beruht, wird ein mathem. Ausdruck für den Zusammenhang zwischen der Ausbeute des Lichtes u. der Menge des adsorbierten Gases abgeleitet. Messungen der zeitlichen Änderung des Photostroms von Zn u. Sb nach der Methode von STOLET ergeben, daß die Adsorption nach der Gleichung $dC/dt = q(C_{\infty} - C)^2$ erfolgt (C_{∞} = Adsorptionskapazität, q = Adsorptionskoeffizient), u. daß q von der mechan. Bearbeitung des Metalls unabhängig ist. (Ztschr. f. Physik **35**. 783—91. Mosk. Univ.)

KRÜGER

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Eugénie Siegler, *Verteilungsgleichgewicht, Dissoziationsgrad und elektromotorische Kraft*. Vf. beweist experimentell den für die Nernstsche Theorie der Elektrodenpotentiale wichtigen Satz, daß nach Einstellung des Verteilungsgleichgewichtes eines Elektrolyten zwischen 2, gegenseitig nicht mischbaren Lösungsm., sein Dissoziationsgrad in beiden der gleiche ist. Dies geschieht 1. auf direktem Wege, indem die Verhältnisse λ/λ_{∞} für beide Lösungsm. gemessen werden. 2. Weiterhin wird es durch die Konstanz des gegenseitigen Verhältnisses der spezif. Leitfähigkeiten für verschiedene Konzentrationen bewiesen. Die Krüger-Waldensche Formel ist nur für stark dissoziierte, nicht für schwach dissoziierte gültig. Die elektromotor. Kraft zwischen zwei Phasen ist nach Einstellung des Verteilungsgleichgewichtes gleich Null. Zwischen den Dielektrizitätskonstanten von Fl. u. den Potentialwerten von Metallen in demselben besteht Parallelismus, der auch für Flüssigkeitsgemische sich als gültig erweist. (Ann. sci. Univ. Jassy **13**. 360—90. Jassy, Univ.)

FRANKENBURGER

P. Fischer, *Über die elektrische Leitfähigkeit von festen Salzgemischen*. Die Leitfähigkeit folgender Salzgemische bei Temp. unterhalb der FF. wurde gemessen: $AgJ + AgBr$, $AgJ + KJ$, $AgBr + KBr$, $AgBr + PbBr_2$, $Cu_2Cl_2 + PbCl_2$ sowie $CuS + S$. Das Gemisch $CuS + S$ leitete metallisch, die übrigen elektrolytisch. Das Ohmsche Gesetz war nicht anwendbar. Die Größen der Leitfähigkeit gegen Gleichstrom waren mit wechselndem Vorzeichen von denen für Wechselstrom verschieden. Geschmolzene Gemische ergeben andere Werte als gepreßte. Ein Zusammenhang zwischen den Diagrammen der Leitfähigkeit u. denen der therm. Analyse konnte nicht festgestellt werden. Die Verss. beweisen die Unmöglichkeit, etwas über den Gang der Leitfähigkeitskurven von Gemischen vorauszusagen. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 136—43. Kiew.)

HEIMANN

Chr. Roos, *Über die Erhöhung der Leitfähigkeit fester Dielektrika bei Bestrahlung Röntgenstrahlen*. Vf. untersucht Schwefel, Hartgummi, Paraffin u. Bernstein auf die Leitfähigkeitsänderung bei der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. Diese werden durch Filter bekannten Absorptionsvermögens nach Möglichkeit monochromatisiert bzgl. ihrer Intensität durch Messungen ihrer Ionisierungsfähigkeit in einer Luftionisierungskammer bestimmt. Die Messungen der in den bestrahlten Isolatoren auftretenden Ströme erfolgt elektrometr. — Während beim Schwefel die Bestrahlungs-fähigkeit keine Anzeichen eines Sättigungswertes zeigt, liefern Paraffin, Hartgummi Bernstein typ. Sättigungsstromkurven. Weiter wird die Bestrahlungsleitfähigkeit Abhängigkeit von der Härte der verwendeten Röntgenstrahlung untersucht u. mit der Leitfähigkeit der Luft verglichen. Die Leitfähigkeiten steigen beim S linear mit der angelegten Spannung an, gehorchen also dem Ohmschen Gesetz; bei den übrigen Substanzen ist eher von einer, leicht zu sättigenden „Ionisation“ zu sprechen. Die Leitfähigkeitsänderungen wachsen proportional mit der Intensität der absorbierten Strahlung an. Die Wellenlängenabhängigkeit der erzeugten Leitfähigkeiten ist im allgemeinen anders als bei der Luftionisation; sie steigt dieser gegenüber mit abnehmender Wellenlänge der X-Strahlung stärker an. Während beim S nur die bei kurzer Bestrahlung auftretenden Ströme diesen Regeln gehorchen u. nach längerer Bestrahlung Abkündungs- u. andere Sekundäreffekte auftreten, ist dies bei den anderen Isolatoren nicht der Fall. Beim S ist die Erhöhung der Leitfähigkeit bei 100° etwa doppelt so groß als bei 18°. Größenordnungsmäßig ist die Schwefelleitfähigkeit bei dünnen Isolatorschichten wesentlich größer als die der übrigen untersuchten Substanzen. (Ztschr. f. Physik 36. 18—35. Bonn, Univ.)

FRANKENBURGER.

Hugo Decker, *Die magnetische Suszeptibilität von wässrigen Lösungen der Salze seltener Erden*. Nach einer Differentialmethode wurde die Magnetisierbarkeit der selteneren Erden bestimmt. Die gefundenen Werte stimmen mit den vorhandenen gut überein: Die Suszeptibilität der Salze in wss. Lsg. ist gleich der der Salze in Krystall-lösungen. Bei der Berechnung der Weißschen u. Bohrschen Magnetonenzahl nach der gewöhnlichen Formel ergibt sich keine Ganzzahligkeit. Im folgenden bedeutet die erste Zahl die Anzahl der Weißschen, die zweite in Klammer die der Bohrschen Magnetonen. Sie betragen für Ce^{III} 10,45 (2,10), Pr 16,95 (3,41), Nd 17,13 (3,45), Sm 8,08 (1,63), Eu 19,68 (3,96), Gd 39,08 (7,86), Tb 48,52 (9,76), Dy 53,95 (10,85), Ho 51,64 (10,39), Er 7,42 (9,54), Yb 22,36 (4,50), Cp 6,08 (1,22). (Ann. der Physik [4] 79. 324—60.) ENSZ.

W. Nernst und **W. Orthmann**, *Die Verdünnungswärme von Salzen bei sehr hohen Konzentrationen*. Nach der Theorie von DEBYE u. HÜCKEL, wie auch nach den älteren von J. CH. GHOSH, sind die auf hinreichend kleine Konz. bezogenen Verdünnungswärmen nur von den Ladungen der Ionen abhängig, müßten also für alle ungeladenen Elektrolyte, ebenso wie die osmot. Drucke, verd. Lsgg. gleich groß sein. Vff. prüfen diese Forderung der Theorie nach der von v. STEINWEHR zur Berechnung kleiner Verdünnungswärmen ausgearbeiteten elektrotherm. Methode (Ztschr. f. Physik. Ch. 38. 185; C. 1901. II. 724). Die Ergebnisse stehen in krassstem Gegensatz zu den Forderungen der Theorie, auch wenn die Debyeschen Formeln, wie das auch nicht veröffentlichten Arbeiten von DEBYE u. von BJERRUM geschehen ist, durch Berücksichtigung der Elektrostriktion korrigiert werden. Wegen des engen Zusammenhanges zwischen Verdünnungswärme u. osmot. Arbeit glauben Vff. infolge Versagens der Theorie im 1. Fall auch die Anwendbarkeit im 2. Fall als mehr oder weniger zufällig bezeichnen zu können. (Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin 1913. 51—56.)

LESZYNSKI.

Th. Ionesco, *Die Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten; Zusammenhang mit der Verdünnungswärme*. Vf. beschreibt eingehend die bisherigen Verss. zur Best. der Schallgeschwindigkeiten in Fl. u. schildert hierauf eine von ihm entwickelte, sehr einfache Methode zur Messung dieser Größen. Sie beruht auf einer, mittels Mem-

see
errata
p. 3977

branen sichtbar gemachten Fortpflanzung elast. Wellen in Flüssigkeitssäulen. Registrierung der Membranbewegungen erfolgt mittels Spiegeln u. photograph. zeichnung. Es werden die Schallgeschwindigkeiten in *W.*, *A.*, *Aceton*, *Ä.*, *X Bzl.* u. *Petroleum* bestimmt. Die Beziehung $v = \sqrt{l}$ (v = Schallgeschwindigkeit, l = Verdampfungswärme) gilt für einige Fl. bei gewöhnlicher Temp.; bei erhöhter Temp. nähern sich die Werte der nach dieser Formel berechneten Schallgeschwindigkeiten denjenigen, die aus dem Elastizitätskoeffizienten der Fl. errechnet werden.

Die Formel $v = \sqrt{\frac{l}{\alpha T}}$ ist für alle n. Fl. gültig (α = Ausdehnungskoeffizient).

Auch die Konstante b der van der Waalsschen Gleichung läßt sich mittels

Best. von v auf Grund der Beziehung $v = \sqrt{l \frac{\varphi}{\varphi - b}}$ berechnen. Kinet. Untersuchungen zeigen, daß die Schallgeschwindigkeit in einem Gas gleich der wahrscheinlichsten Molekulargeschwindigkeit U_p in demselben, multipliziert mit

ist ($\gamma = \frac{C_p}{C_v}$); für Fl. modifiziert sich diese Beziehung zu $v = U_p \cdot \sqrt{\frac{1}{2} \frac{\varphi}{\varphi - b}}$.

Der Binnendruck P steht mit v in folgendem Zusammenhang: $P = \frac{\varphi - b}{\varphi}$.

Der Geschwindigkeitsverlust u der Molekeln, die aus der Fl. in den Dampf austreten, ist $U = U_p \sqrt{\frac{\varphi}{\varphi - b}}$. (Ann. scient. Univ. Jassy 13. 278—314.) F.

K. Schreiber, Die Abhängigkeit der elektromotorischen Kraft der Akkumulatoren vom Säurereichtum. Zur Klärung der Streitfrage, ob der aus einer Lsg. entstehende Dampf die Temp. des aus dem reinen Lösungsm. bei gleichem Druck entstehenden Dampfes besitzt (FARADAY) oder die Temp. der Lsg. (GAY-LUSSAC), berechnet aus alten Vers.-Reihen von DOLEZALEK u. THIBAUT die EMK. gegeneinander geschalteter Akkumulatoren mit Säuren verschiedenen Reichtums. Nur mit FARADAYS Annahme werden gut stimmende Werte erhalten. Vf. folgert: Der aus einer Lsg. entstehende Dampf ist gesätt. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 143—49.) H.

K. Schreiber, Gleichung zwischen osmotischem Druck und Siedepunkterhöhung nach Arrhenius. Als Folgerung aus der vom Vf. bewiesenen Annahme FARADAYS über die Temp. des Dampfes über einer Lsg. (vgl. vorst. Ref.) ergibt sich: Der osmotische Druck im Osmometer wird nicht nur einseitig an der auswählend durchlässigen Membran durch den hydrostat. Druck der Flüssigkeitssäule kompensiert, sondern auch an der Membran zum Dampf hin findet er seine Gegenwirkung, u. zwar durch den Intensitätsunterschied, der sich aus der unterschiedlichen Temp. von Dampf u. Lsg. ableiten läßt. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 149—50.) HEIMANN

B. Anorganische Chemie.

A. W. Browne und Frank Wilcoxon, Stickstoffwasserstoffsäure als Desolvationsprodukt von Ammonosalpetersäure, hydrazosalpetriger Säure und ammonohydrosalpetriger Säure. Experimentelle Bildung von Natriumtrinitrid durch Ammoniumsalpeterminerale mit Natriumamid. Vf. zeigt, daß nach bekannten experimentellen Einzelheiten eine nahe Verwandtschaft zwischen der Stickstoffwasserstoffsäure und der hydrazosalpetrigen Säure bestehen muß. Zur Darst. von N_3H aus HNO_2 werden Desolvationsmittel angewandt, das ähnlich wie $W.$ u. NH_3 die Basis eines Systems von Säuren, Basen u. Salzen bildet. Die Stickstoffwasserstoffsäure kann als eine der petrigen Säure dieses Systems, als hydrazosalpetrige Säure, angesehen werden.

aus n. hydrazosalpetriger Säure, $N(N_2H_3)_3$, durch Hydrazinabspaltung abgeleitet werden. $N(N_2H_3)_3 \rightarrow N_3H + 2 N_2H_4$. Nach FRANKLIN (Journ. Americ. Chem. c. 46. 2137; C. 1925. I. 4) kann Stickstoffwasserstoffsäure auch als *Ammonosalpeterure* angesehen werden. Andererseits läßt sich die Stickstoffwasserstoffsäure auch

der n. ammonountersalpetrigen Säure herleiten
$$\begin{array}{c} N \cdot NH_2 \\ || \\ N \cdot NH_2 \end{array} \rightarrow N_3H + NH_3$$
. Da

er bei der Zers. der organ. Derivv. dieser Säure, den Tetrazenen, keine N_3H auftritt, muß man sich die Stickstoffwasserstoffsäure vom i-Tetrazen, $HN:N \cdot NH \cdot NH_2$, empir. Isomeren des Tetrazens, abgeleitet denken. Sowohl Tetrazen als auch Tetrazen können als gemischte *ammonohydrazosalpetrige Säuren* angesehen werden. In anderen Betrachtungen aus ist Vf. schon früher (vgl. BROWNE u. OVERMAN, Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 285; C. 1916. I. 825) zu der Annahme gekommen, daß sich bei der B. von N_3H bei der Einw. von einigen Oxydationsmitteln, die keinen enthalten, auf N_2H_4 intermediär i-Tetrazen bildet, während bei der Einw. anderer Oxydationsmittel auf N_2H_4 , wobei NH_3 u. N_2 aber wenig oder keine N_3H gebildet wird, Tetrazen als Zwischenprod. angenommen wird. Von diesem Standpunkt können Methoden, die bisher zur B. oder Darst. von N_3H benutzt wurden, so aufgefaßt werden, daß zuerst Solvolyse einer Oxsäure des Stickstoffs oder ihrer Derivv. mit intermediärer B. einer n. Säure, die zum Ammoniak-, Hydrazin- oder zu beiden Systemen gehört, u. dann Desolvation dieser Säure eintritt. — Stickstoffwasserstoffsäure kommt in Zus. u. Charakter den „Ansolviden“ der Ammonosalpeter-, hydrazosalpetrigen u. ammonohydrazosalpetrigen Säure nahe, bisher sind aber das „Anmonid“, Stickstoffpentanitrid, $N:N(N_3)_2$, u. das „Anhydrazid“, $N_3 \cdot N_2 \cdot N_2 \cdot N_3$, nicht isoliert worden.

Ammonolyse von $NaNO_3$. Vff. untersuchen die Rk. zwischen $NaNO_3$ und $NaNH_2$ bei höheren Temp. u. Atmosphärendruck in Ggw. u. Abwesenheit von NH_3 , die zur B. von *Natriumtrinitrid* führt. Beim vorsichtigen Erhitzen von $NaNH_2$ im Ni-Tiegel u. allmählichem Zugeben von pulverisiertem $NaNO_3$ zu der geschmolzenen M. trat heftige Rk. ein, NH_3 wurde frei, Funken entstanden u. bis zum Ende glühte ein Teil der ganzen M. Diese letzte Erscheinung schien die 2. Stufe der Rk. einzuleiten, in der sich die anfangs gebildeten Prodd. wieder zersetzten. Um eine gute Ausbeute an NaN_3 zu erhalten, konnte nicht das $NaNH_2$ des Handels verwendet werden, sondern es mußte reines $NaNH_2$ durch Überleiten von NH_3 über metall. Lithium hergestellt werden. Nach der Rk. mit $NaNO_3$ wurde das feste Prod. der Hydrolyse unterworfen. Das Trinitrid wurde in der Lsg. gravimetr. als Ag-Salz bestimmt. Die höchste Ausbeute wurde bei 175° erhalten, sie betrug 65,7% der theoret. nach der Gleichung $NaNO_3 + 3 NaNH_2 = NaN_3 + 3 NaOH + NH_3$ zu erwartenden. Höhere Temp. begünstigen die therm. Zers. des NaN_3 , das anfangs wahrscheinlich in theoret. Menge gebildet wird. — Bei der Rk. von $NaNO_2$ u. $NaNH_2$ tritt nach einigen Sekunden Detonation ein, NaN_3 wird nicht gebildet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1900. Ithaca [N. Y.], CORNELL Univ.) JOSEPHY.

G. de Hevesy, Untersuchungen über die Eigenschaften des Hafniums. In dieser Monographie sind die bisher in Dänemark ausgeführten Arbeiten über das *Hf* übersichtlich zusammengestellt u. ergänzt. Ein einleitendes Kapitel über die Stellung des *Hf* unter den Metalle der seltenen Erden im period. System u. über die mutmaßliche Natur des *Hf* in den Elementen mit dem At.-Gew. 72 u. ein Schlußkapitel über die Entdeckung des *Zr* u. über die früheren Verss., in den Zirkonmineralien neue Elemente zu entdecken, sind hinzugefügt. Eine auszugsweise Wiedergabe der zahlreichen Einzelheiten, über die zum Teil schon früher Mitteilung gemacht wurde, ist nicht möglich; bestehend wird deshalb im Anschluß an die einzelnen Kapitel der Monographie (Ausnahme der beiden schon genannten) auf diejenigen Stellen hingewiesen, an

denen über die einschlägigen, in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten Arbeiten berichtet wurde. Die Veröffentlichung erfolgte, wo nichts anderes angegeben von G. v. HEVESY oder von D. COSTER oder von beiden Autoren gemeinsam. *deckungsgeschichte*: C. 1923. I. 1005. III. 106. 354. 991. 1349. 1385; C. 1924. I. 1739. *Eigenschaften*: C. 1923. I. 1265; C. 1924. I. 2854. II. 1152; C. 1925. I. 1109. 1110. 1857. 1967. 2136. II. 713. 1297. 1739. 2011. *Spektrum*, HANSEN, WERNER, C. 1923. I. 1068. 1924. I. 1152. II. 431. 1914. 1925. II. 138. 1297. *Gehalt des Zirkons*: C. 1924. I. 432. 534. 1151. 1152. 1976. 2087. 1925. I. 1889. 2396. HEVESY u. JANTZEN, C. 1924. I. 534. 1647. II. 450. 1901. (Kong. Danske Vidensk. Meddelelser. Mathematisk-fysiske Meddelelser 6. Nr. 7. 149. 1925.) BÖTTGER

Peter Fireman, *Oxydation von metallischem Eisen durch einen Luftstrom in Gegenwart von Eisensalzen*. (Vgl. S. 37.) Bläst man durch ein Bündel von Eisendraht, welches in einer Ferrosalzlsg. liegt, andauernd Luft hindurch, so beobachtet man schon sehr bald die B. von gelben Oxydationsprod., welche bei längerer B. eine rotbraune Färbung annehmen. Die genaue Analyse ergab einen Gehalt von 83, Fe₂O₃, 2,53% SO₃, 0,07% SiO₂ u. 13,63% W. SO₃ u. SiO₂ sind als Verunreinigungen anzusprechen, so daß die Verb. als echtes Ferrioxymonohydrat anzusprechen (Ind. and Engin. Chem. 18. 286—87. Trenton [N. J. J.] GRIMM

René Girard, *Über die Einwirkung von Natriumchloridlösungen auf die Eisenmetalle*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 215; C. 1925. II. 1892). Versucht die Löslichkeit von Eisen in 2%ig. Lsgg. von NaCl (Meerwasser) ergaben in lufttrockenem Stahl, daß sowohl Stahl, wie Gußeisen gleichmäßig angegriffen werden u. in einer bestimmten Zeit gewisse Gewichtsverluste erleiden. In lufthaltigen Lsgg. zeigt der Stahl einen n. Gewichtsverlust, es tritt aber starke Korrosion desselben ein. Gußeisen wird ebenfalls angegriffen. Die Gewichtsabnahme fällt bis zu einem Minimum nach 1 Monat, steigt dann wieder u. wird nach 6 Monaten konstant. Die Metalle bedecken sich dabei mit einer Schutzschicht, welche beim Gußeisen fester als beim Stahl haftet. Korrosion tritt bei Gußeisen nicht ein. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 552—55. 1925.) ENSZL

B. M. O'Harra, *Oxydation des Zinkdampfes durch Kohlendioxyd*. Die Ursache zur Entstehung des Zinkstaubs unterscheidet Vf. als physikal. (Verdichten des gasförmigen, mit CO gemischten Zn-Dampfes infolge zu langsamer Diffusion nach den Wänden der Vorlage, wobei nahezu reines, von ZnO fast freies metall. Zn entsteht) u. als chem., unter denen die Oxydation des gasförmigen Zn durch CO₂ gemäß dem umkehrbaren Vorgange $\text{ZnO} + \text{CO} \rightleftharpoons \text{Zn} + \text{CO}_2$ die wichtigste ist. Die zu einer Einw. von CO₂ auf Zn erforderliche Konz. des CO₂ nimmt, wie diesbezügliche Versuche zeigten, mit steigender Temp. zu. Bei 750° wird ZnO selbst bei Ggw. großer Mengen CO₂ durch C reduziert, in dem kälteren Teil des Reaktionsgefäßes erfolgt aber Reduktion und Bildung des ZnO. Mit wachsender relativer Menge des CO₂ nimmt das Gewicht des ZnO in einer gegebenen Zeit reduzierten ZnO ab, u. bei Ggw. von 90% CO₂ sind die beiden einander folgende Oxydation u. Red. nur noch an dem Transport des ZnO von dem wärmeren nach dem kälteren Teil des Reaktionsgefäßes erkennbar. Bei Temp. zwischen 750° u. Zimmertemp. wird das gesamte CO₂ in CO umgewandelt, wenn die für die Red. zur Verfügung stehende Zeit hinreichend groß ist. Auch CO vermag das gasförmige Zn zu oxydieren; diese Oxydation ist jedoch prakt. bedeutungslos. (C. 1925. News 132. 138—41. Bureau of Mines, Vereinigte Staaten.) BÖTTGER

W. Fraenkel und A. Stern, *Über Gold-Nickellegierungen*. Es wurde das System Au-Ni therm. u. mkr. untersucht u. im Gegensatz zu früheren Arbeiten festgestellt, daß Au u. Ni nicht eutekt. krystallisieren, sondern eine unbegrenzte Reihe von Metallkrystallen bilden. Die Schmelzkurve weist ein Minimum von 950° bei Konz. von 10% Au.

—20% Ni auf. Der Nachweis der Mischkrystallbildung wurde dadurch erbracht, daß sämtliche Schmelzen durch genügend langes Tempern homogene Struktur annehmen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 105—8. Frankfurt a. M.) LÜDER.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

Georg Kalb, *Das System As-Sb in der Natur*. Auf Grund erzmikroskop. Unters. angenommen, daß das System As-Sb bei höheren Temp. eine lückenlose Reihe von Mischkrystallen bildet, welche sich bei niedrigen Temp. entmischen. Auf eine partige Entstehung deuten die natürlichen VV. von Allemont, Dauphiné. Diese zeigen eine innige Verwachsung von As u. Sb, wobei die Spaltrisse nach (0001) ohne Störungsbrechung oder Ablenkung durch beide Komponenten durchlaufen. Die Zus. der einzelnen Stücke ist sehr verschieden. Eine zweite Art der Ausbildung mit ebenfalls wechselnden Mengenverhältnissen, aber einem Überwiegen des Arsengehalts, bilden die dichten, meist schaligen MM. von Andreasberg u. Przibram. Bei diesen handelt es sich wahrscheinlich um eine Krystallisation aus einem Gel bei niedrigen Temp. (Metall u. Erz **23**. 113—15. Köln, Geolog. Inst. der Univ.) ENSZLIN.

Georg O. Wild und **R. Klemm**, *Mitteilung über spektroskopische Untersuchungen Mineralien*. VII. *Roter Spinell*. VIII. *Rubin* und IX. *Alexandrit*. (VI. vgl. S. 2318.) Bei *roten Spinellen* unbekannten Fundorts enthielten bei der Unters. neben den Linien Al, Mg u. Fe die Linien des Cr u. Vd. Bei einem Stück waren außerdem noch Linien Cu, Ni, Zn, Sn, Ti u. Mn zu erkennen. — Es wurden das Spektrum eines *Siamrubins* mit dem eines synthet. verglichen, wobei sich völlige Übereinstimmung derselben ergab. In dem synthet. sind die Cr-Linien etwas stärker. Vd fehlt. Ein hellroter Rubin aus Montana zeigt außer Cr keinerlei Verunreinigungen. Die Linien des letzteren sind nur durch die hellere Farbe intensiver u. in größerer Anzahl vorhanden. Zwei Stücke natürlichen *Alexandrits* unbekannter Herkunft, ein smaragdgrünes u. ein rotviolett gefärbtes, wurden untersucht. Beide sind stark eisenhaltig. Ersteres enthält vor allem Cr u. Zn, letzteres Mg u. Mn in ziemlicher Menge, sowie Ni, Co, Ti, Pb u. Vd. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. **1926**. 29—33. Idar a. d. Nahe, Inst. f. Edelstein-Forsch.) ENSZ.

Antonio Pauly, *Bolivianit und Silesit, zwei neue Mineralien der bolivianischen Zinnerzlagertstätten*. Die Zinnerzlagertstätten, welche an saure Eruptivgesteine gebunden sind, werden in verschiedene Typen eingeteilt. Der *Bolivianit* ist ein sulfidisches Mineral, gehört zur Klasse der Blenden. Er bildet schöne schwarze Drusen u. hat die Zus. $25\% \text{ Sn}$, $25\% \text{ Cu}$ u. $33\% \text{ S}$. Daneben ist oft noch bis $10\% \text{ Fe}$ vorhanden, auch ließ sich Ge nachweisen. Härte 4—5. D. 4,1. Die Krystalle zeigen Rhomboederflächen und trigonalen Strich bräunlichgelb. Das Mineral verwittert leicht zu Zinn- u. Kupfersulfat. 10% der bolivian. Zinnerze werden von *Silesit*, einem Zinnsilicat, mit $55\% \text{ Sn}$ gebildet. Seinen Namen hat dies Mineral von dem Präsidenten Boliviens SILES. D. 5. Härte ungefähr 6. Es bildet feinkörnige, hornartige, matt hellgelbe unregelmäßige Aggregate. Silesit kommt meist in der Zementationszone vor u. ist wahrscheinlich ein Gel. Beim Zerkleinern der Erze neigt er zur Schlamm- u. Tonbildung, wodurch bedeutende Aufbereitungsverluste ergeben. *Hohlzinn* liefert 60% der Zinn- u. Kupfererze Boliviens. Es verhält sich zum Kassiterit wie Chalcedon zu Quarz u. kommt in verschiedenen Gängen vor. D. 6,5. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. **1926**. 43—46. Prensa [Buenos Aires].) ENSZLIN.

Georg Kalb und **Maximiliane Bendig**, *Cuban oder Chalmersit? Chalmersit ist identisch mit Cuban*, wodurch der jüngere Name Chalmersit als überflüssig zu streichen ist. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. **1926**. 25. Berlin.) ENSZLIN.



C. W. Davis, *Die Zusammensetzung und das Alter von Uranmineralien von Katanga, Nord-Dakota und Utah*. Nach den üblichen verschiedenen Methoden wird das Alter von *Uraninit* von Katanga aus dem Verhältnis Pb:U zu 665 Millionen Jahren als

Maximum bestimmt. Th wurde in diesem Mineral nicht gefunden, was dafür spricht, daß Th nicht aus U entsteht. Wenn das Pb nicht anderen Ursprungs ist, so ist das Uraninit das älteste bis jetzt bekannte Uranmineral. Das Verhältnis Pb:U in *Asphaltit* von Utah spricht für eine Umbildung desselben durch h. Lsgg., wobei Pb u. He entfernt wurden, so daß das Verhältnis nur die seit dieser letzten Veränderung verfllossene Zeit angibt. (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [5] 11. 201—17.) ENSZL

S. Iimori, *Radioaktive, manganhaltige Knollen von Tanokami, Provinz Chugoku, Japan*. In einem Flußbett wurden dunkle Konglomerate gefunden, welche aus Quarz u. and. Mineralien, die durch Oxyde des Mn verkittet sind, bestehen. Der l. Anteil derselben zeigt eine schwache Radioaktivität. Es gelang nicht, irgendwelche radioaktiven Elemente nachzuweisen. (Sci. Papers Inst. Phys. Chem. Res. 4. 79—83. Bull. Chem. Japan 1. 43—47.) ENSZL

Georg Kalb und Emil Meyer, *Die Nickel- und Kobaltführung der Knochenerz-lagerstätte von Mechernich*. Ein kleiner Teil der aufbereiteten Erze, welcher reich an Kupferkies ist, hat einen hohen Gehalt an Ni u. Co. Es gelang nun, einige Kristalle, welche einen zonaren Aufbau mit pentagondodekaed. Form haben, zu isolieren. Das Mineral hat die Zus. $(\text{Ni, Fe, Co})\text{S}_2$ mit einer geringen Vertretung dieser Metalle durch Cu. Das nickelarme Erz ist *Kobaltnickelpyrit*, das nickelreiche wahrscheinlich *Braunerz*. Die Mineralien sind vermutlich Mischungsglieder der Mischkristallreihe FeS_2 — $(\text{Ni, Co})\text{S}_2$. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1926. 26—28. Köln, Univ.) ENSZL

Walther Fischer, *Die Helvinlagerstätte von Casa La Plata (Sierra de Córdoba, Argentinien)*. Der Helvingang im Paragneis ist ein umgewandelter Pegmatit. In ihm treten *Biotit*, *Chlorit*, *Muskovit*, *Feldspäte*, *Granat*, *Vesuvian*, *Flußspat* u. *Hämatit* auf. Letzterer ist dunkelbraun mit fettigem Glanz. Härte 6,5. D.¹⁴ 3,289. Lichtbrechung $< 1,740$. Die bis 1,5 cm großen Tetraeder haben die Zus. $\text{BeO } 12,20$, $\text{FeO } 30,79$, $\text{FeO } 14,75$, $\text{ZnO } 4,89$, $\text{MgO } 2,24$, $\text{SiO}_2 \text{ } 32,65$ u. S 6,01%. Vf. hat durch Lösungsverss. in verschiedenen Agentien versucht, die Bindung des S zu bestimmen. Er findet, daß derselbe wahrscheinlich sulfid. an Mn, Fe oder auch Zn gebunden ist.



Formel wird für *Helvin* I u. für *Danalith* II vorgeschlagen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1926. 33—42. Dresden.) ENSZL

S. Tomkeieff, *Kaolinhaltige Knollen aus den Kohlelagern von Newcastle*. In septor. Toneisensteine enthalten Knollen, welche mit Kaolin u. Calcit gefüllt sind. Besprechung ihrer Bildungsart. (Proc. Univ. Durham 7. 101—02. 1925.) ENSZL

Georg Frebold, *Über die röntgenographische Unterscheidung der Hydroxyde des Eisens in Erz-lagerstätten*. (Vgl. S. 1789.) Mit Hilfe der Debye-Scherrer-Methode wurde eine Reihe von oxyd. Eisenzen untersucht u. festgestellt, daß unter den *Oxide*, *Eisenglanz*, *Hydrohämatit* u. *roter Glaskopf* eine dem künstlichen Fe_2O_3 gleiche Struktur haben. Die Hydroxyde können in 2 Reihen mit verschiedener rhomb. Struktur geteilt werden. Gleiche Struktur haben *Goethit*, *Lepidokrokit*, *Xanthosiderit* u. *roter Glaskopf*, während der *Rubinglimmer* das einzige Glied der zweiten Reihe darstellt. (Metall u. Erz 23. 115—17. Hannover.) ENSZL

G. M. Schwartz und R. J. Leonard, *Die Verwitterung von Spodumene in der Etta Mine, Black Hills, S. D.* Es wird der Verlauf der Verwitterung eines Spodumens aus einem Pegmatit mikroskop. u. chem. verfolgt. Das frische Material hat die Härte 6,5 u. die Lichtbrechung $\alpha = 1,660$, $\beta = 1,667$ u. $\gamma = 1,672$. Diese nehmen mit zunehmender Verwitterung, welche in der Hauptsache auf einer Wegfuhr von SiO_2 u. Li_2O beruht, ab. Die erstere sinkt von 62,91% auf 47,20%, letzteres von 6,78% auf 0,28% —, ab u. erreichen die Werte 2,5 bezw. für die Lichtbrechung 1,541—1,563. Li_2O wird durch K_2O teilweise durch MgO ersetzt. Die Verwitterungslsgg. sind Tagewässer. (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [5] 11. 257—64. Minneapolis, Univ.) ENSZL

Clarence S. Ross, *Nephelit-Hauyn Alnoit von Winnett, Montana*. Beschreibung des Alnoits, welcher zu 5% aus unbestimmbarer Grundmasse, 35% Olivin, 16% Phloplit, 11% Hauyn, 17% Melilit, 4% Nephelin, 5% Augit, 6% Magnetit u. 1% Apatit steht. Es wird seine Entstehung besprochen. (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [5] **11**. 8—27. Washington, W. S. Geol. Survey.) ENSZLIN.

Ernst Nowack, *Die Kohlenvorkommen Albaniens*. (Montan. Rundsch. **18**. —84. Wien.) BEHRLE.

W. Obrutschew, *Lagerstätten von Erdöl und Asphalt in der Dsungarei (Nordwest-sina)*. (Neftjanoe Chozjajstwo **9**. 757—66. 1925.) BIKERMAN.

P. Balavoine, *Monographie der Quellen des Salève*. Es werden die chem. Daten n 62 sehr kalkreichen Quellen des großen u. kleinen Salève angegeben. Der Trocken-ckstand bei 180° beträgt zwischen 12 u. 585 mg pro Liter. (Arch. Sc. phys. et nat. nève [5] **8**. 23—32.) ENSZLIN.

Emanuele Quercigh, *Über Schwefelselen von Vulcano (äolische Inseln)*. Vf. schreibt zwei Arten von Schwefelselen, eine amorphe u. eine krystalline β -Modi-ation. Der Gehalt an Selen der ersten Art ist stark schwankend zwischen 83 u. 5 Gew.-% Selen. Sie ist braunrot, beginnt bei 100° weich zu werden u. geht all-ählich in fl. Zustand über; sie verbrennt leicht mit charakterist. Flamme unter uch nach Rettich u. SO₂ ohne Hinterlassung eines Rückstandes. Die β -Modi-ation besteht in der Hauptsache aus S (98—99%) etwa 1% Se u. Spuren von Te. endicono Accad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] **31**. 65—69. 1925.) GOTTFER.

D. Organische Chemie.

Josef Heuberger, *Notiz über die Eigenschaften von Natriumnitromethan*. Vf. ist dringend auf die Gefahren beim Arbeiten mit Natriumnitromethan hin u. führt t, daß zwar das mit A. gewaschene u. im Vakuumexsiccator getrocknete Salz gegen hlag mit dem Hammer unempfindlich ist, daß es aber bei Berührung mit feuchtem trierpapier unter Feuererscheinung heftig explodiert. Gemische von A. u. W. im hhältnis 1:3 wirken wie W. Wahrscheinlich tritt beim Befeuchten teilweise Lsg. Umwandlung der aci-Form ein, u. die dabei entwickelte Wärme reicht zum Ein- en der Explosion hin. Beim Lösen geringer Mengen des Na-Salzes (0,5 g in 50 cem oder verd. Säure) unter Umrühren u. Kühlen tritt entgegen den Angaben NEFS ne Zers. ein. Beim Arbeiten mit Na-Nitromethan ist daher Befeuchtung irgend- cher Art, selbst durch Nießen oder Husten in der Nähe des Salzes zu vermeiden. ensk Kem. Tidskr. **38**. 29—30. Upsala, Univ.) BÖTTGER.




Frederick Henry McDowall, *Die Herstellung von Äthylenbromhydrin*. Nach der hode von READ u. WILLIAMS u. READ u. HOOK (Journ. Chem. Soc. London **1**. 240 u. **117**. 1214; C. **1918**. I. 75 u. **1921**. I. 208) zur Herst. von Äthylenbrom- rin werden die Komponenten gasförmig in den Reaktionsraum eingeführt, wobei eil des Äthylens unverändert von der Luft mitgerissen wird. Vf. ändert aus em Grunde das Verf. in der Weise ab, daß das Br aus einem Tropftrichter unter Oberfläche der heftig gerührten wss. Lsg. langsam eingetropft wird, wodurch sich r-Brzufuhr besser regulieren läßt u. kein überschüssiges Äthylen verbraucht wird. urn. Chem. Soc. London **1926**. 499—500.) TAUBE.

R. R. Renshaw, N. Bacon und J. H. Roblyer, *Die Grundlage für die physiologische irksamkeit einiger Oniumverbindungen*. IV. *Die Schwefel-Analoga des Cholins*. I. vgl. RENSCHAW u. WARE, S. 1525.) Es wurden zwei geschwefelte Cholinderivv. gestellt. — *Oxyäthyl dimethylsulfoniumjodid*, C₄H₁₁OSJ = (CH₃)₂S(J)CH₂·CH₂OH, s Dimethylsulfid u. β -Jodäthylalkohol bei mehrtägigem Stehen im Dunkeln u. mtemp., bildete ein farbloses Öl, das im Vakuumexsiccator in Nadeln krystalli-

sierter, sehr hygroskop. u. zersetzlich war. — *Acetoxymethyl-dimethylsulfoniumbromid* $C_5H_{11}O_2SBr = (CH_3)_2S(Br)CH_2OOCCH_3$, aus Dimethylsulfid u. Brommethylacetylfluorid, F. 104° (korrr.), ll. in W. u. Methylalkohol, hatte eine intensive Muscatw. (vgl. HUNT u. RENSCHAW, Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 25. J. C. 1925. II. 1466), aber keine Nicotinw., während die entsprechende Ammoniumverb. diese letztere Eigenschaft deutlich zeigte. (Journ. Americ. Chem. Soc. 517—20. New York, Univ.)

WINKELMANN

Fritz Zetzsche und **E. Zurbrüggen**, Untersuchungen über organische Phosphorsäureverbindungen. II. Einige Ester des Nitro-*i*-butylglycerins. (I. vgl. ZETZSCHE NACHMANN, S. 1396.) Die Phosphorylierung des Nitro-*i*-butylglycerins (I) nach dem Verf. von FISCHER u. PFÄHLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1615; C. 1913. III. 826) führt zu zwei verschiedenen Verb., je nachdem man unter Ausschluß W. oder in Ggw. von wenig W. arbeitet. — Nitro-*i*-butylglycerin-[bi-cyclo-phosphat] $C_4H_6O_6NP$ (II.). Zu 0,1 Mol. I in 60 ccm trockenem Pyridin läßt man bei 0° 0,1 Mol. $POCl_3$ in 20 ccm Pyridin tropfen, läßt 1 Tag bei Zimmertemp. stehen, gießt in 500 ccm Eiswasser + 120 ccm 25%ig. H_2SO_4 . Prismen aus W., F. 210° wl. in k. W., A., Ä. 100 ccm sd. W. oder A. lösen 3 g. Sehr beständig gegen Säuren, dagegen schon von k. Soda verseift. Ausbeute 62%. — Nitro-*i*-butylglycerinphosphat saures Ba, $C_4H_6O_6NPBa$ (III.). Zunächst wie beim vorigen Vers., nur wird der l.



von I 1 ccm W. zugesetzt. Nach Eingießen in die verd. Säure mit 0,15 Mol. Ag_2O schütteln, Ag^+ mit H_2S , SO_4^{--} mit $Ba(OH)_2$ entfernen, über Tierkohle absaugen, Vakuum bei 40° eindampfen. Nach mehrfachem Umfällen aus W. (Tierkohle) weiß, krystallin. Wird von Alkalien sehr leicht verseift u. zers. Ausbeute 22%. Nitro-*i*-butylglycerin-[phenyl-cyclo-phosphat], $C_{10}H_{12}O_7NP$ (IV.). Zu 0,1 Mol. I in 20 ccm Chinolin gibt man 0,1 Mol. Phenylphosphorsäuredichlorid (vgl. AUTENRIEDER u. BÖLLI, S. 628) in 20 ccm Chlf., fügt nach 24 Stdn. noch Chlf. zu, wäscht mit 1% HCl , $NaHCO_3$ -Lsg. u. W., trocknet über Na_2SO_4 u. verdunstet. Nach 4-wöchig. Stehen im Vakuum über P_2O_5 u. Paraffin hellgelbes Öl, im Vakuum nicht unzersetzt, ll. außer in W. Wird von Alkalien verseift u. zers. — Nitro-*i*-butylglycerin-[anilido-cyclo-phosphat], $C_{10}H_{13}O_6N_2P$ (nach IV., NHC_6H_5 für OC_6H_5). Zu 0,01 Mol. I in 10 ccm Pyridin gibt man 0,01 Mol. Anilidophosphorsäuredichlorid (l. c.) in 10 ccm Chlf., setzt nach 2 Tagen W. zu, äthert aus u. schüttelt die äth. Lsg. mit verd. H_2SO_4 , wodurch die Verb. sich abscheidet. Rötliche Nadeln, F. $192-194^\circ$ (Zers.), ll. in Aceton, Essigester, wl. in Ä., Chlf. Ausbeute 35%. (Helv. chim. Acta 9. 297—300. Bern, Univ.)

LINDENBAUM

Marcel Guerbet, Über die unsymmetrischen Dialkylarsinsäuren, insbesondere Methyläthylarsinsäure. Die bisher unbekannte Methyläthylarsinsäure, $(CH_3)(C_2H_5)AsO_2H$, hat Vf. in Anlehnung an das Verf. von AUGER (C. r. d. l'Acad. des sciences 137. 915 [1903]) wie folgt dargestellt: 47 g Methylarsenoxyd, 29 g C_2H_5Cl u. 5 g KOH in 230 ccm A. von 76° werden in einer Bierflasche 12 Stdn. im sd. Wasserb. erhitzt. Nach dem Erkalten so lange CO_2 einleiten, bis Phenolphthaleinpapier nicht mehr gerötet wird, Salze absaugen, mit A. waschen, A. im Vakuum abdest., Rückstand mit Bzn. auskochen, in A. lösen, mit CO_2 zerlegen, Filtrat im Vakuum eindampfen, Rückstand aus Bzn., dann W. oder A. umkrystallisieren. Monokline Blättchen, F. $120-121^\circ$, stark u. unangenehm riechend, Kopfschmerz verursachend, an feuchter Luft zerfließend, ll. in W., A., l. in sd. Bzn., unl. in Ä. Einbas. Säure (Phenolphthalein-Stabil gegen HNO_3 , CrO_3 , $KMnO_4$, SO_2 , $FeSO_4$). Wird von phosphoriger Säure wahrscheinlich zu Methyläthylarsenoxyd, von unterphosphoriger Säure zu As_2O_3 reduziert.


u. Na-Salze, Nadeln, zerfließlich an feuchter Luft, ll. in W., A., werden von CO_2 alkoh. Lsg. zerlegt. — Mittels Propylchlorid wurde ebenso *Methylpropylarsinsäure* gestellt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 638—40.) LINDENBAUM.

James Denis Mounfield und **John Kerfoot Wood**, *Die Wirkung von Hitze auf Chloralhydrat*. Um die Temp. zu ermitteln, bei welcher *Chloralhydrat* zu dissoziieren innt, haben Vff. dilatometr. u. tensimetr. Unterss. angestellt. Chloralhydrat vertert sein Vol. bei 32° , auch wenn die Substanz einige Tage bei 20 oder 40° gehalten dann erwärmt bzw. abgekühlt wird. Die tensimetr. Messungen zeigen keinen ick in der Dampfdruckkurve in der Nähe von 32° , woraus erhellt, daß die Änderung dieser Temp. keine Änderung der Modifikation, sondern den Anfang der Dissoation darstellt. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 498—99. Manchester, Univ.) TAU.

Lespiau, *Über die Einwirkung von Acrolein auf die gemischte Dimagnesiumverbindung des Acetylens*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1606; C. **1925**. I. 947.) l. c. beschriebenen Verss. mit der *gemischten Di-Mg-Verb. des Acetylens* wurden *Acrolein* ausgedehnt u. gaben analoge Resultate. Das erste Prod. ist *Penteninol*, $\text{C} \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{CH} : \text{CH}_2$, schwach stechend riechende Fl., Kp. $128,5\text{—}129^\circ$, D.²⁵ $1,4525$, l. in W. Wird von anhaftendem Acrolein durch Dest. über H_2SO_4 befreit. Läßt sich mit 30% ig. Br-Lsg. in Chlf. gut titrieren; 2 Br werden rapide, folgenden 2 Br etwas langsamer aufgenommen. Die weitere Aufnahme erfolgt langsam, daß der Punkt nach Addition von 4 Br gut zu erkennen ist. Im ganzen den 6 Br addiert unter B. der Verb. $\text{C}_5\text{H}_6\text{OBr}_6$, Prismen aus A., F. $77\text{—}79^\circ$. — zweite Prod. ist die schon von DUPONT (Dissert., Paris [1912]) beschriebene b. $\text{CH}_2 : \text{CH} \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{C} : \text{C} \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{CH} : \text{CH}_2$. Dest. auch im Vakuum nicht z ohne Zers. Addiert 6 Br unter B. der Verb. $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2\text{Br}_6$, Krystalle aus Eg., $196\text{—}197,5^\circ$. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 637—38.) LINDENBAUM.

R. Dietzel und **R. Krug**, *Optische Untersuchungen über die Milchsäure und ihre hydride*. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 117—31. — C. **1925**. 1144.) LINDENBAUM.

R. Eder und **F. Kutter**, *Gleichgewicht von Milchsäure und Milchsäureanhydrid Handelsmilchsäure*. Nach den vorliegenden Literaturangaben ist der Gehalt der *ndelsmilchsäure* an *anhydrierter Säure* — unter dieser ist nur Lactylmilchsäure, $\text{C}_3\text{H}(\text{OH}) \cdot \text{CO} \cdot \text{O} \cdot \text{CH}(\text{CH}_3) \cdot \text{CO}_2\text{H}$, zu verstehen — von der Konz. u. dem Alter Säure abhängig. Vff. haben diese Verhältnisse an Mustern reiner Milchsäure Byk-Guldenwerke von 100, 90, 80 u. 50% Totalsäuregehalt eingehend untersucht. Diese 4 Säuren wurden erstmals 45 Tage nach der Darst., dann in Intervallen von je 60 Tagen untersucht u. hierdurch von neuem bestätigt, daß der Anhydridgehalt eine Funktion der Konz. ist u. sich beim Aufbewahren eventuell ändern n. — Zur Verfolgung des Säure-Anhydrid-Gleichgewichts beim Verdünnen mit W. wurden aus obigen 4 Säuren hergestellte Säuren von 80, 50 u. 20% Gehalt in bestimmten Zeitintervallen untersucht. Die Resultate sind im Original in Tabellen Kurven dargestellt. Es hat sich folgendes ergeben: 1. Das vor der Verdünnung bestehende Verhältnis von Säure zu Anhydrid verschiebt sich durch Verdünnung momentan. 2. Das Verhältnis verschiebt sich bei Zimmertemp. infolge Verung des Anhydrids allmählich zugunsten eines höheren Gehaltes an freier Säure. 3. Verschiebung verläuft zuerst relativ rasch u. verlangsamt sich dann immer mehr. Nach 20 Tagen ist der Anhydridgehalt um mindestens die Hälfte zurückgegangen. 4. Es gilt das Massenwirkungsgesetz nach der Gleichung:



Für jede Konz. gibt es einen bestimmten Gleichgewichtszustand, auf den sich Lsgg. mit gleichem Totalsäuregehalt, aber anfänglich verschiedenen Anhydridgehalten einstellen. Diese Gleichgewichtszustände liegen ungefähr wie folgt (sämtliche Zahlen als Milchsäure berechnet):

Gesamtsäuregehalt	Freie Säure: Anhydrid
ca. 80 %	ca. 62 : 18 %
„ 50 „	„ 46,5 : 3,5 „
„ 20 „	„ 19,6 : 0,4 „

4. Bei Zimmert
wird das Gleichgew
erst in ca. 100 Ta
bei 100° schon in
12 Stdn. erreicht.
Nach Erreichung

Gleichgewichts ändert auch eine höhere Temp. das Verhältnis nicht mehr, so
Verdampfen vermieden wird. (Helv. chim. Acta 9. 355—64. Zürich, Te
Hochsch.)

LINDENBAUM


Fritz Zetzsche und Max Hubacher, *Einige Umwandlungsprodukte des Diben-
d-weinsäureanhydrids*. *Dibenzoyl-d-weinsäureanhydrid*, $C_{18}H_{12}O_7$ (I). Durch
mäßliches Erhitzen von Weinsäure u. Benzoylchlorid auf 150°. Nach Waschen
Lg. Nadeln aus Xylol, F. 173°, $[\alpha]_D^{20} = +141,98^\circ$ (in Aceton, $p = 1,1190$, $d = 0,7$).
Geht an der Luft langsam in das folgende über. — *Dibenzoyl-d-weinsäurehydrat*,
 $C_{18}H_{14}O_8 \cdot H_2O$. Aus I mit sd. W. ($\frac{1}{2}$ Stde.). Nadeln aus Bzl., F. 88—90°, $[\alpha]_D^{20}$
—115,78° (in A., $p = 2,1075$, $d = 0,8144$), ll. in A., Xylol, wl. in Chlf. — *Dibenz-
d-weinsäure*, $C_{18}H_{14}O_8$. I wird in verd. NH_4OH gel. u. unter Kühlung mit HCl gef.
Aus Chlf. zunächst Gallerte, die beim Schütteln mit Lg. nach Wochen in ein
Nädelchen bestehendes Pulver übergeht. F. 138—140°, $[\alpha]_D^{20} = -118,51^\circ$ (in
 $p = 4,9011$, $d = 0,8170$). Bildet mit sd. W. wieder das Hydrat. — *Mg-Salz*, $C_{18}H_{12}O_8$.
Durch Kochen des Hydrats mit Mg in 80%ig. A. Warzen, Zers. von 220° ab, $[\alpha]_D^{20}$
—104,15° (in W., $p = 1,8680$, $d = 1,0033$). — *NH₄-Salz*, $C_{18}H_{20}O_8 \cdot N_2$. Durch
leiten von NH_3 in die Chlf.-Lsg. des Hydrats. Aus verd. A., Zers. von 190°
 $[\alpha]_D^{15} = -151,80^\circ$ (in W., $p = 0,8316$, $d = 0,9991$). — *Dimethylester*, $C_{20}H_{18}O_8$. Aus
dem Hydrat, der Säure oder dem Monomethylester (dieser aus I mit sd. CH_3
unl. in W., zers. sich bei der Vakuumdest.) mit $CH_3OH + HCl$ -Gas. Nadeln aus
 CH_3OH oder Lg., F. 132°, $[\alpha]_D^{18} = -93,70^\circ$ (in Bzl., $p = 4,2815$, $d = 0,8915$).
Mit Anilin liefert I je nach der Temp. verschiedene Verbb. — *Anilinsalz des Diben-
d-weinsäuremonoanilids*, $C_{30}H_{26}O_7 \cdot N_2$. Durch Eintragen von I in Anilin u. Erwär-
auf höchstens 80° (einige Min.), Nadeln mit Ä. waschen. Aus Chlf., F. 152°, $[\alpha]_D^{20}$
—78,24° (in A., $p = 1,4561$, $d = 0,8601$), ll. außer in W. Wird schon von k. Lau-
u. Carbonaten (wie I u. die Säure) unter Abspaltung von Benzoessäure verseift.
Dibenzoyl-d-weinsäurephenylimid, $C_{24}H_{17}O_6 \cdot N$. Durch Einleiten von HCl in die Cl-
Lsg. des vorigen, Filtrat einengen. Nadeln aus A., Aceton, Chlf. oder Acetessiges
F. 173°. Bei der Darst. aus I u. Diphenylharnstoff nach VALLÉE (Ann. Chim
Phys. [8] 15. 368 [1908]) entsteht als Nebenprod. Anilinomaleinanil (vgl. unt.
Trennung durch fraktionierte Krystallisation aus A. — Erhitzt man I mit An-
auf 160—170° u. hält einige Min. auf dieser Temp., so fallen beim Erkalten zu-
weiße Nädelchen aus, die schnell abfiltriert werden, dann gelbe Blättchen. Bei
Verbb. werden aus A. umkrystallisiert. Die weiße ist *Weinsäuredianilid*, $C_{16}H_{16}O_4$,
F. 268—270°; die gelbe ist *Anilinomaleinanil*, $C_{16}H_{12}O_2 \cdot N_2$, F. 235°. — Die drei letz-
Verbb. entstehen gleichzeitig, wenn obiges Anilinsalz 1 Stde. auf 153° erhitzt wird.
Bei der Red. des Anilinomaleinanils mit Zn-Staub in sd. Eg. oder Na in A. zu
Oxanilid erhalten. — Verss. zur Darst. des Dibenzoylweinsäuredichlorids waren
folglos. Mit 1 Mol. PCl_5 reagiert I kaum. Mit 3 Moll. PCl_5 (Rohr, 130°, 3—4 St-
entsteht ein Gemisch von *Benzoylchlorid* u. *Chlorfumarsäuredichlorid*, das zwar sel-
nicht getrennt werden konnte, aber nach Kochen mit A. bei der Dest. $\frac{2}{3}$ Benzoessä-
äthylester u. $\frac{1}{3}$ Chlorfumarsäurediäthylester lieferte. (Helv. chim. Acta 9. 291—
Bern, Univ.)

LINDENBAUM

L. Vanino und O. Guyot, *Über Salze der Anhydromethylencitronensäure*. N.
einer tabellar. Zusammenstellung der in Lsgg. von Citarin (vgl. S. 2393) mit v-
schiedenen Salzen erhältlichen Fällungen beschreiben Vff. die folgenden Salze: Li-S-


$C_7H_6O_7 \cdot 3 H_2O$, aus der durch HCl aus Citarin freigemachten Säure u. $LiCO_3$, prismat., ht hygroskop. Tafeln, l. in $\frac{1}{2}$ Teil W., wl. oder unl. in organ. Lösungsmm. Bei schen der wss. Lsg. Geruch nach CH_2O . — *Mg-Salz*, $MgC_7H_6O_7 \cdot 2 H_2O$, kristallert aus Lsg. von Citarin 1:1 nach Zusatz von k. gesätt. $MgSO_4$ -Lsg., wl. in W., in organ. Lösungsmm. — *Cu-Salz*, $CuC_7H_6O_7 \cdot 2 H_2O$, nach VANINO u. M. SCHEIBLE ch nicht veröffentlicht) durch Zusatz von konz. Citarinlsg. zu überschüssiger konz. SO_4 -Lsg., wl. in W., unl. in organ. Lösungsmm. — *Mn-Salz*, $MnC_7H_6O_7 \cdot 3 H_2O$, rst. wie bei Cu-Salz, Säulen, ll. in W., wl. in organ. Lösungsmm. — *Cr-Salz*, $(C_7H_6O_7)_3 \cdot 2 H_2O$, aus konz. Citarinlsg. u. k. gesätt. Lsg. von Chromalaun nach hrstdg. Stehen, blaugraue Nadeln, etwas l. in k., unl. in h. W., unl. in organ. Lösungsmm. — *Co-Salz*, $CoC_7H_6O_7 \cdot 3 H_2O$, Darst. wie beim vorigen mit $Co(NO_3)_2$, e Krystalle, ll. in W. — *Ni-Salz*, $NiC_7H_6O_7 \cdot 3 H_2O$, hellgrüne, zugespitzte breite eße, l. in W. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 113—17.) Sp.

P. Karrer, K. Escher und Rose Widmer, *Über die Konfiguration der d-Glutaminsäure, des d-Ornithins und d-Lysins*. Nachdem KARRER (Helv. chim. Acta **6**. 957; **1924**. I. 751) die Konfiguration der l-Asparaginsäure aufgeklärt hatte, haben Vff. gleiche für die natürliche d-Glutaminsäure angestrebt. Der zunächst eingeschlagene, n Serin ausgehende Weg ist durch folgendes Schema gekennzeichnet:



führte nicht zum Ziel, denn die letzte Phase ist von völliger Racemisierung be- tet, so daß nur inakt. Glutaminsäure erhalten wurde. — Darauf wurde mit mehr olg das Verf. von KARRER u. SCHLOSSER (Helv. chim. Acta **6**. 411; C. **1923**. 228) auf die Acetylverb. des natürlichen d-Glutamins übertragen u. dessen Abbau d- α,γ -Diaminobuttersäure erreicht:

$CONH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH(NH_2) \cdot CO_2H \rightarrow CH_2(NH_2) \cdot CH_2 \cdot CH(NH_2) \cdot CO_2H$. u bildet mit der d-Diaminopropionsäure (aus l-Asparagin, l. c.), dem natürlichen rnthin u. natürlichen d-Lysin eine homologe Reihe:



galt nun, die drei höheren Glieder mit dem ersten konfigurativ zu verbinden. ahrungsgemäß drehen die einer homologen Reihe opt.-akt. Verb. angehörnden eder in gleichem Sinne, obwohl die Drehung nicht stetig zu- oder abnimmt, sondern beliebig Stelle ein Maximum erreicht. Da nun salzbildende Gruppen Kom- tationen hervorrufen können, so wurden die NH_2 -Gruppen benzoiliert u. die H -Gruppen verestert. So ergab sich folgendes: 1. Die vier Säuren drehen als drochloride rechts. 2. Ihre N-Dibenzoylmethyl- u. -äthylester drehen (erstere in OH_3 , letztere in A.) sämtlich links, letztere etwas schwächer als erstere; unter n weichen die Drehungen der Methylster einerseits, Äthylester andererseits wenig einander ab. Daraus folgt, daß die vier Säuren dieselbe Konfiguration haben. lutaminsäure, d-Ornithin u. d-Lysin schließen sich damit konfigurativ an die l bezeichnete Reihe der natürlichen Aminosäuren an. Dasselbe gilt wahrscheinlich für das natürliche l-Prolin, da es aus d-Ornithin dargestellt werden konnte chst. Ref.). — Die in der Reihe der natürlichen Aminosäuren bisher gewonnenen ultate werden übersichtlich zusammengestellt (vgl. Original). Nebenbei wird geschlagen, die Zugehörigkeit opt.-akt. Verb. zu einer bestimmten ster. Reihe λ u. ρ , dagegen mit d u. l nur die Drehungsrichtung zu bezeichnen (z. B. natür- es Alanin = λ -d-Alanin). Es ist bisher gelungen, von den Bausteinen des Eiweiß e außer Valin, i-Leucin, Tryptophan u. Oxyprolin konfigurativ unter sich u. mit facheren Alkaloiden zu verbinden, so daß man drei Gruppen mit Angehörigen icher Konfiguration unterscheiden kann: 1. d-Alanin, l-Serin, l-Cystin, l-Asparagin-

säure, 1-Asparagin, 1-Histidin, 1-Leucin, d-Glutaminsäure, d-Glutamin, d-Ornithin, d-Lysin. 2. 1-Phenylalanin, 1-Tyrosin, 1-Dioxyphenylalanin. 3. 1-Prolin, 1-Hydroxyprolin, 1-Stachydrin, 1-Nicotin. Daß die drei Gruppen ster. übereinstimmen, ist wahrscheinlich (vgl. den oben erwähnten Übergang d-Ornithin $\rightarrow$ 1-Prolin), ebenso obige vier konfigurat. noch unaufgeklärten Säuren sich einfügen werden.

Die von CLOUGH (Journ. Chem. Soc. London **113**, 526; C. **1919**, I, 713) aufgestellte Regel, daß die Drehungen der natürlichen Aminosäuren durch Salze, Änderung Lösungsm., Acetylierung gleichsinnig beeinflusst werden, hat Ausnahmen, wie übri. aus der Arbeit von CLOUGH schon hervorgeht. In vorliegender Arbeit werden Drehungen des *d*-Alanins, *l*-Leucins u. *l*-Tyrosins, ihrer N-Acetylderiv. u. deren Met. ester verglichen u. gefunden, daß diese Umwandlungen beim Alanin u. Leucin Drehungsabnahme, beim Tyrosin mit Drehungszunahme verbunden sind. — Nebenw. wird mitgeteilt, daß das von KARRER, JÄGGI u. TAKAHASHI (Helv. chim. Acta **8**, I, C. **1925**, II, 1269) beschriebene *l*-2,5-Dimethyl-4-benzoylamino-5-oxylhexen-(1) bei Oxydation mit Ozon außer HCHO u. HCO₂H auch Aceton ergab. Es liegt also wahrscheinlich ein Gemisch von Δ^1 - u. Δ^2 -Verb. vor.

Versuche. *d*-Acetylglutamin, C₇H₁₂O₄N₂. Man löst d-Glutamin in n. Nat. schüttelt mit Acetylchlorid (in Ä. gel.) u. n. NaOH (portionsweise), dampft die schw. angesäuerte wss. Lsg. im Vakuum bei 40° ein u. kocht mit A. aus. Nadeln aus F. 199°, ll. in W., 90%ig. A., weniger in absol. A., fast unl. in Ä., Essigester. $[\alpha]_D^{25}$ = -12,5° (in W.). — *d*- α , γ -Diaminobuttersäure. Aus dem vorigen mit 5 Moll. Ba(OH)₂ 2 Moll. Br (80°, 1 Stde.). Nach Entfernung von Ba⁺ mit CO₂ u. H₂SO₄, Br mit Ag⁺, Ag⁺ mit H₂S im Vakuum bei 40° stark einengen, mit konz. HCl kochen, im Vakuum verdampfen, mit absol. A. Schmierf. beseitigen, in W. mit Ag₂O behandeln, Ag⁺ entfernen, einengen, Oxalsäure zufügen. Oxalat, C₁₀H₂₂O₈N₄, Tafeln aus W., Zers. bei 210°. $[\alpha]_D^{18}$ = +7,8° (in W.). Dem Racemat ähnlich (vgl. FISCHER, Ber. Dtsch. Ch. Ges. **34**, 2900 [1901]). Für das Hydrochlorid berechnet sich $[\alpha]_D$ = +8,2°, best. durch Umwandlung des Oxalats mit CaCl₂. Die HCl-Lsg. gibt mit Phosphorwolframsäure weißen Nd. — *d*-Dibenzoyl- α , γ -diaminobuttersäure, C₁₈H₁₈O₄N₂. Durch Benzoylierung des Oxalats (Rk. stets alkal.), mit HCl fällen, Benzoesäure mit sd. Lg. entfernen, Nadelchen aus A. + W., dann A., F. 149°, ll. in h. A., swl. in W., unl. in Lg. $[\alpha]_D^{11}$ = -18,15° (in NaOH), $[\alpha]_D^{15}$ = -16,36° (in CH₃OH). — *Methylester*, C₁₉H₂₀O₄N₂. CH₃OH mit äth. CH₂N₂-Lsg. Nadelbüschel. $[\alpha]_D^{17}$ = -22,74°, $[\alpha]_{C,E,F}$ = -19, —30,83°, -34,41°. — *Äthylester*, C₂₀H₂₂O₄N₂. Mit Diazoäthan. Nadeln aus A., F. bis 134°, ll. in A., Essigester, fast unl. in W., Ä. $[\alpha]_D^{18}$ = -11,74°, $[\alpha]_{C,E,F}$ = -10, —13,05°, -13,92°. — *d*-Dibenzoyl- α , β -diaminopropionsäure. Durch Benzoylierung des Diaminopropionsäurehydrochlorids (KARRER u. SCHLOSSER) wie oben. Nadelchen aus A. + W., dann A., F. 156—157°. $[\alpha]_D^{18}$ = -28,06° (in NaOH), $[\alpha]_D^{15}$ = -28, (in CH₃OH). — *Methylester*, C₁₈H₁₈O₄N₂, Nadeln, F. 153—154°, ll. in A., Essigester fast unl. in W., Ä. $[\alpha]_D^{16}$ = -21,58°, $[\alpha]_{C,E,F}$ = -17,62°, -25,55°, -28,63°. — *Äthylester*, C₁₉H₂₀O₄N₂, Nadeln, F. 151°, ll. in A., Essigester, unl. in Ä. $[\alpha]_D^{18}$ = -13, $[\alpha]_{C,E,F}$ = -11,51°, -15,5°, -16,83°. — *d*-Ornithinsäure. $[\alpha]_D^{18}$ = +10,1° (in NaOH), $[\alpha]_D^{15}$ = -1,6° (in CH₃OH). — *Methylester*, C₂₀H₂₂O₄N₂, Nadelchen, F. bis 146°. $[\alpha]_D^{17}$ = -13,24°, $[\alpha]_{C,E,F}$ = -11,48°, -15,45°, -16,34°. — *Äthylester*, C₂₁H₂₄O₄N₂, Nadeln, F. 155°. $[\alpha]_D^{19}$ = -8,64°, $[\alpha]_{C,E}$ = -7,74°, -10,02°. — *d*-Lysin. $[\alpha]_D^{20}$ = +3,07° (in NaOH), $[\alpha]_D^{15}$ = -8,59° (in CH₃OH). — *Methylester*, C₂₁H₂₄O₄N₂, aus A., F. 114°. $[\alpha]_D^{17}$ = -18,62°, $[\alpha]_{C,E,F}$ = -15,15°, -22,52°, -26, — *Äthylester*, C₂₂H₂₆O₄N₂, F. 101°, sl. in A., Essigester, unl. in W., Ä. $[\alpha]_D^{19}$ = -16, $[\alpha]_{C,E,F}$ = -13,81°, -19,49°, -22,74°. — *d*-Acetylglutaminsäure, C₇H₁₁O₅N. d-Glutaminsäure in verd. NaOH mit Acetanhydrid, mit H₂SO₄ fällen, im Vakuum verdampfen. Aus A., F. gegen 195°. — *d*- α -Benzoylamino- β -chlorpropionsäuremethylester, C₁₁H₁₂O₃NCl. Aus d- α -Amino- β -chlorpropionsäuremethylesterhydrochlorid

SCHER u. RASKE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **40**. 3723 [1907]) in NaHCO_3 -Lsg. mit Zinkchlorid (Rk. stets alkal.). Nadeln aus Lg., F. 114° , ll. in A., sd. Lg., wl. in Ä. $[\alpha]_D^{18} = +16,2^\circ$ (in A.). — *Glutaminsäurehydrochlorid*, $\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_4\text{N}\cdot\text{HCl}$. Das vorige mit Malonester in A. 2 Stdn. kochen, Filtrat im Vakuum eindampfen, mit 25%ig. HCl dn. kochen, Benzoesäure entfernen, auf einige cem einengen, mit HCl sättigen. 95%, opt.-inakt. Ebenso fällt der Vers. in Bzl. aus.

(Mit **W. Jäggi**.) *N-Benzoylasparagin* wurde analog dem Acetylaspargin (KARRER u. SCHLOSSER) dem Hofmannschen Abbau unterworfen u. lieferte die dort beschriebene *oxalidon-(2)-carbonsäure-(5)*, $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_2$, aus W., F. 185° (Zers.). — (Mit **W. Klarer**.) *Diaminopropionsäuremethylesterhydrochlorid*, $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2\cdot 2\text{HCl}$. Durch Einleiten von HCl in die methylalkoh. Lsg. der d-Diaminopropionsäure. Krystalle, Zers. bei 83° nach Erweichen bei 170° . $[\alpha]_D^{15} = +18,51^\circ$ (in W.). — *Dipeptid aus d-Diaminopropionsäuremethylester*. Der vorige freie Ester wird bei Zimmertemp. 5 Tage stehen lassen, zähe M. mit absol. A. verrieben, amorphes Pulver über P_2O_5 getrocknet. $[\alpha]_D^{20} = \text{ca.} +20^\circ$ (in W.). *Pikrat*, $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}_4\cdot 2\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_7\text{N}_3$, aus 50%ig. A., F. $200\text{--}210^\circ$ (schäumen) nach Dunkelfärbung bei $170\text{--}180^\circ$. — (Mit **Herbert C. Storm**.) *Acetylanilin*, $\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_3\text{N}$. Aus d-Alanin in NaOH mit Acetanhydrid, ansäuern, mit Essigester ausziehen. Krystalle aus Essigester + Bzl., F. 116° nach Sintern, l. in W., wl. in Ä. $[\alpha]_D^{16} = -45,59^\circ$ (in W.). — *Methylester*, $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}$. Mit CH_2N_2 . Nach Vakuumdest. gelbe Fl. $[\alpha]_D^{16} = -64,30^\circ$ (in W.). — *l-Acetylleucin*, $\text{C}_8\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}$. St. analog. Krystalle aus W., F. gegen 167° nach Sintern bei 155° , nach Wiedererhitzen F. 155° , l. in A., fast unl. in Ä. $[\alpha]_D^{16} = -12,09^\circ$ (in A.). — *Methylester*, $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}$, Krystalle aus Bzl.-Lg., F. $74\text{--}75^\circ$ nach Sintern, wl. in W., A. $[\alpha]_D^{16} = +7,22^\circ$ (in W.). (Helv. chim. Acta **9**. 301—23.) LINDENBAUM.



P. Karrer und **Maximilian Ehrenstein**, Zur Kenntnis einiger natürlicher Aminoester. Nach FISCHER u. WEIGERT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **35**. 3776 [1902]) wird die Lysursäure (Dibenzoyllysin) durch HCl zu einer Monobenzoylverb. verseift, von Phosphorwolframsäure nicht gefällt wird. v. BRAUN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **34**. 844 [1909]) glaubt, daß in dieser Verb. das α -Benzoyllysin vorliegt, denn er hat inakt. ϵ -Benzoyllysin auf eindeutigem Wege synthetisiert, u. dieses wird von Phosphorwolframsäure gefällt. Auf opt.-akt. Material übertragen, sollte man so vom akt. Benzoyllysin durch successiven Austausch des NH_2 gegen Br u. H zum akt. Norleucin kommen können. Vff. erhielten jedoch ein akt. Bromid, das sich beim Erhitzen über P_2O_5 leicht racemisierte u. nun mit der α -Brom- ϵ -benzoylaminocapronsäure (II.) von BRAUN (l. c.) ident. war. Ferner lieferte es bei der Red. inakt. ϵ -Benzoylamino- δ -oxyvaleriansäure (III.), ident. mit der von v. BRAUN beschriebenen Verb. Das Verseifungsl. der Lysursäure ist folglich d- ϵ -Benzoyllysin (I.), wird übrigens auch von Phosphorwolframsäure gefällt. Auch bei der alkal. Verseifung der Lysursäure mit 0,25-n. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ (Wasserbad, 3 Tage) bildet sich I., während SÖRENSEN (Ztschr. f. physiol. Ch. **76**. [1911]) unter diesen Bedingungen aus der Ornithursäure das α -Benzoylornithin erhalten hat. — I. liefert mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{NCO}$ glatt IV. u. dieses das akt. Hydrantoin V. (rac. b. vgl. v. BRAUN). Es gelang nicht, letztere Verb. in akt. Norleucin überzuführen, n. beim Kochen mit starker Säure racemisiert sie sich ohne Abspaltung des Benzoyls. SÖRENSEN (C. r. du Lab. Carlsberg **6**. 137 [1905]) hat inakt. α -Benzoylornithin u. die α -Benzoylamino- δ -oxyvaleriansäure in d,l-Prolin übergeführt. Bei der Überführung auf akt. Material erhielten Vff. (ohne Isolierung der reinen Oxsäure) neben d,l-Prolin wenig einer akt. Substanz, die zwar nicht rein isoliert, aber hinreichend l-Prolin charakterisiert werden konnte.

Versuche. d-Lysursäure. Durch Benzoylierung von d-Lysindihydrochlorid nach FISCHER u. WEIGERT (l. c.). Krystalle aus verd. A., F. $149\text{--}150^\circ$. Drehung vorst. Ref. — d- ϵ -Benzoyllysin, $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_3\text{N}_2$ (I.). Darst. entsprechend der inakt. l-Form (l. c.). Krystalle aus W., F. 235° . $[\alpha]_D^{19} = +20,12^\circ$ (in n. HCl). — Opt.-akt.

α -Brom- ε -benzoylaminocapronsäure, $C_{13}H_{16}O_3NBr$ (II.). Man löst I. in 20%ig. H₂O gibt Br zu u. leitet unter Eiskühlung NO ein, entfärbt schließlich mit SO₂. Na₂SO₄ aus verd. A., F. 128,5—129°. $[\alpha]_D^{18,5} = -29,15^\circ$ (in A.). Wird wenige Grade über dem F. wieder fest u. schm. dann bei 164—165°. Die alkoh. Lsg. ist jetzt inakt. Es ist die *d,l*-Verb. vor, Krystalle aus A. vom gleichen F. — ε -Benzoylaminocapronsäure (I.)

I.


II.



Aus II. in verd. A. mit Na-Amalgam u. verd. H₂SO₄ (Eiskühlung). F. 76—79°. *Phenyl-i-cyanat des d- ε -Benzoyllysins*, $C_{20}H_{23}O_4N_3$ (IV.). Aus I. in n. NaOH mit C₆H₅NCO (Eiskühlung), mit HCl fallen. Aus Essigester gallertig, F. 128—130° (Zers.). *Hydantoin des d- ε -Benzoyllysins*, $C_{20}H_{21}O_3N_3$ (V.). Aus IV. mit sd. 12%ig. HCl (2 Std.) Nadelchen aus wss. A., F. 145°. $[\alpha]_D^{16} = -45,84^\circ$ (in A.). Geht mit sd. HCl (bis 20%ig.) in die *d,l*-Verb. über, Nadelchen aus wss. A., F. 156,5—157°. — *d- α -Benzornithin*, $C_{12}H_{16}O_3N_2$. Arginin wird in Ornithin, dieses in Ornithursäure (aus A., F. bis 186°, Drehung vgl. vorst. Ref.) übergeführt u. letztere nach SÖRENSEN (l. c.) saftig. Aus W., F. 224—226°. $[\alpha]_D^{20} = +8,03^\circ$ (in W.). — *Prolin*. Ersatz des M in im vorigen durch OH nach SÖRENSEN. Die α -Benzoylamino- δ -oxyvaleriansäure (zäher, glasig erstarrender, linksdrehender Sirup) wurde mit HJ (D. 1,96) 3 Std. 120—140° erhitzt. Nach Entfernung von Benzoesäure, J, HJ wurde neutralisiert eingengt u. mit CuCO₃ gekocht. Trennung der Cu-Salze mit sd. A. Der ungel. Niederschlag lieferte in W. mit H₂S eine inakt. Lsg. Aus der alkoh. Lsg. schied sich beim Eindampfen *d,l*-Prolinkupfer, $C_{10}H_{16}O_4N_2Cu$, ab, blaue Blättchen u. Säulenbüschel. Schließl. hinterblieb wenig eines blauen, sehr hygroskop. Salzes. Daraus in W. mit H₂S lösliche drehende Lsg., mit H₂SO₄ u. Phosphorwolframsäure Nd. Das nach Eindampfen haltene Prod. war sehr hygroskop., in A. l., durch Ä. fällbar, gab Fichtenspankräutelfällung mit Pikrinsäure. (Helv. chim. Acta 9. 323—31. Zürich, Univ.) LINDENBAUM

M. Bridel und C. Béguin, *Über die Einwirkung von Mandelemulsin auf l-Arabinose in äthylalkoholischen Lösungen von verschiedenem Gehalt*. Lsgg. von l-Arabinose in 20, 30 usw. bis 95%ig. A. wurden mit *Emulsin* versetzt u. auf 33° erwärmt. Drehung, Reduktionsvermögen nehmen sehr langsam, aber stetig ab. Die Rk. war auch nach 280 Tagen (Emulsin mehrmals erneuert) nicht beendet. Mit der Stärke des A. (ausgenommen 60%ig. A.) nimmt die Wrkg. zu; nach der angegebenen Zeit waren in 40%ig. A. in 95%ig. A. 68,3% l-Arabinose umgewandelt. Da l-Arabinose, obwohl rechtsdrehend, von der l-Glykose abgeleitet wird u. in der l-Reihe die schwächer drehenden Glykose mit α bezeichnet werden, so beruht obige Rk. auf der B. von α -Äthyl-l-arabinose (vgl. dazu HUDSON, Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 265; C. 1925. I. 2547). (C. r. l'Acad. des sciences 182. 659—61.) LINDENBAUM

P. A. Levene und H. A. Sobotka, *Über die α - und β -Formen der Zucker und Zuckerderivate*. Da Vff. der Hudsonschen Regel zur Best. der α - u. β -Formen kein unbedingtes Vertrauen schenken, suchen sie nach einer anderen Methode, die ih-








weniger willkürlich erscheint. Sie führen zu diesem Zweck, die α - β -Isomerie auf die cis-trans Isomerie zurück, wobei sie die Ringebene als Bezugsebene wählen. Beispiel



se teilen sie der α -D-Glucose die Formel I, der β -Form II zu. Diese Isomerie wäre einigen von Malein- u. Fumarsäure vergleichbar u. müßte daher in gewissen Regelmäßigkeiten der physikal. Eigenschaften zum Ausdruck gelangen. Mit der experimentellen Prüfung dieser Theorie sind sie noch beschäftigt. (Science 63. 73—74. OKEFFELLER Inst.)

OHLE.

William Charlton, Walter Norman Haworth und Stanley Peat, Eine Prüfung der Strukturformel für Glucose. Vff. untersuchen die Beziehungen, die zwischen der Struktur eines Zuckers u. der seines Lactons bestehen. Vollständig methylierte Lactone, die durch Methylierung u. darauffolgende Oxydation mit Br-Wasser aus stabilen Zuckern entstanden sind, zeigen eine außerordentlich schnelle Ab- oder Zunahme ihres spezif. Drehungsvermögens in W. oder wss. A. Diejenigen Lactone, die sich von den labilen oder γ -Zuckern ableiten, ändern ihre spezif. Drehung sehr langsam. — Wie aus der graph. Darst. der Drehungen der Lactone der Tetramethyl- u. Trimethylzucker ersichtlich ist, gehören die Lactone, die sich von der stabilen Glucose, Galaktose, Mannose, Arabinose u. Xylose ableiten, einerseits u. die Lactone der entsprechenden γ -Zucker andererseits zu ein u. demselben Typus. Da die amylenoxyd. Struktur der stabilen Arabinose, Xylose, Galaktose u. die butylenoxyd. der entsprechenden γ -Zucker feststeht, so folgt auch für die zu den stabilen Zuckern gehörigen Lactone die amylenoxyd., für die zu den γ -Zuckern gehörigen Lactone die butylenoxyd. Struktur. Aus Analogiegründen folgern Vff. daher für das Lacton der normalen Tetramethylglucose die amylenoxyd. Struktur. Dieselbe Struktur kommt dann auch der Tetramethylglucose (II) u. der Glucose (III) selbst zu. Aus



Lactose u. Cellobiose



Rohrzucker

selben Gründen folgt für Tetramethyl- γ -glucose die Struktur IV. — Eine Stütze bildet diese Annahme in der Tatsache, daß das bei der Oxydation der 2,3,6-Trimethylglucose entstehende γ -Lacton nach vollständiger Methylierung mit dem Lacton, das

sic
mutata
p. 3477

sich von der normalen Tetramethylglucose ableitet, nicht ident. ist, wohl aber dem, das aus der γ -Form der Tetramethylglucose entsteht. — Fructose kommt der Natur als γ -Form im Rohrzucker, in der Raffinose u. im Inulin vor. Die Oxydation der Tetramethyl- γ -fructose aus Rohrzucker ergab, daß dieser Zucker die amylenoxyd. Struktur besitzt. (Vgl. HAWORTH u. MITCHELL, Journ. Chem. Soc. London 1923. 301; C. 1923. III. 1002.) IRVINE u. PATTERSON (vgl. Journ. Chem. Soc. London 1921. 2696; C. 1923. III. 1066) geben für die normale Tetramethylfructose, die von keinem natürlich vorkommenden Kohlenhydrat ableitet, die butylenoxyd. Form an. Daraus scheint hervorzugehen, daß in der Natur sowohl Aldosen als auch Ketose als δ -Oxyde auftreten. Berücksichtigt man die neuen Ergebnisse für die Struktur der Zucker, so kommt man zu 3 Formulierungen, V, VI, VII, für die wichtigsten Disaccharide.


Versuche. *Tetramethyl- δ -gluconsäurelacton*. $Kp_{0,05}$ 100°. $n_D = 1,4532$. In wss. Lsg. war nach 24 Stdn. zu 90% in die freie Säure übergegangen. *Phenylhydrazinderiv.*, $C_{16}H_{26}O_6N_2$, aus Ä. + PAc. F. 109–112°. — *Tetramethyl- γ -gluconsäurelacton* aus 2,3,6-Trimethylglucose. $Kp_{0,02}$ 92–96°. $[\alpha]_D = +48^\circ$ (CH_3OH ; $c = 2,0$). Nach der Verdünnung des A. mit W. (44%) nach 3 Stdn. $+48,9^\circ$. Nach 2 Tagen geringe Änderung dieses Wertes. Eine Titration ergab, 30% des Lactons als freie Säure vorlag. Das *Phenylhydrazid*, $C_{16}H_{26}O_6N_2$, aus F. 130–133°. Dasselbe γ -Lacton wurde auch aus Tetramethyl- γ -glucose hergestellt $[\alpha]_D = +48^\circ \rightarrow +39,6^\circ$ in 20 Tagen. — *Tetramethyl- δ -galaktonsäurelacton*. $c = 0,95$ in W.: $[\alpha]_D = +161,1^\circ \rightarrow +27,2^\circ$ in 22 Stdn. — *Trimethyl- γ -arabinsäurelacton*. In W. $[\alpha]_D = -42,0^\circ \rightarrow -25,1^\circ$ in 20 Tagen. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 89–101. Durham, Univ.)

BERENSON

Edmund Langley Hirst, Die Struktur der normalen Monosaccharide. IV. Glucose (III. vgl. S. 2790.) Zur Konstitutionsermittlung oxydiert Vf. Tetramethylglucose mit HNO_3 (D. 1,420). Sowohl eine 2,3,4,6-(I) als auch eine 2,3,5,6-Tetramethylglucose (II) müßte dabei primär *Tetramethylgluconsäure* u. daraus I *d*-Dimethoxybernsteinsäure (III) oder inaktive *Xylotrimethoxyglutarsäure* (IV) ergeben, je nachdem ob Sprengung der C-Kette zwischen dem 4. u. 5. oder 5. u. 6. C-Atom stattfindet. Auch müßte unter denselben Bedingungen *Dimethoxybernsteinsäure*, dagegen als zweite Spaltstück *Methoxymalonsäure* (V) ergeben. — Die Oxydation verläuft einheitlich ohne erhebliche B. von Nebenprodd., während diese bei der Oxydation mit H_2O_2 (D. 1,2) gebildet werden. Es resultiert in guter Ausbeute ein Gemisch von *d*-Dimethoxybernsteinsäure u. *Xylotrimethoxyglutarsäure*. Die Trennung der beiden Säuren gelingt über die Diamide. Da keine Methylwanderung während der Oxydation eingetreten ist, so folgt aus den Oxydationsergebnissen, daß 2,3,4,6-Tetramethylglucose vorliegt, u. ihr dementsprechend die amylenoxyd. Struktur zukommt. — Während die 2,3,6-Trimethylglucose bei der Oxydation mit HNO_3 (D. 1,2) bei 60° Dimethoxyglucuronsäure ergibt (vgl. IRVINE u. HIRST, Journ. Chem. Soc. London 1921. 12; C. 1922. III. 1331), resultiert aus der Tetramethylglucose unter denselben Bedingungen *Tetramethylgluconsäure* u. wenig *Dimethoxybernsteinsäure*. Läßt man HNO_3 (D. 1,42) längere Zeit bei erhöhter Temp. auf Tetramethylglucose einwirken, so entsteht Oxalsäure, wenig oder gar keine *Trimethoxyglutarsäure* u. als Hauptprod. *Dimethoxybernsteinsäure*. Die Oxydation mit $KMnO_4$ in alkal. Lsg. ergibt Oxalsäure u. *methoxybernsteinsäure*.

Versuche. *Dimethoxybernsteinsäure* u. *Trimethoxyglutarsäure* werden mit HNO_3 (D. 1,42) bei 100° nicht angegriffen. — 5 g reiner Tetramethylglucose werden in 40 ccm HNO_3 (D. 1,42) bei Zimmertemp. gel. Die Oxydation setzte nach 5 Min. ein. Die Temp. wurde allmählich gesteigert u. betrug nach $\frac{1}{2}$ Stde. 90°. Das Reaktionsgemisch wurde 2 Stdn. bei dieser Temp. aufbewahrt. Das Oxydationsprod. enthielt keine Oxalsäure. Es wurde mit CH_3OH verestert u. durch fraktionierte Dest.

0 d-Dimethoxybernsteinsäuremethylester u. 40% Xylotrimethoxyglutarsäure-
hylester getrennt. Für das Gemisch betrug $[\alpha]_D = +31,5^\circ$ (CH_3OH ; $c = 2,085$).
10 135—140°. $n_D^{16} = 1,4375$. — *Dimethoxybernsteinsäureamid*, $[\alpha]_D = +95^\circ$
; $c = 0,80$). Beim Erhitzen im Vakuum sublimiert es in langen Nadeln. Besitzt
nen scharfen F. Beim schnellen Erhitzen Dunkeln bei 245° , teilweises Schmelzen bei



0 (Zers.), vollständige Zers. bei 276° . Aus der Mutterlauge krystallisiert beim
nen *Xylotrimethoxyglutaramid*. Opt.-inakt., F. 194—195°. — 5,5 g Tetramethyl-
ose in 85 cem HNO_3 (D. 1,2) wurden 12 Std. auf 75° erhitzt. Dabei entstanden
lsäure u. d-Dimethoxybernsteinsäure. — 7 g Tetramethylglucose in 50 cem HNO_3
1,2) wurden bis zum Oxydationsbeginn auf 85° erhitzt, dann auf 60° abgekühlt
4 $\frac{1}{2}$ Std. stehen gelassen. Dabei entstehen 80% *Tetramethylglucosäurelacton*
0% *Dimethoxybernsteinsäure*. — Eine wss. Lsg. von 5 g Tetramethylglucose wurde
KOH gerade alkal. gemacht u. dazu bei 75° eine Lsg. von 25 g KMnO_4 langsam
geben. Es resultiert *Oxalsäure* u. *Dimethoxybernsteinsäure*. (Journ. Chem. Soc.
don 1926. 350—57. Univ., St. Andrews.) BEREND.

H. Pringsheim, *Über eine stabile γ -Glucose*. Vf. teilt mit, daß er bei der Behand-
lung von Lävuglucosan mit k. konz. HCl eine in wss. Lsg.
stabile γ -Glucose von $[\alpha]_D = 85^\circ$ erhalten hat, die unver-
gärbar ist u. von h. verd. HCl in die n. Glucose verwandelt
wird. Sie liefert ein Pentacetat, verschieden von α - u.
 β -Pentacetylglucose u. bei der Methylierung eine Trimethyl-
 γ -glucose, die mit sd. verd. HCl in die bekannte 2,3,5-Tri-
methylglucose übergeht. Vf. erteilt daher seiner γ -Glu-
cose die Konst. I. (Naturwissenschaften 14. 198.) OHLE.

P. Petit und Richard, *Über die mechanische Verflüssigung des Stärkekleisters*.
(PETIT, S. 56.) Man erhält in W. l. Stärke auch durch energ. mechan. Behandlung
Stärkekleisters, z. B. wenn man ihn sechsmal unter einem Druck von 1 kg Luft,
oder H verdampft. Die Stärkelsg. ist durch Papier filtrierbar u. zeigt die Mole-
rotation 210° . Die Viscosität ist im Verhältnis 25:1 vermindert. Ist die so er-
ene Lsg. klar, so bleibt sie es nach Zusatz von Toluol oder nach Sterilisierung bei
unbegrenzt. Meist enthält sie jedoch geringe Trübungen von Cellulose, an welche
Stärkekörnerchen ansetzen, so daß sich nach Monaten eine starke Trübung gebildet
Durch Behandlung dieser Ndd. mit Malz bei 50° kann man die Stärke beseitigen
die Cellulose isolieren. — Mittels Amylase bei 20° erhält man aus Stärkekleister

einen sehr geringen (0,91%), aus l. Stärke einen reichlichen (2,79%) Nd., bestehend aus Cellulose u. Stärke, welche letztere von der ersteren geschützt wird, so daß sie schwer entfernbar ist. Der Nd. gleicht daher den kondensierten Amylosen. — We Verss. haben gezeigt, daß mit tiefsd. PAe. behandelte Stärke besonders leicht in l. Zustand überführbar ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 657—59.) LINDEN

E. Heuser und N. Hiemer, *Entgegnung auf die Bemerkungen von K. Hess Depolymerisation der Cellulose*. (Vgl. HESS, S. 1394.) Vf. haben die Mol.-Gew.-Best. an ganz besonders gereinigten Methylderiv. der aus Stapelfaser erhaltenen Hydrocellulose u. einer Cellulose mit sehr geringem Reduktionswert ausgeführt. Die erhaltenen Resultate lassen sich in die früheren einreihen, so daß die Einwände von HESS beseitigt werden. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 47—50.) BRAUN

E. Ott, *Röntgenometrische Untersuchungen an hochpolymeren organischen Substanzen zum Zwecke einer Abgrenzung des Molekulargewichts derselben*. (Vgl. S. 191.) Mit Hilfe röntgenometr. Methoden versuchte Vf. die wahren, maximalen Molekulargewichte von sogenannten hochpolymeren Stoffen, wie Amylosen, Stärke, Inulin, Cellulose u. Lichenin zu bestimmen. Die Röntgenaufnahmen wurden mit Hilfe von Eisen-Kupferstrahlung in einer Plattenkamera ausgeführt. Von den Amylosen wurde Tetra- u. Oktaamylose mit Eisenstrahlung untersucht. Für *Diamylose* ergab sich die Maximalformel $(C_6H_{10}O_5)_{22}$, für *Tetraamylose* $(C_6H_{10}O_5)_{12}$ u. für *Oktaamylose* $(C_6H_{10}O_5)_6$. *Hexa-* u. *Triamylose* ergaben beide nach der röntgenometr. Unters. $(C_6H_{10}O_5)_6$ als Maximalformel. Der pflanzliche Reservestoff, das *Inulin*, wies ähnliche Linien auf, wie die zuvor erwähnte Hexaamylose, jedoch sind noch andere Linien erkennbar, die den Unterschied des Inulins von der Hexaamylose deutlich machen. Die Verss. von HERZOG u. JANCKE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. 2162. Ztschr. f. Physik **3**. 196; C. r. Acad. Sci. Paris **I**. 278. 564) wurden wiederholt u. bestätigten für die *Cellulose* die maximale Formel $(C_6H_{10}O_5)_3$. Der Reservecellulose, dem *Lichenin*, kommt maximal die Formel $(C_6H_{10}O_5)_3$ zu. Bei der *Stärke* werden zwei starke Linien gefunden (einige weitere, schwächere liegen weiter außen), aus denen sich die Formel $(C_6H_{10}O_5)_2$ ergibt, was mit den neueren Anschauungen über den Aufbau dieses Stoffes gut übereinstimmt. (Physikal. Ztschr. **174**—77. Zürich, Techn. Hochschule, Phys. Inst.) HAAS


Maximilian Ehrenstein, *Über den enzymatischen Abbau des Xylans*. Vf. hat den Verh. des Xylans gegen Schneckenferment u. Malzextrakt geprüft. — Darst. des Xylans aus mit W. ausgekochtem u. mit k. A. behandeltem Weizenstroh nach SALKOWSKY (vgl. HEUSER, Journ. f. prakt. Ch. [2] **103**. 69; C. **1922**. I. 854). Weiter Reinigung durch Dialyse der Lsg. in 10%ig. NaOH in Kollodiummembranen gegen fließendes W. u. Elektrodialyse. Die mit Toluol versetzte kolloide Lsg. ist lange Zeit stabil. Gehalt bis zu 3%. — Zur Ermittlung der günstigsten pH dienten 20 cm³ Xylanlsg., versetzt mit 5 cm³ W., 4 cm³ Schneckenenzym-lsg. (= Ferment von 1 Schnecke) u. 5 cm³ Citrat- bzw. Phosphatpuffer. Günstigste Rk. mit Citratpuffer bei pH = 4,65, mit Phosphatpuffer bei pH = 5,28. Citratpuffer ist wirksamer u. dient zu den folgenden Verss. — Völlige Verzuckerung der Xylanpräparate zu Xylose gelingt nicht. Höchster erreichter Abbau bei 36° ca. 69%. — Verdoppelung der Enzymkonz. steigert den Abbau durchschnittlich nur um das 1,2-fache. Die fortschreitende Verzuckerung gehorcht weder der monomolekularen Gleichung noch der Regel von SCHÜTZ. — Fermentverdünnung beeinflusst die Verzuckerung einer kolloidalen Xylanlsg. kaum, verzögert dagegen etwas die von suspendiertem Xylan. Ähnliches zeigt sich beim Abbau der Gerüstcellulose (vgl. KARRER, SCHUBERT u. WEHRLI, S. 2194). Zum Nachweis der *Xylose* wurde nach vollendetem Abbau verdampft, Rückstand mit CH₃OH ausgezogen, wieder verdampft, in A. gel., verdampft u. das Phenylloson in A. dargestellt. Aus verd. A., F. 153—155°, $[\alpha]_D = -40,90$ (in A.). Andere Zucker wurden nicht beobachtet. — Ein aus Grünmalz bereiteter Malzenzymextrakt lieferte in C.

Phosphatpuffer ($p_H = 5,28$) ebenfalls Xylose. Der Abbau betrug aber nur 28,8%.
 (sv. chim. Acta 9. 332—36. Zürich, Univ.) LINDENBAUM.

Roger J. Williams und **Percy A. Lasselle**, *Die Identifizierung des Kreatins*. Die Angaben über die Eigenschaften des *Kreatins* in der Literatur sich widersprechen ungenau sind, haben Vff. dieselben nochmal untersucht. Nach ihrer Beschreibung ist Kreatin monokline Prismen, die sich bei 291° (korr.) zersetzen. Einige Personen, denen es zur Prüfung übergeben worden war, bezeichneten es als geschmacklos, andere konstatierten aber einen bitteren Geschmack. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. —37. Eugene [Oregon], Univ.) WINKELMANN.

L. Ruzicka, *Zur Kenntnis des Kohlenstoffringes*. I. Über die Konstitution des Zibetons. Von den moschusartig riechenden, dem Tierreich entstammenden Stoffen des *Zibeton*, das von SACK (Chem.-Ztg. 39. 538 [1915]) isolierte u. als Keton $C_{17}H_{32}O$ erkannte riechende Prinzip des Zibets, deshalb zuerst einer Unters. unterzogen, es als ungesätt. Substanz am ehesten die Möglichkeit zur Gewinnung definierter Bauprodukte. Zunächst wurde seine Isolierung wesentlich verbessert. Es ist im Zibeton zu 2,5—3,5% enthalten. Seine schon von SACK hervorgehobene Beständigkeit gegen Alkali konnte Vff. von neuem bestätigen, denn man erhält Prodd. von absolut ungesätt. Eigenschaften, gleich ob man bei der Isolierung Alkali verwendet oder nicht. Mol.-Refr. stimmt auf ein monocycl., einfach ungesätt. Keton. Auch das Verhalten Br u. $KMnO_4$ u. die Hydrierung zu einem *Dihydrozibeton*, $C_{17}H_{32}O$, beweisen, daß das Zibeton eine Doppelbindung enthält. Letztere beeinflusst den Geruch übrigens nicht. Die Formel des Dihydrozibetons kann nach I. aufgelöst werden, denn es kondensiert sich mit Benzaldehyd zum Ketonalkohol II., der unter Verlust von H_2O in III. übergeht. Dem CO muß also mindestens ein CH_2 benachbart sein. Die weitere Unters. ergibt, daß sich sowohl das CO als auch die Doppelbindung innerhalb des Ringes befinden. Ersteres folgt aus der Oxydation des Dihydrozibetons zur *Dicarbonensäure* IV. mit gleicher C-Zahl u. aus der Beckmannschen Umlagerung des *Dihydrozibetons* zum *Isoxim* V., welches zur *Aminosäure* VI. verseift wird; letzteres folgt aus der Oxydation des Zibetons selbst mit k. $KMnO_4$ -Lsg., wobei unter allmählichem Verbrauch von 5O die *Ketodicarbonensäure* VII. entsteht. — Um nun das Mol. des Zibetons zugleich an der Doppelbindung u. dem CO aufzuspalten u. aus den so gewonnenen Fragmenten seine Konst. zu erschließen, wurde die Säure VII. mit $KMnO_4$ u. NaOH unter Kälte energ. oxydiert. Nach Verbrauch von etwas über 100 wurde das erhaltene Säuregemisch in die Methylester übergeführt, diese durch fraktionierte Vakuumdestillation getrennt, jede Fraktion mit HCl im Rohr bei 130° verseift, die Säuren durch fraktionierte Krystallisation aus W. u. Essigester getrennt. Erhalten wurden *Bernsteinsäure*, *Adipinsäure* u. als Hauptprod. *Korksäure*. — Bei einem zweiten Vers. unter anderen Bedingungen wurde Zibeton zunächst wieder mit $KMnO_4(5O)$ oxydiert, das ganze Oxydationsprod. (also nicht nur die reine Säure VII.) mit Bromlauge oxydiert. Erhalten wurden als Hauptprod. wieder *Korksäure*, außerdem *Bernsteinsäure*, *Pimelinsäure* u. *Azelainsäure*. — Ferner wurde Zibeton in CCl_4 ozonisiert, das Spaltprod., welches nicht rein gewonnen werden konnte, wieder mit Bromlauge oxydiert. Auch hierbei wurde über die Hälfte des Mol. als *Korksäure*, außerdem *Bernsteinsäure* gewonnen. — Aus den Ergebnissen des oxydativen Abbaus wurde geschlossen, daß im Zibeton ein 16- oder 17-gliedriger Ring (VIII. oder IX.) mit einer Doppelbindung u. des CO an entgegengesetzten Stellen des Ringes vorhanden ist. Formel VIII. konnte ausgeschlossen werden, denn es ergab sich, daß die Säure IV. der *n-Pentadecan-1,15-dicarbonensäure* (vgl. CHUIT, drittfolgendes Ref.) ident. ist. Zibeton enthält demnach den ungesätt. cyclo-Heptadecanring (Synthese des Dihydrozibetons vgl. nachst. Ref.), u. es blieb nur noch die Wahl zwischen den Formeln X. u. XI. Da sich nun die aus der Oxydation von XI. zu erwartende *Sebacinsäure* nachweisen ließ, so ist X. die richtige Formel, um so mehr, als sie allein das Über-

wiegen der Korksäure unter den Oxydationsprodd. zu erklären vermag. Die Formel VI ist nun in XII. aufzulösen. — Die Formel X. besitzt mehrfaches Interesse. Einmal erscheint das Zibeton als einfaches Umwandlungsprod. der Ölsäure. Sodann nimmt es als 17-Ring zunächst eine isolierte Stellung ein (vgl. nachst. Ref.). Schließlich fordern vorliegende Ergebnisse zur erneuten Diskussion der Baeyerschen Spannungstheorie heraus.



Versuche. Das rohe Handelszibet, ein 5–10% W. enthaltendes, unangenehm riechendes, salbenartiges Prod., kann direkt im Hochvakuum dest. u. dann erst verseift werden. Bei Verarbeitung größerer Mengen verseift man besser vor der Dest. durch 8-std. Kochen mit alkoh. KOH, gießt in W., äthert aus, schüttelt die äth. Lsg. 2 Tage mit $CaCl_2$ -Lsg., verdampft u. kocht achtmal mit CH_3OH aus, wobei die fettsauren Ca-Salze zurückbleiben. Der Rückstand der CH_3OH -Lsg. wird in Ä. gel., mit Na_2SO_4 getrocknet u. im Hochvakuum dest. Die unter 0,5 mm zwischen 140 u. 160° übergelenden dicken Öle werden in CH_3OH mit Semicarbazidacetat behandelt. Daraus fallende Zibetonsemicarbazon, $C_{18}H_{33}ON_3$, bildet Blättchen aus CH_3OH , F. 110° bis 186°, u. wird mit wss. Oxalsäurelsg. auf dem Wasserbad zerlegt. Zibeton, $C_{17}H_{30}O$ (X), Kp. 158–160°, Kp._{0.5} ca. 145°, bald zu campherartiger M. erstarrend, F. 31°, D. 0,9135, $n_D^{27} = 1,4820$, von moschusähnlichem, zugleich an Zedernöl erinnerndem Geruch. Reagiert momentan mit Br u. $KMnO_4$. — *p*-Nitrophenylhydrazon, gelbe Nadelchen aus A., F. 125°, färbt sich am Licht braun u. verschmiert. — 7-Ketotetradecan-1,14-dicarbonsäure, $C_{16}H_{28}O_5$ (XII.). Nach Beendigung der Oxydation wird SO_2 eingeleitet, noch etwas verd. H_2SO_4 zugesetzt u. ausgeäthert. Nach Reinigen mit wenig Ä. Würzchen aus CH_3OH , F. 113–116°. — Dihydrozibeton, $C_{17}H_{32}O$. A. X. durch Hydrierung in wss. A. (+ kolloidalem Pd). Kp._{0.3} 145°, F. 63–64°, v. X. aussehend u. riechend. Reagiert mit Br unter HBr-Entw. Semicarbazon, $C_{18}H_{35}ON_3$, Blättchen aus CH_3OH , F. 191°. Oxim, $C_{17}H_{33}ON$, aus CH_3OH , F. 63°. — *Ve*. $C_{24}H_{38}O_2$ (II.). Durch Schütteln von Dihydrozibeton mit Benzaldehyd in A. 10%ig. NaOH (3 Tage). Aus dem Rohprod. werden mit PAe. ölige Anteile (vorher nächste Verb.) entfernt. Nadelchen aus PAe., F. 113–114°. — Benzylidendi-*zibeton*, $C_{24}H_{36}O$ (III.). Durch Hochvakuumdest. der öligen Anteile. Dickses, gelbes Öl, Kp._{0.5} 203–208° (nicht ganz rein). — Dihydrozibetonisoxim, $C_{17}H_{33}ON$ (V.). Durch kurzes Aufkochen obigen Oxims mit starker H_2SO_4 (4:1 Vol.), dann mit H_2O versetzen. Nadeln aus PAe., F. 123–124°. — 16-Aminohexadecan-1-carbonsäurehydrochlorid, $C_{17}H_{35}O_2NCl$ (nach VI.). Aus V. mit sd. konz. HCl (15 Stdn.). Nadelchen aus A., F. 153°. Die freie Aminosäure ist fast unl. in h. A., l. in Eg. u. fä. beim Eingießen in Soda wieder aus. — Pentadecan-1,15-dicarbonsäure, $C_{17}H_{32}O_4$ (IV.). Aus Dihydrozibeton mit der gleichen Menge CrO_3 in Eg. (Wasserbad, 2 Tage). Krystalle aus Essigester, F. 116–117°. Dimethylester, aus CH_3OH , F. 52°. (Helv. chim. A. 9, 230–48.)

LINDENBAUM

L. Ruzicka, M. Stoll und H. Schinz, Zur Kenntnis des Kohlenstoffringes. II. Synthese der carbocyclischen Ketone vom Zehner- bis zum Achtzehner. (I. vgl. vor.

ef.) Zur Gewinnung *carbocycl. Ketone* hat man sich bisher meist der Ca-Salze der entsprechenden Dicarbonsäuren bedient, jedoch ist schon bei der Sebacinsäure die Ausbeute an Keton so gering, daß man kaum hoffen durfte, auf diesem Wege zu höher- niedrigen Ketonen zu gelangen. Es hat sich nun gezeigt, daß die Ausbeute an Keton wesentlich von der Natur des Metalles abhängt. Die Metalle der 3. u. 4. Gruppe des period. Systems haben sich als besonders vorteilhaft erwiesen; bei den vorliegenden Verss. wurde Th benutzt. Die schwer zugänglichen Polymethylen dicarbonsäuren wurden von CHUIT (zweitfolgendes Ref.) synthet. dargestellt. — Folgendes Arbeitsverf. wurde angewendet: Alkoh. Lsg. der Dicarbonsäure mit 20%ig. NaOH neutralisieren, W. u. wss. Lsg. von ThCl_4 zusetzen, Th-Salz mit W. waschen, bei 150° trocknen aus einem Kupferkolben unter 12 mm dest. Die Zers. vollzieht sich zwischen 350 – 400° . Destillat in Ä. mit verd. NaOH waschen, im Vakuum fraktioniert dest. u. aus den einzelnen Fraktionen in CH_3OH die Semicarbazone abscheiden. Diese sind nicht einheitlich, sondern der F. steigt beim Umkrystallisieren aus CH_3OH bis zu dem Höchstwert (stets über 180°), der dem gesuchten Polymethylenketon entspricht. Zur Darst. der freien Ketone werden die Semicarbazone mit Oxalsäure gespalten, u. zwar benutzt man dazu entweder das ganze Semicarbazongemisch oder zerlegt es in 2–3 Anteile. Aus dem Ketongemisch wird das reine Keton im Vakuum herausdest. Die Ausbeute an Keton beträgt beim 10-Ring nur 0,1–0,2%, steigt aber mit der Zahl konstant u. recht beträchtlich bis zum 18-Ring. Die Konst. der Ketone wurde durch Oxydation mit CrO_3 in Eg. zu den Dicarbonsäuren mit gleicher C-Zahl bewiesen, die mit den synthet. Verbb. ident. waren. Die Ketone C_{10} u. C_{11} schm. scheinbar unterhalb Zimmertemp., alle anderen sind feste, campher- oder camphenartige Massen. Die höheren Glieder riechen nach Campher, die nächsten nach Zedernholz, die von C_{14} nach Moschus. — Durch diese Synthesen ist der Weg zur techn. Gewinnung der tierischen Moschus- u. Zibetgeruchsträger angebahnt. Auch hat sich gezeigt, daß die Fähigkeit des C zur B. größerer Ringe nicht so beschränkt ist, wie man bisher nahm.

Versuche. *cyclo-Decanon*, $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$. Aus Nonan-1,9-dicarbonsäure. Kp_{12} 0 – 102° , erstarrt in Kältemischung, schm. wieder bei Zimmertemp. Enthält, wie später festgestellt, beträchtliche Mengen Methylnonylketon. *Semicarbazon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{ON}_3$, Kristalle, F. 200 – 201° . — *cyclo-Undecanon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}$. Aus Decan-1,10-dicarbonsäure. Kp_{12} 110° , erstarrt in Eis, schm. wieder bei Zimmertemp. *Semicarbazon*, $\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{ON}_3$, Blättchen, F. 200° . — *cyclo-Dodecanon*, $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}$. Aus Undecan-1,11-dicarbonsäure. Kp_{12} 126 – 128° , F. 59° . *Semicarbazon*, $\text{C}_{13}\text{H}_{25}\text{ON}_3$, F. 226 – 227° . — *cyclo-Tridecanon*, $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}$. Aus Dodecan-1,12-dicarbonsäure. Kp_{12} 137 – 139° , F. 32° . *Semicarbazon*, $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{ON}_3$, F. 207 – 208° . — *cyclo-Tetradecanon*, $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{O}$. Aus Tridecan-1,13-dicarbonsäure. Kp_{12} 155 – 156° , F. 52° . *Semicarbazon*, $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{ON}_3$, F. 197 – 198° . — *cyclo-Pentadecanon* (*Exalton*), $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{O}$. Aus Tetradecan-1,14-dicarbonsäure. $\text{Kp}_{0,3}$ ca. 90° , Nadelchen aus CH_3OH , F. 63° . Geruch dem des Muscons fast gleich. *Semicarbazon*, $\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{ON}_3$, Blättchen, F. 187 – 188° . — *cyclo-Hexadecanon*, $\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}$. Aus Pentadecan-1,15-dicarbonsäure. $\text{Kp}_{0,5}$ ca. 138° , F. 56° . *Semicarbazon*, $\text{C}_{17}\text{H}_{32}\text{ON}_3$, F. 180° . — *cyclo-Heptadecanon* (*Dihydrozibeton*, vorst. Ref.), $\text{C}_{17}\text{H}_{32}\text{O}$. Aus Hexadecan-1,16-dicarbonsäure. $\text{Kp}_{0,3}$ ca. 145° , F. 63° . *Semicarbazon*, $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{ON}_3$, F. 187° (nicht völlig rein erhalten). — *cyclo-Octadecanon*, $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}$. Aus Heptadecan-1,17-dicarbonsäure. $\text{Kp}_{0,3}$ 157 – 159° , F. 71° . *Semicarbazon*, $\text{C}_{19}\text{H}_{36}\text{ON}_3$, F. 184° . (Helv. m. Acta 9. 249–64.)

LINDENBAUM.

L. Ruzicka und W. Brugger, Zur Kenntnis des Kohlenstoffringes. III. Über die Gewinnung des *cyclo-Octanons* aus Azelainsäure. (II. vgl. vorst. Ref.) Von allen Verss., die aliphat. Verbb. einen Achtring zu gewinnen (Überblick vgl. Original), hat nur die von azelainsaurem Ca Anzeichen für die B. eines solchen erkennen lassen. Vff. haben das Ca durch andere Metalle ersetzt u. mit dem azelainsauren Thorium ziemlich

gute Erfolge erzielt. Darst. des Salzes u. Dest. desselben entsprechen im wesentlichen im vorst. Ref. mitgeteilten Verss. Die Zers. vollzieht sich bei einer Innentemp. von etwas über 300°. Das Destillat wird in einigen hintereinander geschalteten Péligré-Röhren kondensiert, die mit von früheren Verss. herrührenden hochsd. Zers.-Prod. beschickt werden. Ausbeute an zwischen 65 u. 100° (12 mm) sd. Zers.-Prodd. 20%. Das aus ihnen abgeschiedene rohe Semicarbazon liefert schon nach zweimaligem Umkrystallisieren aus CH_3OH reines *cyclo-Octanonsemicarbazon*, F. 167—168°, u. dies nach Zerlegung mit Oxalsäure reines *cyclo-Octanon*, Kp.₁₂ 74°, F. ca. 28°, das von Cr nach Zerlegung mit Oxalsäure reines *Korksäure* oxydiert wird. Ausbeute durchschnittlich 18% bei Mischung des Th-Salzes mit der doppelten Menge Cu-Späne bis 25%. — Aus d. tiefer sd. (bis ca. 200° bei 720 mm) Anteilen des Zers.-Teers wurde mittels Bisulfit eine kleine Menge *cyclo-Hexanon* (identifiziert durch Semicarbazon u. Dibenzylideneverb.) isoliert. Das in diesen Anteilen enthaltene *cyclo-Octanon* reagiert bei der starken Verdünnung nicht mit Bisulfit. Vff. haben sich durch Überführung der Azelainsäure in den Äthylester u. Unters. des bis 285° sd. Anteils desselben von der Abwesenheit auch von Spuren anderer Säuren überzeugt. Die B. des *cyclo-Hexanons* ist so zu erklären, daß ein kleiner Teil der Azelainsäure — analog den Fettsäuren bei der Alkalischesmelze — bei der hohen Zers.-Temp. des Th-Salzes in Pimelinsäure übergeht, aus der dann das *cyclo-Hexanon* entsteht.

Im Anschluß an diese Verss. wurde auch die Zers. des *azelainsauren Calciums* nochmals genau untersucht. Nimmt man dieselbe in Metallgefäßen u. in Mischung mit Metallspänen vor, so kann man ohne Einfluß auf die Ausbeute 1 kg Salz in einer Vers. verarbeiten. Ketonausbeute ca. 10%. Das Ketongemisch liefert bei der Oxidation mit CrO_3 u. verd. H_2SO_4 *Korksäure* u. *Adipinsäure*, letztere aus *cyclo-Hexanon* gebildet. HARRIES u. TANK (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 4556 [1907]) haben das Säuregemisch offenbar auch in Händen gehabt, konnten es aber nicht trennen. Die Mittelfraktion (Kp. ca. 175°) des Ketongemisches zeigte D_{19}^{19} 0,8837, $n_D^{19} = 1,43$. HARRIES u. TANK haben nur die Lichtbrechung mehrerer Fraktionen bestimmt, daraus die falsche Folgerung gezogen, daß ein Gemisch von Methyl-*cyclo-heptanon* u. Dimethyl-*cyclo-hexanon* u. Trimethyl-*cyclo-pentanon* vorliegt. Da jedoch die artigen Ketone DD. von 0,90 u. höher, die entsprechenden aliphat. Ketone dagegen solche von ca. 0,82 aufweisen, so läßt obige D. die Ggw. letzterer vermuten. Daher wurde zunächst das aus dem Ketongemisch gewonnene Rohsemicarbazon (F. nach einmaligem Umkrystallisieren aus CH_3OH unscharf ca. 85°) aus CH_3OH fraktioniert krystallisiert. Dabei steigt der F. fortlaufend, bis schließlich kleine Mengen reines *cyclo-Octanonsemicarbazons* (F. 167—168°) resultieren, aber ein anderes Semicarbazon war in reiner Form nicht erhältlich. — Die Zerlegung des Ketongemisches gelang schließlich durch 24-std. Schütteln der bis 120° (12 mm) sd. Anteile mit Bisulfit u. fraktionierte Dest. der aus den Bisulfitverbb. abgeschiedenen Ketone einerseits u. der nicht mit Bisulfit reagierenden Ketone andererseits. Erstere lieferten *cyclo-Hexanon* u. *Methylheptylketon*, $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}$, Kp.₁₂ 75—77°, D_{22}^{22} 0,8188, $n_D^{22} = 1,41$, nach Reinigung über das *Semicarbazon*, $\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{ON}_3$, aus CH_3OH , F. 119°. Die Ketone wurden zum Vergleich durch Ketonspaltung des Hexylacetessigesters dargestellt. Die anderen Ketone lieferten hauptsächlich *cyclo-Octanon* u. wenig eines höher Ketons, aus dem ein *Semicarbazon* vom F. 155—157° (aus CH_3OH) erhalten wurde. Zur Identifizierung war die Menge zu gering. Die Gesamtketone enthalten schätzungsweise ca. 1% *cyclo-Hexanon*, 2% *Methylheptylketon*, 5—6% *cyclo-Octanon*, und 1% unbekanntes Keton. — Die B. des *Methylheptylketons* ist vielleicht so zu erklären, daß aus Azelainsäure unter CO_2 -Abspaltung Heptancarbonsäure entsteht u. die mit von einer anderen Zers.-Art herrührender Essigsäure reagiert.

Schließlich wurden noch einige andere Salze der Azelainsäure der Zers. unterworfen. Es lieferten das Ce^{III} -Salz ca. 10%, das Zr -Salz u. Pb -Salz ca. 2% *cyclo-*

stanon. In allen drei Fällen konnten die F.F. der Semicarbazone schon nach 2- bis 3-maligem Umkrystallisieren auf den Höchstwert 168° gebracht werden, also viel höher als beim Ca-Salz. (Helv. chim. Acta 9. 339—54. Zürich, Techn. Hochschule u. Chem. Lab. der Firma M. AEF & Co.)

LINDENBAUM.

Philippe Chuit, Über die Darstellung der Polymethylen dicarbonsäuren mit 11 bis 12 Kohlenstoffatomen und einiger Derivate derselben. (Mitbearbeitet von **F. Boelsing, Hausser** u. **G. Malet**.) Als Ausgangsmaterialien für diese Synthesen dienten das *Nonandiol*-(1,9) u. *Decandiol*-(1,10). — *Azelainsäuredimethylester*. Durch Verestern der Säure mittels H_2SO_4 . Kp.₈ 140°, D.¹⁵ 1,006. — Nebenprod.: *Monomethylester*, Kp.₁₅ 185°, D.¹⁵ 1,033, F. 25°. — *Diäthylester*, Kp.₈ 154—155°, D.¹⁵ 0,9756. — *Monomethylester*, Kp.₁₅ 187—192°, D.¹⁵ 1,020. — *Nonandiol*-(1,9), $C_9H_{20}O_2$. Durch Red. des richtigen Dimethyl- oder Diäthylesters mit der 1,5-fachen Menge Na in A. nach BOUVAULT. Kp.₈ 150—151°, aus Bzl., F. 45,8°. — *Decandiol*-(1,10), $C_{10}H_{22}O_2$. Darst. analog. Kp.₈ 170°, F. 72,2°. — *1,9-Dibromnonan*, $C_9H_{18}Br_2$. Durch Einleiten von HBr in *Nonandiol* bei 150°. Kp.₂ 121°, D.¹⁵ 1,415. — *1,10-Dibromdecan*, $C_{10}H_{20}Br_2$. Ebenso aus *Decandiol* bei 130°. Kp.₉ 161,1—162,4°, F. 27,4°, D.³⁰ 1,335, $n_D^{30} = 1,49051$. — *Nonandiol*-(1,10)-monobromhydrin, $C_{10}H_{21}OBr$. Mit ungenügender Menge HBr neben dem vorigen. Kp.₈ 153—155°, D.¹⁵ 1,188. — *Nonan-1,9-dicarbonsäurenitril*, $C_{11}H_{18}N_2$. Aus *Dibromnonan* u. KCN in verd. A. Kp.₇ 189—190°. — *Decan-1,10-dicarbonsäurenitril*, $C_{12}H_{20}N_2$, Kp.₈ 195°, F. 16°. — *Nonan-1,9-dicarbonsäure*, $C_{11}H_{20}O_4$. Aus dem Nitril mit alkoh. KOH. Aus Bzl., F. 111°. *Dimethylester*, Kp.₃ 140—141°, D.¹⁵ 0,990. — *Diäthylester*, Kp.₅ 165—166°, D.¹⁵ 0,957. — *Undecandiol*-(1,11), $C_{11}H_{24}O_2$. Aus dem richtigen Diäthylester. Kp.₁₃ 179—180°, aus Bzl., F. 52,8°. Der F. kann durch Umkrystallisieren aus verd. A., dann mehrfach Bzl. auf 62—62,5° gebracht werden. — *1-Dibromundecan*, $C_{11}H_{22}Br_2$. Man führt nach DIONNEAU (Bull. Soc. Chim. de France [4] 7. 327 [1910]) die Di-Mg-Verb. des *Dibromnonans* nach Ersatz des Ä. durch Ä. mit Chlormethyläther in *Dimethoxyundecan* ($C_{13}H_{28}O_2$, Kp.₁₂ 130—135°) über und behandelt dieses mit HBr bei 130° (vgl. v. BRAUN u. DANZIGER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 1977 [1912]). Kp.₁₂ 179°, D.¹⁵ 1,332. — *Undecandiol*-(1,11)-diacetat, $C_{15}H_{28}O_4$. Aus dem vorigen mit K-Acetat in sd. Eg. Kp.₁₃ 181—183°, D.¹⁵ 0,964. — *Decan-1,10-dicarbonsäure*, $C_{12}H_{22}O_4$. Aus *Dibromdecan* u. KCN, Nitril mit wss.-alkoh. KOH verfeinern. Aus W., F. 127,8—128°. *Dimethylester*, Kp.₉ 167—169°, F. 31°. *Diäthylester*, Kp.₁₅ 165—166°, D.²⁰ 0,849, F. 16°. — *Dodecandiol*-(1,12), $C_{12}H_{26}O_2$. Aus dem vorigen *Dimethylester*. Kp.₈ 185°, aus Bzl., F. 79,2°. — *1,12-Dibromdodecan*, $C_{12}H_{24}Br_2$. Aus dem vorigen mit HBr bei 120°. 2. Aus *Dibromdecan* über das *Dimethoxydodecan* ($C_{14}H_{30}O_2$, Kp.₁₅ 155—160°), das mit HBr bei 160° behandelt wird. Kp.₈ 177—180°, aus A., F. 36,8°. — *Dodecandiol*-(1,12)-diacetat, $C_{16}H_{30}O_4$, Kp.₁₀ 189—190°, F. 36°. — *Decan-1,11-dicarbonsäure* (*Brassylsäure*), $C_{13}H_{24}O_4$. Man kocht *Dibromnonan* mit *Malonester* in A. einen Tag oder erhitzt einige Stdn. im Autoklav auf 125°, verseift mit KOH, äthert aus, fällt mit HCl, nimmt die *Tetracarbonsäure* in Ä. auf u. erhitzt langsam auf 180°. Das Rohprod. wird in Soda gel. u. ausgeäthert. Aus Bzl., F. 113—113,2°. *Dimethylester*, Kp.₁₁ 192—194°, aus verd. A., F. 33,2°. *Diäthylester*, Kp.₁₂ 195°, F. 20°. — *Tridecandiol*-(1,13), $C_{13}H_{28}O_2$. Aus dem vorigen *Dimethylester*. Kp.₁₀ 195—197°, nach Behandeln mit PAe. aus verd. A., dann Bzl., F. 76,4—76,6°. — *3-Dibromtridecan*, $C_{13}H_{26}Br_2$. Aus dem vorigen mit HBr bei 150—160° oder nach DIONNEAU. Kp.₉ 185—187°, D.¹⁵ 1,276, F. 8—10°. — *Dodecan-1,12-dicarbonsäure*, $C_{14}H_{26}O_4$. Aus *Dibromdecan* analog der vorigen Säure; CO_2 -Abspaltung bei ca. 150°. Reinigung über den *Dimethylester* (Kp.₈ 193—194°, aus CH_3OH , F. 43°). Aus A., *Dimethylester*, Bzl. u. Aceton, F. 125,8°. — *Tetradecandiol*-(1,14), $C_{14}H_{30}O_2$. Aus dem richtigen Ester. Kp.₉ 200°, aus Bzl., F. 84,8°. — *1,14-Dibromtetradecan*, $C_{14}H_{28}Br_2$. Aus dem vorigen mit HBr bei 130—140° oder nach DIONNEAU über das *Dimethoxytetradecan* ($C_{16}H_{34}O_2$, Kp.₁₀ 170—171°, D.¹⁵ 0,895, Nadeln aus A., F. 23,3°). Kp.₈ 190

bis 1920, aus A., F. 50,4°. — *Tridecan-1,13-dicarbonsäure*, $C_{15}H_{28}O_4$. Aus Dibromundecan wie oben. Aus Bzl., Essigester, A., Aceton, wieder Bzl., F. 114,6—114, *Dimethylester*, Kp.₁₁ 203—205°, Blättchen aus A., F. 43°. *Diäthylester*, Kp.₃ 192—19 F. 30°. — *Pentadecandiol-(1,15)*, $C_{15}H_{32}O_2$. Aus dem zugehörigen Monobromhydrin (v unten) mit K-Acetat in sd. Eg., entstandenes Diacetat (F. 36°) verseifen. Aus B. F. 87°. — *1,15-Dibrompentadecan*, $C_{15}H_{30}Br_2$. Nach DIONNEAU über das *Dimethoxypentadecan* ($C_{17}H_{36}O_2$, Kp.₁₅ 190°). Kp.₁₅ 215—225°, F. 15°. — *Pentadecandiol-(1,15)-monobromhydrin*, $C_{15}H_{31}OBr$. Mit ungenügender Menge HBr neben dem vorigen. Aus PA F. 59—60°. — *Tetradecan-1,14-dicarbonsäure* (*Thapsiasäure*), $C_{16}H_{30}O_4$. Aus Dibrododecan. Aus Essigester, Bzl., Aceton, F. 124—124,2°. *Dimethylester*, $C_{18}H_{34}$ Blättchen aus A., F. 51,6°. *Diäthylester*, F. 39°. — *Dimethoxyhexadecan*, $C_{18}H_{38}$ Aus Dibromtetradecan wie oben. Kp.₃ 174—176°, Nadeln aus A., F. 32°. — *1,1-Dibromhexadecan*, $C_{16}H_{32}Br_2$. Aus dem vorigen mit HBr bei 170°. Kp.₄ 204—20 Nadeln aus A., F. 56—56,2°. Gibt keine Mg-Verb. — *Hexadecandiol-(1,16)*, $C_{16}H_{34}$ Man führt das vorige in das *Diacetat* ($C_{20}H_{38}O_4$, aus A. u. Aceton, F. 47,2°) über verseift dieses mit alkoh. KOH. Kp.₄ 195—200°, Nadelchen aus Bzl., Blättchen aus F. 91,4°. — *Pentadecan-1,15-dicarbonsäure*, $C_{17}H_{32}O_4$. Aus Dibromtridecan. Blättchen aus CH_3OH , F. 118°. *Dimethylester*, $C_{19}H_{36}O_4$, Kp.₁₅ 235°, Blättchen, F. 52,3°. *Diäthylester*, Kp.₃ 209—210°, perlmutterglänzende Krystalle aus A., F. 41,6°. — *Hexadecan-1,1-dicarbonsäure*, $C_{18}H_{34}O_4$. Aus Dibromtetradecan. Aus CH_3OH , Essigester u. B. F. 124,6—124,8°. *Dimethylester*, Kp.₃ 205—207°, aus CH_3OH u. A., F. 60°. *Diäthylester*, Kp._{1,5} 201—204°, perlmutterglänzende Krystalle aus A., F. 48,2°. — *Hepdecan-1,17-dicarbonsäure*, $C_{19}H_{36}O_4$. Aus Dibrompentadecan. Aus Bzl., Aceton Essigester, F. 119,2°. *Dimethylester*, Kp.₃ 212—213°, Blättchen aus CH_3OH u. F. 60,2°. *Diäthylester*, Kp._{1,5} 212—213°, perlmutterglänzende Blättchen aus A., F. 49.

Die F.F. der *Polymethylenedicarbonsäuren* mit C_4 bis C_{19} fallen mit wachsender C-Zahl regelmäßig bei den geraden u. steigen ebenso bei den ungeraden Gliedern, daß die anfangs weit auseinander liegenden Kurven schließlich fast miteinander verschmelzen. — Die F.F. der *Dimethyl-* u. *Diäthylester* aller Säuren mit C_{10} bis C_{19} steigt mit wachsender C-Zahl regelmäßig. Da aber der F. des Esters einer ungeraden Säure stets dem des Esters der nächst niederen geraden Säure näher liegt, so ergeben sich je zwei parallele, fast geradlinige Kurven. — Die F.F. der *Glykole* mit C_4 bis C_{16} steigt mit wachsender C-Zahl sowohl in der geraden wie in der ungeraden Reihe. Anfangs laufen die beiden Kurven parallel, nähern sich dann, um bei C_{15} u. C_{16} fast zu verschmelzen. (Helv. chim. Acta 9. 264—78. Genf, Lab. der Firma M. NAEF & Co.) I

Raymund Säger, *Zur Frage des elektrischen Momentes des Benzolmoleküls*. Vf. zeigt, daß Rückschlüsse auf das elektr. Moment aus dem therm. Verh. der Dämpfe einer Fl. nicht gemacht werden dürfen wegen der nicht genügenden experimentellen Genauigkeit; das genannte Verf. sei nur auf Gase u. Dämpfe anwendbar. Vf. glaubt nach seinen Berechnungen dem Bzl. molekulare Symmetrie zuerkennen zu müssen. Ganz ähnliche Betrachtungen wie für das Bzl. führte Vf. auch für A. u. Ä. durch. (Physikal. Ztschr. 27. 165—74. Zürich.) HAASE.

Frank C. Whitmore und **Gladys E. Woodward**, *p-Chlorquecksilberbenzoesäure und verwandte Verbindungen*. Vorl. Mitt. *p-Chlorquecksilberbenzoesäure*, $ClHgC_6H_4CO_2H$ (I), wurde nach WHITMORE, HAMILTON u. THURMANN (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1066 [1923]) durch Oxydation von *p-Tolylquecksilberchlorid* mit $KMnO_4$ in alkoh. Lsg. dargestellt. Ausbeute: 90%. Weißes Pulver. Unl. in organ. Solventien, auf A. Die Struktur wurde durch B. von *p-Jodbenzoesäure* (F. 266—267°) in 95%iger Lsg. bei Behandlung mit Jod in alkoh. Lsg. bewiesen. — *Natrium-p-oxyquecksilberbenzoesäure*, $C_7H_5O_3HgNa = HOHgC_6H_4CO_2Na$ (II), bildete sich beim Kochen von I mit 6-n. NaOH-Lsg. in A. + W., während *Natrium-p-chlorquecksilberbenzoesäure*, $C_7H_4ClO_3HgNa = ClHgC_6H_4CO_2Na$, beim Kochen mit Na_2CO_3 entstand. *Natrium-p-jodbenzoesäure*, $C_7H_4JO_3Na$, entstand aus I durch Erhitzen mit Na_2CO_3 in A. + W. (F. 266—267°) in 95%iger Lsg. bei Behandlung mit Jod in alkoh. Lsg. bewiesen. — *Natrium-p-chlorquecksilberbenzoesäure*, $C_7H_4ClO_3HgNa = ClHgC_6H_4CO_2Na$, bildete sich beim Kochen von I mit 6-n. NaOH-Lsg. in A. + W., während *Natrium-p-jodbenzoesäure*, $C_7H_4JO_3Na$, entstand aus I durch Erhitzen mit Na_2CO_3 in A. + W. (F. 266—267°) in 95%iger Lsg. bei Behandlung mit Jod in alkoh. Lsg. bewiesen.

cksilberbenzoat, $C_7H_4O_2JHgNa = JHgC_6H_4CO_2Na$, aus II u. NaJ. Natrium-*p*-brom-cksilberbenzoat, $BrHgC_6H_4CO_2Na$, aus II u. NaBr. Alle 4 Na-Salze sind l. in W., zwar wächst die Löslichkeit in der Reihenfolge OH, Cl, Br, J. — *p*-Quecksilberbis-zoesäure, $C_{14}H_{10}O_4Hg = Hg(C_6H_4CO_2H)_2$, wurde aus I durch Behandlung mit er Lsg. von Stannochlorid in Natronlauge erhalten. Ausbeute 60%. Na-Salz, der Säure u. Natriumdicarbonat. — *p*-Chlorquecksilberbenzoylchlorid, $ClHgC_6H_4 \cdot Cl$, entstand beim Kochen von I in Chlf. mit PCl_5 u. bildete bei Behandlung mit Butylalkohol *n*-Butyl-*p*-chlorquecksilberbenzoat, $C_{11}H_{13}O_2ClHg = ClHgC_6H_4CO_2C_4H_9$, 170°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 533—36. Evanston [Ill.], Northwestern iv.)

WINKELMANN.

Fr. Hein und **R. Späte**, *Chrom-organische Verbindungen*. VII. Über die Pro- te der Einwirkung von Bromphenylmagnesiumbromid auf sublimiertes Chromchlorid. (vgl. S. 2456.) In der Hoffnung, beständigere Organochromverbb. zu erhalten, en Vff. *p*-Bromphenyl-MgBr auf sublimiertes Chromchlorid einwirken, erhielten r ein kompliziertes Gemisch von *p*-Bromphenylchromverbb., aus dem das Tetra- romphenylchrombromid, $(BrC_6H_4)_4CrBr$, das Penta-*p*-bromtriphenylchrombromid, $(C_6H_4)_3BrCrBr$, u. das Di-*p*-bromtetraphenylchromhydroxyd, $[Br(C_6H_4)_2]_2CrOH$ iert werden konnte. — Grignardlsg. aus *p*-Dibrombenzol, Mg u. Ä. werden mit O-freiem Chromchlorid 2—3 Stdn. gerührt, 2 Tage bei 0° aufbewahrt, mit Eis zers. ie ausgeschiedene braune M. nach dem Auswaschen mit H_2O u. Trocknen mit A. gezogen. Aus der alkoh. Lsg. fällt Ä. das Tetra-*p*-bromphenylchrombromid, $C_{24}H_{16}Br_5Cr$ aus. F. (direkt erhitzt) 90° (beim Vorerwärmen auf 110°) 115° unter Zers. Aus dem ckstand von I erhält man durch Extraktion mit $CHCl_3$ u. Füllen mit Ä. das Penta- romtriphenylchrombromid, $C_{30}H_{20}Br_6Cr$ (II). Zers. sich gegen 120°. Rückstand II gibt nach dem Waschen mit Bzl., CS_2 u. Ä. u. mechan. Reinigen Analysenzahlen, auf Di-*p*-bromtetraphenylchromhydroxyd mit 1 Mol. CS_2 , $C_{49}H_{33}OBr_2S_2Cr$, stimmen. r. Dtsch. Chem. Ges. 59. 751—56.)

BRAUNS.

G. D. Palmer und **E. Emmet Reid**, *Der Einfluß des Schwefels auf die Farbe von farbstoffen. Weitere Untersuchung*. (Vgl. FOSTER u. REID, Journ. Americ. Chem. 46. 1936; C. 1924. III. 1685.) Um den Einfluß des S u. der SO_2 -Gruppe auf die be von Azofarbstoffen zu studieren, wurden die Basen $m-NH_2C_6H_4SR$ u. $m-C_6H_4SO_2R$ ($R = \text{Methyl, Äthyl, } n\text{-Butyl u. Benzyl}$) hergestellt, diazotiert, mit Salz gekuppelt u. dann die Farben verglichen. Die -S-Verbb. waren bathochrom, - SO_2 -Verbb. hypsochrom, beide Effekte waren bei den Methylverbb. am ausgepräg- en. Nach ihrer bathochrom. Wrkg. ordnen sich die Gruppen folgendermaßen: $CH_3 < -CH_3 < -OCH_3 < -SCH_3$, u. zwar sowohl in der *m*-, wie in der *p*-Reihe, Einfluß des S ist in der *m*-Reihe jedoch nicht so deutlich u. intensiv wie in der eihe. — *m*-Acetylaminothiophenolnatrium, $CH_3CONHC_6H_4SNa$, wurde nach ZINCKE MÜLLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 775 [1913]) hergestellt u. mit Dimethyl- at, Äthyljodid, Butylbromid, Benzylchlorid in folgende Verbb. übergeführt: Acetylaminothiophenolmethyläther, $m-CH_3CONHC_6H_4SCH_3$, F. 75°, *m*-Acetylaminophenoläthyläther, Öl, nicht destillierbar, $D_{25}^{25} 1,0360$, *m*-Acetylaminothiophenol- tyläther, Öl, $D_{25}^{25} 1,0101$, u. *m*-Acetylaminothiophenolbenzyläther, F. 74,1°. Durch w. von konz. Salzsäure auf die alkoh. Lsg. dieser Acetylverbb. entstanden die drochloride der Aminothiophenolalkyläther, $m-NH_2C_6H_4SR \cdot HCl$. — Die *m*-Acetyl- nophenylalkylsulfone, $m-CH_3CONHC_6H_4SO_2R$, wurden aus den entsprechenden Sul- n mit einem Überschuß von 30%ig. H_2O_2 in 83—95%ig. Ausbeute erhalten. Acetylaminophenylmethylsulfon, das schon ZINCKE u. MÜLLER beschrieben haben, 137°, *m*-Acetylaminophenyläthylsulfon, F. 96°, *m*-Acetylaminophenyl-*n*-butylsulfon, $D_{25}^{25} 1,3727$ u. *m*-Acetylaminophenylbenzylsulfon, F. 134,2°, waren unl. in PAe., l. A., ll. in Chlf., aus dem sie in Nadeln krystallisierten. Alle vier Verbb. ließen sich HCl leicht in die entsprechenden *m*-Aminophenylalkylsulfonhydrochloride $m-NH_2 \cdot$

$C_6H_4SO_2R \cdot HCl$ überführen. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 528—32. Baltim. Johns Hopkins Univ.) WINKELMANN

Mario Amadori, *Kondensationsprodukte aus Glucose und p-Phenetidin*. Rk. zwischen Glucose u. *p*-Phenetidin in mol. Verhältnissen ergibt je nach den Bedingungen verschiedene Prodd. Läßt man beide in alkoh. Suspension in der K oder Wärme (in letzterem Falle jedoch nur bis zur erfolgten Lsg. kochen) einwirken, so entsteht die schon von IRVINE u. GILMOUR (Journ. Chem. Soc. London **95**. [1909]) erhaltene Verb. vom F. 118°. Wird jedoch das Gemisch beider Komponenten vor dem Kochen mit A. in trockenem Zustand auf 50—80° erhitzt, so krystallisiert nach dem Erkalten der alkoh. Lsg. eine Verb. vom F. 155°. — Verb. $C_{14}H_{21}O_6N$, F. 1 aus A., gibt nur schwer die letzten Spuren A. ab. An der Luft erfolgt Verfärbung. Verb. $C_{14}H_{21}O_6N$, F. 155°, farblose oder schwach strohfarbene Nadeln, ist sehr beständig, ist wahrscheinlich mit der von CLAUS u. REE (C. **98**. II. 695) erhaltenen Verb. identisch. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **2**. 337—42. 1925. Padua, Univ.) ZANDELLI


Raoul Poggi, *Über einige Derivate des Toluols*. 3-Nitrobenzyljodid, $C_7H_6O_2$, aus Nitrobenzylchlorid u. KJ in sd. alkoh. Lsg., schwach gelblich gefärbte, prismatische Tafeln aus A. (beim Verd. mit W.), F. 84,5—86°. — 2,4-Dinitrobenzyljodid, $C_7H_5O_4N_2$, gelbliche Nadeln, F. 75,5—76°. — Thiocarbaminsäure-(4-nitrobenzyl)-ester, $C_8H_8O_3N_2S$, $NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot CH_2 \cdot S \cdot CO \cdot NH_2$, aus *p*-Nitrobenzylthiocyanat durch Einw. von konz. Schwefelsäure bei 0° u. Eingießen in W., glänzende Krystalle aus A., F. 140—141°. — *p*-Nitrobenzylmercaptan, $C_7H_7O_2NS$, aus vorigem durch Hydrolyse mit HCl, glänzende Lamellen aus Ä., F. 55°. — 4,4'-Dinitrodibenzylidisulfid, aus vorigem durch Oxydation an der Luft. — *m*-Cyanbenzylbromid, C_8H_6NBr , aus *m*-Tolunitril durch Bromieren bei 160°, weiße Prismen aus A., F. 94—95,5°; entsteht auch aus *m*-Cyanbenzylchlorid durch Kochen mit NaBr in alkoh. Lsg.; gibt mit KSCN in alkoh. Lsg. das entsprechende Thiocyanat, F. 55° (vgl. EHRLICH, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **34**. 3370 [1901]). — *m*-Cyanbenzyljodid, C_8H_6NJ , aus *m*-Cyanbenzylchlorid u. KJ in sd. alkoh. Lsg., prismatische Krystalle aus A., F. 113—114°. — *o*-Cyanbenzyljodid, C_8H_6NJ , aus *o*-Cyanbenzylchlorid u. KJ, gelbliche rhomb. Krystalle, F. 77—78°. — *p*-Cyanbenzylmercaptan, C_8H_7NS , aus *p*-Cyanbenzylchlorid u. $Na_2S_2O_3$ in sd. alkoh. Lsg. u. Zers. des primär entstehenden *p*-Cyanbenzyl-Na-Thiosulfats (?), $NC \cdot C_6H_4 \cdot CH_2 \cdot S_2O_3Na$, mit konz. Schwefelsäure, weiße Tafeln aus A. u. danach aus PAE., F. 43°. — 4,4'-Dicyandibenzylidisulfid, $C_{16}H_{12}N_4$, aus vorigem durch Oxydation an der Luft oder mit Jod in alkoh. Lsg. in der Wärme, leuchtende Prismen, F. 147,5°. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **2**. 423—424. 1925. Florenz, Univ.) ZANDELLI

H. Gelissen und P. H. Hermans, *Organische Peroxyde*. IX. Beitrag zur Kenntnis der Hydrolyse (und Aminolyse) der Diacylperoxyde. (Jodometrische Bestimmung der Benzoylperoxyds.) (VIII. vgl. S. 906.) Berichtigung u. Ergänzung einiger Angaben in der Literatur der Diacylperoxyde. — Die doppelseitig substituierten Hydroperoxyde u. damit die Diacylperoxyde wirken niemals im wahren Sinne oxydierend, d. h. unter Abgabe von Sauerstoff. — Die Ansicht, daß die Diacylperoxyde aus sich selbst Jod frei machen, ist unzutreffend; in wss. oder wss.-alkoh. Lsg. erfolgt Jodabscheidung, u. zwar nicht nur durch Hydrolyse, sondern auch direkt aus dem nicht hydrolysierten Diacylperoxyd, wenn es nur genügend in dem betreffenden Lösungsm. löslich ist. Die Jodabscheidung durch das Peroxyd selbst ist aber keine Oxydation im eigentlichen Sinne. Die Aufspaltung findet an der O-Brücke durch direkte Einw. des Jodids statt:




während bei der Hydrolyse die Spaltung zwischen der CO-Gruppe u. der O-Brücke erfolgt. Ähnliches gilt für die Rk. mit Kaliumbromid, aus dem ebenfalls unter bestimmten Bedingungen Brom freigemacht wird. An Diacylperoxyden wurden

etyl- u. Dibenzoylperoxyd in ihrem Verh. gegen Bromide u. Jodide in verschiedenen Lösungsm. untersucht. — Die Hydrolyse des Dibenzoylperoxyds, welche neutraler u. saurer Lsg. nur äußerst langsam verläuft, wird durch alkal. Reagenzien beschleunigt. Eine Lsg. des Peroxyds in 70%ig. A. reagiert mit der äquivalenten Menge Natronlauge nach der Gleichung:



Beim Ausgießen in W. ist dann keine Trübung von ausgeschiedenem Peroxyd mehr merkbar, während die Lsg. KJ sofort braun färbt. Basen wirken demnach fördernd auf die Hydrolyse; daneben kann aber auch Rk. zwischen der Base u. dem Peroxyd eintreten, wie es beim Ammoniak der Fall zu sein scheint. Dibenzoylperoxyd reagiert mit Ammoniak in wss.-aceton. Lsg. nach folgender Gleichung:



Beim kurzem Stehenlassen der aceton. Lsg. bei Zimmertemp. verschwindet die Perle allmählich wieder, indem das überschüssige Ammoniak zu N oxydiert wird. *Jodometr. Best. des Benzoylperoxyds.* 0,2 g Benzoylperoxyd werden in 10 ccm Aceton, in welchem sich das Peroxyd schon in der Kälte leicht löst, aufgenommen mit 3 ccm einer konz. wss. KJ-Lsg. versetzt (evtl. schwach angesäuert); nach Verleihen mit etwas W. wird das abgeschiedene Jod sofort titriert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 63—68. Deventer [Holland].) ZANDER.

Fr. Fichter und Max Adler, *Elektrochemische Oxydation von im Kern chlorierten aromatischen Kohlenwasserstoffen*. (Vgl. FICHTER u. LOTTER, Helv. chim. Acta **8**. 1925. II. 1350.) Chlorbenzol. Liefert in n. H_2SO_4 -Suspension, an PbO_2 -Anode, sowohl ohne als mit Diaphragma Chinon u. Bernsteinsäure (Abbauprod. des Chinons), höchstens Spuren Brenzcatechin. Das Cl findet sich im Elektrolyten als Cl^- . Zwischenprod. der Oxydation wird analog wie beim Jodbenzol (I. c.) *p*-Chlorphenol beobachtet, das unter gleichen Bedingungen dieselben Prodd., aber mit viel besserer Ausbeute liefert. Ermittlung der Stromausbeute durch Best. des Cl^- oder des Chinons. Verss. mit Diaphragma geben bessere Stromausbeuten. — *p*-Chlortoluol. Liefert *p*-Chlorbenzaldehyd u. *p*-Chlorbenzoesäure. Mit steigender Strömdichte nimmt die Ausbeute an Aldehyd bis zu einem Maximum bei 0,009 Amp./qcm zu, die an Säure auch die Gesamtausbeute vermindert sich. Bei niedriger Strömdichte (0,0018 Amp./qcm) ist die Ausbeute an Säure (33,5%) hoch im Vergleich zu der an Aldehyd (1,3%), was aber mitverursacht durch die Unlöslichkeit der Säure im Elektrolyten. Durch Zusatz von Aceton läßt sich die Ausbeute noch etwas steigern. In 0,25-n. Soda-Lösung erhält man bei 60° nur die Säure; Ausbeute 26,7% bei 0,0018 Amp./qcm. Chlorbenzaldehydphenylhydrazon, $C_{13}H_{11}N_2Cl$, Blättchen aus A., F. 127°. — *p*-Chlorbenzoesäure. Wird in n. NaOH-Lsg. an PbO_2 -Anode mit 0,0066 Amp./qcm nicht merklich angegriffen. In Eg. + etwas n. H_2SO_4 , an Pt-Anode, mit 0,25 Amp./qcm, wird merklich angegriffen. In 60—70°, mit Diaphragma entsteht *p*-Chlorsalicylsäure. — Darauf kamen die reinen Alkalisalze zur Verwendung. Damit nicht an der Anode sofort unlöslich abgeschieden wird, wurde das Na-Salz in n. NaOH-Lsg. anod. oxydiert. Die Befunde, daß unter diesen Bedingungen die Kernoxydation vermieden u. der Angriff auf CO_2H unter B. von Peroxyd u. dann KW-stoff stattfinden würde, hat sich nicht bestätigt. Im günstigsten Falle wurde höchstens $\frac{1}{10}$ des zu erwartenden CO_2 erhalten. — Aufhin wurde die therm. Zers. des 4,4'-Dichlordibenzoylperoxyds, $C_{14}H_8O_4Cl_2$, untersucht. Darst. vgl. GELISSEN u. HERMANS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 292; C. **1925**. 594). Aus CS_2 , F. 142° (Zers.). Es liefert in der Bombe bei 180° wenig *p*-Chlorbenzoesäure, hauptsächlich CO_2 (74%) u. 4,4'-Dichlordiphenyl, $C_{12}H_8Cl_2$, Blättchen, F. 48° (53%). Dagegen bildet sich nach GELISSEN u. HERMANS in sd. Bzl. 4-Chlorphenyl, was Vff. bestätigt fanden. Der verschiedene Verlauf der Zers. hängt also von der Temp. ab (vgl. DIETRICH, Helv. chim. Acta **8**. 149; C. **1925**. I. 2217). — 2,4-Dichlortoluol u. 2,4-Dichlorbenzoesäure. Ersteres liefert in

n. H_2SO_4 , an PbO_2 -Anode, ohne Diaphragma nur 2,4-Dichlorbenzoesäure. Stoff heute höchstens 6,5%. Das Na-Salz der Säure, $\text{C}_7\text{H}_3\text{O}_2\text{Cl}_2\text{Na}$, gab weder in neutral noch alkal. Lsg. brauchbare Resultate. Die Säure wird in Na_2SO_4 -Lsg., an Pt-Anode, bei 60° langsam zu CO_2 verbrannt. — 2,4,2',4'-Tetrachlordibenzoylperoxy. $\text{C}_{14}\text{H}_6\text{O}_4\text{Cl}_4$. Man läßt 2,4-Dichlorbenzoylchlorid in Aceton in eine Lsg. von Natrium in Eiswasser tropfen. Nach Waschen mit W. u. Ä. aus PAe., F. 106°. Die therm. Zersetzung in einem evakuierten Kolben verläuft sehr regelmäßig u. liefert CO_2 , wenig 2,4-Dichlorbenzoesäure, 2,4,2',4'-Tetrachlordiphenyl, $\text{C}_{12}\text{H}_6\text{Cl}_4$, F. 83° (von diesem mindestens 71°). — harzige Prodd. (Helv. chim. Acta 9. 279—87. Basel, Univ.) LINDENBAUM


Jean-Baptiste Senderens, Über die Verätherung von aromatischen Alkoholen (Vgl. S. 1132.) Benzylalkohol. Die früheren Ergebnisse (C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1412; C. 1924. II. 322) sind dahin zu ergänzen, daß man 70% Benzyläther erhält, wenn man den Alkohol mit $\frac{1}{2}$ Vol. ($\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$) bei Zimmertemp. 8 Tage stehen läßt. Mit 2 Voll. Säure ist die Rk. zwar in einigen Stdn. vollendet, aber es bilden sich fast nur KW-stoffe, die bei der Dest. verharzen. — Primärer Phenyläthylalkohol, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2(\text{OH})$, veräthert sich schwerer als Benzylalkohol. Mit 5 Vol.-% ($\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$) erhält man nach 4-std. Kochen ca. 8% Benzyläther. [Phenyläthyl]-äther, Kp. 317—320° (schwache Zers.), D. 1,014. Mit konz. H_2SO_4 verläuft die Rk. schneller, aber es bilden sich reichlich (bei mehr Säure schließlich) kondensierte KW-stoffe. Diese scheinen aus der Dehydratisierung des Äthers hervorzugehen, denn wenn man letzteren mit konz. H_2SO_4 erhitzt, so destilliert von 170° ab die molekulare Menge W. über. Bei Zimmertemp. mit dem gleichen Gemisch ($\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$) veräthert sich der Alkohol nur unmerklich. — Sekundärer Phenyläthylalkohol, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{CH}_3$, veräthert sich viel leichter (Vgl. S. 1132). Mit 2 Vol.-% ($\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$) bei 110° ist die Rk. in einigen Min. vollendet, aber es entstehen hauptsächlich Styrol, etwas Distyrol u. höher kondensierte KW-stoffe. Läßt man jedoch mit $\frac{1}{3}$ Vol. ($\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$) ca. 20 Stdn. bei Zimmertemp. stehen u. fraktioniert die obere Schicht nach Behandlung mit K_2CO_3 , so erhält man 84% sekundären [Phenyläthyl]-äther, Kp. 280—282°, D. 1,005. — Zimtalcohol. Der bereits bekannte Zimtaläther entsteht, wenn man 100 g Alkohol mit 2 ccm ($\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$) einige Min. auf 115° erhitzt. Dickes, hellgelbes, nach Fenchol riechendes Öl, das sich bei der Dest. zers. Auch bei Zimmertemp. tritt Verätherung mit $\frac{1}{10}$ u. sogar $\frac{1}{15}$ Vol. derselben Säure in einigen Stdn. ein, mit $\frac{1}{2}$ Vol. Säure Selbsterhitzung u. Verharzung. — Aus primärem Phenyläthylalkohol lassen sich, obwohl schwerer wie aus Benzylalkohol (l. c.), auch gemischte Äther darstellen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 612—15.) LINDENBAUM

R. de Forcrand, Über die Einwirkung von Thallium auf gelöste Alkohole, Säuren, sowie auf Wasser und Äthylalkohol im Überschuß. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 176. 20. 873; C. 1923. III. 125. I. 1559.) Vf. hat die Wärmemengen, die bei der Lsg. von Tl u. Na in wss. Lsgg. verschiedener Alkohole u. Säuren entwickelt werden, berechnet u. miteinander verglichen. Folgende Zahlen haben sich ergeben:

cyclo-

	Hexanol	H_2O	$\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{OH}$	$\text{CH}_3\cdot\text{CO}_2\text{H}$	HF	HCl	H_2SO_4
Tl . . . cal.	−14,349	−14,654	− 6,140	− 0,667	+ 1,786	− 0,954	+ 0
Na . . . cal.	+44,050	+44,100	+52,100	+57,400	+60,400	+57,820	+59

Die Differenz zwischen den Tl- u. Na-Werten ist so gut wie konstant u. beträgt 58,522 cal. Das entspricht den wirklichen Verhältnissen. Während Na u. W., Alkoholen u. Säuren heftig reagiert, wirkt Tl nur etwas auf HF u. noch schwächer auf H_2SO_4 ein. — Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn man Tl in W. oder A. verteilt u. Luft oder O durchleitet. Folgende Rkk. treten ein:





und wegen der B. von H_2O exotherm, u. zwar liefert die erste $+19,846$, die zweite $+128$ cal. pro Tl. Die Differenz rührt von der Unlöslichkeit des TiOC_2H_5 her. — Differenz zwischen $-14,654$ u. $-10,372$ (dem errechneten Wert für die Rk.: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = \text{TiOC}_2\text{H}_5 + \text{H}$) einerseits, $+19,846$ u. $+24,128$ andererseits beträgt 2 u. setzt sich annähernd zusammen aus der Neutralisationswärme $+1,216$ im A. u. der Lösungswärme $-3,156$ im Falle W. — Die Differenz zwischen $-14,654$ $-19,846$ einerseits, $-10,372$ u. $+24,128$ andererseits beträgt $34,500$, entsprechend Bildungswärme von $\frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 609—12.) LI.

Roger Adams und B. S. Garvey, *Selektive Reduktion von Citral mit Platinoxyd-schwarz und einem Beschleuniger*. XII. (XI. vgl. TULEY u. ADAMS, S. 1640.)
 rend bei den Reduktionsverss., die bisher mit *Citral* (I) ausgeführt wurden, H_2 zuerst an die der Aldehydgruppe benachbarte Olefin-, dann an die Aldehyd- u. eßlich an die 2. Olefingruppe anlagerte, fanden Vff., daß es bei Benutzung von inoxyd-Platin-schwarz als Katalysator u. Zusatz von Fe- oder Zn-Salz möglich die Aldehydgruppe zuerst zu reduzieren, so daß *Geraniol*, $\text{CH}_3\cdot\text{C}(\text{CH}_3):\text{CH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{C}(\text{CH}_3):\text{CH}\cdot\text{CH}_2\text{OH}$ (II), entstand. Weitere Anlagerung von H_2 ergab *melol*, $\text{CH}_3\cdot\text{C}(\text{CH}_3):\text{CH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (III) u. schließlich *Tetra-ogeraniol*, $\text{CH}_3\cdot\text{CH}(\text{CH}_3)\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{CH}_3)\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\text{OH}$ (IV). — Bei Zu- von wenig FeSO_4 verlief die Red. schnell u. vollständig unter B. von IV. Wurde Red. nach Aufnahme von 1 Mol. Äquivalent H_2 unterbrochen, so entstand II, u. Einw. von 2 Mol. Äquivalenten H_2 bildete sich III. Variation der Eisensalzmenge e keinen Einfluß auf die Rk., durch Erhöhung der Katalysatormenge wurde die hwindigkeit vergrößert. Zinkacetat hatte dieselbe Wrkg. wie FeSO_4 , wenn es eringen Mengen zugesetzt wurde, in größeren Mengen wirkte es als Katalysator. Durch entsprechende Mischung von Fe- u. Zn-Salz konnte man den Verlauf Rk. beliebig regeln. — *Geraniol* wurde mit Platinoxyd-Platin-schwarz unter Wärme- r. reduziert. Die Red. verlief sehr schnell über II zu III. Fe- oder Zn-Salzzusatz en in diesem Falle verzögernd auf die Rk. ein. — Die Resultate sind im Original enmäßig in Tabellen niedergelegt, die Apparatur u. Versuchsanordnung sind den en früheren Arbeiten beschriebenen analog. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. —82. Urbana [Ill.], Univ.)

WINKELMANN.

Henry George Dennett und Eustace Ebenezer Turner, *Orientierungseffekte in Diphenylreihe*. I. $4,4'$ -Dibromdiphenyl sollte nitriert ein s. Nitroderiv. geben, doch e sich, daß die Substitution unsymm. vor sich geht u. fast quantitativ $4,4'$ -Dibrom- $(2,5')$ -dinitrodiphenyl entsteht. Die Nitrierung des $4,4'$ -Dibromdiphenyls haben IG (LIEBIGS Ann. **132**. 206 [1864]) u. SCHULTZ (LIEBIGS Ann. **174**. 218 [1874]) eführt u. ein Nitroderiv. vom F. 148° erhalten. Dieses ist mit dem von den Vff. ltenen Deriv. ident. Aus 2-Nitrobenzidin hergestelltes $4,4'$ -Dibrom-2-nitrodiphenyl es sich als ident. mit dem nach LELLMANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **15**. 2837 2]) hergestellten Mononitroderiv. vom F. 124° u. ist die erste Stufe der Nitrierung Dibromdiphenyls. Weitere Nitrierung liefert das obige Dinitroderiv. vom F. 148° , hes somit eine NO_2 -Gruppe in 2-Stellung trägt. Das Dinitroderiv. reagiert leicht Piperidin zu $4\text{-Brom-4'-piperidino-2,3'-dinitrodiphenyl}$. Das von SCHMIDT u. ULZ (LIEBIGS Ann. **207**. 340 [1881]) hergestellte Dinitroderiv. des $4,4'$ -Dichlor- enyls erweist sich ebenfalls als $4,4'$ -Dichlor-2,3'-dinitrodiphenyl. Aus der Verb. F. 148° läßt sich durch Red. das $4,4'$ -Dibrom-2,3'-diaminodiphenyl gewinnen. ASSER u. SCHULZ (LIEBIGS Ann. **210**. 194 [1881]) haben durch Eliminierung Br eine von ihnen γ -Benzidin genannte Base erhalten, welche nach den angeführten s. als $2,3'$ -Diaminodiphenyl anzusprechen ist. Ferner kondensiert sich Benzidin p-Nitrobenzaldehyd zu einer Verb. II, nicht I (BARZIŁOWSKI, Journ. Russ. Phys.- n. Ges. **23**. 69 [1891]), indem die Verb. sich leicht mit noch einer zweiten Keto- pe kondensiert.

Versuche. 2-Nitrobenzidin liefert über die Diazoverb. 4,4'-Dibrom-2,2'-diphenyl, $C_{12}H_7O_2NBr_2$, aus A. u. Bzl. F. 124°. Durch weitere Nitrierung



4,4'-Dibrom-2,3'-dinitrodiphenyl aus Bzl. F. 148°. Die Verb. mit Piperidin erwärmt 4-Brompiperidin-2,3'-dinitrodiphenyl, $H_{16}O_4N_3Br$, aus A. F. 136°. Das Dinitroderiv. liefert mit $FeCl_3$ reduziert 4,4'-Dibrom-

diaminodiphenyl u. dieses mit Salicylaldehyd kondensiert Disalicyliden-4,4'-dibrom-2,3'-diaminodiphenyl, $C_{26}H_{18}O_2N_2Br_2$, aus Bzl., F. 195°. 4,4'-Dichlordiphenyl nitriert u. das Nitroderiv. mit Piperidin erwärmt 4-Chlor-4'-piperidino-2,3'-dinitrodiphenyl, $C_{17}H_{16}O_4N_3Cl$, aus A. F. 132°. Ditolyl liefert in Eg. mit einem Äquival. HNO_3 nitriert Mononitro-4,4'-ditolyl, $C_{14}H_{13}O_2N$, aus A. F. 91—92°, bei der heftig Nitrierung Dinitro-4,4'-ditolyl, $C_{14}H_{12}O_4N_2$, aus A. u. Eg. F. 119°. Ferner 3,3'-(Dinitro-4,4'-ditolyl aus 4-Jod-2-nitrotoluol durch Erhitzen mit Cu-Bronze u. Dinitrodiphenyl aus m-Jodnitrobenzol. ULLMANN u. FRENTZEL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 726 [1905]) geben eine Vorschrift zur Herst. von 3,5'-Dinitrodiphenyl m-Nitrobenzoldiazoniumsulfat u. $CuCl$, doch haben Vff. bei Nachprüfungen stets m-Chlornitrobenzol in Ausbeuten von 85% erhalten. 3,5'-Dinitrodiphenyl liefert Fe u. $FeCl_3$ reduziert das Diamin u. dieses mit Salicylaldehyd Disalicyliden-diaminodiphenyl, $C_{26}H_{20}O_2N_2$, aus Bzl. F. 176—177°. Das Einwirkungsprod. p-Nitrobenzaldehyd u. Benzidin (II) kondensiert sich mit Salicylaldehyd zu p-Nitrobenzylidensalicylidenbenzidin, $C_{26}H_{19}O_3N_3$, aus Bzl. F. 210°, mit Acetylaceton p-Nitrobenzylidenacetyl-i-propylidenbenzidin, $C_{23}H_{21}O_3N_3$, aus A. F. 185°. (Journ. Soc. London 1926. 476—81. London, Univ.) TAUB

I. A. Pastak, Über Polynitrostilbene. Die Synthese dieser Verbb. aus Polynitrotoluolen u. aromat. Aldehyden nach THIELE u. ESCALES (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2842 [1901]) beruht darauf, daß durch Einführung von NO_2 -Gruppen in die nach Theorie des Vfs. (Rev. gén. des Sciences pures et appl. 36. 70; C. 1925. I. 1864) Stellungen 2, 4 u. 6 des Toluols die innere Unausgeglichenheit des Kerns erhöht das C-Atom des CH_3 somit fester gebunden wird. Dadurch werden die H-Atome CH_3 beweglicher. Ein NO_2 genügt nicht, 2,6-Dinitrotoluol reagiert ebenfalls u. gewöhnlichen Bedingungen nicht, wohl aber 2,4-Di- u. besonders 2,4,6-Trinitrotoluol ebenso 2,4-Dinitro-1-methylnaphthalin. Vf. hat gefunden, daß Pyridin ein recht geeignetes Medium ist. An Stelle von Piperidin als Katalysator kann man auch Piperidin anwenden.

Versuche. 2,4-Dinitrostilben, $C_{14}H_{10}O_4N_2$. Aus 2,4-Dinitrotoluol u. p-Nitrobenzaldehyd in Pyridin + einigen Tropfen Piperidin (Wasserbad, 1 Stde.). Schwefelgelbe Krystalle aus Eg., F. 143—145°. — 2,4-Dinitro-4'-methoxystilben. Mit Anisaldehyd (Zimmertemp., einige Tage). Rote Krystalle aus Eg., F. 162—163°. — 2,4-Dinitro-3'-methoxy-4'-oxystilben, $C_{15}H_{12}O_6N_2$. Mit Vanillin bei 80—100° (2 Stdn.). Rotes Pulver aus Eg., F. 191—192°, ll. in A., Eg. — 2,4-Dinitro-3',4'-methylenedioxystilben. Ebenso mit Piperonal. Rote Krystalle aus Eg., F. 183—184°. — 2,4-Dinitronaphthylphenyläthyl, $C_{18}H_{12}O_4N_2$. Aus 2,4-Dinitro-1-methylnaphthalin u. Benzaldehyd (Zimmertemp., 2 Tage), mit A. fällen. Kupferrote Schuppen aus Bzl. oder Eg., F. 166°, fast unlöslich in A., ll. in Aceton, Chlf. — 2,4-Dinitronaphthyl-3',4'-methylenedioxyphenyläthyl, $C_{19}H_{12}O_6N_2$. Mit Piperonal + Piperazin bei 90—100° ($\frac{1}{2}$ Stde.). Orangefarbige, goldglänzende Schuppen aus Eg., F. 197—198°. — 2,4,6-Trinitro-4'-methylenedioxystilben, $C_{15}H_{11}O_7N_3$. Aus 2,4,6-Trinitrotoluol u. Anisaldehyd + Piperidin (Zimmertemp., 2 Tage). F. 167—168°. — 2,4,6-Trinitrophenylfuryläthyl, $C_{12}H_7O_7N_3$. Mit Furfural (Zimmertemp., 1 Woche), mit A. fällen. Rote Krystalle aus Eg., F. 128°. — 2

nitro-4'-methylstilben, $C_{15}H_{11}O_6N_3$. Mit p-Toluylaldehyd + Piperazin ohne Lösgsm. bei 80—90° ($\frac{1}{2}$ Stde.), dann in A. Citronengelbe Nadeln aus Eg., F. 162—163°. — *2,4,6-Trinitro-3',4'-methylendioxystilben*, $C_{15}H_9O_8N_3$. Ebenso mit Piperonal. Gelbe Krystalle aus Eg. oder Nitrobenzol, F. 159°. — *2,4,6-Trinitro-3'-methoxy-4'-oxy-stilben*, $C_{15}H_{11}O_8N_3$. Mit Vanillin. Rote Krystalle aus Eg., F. 197°, zl. in A. H_2SO_4 . (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 72—77.) LINDENBAUM.


I. A. Pastak, Über *2,4,6,2'',4'',6''-Hexanitro- α,β,γ -triphenylpropan* und seine Isomere. (Vgl. vorst. Ref.) Während die Kondensation von 2,4,6-Trinitrotoluol mit Benzaldehyd bisher nur zum Trinitrostilben geführt hat, erhält man beim Arbeiten mit Pyridin eine andere Verb., die nach den Analysen ein Tetranitrostilben (mit dem Trinitrostilben NO_2 im anderen Benzolkern oder an einer der CH-Gruppen) oder ein *2,4,6,2'',4'',6''-Hexanitro- α,β,γ -triphenylpropan*, $C_6H_2(NO_2)_3 \cdot CH_2 \cdot CH(C_6H_5) \cdot CH_2 \cdot C_6H_5$, sein konnte. Im ersten Fall hätte ein Teil des Trinitrotoluols nitrierend gewirkt, wie Tri- oder Tetranitromethan. Dieser Fall liegt jedoch nicht vor. Die drei kernnitrierten Tetranitrostilbene sind verschieden von der neuen Verb., u. Tetranitromethan wirkt auf derartige Stilbene nicht ein. Daß in der Tat das Triphenylpropaneriv. vorliegt, wurde durch die kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in Trinitrotoluol (S. 2721) bewiesen. Vielleicht addiert sich erst 1 Mol. Trinitrotoluol an den Benzaldehyd, u. der so entstandene sekundäre Alkohol reagiert mit einem zweiten Mol. Trinitrotoluol unter Austritt von H_2O . Der Verlauf der Kondensation wird von der Natur der Aldehyds bestimmt. Anisaldehyd liefert nur Stilbenderiv. (vorst. Ref.), Benzaldehyd liefern fast ausschließlich Triphenylpropaneriv.

Versuche. *2,4,6,2'',4'',6''-Hexanitro- α,β,γ -triphenylpropan*, $C_{21}H_{14}O_{12}N_6$. Aus Komponenten in Pyridin + einigen Tropfen Piperidin oder Piperazin (Zimmer-temp., einige Tage), mit A. fällen. Gelbes Pulver aus Eg., F. 183—185°, lichtempfindlich. — *2,4,6,2'',4'',6''-Hexanitro- α,γ -diphenyl- β -p-tolylpropan*, $C_{22}H_{16}O_{12}N_6$. Mit p-Tolaldehyd (2 Wochen). Citronengelbe, seidige Nadeln aus Eg., F. 183—186°, lichtempfindlich. — *2,4,6,2'',4'',6''-Hexanitro-4'-i-propyl- α,β,γ -triphenylpropan*, $C_{24}H_{20}O_{12}N_6$. Cuminaldehyd. Gelbe, seidige Nadeln aus Eg., F. 202—203°, lichtempfindlich. — *2,4,6,2'',4'',6''-Heptanitro- α,β,γ -triphenylpropan*, $C_{21}H_{13}O_{14}N_7$. Mit m-Nitrobenzaldehyd in geringer Menge neben dem Stilbenderiv. Hellgelb, F. 207—208°, wl. in Eg. — *2,4,6,2'',4'',6''-Hexanitro-3',4'-methylendioxy- α,β,γ -triphenylpropan*, $C_{22}H_{14}O_{14}N_6$. Mit Piperonal. Gelbe Krystalle aus Eg., F. 137—140° (Zers.). (Bull. Soc. Chim. de France **39**. 77—82. Brünn, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

Michele Giua, Der Einfluß der Substituenten auf die Bildung und Stabilität cyclischer Verbindungen. Im Anschluß an frühere Unterss. über die B. von Coumaronen u. Coumarandionen untersucht Vf. die Rk. zwischen Naphthol-2 u. Malonylnitril. Statt des nach dem Verlauf der früheren Rk. zu erwartenden Benzocumarins erhält man die der Malonsäuredinaphthyl-2-ester erhalten, $C_{23}H_{16}O_4$, weiße glänzende Lamellen, die bei Wasserdampfdest. gereinigt, danach aus Eg., F. 146—147°. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **2**. 343—46. 1925. Turin, Scuola d'Ingegneria.) ZANDER.

Ludwig Kalb und **Otto Groß**, Über die Darstellung von Aldehyden durch Oxydation primärer Säurehydrazide. Bei der Oxydation von Benzhydrazid in alkal. Lsg. erhalten CURTIUS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **33**. 2559; C. **1900**. II. 900) u. DARAPSKY (Ann. f. prakt. Ch. [2] **76**. 464; C. **1908**. I. 452) Benzalbenzoylhydrazin, allgemein Benzaldehydhydrazone genannt. Letzterer nimmt als Zwischenprod. Benzaldehyd an, während CURTIUS glaubt, daß sich das Hydrazid zu N, N'-Dibenzoylhydrazin u. Hydrazin umproportioniert u. letzteres das Dibenzoylhydrazin zum Benzaldehyd reduziert. Auch im letzteren Fall nehmen Vf. eine Autoxydation an u. beabsichtigen, die Benzaldehydhydrazoneoxydation zu einer präparativen Aldehyddarstellungsmethode zu gestalten. (Vgl. auch) CURTIUS, ähnlich wie ST. GOLDSCHMIDT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **46**. 1529. 2300; C. **1913**. II. 35. 857) beim Phenylhydrazin, eine Dehydrierung des Säurehydrazids

zu hypothetischen, labilen Acyldiimin an, die unter Abspaltung von Sticks in Aldehyd übergehen. Um die besten Oxydationsbedingungen festzustellen, wurden Benzhydrazid mit PbO_2 oder MnO_2 bei Ggw. von H_2O oder NH_4OH , mit Fehlings Lsg., mit K_2CrO_4 u. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, Phosphorsalz oder Borax, mit Kaliumferricyanid Ggw. von NaHCO_3 , MgO oder NH_4OH oxydiert. Kaliumferricyanid u. NH_4OH die besten Ausbeuten, doch waren diese sehr von der Art des Hydrazids abhängig. Die Hydrazide der unsubstituierten Benzoe- u. 2-Naphthoesäure, der *p*-Methylbenzoesäure, der Trimethyläthergallussäure gaben die besten Ausbeuten, o- u. p-, wenn m-substituierte gaben schlechte Ausbeuten, o-Nitro- u. p-Hydroxylgruppen verhindern die Aldehydbildung. Auch aliphatische Hydrazide gaben keine Aldehyde. Die von sekundären Hydraziden scheint nicht über Acylhydrazone zu gehen, da Benzoylhydrazon sich nicht zu N,N'-Dibenzoylhydrazin weiteroxydieren ließ. In einzelnen Fällen wurden sekundäre Hydrazide erhalten. B. von Acylhydrazon findet nur in alkal., am besten ammoniakal., Lsg. statt, wobei aber zuweilen große Mengen Säure entstehen; diese sind nie zu vermeiden und nehmen mit steigender Alkalität zu. Vielleicht geht diese Reaktion über eine reaktionsfähige Vorstufe Aldehyds oder über freie Acyle, die von WIELAND (LIEBIGS Ann. 446. 31; S. 11) nachgewiesen wurden, denn fertige Aldehyde werden von Kaliumferricyanid u. N. kaum angegriffen. — Bei der Oxydation von *p*-Tolonylhydrazidin erhielten Vff. Einklang mit PINNER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 1874; C. 97. II. 752. 9), der aus Benzenylhydrazidin Diphenyldihydrotriazol bekam, das *Di-p*-tolonyldihydrotriazol, wobei starker Geruch nach Tolunitril auftrat. Da die Dihydrotriazole bei der Hydrolyse Aldehyde geben, halten Vff. es für wahrscheinlich, daß primär Aldehyd bzw. Aldehydimid auftritt u. fassen die Oxydation der Hydrazidine an der Hydrazidoxydation nach folgendem Schema auf, nur mit dem Unterschied, daß bei den ersteren die Imidogruppe Ringschluß veranlaßt.



Versuche. Die Hydrazide der Benzoesäure u. 4-Methylbenzoesäure gaben bei der Oxydation die Aldehyde (60%). — 2-Chlorbenzoylhydrazin, $\text{C}_7\text{H}_7\text{ON}$ F. 109—110°, gab 32% Aldehyd. — 2-Brombenzoylhydrazin gab 2-Brombenzaldehyd (51%). Isoliert als *p*-Nitrophenylhydrazon, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_3\text{Br}$. F. 240—241°. — 3-Brombenzoylhydrazin gab mit 2 Moll. $\text{Fe}(\text{CN})_6\text{K}_3$, 3-Brombenzaldehyd, mit 1 Mol. dagegen 3-Brombenzal-3'-brombenzoylhydrazin, $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{ON}_2\text{Br}_2$, F. 164—165°. — 4-Brombenzoylhydrazin gab 9% 4-Brombenzal-4'-brombenzoylhydrazin u. 45% Aldehyd. — 3-Nitrobenzoesäure gab 16% Acylhydrazon u. 23% Aldehyd. — 2-Aminobenzoylhydrazin gab 26% Aldehyd. — 3-Aminobenzoylhydrazin gab 52% Aldehyd. — 4-Aminobenzoylhydrazin gab 34% Aldehyd. — 2-Oxybenzoylhydrazin gab 24% Acylhydrazon 37% Aldehyd. — 3-Oxybenzoylhydrazin gab 53% Aldehyd. — 2-Methoxybenzoylhydrazin, $\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_2\text{N}_2$, F. 80—81°, Chlorhydrat, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl}$, F. 194—195°, gab 11% 2-Methoxybenzal-2'-methoxybenzoylhydrazin, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}_2$, F. 147—148°, u. 30% Aldehyd als 2-Methoxybenzaldehyd-4-nitrophenylhydrazon, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}_3$. Rote Nadeln aus A. F. 206—208° (geringe Zers.). — 4-Oxy-3-methoxybenzoylhydrazin, $\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_3$ F. 211—212°, gab 4,4'-Dioxy-3,3'-dimethoxy-N,N'-dibenzoylhydrazin, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_6$ Nadeln aus A. F. 263° unter Zers. Vanillin war nicht nachweisbar. — 3,4,5-trimethoxybenzoylhydrazin, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_2$, F. 158—159°, gab 58% Aldehyd u. 10% 3,4,5-trimethoxybenzal-3',4',5'-trimethoxybenzoylhydrazin, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_7\text{N}_2$, F. 232—233°, liess sich nicht durch Kochen mit verd. H_2SO_4 spalten. Bei der Oxydation mit Phosphor

statt NH_3OH bei 60° bildete sich 3,4,5,3',4',5'-Hexamethoxy-N,N'-dibenzoylrazin, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_8\text{N}_2$, F. 177° . — 2-Nitro-5-aminobenzoesäureäthylester, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2$, als Krystalle aus A. F. $107,5^\circ$. 2-Nitro-5-aminobenzoylhydrazin, $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_4$. Bei Oxydation entstand weder Aldehyd noch ein N-haltiges Oxydationsprod. — Phthalaldehyddibenzoylhydrazid gab 50% Aldehyd, der als i-Phthalaldehyddibenzoylhydrazon, $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{N}_4$, F. $247,5^\circ$, isoliert wurde. — Primäres Diphenylsäuredihydrazid, $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_4$, F. $215-216^\circ$. Dibenzalverb. $\text{C}_{28}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{N}_4$, F. 178° . Oxydation des Dihydrazids gab primäres Diphenylsäuremonohydrazid (I oder II), $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N}_2$, F. 164° . Unl. in Na-Diäthylatlg. daher Formel II wahrscheinlich, geht leicht in sekundäres Diphenylsäuremonohydrazid, $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$ (III), vom F. 250° (unter Zers.) über. — 2-Naphtoesäuremonohydrazid gab 55% Aldehyd. — Cinchoninsäurehydrazid gab keinen Aldehyd, sondern sekundäres Cinchoninsäurehydrazid, $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_4$, F. 179° . (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 727—37.; München, Bayer. Akad. d. Wiss.)

BRAUNS.


L. Chas. Raiford und E. P. Clark, Verhalten gemischter-O-Acyl-N-acylderivate, in denen die reagierenden Gruppen nicht an benachbarten C-Atomen sitzen. Die Acetylbenzoylderiv. verschiedener Basen mit einer NH_2 - u. OH -Gruppe, von denen sich eine in einer Seitenkette befindet, wurden untersucht um festzustellen, ob sich der Rest umlagerte. — Benzoylierung von 2-Oxy-3,5-dibrombenzylacetanilid, Nadeln, F. 150° , gab ein stabiles O-Benzoyl-N-acetylderiv., das keine Neigung sich umzulagern zeigte. — Aus o-Aminobenzylalkohol wurden Diacylderiv. erhalten, die ebenfalls keine Wanderung von Acyl zeigten: o-Acetylaminobenzylbenzoat, Blättchen, F. 110° , Bzl. u. Lg. o-Acetylaminobenzylacetat, Stäbchen, F. 95° , l. in Bzl. u. Lg. o-Acetylaminobenzylalkohol, Nadeln, F. 116° , l. in Bzl. o-Benzoylaminobenzylbenzoat, Nadeln, F. $131-132^\circ$, l. in A. o-Benzoylaminobenzylalkohol, Stäbchen, F. 95° , l. in Bzl. o-Benzoylaminobenzylacetat, Nadeln, F. 115° , l. in Lg. — Die Acetylbenzoylderiv. des 4-Amino-4-oxydiphenyls hatten auch nicht die Tendenz sich umzulagern: 4'-Benzoyl-4-amino-4-oxydiphenyl, F. $273-274^\circ$, l. in Pyridin u. A., hydrolysierte sich mit verd. KOH -Lsg. zu 4'-Benzoylamino-4-oxydiphenyl, Platten, F. 284° , l. in Amylalkohol, das beim Acetylieren 4'-Benzoylamino-4-acetyloxydiphenyl gab, Nadeln, F. 127° , l. in Amylalkohol. Aus 4'-Benzoylamino-4-acetyloxydiphenyl, Stäbchen, F. $219-220^\circ$, l. in Chlf. entstand durch Hydrolyse 4'-Acetylamino-4-oxydiphenyl, Prismen, F. $224-225^\circ$, l. in verd. A., das beim Benzoylieren übergang in 4'-Acetylamino-4-benzoyl-4-oxydiphenyl, Blättchen, F. $254-255^\circ$, l. in Butylalkohol. — Vom 8-Amino-1-naphthol wurde nur ein Acetylbenzoylderiv. erhalten, obwohl der Säurerest in beiden möglichen Folgen eingeführt wurde. Es muß in einem Falle also eine Umlagerung stattgefunden haben. 8-Benzoylamino-1-benzoyloxynaphthalin, Nadeln, F. $207-208^\circ$, l. in A., hydrolysierte sich zu 2-Benzoylamino-1-oxynaphthalin, Platten, F. 216° (Zers.), l. in A., das leicht in 8-Benzoylamino-1-acetyloxynaphthalin, kurze Nadeln, F. 180° , l. in A., überzuführen war. 8-Acetylamino-1-acetoxynaphthalin, Platten, F. 118° , l. in A. u. W. 8-Acetylamino-1-oxynaphthalin, Platten, F. 181° , l. in A. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 483—89. Iowa, Univ.)

WINKELMANN.

A. Kliegl, Albert Wunsch und Reinhold Weigele, Isomerie bei Fluoren-9-yl-derivaten. Das von J. SCHMIDT u. BAUER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 3757; C. 6. I. 40) durch Erhitzen der Diphenylenglykolsäure mit Essigsäureanhydrid erhaltene Isomere konnten weder SCHMIDT u. MEZGER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 3; C. 1907. I. 166) noch Vff. wieder erhalten. Stets entstand O-Acetyldiphenylenglykolsäure (I). Auch den von SCHMIDT u. STÜTZEL (LIEBIGS Ann. 370. 19; C. 1910. 177) erhaltenen Benzoesäurefluorenyl-ester von F. 161° konnten Vff. nicht wieder erhalten, sondern sie erhielten immer die schon von STAUDINGER u. GAULE (Ber.

see
erata
P. 3977

Dtsch. Chem. Ges. **49**. 1957; C. **1916**. II. 887) beschriebene Verb. vom F. 101—102°. Das niedrig schmelzende Acetofluoren ist mit dem von BARBIER (Ann. Chim. Phys. [5] **7**. 506 [1876]) aus Essigsäureanhydrid u. Fluorenalkohol erhaltenen Produkt identisch. Die angebliche β -Verb. ist der Fluorenylester der O-Acetyldiphenylglykolsäure (II); denn sie gibt beim Verseifen Fluorenalkohol, Essigsäure u. Diphenylglykolsäure; Spaltung mit Eg.-HBr gibt 9-Bromfluoren u. Diphenylglykolsäure und Erhitzen mit A. auf 200° gibt nicht, wie SCHMIDT u. MEZGER angeben, α -Verb., sondern unter Abspaltung von CO₂ 9-Äthoxyfluoren (IV), Essigester Fluorenalkohol (III). Dies wird bestätigt durch die Synthese von II aus Diphenylchloroessigsäure u. aus I, das sich zum Diphenylglykolsäureester der O-Acetyldiphenylglykolsäure (V) kondensieren läßt, der beim Erhitzen mit Essigsäureanhydrid C unter B. von II abspaltet, die nur bei Abwesenheit von Essigsäure glatt verläuft, sonst Spaltung in 9-Acetofluoren u. CO₂ eintritt, wodurch die geringe Ausbeute II bei SCHMIDT u. MEZGER erklärt wird. Mit Anilin bildet V 9-Anilinofluoren. Von den 9-Aminofluorenen haben schon KUHN u. JACOB (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1432. 2232; C. **1925**. II. 2207. **1926**. I. 655) mitgeteilt, daß die β -Verb. v. SCHMIDT u. STÜTZEL CO₂-haltig sei. Vff. fanden, daß α -Aminofluoren lebhaft C unter B. des 9-Aminofluorensalzes der Fluorenyl-9-carbaminsäure (VI) aufnimmt. An die Existenz des γ -Aminofluorens glauben Vff. nicht, das Acetat desselben sei die von KERP (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **29**. 231; C. **96**. I. 598) beschriebene Verb. vom F. 161° sein. Es ist nicht gelungen, durch fraktionierte Krystallisation des Chlorhydrats, der freien Base u. der Acetylverb. zu einem Isomeren zu gelangen. Da sich KERPS Verb. leicht aus Aminofluoren u. essigsäurehaltigem Essigester bilden, halten Vff. es für zweifelhaft, ob dieses bei 161° schmelzende Acetat mit der von KERP als „Diphenylmethylenamin“ beschriebenen Verb. identisch ist; sie glauben, daß bei der F.-Angabe ein Druckfehler (lies 61° statt 161°) unterlaufen ist. Weder das Chlorhydrat noch die freie Base aus KERPS Verb. unterschied sich von den entsprechenden Verbb. des α -Aminofluorens. Ein zwischen 45° u. 50° schmelzendes Prod. schmolz nach dem Umkrystallisieren unter CO₂-Ausschluß bei 61,5—62,5°.




Versuche. O-Acetyldiphenylglykolsäure, C₁₆H₁₂O₄ (I), krystallisiert aus Toluol mit 1/2 Mol. C₇H₈. F. (toluolfrei) 190° unter Zers. — Diphenylglykolsäureester der O-Acetyldiphenylglykolsäure (O-[Diphenylacetoxyl]-acetyldiphenylglykolsäure), C₃₀H₂₀O₆ (V). Aus I durch Erhitzen mit C₇H₈ (3 Stdn.). F. 207—209°. O-Acetyldiphenylglykolsäurefluorenylester, C₂₂H₂₀O₄ (II), aus V durch Erhitzen mit Essigsäureanhydrid, oder aus Diphenylchloroessigsäurefluorenylester (C₂₇H₁₇O₂) F. 209,5—210° u. Silberacetat. Krystalle aus Eg. F. 208°. — 9-Anilinofluoren, C₁₉H₁₅N, aus V mit Anilin. F. 121—122°. — 9-Äthoxyfluoren, C₁₅H₁₄O, aus II durch Erhitzen (20 Stdn.) mit A. im Einschlußrohr. F. 54°. — Fluorenylcarbaminsäureester, C₂₇H₂₂O₂N₂ (VI), F. unscharf bei 124—125°. — Benzoesäurefluorenylester, C₂₀H₁₄O₂, F. 101—102°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 631—41. Tübingen Univ.)

BRAUNS.


Edwin H. Shaw, jr. und E. Emmet Reid, Einige Derivate des Äthylselenomercaptans. Die Tschugajewsche Darst.-Methode des Äthylselenomercaptans (I) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **42**. 49; C. **1909**. I. 517) wurde verbessert, so daß im Durchschnitt eine Ausbeute von 40% erhalten wurde, es wurden dann verschiedene Derivate hergestellt. Die Verss. wurden in einer im Original genau beschriebenen Apparatur ausgeführt. — Durch Kondensation mit Ketonen (Aceton, Methyläthyl-

ton u. Diäthylketon) entstanden die Verb. 2,2-Bis-[selenoäthyl]-propan, $(\text{CH}_3)_2\text{C} \cdot (\text{C}_2\text{H}_5)_2$, Kp. 81°, D.₀ 1,4577, 2,2-Bis-[selenoäthyl]-butan, $\text{CH}_3(\text{C}_2\text{H}_5) \cdot \text{C}(\text{SeC}_2\text{H}_5)_2$, Kp. 91,5°, D.₀ 1,4294, 3,3-Bis-[selenoäthyl]-pentan, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{C}(\text{SeC}_2\text{H}_5)_2$, Kp. 91,5°, D.₀ 1,3825. — Oxydation der Selenomercaptole ergab: Verb. $\text{H}_5\text{SeO}_2\text{H} \cdot \text{HNO}_3$ (II), dünne Platten, F. 80° (korr.), zers. sich bei 100°, ll. in W. konz. wss. Lsg. gibt bei Behandlung mit HCl das Hydrochlorid $\text{C}_2\text{H}_5\text{SeO}_2\text{H} \cdot \text{HCl}$, welches bei 100–107° schmilzt u. sich zersetzt. Äthylseleniumtribromid, $\text{C}_2\text{H}_5\text{SeBr}_3$, II durch Behandlung mit HBr in 89%ig. Ausbeute, stellt einen neuen Typus dar, dem keine analoge Schwefelverb. bekannt ist, zers. sich bei 73°. — Durch Einw. β, β' -Dichloräthylsulfid, -sulfoxyd u. -sulfon auf Natriumäthylselenomercaptan (III) entstanden: Bis-[β -äthylselenomercaptoäthyl]-sulfid, $(\text{C}_2\text{H}_5\text{SeCH}_2\text{CH}_2)_2\text{S}$, F. 15°, Kp. 4°, D.₂₅ 1,4724. Bis-[β -äthylselenomercaptoäthyl]-sulfoxyd, $(\text{C}_2\text{H}_5\text{SeCH}_2\text{CH}_2)_2\text{SO}$, lt zersetzlich, l. in A. Bis-[β -äthylselenomercaptoäthyl]-sulfon, $(\text{C}_2\text{H}_5\text{SeCH}_2\text{CH}_2)_2\text{SO}_2$, 72,5°. Aus β, β' -Dichloräthylsulfid u. III entstand als Nebenprod. ein Körper, der 91,5° schmolz u. dessen Analyse u. Mol.-Gew. auf eine Verb. $\text{Se}(\text{C}_2\text{H}_4\text{SC}_2\text{H}_4\text{SeC}_2\text{H}_5)_2$ sen. — Mit Anthrachinon-1-butylsulfon-5-natriumsulfonat (IV), bildete III Anthra-



non-1-butylsulfon-5-äthylselenid (V) in 30%ig. Ausbeute, rote Nadeln (aus W.), molz noch nicht bei 300°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 520–28. Baltimore, HNS HOPKINS Univ.) WINKELMANN.

George Hallatt Christie und James Kenner, Molekularkonfigurationen mehrerer aromatischer Verbindungen. V. Die Identität der Nitrierungsprodukte von 2,7-4,5-Dinitrophenanthrachinon. (IV. vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 1948; 1923. III. 1569) CHRISTIE u. KENNER (Journ. Chem. Soc. London 123. 779; 1923. III. 136) haben durch Nitrieren von 2,7-Dinitrophenanthrachinon 2,4,7-nitrophenanthrachinon erhalten. Das 4,5-Dinitroderiv. I von SCHMIDT u. KÄMPF (Dtsch. Chem. Ges. 36. 3745 [1903]) sollte bei der Nitrierung das 2,4,5-Deriv. II sein, doch liefert die Oxydation dieses Nitrierungsprod. die Diphensäure III, aus der durch weitere Nitrierung 4,6,4',6'-Tetranitrodiphensäure entsteht. Die Aufng der Säure III in die opt.-akt. Komponenten zeigt ihre Identität mit der 4,6,4'-nitrosäure. Die Identität der beiden Nitrierungsprodd. folgt ferner auch aus der Identität der mit o-Phenylendiamin aus den Chinonen hergestellten Chinoxaline. 6'-Dinitrodiphensäure gibt bei der Red. IV, analog auch die 4,6,4',6'-Tetranitrodiphensäure V. Die Trinitrodiphensäure gibt jedoch analog reduziert eine Aminosäure, die sowohl in Alkali wie in Säuren l. ist, was auf ein 4,6,4'-Deriv., vom 2,4,7-Triphenanthrachinon abgeleitet, hindeutet. 3,3'-Dinitrobenzil liefert bei der Nitrierung leicht 3,5,3',5'-Tetranitrobenzil, dessen Konst. aus der Oxydation zu 3,5-Dinitrooesäure folgt.



Versuche. 4,5-Dinitrophenanthrachinon liefert bei der Nitrierung 2,4,7-Trinitrophenanthrachinon, $C_{14}H_5O_8N_3$, aus Bzl. mit $1 \cdot C_6H_6$, F. 209°. Mit o-Phenylendiamin hieraus das *Chinoxalin*, $C_{20}H_9O_6N_5$, aus Bzl. F. 307°. Aus 2,4,7-Trinitrophenanthrachinon mit $K_2Cr_2O_7$, 4,6,4'-Trinitrodiphenensäure, $C_{14}H_7O_{10}N_3$, F. 292°. *Chinin*-4,6,4'-trinitrodiphenat, $C_{54}H_{55}O_{14}N_7$, F. 222,5° (Zers.) in 10-n. Eg. $[\alpha]_D^{19} = -156,1$. *Chinin*-l-4,6,4'-trinitrodiphenat, F. 176° (Zers.) in Chlf. $[\alpha]_D^{19} = -77,5^\circ$. *Chinidin*-Salz, F. 228°, $[\alpha]_D = -189,2^\circ$ (Chlf.) u. *Chinidin*-d-Salz, F. 178°, $[\alpha]_D = +101$. (Chlf.). d-4,6,4'-Trinitrodiphenensäure, F. 281—282° (Zers.) in Ä. $[\alpha]_D = +23,47^\circ$, N-Salz, $[\alpha]_D = -149,0^\circ$. l-4,6,4'-Trinitrodiphenensäure, F. 280—282°, in Ä. $[\alpha]_D = -15,1$. Na-Salz, $[\alpha]_D = +136,6^\circ$. 4,6,4',6'-Tetranitrodiphenensäure gibt mit $SnCl_2$ u. H reduziert Verb. $C_{14}H_{10}O_2N_4$ (V), Sulfat, kein F. bis 300°. 4,6,4'-Trinitrodiphenensäure gibt analog reduziert Verb. $C_{14}H_{11}O_3N_3$, Dinitrobenzil liefert mit HNO_3 u. H_2S nitriert 3,5,3',5'-Tetranitrobenzil, $C_{14}H_6O_{10}N_4$, aus Bzl. F. 168°, *Chinoxalinderivat* $C_{20}H_{10}O_8N_6$, F. 274°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 470—76. Sheffield, Univ.) TA

John R. Johnson und W. L. Mc Ewen, Die Identifizierung von monosubstituierten Acetylenen. *Derivate des Diäthynylquecksilbers*. Es wurden Hg-Salze vom Typ $(R-C\equiv C)_2Hg$ hergestellt, in denen R eine aliph., aromat. u. gemischte aliph. aromat. Gruppe darstellt. Die Salze eignen sich gut zur Identifizierung u. Charakterisierung der entsprechenden Acetylene. — Allgemeine Darst. der Hg-Salze. In eine gekühlte, verd. alkal. Lsg. von 2 Moll. Mercurijodid (oder -cyanid) wurde langsam, unter Umrühren 1 Mol. der Acetylenverb. in 95%ig. A. gegeben. Das ausfallende Hg-Salz wurde aus A. oder Bzl. gereinigt. — *Methylacetylen* gab auf diese Weise *Dipropinylquecksilber*, $C_6H_6Hg = (CH_3-C\equiv C)_2Hg$, F. 203—204°. Analog entstand *Dibutinylquecksilber*, $C_8H_{10}Hg = (C_2H_5-C\equiv C)_2Hg$, Nadeln, F. 163 bis 163°. — *Di-[3,3-dimethylbutinyl]-quecksilber*, $C_{12}H_{18}Hg = (tert.-C_4H_9-C\equiv C)_2Hg$, aus *tert. Butylacetylen*, F. 91—92°. — *Di-n-heptinylquecksilber*, $C_{14}H_{22}Hg = (n-C_5H_{11}-C\equiv C)_2Hg$, aus *n-Amylacetylen*, Nadeln, F. 61°. — *Di-n-decylquecksilber*, $C_{20}H_{34}Hg = (n-C_8H_{17}-C\equiv C)_2Hg$, aus *n-Octylacetylen* (I), Nadeln, F. 83—84°. Für I wird eine neue Darst.-Methode angegeben: aus n-Heptylmagnesiumbromid 2,3-Dibrompropen-1 in Ä. entstand in 60%ig. Ausbeute 2-Bromdecen-1, farbloses Öl, Kp.₂₂ 115—116°, D.₄ 1,1044, D.₂₀ 1,0844, $n_D^{20} = 1,46290$, welches mit Natriumamid I bildete (Ausbeute 68%, Kp.₂₂ 80—82°). — *Diphenyläthynylquecksilber*, $C_{16}H_{10}Hg = (C_6H_5-C\equiv C)_2Hg$, aus *Phenylacetylen* in 90%ig. Ausbeute, Blättchen, F. 124 bis 125°. — *Diphenylpropinylquecksilber*, $C_{18}H_{14}Hg = (C_6H_5-CH_2-C\equiv C)_2Hg$, aus *Benzylacetylen*, F. 106,5—107,5. — *Diphenylbutinylquecksilber*, $C_{20}H_{18}Hg = (C_6H_5-CH_2-CH_2-C\equiv C)_2Hg$, aus *Phenetylacetylen* (II), bildet farblose Krystalle, F. 83 bis 84,5°. II wurde außer nach der bekannten Methode (ANDRÉ, Ann. Chim. et Phys. [8] 29. 550; C. 1913. II. 1142) analog I aus 4-Phenyl-2-brombuten-1 dargestellt. Letzteres wurde nach dem Grignardschen Verf. in 44%ig. Ausbeute gewonnen, farbloses Öl, Kp.₂₁ 117—118°, D.₄ 1,2901, $n_D^{20} = 1,5450$. — *Di-p-tolyläthynylquecksilber*, $C_{18}H_{14}Hg = (p-CH_3-C_6H_4-C\equiv C)_2Hg$, aus *p-Tolylacetylen* in 75%ig. Ausbeute, Nadeln, F. 111 bis 202° (unter Voranheben der Schwärzung). — *Di-p-anisyläthynylquecksilber*, $C_{18}H_{14}Hg = (p-CH_3O-C_6H_4-C\equiv C)_2Hg$, aus *p-Anisylacetylen* in 95%ig. Ausbeute, F. 122 bis 209° (Schwärzung). — *Dicyclohexylpropinylquecksilber*, $C_{18}H_{26}Hg = (C_6H_{11}-CH_2-C\equiv C)_2Hg$, aus *Hexahydrobenzylacetylen* (Kp.₁₅ 55—58°) in 78%ig. Ausbeute, Nadeln, F. 104°. — *Diphenoxypropinylquecksilber*, $C_{18}H_{14}O_2Hg = (C_6H_5 \cdot O \cdot CH_2-C\equiv C)_2Hg$, aus *Phenoxymethylacetylen* (Kp.₂₀ 87°) in 84%ig. Ausbeute, Nadeln, F. 120,5—121°. — *Dichloräthynylquecksilber*, $C_4Cl_2Hg = (Cl-C\equiv C)_2Hg$, F. 185°, Zers. bei 195°. — *Dibromäthynylquecksilber*, $C_4Br_2Hg = (Br-C\equiv C)_2Hg$, Zers. bei 153—155°. — *[Furyl-(2')-äthynyl]-quecksilber*, $C_{12}H_6O_2Hg = (C_4H_3O-C\equiv C)_2Hg$, F. 118—118,5°. — *Di-[5'-bromfuryl-(2')-äthynyl]quecksilber*, $C_{12}Br_2O_2Hg = (BrC_4H_2O-C\equiv C)_2Hg$, F. 118 bis 177°. — *Phenylmethylacetylen*, welches den Typus $(R-C\equiv C-R')$ repräsentiert

lete kein Hg-Salz. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 469—76. Urbana [Illinois], iv.)

WINKELMANN.

Arnold Reißert und **Friedrich Lemmer**, *Berichtigung*. (Vgl. S. 2348.) Ein Teil aus dem o-Nitrophenylanilinoacetonitril dargestellten Indazolverb. sind schon von **LLER** u. **SPIELMEYER** (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 834; C. **1925**. II. 301) beschrieben. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 865. Marburg, Chem. Inst.)

BRAUNS.

A. Beretta, *Der Phthalsäure analoge Triazol-o-dicarbonensäuren*. Die 2-Phenyl-3-triazol-4,5-dicarbonensäure entsteht leicht bei der Oxydation der entsprechenden 2-triazolderiv., u. zwar des 5-Amino-2-phenyl-1,2,3-benztriazols u. des 6-Methyl-2-phenyl-1,2,3-benztriazols, mit KMnO_4 in alkal. Lsg. Die Ggw. der Amino-2-phenyl-1,2,3-benztriazols so weit herab, daß die Oxydation leicht erfolgen kann. — 2-Phenyl-1,2,3-triazol-4,5-dicarbonensäure, $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O}_4\text{N}_3$, farblose Prismen aus W. oder verd. HCl, F. 255° (Zers.). — Anhydrid, $\text{C}_{10}\text{H}_5\text{O}_3\text{N}_3$, aus vorigem durch Erhitzen im Ölbad auf 255° , prismat. Nadeln durch Sublimation, F. 174° . — Triphenylfluorescein, $\text{C}_{22}\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_3$, aus vorigem u. Resorcin durch Erhitzen im Ölbad auf 180° bis 200° , Zusatz von ZnCl_2 u. weiteres 2-stdg. Erhitzen auf 210° , Reinigung durch Umfällen in alkal. Lsg. mit HCl, rotes amorphes Pulver; die alkal. Lsg. fluoresciert grünlich. — Triazoleosin, $\text{C}_{22}\text{H}_9\text{O}_5\text{N}_3\text{Br}_4$, aus vorigem in alkoh. Suspension u. alkoh. Br., Reinigung aus alkoh. Lsg. durch Verdampfen des Lösungsm., intensiv rotes Pulver; die Lsgg. sind intensiv rot u. fluorescieren gelbgrün. — Das Anhydrid bildet mit m-Diäthylaminophenol das entsprechende Rhodamin. — 1-Phenyl-1,2,3-triazol-4,5-dicarbonensäure, $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O}_4\text{N}_3$, aus 5-Amino-1-phenylaziminobenzol (dieses aus 5-Nitrophenylaziminobenzol durch Red. mit Zinkstaub, farblose oder schwach gelblich gefärbte Nadeln aus A., F. 158 — 159°) durch Oxydation in alkal. Lsg. mit Kaliumpermanganat, farblose Prismen aus W., F. 149 — 150° . (Gazz. chim. ital. **55**. 788 bis 790. 1925. Pavia, Univ.)

ZANDER.

William Henry Perkin, jr. und **William Greenwell Sedgwick**, *Tetrahydroacridin, Octahydroacridin und ihre Derivate*. II. Auflösung der Octahydroacridine A u. B. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London **125**. 2437; C. **1925**. I. 652.) Die Red. des Octahydroacridins mit Sn u. HCl liefert zwei Octahydroacridine A u. B, u. zwar die re **I** u. **II**, welche sich in die d- u. l-Komponenten zerlegen lassen. Die Auflösung erfolgt über die Salze mit d- u. l-Camphersulfosäure erreichen, u. es entstehen so d-Octahydroacridin A, F. 85° , $[\alpha]_D = -32^\circ$, d-Octahydroacridin A, F. $84,5^\circ$, $[\alpha]_D = +4^\circ$, l-Octahydroacridin B, F. 73° , $[\alpha]_D = -24^\circ$, d-Octahydroacridin B, F. 73° , $[\alpha]_D = +22^\circ$. Durch Erhitzen werden die akt. Verb. inaktiviert, vollständig durch Erhitzen unter vermindertem Druck. Mit Essigsäureanhydrid liefert l-Octahydroacridin A Acetylderiv. des d,l-Octahydroacridins (l. c.). Da die Red. des Tetrahydroacridins mit Na-Amalgam ausschließlich Verb. A liefert, geben Vff. ihr die Formel **I**, dem l-Octahydroacridin B die Formel **II**. 1-Methyl-cyclo-hexan-3-on kondensiert sich mit m-oxobenzaldehyd oder Isatin zu 6(8)-Methyltetrahydroacridin, F. 71° oder 6(8)-Methyltetrahydroacridincarbonensäure, F. 296° . Ersteres läßt sich mit Sn u. HCl zu 6(8)-Methyloctahydroacridin A vom F. 92° u. B vom F. 80° reduzieren. Die Red. mit Na-Amalgam gibt ausschließlich A, welches sich mit Camphersulfosäure in die akt. Komponenten $[\alpha]_D = +20^\circ$ u. $[\alpha]_D = -28^\circ$ auflösen läßt.

Versuche. d,l-Octahydroacridin A liefert mit d-Camphersulfosäure l-Octahydroacridin A-d-camphersulfonat, $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{O} \cdot \text{SO}_3\text{H}$, aus A. F. 182° . Durch Erhitzen mit $\frac{1}{10}$ -n. NaOH l-Octahydroacridin A, $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{N}$, aus A. F. 85° , $[\alpha]_D = -32^\circ$. Analog mit l-Camphersulfosäure d-Octahydroacridin A, F. $84,5^\circ$, $[\alpha]_D = +34^\circ$. d,l-Octahydroacridin B liefert mit d-Camphersulfosäure l-Octahydroacridin B-d-camphersulfonat, aus A. F. 172° , mit $\frac{1}{10}$ -n. NaOH, hieraus l-Octahydroacridin B, $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{N}$, PAe. F. 73° , $[\alpha]_D = -24^\circ$. Analog mit l-Camphersulfosäure d-Octahydroacridin B, F. 73° , $[\alpha]_D = +22^\circ$. Die Salze des Hydroacridins B sind in wasserfreiem A. wesentlich

in W. (blau), unl. in Ä., Bzl. H_2SO_4 -Lsg. bordeauxrot, mit W. rot, dann orange-
gelb, nach Neutralisieren blau. (Helv. chim. Acta **9**. 216—20.) LINDENBAUM.

F. Kehrmann und Friedrich Brunner, *Versuche zur Synthese von Carbazinderivaten aus Naphthalins*. VII. Mitt. über farbige Derivate des Tetraphenylmethans. (VI. vgl. vorst. Ref.) Die von KEHRMANN, RAMM u. SCHMAJEWSKI (3. Mitt.) aufgefundene Synthese von nitrirten Diphenylcarbazinen wurde auf die Naphthalinreihe zu übertragen versucht. Kocht man den Toluolsulfonsäureester des Dinitro- α -naphthols (kartusgelbs) mit o-Aminotriphenylmethan in gleichen Teilen A. u. Bzl., so erhält man o-[Dinitronaphthylamino]-triphenylmethan, $\text{C}_{29}\text{H}_{21}\text{O}_4\text{N}_3$, citronengelbe Krystalle aus A.-Bzl., F. 220° (Zers.). Die alkoh. Lsg. wird mit konz. KOH blaurot, doch konnte das K-Verb. nicht in fester Form erhalten werden. Verss., durch Ringschluß zum Carbazinderiv. zu gelangen, sind bisher gescheitert. — o-[Diaminonaphthylamino]-triphenylmethan, $\text{C}_{29}\text{H}_{25}\text{N}_3$. Mit $\text{SnCl}_2 + \text{Sn}$ u. HCl in sd. A. Nach Entzinnen erhält man Nadeln des Hydrochlorids, das mit NH_4OH zerlegt wird. Weißes, krystallin. Pulver, F. $125\text{—}130^\circ$, unl. in W., ll. in A. mit blauer Fluorescenz. Wird von FeCl_3 in einem gelbroten Prod. oxydiert. Das Acetylderiv. krystallisiert aus A. (Helv. chim. Acta **9**. 221—22.) LINDENBAUM.


F. Kehrmann, H. Goldstein und F. Brunner, *Einige Beobachtungen über Beziehungen des Fluoreszenzlichtes und der Lösungsfarben der Aminocarbazone in verschiedenen farblosen Lösungsmitteln zu anderen optischen Eigenschaften dieser Lösungsmittel*. VIII. Mitt. über farbige Derivate des Tetraphenylmethans. (VII. vgl. vorst. Ref.) Die von KEHRMANN u. TSCHUI (4. u. 6. Mitt.) gemachte Feststellung, daß die Lösungsfarben des 2-Amino- u. 2,4-Diaminodiphenylcarbazons in farblosen organ. Lösungsmmm. von der Natur der letzteren abhängig sind, entspricht früheren, von KEHRMANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **37**. 3581 [1904]) sowie KEHRMANN u. HERZUM (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **50**. 882; C. **1917**. II. 388) gemachten Beobachtungen, erinnert an die verschiedenen Färbungen von Jodlsgg. Die spektroskop. Unters. der beiden genannten Farbstoffe in CH_3OH , A., Ä., Bzl., Chlf., Aceton, CS_2 u. Pyridin (Absorptionskurven im Original) hat folgendes ergeben: 1. Es findet nur eine Verschiebung des Maximums der Absorption, keine Änderung ihres Gesamtcharakters statt. 2. Die Verschiebung ist beim Monoaminoderiv. bedeutend größer als beim Diaminoderiv. 3. A. verschiebt am stärksten nach der langwelligen, Bzl. am stärksten nach der kurzwelligen Seite des Spektrums, die übrigen Lösungsmmm. nehmen eine Mittelstellung ein. 4. Im allgemeinen verschieben die Lösungsmmm. mit kleiner Mol.-Ref. nach längeren, die mit großer Mol.-Refr. nach kürzeren Wellen, u. zwar in der von l. c. festgestellten Reihenfolge. 5. Beziehungen zwischen der Lage der Maxima der Mol.-Dispersion der Lösungsmmm. sind nicht zu erkennen. 6. Die Lösungsmmm. mit hoher DE. wirken farbvertiefend, die mit kleiner DE. farberhöhend. 7. Pyridin tritt ganz aus der Reihe heraus, vielleicht wegen seiner bas. Eigenschaften. (Helv. chim. Acta **9**. 222—26.) LINDENBAUM.

F. Kehrmann, Peter Tschudi und Jean Tschui, *Über einige neue Derivate des Diphenylcarbazins*. IX. Mitt. über farbige Derivate des Tetraphenylmethans. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Einige früher beschriebene Polynitroderiv. des Diphenylcarbazins werden zu Nitroaminoderiv. reduziert. Die alkoh. Lsg. oder Suspension wird erst mit NH_3 , dann mit H_2S gesätt., schließlich mit W., manchmal unter Zusatz von NaOH, vollständig gefällt. (Bezifferung vgl. 6. Mitt.) — 2-Amino-7-nitrodiphenylcarbazin, $\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}_3$, grünlich glänzende, fast schwarze Nadeln aus A.-Bzl., Zers. von 270° ab, unl. in W., wl. in A. (orangerot). Diese Lsg. wird von NaOH nicht verändert, von verd. Salzsäure hell grünlichgelb gefärbt. H_2SO_4 -Lsg. weinrot, dann schnell gelbbraun (Zers.). — 4-Amino-2,7-dinitrodiphenylcarbazin, $\text{C}_{25}\text{H}_{18}\text{O}_4\text{N}_4$, rote Nadeln aus A.-Bzl., Krystallfl., unl. in W., ll. in A. (orange-gelb), wl. in Bzl. Gibt mit alkoh. NaOH eine grünblaue Na-Verb. von derselben Farbe wie der des 2,7-Dinitrodiphenylcarbazins.

f dem Wasserbad erhitzt *d*-Methylencampher-*l*-alaninäthylester, $C_{16}H_{25}O_3N$, aus PAe. 108—109°, sll. in allen organ. Lösungsm., in A. $[\alpha]_{H_g}^{grün} = +256$. Bei der asserdampfdest. mit konz. HCl entweicht Oxymethylencampher u. *l*-Alaninhydro-*l*id bleibt zurück. Hieraus *l*-Alanin, in 1,25-n.HCl $[\alpha]_{H_g}^{grün} = -12,2^\circ$. Der alaninäthylester gibt beim Aufbewahren *l*-Lactimid, aus A. F. 272, in A. $[\alpha]_{D}^{20} = 29,1^\circ$. Das Lactimid wird von Na in A. zu *trans*-2,5-Dimethylpiperazin reduziert, Dibenzoylederiv. vom F. 227—228° isoliert. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 4—97. Cambridge, Univ.)

TAUBE.

Max Bergmann und **Fritz Stather**, Umlagerungen peptidähnlicher Stoffe. Umwandlung eines cystinhaltigen Diketopiperazins. (6. vgl. S. 350.) Um zu entscheiden, ob auch solche Diketopiperazine in einen hochmolekularen, proteinähnlichen stand übergeführt werden können, die keine Methylengruppe u. keinen Serinrest enthalten, studierten Vff. das Verh. des *Di-d,l*-alanylcystinanhidrids (I.), welches aus dem



d,l-alanyl-*l*-cystin, $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_2\text{)-CO-NH-CH(COOH)CH}_2\text{-SS-CH}_2\text{-CH(COOH)NH-CH(NH}_2\text{)CH}_3$, über den Ester durch Behandlung mit alkoh. NH_3 dargestellt wurde. Ist man dieses Anhydrid mit n. oder $\frac{1}{10}$ -n. NaOH, so erhält man beim Ansäuern unter Abspaltung von S u. H_2S die hochmolekulare Form des 3-Methylen-6-methyl-2,5-piperazin, $(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2)_x$, welches mit der früher (l. c.) auf anderem Wege dargest. Verb. identifiziert wurde. Ein geringer S-Gehalt verhindert die Mol.-Gew.-st. u. die katalyt. Hydrierung zu Alaninanhydrid. Cystinhaltige Proteine, freies Cystin u. auch Dialanincystin spalten den S viel weniger leicht ab. Durch die Einwirkung des Cystins in den Diketopiperazinring werden also die Affinitätsverhältnisse dahingehend verschoben, daß das Cystin- β -C-Atom den Disulfid-S nur noch recht schwach zu fesseln vermag. Die affinitative Wrkg. der Piperazinbindung wirkt sich also über den Ring hinaus in die Seitenkette. Unter geeigneten Umständen gehen auch nicht OH- oder SH-haltige Aminosäuren in α,β -ungesättigte α -Aminoglysäuren bezw. in ihre tautomeren Formen α -Iminopropionsäure über, z. B. nachweisbar mit **F. Stern** ausgeführten Verss. *N*-Chloracetylphenylalanin in *N*-Acetyl- α -inozimsäure. Das Verh. des *d*-Alanyleystinanhidrids gibt auch eine Erklärung für die raschere Zerstörung der cystinhaltigen Oberhaut u. der Haare bei der Einwirkung Alkali u. Schwefelalkalien auf die Keratine, wie sie bei den Gerbereiprozessen stattfindet (Collegium 1925. 109; C. 1925. II. 1874). Die als Zwischenprod. bei der Hydrolyt. Zers. von Cystin auftretende Brenztraubensäure entsteht wahrscheinlich aus α -Aminoacrylsäure u. Iminobrenztraubensäure (vgl. BERGMANN, MIEKELEY KANN, S. 119). — Dialanyleystinmethylesterchlorhydrat, B. aus dem Dipeptid mit alkoh. $\text{CH}_3\text{OH} + \text{HCl}$ wurde nicht isoliert. — Dialanyleystindianhydrid, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_4\text{S}_2$, eiförmige Blättchen u. Nadeln aus W. Braunfärbung von 275° an, schm. nicht bis 350°. in W. u. A., fast unl. in Ä., Essigäther, Aceton u. den meisten organ. Lösungsm., in h. Eg. Mol.-Gew.-Best. in Phenol 326 u. 336. Nach der Spaltung mit konz. HCl unter Cystin u. *d*-Alanin isoliert werden. n-NaOH spaltet schon in $\frac{1}{2}$ Stde. den größten Teil des S ab. Löst man 2 g Anhydrid mit 50 cem n-NaOH u. fällt mit 100 cem absol. A. aus, so erfolgt Abscheidung eines krystallwasserreichen, krystallinen Na-Salzes, von den Eigenschaften des Na-Salzes des 3-Methylen-6-methyl-2,5-piperazins, das sich beim Ansäuern in das Diketopiperazin $(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2)_x$ verandelt, welches in die Diacetylverb. $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2(\text{COCH}_3)_2$ u. in den Tetrapeptidmethyl-er $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}_6\text{N}_4\text{Cl}_2$ übergeführt wurde (vgl. 6. Mitt., l. c.) (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 1—201. Dresden, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Lederforschung.) GUGGENHEIM.


Emil Abderhalden und **Ernst Rossner**, Studien über Polypeptide, an deren Aufbau Glutaminsäure beteiligt ist, und Derivate von solchen. *d,l*-Brom-*i*-capronyl-*d*-

all
errata
p. 3977

glutaminsäurediäthylester, $C_{15}H_{26}NO_5Br$. B. aus Glutaminsäurediäthylester u. Bromcapronylbromid in Chlf. Im Hochvakuum Kp. 153° . Farbloses Öl, Geruch angenehmer, Geschmack bitter. Mit alkoh. NH_3 entsteht *d,l-Leucyl-d-glutaminsäureanhydrid*, $C_{13}H_{22}N_2O_4$, aus W. wetzsteinartige, büschelförmig angeordnete Krystalle, F. $214-215^\circ$. Unl. in Ä. u. k. W., wl. in Bzl., l. in A., Chlf. u. Pyridin. Rk. schwach sauer, Geschmack schwach bitter. Mit Pikrinsäure nur sehr schwache, mit Dinitrobenzoesäure starke Rk. Ninhydrinprobe negativ, nach vorherigem Kochen mit $\frac{1}{10}$ -n. Alk. positiv. *d,l-Leucyl-d-glutaminsäureanhydrid*, $C_{11}H_{18}N_2O_4$, findet sich in der Mutterlauge der vorigen Verb. verunreinigt mit dem Ester u. wird durch Erhitzen mit W. rein erhalten. F. 203° . Derbe kurze Nadeln. *d,l-Brom-i-capronyl-d-glutaminsäuredimethylester*, $C_{13}H_{22}NO_5Br$, zähes, bitter schmeckendes Öl, gelb, grünlich fluoreszierend, sd. im Hochvakuum bei 133° . Mit 2 Voll. 25%ig. NH_3 entsteht *d,l-Leucylglutaminanhydrid*, $C_{11}H_{18}N_2O_3$, breite büschelförmige Nadeln aus W. + A. u. kleinen Würzchen. Erstere verwandeln sich unter A. in letztere. F. 252° . Ninhydrinprobe negativ, Pikrinsäurerk. positiv. Mit NaOH Abspaltung von NH_3 . Als Nebenprodukt findet sich eine in A. l., nicht näher charakterisierte Verb., l. in W., A. u. Pyridin unl. in den übrigen Lösungsm. Fällbar mit Phosphorwolframsäure. *Benzoylglutaminsäureäthylester*, $C_{16}H_{21}NO_5$, verfilzte Nadeln aus A. + W. u. aus Lg. Wl. in W. zl. in Lg. u. PAe., sl. in den übrigen Lösungsm. F. $73-74^\circ$. $[\alpha]_D^{20}$ (0,112 g Substanz in 1,1285 g Chlf.) = $+17,8^\circ$. Der Ester dest. im Vakuum bei 290° Badtemp. unzerlegt bei gewöhnlichem Druck dest. bei 330° eine gelbliche Fl., die sich allmählich verfestigt u. aus A. + PAe. derbe Prismen vom F. $77-78^\circ$ lieferte. Die Substanz ist opt.-inaktiv u. wahrscheinlich die Racemform des Benzoylglutaminsäureesters. *Benzoylglutaminsäurediamid*, $C_{12}H_{15}N_3O_2$, beim Erhitzen des Esters auf $80-90^\circ$ mit alkoh. NH_3 drusenförmige Nadeln aus A. oder A. + Ä., F. $202-204^\circ$. *Benzoyl-d-glutaminsäuremethylester*, $C_{14}H_{17}NO_5$, aus A. + W. feine büschelförmige Nadeln. F. $76-78,5^\circ$, Löslichkeit wie beim Äthylester. Dest. im Vakuum bei 220° Badtemp. als leicht gelbliches Öl, das erstarrt u. bei $74-75^\circ$ schm. *Leucylasparaginänhydrid*, $C_{10}H_{17}N_3O_3$, bildet sich aus Brom-i-capronylasparaginsäureester (E. FISCHER u. KÖNIGS, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **37**. 4585; C. **1905**. I. 350) mit alkoh. NH_3 aus A. Krystalle vom F. 247° . Pikrinsäurerk. positiv. *Pyrrolidoncarbonsäureamid*, B. aus Glutaminsäureester mit alkoh. NH_3 beim Erwärmen auf $80-90^\circ$. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 271—81. Halle a. S. Univ.)

GUGGENHEIM.

P. Karrer und **E. Miyamichi**, Überführung einer β -Aminosäure in ein Metoxazinderivat. Nach KARRER u. GRÄNACHER (Helv. chim. Acta **7**. 766; C. **1924**. II. 98) werden α -Acylaminosäureester von PCl_5 oder P_2O_5 zu Oxazolderivv. kondensiert. Zu einem analogen Ringschluß scheinen auch β -Acylaminosäureester befähigt zu sein. Folgende Kondensation wurde verwirklicht:



Das *Metoxazinderiv.* II. ist gegen Alkalien recht beständig, wird aber von Säuren leicht aufgespalten, verhält sich also wie die Oxazolderivv. — *N-Benzoyl- β -aminopropionsäure*, $C_{10}H_{11}O_3N$. Durch Benzoylierung von β -Aminopropionsäure unter Kühlung. Mit HCl fällen, Benzoesäure mit h. Lg. entfernen. Säulen aus W., F. 133° . — *Äthylester*, $C_{12}H_{15}O_3N$ (I.). Mit A. + HCl-Gas (Wasserbad). Öl, Kp. $184-186^\circ$. — *2-Phenyl-6-äthoxymetoxazin*, $C_{12}H_{13}O_2N$ (II.). Aus I. mit der 4-fachen Menge P_2O_5 (Wasserbad, 8—9 Stdn.), Prod. in eisgekühlte NaOH, ausäthern. Nach Waschen mit Lg. Krystalle aus verd. A., F. 74° . *Pikrat*, $C_{18}H_{16}O_9N_4$, aus äth. Lsg.; Krystalle aus CH_3OH , F. 103° . — II. wird von 7%ig. HCl (Wasserbad) zu *N-Benzoyl- β -aminopropionsäure* gespalten.

LINDENBAUM.

The scheme illustrates the synthesis of various arsenic compounds from cyclohexylamine derivatives. The reactions are as follows:

- Cyclohexylamine with a nitro group (NH_2 , NO_2) reacts with an arsenic compound (I, OAsBr) to form compound II (AsO(OH) , NO_2). Compound II then reacts with a brominated cyclohexane derivative to form compound III (AsO(OH) , NH_2).
- Compound III reacts with a brominated cyclohexane derivative to form compound IV ($\text{AsO} \cdot \text{OH}$, NH). Compound IV then reacts with an arsenic compound (V, AsCl) to form compound VI (AsCl , NH).
- Cyclohexylamine with a methylamino group (NHCH_3) reacts with an arsenic compound (VI, AsO(OH)) to form compound VII ($\text{AsO} \cdot \text{OH}$, $\text{N} \cdot \text{CH}_3$). Compound VII then reacts with an arsenic compound (VIII, AsCl) to form compound IX (AsCl , $\text{N} \cdot \text{CH}_3$).
- A cyclohexylamine derivative with an N-acetyl group ($\text{N} \cdot \text{Ac}$) reacts to form compound X (AsO(OH)_2 , $\text{N} \cdot \text{Ac}$). Compound X then reacts with an arsenic compound (XI, AsCl_2) to form compound XII (AsCl_2 , $\text{N} \cdot \text{Ac}$).
- A cyclohexylamine derivative with an N-acetyl group ($\text{N} \cdot \text{Ac}$) reacts to form compound XIII (AsO(OH)_2 , NH). Compound XIII then reacts with an arsenic compound (XIV, AsCl_2) to form compound XIV (AsCl_2 , NH).

The structures of the arsenic compounds (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) are shown as cyclohexane rings with the respective arsenic substituents.

der konz. Halogenwasserstoffsäuren auf die in Eg. gel. Oxyverb. Letztere liefert Alkoholen leicht Alkyloxyderiv., so *n*-Butoxy- u. Benzoyloxy-5,10-dihydrophenarsaz.

Versuche. o-Aminophenylarsinsäure gibt in HBr-Lsg. diazotiert u. Diazolsg. mit CuBr umgesetzt o-Bromphenylarsinsäure, aus verd. A. F. 201° (Zers.). Die Säure liefert in alkoh. HCl (Spuren J) gel. mit SO₂ das entsprechende Chlorarsin, dieses mit NH₃ (d = 0,88) o-Bromphenylarsenoxyd, C₆H₄OBrAs (I), F. 234—235°, unl. in den meisten indifferenten Lösungsm. Diazotiertes o-Nitranilin gibt in 2-Brom-6'-nitrodiphenylarsinsäure, C₁₂H₉O₄NBrAs (II), aus verd. A., F. 254—255° (Zers.). Die Red. von II mit Fe(OH)₂ führt zu 2-Brom-6'-aminodiphenylarsinsäure, C₁₂H₁₁O₂NBrAs (III), aus verd. A., F. 213—214° (Zers.). Die Methylierung von III mit Dimethylsulfat u. Alkali gibt 2-Brom-6'-methyldiaminodiphenylarsinsäure, C₁₃H₁₃O₂NBrAs (VI) aus A., F. 193—194° (Zers.). Bei stärkerer Einw. des Dimethylsulfates 2-Brom-6'-dimethyldiaminodiphenylarsinsäure, C₁₄H₁₅O₂NBrAs, aus verd. A., F. 220—221° (Zers.). III gibt in Amylalkohol mit K₂CO₃ u. Cu-Pulver 12 Stdn. rückfließend erhitzt, der Amylalkohol mit Wasserdampf entfernt, die wss. Lsg. mit HCl angesäuert, der Nd. in alkoh. HCl (Spuren J) gel. u. SO₂ eingeleitet, 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin (V), aus CCl₄, F. 191—192°. Leichter entsteht die Verb. aus Phenylamin u. AsCl₃ in o-Dichlorbenzol bei 5-std. Erhitzen. III liefert in alkoh. Lsg. mit SO₂ behandelt o-Bromphenylarsenchlorid, F. 65—66°. Die Methyl- u. Dimethyldiphenylarsinsäuren (s. o.) liefern analog behandelt Methyl- u. Dimethylanilin u. o-Bromphenylarsenchlorid. AsCl₃ u. Diphenylamin geben in trockenem Bzl. gel. nach 24 Stdn. eine Additionsverb., C₁₂H₁₂NCl₄As = HCl, NH(C₆H₅)₂AsCl₃. N-Acetyl-p-aminodiphenylamin liefert diazotiert u. mit Na-Arsenit umgesetzt p-Phenylacetylaminophenylarsinsäure, C₁₄H₁₄O₄NAs (X) aus W. mit 1 H₂O, F. 126° (Zers.). Durch Verseifung mit NaOH p-Phenylaminophenylarsinsäure, C₁₂H₁₂O₃NAs (XII), aus verd. H₂SO₄, F. 265° (Zers.). X gibt in alkoh. HCl gel. mit SO₂ behandelt p-Phenylacetylaminophenylarsenchlorid, C₁₄H₁₂ONCl₂As (XI) aus Bzl. + Lg., F. 141°. β-Naphthylamin u. AsCl₃ liefern in o-Dichlorbenzol 18 Stdn. rückfließend erhitzt 14-Chlor-14,7-dihydrodibenzophenarsazin, C₂₀H₁₃NClAs (XIV) aus Nitrobenzol, F. 355° (Zers.). Die Verb. entsteht auch aus Di-β-naphthylamin u. AsCl₃ in s-Tetrachloräthan. Di-α-naphthylamin gibt analog 7-Chlor-7,14-dihydrodibenzophenarsazin, C₂₀H₁₃NClAs, aus Nitrobenzol, F. 278—279° (Zers.). Diphenylamin u. As₂O₃ reagieren bei Ggw. von P₂O₅ u. 160—170° miteinander zu 10,10'-Oxy-5,10-dihydrophenarsazin (vgl. BURTON u. GIBSON, l. c.). Diphenylamin u. AsBr₃ geben wie oben 10-Brom-5,10-dihydrophenarsazin, aus Toluol, F. 218°. Die Verb. entsteht auch aus 10-Acetyl-5,10-dihydrophenarsazin mit HBr. Analog 10-Jod-5,10-dihydrophenarsazin, aus Eg., F. 217—221° (Zers.). 10,10'-Oxy-5,10-dihydrophenarsazin liefert aus n-Butylalkohol umgel. 10-n-Butoxy-5-10-dihydrophenarsazin, C₁₆H₁₈ONAs, F. 158—160°. Analog 10-Benzoyloxy-5-10-dihydrophenarsazin, C₁₈H₁₆ONAs, F. 173—175°. Eine Lsg. des 10,10'-Oxyderiv. in sd. Butylalkohol liefert mit H₂S gesättigt 10,10'-Sulfo-5,10-dihydrophenarsazin, F. 256—257° (Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 1926. 450—64.)

Harold Burton und Charles Stanley Gibson, 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin und seine Derivate. II. Die Einwirkung von primären Chlorarsinen auf Diphenylamin und seine Homologen. (I. vgl. vorst. Ref.) Phenylchlorarsin u. Diphenylchlorarsin geben in o-Dichlorbenzol erhitzt nicht die zu erwartete


I $C_6H_5As \left\langle \begin{smallmatrix} C_6H_4 \\ C_6H_4 \end{smallmatrix} \right\rangle NH$ Verb. (I), sondern 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin. Phenyl-p-tolylamin gibt mit AsCl₃ kondensiert 10-Chlor-2-methyl-5,10-dihydrophenarsazin, p,p'-Ditolylamin analog 10-Chlor-2,8-dimethyl-5,10-dihydrophenarsazin. Nachprüfung der Verss. von LEWIS u. STIEGLER (S. 675), welche aus β-Chlorvinylchlorarsin mit Diphenylamin u. Phenyl-α-naphthylamin 6-β-Chlorvinylphenarsazin u. 7-β-Chlorvinyl-7,12-dihydro-γ-benzophenarsazin erhalten hatten, ergab, daß die genannten Forscher nur 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin

7. 7-Chlor-7,12-dihydrobenzophenarsazin in den Händen hatten. Beim Arbeiten nach den Vorschriften von LEWIS u. STIEGLER verläuft die Rk. wie im Falle des 7,12-Dichlorarsins u. das entstehende Vinylchlorid kann als α -Brom- β -chlorbroman nachgewiesen werden.

Versuche. Phenyl-p-tolylamin u. AsCl_3 geben in Dichlorbenzol 4 Stdn. rückend erhitzt 10-Chlor-2-methyl-5,10-dihydrophenarsazin, $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{NClAs}$, aus Bzl., 199—200° (Zers.). Analog aus Di-p-tolylamin 10-Chlor-2,8-dimethyl-5,10-dihydrophenarsazin, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{NClAs}$, aus Nitrobenzol, F. 261—262° (Zers. vor dem F.). Aus 1 entsprechenden Phenarsazin durch Kochen mit Essigsäureanhydrid 10-Chlor-2-methyl-5,10-dihydrophenarsazin, $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{ONClAs}$, aus Bzl. u. PAe., F. 154—155° u. 10-Chlor-5-acetyl-2,8-dimethyl-5,10-dihydrophenarsazin, $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{ONClAs}$, aus u. PAe., F. 164—165°. Nach BURTON u. GIBSON (Journ. Chem. Soc. London 1925; C. 1925. I. 485) aus dem entsprechenden Chlorarsin u. Chloramin T (Naphtholsulfonchloramid) 2-Methylphenarsazinsäure, $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{NAs}$, aus verd. Eg., S. über 300°, Na-Salz, Hydrochlorid, F. 209—211° (Zers.). 2,8-Dimethylphenarsazinsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{NAs}$, aus verd. Eg., Zers. ohne F., Na-Salz, Hydrochlorid, F. 216° (Zers.). N-Acetyl-2,8-dimethylphenarsazinsäure, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{NAs}$, aus verd. Eg., F. 240° (Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 1926. 464—70. London, GUYS Hosp. Med. School.)

TAUBE.

Walter G. Christiansen, Derivate der p-Carboxyphenoxyessigsäure. (Vgl. Journ. Chem. Soc. 1915; C. 1915. II. 290.) Es wurden verschiedene Deriv. der p-Carboxyphenoxyessigsäure dargestellt u. untersucht. — p-Carbomethoxyphenoxyessigsäuremethylester, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_6$, F. 92—92,7°, gibt mit konz. wss. NH_3 p-Carbomethoxyphenoxyacetamid, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}$ (I), Nadeln, F. 164°, l. in A., Chlf. u. Aceton. Die isomere p-Carbomethoxyphenoxycarboxamid, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}$ (II), konnte nicht isoliert werden. Durch Behandlung von p-Oxybenzoesäure mit Chloracetamid in NaOH-Lsg. wurde p-Carboxyphenoxyacetamid, $\text{C}_9\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$, erhalten, F. 282—282,5°, unl. in W., Ä., Chlf., Bzl., l. in verd. NaHCO_3 -Lsg. u. h. A., welches beim Methylieren ebenfalls I ergab. Als Nebenprod. entstand O-p-Oxybenzoylchlorid, $\text{C}_9\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$, Blättchen, F. 257—258°, unl. in NaHCO_3 -Lsg., l. in k., verd. H-Lsg. Bei $\frac{1}{2}$ -std. Erhitzen von I mit konz. wss. NH_3 unter Druck bei 60—65° wurde p-Carbamidophenoxyacetamid, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3\text{N}_2$, gebildet, Nadeln, F. 261—264,5°, unl. in k., verd. NaOH, ll. beim Erwärmen unter Entw. von NH_3 . — Durch Nitrierung von p-Carbomethoxyphenoxyessigsäuremethylester mit einem Mol.-Äquivalent HNO_3 bei etwa 0° wurde als Hauptprod. 2-Nitro-4-carbomethoxyphenoxyessigsäuremethylester, $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{O}_7\text{N}$ (III), erhalten, Nadeln, F. 125,5—127°, l. in Chlf., Bzl., Nitrobenzol, unl. in A., ll. in Ä., unl. in W. Als Nebenprodd. entstanden: 2,6-Dinitro-4-carbomethoxyphenoxyessigsäuremethylester, $\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{O}_9\text{N}_2$ (IV), 2,4-Dinitrophenoxycarboxyessigsäuremethylester, $\text{C}_9\text{H}_9\text{O}_7\text{N}_2$ (V), die schon früher beschriebene 2-Nitro-4-carboxyphenoxyessigsäure u. 2-Nitro-4-carboxyphenoxyessigsäuremonomethylester, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_7\text{N}$ (VI oder VII). III wurde beim Erhitzen mit NaOH-Lsg. zu 3-Nitro-4-oxybenzoesäure, F. 180—181,5°, umgewandelt. IV bildete Blättchen, F. 118,5—119°, l. in Chlf., Aceton, Bzl., Eg., unl. in Ä., W. V, F. 53—58°, konnte nicht vollkommen gereinigt werden. Ein 2,4-Dinitrophenoxycarboxyessigsäure bereitetes reines Prod. schmolz bei 70—73°. Die




2,4-Dinitrophenoxycarboxyessigsäure bereitetes reines Prod. schmolz bei 70—73°. Die

Identität der beiden Verbb. wurde bewiesen, dadurch, daß V mit NaOH in 2,4-nitrophenol u. mit konz. wss. NH_3 in 2,4-Dinitrophenoxyacetamid übergeführt wurde. 2-Nitro-4-carboxyphenoxyessigsäuremethylester (VI oder VII) krystallisierte in NaCl F. 204—205°, l. in A., Eg., Aceton, NaHCO_3 -Lsg., unl. in W., Bzl., Ä., CS_2 , PAe. k. Chlf. Mit NaOH ließ es sich zu 3-Nitro-4-oxybenzoesäure hydrolysieren. — I von 2-Nitro-4-carboxyphenoxyessigsäure mit Ferrohydroxyd u. von III mit Fe u. methylalkoh. HCl ergab 6-Carboxy-3-keto-3,4-dihydro-1,4-benzoxazin, $\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_4\text{N}$ (VIII), Nadeln, F. 310—314°, l. in wss. NaHCO_3 , konz. H_2SO_4 u. h. A., unl. in W. u. 6-Carbomethoxy-3-keto-3,4-dihydro-1,4-benzoxazin, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$ (IX), Nadeln, F. 188—190,5°, l. in Acet. h. A., h. Chlf., anstatt der Aminoverbb. X u. XI. — IX entstand auch bei Einwirkung von methylalkoh. HCl auf VIII. Als Nebenprod. bei der Red. von III wurde Na-Salz, F. 149—152° erhalten, das bei der Hydrolyse mit NaOH 3-Nitro-4-carboxybenzoesäure u. mit HCl 2-Nitro-4-carboxyphenoxyessigsäuremonomethylester, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$ (VI oder VII), F. 151—154°, bildete; l. in A., Ä., Aceton u. wss. NaHCO_3 . Es wurden somit beide Ester VI u. VII dargestellt; welcher Verb. die Formel VI u. welcher Formel VII zukommt, konnte nicht entschieden werden. — Methylierung von V mit Dimethylsulfat ergab 6-Carboxy-3-keto-4-methyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazin, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$ (XII), Nadeln, F. 287—290°, l. in Aceton, Chlf., Eg., wss. NaHCO_3 , 6-Carbomethoxy-3-keto-4-methyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazin, $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}$, Blättchen, F. 165—166°, unl. in W., HCl u. NaOH-Lsg. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 460—Boston [Mass.], HARVARD Med. School.)

WINKELMANN

Robert Downs Haworth und William Henry Perkin, jun., Die Umwandlung von Berberin in β -Homochelidonin (α -Allocryptopin). Bekanntlich (vgl. PERKIN Journ. Chem. Soc. London 109. 952; C. 1917. I. 229) spaltet eine wss. Lsg. von Tetrahydromethylberberinhydroxyd (I) im Vakuum W. ab u. geht dabei in Anhydrotetrahydromethylberberin (II) über. Um von dieser Verb. zum β -Homochelidonin (III) zu gelangen, muß nur die Gruppe $-\text{CH}=\text{CH}-$ in $-\text{CO}\cdot\text{CH}_2-$ umgewandelt werden. Da sich jedoch II schon beim Kochen mit A. oder Chlf. unter Verlust des Zehnerrings in I zurückverwandelt, so führte weder die Einw. von Br in eiskalter Lsg. noch anderen Oxydationsmitteln zum Ziel. — Da es PRILISHAJEW (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 4811; C. 1910. I. 418) mittels Perbenzoesäure gelungen war, Äthylender

$-\text{CH}=\text{CH}-$ in Äthylenoxyde $-\text{CH}-\text{CH}-$ überzuführen, so wurde eine eiskalte Lsg. von I in Chlf. zu einer eiskalten Lsg. von Perbenzoesäure zugegeben, ohne



jedoch das Äthylenoxydderiv. gebildet wurde. Die Oxydation fand statt unter Einwirkung von Anhydrotetrahydromethylberberinhydroxyd (IV), $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_5\text{N}$, das mit β -Homochelidonin

er ist u. ein in W. swl. *Hydrochlorid*, $C_{21}H_{23}O_5N, HCl$, liefert. In Ggw. von Eg. HCl findet eine Isomerisation dieses Aminooxyds zu β -*Homochelidonin* statt.

Versuche. *Anhydrotetrahydromethylberberinoxyd*, (IV), $C_{21}H_{23}O_5N$, aus W. Prist. F. 135° (Zers.). *Hydrochlorid*, $C_{21}H_{23}O_5N, HCl$, F. 203° (Zers.) — Eine Lsg.

IV in Eg. u. konz. HCl wurde 1 Stde. auf 100° erhitzt. Aus Essigester kristallisiert β -*Homochelidonin*, $C_{21}H_{23}O_5N$, (III), in monoklinen Prismen. F. 160 161°. Gibt dieselben Farbrkk. u. dasselbe Hydrochlorid u. Aurichlorid wie natürlich vorkommende Prod. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 445—50. ord.)

BEREND.

O. Schumm, *Über Cytochrom, das bei seiner Spaltung entstehende Porphyratin das zugehörige Porphyrin*. Das Cytochrom (vgl. SCHUMM, S. 1865) findet sich r in den von KEILIN (Proc. Royal Soc. London, Serie B. 98. 312; C. 1925. II. 1) angegebenen Pflanzen auch in den verschiedenen Rübenarten u. in den Fruchtern höherer Pilze. Als *Porphyrtin* werden solche künstliche Komplexverbb. Porphyrin bezeichnet, die in Pyridin eventuell nach Zusatz von $NH_2 \cdot NH_2$ im ein ähnliches Absorptionbild liefern, wie das Pyridinhämochromogen aber mit selndem Ort des Streifenpaares. Natürliche *Fe-Porphyratine* sind das Verdauungs- atin von ZEYNEK (= α -Hämatin nach KÜSTER), die Sapohämatine, das Kopratin IUMM, S. 1219). Die Werte für die Pyridinrk. der verschiedenen Porphyratine : Hauptstreifen I bei α -Porphyroidin Schumm 557,5, Phylloporphyrin- β March- ki 552,5, Hämatoporphyrin Nenki 548,5, Mesoporphyrin Zaleski 547,2, Kopro- hyrin H. Fischer 547,5, Kopratoporphyrin Schumm 545,0, α -Hämatin 557,5, ohämatine 545—549, Kopratin 545, pflanzliches Porphyratin 557—558. Der e Hämochromogen soll nur für die aus dem Hämatin abgeleiteten, dem Pyridin- ochromogen entsprechenden Porphyrinderivv. angewendet werden, für die ana- Verbb. der übrigen Fe-Porphyratine dagegen die Bezeichnung *reduziertes (Fe)- hyrtin*. Das Porphyratin ließ sich aus dem pflanzlichen Material in einer Menge ren, die der Stärke des Cytochromspektrums entsprach. Mit $NH_2 \cdot NH_2$ -Eg- isch wurde ein porphyrinartiger Farbstoff abgespalten, der mikrochem. mit dem ylloporphyrin u. dem α -Porphyroidin übereinstimmt. Entgegen H. FISCHER INK (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 101; C. 1925. II. 931) ist Vf. der Ansicht, daß er Brennereihefe nicht freies Porphyrin vorherrscht, sondern ein oder mehrere plexe Fe-Porphyratine. Der Gehalt an freiem Porphyrin — *Koproporphyrin* — trat ur wenig hervor. Eine künstliche B. aus Fe-Porphyratin, Porphyrin u. Fe- n unter der Einw. des Eg. wird aus verschiedenen im Original angeführten Gründen n wahrscheinlich hingestellt. Insbesondere wird betont, daß das freie unbehandelte chrom die den komplexen Fe-Verbb. eigentümliche Peroxydaserk. gibt, welche freien Porphyrinen fehlt. Auch das Porphyratin aus Brustmuskulatur von In- n (Wespen) verhielt sich wie pflanzliches Porphyratin u. Myohämatin aus den muskeln von Säugetieren. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 147—59. Hamburg, „Allg. Krankenh. Eppendorf.)

GUGGENHEIM.

Rolf Meier, *Studien über Methämoglobinbildung*. VII. Mitt. *Nitrit*. (VI. vgl. 6.) Die Oxydation von Nitrit zu Nitrat, die bei alkal., neutraler u. schwachsaurer durch O_2 nicht oder nur sehr langsam verläuft, wird durch Zusatz von $FeSO_4$, das i selbst oxydiert wird, sowohl bei neutraler wie besonders bei schwachsaurer Rk. 5) stark beschleunigt. Wie in diesem Modellvers. wurde der Einfluß der $[H^+]$ (pH-puffer) auf die B. von *Methämoglobin* (I) durch *Nitrit* untersucht u. dabei den, daß das Nitrit bei pH 7 u. 5 auf *Oxyhämoglobin* (II) als Reduktionsmittel , indem es ähnlich wie Hydrazobenzol, Phenylhydroxylamin u. a. in Ggw. von arbstoff oxydiert wird. In alkal. Lsg. (pH 9,2) bewirkt Nitrit nur eine geringe nderung, neben alkal. I tritt bei dem molekularen Verhältnis (m. V.) Nitrit: arbstoff 20—50 noch II, bei m. V. 100—1000 noch *Stickoxydhämoglobin* (III)

auf. Bei p_H 7 u. 5 hat ausschließliche B. von **I** nur bei bestimmtem m. V. statt: p_H 7 5—50, bei p_H 5 1—5. Unterhalb dieser Konz. ist neben **I** noch **II**, oberhalb vorhanden. Bei völliger B. von **I** wird etwa $\frac{1}{4}$ des an **II** gebundenen O_2 gemäß Gleichung: $4 HbO_2 + 4 HNO_2 + 2 H_2O = 4 HbOH + 4 HNO_3 + O_2$ frei gemacht. Die B. von **III** bei größerem Nitritüberschuß beruht auf einer sek. Rk. von schon gebildetem **I** mit NO zu **III**. Aus in H_2 reduziertem Hämoglobin entsteht mit NO stets unabhängig von der Rk. **I** u. **III**. Mit Nitrit (1,2 g $NaNO_2$ subcutan) sowie mit nitrosen Gasen vergiftete Katzen zeigten etwa dasselbe Vergiftungsbild; das Blut enthielt nach dem Töten 60 bzw. 80% **I**. Nach 2-tägigem Stehen war das vor schokoladenbraune Blut scharlachrot unter ausschließlicher B. von **III** geworden. — Die im Tier durch größere Dosen von Nitrat hervorgerufene B. von **I** beruht wahrscheinlich auf einer Nitritvergiftung, da nach HEFFTER im Gewebe Nitrat zu Nitrit reduziert wird. Diese Red. von Nitrat zu Nitrit steht in Parallele zu der Red. von Dinitrobenzol zu Nitrophenylhydroxylamin im Gewebe einerseits, u. die Oxydation im Blut von Nitrit zu Nitrat zu der Oxydation von Nitrophenylhydroxylamin zu Nitroazoxybenzol andererseits. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1924—64. Göttingen, Univ.)

LOHMANN


Arno Papendieck, *Über Porphyrine aus Blutfarbstoff*. IV. Mitt. *Beiträge zur Konstitution der Porphyrine*. (III. vgl. S. 1815.) Vf. erblickt in den Arbeiten von LIST (Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 95; C. 1924. II. 484) u. von PAPENDIECK u. BONAI (Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 60; C. 1925. II. 40) eine Widerlegung der Willstätterschen Äthinformel mit den Äthinbrücken (vgl. WILLSTÄTTER u. M. FISCHER, Ztschr. f. physiol. Ch. 87. 423; C. 1913. II. 1979). Die von H. FISCHER u. LINDNER (Ztschr. f. physiol. Ch. 142. 141; C. 1925. II. 2017) im Ooporphyrin angegebene Acetylenbindung ist nach ihm im Blutfarbstoff vorgebildet bzw. in der Dicarbonsäure KÜSTER-HÄMATERINDICARBONSÄURE, gel. in Eg., ließ sich bei Ggw. von 2,5% H_2SO_4 in schwach saurer Lsg. elektrochem. zu Mesoporphyrin reduzieren. (Vergoldete Röhrelektrode, Platinanode, 10 Volt, 0,6—0,8 Amp.) Bei der elektrochem. Red. des Hämatoporphyrins Nencki entsteht das *Oxymesoporphyrin*, dessen Spektralstreifen ähnlich, jedoch nicht ident. sind mit denjenigen des Mesoporphyrins: in Ä. I. 623,8, II. 566,8, IIIa. 530,5, IIIb. 525,5, IV. 496,0; Chlf. I. 621,7, II. 566,8, III. 534,0, IV. 500,0; $\frac{1}{10}$ -n. KOH I. 623,5, II. ca. 570, III. 536, IV. 504; 25% HCl I. 594,3, II. 550,8; Verb. in Pyridin u. Hydrazinhydrat I. 547,6, II. 518,8. Hämaporphyrin: in Ä. I. 623,8, II. 567,0, IIIa. 529,8, IIIb. 524,5, IV. 494,6; Chlf. I. 620,8, II. 565,4, III. 533, IV. 498,0; $\frac{1}{10}$ -n. KOH I. 628,2 (616,1), IIa. 573,6, IIb. 562,1, III. 536, IV. 505; 25% HCl, I. 593,0, III. 549,6; Fe-Verb. in Pyridin u. Hydrazinhydrat I. 546,7, II. 518,8. Die spektrometr. Unters. des nach WILLSTÄTTER u. M. FISCHER (l. c.) dargestellten Hämaporphyrins ergab Werte, die sich mit denjenigen des Mesoporphyrins fast ident. erwiesen. Eine Trennung des Mesoporphyrins vom Hämaporphyrin ist möglich durch Ausschütteln der Lsgg. in 5—15% ig. HCl mit Chlf., wobei nur ersteres in Lsg. geht. Bei der elektrochem. Red. des Mesoporphyrins entsteht ein Farbstoff mit dem Spektrum des Mesoporphyrins. Die gleichen Resultate wurden erzielt bei der katalyt. Hydrierung mit Pd in Eg.-Lsg. Hämaterindicarbonsäure liefert Mesoporphyrin, Hämatoporphyrin Nencki Oxymesoporphyrin, u. Hämaporphyrin Mesoporphyrin. Aus dem Nachweis der Hydrierbarkeit des Hämatoporphyrins ergibt sich die Anwesenheit einer ungesätt. Seitenkette. Nimmt man in der Hämaterinsäure, $C_{34}H_{32}O_4N_4$, eine Acetylenbindung an, so ergibt sich für Mesoporphyrin $C_{34}H_{38}O_4N_4$, für Hämatoporphyrin $C_{34}H_{36}O_6N_4$, für Hämaporphyrin $C_{34}H_{36}O_4N_4$, für Oxymesoporphyrin $C_{34}H_{38}O_4N_4$, welche Beziehungen im Original strukturell veranschaulicht werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 215—29. Hamburgsche Univ., Allg. Krankenh. Eppendorf.)

Maurice Nicloux und Jean Roche, *Über den Sauerstoffgehalt des Methämoglobins*. Ausführliche Mitteilung mit vorangehender histor. Betrachtung des Problems 1926.

hlägige Verss. mit dem bereits veröffentlichten Ergebnis (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1968; C. **1925**. II. 1683), nach dem *Methämoglobin* die Hälfte des Oxyoglobin- O_2 besitzt. Der Nachweis gelingt nicht nur mit der Behandlung des Hämoglobins durch ein Reduktionsmittel u. nachfolgende Messung des freien O_2 , sondern auch durch Behandlung von Hämoglobin mit einem Oxydationsmittel $[Fe(CN)_6K_3]$ u. Best. des auf solche Weise fixierten O_2 . (Bull. Soc. Chim. Biol. **1**—97. Straßburg, Inst. de Chim. biol. de la Fac. de méd.) OPPENHEIMER.

Jean Roche, Über *Methämoglobinbildung*: Wirkung von *Hydroxylamin* auf *ämglobin*. (Bull. Soc. Chim. Biol. **8**. 98—112. — C. **1926**. I. 2474.) OPP.

Hans Fischer und **J. J. Postowsky**, Bestimmung des „aktiven Wasserstoffs“ *Hämin* und *Bilirubin*, einigen ihrer Derivate und in *Pyrrolen*. Bei der Anwendung von FLASCHENTRÄGER (Ztschr. f. physiol. Ch. **146**. 219; C. **1925**. II. 2220) ausgetesteten Methode von ZEREWITINOFF auf eine Reihe von Pyrrolderivv. ergab daß nur der Imin-H der Pyrrole, nicht aber der Methin-H bestimmt wird. Oxy-*le* ergaben 2 aktive H, *Methyläthylmaleinimid* ein H. *Bis*-(2,4-dimethyl-3-äthyl-)



methen, sowie andere *Methene* lieferten entsprechend der Theorie ein Mol. CH_4 . Dagegen gab *Bis*-(2,4-dimethyl-3-carbäthoxy-pyrrol)-methen 2 Moll. CH_4 , wahrscheinlich infolge der geringeren Stabilität.


4,5-dimethyl-3-carbäthoxy-pyrrol)-methan lieferte der Theorie entsprechend 2 Mol. *Tetra*-(2,3-dimethyl-4-carbäthoxy-pyrrol)-äthan u. *Tetra*-(2,3-dimethylpyrrol)-an 4 Moll. CH_4 , ebenso das *Tetra*-(2,3-dimethyl-4-carbäthoxy-pyrrol)-äthylene (vgl. FISCHER u. BELLER, S. 91). Bei der *Bilirubinsäure* wurden 4 akt. H gefunden, der *Xanthobilirubinsäure* 3, bei deren Ester 2. Das Red.-Prod. aus der *Benz-ydverb.* des *Mesobilirubinogens* (H. FISCHER u. NIEMANN, Ztschr. f. physiol. **146**. 196; C. **1925**. II. 2166) lieferte 3 akt. H. *Bilirubin* u. *Mesobilirubin* ergaben Einklang mit der Fischerschen Formulierung (vgl. Original) 7 u. *Mesobilirubinogen* t. H-Atome, während KÜSTERS Formel 5 verlangt. In dieser Tatsache, sowie der Ähnlichkeit der Tetrapyrroläthylene mit dem Gallenfarbstoff erblicken Vff. starke Stütze für ihre Auffassung. *Hämin* ergab 3, *Mesohämin* 2, bei 40° 3, *Hämin*-1 akt. H. Die Zahlen für *Hämin* stimmen leidlich, wenn man die Annahme macht, daß an Fe gebundene Cl mit dem Grignardreagens unter B. von CH_3Cl reagiert. *henylchlormethan* ergibt ebenfalls einen positiven Wert. KÄMMERERS bzw. *rphyrin* gibt in Übereinstimmung mit der angenommenen Formel 4 H, *Ätioporin*, *Uroporphyrinester*, *Koproporphyrinester*, *Tetramethylhämatoporphyrin* je 2 H. *Mesoporphyrindiäthylester* reagierte nur 1 Pyrrolkern, möglicherweise infolge einer Betainbildung. *Mesoporphyrinogen* gab wie die synthet. *Tetrapyrroläthane* t. H, bei denen 2 auf die Carboxylgruppe entfallen. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 312. München, Techn. Hochsch.) GUGGENHEIM.

M. Bergmann, Über den hochmolekularen Zustand von Kohlenhydraten und Proteinen seine Synthese. (Vgl. S. 350.) Theoret. Betrachtungen über den Aufbau der enhydrate u. Proteine im Zusammenhang mit neuen, bereits veröffentlichten nden des Vf.s (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 1141—44. 1925. Dresden.) OHLE.

Percy Brigl und **Robert Held**, Eiweißchemie. III. Zur Konstitution der Eiweiß-*r*. (II. vgl. BRIGL u. KLENK, Ztschr. f. physiol. Ch. **131**. 66; C. **1924**. I. 674.) oisher für die Diketopiperazinstruktur des Eiweißes erbrachten Beweise — Verh. Farbrkk., bei Oxydation u. Red. — werden als nicht stichhaltig angesehen. Eine die Diketopiperazinstruktur sprechende Tatsache erblicken Vff. in den Er-*issen* der Elementaranalysen bzw. in dem daraus errechneten Verhältnis von . Dieses müßte etwa 1:1 betragen, wenn man annimmt, daß das Eiweiß poly-*d-* oder diketopiperazinartig aus Monoaminosäuren aufgebaut ist. Tatsächlich

see
erata
p. 3977


liegt es bedeutend höher, beim *Lactalbumin* 1,28:1, *Serumalbumin* 1,23:1, *Seroglobulin* 1,29:1, *Casein* 1,27:1, *Fibroin* 1,18:1, *Elastin* 1,12:1. Auch wenn man Anwesenheit von Dicarbonsäuren u. Oxyaminosäuren berücksichtigt, bleibt der errechnete Wert erheblich hinter dem tatsächlichen zurück. Beim *Lactalbumin*, von dem 8 der Aminosäuren isoliert wurden u. das 10% Oxyglutaminsäure enthält, gelangt n. z. B. bei Annahme einer Polypeptidstruktur zum Werte 1,15. Das große Defizit zwischen den errechneten u. tatsächlich gefundenen Werten deutet auf das Vorhandensein von bisher noch unbekannten O-haltigen Komplexen, welche nach der Ansicht der Vff. nicht ausschließlich Oxyaminosäuren sind. Es wurde geprüft, ob das Eiweiß nicht aus einer Reihe von parallelen Polypeptidketten bestehen könnte, die ihrerseits entweder an den endständigen Amino- oder Carboxylgruppen durch O-haltige Restzusammengehalten werden, die Aminogruppen carbamidartig durch CO_2 , die Carboxylgruppen esterartig durch einen mehrwertigen A. Die gleichzeitige Berücksichtigung dieser beiden Möglichkeiten ergibt folgendes Schema:



welches nicht nur im Einklang mit dem Verhältnis O:N, sondern auch mit verschiedenen bisher ungeklärten Befunden der Eiweißchemie steht. Zur Prüfung der Hypothese wurde das Verh. von *Carbonyl-bis-glycylglycinester* u. *Carbonyl-bis-glycylglycin* studiert (E. FISCHER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **35**. 1095; C. **1902**. II. 9) gegen Reagenzien, welche die Dipeptidstruktur nicht angreifen, nämlich gegen geschmolzenes Phthalsäureanhydrid, NaOBr u. Pepsin. Phthalsäureanhydrid bewirkt Sprengung der Ureidbindung u. B. des *Phthalglycylglycins* (BRIGL u. KLENK, Ztschr. f. physiol. Ch. **131**. 66; C. **1924**. I. 674). NaOBr sprengt beim *Carbonyl-bis-glycylglycin* zunächst die Ureidbindung, um nachher allmählich die Polypeptidstruktur zu lösen. Der Verlauf der Zersetzungskurve des NaOBr ist ähnlich wie beim Eiweiß (vgl. GOLDSCHMIDT u. STEIGERWALD, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1346; C. **1919**. II. 1169). Nach der Hypobromitreaktion findet man von den 4 ursprünglich vorhandenen N-Atomen nach DUMAS 3,5, nach KJELDAHL 3. Das zunächst auftretende Reaktionsprodukt ist ein sauer reagierendes Acylderivat des Glycins, das aber nicht isoliert werden konnte, sich unter Abspaltung von Glycin zersetzt, welches als Glycinesterbromhydrid isoliert wurde. Pepsin u. Trypsin zeigten keine merkliche Einwirkung. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 230—48. Hohenheim, Landw. Hochschule.)

GUGGENHEIM

Max Bergmann und **Leonidas Zervas**, *Über die Aldehydverbindungen der Aminosäuren und ihre präparative Verwendung*. Wie früher (BERGMANN, ENSERIN u. ZERVAS, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1034; C. **1925**. II. 810) wurden die N-Aldehydverbindungen von *d,l-Serin*, *l-Cystin*, *l-Histidin*, *d-Arginin*, *d-Ornithin* u. *d-Lysin* dargestellt. Die Benzaldehydverbindung des *d-Arginins* fällt auch aus alkalischer Lösung. Das *d-Arginin* u. ist in allen Lösungsmitteln fast unlöslich. Offenbar ist die Carboxylgruppe des *Arginins* festgelegt, möglicherweise durch die Guanidogruppe. In Säuren ist *d-Benzylidenarginin* II. unter Abspaltung von $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CHO}$. Salicylaldehyd bildet mit freiem *Arginin* *Monooxybenzylidenarginin*, mit Argininnitrat entsteht bei Abstumpfung der HN -Gruppe mit NaOH eine Verbindung der Zusan. $[\text{HO} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_4]_4 \cdot \text{NaNO}_3$. Für das *Ornithin* kommt Formel I in Betracht. Mit Hilfe der Benzylidenverbindung lassen sich *Arginin*, *Lysin* u. *Prolin* aus *Gelatine* durch Hydrolyseprodd. der *Gelatine* isolieren u. trennen. Man trennt zu diesem Zwecke die mit Phosphorwolframsäure fällbaren Aminosäuren ab u. fällt aus dieser Fraktion bei neutraler Reaktion das *Arginin* u. einen Teil des *Lysins* als Benzylidenverbindung. Beim Behandeln mit Alkali hinterbleibt reines Benzylidenarginin. Die alkalische Lösung liefert beim Behandeln mit Säuren *Lysin*, das über die Verbindung mit Salicylaldehyd gereinigt u. mit HCl als Chlorid



trat abgeschieden wurde. Der übrige Teil der mit Phosphorwolframsäure abgetrennten Aminosäuren ließ sich durch absol. A. in das Gemisch von l- u. d,l-Prolin zerlegen. Aus 100 g Gelatine wurden erhalten: 6,43 g d-Arginin, 3,48 g Lysindichlorid, 7,44 g Prolingemisch (4,5 g l-Prolin, 2,6 g d,l-Prolin). Handelt es sich nur um die Isolierung des Arginins, so wird nach Entfernung der überschüssigen Säure mit $C_6H_5CHO + Baryt$ nacheinander zuerst Glycin, dann das Arginin abgeschieden. Die Argininverb. ist nach einmaligem Lösen rein. Aus 100 g Gelatine wurden erhalten: 2,95 bis 4,43 g Arginin u. mindestens g Glykokoll. Verkocht man Arginin mit Baryt u. versetzt mit Salicylaldehyd Ggw. von Baryt, so scheidet sich das o-Oxybenzylidenornithin-Ba ab. Die Vers., em. Aminosäuren durch Darst. der Aldehydverb. u. Überführung der Alkaloid- in ihre opt.-akt. Komponenten zu trennen, ergaben kein befriedigendes Resultat. Nur beim o-Oxybenzyliden-serin wurde eine teilweise Spaltung erreicht. Mit Hilfe der Aldehydverb. sollen auch Proteine u. höhere Proteinspaltprodd. abgeschieden werden. Aus Protaminen u. aus Edestin konnten so kristallisierte Verb. abgetrennt werden. — o-Oxybenzyliden-l-histidinbrucin,

$C_{109}H_{120}O_{24}N_{12} = 4 C_7H_6O_2 + 2 C_6H_5O_2N_3 + 3 C_{23}H_{26}O_4N_2$.
 96—102° unter Zers. Ll. in A., Chlf., Essigester unter Spaltung. Benzyliden-l-in-Ba, $C_{20}H_{18}O_4N_2S_2Ba$, farblose Nadeln aus W. o-Oxybenzyliden-l-cystin-Ba, $I_{18}O_6N_2S_2Ba$, gelbe Nadeln. o-Oxybenzyliden-d,l-serinchinin, $C_{30}H_{35}O_6N_3$, aus 1 Mol. Aldehyd + 1 Mol. Serin + 1 Mol. Chinin. Citronengelbe Nadeln mit 3 Moll. H_2O . n A., Chlf., Essigester, wl. in W., Ä. u. PAe. o-Oxybenzyliden-d,l-serincinchonidin, $I_{33}O_5N_3$, hellgelb. o-Oxybenzyliden-serin-Brucin, $C_{33}H_{37}O_8N_3$, gelbe Nadeln oder men. L. in viel W., A., Chlf., Essigäther, F. 140° (Zers.). Das Salz enthält neben etwas d-Serin. Benzylidenarginin, $C_{13}H_{18}O_2N_4 + 1 H_2O$, wetzsteinartige Blättchen. in fast allen organ. Lösungsm., l. in h. W. u. in benzaldehydhaltigem CH_3OH . zert bei 200°, schmilzt bei 204—205° zu einer gelbbraunen Fl. o-Oxybenzyliden-arginin, $C_{13}H_{18}O_3N_4$, hellgelbe Prismen, F. 211° unter Aufschäumen. L. in viel W. Alkalien, wl. in organ. Mitteln. o-Oxybenzyliden-d-arginin-Na-Nitrat ($C_{13}H_{18}O_3N_4$)· $NaO_3 + 16 H_2O$, büschelförmige, gelbe Nadeln. Ll. in W. Monobenzyliden-d-lysin, $I_{18}O_2N_2$ beginnt bei 140° zu sintern u. schmilzt bei 205—206°. L. in w. W. u. alien. Mono-o-oxybenzyliden-d-lysin, $C_{13}H_{18}O_3N_2$, gelbe büschelförmige Nadeln. Darstellung von d-Arginin, d-Lysin, l- u. d,l-Prolin aus Leim. 200 g Gelatine werden zdn. mit konz. HCl gekocht, die HCl abgedampft, mit ca. 925 g Phosphorwolframsäure ausgefällt, der Nd. mit Baryt zerlegt u. die Lsg. der freien Aminosäuren zur Trockne gedampft. Man löst in 40—45 ccm W. u. versetzt mit 20 g C_6H_5CHO , wobei sich das Arginin u. ein Teil des Lysins als kristallisierte Benzylidenverb. abscheiden. Ausbeute ca. 22 g. Zur Entfernung des Benzylidenlysins wird der Nd. mit der Lsg. von 5 g Baryt in 60 ccm W. geschüttelt, wobei das Benzylidenarginin ungelöst bleibt. Es wurde mit der berechneten Menge 5-n. HNO_3 zerlegt u. das Nitrat durch Ausätherung des C_6H_5CHO kristallisiert. Ausbeute 15,1 g. Das Lysin findet zum Teil in der barythaltigen Waschfl. des Benzylidenarginins, zum größeren Teil im Filtrat des Nd. des Benzylidenarginins u. -lysins. Aus ersterem gewinnt man nach Entfernung des Ba mit H_2SO_4 über die Oxybenzylidenverb. rein oder weniger, wenn man mit HCl ansäuert, zur Trockne dampft, das Lysinchlorhydrat mit OH vom $BaCl_2$ trennt u. mit Ä. abscheidet. Zur Gewinnung des anderen Lysinfraktionals wurde das Filtrat der Benzylidenverb. mit 5-n. H_2SO_4 angesäuert, ausgeäthert, H_2SO_4 befreit u. eingedampft. Der Rückstand wird mit A. ausgekocht, wobei g d,l- u. 7,9 g l-Prolin in Lsg. gehen. Aus dem ungel. Rückstand wird das Lysin als Pikrat gefällt. Gesamtausbeute an d-Lysindichlorhydrat 2,3%. Will man nur Arginin isolieren, so wird das Gelatinehydrolysat von 200 g Gelatine nach Entfernung der Hauptmenge HCl mit NaOH neutralisiert u. mit einer Lsg. von 260 g kry-

stallisiertem Baryt u. mit 210 g C₆H₅·CHO versetzt. Es erfolgt zunächst Abscheidung von etwa 60 g *Benzylidenglycin-Ba*. Aus dem unterhalb 28° konz. Filtrat scheiden sich das krystallisierte *Benzyliden-d-arginin* ab. *Darstellung von Ornithin aus Arginin*. 3 g d-Argininnitrat werden mit 5 g krystallisiertem Baryt u. 15 ccm W. 1½ Stg gekocht, nach dem Erkalten filtriert u. mit 3 g HO·C₆H₄CHO geschüttelt, wo sich das *o-Oxybenzylidenornithin-Ba* in gelben Nadeln abscheidet. Der Nd. wird mit HCl zerlegt, ausgeäthert, zur Trockne gedampft, das Ornithinchlorid mit CH₃OH von BaCl₂ abgetrennt u. mit absol. A. abgeschieden. Ausbeute 23% der Theorie. Der Hauptverlust entsteht voraussichtlich bei der Verkochung mit Baryt. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 282—99. Dresden, Kaiser Wilh.-Inst. f. Lederforsch.) G.

E. Biochemie.

Julius Stoklasa, *Die Rolle des Aluminiums im Leben der Organismen*. Vf. referiert über die Rolle des Al in der Farbbildung der Blütenblätter, in der Pigmentation der Vogelfedern, der Käferflügeldecken u. in der sogenannten „Austauschacidität“ des Bodens. (Revue internat. de Renseignements agricoles **3**. 10 Seiten. 1925. Sep.) Tr

E₁. Enzymchemie.

Bridel und C. Charaux, *Fermenthaltiger Extrakt aus den Samen verschiedener Rhamnusarten oder Rhamnodiastase*. (Bull. Soc. Chim. Biol. **8**. 35—39. — C. **1926**. I. 2208.) OPPENHEIMER.

M. Bridel und C. Charaux, *Biochemische Methode der Prüfung auf hydrolytische Glukoside durch die Rhamnodiastase in Pflanzen*. (Bull. Soc. Chim. Biol. **8**. 40—49. C. **1926**. I. 2612.) OPPENHEIMER.

George Edward Briggs, *Eine weitere Notiz über die Kinetik von Enzymwirkungen* (Vgl. Biochemical Journ. **19**. 338; C. **1925**. II. 726.) Unter der Annahme, daß das Zuckeräquivalentgewicht gleich ¼ des Äquivalentgewichtes der Saccharase ist (was aus den Befunden von EULER, Ztschr. f. physiol. Ch. **121**. 177; C. **1922**. III. 103 erschlossen wird), findet man in einer Lsg. von Saccharase u. Zucker Saccharasemoleküle mit 0—4 Molekülen Zucker. Bezeichnet man die Bruchteile, die die 5 Saccharasemoleküle von der Gesamtmenge des Enzyms darstellen, mit x, y, z, u, v , so ist der wirksame Bruchteil c_s der Gesamtmenge des Enzyms gleich $\frac{1}{4}(y + 2z + 3u + 4v)$; das bedeutet, daß ein mit 2 Molekülen Zucker verbundenes Molekül der Saccharase doppelt so wirksam ist wie das mit einem Molekül Zucker verbundene Enzymmolekül. Nimmt man an, daß zu gleicher Zeit immer nur ein Molekül Zucker gebunden oder abgegeben werden kann, dann erhält der Ausdruck für den Anteil des wirksamen Enzyms folgende Form:

$$4c_s = \frac{s \cdot k_s^3 + s^2 \cdot k_s^2 + s^3 \cdot k_s/2 + s^4/6}{k_s^4 + s \cdot k_s^3 + s^2 \cdot k_s^2/2 + s^3 \cdot k_s/6 + s^4/24},$$

worin s die Konz. des Substrates bedeutet u. $k_s = (k_2 + k_3)/k_1$ ist, wenn k_2 der Reaktionskoeffizient der Ablösung der Zuckermoleküle u. k_3 der Reaktionskoeffizient der B. von Invertzucker ist. Die so erhaltenen Werte weichen ganz erheblich von den nach der Gleichung von MICHAELIS u. MENTEN (Biochem. Ztschr. **49**. 33 C. **1913**. I. 1614) erhaltenen Werten ab. — Nimmt man nun noch weiter an, daß die Vereinigung der Zuckermoleküle mit dem Enzym an ein oder zwei Stellen erfolgen kann, so wächst die Zahl der möglichen Enzym-Zucker-Moleküle auf 9. Wenn nur bei den Enzym-Zucker-Molekülen, bei denen der Zucker an eine Stelle gebunden ist, B. von Invertzucker erfolgen kann, so ist die Aktivität des wirkenden Teiles des Enzyms gegeben durch die Gleichung:

$$4c_s = \frac{s k_i^2 k_s^3 + s^2 \cdot k_i^2 k_s^2 + s^3 \cdot k_i^2 k_s/2 + s^4 \cdot k_i^2/6 + s^2 \cdot k_i k_s^3 + s^3 \cdot k_i k_s^2}{k_i^2 k_s^4 + s k_i^2 k_s^3 + s^2 \cdot k_i^2 k_s^2/2 + s^3 \cdot k_i^2 k_s/6 + s^4 \cdot k_i^2/24 + s k_i k_s^4 + s^2 \cdot k_i k_s^3 + s^3 \cdot k_i k_s^2/2 + s^3 \cdot k_i k_s/2 + s^4 \cdot k_i/24},$$

bei bedeutet k_i das Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten von Bindung u. Lösung der zweiten Klasse von Zuckermolekülen. (Biochemical Journ. **19**. 1037 1038. 1925. Cambridge, Botan. Schule.) HESSE.

Hans v. Euler und Karl Josephson, *Über verschiedene Hemmungserscheinungen der enzymatischen Rohrzuckerspaltung*. Nach einer Zusammenfassung der Arbeiten der Vff. über den Mechanismus der Hemmungserscheinungen (vgl. S. 2006) I über den Einfluß von *Galaktose*, *Zymophosphat* u. *Acetaldehyd* auf die Hemmung der *Saccharase* durch die Spaltprodd. des Rohrzuckers, sowie über die Hemmung der *Saccharase* durch Amine berichtet. — *Galaktose*, *Zymophosphat* u. *Acetaldehyd*, die jeder für sich die *Saccharase* hemmen, verringern die durch *Glucose* bewirkte Hemmung, während sie auf die durch *Fructose* bewirkte Hemmung ohne Einfluß haben. Diese Stoffe werden also wahrscheinlich an die gleiche Gruppe der *Saccharase* binden wie die *Glucose*. Für *Zymophosphat* würde das eine mehr *glucose*-ähnliche statt *fructose*-ähnliche Konst. wahrscheinlich machen. — Die Hemmung der *Saccharase* durch Amine, welche von der Substratkonz. unabhängig ist u. daher als eine Änderung der Zerfallsgeschwindigkeit der Enzym-Substratverb. beruhende Hemmung anzusehen ist, wird durch Zusatz von *Glucose* oder *Fructose* zum Teil aufgehoben. Es beruht dies wahrscheinlich auf einer Rk. zwischen Zucker u. Amin, bei der die *Glucose* leichter reagiert als die *Fructose*. Die mit meßbarer Geschwindigkeit verlaufende Rk. zwischen Zucker u. Amin wird genau gemessen. Es wird darauf hingewiesen, daß solche Reaktivierungen auch durch im Enzymmaterial vorhandene Stoffe erfolgen könnten; z. B. könnten die Verss. von KUHN (Ztschr. f. physiol. Ch. **129**. 57; C. **1923**. III. 1174) über die *Saccharasen* aus *Asp. oryzae* u. aus *Asp. nidulans* eine Erklärung finden. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 31—54.) HESSE.

Hans v. Euler und Karl Josephson, *Einfluß der Hefenvorbehandlung auf die Affinitätskonstanten der Saccharase*. I. (7. Mitt. über die Affinitätsverhältnisse der Saccharase.) (Vgl. S. 1212 u. 2006.) Hefe bildet am schnellsten u. reichlichsten *Saccharase*, wenn sie irgend einen Zucker vergärt. Dabei handelt es sich um einen Übergang von inaktivem in aktives Enzym in der Zelle, wobei wahrscheinlich eine Neugruppierung von enzymat. wirksamen Gruppen stattfindet. Nimmt man an, daß die lebende Hefe die Fähigkeit besitzt, die für ihre gesteigerte Wirksamkeit zweckmäßigsten Enzymgruppen auszubilden, so müßte man durch Anwendung verschiedener Zucker bei der vorbehandelnden Gärung in der Lage sein, *Saccharasen* mit gewissen Aktivitätsverhältnissen zu erhalten; z. B. müßte die Vorbehandlung mit Rohrzucker (= *Fructose* + α -*Glucose*) einen etwas anderen Einfluß auf die Konst. u. Konfiguration der gebildeten spezif. substratbindenden Gruppen des Enzyms haben können als die Vorbehandlung mit nur *Glucose* oder nur *Fructose*. Hierüber muß also eine Unters. der Affinitätsverhältnisse (Best. von K_M) der gebildeten Zucker zu den mutameren Enzymen von *Glucose* u. zu der *Fructose* Auskunft geben. Tatsächlich ergaben sich bei Vorbehandlung von *Saccharasen* aus Münchener Löwenbräuhefe mit verschiedenen Zuckern Unterschiede in den gemessenen Affinitätskonstanten. Bei Vorbehandlung mit Rohrzucker oder mit α -*Glucose* wird die Affinität zur α -*Glucose* erhöht, während die Affinität zu β -*Glucose* oder zu *Fructose* keine Steigerung erfährt; dabei ist bei der vorbehandelten *Saccharase* die Affinität zu α -*Glucose* etwas größer als zu β -*Glucose* u. nur unwesentlich kleiner als die Affinität zur *Fructose*, während die vorbehandelte *Saccharase* eine im Verhältnis zu der Affinität zur *Fructose* nur geringe Affinität zur α -*Glucose* besitzt. Gleichzeitig scheint eine gewisse Steigerung der Affinität zum Rohrzucker einzutreten. Da diese jedoch nur gering ($K_M = 33$ statt 100) ist, sind die aus den Prodd. der Affinitätskonstanten der beiden Spaltprodd. des Rohrzuckers erhaltenen Werte (etwa 4-mal) größer als der experimentell ermittelte Wert der Affinitätskonstante der Rohrzucker-*Saccharase*verb. — Zur Deutung der

veränderlichen Affinitätskonstanten der Saccharase zu Fructose bzw. Glucose stehen zwei Ausnahmen offen: 1. Bei Vorbehandlung wird an jeder Affinitätsgruppe spezif. Affinitätskraft geändert (in Analogie z. B. mit der Änderung der elektr. Dissoziation der Carboxylgruppe bei Substitution im Molekül der Säure). 2. Vorbehandlung kann die relative Anzahl der fructose- u. glucosebindenden Affinitätsgruppen der Saccharase ändern. Hieraus ergibt sich auch die schon früher (l. c.) gefundene teilweise Unabhängigkeit der beiden Affinitätsgruppen. — Die Unterschiede zwischen den Affinitätskonstanten der Saccharase zu Glucose u. zu Fructose werden durch die vorbehandelnde Gärung nach WILLSTÄTTER, LOWRY u. SCHNEIDER (S. 2) mehr ausgeglichen, als wenn die Vorbehandlung nur mäßig weit getrieben wurde. Die dabei erhaltenen Werte lassen vermuten, daß die Erhöhung der Affinität zu Fructose auf die Steigerung der Affinität zu α -Glucose zurückgeführt werden kann (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 66—87. Stockholm, Hochschule.) HESS

Rintaro Tateyama, *Über die Fermente in der menschlichen Brustdrüse*. Die in 24—48 Stdn. alten Frauenleichen stammenden Brustdrüsen wurden nach Zerkleinerung mit der $1\frac{1}{2}$ -fachen Menge physiolog. NaCl-Lsg. bei 0° extrahiert. Nachgewiesen u. untersucht wurden eine *Peptidase*, welche Glycyltryptophan zu zerlegen vermag, eine sehr wirksame *Nuclease*, *Phosphatase*, *Diastase*, eine gegen Chinin u. Atropin unempfindliche *Tributyrase*, eine *Phenolase*, welche Brenzcatechin u. Adrenalin oxydieren kräftig, dagegen Dioxyphenylalanin nur schwach zu oxydieren vermag. — Die *Peptidase* konnte entgegen den Angaben von GRIMMER (Biochem. Ztschr. **53**. 407. C. **1913**. II. 887) auch in der ruhenden Brustdrüse nachgewiesen werden. Die *Nuclease* ist besonders wirksam während der Lactation, während bei der *Phosphatase* ein Unterschied zwischen ruhender u. lactierender Drüse nicht gefunden wurde. *Diastase* hat nach WOHLGEMUTH bestimmt im Extrakt aus der ruhenden Drüse $d_{24}^{380} = 64$, in der lactierenden Drüse 256, während im Blute d_{24}^{380} zwischen 120 und 512 schwankt. — *Lactase* wurde nicht gefunden; da aber in den meisten Versuchsvers. Einw. von Brustdrüsenextrakt auf Lactose eine Abnahme der Reduktion gefunden wurde, wurde untersucht, ob ein oxydativer Abbau des Zuckers stattfindet. Es konnte mit Hilfe des Abfangverf. (Zusatz von Calciumsulfid) gezeigt werden, daß die Drüse aus Zuckern Aldehyd bildet u. zwar wurden aus je 0,5 g Milchzucker 6,4 u. Glucose u. Galaktose bei pH 6,5 (unter Zusatz von 0,5 g Optochin. bas.) 6,4, 1,7 bzw. 5,7 g Aldehyd durch je 50 g Substanz aus lactierender u. 2,0, 1,7 bzw. 1,1 g Aldehyd durch je 50 g Substanz aus ruhender Brustdrüse gebildet. — Die lactierende Drüse enthält etwas mehr *Tributyrase* als die ruhende Drüse; in beiden Fällen ist die Fermentmenge klein im Vergleich zum Fermentgehalt des Blutes. (Biochem. Ztschr. **163**. 297—307. 1925. Berlin, Virchow-Krankenh.) HESS

Robert Alexander McCance, *Die Wirkung der Tyrosinase auf Phenole, Tyrosin und andere Aminosäuren*. (Vgl. ROBINSON u. McCANCE, Biochemical Journ. **19**. 251; C. **1925**. II. 406.) Die verschiedenen, als H-Acceptoren dienenden Substanzen weisen Spezifitäten auf, deren Grund in ihrer chem. Struktur zu liegen scheint. Da Tyrosinase die Red. von Methylenblau durch eine pH = 8 zeigende Lsg. von p-Kresol + Glykokoll katalysiert, scheint das Enzym durch H₂-Aktivierung zu wirken. — Die Wrkg. der Tyrosinase (aus *Lactarius vellereus* u. aus Mehlwurm) auf Tyrosin beruht darauf, daß Tyrosin gleichzeitig ein Phenol u. eine Aminosäure ist u. obwohl die Aminosäure nicht einer Desamidierung unterliegt (vgl. HAPPOLI, RAPER, Biochemical Journ. **19**. 92; C. **1925**. I. 2451), diese dort als ein Co-Enzym für die Oxydation des Phenols wirkt. Ähnlich kann die Aminosäure in dem System p-Kresol + Aminosäure + Tyrosinase zwar nicht oxydiert werden, hat aber an der Rk. wesentlichen Anteil. — Die spontane Oxydation von Phenolen allein oder in Gegenwart von Aminosäuren wird von KCN nicht beeinflusst; $\frac{1}{500}$ m. KCN verhindert die akt.

aerobe Wrkg. der Tyrosinase. — Es wurden folgende Additionsverb. hergestellt.
 $\text{Diäthylamin} + 2 \text{ Brenzcatechin}$, $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N} + 2 \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$. Aus den Komponenten in l. A., weiße, rechteckige Platten, F. 78—79°, ll. in W. u. Ä., wl. in Bzl. u. PAe. In einmonatigem Aufbewahren waren die Krystalle braun geworden unter völligem Fall der Verb. — $\text{Diäthylamin} + 2 \text{ Resorcin}$, $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N} + 2 \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$. Aus den Komponenten in Ä. Weiße Nadeln, F. 115°, Löslichkeit wie bei der ersten Verb. Die Krystalle waren nach 6 Mon. nicht braun geworden. — Um die bei der Einw. von Tyrosinase auf p-Kresol entstehende Verb. zu erforschen, wurde eine Additionsverb. $\text{Chinon} + 2 \text{ p-Kresol}$, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 + 2 \text{C}_7\text{H}_7\text{O}$, hergestellt; orangerote Nadeln, F. 63,5°. (Chemical Journ. 19. 1022—31. 1925. Cambridge, Biochem. Lab.) HESSE.

J. Wohlgemuth und N. Sugihara, *Über Aktivierung und Hitzebeständigkeit von Fermenten. Zugleich ein Beitrag zur Frage von den Beziehungen zwischen Lab und Pepsin*. Früher war von HIZUME (Biochem. Ztschr. 146. 52; C. 1924. II. 477) unterstellt worden, welchen Einfluß die Ggw. von aktivierend wirkenden Salzen auf die Hitzebeständigkeit der Amylase hat. Die gleiche Frage wird jetzt für Lab u. Pepsin untersucht. Als Ferment diente Pepsin Witte, das auch eine gute Parachymosin-aktivität hatte. Es ergab sich, daß Parachymosin, welches durch CaCl_2 aktiviert wird, in wss. Lsg. durch dieses Salz auch vor der Zerstörung durch erhöhte Temp. (60°) geschützt wird. Man beobachtet nur eine geringe Abnahme der Wrkg. der wss. Lsg. nach 1-stdg. Erhitzen auf 60°. Durch Vergleich der Wrkg. von $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ u. MgCl_2 ergab sich keine aktivierende Wrkg. ausüben, mit der Wrkg. von $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ u. CaCl_2 verglichen, daß die Schutzwrgk. in erster Linie durch das Ca^{++} -Ion verursacht wird, daß aber diese Wrkg. in Ggw. von Cl^- -Ion verstärkt wird. — Chymosin (Chymase nach OPPENHEIMERS Nomenklatur) unterscheidet sich von Parachymosin u. a. dadurch, daß es durch CaCl_2 wenig oder gar nicht aktiviert wird. Wenn also die Annahme richtig ist, daß Schutzwrgk. u. Aktivatorwrgk. der Salze miteinander zusammenhängen, so müßte Chymosin (Labpräparat [WITTE] aus Kälbermagen) auch in wss. Lsg. von CaCl_2 durch Erhitzen vernichtet werden. Diese Voraussage konnte experimentell bestätigt werden; darüber hinaus scheint sogar CaCl_2 die Zerstörung von Chymase durch Hitze in wss. Lsg. noch zu beschleunigen. — Pepsin, welches durch CaCl_2 nicht aktiviert wird, wird in wss. Lsg. durch CaCl_2 vor der Zerstörung durch Erwärmen auf 60° geschützt. — Da also Pepsin u. Lab sich gegenüber CaCl_2 in bezug auf die Aktivierung verschieden, bezüglich der Schutzwrgk. gleich verhalten, ist es wichtig, sich für die Frage nach der Identität der beiden Fermente, daß zwischen ihnen keine nahe Beziehungen bestehen. Vff. wollen nicht die Identität der Enzyme behaupten, glauben jedoch, daß mindestens die von NENCKI u. SIEBER (Ztschr. f. physiol. Ch. 32. 291 [1901]) vermuteten sehr nahen Zusammenhänge bestehen. (Biochem. Ztschr. 163. 253—59. 1925.) HESSE.

J. Wohlgemuth, Die Fermente der Haut. III. N. Sugihara, *Vergleichende Untersuchungen über den Fermentgehalt frischer Haut von Mensch und Tier und über den Einfluß verschiedener Lichtarten auf die Haut*. (II. vgl. Biochem. Ztschr. 153. 487; C. 1925. I. 1878.) Die früheren, nur an der Haut von Leichen vorgenommenen Untersuchungen konnten an der Haut von Lebenden wiederholt werden; verwendet wurden kleine Partien der Haut vom Unterschenkel zweier Männer (20 u. 40 Jahre), denen der Unterschenkel wegen plötzlich eingetretener Gangrän abgesetzt werden mußte. Die vom anhaftenden Fett befreite Haut wurde unter Zusatz von Glassplittern mit wss. NaCl-Lsg. im Verhältnis 1 : 2 verrieben; nach eintägigem Stehen im Eisschrank wurde der Brei zentrifugiert u. das Extrakt zur Unters. verwendet. Es ergab sich, daß der Fermentgehalt der menschlichen Haut (Diastase, Phenolase, Gelatinase, etc.) in lebensfrischem Zustand der gleiche ist wie der von Leichen, die 2 oder 3 Tage post exitum zur Unters. kamen. — Mit der gleichen Methodik wurde der Fermentgehalt der lebensfrischen Haut von Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hund,

Kaninchen, Katze, Meerschweinchen, Ratte, Huhn, Fisch, Frosch untersucht. Haut der untersuchten Tiere (mit Ausnahme von Schaf) enthält mehr Diastase (Amylase), als die Haut des Menschen. Die höchsten Werte wurden für Meerschweinchen, Ratte (64—128-mal mehr als beim Menschen) u. Frosch gefunden. Phenolase wird in absteigender Menge gefunden bei Ratte, Frosch, Schwein, Kaninchen, Meerschweinchen, Mensch, Rind, Schaf, Ziege, Hund. — Gelatinase, welche beim Menschen entweder fehlt oder in geringer Menge vorhanden ist, konnte nicht nachgewiesen werden bei Frosch, Schwein, Meerschweinchen, u. wurde nur ab und zu bei Rind u. Schaf gefunden. Bei den übrigen Tieren war sie am kräftigsten bei der Katze vorhanden. — Lipase ist in jeder Haut (außer bei Fisch) in größeren Mengen vorhanden. Empfindlichkeit der Lipase gegen Atoxyl u. Chinin konnte nur bei Rindschafhaut gefunden werden. — Ein Zusammenhang der Fermentgehalte in Haut u. Blut wurde nicht gefunden. — Bestrahlung von Meerschweinchen (bei abrasierter Rückenhaut) mit natürlichem Sonnenlicht, künstlicher Höhensonne u. Ultrasonne (LANDEKER-STERNBERG) führt bei genügend langer Bestrahlung zu einer beträchtlichen Vermehrung (um das 2—4-fache) der Phenolase, zu einer erheblichen Verringerung der Diastase u. zu geringfügiger Abnahme der Lipase. Röntgenstrahlen bewirken Abnahme der Phenolase, aber keine Änderung von Diastase u. Lipase. In keinem Falle wurde durch die Bestrahlung eine Änderung im Fermentgehalt des Blutes bewirkt. (Biochem. Ztschr. **163**. 260—70. 1925. Berlin, Virchow-Krankenh.) HESS

Nogaki, *Über die Kinetik der Esterspaltung durch Leberlipase*. Von KNAFFL-LENZ (Medd. Kgl. Vetenskapsakad. Nobelinst. **6**. Nr. 2. 1; C. **1923**. III. 261) gefunden worden, daß die Esterverseifung durch Lipase zunächst proportional zwischen Versuchszeit u. umgesetzter Menge ergibt, u. daß erst gegen Ende der Reaktion diese nach der Gleichung für monomolekulare Rkk. verläuft. KNAFFL-LENZ erklärt diesen Reaktionsverlauf so, daß die Verseifung bei Zerfall einer intermediär bestehenden Verb. von Ester + Lipase erfolgt, wobei solange noch der Ester im Überschuß vorhanden ist, die Konz. der Ester-Lipaseverb. konstant bleibt u. daher Proportionalität von Versuchszeit u. umgesetzter Menge gefunden wird. Demgegenüber erklärt ARRHENIUS (Medd. Kgl. Vetenskapsakad. Nobelinst. **6**. Nr. 4. 1; C. **1923**. I. 347) bei einer Kritik der Zahlen von KNAFFL-LENZ diesen Reaktionsverlauf entstanden, daß die Lipase aus mehreren Komponenten bestehe, von denen diejenige am schnellsten zerstört werde, die die größte Reaktionsgeschwindigkeit bei der Zersetzung der Ester zeige. Es wurden nun neue Verss. bei verschiedenen Temp. angestellt, welche es höchst wahrscheinlich machen, daß nicht eine allmähliche Zerstörung mehrerer gleichzeitig vorhandener Enzyme die Ursache der erwähnten Abweichung vom n. Reaktionsverlauf ist, sondern daß die Verteilung des Enzyms zwischen Substrat u. Spaltprodd. hierfür eine hinreichende Erklärung gibt. — Als Fermentlsg. die mit CaCl_2 + Na-Phosphat versetzter Preßsaft aus Lebern, der nach mehrstd. Stehen von dem erhaltenen Nd. abgetrennt u. dann mit Glycerin versetzt war. Das pH der Reaktionsgemische wurde durch entsprechende Zugabe von NaOH während der Versuchsdauer konstant gehalten. — Läßt man HCl ($\text{pH} = 4,6$) mehrere Stdn. Ggw. von Ester auf Lipase wirken u. macht dann alkal. ($\text{pH} = 8,6$), so ist die Wirkung der Lipase nach 4 Stdn. Vorbehandlung bei 15° um 20%, bei 10° um 9%, bei 10° $\text{pH} 4,2$ kaum merklich zurückgegangen. Die Verseifung durch vorbehandelte Lipase verläuft wie mit nicht vorbehandelter Lipase. Dabei ist die Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit in saurer wie in alkal. Lsg. größer als die, welche durch Vorbehandlung der Lipase mit Säure verursacht wird. Diese Befunde sprechen also gegen die Annahme von Lipasen verschiedener Widerstandsfähigkeit u. Stärke. — Die Verseifung der einzelnen Ester verläuft verschieden; die umgesetzte Menge ist der Zeit nicht genau proportional. Bei Äthylbutyrat u. Propionylpropionat nimmt der Quotient x/t erst rasch u. dann allmählich ab; bei Äthylpropionat steigt die Geschwindigkeit

see
errata
p. 3917

am Anfang ein wenig u. fällt dann allmählich; besonders deutlich ist dies bei sam verlaufender Spaltung (bei niedriger Temp. bzw. geringen Enzymmengen). Zeiten, in denen die halbe Menge des Äthylbutyrates umgesetzt ist, verhalten bei den Enzymkonz. 1:3:6 bei 20° wie 1:2,99:5,88, bei 30° wie 1:2,95:5,9 bei 40° 1:3,4:6,1. Bei Propylpropionat sind die entsprechenden Zahlen bei 30° 1:1,92:2,76, 40° 1:1,77:2,69. Bei Äthylpropionat erfolgt bis zur Spaltung von 50% ein Anstieg dann ein allmählicher Abfall. Unter Zugrundelegung der Halbwertzeiten werden die Temperaturkoeffizienten $[(k_t + 10)/k_t]$ berechnet: Äthylbutyrat 20—30°: ; 30—40°: 1,43; 20—40°: 1,54; Propylpropionat 30—40°: 1,77; Äthylbutyrat 30°: 1,38; 30—40°: 1,69; 20—40°: 1,54. — Setzt man zu Beginn des Vers. die Menge A. zu, welche am Ende der Verseifung vorhanden wäre, so wird die Reaktionsgeschwindigkeit bedeutend verlangsamt, u. zwar um so viel, daß die Reaktionsgeschwindigkeit mit Zusatz von A. ungefähr ebenso groß ist wie die Endgeschwindigkeit in den Vers. ohne A. Verf. nimmt aus diesen und den Vers. von AFFL-LENZ (l. c.) an, daß die scheinbare Zerstörung des Enzyms bei alkal. Rk. einer Bindung des Enzyms durch A. u. bei saurer Rk. durch A. u. Säure bedingt ist. Die Verseifungskurven werden daher bedingt sein durch die Verteilung des Enzyms auf Enzym u. Spaltprodd. Diese Verteilung ist auch von der Zeit abhängig. Bei sich bei den schnell verlaufenden Rk. die Verlangsamung wenig geltend macht, kann man annehmen, daß die Bindung der Lipase an den A. wesentlich langsamer abläuft als die Bindung an den Ester. Bei Äthylpropionat scheint die Bindung der Lipase-Ester nicht augenblicklich zu verlaufen. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 101—18. Wien, Univ.)

HESSE.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

E. Philip Smith, *Acidität des Mediums in Beziehung zur Wurzelentwicklung von Pis. V.* untersucht die Wurzelbildung von Stecklingen bei verschiedenen Rk. Mediums. Wurzelbildung trat zwischen pH 4,0—9,2 ein. Bei pH 7,0—7,2 war die Wurzelbildung am kräftigsten, bei pH 4,5 günstiger als bei pH 9,2. Unterhalb pH 4,0 bilden die Stecklinge ab. (Nature **117**. 339—40.)

TRÉNEL.

Karl Pirschle, *Acetaldehyd als Zwischenprodukt bei der Keimung fetthaltiger Samen.* KLEIN u. PIRSCHLE, S. 2928.) Früher war in Gramineen mit stärkereichen u. Leguminosen mit eiweißhaltigen Samen das Auftreten von *Acetaldehyd* (I) als Zwischenprod. bei der Pflanzenatmung bestätigt. In Keimlingsmazeraten verschiedener Samen wurden mit Na₂SO₃ als Abfangmittel für 100 g Samen 33—100 mg I, der quantitativ bestimmt wurde, gefunden. Der aus Fettsamen gebildete I ist einmal das normale Atmungszwischenprod. des zunächst aus den Fetten gebildeten Zuckers, in anderen Fällen wird als wahrscheinlich diskutiert, daß die Umbildung des Fettes in Zucker über I verläuft. (Biochem. Ztschr. **169**. 482—89. Wien, Pflanzenphysiol. Inst. d. Univ.)

LOHMANN.

Julius Stoklasa und Josef Bareš, *Über den Mechanismus der Kohlenhydrat-Atmung bei der anaeroben Atmung der Pflanzenorgane.* Die Prozesse bei der anaeroben Atmung lassen sich nicht für alle Pflanzen verallgemeinern; der Kohlenhydratstoffwechsel ist spezif. Die anaerobe Atmung wird durch Enzyme, die Ähnlichkeit mit Hefezymase aufweisen, hervorgerufen. Die 1. Phase ist die B. von Milchsäure aus Kohlenhydrat, die 2. Phase die Aufspaltung in CO₂ u. Alkohol, wobei intermediär *Acetaldehyd* nach der biochem. Abfangmethode von NEUBERG nachgewiesen wurde. Daneben entstehen Essig- u. Ameisensäure. Die Anoxybiose wird durch Zugabe von Kaliumausgelöst. (Annalen d. Tschechoslowak. Akad. d. Landwirtschaft **1926**. 42 Seiten. Sep.)

TRÉNEL.

Hugo Kaho, *Ein Beitrag zur Theorie der antagonistischen Ionenwirkungen der Alkalien auf das Pflanzenplasma.* VII. (Vgl. Keta et Comm. Univ. Dorpat A. V. 4

[1924]). Im Anschluß an Verss. über das mehr oder weniger schnelle Eindringen v. Anionen durch die Zellwände führte jetzt der Vf. Verss. durch, die nicht nur die Giftigkeit der Anionen, sondern auch der Kationen zum Ziel hatten, u. besonders die Unterwelche Salzzusätze diese Giftwrkkg. herabsetzen können. Aus sehr zahlreichen Verssergab sich, daß die Giftigkeit der Anionen in folgender Reihe abnimmt: $\text{CNS} \rightarrow \text{Br} \rightarrow \text{NO}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2 \rightarrow \text{Cl} \rightarrow \text{SO}_4$ u. die Kationen in folgender, wenn auch nicht ganz so eindeutiger Weise: $\text{Mg} \rightarrow \text{Ba} \rightarrow \text{Sr} \rightarrow \text{Ca}$. Die Salze der Erdalkalien verhalten sich demnach fast gleich denen der Alkalien. Was die entgiftende Wrkkg. dieser Salze anbetrifft, so wurde festgestellt, daß diese sich umgekehrt proportional dem Eindringungsvermögen dieser Salze verhält. Hierfür gelten die geführten Ionenreihen in umgekehrter Folge. (Biochem. Ztschr. 167. 25—37.) HAAS.

Hugo Kaho, Über den Einfluß der Temperatur auf die koagulierende Wirkung einiger Alkalisalze auf das Pflanzenplasma. VIII. (VII. vgl. vorst. Ref.) Es wurde auch hier, wie im vorstehenden Ref., die Epidermis des Rotkohls, die in Quadraten von 1 mm Kantenlänge geschnitten worden waren, zu den Verss. benutzt. Der untersuchte Temp.-Abschnitt war 0—36°, die angewandten Salze: Chloride, Acetate, Sulfate, Citrate, Tartrate u. Nitrate des Kaliums u. Natriums. Diese Salze erzielten mit steigender Temp. ihre maximale Koagulationswrkkg., d. h. ihre tödliche Wrkkg., was durch eine starke Permeabilisationssteigerung bei Temp.-Erhöhung erklärt wird. Anders verhalten sich die Rhodanide, Jodide, Bromide bezw. Nitrate, die zwei Maxima besitzen u. zwar eins bei 0° u. eins bei 36°; in den mittleren Temp.-Gebieten ist die Koagulationswrkkg. am geringsten. (Biochem. Ztschr. 167. 182—94.) HAASE.

T. Kuroda, Über den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf die antiseptische Wirkung einiger Phenole und aromatischer Säuren. Es wurde die antisept. Wirkung des Phenols, der drei isomeren Kresole u. Chlorphenole, des Thymols, der Benzoesäure u. Salicylsäure auf das Wachstum von Bact. coli u. Bac. prodigiosus u. auf die Gärungsfähigkeit von Hefe untersucht. Für die Einstellung der $[\text{H}^+]$ (Bereich pH 1,4—12) dienten Pufferlsgg. nach SÖRENSEN. Die antisept. Wrkkg. der Phenole u. auch der Säuren ist im sauren Gebiet am stärksten, am Neutralpunkt stark abgeschwächt, bei stark alkal. Rk. wieder gut nachweisbar. Neben der direkten Einw. der H^+ -OH-Ionen sowie anderer Faktoren scheint die Erhöhung des Teilungskoeffizienten in saurer Lsg. zwischen Lipoiden u. W. eine Rolle zu spielen. Dieser war zwischen wss. 0,5%ig. Carbonsäure u. Olivenöl (1:1) bei 18° u. 16-std. Schütteln bei neutralem Rk. 7,2, bei saurer 8,09. Die Oberflächenspannung wird in saurer Lsg. nicht verändert. (Biochem. Ztschr. 169. 281—91. Berlin, Pharmak. Inst. d. Univ.) LOH.

Ernest Linwood Walker und **Marian A. Sweeney**, Chemotherapie bakterieller Infektionen. I. Wirkung von Acriflavin, Gentianaviolett und Mercurochrom bei experimenteller Infektion mit Bakterien. Acriflavin (Trypaflavin), Gentianaviolett und Mercurochrom hemmen die Infektion mit Staphylokokken intraperitoneal infizierter Mäuse, wenn sie kurze Zeit später intraperitoneal injiziert werden. Bei subcutaner Anwendung u. gegen Streptokokken u. Friedländerbacillen geringe oder gar keine Wrkkg. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 461—67. San Francisco, Univ. of California Med. School.) MEIER.

E₄. Tierchemie.

A. Leulier und **A. Charnot**, Über das Cholesterin eines gasteropoden Weichtieres *Helix pomatia* L. Das Cholesterin der Weinbergschnecke ist identisch mit dem der Wirbeltiere. (C. r. soc. de biologie 94. 63—64. Lyon.) OPPENHEIMER.

Marcel Abeloos, Über die Farbstoffe des Integuments der Seesterne. Die gelben, orangen u. roten Farbstoffe des Hautpigments gehören zu den carotinoiden Pigmenten, die violetten zu den Carotinalbuminen. Die verschiedenen Stoffe können alle

Tierart (*Asterias rubens* L.) nachgewiesen werden. Der Nachweis wird durch typ. Verh. gegenüber Lösungsmitteln u. Fällungsmitteln usw. erbracht. (C. r. soc. biologie **94**. 19—21. WIMEREUX u. ROSCOFF, Stat. biol.) OPPENHEIMER.

David Landsborough Thomson, *Die Farbstoffe der Schmetterlingsflügel. Melanargia galatea*. Es konnte ein gelber Farbstoff vom F. 253⁰ (korr.) von den Eigenschaften eines Flavons oder Flavonols isoliert werden. (Biochemical Journ. **20**. 75. Univ. of Cambridge.) SPIEGEL.

Harold John Channon und Geoffrey Arthur Harrison, *Die chemische Natur Unterhautfettes beim normalen und sklerematischen Kinde*. Sclerema neonatorum ist älterer Zustand, charakterisiert durch Auftreten harter Verdickungen des Unterhautgewebes. In Gefrierschnitten solcher Verdickungen zeigten sich zahlreiche Bündel elbrechender Krystalle, die zunächst, wahrscheinlich zu Unrecht, für Cholesterin Ester desselben gehalten wurden. Es wurden, um Vergleichsmaterial zu erhalten, analyt. Konstanten des Unterhautfettes von 8 Kindern u. einem Erwachsenen ermittelt. Die J-Zahl war am niedrigsten bei der Geburt u. stieg vom 8. bis 12. Lebensjahr auf den Wert des Erwachsenen; entsprechend sinkt der F. mit dem Alter. Die J-Zahl ist fast konstant (200). In 4 Scleremafällen erschien das Fett von höherem F. u. niedrigerer J-Zahl als bei n. Kindern gleichen Alters. Das Unterhautgewebe in diesen Fällen abnorm reich an Cholesterin, Ca u. P. (Biochemical Journ. **20**. 92. London, Univ. Coll.; Hosp. f. sick children.) SPIEGEL.

Pietro Saccardi, *Über die Natur des Melanogens*. Aus angesäuertem melanot. läßt sich das Melanogen leicht mit Ä. oder besser mit Amylalkohol extrahieren. Äth. Extrakt hinterläßt nach dem Verdampfen einen fl. Rückstand, der mit HCl o-Nitrobenzaldehyd intensive Violettfärbung ergibt. Das Melanogen selbst ist ordentlich schwer zu isolieren. Da melanot. Urin die Ehrlichsche Diazork. gibt, wurde der aus dem äth. Extrakt erhaltene Rückstand mit Diazoniumchlorid behandelt; das Diazonverbr. wurde als rotbraune M. isoliert, F. gegen 113⁰, l. in A. Ein Pikrat bildet das Melanogen nicht. Mit dem von FISCHER u. HEPP dargestellten Bisdiazopyrrol als Melanogen nicht ident.; allem Anschein nach ist es ein Polymerisationsprod. Oxypyrrols. Die Oxydation des Pyrrols erfolgt im Organismus u. nicht durch Fermente des Urins. Bei Zusatz von Pyrrol zu Urin erfolgt nämlich keine Melanogenbildung. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **2**. 346—49. 1925. Camerino, Univ.) ZAND.

Victor Ross, *Über das Vorhandensein von Insulin in getrocknetem Pankreasbrei*. Bei 40⁰ u. 15 mm Hg getrocknetem Pankreasbrei findet sich annähernd die gleiche Menge Insulin wie in dem frischen Ausgangsmaterial. (Amer. Journ. Physiol. **74**. 1—82. 1925. Bloomfield, Plant Research Lab.) MEIER.

R. S. Allen und John R. Murlin, *Biuretfreies Insulin*. Methode zur Gewinnung blutzuckersenkenden Stoffes, der keine Biuretrk. gibt, aus der Durchströmungsgabe von Schweinepankreas. Die Ausbeute ist nicht groß, das Prod. wird leicht zerfallsam, unl. in schwachen Säuren u. W., l. in Spuren Alkalien. Aus wss. Extrakten des Pankreas läßt sich dieses Prod. nicht gewinnen. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 131—39. Rochester, Dep. of Vital Econom. Univ. of Rochester.) MEIER.

Daniel J. Healy und Alfred M. Peter, *Die Wasserstoffionenkonzentration und Basizität von Eigelb und Eiweiß*. pH des Eigelbs frisch gelegter Eier 6,36, Eigelb 24. Die Rk. des Eigelbs bleibt über mehrere Wochen konstant, die des Eiweißes mehr alkal. bis ca. pH 9,6. Dies gilt für befruchtete u. unbefruchtete Eier. Bei Erhaltung in CO₂-Atmosphäre steigt die [H⁺] des Eiereiweißes an. (Amer. Journ. Physiol. **74**. 363—68. 1925. Lexington, Kentucky Agricult. Exp. Station.) MEIER.

A. Blanchetière und Léon Binet, *Über den Gehalt verschiedener Organe des Hundes an Glutathion*. Die Organe des Hundes sind reicher an Glutathion als die Organe des Kaninchens oder der Ratte. (Vgl. TUNNICLIFFE, Biochemical Journ. **19**. 194;

C. 1925. II. 576.) Am reichsten ist die Leber (215—396 mg pro 100 g Gew. Es folgen Niere (264—306 mg), Milz (193—215 mg), Herzmuskel (107—136 mg), Skelettmuskel (58—89 mg) u. Lunge (74—87 mg). Synergist. wirkende Muskeln haben verschiedenen, s. ziemlich den gleichen Gehalt. Narkose mit Chloralose keinen merklichen Einfluß. (C. r. soc. de biologie 94. 494—96.) OPPENHEIME

Diego D'Amico, *Die Siderose des Augapfels*. Kritik älterer Arbeiten u. Verss. über den n. Fe-Gehalt der Bulbusgewebe u. über die Veränderungen durch Einfluß exogenen Fe. (Ann. di ottalmol. e clin. oculist 53. 289—398. 1925. Rom, oculist.; Ber. ges. Physiol. 32. 884—86. 1925. Ref. ASCHER.) OPPENHEIME

L. Lematte und **L. Beauchamp**, *Beitrag zum Studium der Zusammensetzung des menschlichen Gehirns*. Nach einer eingehenden Beschreibung der Untersuchungsmethoden werden in einer Tafel die Mengen der anorgan. Stoffe, die sich im trocknen wie im wss. Auszug befanden, zusammengestellt. Die Mengen der einzelnen Stoffe sind in den verschiedenen Lebensaltern in verschieden hohem Maße vorhanden. Der relativ größten Anteil macht stets die Phosphorsäure aus. Mit zunehmendem Alter nimmt der W.-Gehalt ab u. der Gehalt an Phosphorsäure- wie an Na-Salzen zu. (Bull. d. l'Acad. des sciences 181. 578—80. 1925.) HAAS

Marcel Labbé, **Jean Heitz** und **F. Nepveux**, *Calcium-, Magnesium- u. Cholesteringehalt der Arterien in einem Fall atheromatösen Diabetes*. Kasuistik. Arterienwände eines Diabetikers zeigten einen auffallend hohen Ca- u. Mg-Gehalt. Zudem eine Erhöhung des Cholesterins parallel lief. (C. r. soc. de biologie 94. 104—106. Paris.) OPPENHEIME

E₅. Tierphysiologie.

K. Bahn, *Zur Frage der spezifisch-dynamischen Eiweißwirkung*. Die spezifisch-dynam. Wrkg. ist ein direkt am Zellprotoplasma angreifender Reiz. Seine Intensität wird bestimmt durch die Tonuslage des vegetativen Nervensystems, wobei eine gegenseitige umgekehrte Proportionalität zwischen Grundumsatz u. spezif.-dynam. Wrkg. besteht. Die Hormone wirken demnach auf dem Umwege über den Grundumsatz in dem Sinne, daß ein erhöhter Grundumsatz die potentielle Energie der Körperzellen bei Eivorrückfuhr herabsetzt u. umgekehrt. Die Hormone ihrerseits sind wieder in ihrer Wirkungssamkeit abhängig von der Elektrolytverteilung an der Zelle, deren vornehmster Regulator das vegetative Nervensystem ist. (Münch. med. Wchschr. 73. 315—316. Rostock, Univ.) FRANZ

S. Loewe, **F. Lange** und **W. Faure**, *Die Wirksamkeit des Zyklushormons bei peroraler Zuführung*. Zu den Verss. wurde ein selbsthergestelltes Ovarialhormonpräparat benutzt. Es zeigte sich, daß das Hormon auch in gewissem Sinne peroral wirksam ist, man braucht aber eine etwa 20-mal so große Menge als bei subcutaner Applikation. Bei Prüfung peroral zu verwendender Handelspräparate wurden gelegentlich Unbereitungen angetroffen, die bei quantitativer Auswertung zwar nicht vollkommen hormonfrei waren, der Wirkungswert der besten dieser Präparate erreichte aber auch nur 1 Mäuseeinheitswert pro Menschendosis. Ein neuestes, perorales Trockendrüsentraktpräparat, das für sich den Vorzug in Anspruch nimmt, biolog. geprüft zu sein, enthielt nur $\frac{1}{37}$ des Wirkungswertes der bestwirksamen, nicht im Handel befindlichen Trockendrüsentraktzubereitungen vom Vf. geprüfter Präparate. Da die therapeut. Wirkung bei der Frau sicherlich ein nicht unbeträchtlich Vielfaches derjenigen der Mäuse tragen muß, ist es erklärlich, warum noch nie ein überzeugender Erfolg erzielt worden ist. Vf. fordert eine biolog. Standardisierung für die Hormonpräparate des Handels so gut wie für Insulin- u. Hypophysenpräparate. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 310—311. Dorpat, Univ.) FRANZ

Benno Hurwitz, *Ein mit „Thyreoid Dispert“ (Krause-Medico) behandelter Patient mit echtem Zwergwuchs*. Vf. konnte mit dem standardisierten Präparat „Thyre-

ert" der Krause-Mediko-Gesellschaft, München, bei einem Fall Wachstumsstörung rein thyreogener Natur deutliche Erfolge erzielen. (Dtsch. Wehschr. 52. 452—53.) FRANK.

H. Flechtner, *Klinische Erfahrungen ovarieller Substitutionstherapie mit Ovowop (non), einem neuen, biologisch geprüften Ovarialpräparat*. Bericht über ein neues Präparat *Ovowop* (Herst. Tetewop, A.-G., Berlin), das nach einem besonders leichten Trocknungsverf. hergestellt wird. Es bewährte sich bei der Behandlung hypoplast. Zuständen des inneren Genitalsystems, bei Ausfallserscheinungen u. dgl. Beschwerden. (Münch. med. Wehschr. 73. 320. Breslau, Univ.) FRANK.

W. Popow, *Zur Frage über das Geschlechtshormon von Manoilow bei einigen gynäk. Erkrankungen*. Die Rk. von MANOILOW (Wratschebnaja Gaseta 1923. 15), durch die man fehlerlos das Geschlecht des Menschen bestimmen kann, ist offenbar vom Geschlechtshormon abhängig. Ihre Veränderung bei innersekretor. Störungen läßt vermuten, daß das Resultat der Reaktion von der Intensität der Oxydationsprozesse abhängt. (Münch. Med. Wehschr. 72. 2139—41. 1925. Petersburg, u. d. Klinik der Militärmedizin.) HÜCKEL.

Swale Vincent, *Weitere Beobachtungen über Änderungen in den Nebennieren unter wechselnden Bedingungen*. Wenn weiße Ratten Körperarbeit leisten müssen, sinkt bei Kälte ihre Körpertemp. u. der Gehalt der Nebennieren an chromaffinen Substanz nimmt ab, während bei hoher Außentemp. ihre Bluttemp. steigt u. die Nebennieren keinen chromaffinen Verlust anzeigen. Bei 18—20° sind Körpertemp. u. Nebennieren unverändert. — Es scheint nur die Abnahme der Körpertemp., nicht die Ermüdung, die Nebennieren zu beeinflussen. — Wenn man zuvor Adrenalin injiziert, tritt bei Kälte u. Ermüdung bis zum Kollaps keine Abnahme der Chromaffinsubstanz ein. — Zwischen Nebennierenmark u. „oestrous cycle“ besteht eine bestimmte Beziehung: Im späten Oestrous- u. Post-oestrous-Stadium ist die chromaffine Substanz der Nebennieren stark reduziert. (Journ. of Physiol. 61. III—IV. Middlessex Hosp. School.) MÜLLER.

Albert T. Walker, *Eine Verhinderung der Ovulation des Huhns durch die intramuskuläre Verabfolgung frischer Substanz des Hypophysenvorderlappens*. Durch intramuskuläre Injektion von frischem Hypophysenvorderlappenextrakt wird die Ovulation der Henne (White Leghorns) vollständig gehemmt, dabei Verkleinerung des Ovariums u. degenerative Prozesse in den unreifen Follikeln. Gleiche Verabfolgung von Salzsäure- u. Muskelextrakt zeigen die Wrkg. nicht. (Amer. Journ. Physiol. 74. 56. 1925. Univ. of California, Dep. of Anatomy.) MEIER.

A. D. Macdonald, *Die Wirkung von Hypophysenextrakten auf die Darmmuskulatur*. In der Hypophyse vorhandenen, den Darm stimulierenden Substanzen, deren Existenz bezweifelt wird, sind 1. in A. u. gegen Alkali widerstandsfähiger als andere Darmaktivstoffe der Drüse. (Quart. Journ. of exp. physiol. 15. 191—200; Ber. ges. Physiol. 33. 420—21. 1925. Edinburgh, Dep. of physiol. Ref. v. VOSS.) OPPENHEIMER.

István Weiss und Albert Telbisz, *Untersuchungen über die Wirkung des Hinterlappens der Hypophyse*. Die Resorption subcutan beigebrachten NaJ wird durch Thyroxin beschleunigt. (Magyar orvosi arch. 25. 380—86. 1924; Ber. ges. Physiol. 34. 421. 1925. Ref. WEISS.) OPPENHEIMER.

W. Koskowski, *Der Einfluß des Histamins auf die Darmsekretion des Hundes*. Subcutane Injektion von Histamin bewirkt Steigerung des Dünndarmsaftes am Hund. Hunde mit Erhöhung des Gehalts an Invertase u. Amylase. Das Optimum der Wirkung für die Invertase liegt bei 10⁻⁶. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 19. 1925. Johns Hopkins Univ., Pharmacol. Labor.) MEIER.

W. Raab, *Das hormonal-nervöse Regulationssystem des Fettstoffwechsels*. Während 20 Stdn. dauerndem Hungern nimmt bei Hunden das Blutfett etwas zu. — Ohne Insulin auf die Fettmenge im Blut sind subcutane Injektionen von Thyroidin,

Insulin, *Keimdrüsensubstanz*, *Epiphysenextrakt*. *Pituitrin* (ab 5 cem) oder *Pituitrininjektion* in die Hirnventrikel wirkt schon in Mengen von 0,18 cem ab. Der Effekt fehlt oder ist gering, wenn Infundibulum u. Tuber cinereum mehr oder weniger vollständig zerstört sind; er fehlt nach Durchschneidung des Halsmark am V.—VI. Segment; er fehlt vorübergehend nach Durchschneidung des Splanchnicus. — Die Pituitrinwrkg. auf das Blutfett wird durch *Adrenalin* u. *Insulin* gestört, durch *Hypophysenvorderlappenpräparate*. — Adrenalin allein bewirkt auch Abnahme des Blutfettes, aber weniger stark u. kürzer dauernd als nach Pituitrin. Nach oben genannten Gehirnverletzungen ist die Adrenalinwrkg. erhalten oder nur vermindert. Durch Einnahme von Traubenzucker sinkt, auch nach Gehirnverletzungen, das Blutfett stark.

Die Ketonkörper des Blutes steigen im Hungern an, je länger um so höher. Sie bleiben unbeeinflusst durch Thyreoidin, Keimdrüsenpräparate u. Zirbeldrüsenextrakte. Sie steigen stark an durch Adrenalin (Senkung durch Zuckerzufuhr), fallen zunächst durch Insulin, aber nehmen dann stark zu; der Anstieg kann durch Zuckerzufuhr verhindert werden. Pituitrin senkt den Anstieg der Ketonkörper stark unter Norm. — Es besteht kein gesetzmäßiger direkter Zusammenhang zwischen Fett- u. Zuckergehalt des Blutes. — Bei jedem Verlust von Leberglykogen (Hunger, Adrenalin) wird Fett aus den Depots mobilisiert u. in Kohlenhydrate mit Ketonkörpern in Zwischenprodd. verwandelt. Diese Fettmenge ist unabhängig vom Fettgehalt der Leber. Insulin hemmt den Verbrauch des Leberglykogens. — Die Hypophyse bewirkt Ausschluß des Vorderlappens beeinflusst den Fettstoffwechsel direkt, indem sie Fett in der Leber anders als n. u. nicht zur Kohlenhydratsynthese abgebaut wird. Die Angriffspunkte sind die Zentren des Tuber cinereum u. des Infundibulums u. Bahnen über das Halsmark u. den Splanchnicus. Es bestehen nahe Beziehungen zur Wärmehaushalt. Die hypophysäre intrahepatale Fettverbrennung scheint der Wärmebildung zu dienen, die durch Insulin u. Adrenalin regulierte Form des Fettabbaus u. Versorgung der Gewebe mit Zucker. — Pituitrin hemmt die Adrenalin- u. Insulinwrkg. auf die Kohlenhydrate, die für die Umwandlung von Fett in Kohlenhydrat von Bedeutung ist. Adrenalin u. Insulin hemmen die direkte Fettverbrennung. — Schilddrüse, Keimdrüsen, Zirbeldrüsen u. Vorderlappen der Hypophyse wirken nur indirekt auf den Fettstoffwechsel. So regen die Keimdrüsen die Hypophysensekretion an, die Schilddrüse steigert den Eiweißabbau. — Hypophysäre u. cerebrale Fettsäuren entstehen infolge mangelhafter Verbrennung des nicht unmittelbar zur Kohlenhydratneubildung nötigen Fettüberschuß. — Wenn die Pituitrinpräparate bei Fettsäureverbrennung versagen, so ist die Dose entweder zu niedrig, oder die Zentren sind in ihrer Reaktivität gestört. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 179—269. Prag.) MÜLLER

Estelle E. Hawley und **John R. Murlin**, *Der veränderte Stoffwechsel normaler Tiere unter Insulinbehandlung*. Gleichzeitige Best. des O_2 -Verbrauches, CO_2 -Abgabe u. der Blutzuckeränderung durch Insulin über mehrere Std. Es besteht keine Parallele zwischen Änderung des respirator. Stoffwechsels u. der Blutzuckeränderung. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 107—31. 1925. Rochester, Dep. of Vital Statistics, Univ. of Rochester.) MEIER

Edmund Nobel und **Richard Priesel**, *Insulinversuche an Ratten*. Vers., Insulin an weißen Ratten zu eichen. Als Vergleichsdosis wird diejenige genommen, bei der alle gespritzten Tiere sterben. Diese ist für eine Reihe von Präparaten 20 klin. Einheiten. (Phig, Wellcome, Kahlbaum, Chemosan, Norgine). Einzelne, Insulin G. u. Chemosan R 24, verhielten sich anders, beim ersten starben schon bei 10 Einheiten alle Tiere, beim letzten bei 10 Einheiten keins. Doch war dieses am Menschen ebenso wirksam wie die andern. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **48**. 1—5. 1925. Wien, Kinderklinik.) MEIER

H. Simmich, *Zur Insulinstandardisierung am Phlorizin-Hund*. Versuch, die linwrkg. durch den Einfluß auf die Zuckerausscheidung des Phlorizin diabet. des zu eichen. Ohne u. mit gleichzeitiger Fütterung von Traubenzucker wird h Insulin kein konstanter Effekt erzielt. Auch die Best. des Verhältnisses 1 N: Dextrose gibt keine eindeutigen Werte. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **48**. -25. 1925. Berlin.) MEIER.

D. Adlersberg, *Die antagonistische Wirkung des Insulins und des Hypophysenhormons auf den Wasserhaushalt*. Die antidiuret. Wrkg. des Insulins (SEREBRIJSKI TOLLMER, S. 1668) ist nicht immer konstant. (Biochem. Ztschr. **169**. 129—31. 1925. I. med. Univ.-Klin.) OPPENHEIMER.

Richard Wagner, *Insulin in der Behandlung der Säuglingstoxikosen*. Vf. empfiehlt h in Fällen von Toxikosen als auch bei chron. ernährungsgestörten Säuglingen kombinierte Zucker-Insulinbehandlung zu versuchen. Vermutlich fördert der Mechanismus der Zuckerverbrennung die W.-Bindung im Gewebe. (Dtsch. med. Wochenschr. **52**. 409—10. Wien, Univ.) FRANK.

K. Okashima und **J. Ohkuni**, *Ein Beitrag zum Mechanismus der Insulinwirkung. I. elektrokardiographische und biochemische Studie*. Mit sinkendem Blutzucker-It nach Insulin wird die T-Zacke im Elektrokardiogramm niedriger, während venöse Traubenzuckerinjektion die Zacke nicht erhöhte. Die erwähnte Insulin- g. läßt sich durch Adrenalin oder Atropin hemmen. (Journ. of orient. med. **3**. 43; Ber. ges. Physiol. **33**. 409. 1925. Kyoto, Kinderklin. Ref. LAQUER.) OPP.

J. Giaja und **X. Chahovitch**, *Wirkung des Insulins auf den „Spitzen-Umsatz“*. Ratten sinkt der Umsatz fast auf die Hälfte durch Insulin. Auch der Effekt von benzucker auf den O₂-Verbrauch nimmt ab. (C. r. soc. de biologie **94**. 224. 1925. rad.) MÜLLER.

Horace A. Shonle, *Die Herstellung und Chemie des Insulins*. Sehr klare u. aus- sliche Beschreibung der Geschichte der Entdeckung, der Herst. im Fabrikbetriebe vielen Einzelheiten u. der Eichung, sowie der chem. Eigenschaften des Insulins. rn. Chem. Education **3**. 134—47. Lilly Res. Labb. Indianapolis.) MÜLLER.

André Choay, *Über Konservierung von Insulin*. Aufnehmen des mit 92% ig. lann mit Ae. gewaschenen Prod. in 1/1000-n. Säure u. Zusatz von 3%₀₀ Trikresol. i 2 Jahren trockener Aufbewahrung u. 18 Monaten in Lsg. fand Vf. keine Ab- hung der Wrkg. — Dasselbe wurde bei Lsgg. in Ampullen konstatiert. (C. r. soc. biologie **94**. 178—79. Paris.) MÜLLER.

J. W. Grott, *Beeinflußt Trypsin den Blutzuckergehalt?* Auf Trypsininjektion gt Hyperglykämie. Überlegungen werden angestellt, ob das Ergebnis eine Folge Beseitigung des Insulins durch Trypsin sein kann. (C. r. soc. de biologie **94**. -43. Warschau, Clin. méd. Prof. MODRAKOWSKI.) OPPENHEIMER.

Johann Mosonyi, *Zur Magensalzsäurebildung aus den Chloriden des Blutes*. immt während der HCl-Sekretion des Magens im Blut ab. Besprechung der rrien, die sich mit der HCl-B. befassen. (Biochem. Ztschr. **169**. 120—24. Buda- physiol. Inst. d. Univ.) OPPENHEIMER.

Hermann Regelsberger, *Über die Einwirkung des Scopolamins auf das Säure- ngleichgewicht des Blutes und die Atmungsregulation*. Scopolamin bewirkt beim nden (0,0005 g) u. beim empfindlichen Kranken (Parkinsonismus 0,00025 g) hung des CO₂-Bindungsvermögens des Blutes mit Verschiebung der Rk. ins l. CO₂-Partialdruck der Alveolarluft dabei meist erniedrigt, manchmal gegen Norm erhöht, doch nicht genug, um die Alkalose des Blutes zu kompensieren. ungsgröße unverändert. Harn ebenfalls alkal. Kombination mit Morphin ist deswegen vielleicht zweckmäßig, weil bei ähnlicher schlafmachender Wrkg. die sinne einer Säuerung der Blutrk. gerichtete Wrkg. von Morphin durch die ent-

gegengesetzte des Scopolamins kompensiert wird. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 208—31. Erlangen, Med. Klinik.) MEIER

K. G. Hancher, Marjorie Hupper, Nathan F. Blau und John Rogers, *Änderungen des Blutzuckers im Gefolge experimenteller Schilddrüsenfütterung.* Vergleich der Wrkg. von Schilddrüsenpräparaten auf den Blutzucker des Hu ergab sich, daß bei oraler Zufuhr ein selbstangefertigter Glycerinauszug frischer Sc drüse eine weit stärkere blutzuckersteigernde Wrkg. hatte als mehrere Han präparate bei gleichem Jodgehalt der verfütterten Menge. Der Glycerinauszug w nach Abdampfen des W. durch Zusatz von Kartoffelmehl zu einer festen Masse arbeitet, nur so bleibt seine Wrkg. längere Zeit konstant. (Amer. Journ. Physiol 1—5. 1925. New York, Cornell Univers.) MEIER

Edwin A. Riesenfeld, Anton R. Rose und I. Handelsman, *Die Verteilung anorganischem Phosphor im Blute von Neugeborenen.* (Americ. Journ. of dis. of ch 29. 611—17; Ber. ges. Physiol. 33. 402. 1925. New York, Pediatr. serv. Harlem l a. dep. of chem. Fordham univ. Ref. KÜRTEN.) OPPENHEIM

Aurelio Cossu, *Untersuchungen über die Viscosität von Eiweißlösungen unter Einfluß von Jod.* Ochsenblut mit steigender Konz. von J-KJ-Lsg. versetzt. B 0,0035 g-Äquivalenten J pro l geringe Änderung der Viscosität. Zunahme zwis 0,0035 u. 0,075 g. Darüber hinaus besonders schnelle Zunahme u. Trübung. Gr durch J bedingte physikal.-chem. Modifikation des Eiweißmoleküls (Übergang Hydrosols in das Hydrogel). Bei 0,150 g J-Äquivalent Ausflockung u. schnelle nahme der Viscosität. Verss. mit A. (95% rein u. mit gel. J) ergeben ähnliche Resul Der mit der Ausfällung verbundene Viscositätsumschlag tritt bei alkoh. J-Lsg. fr ein als mit A. allein. Zusatz von J in Substanz veranlaßt Fällung, desto stärk größer die J-Menge. Viscosität der Fl. (Nd. entfernt) sinkt zunächst, steigt wieder, um wieder mit steigendem Zusatz abzunehmen. Es handelt sich dabei fraktionierte Fällung der verschiedenen Eiweißkörper. (Arch. di fisiol. 22. 399— Ber. ges. Physiol. 33. 257—58. 1925. Sassari, Istit. di materia med. e farmacol. spo Ref. KAISER.) OPPENHEIM

C. M. Wilhelmj und Moyer S. Fleisher, *Die Beziehung der Schilddrüse zur O flächenspannung des Blutplasmas. I. Die Wirkung von Schilddrüsenexstirpation. Die Wirkung von Schilddrüsenextrakt und Thyroxin.* Bei Meerschweinchen ni meist die Oberflächenspannung des Blutplasmas 19—22 Tage lang nach Schilddrü exstirpation zu. Sie hält anscheinend dauernd an. — In 20 von 27 Fällen nahm : Thyroxinfütterung die Oberflächenspannung ab. Nach Schilddrüsenfütterung (10 T trat das gleiche ein. Es scheinen n. vorkommende oberflächenakt. Stoffe infolge steigerten Zellstoffwechsels reichlicher als n. im Blut vorhanden zu sein. (Jc Exp. Med. 43. 179—93. 195—205. St. Louis.) MÜLLE

G. Myhrman, *Über die Pituitrinhyperglykämie und ihre Beeinflussung d intravenöse Ca- und K-Injektion.* Pituitrin bewirkt beim Kaninchen bei einigen T starke Blutzuckersteigerung, bei anderen nur geringe, der immer eine Senkung r folgt. Es kann auch primäre Senkung, folgende Steigerung u. erneute Senkung treten. Die Rk. ist bei einzelnen Tieren nicht konstant. Vorherige Injektion vo oder K verstärkt die Blutzuckererhöhung. Da Pituitrin eine Hydrämie macht, bi offen, ob diese Wrkg. auf einer Vermehrung der absol. Zuckermenge oder Ver derung der Hydrämie beruht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 166—73. 19 Eksjö, Militär-Krankenhaus.) MEIER

V. Calvo-Criado, *Untersuchungen über den Hämoglobinabbau durch Ge extrakte.* Hämoglobin wird durch Extrakt aus Leber, Haut, Lunge, Niere, Musk der Reihenfolge entsprechender Stärke abgebaut; die Wrkg. des Leberextraktes durch Zusatz von Milzextrakt, der selbst wenig wirkt, verstärkt. (Biochem. Ztschr. 61—75. 1925. Bern, Physiol. Inst.) MEIER

J. T. Irving und **H. D. Kay**, *Die „in vivo“-Permeabilität der roten Blutkörperchen Kaninchens*. Die reduzierenden Stoffe sind zum allergrößten Teil im Blutplasma enthalten, nicht in den Erythrocyten. Zusatz von die Gerinnung hindernden Mitteln, Oxalat oder NaF oder *Heparin* zum entnommenen Blut ändert die Permeabilität roten Blutzellen für reduzierende Stoffe vollkommen. Der Zucker des Plasmas von 0,17 auf 0,14 u. die reduzierende Substanz der Erythrocyten steigt dementsprechend von 0,045 auf etwa 0,1, während der Gesamtzuckergehalt sich nicht ändert. —

Injektion von *Insulin*, durch Hitze oder Alkali inaktiviertem *Insulin* oder *m* nimmt in vivo die reduzierende Substanz der Erythrocyten relativ u. absol. zu. *Insulin* enthält ein thermostabiles Prod., das die Permeabilität der Erythrocyten ändert, aber die Blutzuckersenkung nicht bewirkt. — Es ist fast sicher, daß im Verlauf der Krämpfe bei sogenannter „Hypoglykämie“ noch Traubenzucker im Blut des Kaninchens vorhanden ist. (Journ. of Physiol. **61**. 112—21. Cambridge.) MÜLLER.

Julius Förster, *Die Wirkung des Luftdrucks auf den Gaswechsel der roten Blutkörperchen*. Blut der bei vermindertem Druck lebenden Tiere hat einen wesentlich höheren O₂-Verbrauch als das Blut der unter den atmosphärischen Druckbedingungen lebenden Tiere, u. zwar vermutlich deshalb, weil es reicher ist an jungen Zellen. (Ztschr. **169**. 93—99. Budapest, Pázmány-Péter-Univ.) OPPENHEIMER.

Anton Fischer und **Heinrich Weiß**, *Über den Tyrosin- und Tryptophangehalt Serum-eiweißkörper unter normalen und pathologischen Verhältnissen*. Tyrosin in der mit A. gefällten Plasma-eiweißkörper wurde bei zahlreichen Krankheiten verändert, freies Tyrosin im Serum nicht gefunden. Tryptophangehalt bei den verschiedenen Krankheiten gleich dem n., bei einigen (darunter besonders Krebskranke) erniedrigt, bei anderen (darunter besonders Lueskranke) erhöht. (Ztschr. f. d. ges. Medizin **48**. 111—18. 1925. Wien, Physiol. Inst.) MEIER.

F. Voigt, *Ein Verfahren zum Charakterisieren von Schutzkolloiden und zum Studium der Veränderungen in eiweißhaltigen Flüssigkeiten (Serum, Plasma)*. Die Teilchen eines geschützten Hydrosols wird erheblich durch das Schutzkolloid beeinflusst. Je weniger Teilchen das Schutzkolloidsol enthält, desto mehr Teilchen des zu schützenden Metallsols werden an einem Schutzkolloidteilchen gebunden, d. h. die Teilchenzahl des Metallsols vermindert. Zur Charakterisierung eines Schutzkolloidsols wird die Veränderung seiner Teilchenzahl durch Salzzusatz ermittelt u. die Teilchenzahl des Metallsols mit einem Goldsol bekannter Teilchenzahl bestimmt. Je weniger Teile vorhanden sind, desto mehr Goldteile werden an eins gebunden, die Zahl der nach der Fällung vorhandenen Goldteilchen entspricht derjenigen des Schutzkolloids. (Ztschr. f. ges. exp. Medizin **48**. 226—32. 1925. Göttingen.) MEIER.

Corrado Sestini, *Über die Menge des Cholesterins und der Fettsäuren und ihr Ver-
hältnis zueinander im Blutserum bei experimentellem Hyperthyreoidismus*. Geringe Ver-
änderung der Fettsäuren u. deutliche aber inkonst. Vermehrung des Cholesterins beim
Versetzen nach kleinen Dosen Schilddrüsen. Auch Cholesterin nimmt ab, wenn Dar-
reichung längere Zeit fortgesetzt oder größere Dosen gegeben werden. Die Verringerung
der Fettsäuren kann aber so viel stärker sein als die des Cholesterins, daß von einer
Cholesterinämie gesprochen werden kann. (Biochem. e terap. sperim. **12**. 293—306.
Ber. ges. Physiol. **33**. 882. Florenz, Istit. di patol. med. Ref. KAISER.) OPP.

K. Wolff und **K. Frankenthal**, *Über die Verteilung der Lipide im Serum*.
Beitrag zu den Serumveränderungen bei Syphilis. Im Gegensatz zu n. Sera ist
bei Syphilis die Globulinfraktion ärmer, die Albuminfraktion reicher an Lipiden.
(Ztschr. f. klin. Med. **10**. 445—56; Ber. ges. Physiol. **33**. 402. 1925. Berlin, Pathol.
Ref. E. K. WOLFF.) OPPENHEIMER.

Francesco Albano, *Einfluß der Thyreoidektomie auf den Cholesteringehalt des Blut-
serums und der Nebennieren*. Nach Schilddrüsenentfernung nimmt Cholesterin im

Blut ab, in den Nebennieren zu. (Gazz. internaz. med.-chir. 1925. 185—87; Ber. physiol. 33. 402—03. 1925. Neapel, Istit. di patol. med. Ref. KAISER.) O

Robert E. Mark, *Über den Einfluß von Nahrungsfaktoren auf den Serumeiweißgehalt*. Gleichzeitiger Hunger u. Durst erhöht den Serumeiweißgehalt, Rückgang Wasserzufuhr oder Wasser- u. Nahrungszufuhr. Zugabe von Fleisch zu ausreichende Futter erhöht den Serumeiweißgehalt, Zugabe von Speck erniedrigt ihn, Zucker keinen deutlichen Einfluß. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 212. 95—102. Wien, Physiol. Institut.) MEN

Wilhelm Starlinger, *Über das Verteilungsverhältnis der Eiweißkörpergruppen tertiärsyphilitischen Seren bei positiver Komplementbindungsreaktion*. Nach der f. beschriebenen gravimetr. Methodik (vgl. S. 2817) war in den tertiärsyphilit. im allgemeinen die $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Halbsättigungsfraction absolut u. relativ vermehrt, die $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Ganzsättigungsfraction vermehrt. (Biochem. Ztschr. 169. 449. Wien, II. med. Univ.-Klinik.) LOHMAN

Herm. Bennhold, *Über die Adsorptionsfähigkeit der Serumkolloide tubulär Nierenkranker gegenüber Farbstoffen*. Kongorot verschwindet sehr schnell aus dem tubulär Nierenkranker. — Eine 0,045%ig. Lsg. von Naphtholgelb-S diffundiert 4,5-fach schneller in Gelatine als mit Normalserum. Diese Diffusionshemmung bei Serum tubulär Nierenkranker unabhängig vom Eiweißgehalt herabgesetzt. in dem letzten Stadium der Schwangerschaft, bei hohem Fieber infolge sept., ei Prozesse findet man geringe Herabsetzung. — Das Kongorot ist im Blut tubulär Nierenkranker abnorm locker u. unvollständig gebunden. Es wird daher schneller der Blutbahn entfernt. — Bei Amyloiderkrankung fängt das Amyloid vital den Farbstoff ab. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 71—94. München.) MÜLLER

A. H. Roffo und **B. Barbará**, *Aktivierung des Ophidiengiftes durch das Serum von Tumorträgern*. Verss., die serolog. Beziehungen zwischen verschiedenen Schlangengiften u. dem Serum von tumorbehafteten Ratten u. Menschen aufzustellen. (Bol. del inst. de med. exp. 1. 412—16. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 1925. Ref. ROFFO.) OPPENHEIM

B. Sbarsky, *Zur Kenntnis des Mechanismus der Immunitäterscheinungen*. I. Mitt. *Die Adsorption des Diphtherietoxins durch Meerschweinchen- und Rattenerythrocyten*. Die Adsorption von Toxin durch Blutkörperchen geht mit der Empfindlichkeit der betreffenden Tierart gegen das Toxin parallel. (Biochem. Ztschr. 169. 115. 1925. Moskau, bioch. Inst. des Kom. f. Volksges.) OPPENHEIM

S. Winokurov und **D. Konstantinowskaja**, *Zur Frage der Bedeutung von Acetonen in der Pathogenese der periodischen Atmung*. Intravenöse Infusion von Aceton ruft beim Hunde rhythmische Atemstörungen hervor. Doch erst bei Konz. (0,85% im Blut), wie sie beim menschlichen Diabetes nicht beobachtet werden. Die Atmung des Diabetikers ist wohl nicht nur auf das Aceton zu beziehen. (Ztschr. f. ges. exp. Medizin 48. 47—51. 1925. Odessa, Inst. f. Pathol. Phys.) MEYER

Oertel und **F. Kieferle**, *Ernährungsversuche mit Silomilch*. Verss. am Meerschweinchen u. am Säugling beweisen die biolog. Hochwertigkeit der Silomilch, welche sicher nicht allein durch das A- u. C-Vitamin, sondern durch einen höheren Gehalt an akzessorischen Nährstoffen überhaupt bedingt ist. (Münch. med. Wchschr. 72. 2100. 1925. München, Kinderklinik.) HÜCK

G. Mouriquand und **A. Leulier**, *Hunger und Cholesterin im Blut und in den Organen des Meerschweinchens*. Der Cholesteringehalt von Leber, Lunge, Milz, Nieren ist im Hunger im Gegensatz zur Avitaminose (vgl. S. 1838) nicht verändert. Nur das Blut zeigt eine geringe Erhöhung über die Norm. (C. r. soc. de biologie 533—34. Lyon.) OPPENHEIM

Alfred F. Hess, *Die antirachitische Aktivierung von Nährstoffen und von Cholesterin durch ultraviolette Strahlen*. (Vgl. S. 1837.) Chem. reines Cholesterin u. I.

n, die durch ultraviolette Strahlung im antirachit. Sinne aktiviert werden, müssen an einer Umlagerung unterliegen, denn das Absorptionsspektrum ihrer Lsg. in A. typ. Änderungen. (Journ. of the Americ. med. assoc. **84**. 1910—1913. 1925; ges. Physiol. **33**. 855—56. New York, Pathol. laborat. Columbia univ. Ref. Gy-Y.)

OPPENHEIMER.

L. Randoi und **E. Lelesz**, *Avitaminose B, Glykämie und Glykogenreserven*. Gel an Vitamin B bringt das Glykogen aus der Leber nicht zum Schwinden. Zahlreiche andere Ergebnisse sind darauf zurückzuführen, daß neben der Avitaminose eine kalor. Unterernährung bestand. In den ersten Tagen der Avitaminose tritt geringe Hypoglykämie auf, in den späteren Stadien nimmt der Blutzucker zu, bei der gebundene Zucker im Blut nur um ein Geringes ansteigt. (Bull. Soc. Chim. **8**. 15—29. Paris, Stat. centr. des rech. sur l'alimentat.)

OPPENHEIMER.

Z. Ernst und **Gy. Förster**, *Experimentelle Untersuchung über die fördernde Wirkung Kohlenhydraten auf die Oxydation der Acetessigsäure*. Wie Dextrose die Acetessig-oxydation fördert (SHAFFER) so fördern auch andere *Monosaccharide*, *Mannit*, *eritrit*, *Mono-* u. *Tributyryl*. Hemmend wirken ein- u. zweiwertige *Alkohole*, *Aldehyde*, u. *Polysaccharide*. (Magyar orvosi arch. **25**. 363—367. 1924; Ber. ges. Physiol. 256. 1925. Autoref.)

OPPENHEIMER.

Paul Mahler, *Über die Wirkung verschiedener Zucker auf die Salzsäuresekretion Magens*. Galaktose, Glucose, Maltose regen die HCl-Sekretion stärker an als Lactose, Dextrose u. Arabinose. Saccharose nimmt eine Mittelstellung ein, mit ihr schwanken auch mit den anderen Stoffen ungleichen Ergebnisse am stärksten. (Wien. Arch. n. Med. **10**. 549—58; Ber. ges. Physiol. **33**. 380—81. 1925. Prag, Med. Klin. R. SCH-WARTENHORST. Ref. DRESEL.)

OPPENHEIMER.

Fusakichi Nakazawa, *Untersuchungen über die Resorption einiger Nährstoffe in einzelnen Teilen des Verdauungskanales*. Geprüft wurden Glucose, Glykokoll, Fett-säuren, Pepton u. NaCl. Es ergeben sich physiolog. aber auch prakt. wichtige Gesichtspunkte für die Resorption bei Herbivoren u. Carnivoren in den einzelnen Darmabschnitten. (Tohoku journ. f. exp. med. **6**. 130—59; Ber. ges. Physiol. **33**. 382—83. 1925. Ref. KRYZWANEK.)

OPPENHEIMER.

Helen S. Mitchell, *Eiereiweiß gegen Casein als Eiweißanteil bei der Rattendiät*. Das Wachstum junger Ratten ist Eiereiweiß von etwas geringerem Werte als Casein. Je höher die prozentuale Eiweißgabe ist, desto mehr fällt dieser Unterschied fort. (Journ. Physiol. **74**. 359—62. 1925. Battle Creek Sanitarium, Nutrition Res. r.)

MEIER.

P. Cristol, **L. Hedon** und **A. Puech**, *Der Durchgang der im Lauf der Verdauung vorhandenen Polypeptide durch den Pfortaderkreislauf und deren Stillstand in der Leber*. Der N-Gehalt im Pfortaderblut u. im Blut des allgemeinen Kreislaufs (Femoralis—Carotis—rechtes Herz—Blut) einmal durch Trichloressigsäure-, ein andermal durch Phosphorwolframsäurefällung läßt erkennen, daß die Polypeptide im Pfortaderblut vorhanden sind, die Leber aber nicht verlassen (Hundeverss.). (C. r. d. l'Acad. sciences **182**. 416—18.)

OPPENHEIMER.

Ikutaro Iwanaga, *Experimentelle Untersuchungen über den Eisenstoffwechsel*. Der Fe-Stapelplatz ist nicht die Milz, sondern die Leber. Bei Fe-Abgabe aus der Leber Aufnahme im Knochenmark u. Milz. Aus anderen Organen wird Fe rasch abgegeben. (Mitt. über allgem. Pathol. u. pathol. Anat. Sendai **2**. 223—35. 1925; ges. Physiol. **33**. 862—63. Sendai, Inst. of pathol. Ref. KRYZWANEK.)

OPP.

Jacques Irger, *Zur Frage des Eisenstoffwechsels im tierischen Organismus nach der Exstirpation*. An 2 Hunden wurde der Fe-Gehalt im Urin, Kot, in der Galle u. im Blut vor u. nach der Milzexstirpation bei gleichmäßiger reichlicher Fleischfütterung untersucht. Im Gegensatz zu ASHER (vgl. Biochem. Ztschr. **151**. 119; C. **1924**. II.) wurde nach der Exstirpation in keinem Falle erhöhte Fe-Ausscheidung gefunden.

Demzufolge kann die Milz nicht als Organ des Fe-Stoffwechsels angesprochen werden. Auch der Bilirubingehalt der Galle zeigte keine Veränderung. Im Blut nimmt Zahl der Erythrocyten u. der Hämoglobingehalt stark ab; die Anämie trat also trotz der Fe-reichen Nahrung auf. (Biochem. Ztschr. **169**. 417—26. Berlin, II. med. Kl. d. Charité.)

LOHMANN

Emile F. Terroine und **Anne-Marie Mendler**, *Einfluß der drei Ernährungsgrundstoffe auf die Größe der Stickstoffretention im Verlauf des Wachstums*. (Vgl. S. 24) Stoffwechselverss. an jungen Schweinen, die mit einer Grunddiät aus Milch Zusatz an Fett u. Kohlehydraten erhalten. Die N-Retention wird durch neue Kohlehydratzusätze von einem gewissen Verhältnis der Eiweiß- u. Kohlehydratzufuhr an n mehr beeinflusst. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 413—16.)

OPPENHEIMER

K. S. Hetzel und **C. N. H. Long**, *Der Stoffwechsel von Diabetikern während nach der Muskelübung*. Der Stoffwechsel von (3 untersuchten) Diabetikern ähnelt bei mäßiger u. etwas stärkerer Anstrengung (Laufen auf der Stelle; 156 u. 220 Schritte pro Min.; Dauer 0,5—8 Min.) in hohem Grade dem normalen Organismus u. besonders dem fetternährten (vgl. FURUSAWA, S. 2214). O₂-Verbrauch. CO₂-Ausatmung. Milchsäurebildung u. -entfernung im Blut während der Arbeit u. in der Erholungszeit zeigen weitgehende Übereinstimmung. Ein Einfluß von Insulin wurde nicht beobachtet. Der respirator. Quotient war bei den Diabetikern im Durchschnitt der Ruhe 0,76, der einer Kohlenhydratverbrennung von 18% u. einer Fettverbrennung von 82% entspricht, wobei Eiweiß als Fett gerechnet wurde. Bei einer Insulingabe innerhalb der letzten 17 Stdn. stieg der respirator. Quotient bei kürzeren Anstrengungen auf 0,99, bei längeren dagegen nur auf 0,85. Bei kurzer Arbeit verbrannte also in Ggw. von Insulin ausschließlich Kohlenhydrate, bei längerer etwa 50% Gesamtstoffwechsels. Ohne vorhergehende Insulindarreichung betrug der respirator. Quotient, auch bei kurzen Anstrengungen, im Mittel 0,80, einem Kohlenhydratverbrauch von 32% entsprechend. Im allgemeinen werden also im menschlichen Körper durch lange Muskelanstrengung, durch kohlenhydratarme Nahrung u. durch Insulinmangel die verfügbaren Vorräte an Kohlenhydraten gleichmäßig mit aufgebraucht, Erfolg erschöpft, daß andere Substanzen diesen Vorrat zu ergänzen haben. Die Hypoglykämie nach Nahrungsaufnahme nimmt bei Diabetikern durch Muskelarbeit in Ggw. von Insulin stark ab, bei Abwesenheit sinkt der Blutzuckerspiegel in der Ruhe wie bei der Arbeit gleichmäßig langsam. Die Menge der Ketone im Urin ist mit Insulin bei der Arbeit verringert, ohne Insulin vermehrt. Die Verbrennung im Körper ist mit Insulin also eine vollständigere. Unterschiede im N-Gehalt des Urins wurden nicht gefunden. (Proc. Royal Soc. London Serie B **99**. 279—306. London, Univ.)

LONG

Robert Emlyn Havard und **George Adam Reay**, *Mitteilung über die Ausscheidung von Phosphat während Wasserdiurese*. (Vgl. S. 2817.) Die Größe der Phosphatausscheidung ist unabhängig von der Menge W., selbst wenn infolge starker Diurese die Phosphatkonz. im Harn unter die des Plasmas sinkt. Diese Beobachtung ist unvereinbar mit der Ansicht, wie sie in CUSHNYS Theorie der Nierensekretion vorkommt, daß Phosphat eine Substanz ohne Schwellenwert sei, u. muß auch zur Modifikation anderer Theorien führen. (Biochemical Journ. **20**. 99—104. Cambridge.)

SPIEGEL

Max Reiß und **Günther Schwoch**, *Über das Verhalten von Kohlehydrat, Fett u. Eiweiß in der Leber. I. Im Hungerzustande*. Beim Kaninchen steigt während Hungers der N der Leber, ebenso wie das Fett. Glykogen nimmt ab, N nimmt zu. Umgekehrt ist es bei gefütterten Tieren. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 270—75. Prag.)

MÜLLENBACH

Max Reiß und **Robert Weiß**, *Der Einfluß des Insulins auf den Gaswechsel*. (Vorst. Ref. u. Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **38**. 496; C. **1924**. I. 2445.) Bei mit Urethan tief narkotisierten Kaninchen bewirkt intravenös injiziertes Insulin keine Zunahme

Grundumsatzes. In leichter Narkose erfolgt nach großen Dosen Steigerung. Der Quotient steigt immer, als Zeichen gesteigerter Kohlenhydratverbrennung. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 276—93. Prag.) MÜLLER.

Sozo Hirayama, *Zuckergehalt der Verdauungssäfte bei dem mit Phlorrhizin vergifteten Hunde*. In der Phlorrhizinvergiftung nimmt der Gehalt des Speicheldrüsen-, Magen-, Darm- u. Pankreassaftes, wie auch der Galle an reduzierenden Substanzen zu. (Tohoku Journ. of exp. med. **6**. 168—85; Ber. ges. Physiol. **33**. 376. 1925.) OPP.

Jan Paroulek, *Anteil der Leber am Purinstoffwechsel*. Nachweis, daß Leber Harnsäure synthetisieren kann, aber auch über ein urikolyt. Ferment verfügt, wird berichtet. (Swornik lékařský **26**. 1—22; Ber. ges. Physiol. **33**. 369—70. 1925.) OPP.

Hans Much, *Von Lipoiden und ihrer biologischen Bedeutung*. Vf. spricht die Lipide als den wesentlichsten immunbiolog. u. reinbiolog. Bestandteil der Zelle an, da das Eiweiß ganz abzulehnen. Bei der Tuberkulose haben die Antifettlipide eine große Bedeutung. Führung, wenn es zur Heilung kommen soll. Vf. hat bei Tuberkulose u. anderen chron. Krankheiten unabgestimmte Lipide in zelldisperser Form mit bestem Erfolge angewandt. Die Lipoidtherapie ist in erster Linie Organismustherapie, wirkt aber auch als Zell- u. Organtherapie. Lipide können einerseits bestimmte Gifte entfernen, andererseits haben bestimmte Lipide die Fähigkeit, die Reaktivität bestimmter Enzyme zu steigern. Lipoidreithherapie zerfällt in die Aufgaben: 1. Lipoidantikörper bilden, 2. die allgemeinen Lipoidbewegungen anzuregen und 3. derart sowohl als Organismustherapie wie als Zelltherapie zu wirken. (Münch. med. Wchscr. **72**. 1925. 2143—47. 1925.) HÜCKEL.

S. Kaplansky, *Über die Autolyse tierischer Organe bei Zimmertemperatur*. Die Autolyse von Muskeln u. Leber (Hund), gemessen an der Zunahme des Extraktiv-N im gekochten u. mit Essigsäure enteiweißten Gewebestreifen tritt bei Zimmertemp. nach 6—9 Stdn. ein. Die Zunahme des Gesamt-N beträgt nach 24 Stdn. nur bezw. 12,6%. Die Autolyse der Milz ist stärker; der N-Gehalt ist schon nach 24 Stdn. um 2,2%, nach 24 Stdn. um 28,8% vermehrt. Die Zunahme des Amino-N erfolgt rascher als die des Gesamt-N. Die Werte sind bezw. 15, 33 u. 100%. (Biochem. Ztschr. **169**. 245—48. Moskau, Inst. f. allgem. Pathol., 1. Staatsuniv.) LOH.

A. D. Ritchie, *Milchsäure und Totenstarre beim Fischmuskel*. Während u. nach Totenstarre war der Milchsäuregehalt verschiedener Fischmuskeln deutlich vermindert: von zuvor 0,05—0,15% auf 0,06—0,29%. — Nach Lösung der Totenstarre steigt man mehr freie Aminosäuren als zuvor. (Journ. of Physiol. **61**. IV—V.) MÜ.

Howard Florey, *Capillarpermeabilität*. Durchströmung von Darmschlingen mit 0,5% Lsg. von Ferricyankalium u. Eisenammonnitrat. Das Berlinerblau fand sich im Cytoplasma der Endothelzellen, nicht im Kern. Bei Durchströmung mit 0,5% Stärkelsg. zeigte sich durch Jod-Formalinfixation ein Nd. in den Endothelzellen, u. zwar stärker im Innern als an dem äußeren Teil des Zellprotoplasmas. — Ional- u. osmotisch-dispers gel. Stoffe können also in die Zellen eintreten u. durch sie hindurchströmen. (Journ. of Physiol. **61**. I—III.) MÜLLER.

M. Nikolajew, *Über den Einfluß einiger pathogenen Bakterien und ihrer Toxine auf die Funktion der isolierten Nebenniere*. (Vgl. S. 1832.) Durchströmung der isolierten Nebenniere mit Lockescher Lsg. bei 38° u. 40—80 cm W.-Druck führt in den ersten 2—3 Stdn. zu gleichmäßiger Absonderung des adrenalinähnlichen Sekrets. Konz. fällt erst nach 6—7 Stdn. um das 1½-fache. — Nach Bepinseln der Oberfläche der Nebenniere mit Crotonöl steigt die Absonderung kaum merklich, nach Durchströmung von Cantharidin in Konz. 1 zu 10000—100000 nimmt die Sekretion stark zu, nach Durchleiten von 1 Crotonöl auf 100 cem Lockslg. gleichfalls, aber nur ganz kurze Zeit. Terpentin hemmt. — Agarlsg. steigert sie nur wenig u. nur höchstens 20 Min. — Die Sekretion verstärken Suspensionen von Pneumokokken oder Diphtheriebakterien. Pyocyaneus u. Diphtherietoxin (1:100000 bis 50000000) hemmen, Staphylococcus

kokken hemmen nicht immer. Tetaotoxin (1:100000 bis 1000000) steigert die Sekretion. Die Bouillon, die zur Herst. des Diphtherie- oder Tetanustoxins benutzt wird, erzeugt auch geringe u. kurzdauernde Sekretzunahme. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48: 27—44. Leningrad.) MÜLLER.

H. Rein, *Über die Elektrosmose überlebender menschlicher Haut und ihre Anwendung in der Medizin*. Es handelt sich bei der medizin. Kataphorese um elektrosmot. Fl.-Verschiebungen. Die Haut verhält sich wie ein Ampholytoid. Isoelektr. Punkt schwankt je nach Alter der Haut, Durchströmungsdauer u. Stromstärke. Verss. über die Beeinflussung der Durchflußgeschwindigkeit mit *W.*, *A.*, *Elektrolyten*, *Zucker* usw., über die Änderung des Hautwiderstandes u. zur Besserung der Kataphorese Lokalanästhesie mit *Cocain*. (Verhandl. d. physikal.-med. Ges. 49. 105—108. 1924. Ber. ges. Physiol. 33. 245—46. 1925. Würzburg. Ref. PINKUS.) OPPENHEIMER.

Nobunori Tashiro, *Über Änderungen im Wassergehalte der quergestreiften Muskulatur als Folge der Störungen des Wasserhaushaltes von Kaninchen*. Injektion von hypoton. NaCl-Lsgg. in die Blutbahn bewirkt Zunahme des Wassergehaltes der Muskeln. Injektion von hyperton. Lsgg. von *NaCl*, *Na₂SO₄*, *Na₂HPO₄*, u. *Traubenzucker* starke von Harnstoff geringe Abnahme des Wassergehalts. Aderlaß bewirkt an einzelnen Muskeln stärkere Wasserabgabe als bei anderen. *Novasurol* bewirkt erst Erhöhung dann Abnahme des Wassergehalts. Beim entnährten Kaninchen ergibt sich das gleiche Verh. In der Quantität der Wrkg. zeigen einzelne Muskeln die Quellung, andere die Entquellung deutlicher. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 218—45. Wien, Pharm. kol. Institut.) MEIER.

Noël Fiessinger und **Henry Walter**, *Die Art der Diffusion und Ausscheidung von Rose bengale im menschlichen Organismus*. Die Verteilung des intravenös injizierten Farbstoffs ist individuell sehr verschieden. Auch die Ausscheidung durch die Nieren ist sehr inkonstant, so daß bei der Berechnung der Blutmengen-Best., vor allem kurz nach der Injektion, große Vorsicht am Platze ist. (C. r. soc. de. biologie 94. 510 bis 512.) OPPENHEIMER.

Kurt Leddig, *Beitrag zur Frage der Einwirkung des Alkohols auf die Magentätigkeit*. Alkoholprobetrunken u. Probefrühstück (Tee + Semmel) geben häufig gleiche Werte der hervorgerufenen Magensaftsekretion. Besonders bei Subacid werden nach A. höhere HCl-Werte gefunden, bei n. häufig kleinere; bei Superacid meist Menge u. Dauer vergrößert. Bei Kombination von Tee mit A. meist stärkere Sekretion als bei einem allein. Bei Anwesenheit von A. findet sich bessere Verdauung der Semmel u. meist Verlangsamung der Magenentleerung. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 150. 232—50. Greifswald, Med. Klinik.) MEIER.

Frank C. Mann, **Charles Sheard**, **Jesse L. Bollman** und **Edward J. Baldrick**, *Der Sitz der Bilirubinbildung*. (Vgl. S. 433.) Bei spektrophotometr. Vergleich des Bilirubingehaltes des arteriellen u. venösen Blutes verschiedener Organe u. Körperteile fand sich, daß der Gehalt im venösen Blut bei Milz u. Knochenmark größer war als der des zufließenden arteriellen Blutes. Es wird also außer in der Leber auch in diesen Organen Bilirubin gebildet. (Amer. Journ. Physiol. 74. 497—517. 1925. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.) MEIER.

Ernst Wiechmann, *Über die Bedeutung der Erdalkalien*. Zusammenfassende Darst. der Bedeutung der Erdalkalien für Physiologie u. Pathologie. (Münch. med. Wehschr. 73. 328—31. Köln, Univ.) FRANK.

G. B. Zanda, *Verteilung des Kupfers vom biologischen Gesichtspunkt*. Studien an Hundeorganen nach experimenteller Einführung von Cu-Verbb. ferner an neugeborenen Ratten u. in der Milch. Schlußfolgerungen für das physiolog. V. von Cu, seine biolog. Bedeutung u. für das Schicksal (Speicherung) im Organismus. (Arch. ital. de biol. 74. 184—96; Ber. ges. Physiol. 33. 255. 1925. Cagliari, Inst. de pharmacol. exp. R. AMSTER.) OPPENHEIMER.

Luciano Pigorini, Wirkung des Natriumnitrits auf die quergestreiften Muskeln und die Nervenstämmе des Frosches. Bis zu einer Verdünnung 1:500 wirkt NaNO_2 münd. (Annuario d. R. stag. bacol sperim. **44**. 132—45; Ber. ges. Physiol. **33**. 1925. Padua.) OPPENHEIMER.

A. Patta, Erste pharmakologische Beobachtungen über eine Oxyalkylarsenverbindung (oxypropyldiarsinsäure). Pharmakologisch kommt der Oxypropyldiarsinsäure, $\text{CHOH} \cdot \text{I}_2\text{AsO}_3\text{H}_2$, eine Stellung zwischen den sehr wirksamen anorgan. Arsenverb. u. weniger wirksamen Dimethylarsinaten zu. (Boll. della Soc. Medico-Chirurgica Pavia **37**. 13 Seiten. 1925. Sep. Pavia, Pharmakolog. Institut.) HÜCKEL.

Charles M. Gruber, Die Pharmakologie des Benzylalkohols und seiner Ester. VI. Die klinische Untersuchung der Wirkung von Natriumbenzylsuccinat „Benzycin“ und Natriumibenzylphosphat „Benzylphos“ auf den Blutdruck bei arterieller Hypertonie. (V. vgl. S. 2377.) Die Ergebnisse waren in Übereinstimmung mit den Tiervers. (I. c.) unbefriedigend. Der Blutdruck blieb unverändert oder stieg noch ein wenig. (Journ. Lab. Clin. Medicine **11**. 451—53. St. Louis [Mo.]) SPIEGEL.

Anastasios A. Christomanos, Zur Pharmakologie einiger Benzylalkohole. o-Oxybenzylalkohol (I) wird in 1,8%ig. Lsg. als Lokalanästhetikum verwendet. — Die antisept. Wrkg. der isomeren Alkohole (auf Bact. coli) wurde bei I < m- (II) < p-Oxybenzylalkohol (III) gefunden. Von den Säuren wirkt o-Oxybenzoesäure stärker als m- u. die p-Verb. Die lokalanästhet. Wrkg. am Auge der Katze u. auf der menschlichen Zunge nimmt von I über II nach III ab, die selbst wirkungslos ist. In Verss. an Fröschen bzw. weißen Mäusen betrug die letale Dosis bei III 1,6 bzw. 2,5 mg pro Tier, bei II 6 bzw. 4,2 mg, bei I 10 bzw. 4,6 mg. Die Injektionen (in den Brustphsack bzw. intraperitoneal) rufen im ganzen eine allgemeine Lähmung mit tralem Angriffspunkt hervor, der manchmal ein Stadium gesteigerter Reflexgbarkeit folgt. Der Befund DEVRIENTS (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **90**. 1921. III. 673), daß vom Menschen I nur zu etwa $\frac{1}{10}$ im Urin als Salicylsäure geschieden wird, wurde bestätigt. Bei Einnahme von I u. III war im Harn die Menge der gepaarten Schwefelsäuren proportional der zugeführten Menge Alkohol, nehrte, dagegen nicht bei Einnahme von 2,6-Dimethyl-p-kresol — II aus m-Oxybenzoesäure + Na-Amalgam, F. 67° (unkorr.); mit FeCl_3 veilchenblaue Färbung. III aus Phenol + Formaldehyd, aus W. Blättchen, F. 110° (unkorr.); Löslichkeit V. bei 18° 0,13%, in sd. W. bis zu 1%, mit FeCl_3 schwache, blauviolette Färbung. 2,6-Dimethylol-p-kresol, aus p-Kresol + Formaldehyd, aus Essigester Nadeln, 127,5° (unkorr.); mit FeCl_3 amethystblaue Färbung. (Biochem. Ztschr. **169**. 344 351. Berlin, Pharmak. Inst. d. Univ.) LOHMANN.

A. Fröhlich und **E. Zak**, Über Beeinflussung von Froschlarven durch Theophyllin. Verss. an Froschlarven mit Theophyllin. natrio-acetic. Es zeigte sich, daß h 14 Tagen die Kaulquappen in der Theophyllinlsg. an Gewicht prozentual mehr genommen hatten als die Kontrolltiere. Ein Teil dieser Tiere wurde dann in W. racht, der andere Teil blieb in der Theophyllinlsg. Die größte Zunahme zeigten in dieser Lsg. verbliebenen, aber auch die in W. gehaltenen Kaulquappen nahmen gegenüber den Kontrolltieren erheblich an Gewicht zu. (Klin. Wchschr. **4**. 2303—05. 5. Wien, Univ.) FRANK.

A. Fröhlich und **E. Zak**, Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Gewebsaufnahme des Theophyllins. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. über die Resorption u. Verteilung von Farbstoffen an Tieren, deren Organismus unter der Einw. von Theophyllin stand. Bei Mäusen war intraperitoneal ein Farbstoffdepot angelegt worden. Es wurde beobachtet, daß der Eintritt u. der Fortschritt der resultierenden Färbung des lebenden Tieres abh. vom Einfluß des Diuretikums geriet die Gewebsfl. in rascheren Umlauf, mit Theophyllin behandelten Tiere zeigten eine schnellere Verfärbung. Wurde

see
errata
p. 3977

der Farbstoff subcutan injiziert, so zeigte sich das umgekehrte Verh. wie bei den peritoneal injizierten; die mit Theophyllin vorbehandelten Tiere blieben im zeitlichen Auftreten u. in der Intensität der Färbung hinter den Kontrollen zurück. Vgl. bei den geprüften Stoffe u. diejenigen, deren Verh. bekannt ist, in 2 Gruppen: NaCl, Na₂Na₄(FeCN₆) werden beschleunigt, Indigocarmin, Trypanblau verzögert unter Theophyllin in Bewegung gesetzt. Anscheinend werden die Gewebe durch Theophyllin so beeinflusst, daß leicht diffusible Stoffe rascher, schwerer diffusible langsamer resorbiert bzw. in Bewegung gebracht werden. Bei peritonealer Verabfolgung obigen Stoffe sind die Resorptionsverhältnisse offenbar so außerordentlich günstig, daß die durch Theophyllin gesteigerte Fl.-Strömung sich bei allen geprüften Stoffen nur in förderndem Sinne geltend macht. (Klin. Wchschr. 4. 2305. 1925. Wien, Univ.)

FRANK

N. Melczer, Untersuchungen über die Ausscheidung der harnsauren Salze durch die Schweißdrüsen. Injizierte Harnsäure (in 10%ig. Piperazinslg.) wird von nephrektomierten Katzen nach Pilocarpininjektion durch die Schweißdrüsen ausgeschieden. Histolog. Nachweis in Form von amorph. Uratsalzen. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis. 75—79. Budapest, Univ.-Klin. f. Haut- u. Geschlechtskrkht.)

OPPENHEIMER

H. Kämmerer und **H. Weisbecker**, Über die sensibilisierende Wirkung von Porphyrinen, besonders des Fäulnisporphyrins, gegenüber Licht- und Röntgenstrahlung. Hämatorporphyrin, Mesoporphyrin, Fäulnisporphyrin, Uroporphyrin u. Koproporphyrin sensibilisieren Paramaecien gegen Licht, die beiden letzten am wenigsten. Bei Körperchenhämolyse wird von allen gleichmäßig beeinflusst. Bei Mäusen tritt bei Mesoporphyrin keine Lichtsensibilisierung ein. Fäulnisporphyrin wirkt am stärksten. Eine Sensibilisierung gegen Röntgenstrahlen tritt bei allen Porphyrinen an keinem Objekt ein. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 263—80. Münch. Klin. Inst. der II. med. Klinik.)

MEIER

Léon Binet und **René Fabre**, Refraktionsindex der Öle vor und nach Darmperistaltik. (Vgl. S. 1841.) Der Refraktometerwert von Oliven-, Arachis-, Leinöl u. Lebertran wird vor der Zufuhr in den Darmkanal eines Hundes bestimmt. Ebenso nach der Zufuhr der Ä.-Extrakt der aus einer Ductus thoracicus-Fistel gewonnenen Lymphflüssigkeit. Die Werte waren unverändert. (C. r. soc. de biologie 94. 517—18. Paris, 1925. de phys. de la Fac. de méd.)

OPPENHEIMER

G. H. Miller, Der Einfluß allgemeiner Narkose auf die Muskeltätigkeit des Magens und des Darmkanals. Eine Untersuchung von Äther, Chloroform, Äthylen und Stickoxyd. In Ä.- u. CHCl₃-Narkose ist die Tätigkeit des Magen-Darmkanals herabgesetzt. Nach Aufhören erholt sich der Magen sehr langsam, Dickdarm u. Dünndarm schnell u. zeigen erhöhte Tätigkeit. Äthylen hat während u. nach der Zuführung geringen Einfluß auf die Tätigkeit. bewirkt während der Narkose vermehrte Tätigkeit, nach Aufhören derselben ist die Tätigkeit herabgesetzt. Die Erscheinungen treten auch am entnervten Darm ein. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 27. 41—59. Iowa, Univ. Dep. of Pharmacol.)

MEIER

W. Easson Brown und **Velyien E. Henderson**, Versuche mit anästhetischen Gasen. Mit Methan u. Propan läßt sich eine vollkommene Anästhesie nur unter Anwendung hoher Konzz. (90—93%) erreichen, wobei schon Blutdrucksenkung u. Herzirregularität eintritt. Bei Pentan liegt die narkot. u. tox. Dosis sehr nahe beieinander. Butylen hat narkot. Wrkg. bei 30—40% in der Atemluft, doch bestehen dabei keine Muskelspannung u. Bewegungen. Propylen macht bei 50% Narkose (vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 23. 485; C. 1924. II. 1955), keine starke Wrkg. auf den Blutdruck u. Herzaktion, keine Änderung des Blut-pH u. der CO₂-Bindung. Es besteht ein weites Feld zwischen narkot. u. tox. Dosis, rasche Erholung u. auch bei mehrmaliger Anwendung keine Nachschädigung. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 27. 1—8. Toronto, Univ. Dep. of Pharmacology.)

MEIER

J. T. Halsey, Chapman Reynolds und W. A. Prout, *Eine Untersuchung über narkotische Wirkung des Propylens*. Anästhesie u. Narkose wird am Tier u. Mensch nicht hervorgerufen, Unterdrückung der Muskelbewegungen u. Muskelspannung wird nicht erreicht, bei Tieren auch bei fast tödlicher Dosis nicht. Narkot. Dosis: tödliche Dosis = 1:1,67. Tod durch Atmungs- u. Zirkulationslähmung. (Journ. Pharm. Exp. Therapeutics **26**. 479—90. New Orleans, Tulane Univ. Dep. of Pharmacol.) **ME.**

H. Fühner, *Solanazeen als Berausungsmittel. Eine historisch-ethnologische Studie*. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 281—94. Bonn.) **MEIER.**

M. Cloetta und E. Brauchli, *Der Einfluß des Morphins auf den Ionengehalt Blutplasmas*. Während in der Narkose durch aliphatische Substanzen stets eine Erregung von Ca, Erniedrigung von K u. Herabsetzung der Oberflächenspannung bei verändertem Na-Gehalt erhalten wird, ist bei *Morphin* zwar Na-Gehalt unverändert, geringe Herabsetzung der Oberflächenspannung vorhanden, der Ca- u. K-Gehalt regelmäßig, manchmal Ca erhöht, K erniedrigt u. umgekehrt, oder beide erniedrigt, in die Norm geändert. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 254—62. Zürich, Pharmakol. Inst.) **MEIER.**

V. Nagel, *Über die gute Verträglichkeit des Veramons*. Günstiger klin. Bericht über *Veramon*. (Dtsch. med. Wochschr. **52**. 325. Halle a. S.) **FRANK.**

Frensdorf, *Übergang von Luminal in die Milch*. Es konnte beobachtet werden, daß der Mutter zugeführtes *Luminal* durch die Milch auf das Kind überging u. dort in einer kumulierenden Wrkg. führte, die am 4. Tage sich so steigerte, daß das Kind in einen Dämmer Schlaf fiel, aus dem es nur schwer geweckt werden konnte. (Münch. med. Wochschr. **73**. 322—23. Hildesheim, Heil- u. Pflegeanstalt.) **FRANK.**

Polixa, *Sedacao, ein neues Beruhigungs- und Schlafmittel. Sedacao* (Bericht in den m. Werke Marienfelde), eine Kombination aus Bromcalcium u. Kakao, führte sich als Schlaf- u. Beruhigungsmittel. (Dtsch. med. Wochschr. **52**. 325. Hamburg-Hamm.) **FRANK.**

J. Lackerbauer, *Phanodorm in der Anstaltspraxis*. Phanodorm wird auch für die Anstaltspraxis als gutes u. unschädliches Hypnoticum empfohlen. (Ztschr. f. klin. Neurol. u. Psychiatrie **99**. 4 Seiten. 1925. Sep. Mainkofen [Bayern], Heil- u. Pflegeanstalt.) **HÜCKEL.**

William Salant und Henry Washeim, jr., *Der Einfluß von Kalium und Calcium auf die Reaktion des isolierten Froschherzens auf Nikotin*. (Vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics **25**. 75; C. **1925**. II. 480.) Erhöhter K-Gehalt der Ringerlösung verstärkt die tox. Wrkg. des Nicotins auf das durchströmte Froschherz, ebenso Ca-Mangel. Erhöhter Ca-Gehalt hebt den sonst fördernden Einfluß kleiner Nicotindosen auf das Froschherz. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 6—15. 1925. v. of Georgia, Med. Department.) **MEIER.**

William Salant, *Der Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf die Wirkung von Nicotins*. Bei Ä. oder Urethan narkotisierten Hunden u. Katzen wird die herzstärkende Wrkg. (Vagus) durch intravenöse Injektion kleiner Mengen Nicotin (0,025—0,1 mg pro kg) durch vorhergehende Injektion von Säure (HCl, NaH₂PO₄) verstärkt, durch Injektion von NaHCO₃ abgeschwächt oder unterdrückt. Ebenso wird die blutdrucksteigernde Wrkg. des Nicotins beeinflusst, besonders deutlich an Katzen mit partiell durchschnittenem Vagus, weniger gut an Hunden. Erklärungsmöglichkeiten werden erörtert. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 17—26. 1925.) **MEIER.**

W. Stroß, *Das Campherproblem*. Die dem Campher in ausgesprochenem Maße zugeschriebene Stellung als *Analeptikum* wird auf Grund neuer experimenteller Befunde in Frage besprochen, u. z. T. abgelehnt; andere Wirkungsgebiete (Lsg. von spast. Zuständen, glatte Muskulatur) als geeignet hervorgehoben. (Umschau **30**. 185—88.) **MEIER.**

W. Leibbrand, *Cibalgin in der psychiatrischen Praxis*. *Cibalgin*, eine Verbindung von Dimethylaminophenyl- und Dimethylpyrazolon mit Dial, bewährte sich als Heilmittel

bei Migräne u. in der Abstinenzphase der Morfinentziehung. (Dtsch. med. Wehschr. 52. 240.) FRAN.

L. Tschapkewitsch, *Über die Chininverteilung im Organismus nach Versuche angiotomierten Hunden*. Durch Best. des Chiningehaltes des u. von den Organen abfließenden Blutes wird gezeigt, daß das Chinin in kurzer Zeit aus dem Blute schwindet u. in den Organen festgehalten wird. In % der eingeführten Menge findet sich in hinterer Extremität 1,5%, Magendarm 7%, Milz 31,5%, Leber 42%, Niere 10%. Ausgeschieden wird ca. 30%, d. h. die in den Nieren festgehaltene Menge. (Biolog. Ztschr. 164. 53—60. 1925. Petrograd, Inst. f. experim. Medizin.) MEIE

N. Klissianis, *Über experimentelle Colicystitis bei Hunden und ihre Beeinflussung durch Tellurit*. Die Colicystitis, durch Einbringung von Bacillen in die Harnblase hervorgerufen, führt leicht zu allgemeiner Sepsis. Nur in einem Falle wurde mit Tellurit eine Heilung der Cystitis erzielt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 48. 287—90. 1925. Berlin, Pharmakol. Inst.) MEIE

Schulz, *Über Trocken-Presojod (eine neue Form der Preglschen Jodlösung)*. Presojod ist nach PREGL (Graz) eine isoton. J-Lsg., die neben etwa 0,035—0,04% freiem J noch Na-Ionen, J-Ionen, Hypojoditionen u. Jodationen enthält. Das Präparat wird außer in fl. Form auch in Tablettenform unter der Bezeichnung „Trockenpresojod“ geliefert. Die Reinigung von verschmutzten Wunden erfolgt nach Anwendung von Presojodumschlägen häufig in überraschend schneller Zeit. (Dtsch. med. Wehschr. 52. 453. Wiesbaden.) FRAN.

H. Nebert, *Über die Oxyurenbehandlung mit Oxylax*. Günstiger klin. Bericht über das von KOCH angegebene Oxyurenmittel Oxylax. (Dtsch. med. Wehschr. 52. 240—41. Halle a. S.) FRAN.

Daijro Iwasa, *Die antisymphilitische Wirkung von Glutinkupfer*. Glutinkupfer, dessen letale Minimaldosis beim Kaninchen 5—6 mg pro kg Körpergewicht subcutan beträgt, ist, soweit die bisher geringen Vers.-Reihen einen Schluß zulassen, anscheinend ein aussichtsreiches neues Heilmittel gegen Syphilis. (Münch. med. Wehschr. 52. 321. Osaka, Japan.) FRAN.

Kurt Heymann, *Bekommen wir eine Gold-, Platin- oder Cadmiumtherapie der Syphilis?* LEVADITI, NICOLAU u. NAVARRO-MARTIN stellten Kaninchenversuche an. Bei spontanen Kaninchenspirochätose mit Cd-Salzen an. Gleichzeitig wurden entsprechende Kontrollversuche mit Bi-Verbb. gemacht. Während die Cd-Wrkg. ganz Null war, heilten die Bi-behandelten Tiere ausnahmslos in 3—4 Tagen. Demgegenüber erscheint eine Au-Therapie der Syphilis aussichtsreicher. LEVADITI, GIRARDI u. NICOLAU zeigten, daß das Sanocrysin bei experimenteller Kaninchensyphilis u. spontaner Kaninchenspirochätose intravenös u. subcutan u. überraschenderweise auch peroral eine unverkennbare Wrkg. hat. Die Spirochäten verschwanden in 2—5 Tagen je nach Dosis u. Applikationsweise. Bei Hühnerspirochätose genügten 0,01—0,02 g pro Tag zur Prävention. Bei gleichen Unterss. mit Pt (Pt-Natriumhyposulfit) war die spir. Wrkg. erheblich geringer als beim Au, beide stehen jedoch weit unter dem Bi. von dän. Seite bereits vermutete Beziehung zwischen At.-Gew. u. therapeut. Wirksamkeit scheint durch diese Verss. eine neue Bestätigung zu erfahren. (Dtsch. med. Wehschr. 52. 152—53. Berlin.) FRAN.

Josef Schumacher, *Warum vermögen schon subtherapeutische Salvarsan- größere Stovarsoldosen so prompt die Hauterscheinungen der Syphilis therapeutisch beeinflussen, nicht aber die Spirochäten?* (Vgl. S. 1232.) Durch den Nachweis, daß die CO_2 -Atmung der Haut, der Ggw. von Ca in ihr u. der Anwesenheit von Lipoiden, von Lipoproteiden, gerade in den obersten Schichten der Haut, sind die Bedingungen dafür gegeben, daß gerade dort aus der mit dem Blute herangebrachten Dinatriumphenolatlsg. des Salvarsans die Salvarsanbase ausfällt u. fixiert wird. findet deshalb auch dort eine hochgradige O_2 -Entziehung statt u. dort fallen

schäden der Wrkg. der Salvarsanbase anheim. Hierdurch wird es verständlich, um die Spirochäten bei Verabreichung zu ihrer Abtötung ungenügender Salvarsan- oder bei mangelnder Lipoproteidlöslichkeit des Umwandlungsprod. eines andern nikale, des p-Oxy-m-aminophenylarsinoxydes, im Falle der *Stovarsol*-Behandlung Haut verlassen, wodurch sekundär auch die Erscheinungen in der Haut werden, die sie verursacht haben. Gerade im Epithel der Haut wird eine stark zierende Wrkg. nach einer Salvarsaninjektion entfaltet. (Dtsch. med. Wchschr. 148—49. Berlin.) FRANK.

Inosuke Noguchi, *Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Novasurolwirkung*. Ihr großer Wassermengen zeigt bei der eintretenden Hydrämie einen stark erhöhten K-Gehalt des Serums. Denselben Einfluß hat Injektion von *Novasurol*. (Arch. p. Pathol. u. Pharmak. 111. 295—300. Würzburg, Med. Klinik.) MEIER.

J. Kritschewsky, *Über die Möglichkeit einer Sterilisation der Spirochätosen durch Nutpräparate*. Zu den Verss. dient eine höchst disperse, 10%o-Suspension einer komplexen Verb. des Bi mit Weinsäure in Olivenöl („*Bismoverol*“). Im Gegensatz zu den Salvarsanpräparaten können Bi-Präparate nicht spirochätözig, also nicht sterilisierend wirken. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 148—53. Moskau, obiol. Inst. d. Volksbild.-Kom. u. a. d. Lab. d. Reichsanilintrusts f. Prüf. chemo-Präparate.) OPPENHEIMER.

L. J. Del Baere, *Das Schicksal des Neosalvarsans im menschlichen Körper nach venöser Injektion. Die Ausscheidung im Urin und in den Faeces*. I. u. II. Mitt. *e Ausscheidung in den Faeces*. As-Best. in Harn u. Stuhl nach Injektion von Neosalvarsan. Während nach zwei aufeinanderfolgenden Injektionen der gleichen Menge der Galle ungefähr dieselbe Menge As ausgeschieden wird, finden sich im Kot nach der ersten Gabe erheblich kleinere Mengen als nach der zweiten. Im ersten Falle also wahrscheinlich ein größerer Teil des in der Galle ausgeschiedenen As in den ersten Darmabschnitten wieder aufgenommen als im zweiten Fall. Dabei steigt im Harn erscheinende Menge nicht erheblich an. II. *Über den Kontraktionsabfall des Neosalvarsans im Blute. Die Ausscheidung mit Galle und Darm*. rimetr. Best. des Neosalvarsans nach Diazotieren u. Kuppelung mit Phloroglucin Komparator unter Ausschaltung der Eigenfarbe der Lsgg. Als Standard wird eine Lösung von CoSO_4 u. FeCl_3 -Lsg. benutzt. Im nativen Plasma (dieses enthält 50 75%o mehr als Oxalatplasma!) finden sich nach 15 Min. ca. 50%o, nach 1 Stde. , nach 2 Stdn. 26%o, der eingespritzten Menge. In Harn u. Galle sind nach 1 Stde. e Prozent ausgeschieden. Der Rest ist also in den Geweben zurückgehalten. echeidung im Harn u. Kot mehrere Tage nach primärem Abfall ziemlich konstant. Best. von As u. Neosalvarsan ergibt sich, daß manchmal mehr, manchmal weniger gefunden wird, als dem Neosalvarsan entspricht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 24—30. 31—45. 1925.) MEIER.

Gregorius, *Über den Einfluß toxisitätsherabsetzender und desensibilisierender Maßnahmen bei der Salvarsaneinwirkung auf die Spirochäten*. Es wird der Einfluß von *ephin*-, Eigenserum-, CaCl_2 - u. Adrenalininjektionen, ferner von *Antipyringaben* den *Salvarsan*- bzw. *Neosalvarsaneffekt* gemessen an dem Vorhandensein lebender schädigen in syphilit. Geschwür studiert. Ein Einfluß solcher Maßnahmen ist rkenkbar. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 1—15. Jena, Univ. Hautklin.) OPP.

St. K. Mayer, *Pharmakologische Notizen über saponinhaltige Antiluetika*. Histor. achtungen. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 26—37. Mainz.) OPPENHEIMER.

Ferdinand C. Lee, *Der Einfluß von Histamin auf den Druck der Cerebrospinaligkeit*. Intravenöse Injektion von Histamin erniedrigt gleichzeitig mit dem Arndruck den Druck des Cerebrospinalliquors bei Ä.-narkotisierten Hunden u. zen, der venöse Blutdruck kann dabei steigen. Die Gehirncapillaren erweitern

sich nicht. (Amer. Journ. Physiol. **74**. 317—25. 1925. John Hopkins Univ. Anatom. Lab.) MEI

M. Arieu, *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Acetylcholin und des Chlorcholin auf den isolierten Darm der Katze*. Kleine Dosen der Ch (Cholin. Hydrochlor. 1:300000, Acetylcholin 1:500 Millionen) bewirken Verstärkung der Pendelbewegung des isolierten Katzendarms, große Dosen Spasmen eventuell Unterdrückung der Pendelbewegung. Wirkt eine schwache Konz. längere Zeit so hören diese Bewegungen auf, um bei Erhöhung der Konz. wieder einzusetzen auch hier der Darm zum Stillstand gekommen, so kann er durch Herabgehen auf niedrigere Konz. wieder in Tätigkeit versetzt werden. Die n. Bewegungen werden weniger durch eine konstante Konz. als durch Schwankung derselben beherrscht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **48**. 13—23. 1925. Leningrad, Pharmacol. Lab. St. inst.) MEI

Melvin Dresbach und Kenneth C. Waddell, *Das Erbrechen nach K-Strophantin bei Katzen mit entnervten Herzen. Der Angriffspunkt seiner Wirkung*. Das Erbrechen nach Strophantin wird wahrscheinlich durch zentrale Wrkg. (Breachzentrum), durch Wrkg. auf das Herz bedingt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics **27**. 9—12. 1925. New York, Albany Medic. College. Physiolog. Labor.) MEI

Konrad Schübel, *Gewöhnungsversuche mit Coramin*. Unter Mitarbeit von J. Maier. Ausführliche Darst. der S. 1232 referierten Arbeit. (Ztschr. f. d. ges. Medizin **48**. 593—601. Erlangen, Univ.) FRAN

K. Kaiser, *Über Cardiazol*. Klin. Bericht über günstige Erfahrungen mit Cardiazol, einem in W. II. N.-halt. Polymethylen, als Analeptikum, besonders in subcutanen Anwendungen. (Dtsch. med. Wchschr. **52**. 236—37. Berlin.) FRAN

Hinrichs, *Cardiazol*. Gute Erfolge mit Cardiazol, besonders in Fällen schwerer Kollapses ohne Nebenerscheinung. (Münch. med. Wchschr. **72**. 2102—03. 1925. Neustadt in Holstein, Landesheilanstalt.) HÜCK

Ch. Shookhoff, *Zur Kenntnis der Wirkung von Novocain bzw. Cocain auf das Säugetierherz*. Die Unters. des Elektrokardiogramms des Hundeherzens nach intravenöser Injektion von Novocain (2,5 u. 5%ig. Lsg.) oder Cocain bei gleichzeitiger Respiration des Herzens u. Registrierung ergab Leitungsstörungen außer Lähmung extracardialer Nerven. — Die Erregbarkeit der Reizleitungsfasern wird herabgedrückt oder ihre Refraktärperiode verlängert. — Novocain ist ja, ebenso wie Chinin, ein Muskelgift u. hebt die Möglichkeit der Erzeugung farad. Kammerflimmerns. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 110—23. Wien.) MÜLL

Julius Förster und Zoltán Benkovics, *Ist die Wirkung des Adrenalins auf den Blutdruck und Blutzucker eine dissoziierte?* Man muß die Wrkg. des Adrenalins auf verschiedenem Wege untersuchen, je nachdem man die Wrkg. auf den Blutzucker oder die Steigerung des Blutdrucks als Merkmal benutzen will. Im ersten Fall muß subcutan, im zweiten intravenös injizieren. Nur Blutzuckeranalysen sind maßgebend, nicht Harnunterss. Die verschiedenartige Äußerung der Wrkg. des Adrenalins sogenannte „Dissoziation“ der Wrkg. ist eine Folge falscher Anordnung der Versuche. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 1—8. Budapest.) MÜLL

F. Schilling, *Unerwünschte Nebenwirkungen des Atophan*. Es werden von V. beobachtete unerwünschte Nebenerscheinungen nach Gebrauch von Atophan berichtet, die aber nicht die hervorragenden pharmakolog. u. klin. Eigenschaften des Atophans beeinträchtigen können. (Münch. med. Wchschr. **73**. 362—64. 1925. Leipzig, berg.) FRAN

E. Berger, *Zur Kenntnis der trypanoziden Wirkung von „Peracrina 303“*. „Peracrina 303“ ist eine Trypaflavin-Eiweißverb. mit einem Trypaflavingehalt von 30%. Die Wrkg. von „Peracrina 303“ ist derjenigen der Trypaflavinbase unterlegen. Trypaflavin in Form des Peracrina sind keine sicher heilende Dosis bei der Er-

ellen Nagana der Maus, während von der reinen Trypaflavinbase noch 2,5 mg Dauerheilung herbeiführten. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 394—95. Berlin, In- „Robert Koch“.) FRANK.

Martin Hartinger, *Meine Erfahrungen mit dem Tuberkuloseheilmittel „Angio- che“*. Vf. berichtet über 2-mal beobachtete starke Rkk. nach Injektion von „Angio- che“, einem nach Angabe der herstellenden Firma „Chemothera“ unschädlichem Pflanzenauszug bestehendem Tuberkuloseheilmittel. (Münch. Wchschr. 73. 288. Pfaffenhausen.) FRANK.

Felix Klemperer, *Die Sanocrysinbehandlung bei Lungentuberkulose*. Das Möll- sche Serum hat vollständig versagt. Die von MÖLLGAARD empfohlenen Sano- cridosen von 0,5 u. 1,0 als Anfangsdosen sind als schädlich u. gefährlich zu wider- , unschädlich dagegen sind anfangs kleinere Dosen von 0,1 u. 0,25 g, langsam nd bis 0,5—1,0 g. In einem Teil der Fälle hilft die Sanocrysinbehandlung, in anderen, ebenso häufigen, bleibt sie wirkungslos. Die Wrkg. des Sanocrysin- örper ist sehr wahrscheinlich nicht eine direkt chemotherapeut., sondern erklärt indirekt durch eine Beeinflussung des kranken Gewebes. Sie ist also von der . des *Krysolygans* u. *Triphals*, wahrscheinlich auch von der des *Tuberkulins* dem n nach nicht verschieden, eine Überlegenheit über diese Mittel konnte jedenfalls erwiesen werden. (Therapie der Gegenwart 67. 76—80. Dtsch. med. Wchschr. 86—92. Berlin-Reinickendorf, Städt. Krankenh.) FRANK.

F. H. Gaddum, *Die Wirkung von Adrenalin und Ergotamin auf den Kaninchen- s*. In Wellcomes Laboratorien wird die Wirkungsstärke der *Secale*-Alkaloide aninchenuterus nach BROOM u. CLARK (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 9; C. 1924. I. 802) bestimmt. (20 cem Fl., 1 g Gewichtsspannung, Ringerlsg.: 0,90%, KCl 0,042%, CaCl₂ 0,024%, NaHCO₃ 0,05%, Traubenzucker 0,1%. — lange Uterusstückchen, vom Mesenterium sauber befreit.) — *Ergotamin* ent- erst nach 20 Min. oder länger seine maximale Wrkg. Zunächst diffundiert es n Uterusmuskel, dann findet in ihm irgendeine Veränderung statt. — *Ergotamin* kt, daß die Konz. des *Adrenalins*, die für Erzielung einer gewissen Wrkg. er- rlich ist, in bestimmter Proportion vermehrt werden muß. — *Adrenalin* wirkt sinen bestimmten Teil des Muskels, der zum Teil durch *Ergotamin* blockiert en kann. (Journ. of Physiol. 61. 141—50. Wellcome Res. Labb. London.) MÜ.

V. Schustrow und E. Salistowskaja, *Das Blut bei der Benzinintoxikation*. Ein- ng von Bzn. ruft bei Kaninchen Anämie, Leuco- u. Lymphopenie hervor. Die örung der Blutzellen ist auf Verminderung ihrer Resistenz zurückzuführen, viel- d durch Herauslösung der Lipide. Dieser Vorstellung entsprechend ist der Chole- egehalt des Serums gering (0,3 g statt 0,5—0,75 g pro l). (Dtsch. Arch. f. klin. 150. 271—76. Moskau, Staatsinst. f. Gewerbekrankheiten.) MEIER.

V. Schustrow und E. Salistowskaja, *Die Benzinangewöhnung*. Nach mehr- r Einatmung von Bzn.-Dämpfen werden Tiere bedeutend schwerer zu Krämpfen ht als anfangs, auch erholen sie sich schneller. Solche Tiere sind sehr fettarm. ermutet wurde, daß dadurch die im Körper l. Menge Bzn. abnimmt, wurde ihnen a dem Lecithin gel. war, injiziert, dadurch wurden sie wieder so empfindlich wie gs. Als Symptome der chron. Benzinwrkg. zeigen sich: Abmagerung, Reizbar- Erlöschen des Geschlechtstriebes bei den Tieren. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 150. 84. Moskau, Staatsinst. f. Gewerbekrankheiten.) MEIER.

A. E. Koehler, H. M. F. Behneman, O. E. Benell und A. S. Loevenhart, *Die che des Todes durch Anoxämie*. Bei Entfernung des Sauerstoffs aus der Atemluft die Rk. des Blutes zuerst alkal. (durch die vermehrte Austreibung von CO₂ bei rter Atmung), u. zwar je vollständiger O₂ fehlt, desto mehr (bis pH 7,84), dann eine Änderung der Rk. ins saure (bis pH = 6,6). Tod kann in der ersten Periode

eintreten, besonders wenn durch Injektion von NaHCO_3 die Alkalose noch verstärkt wird, wahrscheinlich durch die alkal. Rk. allein, in der zweiten Periode dadurch anaerobiot. gebildete Säuren, z. B. Milchsäure nicht mehr oxydiert werden können. Injektion von Alkali in dieser Periode verzögert den Tod. (Amer. Journ. Physiol. **74** bis 615. 1925. Univ. of Wisconsin, Madison Dep. of Pharmacol. and Physiol.) MED

Rudolf Hofer, *Über die Wirkung von Gasegemischen. (Potenzierung von Wirkungen.)* Tödliche Vergiftung wird durch eine Kombination von CO u. H_2S erzielt, wenn von jedem Gase Konz. angewandt werden, die unterhalb der tödlichen Konz. des einzelnen liegen, bei Kombination von HCN u. CO dann, wenn von CO 30% u. HCN 50% der tödlichen Konz. des einzelnen in der Atmungsluft vorliegt. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **111**. 183—205. Würzburg, Pharmakol. Inst.) MED

Kretschmer und Frieder, *Cholesterinuntersuchungen bei Bleivergiftung.* Cholesteringehalt bei Bleikranken im Serum n. oder herabgesetzt, im Gesamtblut erst Serumcholesterin < Gesamtblutcholesterin, während n. das umgekehrte Verh. liegt. (Biochem. Ztschr. **164**. 44—46. 1925. Berlin, III. med. Klinik.) MED

R. H. Kahn, *Über die zentrale Reizung der Nebennieren und der Paraganglien während der Insulinvergiftung.* Insulinvergiftung bewirkt beim Hunde Abnahme der chromfärbbaren Substanz der Nebenniere u. des Adrenalingehaltes. Diese Ver- tritt aber nur bei intakter Innervation der Nebenniere ein, also zentraler Angriffspunkt. (PLÜGERS Arch. d. Physiol. **212**. 54—63. Prag, Physiolog. Inst. d. deutschen Univ.) MED

Hans Ullmann, *Cyanvergiftung durch ein Schuhputzmittel.* Durch ein Schuhputzmittel für Brokat- u. Silberschuhe, das von der amerikan. Whittier Bros. Corporation, Boston, eingeführt wurde, entstanden bei den Angestellten eines Schuhgeschäftes Krankheitserscheinungen, wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Schläfrigkeit u. allgemeines Unbehagen. Die chem. Unters. ergab, daß in dem parat freie HCN vorhanden war, u. zwar betrug der Gehalt von 1 cem etwa 0,1 KCN. Aus der II. Doppelverb. $\text{AgCN} \cdot \text{KCN}$ spaltet sich metall. Ag ab, die Schmelzkreide dient nur zur gleichmäßigen Verteilung u. zum Glänzendmachen des Aufstrichs auf den Schuhen. Vf. fordert sofortiges Verbot der Einfuhr, Beschlagnahme der vorhandenen Bestände, Aufklärung des Publikums u. internationales Verbot der Herstellung dergleichen giftiger Waren. (Dtsch. med. Wchschr. **52**. 451—52. Berlin, Charité.) FR

Aldo Patta, *Pharmakologische und toxikologische Studien über die Arsenobenzol. II. Spätere Beobachtungen über die Toxizität verschiedener Arsenobenzole.* (I. Boll. Chim. Farm. **64**. 417; C. **1925**. II. 1707.) Erwiderung auf die Arbeit von TARDI u. CAZZANI (Biochimica e Terapia Sperimentale; C. **1924**. II. 2512). (Biochimica e Terapia Sperimentale **1925**. 8 Seiten. Sep. Pavia, Pharmakolog. Institut.)

Aldo Patta, *Pharmakologische und toxikologische Studien über die Arsenobenzol. III. Viscosität und Toxizität von Arsenobenzollösungen.* (II. vgl. vorst. Ref.) Zwischen den gekuppelten Arsenobenzolen besteht zwischen dem viscosimetr. Index u. Toxizität keine Beziehung. (Rivista Biologie Médicale **1925**. 8 Seiten. Sep. Pavia, Pharmakolog. Institut.) HÜCK

Aldo Patta, *Pharmakologische und toxikologische Studien über die Arsenobenzol. IV. Toxikologisches Verhalten von im Blut oder im Blutserum gelösten Arsenobenzolen.* (III. vgl. vorst. Ref.) Beim Kaninchen nimmt die Giftigkeit von Arsenobenzol mit steigender Löslichkeit im Serum zu. (Rivista Biologie Médicale **1925**. 10 Seiten. Sep. Pavia, Pharmakolog. Institut.) HÜCK

Otto Dittrich, *Codeinexantheme.* Kasuistik. Aus dem angeführten Falle geschlossen, daß Arzneiexantheme mitunter durch vasoneurot. Vorgänge sich erklären lassen. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis **150**. 120—22. Kiel, Univ. Hautklin.) O

K. K. Chen, *Die akute Toxizität des Ephedrins.* Von *Ephedrinsulfat* (I. bis 236%) ist die kleinste tödliche Dosis pro kg Körpergewicht beim Frosch 530—690 mg.

135—140 mg, Kaninchen 66—70 mg, Katze u. Hund 70—75 mg, wenn intra-, beim Frosch in den Lymphsack injiziert. Beim Kaninchen ist es per os nur $\frac{1}{10}$ so wirksam. Der Tod erfolgt durch Herzlähmung u. Atemstillstand unter pfn. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 27. 61—76. Peking, Union med. re. Lab. of Pharmacology.)

MEIER.

K. K. Chen, *Der Einfluß von wiederholter Zuführung von Ephedrin*. (Vgl. vorst. Tägliche Gabe von 25 mg Ephedrinsulfat pro kg Kaninchen ruft keine tox. Er-
nungen hervor. Allgemeinzustand u. anatom. Befund ergibt keinen Anhaltspunkt
chron. Schädigung. Es tritt keine Gewöhnung oder verstärkte Empfindlichkeit
den Stoff ein. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 27. 77—86.)

MEIER.

K. K. Chen, *Der Einfluß des Ephedrins auf die Sekretion der Verdauungssäfte*.
vorst. Ref.) Die Sekretion von Speichel u. Magensaft wird durch Ephedrin an-
Atropin verhindert die Wrkg. fast vollständig. Sekretion von Pankreassaft,
darmsaft u. Galle wird nicht beeinflusst. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics
27—92.)

MEIER.

V. Steinbrinck und **H. Münch**, *Über Knollenblätterschwammvergiftung*. Die
ik der Knollenblätterschwämme, die Verwechslungsmöglichkeiten u. Giftigkeit
rschiedenen Arten werden eingehend erörtert. Die klin. u. patholog.-anatom. Er-
nungen am Tier u. Mensch werden beschrieben. Pathogenet. besteht die Wrkg.
er allgemeinen Gefäßlähmung u. in einer Störung des Kohlehydratstoffwechsels
ders der Leber. Die therapeut. Maßnahmen werden besprochen. (Ztschr. f.
Med. 103. 108—46. Breslau, Med. Abt. Städt. Krankenh. Allerheiligen.)

ME.

G. Analyse. Laboratorium.

Hilton T. Hanke und **Karl K. Koessler**, *Ein bei ermäßigtem Druck mit einem
nten Flüssigkeitsvolumen arbeitender kontinuierlicher Dialysen- oder Extraktions-
at* (Fig. 5). (Journ. Biol. Chem. 66. 495 bis
1925. Chicago, OTHO S. A. SPRAGUE Mem.
Univ. of Chicago.)

SPIEGEL.

Mutsoshi Bito, *Über eine neue Methode der
färbung*. Färbung mit Carbolthionin, Waschen,
enzieren mit Anilinalkohol u. weiter mit
weinstein- u. Tanninlg. nach jedesmaligem
hen. Carbolxytol u. s. f. wie bei histolog.
üblich. (Folia anat. japon. 3. 11—15. 1925;
ges. Physiol. 33. 825. Okayama, Anat. Inst.
PÉTERFI.)

OPPENHEIMER.

Vittorio Puntoni, *Darstellung von Azur-
len mit Hilfe von Ozon und seine Anwendung
färbung nach der Methode von Romanowski*.
S. 744.) Lsg. von Methylenblau in W. unter
z von etwas Na_2CO_3 (10,0 g auf 25,0 g Farb-
u. 1000,0 ccm W.), 24 Stdn. stehen lassen,
ren. 48 Stdn. lang ozonhaltige (mit dem
nschen Ozonisator gewonnene) Luft durch-
lassen, abschütten der grünlichen Fl., Behandeln des blauen, am Glase haften-
Nd. (= unl. Azurmethylenbase) mit CO_2 . Man erhält das l. Azurcarbonat als
e, leicht abkratzbare M. Benutzung des Farbstoffs nach der Vorschrift unter
z von 0,3 Azur, 0,15 Methylenblau u. 0,15 Eosin in 50,0 ccm Glycerin, dem
ch die gleiche Menge Methylalkohol zugesetzt wird. (Annali d'Igiene 36. 24—30;
soc. de biologie 94. 21—23. Rom, Inst. d'hyg.)

OPPENHEIMER.




Fig. 5.

(1925. SPRAGUE)

Kuranosuke Kumagai, *Neue Aufhellungsverfahren ohne vorhergehende wässerung*. Mischungen von Xylol (7,5) + Phenol (2,5) + A. abs. (10,0) oder Or. (3,0) + Phenol (1,0) + A. abs. (3,0) werden als Aufhellungsfll. zum mkr. An empfohlen. (Folia anat. japon. 3. 31—36; Ber. ges. Physiol. 33. 272. 1925. Oka Anat. dep. Ref. RÖTHIG.)

John R. Baylis, *Turbidimeter für genaue Messungen geringer Trübungen* schreibung eines App. zur Best. der Klarheit von Trinkwasser in durchschein. Lichte. Als Vergleichslsgg. dienen Ausschüttelungen von Fullererde von besti. Absetzungsdauer. Figuren im Original. (Ind. and Engin. Chem. 18. 311—12 timore [Md.].) GRIM

Carl Leiss, *Über ein verbessertes Ultrarot-Spektrometer und über einen Universal-Spektrographen mit Glas- und Quarzoptik*. Beschreibung eines, nach Vorschläge Prof. C. SCHÄFER konstruierten Ultrarotspektrometers für Messungen bis etwa bei dem a) zur Verdoppelung der Dispersion auch 2 Prismen angewendet werden k b) die Drehung des Dispersionssystems durch eine „Schraube ohne Ende“ mit Teiltrommel erfolgt u. c) neuartige symmetr. Spalte zur Anwendung gelangen. Universal-Spektrograph mit Quarz- u. Glasoptik für Aufnahmen von Rot (etwa 7 bis zum Ultraviolett von 200 $\mu\mu$, wobei die Prismen schnell gegeneinander ausgew. werden können u. als Objektive für beide Fälle Quarzlinsen dienen. (Ztschr. f. Phy. 60—72. Berlin-Steglitz.) FRANKENBUR

Y. Katsu, *Der Einfluß der Temperatur auf das elektrische Potential der $\frac{1}{10}$ N. Kalomel-Elektrode*. Elektrometr. Best. von p_H erfolgt nach der Formel:

$$p_H = (\pi - \pi_0) / 0,0001983 T.$$

π = beobachtete elektromotor. Kraft gegen $\frac{1}{10}$ -n. HgCl-Elektrode, π_0 = Kor. die HgCl-Elektrode bei gegebener Temp. Das funktionelle Verhältnis von π_0 zur wird gefunden, indem man $\frac{1}{10}$ -n. Buttersäure als Elektroden-Fl. für die H-El. benutzt u. nach der Formel $(\pi_0)_t = (\pi_0)_{18} - 0,000002 (t^2 + 9t - 489)$, wobei $(\pi_0)_{18} = \pi_0$ bei t^0 bezw. 18° sind, rechnet. (Journ. of biophysics 1. 44. 1924; B. Physiol. 33. 803. Tokyo, Gen. meet., physiol. soc. Ref. KATSU.) OPPENHEIM

R. Shoji, *Ein neuer Typ eines Potentiometers zum Messen der H-Ionenkonzentr.* Meßteil des Instruments ist ein Feussner-Widerstand (Zeigertyp) von 150 Ω insg. bestehend aus Spiralen von 10^{-1} u. 0,1 Ω . Regulierwiderstand hat 80 Ω , u. 0,1 Ω Differenz genau einstellbar. Der Zeigertyp ist für das Potentiometer, d. ziemlich niedrigen Widerstand hat, gewählt, um Beschädigungen des Meßteils zu vermeiden. Umfang der Ablesung: 0,001—1,5 V. (Journ. of biophysics 1. 44. 192 ges. Physiol. 33. 803—04. Tokyo, Gen. meet., physiol. soc. Ref. SHOJI.)

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Leo Lorber, *Einfache Mikro-Diastase-Bestimmung in den Körperflüssig.* Es wird eine Methode zur Best. der Diastase unter Benützung der früher (vgl. B. Ztschr. 158. 205; C. 1925. II. 1375) ausgearbeiteten Mikrozuckerbestimmung geteilt. Man läßt 0,5 cm der Diastaselsg. mit der gleichen Menge W. auf 4 cm Stärkelsg. (2 g Amylum solubile MERCK in 100 cm $\frac{1}{100}$ -n. NaCl-Lsg.) eine ger. Zeit einwirken, gibt dann 1 cm dieser Mischung zu 2 cm Fehlingscher Lsg. in Zentrifugenglas u. bestimmt die erhaltene Menge Zucker nach der angegebenen Methode (3 Min. kochen!). Als Diastaseeinheit (D) gilt die Menge, welche aus obiger Stärkelsg. in 10 cm Gesamtvolumen in 1 Stde. soviel reduzierende Substanz bildet, wie 1 mg Cu entspricht. In Körpersäften wird die Einheit auf 1 cm b. Die Ausführung der Methode für Diastasebest. in Harn, Stuhl, Blut bezw. Ex- u. Transsudaten, Liquor, Speichel u. Duodenalsaft wird beschrieben. Vfscheidet zwischen der scheinbaren, in der Körperfl. direkt bestimmten u. „vom Milieu beeinflussten“ Diastasemenge (D_{ph} , abgeleitet von phaneros) u. de

n Diastasemenge D_d (dikaos), welche vom Milieu nicht beeinflußt ist. D_d wird ermittelt, indem man zunächst D_{ph} ermittelt; „sodann so, daß wir eine bekannte D enthaltende Lsg. hinzugeben; mit wieviel das neue Milieu die Wrkg. der im reinen neutralen Medium enthaltenen Diastase (= zugesetzte D) veränderte, mit wieviel veränderte das Milieu gleichfalls die Wrkg. der darin ursprünglich vorhandenen Diastase.“ Man bestimmt also D_d so, daß D_{ph} ermittelt wird, dann aus einem bekannten D hinzufügt u. das gemeinsame D_{ph1} bestimmt. Dann ist:

$$D_d = D \cdot D_{ph} / (D_{ph1} - D_{ph})$$

zum Prinzip S. 1242). Als „reine Diastaselsg.“ wird 1:100 verd. Speichel angesetzt u. als Vergleichslsg. D hinzugefügt. (Biochem. Ztschr. **163**. 480—87. 1925. Pest, Krankenh. d. jüd. Gem.) HESSE.

Brno Mendel und Ingeborg Goldscheider, *Eine colorimetrische Mikromethode zur quantitativen Bestimmung der Milchsäure im Blut*. Die Milchsäure wird in einem Blut nach Enteiweißung u. Entfernung der Kohlehydrate durch Vergleich der H_2SO_4 u. Veratrolzusatz auftretenden Färbung mit einer Standardlsg. bestimmt. Resultate (Fehler 3—5%) werden nur unter genauer Einhaltung der Vorschriften erhalten. (Biochem. Ztschr. **164**. 163—74. 1925. Berlin, III. Med. Klinik.) MEIER.

B. Pohorecka-Lelesz, *Über eine vereinfachte Mikromethode nach Kjeldahl (Verfahren Destillation)*. (Vgl. S. 2613.) Die Methode schließt sich an die Mikrobest. des Harns u. Ammoniumsalzen durch jodometr. Titrierung alkal. Hypobromits an. (Vgl. Bull. Chim. Biol. **6**. 773; C. **1925**. I. 140.) Vorausgehen muß eine Best. der Spuren von Salzen in der konz. H_2SO_4 . (1 ccm H_2SO_4 enthielt 0,0745 mg N, eine andere Partie 0,09 mg.) Der Vorgang ist folgender (Beispiel): 1 ccm Harn auf 20 ccm verd., Zusatz von H_2SO_4 u. 1 ccm 30% K-Oxalat. Nach beendeter Veraschung, Neutralisation mit Methylrot mit NaOH, Zusatz von 2 ccm 0,1-n. Hypobromit, 0,5 ccm KJ u. 2 ccm Cl . Titrierung mit $\frac{1}{50}$ -n. Na-Hyposulfit. (Bull. Soc. Chim. Biol. **7**. 1038—43. Poznan, Lab. de chim. physiol.) OPPENHEIMER.

L. Flatow, *Ein neues titrimetrisches Prinzip und seine Anwendung zur Zuckerharnsäurebestimmung*. Vf. fand im indigomonosulfosauren Na eine Substanz zur Best. der kleinsten Mengen $K_3Fe(CN)_6$. Läßt man zu einer sodaalkal. Lsg. dieses Fe-Salzes eine Lsg. von indigosulfosaurem Na hinzufließen, so wird letztere sofort entfärbt. Die Entfärbung ist aber unvollständig, wenn umgekehrt $Fe(CN)_6K_3$ zu der Indigolsg. gegeben wird. Auf ein Molekül Indigolsg. entfallen 2 Moleküle $K_3Fe(CN)_6$. Durch diese Umfärbung lassen sich sowohl reduktive Prozesse messend verfolgen (Traubenzucker, Harnsäure, H_2O_2) als auch oxydative, welche $K_4Fe(CN)_6$ in saurer oder neutraler Lsg. zu $K_3Fe(CN)_6$ umwandeln (Cl, Br, HNO_2). Es werden speziell die Bestst. des Harns u. u. d. der Harnsäure ausführlich beschrieben. Die Einzelheiten sind im Original einzusehen. (Münch. med. Wchschr. **72**. 2009—11. 1925. München.) FRANK.

Kurt Samson, *Phosphorsäurebestimmungen in kleinen Substanzmengen*. Angabe der titrimetr. Mikrophosphorsäurebest. im Serum u. im Liquor cerebrospinalis mittels $MgPO_4$ in 10%ig. HNO_3 -Lsg. Zur Best. des anorgan. P im Serum wird dasselbe Serum mit Trichloressigsäure enteiweißt, nach dem Veraschen des Eiweißnd. kann der organ. P mit ziemlicher Genauigkeit bestimmt werden. (Biochem. Ztschr. **288**—94. 1925. Dortmund, Städt. Krankenanstalten.) FRANK.

K. Samson, *Die physikalisch-chemischen Grundlagen der Mastixreaktion*. Man hat zurzeit an, daß die Ausfällung der Mastixsuspension durch Sensibilisierung des Eiweiß erfolge. — Die Fällung durch Salze ist eine Funktion der $[H^+]$ des Mediums. Gegen $(NH_4)_2SO_4$ verhält sich Mastix-Serumgemisch genau wie reines Serum. Eine Sensibilisierung ist demnach auszuschließen. — Die Mastixteilchen mit einer Fetthülle haben je nach Verdünnung des Liquors, Änderung der pH oder des Ionengehalts verschiedene Fällungspunkte. — Eine sichere Erklärung der Grundlagen

der Mastixrk. konnte noch nicht gefunden werden. (Ztschr. f. d. ges. exp. M. 49. 95—109. Hamburg.) MÜLL

Eugen Enriques und Rudolf Sivó, *Neues Verfahren zur Bestimmung des rubingehaltes von Seren und Duodenalsäften*. Die Methode vermeidet die colorimetrischen Schwierigkeiten des Verf. von VAN DEN BERGH, die Adsorption von Bilirubin b. A.-Fällung u. erhöht die Empfindlichkeit der Best. durch Verwendung von Co. Na-benzoicum (bezw. salicylicum), das nach bestimmten Serumengen u. entsprechenden Mengen Diazoreagens unmittelbar in den Trog zum Farbvergleich gebracht wird. (Biochem. Ztschr. 169. 152—60. Budapest, III. med. Univ.-Klin.)

Richard Foit, *Eine einfache Methode zur raschen und verlässlichen Bestimmung des Stickstoffs im Harn und Blute*. Beschreibung eines Verf., bei dem die zu untersuchende Fl. ohne Katalysator nur mit kleinen Mengen H_2SO_4 u. darauffolgend tropfenweisem Zusatz von H_2O_2 verbrannt u. N in Ammonsalz übergeführt wird. N-Best. geschieht in einem besonderen Rohr auf volumetr. Wege durch Einwirkung Bromlauge auf das entstandene $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. (Biochem. Ztschr. 169. 161—68. med.-chem. Inst. d. Karls-Univ.) OPPENHEIM

Charles Alfred Hill, *Die Bestimmung kleiner Mengen Wismut im Urin*. C. metr. Methode nach Zerstörung der organ. Bestandteile. (Lancet 209. 1281. 1925.)

R. Goiffon und F. Nepveux, *Bestimmung des Ammoniaks und der freien Aminosäuren im Stuhl*. Zu 50 ccm 10%ig. Aufschwemmung von Faeces kommen 10 ccm konz. Lsg. von AlCl_3 + einige Tropfen Phenolphthalein. Nach 5 Min. 2—3 g CaO bis zu deutlicher alkal. Rk. Zu 25 ccm Filtrat weitere Tropfen Phenolphthalein verd. HCl bis zu schwach Rosafärbung. Nach Zusatz von 5 ccm Formol, mit gleichen Teilen W. verd., mit $\frac{1}{10}$ -n. NaOH titriert. Man erhält so freies u. gebundenes u. freie Aminosäuren. (Arch. des maladies de l'appar. dig. et de la nutrit. 15. 478. Ber. ges. Physiol. 33. 385. 1925. Paris, Soc. de gastro-entérol. Ref. FR. N. SCHULZ.)

Edward J. Baldes und S. Franklin Adams, *Spektrophotometrische Analyse von Handelsinsulinen*. Insulinlsgg. zeigen zwischen Wellenlänge 480—680 $\mu\mu$ eine Absorption, die wahrscheinlich von einem beigemischten gelben Farbstoff herrührt. Eine Eichkurve eines Präparats bekannten Insulingehalts aufgenommen, so kann durch Spektrophotometrie unbekannter Lsgg. desselben Präparats der Insulingehalt derselben ermittelt werden. (Amer. Journ. Physiol. 74. 309—13. 1925. Rochester, Minnesota, Mayo Clinic.) MEI

W. Kollé, *Die experimentellen Grundlagen der biologischen Prüfung und Heilwertbestimmung der Salvarsanpräparate*. Prinzipiell wichtig für die deutschen Richtlinien ist ein auf Antrag des Vfs. eingeführtes Standardsalvarsan, das auf Veranlassung der Standardisierungskommission des Völkerbundes in die internationalen Prüfungsschriften aufgenommen hat. Das Standardsalvarsan soll nicht nur bei der Beurteilung der Toxizität, sondern auch bei der Heilwertermittlung als Vergleichsmaßstab dienen. Die chem. Prüfung erstreckt sich auf die Feststellung der chem.-physikal. u. biolog. Eigenschaften der Arsenobenzolderivate, insbesondere auf die Feststellung der Löslichkeit sowie auf die Best. des Gehaltes an den wichtigsten Elementen der Moleküle, für welche Grenzwerte festgesetzt sind, ferner auf Angaben über die Ausführung der Analyse u. bietet die Möglichkeit, Fälschungen der Salvarsane auch chem. zu erkennen. Die Prüfung auf Giftigkeit erfolgt an Mäusen u. Ratten. Es werden von 3 verschiedenen Prüfern aus einer Anzahl Röhren (etwa 6) einer jeden Operationsnummer bestimmte Dosen in geeigneter Verdünnung 3 Serien von je 10 Mäusen intravenös injiziert. Von den so behandelten Mäusen sollen während 2 Tagen etwa 60% munter u. am Leben bleiben. Die gleiche Prüfung erfolgt bei Ratten. Es soll nicht nur die Giftigkeit der Präparate hierdurch garantiert werden, sondern auch eine gewisse Charakteristik, wie sie charakteristisch ist für solche Salvarsane, die auf Grund prakt. Erfahrungen eine optimale Wrkg. beim Menschen entfalten u. die als Charakteristikum für

ial-(Standard)Salvarsan gelten kann. Für die Ermittlung des Heilwertes dient er ein Standardsalvarsan. Es wird dabei nicht eine absol. Dosis als Kennzeichen eine genügende Heilwrkg. bezeichnet, sondern der Heilwert der zu prüfenden Heringsnummern wird mit dem in jeder Infektionsserie gleichzeitig ausgewerteten Standardsalvarsan verglichen. Ein Präparat gilt als genügend wirksam, wenn es sich Anwendung abgestufter Mengen ebenso verhält wie das in der mit demselben infizierten Parallelreihe mitverwendete entsprechende Standardpräparat. Ich werden alle durch die chem. u. biolog. Prüfungen als einwandfrei erkannten Nummern in staatlich anerkannten öffentlichen Krankenanstalten auf klin. Verwertbarkeit, namentlich auf das Fehlen von Nebenerscheinungen untersucht. (h. med. Wehschr. 52. 431—33. Frankfurt a. M., Staatsinst. f. experim. Therapie VORG SPEYER-Haus.)

FRANK.

Floyd De Eds, *Eine einfache Methode zur Messung von Veränderungen der Oberflächenspannung reiner und biologischer Flüssigkeiten*. Für die Best. in biolog. Flüssigkeiten sich die Ermittlung der capillaren Steighöhe besser als die stalagmometrische. Vf. hat den App. von RICHARDS, SPEYERS u. CARVER (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1196; C. 1924. II. 1667) u. die Technik der Messungen vereinfacht u. Beschreibung des App. im Original) u. berichtet über sehr befriedigende Ergebnisse. (Journ. Lab. Clin. Medicine 11. 464—67. San Francisco [Cal.]) SPIEGEL.

Dr. C. E. Burger und J. G. Dusser de Barenne, *Ein Apparat zur graphischen Registrierung des Gesamtgaswechsels beim Menschen*. Durch Kombination eines großen pneumatischen Spirometers, aus dem atmosphär. Luft eingeatmet wird, mit einem Respirometer, der in einer festen Außenhülle steckt, wird die Best. von O₂, CO₂, in Respirometersform u. respirator. Quotient auf graph. Wege ohne Gasanalyse möglich. — Die Kurve zeigt zunächst außer den Atemzügen gemeinsam den O₂-Verbrauch u. den von CO₂, nach Absorption von CO₂ in KOH mittels 2 Absorptionsflaschen auf Wagebalken außerdem die CO₂-Abgabe u. als Gesamtabnahme den gesamten Gasverbrauch. — Angeblich bietet der App. keinen Widerstand beim Atmen. (Ztschr. f. phys. exp. Medizin 49. 130—46. Utrecht.)

MÜLLER.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

George K. Burgess, *Die Organisation und Arbeitsweise des United States Bureau of Standards*. (Journ. Chem. Education 3. 7—28. Washington D. C., Director, U. S. Bureau of Standards.)

BEHRLE.

Carl G. Schwalbe, *Die Versuchsstation für Holz- und Zellstoffchemie in Eberswalde, Provinzial-Institut der Technischen Hochschule Berlin*. Die Einrichtungen der Station und Arbeitsgebiet — Harz-, Holz- u. Zellstoffstudien, Verkohlung von Holz — werden besprochen. (Wehbl. f. Papierfabr. 57. 205—11.)

SÜVERN.

Dr. F. Liebing, *Die Verwendung des Gußeisens und des säurebeständigen Emails im Maschinenbau*. (Vgl. S. 776.) Mit steigendem Si-Gehalt nimmt die Säurewiderstandsfähigkeit des Gußeisens zu, doch vermindert sich Festigkeit u. Elastizität, folglich der Hitzewiderstand. Form- u. Gießbarkeit werden erschwert, die Bearbeitbarkeit beschränkt sich auf das Schleifen. Wegen der schwierigeren Formgebung ist die Verwendung hochsilizierter Gußeisensorten für kompliziertere säurebeständige Bauteile ausgeschlossen. An Säurebeständigkeit mindestens gleichwertig, bzgl. Hitzewiderstand, Hitzebeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Korrosionen u. Erosionen sind Si-freie Fe-Legierungen mit ca. 1% Ni (mit u. ohne Cr u. Mn). Auch der Co-Zusätze erhöhen die chemische Widerstandskraft des Gußeisens. Infolge

ihres hohen Preises haben die Ni-Legierungen das hochsilizierte Fe im Apparat noch nicht verdrängen können. (Apparatebau **38**. 49—50. München.) ASCH

Justin F. Wait, *Das geschlossene kontinuierliche Filter*. Beschreibung prakt. Filterpresse mit einem Arbeitsdruck bis zu 14 Atm., welche sich auch bei brennbaren Fl. bewährt hat. Figuren im Original. (Ind. and Engin. Chem. **18**. bis 97. New York [N. Y.].) GRIM

T. S. Carswell, *Berechnung von Fraktionierkolonnen. Zusammenhänge zwischen Höhe der theoretischen Wirksamkeit, Radius der Packringe und Natur der Flüssigkeit bei der Destillation in gepackten Fraktionierkolonnen. Gleichungen zur Berechnung der Wirksamkeit von Fraktionierkolonnen*. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 294—95. New York [P. A.].) GRIM

A. J. V. Underwood, *Verdampfer mit Brüdenkompression. Prinzip, Zweck und Leistung*. Zusammenfassende Darst. der Heizung durch Kompression des Dampfes beim Eindampfen u. Trocknen mit Literaturübersicht. (Chem. Trade Journ. **78**. 15 bis 217—19. 283—84. 315—16.) Ju

H. F. Pierce, *Eine bewegliche Gefrieranlage*. Beschreibung einer elektr. Gefrieranlage für Laboratoriumsgebrauch. Figuren im Original. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 270—71. New York [N. Y.].) GRIM

Meredith Daniel Avery, V. St. A., *Reinigen von Flüssigkeiten*. Die zu reinen Flüssigkeiten wird zwischen Elektrodenplatten in kreisförmiger Bewegung hindurchgeführt. (F. P. **601 031** vom 22/6. 1925, ausg. 20/2. 1926.) KAUF

Hans Edler, Gelsenkirchen, *Apparat zur elektrischen Gasreinigung mit ringförmigen Querschnitt als Sammelelektroden u. flachen Bändern als Elektroden*. (A. P. **1 574 237** vom 9/2. 1925, ausg. 23/2. 1926.) KAUF

Arthur Seligmann, Bremen, *Gastrennung unter Verflüssigung*. Die ganze Gasmenge des in der Verflüssigungs- u. Trennapparatur zirkulierenden Gases wird erst im Strom gekühlt, dann teilweise in einer Maschine zur Expansion gebracht, dann im Gegenstrom gekühlt u. dann völlig zur Expansion gebracht. (A. P. **1 574 237** vom 21/2. 1924, ausg. 23/2. 1926.) KAUF

V. Anorganische Industrie.

Edmund O. von Lippmann, *Zur ehemaligen Gewinnung des Salpeters*. Von HILDEBRANDT (S. 2034) erwähnte Edikt ist bereits in dem Werk von T. „Salpeterwirtschaft u. Salpeterpolitik“ (Tübingen 1905) gewürdigt. Ein 14. teiles Privilegium erwähnte Vf. in seinem Aufsatz („Abhandlungen u. Vorträge“, 125, Leipzig 1906). (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 401.) Ju

J. H. Frydlander, *Das Hyperol oder das feste Wasserstoffsperoxyd*. E. BOOER, S. 1005) wird jetzt in England als eine Neuheit auf den Markt gebracht, aber bereits von TANATAR (Journ. Russ. Phys.-chem. Ges. **40**. 376; C. **1908**. 1 u. 2) nach ihm von anderen beschrieben worden. Vf. beschreibt seine Eigenschaften die Vorteile seiner Anwendung als Oxydationsmittel. (Rev. des produits chimiques **115** bis 16.) RÜ

C. A. Silberrad, *Thionylchlorid*. Kurze Übersicht über Darst. u. Rk. mit ausführlichem Literaturnachweis. (Chemistry and Ind. **45**. 36—38. 55—57.) BEH

Albert Hutin, *Die moderne Schwefelnatriumherstellung*. Nach einem Artikel „Canadian Chemistry and Metallurgy“ haben eingehende Verss. der „Shawinigan Falls“ (Dép. Quebec) zu einem elektr. Verf. der Schwefelnatriumherstellung geführt, welchem ein 90% Na_2S enthaltendes Prod. erhalten werden soll. Das anfangs oberhalb 1000° aber fest werdende Gemisch von Na_2SO_4 u. C wird durch ganz kleine Zusätze von K_2SO_4 wieder fl., wonach die Rk. fast quantitativ unter B. von Na_2S verläuft. (Le Cuir Technique **17**. 306. 1925.) R

B. Moore, *Technische Herstellung von Radium, Mesothorium und Helium.* Einzelbericht über bewährte Verff. zu techn. Herst. von Ra, Mesothorium u. He. and Engin. Chem. **18.** 198—211.) GRIMME.

Union Sulphur Co., New Jersey, übert. von: **Carl Marx**, Wyoming, N. J., *Flüchtiger Schwefel.* Flüchtigen S enthaltende Erze werden unter hohem Vakuum u. die Dämpfe kondensiert. (A. P. **1574987** vom 19/12. 1922, ausg. 2/3.) KAUSCH.

Union Sulphur Co., New Jersey, übert. von: **Carl Marx**, Wyoming, N. J., *Flüchtiger Schwefel.* Man erhitzt elementaren S enthaltende Materialien in einem Vakuum, bis kein S mehr verdampft, worauf man die Dämpfe kondensiert. (A. P. **1574988** vom 19/12. 1922, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH.

I. A. Humphrey und **Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd.**, Stocton-on-Tees, *Verfahren für die Ammoniaksynthese.* Brennstoff wird, bei sehr hoher Temp., 1300°, mittels überhitzten Dampfes u. Luft verbrannt, u. es wird das entstandene Nit Dampf unter Vermittelung eines Katalysators zur Umsetzung gebracht. Die der Erzeugnisse wird zum Vorwärmen benutzt. (E. P. **243 122** vom 24/9. 1924, 17/12. 1925.) KÜHLING.

I. Lohmann, Johannisthal b. Berlin, *Metallcarbide.* Feste Körper aus Wogl. Carbiden erhält man durch Erhitzen der entsprechenden Säureanhydride der stark reduzierten pulverigen Metalloxyde oder der Metalle selbst in Ggw. geringer Mengen Th, Ur, Ta, Mo o. dgl. in Kohletiegeln mit anliegenden Formen, die fl. Reaktionsmasse einfließt. (E. P. **246 487** vom 21/1. 1926, Auszug veröff. 1924. Prior. 24/1. 1925.) KAUSCH.

Elite Co., Los Angeles, Californ., übert. von: **Robert Calvert**, Lompoc, Californ., *Kieselkalisilikat.* Man erhitzt ein Gemisch von fein verteilter Kieselgur, einem Erdhydroxyd u. W. (A. P. **1574363** vom 1/12. 1923, ausg. 23/2. 1926.) KA.

E. Lederer und **W. Stanczak**, Prag, *Aluminiumsalze.* Ton u. dgl. wird unter Druck in einem Autoklaven mit Na₂CO₃-Lsg. erhitzt u. dann abgekühlt vor Öffnen des Autoklaven. (E. P. **246 512** vom 23/1. 1926, Auszug veröff. 24/3. 1926. Prior. 1925.) KAUSCH.

Ever Smelting and Refining Co., St. Louis, übert. von: **Howard H. Utley** und **Jean Mc Callum**, Florence, Colorado, *Zinkoxyd.* Zinkkonzentrat (Gemisch aus ZnO u. PbSO₄, sowie ZnSO₄) wird mit NaCl gemischt, dann auf etwa 800—1000° erhitzt. Es verdampft dann PbCl₂, die Zn-Verbb. bleiben unverändert. Die PbCl₂-Dämpfe werden verdichtet. (A. P. **1574317** vom 7/6. 1923, 23/2. 1926.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

H. Bates, *Die Verwendung von Schwefel, um Zementrohre gegen den Angriff von Alkali widerstandsfähig zu machen.* Imprägnierung von Zementrohren mit geschmolzenem Schwefel erhöht ihre Haltbarkeit u. verringert die Absorptionsfähigkeit, jedoch ohne Einfluß auf die Alkalibeständigkeit. (Ind. and Engin. Chem. **18.** 309.) Washington [D. C.] GRIMME.

Frank H. Riddle und **Albert B. Peck**, *Versuche von 18 Monate Dauer über feuerfeste Stoffe.* Einige feuerfeste Körper wurden vor der Inbetriebsetzung eines Dressler-Ofens an verschiedenen Stellen eingesetzt u. 18 Monate lang darin gelassen. Bei 17—18 SK. SiC wird unter oxydierenden Bedingungen bis zu 600° angegriffen. Bei niederen Temp. tritt Oxydation zu Christobalit unter großer Spannung ein, bei hohen Temp. überwiegt die Verflüchtigung. Im Ofen verteilte Zementhalter aus glasiertem Porzellan scheinen bis 1200° ihre Mikrostruktur nicht zu ändern. Bei höheren Temp. ist das Wachstum der Mullitkrystalle verhältnismäßig

gering. Korund wurde auch bei den höchsten Temp. nicht gebildet, Formveränderung trat nicht ein, obgleich die Glasur bei höchster Temp. aufgesaugt oder verflüchtigt war. Pyrometerrohre zeigten dieselbe krystall. Zus., aber nicht gleiche Beständigkeit gegen das Krystallwachstum. Die Feuerfestigkeit war geringer u. die Neigung Blasen- u. Rissebildung größer geworden. Silicasteine der heißesten Zone zeigten bei diesen Temp. zu erwartenden Veränderungen der Mikrostruktur. Kieselhaltige Mörtel bewährten sich besser wie Ton oder Chromit enthaltende. Ein heißesten Zone verwandter SiC-Mörtel zeigte Oxydation zu Christobalit bei st. Dehnung. 3 neu gebildete künstliche Mineralien wurden aufgefunden: In der Verdampfungzone hatte sich Kieselsäureglas gebildet, offenbar aus der heißen verflüchtigt u. in Berührung mit den W.-Dämpfen niedergeschlagen. In der Zone fanden sich Krystalle, die aus einer Mischung von Fe_3O_4 u. Fe_2O_3 bestand eine niedrigere Diss.-Temp. von Fe_2O_3 vermuten lassen als gewöhnlich angenommen wird. Durch Oxydation von SiC hatte sich in den Muffeln der h. Zone oft Christobalit gebildet. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 1—22. Champion Porcel. Co.) SALMAGOR.

Bernhard Kleinschmidt, *Ein neuer hochfeuerfester Stoff*. Über „Refrax“ u. „Refrax“, zwei Formen des Carborundums u. ihre Verwendung als feuerfestes Material. (Centralbl. d. Hütten- u. Walzw. 30. 79—81. Düsseldorf-Reißholz.) WEC

Allgemeine Elektrizitäts-Ges., Berlin, *Verbinden von Glas mit Metall*. Beim Zusammenschmelzen von Glas- u. Metallrohren werden die Berührungspunkte auf verschiedene Temp. gebracht, die von den verschiedenen Expansionskoeffizienten der beiden Stoffe abhängen. (E. P. 243 553 vom 2/1. 1925, ausg. 24/12. 1925.)

A. Grote, Köln a. Rh., *Verwertung häuslicher und industrieller Abfälle zur Herstellung von Glaswaren durch Sintern* der aus den Rückständen abgesiebten SiO_2 -haltigen Stoffe, worauf diese mit dem Klinker von der Verbrennung der größeren Abfälle geschmolzen werden. (E. P. 244 358 vom 16/7. 1925, ausg. 7/1. 1926.) KAUF

Adolph Herscovitch, Montreal, Canada, *Kunstmarmor*. Man vermischt 1 Teil Lsg. mit MgO u. setzt behufs B. einer plast. M. Marmorstaub hinzu, worauf die Masse geformt wird. (Can. P. 251 868 vom 31/7. 1924, ausg. 21/7. 1925.) KAUF

Harbinson-Walker Refractories Co., übert. von: **William F. Rochow**, Pittsburgh, Pennsylvan., *Neutraler Zement*, bestehend aus einer innigen Mischung gepulvertem Al_2O_3 u. Na_2SiO_3 . (Can. P. 250 556 vom 2/6. 1924, ausg. 9/6. 1925.) KAUF

John A. Rice, Berkeley, Californ., *Zellenzement*, bestehend aus einem Gemisch von Zementmaterial u. zähem, stabilem Schaum (einer gelatinösen M.). (Can. P. 252 546 vom 13/6. 1924, ausg. 11/8. 1925.) KAUF

Hartford-Empire Co., Hartford, Conn., übert. von: **Paul G. Willetts**, Hartford, Conn., *Hochtemperaturbindemittel*, enthaltend BaSO_4 , SiO_2 u. Na_2SiO_3 -Lsg. (Can. P. 1573 888 vom 13/11. 1925, ausg. 23/2. 1926.) KAUF

August Benson, Chicago, Ill., *Überzugsmasse*, bestehend aus einer gepulverten M., die aus gleichen Teilen Magnesit, SiO_2 u. Kieselgur, die miteinander verschmolzen sind, u. einer MgCl_2 -Lsg. besteht. (A. P. 1574 862 vom 19/7. 1924, ausg. 2/3. 1926.) KAUF

U. S. Metals Refining Co., Carteret, N. J., übert. von: **A. Marks**, Carteret, N. J., *Feuerbeständiges Material*. Calciniertes Magnesit wird mit einem organ. Öl gemischt, die Mischung geformt u. gebrannt. (E. P. 244 391 vom 21/1. 1925, ausg. 3/2. 1926. Prior. 10/12. 1924.) KAUF

Gustav A. Nelson, New York, *Reinigungsmittel für Stein, Marmor usw.*, bestehend aus techn. NH_4F , Oxalsäure u. W. (A. P. 1574 406 vom 12/6. 1923, ausg. 23/2. 1926.) KAUF

Gustav A. Nelson, New York, *Reinigungsmittel für Granit, Stein usw.*, bestehend aus 75% NH_4F , 10% Oxalsäure, 15% Na_2CO_3 u. W. (A. P. 1574 407 vom 12/6. 1923, ausg. 23/2. 1926.) KAUF

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Julius Stoklasa, *Über den physiologischen Wert der Phosphorsäure in den Superphosphaten und verschiedenen Phosphaten*. 1. Orthophosphorsäure wirkt auf Sand- u. Kalkböden besser als Monocalciumphosphat, letzteres ist dagegen auf sauren Böden überlegen. 2. Die wasserlösliche Phosphorsäure der „Superphosphate“ wirkt auf Pflanzenphysiolog. allen wasserunl. Phosphaten überlegen, weil die Keimlinge die Pflanze sofort assimilierbar vorfinden. 3. Auf sauren Böden wird man, besonders für Klee, Kirschen, Neutralphosphat u. Thomasmehl anwenden. 4. P dient auch zum Aufbau der Chlorophylls u. spielt neben K u. Mg in den photosynthet. Prozessen eine große Rolle. (Internat. Agrikultur-wissenschaftl. Rundschau 1925. 22. Seiten. Sep.) TRÉNEL.

M. Dobrescu-Cluy, *Die Dynamik der Kaliassimilation kalihaltiger Silicate*. Das Studium der Löslichkeit von Nährstoffen kann nur vergleichbare Ergebnisse liefern, wenn chem.-dynam. Methoden angewendet werden. Die logarithm. Bestimmung der Geschwindigkeit monomolekularer Rkk. zeigt, daß der Faktor C — der Faktor S von MITSCHERLICH — das Kriterium zur Beurteilung der Lösungs-geschwindigkeit ist. Das Studium nur eines Lösungsm. gibt keinen sicheren Anhalt über die Nährstoffe, die den Pflanzen zugänglich sind. CO₂-haltiges W. ist für das Studium der P₂O₅-Assimilation, nicht aber für die Aufnahme von K geeignet. Die Löslichkeit von K aus dem Boden steht im engen Zusammenhang mit dem Verwitterungsgrad der Bodenminerale. (Bied. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 55. 115—17.) TRÉNEL.

Bottini, *Über „Promoloid Asahi“*. Es handelt sich um ein gel. kolloidales Silicat mit 88% W., 2,03% MgO u. 6,94% SiO₂. Es soll als Bodenverbesserungsmittel, vor allem bei der Absorption von N-Salzen dienen. Verss. ergaben, daß auf sauren Böden die Bindigkeit u. Kapillarität verbessert wird, auf den anderen Bodenverbessert es die Kapillarität. NH₄Cl wird gut, NaNO₃ schlecht absorbiert, auf dem wirkt es säurebindend. (Annali Chim. Appl. 16. 29—39. Turin.) GRIMME.

Parisi, *Denitrifikation in oxydierendem Medium*. Die Verss. ergaben, daß oxydierendes Medium N-Verluste eintreten können infolge sekundärer Rkk. von HNO₂ u. Aminosäuren. (Annali Chim. Appl. 16. 40—45. Bologna.) GRIMME.

Weigert, *Über den derzeitigen Stand und die bisherigen Erfahrungen bei der Gärstättbereitung*. Bei Mineralvolldüngung wurde durch Gärstättedünger bei Kartrüben ein Mehrertrag von 65,4% gegenüber 47,4% durch Stalldünger erzielt. Die Düngung von Hafer verhielt sich ohne Beidüngung wie 6,2:10,5% zugunsten des Gärstättedüngers. Die Analyse ergab, daß in der Gärstätt der Verlust an Trockensubstanz 10%, an Mineralstoffen jedoch kleiner war als auf der gewöhnlichen Düngungsstätte. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. B 5. 145—61.) TRÉNEL.

Lemmermann, *Das Verfahren der sogenannten Heißvergärung des Stalldüngers*. Stellungnahme zum „Gärstättverf.“ von KRANTZ. Um ein sicheres Urteil über den Wert des neuen Verf. zu gewinnen, ist es notwendig, den „Gärstättedünger“ mit dem Stalldünger zu vergleichen. Die Verss. sprechen nicht zugunsten einer CO₂-Anreicherung des Stalldüngers. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. B 5. 162—168.) TRÉNEL.

F. Jensen, *Die Anwendung von künstlichen Düngemitteln bei Kartoffeln*. Vorschläge für die landwirtschaftliche Praxis. (Amer. Fertilizer 64. No. 6. 34—35.) TRÉ.

J. Hissink, *Die Beziehungen zwischen p_H, V und S (Humus) von Humusböden*. (Humus) und V dieser Böden bei p_H 7. Das Äquivalentgewicht der Humussubstanz. (Sättigungsgrad der Böden) u. S (Humus) (d. i. Milligrammäquivalente auslöslicher Basen auf 100 g Humus. D. Ref.) sind — mit Ausnahmen — proportionalen Größen. Das Äquivalentgewicht der Humussubst. wurde vorläufig zwischen 100 und 194 ermittelt. (Vgl. auch Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A 4. 137;

C. 1925. I. 2037.) (Proc. of the second Commission of the internat. Soc. of Science 1926. 10 Seiten. Sep.)

Antonin Nemeec, *Über die Humifizierung der abgestorbenen Decke von Waldanalysen u. [H⁺] von böhm. Waldböden.* (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 5: 592.)

M. Trénel, *Ist die Bodenreaktion auch für die praktische Landwirtschaft von Bedeutung?* II. Mitt. (I. vgl. Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. B 4. C. 1925. II. 1711.) In enger Zusammenarbeit mit prakt. Landwirten wird gezeigt, daß die mit dem „Acidimeter“ des Vf. gewonnenen Bodenrk.-Karten Spiegel der Wachstumsfreudigkeit von folgenden „säureempfindlichen“ Kulturpflanzen Zuckerrüben, Gerste, Klee, Luzerne, Erbsen u. Bohnen. Sobald die [H⁺] in KCl-ha Bodensuspensionen saurer als pH 6 war, zeigten sich diese Pflanzen geschädigt u. im Ertrag herabgesetzt. Hafer u. Weizen ergaben noch bei einer sauren Rk. pH 5,2 Höchsterträge; bei pH 4,3 war auch Hafer geschädigt. Die Kartoffeln bis pH 4,2 gegen saure Rk. unempfindlich, was durch Ertragsangaben nachgewiesen wird. Roggen ist gleichgültig gegen Rk.-Schwankungen innerhalb pH 4,2. Die Unters. des Untergrundes ist von großer Bedeutung, andernfalls Fehlschlüsse unvermeidlich sind. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. B 5. 169—81.)

J. S. Mc Hargue, *Mangan und Pflanzenwachstum.* Mn wirkt günstig auf Chlorophyllbildung u. somit auf die Assimilation. Man verwendet es deshalb Vorteil als Zusatz bei Kulturverss. in Sandkulturen (2 g MnCO₃ je 8 kg Sand). and Engin. Chem. 18. 172—75. Lexington [Ky.]

Wolfgang Schnellbach, *Ein neues Ungeziefervertilgungsmittel.* Bericht über Unterss. mit Aulin im Vergleich zu Nissex u. Cuprez. Aulin ist eine gelbliche, ölige Substanz bestehend aus Bisäthylxanthogen gel. in organ. Lösungsmitteln. Sowohl im Taupf. Tropfverf. gegen Läuse als auch bei Körpertemp. gegen Nisse zeigte sich die gleiche Wirksamkeit, wobei noch hervorgehoben werden muß, daß Aulin nicht brennbar ist. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 64. 99—101. Bern.)

G. P. Gray und E. R. de Ong, *Insektenvertilgungsmittel aus kalifornischem Petroleum. Laboratoriums- und Feldversuche.* Die Verss. ergaben, daß die Insektizid-Wrkg. der Fraktionen steigt mit dem Gehalte an ungesätt. Verb., so daß die 1. Probe (%ig. Löslichkeit des Öles in 37-n. H₂SO₄) einen guten Maßstab für die Wirksamkeit bildet. (Ind. and Engin. Chem. 18. 175—80. Berkeley [Calif.]

R. Hanne, *Die Vernichtung von Ratten und Mäusen mit „Zelio“.* Vf. beschreibt die Vergiftung von Ratten u. Mäusen mit TL₂(SO₄)₃ („Zelio“, Farbenfabriken BAYER & Co.). Haustieren sind Zeliopaste u. -körner nur in größeren Mengen schädlich. (Der prakt. Desinfektor 18. 53—56. Hamburg.)

G. Hilgendorff, *Über die Verwendung einiger Quecksilberbeizmittel in der Tauchbeize.* Die Ergebnisse der Best. des Entgiftungsgrades von Uspulmisan u. Uraniabeize sind mit den daraus berechneten Konz. der Nachfüllsg. in Tabelle zusammengestellt. Die Werte weichen teilweise von den Kraußschen (S. 1021) ab. Bei einfachem Ausfällen des Hg mit H₂S werden durch Mitaußfall in Lsg. gegangenen Bestandteilen des Getreides unsichere Werte erhalten. Dies wurde daher mit HCl u. KClO₃ gekocht, Hg mit H₂S gefällt, das HgS mit H₂O₂ oxydiert u. nach Zerstörung des H₂O₂ mit KMnO₄ Hg entweder nach (Chem.-Ztg. 32. 1077; C. 1908. I. 45) titriert oder mit H₂S gefällt. Der gewichtsm. Wert lag meist um ein Geringes über dem titrimetrischen. Temperaturunterschiede beim Beizlg. vermögen den Entgiftungsgrad im allgemeinen nur unwesentlich zu beeinflussen. Durch zunehmenden Gehalt der Lsgg. an Extraktstoffen aus dem Getreide wird die Adsorption von Hg-Salzen verringert u. allmählich gänzlich verhindert. Es wurde festgestellt, daß die gel. Stoffe einen Teil der Hg-Verb. für sich binden. (Ztschr. angew. Ch. 39. 377—79. Berlin-Dahlem.)

Margarete Bayer, *Die hygienische Bedeutung der Ameisen und die Bekämpfung Wohnungsameisen*. Zusammenfassender Bericht mit ausführlichen Literaturben. (Der prakt. Desinfektor **17**. 77—83. 116—20.) ROJAHN.

A. Mouquet, *Die Anwendung der Gelatine in der Aufzucht*. Zusatz von Gelatine empfiehlt sich bei der Aufzucht von Haustieren. (Bull. de la soc. scien. d'hyg. **13**. 338—41; Ber. ges. Physiol. **33**. 362. 1925.) OPPENHEIMER.

J. Zaykowsky, *Über den Einfluß des Calciums und der Phosphorsäure auf die h. Nach allgemeineren Überlegungen über die Notwendigkeit von Stoffwechseln, die die Rolle u. Bedeutung der Salze für die Viehwirtschaft zu erfassen suchen, Hilfen über Verss. an Kühen, die CaO- u. P₂O₅-Zulagen zu verschiedenen Diäten erhalten. Fettgehalt, D., Gerinnungsgeschwindigkeit werden sowohl durch Ca⁺⁺ P₂O₄⁼⁼ beeinflußt. (Biochem. Ztschr. **169**. 67—76. Leningrad, Agronom. Inst.) OPP.*

Stephan Weiser, *Der Nährstoffgehalt von brandsporenhaltigen und brandsporenr Koppereistauben*. Die Stoffwechselverss. ergeben, daß brandsporenhaltiger Kopp die Kleie für Schweine ungenießbar macht. Der Nährwert wird erheblich herabzt. Die Brandsporen werden im Verdauungstrakt gel. u. können ev. tox. wirken. (Ztschr. d. Landwirtschaft **1**. 169—71.) TRÉNEL.

M. Trénel, *Die Bedeutung der Bodenreaktion für die künstliche Düngung*. Zusammenfassender Vortrag über Falsches u. Richtiges in der „Bodenaciditätsfrage“ über die günstigen bzw. ungünstigen Wrkkg. der Kalkung. (Ill. Landw.-Zeit. **1**. 633.) TRÉNEL.

D. J. Hissink und Jac. van der Spek, *Die p_H-Bestimmung des Bodens nach der nannschen Chinhydronmethode*. Unters. über den Einfluß der Zeit, Verhältnis n zu Wasser, KCl-Zusatz. Die endgültige Ablesung kann erst nach 6—10 Min. gen; die Bodensuspension soll möglichst konzentriert sein, KCl wird besser nicht geben. (Verhdlg. d. zweiten Kommission d. internat. bodenkundl. Ges. **1926**. eiten. Sep.) TRÉNEL.

D. J. Hissink, *Über Titrationskurven von Humusböden*. Bei der Best. des Kalkfrs der Böden mit Hilfe der potentiometr. Titration wurde das Gleichgewicht etwa 3 Tagen erreicht. Die Titration mit NaOH ergab andere Kurven als die Ca(OH)₂. Der Titration mit Kalk ist der Vorzug zu geben, weil mit NaOH derbedarf viel zu niedrig gefunden wird. Titriert wurde auf den Neutralpunkt, nicht Äquivalenz. (Verhdlg. d. zweiten Kommission d. internat. bodenkundl. Ges. **1926**. eiten. Sep.) TRÉNEL.

A. C. Hyde, London, *Superphosphat*. Fein gemahlenes Ca₃(PO₄)₂ wird gemeinlich mit H₂SO₄ verstäubt. Mit H₂SO₄ von 1,84 D. wird meist ein Erzeugnis lten, welches unmittelbar verpackt werden kann, bei Verwendung schwächerer e ist Trocknen erforderlich. (E. P. **243 192** vom 19/1. 1925, ausg. 17/12.) KÜHLING.

A. Baumgarten-Crusius, Dresden, *Dünger*. Organ. Rückstände läßt man unter tlicher Belüftung bei einer über 50° liegenden Temp. vergären. (E. P. **246 484** 21/1. 1926. Auszug veröff. 24/3. 1926. Prior. 21/1. 1925.) KAUSCH.

Robert S. Otto, V. St. A., *Bekämpfung von Pflanzenschädlingen*. Unter die Rinde durch die Wurzeln wird in das Innere der zu schützenden Pflanzen Saft oder wss. zug von Pflanzen eingeführt, welche von den Schädlingen nicht befallen werden. Gewinnung der Säfte oder Auszüge dienen vornehmlich Pflanzen, welche Alkaloide, oside, Saponin, Amarine, Phenole, Gerbstoffe u. dgl. enthalten (vgl. Schwz. P. **331**; C. **1926** I. 2620). (F. P. **577 377** vom 14/4. 1923, ausg. 4/9. 1924.) KÜHL.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung

Herbert Lang, *Studien über die Schlackenbildung*. Es wird die Schlackenbildung in Pyritöfen besprochen. Die Stärke der Sauerstoffzufuhr hat keinen großen Einfluß auf die Art der Schlacke. Fe ist das edelste Metall, welches in dieselbe geht, während Cu nur in geringer Menge in die Schlacke übergeht. Die Sulfide sind bis zu einem gewissen Grade l., auch wird fast immer Magnetit in derselben angetroffen. Die Konzentration der Schlacke hat mit der Pyritofenschlacke große Ähnlichkeit. (Eng. Mining Journ. 1921. 485—90. Berkeley, Calif.)

ENSZL

W. Stahl, *Bemerkungen zur Generatorgasfeuerung im Kupferraffinierbetrieb*. Vermeidung der Fehler im Kupferraffinierbetrieb mit Generatorgasfeuerung besprochen. Solche entstehen durch einen Überschuß von O₂ im Gas, wodurch hohe Oxydation eintritt, oder durch einen Mangel an O₂, wobei das Cu H₂, CO u. d. sorbiert. SO₂ wird in beiden Fällen aufgenommen, weshalb dasselbe aus dem Gas so weit wie möglich zu entfernen ist. KW-Stoffe u. CO₂ werden vom Cu nicht absorbiert. (M. u. Erz 23. 117—18.)

ENSZL

L. Vielhaber, *Flußpat in Emails*. (Vgl. S. 776.) Vf. führt aus, daß man Flußpat in Emailversätzen nicht nur anwenden darf, sondern sogar zweckmäßig anwenden soll. (Keram. Rdsch. 34. 144—45.)

WECH

Fredk. Braby and Co., Ltd. (per **Ken. D. Mac Kenzie**), *Galvanisieren*. weist die Behauptung, daß weicher Stahl in geschmolzenem Zink mehrere Male schneller angegriffen wird als Gußeisen, zurück u. beweist durch seine Verss. das Gegenteil. Zu den Verss. diente weicher Stahl mit 0,64% Verunreinigung u. ein Gußeisen mit nur 0,15% Verunreinigung; nach 21 Tagen bei einer Temp. von ungefähr 461° zeigte sich, daß das Gußeisen sehr stark korrodiert worden war, der weiche Stahl dagegen nicht. Es scheint nach Ansicht des Vfs. der Fall zu sein, daß gerade die Verunreinigungen des Stahls es sind, die die Widerstandsfähigkeit dieses Stoffes erhöhen. (Chem. and Ind. 45. 186—87.)

HAA

Barrett Co., New York, übert. von: **F. G. Moses**, New York, und **E. J. Cavan**, West-Hoboken, N. J., *Erzkonzentration*. Man benutzt zum Flottieren der Teeröle u. geschwefelte Teersäuren. (E. P. 243 383 vom 21/11. 1925, Auszug vom 20/1. 1926. Prior. 22/11. 1924.)

KAUS

George E. Gail, **Harry A. Sibley** und **George A. Brown**, Pontiac, Mich., *Metallspänebriketts* erhält man durch Mischen der Späne mit einem Bindemittel (Wasser u. Glas) u. Komprimieren des Gemisches. (A. P. 1574 878 vom 2/2. 1925, ausg. 1926.)

KAUS

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, *Erhöhung des Ohmstandes von Eisenkörpern*. Man fügt dem Fe auf chem. Wege Si, B o. dgl. zu. (E. P. 245 753 vom 21/12. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 9/1. 1925.)

KAUS

Driver-Harris Co., Harrison, N. J., übert. von: **John Clifton Henders**, New York, *Gußeisen*. Man bringt eine Legierung von Ni, Cr u. Fe, das hohen C-Gehalt aufweist u. einen verhältnismäßig niedrigen F. besitzt, in fester Form u. geschmolzenes Fe in eine Schöpfkelle ein. (A. P. 1573 937 vom 22/4. 1925, ausg. 1926.)

KAUS

K. Emmel und Thyssen & Co., Akt.-Ges., Mülheim, Ruhr, *Gußeisen*. Man schmilzt ein Gemisch von 50% oder mehr kohlenstoffarmes Fe (z. B. Stahl) u. kohlenstoffreicheres Fe in einem Cupolofen. (E. P. 244 405 vom 11/6. 1925, Auszug vom 3/3. 1926. Prior. 9/12. 1924.)

KAUS

C. H. Wills, Detroit, Mich., übert. von: **J. K. Smith**, Worksop, Nottinghamshire, *Stahlerzeugung*. Man stellt Stahl aus fest erzeugtem Fe in einem offenen

- her. (E. P. 245 715 vom 5/5. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 10/1. 1925.) KAUSCH.
- C. H. Wills, Detroit, Mich., übert. von: J. K. Smith, Worksoop, Nottingham, *Stahlerzeugung*. Fest erzeugtes Fe, d. i. Fe ohne Schmelzen aus Erzen gewonnen, wird in einem Tiegel geschmolzen, worauf nach Entfernung der Schlacke Fe_2O_3 das reine Fe brikkettiert wird. (E. P. 245 716 vom 5/5. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 10/1. 1925.) KAUSCH.
- C. H. Wills, Detroit, Mich., übert. von: J. K. Smith, Worksoop, Nottingham, *Stahlerzeugung*. Fest erzeugtes Fe wird während seiner Behandlung in einem Herdofen durch Einführen von Eisengans oder Ferrosilicium in die Charge Oxydation geschützt. (E. P. 245 717 vom 5/5. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 10/1. 1925.) KAUSCH.
- W. Tafel, Breslau, *Eisen und Stahl*. Flußeisen oder -stahl wird im Tiegel oder Form mittels Zusatz einer Si-haltigen Schlacke enthaltend ein Gemisch von Fe-, Mn, SiO_2 u. Oxyden des P, Mn, Ca, Mg u. Al, desoxydiert. (E. P. 245 486 vom 1/1. 1924, ausg. 4/2. 1926.) KAUSCH.
- Fr. Krupp Akt.-Ges., Essen, *Metallartikel* werden durch Verb. mit N_2 gehärtet an den Randlagen. Verwendet werden z. B. Stahllegierungen, die 0,52% Al, bis zu 0,54% Gesamtgehalt an Si, Mn, Ni, Cr, Mo, Wo, Vd, Ti u. Zr aufweisen. (E. P. 243 613 vom 16/5. 1925, ausg. 24/12. 1925.) KAUSCH.
- Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, *Überführung von Quecksilber in ein anderes Element*. Das Hg wird der Einw. elektr. Entladungen, insbesondere der elektr. Entladungen ausgesetzt. (E. P. 243 670 vom 12/6. 1925, Auszug veröff. 20/1. 1926. Prior. 28/11. 1924.) KAUSCH.
- General Electric Co., Ltd., London, übert. von: Patent-Treuhand-Ges. für elektrische Glühlampen, Berlin, *Wolframdraht*. Man unterwirft feinen, durch Erhitzen erhaltenen W-Draht 1—2 Min. oder weniger einer sehr starken u. schnellen Oxydation. (E. P. 246 406 vom 17/9. 1925, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 16/5. 1925.) KAUSCH.
- Vere B. Browne, Brackenridge, Pennsylvan., *Magnetische Legierungen*. Man reduziert Fe, indem man den C in einem Schmelzbade durch Eisenerzzusatz vermindert, auf man Ferrosilicium zwecks Gewinnung der notwendigen Wärme für die Schmelze gibt, alsdann bringt man das Metall in einen Bessemerconverter u. entfernt in dem das Si u. den C. Schließlich führt man das Metall in ein Schöpfgefäß über, in dem ihm das erforderliche SiO_2 zu. (A. P. 1 574 550 vom 2/4. 1925, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.
- Lee S. Smith & Son Manufacturing Co., Pittsburgh, Pennsylvan., übert. von: Clarence C. Vogt, Pittsburgh, *Legierung für zahnärztliche Zwecke*, enthaltend Sn u. wenig Cr, Vd, Mn, Mo, W oder Ta. (A. P. 1 574 714 vom 26/12. 1922, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.
- W. B. B. Penniman und E. J. Shackelford, Baltimore, *Legierungen*. Cr-Erzen reduziert, das Cr wird in ein geschmolzenes Fe-Bad eingebracht u. das Prod. desoxydiert. (E. P. 244 413 vom 3/9. 1925, Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 11/12. 1924.) KAUSCH.
- Fannie Lewin und William Lewin, St. Louis, Miss., *Trennung und Gewinnung von Kupfer, Zinn und Blei aus Erzen oder Bronze*. Das Erz, bezw. die Rückstände aus dem Fe, den nichtmetallischen u. anderen Verunreinigungen befreit, dann in Anodenformen gegossen, worauf die darin enthaltenen Anoden in einem elektrolyt. Bad verwendet werden, wodurch das Cu ausgezogen u. auf den Kathoden niedergelassen wird. (A. P. 1 574 043 vom 24/8. 1925, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.
- American Magnesium Corporation, Niagara Falls, N. J., übert. von: Lewis C. C. C., Niagara Falls, *Schutzüberzug für Magnesiummetall und -legierungen*. Man

bringt das Mg mit naszierendem F in Berührung (wss. Lsg. von HF). (A. P. 1574 vom 22/1. 1923, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH

American Magnesium Corporation, Niagara Falls, N. J., übert. von: **Le J. Keeler**, Niagara Falls, *Schutzüberzug für Magnesiummetall und -legierungen*. 1 elektrolysiert eine Lsg. eines Alkalichromates mit Mg-Anoden. (A. P. 1574 vom 22/1. 1923, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH

Madsenell Corporation, New York, *Elektrolyse*. Bei der elektrolyt. Niesschlagung von Ni, Co u. Ni-Legierungen wird dem Bade nach anfänglicher Oxydation mit Cl₂ H₂O₂ zugesetzt. (E. P. 244 166 vom 11/9. 1924, ausg. 7/1. 1926.) KAUSCH

Madsenell Corporation, New York, *Elektrolyse*. Bei der elektrolyt. Abscheidung von Ni, Co u. Ni-Legierungen werden Elektrolyte verwendet, die Hydrochinon-Reduktionsmittel enthalten. (E. P. 244 167 vom 11/9. 1924, ausg. 7/1. 1926.) KAUSCH

Blasius Bart, East Orange, N. J., *Abscheiden von Silber*. Man zerstäubt Ag-Salzlsg. unter Luftabschluß in einer Kammer, gleichzeitig eine Lsg. eines Reduktionsmittels für das Ag-Salz, u. bestäubt alsdann mit dem Gemisch die Oberfläche des zu versilbernden Gegenstandes in Ggw. von Luft. (A. P. 1574 544 vom 22/1. 1923, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH

G. Le Bris, Levallois-Perret, Frankreich, *Elektrolytische Chromabscheidung* u. Verwendung eines Elektrolyten, den man durch Kochen von Cr₂O₃ · 2 H₂O mit einer Lsg. von CrO₃ erhält. (E. P. 243 667 vom 15/5. 1925, Auszug veröff. 20/1. 1926.) KAUSCH

Samuel T. G. Smith, St. Louis, Miss., *Stahl-, Eisen- oder sonstige Metallplatten*. Um der Adhäsion der Platten vorzubeugen, bringt man auf ihre Oberfläche gepulvertes Baryt. (A. P. 1574 131 vom 1/6. 1925, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH

X. Farben; Färberei; Druckerei.

John D. Carter, *Lösliche Silicate. Ihr Einfluß auf die Hypochloritbleiche*. eingehenden Verss. ergaben, daß Na-Silicate genau so wie bei der Peroxydbleiche die Wirksamkeit der Hypochloritbleiche erhöht. Die Vorteile liegen vor allem bei Baumwoll- u. Celluloseindustrie. Das Optimum liegt bei 1% des lufttrockenen Bleichgutes. (Ind. and. Engin. Chem. 18. 248—52. Philadelphia [P. A. J.]) GRIM

Georg Rudolph, *Farbstoffe für Viscose- und Kupferseide*. Die geeigneten substantiven, auch mit CH₂O nachzubehandelnden substantiven, Azo-, S- u. Küfarbstoffe werden besprochen. (Kunstseide 8. 59—60.) SÜVER

D. H. Peacock, *Die Verwendung von Nitrobenzylcelluloseäthern beim Färben von Baumwolle*. m-Nitroleukotrop wurde durch Kondensieren von m-Nitrobenzylchlorid mit Dimethylanilin hergestellt, Kochen mit Baumwolle ergab den Celluloseester. wurde mittels Hydrosulfit reduziert, diazotiert u. mit bekannten Azofarbstoffkomponenten gekuppelt. Die erzielten Färbungen sind nicht zu unterscheiden von den durch die über das bekannte p-Nitrobenzylphenyldimethylammoniumchlorid gewonnenen. Die Färbungen zeichnen sich durch Waschechtheit aus, die Lichtechtheit spricht der der meisten Azofarbstoffe. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 53.) SÜVER

Robert G. Dort, *Überfärben von Celanesegearn mit verschiedenen anderen Farbstoffen*. Teil III. S. R. A.-Farbstoffe für Celanesegearne, -gewebe und -kleider. Das Färben verschiedensten Fasermischungen ist beschrieben. Vorschriften für gangbare Töne. (Chemicals 25. 22—26. 39.) SÜVER

René Clavel, *Färben von Celluloseacetaten*. Die Erzeugung schwarzer Färbungen mittels Diphenylschwarzbase in Ggw. einer oder mehrerer aliphat. Carbonsäuren oder ohne l. Chloride u. mit oder ohne Schutzkolloide gemäß A. P. 1547789 vom 11/9. 1924, E. P. 194840; C. 1923. IV. 208) ist näher beschrieben. (Chemicals 25. 20—21.) SÜVER

M. N. Conklin, *Ricinusölprodukte in der Textilindustrie*. Die Herst. u. Beurteilung.

Türkischrotöl u. seine Verwendung beim Bleichen, Beizen u. Färben ist beschrieben. (Chemicals 25. 34—35.) SÜVERN.

W. A., Appreturöle. Wesentlich ist, daß die Öle große CaO-, MgO- u. Säurebeständigkeit aufweisen u. beim Mischen mit anderen Füllmitteln keine Ausscheidungen bilden. Führend sind *Avirol*, *Monopolbrillantöl* u. *Universalöl*. (Ztschr. f. ges. Textilind. 90.) SÜVERN.

A. Eibner, Zur Zinkweißunechtheit. (Vgl. TÄUBER, S. 2844.) Beim Arbeiten mit Glas mit Farbpasten erwies sich wurtzit. ZnS im Lichte der Quarzlampe von NAU dann als absolut lichtecht, wenn es nach dem Verf. des Vf. frei von fremden Metallen gemacht ist. Es ergab sich ferner ein enormer Unterschied in der Quellen u. qualitativen Wrkg. stetiger kurzweiliger künstlicher Strahlungen gegenüber den natürlichen un stetigen des Sonnenlichts. Arbeitet man mit trocknen Aufhängen u. nicht unter Glas, so treten diese Wrkgg. nicht auf. (Farben-Ztg. 31. 1353 1354.) SÜVERN.

William B. Nanson, Beizenfarbstoffe auf Baumwollgarn. Kurze Angaben über Färben mit Alizarinfarbstoffen. (Chemicals 25. 27.) SÜVERN.

A. Foulon, Das Spektroskop im Dienste der Farbstoffuntersuchung. Der Farbnachweis ist geschildert. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 106—08.) SÜVERN.

Michihiko Tsubata, Tachibana-Gori, Japan, Anstrichmittel, das mit Öl oder W. verwendet werden kann. Durch Trocknen u. Pulverisieren erhaltene M. aus Farbstoffen für trocknende Öle, Gelatine, CH₂O u. A. (A. P. 1574 854 vom 24/7. 1923, g. 2/3. 1926.) KAUSCH.

H. M. Mines, Liverpool, Leuchtmischungen, bestehend aus den Carbonaten des Sr, Ca, Mg, Al, Li u. Ru im Gemisch mit kohlenstoffhaltigen Stoffen (Stärke), in geringen Mengen eines oder mehrerer Verbb. des Th, Tl, Ur, Bi, Ag oder Ni, zusammen mit einer oder mehreren Verbb. des Na, K, Mn, Ba oder Ca. (E. P. 245 612 vom 18/5. 1925, ausg. 4/2. 1926.) KAUSCH.

XV. Gärungsgewerbe.

Marc H. van Laer, Die Bedeutung der Reaktion des Milieus bei den industriellen Gärungen. Übersichtsreferat. (Ann. et bull. de la soc. roy. des sciences méd. et natur. Bruxelles 1925. 43—55; Ber. ges. Physiol. 32. 820. 1925. Ref. GOTTSCHALK.) OPP.

Oskar Ludwig, Über den Wachstumsverlauf von Hefe in Würze. Verss. über das Wachstum von Froberghefen wurden in der Weise ausgeführt, daß die jeweilig in einem mm enthaltenen Hefezellen gezählt wurden. Nach Ansicht des Vfs. kommt es zu besseren Ergebnissen, wenn man sich eine Hefekonz. durch Verdünnen so stellt, daß diese 1 cm entspricht, als wenn man u. Mk. einzelne Quadrate auszählt. — Man konnte feststellen, daß die Hefe im Verlaufe der Zeit unregelmäßig wächst; das Wachstum durchläuft einige Maxima, von denen das zweite stets höher als das erste war. Als Erklärung hierfür gibt der Vf. an, daß es eine Folge autolyt. Vorgänge sein könnte. Eine Anwendung der Robertsonschen Wachstumsformel sei auf den Gesamtverlauf des Wachstums einer Hefekultur nicht anzuwenden. (Biochem. Ztschr. 1925. 384—94.) HAAST.

H. Claaßen, Die Assimilierbarkeit des Stickstoffs aus Nährstoffen durch die Hefe im Lüftungsverfahren. Als assimilierbar ist nicht nur, wie bisher üblich, der bei dem Gärvers. in der Hefe verbliebene N anzusehen, sondern der unter günstigsten Bedingungen, gegebenenfalls bei wiederholter Vergärung insgesamt aufgenommene N einschl. des durch den Stoffwechsel wieder ausgeschiedenen. Nach Verss. von **Weber** werden für (NH₄)₂SO₄, Asparaginsäure, Asparagin, Harnstoff, Betain, KNO₃, Molkekeimatzug u. Melasse als Nährmittel die entsprechenden Zahlen (in % des vorhandenen N) mitgeteilt. Die Unterschiede zwischen den bisher üblichen Angaben

u. den jetzigen Ermittlungen sind bei Malzkeimauszug u. Melasse groß. (Brennztg. **43**. 35; Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 443—47. Dormagen.) HAB

E. Ehrich, *Die Mürbigkeit des Malzes und der Unterschied zwischen Fein- und Grobschrotausbeute*. Nach Verss. an 100 Malzen ist dieser Unterschied für Feststellung der Mürbigkeit, d. h. des Verhältnisses der Glasigkeit des Malzes Auflösung des Mehlkörpers in Mehl u. feinen Gries, nicht geeignet, die Reiß- oder die Schnittprobe zu ersetzen. Auf Grund der Best. des tatsächl. Extraktgehalts in 8 von diesen Malzen nach dem Weichverf. des Vf. erscheint es als ob der Unterschied zwischen Extraktgehalt u. Grobschrotausbeute ein besseres Merkmal sei. (Ztschr. f. ges. Brauwesen **49**. 36—40. Worms a. Rh., Brauereiakad. u. V. Stat. f. Brauerei u. Mälzerei.) HAB

Giovanni Issoglio, *Über einen 100 Jahre alten Wein*. Der Wein, ursprünglich ein Weißwein, war infolge der langen Lagerung goldgelb geworden u. erinnert Geruch u. Geschmack an Chablis. Er enthielt 13,63% (Vol.) A., 31,48% Extrakt, 9,45% Glycerin, 6,90% Säuren, 0,68% Ester u. 2,76% Asche. Bemerkenswert ist, daß die Weinsäure zugunsten von Apfel-, Milch- u. Bernsteinsäure fast vollständig zurückgetreten ist. (Giorn. Farm. Chim. **75**. 31—35. Turin.) GRIMM

Fred D. Weidman und **Walter Freeman**, *Indische Tusche als Hilfsmittel zum Studium der mikroskopischen Struktur von Hefezellen*. (Proc. of the pathol. soc. Philadelphia **26**. 51—52. 1924; Ber. ges. Physiol. **33**. 272. 1925. Ref. KRAUSPE.) GRIMM

F. R. Georgia und **Rita Morales**, *Nachweis von Methylalkohol in alkoholischen Getränken*. 5 ccm der auf einen Gehalt von 5 Vol.-% A. eingestellten Fl. we 10 Min. lang mit 2 ccm einer Lsg. von 3 g KMnO_4 u. 15 ccm 85%ig. H_3PO_4 auf 100 oxydiert, darauf wird der Überschuß von KMnO_4 zerstört durch Zusatz von 2 ccm einer Lsg. von 5 g Oxalsäure in 100 ccm H_2SO_4 (1:1). Zugeben von 5 ccm einer 1% ige Lösung von fälschtem Schiffschens Reagens u. gebildeten Formaldehyd nach 10 Minuten colorimetrisch bestimmen. Das Reagens stellt man her durch Lsg. von 0,2 g Rosanilinhydrochlorid in 100 ccm h. W., nach dem Abkühlen Zugeben von 2 g wasserfreier Na_2SO_3 gel. in 20 ccm W., darauf von 2 ccm konz. HCl u. Auffüllen auf 200 ccm. Es gibt eine ganze Reihe von Substanzen, welche den Ausfall der Rk. ungünstig beeinflussen. Folgende Methoden zur Entfernung werden empfohlen: 1. *Formaldehyd*. 1 g Pyrogallol gel. in 10 ccm W., zugeben zu 10 ccm der auf 5 Vol.-% eingestellten Fl., Ansäuern mit 5 ccm konz. H_2SO_4 . 10 Minuten unter Verschluss u. öfterem Schütteln stehen lassen. 10 ccm abdest. u. 5 ccm zur Rk. benutzen. — 2. *Amylalkohol*. äth. Öle (mit Ausnahme von Angelicaöl), Fluidextrakte von Arnica u. Ipecacuanha. 10 ccm der Verdünnung (5 Vol.-%) mit 40 ccm W. u. 14 g NaCl versetzen. 25 ccm PAe. ausschütteln, äth. Lsg. zweimal mit gesätt. NaCl-Lsg. ausschütteln, Salzlsg. dest. u. die ersten 10 ccm, welche den A. enthalten, zur Rk. verwenden. 3. *Cinchonin*, *Glycerin*, *Glycerrhizin*, *Methylviolett*, *Chininsulfat*, *Resorcin*, *Strichninsulfat*, *Gerbsäure*. Bleiben bei der Dest. im Rückstand. — 4. *Anilin*. Dest. über H_2SO_4 . — 5. *Phenole*. Dest. über NaOH. — 6. *Acetaldehyd*, *Benzaldehyd*. Zugeben von H₂O vor Versetzen mit dem Reagens. — 7. *Methylacetat*, *Angelicaöl* u. *Pektinstoffe* lassen sich nicht entfernen. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 304—06. Ithaca [N. Y.]) GRIMM

Dresdener Preßhefen- & Kornspiritus-Fabrik sonst **J. L. Bramsch**, Dresden. *Klären von angesäuerten Melasselösungen für die Hefefabrikation* unter Verwendung von Sandfiltern, dad. gek., daß man die zweckmäßig auf etwa 20—50° erwärmte angesäuerte Melasselslg., insbesondere die Lsgg. von dunklen, an ausfällbaren Stoffen reichen Melassen, ohne vorheriges Absetzenlassen unmittelbar durch die angefeuchteten Sandfilter filtriert. — Gegenüber den früher üblichen Verfahren, bei denen ein vorheriges Absetzenlassen u. Keimfreimachen nötig war, wird eine wesentliche

machung u. Abkürzung an Arbeitszeit erzielt. (D. R. P. 424 168 Kl. 6b vom 4/7. 1922, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

Ulrich Wegener, Berlin-Steglitz, *Konservieren von Hefe*. Die Hefe wird in eine krystallin. M. von Invertzucker eingebettet. Zu diesem Zweck vermischt man Hefe mit geschmolzenem Invertzucker u. impft die Mischung mit Invertzuckerställen. Der Zuckergehalt der ganzen M. soll wenigstens 65% betragen. (A. P. 70 418 vom 21/3. 1925, ausg. 19/1. 1926.) OELKER.

Jacques Auguste Vasseux, Frankreich, *Verwendung des Produkts der Runkelendestillation als Nahrungsmittel bei der Herst. von Luftheife aus Melasse o. dgl.* (F. P. 135 vom 5/8. 1924, ausg. 13/11. 1925.) KAUSCH.

Henry C. Fuller, Washington, Col., V. St. A., *Denaturierter Alkohol*, welcher gewöhnlichem A. u. einem ein Halogen enthaltenden Ester des Glycerins, z. B. dem Chloressigsäureester des Glycerins, zusammengesetzt ist. (A. P. 1573 697 vom 6/6. 1921, ausg. 16/2. 1926.) OELKER.

Union Carbide and Carbon Research Laboratories, Inc., Long Island City, N. Y., übert. von: **Henry C. Fuller**, Washington, Col., V. St. A., *Denaturierter Alkohol*, welcher dadurch erhalten wird, daß man dem A. einen Chlorfettsäureester eines wertigen Alkohols, z. B. den Chloressigsäureester des Äthylenglycols zusetzt. (A. P. 1573 698 vom 21/6. 1922, ausg. 16/2. 1926.) OELKER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

A. Stieltjes, *Die mechanische Behandlung der Früchte der Ölpalme*. Um wenige Öle zu erhalten, sterilisiert man die Früchte, möglichst bald nach der Ernte, weder durch Kochen in W. während 30—40 Min. oder durch Erhitzen im Autoklav mit 2 at Manteldampf. Beschreibung mehrerer Konstruktionen zur Trennung der Kerne von der Pülpe. Extraktion, zumal in Zentrifugalextraktoren, verläuft noch besser in Ggw. der Kerne. — Das Pressen soll bei 70° u. 25—30 at geschehen, bei der Ausbeute 10—11% beträgt. Andersonpressen befriedigen in keinem Fall. Die Zentrifugalextraktion liefert die (näher beschriebene) Zentrifugalextraktion bis zu 90% des Öls, allerdings in drei Operationen. — Die Extraktion mit Tri ist bisher dadurch nachteilig, daß sie beim Abtreiben des Lösungsm. zu braunen Verfärbungen führt. Die Extraktion kommt vielleicht für die Preßrückstände in Betracht. — Bleichung des Öls geschieht zweckmäßig am Erzeugungsort. Es werden weitere Vorschläge zur Verbesserung der Fabrikation im Ursprungslande gemacht. (Bull. Matières Grasses 1925. 275—83. Marseille, Institut Colonial.) HELLER.

D. R. Sperry, *Ölfiltration*. Vf. beschreibt das Klären von Öl durch Filtration durch Filterpressen an Hand dreier Abbildungen solcher App. zum Zwecke der Klärung des Öls in oder der gleichzeitigen Entfernung von im Öl aufgeschwemmten Stoffen (z. B. von der Erde) bei erhöhter oder erniedrigter Temp. (z. B. Abscheidung von Stearin aus Baumwollsaamenöl) oder zum Zwecke der Änderung des physikal. Zustandes des Öls, z. B. Überführen einer Öl-Wasseremulsion durch Filtration in Öl u. W., beide Verfahren. (Journ. Oil Fat. Ind. 3. 43—47.) RÜHLE.

Maximilian Toch, *Untersuchung von chinesischem Holzöle* (S. 1324). Es wird an Hand von Tabellen gezeigt, wie die D., der Refraktionsindex u. die Dispersion des Holzöls durch Zugabe verschiedener fremder Öle beeinflusst werden, was zum Nachweise von Verfälschungen dienen kann. Die Erhitzungsprobe, sowie das Verf. von WORSTALL werden beschrieben, u. es wird gezeigt, daß beide auch zum Nachweise von Verfälschungen des chines. Holzöles dienen können. (Journ. Oil Fat. Ind. 3. 52—59.) RÜ.

Kurt Täufel und **Javier G. Sarria**, *Beitrag zur Analyse und Kenntnis der Konstanten des spanischen Olivenöls*. Die Konstanten des spanischen Olivenöls sind: D.₁₅ 0,914, n._D 1,465, Säurezahl 0,62 mg KOH pro 1 g Öl, Verseifungszahl 192,6, Jodzahl 75,3

bis 94,7, Reichert-Meißl-Zahl 0,13. Der F. der Säuren liegt bei 28,2°. Der Gel. an unverseifbarer Substanz beträgt 0,77 bis 1,15%. Die im Öl enthaltenen Säuren sind: 2,27% Stearinsäure, 7,55% Palmitinsäure, 83,94% Ölsäure u. 0,51% Linolensäure. Glycerin ist nach den Berechnungen der Autoren mit 4,44% vorhanden. Durch Fraktionieren des Öls in Aceton bei niedriger Temp. gelang es den Vff., Triolein in fast reinem Zustand zu isolieren. Durch fraktionierte Krystallisation des reduzierten Olivenöls erhielten Vff. *Tristearin* u. schließen daraus auf die Existenz von Triolein im Olivenöl. Bei diesem Verf. fanden Vff. in einer Fraktion α -*Palmitodistearin*, woraus hervorgeht, daß in der Originalsubstanz α -*Palmitodiolein* vorhanden war. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **24**. 25—40. München, Deutsche Forschungsanst. f. Lebensmittelchemie.) HANTKE

H. Pomeranz, *Die Seife als Waschmittel in der Färberei und im Zeugdruck*. muß neutral oder sogar überfettet sein. Wegen der leichteren Löslichkeit finden K-Seifen immer mehr Verwendung. Gehalt an Oxyfettsäuren ist ohne Nachteil, da es sich nicht um Kernseifen handelt. Die Verwendung entdünnter Trane hängt vom Preis ab. Schilderung der allgemeinen Waschmethoden, besonders rücksichtlich der Behandlung farbiger Stoffe. (Seifensieder-Ztg. **53**. 185—86.) HELLEN

A. Stiel, *Ein Fall aus der Praxis der Schmierseifenfabrikation*. Leinöl 0,22% Asche, wahrscheinlich von Bleicherde herrührend, lieferte trübe Schmierseifen. Erst Verschnitt mit 50% eines einwandfreien Öles lieferte Transparenz. Leinölfettsäure mit Resten von BaCO₃ u. BaSO₄ ergab ebenfalls verschleierte Seifen. (Seifensieder-Ztg. **53**. 169.) HELLEN

Robert M. Chapin, *Methode zur Vergleichung der reinigenden Wirkungen von Seifen*. (Seifensieder-Ztg. **53**. 203—05. 221—23. — C. **1925**. II. 701.) HELLEN

A. Clever, *Flüssige Spezialseifen*. Bringt man 50 g einer guten Leinöl-K-Schmierseife mit 100 ccm dest. W. u. der gleichen Menge Spiritus (oder Methyl- bezw. Propylalkohol) unter Erwärmen in Lsg., so lassen sich dieser Lsg. große Mengen chlorierter KW-Stoffe, Bzl. usw. ohne Auftreten einer Trübung einverleiben. Selbst in 30-facher Verdünnung ist die Wrkg. solcher Lsgg. noch sehr groß. (Seifensieder-Ztg. **53**. 206.) HELLEN

G. de Belsunce, *Parfümierte Marseiller Seifen. Über das Verhalten einiger Chalkalien und Parfümieren in Marseiller Seifen auf Cocosölgrundlage*. Im Jahre 1925 parfümierte 72%ig. Marseiller Seife auf Cocosöl-Erdnußölgrundlage wurde nach dreijährigem Lagern an offener Luft in einem gewöhnlichen Zimmer bei Temp. zwischen 0° u. 33° auf ihre geruchlichen Eigenschaften untersucht. Aus einer Tabelle geht hervor, daß die meisten Düfte verändert in Erscheinung traten, doch genügte durchweg geringere Mengen zum Verdecken des Cocosparfüms als unmittelbar nach der Herst. der Seife. Eine Anzahl Kompositionen sowie zahlreiche Duftstoffe werden hinsichtlich ihrer Beständigkeit besprochen. (Bull. Matières Grasses **1925**. 288—90.) HELLEN

H. Heller, *Zur Deklaration von Fettsäuren*. Der tschecho-slowakische Zoll gestattet nur die zollfreie Einfuhr von Fettsäuren mit einem Gehalt von „unter 33% freier Säure“. Die zollamtliche Analysenvorschrift läßt jedoch alle Waren mit einem Gehalt als ca. 33% freier Säure bereits zollpflichtig erscheinen, da sie nicht exakt ist. (Ztsch. Dtsch. Öl- u. Fettind. **46**. 148.) HELLEN

B. M. Margosches und Eduard Neufeld, *Über eine Halbmikro-Ausführungsmethode der Jodzahlschnellmethode*. (Vgl. MARGOSCHES, HINNER u. FRIEDMANN, Ztsch. angew. Ch. **37**. 982; C. **1925**. I. 792 u. S. 791). Bei der Halbmikroausführung ist die Jodwage auf die Hälfte verringert. (Chem.-Ztg. **50**. 210—11. Brünn, Deutsche Technische Hochschule.) JUN

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

R. O. Herzog, *Fortschritte in der Erkenntnis der Faserstoffe*. (Vgl. S. 1901.) Physi- u. chem. Erkenntnis vermag zur Synthese von Fasern mit geforderten Eigenschaften zu führen. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure 137—42.) SÜVERN.

Walter Bruckhaus, *Imprägnierung von Geweben unter Verwendung von diversen Colosepräparaten*. Das Wasserdichtmachen durch Pergamentieren, unter Verwendung von Kupferoxydammoniakcellulose, u. mittels Nitrocellulose ist beschrieben. (Kunstseide 8. 66.) SÜVERN.

Edmund Knecht und Eric F. Muller, *Vergleich der Wirkungen einer Oxydation vor u. nach dem Mercerisieren von Baumwollfaser*. Mercerisierte Garne sind leichter färbbar als unbehandelte Baumwolle. Die Cu-Zahlen der Prodd. sind höher als gewöhnlicher oxydierter Baumwolle, auch bei gleicher Oxydation. Die Steigerung der Cu-Zahlen, nach Abzug der durch das Mercerisieren bedingten Beträge, ist bei Garne, die mit NaOH-Lsg. u. mit HNO₃ von günstigster Mercerisierwrkg. mercerisiert sind, dieselbe. Mercerisieren oxydierten Garns mit NaOH-Lsg. schwächt das Garn u. setzt die Cu-Zahl herab, entspricht die Oxydation weniger als 0,0064 O-Atom %, so erhöht die Mercerisation die Stärke u. erniedrigt die Cu-Zahl des Garns. Mit HNO₃-Lsg. mercerisierte Garne, die im Vakuum oxydiert wurden, haben dieselbe Cu-Zahl wie gewöhnliche, im Vakuum oxydierte Baumwolle. Mit NaOH-Lsg. weicher der Stärke mercerisierte u. dann oxydierte Baumwollgarne zeigen mit der abnehmenden Stärke der Lauge sinkende Cu-Zahlen. Sowohl beim Mercerisieren mit NaOH-Lsg. als auch mit HNO₃ tritt deutliche Steigerung der Temp. auf. Zur Erzielung vollkommen mercerisierten Garns ist eine bestimmte Stärke der Mercerisierung nötig. Die in vollkommen mercerisiertem Garn zurückgehaltene Feuchtigkeitsmenge entspricht dem Verhältnis 2 Mol. Cellulose: 1 Mol. W. Halbmercerisiertes Garn enthält weniger Feuchtigkeit u. hat geringere Affinität zu O₂ als vollmercerisiertes. Auch die Reaktionswärme ist geringer. Es kann wohl geschlossen werden, dass getrocknetes, wasserfreies mercerisiertes Garn seine Affinität zu O₂ verliert u. auf physikal. Wege feucht gehaltene Garne keine erhöhte Affinität zu O₂ haben. Gefärbte mercerisierte Garne verschleßen leichter als gewöhnliche gefärbte. Mit NaOH-Lsg. mercerisierte Garne tun dies leichter als mit HNO₃ mercerisierte. (Journ. of Dyers Colourists 42. 46—53.) SÜVERN.

E. Belani, *Das Siemens-Billiterverfahren im Dienste der Zellstoff- und Papierindustrie*. (Vgl. auch S. 1902.) Das elektrolyt. Zerlegen von Chloralkalien nach dem SIEMENS-BILLITER ist beschrieben. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure 143—45. Villach.) SÜVERN.

S. Hilpert, *Neues über die Verwertung der Sulfitablauge*. Die Verwendung chlorierter Sulfitablauge als Desinfektionsmittel ist besprochen. Der wesentliche Bestandteil der chlorierten Sulfitablauge sind gechlorte Chinone, die sich jedenfalls zum großen Teil von mehrkernigen KW-stoffen ableiten. Sie schlagen sich gleichzeitig mit der Sulfosäure auf der Oberfläche des angegriffenen Organismus nieder u. in dieser Zone tritt nun Säure erhöhter Konz. auf. Diese lokale Säurewrkg. verursacht den Tod des Organismus. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure 148. Berlin.) SÜVERN.

Artisetus, *Wirtschaftliche Betrachtungen über den gegenwärtigen Stand der deutschen Kunstseideindustrie und ihre Zukunftsaussichten*. Die Produktion der einzelnen Faserarten wird besprochen. Neue Absatzgebiete sind China, Indien u. Lateinamerika, Kakaofaser, Vistra u. Sniafil kommen außer der Kunstseide in Betracht. (Kunstseide 8. 60—63.) SÜVERN.

M. Halama, *Bau und Anlage von Kunstseidefabriken*. Die Einrichtungen die Herst. von Viscoseseide werden kurz besprochen. (Kunstseide 8. 30—32.)

J. D'Ans und **A. Jäger**, *Das Reifen der Viscoselösungen*. Durch Titrieren kann man die Anzahl der an Cellulose gebundenen Thiocarbonatgruppen direkt bestimmen u. ihre Veränderung mit der Zeit ermitteln. Der Xanthogenatgehalt nimmt regelmäßig ab, die Abspaltung der Xanthogenatgruppen erfolgt um so rascher, höher die Temp. ist. Aller an Cellulose gebundene CS_2 reagiert mit J_2 . Die Empfindlichkeit der Viscoselsg. gegenüber Elektrolyten hängt ab vom Abbaugrad der Cellulose als solche, von der Zahl der an Cellulose noch haftenden Xanthogenatgruppen von der Menge an Elektrolyten, die in der Viscoselsg. stets enthalten sind, vom Gehalt an freiem NaOH u. von der Temp. Bei der Best. der NH_4Cl -Reife ist der Gehalt an NaOH wesentlich. Die NH_4Cl -Reife vermag das Eintreten der freiwilligen Gerinnung der Viscoselsg. nicht scharf anzuzeigen. Bisher fehlen Anhaltspunkte für eine genauere Auffassung der Größe des Cellulosexanthogenatmoleküls. Es erscheint richtig, bei der Abspaltung der CS_2 -Gruppe irgendwie Veränderung der Molekülgröße des Cellulosekomplexes annehmen zu müssen. Viscositätsbestst. sind bei Viscoselsgg. möglichst mit der unverd. Viscoselsg. vorzunehmen. Viscositätsmessungen mit dem Kochiusschen Viscosimeter u. unverd. Viscoselsgg. ergaben für techn. Zylinder Übereinstimmung mit Messungen in einem einfachen Auslaufviscosimeter bei Viscoselsgg., die auf das dreifache Vol. verd. wurden. Paralleler Verlauf der Viscositätskurve ergab sich aber nicht, wenn der NaOH -Gehalt wesentlich niedriger oder höher als der techn. Viscoselsgg. ist. Die üblichen Bestst. für den Zustand der Viscoselsg. Viscosität u. NH_4Cl -Reife ergeben unter bestimmten Bedingungen wohl vergleichbare Zahlen, man muß aber dabei die Zus. der Lsgg. mit berücksichtigen. Bei frischen Viscoselsgg. läßt sich in den meisten Fällen in der mit NH_4Cl gemischten Lsg., ein Gehalt an freiem Ätzalkali berechnen, der um so größer wird, je älter die Viscoselsg. ist. Bei ganz frischen Viscoselsgg. mit geringem Alkaligehalt findet man dagegen, daß beim Koagulierungs-punkt ein Überschuß an freiem Alkali in der Lsg. nicht vorhanden ist, sondern im Gegenteil ein solcher an NH_4Cl . Bei höherem Alkaligehalt der Viscoselsg. ist die Menge an NH_4Cl , die durch die doppelte Umsetzung verbraucht wird, so groß, daß in der Lsg. sich eine solche Elektrolytkonz. ansammelt, daß die Ausfällung des Cellulosekomplexes bereits in einer noch Alkali enthaltenden Flüssigkeit tritt. Verstärkte Xanthogenierung erhöht etwas die Beständigkeit der Viscoselsg. gegen Gerinnung. Bei der NH_4Cl -Reife hat die Xanthogenierung stärkeren Einfluß als der NaOH -Gehalt der Lsg., bei frischen Viscoselsgg. ist der Unterschied viel größer als bei stark gereiften. Die NaOH -reichere Lsg. ergibt bei gleicher Xanthogenierung eine scheinbar geringere NH_4Cl -Reife, bei sehr weitgehend gereiften Viscoselsgg. schon beinahe freiwillig koagulieren, ist der Unterschied in der Xanthogenierung bezug auf die NH_4Cl -Reife fast ganz verwischt. Der Gehalt der Viscoselsgg. an Cellulosexanthogenat, der durch Titrieren mit J_2 faßbar ist, hängt von der Xanthogenierung ab, man erhält um so höhere Xanthogenatzahlen, je mehr CS_2 man wendet hat. (Kunstseide 8. 17—19. 43—46. 57—59. Berlin.) SÜVE

A. P., *Die Behandlung der Kunstseide vor der Verarbeitung in der Wirkstoffindustrie*. Eine dem Schlichten der Baumwollgarne entsprechende Behandlung mit dem Spulen verbunden werden oder man präpariert erst u. spult dann trocken. Die verwendete Fl. muß neutral sein, als Emulsion genügend lange haltbar, sie soll das Rosten der Platinen verhindern, den Faden gleichmäßig netzen u. schließlich sich nachher leicht u. restlos auswaschen lassen, ohne daß die Faser leidet. Zu vermeiden sind Paraffin u. Mineralöl, ferner Wollfette wegen des hohen Gehalts an unverseifbarem, empfohlen wird Monopolseife, Monopolbrillantöl, Türkönöl usw., besonders Glykom der Chem. Fabrik STOCKHAUSEN u. Co., Krefeld. (Zentralbl. f. ges. Textilind. 29. 99—100.) SÜVE

Winter, Die Herstellung von Buntgeweben. Die Herst. aus Baumwolle oder Kunst-, aus tier. Fasern, aus gemischten Faserstoffen u. die Erzielung verschiedener Effekte ist nach den Vorschlägen der Patentliteratur besprochen. (Ztschr. f. Textilind. 29. 100—104.) SÜVERN.

R. G. Parker und D. N. Jackman, Einige Wirkungen der Feuchtigkeit auf Ge-, mit besonderer Bezugnahme auf die Kontrolle der Feuchtigkeit während der Festigkeitsprüfungen. Bei Baumwolle, Leinen, Wolle, Naturseide u. Acetat- sowie Viscose- wurde die Wiederaufnahme von Feuchtigkeit in Proben bestimmt, die 5 Tage P₂O₅ getrocknet waren, u. zwar bei Feuchtigkeiten von 50—80%. Geringe Feuchtigkeitsgehalte, 1—2%, werden von den Fasern hartnäckig zurückgehalten. Celanese ergab sich ein Feuchtigkeitsrest von 0,1%. Die Kurven für die Wiederaufnahme von Feuchtigkeit ähnelten sich bei allen Fasern, im allgemeinen steigt der Feuchtigkeitsgehalt mit wachsender Schnelligkeit entsprechend der Raumfeuchtigkeit. Bei Untersch. der Schnelligkeit, mit der Feuchtigkeitsgleichgewicht eintritt, ergeben sich rasche Änderungen zu Anfang, beim Conditionieren ist daher darauf zu achten, daß bei möglichst konstant bleibenden Verhältnissen gearbeitet wird. Es ist wesentlich, daß man die Eigenschaften von Geweben nur vergleicht, wenn sie demselben Zustand konditioniert sind, entweder aus nassem oder aus trockenem Feuchtigkeitsgehalt macht Wolle schwächer, Baumwolle u. mercerisierte Baumwolle mit steigender Feuchtigkeit etwas höhere Reißfestigkeit, feuchtes Leinen wird mehr als 25% fester. Seide zeigt nur den halben Festigkeitsverlust von Viscose, Naturseide u. Wolle stehen zwischen Seide u. Viscose. In allen Fällen scheint die Festigkeitsveränderung sehr schnell einzutreten. Netzen führt zu unmittelbarem Festigkeitsabfall, längeres Tauchen in k. W. oder k. Seifenlsg. ergibt keine weitere Festigkeitsabnahme. 1%ig. Na-Oleatlsg. ergab bei 60° merkliche weitere Festigkeitsabnahme. Seide u. Wolle, beeinflusste aber die Kunstseiden nicht. Viscoseseidengewebe verlor an Festigkeit sofort nach Eintauchen in k. dest. W., keine andere Behandlung wirkte so, die anderen Stoffe litten mehr durch 1-std. Kochen in W. als durch Tauchen in k. W. Alle Stoffe außer Wolle zeigten denselben Festigkeitsverlust. Nach 1-std. Kochen in 1%ig. Na-Oleatlsg. wie nach Kochen in W., Wolle verlor beträchtlich an Festigkeit, auch bei 60°. Kochen mit 1%ig. Sodalslg. setzte die Festigkeit nicht merklich herab. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 47—54.) SÜVERN.

W. F. Edwards, Prüfen und Normieren in den Baumwollindustrien. Auf die Wichtigkeit der Best. der Feuchtigkeit wird hingewiesen. Die zur Reißfestigkeitsbestimmung benutzten Methoden geben keine übereinstimmenden Resultate. Bei der Unters. mit dem Serigraph kommt es auf den Abstand zwischen den Klemmen an. (Cotton 90. 226—30.) SÜVERN.

—, Beschreibung und Gebrauch von Crugers Micro-Analyser. Die Vorrr. gestattet, Faser- u. Gewebe unter Beleuchtung von unten oder oben mit einem Leitzschen Binarmikroskop zu betrachten. Bilder untersuchter Gewebe sind beigefügt. (Amer. stuff Reporter 15. 96—99.) SÜVERN.

Wolf J. Müller und Wilh. Herrmann, Zur Ligninbestimmung in Holz- und Zellstoffen. Zum Absaugen des durch Aufschluß nach WILLSTÄTTER-KRULL oder KLEIN u. BECKER erhaltenen Lignins benutzten Vff. ein auf einem Glas- oder Porzellantiegel hergestelltes Naphthalinpolster. Sie erhalten dies, indem sie den Schaum, beim Eingießen von 10—40 ccm einer 5%ig. alkoh. Lsg. von reinstem Naphthalin in verdoppelte Menge H₂O entsteht, auf das Filter bringen u. mit einem Glaspistill leicht nachwuscheln. Nach dem Fortsublimieren des Naphthalins wird das Lignin als Rückstand gewogen. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. Anorg. Lab. der I. G. Farbenindustrie A.-G., Leverkusen.) BRAUNS.

Wood Products & By Products Corporation, Nevada, übert. von: **Frederic K. Fish, jr.**, Windsor Mills, Canada, *Papierstoff*. Pflanzenstoffe werden der einer erhitzten Fl., die die flüchtigen Extraktivstoffe der Pflanzen enthält, ausgesetzt u. dann mit einer besonderen chem. Lsg. behandelt. (**A. P. 1574 026** vom 5. 1920, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH

J. C. Hartogs, Arnhem, Holland, *Kunstseide*. Man verwendet eine Lsg. K-Viscose, der man Kaliseife oder eine solche bildende Fettsäure zugesetzt. (**E. P. 246 423** vom 9/11. 1925, ausg. 18/2. 1926.) KAUSCH

Sté. Anonyme La Cellophane, Paris, *Vorrichtung zum Trocknen von Cellulosehäuten*. (**D. R. P. 424 686** Kl. 39a vom 7/2. 1924, ausg. 29/1. 1926. F. Prior. 1. 1923. — **C. 1926. I. 2267.**) FRANZ

Eastman Kodak Company, übert. von: **Stewart J. Carroll**, Rochester, New York, V. St. A., *Celluloseacetatfilme*. Zum Gießen des Filmes verwendet man ein Gemisch von 100 Gewichtsteilen in Aceton l. Celluloseacetat, 10—35 Gewichtsteilen Tributyrin u. die erforderliche Menge eines flüchtigen Lösungsm.; die hiermit hergestellten Filme bleiben auch nach monatelangem Erhitzen auf 65° biegsam. (**A. P. 1572 232** vom 22/4. 1925, ausg. 9/2. 1926.) FRANZ

Eastman Kodak Company, übert. von: **Leonard E. Branchen**, Rochester, V. St. A., *Verringerung der Viscosität von Nitrocellulose*. Man behandelt die gelatinisierte Nitrocellulose, wie Filmabfälle, mit einem Erweichungsmittel, verd. CH_3 , unterbricht die Behandlung, bevor die Nitrocellulose gel. ist, u. behandelt dann mit verd. Alkalien, 5%ig. NaOH, 2%ig. Na_2CO_3 , denen zum Bleichen Cl_2 zugesetzt werden kann. (**A. P. 1572 266** vom 13/5. 1925, ausg. 9/2. 1926.) FRANZ

Eastman Kodak Company, übert. von: **Samuel E. Sheppard** und **L. W. Eberlin**, Rochester, New York, V. St. A., *Verringerung der Viscosität von Nitrocellulose*. Man setzt gelatinisierte Nitrocellulose, insbesondere Filmabfälle bei gewöhnlicher Temp. u. Druck der Einw. von gasförmigen Stickstoffperoxyden aus. (**A. P. 1572 249** vom 15/6. 1925, ausg. 9/2. 1926.) FRANZ

Eastman Kodak Company, übert. von: **Samuel E. Sheppard** und **L. W. Eberlin**, Rochester, New York, V. St. A., *Verringerung der Viscosität von Nitrocellulose*. Man behandelt gelatinisierte Nitrocellulose, insbesondere Filmabfälle, mit der Lsg. eines Peroxydes, H_2O_2 . (**A. P. 1572 249** vom 15/6. 1925, ausg. 9/2. 1926.) FRANZ

Société Chimique des Usines du Rhône, Seine, Frankreich, *Trocknen von Cellulosemassen, insbesondere aus Celluloseacetat*. Man trocknet Gegenstände aus Celluloseacetat in einer mit den Lösungsmitteldämpfen beladenen Atmosphäre, hierbei kann sich nicht eine trockne äußere Haut bilden, die das Verdunsten der inneren befindlichen Lösungsm. verhindert; man bringt die zu trocknenden Gegenstände in einen Raum, in den die erwärmten mit Lösungsmitteldämpfen angereicherten Gase, wie Luft oder N_2 , eingeleitet werden; die mit den Lösungsmitteldämpfen gesättigten Gase gehen durch einen Kondensator u. von dort durch eine Heizvorr. wieder in den Trockenraum. (**F. P. 601 221** vom 27/10. 1924, ausg. 25/2. 1926.) FRANZ

Pathé Cinéma (Anciens Etablissements Pathé frères), Seine, Frankreich, *Lösungsmittel für Nitrocellulosen*. Als Lösungsm. verwendet man Mischungen von absol. A. mit Aceton oder den Essigsäure- oder Ameisensäureestern der Alkohole; man verwendet z. B. ein Gemisch von 80 Raumteilen absol. A. u. 20 Raumteilen reinem Aceton, oder 80 Teilen wasserfreiem Amylalkohol u. 20 Teilen Amylace. Die Lsgg. dienen zur Herst. von *Kunstfäden, Filmen, Lacken, Kunstleder* usw. (**J. P. 601 546** vom 30/10. 1924, ausg. 3/3. 1926.) FRANZ

Pathé Cinéma (Anciens Etablissements Pathé frères), Seine, Frankreich, *Lösungsmittel für Celluloseacetat*. Als Lösungsm. für Celluloseacetat verwendet man ein Gemisch von gleichen Teilen absol. A. u. reinem Aceton; an Stelle des Acetons kann man auch die Ameisen- oder Essigsäureester der Alkohole verwenden; die I

nen zur Herst. von *Filmen, Kunstfäden, Lacken* usw. (F. P. 601 547 von 30/10. 14, ausg. 3/3. 1926.) FRANZ.

IX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

Osw. Peischer, *Über Ergebnisse neuerer stetig betriebener Vertikalkammerofen-agen*. Von zwei Vertikalkammer-Koksofenanlagen, die im übrigen gleich waren, daß die eine Eisenverankerung, bei der anderen war der feuerfeste Teil des Ofenbaus von einer Eisenbetonverankerung umfaßt u. in eine 10 cm starke Betonhülle geschlossen. Infolgedessen erforderte die letztere weniger Unterfeuerung u. zeigte Laufe des Betriebes keine Undichtheiten der Wandung. — Bei dem Vergleiche aus stetigem oder period. Vertikalkammerofenbetriebe erhaltenen Koksausbeuten ist, daß der Koks aus dem stetigen Betriebe an Güte in keiner Weise dem dem period. Betriebe erhaltenen nachsteht u. daß die Beschaffenheit der Kohle erster Linie für die des Kokses maßgebend ist, aus einer minder gut backenden Kohle in keinem der beiden Ofensysteme ein guter Koks zu erhalten ist. (Gas- u. Wasserfach 68. 596—97. 1925. Essen.) BÖRNSTEIN.

R. Kattwinkel, *Neue Geräte für die Überwachung des Kokereibetriebes*. Beschreibung geeigneter App. zur Best. von Bzl. im Gase, von W. im Bzl.-Waschöl, der freien Ammonie im NH₃-Salz u. im Sättiger u. zur Probenahme von fl. Brennstoffen. (Glückauf 205—08. Gelsenkirchen.) BÖRNSTEIN.

Joseph D. Davis und John F. Byrne, *Einfluß von Feuchtigkeit auf die Selbstentzündung von Kohle*. Laboratoriumsvers. ergaben, daß absol. trockene Kohlen in reinem O₂ sich weniger leicht erhitzen als in Ggw. von gewissen Mengen W. Zimmertemp. mit Wasserdampf gesätt. O₂ begünstigt die Selbsterhitzung entsprechend der O₂-Zirkulation u. der bestehenden Höhe der W.-Verdampfung. Es wurde als Gefahrzone die Temp. von 70—97° festgestellt. (Ind. and Engin. Chem. 17. 233—36. Pittsburgh [P. A.].) GRIMME.

G. Stadnikow, N. Gawrilow und W. Rakowsky, *Über die Entschwefelung von sauren und sauren Fraktionen verschiedener Kohlenteere*. Für die Beseitigung alkalischer S-Verbb. aus sauren (phenol.) Ölen, für die es bisher keinen Weg gab, benutzten sich Vff. der Kondensation mit Aldehyd (Formalin) oder Glucosesyrup unter Einwirkung von Naphthasulfosäuren („Kontakt“ nach PETROFF), der die S-Verbb. besser unterliegen als die O-Verbb. So ergaben z. B. 100 g Kresol aus dem Donetzki-Kohlenteer mit 2,25% S nach 15-stünd. Erhitzen mit 1 g Formalin u. 1 g Kontakt im Autoklav auf 120° bei folgender Dest. im Vakuum eine Ausbeute von 85 g mit 0,02% S. Die Dest. der Rk. so befriedigend bei Steinkohlenteerölen verläuft, ist sie bei Braunkohlenteerölen weniger erfolgreich, infolge der Beimischung von neutralen Ölen, die die Wirkung der Reagentien u. daher die Geschwindigkeit der Kondensation verringern. Die prakt. völlige Entfernung des S gelingt nur bei einem Gehalt von nicht mehr als 0,15% Neutralölen, versagt bei einem solchen über 50%. (Brennstoffchemie 7. 1925. 68. Moskau, Chem. Laboratorium des Hydrotorfs.) BÖRNSTEIN.

Faber, *Die Doppelgasanlage, Bauart Tully*. Der einfache u. wenig umfangreiche App. vergast Magerkohle allein oder in Mischung mit Gaskohle abwechselnd durch u. W.-Dampf. Ein App. liefert bis zu 21000 cbm Gas von 5,2% CO₂, 30% CO, 1,4% CH₄, 50% H₂ u. 2% schwere KW-stoffe pro Tag. (Gas- u. Wasserfach 68. 592—93. 1925.) BÖRNSTEIN.

E. Berl und W. Schmid, *Zur Kenntnis des Karwendelölschiefers*. Unters. des 24% Bitumen enthaltenden Schiefers u. der durch Schwelen daraus dargestellten Schieferöle u. Gase. (Brennstoffchemie 7. 49—54. Darmstadt, Chem.-techn. u. elektrochem. Inst. der Techn. Hochschule.) BÖRNSTEIN.

N. Dănilă, *Zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der rumänischen Erd-*

ole. Mittlg. von Analysenmethoden u. Ergebnissen. (Petroleum 22. 209—10. Bukarester Chem.-techn. Inst.) REINER

Ulick D. Watson, *Über Schmieröle. Kennzeichnung der Schmieröle rumänischer Ursprungs. Zusammenstellung der rumän. Schmieröle mit Analysendaten.* (Le Pétrole 16. 615.) REINER

Julius Swoboda, *Über Maschinenschmieröle. Besprechung der einzelnen Maschinenschmieröle u. Bedingungen.* (Petroleum 22. 247—53. Hamburg.) REINER

D. J. W. Kreulen, *Die Bedeutung der Verbrennlichkeit des Kokes für die Feuerung fester Brennstoffe auf dem Rost. Eine neue Heiztheorie.* Auf mathemat. W. läßt sich ableiten, daß innerhalb der Brennstoffschicht auf dem Roste bei konstantem Brennstoffverbrauche u. unter sonst gleichen Umständen die Temp. um so höher ist, je geringer die Höhe des brennenden, aus der Kohle entstandenen Kokes ist. Die Höhe dieser Kokeschicht ist um so geringer, je größer die Verbrennlichkeit des Kokes ist u. diese nimmt mit zunehmender Porosität u. Aktivität des Kokes zu, mit wachsender Korngröße u. steigendem Aschengehalt ab. Der Wert einer Kohle für Feuerungsanlagen ist also vollständig bestimmt, wenn von ihr folgende Größen ermittelt sind: W., Asche, Ausbeute u. Verbrennlichkeit des aus der Kohle gebildeten Kokes; bisher bestimmte Heizwert gibt keine weitere Auskunft. Dadurch lassen sich die beobachteten Verschiedenheiten im Wirkungsgrade verschiedener Kohlsorten klären, die der Analyse nach gleich zusammengesetzt sind. (Brennstoffchemie 54—57.) BÖRNSTEDT

M. Dolch, *Die Bestimmung des Treibgrades backender Steinkohlen im Gang gewöhnlichen Kohlenuntersuchung.* Unter Abänderung früher angegebener Methoden zur Best. des Vol. von Koksprodd. unter Verwendung von festen Füllmaterialien Verdrängungsfl. u. Einstellung des größtmöglichen Stauungsgrades wird ein kleiner App. angegeben, in dem unter Verwendung von feinstem Pb-Schrot in kürzester Zeit das Vol. der Kohlen- bzw. Koksproben bestimmt werden kann. Der Quotient beider Zahlen gibt den Treibgrad. Die Frage, ob ein Stück gewachsener oder gepulverte Kohle der Verkokung zugrunde zu legen ist, läßt Vf. unentschieden. (Brennstoffchemie 7. 69—73.) BÖRNSTEDT

Robert M. Crawford, *Entfernung und Nachweis von Phenolen bei rohen moniakflüssigkeiten.* Vf. beschreibt eine Apparatur für den Großbetrieb, bei der handene Phenole aus roher NH₃-Fl. mit Bzl. ausgelaugt werden. Die benzol. Lsg. mit NaOH behandelt u. schließlich die Phenolalkalilsg. mit H₂SO₄ oder CO₂ Figuren im Original. (Ind. and Engin. Chem. 18. 313—15. Pittsburg [P. A.].) KAUSCH

Lucien Liais, Frankreich, *Brennstoffbriketts usw.* Man mischt dem Bindemittel NaHCO₃ in Krystallform oder Lsg. bei. (F. P. 597 483 vom 30/4. 1925, ausg. 2/1. 1925.) KAUSCH

Julien Petitpas, Frankreich, *Einführung und Verteilung von Bindemitteln zu agglomerierende Absorptionsstoffe, wie Sägespäne u. dgl.* Man verteilt ein feinstes Bindemittel in der Absorptionsmittelmasse u. behandelt die M. dann wie gew. (F. P. 601 979 vom 10/11. 1924, ausg. 10/3. 1926.) KAUSCH

Soc. L'Air Liquide, Soc. Anon. pour l'Étude et l'Exploitation des g. cédés G. Claude, Paris, *Destillation von Kohle unter Verdrängung der Gase gegen Ende der Erhitzung durch N₂, Luft oder Verbrennungsprodd. in den Retorten, so daß der H₂ u. das CH₄ aus dem Koks ausgetrieben wird.* (E. P. 243 665 vom 1925, Auszug veröff. 20/1. 1926. Prior. 28/11. 1924.) KAUSCH

Chemisches Zentralblatt.

1926 Band I.

Nr. 20.

19. Mai.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

B. Lepsius, *Zum 25-jährigen Jubiläum des Hofmann-Hauses*. Gedenkschrift. (Ber. sch. Chem. Ges. **59**. Abt. A. 42—57.) PFLÜCKE.

Ernest Cook, *Peregrine Phillips, der Erfinder des Kontaktverfahrens für Schwefel-er.* Biographie u. Würdigung der Arbeiten des wenig bekannten Erfinders des Kontaktverf. zur Schwefelsäurefabrikation, Peregrine Phillips, dessen Erfindung 1831 entiert worden ist. (Nature **117**. 419—21.) JOSEPHY.

C. G. Bedreag, *Physikalisches System der Elemente*. (Vgl. S. 1754.) Vf. setzt e Betrachtungen über die Zusammenhänge zwischen dem spektralen Verh. (Multi- ität der Terme) u. der Elektronenkonfiguration der einzelnen Elemente (vgl. 1997) weiter fort; er weist darauf hin, daß die neuen Feststellungen über die Multi- ts des Co u. Ni seine Ansichten bestätigen. Es wird die Bedeutung der Stoner- en Ansichten über die Unterteilung der Außenelektronen der Atome in Untergruppen vorgehoben u. die Bedeutung der Unters. der Bandenspektren im Hinblick auf Elektronenkonfiguration der Moll. betont. (Ann. scient. Univ. Jassy **14**. 47—57. sy, Univ.) FRANKENBURGER.

M. Centnerszwer, *Über die Haupt- und Nebengruppen des Periodischen Systems*. der Anordnung der Elemente im period. System von FAJANS (vgl. Radioaktivität, unschweig 1919, Sammlung Vieweg), die sich durch besondere Übersichtlichkeit zeichnet, besteht immer noch eine gewisse Unbestimmtheit in der Verteilung der mente innerhalb einzelner Gruppen. Die Einteilung erscheint nicht frei von kür. In einer aus dem Original zu ersiehenden Tabelle gibt Vf. eine Verteilung Elemente wieder, die ihm einige systemat. Vorzüge zu bieten scheint. — Aus mitgeteilten Anordnung ergeben sich eine Reihe von Regelmäßigkeiten u. auf r Grundlage läßt sich eine systemat. Behandlung aller Elemente u. ihrer Verbb. Unterricht erreichen, indem man von der ersten Gruppe ausgeht u. mit der nullten ppe schließt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 786—88. Riga, Univ.) BUSCH.

J. de Boissoudy, *Die Periodizität der positiven und negativen Valenzen*. Vf. weist uf hin, daß bei Komplexen, wie z. B. NH_4^+ , das sich nach SAZ (S. 1) aus einem tom u. 3, mittels ihrer positiven, sowie einem, mittels seiner negativen Valenz n gebundenen H-Atomen aufbaut, eine Dissymmetrie zu erwarten wäre, die der abweichenden Bindung u. damit bedingten andersartigen chem. Reaktions- keit des einen H-Atoms beruhen müßte. Aus demselben Grund kann dem, mit n derartigen Komplexion verbundenen Anion keine ganz speziell definierte Ver- ofung mit einem bestimmten der 4 H-Atome zugewiesen werden. Dasselbe gilt andere, um Metallatome sich aufbauende Komplexionen. Vf. folgert hieraus, kein stat., sondern ein statist. Gleichgewicht der Atomkräfte insofern vorliegt, aß die, von den übrigen Valenzen singular verschieden Valenz period. von einem andern der im Komplex vorhandenen Atome übergeht u. daß ebenso das außer- des Komplexes angelagerte Ion zeitlich wechselnd an verschiedene Atome des plexes speziell gebunden erscheint; hierdurch bildet sich eine, durch den zeitlich amäßigen Wechsel bedingte Symmetrie des eigentlich unsymmetr. Gebildes aus. vendet diese Anschauung auch auf die Konstitution einfacherer Verbb. wie von infachen Säuren u. Basen an. (Rev. gén. des sciences pures et appl. **37**. 77—82.) FB.

VIII. 1.

Wartan Lodotschnikow, *Die einfachste Methode der Darstellung polynärer Systeme auf der Ebene.* (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 185—213. — C. **1925**. I. 1553.)

H. V. A. Briscoe und **P. L. Robinson**, *Die Konstanz der Atomgewichte.* Venden sich gegen die Schlüsse, die JÄGER u. DYKSTRA (Koninkl. Akad. van Wetense Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **33**. 333; C. **1924**. II. 794) aus ihrer Arbeit über u. At.-Gew. von Si gezogen haben, u. berechnen auf Grund der beobachteten die verschiedenen At.-Geww. neu unter der Annahme, daß die mittlere beobachtete des Tetraäthylsilicans 0,767349 dem wahrscheinlichsten Wert für das At.-Gew. d Si 28,060 entspricht. Dabei ergeben sich als maximale u. minimale Werte 28,060 28,051, d. i. eine Differenz von 1 auf 1477. Ähnlich wie vom Bor (vgl. Journ. Chem. Soc. London **127**. 696; C. **1925**. I. 2682) bestimmen Vf. das At.-Gew. des Si aus verschiedenen Quellen u. finden als maximalen Wert von 5 angegebenen Werten 28,063 minimalen 28,058, im Mittel 28,060. Wenn die neuen Daten für Si auch nicht die Konstanz des At.-Gew. endgültig beweisen können, so sollen sie doch zeigen, daß die Differenz wenn überhaupt eine auftritt, nicht größer als 1 auf 6000 ist. (Nature **117**. 377—378. Newcastle-upon-Tyne, ARMSTRONG Coll.)

E. Moles, *Über die Genauigkeitsgrenze bei den physiko-chemischen Atomgewichtsbestimmungen.* Vf. hält die im VI. Bericht der Deutschen Atomgewichts-Kommission (vgl. BODENSTEIN etc., S. 1755) gemachten krit. Bemerkungen über im Lab. Investig. fisicas, Madrid, ausgeführte Arbeiten für unbegründet u. irreführend. Zunächst wird das Litergewicht für Sauerstoff besprochen. Dem Wert von BAXTER u. STARKWEATHER (Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 479; C. **1925**. I. 15) ist keine größere Genauigkeit zuzuschreiben, als dem vom Vf. u. GONZALEZ (Journ. de Chim. physique **19**. 310; C. **1922**. III. 594) abgeleiteten Mittelwert. — Weiter wird die Best. des Wertes von $1 + \lambda$ besprochen u. wegen der Verfeinerung u. Vervollkommenung bei der Messung von $1 + \lambda$ auf HOWARTH u. BURT (Trans. Faraday Soc. **20**. 546; C. **1925**. II. 672) hingewiesen. — Weitere Ausführungen beziehen sich auf die Anwendbarkeit der Grenzschichtmethode auf leicht kondensierbare Gase dagegen, die Übereinstimmung als Hauptkriterium für die Genauigkeit zu halten. Der kürzlich von BAXTER u. STARKWEATHER (S. 2311) für das l-Gewicht von Sauerstoff angegebene Wert 1,42898 ist von dem des Vfs. nicht mehr sehr verschieden (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 740—50. Madrid, Lab. de Investig. fisicas.)

J. Saslawsky, *Die Volumänderung bei der Bildung von Basen und Säuren.* untersucht die Abhängigkeit der bei der Entstehung einer festen, komplizierten Verbindung aus den sie bildenden elementaren Körpern stattfindenden Volumänderung von der basischen oder sauren Charakter der komplizierten Verbindung. — Die Volumänderung wird durch die Größe $C = MV/\Sigma AV$ ausgedrückt, wobei MV das Mol.-Vol. der Verbindung u. ΣAV die Summe der Atomvolumina der festen, einfachen Stoffe im freien Zustande bedeutet. Die Größe C ist als *Kontraktionskonstante* bezeichnet. — Die hier benötigten Atomvolumina werden am besten beim absoluten Nullpunkt miteinander verglichen; die vom Vf. benutzten entsprechen meist der gewöhnlichen Temp.; der Fehler ist infolge der relativen Geringfügigkeit des Ausdehnungskoeffizienten der festen Körper recht klein; nur für H, N, O u. die Haloide sind die Atomvolumina, ausgehend von der berechneten D. dieser Stoffe beim absoluten Nullpunkt ermittelt worden. Das ist aus der Abhängigkeit zwischen der D. einer beliebigen Fl. u. ihrer Temp. berechnet worden (vgl. Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 111; C. **1925**. I. 814). — Bei basischen Oxyden wurde stets eine sehr bedeutende Kontraktion gefunden (Zahlen vgl. Original), bei sauren Oxyden bedeutend schwächere. — Der Schluß von LORENZ u. HERZ (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **117**. 267; C. **1921**. III. 751), daß die Verkleinerung der Atomvolumina zum Atomvol. der Verbindung um so größer ist, je aktiver die reagierenden Elemente sind, ist also nicht für alle Fälle zutreffend. Ein ebenso scharfer Unterschied wie

h bei den Oxydhydraten, d. h. bei echten Basen u. Säuren, bemerkt; die Kontraktion der Basen ist, relativ genommen, bedeutend stärker als die Kontraktion Säuren. In solchen idealen Fällen, wo der relative Unterschied in der Kontraktion

Verbb. ausnahmsweise durch die Verschiedenheit zwischen den bas. u. sauren Eigenschaften beeinflußt wird, sollte beobachtet werden: Stärkere bas. Eigenschaften charakterisieren sich auch durch stärkere Kontraktion; je stärker die saure Natur geprägt erscheint, desto schwächer ist die Kontraktion. — In einer Reihe analog auter organ. Säuren wurde ein Parallelismus zwischen der Konstante der elektrolyt. Assoziation u. der Kontraktionskonstante C beobachtet. — In der Kontraktionskonstante der verschiedenen Salze einer u. derselben Säure ist eine um so intensivere Volumendeckung zu erwarten, je positiver das Metall ist; an der Reihe der Chloride wird bemerkt, daß sich die Kontraktion der Salze parallel mit dem Nachlassen des metall. Charakters vom Cs bis zum Be vermindert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 712—14. Nowo-Wosnessensk, Polytechn. Inst.)

BUSCH.

Georg-Maria Schwab, *Zur Volumadditivität in flüchtigen anorganischen Substanzen. Bemerkungen zu der Arbeit: Eugen Rabinowitsch, Über die Additivität der Molarkolumina flüchtiger anorganischer Verbindungen.* Vf. hat schon früher (Ber. f. Physik **11**. 188; C. **1923**. III. 966) denselben Schluß bezüglich der Additivität gezogen wie RABINOWITSCH (S. 1497). Auch in anderer Hinsicht ergänzen die Untersuch. RABINOWITSCHS u. des Vf. vollkommen. Anwendungen von der Additivitätsregel auf anorgan. Verbb. wurden nach einer Mitteilung von RABINOWITSCH an den Vf. bereits früher versucht, insbesondere von VAN LAAR (Ber. f. anorg. u. allg. Ch. **104**. 66; C. **1919**. I. 257). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **73**. 737—38. Würzburg, Univ.)

BUSCH.

Victor Lombard, *Über die Durchlässigkeit des Nickels für Wasserstoff. Einfluß des Druckes.* Die in früheren Verss. gemachte Feststellung, daß die Durchlässigkeit für N_2 gegenüber H_2 eine Funktion der Zeit ist u. daß sie im Verhältnis zum Quadrat des Durchgangsdruckes des Gases wächst, wurde bestätigt. Anschließend wurde der Einfluß der Dicke der Metallproben untersucht. Die Durchlässigkeit, die für sehr dünne Querschnitte groß ist, nimmt, wenn die Metaldicke stärker wird, zunächst sehr schnell, später mehr u. mehr langsam ab; sie verhält sich nicht umgekehrt wie die Metaldicke, wie es verschiedene Forscher angenommen haben. An Hand von Schauen wird gezeigt, daß die Durchlässigkeit von N_2 eine Funktion der Metaldicke ist, die der Formel: $d = K/a^h$ (h = Dicke). (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 463—464.)

KALPERS.

Macheleidt, *Löslichkeit von Salzen. Eine graphisch-mathematische Studie.* Vf. entwickelt ein mathemat. Schema, um die Fehlergrenzen bei der Interpolation von Löslichkeitswerten einzuengen. Er schlägt vor, die so gefundenen Werte — statt des üblichen Koordinatensystem — durch Zusammenlegung von Ordinate u. Abscisse in einer Form graph. darzustellen. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 129—36. Wiesbaden, Gießen.)

HEIMANN.

Fritz Ephraim, *Additionsverbindungen von Chlorwasserstoff und Metallsulfaten.* (I. vgl. S. 818.) Nur die Sulfate der Metalle mit mehr als 10 Außenelektronen, d. h. der Nebengruppen des period. Systems sind zu dieser Addition befähigt. — Sulfate der Alkalien, der Erdalkalien wie des Mg u. Be, des Al, Ce, La, des Fe, Co u. Ni sind zur HCl-Addition nicht befähigt; ihre Chloride geben umgekehrt mit konz. H_2SO_4 HCl; ebenso verhalten sich $[Co(NH_3)_6]Cl_3$, $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ u. konz. H_2SO_4 HCl; ebenso verhalten sich $[Co(NH_3)_6]Cl_3$, $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ u. $[Co(NH_3)_4(NO_2)_2]Cl$. — Stannosulfat absorbiert unter Selbsterwärmung HCl unter Ausbreitung des trockenen weißen Pulvers; beginnt bei 38,5° HCl-Gas zu entwickeln; die Temp. betrug 40°, als die Substanz noch 0,9 Mol., 45°, als sie 0,5 Mol. HCl enthielt; zur Ausbreitung der HCl war stärkere Temp.-Erhöhung notwendig. Beim Erwärmen

von SnCl_2 mit konz. H_2SO_4 vollzieht sich die Entw. von HCl scharf bei 42° ; es reagiert also das Chlorid mit H_2SO_4 bei der gleichen Temp., bei der das Sulfat- HCl -Additionsprod. zerfällt; für dieses ist deshalb Formel $\text{SnSO}_4 \cdot 2\text{HCl}$ zu vermuten; die völlige Beladung des SnSO_4 mit HCl ist wohl aus mechan. Ursachen unmöglich gemacht. *Wismutsulfat*, $\text{Bi}_2(\text{SO}_4)_3$, addiert bei Zimmertemp. etwas mehr als 4 Moll. HCl ; der Überschuß über 4 Moll. entweicht bis 110° ; bei 111° bzw. wenig darüber findet Abbau von 2 Moll. HCl statt, ein weiteres Mol. entweicht bei 154° , der Rest verflüchtigt sich in Grade höher; bei 175° ist die Substanz praktisch frei von HCl . — Nach HENSGEN (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4. 401 [1885]) verbindet sich *Antimonsulfat*, $\text{Sb}_2(\text{SO}_4)_3$, mit 5,2 Moll. HCl ; das Additionsprod. zeigt keine Abspaltung von HCl ohne gleichzeitige Sublimation eines festen Körpers. SbCl_3 gibt mit konz. H_2SO_4 kein HCl -Gase, u. ist in k. H_2SO_4 unl.; bei hoher Temp. erfolgt weitgehende Auflösung; beim Abkühlen krystallisiert nicht SbCl_3 , sondern eine höher schmelzende Verb., die, da kein HCl entweicht, das Additionsprod. darstellt. — AsCl_3 reagiert ebenfalls nicht mit konz. H_2SO_4 . *Thallosulfat*, Tl_2SO_4 , addiert 1,84 Mol. HCl ($\text{Tl}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{HCl}$?); beim Erwärmen beginnt sofort HCl -Entw., die sehr schnell verläuft; bei 170° Klumpung, bei 220° stark, bei 280° erheblicher Teil geschm., bei 320° Schmelzung vollständig. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 790—92. Bern, Univ.)

BUSCH

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

W. R. Whitney, *Ist irgend etwas in der Materie?* Populäre Darst. der neuesten physikal. u. chem. Erkenntnisse über den Aufbau der Materie aus elektr. Teilchen. Es werden gleichzeitig einige, mit sehr empfindlichen Radio-Empfängern ausführbare Verss. geschildert, bei denen der Nachweis äußerst geringer Ladungen u. Strömungen mittels Lautsprechers erbracht wird (α -Teilchen-Zählung, Luftionisierung, Thermionstrom in Glühlampen, Flammen- u. X-Strahlenionisierung, hohe Widerstände, Barkhausen-Effekt). (Ind. and Engin. Chem. 17. 885—90. 1925. General Electric, Schenectady, N. Y.)

FRANKENBURGER

R. G. Lunn, *Atomare Dimensionen*. Zusammenfassende Darst. der Methoden u. Ergebnisse der Bestimmung der Größenverhältnisse der Atome u. Ionen. Es werden nach verschiedenen Methoden erhaltenen Werte für die Radien der Atome einzelner Elemente zahlenmäßig u. in Kurvenform aufgeführt. 22 Methoden sind zur Bestimmung dieser Größen bereits verwendet worden u. zwar: 1. Atomvolumina, 2. Röntgenstrahlenanalyse, 3. Viskosität der Gase, 4. die van der Waals'sche u. verwandte Gleichungen, 5. Kompressibilität, 6. Viskosität von Flüssigkeiten, 7. Viskosität von Lösungen, 8. Ionendiffusion, 9. Beweglichkeit von Ionen in Lösungen, 10., Lösungswärmen, 11. Thermionstrom, 12. Betrachtungen über die atomaren Kraftfelder, 12. Streuung von X-Strahlen, 13. BOHR'S Theorie des H-Atoms, 14. Ionisierungspotentiale, 15. Bandenspektren, 16. chem. Konstanten, 17. opt. Drehung, 18. molekulare Adsorptionsschichten, 19. LANGEVIN'S Theorie des Diamagnetismus, 20. Stöße eines Elektronenstroms mit Gasmolekülen, 21. Dichteveränderungen in Permutiten, 22. FF. von festen Körpern. Die Größenordnung der nach diesen Methoden erhaltenen Werte ist überall die gleiche, mit jeder zugefügten Elektronenschale steigt der Durchmesser der Atome um etwa 0,5 Å. Eine reichhaltige Literaturübersicht ist beigelegt. In einer Diskussion des Vortrags wird erörtert, daß die Größenverhältnisse von Atomen u. Ionen in ihnen nicht streng auseinandergehalten sind. (Proc. Physical Soc. London 38. 93—108.)

J. Kudar, *Kernimpuls und Atombau*. Mathemat. quantentheoret. Behandlung einiger Fragen der Atomstruktur unter besonderer Berücksichtigung der Impulse der Atomkerne. (Physikal. Ztschr. 27. 59—62. Szeged, Univ.)

FRANKENBURGER

H. C. Urey, *Die Struktur des Wasserstoffmolekül-Ions*. Vf. bespricht ausführlich als in seiner ersten Note (S. 826) die Energien u. die Dimensionen des Wasserstoffmolekül-Ions. Er berechnet ferner die Ionisationspotentiale, die Resonanzpotentiale

Wasserstoffmolekül-Ions, die Dissoziationswärme des Wasserstoffmoleküls u. das Drehmoment des angeregten Wasserstoffmoleküls, aus Vergleichen mit experimentellen Befunden anderer Forscher ist die gute Übereinstimmung zwischen Rechnung Experiment zu erkennen. (Physical Review [2] 27. 216—37. Baltimore, Md., J. HOPKINS Univ.)

HAASE.

E. Schiebold und G. Sachs, *Graphische Bestimmung der Gitterorientierung von Kristallen mit Hilfe des Laueverfahrens. Gesetzmäßiges Wachstum von Aluminiumkristallen bei der Rekristallisation.* Vff. diskutieren kurz die einzelnen Verff., die zur Orientierung von Kristallen dienen, so die Drehkristallmethode u. die von GROSS modifizierte Laueverf. Ist das Kristallsystem u. die Kristallstruktur bekannt, so ist es nach dem von den Vff. angegebenen Verf. möglich, die Orientierung mit Hilfe einer einzigen Aufnahme durchzuführen. Die Orientierungsbest. erfolgt in der Weise, daß aus der im allgemeinen unsymmetr. Laueaufnahme eine stereograph. Projektion der Netzebenenpole abgeleitet wird, u. mit Hilfe eines Wulffschen Kugelschreides so gedreht wird, daß einer der wichtigen Zonenkreise der Aufnahme auf den Äquator fällt. Dieses Verf. ist zur Orientierungsbest. von *Al-Kristallen* mit kub. Symmetrie benutzbar. Ein zentriertes Raumgitter ausgearbeitet worden. Aus einer Besprechung der möglichen Fehlerquellen ist zu ersehen, daß der maximale Ablesungsfehler bei sorgfältigster Durchführung unter 2° liegt. Als Versuchsmaterial dienten *Al-Drähte*, die nach dem Rekristallisationsverf. gewonnen wurden; besonders bei den letzten Kristallen zeigte sich, daß die Stabachsen die [110]-Richtung als Wachstumsrichtung bevorzugen. (Ztschr. f. Kristallogr. 63. 34—48. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.)

HAASE.

W. L. Bragg und G. B. Brown, *Die Kristallstruktur von Chrysoberyll (BeAl_2O_4).* Die Grundzelle des BeAl_2O_4 ergab die Werte für $a = 4,420 \text{ \AA}$, $b = 9,390 \text{ \AA}$, $c = 10,00 \text{ \AA}$. Die Grundzelle enthält 4 Moll. woraus sich die D. zu 3,710 berechnet. Die Röntgenbeugungsbeobachtungen ergaben, daß die Symmetrieelemente der Struktur mit der Raumgruppe V_h^{16} angeordnet sind. Die Lage der Be-Atome konnte aus Röntgenbeugungen nicht entnommen werden, dagegen aber wurden die Lagen der O- u. Al-Atome durch neun Parameter festgelegt. In Übereinstimmung mit den oben angegebenen Achsenlängen sind die O-Atome in einer hexagonalen Kugelpackung angeordnet, wobei die Entfernung der benachbarten Atomzentren $2,7 \text{ \AA}$ beträgt. Gelegentliche Ähnlichkeiten mit der Struktur des Spinells werden erörtert, ferner werden Gründe für die Be-Atome angenommen, analog denen der Mg-Atome im Spinell, jedoch ist die Lage der Be-Atome nur vermutet. Die auf dem Photogramm befindlichen ca. 80 Reflexe werden durch die vorgeschlagene Struktur erklärt werden. (Ztschr. f. Kristallogr. 63. 122—43. Manchester.)

HAASE.

G. M. Cardoso, *Feinbauliche Untersuchungen am Epsomit.* Vf. ging vom künstlichen, kristallisierten Bittersalz aus, durch langsames Verdunsten einer Lsg. bei 18° erhielt er reine einschlußfreie, kein Hexa- u. Dodekahydrat enthaltende Kristalle. Diese eignen sich zur Unters. eignen sich 5 mm große Kristalle, an denen sich die Flächen 111 , $\bar{1}\bar{1}\bar{1}$, meist auch 010 u. 101 , selten die Vicinalflächen hko in der Nähe von 111 zeigten. Zur Herst. von Lauediagrammen dienten orientierte Kristallplatten mit 100 , 010 , 001 u. 110 . Der Plattenabstand betrug 4 cm. Die Auswertung der Lauediagramme zeigte eine sehr wahrscheinliche Übereinstimmung zwischen feinbaulichem Achsenverhältnis u. kristallograph. Achsenverhältnis. Eine genauere Best. des Achsenverhältnisses, der Konstanten des Elementargitters u. der Raumgruppe des Epsomits wurde mit Hilfe der Drehspektrogramme erzielt. Die Ergebnisse sind in einem Diagramm zusammengestellt. Es ergibt sich daraus, daß der Epsomit röntgenograph. kristallograph. zur spheonoiden Klasse des rhomb. Systems gehört. Im ganzen System des Elementarkörpers herrscht Vierzähligkeit der Punktlage bei drei Freiheitsgraden.

Die Bestimmung der Dimensionen des Elementarkörpers u. die Anzahl der ihm enthaltenen Moll. $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ erfolgte aus den Spektraldiagrammen u. gleichzeitiger Mitaufnahme des Kalkspatrhomboeder (1011)-Spektrums. Gefunden wurde: $a_0 = 11,91 \text{ \AA}$, $b_0 = 12,02 \text{ \AA}$, $c_0 = 6,87 \text{ \AA}$. Die Anzahl der Moll. im Elementarkörper beträgt 4. Die röntgenograph. Best. der Hauptwachstumsrichtung am natürlichen Epsomit ergab $d = 6,87 \text{ \AA}$, was sehr gut mit dem gefundenen Wert $c = 6,87 \text{ \AA}$ übereinstimmt u. erweist, daß die in Rede stehenden Epsomitnadeln in der c-Achse gestreckt sind. (Ztschr. f. Krystallogr. **63**. 19—33. Leipzig, Univ. Inst. f. Mineral. u. Petrogr.) HAASE

C. E. Mendenhall, *Elektronenphänomene an der Oberfläche von Metallen*. untersucht eine Anzahl von Erscheinungen, welche auf Elektronenbewegungen der Oberfläche von Metallen beruhen, um über den Einfluß des Zustands, in dem Metalloberflächen sich befinden, auf diese Effekte näheres festzustellen. Es werden vor allem Phänomene der Kontaktelektrizität, der Lichtelektrizität u. des Elektronenbombardements von Metallen studiert. Besonders wird der Einfluß des Gasgehalts der Metalle auf diese Effekte untersucht; hierzu werden sie in mit ungefetteten Schliffen versehenen Hochvakuumapparaturen durch Hochfrequenzheizung auf hohe Temp. gebracht. Die mit zunehmender Entgasung gemessenen Werte für die Kontaktelektrizität von Ni- u. Cu-Platten zeigen einen anfänglichen Abfall nach der elektro-negativen Seite, um mit weiterer Entgasung wieder einen Gang nach der elektropositiven Seite zu nehmen. Dies steht anscheinend mit der von HALLWARD u. seinen Mitarbeitern festgestellten Veränderlichkeit der lichtelektr. Erregbarkeit der Metalle mit ihrem Gasgehalt in Zusammenhang. An Sn u. Woodschem Metall wurde die Abhängigkeit der Kontaktelektrizität vom Aggregatzustand untersucht; hier überlagern sich anscheinend von der Entgasung herrührende Effekte mit strukturellen Änderungen der Metalle selbst; in der Nähe des F. scheint jedoch ein Sprung in der Kontakt-EMK. einzutreten. Photoelektr. Messungen zeigen, daß bei Pt der lichtelektr. Schwellenwert zwar bedeutend mit fortschreitender Entgasung nach kürzeren Wellenlängen hin verschoben wird, jedoch bleibt ein lichtelektr. Effekt auch bei den am stärksten entgasten Präparaten im kurzwelligen Ultraviolett bestehen. Verss. über die Emission sekundärer Elektronen beim Elektronenbombardement 10 verschiedenen Metallen erweisen, daß neben der durch Entgasung bewirkten Veränderung auch die Struktur der bombardierten Oberflächen, vor allem ihr kristallin bzw. amorpher Zustand eine maßgebende Rolle spielt. (Journ. Franklin Inst. **269**—78. Wisconsin, Univ.) FRANKENBURGER

P. W. Bridgman, *Die universelle Konstante der Thermionenemission*. Vf. gibt eine theoret. Ableitung der Formel für die thermion. Emission, u. zwar besonders der Größe A in der Formel $I = A T^2 e^{-b_0/T}$. Die Erklärung, die DUSHMAN (Phys. Review [2] **21**. 623. **25**. 338; C. **1924**. I. 1144. **1925**. I. 2529) gegeben hat, wird kritisch erörtert u. Vorschläge zur Beseitigung seiner Mängel gegeben. (Physical Review **27**. 173—80. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) HAASE

William J. Hooper, *Kritische Ionisierungspotentiale beim Stoß positiver Ionen*. Vf. unternimmt mit einer besonders konstruierten, in ihren Einzelheiten näher beschriebenen Apparatur Messungen über die Lage der krit. Potentiale für die Sekundärladungsisionierung von H_2 niederen Drucks durch die von einem glühenden, mit Na-Phosphat bedeckten Pt-Draht emittierten positiven Ionen unter besonderer Berücksichtigung des Ausschaltens störender Sekundäreffekte. Eine große Zahl von Verss. bei verschiedenen Gasdrücken u. unter variierten elektr. Bedingungen ausgeführt werden, erweisen, daß der bisher als „Ionisierungsstrom“ bezeichnete Strom doch eine Sekundäremission von Elektronen an der Pt-Wand der Ionisierungskammer entsteht u. daß diese Emission durch den Aufprall der positiven Ionen auf die Metalloberfläche herrührt. Weiter ergibt es sich, daß in H_2 entweder durch Ionen, die bis

5 V beschleunigt sind, keine Ionisierung eintritt, oder zum mindesten bei relativ niedrigen Drucken ($\sim 0,012$ mm) so gering ist, daß sie völlig durch die Sekundäreffekte verdeckt wird; bei höheren Gasdrucken scheint jedoch die Ionisierung durch positive Ionen bedeutend in den Vordergrund zu treten, soweit die angelegten Potentiale die Ionen innerhalb einer mittleren freien Weglänge genügend beschleunigen. (Journ. Franklin Inst. 201. 311—31.)

FRANKENBURGER.

Leonard B. Loeb, *Einschränkungen der theoretischen Gleichungen für die Beweglichkeiten von Gasionen*. (Vgl. S. 2291.) Vf. diskutiert die Gründe für die Unabhängigkeit der Beweglichkeit von Gasionen von ihrer Trägheit; er kommt zu dem Schluß, daß die „Alterungseffekte“ der Ionen bzgl. ihrer Beweglichkeit auf Änderungen des Durchmessers zurückzuführen sind. Quantitative Betrachtungen müssen auf einer noch ausstehenden Klärung der Frage nach der Beschaffenheit des Kraftfeldes zwischen Gasionen u. eng benachbarten Molekeln sich aufbauen. Anscheinend können auch diejenigen Theorien den experimentellen Feststellungen Rechnung tragen, welche von der Annahme elast. Stöße zwischen den Ionen u. Molekeln unter Berücksichtigung der dabei gegenseitig sich auswirkenden Kräfte beruhen; jedoch fehlt auch bei diesen noch die nähere Kenntnis der in Frage kommenden Kraftgesetze. (Journ. Franklin Inst. 201. 279—99.)

FRANKENBURGER.

Hans Lessheim, *Über den Elektronendrehimpuls rotierender Moleküle*. Vf. behandelt das Verh. rotierender, mehratomiger Moll. mit einem Elektronendrehimpuls elektr. Feld u. zwar speziell die Ablenkung eines Molekülstrahls im inhomogenen Feld. Ferner versucht Vf. den Abfall der Rotationswärme des H_2 unter Berücksichtigung des Elektronendrehimpulses zu verfolgen. Keine der so berechneten Kurven führt zu einem befriedigenden Ergebnis. (Ztschr. f. Physik 35. 831—49. Breslau, Univ.) FRB.

H. E. Krefitt, *Über den Dopplereffekt an Kanalstrahlen von Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff*. Zusammenfassender Bericht der vom Vf. in Physikal. Ztschr. 25. 1924. II. 1557. 1769. 1925. I. 12 veröffentlichten Arbeiten. (Journ. Science Assoc. Maharajah's Coll. Vizianagarem. 2. 21—42. 1925.)

PHILIPP.

J. S. Lattès und Georges Fournier, *Über die Absorption der β -Strahlen durch Materie*. Unter Bezugnahme auf die Arbeiten von LATTÈS (C. r. d. l'Acad. des sciences 1923. 1400; C. 1925. II. 885. 1543) u. FOURNIER (C. r. d. l'Acad. des sciences 1924. 284. 1490; C. 1925. II. 266. 1926. I. 14) teilen Vff. mit, daß die von FOURNIER mit Hilfe der primären β -Strahlung des RaE aufgestellte lineare Beziehung $\mu/\rho = a + bN$ auch exakt für die von LATTÈS bestimmten Massenabsorptionskoeffizienten für von den γ -Strahlen des Ra sekundär in C, Al, Ag, Pt, Au u. Pb erzeugten u. in denselben Stoffen auch absorbierten β -Strahlen gilt. Die Konstanten a u. b haben für die Werte 5,73 bzw. 0,0547. Das lineare Gesetz ist demnach sowohl für die weiche als auch die durchdringende β -Strahlung des RaE u. für die noch härtere von den γ -Strahlen des Ra sekundär erzeugte β -Strahlung, also innerhalb ziemlich weiter Grenzen bewiesen. Für alle 3 untersuchten Strahlengruppen ist das Verhältnis a/b konstant. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 855—56. 1925.)

PHILIPP.

Jean Thibaud, *Die Struktur des Kernes der radioaktiven Atome und die Aussendung der γ -Strahlspektren*. (Vgl. S. 1763 u. 2649 auch Journ. de Physiqu. et le Radium [6] 6. 82; C. 1925. II. 1335.) Vf. entwickelt folgende Vorstellungen über den Aufbau des Kernes der radioaktiven Atome. Der Kern soll einen sehr dichten Zentralteil von der Gesamtladung $N \cdot e$ (N = Kernladungszahl) enthalten. In der Nähe dieser Ladung soll statt des Coulombschen Gesetzes das folgende Kraftgesetz gelten:

$$F = N \cdot e^2 / r^2 (1 - b a^{-2} / r^{a-2}),$$

wo r = Entfernung vom Kernmittelpunkt. Im Bereich dieses Kraftfeldes sollen die Satelliten um den Zentralkern gewisse positive Bestandteile des Kernes kreisen. Aus der Rechnung ergibt sich, daß die einzig möglichen period. Bahnen Kreise sein

müssen, die außerdem instabil sind (Ursache des Zerfalls). Es werden nun nur solche Bahnen ausgewählt, die für das Moment der Bewegungsgröße des kreisenden positiven Teilchens ganzzahlige Werte geben. Gelangt ein positives Teilchen von einer solchen Kernbahn auf eine andere höherer Energie, so soll dies der Anlaß zur Aussendung einer γ -Strahlung sein, deren Energie durch die Energiedifferenz der beiden betreffenden Kernbahnen gegeben ist. Vf. versucht nun, das aus seinen Vorstellungen für *MsTh 2* zu erwartende γ -Strahlspektrum zu bestimmen. Er berechnet aus dem angegebenen Kraftgesetz die Energie für 8 Quantenbahnen, indem er setzt: $N = 1$, $a = 3$ u. $b = 3,29 \cdot 10^{-12}$ cm (entsprechend dem aus der Streuung der α -Strahlen bekannten Minimalwert der Entfernung, bis zu der ein α -Teilchen mit vorgegebener Geschwindigkeit, Masse u. Ladung sich dem ablenkenden Atomkern nähern kann u. indem er annimmt, daß die positiven Teilchen Protonen sind. Die Energiedifferenzen, die die einzelnen Kernbahnen mit der ersten Bahn bilden, sind dann in sehr befriedigender Übereinstimmung mit dem vom Vf. u. auch von BLACK beim *MsTh* beobachteten γ -Strahlenspektrum. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 857–1925.)

Y. H. Woo, Die Energieverteilung zwischen unverschobenen und verschobenen Linien beim Comptoneffekt. Die Messungen über die Intensität der gestreuten Röntgenstrahlen wurden mit Paraffin, Holz, Graphit, Aluminium u. Schwefel als Streustrahlern unternommen, die Versuchsanordnung u. die Ergebnisse der unter verschiedenen Winkeln aufgenommenen Strahlen wurden mitgeteilt. Es werden auch noch einige Verss. beschrieben, die die Unters. der an Lithium gestreuten sekundären MoK-Strahlen zum Ziele hatte. (Physical Review [2] **27**. 119–29. Rynson Phys. Lab. Chicago Univ.)

Manne Siegbahn, Atombau und Röntgenspektren. Kurzer Überblick über die Theorie der Röntgenspektren. (Svensk Kem. Tidskr. **38**. 61–65. Upsala.)

B. R. Stephenson und **J. M. Cork**, K-Serien-Emissionsspektren der Elemente vom Ta (73) bis zum Bi (83). Mit Hilfe eines Röntgenrohres, das durch Vorschalten von Widerständen u. automat. wirkenden Relais gegen Überbelastung bei Gasweichen oder Überhitzung des Brennfleckes geschützt war, u. eines Spektrographen von hohem Auflösungsvermögen, welches noch durch großen Abstand der Platten von den Spalten erhöht wurde, untersuchten Vff. die K-Linien der Elemente der Ordnungszahlen 73–83 mit Ausnahme von Quecksilber. Die betreffenden Stoffe wurden in dünner Schicht auf die Cu-Antikathode gebreitet u. durch Strahlung von 120–150 V zur Anregung gebracht. Die erhaltenen Ergebnisse sind in Tafeln zusammengestellt u. die $\sqrt{\nu/R}$ -Werte graph. dargestellt. Diese zeigen eine völlige Übereinstimmung mit den berechneten Werten. Die Unterschiede der ν/R -Werte für die α - u. α' -Linien stimmen gut überein mit den entsprechenden Werten für die $L\beta$ - u. $L\alpha'$ -Linien. Die entsprechenden Wellenlängenunterschiede betragen 4,85. (Physical Review [2] **138**–43. Michigan Univ. Physics Lab.)

J. Kudar, Das Korrespondenzprinzip und die Dublettspektren. (Vgl. S. 26 Mathematisch. (Physikal. Ztschr. **27**. 107–11. Szeged, Univ.)

F. R. Bichowsky und **H. C. Urey**, Eine mögliche Erklärung der Relativität dubletts und des anomalen Zeemaneffektes mittels eines magnetischen Elektrons. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 80–85. Johns Hopkins Univ., Dept. of Chemistry.)

T. Lyman und **F. A. Saunders**, Das Neonspektrum im äußersten Ultraviolett. Vff. benutzten zu ihrer Unters. denselben App., den sie zur Unters. des Heliumspektrums im äußersten Ultraviolett verwendeten u. bereits beschrieben hatten (S. 307) um festzustellen, ob Neon wirklich die bei dem Heliumspektrum beobachtete Verunreinigung ist. Die Gase waren in Quarzröhren eingeschmolzen u. nur in einigen Fällen

Pyrexglas; sie wurden durch einen Strom von 15—20 Milliamp. angeregt. Auf Viedergabe von 3 Aufnahmen, die ein stark belichtetes Neonspektrum darstellten, ein halbstündig belichtetes u. ein Heliumspektrum, das vermutlich Spuren Neon als Verunreinigung enthielt, konnte man ersehen, daß die Verunreinigung Heliums wirklich aus Neon bestand, aber ferner noch, daß die Intensität der Neon- durch das im Überschuß vorhandene Helium stark geschwächt wurde. Die Abnahme einer Absorptionsbande an dieser Stelle wurde verworfen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 12. 92—96. HARVARD Univ., Jefferson Phys. Lab.) HAASE.

R. C. Johnson, *Die Spektren des neutralen Kohlenmonoxymoleküls*. (Vgl. S. 1107.) berichtet über die verschiedenen Banden des CO-Moleküls u. die zugehörigen Intensitäten u. diskutiert auch die Ergebnisse von BIRGE (vgl. S. 2651). Es erregt dem Vf. zweifelhaft, ob dem CO₂-Molekül überhaupt ein Spektrum zuzuschreiben sei, das mit seiner Edelgaskonfiguration im Einklang stehen würde. Analog glaubt er auch die dem SiO₂ u. TiO₂ zugeschriebenen Bandenspektren dem SiO u. TiO zuzuschreiben. (Nature 117. 376—77. Belfast, Queen's Univ.) JOSEPHY.

L. S. Bowen und **R. A. Millikan**, *Valenzelektronenfreier Sauerstoff, O (VI), die Gruppe bei O (V), und neue Aluminiumlinien im äußersten Ultraviolett*. (Vgl. S. 1106.) Bei Anwendung von Reinaluminiumelektroden gelang es den Vff., zwei Linien zu beobachten, die sie dem valenzelektronenfreien Sauerstoff zuschrieben, u. zwar 1031,9 u. 37,69 Å. Ferner wurden etwa 15 neue Aluminiumlinien zwischen 1250 u. 500 Å. beobachtet, die dem Al (III) u. Al (II) gehören. Durch Extrapolation wurden die Ionisationspotentiale der valenzelektronenfreien Atome berechnet, diese Werte sollen auf 2 Volt genau sein. (Physical Review [2] 27. 144—49. Pasadena, Cal.) HAASE.

H. K. Sur, *Das Fundamentalniveau des Eisenatoms*. Vf. zeigt, daß aus den bisherigen Untersuchungen noch kein bündiger Schluß auf das Fundamentalniveau des Fe-Atoms gezogen werden kann, dazu ist erst eine eingehende Untersuchung des Spektrums im Schumann-Bereich notwendig. (Nature 117. 380. Allahabad, Univ.) JOSEPHY.

R. V. Zumstein, *Das Absorptionsspektrum von Zinndampf im Ultraviolett*. (Vgl. S. 1105.) Vf. untersuchte auf eine neue Methode das Bogenspektrum des Zinns in einem 25 Ampere-Strom; er konnte in dem Gebiete von 2170—1950 Å. 12 neue Linien beobachten u. eine Reihe bekannter bestätigen, die Meßgenauigkeit betrug oberhalb 2020 Å. 0,1 Å. u. unterhalb 2020 Å. 0,2 Å. Durch Untersuchung des Zinndampfes bei 1600° wurden neue Linien im Absorptionsspektrum festgestellt u. zwar zwischen 6000 u. 2000 Å. Die Resultate stützen im allgemeinen die Ergebnisse früherer Forscher. Aus der Untersuchung der Absorptionslinien konnte auf die Energieverteilung geschlossen werden, auch die Natur dieser Energiezustände noch ungeklärt geblieben ist. (Physical Review [2] 27. 150—56. Michigan, Univ.) HAASE.

Marion Eppley, *Der Funken zwischen Kohlenstäben, die mit einem Gemisch der Oxide des Molybdäns, Titans und Vanadins imprägniert sind, als Quelle eines enggestreiften Linienspektrums im sichtbaren Gebiet*. Vf. weist darauf hin, daß das Spektrum einer Funkenentladung zwischen Kohlenstäben ein enggestreiftes Linienspektrum ergibt, in welchem die Linien außer 2 (Mo 5896,12 u. 5888,52) annähernd gleicher Intensität sind. 6 mm starke Graphitstäbe werden an ihren Enden auf Rotglut erhitzt u. in ein trockenes Gemisch der gepulverten Oxide im Mischungsverhältnis 8 V₂O₅/5 MoO₃/2 TiO₃ gesteckt, worauf durch erneutes Erhitzen ein Oxydgemisch um den Graphitstab geschmolzen wird. Wiederholung dieser Prozedur erfolgt, bis beide Graphitstäbe mit schweren schwarzen Oxyden auf etwa 1 cm Länge bedeckt sind. Die Funkenentladung zwischen beiden Stäben auf 1 cm voneinander entfernten Stäben erfolgt durch Anlegen einer Spannung von etwa 15 000 V; die Expositionszeit beträgt bei einer Spaltweite des Spektroskopes von 0,03 mm etwa 26 Min. Zur Identifizierung der Linien dieses Spektrums wurde zweckmäßig, über dasselbe das Funkenspektrum einer Legierung aus 35 Tln. Cd,

35 Tln. Zn, 73 Tln. Pb u. 30 Tln. Sn zu photographieren, in welchem die Linien 64 des Cd, 6362,75 des Zn, 4680,43 des Cd, 4768,42 des Zn, 4062,30 u. 4058,00 des besonders markant auftreten. (Journ. Franklin Inst. **201**. 333—35. FRANKLIN INST.)

FRANKENBURGE

W. F. Meggers und **Otto Laporte**, *Regelmäßigkeiten im Bogenspektrum Rutheniums*. Ausführliche Wiedergabe der bereits nach Science (vgl. C. 1925. 890) kurz referierten Arbeit. Die l. c. angegebenen inneren Quantenzahlen sind sämtlich um 1 zu erhöhen. Die relativen Terme im Bogenspektrum des Ru u. die Zeeneffekte an den Ru-Linien sind in Tabellen zusammengestellt. (Journ. Washington Acad. of Sciences **16**. 143—54. Bureau of Standards.)

JOSEPH

Frederick K. Bell, *Das infrarote Absorptionsspektrum von geschmolzenem Naphthalin*. Nach kurzer Beschreibung der gegen früher (Journ. Americ. Chem. Soc. **2194**; C. 1925. II. 1931) nur wenig veränderten Versuchsanordnung berichtet Vf. über die Ergebnisse seiner Unterss. über das infrarote Absorptionsspektrum von geschmolzenem Naphthalin. Die Temp. des geschmolzenen Naphthalins betrug 95°, die Schmelzdicke 0,20 mm. Zum Vergleich wurde auch das infrarote Absorptionsspektrum von Benzol (Bzl.) bestimmt. Die Messungen erstreckten sich auf den Bereich zwischen 1 u. 12 μ . Die Absorptionskurve des Bzl. zeigt bis zu 5,0 μ ziemlich komplizierte Zus. Die COBLENTZ (Carnegie Inst. Publications **35**. 127 [1905]) beobachtete Bande bei 5 μ ist in zwei scharfe Banden bei 5,1 u. 5,5 μ zerlegt worden. Die Kurve des geschmolzenen Naphthalins zeigt gute Übereinstimmung mit den Kurven, die STANG (Phys. Review **9**. 542 [1917]) für Naphthalin in CCl_4 - u. CS_2 -Lsg. erhalten hat. — Die infraroten Absorptionskurven von Naphthalin u. Bzl. zeigen bis zu 5,5 μ weitgehende Ähnlichkeit. Schwache, aber gut ausgebildete Banden erscheinen bei beiden Verbindungen bei 1,7 μ , sowie in der Gegend zwischen 2,2 u. 2,5 μ . Die charakteristische Benzolbande bei 3,3 μ ist in beiden Kurven vorhanden. Die 3,8 μ -Bande des Bzl. erscheint im Naphthalin bei 3,9 μ wieder. Die 4,5- μ -Bande des Bzl. ist anscheinend auch im Naphthalin vorhanden, aber nicht eindeutig zu erkennen. Die 5,1 μ -Bande des Bzl. erscheint im Naphthalin bei 5,2 μ ; die 5,5 μ -Bande haben beide Kurven gemeinsam. Die 6,25 μ -Bande des Bzl. erscheint im Naphthalin bei 6,3 μ u. ist hier dunkler als im Bzl. Abgesehen von der Bande bei 7,2 μ , die beide Kurven gemeinsam haben, ist der Verlauf beider Kurven jenseits 5,5 μ grundverschieden. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 2811—16. 1925. Baltimore [Maryland], JOHNS HOPKINS UNIV.)

E. O. Salant, *Infrarotabsorption der N-H-Bindung*. Vf. schloß aus experimentellen Strukturbetrachtungen, daß die dem NH_2 -Radikal charakteristische Absorption durch die N-H-Bindung verursacht wird. Um diesen Satz zu bestätigen, wurden folgende symmetr. Dialkyl- u. Trialkylamine ausgewählt zur Unters. im Gebiet 3 μ verwandt: Tri-n-propylamin, Di-n-propylamin, Tri-n-butylamin, Di-n-butylamin, Tri-i-amin, Tri-i-amin, Di-i-amin, Triphenylamin, Diphenylamin, Triphenylamin, Dibenzylamin, Azobenzol u. Hydrazobenzol, ferner Toluidin u. Dimethyltoluidin. Es ergab sich aus den Aufnahmen, die mit Hilfe einer 500 Wattlampe gemacht wurden, daß die Diamine Absorptionsmaxima bei 3 μ zeigten, die Trialkylamine dagegen nicht; die durchgehende Strahlung wurde mit einem Wismut-Silberthermoelement gemessen. Als Absorptionszellen dienten Kammern aus Steinsalzplättchen, deren Wandungen 0,05 mm voneinander entfernt waren. Mit Ausnahme von Azo- u. Hydrazobenzol, welche als gesätt. Lsgg. in Bzl. angewandt wurden, waren es reine Substanzen. Die Phenylamine u. die Tribenzylamine, die feste Stoffe sind, wurden im reinen Zustand untersucht. Aus zahlreichen Darst. ist die Richtigkeit des oben aufgestellten Satzes zu erkennen. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 74—80. JOHNS HOPKINS UNIV., Dept. of Physics.)

HAAS

Rudolf Wegscheider, *Zur photochemischen Kinetik. Antwort an J. Plotnikow*. Die Behauptung von PLOTNIKOW (Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**. 798; C. 1925

3), daß die Endformen der vom Vf. abgeleiteten Geschwindigkeitsgleichungen in den meisten Fällen mit den Seinigen übereinstimmen, trifft nicht zu. Da die absorbierte Lichtmenge nach dem Beerschen Gesetz der Lichtintensität proportional besteht auch Proportionalität zwischen Reaktionsgeschwindigkeit u. Lichtintensität. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**. 1118—20. 1925. Wien, Univ.) KRÜGER.

Ralph B. Mason und **J. H. Mathews**, *Der Einfluß von ultraviolettem Licht auf Oxydation von Natriumsulfid durch Luftsauerstoff*. Vff. untersuchen die Oxydation v. Lsgg. von Na_2SO_3 mit verschiedenen Zusätzen beim Einleiten von CO_2 -freier L. Im Dunkeln u. besonders in ultraviolettem Licht hängt die Oxydationsgeschwindigkeit stark von der Geschwindigkeit, mit der die Luft durchgeleitet u. von Größe u. Form der Gasblasen ab. O_2 u. Ozon beschleunigen, CO_2 verhindert beide z. *Hydrochinon* u. *Phenol* sind positive, *Zucker*, *Chininsulfat*, CuSO_4 u. *Kautschuk*, terer besonders nach vorheriger Einw. von ultraviolettem Licht, negative Katsatoren für die Lichtrk.; die Dunkelrk. wird durch Hydrochinon vollständig ver-
lert, durch Chininsulfat u. Phenol verzögert, durch CuSO_4 nicht beeinflusst. Eine
ziehung zwischen der Lichtabsorption des zugesetzten Stoffes u. seiner Wrkg. auf
Lichtrk. besteht nicht. Die Steigerung der Oxydationsgeschwindigkeit durch
aviolettetes Licht beruht wahrseheilich auf der B. von aktiviertem O_2 . (Journ.
ysical Chem. **30**. 414—20. Madison [Wisc.]) KRÜGER.

Frank Briers, **David Leonard Chapman** und **Ernest Walters**, *Der Einfluß Lichtintensität auf die Geschwindigkeit photochemischer Umwandlungen. Die Be-
mung der mittleren Lebensdauer eines hypothetischen Katalysators*. Vff. wieder-
n die Verss. von BERTHOUD u. BELLENOT (Helv. chim. Acta **7**. 307; C. **1924**. II.
) über die photochem. Rk. zwischen $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ u. J_2 bei intermittierender Belichtung
ierende Sektorscheibe) u. bestätigen deren Angabe, daß bei hohen Umdrehungs-
en die Reaktionsgeschwindigkeit der Quadratwurzel aus der Lichtintensität pro-
tional ist, aber mit abnehmender Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe abnimmt.
wird gezeigt, daß dies Ergebnis weder auf der Ggw. einer die Rk. verzögernden
stanz, noch auf verschieden schnellem Entweichen des CO_2 oder ungleichem J-
brauch in verschiedenen Teilen der Lsg., noch auf der Methode zur Veränderung
Lichtintensität beruht, sondern durch die B. eines instabilen Katalysators von
ächtlicher Lebensdauer zu erklären ist. Unter der Voraussetzung, daß die Bildungs-
hwindigkeit des Katalysators der Lichtintensität, seine Zerfallsgeschwindigkeit
u. Quadrat seiner Konz. u. daß die Reaktionsgeschwindigkeit der Konz. des Kata-
tors proportional ist, wird ein Ausdruck abgeleitet, der die mittlere Lebensdauer τ
Katalysators aus den bei verschiedener Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe
bachteten, Reaktionsgeschwindigkeiten zu berechnen gestattet. Es ergibt sich
Verss. in weißem Licht $\tau = \text{ca. } 0,03 \text{ sec}$, in durch wss. Jodjodkaliumlsg. filtriertem
t $\tau = \text{ca. } 0,1 \text{ sec}$. Nimmt man an, daß der Mechanismus der Dunkelrk. derselbe
wie der der Lichtrk., so folgt für die mittlere Lebensdauer des Katalysators im Dunklen
6,3 sec. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 562—69. Oxford, Jesus Coll.) KRÜ.

Bernard Lewis und **Eric Keightley Rideal**, *Der Budde-Effekt in Brom*. I. u.
Mitt. I. *Der photoaktive Bestandteil des feuchten Broms*. Der Buddeeffekt in feuchtem
(vgl. LUDLAM, Proc. Roy. Soc. Edinburgh **44**. 197. 1924; C. **1925**. I. 339) beruht
der B. eines lichtempfindlichen Hydrats $\text{Br}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$; während in trockenem Br_2
einfallende Licht entweder an den Molekeln zerstreut oder als Fluoreszenzstrahlung
mittiert wird, kann das von den Hydratmoll. absorbierte Licht in therm. Energie
wandelt werden. — Der Buddeeffekt steigt bei konstantem Partialdruck p_{Br} des
mit wachsendem Partialdruck p_{W} des W. zunächst (bis $p_{\text{W}} = \text{ca. } 0,005 \text{ mm Hg}$)
r rasch, dann in einem gewissen Bereich ($p_{\text{W}} = \text{ca. } 0,03—0,16 \text{ mm Hg}$) linear
 p_{W} , bei höheren p_{W} immer langsamer u. erreicht schließlich, infolge vollständiger

Absorption der akt. Strahlen ein Maximum. Wird bei konstantem p_W der Buddeeffekt gegen p_{Br} aufgetragen, so entstehen Kurven mit einem geradlinigen mittleren Stück, einem gegen die p_{Br} -Achse konkaven Anfangsteil u. einem konvexen obersten Verlauf. Licht von den Wellenlängen 550—560 $\mu\mu$ ist besonders wirksam, Licht, langwelliger ist als 580 $\mu\mu$, unwirksam. — Die lineare Abhängigkeit des Buddeeffektes von p_{Br} u. p_W wird durch die B. eines photoakt. Hydrates $Br_2 \cdot H_2O$, mit den Komponenten im Gleichgewicht $Br_2 + H_2O \rightleftharpoons Br_2 \cdot H_2O$ steht, erklärt. Der konkave bzw. konvexe Anfangsteil der Kurven bei konstantem p_W bzw. p_{Br} beruht auf der Adsorption des Hydrats an der Glasoberfläche des Belichtungsgefäßes. Die Verteilung des Hydrats zwischen der Gefäßoberfläche u. der homogenen Lösungphase entspricht einer Adsorptionsisotherme. Durch W. kann das Hydrat von der Oberfläche verdrängt werden, so daß bei sehr hohen p_W eine Abnahme des Buddeeffektes eintritt.

II. *Die Kinetik der Reaktion und die Lichtabsorption von feuchtem und trockenem Brom.* Aus der Messung des Buddeeffektes bei verschiedenen Temp. u. niedrigen Partialdruck des W. ergibt sich die Bildungswärme des Hydrats $Br_2 \cdot H_2O$ in der Oberflächenphase zu 1090 cal u. daraus nach dem Nernstschen Wärmesatz die Konstante $K_p = [Br_2][H_2O]/[Br_2 \cdot H_2O]$ (in mm) zu $3,10 \cdot 10^9$. Feuchtes Br_2 zeigt dieselbe Lichtabsorption von $\lambda = 610 \mu\mu$ an, trockenes Br_2 erst von $\lambda = 570 \mu\mu$ an, das krit. Energieinkrement der molekularen Erregung ist daher für das Hydrat um 3200 cal kleiner als für Br_2 . Messung der durch feuchtes u. trockenes Br_2 absorbierten Energie ergibt, daß etwa 43% des vom feuchten Br_2 scheinbar absorbierten Lichtes wieder in Form von Strahlung emittiert wird, u. daß das Verhältnis zwischen der Zahl der durch das Hydrat tatsächlich absorbierten Quanta u. der Zahl der Hydratmoleküle, die unter Freiwerden von kinet. Energie zerfallen, dem photochem. Äquivalentgesetz entspricht. Der Absorptionskoeffizient des Hydrats zwischen 540 u. 570 $\mu\mu$ beträgt im Mittel $10,5 \cdot 10^6$. Zum Auftreten des Buddeeffektes scheint die Absorption von ca. 47090 cal pro Mol Hydrat erforderlich zu sein. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 583—96. 596—606. C. Krüger, Lab. of Physical Chem.)

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

E. Liebreich, *Zur Frage der Anomalien der Elektrocapillarkurven.* Die Kurven der Abhängigkeit der Oberflächenspannung Hg/Elektrolyt im Lippmannschen Capillar-Elektrometer von der angelegten Potentialdifferenz (Elektrocapillarkurve) stimmen nach der Theorie (HELMHOLTZ-LIPPMANN) Parabelform zeigen. Die absteigenden Äste genügen bei den verschiedensten Elektrolyten im allgemeinen dieser Forderung, während die ansteigenden fast stets Anomalien aufweisen. Die bisher zur Deutung aufgestellten Theorien sind unbefriedigend. Vf. bringt neues Vers.-Material bei. Er nimmt gleichzeitig die Elektrocapillarkurven u. die Strompotentialkurven an H_2SO_4 , KNO_3 u. $NaOH$ auf. Außerdem verfolgt er die Vorgänge auf dem Hg-Meniskus mit dem Vergrößerungsfernrohr. Das Maximum der Elektrocapillarkurve fällt mit demjenigen Teil der Stromspannungskurve, der der B. von Hydroxyden an der Oberfläche des Hg bei schwacher kathod. Polarisierung entspricht. (Vgl. LIEBREICH-WIEDERHOLT, Ztschr. f. Elektrochem. 30. 263; C. 1924. II. 1317.) Nach Überschreiten des Maximums wird H_2 entwickelt, der die Oberfläche von den Hydroxyden befreit. Der absteigende Ast entspricht somit wohl einer metall. blanken Oberfläche, der ansteigende u. das Maximum hingegen einer mit Hydroxyden (bzw. bas. Salzen) bedeckten, die dadurch zur Elektrode 2. Art wird. Vf. vermutet einen Zusammenhang zwischen diesen Erscheinungen u. den Anomalien in der Elektrocapillarkurve. Es könnte etwa eine Verminderung der Oberflächenspannung durch teilweise Reduktion der Hydroxyde (bzw. bas. Salze) in Hg oder eine Adsorption der betreffenden Anionen

etracht gezogen werden. (Ztschr. f. Elektrochem. **32**. 162—72. Chem.-techn. Anst.)

HEIMANN.

Humphrey Rivaz Raikes, Albert Frederick Yorke und Frederick Kenneth *rt*, Die Äquivalentleitfähigkeit von Natriumhydroxydlösungen und die Beweglichkeit der Hydroxylionen. Die Leitfähigkeit verd. wss. NaOH-Lsgg., die durch Elektrolyse von NaCl-Lsgg. hergestellt wurden, wird bei 10° u. 18° bestimmt. Die Äquivalentleitfähigkeiten Λ für Konz. c zwischen $1/30$ - u. $1/1000$ -n. entsprechen den Gleichungen: $\Lambda = 217 - 75,7 \sqrt{c}$ u. $\Lambda_{10} = 180,2 - 44,2 \sqrt{c}$; die Eigenleitfähigkeit des sehr reinen NaOH blieb unberücksichtigt. Werden die Werte von WASHBURN (Journ. Americ. Soc. **40**. 150; C. **1918**. I. 1119) für die Beweglichkeit des Na⁺ eingesetzt u. Überföhrungszahlen des OH⁻ bei beiden Temp. als gleich angenommen, so ergibt sich für die Beweglichkeit des OH⁻ bei 18° 173,8, bei 10° 144,3. (Journ. Chem. Soc. **1926**. 630—37. Oxford, Exeter Coll.)

KRÜGER.

R. W. Harman, Wässerige Lösungen von Natriumsilicaten. II. Überföhrungszahlen. (I. vgl. S. 5.) Die Überföhrungszahlen wss. Lsgg. von Natriumsilicaten mit verschiedenem Verhältnis Na₂O : SiO₂ werden nach der Hittorfschen Methode bestimmt; sie liegen in dem untersuchten Bereich (0,2—2-n. Lsgg.) von der Konz. ziemlich unabhängig von ein. In den Lsgg. des Metasilicats sind nur Na⁺- u. SiO₃²⁻-Ionen vorhanden, für die Überföhrungszahlen wird gefunden: $n_{Na} = 0,31$, $n_{SiO_3} = 0,16$, was unter Berücksichtigung der Ionenkonz. für die Beweglichkeit der SiO₃²⁻ der 70 folgt. In den Lösungen der Silicate mit den Verhältnissen Na₂O : SiO₂ = 1 : 2 u. 1 : 4 ist die Überföhrungszahl des Silications hoch, seine Beweglichkeit etwa die des Na⁺. Die Anionen sind nicht einfache SiO₃²⁻-Ionen, sondern entweder dissoziierte Aggregate einfacher Ionen mit oder ohne kolloide SiO₂ oder bestimmte komplexe Silicationen. Das Silicatanion enthält auf eine doppelte Ladung etwa soviel als dem Verhältnis SiO₂ : Na₂O entspricht. (Journ. Physical Chem. **30**. 359—68. London, Univ.)

KRÜGER.

M. Kolthoff, Der Ausdruck für die Reaktion von wässerigen Lösungen. Gegenüber dem neuen Vorschlage, die Rk. wss. Lsgg. durch $\log H^+/OH^-$ auszudrücken, werden die Vorteile des SÖRENSEN p_H hervorgehoben, besonders die, daß p_H eine sofort mathematisch verwertbare, von der Temp. unabhängige Größe ist, während bei $\log H^+/OH^-$ zu beachten ist, daß K_W eingeht, für jede Temp. ein anderer Wert für $\log H^+ = \log OH^-$ die Neutralität bedeutet, außerdem der Zustand „wahrer Neutralität“ d. h. $\log H^+ = \log OH^-$ für biolog. Prozesse ohne Bedeutung ist, da hier ausschließlich die Verschiebung des Gleichgewichts eine Rolle spielt, nicht aber, ob dabei der Neutralpunkt überschritten wird. (Biochem. Ztschr. **169**. 490—93. Utrecht, Pharmazeut. Institut der Universität.)

MEIER.

Karl Lichtenecker, Die Dielektrizitätskonstante natürlicher und künstlicher Mischkörper. Vf. referiert über natürliche u. künstlich aufgebaute Dielektrika. Für die dielektr. Eigenschaften getroffene Beschränkung u. Auslese der Gesamtliteratur diente als Richtschnur der Gedanke, die DE. der Mischkörper als ein Glied der allgemeinen Theorie der Mischkörper zu behandeln u. verwandte Gebiete des Mischkörperproblems, wie die dielektr. Leitfähigkeit u. elektr. Widerstand dort heranzuziehen, wo die Ergebnisse der einen anderen Teilgebieten gewonnenen Ergebnisse u. Zusammenhänge rückwirkend auf das Gebiet der DE. Anwendung finden konnten. Die Arbeit hat nach folgender Kapiteileinteilung: 1. Geschichtliche Entwicklung u. allgemeine Bedeutung des Problems. 2. Vergleichende Unters. der bisher für den Mischkörper aufgestellten Formeln. 3. das opt. Brechungsverhältnis von Mischkörpern, 4. die Abhängigkeit des Brechungsverhältnisses von der D. (Druck), 5. die Abhängigkeit der DE. von der D. (Druck), 6. DE. von Fl. unter hohem Druck, 7. Die Abhängigkeit der DE. von der Temp., 8. Anisotrope Mischkörper. (Lamellare Doppelbrechung; Stäbchen-

doppelbrechung; Anwendung der Theorie des Mischkörpers auf Strukturstudien betreffend die organ. Substanz; Einfluß der Eigendoppelbrechung der Aggregatbestandteile auf die Formdoppelbrechung; Erscheinungen der Doppelbrechung in weißen Lichtern.) Literaturübersicht zum Schlusse. (Physikal. Ztschr. **27**. 115—58.) K. W.

F. Zwicky, *Theorie der spezifischen Wärme der Elektrolyten*. Vf. gibt im Ansehn an seine vorläufige Mitt. (S. 843) einen Weg an, auf dem man die spezif. Wärme Elektrolyten berechnen kann. Zum Zwecke dieser Berechnung sei es notwendig folgende Faktoren zu berücksichtigen. 1. die Freiheitsgrade der Moleküle des Lösungsmittels, 2. die Änderung der spezif. Wärme des Wassers mit der elektr. Polarisation im Ionenfeld, 3. die Änderung der spezif. Wärme des Wassers durch Druck, 4. Berücksichtigung der Dipolnatur des Wassermoleküls u. der Anziehung dieser Dipole durch die Ionen eines inhomogenen Feldes. 4. die Hydratation der Ionen u. 5. die Ionenatmosphäre. Um die vom Vf. mathematisch errechneten Formeln zu stützen, sind es erforderlich, an Elektrolyten eine große Anzahl von Bestst. der spezif. Wärme bei Temp. von 0—100° auszuführen. Dem Faktor 3 mißt der Vf. große Bedeutung bei. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 86—92. Norman Bridge Lab. of Physics, California, Inst. of Technology.) HAAS

Franz de Rudder und **Max Ferrer**, *Schwefelkies und Zinkblende*. In einer Abhandlung von HEIHACHI KAMURA (Chem. Metallurg. Engineering **24**. 437; C. **1922**. I. 31.) ist die *Bildungswärme* von FeS_2 aus FeS u. S zu 18611 cal. berechnet; Vf. fand 18513 cal. Die Verbrennungstemp. fällt niedriger aus; gleichzeitig ergibt sich ein größerer Unterschied zwischen den Verbrennungstemp. von FeS_2 u. ZnS . — Antwort von JULIUS BAUMANN. Die Größenordnung der gefundenen Temp. kann als richtig angesehen werden. (Chem.-Ztg. **50**. 251.) JUN

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

Alexander Findlay, *Die Zwiellichtzone der Materie*. (Ind. and Engin. Chemistry **891**—94. 1925. — C. **1926**. I. 31.) FRANKENBURG

Karl Schultze, *Zur Capillartheorie der Quellungs- und Entquellungserscheinungen*. Es wird an Hand früherer Beobachtungen (Kolloid-Ztschr. **35**. 76. **36**. 65. **37**. 10. C. **1924**. II. 2012. **1925**. I. 1964. II. 1939) dargelegt, daß das Verh. der Gele in Bezug auf Quellung u. Entquellung nur mit Hilfe der gemischten u. offenen Capillarformeln zu erklären ist. Von Wichtigkeit für das Eindringen von Fl. ist die Stärke der Kräfte, die in den Winkeln (Capillarwinkel), die an den verschiedenen Stellen der normalen Capillarwand auftreten. — Die Verdunstung aus „gemischten“ Capillaren ist stärker als aus „echten“. (Kolloid-Ztschr. **38**. 232—34. Hygien. Staatsinst. Hamburg.) LA

P. P. v. Weimarn, *Über Schwefellösungen von allen Farben des Spektrums*. (Z. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **47**. 2177; C. **1916**. II. 445.) Rhomb. S löst sich bei Zimmertemp. in Glycerin oder Äthylenglykol spontan auf; die farblosen Lsgg. nehmen bei ca. 160° eine blaue Färbung an, deren Intensität mit steigender Temp. u. S-Konz. zunimmt; bei Vermeidung von Oxydationsprozessen u. anderer Nebenrkk. sind die Färbungen u. Verschwinden der Färbung reversibel. Die blaue Farbe wird nicht durch eine kolloide S-Phase bedingt, sondern hängt mit der Ggw. molekular-disperser Sulfide zusammen, die die S-Atome in einem besonderen Zustand enthalten; so sind die farblosen als die blauen Lsgg. klar, nicht opalescent u. zeigen im Ultramikroskop keine Ultramikronen. Zusatz von Säure verhindert, Zusatz von Alkali verursacht die Blaufärbung der Glycerinlsgg. Methylalkohol, A., Propyl-, Butyl- u. Amylalkohol, Aceton u. W. lösen S bei Ggw. von Alkalien ebenfalls mit blauer oder blaugrüner Farbe. Aus dem Vergleich mit der Blaufärbung, die beim Auflösen von S in schmelzendem KCl oder KCNS , in SO_3 , fl. NH_3 u. a. auftreten, schließt Vf., daß sie auf die Anwesenheit von „Sulfuraten“, in denen die Bindung des S geschwächt ist, gebunden ist. Stellt man durch Auflösen von S u. KOH in Glycerin dunkelrote Polysulfide her, so

her u. verd. mit verschiedenen Mengen Glycerin, so kann man beim Erwärmen Farben des Spektrums erhalten. — Von der blauen Farbe der molekulardispersen in Glycerin u. Äthylenglykol sind die in der Durchsicht blauen, in der Aufsicht grobdispersen Systeme, u. die in der Aufsicht blauen, hochdispersen kolloiden g. zu unterscheiden. (Kolloidchem. Beihefte **22**. 38—62.) KRÜGER.

A. Buzágh, *Über kolloide Lösungen der Erdalkalicarbonate*. I. Mitt. Es wurde kolloide Lsg. von CaCO_3 nach der Methode von NEUBERG u. REWALD (Ztschr. m. u. Ind. der Kolloide **2**. 321. 351 [1908]) durch Einw. von CO_2 auf CaO in alkoh. Suspension dargestellt. Die Analyse des Rückstandes dieser Lsg. ent. der Zus. von dimethylkohlen saurem Ca. Genau so verhalten sich bei gleicher BaO u. SrO . Diese Dimethylkohlen säureverbb. bilden echte kolloide Lsgg. zerfallen durch Einw. von W. in CO_2 , Methylalkohol u. reine Carbonate. — Versteht man zur Darst. statt der Erdalkalioxyde die Hydroxyde, so erhält man methylkolloide Lsgg. der Carbonate, die durch Dialyse gegen W. in wss. kolloide Lsgg. umwandelbar sind. Nur bei CaCO_3 gelang diese Darst. nicht. — Wenn man den längeren Einleiten von CO_2 in methylalkoh. Suspension sich bildenden Boden von Dimethylerdalkalicarbonaten, wie $(\text{CH}_3\text{CO}_3)_2\text{Ca}$, mit einer entsprechenden W. zerstört u. die hochkonz. kolloide Lsg. dann gegen W. dialysiert, so erhält man wss. kolloide Lsgg. der Erdalkalicarbonate u. zwar *Bariumcarbonatlsg.*, enthaltend 3% BaCO_3 , *Strontiumcarbonatlsg.*, enthaltend ca. 4,4% SrCO_3 , *Calciumcarbonatlsg.*, enthaltend ca. 3,9% CaCO_3 . Die Konz. kann durch vorsichtiges Einengen noch erhöht werden. Die Lsgg. sind mehrere Wochen haltbar. (Kolloid-Ztschr. **38**. 222 [1906]. Budapest, Univ.)

LASCH.



Fricke, *Über das komplexchemische Verhalten des Berylliums*. Aus der Stellung im period. System werden verschiedene Folgerungen gezogen. Be ist das Metall mit dem kleinsten Atomvol., auch besitzt es die kleinste Atomwärme. In chem. Beziehung sollte das Be infolge des Baus seiner Atome ein guter Komplexbildner sein, liegen die Verhältnisse für negative Addenden besonders günstig. Die Bindung an Beryllium ist auch locker genug, um Einlagerungsverbb. zu ermöglichen. An Hand der Erfahrungen mit seinen Mitarbeitern (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **146**. 121; C. **1925**. 17) hergestellten Verbb. des BeCl_2 mit 2, 4 u. 6 Addenden wird das Auftreten bestimmter Koordinationszahlen dargetan u. die Möglichkeit der Koordinationszahlen, welche aber nicht sicher erwiesen ist, in Verbb. vom Typ. $\text{BeCl}_2 \cdot 3\text{NH}_2 \cdot \text{NH}_2$ besprochen. Verbb. des Typs $\text{BeCl}_2 \cdot 2\text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3 \cdot 4\text{C}_6\text{H}_6$ können durch Ausbildung von koordinativ zweiter Sphären erklärt werden, da es unwahrscheinlich erscheint, daß ein Beryllium in einer Sphäre 8 Stellen u. das für so große Addenden zu besetzen hat. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **39**. 317—21.)

ENSZLIN.


Y. Takamatsu, *Über die Fällung des Eisenhydroxydsols durch verschiedene Elektrolyte*. Bei der Fällung von Eisenhydroxydsol durch Elektrolyte kann man je nach der Art der Anionen unterscheiden: 1. diejenigen, welche mit Ferriion unl. Salze bilden, wie $\text{Fe}(\text{CN})_6'''$, SO_4'' , $\text{Cr}_2\text{O}_7''$, CO_3'' , HPO_4'' , OH' . Bei ihnen ist die Flockungsschwelle für Eisenhydroxydsol der Konz. des letzteren proportional. Sie werden quantitativ adsorbiert u. ihre Wrkg. beruht hauptsächlich auf den adsorbierten Ionen. 2. diejenigen Ionen, welche mit Ferriion zwar keine unl. Salze bilden, aber doch chem. Verbindungen (Farbrkk.). Hierher gehören $\text{CH}_3\text{COO}'$ u. J' . Ihre Flockungsschwelle ist im allgemeinen viel höher u. für die Fällung sind sowohl die adsorbierten als auch die in Lsg. bleibenden Ionen verantwortlich. Sie bilden eine Übergangsgruppe. 3. diejenigen Ionen, welche mit Ferriion überhaupt nicht reagieren, haben einen von der Konz. des Soles unabhängigen Schwellenwert, wie NO_3' u. Cl' . Ihre fällende Wirkung beruht auf dem Einfluß, den alle Elektrolyte auf die Beschaffenheit der elektr. Doppelschicht an der Kolloidmizelle haben. Dieser Einfluß hängt für einen bestimmten Elektrolyten nur von seiner Konz. u. nicht von der Größe der Oberfläche

der Kolloidteilchen ab. Der Schwellenwert für die Flockung liegt hier immer ziemlich hoher Elektrolytkonz. (Kolloid-Ztschr. **38**. 229—31. Sapporo, Japan. Biochem. Inst. d. Hokkaido-Univ.)

A. Dumanski, A. Buntin, S. Dijatschkowski und A. Kniga, Die Komplexbildung als Zwischenstadium bei der Synthese eines Kolloidteilchens. Vff. beim Vanadinpentoxyd den Übergang $\text{VO}_4''' \rightarrow \text{V}_2\text{O}_7''' \rightarrow \text{V}_3\text{O}_9''' \rightarrow \text{H}_2\text{V}_2\text{O}_7$ nachgewiesen (Kolloid-Ztschr. **33**. 147; C. **1924**. I. 286). Der allmähliche Übergang Ion $\rightarrow$ Komplexion $\rightarrow$ Kolloidteilchen läßt sich scharf beobachten. In der vorliegenden Arbeit soll bewiesen werden, daß in allen Fällen, wo die (Gele) durch Rk. entstehen, das Endprodukt nicht von Anfang an erhalten wird, sondern daß dem Verhältnis der reagierenden Substanzen gewisse Zwischenproportionen entsprechen u. bei dem allmählichen Verlauf der Rk. bis zum Entstehen des Kolloidteilchens (Mizelle) der obige Übergang stattfindet. — Es wird die Entstehung von Hydrosols der Molybdän- u. Wolframsäure durch folgende Rkk. untersucht:



Es wird das spezif. Leitvermögen X_1 des Reaktionsgemisches u. X_2 das des theorett. Gemisches gemessen u. ebenso die Gefrierpunktserniedrigung des Reaktionsgemisches u. des theorett. Gemisches Δ_1 u. Δ_2 . Aus der Ungleichheit dieser Größen $X_1 \neq X_2$ u. $\Delta_1 \neq \Delta_2$ wird auf die B. von Zwischenprodd. geschlossen. Die Werte werden graph. dargestellt u. die erhaltenen Kurven diskutiert. — Die Methode wird auf ein Beispiel der Synthese von $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ u. $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ u. Kieselsäure angewendet. Das Nichtzusammenfallen der Größen X_1 u. X_2 u. auch der Charakter der Kurven zeigen dieselben Erscheinungen wie bei der Synthese der Molybdän- u. Wolframsäure. In diesem Falle bilden sich zuerst die nicht kolloiden Komplexe, die allmählich wachsender Größe, die später in Mizellen übergehen:



Es wird die Darst. von Hydrosolen echter Kolloide wie Eisen- u. Zirkoniumhydrosol u. eines Hydrosols der Zinnsäure untersucht: $\text{FeCl}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$; $\text{K}_2\text{SnO}_3 + \text{u. Zn}(\text{NO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3$. Aus den Tabellen ist zu ersehen, daß in allen Fällen, in denen das sich bildende Sol koaguliert wird, die B. des Sols auf der gleichen Gesetzmäßigkeit beruht, wie die B. von Zwischenverbb. — Vff. gelangen zu der Ansicht, daß die Kolloidteilchen zusammengesetzte Verbb. vom kolloiden Typus sind. Es existiert ein allmählicher Übergang vom Ion zum Komplexion u. zur Mizelle, der bei der Bildung von Kolloidteilchen durch eine chem. Rkk. mit doppelter Umsetzung obligator. stattfindet. (Kolloid-Ztschr. **38**. 208—18. Woronesch, Rußland, Landwirtschaftl. Inst.)

Curt Hagen, Das Hangphänomen des Quecksilbers in hochevakuierten Capillaren. Vff. studiert in einem MacLeod-Manometer Gasdrucke, sowie als Kriterium der Adhäsionskräfte die Hanglänge des Hg in dessen Capillare. Die Beziehung zwischen Druck u. Hanglänge wird kurvenmäßig festgelegt, bei Drucken von etwa 10^{-3} mm verschwindet das Hangphänomen. Weiterhin wird der Effekt in Abhängigkeit von der Gestalt der Capillare, dem Entgasungszustand, der Temp. u. dem Material der Innenwand der Capillare untersucht. Zu letzterem Punkt ist zu bemerken, daß bei eisernen Capillaren das Phänomen überhaupt nicht, bei Capillaren aus Cu u. Ni erst bei weit geringeren auftritt. Wird an Stelle von Hg Woodsches Metall als Füllsubstanz drängungsfl. eingeführt, so ist keine Hangerscheinung festzustellen. Das Hangphänomen kann zur Messung sehr hoher Vakua benutzt werden. (Physikal. Ztschr. **47**—57. Hamburg, Univ.)

S. S. Bhatnagar, Mata Prasad und Balwant Singh, Einige physikalische Eigenschaften von einwertigen Salzen höherer Fettsäuren im geschmolzenen Zustande. I. Leitfähigkeit und Oberflächenspannung. Es wurde die Leitfähigkeit u. Oberflächenspannung von geschmolzenem Na-Oleat, linolsaurem Na u. K untersucht. Die

igkeit aller untersuchten Salze erreicht bei einer bestimmten Temp. ein Maximum, auf sie konstant bleibt. Die Dissoziation des Salzes nimmt nämlich mit Temp.-stieg ebenfalls bis zu einem Maximum zu, weshalb auch keine weitere Zunahme Leitfähigkeit eintreten kann. „Temp. der unendlichen Dissoziation.“ — Die flächenspannung der Seifen wurde aus der Masse eines aus einer Capillare fallenden geschmolzenen Seifentropfens bestimmt: $Mg = KT$, M = Masse eines Tropfens, O = Oberflächenspannung, K = von der Temp. abhängige Konstante. Die Oberflächenspannung der geschmolzenen Seifen ist in zwei Fällen von derselben GröÙenordnung wie Olivenöl bei 50 u. 105°. Unterhalb dieser Temp. sind die geschmolzenen so viscos, daß sie überhaupt nicht ausfließen. (Kolloid-Ztschr. 38. 218—22. Indien.)

LASCH.

N. Isgaryschew und **A. Pomeranzewa**, *Die Quellung in Gegenwart organischer Stoffe im Zusammenhang mit deren Struktur*. Es wird die Wrkg. organ. Säuren auf die Quellung des Caseins untersucht, u. zwar: Chloressigsäure, Milchsäure, Glykolsäure, Malonsäure, Ameisensäure, Citronensäure, Äpfelsäure, Maleinsäure, Weinsäure, Fumarsäure, Oxalsäure, Propionsäure, Mellitsäure, i-Buttersäure, Essigsäure, Valeriansäure, n-Buttersäure, Wasser, Crotonsäure, n-Capronsäure, m-Oxybenzoesäure, p-Oxybenzoesäure, Bernsteinsäure, Benzoesäure, Glykokoll. Es besteht keine Abhängigkeit der Quellungswerte vom Dissoziationsfaktor. Die Anwesenheit einer Carboxylgruppe begünstigt die Quellung in hohem Maße. Weniger die Anwesenheit einer zweiten Carboxylgruppe, wobei die cis-Konfiguration stärker wirkt, als die trans-Lage. Bei Anhäufung von Hydroxyl u. Carboxylgruppen scheint es, daß die Wrkg. gegenseitig hemmen. Einbas. Fettsäuren zeigen im allgemeinen keine Quellungswrkg. u. geringe Unterschiede, ausgenommen Ameisensäure. — Erniedrigend wirkt die Amidogruppe im Glykokoll. — Die allerhöchste Quellungsstärke zeigt die Monochloressigsäure. Im allgemeinen wird die Quellung von den „inaktiven“ oder „aktiven“ Gruppen beeinflusst, die die Reaktionsfähigkeit der Säure erhöhen u. ihre Konstanten ändern. In dieser Weise äußert sich der Chemismus bei der Erscheinung. — Die Säure muß in engen Kontakt mit dem Casein treten. Wahrscheinlich geht dem Quellungseffekt die Adsorption der Säure voraus, u. es geht an der Oberfläche eine Adsorptionsverb., die ein anderes Quellungsvermögen hat, als das reine Casein. — In den meisten Fällen sind die Gruppen, die sich bei der Koagulation als aktiv erwiesen haben, es auch bei der Quellung. (Kolloid-Ztschr. 35—38. Moskau, Elektrochem. Abtlg. d. wissenschaftl. chem. Inst.) LASCH.

Akiji Fujita, *Untersuchungen über elektrische Erscheinungen und Ionendurchlässigkeit von Membranen*. VIII. Mitt. Die Permeabilität der getrockneten Kollodiummembran für Nichtelektrolyte. (VII. vgl. MICHAELIS u. FUJITA, S. 1379.) Die Permeabilität von Nichtelektrolyten durch getrocknete Kollodiummembranen ist wie die von einwertigen Kationen von dem Diffusionskoeffizienten in freier Lsg. abhängig. Diffundierten Substanzen wurden je nach der Durchlässigkeit nach ein oder mehreren Tagen analyt. bestimmt. Eine geringe Abnahme der freien Diffusion entspricht einer vielfach geringeren Durchlässigkeit durch getrocknetes Kollodium. Von dem Teil der untersuchten Verbb. wurde der relative Diffusionskoeffizient im Vergleich zu einer KCl-Lsg. näherungsweise durch Best. der Diffusionsgeschwindigkeit durchlässige Kollodiumhülsen ermittelt. Die Messungen erstreckten sich auf Ethylalkohol, Aceton, Formamid, Äthylalkohol, Propylalkohol, Harnstoff, Butylalkohol, Methylglykol, Glycerin, Chloralhydrat, Monoacetin, α -Monochlorhydrin u. Traubenzucker. Stoffe, deren freier Diffusionskoeffizient kleiner als die Hälfte des von KCl war, diffundieren nicht mehr durch getrocknetes Kollodium. — Von den schwachen Elektrolyten diffundierte Essigsäure im Gegensatz zum Acetation; Ammoniak wird nicht durchgelassen als das NH_4 -Ion. Eine Korrosion der Membran durch NH_3 wird beobachtet, da dem NH_3 beigemisches Aceton die übliche Diffusionsgeschwindigkeit mitteilt.

keit hatte. Die Durchlässigkeit des W. durch die getrocknete Membran wurde (n. metr.) qualitativ bestimmt; sie scheint von derselben Größenordnung zu sein für andere leicht durchgängige Substanzen. (Biochem. Ztschr. **170**. 18—29. Na [Japan], Aichi-Med. Univ.)

LOHMAN

A. H. Roffo und B. Barbará, *Verhältnis zwischen der Adsorption der Farbstoffe und ihren physikalisch-chemischen Konstanten*. Adsorption von Farbstoffen an Kohle steht in umgekehrtem Verhältnis zur Oberflächenspannung, gemessen mit Stalagnometer von TRAUBE. (Bol. del inst. de med. exp. **1**. 295—96; Ber. ges. Ph. **33**. 249. 1925. Ref. MONA SPIEGEL-ADOLF.)

OPPENHEIM

A. Frumkin, *Über die Beeinflussung der Adsorption von Neutralkmolekülen ein elektrisches Feld*. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. **116**. 466; C. **1925**. II. 1512.) versucht, die von ihm selbst u. von GOUY (Ann. Chim. et Phys. [8] **8**. 291; C. **1906**. II. 996) beobachtete Deformation der Elektrocapillarkurven von Neutralsalzen u. capillarakrt. organ. Stoffe quantitativ mathemat. zu deuten. Die von ihm unter Annahme eines Antagonismus zwischen der Wrkg. des elektr. Feldes u. der Adsorption der Neutralkmoleküle entwickelten Gleichungen entsprechen in der Mehrzahl der annähernd den Beobachtungsergebnissen, wenn einerseits die gegenseitige Anziehung der adsorbierten Moleküle, andererseits die Veränderlichkeit der von einem adsorbierten Molekül eingenommenen Fläche in verschiedenen Stadien des Adsorptionsvorganges berücksichtigt wird. In einzelnen Fällen muß jedoch auch die Abhängigkeit der Aufladung von der adsorbierten Menge an der Grenzfläche Hg-Lsg. in Betracht gezogen werden. (Ztschr. f. Physik **35**. 792—802. Moskau, Karpow-Inst.) KRIEGER

Julius Kleeberg, *Die Hydroxyde des Yttriums und Lanthans als Adsorptionsmittel*. $\text{Be}(\text{OH})_2$ ist ein vorzügliches bas. Adsorptionsmittel (vgl. Kolloid-Ztschr. **17**; C. **1925**. II. 1940). Dagegen ist $\text{La}(\text{OH})_3$ kein brauchbares Adsorptionsmittel. $\text{Y}(\text{OH})_3$ ist bei entsprechender Darst. ein hervorragendes Adsorptionsmittel, das adsorbiert molekular-dispers wie kolloide, saure wie bas. Farbstoffe zum Teil der allgemeinen Adsorptionsisotherme. Die Adsorptionskraft ist bei einem 3 M. alten Gel unverändert. Die Gleichgewichtseinstellung ist unabhängig von den Ionenkonz. u. nach halbst. Schütteln vollendet. Beim Kataphoresevers. zeigt $\text{Y}(\text{OH})_3$ positive Ladung. (Kolloid-Ztschr. **38**. 226—29. Frankfurt a. M., Medizin. Klinik d. Univ.)

H. Freundlich und G. Schikorr, *Über die durch kolloiden Schwefel beschleunigte Umwandlung der Maleinsäure in Fumarsäure*. Fumarsäure wird durch Blutkohle stärker adsorbiert als Maleinsäure, in beiden Fällen gilt die Adsorptionsisotherme. Eine merkliche Beschleunigung der Umsetzung von Fumarsäure in Maleinsäure durch Blutkohle tritt nicht ein. — Adsorption der Säuren an den Teilchen eines S-Sols läßt sich nicht nachweisen; S-Sole — sowohl solche, die durch Wechselwirkung von SO_2 u. SO_2 als auch solche, die durch Zers. von $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ mit konz. H_2SO_4 hergestellt — beschleunigen jedoch die Umwandlung der Fumarsäure in Maleinsäure. Die Beschleunigung tritt erst ein, wenn das S-Sol eine gewisse Zeit auf die Maleinsäure gewirkt hat, dauert aber nach Flockung der Hauptmenge des S fort. Quantitative Messungen zwischen 60 u. 100° zeigen, daß die Reaktionsgeschwindigkeit proportional der adsorbierten Maleinsäuremenge proportional ist, entsprechend dem Ansatz — $d c / d t = k \cdot c^{1/n}$ u. bei demselben S-Sol proportional mit dem S-Gehalt steigt; die Rk. kommt bei endlicher Maleinsäurekonz. zum Stillstand; um ein Gleichgewicht handelt es sich nicht. Stark adsorbierbare Stoffe, z. B. Phenylurethan, beschleunigen die Rk. Die Beschleunigung beruht also nicht allein auf einer Oberflächenrk., sondern wahrscheinlich auf der B. eines kolloid gel. Stoffes aus Maleinsäure u. kolloidem S. Die Temperaturabhängigkeit der Maleinsäureumwandlung läßt sich durch die Arrheniussche Formel $\ln k = -A/T + B$ darstellen, wobei die Konstanten A u. B größer sind als bei den meisten chem. Rkkn. Für die D.

konstanten der Fumarsäure wurde durch elektrometr. Titration bei 20° gefunden: $\kappa = 9,2 \cdot 10^{-4}$; $K_2 = 7,1 \cdot 10^{-5}$. (Kolloidchem. Beihefte 22. 1—15. Berlin-Dahlem, er Wilhelm-Inst. für physikal. Chemie u. Elektrochemie.) KRÜGER.

K. C. Sen, *Über die Viscosität kolloider Lösungen in Gegenwart von Elektrolyten*. (S. 1122.) Vf. bespricht die Studien zahlreicher Autoren über die Viscosität der Lsgg. in Ggw. von Elektrolyten. Aus den angeführten Resultaten geht hervor, daß es nicht möglich ist, einen allgemeinen theoret. Fall herauszufinden. In der entwickelten Auffassung wird eine anorgan. Suspension, die in Ggw. gewisser Elektrolytkonz. eine Vermehrung ihres kataphoret. Potentials zeigt, bei diesen Elektrolytkonz. eine entsprechende Verminderung der Viscosität zeigen. Diese Theorie kann mit *Eisenhydroxydsol* in Ggw. verd. Säuren u. *Ferrichlorid* gestützt werden u. einige Verss. des Vf. haben sie bestätigt. (Kolloid-Ztschr. 38. 253—57. Calcutta, Indien, Univ.) LASCH.

A. de Waele, *Bemerkungen über ein augenscheinliches Paradoxon der Plastizität*. (S. 2309.) Bei der plastometr. Prüfung eines *Standöles* waren die graph. dargestellten Werte von $\log P$ u. $\log V$ insofern etwas unzureichend, als keine kontinuierliche Linie erhalten, sondern ein entschieden geringerer Wert von φ gefunden wurde. Nachprüfung mit anderen Capillaren ergab sich, daß sich φ mit dem Radius der Capillare vergrößert, wofür folgende Erklärung gegeben wurde: Gemäß der Ableitung der Plastizitätsgleichung stellt der Wert φ die Volumproportion der viscosen Phase im System dar. In jedem heterogenen System nähert sich das Phasenverhältnis einem konstanten Wert, wenn die Menge des Systems zu jeder Beobachtung unendlich größer ist als die konstituierende Einheit der Heterogenität. Ähnlich verhält es sich, wenn der Durchmesser der Capillare in seiner Dimension einmal mit der Größeneinheit jeder Phase vergleichbar wird, dann kann das bestimmte φ entweder größer oder kleiner als das sein, das durch eine Capillare erhalten würde, die unendlich weiter als der Durchmesser einer Einheit der dispersen Phase wäre. (Kolloid-Ztschr. 38. 259. London.) LASCH.

Emil Hatschek, *Der scheinbare Anstieg der Viscosität von Ammoniumoleatlösungen bei höheren Geschwindigkeiten*. Bei Unters. einer entarteten Oleatlg. (vgl. S. 2310) ergaben sich Bedingungen, bei denen der Eintritt der Turbulenz direkt sichtbar gemacht werden konnte. Es zeigte es sich, daß die von WO. OSTWALD ausgesprochene Vermutung richtig ist, daß bei der Oleatlg. Turbulenz bei bedeutend niedrigeren Schergefällen eintritt, als bei W. Vf. schränkt dementsprechend die Deutung seiner Vers.-Ergebnisse in Übereinstimmung mit der angeführten Arbeit ein. (Kolloid-Ztschr. 38. 259. London.) LASCH.

L. N. da C. Andrade und J. W. Lewis, *Über das hydrodynamische Verhalten von Ammoniumoleatlösungen*. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. konstruierten einen App. zur Beobachtung der Bewegung einer Fl. zwischen zwei Zylindern. Auf Vorschlag von E. HATSCHEK wurde der App. dazu benutzt, zu entscheiden, warum eine durch längere Scherung entartete *Ammoniumoleatlg.* schon bei viel niedrigeren Schergefällen als W. Abweichungen von dem linearen Verhältnis zwischen Ablenkung und Schergefälle zeigte. — In dem beschriebenen App. wird die Art der Bewegung verfolgt, daß kleine Teilchen von metall. Al der Fl. zugesetzt u. deren Bahnen mit einem Mikroskop beobachtet werden. Es zeigte sich, daß die Stromlinienbewegung bei krit. Geschwindigkeit plötzlich aufhört, u. an ihre Stelle treten stabile, überlappende angeordnete Wirbel. Die Geschwindigkeit, bei welcher in der Oleatlg. Turbulenz eintrat, war immer merklich niedriger als die für eine homogene Fl. aus der Poiseuilleschen berechnete, welche bei W. so genau stimmt. Die krit. Geschwindigkeit änderte sich, wenn die Lsg. mechan. behandelt wurde (vgl. HATSCHEK u. JANE, S. 2310). Während also bei einer homogenen Fl. das Schergefälle, bei welchem Wirbelung eintritt, nur von der kinemat. Viscosität abhängt, beginnt beim Ammonium-

oleat die Wirbelbildung bei einem viel niedrigeren Schergefälle als der kinemat. cosität der Fl. entspricht. (Kolloid-Ztschr. 33. 260—61. Woolwich, Physikal. L. Artillery Coll.)

Wolfgang Ostwald, *Über die Geschwindigkeitsfunktion der Viscosität disperser Systeme*. IV. (II. vgl. Kolloid-Ztschr. 36. 157; C. 1925. I. 2361.) Vf. gibt Hin- auf frühere Arbeiten, deren Vff. zu gleichen oder ähnlichen Schlußfolgerungen gelangte, wie er in dieser Untersuchungsreihe. Besonders zitiert er die Arbeit von DE W. (Journ. Oiland Colour Chemists Assoc. 6. 33 [1923]), dessen Gleichung über Fließen von *Vaseline* auch von F. D. FARROW u. G. M. LOWE (Journ. of Text. Inst. 14. 414 [1923]) bei der Druckviscosimetrie von *Stärkekleister* bestätigt wurde. In einer brieflichen Mitteilung teilte WINSLOW H. HERSCHEL dem Vf. mit, daß seine Gleichung:

$$\mu = \pi g d^4 (P - A)^n / 128 l q$$

mit gutem Erfolg an *Kautschuk-Bzl.-Solen* angewandt hat, worin μ die Reibkonstante u. n eine Zahlenkonstante bedeutet. A ist der Anfangsdruck, bei dem die Fl. zu strömen beginnt, P der Druck, q die Durchflußmenge in der Sek., d u. l Durchmesser u. Länge der Capillare u. $g = 981$ m/Sek. (Kolloid-Ztschr. 36. 243 [1925].) BEHR

Wo. Ostwald und **R. Auerbach**, *Über die Viscosität kolloider Lösungen im laminar-, laminar- und Turbulenzgebiet*. (Über die Geschwindigkeitsfunktion der Viscosität disperser Systeme, V.) (IV. vgl. vorst. Ref.) Die allgemeinste Form der Beziehung zwischen Fließgeschwindigkeit u. treibender Kraft ist in graph. Darst. eine S-förmige Kurve, wobei als Ordinate die Geschwindigkeit als Abszisse die treibende Kraft eingezeichnet scheint. Bei n. Fl. sind bisher nur das geradlinige Mittelstück, das dem Hagen-Poiseuilleschen Gesetz bzw. der typ. laminaren Strömung entspricht u. das bei höheren Drucken u. Geschwindigkeiten auftretende Turbulenzgebiet näher betrachtet. Für viele kolloidale Systeme kommt zum „Turbulenzast“ u. zum Hagen-Poiseuilleschen Gebiet bei kleinen Geschwindigkeiten u. Drucken ein ebenfalls gekrümmter Anfangsteil der Kurve hinzu, der das sogenannte „Strukturgebiet“ kennzeichnet. Für den Strukturast als auch für den Turbulenzast gelten Exponentialgleichungen. Für das Turbulenzgebiet gilt die Beziehung $v = k_1 p^{1/n}$, wobei der Exponent n kleiner als 1 ist, während die Exponentenwerte des Strukturastes, entsprechend der entgegengesetzten Krümmung, größer als 1 sind. Bei geeigneten Vers.-Bedingungen ist das Turbulenz- u. Strukturgebiet rechner. genau so quantitativ definiert wie das Hagen-Poiseuillesche Gesetz. — Es wird das Verhalten kolloider Systeme im Turbulenzgebiet untersucht, um den Turbulenzast auch für kolloide Systeme nachzuweisen u. damit an ein u. demselben System die ganze S-Kurve zu realisieren (vgl. HATZEL u. JANE, S. 2310). — Es wird eine Apparatur beschrieben, welche die Messung von 3 Geschwindigkeitsgebieten strömender Fl. (Strukturast, laminar-, turbulent-) in einem Messungsengang gestattet. Die Grundform ist das von R. AUERBACH beschriebene Röhrenviscosimeter. — Es wird gezeigt, daß bei der benutzten Apparatur (wie auch bei ähnlich gebauten Capillarviscosimetern) typ. turbulente Strömung erzeugt u. gemessen werden kann, wie aus der Konstanz der krit. Reynoldszahl bei sehr verschiedenen Vers.-Bedingungen u. der Gültigkeit des Exponentengesetzes der Turbulenz hervorgeht. Zur Prüfung der Exaktheit u. Definiertheit der Turbulenzbedingungen wurde aus dem Gebiet der laminaren Strömung die absolute Viscosität des W. berechnet u. in befriedigender Übereinstimmung mit den bekannten Werten gefunden. — Der Gang der Messungen wird beschrieben u. die Messungszahlen graph. Darst. für 1%ig. *Gelatine* wiedergegeben. Es werden rechner. u. experiment. Verff. zur Auswertung derartiger u. ähnlicher Messungen entwickelt u. diskutiert. — Sowohl für den früher aufgestellten Satz von der S-förmigen Gestalt der allgemeinen Geschwindigkeit-Druck-Funktion tropfbarer Fl., als auch für die Gültigkeit

mentengesetzes der Turbulenz bei kolloiden Systemen werden Beispiele gegeben. Zwar werden die Kurven von 0,8^o/_oig. *Gelatine*, 2,5^o/_oig. *Quecksilbersulfosalicylat*, *arabicum* in 3 Konz., von einem 1^o/_oig. *Stärkesol* u. von 64,5^o/_oig. *Glycerin* gegeben u. diskutiert. — Die Viscositätsanomalien, die HATSCHKE u. JANE (10) am *Ammoniumoleat* kürzlich beschrieben haben, konnten bis in die Einzelwiedergefunden u. innerhalb der allgemeinen Geschwindigkeit-Druck-Funktionisiert werden. Es zeigt sich, daß außer der n. Turbulenz bei hohen Geschwindigkeiten noch eine „Struktur-turbulenz“ bei diesen Solen existiert, die im Gegensatz zur inneren innerhalb der kleinen Geschwindigkeiten des Strukturgebietes auftritt. Erscheinung wird gedeutet als Zerreißeffect einer elast. Struktur dieser Sole. (Kolloid-Ztschr. 33. 261—80. Leipzig, Physikal.-chem. Inst.) LASCH.

A. de Waele, *Die Änderung der Viscosität mit der Schergeschwindigkeit disperser Systeme*. Die Beziehungen zwischen Schergeschwindigkeit u. Viscosität disperser Systeme wurden in neuerer Zeit von WO. OSTWALD untersucht. Vf. stellt eine Gleichung für diese Beziehungen auf u. führt einen Faktor ein, der die stat. Kraft der Kohäsion darstellt (Anlaßwert von BINGHAM). Der Anlaßwert ändert sich mit der Schergeschwindigkeit u. behält seine volle Größe nur bei Ruhelage des Systems bei. Vf. übt Kritik an der Gleichung von HERSCHEL (vgl. WO. OSTWALD, vorvorst. Ref.), die auf diese Tatsachen keine Rücksicht nimmt. Die Gleichung, die Vf. die dynam. u. stat. Eigenschaften von peptisierten als auch geflochtenen Systemen definiert, lautet:

$$\frac{g^{\pi R^4} \left(P - \frac{f}{eK} \right)}{8V^{\varphi} l} = \left(\frac{P \pi R^4 g}{8V^{\varphi} l} - \frac{\pi R^4 g f}{eK} \right) = \eta.$$

Anlaßwert bei vollständiger Ruhe. (Kolloid-Ztschr. 36. 332—33. 1925.) LASCH.

B. Anorganische Chemie.

F. C. de Baat, *Über die Dithionsäure und ihre Salze*. Vf. stellt die Erdalkalidithionate direkt aus MnO_2 bzw. Fe_2O_3 , SO_2 u. den Erdalkalihydroxyden dar. Aus $BaS_2O_6 \cdot 2H_2O$ wurden durch doppelte Umsetzung mit Sulfaten oder Carbonaten die Dithionate dargestellt, deren Löslichkeit in W. in der Reihenfolge $K_2S_2O_6$, $Na_2S_2O_6 \cdot 4H_2O$, $Na_2S_2O_6 \cdot 2H_2O$, $BaS_2O_6 \cdot 2H_2O$, $CaS_2O_6 \cdot 4H_2O$, $MgS_2O_6 \cdot 6H_2O$, $(NH_4)_2S_2O_6 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ zunimmt. Folgende ternäre Systeme sind untersucht: W.-A.- BaS_2O_6 bei 30°, W.-A.- SrS_2O_6 bei 30°, W.-A.- CaS_2O_6 bei 30°, W.- BaS_2O_6 - $Na_2S_2O_6$ bei 30° u. 20°, W.- BaS_2O_6 - $K_2S_2O_6$ bei 30°, 20° u. 0°, W.- BaS_2O_6 - $Na_2S_2O_6$ bei 30°, 20°, 12° u. 0°, W.- SrS_2O_6 - $Na_2S_2O_6$ bei 30°, W.- SrS_2O_6 - $(NH_4)_2S_2O_6$ bei 30°, S_2O_6 - $(NH_4)_2S_2O_6$ bei 30°, W.- BaS_2O_6 - $(NH_4)_2S_2O_6$ bei 30°. Die Ergebnisse sind zusammengeordnet u. einige Gleichgewichtsdiagramme sind gezeichnet. — BaS_2O_6 zers. sich in H_2SO_4 u. H_2SO_3 ; jedoch vollzieht sich die Zers. bei gewöhnlicher Temp. ziemlich langsam, bei höherer Temp. schneller. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 5. 237—44. Leyden, Univ.) JOSEPHY.

Edmund Brydges Rudhall Prideaux und John O'Neil Millott, *Die Einwirkung von Wasserstoff auf Selen- und Tellurverbindungen*. II. *Tellurdioxyd*. (I. vgl. 1.) Bei der Einw. von wasserfreiem HF-Gas auf TeO_2 bei Zimmertemp. entsteht eine farblose Fl., die im Vakuumexsiccator über $CaCl_2$ u. festem NaOH allmählich weiße Krystalle der Zus. $TeF_4 \cdot TeO_2 \cdot H_2O$ abscheidet. Bei längerem Stehen in TeO_2 im Vakuum verlieren die Krystalle W. u. etwas HF. — HF kann in Ggw. von TeO_2 durch Titration gegen p-Nitrophenol bestimmt werden. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 520—22. Nottingham, Univ.) KRÜGER.

A. H. E. Ayleigh, *Die Natur des aktiven Stickstoffs*. Vf. verweist auf seine frühere Arbeit

(vgl. STRUTT, Proc. Royal Soc. London. Serie A. **86**. 267 [1911]), der zufolge akt. Stickstoff bimolekular wäre. (Nature **117**. 381. Chelmsford.) JOSEPH

E. J. B. Willey, *Die Natur des aktiven Stickstoffs*. (Vgl. vorst. Ref.) In Übereinstimmung mit der Arbeit von STRUTT findet Vf. in Gemeinschaft mit **E. K. Rice**, daß die Bildungswärme von akt. Stickstoff — 43000 cal/g-Mol. beträgt. Daraus folgen, daß akt. Stickstoff nicht atomar ist, sondern ein metastabiles Molekül aufweist, welches ein sehr hohen Energieniveau darstellt. (Nature **117**. 381. Cambridge, Univ.)

A. Balandin, *Komplexverbindungen von Beryllium mit Natriumdicarbonat*. untersucht die Rk. von $\text{Be}(\text{OH})_2$ mit NaHCO_3 in wss. Lsg. Die Löslichkeit von $\text{Be}(\text{OH})_2$ in NaHCO_3 -Lsg. beträgt bei 21° 21,7 g/l, bei 52° 23,9 g/l, bei 55° 18,5 g/l, bleibt zwischen 58 u. 80° annähernd konstant u. fällt dann schroff auf 0 ab. Der treppenförmige Charakter der Löslichkeitskurve wird durch die B. von Komplexverbb. erklärt. Unterhalb 53° bildet sich $\left[\text{CO}_3 \right] \text{Be} \left[\text{OH} \right] \text{Na}_2$, in der die CO_3 -Gruppen durch Na-Valenzen gebunden sind. Beim Erhitzen spaltet die Verb. CO_2 ab. Die Verb. zu zerfallen, gelang nicht. Bei 92° etwa tritt nach hypothet. komplexen Zwischenverbb. ständige Zers. ein, das gesamte $\text{Be}(\text{OH})_2$ fällt aus, Na_2CO_3 wird gebildet, das mit $\text{Be}(\text{OH})_2$ reagiert, u. CO_2 entweicht. (Chem. News **132**. 213—15. Moskau, f. angew. Mineralogie u. Metallurgie.) JOSEPH

J. R. Partington und **S. K. Tweedy**, *Die isomeren Chromichloridhexahydrate*. Vff. messen die Viskosität der wss. Lsgg. der 3 bekannten isomeren Chromichloridhydrate: *Hexaaquochromichlorid*, $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$, violett; *Monochloropentaaquochromichloridmonohydrat*, $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, blaugrün, *Dichlorotetraaquochromichloridmonohydrat*, $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, dunkelgrün. Die Viskositätsmessungen stehen in Einklang mit den Wernerschen Formeln im Einklang, als der größere Kern die größere Viskosität bedingt, was die Experimente bestätigen, während nach Arbeiten von BRIDGMAN (vgl. S. 735) u. BIRK u. BILTZ (vgl. S. 1498) die obigen Wernerschen Formeln auf die Chromichloridhexahydrate anwendbar sind. (Nature **117**. 415. London, London Coll.) JOSEPH

Edward Joseph Weeks, *Bleidihydrid und Bleitetrahydrid*. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London **127**. 1799; C. **1925**. II. 2253 u. S. 2316). Bei Zusatz von Al-Folien zu Alkaliplumbitslg. entsteht ein grauer Nd., der nach dem Waschen mit KOH u. Trocknen über H_2SO_4 in H_2 -Atmosphäre die Zus. Pb_2H_2 besitzt. Die B. des *dihydrids* erfolgt wahrscheinlich nach der Gleichung



Pb_2H_2 oxydiert sich schnell an der Luft u. reagiert zum Unterschied von feinverteiltem Pb lebhaft mit geschmolzenem KNO_3 . Beim Erhitzen im Vakuum zerfällt es in H_2 , beim Erhitzen in H_2 -Atmosphäre wird *Bleitetrahydrid*, PbH_4 , erhalten. (Chem. Soc. London **127**. 2845—46. 1925. London, Battersea Grammar School.)

William Branch Pollard, *Einwirkung von Mercuronitrat auf Goldchloridstoffsäure*. Die Rk. zwischen HAuCl_4 u. $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ in wss. Lsg. bei Ggw. HCl oder Alkalihalogeniden verläuft, auch in großer Verd., nach der Gleichung $\text{HAuCl}_4 + 3\text{Hg}_2\text{NO}_3 + 2\text{HCl} = 3\text{HgCl}_2 + 3\text{HNO}_3 + \text{Au}$. Das durch die vorhan. Elektrolyte geflockte Au besitzt ein hohes Adsorptionsvermögen, z. B. für Fe u. gewisse Farbstoffe; Ggw. kleiner Mengen von Brucin oder von Chinaalkaloiden verhindern die Flockung. In Abwesenheit von Halogeniden wird zur vollständigen Umsetzung des Au viel weniger $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ verbraucht, der Nd. setzt sich schrittweise ab. Bei Zusatz des $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ entsteht in diesem Falle zuerst ein schwarzer, kolloider Nd.; die davon abzentrifugierte Lsg. scheidet beim Erwärmen oder Stehen eine Substanz aus. Dieselbe Substanz bildet sich auch bei der Rk. zwischen HAuCl_4 u. einem Überschuß von HAuCl_4 u. hat etwa die Zus. 63,7% Au; 19,7% Hg.

H₂O; 9,4% O. Der schwarze Nd. ist ein Gemisch von Au u. der braunen Substanz. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 529—32. South Kensington, Royal School of Mines.) KRÜGER.

D. Organische Chemie.

Austin M. Patterson, Sitzungen der Internationalen Nomenklaturkommissionen. Der Bericht über die Ergebnisse dieser Sitzungen. (Ind. and Engin. Chem. 18. -21. Xenia [Ohio].) PFLÜCKE.

E. Zmaczyński, Über ein neues Verfahren zum Bromieren und Jodieren von organischen Verbindungen. Der Nachteil der bisherigen Bromierungs- u. Jodierungsverfahren, daß nur die Hälfte oder ein noch geringerer Bruchteil des Halogens zur Substitution Verwendung findet, wird dadurch vermieden, daß man zu der Lsg. von Alkalibromid bzw. -jodid u. 1 Mol. Alkalibromat bzw. -jodat die zu halogenierende Substanz hinzufügt u. in die Mischung gasförmiges Cl₂ einleitet. Die Salzsäure kann man leicht durch Umsetzung von Alkalilauge mit Halogen in der Hitze entfernen. Die Rk. verläuft dann weiter etwa nach



Man hat sich das Verf. bei *Blausäure*, *Toluol* u. *Aceton*. Die Darst. von *Brom-Jodecyan* kann durch Vermeidung der vorherigen Bereitung des Gemisches von Bromid u. -bromat vereinfacht werden. Man löst äquival. Mengen HCN u. HBr oder deren Salze in W. u. leitet gasförmiges Cl₂ ein. Bei Verwendung der Salze empfiehlt sich Mineralsäurezusatz oder Zusatz von ZnSO₄, um Verharzungen zu vermeiden. — Größere Mengen Brom- bzw. Jodecyan erhält man durch Zusatz äquivalenten Menge H₂SO₄ zu einer Lsg. von KCN oder NaCN u. Halogenierung mit Br oder J. Nach Beendigung der Rk. wird die gleiche Menge Cyanid eingetragen u. 0—5°, Cl₂ eingeleitet, bis eben ein Überschuß auftritt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1910—11. Perm.) HARMS.

H. van de Walle und A. Henne, Über die Einwirkung von Brom auf Chlorjodäthylen. (Vgl. S. 870.) Nach PLIMPTON (Journ. Chem. Soc. London 41. 392 [1881]) wird unter W. befindliches *Chlorjodäthylen* (I.) mit Br₂ *Chlorbromäthylen* (II.) u. ein Gemisch von *Chlordibromjodäthan* (III.) u. *Chlortribromäthan* (IV.). PLIMPTON angenommen, daß II. durch direkten Austausch von J gegen Br entsteht. Wie folgenden Unterss. gezeigt haben, ist diese Annahme nicht richtig. — Zunächst wird I. (Gleichgewicht der cis- u. trans-Form, vgl. S. 870) nach PLIMPTON unter I. CHCl:CHJ II. CHCl:CHBr III. CHClBr:CHJBr IV. CHClBr:CHBr₂ mit Br behandelt u. das Rk.-Prod. nach Trennung vom gebildeten J mit A. dest., die Zers. der Additionsprodd. zu verhindern, bis das Destillat mit W. keine Fällung gab. Aus dem Destillat fällt W. II. (cis + trans), Kp. 75—85°, D.₄¹⁵ 1,7923, Gew. 141,4 (vgl. VAN DE WALLE, Bull. Soc. Chim. Belgique 28. 369; C. 1923. 141). Mit reinem cis- oder trans-I. ist das Resultat infolge Isomerisierung ebenso, es geht nur ca. 13%. Die Ausbeute läßt sich wesentlich verbessern, wenn man bei tieferer Temp. arbeitet, was sich am einfachsten dadurch erreichen läßt, daß man das Rk.-Gefäß in A. vornimmt. Die Lsg. erhitzt sich bis zum Sieden, beim Erkalten fällt J aus. Die Dest. des Rohprod. mit A. liefert 89% II. Arbeitet man wie oben, aber im Dunkeln u. langsam, so beträgt die Ausbeute ca. 70%. Die Erzielung der Ausbeute ist eine Folge der geringeren Addition von Br an das gebildete II. Solcherartiger Additionen vom Sonnenlicht begünstigt werden, ist eine bekannte Tatsache; daß Wärme in demselben Sinne wirkt, ist bisher scheinbar wenig beobachtet worden. Vff. haben nach dieser Richtung noch folgenden Vers. ausgeführt: *Chloräthylen* addiert Br in der Kälte nicht, wohl aber allmählich bei 70° unter B. CHClBr:CHClBr (gleichzeitig starke HBr-Entw.).

Was nun die nicht mit A. übergehenden, im Rückstand befindlichen Additionsprodd. betrifft, so bestehen diese, wenn man ohne besondere Vorsicht bromiert wesentlich aus *Chlortribromäthan* (IV.), Kp.₁₅ ca. 100°, D.₁₅ 2,60, verunreinigt mit etwas J-haltiges Prod. Hat man aber unter den angegebenen Vorsichtsmaßregeln bromiert, so zers. sich die Additionsprodd. bei der Dest. im gewöhnlichen Vak. heftig unter J-Abspaltung. Unter 1 mm erhält man erst IV., dann *Chlordibromäthan* (III.), Kp.₁ 75°, Kp.₁₀ 110°, sehr zersetzlich unter J-Abspaltung. Auf der Dest. dürften sich noch labilere Prodd. gebildet haben, z. B. $\text{CHCl}:\text{CHJ} < \begin{smallmatrix} \text{Br} \\ \text{Br} \end{smallmatrix}$ — III. w.

wie folgt synthetisiert: Zu in Chlf. gel. Dibromäthylen gibt man unter Rückflussmählich in Chlf. gel. ClJ. Nach Abkühlen u. Trennung von etwas J wird mit S. lsg. entfärbt, getrocknet u. dest. Unter at-Druck geht II. über, dann folgt im Vak. IV., Kp.₁₀ 93°, Kp.₇₆₀ 220°, schließlich III., Kp. wie oben, D.₁₅ 2,9858, erstarrt fester CO₂ zu glasiger M. Es haben sich also dieselben 3 Prodd. gebildet wie aus I. u. Br₂. Beide Rkk. müssen daher gleichartig verlaufen. Daß II. durch direkte Substitution aus Dibromäthylen u. Cl entstehen sollte, ist unwahrscheinlich, da sich Cl viel eher anlagern würde. Zweifellos bildet sich aus I. u. Br₂ einerseits, Dibromäthylen u. ClJ andererseits zuerst III.; dieses dissoziiert in der Hitze teilweise in I. u. BrJ, u. das Br des BrJ addiert sich nun an II. zu IV. In der Tat zerfällt III. bei der Dest. unter at-Druck in J, II. u. IV.

Anschließend wurde auch die Dissoziation des *Trichlorjodäthans*, $\text{CHCl}_2\cdot\text{CHCl}_2$, untersucht. Man erhält es aus Dichloräthylen u. ClJ in Chlf. im Sonnenlicht (6 Stdn.). Kp.₉ 77°, D.₁₅ 2,2760, wird bei -60° sehr viscos (vgl. HOWELL, J. Americ. Chem. Soc. **45**. 182; C. **1923**. I. 813). Bei der Dest. unter at-Druck liefert es J, *Dichloräthylen* u. *Tetrachloräthan*, Kp. 145—147°. Es zerfällt also in Dichloräthylen u. ClJ, u. das Cl des letzteren addiert sich an ersteres. (Bull. Acad. Belgique, Classe des sciences [5] **11**. 781—93. 1925. Brüssel, Univ.) LINDENBERG.


H. de Graef, *Über Trimethylpropylmethan und Methyläthylpropylmethan*. CHAVANNE u. DE GRAEF, Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 366; C. **1924**. II. 1. Das schon von MARKOWNIKOW beschriebene *Trimethylpropylmethan* hat Verf. auf anderem Wege dargestellt, um den l. c. bereits angedeuteten Vergleich mit der *i-propylmethan* durchzuführen. Ferner wurde das *Methyläthylpropylmethan* dargestellt u. mit dem *Methyläthyl-i-propylmethan* (l. c.) verglichen.

tert-Butylacetylen. Darst. nach IVITZKY (Bull. Soc. Chim. de France [4] **357**; C. **1924**. I. 2580). Kp. 37,6—37,8°. — *Methyl-tert-butylacetylen*, $(\text{CH}_3)_3\text{C}:\text{C}:\text{C}:\text{H}$. Aus dem vorigen nach dem Verf. von BOURGUEL (Ann. de Chimie [10] **3**. 32. **1925**. II. 715). Kp.₇₆₀ 82,9—83°, D.₁₅ 0,7224, D.₂₀ 0,7176, $n_D^{20,1} = 1,4045$, $n_D^{20,2} = 1,4071$, $n_D^{20,6} = 1,4179$. — *Trimethylpropylmethan*, $(\text{CH}_3)_3\text{C}\cdot\text{C}_3\text{H}_7$. Durch Hydrierung des vorigen in Eg. (+ Pt); mit NaOH, konz. H₂SO₄, H₂SO₄ + HNO₃, NaOH waschen. Kp.₇₆₀ 79,3°, F. -137°, D.₁₅ 0,6780, D.₂₀ 0,6738, $n_D^{20,6} = 1,3799$, $n_D^{20,8} = 1,3820$, $n_D^{20,6} = 1,3866$, T. C. S. (krit. Lösungstemp. in Anilin) = 77,7°, Visc. $\eta_{15} = 0,00401$, $\eta_{30} = 0,00340$. — Für das *Di-i-propylmethan* ist nachzutragen: D.₁₅ 0,6769, T. C. S. = 78,6°, $\eta_{15} = 0,00362$, $\eta_{30} = 0,00315$. — Die beiden Stoffe unterscheiden sich demnach in Kp., F. u. η . — *Methyläthylpropylmethan*. Aus Methyläthylketon u. C₃H₇MgBr. Kp.₇₆₀ 142—143°, D.₁₅ 0,8296, D.₂₀ 0,8200, $n_D^{20,8} = 1,4203$, $n_D^{20,8} = 1,4224$, $n_D^{20,8} = 1,4274$. — Gemisch von Heptenen. Dem vorigen nach dem Verf. von WUYTS. Kp. 95—97,2°. — *Methyläthylpropylmethan*, $\text{C}_2\text{H}_5\cdot\text{CH}(\text{CH}_3)\cdot\text{C}_3\text{H}_7$. Durch Hydrierung des vorigen wie oben. Kp.₇₆₀ 100,5°, D.₁₅ 0,6909, D.₂₀ 0,6868, $n_D^{20,4} = 1,3865$, $n_D^{20,4} = 1,3884$, $n_D^{20,4} = 1,3932$, T. C. S. = 70,5°, $\eta_{15} = 0,00386$, $\eta_{30} = 0,00329$. — Für das *Methyläthyl-i-propylmethan* ist nachzutragen: T. C. S. = 68,1°, $\eta_{15} = 0,00419$, $\eta_{30} = 0,00357$. — Ersatz von i-C₃H₇ durch n-C₃H₇ hat also bewirkt: Erhöhung von Kp. u. T. C. S., Erniedrigung von D., n,



Ähnliches ergibt der Vergleich des Trimethylpropylmethans mit dem *Tri-m-i-propylmethan* (CHAVANNE u. LEJEUNE, Bull. Soc. Chim. Belgique **31**. 98; **22**. III. 241), nur daß der Ersatz von $i\text{-C}_3\text{H}_7$ durch C_3H_7 hier eine Erniedrigung Kp. bewirkt. Von dieser Ausnahme abgesehen, entsprechen die Pentane, Hexane u. Heptane der Regel, daß Ersatz von $i\text{-C}_3\text{H}_7$ durch C_3H_7 den Kp. erhöht. (Bull. Soc. Chim. Belgique **34**. 427—33. 1925. Brüssel, Univ.)

LINDENBAUM.

V. Ledbury und **R. Taylor**, *Über Formaldehyd-Natriumbisulfit und Formalschweflige Säure, ihre Bestimmung und Eigenschaften*. Ziel vorliegender Arbeit war die Wiedergewinnung von HCHO in möglichst konz. Form aus *Formaldehyd-Natriumbisulfit*. Letzteres wurde durch Einleiten von SO_2 in eine wss. Lsg. von Moll. HCHO u. Na_2SO_3 bei 70° bis zu schwach saurer Rk. (Methylorange) bis zum gleichen Vol. A. dargestellt. Das über H_2SO_4 getrocknete Salz verliert $1 \text{ H}_2\text{O}$ u. entspricht der Formel HCHO , NaHSO_3 . Mit J reagiert es in neutraler oder saurer Lsg. nicht, in alkal. Lsg. quantitativ nach der Gleichung:



Es läßt sich so glatt jodometr. bestimmen. — Vermischt man HCHO - u. NaHSO_3 -Lsg. von bekanntem Gehalt miteinander, so läßt sich die B. der Verb. quantitativ bestimmen. Durch direkte J-Titrierung der neutralen oder sauren Lsg. findet man ein freies NaHSO_3 mittels des obigen Hypojodidverf. die Gesamtmengen (frei u. gebunden) HCHO u. NaHSO_3 . Dieser Gesamtjodwert der Mischung muß natürlich dem Gesamtgehalt der ursprünglichen beiden Lsgg. entsprechen. Es hat sich gezeigt, daß bei Zimmertemp. die Verb. auch nach 24 Stdn. noch nicht quantitativ gebildet worden ist. Gegeben bei 70° in wenigen Min. Es wird dann, falls anfänglich einer der Komponenten im Überschuß vorhanden war, von dem anderen nichts mehr gefunden. — Bei der Dest. einer wss. Lsg. von HCHO , NaHSO_3 findet man im Destillat nur minimale Mengen HCHO . Das gleiche ist der Fall, wenn man die Lsg. mit Soda unter Rückfluß kocht u. dann dest. Kocht man die Lsg. mit H_2SO_4 , so entweicht im Anfang SO_2 , doch kommt die Rk. bald zum Stillstand, u. die Unters. der Lsg. zeigt, daß nur mäßige Zers. eingetreten ist. In der Vermutung, daß sich *Formaldehydschweflige Säure* gebildet u. den weiteren Verlauf der Rk. bestimmt hat, haben Vff. die Verb. eingehend untersucht. — Sättigt man eine HCHO -Lsg. bei 70° mit SO_2 , erhält man eine Lsg. von HCHO , H_2SO_3 u. freiem HCHO . Sie reagiert, obwohl SO_3 -frei ist, sauer (Methylorange) u. verhält sich gegen alkal. J-Lsg. wie J , NaSO_3 . Die Acidität rührt von der HCHO , H_2SO_3 her. Man hat für die Best. demnach die beiden Gleichungen:



Man folgert, daß die Normalität der HCHO , H_2SO_3 (ausgedrückt in J) gleich der freien Acidität (ausgedrückt in H) ist. Die Best. der Acidität u. des Gesamtjodwertes der Lsg. muß also den Gehalt an HCHO , H_2SO_3 u. an freiem HCHO ergeben. Dies ist in der Tat der Fall, wie eine Kontrollbest. des freien u. gebundenen HCHO nach dem Bisulfitverf. von RIPPER (Monatshefte f. Chemie **21**. 1079 [1900]) zeigt. — Sättigt man eine HCHO -Lsg. bei gewöhnlicher Temp. mit SO_2 , so erhält man eine Lsg. von HCHO , H_2SO_3 u. freiem HCHO . Man bestimmt letztere direkt jodometr., zieht ihren Säurewert (= dem halben Jodwert) von der Gesamtacidität ab, findet so die auf die HCHO , H_2SO_3 entfallende Acidität. Oder man bestimmt den Gesamtjodwert mit Hypojodit, zieht von ihm den Jodwert der freien H_2SO_3 ab, findet den auf die HCHO , H_2SO_3 entfallenden Jodwert, dessen vierter Teil mit dem nach ersterem Verf. gefundenen Acidität übereinstimmen muß. — Eine Lsg. von HCHO , H_2SO_3 mit freiem HCHO hatte nach 4-std. Kochen unter Rückfluß ihre Zusammensetzung geändert. Bei der Dest. verliert die Lsg. nur kleine Mengen SO_2 ; Destillat und Rückstand enthalten freien HCHO , letzterer etwas mehr als zu Anfang. Eine

see
errata
p. 3977.

Lsg. von HCHO , H_2SO_3 mit freier H_2SO_3 verliert bei der Dest. diese völlig; Dest. u. Rückstand bestehen aus Gemischen von HCHO , H_2SO_3 u. HCHO . Eine kleine Menge gebundener H_2SO_3 ist verloren gegangen. Aus diesen Verss. folgt die Schwierigkeit der Wiedergewinnung von HCHO aus HCHO , NaHSO_3 u. H_2SO_4 infolge Stabilität der HCHO , H_2SO_3 . — Schließlich wurde HCHO , NaHSO_3 mit Na_2CO_3 der trockenen Dest. unterworfen. Beste Temp. 165° . Infolge weitergehender Zersetzung konnten nur ca. 40% HCHO wiedergewonnen werden. — Das eingangs angegebene Ziel ist somit nicht erreicht worden. (Journ. Soc. Chem. Ind. **45**. T 85—89. Heath, Roy. Naval Cordite Factory.) LINDENBAUM

B. L. Vanzetti und **E. Manca**, *Beitrag zur Kenntnis elektrolytischer Prozesse in organischen Chemie. Über die elektrolytische Zersetzung von alkalischem Äthylarsäureäthylester*. Vff. untersuchen die Rk.-Prodd. der Elektrolyse von Ba- u. K-Salzen des d-Weinsäureäthylesters in der Absicht, auf diesem Wege zu neuen Synthesen von Säuren höherer C-Zahl im Mol. zu kommen. Bei der Elektrolyse einer 50%ig. Ba-Salzlsg. mit Pt-Anode u. Ni-Kathode, die beide nur wenige mm voneinander entfernt waren, zwischen denen aber eine dünne Membran ausgespannt war, bei 10 — 16° , einer Stromdichte von 9 Amp./dm², 10 V Klemmspannung nach 1 Stde. Vers.-Dauer wurden neben CO_2 , CO , O_2 sowie unverändertem Ba-Tartrat als Rk.-Prodd. nur Mono- u. Diäthyltartrate erhalten. Die Elektrolyse des K-Salzes, bei der sich im Anodenraum nur K-Äthyltartratlsg., im Kathodenraum 30%ig. K_2CO_3 -Lsg. befand, durch die ein Strom perlte, lieferte auch bei mehrfachem Wechsel der Versuchsbedingungen (Kathode, Anodenlsg., Temp., Stromdichte, Versuchsdauer) außer CO_2 , CO , O_2 , Spuren von Stoffen nur reines K-Bitartrat; im äth. Extrakt der Anodenfl. wurden in der Hauptsache Weinsäuremono- u. diäthylester, ferner ein Gemisch kleinerer Mengen von K-Aldehyd, Acetaldehyd, Ameisensäure, Essigsäure, Ameisensäureäthylester, Essigsäureäthylester festgestellt. In der vom Ä. abgetrennten Anodenlsg. fanden sich freie Weinsäure, K-Tartrat, geringe Mengen Oxalsäure, sehr wenig K-Formiat u. Brenztraubensäure. — Zuckersäure u. Dicarbonsäuren mit 6 C-Atomen, deren Ester oder Salze bei der Elektrolyse nicht gebildet wurden. Die Salze des Weinsäureäthylesters zeigen also bei der Elektrolyse nahezu das gleiche Verh. wie Weinsäure selbst. Vff. halten die Bildung von Zuckersäure bei weiterer Änderung der Versuchsbedingungen keineswegs für unmöglich. (Gazz. chim. ital. **56**. 112—21. Cagliari, Univ.) LEHMANN

Robert Hazard, *Die Reservecellulose*. Die Arbeiten über Lichenin u. Lichensäure werden besprochen. (Rev. Plast. **2**. 73—81.) SÜVELE

Karl Kürschner, *Über Ligninkörper*. (Vgl. Brennstoffchemie **6**. 188; C. **11**. 1349.) Aus der krit. Betrachtung der früheren Unterss. wird gefolgert, daß der Hauptkörper des Lignins sich aus einem polymerisierten, kolloiden Koniferinkörper an den freies Koniferin z. T. adsorbiert ist, zusammensetzt. Diese Anschauung wird durch eine größere Reihe von Gründen im einzelnen gestützt. (Brennstoffchemie **6**. 304—311. 1925. Brünn, Dtsch. Techn. Hochsch.) BÖRNSTEIN

B. Ricca, *Über die Methode Jacquemin zur Herstellung von Cyan*. Das nach der Methode JACQUEMIN durch Zutropfen von KCN-Lsg. zu CuSO_4 -Lsg. hergestellte $(\text{CN})_2$ enthält als Verunreinigungen nicht nur CO_2 , sondern nach Feststellungen Vff. auch HCN. Quantitative Bestst. ergaben, daß das Gas in Vol.-% enthält: 3,0% HCN, 62% $(\text{CN})_2$, 30,0—30,5% CO_2 , 5% Luft. In dem zur Herst. angewandten KCN waren im ganzen nur 2% Cyanate u. Carbonate. Die CO_2 entsteht durch die an sich schwach sauren CuSO_4 -Lsg. Bekanntlich werden in alkal. Lsg. bei Gegenwart von schwachen Oxydationsmitteln, wozu hier auch Kupfersalze gerechnet werden können, Cyanide zu Cyanaten oxydiert. Dieser Vorgang spielt sich jedesmal ab, wenn ein Tropfen der stark alkal. KCN-Lsg. mit der CuSO_4 -Lsg. in Berührung kommt. Durch die bald bemerkbar werdende Wrkg. der sauren Kupferlsg. wird dann i

emacht, die sich sehr schnell hydrolyt. in CO_2 u. NH_3 spaltet. Die Ggw. von NH_3 u. Cu-Lsg. konnte nachgewiesen werden. Die B. von CO_2 u. NH_3 ist um so stärker, je geringer die Acidität der Kupferlsg. ist. Die Methode JACQUEMIN liefert also, abgesehen von der Hälfte CN, die an Cu gebunden wird, höchstens 60—65% der theoret. Menge. (Annali Chim. Appl. 16. 83—88.)

LEHMANN.

B. Ricca, *Über die Aufbewahrung von Cyan im Gaszustand*. Zur Aufbewahrung von CN_2 eignet sich als Sperrfl. am besten eine gesätt. Lsg. von NaCl oder Na_2SO_4 unter Zusatz von 10 ccm konz. HCl auf je 1 l Lsg. Für die Herst. kleiner Mengen des Gases empfiehlt sich nach GAY-LUSSAC die Gewinnung durch Erhitzen einer Mischung von $(\text{N})_2$ u. HgCl_2 ; bei Verarbeitung größerer Mengen dieser Mischung verstopft sich das Zuleitungsrohr durch sublimierendes HgCl_2 . Für die Darst. größerer Mengen wurde daher reines, feingepulvertes u. getrocknetes HgCl_2 angewandt. Das Gas haltene, vollkommen farblose Gas war frei von HCN, enthielt nur geringe Mengen des vom HgO im $\text{Hg}(\text{CN})_2$ herrührten. (Annali Chim. Appl. 16. 89—92. Messina, 1906.)

LEHMANN.

Donald Henry Richardson, *Die Einwirkung von alkoholischem Kaliumhydroxyd auf p-Chlornitrobenzol*. p-Chlornitrobenzol liefert 140 Stdn. mit einer 0,5-n. Lsg. von KOH in 95% acetalddehydfreiem A. auf 60° erhitzt 92% der Theorie an p-Nitrotol (90% an o-Nitrophenol u. in Methylalkohol 96% an p-Nitroanisol). Als Nebenprod. entsteht lediglich Nitrophenol u. kein Dichlorazoxybenzol. Letzteres tritt sofort auf, wenn die Temp. oder Alkalikonz. erhöht wird, ebenfalls wenn der A. ganz acetalddehydfrei ist. Wird die Rk. nach Dichlorazoxybenzol geleitet, so entsteht als Nebenprod. p-Chloranilin. Obwohl die Red.-Kraft des alkoh. KOH durch Verdünnen mit W. verringert wird, fallen die Ausbeuten an Nitrophenol. Die Mengen an Nitrophenol steigen mit steigender Temp. u. Alkalikonz., werden jedoch durch W. nicht beeinflusst. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 522—29. London, Polytechnic.)

TAUBE.

George Malcolm Dyson und Robert Fergus Hunter, *Über die Verwendung des Thionylchlorids für die Synthese organischer Schwefelverbindungen*. (Vgl. DYSON u. HUNTER, Journ. Chem. Soc. London 125. 1702; C. 1924. II. 1915.) Das Thionylchlorid ist zu Synthesen vieler organ. S-haltiger Verbb. sehr geeignet, da es glatt, ohne Nebenprodd. reagiert u. meist gute Ausbeuten liefert. Seine Darst., richtig durchgeführt, ist weder belästigend, noch teuer, falls das zur Red. dienende Sn zurückgewonnen wird. Vff. beschreiben ausführlich ein erprobtes Verf. (Abbildungen im Orig.), nach welchem auch im Laboratorium größere Mengen CSCl_2 bequem hergestellt werden können. — In vorliegender Arbeit wird die Darst. von kernmethylierten aromat. Senfölen u. Thioharnstoffen mitgeteilt (teilweise schon l. c. referiert). — o-Tolylsenföl, $\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{NCS}$. Man rührt 1 Mol. CSCl_2 mit der 8-fachen Menge W. kräftig u. läßt 1. o-Toluidin in der doppelten Gewichtsmenge Chlf. einlaufen (100 g Amin in 100 g Chlf.), rührt noch einige Zeit, extrahiert mit Chlf., trocknet u. fraktioniert. Kp. 239°. — m-Tolylsenföl, $\text{CH}_3\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CS}\cdot\text{NH}_2$. Aus dem vorigen in sd. A. mit NH_4OH (1:1). Nadeln aus 50%ig. A., F. 155°. — s. Di-o-tolylthioharnstoff, $\text{CS}(\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4)_2$. Aus je 1 Mol. o-Tolylsenföl u. o-Toluidin in sd. A. Nadeln aus verd. A., F. 161°. — p-Tolylsenföl, $\text{CH}_3\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CS}\cdot\text{NH}_2$. Aus dem vorigen in sd. A. mit NH_4OH (1:1). Nadeln aus 50%ig. A., F. 155°. — s. Di-p-tolylthioharnstoff, $\text{CS}(\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4)_2$. Aus je 1 Mol. p-Tolylsenföl u. p-Toluidin in sd. A. Nadeln aus verd. A., F. 161°. — m-Tolylsenföl, Kp. 244°, äußerst stark riechend. — m-Tolylthioharnstoff, Nadeln aus verd. A., F. 110°. — s. Di-m-tolylthioharnstoff, Nadeln aus 30%ig. A., F. 111—112°. — p-Tolylsenföl, nach Dest. auf 140° überhitztem Dampf Platten aus Chlf., F. 26°, Kp. 236°, anisartig riechend. — p-Tolylthioharnstoff, Nadeln aus A., F. 182°. — s. Di-p-tolylthioharnstoff, mkr. Prismen aus A., F. 176°. — Die Derivv. der Xylidine u. des ps-Cumidins sind schon l. c. beschrieben. — Dinotromesitylen. Durch Eintropfen von Mesitylen in rauchende HNO_3 (1:1). Hellgelbe Prismen aus A., F. 86°. — Nitromesidin. Aus dem vorigen mit verd. $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ im Autoklaven (160—180°, 8 Stdn.). Schwefelgelbe Nadeln aus verd.

A., F. 74°. — *Nitromesitylen*. Das vorige wird in A. + konz. H_2SO_4 mit Me-
nitrit unter Eiskühlung diazotiert, dann erhitzt. Nach Dampfdest. hell
Krystalle aus A., F. 42°. — *Mesidin*. Aus dem vorigen mit Sn u. HCl. — *Tri-
phenylsenföhl*, Nadeln aus A., F. 63°, angenehm riechend. — *Mesitylthioharnstoff*, Na
aus verd. A., F. 220°. — s. *Dimesitylthioharnstoff*, mkr. Prismen aus A., F. 195.
Aminopentamethylbenzol. Aus Dimethyl-ps-cumidin u. CH_3J (Rohr, 200°, 8 St
Nadeln, F. 150°. — *Pentamethylphenylsenföhl*, Nadeln, F. 86°. — *Pentamethylphenyl-
harnstoff*, Prismen, F. 240°. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 81—85. London, 1926.)
LINDENBAUM

Erich Krause und Herbert Polack, *Reindarstellung des „Triphenyl-
natriums“ und der Verbindungen des Bortriphenyls mit den übrigen Alkalimetallen*.
Das früher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 216; C. 1924. I. 1185) beschriebene Triphenyl-
borylnatrium wurde rein dargestellt u. die Rk.-Prodd. auch sämtlicher anderer Alkali-
metalle mit $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B}$ gewonnen. — Für Darst. von sehr reinem Bortriphenyl
KRAUSE u. NITSCHKE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1261; C. 1922. III. 140) v
eine Methode ausgearbeitet, bei der man die B. des Phenylmagnesiumbromids
weise bei gleichzeitiger Ggw. des Borfluorids vor sich gehen läßt. — Es wird
Apparatur zum Umkrystallisieren luftempfindlicher Körper beschrieben u. das
triphenyl mit Hilfe derselben völlig rein u. schneeweiß erhalten. — *Triphenyl-
natrium*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B} \cdot \text{Na}$, aus Bortriphenyl u. Na in einer N-Atmosphäre, der durch
verdrängt wird (App. vgl. Original); orangegebe, seidig glänzende Nadeln; es
noch 1 Mol. Krystalläther, wenn bei 0° auf 6 mm evakuiert wurde; bei 100° u.
gehen nur ca. 30% des Ä. verloren, vollständig erst oberhalb 180°; das Ä.-freie
ist schwach citronengelb u. nimmt bei gewöhnlicher Temp. wieder Ä. auf unter
Bildung der ursprünglichen Farbe. — Die B. von $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B} \cdot \text{Na}$ erfolgt auch ohne
in Bzl. (darin unl.) u. mit Na-Amalgam mit ca. 2,9% Na anstatt Na. Überschüssiges
reines Hg nimmt beim Schütteln in äther. Lsg. das Na aus dem $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B} \cdot \text{Na}$
ständig heraus. — $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B} \cdot \text{Na}$ ist in Ä. l. mit leuchtend gelber Farbe; in 100 ccm
bei 18° 0,08 g; ist in Lsg. u. fest auch am Licht unverändert haltbar; an der Luft
färben sich die Lsgg. unter Trübung; die feste Substanz wird an der Luft entfärbt
klebrig. Das Oxydationsprod. setzt mit Schwefelsäure, KJ-Lsg. u. Ä. J in Frä-
Gibt mit W. eine von organ. Substanzen getrübe Lsg., die Titanschwefelsäure r
färbt. Die äther. Lsg. gibt mit J in Ä. bei Ausschluß von Luft NaJ u. Bortriphenyl
nach der Gleichung: $2(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B} \cdot \text{Na} + \text{J}_2 = 2(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B} + 2\text{NaJ}$; die Einw. des J
sich quantitativ verfolgen. — *Triphenylmethylchlorid*-Lsg. gibt mit einer Lsg. von
Triphenylborylnatrium Triphenylmethyl u. weiterhin Triphenylmethylnatrium
entsteht auch aus einer fertigen Lsg. von *Triphenylmethyl* mit dem Triphenyl-
natrium. Triphenylborylnatrium u. Triphenylmethyl gibt eine intensive rote Fä-
desgl. mit Triphenylchlormethan. — Triphenylborylnatrium reagiert mit Alky-
geniden, z. B. Bromäthyl, augenblicklich, desgl. mit CO_2 . Seine äther. Lsg. leitet
elektr. Strom. — *Tri-p-tolylbor* verhält sich gegen Na-Metall wie Triphenylbor.
ungesätt. Eigenschaften, die die Fähigkeit geben, sich mit Na zu verbinden, sind
bar nur den typ. arom. Vertretern der Boralkyle eigentümlich; als notwendige
mittler ist das B anzusehen; es zeigt hier einen Valenzüberschuß, der es in auf-
Parallele zum C stellt. — Ist das Bortriphenyl verunreinigt oder spurenweise oxidiert,
so tritt bei der Rk. mit Na neben der Gelbfärbung intensive grüne Farbe auf
triphenyl, das Arylborylhalogenide enthält, gab grüne Krystalle. — *Triphenyl-
lithium*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B} \cdot \text{Li}$; grüngelbe, dreiseitige Pyramiden, aus Ä.; enthält 1 Mol. Krystall-
äther, der ebenso schwer wie von der Na-Verb. abgegeben wird; beim Erhitzen
Vakuum tritt gegen 80° Braunrotfärbung auf, die bei ca. 200° sich in Grünsc-
verändert; ist wesentlich leichter l. als die Na-Verb.; die äther. Lsg. ist braun
wird durch Luftzutritt oder J-Lsg. entfärbt. — *Triphenylboryllithium*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{B} \cdot \text{Li}$

ton heller als der der Na-Verb.; feinkrystallines, schwefelgelbes Pulver; der Ä. im Vakuum bei 180° völlig entfernt; zers. sich an der Luft unter Erhitzung, leb-
 er als die Na-Verb.; das bei langsamem Luftzutritt erhaltene Oxydationsprod.
 et ein weißes Pulver, das von W. nur schwer benetzt wird, in A. klar l. ist; gibt mit
 nschwefelsäure in wss. Aufschwemmung Rk. auf H_2O_2 . — *Triphenylborylrbidium*,
 $(C_6H_5)_3B \cdot Rb$, ähnelt der K-Verb.; Farbe erinnert an Ba-Chromat; verliert bei gewöhn-
 er Temp. im Vakuum fast allen Ä. — *Triphenylborylcäsium*, $(C_6H_5)_3B \cdot Cs$, ähnelt
 Rb-Verb.; ist etwas dunkler gelb; verliert leicht seinen Ä. Zers. sich im Vakuum
 240–250° unter Abspaltung von Bzl. — Die Löslichkeit ist bei der Li-Verb. am
 ten u. nimmt mit wachsendem At.-Gew. des Alkalimetalles ab. — Die Ätherate
 K-, Rb- u. Cs-Verb. können als solche nicht isoliert werden. Die ätherfreien Verbb.
 heller gefärbt; mit Ä. werden die Ätherate zurückgebildet. (Ber. Dtsch. Chem.
 59. 777–85. Berlin, Techn. Hochsch.) BUSCH.

L. Vecchiotti und N. Carani, *Einwirkung von Quecksilberacetat auf 1,2,4-Dichlor-*
n. An einer Reihe der von VECCHIOTTI (Gazz. chim. ital. 54. 422. 55. 372; C. 1924.
 080. 1925. II. 1742) früher hergestellten Verbb. von *Mercuriacetat* u. *p*- u. *o*-Chlor-
n wurde beobachtet, daß, wenn die *p*-Stellung zur NH_2 -Gruppe durch Halogen
 zt ist, die $HgC_2H_3O_2$ -Gruppe immer in *o*-Stellung geht u. umgekehrt, wenn die
 ellung zu NH_2 durch Halogen besetzt ist, die $HgC_2H_3O_2$ -Gruppe immer in *p*-Stellung
 ert. Wenn die *p*-Stellung vom Halogen besetzt ist, lassen sich auch keine Verbb.
 2 $HgC_2H_3O_2$ -Gruppen herstellen; der gleiche Fall liegt auch beim *p*-Toluidin
 Bei den Verbb. mit 2 Mercuriacetatgruppen u. dem Halogen in *o*-Stellung nehmen
 eiden $HgC_2H_3O_2$ -Gruppen vorwiegend die Stellung 4,6 oder 4,5 zur NH_2 -Gruppe
 Vf. stellen eine Verb. von Mercuriacetat u. 2,4-Dichloranilin dar, der sie auf
 d von Konstitutionsbestst. mittels des *Acetylderiv.*, aus dem mit $CaCl_2$ u. Cl_2
 1,2,4,6-Trichloracetanilid gewonnen wurde, die Formel $C_6H_2(NH_2)^1 \cdot (Cl)^{2,4,6}$
 ($HgC_2H_3O_2$)⁶ zuschreiben. Das Hg-Acetat bildet mit un-
 symmetr. Verbb. wie im Falle des 1,2,4-Dichloranilins
 stets Verbb. von symmetr. Struktur. — 6-Hg-Monomercuri-
 acetat-1,2,4-dichloranilin, $C_6H_7O_2NCl_2Hg$, aus Hg-Acetat u.
 Dichloranilin in wss.-alkoh. Lsg., aus A. glänzende Blätt-
 chen, F. 170–171°. — *Hydrat*, $C_6H_2 \cdot (NH_2)^1 \cdot (Cl)^{2,4,6} \cdot (H_2O)^6$,
 aus vorst. Verb. mit KOH, Schuppen, F. 230°, l. in Eg., A., Chlf., wl. in
 ren organ. Lösungsm., unl. in A. u. W. — *Chlorid*, $C_6H_2 \cdot (NH_2)^1 \cdot (Cl)^{2,4,6} \cdot (HgCl)^6$,
 A., Nadeln, F. 193°, ll. in Ä., l. in A., Chlf., Bzl., unl. in W. — *Acetylderiv.*, $C_6H_2 \cdot$
 $(COCH_3)^1 \cdot (Cl)^{2,4,6} \cdot (HgC_2H_3O_2)^6$, F. 283°, bei 260° Schwärzung. — 6-Monomercuri-
 bis-2,4-dichloranilin, $C_{12}H_8N_2Cl_4Hg$, I, aus 1,2,4-Dichloranilin-6-Hg-acetat mit
 ig. $NaHSO_4$ -Lsg., weiße Blättchen aus A., F. 168°, l. in Ä. u. A., unl. in CH_3OH .
 2,4,6-Trichloracetanilid, $C_8H_6ONCl_3$, aus obigem Acetylderiv. Cl_2 u. $CaCl_2$, aus A.,
 ln, F. 203°. (Gazz. chim. ital. 56. 147–52.) LEHMANN.

L. Vecchiotti, *Über die Herstellung der Dijodacetanilide*. I. Mitt. Von den *Dijod-*
aniliden ist durch Arbeiten von WILLGERODT u. ARNOLD (Ber. Dtsch. Chem.
 34. 3346; C. 1901. II. 1206) nur das $C_6H_3 \cdot (NHC_2H_3O)^1 \cdot (J_2)^{3,5}$ bekannt. Vf. stellt
 entsprechende 2,4-Verb. über das 1-Anilin-2,4-di-Hg-Acetat u. dessen Acetyl-
 r. dar. — 1-Acetanilid-2,4-di-Hg-acetat, aus 1-Anilin-2,4-di-Hg-acetat u. $(CH_3COO)_2$,
 20°. — 2,4-Dijod-1-acetanilid, $C_8H_7ONJ_2$, aus vorst. Verb. mit Lsg. von J in KJ,
 A. weiße Nadeln, F. 169°. (Gazz. chim. ital. 56. 152–54.) LEHMANN.

L. Vecchiotti, *Einwirkung von Quecksilberacetat auf o-Toluidin*. Bei Wieder-
 ng der Verss. von SCHÖLLER u. SCHRAUTH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2812;
 12. II. 1626) über die Einw. von Hg-Acetat auf *o*-Toluidin, die in wss. u. methyl-
 u. Lsg. durchgeführt wurden, erhielt Vf. außer einer bei gewöhnlicher Temp. sehr

wenig stabilen u. daher nicht weiter untersuchten Substanz ein *o*-Toluidindimeracetat vom F. 208°, das mit dem von SCHÖLLER u. SCHRAUTH hergestellten nicht ident., sondern dessen Isomeres war. Konst.-Best. durch Behandlung des Acetderiv. mit Cl₂ führte zu einem *Dichlor-o-toluidin*, das nach seinem F. (162—163°) bisher noch nicht bekannt war. Mit Sicherheit steht daher fest, daß in der vorliegenden Hg-Acetatverb. die beiden HgC₂H₃O₂-Gruppen weder die Stellungen 4,6 noch 1,3 einnehmen. Eine Monoverb. mit Hg-Acetat wurde weder in wss. noch in methylal. Lsg. erhalten. — *o-Toluidin-di-Hg-Acetat*, C₁₁H₁₃O₄NHg₂, aus Hg-Acetat in wss. u. *o*-Toluidin, aus A. Nadeln, F. 208°, l. in NH₄OH bei Ggw. von NH₄C₂H₃O₂, in Ä., Bzl. — *Hydrat*, C₇H₉O₂NHg₂, mit 50% ig. K₂CO₃, aus A. weiße Lamellen, F. 211°, l. in Eg., A., Chlf., wl. in Bzl., Lg., unl. in W. — *Chlorid*, C₇H₇NCl₂Hg₂, Nadeln, F. 221° ohne F., — *Bromid*, C₇H₇NBr₂Hg₂, nadelförmige Krystalle, Zers. 232° ohne F. — *Acetylderiv.*, C₁₃H₁₅O₅NHg₂, aus A. weiße Nadeln, F. 219°, bei 214° beginnende Schmelzung. — *Dichlor-o-toluidin*, C₇H₇Cl₂N, Konst. unbekannt, aus dem Acetylderiv. NaCl u. Cl₂, aus A. Nadeln, F. 162—163°. (Gazz. chim. ital. **56**. 155—60. Bolz.)

LEHMAN

Herbert Henry Hodgson und Frederick William Handley, *Untersuchungen über Farbe und Konstitution. I. Der Einfluß der Methylthiolgruppe allein und in Verbindung mit der Methoxygruppe*. 3-Chlor-4- u. 6-nitrophenolmethyläther (HODGSON u. MOORE, S. 2682) geben mit Na-Disulfid die entsprechenden Disulfide u. lassen sich über die Thioäther in 4-Anisidin-2- u. 2-Anisidin-4-methylthioäther überführen. Aus diesen mit Schäffers Salz, R-Salz u. H-Säure hergestellte Farbstoffe wurden auf Wolle mit dem Lavibondschen Tintometer untersucht, sowie die Farbstoffe der Lsgg. der festen Farbstoffe in konz. H₂SO₄ verglichen.



Versuche. 3-Chlor-4- u. 6-nitroanisole geben bei der Red. mit Sn u. HCl 4-Chlor-2-anisidin, C₇H₇ONCl, *Hydrochlorid*, F. 238° u. 2-Chlor-4-anisidin, C₇H₇ONCl, F. 228°. 3-Chlor-4- u. 6-nitroanisole geben in wss. A. mit Na-Disulfid 4- u. 6-nitro-2-anisidin, C₇H₇ONS₂, aus Eg. F. 194° erhitzt 2,2'-Dinitro-5,5'-dimethoxydiphenyldisulfid, C₁₄H₁₂O₆N₂S₂, aus Eg. F. 194° unl. in W., A. u. Bzl., l. in CS₂ u. Eg. In starken Alkalien rötlichviolette Lsg. konz. H₂SO₄ schwach gelbe Lsg. 4,4'-Dinitro-5,5'-dimethoxydiphenyldisulfid, aus F. 194° in Alkalien mit tieferer Farbe l. Die Disulfide geben mit Na-Sulfid 1 u. verd. A. 15 Min. auf dem Wasserbad erhitzt 2-Nitro-5-methoxythioanisole, C₈H₉ONS, aus A. F. 112—113°, in konz. H₂SO₄ rote Lsg. u. 4-Nitro-5-methoxythioanisole, aus F. 79—80°, in konz. H₂SO₄ scharlachrote Lsg. Durch Red. mit Sn u. HCl 2-Anisidin-4-methylthioäther, C₈H₁₁ONS, aus W. F. 44°, ll. in A., *Hydrochlorid*, F. ca. 235°. 4-Anisidin-2-methylthioäther, ein in A. ll. Öl, in konz. H₂SO₄ violette Lsg., *Hydrochlorid*, F. 210—211°. Die Resultate der Farbstoffunterss. sind in Tabellen angeführt. (Chem. Soc. London **1926**. 542—46. Huddersfield, Techn. Coll.)

Moritz Kohn und Gaspar Soltész, *Über ein neues Tribromphenol, das 3,4,5-tribrombenzol und ein neues Tribrom-o-kresol, das 1-Methyl-2-oxy-4,5,6-tribrombenzol*. XVI. Mitt. über Bromphenole. (XV. vgl. KOHN u. ROSENFELD, S. 3142). Bei vorsichtiger Einw. von Brom auf 3,5-Dibromphenol in Eg. entsteht das 3,4,5-tribromphenol. Der Methyläther dieses Tribromphenols, das 3,4,5-Tribromanisole, bei der Nitrierung das 2,6-Dinitro-3,4,5-tribromanisole. Die vorsichtige Bromierung des 4,6-Dibrom-o-kresols (CH₃ = 1) ergibt ein neues Tribrom-o-kresol, F. 106°, aus Analogiegründen die Konst. des 4,5,6-Tribrom-o-kresols (CH₃ = 1) zuzuschreiben ist. Die endgültige Konst. dieses neuen Tribromkresols ist jedoch noch nicht ermittelt.

Versuche. 3,4,5-Tribromphenol, C₆H₃OBr₃, F. 129°, aus 3,5-Dibromphenol durch Bromierung in Eg. unter Kühlung u. Umrühren, eine Stde. stehen lassen, gießen in k. W., kurzsaugige oder dicktaflige Krystalle mit ziemlich starker Doppelbrechung u. rhomboid. Umrissen, triclin pedial, a:b:c = 1,02372:1:0,50166

48' 48'', $\beta = 103^\circ 13' 48''$, $\gamma = 90^\circ 56' 44''$. — 3,4,5-Tribromanisol, $C_7H_5OBr_3$, 0—94°, Kp. 300—310°, aus vorigem mit Dimethylsulfat in alkal. Lsg., prismat. talle aus A. — 2,6-Dinitro-3,4,5-tribromanisol, $C_7H_3O_5N_2Br_3$, F. 127°, aus vorigem ärkster rauchender Salpetersäure unter gelindem Erwärmen, kleine Nadeln aus Ausbeute nahezu theoret. — 4,5,6-Tribrom-o-kresol, $C_7H_5OBr_3$, F. 106°, aus Di-o-kresol u. Brom in Eg. unter Kühlung, dicke Nadeln aus Lg. + PAc. — 4,5,6-rom-o-kresolmethyläther, $C_8H_7OBr_3$, F. 105°, Kp. 320°, aus vorigem u. Dimethylt in alkal. Lsg., dünne Stäbchen aus A. (Monatshefte f. Chemie 46. 245—51. 1, Chem. Labor. der Handelsakademie.) ZANDER.

Moritz Kohn und **Lilly Schwarz**, Darstellung gebromter α -Naphthochinone. f. Mitt. über Bromphenole. (XVI. vgl. vorst. Ref.) Die Bromierung des α -Naphtholäthers liefert Dibrom- α -naphtholmethyläther u. dieser wird von HNO_3 -Brom-1,4-naphthochinon (I) oxydiert. I gibt mit überschüssigem Br bromiert Dibrom-1,4-naphthochinon (II). Tetrabrom- α -naphthochinon (III), welches zuerst BLÜMLEIN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 17. 2486 [1884]) in mangelhaften Ausbeuten h Bromierung von α -Naphthol in Ggw. von Al u. Oxydation mit HNO_3 hergestellt e, läßt sich in wesentlich besseren Ausbeuten gewinnen, wenn man α -Naphthol kleinen Mengen Fe verreibt, mit fl. Br übergießt u. das resultierende Prod. mit H_2O_2 oxydiert. Der F. liegt bei 290°, nicht wie BLÜMLEIN angibt, bei 265°. Mit entsteht aus III 3,6,7-Tribrom-2-oxy-1,4-naphthochinon (IV), mit Anilin außer n. Anilinsalz auch 3,6,7-Tribrom-2-anilido-1,4-naphthochinon (V).



Versuche. α -Naphtholmethyläther liefert in CCl_4 bromiert 2,4-Dibrom-1-methoxynaphthalin, $C_{11}H_8OBr_2$, aus A. F. 54—55°. Die Oxydation mit HNO_3 führt zu 2-Brom-1,4-naphthochinon (I) aus A., F. 132° (korr.). I reagiert mit fl. Br zu 2,3-Dibrom-1,4-naphthochinon (II), aus Eg., F. 218°. α -Naphthol gibt mit wenig Fe-Pulver eben u. mit fl. Br zur Rk. gebracht 2,3,4,6,7-Pentabrom-1-oxynaphthalin, welches HNO_3 2,3,6,7-Tetrabrom-1,4-naphthochinon, $C_{10}H_2O_2Br_4$ (III) liefert, aus Bzl. mit gefällt, F. 290°. III gibt mit KOH u. A. 3,6,7-Tribrom-2-oxy-1,4-naphthochinon, $C_{10}H_2O_2Br_3$ (IV) aus Essigester, F. 253—254°, rotes K-Salz; mit Anilin auf dem Wasser- erhitzt das Anilinsalz, $C_{16}H_{10}O_3NBr_3$, aus A., F. 188—189°. Tetrabromnaphtho- u (III) gibt mit Anilin erwärmt 3,6,7-Tribrom-2-anilido-1,4-naphthochinon, $C_{16}H_{10}O_3NBr_3$ (V) aus Eg., F. 245°. (Monatshefte f. Chemie 46. 317—53. 1925. Wien, der Handelsakad.) TAUBE.

Shin-iti Kawai, Über eine neue Reaktion zwischen Triacetin und Phenol und eine sserte Methode zur Darstellung von Triacetin. Vf. gibt eine neue Darst. von Glycerindiphenyläther. In trockenes Na-Phenolat (3/10 Mol), aus trockenem Phenol stall. Na in absol. alkoh. Lsg. u. Abdampfen des A. im Vakuum hergestellt, wurde 1 Mol Triacetin unter trockener Wasserstoffatmosphäre eingetropft, das Ganze im l stets unter H_2 mehrere Stdn. auf 140—150° erhitzt, die entstandene zähe, gelbe im H_2 -Strom abgekühlt, wobei sie erstarrte, u. das feste Prod. in einer Reibschale u. oder noch besser mit Bzl. extrahiert. Der nach dem Abdampfen des Ä. verbliebene o wurde bei 13 mm bis 197° destilliert u. das stark phenolhaltige Destillat mit viel geschüttelt, wobei die Lsg. infolge hydrolyt. Abspaltung von Essigsäure saure Rk. hm u. sich ein Öl abschied, das alsbald zu farblosen Tafeln erstarrte. Diese wurden

abgesaugt, getrocknet u. aus warmem PAe. umkrystallisiert. F. 81—82°, ll. in meisten organ. Lösungsm., sl. in W. u. k. Lg. Sämtliche Merkmale sprechen dafür, daß hier der bereits von LINDEMAN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **24**. 2147 [1891]) u. RÖSE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **19**. 63. [1886]) auf anderen Wegen hergestellte Gly- α, α' -diphenyläther vorliegt. — Die Darst. von Triacetin nach BÖTTINGER (L. Ann. **263**. 358 [1891]) oder nach PERKIN u. SIMONSEN (Journ. Chem. Soc. L. Ann. **87**. 858 [1905]) leidet an dem Übelstande, daß infolge der Nichtmischbarkeit der Komponenten die Rk. nach Erreichung einer gewissen Temp. explosionsartig heftig setzt, was die Verarbeitung größerer Mengen verbietet. Diese Schwierigkeit läßt folgendermaßen umgehen. 70 g *Glycerin* u. 525 g *Essigsäureanhydrid* werden in Schüttelmaschine bis zur klaren Lsg. geschüttelt, was bei einer Zimmertemp. von nach 2½ Stdn. bei einer solchen von 5° erst nach mehreren Tagen erreicht wird. Die sich erwärmende Lsg. wird einige Stdn. stehen gelassen, danach im Rundkolben Rückfluß 2 Stdn. auf einem Babo gekocht, Essigsäure u. Essigsäureanhydrid ab u. der Rückstand fraktioniert, wobei zwischen 258—259° (756 mm) fast reines *acetin* übergeht. Ausbeute 84% der Theorie. Das Verf. hat einige Ähnlichkeit mit dem der Farbenfabriken vorm. BAYER u. Co. (D. R. P. 347867; C. **1922**. II. (Sci. Papers Inst. Phys. Chem. Res. **3**. 275—78. Tokio, Japan.) GRUNE

Sin-iti Kawai, Über die Darstellung von Brenzcatechin-o-carbonsäure und Kondensation von Brenzcatechin und Glycerin. Bei der Darst. von Brenzcatechin-o-carbonsäure nach PRAXMER (Monatshefte f. Chemie **27**. 1200 [1907]) fand Vf. unter den Nebenprod. der Rk. eine Substanz, die mit dem *Glycerin- α, β -brenzcatechinäther*, $C_6H_4(OH)(OC_3H_5)_2$ von MOUREU (Bull. Soc. Chim. de France **19**. 507 [1898]) ident. war. Durch Änderung der Versuchsbedingungen wurde diese Substanz als Hauptprod. erhalten. 5 g Brenzcatechin, 10 g Kaliumdicarbonat u. 70 g Glycerin wurden im CO_2 -Strom auf ca. 150° erhitzt. Nach dem Abkühlen wurde in HCl gel., die Lsg. mit Ä. extrahiert, der Extrakt mit Kaliumdicarbonatlsg. u. Kalilauge gewaschen, mit Na-Sulfat getrocknet, verdampft, u. der Rückstand aus h. W. u. PAe. umkrystallisiert. Nadeln, F. 89°. Ausbeute 89% vom Brenzcatechin. (Sci. Papers Inst. Phys. Chem. Res. **3**. 275—78. Tokio, Japan.) GRUNE




Sin-iti Kawai, Darstellung des einfachsten Homologen des Urushiols. Es wurde die Darst. u. Unters. der beiden Äthyläther des Brenzcatechins u. ihrer Umlagerungsprod. gegeben, die in naher Beziehung zum Urushiol, dem Hauptbestandteil des Japanlacks, stehen. — Brenzcatechinmonoäthyläther, $C_6H_4(OH)(OC_2H_5)$, Öl, aus Brenzcatechin u. Äthylbromid in Aceton (+ K_2CO_3), Kp._{4,5} 81,2—82,8°, D.₄¹⁵ 1,0898; n._D²⁰ 1,53688. Liefert mit p-Nitrobenzylchlorid Brenzcatechinäthyl-p-nitrobenzyläther, selb. gelbe Prismen, F. 74°, u. lagerte sich beim Erhitzen im Ölbad auf 180—190° um. 3-Allyl-1,2-dioxybenzol u. 4-Allyl-1,2-dioxybenzol. Ersteres gab bei der Methylierung mit Jodmethyl u. nachfolgender Oxydation mit $KMnO_4$ Veratrol-o-carbonsäure, letzteres in gleicher Weise behandelt, Veratrumssäure. Das von den Umlagerungsprodukten niedrigsten sd. 3-Allyl-1,2-dioxybenzol ging bei der Red. mit Platinschwarz u. Wasserstoff über in das von KUROSAWA (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **48**. 1603 [1915]) auf anderem Wege dargestellte 3-Propyl-1,2-dioxybenzol. — Brenzcatechinäthyläther, Kp.₅ 106—107°, als Nebenprod. bei der Darst. des Monoäthyläthers erhalten, liefert beim Erhitzen auf 180—190° ein Gemisch mehrerer Isomeren, aus dem nach der Methylierung u. Oxydation nur die bisher unbekannte 1,2-Dimethoxyterephthalsäure, Nadeln vom F. 213°, isoliert werden konnte, für deren Struktur die Darst. der gleichen Verb. durch Methylierung von 1,2-Dioxyterephthalsäure (v. HEMMELMAYR, C. **1917**. II. 369) den Beweis erbrachte. Die katalyt. Red. des Umlagerungsgemisches mit Platin u. Wasser führte zu keinem Erfolg. Die Ähnlichkeit der beiden durch Umlagerung des Brenzcatechinmonoäthyläthers entstandenen 1,2-Dioxymonoäthylbenzole mit dem Urushiol, das an Stelle des Äthyls nach Arbeiten von R. MAJIMA in 3-Stellung eine Seite

15 C-Atomen enthält, zeigt ihr Erstarren beim Zusatz oxydierend wirkender Katalysatoren wie z. B. Purpureokobaltochlorid u. ihr Verh. beim Zusatz von Alkali zu äth. Lsg., wobei auf Augenblicke eine himmelblaue Farbe auftritt, die alsbald in umschlägt. (Scie. Papers Inst. Phys. Chem. Res. 3. 263—74. Tokio, Japan.) GRU.

P. Bruylants und **L. Mathus**, *Über das Trimere des Crotonsäurenitrils*. *Trimeres Crotonsäurenitril*, $(C_4H_5N)_3$ (I), wurde zuerst von VAN GENECHTEN (Dissert., Löwen 22) aus β -Äthoxybutyronitril u. $AlkMgX$, darauf von DE BOOSERÉ (Bull. Soc. n. Belgique 32. 43; C. 1923. III. 1161) aus β -Chlorbutyronitril u. C_2H_5MgBr , schließlich von BRUYLANTS (Bull. Soc. Chim. Belgique 32. 264; C. 1924. I. 1668) aus β -Dihylaminobutyronitril u. C_2H_5MgBr erhalten. Daneben entsteht immer das Gemisch der beiden stereoisomeren Crotonsäurenitrile. Die Rk. scheint typ. zu sein für substituierte Butyronitrile u. ist wie folgt zu formulieren:

$\cdot CHX \cdot CH_2 \cdot CN + C_2H_5MgBr \rightarrow C_2H_6 + XMgBr + CH_3 \cdot CH \cdot CH \cdot CN \rightarrow (C_4H_5N)_x$
im ersten Stadium gebildete Crotonsäurenitril wird durch C_2H_5MgBr polymerisiert. Hier hat VAN GENECHTEN gefunden, daß sich die Crotonsäurenitrile unter gleichen Bedingungen polymerisieren, u. die Ausbeute an Polymerem steigt bei Anwendung von I_2MgBr auf ca. 60% (bezogen auf die ganze Fraktion Kp. 210—240°). Von dieser Fraktion erhält man aber nur ca. 5% in Form von reinem, aus Bzl. krystallisiertem I (DE BOOSERÉ). Übrigens liefert das höher sd. Crotonsäurenitril überhaupt kein krystallisiertes Prod. Die besten Ausbeuten an I wurden erzielt, als man die Komponenten unter 0° aufeinander wirken ließ, u. betrug pro g-Mol. β -Chlorbutyronitril 7. tiefer sd. Crotonsäurenitril 2,6 bzw. 4,4 g. Es scheint, als ob Organomagnesium- u. zu heftig wirkende Polymerisationsmittel sind. Noch energischer wirken Natrium und Natriumacetat $NaOC_2H_5$ u. liefern Polymerisate, die unter 11 mm erst bei ca. 330° zu destillieren. — I gab bei der Kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in Bzl. für das Trimere stimmende Werte. Es löst sich in ziemlich konz. Mineralsäuren u. wird von W. wieder gefällt, weder saure noch bas. Eigenschaften u. reagiert nicht mit HNO_2 . Es verbraucht 1/2 Mol. Br_2 unter HBr -Entw. u. liefert die Verb. $C_{12}H_{14}N_3Br$, F. 130—131°, l. in A., unl. in W. I enthält demnach keine Doppelbindung. — Wenn man I mit HCl eindampft u. den Rückstand mit Ä. behandelt, so bleibt die 1N-Atom enthaltende Menge NH_4Cl zurück, u. aus der äth. Lsg. gewinnt man die Säure $C_{11}H_{15}N_2 \cdot H$, aus Bzl., F. 108—109°, ll. in A., zl. in Bzl., Chlf., zwl. in Ä. Ausbeute ca. 30%. Sie liefert mit $KMnO_4$ (= ca. $2O_2$) in Sodalslg. bei 35—40° die Säure $C_{10}H_{15}N(CO_2H)_2$, in verd. A., F. 178—179°, ein Ergebnis, das vorläufig schwer zu erklären ist. Man pflegt man dagegen dieselbe einbas. Säure mit HNO_3 (D. 1,30) ein u. reinigt die getrennte Säure über das Ca-Salz, so erhält man die Säure $C_{10}H_{18}O_4$ oder $C_{10}H_{20}O_4$, warzenförmige Kryställchen aus W., F. 195°.



Bzgl. der Konst. von I nehmen Vff. angesichts der Indifferenz der Verb. $3CN$ -Gruppen an, obwohl dieselben nicht gleichzeitig verseift werden. I u. die obigen Säuren entmischen demnach die Formeln erhalten: $C_9H_{15}(CN)_3$, $C_9H_{15}(CN)_2(CO_2H)$, $C_9H_{15}(CN)(CO_2H)_2$, $H_{16}(CO_2H)_2$ bzw. $C_8H_{16}(CO_2H)_2$. Denkt man sich, was bei dem gesätt. Charakter I am nächsten liegt, 3 Moll. Crotonsäurenitril zu einem Hexamethylenring konvertiert, so kann eine Verb. der Formel II. oder III. entstehen. Gegen diese Formeln



sich allerdings einwenden, daß sie kein für den Ersatz durch Br bevorzugtes Heftigkeitsmerkmal erkennen lassen, u. daß Moll. dieser Art eigentlich leicht oxydabel sein sollten. Vorherseits erscheint die Annahme nicht gewagt, wenn man an die B. der Dicroton-VIII. 1.


säure (IV., $X = \text{CO}_2\text{H}$) aus Crotonsäureester unter dem Einfluß von Alkohol denkt. Die B. eines Trimeren (entsprechend II. oder III.) würde die Wanderung von H erfordern u. dürfte sich daher weniger leicht vollziehen. — Besonders bemerkenswert ist das Verh. des *Vinylacetonitrils* im Vergleich zu dem der Crotonsäurenitrile, das unter denselben Bedingungen von AlkMgX zu Dicrotonsäurenitril (IV., $X = \text{CO}_2\text{H}$) kondensiert wird (BRUYLANTS u. GEVAERT, Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 9. 27; C. 1923. III. 1263). Warum liefert einerseits Crotonsäurenitril Dimeres, andererseits Vinylacetonitril kein Trimeres? Die erste Frage kann wohl nur mit der Empfindlichkeit der Crotonsäurenitrile gegen kondensierende Agentien beantwortet werden. Die zweite Frage ist damit zu erklären, daß Vinylacetonitril von AlkMgX bekanntlich leicht zu Crotonsäurenitril isomerisiert wird, u. daß dieses sich mit unverändertem Vinylacetonitril nun leicht zu Dicrotonsäurenitril kondensieren kann. Mit demselben Reagens liefert also Crotonsäurenitril Trimeres u. höhere Kondensate, Vinylacetonitril, obwohl es sich zu Crotonsäurenitril isomerisiert, wesenlos Dimeres. Es ist übrigens möglich, daß das von BRUYLANTS u. GEVAERT angegebene Polymerisationsprod. vom F. gegen 150° aus Vinylacetonitril unreines I gewesen ist. Es sei noch bemerkt, daß Verbb. der Formel II. oder III. in mehreren cis-trans-Isomeren auftreten können. — Als Nebenprod. bei der Darst. von I aus tiefer sd. Crotonsäurenitril entsteht in äußerst geringer Menge *Diäthylpropenylcarbinol*, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{C}(\text{OH})\text{CH}=\text{CH}_2$, Kp. $150\text{--}154^\circ$, angenehm, etwas stechend riechend. Man isoliert es aus Ä.-Extrakt vor der Dest. durch Abblasen mit Dampf. (Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 11. 636—53. 1925.) LINDENBAUM

A. de Coster, Beitrag zum Studium der Einwirkung der Organomagnesiumverbindungen auf die Nitrile. Benzoylcyanid. (Vgl. MATHUS, S. 1961; VELGHE, S. 87; frühere Arbeiten.) Benzoylcyanid (u. wahrscheinlich auch andere α -Ketonitrile) reagiert mit Organomagnesiumverbb. nach Schema I., mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ außerdem nach Schema II. (Rk. von BLAISE-MOUREU):




Es verhält sich also einerseits wie Säurechloride, andererseits wie α -Aminonitrile. Benzoylcyanid (vgl. BRUYLANTS, Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 10. 126. 392; C. 1924. II. 336. 2457). — Mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$: *Triphenylcarbinol*. — Benzyl-MgCl: *Dibenzylphenylcarbinol*, aus A., F. $86\text{--}87^\circ$. — Mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$: 1. Rohprod. krystallisiert teilweise. Die Krystalle sind das *Ketiminhydrocyanid*, $\text{CO}\cdot\text{C}(\text{:NH}, \text{HCN})\cdot\text{C}_2\text{H}_5$, Blättchen aus Bzl., F. $117\text{--}119^\circ$, entstanden aus dem Rohprod. nach II. mit W. u. dem vom $\text{CN}\cdot\text{MgX}$ nach I. gelieferten HCN . Gibt mit Gas in Ä. das *Ketiminhydrochlorid*, F. $137\text{--}139^\circ$. — 2. Das ölige Hauptprod. ist *Diäthylphenylcarbinol*, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$, Kp.₁₅ $111\text{--}113^\circ$, D.₂₀⁴ 0,9831, $n_D^{20} = 1,5182$. (Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 11. 661—65. 1925.) LINDENBAUM

J. Geurden, Beitrag zum Studium der Einwirkung der Organomagnesiumverbindungen auf die Nitrile. Ketocyanhydrine. Die Einw. von Organomagnesiumverbindungen auf Ketocyanhydrine hat bereits GAUTHIER (C. r. d. l'Acad. des sciences 152. 1259) beschrieben. Ohne seine Verbb. analysiert zu haben, hat er angenommen, daß die Einw. von BLAISE unter B. von tertiären Ketonalkoholen erfolgt:



Dagegen sprechen erstens die niedrigen Kpp. der Verbb., zweitens der Umstand, daß sie nicht nochmals mit Organomagnesiumverbb. reagieren, obwohl sie doch zu Pinakonen liefern müßten. Es hat sich denn auch herausgestellt, daß die vermeintlichen Ketonalkohole GAUTHIERs tertiäre Alkohole sind, daß also auch bei den Ketocyanhydrinen lediglich das CN gegen das Radikal der Organomagnesiumverb. ausgetauscht wird.


d, wie bei den α -Amino- u. α -Ketonitrilen u. beim Cyanameisenester (vgl. vorst.). Da in einigen Fällen unter den Rk.-Prodd. auch das dem Cyanhydrin zugrunde liegende Keton aufgefunden wurde, so verlaufen die Rkk. hier wahrscheinlich wie folgt:



zwei Fällen von aliphat. Organomagnesiumverb. wurden auch sehr geringe Mengen tertiären Ketonalkoholen erhalten (einen ähnlichen Fall vgl. vorst. Ref.).


Versuche. Acetoncyanhydrin. Mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$: 1. *tert*-Amylalkohol, 102–103° (Hauptprod.). 2. 2-Methyl-2-oxypentan-3-ol, $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH}) \cdot \text{CO} \cdot \text{C}_2\text{H}_5$, 154°, D.₂₀ 0,9326. Ausbeute ca. 7%. Semicarbazone, F. 129°. — Methylketoncyanhydrin. Mit CH_3MgBr : 1. Methyläthylketon. 2. *tert*-Amylketon. Ausbeute 74%. 3. Wahrscheinlich 3-Methyl-3-oxypentan-4-ol, $(\text{CH}_3)(\text{C}_2\text{H}_5) \cdot \text{H} \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3$. Semicarbazone, F. 140°. Wegen zu geringer Ausbeute nicht analysiert. Mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$: Methyläthylphenylcarbinol, Kp.₂₀ 105–107°. Ausbeute 72%. — Methylpropylketoncyanhydrin. Mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$: Methylpropylphenylcarbinol, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$, Kp.₁₄ 112°. Ausbeute 64%. — Butyroncyanhydrin. Mit MgBr : 1. Butyron. 2. Dipropylphenylcarbinol, Kp.₂₀ 130°. Ausbeute 65%. — Benzyl-MgCl: 1. Butyron. 2. Dipropylbenzylcarbinol, Kp.₁₃ 144°. Ausbeute 75%. l. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 11. 701–10. 1925. Löwen, Univ.) LB.

Alan Francis Titley, Die Bildungsbedingungen von an die o-, m- und p-Stellung Benzolkerns angefügten Ringen. II. Die Reduktion von m- und p-Phenylendiacetonitril. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 121. 1562; C. 1923. I. 81) VON BRAUN, PF u. GARN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 98; C. 1920. I. 286) haben aus m-Phenylendiacetonitril durch Red. mit Na ein sekundäres Amin der Formel I erhalten. Bei Zers. des quartären Dimethylammoniumhydroxyds haben sie dann weiter ungesätt. KW-stoff II u. durch Red. III erhalten. Bei Nachprüfung seitens des Verfassers stellte sich heraus, daß I als β -m-Tolyläthylamin (VII) u. der ungesätt. KW-stoff als m-Methylstyrol (IX) anzusprechen sind. — Hierzu teilt v. BRAUN mit, daß er seit einiger Zeit die oben angeführten Verss. wiederholen konnte, u. dabei zu Ergebnissen gekommen sei, die identisch sind mit den in der Arbeit enthaltenen. — Die Red. des m-Phenylendiacetonitrils (I. c.) gibt nicht bas. Anteil des Reaktionsprod. m-Tolylacetonitril (IV) u. m-Xylol (V), das. Teil m-Phenyl- β, β' -diäthylamin (VI) u. VII. IV gibt mit Na u. A. ebenfalls Ausbeuten von 50% VII, der Rest wird zu V reduziert. VII reagiert leicht mit Natrium, u. das Kondensationsprod. gibt mit CH_3J u. nachfolgender Zers. mit verd. A. m-Tolyläthylmethylamin (VIII). Das quartäre Methyljodid von β -m-Tolyläthylamin liefert leicht Trimethylamin u. liefert m-Methylstyrol (IX), welches mit Br das Diäthyl X bildet. Die Red. von p-Phenylendiacetonitril mit Na u. A. liefert 50% p-Tolyläthylamin neben reichlich p-Xylol. Ersteres gibt mit HNO_2 β -p-Tolyläthylamin. Ferner analog wie oben β -p-Tolyläthylmethylamin sowie p-Methylstyrol.



Versuche. Aus *o,o'*-Dibrom-m-xylol vom F. 76° mit KCN in verd. alkoh.

u. nachfolgende Verseifung keine Änderung in den opt. Eigenschaften erlitt. — der Einw. des zur Verseifung angewandten alkoh. Kalis scheint intermediär das irlich akt. β -Truxinsäurephenylimid entstanden zu sein, das dann zur ebenfalls t. Anilidsäure aufgespalten werden mußte:



de an Stelle des Anilins eine zur Phenylimidbildung ungeeignete Base verwendet, te das Inaktivwerden ausbleiben: die durch Verseifung mit alkoh. KOH aus Menthyl- β -truxinsäuremethylanilid gewonnene β -Truxinmethylanilidsäure war opt.-akt.; eigte gegen Erwartung Rechtsdrehung, ist aber trotzdem als l-Säure zu bezeichnen; en Umkehrungen des Drehsinns begegnet man bei Aniliden u. Amiden dieser Gruppe s. Die l-Methylanilidsäure gab über ihr Chlorid dasselbe β -Truxinsäuredimethyl- d wie die inakt. Methylanilidsäure, womit festgestellt ist, daß die β -Truxinsäure lich eine unspaltbare, innerlich kompensierte Form darstellt.


Versuche. β -Truxinsäureanhydrid, $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_3$, aus 1 Teil β -Truxinsäure mit il Acetanhydrid bei 110—120°; rhomb. Krystalle, aus Bzl., F. 116°. — β -Truxin- lestersäure, $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}_4$, aus dem Anhydrid mit sd. absol. A.; aus Bzl., F. 133°; l. in Ä., wl. in Bzl., unl. in Lg.; Ca-Salz: unl. in h. W. Wird durch h. 10%ig. Sodalsg. k. alkoh. Kali verseift. — Amid der Äthylestersäure, aus der Säure in Bzl. mit Thionyl- id + NH_3 ; aus Bzl., F. 141°. — β -Truxinmethylestersäure, F. 164°. — i-Propyl- säure, F. 84°; l. in h. Lg. — Die Estersäuren werden auch durch h. NH_3 nicht ver- ; beständig gegen k. Sodalsg.; beim Erhitzen damit wird die Methylestersäure er verseift als die Äthylverb. — β -Truxinamidsäure aus dem Anhydrid in Bzl. NH_3 ; Na-Salz: aus h. Sodalsg., Blättchen; mit HCl, aus 50%ig. A., F. 194°; l. in Ä. Eg., unl. in Bzl. — Gibt mit alkoh. KOH (2-stdg. Erhitzen) β -Truxinsäure + längeres Erhitzen mit 10%ig. HCl (1½ Std.) völlige Verseifung zur β -Truxinsäure, . durch sd. Eg.; ebenso in Eg. + Salpetrigsäuregas bis zur Grünfärbung + W. — mit HCl in absol.-alkoh. Lsg. den Äthylester, in Eg. + U_2O_3 die Äthylestersäure. — Amidsäure gibt bei ihrem F. erhitzt β -Truxinimid, F. 224—225°. — β -Truxin- amidsäure, $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_3\text{N}$, aus dem Anhydrid + 30%ig. Lsg. von Äthylamin; aus A., F. 168° (Zers.); l. in A., h. Eg., unl. in Lg. — β -Truxinanilidsäure, aus β -An- id in Bzl. + Anilin; aus verd. A., F. 210° (Zers.) bei raschem Erhitzen; l. in A., n Ä.; Na-Salz: Blättchen. Gibt bei langsamem Erhitzen das Phenylimid, F. 184°. Säure gibt ein in k. u. h. W. fast unl. Ba-Salz. — Verseifung läßt sich außer über litrosoverb. sehr schwer herbeiführen. Gibt mit sd. alkohol. KOH ein swl. K-Salz; längeres Erhitzen mit Eg. gibt sehr wenig β -Säure, in der Hauptmenge das Phenyl- — In Eg. + N_2O_3 + W. entsteht Nitrosoanilidsäure, F. 170—175°, die sich in ig. KOH rasch zers.; HCl fällt dann β -Truxinsäure aus. — β -Truxinmethylanilid- , $\text{C}_{25}\text{H}_{23}\text{O}_3\text{N}$, mit N-Monomethylanilin; gibt mit Sodalsg. ein gallertartiges Na- Säure, aus verd. A., F. 188—188,5°; l. in A., swl. in Ä. Ist schwer verseifbar. — Truxinmenthylestersäure, $\text{C}_{28}\text{H}_{34}\text{O}_4$, aus β -Anhydrid + l-Menthol auf dem Wasser- ; Nadeln, aus A., F. 208°; l. in Aceton, Ä., wl. in h. Lg.; $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = -20,88^\circ$ (in n); l. in w. NH_3 u. verd. Sodalsg.; NH_4 - u. Na-Salz sind gelatinös; wird nicht ft durch sd. Sodalsg., dagegen mit h. 15%ig. alkoh. KOH zu β -Truxinsäure. — ben entsteht die leichter l. l- β -Truxinmenthylestersäure, $\text{C}_{28}\text{H}_{34}\text{O}_4$, Nadeln, aus A., F. 149°; ll. in Ä., Aceton, sl. in A., l. in h. Lg., daraus langsam ausfallend u. n der d-Säure zu trennen. Gibt mit NH_3 u. Sodalsg. ein wl. NH_4 - bzw. Na-Salz; mit alkoh. KOH zur β -Säure verseift; $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = -37,34^\circ$ (in Aceton). — Anilid Estersäure, aus der Estersäure + Soda zur Trockne verdampft, in Bzl. + Thionyl- d + Anilin; Nadeln, aus verd. A., F. 171°; $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = -63^\circ$; Abspaltung des molrestes durch w. 15%ig. alkoh. KOH u. B. der inakt. Anilidsäure vom F. 210°. — ylanilid-d-menthylester, B. ebenso mit N-Methylanilin in sd. Toluol; Nadeln, aus

A., F. 108—109°; l. in Ä., A., Bzl.; $[\alpha]_D^{21} = -22,89^\circ$ (in Aceton). Verseifung ergab die akt. rechtsdrehende *l*- β -*Truxinmethylanilidsäure*, $C_{25}H_{23}O_3N$, Blättchen, aus verd. A., F. 167—168° bei raschem Erhitzen, sonst, vielleicht wegen eintretender Racemisierung erst bei 182—185° geschm.; $[\alpha]_D^{21} = +15,98^\circ$. — Das *Dianilid* $C_{32}H_{30}O_2N_2$ entsteht aus der akt. u. aus der inakt. Methylanilidsäure in h. Bzl. mit Thionylchlorid u. N-Methylanilin; Krystalle, aus verd. A., F. 180°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 641 bis 649. Rostock, Univ.)

BUSCH


K. Alb. Vesterberg und **H. D. Nöjd**, *Über Lupeylen, ein neues, gut krystallisierendes Triterpen*. Vorl. Mitt. *Lupeol* ist im Pflanzenreich etwa ebenso verbreitet wie die Amyrine (vgl. LIEBIGS Ann. **428**. 246; C. **1922**. III. 1007); besonders kommt es mit diesen zusammen in Milchsäften vor. Die Vermutung, daß es nur C_{30} enthält, wurde durch Verss. von NÖJD bestätigt. — *Lupeol*, hergestellt aus Bresk, gibt mit PCl_5 in PAe. unter Abspaltung von W. einen KW-stoff *Lupeylen*, $C_{30}H_{48}$, F. 171 bis 174°; ist nach krystallograph. Unters. von G. BESKOW nicht ident. mit β -Amyrilen, dem es sonst sehr ähnelt. — Weitere *Triterpene* finden sich wahrscheinlich im *Dammarharz*. Das von ZINKE u. UNTERKREUTER (Monatshefte f. Chemie **3**. 867; C. **1919**. III. 12) dargestellte β -*Dammaroresen*, $C_{30}H_{48}$, ist ein Gemisch mehrerer Verbb. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 660—61. Stockholm, Högskola [Univ.])

A. Tschitschibabin und **P. Ssergejew**, *Über einige phenylierte Derivate des *o,o'*-Ditolyls*. In der Absicht, den KW-stoff I herzustellen, sollte das Glykol II aus *Diphenensäuredimethylester* u. *Phenylmagnesiumbromid* bzw. durch Einw. von Metallen auf die dem Glykol entsprechenden Halogenide (VI) erhalten werden. Die Reindarstellung, jedoch waren die Ausbeuten unbefriedigend. Noch schlechter waren sie bei Einw. von Phenyl-MgBr auf *o,o'*-*Dibenzoylbiphenyl*. Als Hauptprod. der Rk. bildete sich eine Verb., die nach den Analysen ein *Ketocarinol* sein konnte, die aber mit einem Überschuß an Phenyl-MgBr nicht weiter reagierte u. die gewöhnlichen Ketonreaktionen nicht zeigte. Eine Verbesserung war dagegen die Einw. von C_6H_5MgBr auf *Diphenensäureanhydrid* u. besonders auf das *Dichlorid*. Das Keton ließ sich nach TSCHITSCHIBABIN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **44**. 441 [1911]) glatt zum KW-stoff IV reduzieren. Dagegen gelang die Überführung in die Dihalogenide VI nicht. Es entstand dabei das cycl. Anhydrid V, das schon SCHLENK u. BRAUNS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **4**. 716 [1915]) erhalten hatten, das bei Red. denselben KW-stoff IV lieferte, der durch Red. des Glykols entstand.



Versuche: *Glykol II*, $C_{38}H_{30}O_2$, Krystalle vom F. 252—53°, ll. in konz. H_2SO_4 mit intensiv roter Farbe. Aus h. A. krystallisiert die Verb. gewöhnlich mit Krystallalkohol: $C_{40}H_{36}O_3$. Auch aus der konz. Chlf.-Lsg. eines unreinen Glykols wird durch die Krystallalkoholverb. in Nadeln erhalten. (Beste Reinigung.) Ausbeuten: aus 10 *Diphenensäuredimethylester* 1—1,5 g, dagegen aus 4 g *Diphenensäuredichlorid* 3,3 g. *o,o'*-*Dibenzhydridiphenyl*, $C_{38}H_{30}$ (IV), durch Red. von II mit HJ. Nadelchen oder Blättchen aus Bzl. + Lg., F. 236—237,5°, zwl. in A. u. Bzl., fast unl. in Lg. Färbt sich nicht mit konz. H_2SO_4 u. ist darin unl. — *Anhydrid des Glykols* (V), aus diesem mit Acetylchlorid. Körnige Krystalle, wl. in A. u. Ä., F. 290—92°. — Das zur Dar-


1 o-o'-Dibenzoyldiphenyl dienende *ms*-Dioxydiphenyldihydrophenanthren ließ sich gegen den Angaben von WERNER u. GROB (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 2887 [1904]) lt aus W. umkrystallisieren. Das o,o'-Dibenzoyldiphenyl schm. nach dem Umkrystallisieren aus Aceton + A., bei 172—73° (W. u. G., l. c., 166—67°). Das Hauptd. der Rk. mit C_6H_5MgBr , den Analysen u. der Mol.-Gew.-Best. nach die Verb. (IV), d aus Chlf. durch Fällen mit A. in rhomboedr. Krystallen erhalten, die Krystallchlf. halten u. an der Luft verwittern: $C_{32}H_{24}O_2 + CHCl_3$, F. 193—94°. Bei niederen npp. fallen die Krystalle auch ohne Chlf. aus. Dagegen fallen aus h., möglichst iz. Lsgg. in Essigester auf Zusatz von A. krystallalkoholhaltige Prismen aus: $H_{24}O_2 + C_2H_6O$. Verss., ein Oxim oder Phenylhydrazon zu erhalten, waren völlig glos. Mit großem Überschuß an C_6H_5MgBr bildete sich eine wl. Mg-haltige Komverb., die auch nach anhaltendem Kochen mit sehr viel C_6H_5MgBr nicht weiter gierte. — Aus der Rk.-Mutterlauge ließ sich neben II das Stereoisomere des Ausgangspinakons vom F. 202—04° erhalten (ident. mit dem zweiten Pinakon $C_{26}H_{20}O_2$ u. WERNER u. GROB). Die Rk. verläuft wohl nach:



phenyl ließ sich in größeren Mengen isolieren. Aus 10 g *Dibenzoyldiphenyl* wurden 9 g Magnesiumkomplex erhalten, daraus 6—7 g Substanz von der Zus. des Ketobinols u. außerdem je 1 g des Glykols II u. des isomeren Pinakons. (Ber. Dtsch. m. Ges. 59. 654—60.)

HARMS.

Edward de Barry Barnett und **Marcus Aurelius Matthews**, *Über 1,5-Dichlor-9-phenylantracen*. Von dem Gesichtspunkt ausgehend, daß das Vorhandensein einer C_5 -Gruppe in einer der meso-Stellungen des Anthracens einen seiner Natur nach gegengesetzten Einfluß geltend macht, wie Halogenatome in α -Stellung, die einen gehenden Einfluß auf die Reaktivität der meso-Stellungen des Anthracens ausn, wurden die Eigenschaften einer Verb. untersucht, in der diese beiden, in ihrer geg. entgegengesetzten Gruppen gleichzeitig vorhanden waren. — Das Verh. von I weist, daß meso-Substitutionsrkk. in der Anthracenreihe wahrscheinlich nur dann reiten, wenn eine Brückenbindung vorhanden ist, wie bei II. — Beim 1,5-Dichlor-phenyl-9-bromanthron ist der stabilisierende Einfluß der α -Cl-Atome als vorherrschend annbar, obwohl ihm der Einfluß der C_6H_5 -Gruppe entgegenwirkt. Auch bei der l. von I ist der überwiegende Einfluß der Cl-Atome zu erkennen. Der noch größere fluß der Cl-Atome im 1,5-Dichlor-9-phenylantracen ergibt sich aus der Stabilität Additionsverbb. — Ob das durch Anlagerung von Cl an die Brückenbindungen standene Dichlorid die cis- (VII) oder die trans-Konfiguration VIII besitzt, konnte t entschieden werden. Die Doppelnatur, die es in seinen Eigenschaften offenbart, die Annahme nahe, daß es beim Erhitzen oder unter dem Einfluß von Reagenzien



n Wechsel in seiner Konfiguration erleidet, der dadurch bedingt sein kann, daß bei meso-H-Atom eine Tendenz besteht, in einen der beiden Seitenringe hinüber

zu wandern, u. die Rückwanderung des H-Atoms in die meso-Stellung dann vorzugsweise so vor sich geht, daß die beiden Cl-Atome nunmehr die am wenigsten behinderte trans-Stellung zueinander einnehmen.

Versuche. 1,5-Dichlor-9-phenylanthron, $C_{20}H_{12}OCl_2$ (I), aus 1,5-Dichlor-9-bromanthron in h. Bzl. + $AlCl_3$; farblose Nadeln, aus Toluol, F. 245°. Zeigt nur geringe Tendenz zur Enolisierung. — 1,5-Dichlor-9-phenylanthranzylacetat, $C_{22}H_{14}O_2Cl_2$ (II), aus I mit Pyridin u. Essigsäureanhydrid auf dem Wasserbade; gelbe Nadeln, aus Eg. u. A., F. 167°. — 1,5,9-Trichlor-9-phenylanthron, $C_{20}H_{11}OCl_3$ (III), aus II + Cl in CCl_4 + etw. J; farblose Krystalle, aus Chlf. + Lg., F. 195°. — I wird von Cl nicht angegriffen. — 1,5-Dichlor-9-brom-9-phenylanthron, $C_{20}H_{11}OCl_2Br$, aus II in CS_2 + Br; aus Chlf. + Lg., F. 171°. Entsteht aus I mit Br in sd. Eg. Ist stabiler als das 9-Bromanthron; wird durch sd. wss. Aceton nur langsam hydrolysiert. Gibt in sd. Xylol mit Cu-Pulver I. — 1,5-Dichlor-9-nitro-9-phenylanthron, $C_{20}H_{11}O_3NCl_2$ (IV), aus II in Eg. + konz. HNO_3 (D. 1,42) bei 60°; farblose Nadeln, aus Chlf. + Lg., F. 140° (Zers.). — 1,5-Dichlor-9-oxy-9-nitrophenylanthron, $C_{20}H_{11}O_4NCl_2$ (VI), aus I + sd. konz. HNO_3 (1,42); aus Eg. F. 270°. Gibt bei der Oxydation 1,5-Dichloranthrachinon. — 1,5-Dichlor-9-oxy-9-phenylanthron, $C_{20}H_{12}O_2Cl_2$ (V), aus I in sd. Pyridin + Chromsäure; farblose Nadeln, aus Eg., F. 224°. Entsteht auch aus II in sd. Eg. + konz. HNO_3 (D. 1,42). Durch Kochen mit 1 Mol. HNO_3 (D. 1,42) in Eg. wird I unverändert zurückgewonnen. — 1,5-Dichlor-9-acetoxy-9-phenylanthron, $C_{22}H_{14}O_3Cl_2$, aus Dichlorbromphenylanthron in sd. Eg. u. Na-Acetat; farblose Krystalle, aus Bzl., F. 254°. — 1,5-Dichlor-9-phenylanthracen, $C_{20}H_{12}Cl_2$, aus I mit Zn-Staub in sd. Eg. + konz. HCl ; gelbe Nadeln, aus Aceton oder Methyläthylketon, F. 104°. — 1,5-Dichlor-10-brom-9-phenylanthracen, $C_{20}H_{11}Cl_2Br$, aus Phenyldichloranthracen + Br in sd. Eg.; gelbe Nadeln, aus Eg. F. 174—175°; B. auch in k. CCl_4 + Br. — 1,5,9,10-Tetrachlor-9-phenyl-9,10-dihydroanthracen (9-Phenyl-1,5-dichloranthracen-9,10-dichlorid), $C_{20}H_{12}Cl_4$ (VII oder VIII), aus I in CCl_4 + Cl; farblose Krystalle, aus Bzl. + Lg., F. 175° (Zers.). — Gibt bei 200°, bis sich kein HCl mehr entwickelt, 1,5,10-Trichlor-9-phenylanthracen, $C_{20}H_{11}Cl_3$, citronengelbe Nadeln, aus A., F. 96°. — Beim Erhitzen in einem indifferenten Lösungsmittel gibt das Dichlorid harzige Prodd. — 1,5-Dichlor-9-phenyl-10-anilinoanthracen, $C_{26}H_{17}NCl_2$ (XI), aus VII mit Anilin in Chlf.; gelbe Nadeln, aus A. + Methyläthylketon, F. 194°, färbt sich vorher dunkel. — 1,5-Dichlor-9-phenyl-10-dimethylaminanthracen, $C_{28}H_{21}NCl_2$ (XII), aus VII mit N-Dimethylanilin in sd. Chlf.; gelbe Nadeln, aus Pyridin + A., F. 232°. — 1,5-Dichlor-9-phenyl-9,10-dioxy-9,10-dihydroanthracen, $C_{20}H_{14}O_2Cl_2$ + C_3H_6O (IX), aus VII + $CaCO_3$, Aceton u. W. bei Siedetemp.; farblose Platten, aus wss. Aceton, F. 164° (Zers.); gibt CHJ_3 -Rk. u. mac. auf KJ J frei; verliert bei 93° das Aceton; besitzt wahrscheinlich die cis-Konfiguration. — 1,5-Dichlor-9-phenyl-9,10-dimethoxy-9,10-dihydroanthracen, $C_{22}H_{18}O_2Cl_2$ (X), aus VII mit sd. CH_3OH ; farblose Nadeln, aus Pyridin + A., F. 210°. — 1,5-Dichlor-9-phenyl-9,10-diäthoxy-9,10-dihydroanthracen, $C_{24}H_{22}O_2Cl_2$ (X), B. mit A.; aus Pyridin + A., F. 201°. — Daneben entsteht als Hauptprod. 1,5-Dichlor-9-phenylanthranzyläthyläthylanthron, $C_{22}H_{16}OCl_2$ (XIII), aus verd. A., gelbes Krystallpulver, F. 124°. — 1,5-Dichlor-9-phenyl-9-acetoxy-10-nitro-9,10-dihydroanthracen, $C_{22}H_{15}O_4NCl_2$ (XIV), aus Phenyldichloranthracen in Eg. mit 1 Mol. konz. HNO_3 (D. 1,42) bei 70—80°; aus Bzl. u. Lg., F. 171° (Zers.). Sehr stabil, unverändert durch sd. Pyridin; Addition danach in cis-Stellung vor sich gegangen u. nur geringe Tendenz zu einem Konfigurationswechsel vorhanden. — 1,5-Dichlor-9-phenyl-9-äthoxy-10-nitro-9,10-dihydroanthracen, $C_{22}H_{17}O_3NCl_2$, aus XI mit sd. A. + H_2SO_4 , farblose Nadeln, aus abs. A., F. 200°. Das Rohprod. enthält anscheinend freie Oxyverb. — Die Einw. von HNO_3 auf das Phenyldichloranthracen führt unter gewissen Bedingungen anscheinend zu einer isomeren Nitroacetoxyverbindung vom F. 189°; stabil gegen sd. Pyridin. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 670—79. London 1890.)







Stanley Horwood Tucker, *Jodierung in der Carbazolreihe*. (Vgl. STEVENS u. TUCKER, Journ. Chem. Soc. London **123**. 2140; C. **1923**. III. 1523.) KJ u. KJO₃ wirken in Eg. auf Carbazol unter B. von 3-Jodcarbazol ein, als Nebenprod. entsteht 3-Jodcarbazol. Die Angaben von CLASSEN (D. R. P. 81929 [1894]) sind zu berichtigen, 3-Jodcarbazol zeigt F. 202—204° u. ist wahrscheinlich 3,6-Dijodcarbazol. 9-Methyl-9-äthylcarbazol geben wie oben jodiert die 3-Jodverb. neben den Dijodderiv. 9-Methylcarbazol reagiert mit KJ u. KJO₃ langsam zu dem 3-Jodderiv. 9-Toluol-p-methylcarbazol reagiert nur unvollständig u. 9-Acetylcarbazol überhaupt nicht. Von 1-Jodderiv. konnte nicht beobachtet werden.

Versuche. In Eg. gel. Carbazol gibt mit KJ u. KJO₃ 10 Min. gekocht 3-Jodcarbazol vom F. 192—194° u. im Filtrat 3,6-Dijodcarbazol, C₁₂H₇NJ₂, F. 202—204°. Essigsäureanhydrid hieraus 3,6-Dijod-9-acetylcarbazol, C₁₄H₉ONJ₂, F. 224—225°. Trennung der beiden Jodderiv. läßt sich auch über die Benzoylderiv. erreichen. 3-Jod-9-benzoylcarbazol, C₁₅H₁₁ONJ₂, aus Pyridin, F. 204—205°, swl. in Aceton u. 3,6-Dijod-9-benzoylcarbazol, C₁₅H₁₂ONJ₂, aus Aceton F. 145—146°, ll. in Aceton. 3-Jodcarbazol, p-Toluolsulfochlorid u. KOH geben in Aceton 10 Min. erhitzt 3-Jod-9-toluol-p-methylcarbazol, C₁₉H₁₄O₂NJS, aus A., F. 170—171°, ll. in Pyridin, Aceton, Bzl., Eg., n. PAe. u. A. 9-Toluol-p-sulfonylcarbazol gibt mit J u. HNO₃ in Eg. 10 Min. gekocht 3,6-Dijod-9-toluol-p-sulfonylcarbazol, C₁₉H₁₃O₂NJ₂S, aus viel Eg., F. 257°. 9-Methyl- u. 9-Äthylcarbazol geben wie oben jodiert neben wenig 3-Jod-9-methylcarbazol 3-Jod-9-äthylcarbazol, C₁₃H₉NJ₂, aus Aceton F. 181—182°, ll. in Eg., swl. in A. Neben wenig 3-Jod-9-äthylcarbazol vom F. 83—84°. 3,6-Dijod-9-äthylcarbazol, C₁₃H₉NJ₂, aus Eg. u. A., F. 152—153°, swl. in Eg. u. A. Ferner aus 3-Jodcarbazol, 3-Jod-9-äthylcarbazol u. KOH 3-Jod-9-i-propylcarbazol, C₁₅H₁₄NJ, aus Eg., F. 95—97°. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 546—53. Glasgow, Univ.) TAUBE.

Gino Carrara und Ernst Cohn, *Über ein Pseudocatechin*. Das durch Einw. von HCl auf Tetramethylcatechin gewonnene Prod. bezeichnen die Vff. im Gegensatz zu KOSTA u. MAC MAHON u. RYAN (Proc. Royal Irish Acad. **36**. 47. 149) als ein *Pseudocatechin I*, da es bei weiterem Abbau zum Zwecke der Konst.-Best. ein von dem natürlichen Catechin *II* abweichendes Verh. zeigt. Die reduktive Spaltung nach KOSTA u. RYAN des durch Abspalten von HCl mit Pyridin erhaltenen Anhydroderiv. *III* liefert, wie FREUDENBERG beim n. Catechin fand, ein α,γ -Diphenylpropan *IV*, sondern ein Prod. von Formel *V*. In dem Pyronring hat sich eine Umstellung der Substituenten vorgenommen, auf Grund deren die so veränderten Verb. als ps-Catechinverb. bezeichnet werden. Das Wesen der Umlagerung konnte durch Abbauverss. nicht geklärt werden. Grundsynthet. Verss. werden 2 Theorien aufgestellt: 1. Annahme der Umwandlung des Chromanringes in einem Cumaranring, die von vornherein schon durch die Eigenschaften bei den Cumaranverb. unbekannten Oxoniumsalze unwahrscheinlich erschien. Kondensation von Homoveratrumsäurenitril mit Phloroglucintrimethyläther nach KOSTA u. RYAN führte nicht zu dem Kostaneckischen Red.-Prod. *V*, u. eine Kondensation Dimethylphloracetophenonnatrium mit Veratrylbromid ergab 2 verschiedene Prodd., wovon die oben gemachte Annahme die B. eines d,l-Tetramethyl-ps-catechins oder eines Epicatechins verlangte. Durch Verss. bewiesen ließ sich die 2. Annahme, nämlich der Veratrylring von α nach β im Pyronring gewandert ist. Durch Kondensation Dimethylacetylphloroglucinaldehyds mit Homoveratrumaldehyd wurde ein β -substituiertes Oxoniumsalz *VI* erhalten, welches sich leicht zu Tetramethyldesoxy-ps-catechin (*V*) reduzieren ließ.

Pseudocatechinchlorid, aus d-Tetramethylcatechin mit PCl₅, weiße, an der Luft zerfallende Krystalle, F. 110—112°. — Verss. zur Red. des Chlorids: mit Zn u. HCl aus CH₃OH Verb. C₁₀H₂₂O₆, F. 129—131°, $\alpha_{16}^{578} = +48,18^\circ$. — Äthyltetramethyl-ps-catechin aus vorst. Verb., F. 123°. — Trimethyldiacetyl-ps-catechin, C₂₀H₂₂O₆.

aus den Mutterlaugen der Krystallisation der Tetramethylverb. mit $(\text{CH}_3\text{COO})_2$ Pyridin, F. 99—100°, $\alpha_{16,6}^{578\mu} = -10,25^\circ$. Red. mit SnCl_2 u. HCl gab eine unl. Ver. mit SnCl_2 , Na-Amalgam oder Mg lassen das Prod. unverändert; Red. nach ROSE MUND mit Pt in Xylol führt zu strohhalmähnlichen, glänzenden Krystallen von F. 125—126°. Einw. von PCl_5 auf d- u. auf l-Tetramethylcatechin liefert das gleiche




Rk.-Prod. — *Pentamethyl-ps-catechin*, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_6$, aus Tetramethyl-ps-catechinchlorid mit CH_3OH , F. 78,5°. — *Tetramethylacetyl-ps-catechin*, $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{O}_7$, aus obigem Chlorid mit K-Acetat u. Eg. Krystalle aus A. oder CH_3OH , F. 151°, $[\alpha]_{17,5}^{578\mu} = +20$. — *Oxoniumsalz des Tetramethylanhydro-ps-catechins*, $\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{O}_5\text{Cl}$, aus der Tetramethylverb. mit gesätt. Lsg. von HCl in Ä., rotviolette Nadeln aus wss. HCl , F. 123—124° aus konz. HCl hellrote Krystalle, die wahrscheinlich 1 Mol. HCl enthalten; aus dem Rückstand der äth.-wss. Lsg. wurden mit A. Krystalle vom F. 117°, wahrscheinlich unreines *Äthyltetramethyl-d,l-ps-catechin* erhalten. — *Desoxytetramethyl-ps-catechin*, $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{O}_5$, wird durch Red. von *Tetramethylanhydro-ps-catechin* nach DRUMM in Abwesenheit von Mineralsäuren in nur sehr kleiner Menge neben unverändertem Ausgangsprod. u. einer aus A. in grünlichen, faserigen Nadeln krystallisierenden Ver. $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{O}_7$, F. 174°, erhalten, bei Ggw. von 2 Tropfen konz. HCl dagegen verläuft die Rk. fast quantitativ unter B. von Desoxytetramethyl-ps-catechin, das ferner durch Red. des Oxoniumsalzes vom *Tetramethylanhydro-ps-catechin* mit Pt u. H_2 entsteht aus A. kleine weiße Nadeln, F. 134°.

Veratrylalkohol, mit Pt u. H_2 , aus dem Aldehyd, Kp._{0,3} 135—138°. Kondensation von *Veratrylbromid* u. Na-Salz vom *Dimethylphloracetophenon* lieferte als Rk.-Prod. weiße tafelförmige Krystalle vom F. 118°, wahrscheinlich ein *Hydroxycumarinderivat*, $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{O}_6$, u. hellgelbe Nadeln vom F. 148°, wahrscheinlich *Veratryldimethylphloracetophenon*, $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{O}_6$, 2,4,6-Trimethoxyphenyl-3,4-dimethoxybenzylketon, $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{O}_6$, 3-Homoveratrum säurenitril u. Trimethylphloroglucin mit wenig Hg , ZnCl_2 u. g. in wässrigem HCl , F. 110°. — β -2,4,6-Trimethoxyphenyl- α -3,4-dimethoxyphenylpropylketon, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_6$, aus vorst. Verb. mit Mg u. CH_3J , Öl im Vakuum, Kp. 200—230°, aus konz. HCl , F. 88°. — β -2,4,6-Trimethoxyphenyl-3,4-dimethoxyphenylpropan, $\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{O}_6$, aus vorst. Verb. mit Pt u. H_2 , F. 65—66°. — *Homoveratrumaldehyd*, Kp._{0,6} 126—127°. — *Acetyldimethylphloroglucinaldehyd*, aus Dimethylphloroglucinaldehyd mit Pyridin u. $(\text{CH}_3\text{COO})_2$, F. 102°. — 5,7-Dimethoxy- β -3,4-dimethoxyphenylbenzopyrylchlorid, aus Acetyldimethylphloroglucinaldehyd u. Homoveratrumaldehyd mit HCl in Ä., rotviolette Nadelchen aus konz. HCl , violette Nadeln aus verd. HCl , F. 123°. — 5,7-Dimethoxy- β -3,4-dimethoxyphenylchroman (*Tetramethyldesoxy-ps-catechin*), $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{O}_5$ (V), aus vorst.

verb. mit H_2 u. Pt in Eg, aus 95%ig. A. F. 134°. (Gazz. chim. ital. **56**. 134—47. ruhe, Techn. Hochsch.)

LEHMANN.


Hanns John, *Chinolinderivate*. IV. Verbindungen des 2-Phenyl-4-methylchinolins. (vgl. S. 2587.) Die Unters. behandelt die Kondensationen mit Aldehyden; 2-Phenyl-4-methylchinolin reagierte mit Formalin bei 86% Ausbeute durch Erhitzen im Einrohr auf 130° zu [2'-Phenyl-4'-chinolyl]-propandiol-(1,3) (I). Bei Verwendung



von Paraformaldehyd stieg die Ausbeute auf 93%. Durch CrO_3 wird die Verb. zu 2-Phenyl-4-methyl-6-methoxychinolin u. Formaldehyd entsteht bei 160—70° mit 97% Ausbeute [2'-Phenyl-6'-methoxy-4'-chinolyl]-propandiol-(1,3). 2-Phenyl-4-methylchinolin gibt mit Acetaldehyd bei 200—210° 2-Phenyl-4-propenylchinolin (61% der Theorie), mit überreichem Benzaldehyd 2-Phenyl-4-styrylchinolin (55% der Theorie). Zusatz von H_2SO_4 verhinderte die Kondensation. Analog entstanden bei 240—50° 2-Phenyl-4-propenyl-6-methoxychinolin (54% d. Th.) u. bei 200—210° 2-Phenyl-4-6-methoxychinolin (53% d. Th.). — Dagegen war unter den angewandten Bedingungen mit Par-, Propion-, i-Butyr-, i-Valeryl-, Önanth-, o- u. p-Nitrobenz-, inobenz-, p-Dimethylaminobenz-, p-Toluy-, Cumin-, Phenylacet-, Zimt-, Salicylaldehyd, sowie mit Vanillin, Piperonal u. Furfurol keine Kondensation zu erzielen. (Mitbearbeitet von **Viktor Fischel**.) [2'-Phenyl-4'-chinolyl]-propandiol-(1,3), $C_{18}H_{17}O_2N$, Nadeln aus A., F. 163,5°. Ll. in A., Eg., Bzl., weniger in Ä., u. h. W. Chlorhydrat, $C_{18}H_{18}O_2NCl$, perlmutterartig glänzende Blättchen vom F. 113°, Pikrat, Blättchen aus A., F. 113°, Tartrat, Sulfat u. Nitrat sl. — [2'-Phenyl-6'-methoxy-4'-chinolyl]-propandiol-(1,3), $C_{19}H_{19}O_3N$. Nadelchen aus A., F. 93°. Ll. in u. absol. A., Ä., Bzl. u. h. Chlf. Sulfat in W. u. verd. H_2SO_4 ll. — 2-Phenyl-4-6-methoxychinolin, $C_{18}H_{15}N$, Prismen aus 80%ig. A., F. 54°, ll. in verd. u. absol. A., Ä., Chlf., CCl_4 u. Bzl. Chlorhydrat gelbe Prismen, Sulfat u. Nitrat ll., Pikrat, Nadeln, F. 207°. — 2-Phenyl-4-propenyl-6-methoxychinolin, $C_{19}H_{17}ON$, Krystalle aus A., F. 123°; ll. in A., Ä., Chlf., CCl_4 u. Bzl. Chlorhydrat gelbe Prismen, Sulfat u. Nitrat gelbe Nadeln, Pikrat gelbe Plättchen. — 2-Phenyl-4-styrylchinolin, $C_{23}H_{17}N$, Nadeln aus A., F. 102°, ll. in A., Ä., Chlf., CCl_4 , Bzl., weniger in Eg. Addiert wie die 13 Verbb. die berechnete Menge Br. Chlorhydrat, Sulfat, Nitrat u. Hg-Doppelsalz gelbe Nadeln, Pikrat, Prismen, F. 268°, wl. in A. — 2-Phenyl-4-styryl-6-methoxychinolin, $C_{24}H_{19}ON$, Prismen, F. 140°. Löslichkeit wie oben. Chlorhydrat (wl. in konz. H_2SO_4), Nitrat, Hg-Doppelsalz gelbe Nadeln, Nd. mit J-KJ in schwefelsaurer Lsg. violette Nadeln. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 722—26. Dtsch. Hyg. Inst.


HARMS.

Lantz und A. Wahl, *Über eine neue Synthese des Phenylrosindulins*. Es war schon bekannt, daß sich in dem vor kurzem (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1509; C. **1925**. 16) beschriebenen 2-Oxy-1,4-naphthochinondiphenylimid das OH, da der Chinonbenachbart, durch große Beweglichkeit auszeichnen würde. Der Vers. hat dies bestätigt. Wenn man die Verb. langsam in auf 160—180° erhitztes, mit etwas Benzoesäure oder $ZnCl_2$ (als Katalysator) versetztes Anilin einträgt u. gleichzeitig — zur Vermeidung der nachteiligen Wrkg. des sich bildenden H — lebhaft Luft durchbläst, bis eine Lösung mit konz. H_2SO_4 eine grüne Färbung liefert, so erhält man Phenylrosindulin:




Es ist schon nach einer Krystallisation rein, u. das Rohprod. gibt durch Sulfonieren sofort ein sehr reines Azocarmin. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 705—08.) LINDER

V. Moucka und C. Rögl, *Über die Kondensation von Salicylsäureamid und aromatischen Aldehyden mit verzweigter Kohlenstoffkette*. Die bisher nur mit arom. bezw. Acetaldehyd unternommene Kondensation von Salicylsäureamid wurde mit *i*-Butyl- u. *i*-Valeraldehyd ($[\alpha]_D^{18} = 0,82^\circ$) ausgedehnt. Bei Ggw. von HCl-Gas entstanden Verbb. vom Typus der Metoxazone (I), da sie mit FeCl₃ keine Phenolgaben u. in wss. Alkalien völlig unl. waren. Diese Verbb. ($R = CH(CH_3)_2$ u. $CH_2CH(CH_3)_2$) ließen sich mit Pyridin u. konz. Alkalien in die *syn*-Derivv. des *i*-Butylid- bezw. *i*-Valeralsalicylamids (II) überführen, die beim Erhitzen oder Schmelzen offen durch intramolekulare Umlagerung wieder in Metoxazone übergingen. Wurden letztere mit CrO₃ oxydiert, so nahmen sie ein O auf u. gingen in *N*-Derivv. des *i*-Butyryl- bezw. *i*-Valerylsalicylamids (IV) über, die auch durch direkte Einw. von *i*-Butyryl- bezw. *i*-Valerylchlorid auf Salicylsäureamid entstehen, wobei sich zunächst die Ä.-unl. Chlhydrate bilden. Die *anti*-Alkylidensalicylamide (III) entstanden durch Erhitzen von Salicylsäureamid mit den Aldehyden im Einschlußrohr. Sie zeigten starke Phenolgaben ließen sich jedoch nicht in die Metoxazone überführen. Durch Erhitzen mit wss. Alkalien ließen sich alle, bis auf die amorph. *anti*-Derivv., krystallisiert erhalten. Verbb. in ihre Komponenten zerlegen.




Versuche. *2*-*i*-Propyl-1,3-benzometoxazin-4-on, C₁₁H₁₃O₂N, Nadeln aus 80% A., F. 105,5—106,5°, ll. in konz. A., Bzl., Eg. u. Pyridin, unl. in k. W. u. PAe. *2*-*i*-Butyl-1,3-benzometoxazin-4-on, C₁₂H₁₅O₂N, prismat. Nadeln aus 70% ig. A., F. bis 99,5°. Ausbeute 70—75% der Theorie. Ll. in A., Aceton, Essigsäureanhydrid, Bzl., Chlf. u. Pyridin, weniger ll. in k. Ä., swl. in h. PAe. u. W., unl. in k. PAe. k. W. — *syn*-*i*-Butylidensalicylamid (II), C₁₁H₁₃O₂N. Nadelchen aus A., F. unschl. 152—60°, da die Verbb. kurz vor dem Schmelzen in Metoxazone übergehen dürfte. Ll. in Chlf. u. Pyridin, wl. in k. Ä., Bzl. u. konz. A., unl. in PAe. u. W. Mit FeCl₃ intensive Rotfärbung. — *syn*-*i*-Valeralsalicylamid, C₁₂H₁₅O₂N, feine, verfilzte Nadeln aus 95% ig. A., F. 153—59°. Mit FeCl₃ tiefviolette Färbung. Ll. in Chlf., Bromoform u. Pyridin, wl. in k. Bzl., swl. in k. Ä., unl. in W. u. PAe. Die frisch gefällte amorphe Substanz ist in allen Lösungsmitteln bedeutend leichter l. als die krystalline. — *anti*-*i*-Butylidensalicylamid, C₁₁H₁₃O₂N, amorphes Pulver, F. 145—60°. Mit FeCl₃ intensive Rotfärbung. Ll. in Chlf., Eg. u. Pyridin, unl. in W. u. PAe. — *anti*-*i*-Valeralsalicylamid, C₁₂H₁₅O₂N, amorph, erweicht bei 120°, bei ca. 130° geschmolzen. Mit FeCl₃ rotviolette Färbung. — *N*-*i*-Butyrylsalicylamid, C₁₁H₁₃O₃N. Feine Nadeln aus 70% A., F. 110—11°, mit FeCl₃ tiefviolette Färbung, sl. in Alkalien. — *N*-*i*-Valerylsalicylamid, C₁₂H₁₅O₃N, Nadeln. F. 126—126,5°. Sl. in Alkalien. Mit FeCl₃ Rotfärbung. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 756—62. Wien, Univ.) HARM

Sven Bodforss, *Über ein isomeres Benzalphenylhydrazon*. In dem Bestreben, die früher als Zwischenprod. bei der Umsetzung von Phenylhydrazin mit Benzaldehyd angenommene Verb. (C₆H₅NH·NH)₂·CH·C₆H₅ zu erhalten, wurde die Einw. von Benzalchlorid auf Phenylhydrazin untersucht. Der vermutete Rk.-Verlauf



ließ sich aber nicht realisieren. Als Hauptprod. entstand α -Benzalphenylhydrazon, daneben in wechselnden Mengen ein Isomeres, als γ -Benzalphenylhydrazon, bezeichnet. Da Vf. die Existenz der von LOCKEMANN u. LUCIUS (Ber. Dtsch. Chem. Ges.

[1913]) angezweifelte β -Verb. für wahrscheinlich hält. Die γ -Verb. unterscheidet sich von der α -Verb. vor allem durch die Löslichkeit. 100 ccm 95%ig. A. lösen bei 24° 2 g α - u. 2,080 g γ -Verb. Die FF. sind ganz oder fast ganz ident. (157—158° für α -Verb., 154—155° für γ -Verb.). Dagegen bleibt die γ -Verb., die in stark gelben, zu spitzen Nadeln krystallisiert, am Licht auch nach tagelanger Sonnenbestrahlung unverändert. Bei längerer Aufbewahrung an der Luft wird die γ -Verb. außerdem der Braunfärbung zers. Unterschiede im chem. Verh. konnten nicht beobachtet werden. Aus 16,2 g Benzalchlorid wurden 2,9 g γ -Verb. erhalten. Neben der γ -Verb. bestand zum Teil in kleinen Mengen (aus 16,1 g Benzalchlorid 0,17 g) *Tetraphenyl-4,6-[tetrazin-1,2,4,5-dihydrid-1,4]*, F. 201—201,5° (unkorr.). Bei Verwendung von reinem, aus Benzaldehyd hergestelltem Benzalchlorid wurde nie Tetrazin erhalten. Vermutung, daß das techn. Benzalchlorid Benzotrichlorid als Ursache der Tetrazinbildung enthalten hätte, wurde unwahrscheinlich, als bei direkter Umsetzung von Benzotrichlorid mit Phenylhydrazin kein Tetrazin beobachtet werden konnte. Dagegen wurde unter gewissen Bedingungen *Formazylbenzol* (F. 173°) nach



erhalten, neben einem bei 179—180° schm. Körper, der nicht näher untersucht wurde. — Ein analoges isomeres Benzalsemicarbazon ließ sich nicht erhalten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 666—70. Malmö, Tekniska Läroverkets Chem. Lab.)

HARMS.

V. Hasenfratz und **R. Sutra**, *Über die Oxydation des Harmalins und Bromharmalins*. *Harmalin*, $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{ON}_2$, u. *Harmin*, $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{ON}_2$, müssen dieselbe Struktur besitzen, da sie zu derselben Verb. $\text{C}_{13}\text{H}_{16}\text{ON}_2$ hydriert werden u. Harmatin zu Harmin hydriert wird. Diese Oxydation wurde schon von FISCHER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **30**. 12 [1897]) ausgeführt, allerdings mit schlechter Ausbeute. Dieselbe gelingt weit besser, wenn man Harmalinhydrochlorid $\frac{1}{2}$ Stde. mit CrO_3 in verd. HCl erhitzt. Auf Zusatz von NaCl fällt Harminhydrochlorid aus, das nach nochmaligem Umfällen mittels NaOH u. Entfärben mit Tierkohle mit h. NH_4OH zerlegt wird. Harmin scheidet sich in langen Nadeln aus u. zeigt in verd. Säuren die charakterist. violette Fluoreszenz der Salze. Ausbeute 86%. — In derselben Weise wurde *Bromharmalin*, $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{ON}_2\text{Br}$ (HASENFRATZ, C. r. d. l'Acad. des sciences **154**. 215 [1912]), oxydiert. Das erst aus dem orangegelbe Chromat ist nach 1-stdg. Erhitzen in ein hellgelbes Chromat übergegangen, das mit h. alkoh. KOH zerlegt wird. Aus dem Filtrat fällt W. *i-Bromharmin*, $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{ON}_2\text{Br}$, F. 203° (l. c.), das gut krystallisierende, wl., nicht gelatinisierende Salz ergibt. Die Verb. wird so am besten dargestellt, da sie bei der Bromierung des Harmins in kleiner Menge entsteht. — Die Br-Atome im Bromharmalin u. *i-Bromharmin* besetzen dieselbe Stelle in den beiden Moll. einnehmen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. — 05.)

LINDENBAUM.

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

H. v. Euler, *Neue Richtlinien in der Enzymchemie*. Zusammenfassende Darst. seiner Arbeiten. (Svensk Kem. Tidskr. **38**. 31—49.)

HESSE.

A. Bach und **K. Nikolajew**, *Sind sauerstoffübertragende Enzyme mit wasserstoffübertragenden identisch?* Die Annahme von WIELAND (Erg. der Physiol. **20**. 477 [1910]), daß das Schardinger-Enzym (*Perhydridase*) gleichzeitig als Oxydase u. als Reduktase wirken kann, wird mit dem von SBARSKY u. MICHLIN (Biochem. Ztschr. **148**. 485; C. **1925**. I. 2232) isolierten Milchenzym nachgeprüft. Es ergibt sich, daß das Enzym an der in Milch erfolgenden Oxydation des *Salicylaldehyds* nicht beteiligt ist, sondern daß hier nichtenzymat. Vorgänge vorliegen. Wahrscheinlich sind in der Milch Begleitstoffe, vielleicht lipoider Natur, welche als H_2 -Acceptoren wirken u.

ähnlich wie reduziertes Methylenblau durch molekularen O₂ leicht dehydriert wird (Biochem. Ztschr. 169. 105—12. Moskau, Komm. f. Volksgesundh.) HESS

Otto Gertz, *Über die Oxydasen der Algen*. In einer früheren Arbeit (Botan. Notiser, Lund 1925. 185) hat Vf. nachgewiesen, daß die *Jodidoxydasen* (welche Alkalijodiden freies Jod abspalten) in den *Rhodophyceen* vorhanden sind. Bei Gattungen *Rhodomela*, *Polysiphonia*, *Delesseria sanguinea*, *Odonthalia*, *Brongniart*, *Furcellaria* sind die *Jodidoxydasen* in ziemlicher Menge vorhanden, während sie in den Gattungen *Ceramium*, *Cystoclonium*, *Rhodymenia* u. *Nemalion* fehlen. — Unterss. auf *Jodidoxydasen* sind so ausgeführt, daß 10 g Gelatine mit 3 g KJ u. etw. Kartoffelstärke in 100 ccm gel. werden u. das Gemisch in Petrischalen zur Kultur Algen benutzt wird. Schon nach einigen Stdn. wird eine durch Jodstärke bedingte Blaufärbung beobachtet. — Die Wrkg. der Oxydase erstreckt sich auch auf Benz. u. Guajakharz. Es werden Tabellen der untersuchten Algen gegeben u. die mit einzelnen Gattungen erhaltenen Resultate ausführlich beschrieben. — Ein Präparat aus der Alge *Delesseria sanguinea* entfärbte in kurzer Zeit Methylenblaulsg. (Biochem. Ztschr. 169. 435—48. Lund, Univ.) HESS

Richard Willstätter, **Wolfgang Grassmann** und **Otto Ambros**, *Über die ereptische Komponente einiger Pflanzenproteasen*. IV. Abhandlung über pflanzliche Proteasen. (III. vgl. S. 2361.) Bei der Unters. von proteolyt. Fermenten muß auf etwaige Ggw. einer erept. wirkenden Komponente Rücksicht genommen werden. Käufl. *Papain* ist zwischen $pH = 4,7-8$ unwirksam gegen Glycylglycin, Glycylalanhydrid, d,l-Leucylglycin u. Leucylalanin. — Die aus frischen Blättern u. Blattstengeln von *Carica Papaya* (Botan. Garten Nymphenburg) abgepreßte grünliche Masse, welche nach ihrer Wrkg. auf Fibrin u. auf Gelatine in 100 ccm 30 Papaineinheiten hervorgebracht zeigte keine Wrkg. auf Leucylglycin. — *Kürbisprotease* enthält ein schwach wirkendes erept. Enzym, welches Glycylalanhydrid nicht, Glycylglycin nicht deutlich, dagegen Leucylglycin nach langen Einwirkungszeiten deutlich ein wenig spaltet. — *Bromelain* (aus *Ananas sativus*) in Trockenpräparaten enthält kein Erepsin. Preßsäfte frischer Früchten zeigen eine geringe erept. Wrkg. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 1925. bis 64.) HESS

Richard Willstätter, **Wolfgang Grassmann** und **Otto Ambros**, *Über die ereptische Komponente einiger Pflanzenproteasen*. V. Abhandlung über pflanzliche Proteasen. (IV. vgl. vorst. Ref.) Die Angaben von VINES (Annals of botany 17. 597 [1925]) daß man Pflanzenproteasen in eine erept. u. eine trypt. Komponente zerlegen konnte, wurden nicht bestätigt. Die fraktionierte Auflösung des Enzymmaterials mit Natriumchlorid-Lsg. (nach dem Vorgang von VINES), ferner fraktionierte Adsorptionen mit Ton, Kaolin u. Fibrin ergaben in keinem Falle eine Verschiebung der Wirkungsverhältnisse in bezug auf die Substrate Fibrin, Gelatine u. Pepton. Die experimentellen Unklarheiten, welche VINES zu seinen irrigen Schlüssen führten, werden gedeutet u. erörtert. — Die von den Vff. erhaltenen Ergebnisse bestätigen wiederum, daß die Messung der frei werdenden Carboxylgruppen ein für den wesentlichen Verlauf der Proteolyse von Gelatine u. Albuminpepton richtiges Maß ist. Die Befunde stimmen mit der älteren Anschauung im Einklang, daß die Proteolyse in der Auflösung von Peptidgruppen $-CO-NH-$ u. nicht in Desaggregation polymerer Komplexe besteht. Die Spaltung von Fibrin wird folgendermaßen bestimmt. 1—10 mg *Papain* werden aktiviert mit 6 mg HCN + 3 ccm Citrat-Phosphatpuffer (l. c.) von $pH = 7,2$ in 2 Stdn. bei 40°. Dann wird das Enzym zur Suspension von 540 mg lufttrockenem (enhydratisiertem) Fibrin in 3 ccm des gleichen Puffers gegeben, mit gesätt. Natriumacetat-molwasser auf 15 ccm aufgefüllt u. die Hydrolyse in 1 Stde. bei 40° ermittelt. — Das Optimum der Rk. liegt für *Kürbisprotease* (Fibrin) bei $pH = 7,2$. — Die *Papain*-Hydrolyse. Bis zu 30 mg *Papain* werden mit 25 mg HCN + 5 ccm m/5-Dinatriumcitrat ($pH = 5,0$) 2 Stdn. bei 40° vorbehandelt. Nach Vermischen mit 2 g Albumin

on (MERCK) in 10%ig. Lsg., die mit HCl auf etwa $pH = 5,0$ eingestellt ist, wird auf 50 ccm aufgefüllt. Die Hydrolyse wird auf 4 Stdn. ausgedehnt. Für Fibrin-Peptonhydrolyse werden Kurven gegeben. — Die Peptonhydrolyse wird entgegen den Angaben von VINES (l. c.) durch NaF nicht beeinflusst. (Ztschr. f. physiol. 152. 164—82. München, Akad. d. Wiss.)

HESSE.

Richard Willstätter und **Eugen Bamann**, *Über direkte Maltosegärung durch malsereiche Hefe*. (VII. vgl. S. 2476.) Es wird gezeigt, daß nicht nur die maltasearmen Hefen (WILLSTÄTTER u. STEIBELT, Ztschr. f. physiol. Ch. 115. 211; C. 1921. 1435), sondern auch die maltasereichen Bierhefen die Maltase direkt, d. h. ohne vorhergehende Hydrolyse vergären. Maltose wird optimal bei $pH = 4,5$ vergoren, bei Acidität, bei der die Maltase schon völlig unwirksam ist. Dabei findet nicht Zerstörung statt, da man, wenn man wieder die für Maltase optimale Acidität $pH = 6,8$ mittels Diammonphosphat einstellt, auch wieder die volle Wrkg. der Maltase beobachtet. — Die Maltasewrkg. unter den Bedingungen der Bestimmungsreihe kann nicht unmittelbar mit der unter den Verhältnissen der Gärung einwirkenden Biospaltung verglichen werden, da im letzten Falle die Glucose hemmt. Bei $pH = 6,8$ in der für 50%ig. Spaltung der Maltose nötigen Zeit nach Aufzucht der äquimolekularen Glucosemenge nur 23% Maltose hydrolysiert; bei $pH = 5,5$ in der gleichen Zeit ohne Glucose 12%, mit Glucose nur 3% gespalten. Die Maltasewrkg. ist also im Gärvorgang infolge der Vergärung der hemmenden Glucose langsamer als der Maltasezeitwert der Hefe anzeigt. Dies wurde in den Unterss. von WILLSTÄTTER u. STEIBELT (l. c.) nicht berücksichtigt. — Die Gärungen von *Glucose* und *Saccharose* zeigen ein breites von $pH = 3$ bis zum Neutralpunkt sich erstreckendes Optimum. Die Maltosegärung mit maltasereicher Löwenbräuhefe verläuft optimal bei $pH = 4,5$ — $5,5$. Bei günstigem pH sind die Induktionszeiten äußerst gering. Für die gesamten u. reduzierten Halbgärzeiten bei wechselndem pH wird eine Figur gegeben. — Prakt. von Maltase freie Branntweinhefe (Frankenthal) verhält sich bei der Maltosegärung im wesentlichen wie die Bierhefe; das Optimum der Gärung liegt bei etwa 3,5, jedoch erstreckt sich das optimale Gebiet bis zu $pH = 2,5$; diese Branntweinhefe ist also der Gärung im sauren Gebiet besonders angepaßt. Die Induktionszeiten sind größer als bei maltasereichen Hefen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 14. München, Akad. d. Wiss.)

HESSE.

J. Bodnár und **Irène Villányi**, *Über die Thermostabilität des pflanzlichen Amylasezymogens*. Bei Verss. über *Amylase* im Weizenmehl ergab sich, daß das Enzym durch Erhitzen der wss. Suspension des Mehles auf 100° nicht zerstört wurde. Diese Amylase wirkt sowohl auf zugesetzte Stärke als auch auf die Stärke des Mehles. Die im wss. Mehl vorhandene Amylase, welche aus dem im Mehl vorhandenen Zymogen entsteht, zeigt keine Thermostabilität, sondern ist durch Erwärmen der wss. Lsg. auf 100° zerstörbar. — In dem durch Erhitzen der Mehlsuspension auf 100° „inaktiv“ gemachte Mehl konnte auch *Maltase* nachgewiesen werden. — Verwahrt man das gemahlene Mehl längere Zeit in einer verschlossenen Flasche, so verliert das in ihm vorhandene Amylasezymogen seine Eigenschaft der Thermostabilität, während diese Eigenschaft in gleich lange aufbewahrt Weizenkorn erhalten bleibt. — Mehl aus Gerste verhält sich wie Weizenmehl. — Die Amylase ist demnach im Mehl als Zymogen u. nicht als Amylase vorhanden. — Die Amylase entsteht aus dem Zymogen in wässriger Lösung. — Extrahiert man Weizenmehl mehrfach mit W., so hat eine nunmehr instabile Suspension zunächst keine amylyt. Wrkg.; erst nach einiger Zeit ist das Zymogen wieder Amylase frei geworden u. es wird nun Stärke abgebaut. — Beim Keimen findet eine B. von Amylase aus dem Zymogen statt; aus keimendem Weizen konnte daher nach Erhitzen der wss. Suspensionen auf 100° keine Amylase nachgewiesen werden. — Das Zymogen wurde auch in Blättern von Mais, Kraut, Bohnen, Erbsen, Rettich, Ricinus, Zuckerrübe, Kartoffel, nicht in den Blättern von

Gurken u. Trauben gefunden. (Biochem. Ztschr. **169**. 1—12. Szeged, Univ., Debre. Univ. u. Budapest, Biochem. Inst.)

Karl Josephson, *Die Enzyme des Emulsins*. II. (I. vgl. S. 2007). Die der I. Mitt. beschriebenen Reinigungsverss. werden fortgesetzt. Die Adsorption β -Glucosidase an Kaolin erfolgt am besten beim Optimum ihrer Wrkg., $pH =$ Durch zweimalige Adsorption an Kaolin u. Elution mit NH_3 oder durch einmalige Adsorption, Elution u. nachfolgende Dialyse werden Präparate von Sal. f. = 4,8 (β -Gl.-W. = 80—81) erhalten. Die Präparate geben keine Molischrkr. u. eine schwache Xanthoproteinrkr. Der Gehalt an Amylase ist sehr gering ($sf.^{30} = 0,00026$). Die Adsorption an Tonerde erfolgt optimal (100%) bei $pH = 6,2-6,8$; bei pH werden 90%, bei $pH = 4,55$ 71%, bei $pH = 3,7$ 52% adsorbiert. — Auch bei den gereinigten Präparaten wurde wie bei ungereinigten Präparaten (vgl. S. 688) u. gegen den Befunden von WILLSTÄTTER u. OPPENHEIMER (Ztschr. f. physiol. **121**. 183; C. **1922**. III. 1201) Übereinstimmung der pH -Aktivitätskurven für die Stungen von *Helicin* u. *Salicin* gefunden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 821—27. Stockholm, Hochsch.)

Mark Serejski, *Über das Wesen des Antitrypsins*. Es wird eine Nachprüfung der Verss. von JOBLING u. PETERSEN (Ztschr. f. exper. Path. u. Ther. I. **23**. C. **1915**. I. 904) vorgenommen. Sowohl das aus Olivenöl hergestellte als auch käufliche *Na-Oleat* vermindern die Wrkg. des *Trypsins*. Jedoch ist diese Wrkg. „antitrypt.“, sondern es handelt sich um eine Ausfällung des Trypsins durch die S. so daß man nicht einmal von einer „Hemmung“ des Trypsins sprechen kann. (chem. Ztschr. **169**. 249—54. Moskau, Kommiss. f. Volksgesundh.)

S. Sorochowitsch, *Über den Fermentgehalt des Blutes bei experimenteller Sympathicotomie*. Bei der durch Unterbindung des Pankreasganges bei Kaninchen hervorgerufenen Sympathicotomie wurden nach 32 Tagen keine wesentlichen Veränderungen im Fermentgehalt des Blutes beobachtet. — Bei pankreaslosen Hunden blieb der Gehalt des Blutes an *Diastase*, *Phenolase*, *Fibrinferment* u. die Menge des *Antitrypsins* unverändert. Die *Lipase* nimmt dagegen zu, was darauf hinweist, daß zum mindesten ein großer Teil der Blutlipase aus dem Pankreas stammt. (Biochem. Ztschr. **169**. 409—16. Berlin, Rud.-Virchow-Krankenh.)

E₂. Pflanzenchemie.

P. Allorge, *Variationen von pH in einigen Sphagnumtorfmooren von Zentral- und Westfrankreich*. Die Torfmoore mit überwiegender *Sphagnum acutifolium*, *tenuifolium* usw. zeigen $pH = 3,9-4,6$, die mit *Carex vulgaris* u. *Sphagnum recurvum* $pH = 4,9-5,4$, die mit *Rhynchospora alba* $4,9-5,6$, die mit *Potamogeton polyfolium* $5,2-5,9$, die mit *Montia rivularis* $5,7-6,8$. (C. r. d. l'Acad. des sciences **1925**. 1154—56. 1925.)

Emile Votoček und **Jean Burda** †, *Über die zuckerartigen Bestandteile einiger Flechten*. Die Flechten wurden nach Reinigung von Fremdkörpern 24 Std. in 1%ig. Na_2CO_3 -Lsg. behandelt, um saure Bitterstoffe zu entfernen, mit W. gewaschen u. bei mäßiger Temp. getrocknet. Jede Unters. zerfiel in drei Teile: 1. Best. der wasserlöslichen W. l. Polyosen durch Extraktion mit sd. W. Falls sich beim Erkalten nichts abscheidet, Fällung mit A. Saure Hydrolyse von Nd. u. Mutterlauge. Best. der Monosaccharide ausgedrückt in Glykose. — 2. Best. der Hemicellulosen durch Kochen des Rückstands mit 5%ig. H_2SO_4 . — 3. Best. der echten Cellulosen durch Behandlung des Rückstands mit k. 80%ig. H_2SO_4 . — Folgende Flechten wurden untersucht: *Pogon jubatum*, *Evernia furfuracea*, *Parmelia physodes*, *Peltigera polydactyla*, *Peltigera bilicaria pustulata*, *Peltigera canina*. Sämtliche Flechten enthalten reichlich (zwischen 25 u. 50%), nur die letztgenannte wenig (1,3%) in W. l. Polyosen, u. zwar hauptsächlich Glykosane, daneben Mannosane u. Galaktosane. Die Hemicellulosen (

haben wesentlich Mannose u. Galaktose zur Basis (Mannane u. Galaktane). echten Cellulosen bestehen durchweg aus Glykocellulosen. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 248—54. Prag, Techn. Hochsch.)

LINDENBAUM.

Marc Bridel, *Über die Rolle der Glykoside in den Pflanzen*. Zusammenfassende st. über den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse auf diesem Gebiet. In der nze existieren zwei Arten von Zuckerreserven. Die eine, bewegliche Art sind die h Invertin hydrolysierbaren Zucker u. die Stärke, die andere, weniger bewegliche sind die Glykoside. Die Pflanze benutzt zunächst immer die erste u. erst im Not- die zweite Art. (Rev. gén. des Sciences pures et appl. 37. 134—39.) LINDENB.

W. Ljubimenko, *Untersuchungen über die Plastidenpigmente*. II. *Über den Zusammenhang des Chlorophylls mit den Proteinen der Plastiden*. (I. vgl. Bull. Acad. St. ersbourg [6] 1918. 1811; C. 1925. II. 407.) Vf. untersucht die Beziehungen zwischen Chlorophyll der lebenden Blätter u. dem extrahierten Chlorophyll. Ihre Absorp- spektra sind nicht gleich; der Identitätsnachweis von MOLISCH (braune Färbung methylalkoh. KOH) ist nicht stichhaltig, weil die Blätter sich auch mit reinem OH braun färben, um bei weiterem Zusatz von CH₃OH wieder grün zu werden; von WILLSTÄTTER angenommene Abwesenheit der Chlorophyllase in vielen Pflan- arten ist zweifelhaft, weil man sonst Fermente allgemein verbreiteter Stoffe überall (z. B. Amylase u. Stärke). Aus diesen Gründen sah sich Vf. veranlaßt, die Ex- tionsbedingungen wieder zu studieren. — Lebende Blätter wurden mit solchen gen abs. CH₃OH oder A. zerrieben, daß die Konz. des Alkohols nicht unter 95% ; dann wurde das Filtrat mit verschiedenen Mengen W. versetzt u. im Dunkeln en gelassen. Die Proben mit 40—90% Alkohol scheiden allmählich Ndd. aus, aus 40—50%ig. Lsgg. sind amorph, aus 50—90%ig. Lsgg. krystallin. Die Fällung m vollständigsten in 50—60%ig. Lsgg. Im krystallin. Nd., der aus *Methyl-* bzw. *chlorophyll* besteht, kann man Nadelaggregate u. Sphärolite unterscheiden. Beim ieren bleibt auf dem Filter eine harzige, äußerlich nicht krystallin. M., die aber n Auflösung in CH₃OH (bzw. A.) u. Verdünnen mit W. wieder Krystalle ab- det. Es gelingt auch, eine dritte „Umkrystallisation“ durchzuführen; bei neuem en erhält man nur einen amorphen Nd. Die Krystalle sind augenscheinlich Methyl- bzw. Äthylchlorophyllid WILLSTÄTTER nicht ident.; Vf. vergleicht sie len von LIEBALDT (Ztschr. f. Botanik 1913) beobachteten Krystallen. Der Vers. e mit mehreren Pflanzen wiederholt, u. a. mit *Aspidistra elatior* u. Nessel. — n diesen grünen Krystallen scheiden sich auch die gelben krystallin. Farbstoffe Ihre colorimetr. in der Lsg. bestimmte Menge ist in ca. 90%ig. CH₃OH, A. oder n höher als in konzentrierteren u. verdünnteren Lsgg. — Wss. Auszüge aus Blättern *Aspidistra elatior* oder *Funkia ovata* werden mit HCl oder Oxalsäure bis zur Braun- ng titriert; die dazu erforderliche Säuremenge ist mehrere Male größer, wenn uszug nicht weiter verarbeitet wurde, als wenn er gekocht oder mit Alkoholen Aceton versetzt wurde. Erklärung: das Chlorophyll wird aus den Zellen mit n Eiweißsubstrat (wie Hämoglobin) extrahiert; die charakterist. grüne Farbe u. eständigkeit des Chlorophylls sind Folgen dieser Proteinverb.; Reagenzien, die omplex zerstören, erleichtern die durch Braunfärbung sich offenbarende Zers. hlorophylls. Der Komplex wird u. a. bei jeder Behandlung der Blätter mit organ. gsmm. zers., weswegen die Extraktion nur mit W. vorgenommen werden darf.

Acad. St. Petersburg [6] 1923. 129—148.)

BIKERMAN.

P. Rondoni, *Über die Beteiligung des Pyrrols am Aufbau des Melanins*. *Erwiderung* m Aufsatz „Pigmentstudien“ von Bloch und F. Schaaf. (Vgl. BLOCH u. SCHAAF, .) Die Pyrroltheorie der Melanogenese nach ANGELI kann gegenüber der Farb- ildung aus Tyrosin, Adrenalin, Dioxyphenylalanin (Dopa) nicht vernachlässigt n. (Biochem. Ztschr. 169. 149—51. Mailand, Inst. f. allgem. Pathol.) OPP.

III. 1.

N. Proskuriakow, *Über die Beteiligung des Chitins am Aufbau der Pilzwand*. Zur Unters. gelangten die zerkleinerten Pilzarten, *Agrarius campestris*, *L. tarius volemus*, *Armillaria mellea* u. *Polyporus betulinus*, u. zwar je 100—125 g. Die weitere Verarbeitung geschah im wesentlichen nach dem Verf. von SCHOLL. Die gewonnenen Rückstände der drei erstgenannten Pilze verhielten sich prakt. gleichartig, nur der Rückstand von *Polyporus betulinus* war anders geartet. In den ersten drei Pilzen konnten 2,8—5,5% der Lufttrockensubstanz als reines *Chitin* festgestellt werden. Bei *Polyporus betulinus* wurden an Stelle von Chitin glukosamin- u. glucosaminbildende Komplexe erhalten, erst durch Verschmelzen mit Kalilauge konnte Chitin erhalten werden, doch konnte Vf. nicht einwandfrei feststellen, ob es dem ursprünglichen Chitin entstammte. (Biochem. Ztschr. **167**. 68—76.) HAASE

H. Colin und **A. Grandsire**, *Chemische Merkmale der grünen, gelben und roten Blätter*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 133; C. **1925**. II. 1535.) Es wurden gleichzeitig gepflückte grüne, gelbe u. rote Blätter der Mohrrübe untersucht. In der Reihenfolge nach dem abnehmenden Gehalt an reduzierendem Zucker: rote > gelbe > grüne, nach Rohrzuckergehalt: rote, grüne > gelbe, nach dem Verhältnis der reduzierenden Zucker zur Saccharose: gelbe > rote > grüne, nach dem Wassergehalt: gelbe > grüne > rote, nach dem Aschegehalt: gelbe > grüne > rote, nach der Frierpunktniedrigung u. Leitfähigkeit des wss. Auszugs: gelbe > rote > grüne, nach der Alkalität der Asche: grüne > gelbe > rote, nach dem Calciumgehalt der frischen Blätter: gelbe > grüne > rote, nach dem Ca-Gehalt der Asche: grüne > gelbe > rote. Die roten Blätter sind also reicher am Zucker u. an freien organ. Säuren, ärmer an Mineralsalzen u. namentlich an Ca, als die grünen Blätter, die gelben enthalten weniger Zucker, mehr W. u. Mineralsalze. Der erhöhte osmot. Druck ist für die roten Blätter nicht charakterist. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1168—70. 1925.) FRIEDL

Sophia Satina und **A. F. Blakeslee**, *Untersuchungen über biochemische Unterschiede zwischen (+)- u. (—)-Geschlecht in Mucorrasen*. II. *Ein vorläufiger Bericht über die Manoilowreaktion und andere Prüfungen*. Die einzelnen Mucorrasen zeigten große Unterschiede im Fermentgehalt, die in einer Anzahl von Tabellen dargestellt werden. Es scheint, daß die + - Arten den weiblichen, die — Arten den männlichen Typ darstellen. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 191—96. Cold Spring Harbor, N. Y.) HESS

Sophia Satina und **A. F. Blakeslee**, *Biochemische Unterschiede zwischen den Geschlechtern in grünen Pflanzen*. (Vgl. vorst. Ref.) An einer großen Anzahl von Pflanzen wird gezeigt u. in Tabellen dargestellt, daß sich männliche u. weibliche Pflanzen in bezug auf die Manoilowrk., die Farbe der Blätterextrakte sowie den Gehalt an Oxydase, Peroxydase u. an Gesamtsäure unterscheiden. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 197—202.) HESS

E₅. Tierphysiologie.

J. Mellanby und **A. St. G. Huggett**, *Die Beziehung von Sekretinbildung zum Eintritt von saurem Chymus in den Dünndarm. Die Eigenschaften des Sekretins*. (Vgl. Journ. of Physiol. **60**. 85; C. **1925**. II. 579.) MELLANBY hat die Vermutung ausgesprochen, daß der Stoffwechsel der Enzyme des Pankreas vom Vagus reguliert wird u. Sekretin nur starke Absonderung von 0,14-n. NaCl durch das Pankreas bewirkt, wobei gleichzeitig die Pankreasenzyme ausgeschüttet werden. — Sekretin findet sich in einer Vorstufe in erheblicher Menge in der Schleimhaut der oberen 2/3 des Dünndarms, viel weniger im unteren Drittel. Sekretin ist l. in W. u. ziemlich haltbar in verd. Lsgg. von Säuren, Alkalien, Aceton. Man extrahiert es mit 0,2% NaOH, 0,2% HCl, 75% ig. A. oder Acet. mit Phosphatlsgg. (pH 6,5—7,5). — Magen-HCl scheint nicht ein Prosecretin in Sekretin umzuwandeln. — Sekretin reagiert wie eine sekundäre Albumose. (Sättigung

$\text{H}_4\text{I}_2\text{SO}_4$, Zerstörung durch Pepsin oder Trypsin). Es ist schon im Dünndarm des Menschen enthalten, also kein Eiweißverdauungsprod. — Es scheint kein primäres Amin zu sein. (Journ. of Physiol. **61**. 122—30. London.) MÜLLER.

Harvey S. Thatcher, *Einfluß von Insulin auf das Gewicht der Nebennieren von Kaninchen*. Die Nebennieren von Insulin behandelten Kaninchen zeigen weder nach der Injektion noch mkr. erhebliche Unterschiede von normalen. (Journ. Exp. Med. **43**. 1924. Cleveland, Dep. of Pathology of Western Reserve Univ.) MEIER.

Zoltán Ernst und Julius Förster, *Einige Beiträge zur Chemie des auf dem Höhepunkt der Insulinwirkung beobachteten Blutzuckers*. In der Insulinhypoglykämie ergibt die Polarisation des Blutzuckers ca. 50—70% der red. Substanzen als Traubenzucker auch noch sehr niedrigen Reduktionswerten. (Biochem. Ztschr. **169**. 498—500. Budapest, med. Klinik.) MEIER.

B. Gutowski, *Abhängigkeit der Sekretionstätigkeit des Pankreas von chemischen Substanzen*. Auf Sekretin-Injektion reagiert die Pankreasdrüse ähnlich wie auf Histamin. (C. r. soc. de biologie **91**. 1346. 1924; C. **1925**. I. 862). Je langsamer die intravenöse Injektion, desto geringer die Saftmenge. Subkutane Injektion hat überhaupt keine Wirkung. (C. r. soc. de biologie **94**. 551—52. Warschau, Labor. de l'institut. de physiologie.) OPPENHEIMER.

Ho Sup Shim, *Einfluß des Atropins und des Pilocarpins auf die Zuckerausscheidung bei Diabetes*. Bei Verss. an diabet. u. nichtdiabet. Menschen fand Vf., daß die Atropinwirkung den Schwellenwert für alimentäre Glykosurie nicht herabsetzt, dagegen sehr hoch erhöht, Pilocarpin scheint keinen nennenswerten Einfluß auszuüben. Beim Menschen wurde der Schwellenwert für Adrenalinglykosurie durch Atropin häufig erhöht, durch doppelte Vagusdurchschneidung deutlich herabgesetzt, wobei die schwellenhebende Wirkung des Atropins nicht aufgehoben wird, sondern z. T. sogar deutlicher wird, woraus zu schließen ist, daß die Erhöhung des Schwellenwertes durch Atropin nicht auf der vaguslähmenden Wirkung desselben beruht. (Journ. Biochemistry **5**. 333—58. 1925. Tokio, mediz. Klin.) HÜCKEL.

Ho Sup Shim, *Über den Einfluß von Atropin und Pilocarpin auf den Blutzuckerwert und die Glykosurie*. Atropin läßt den nüchternen Blutzuckerwert beim Diabetiker beim Gesunden gewöhnlich unbeeinflusst. Pilocarpin ist beim Gesunden, nüchtern unverändert, gewöhnlich ganz wirkungslos, während es beim Diabetiker häufig eine deutliche Blutzuckersteigerung veranlaßt. Die alimentäre Blutzuckersteigerung wird beim Diabetiker u. beim leichten Diabetiker durch Atropin sehr häufig verringert, die Erhebung des Blutzuckermaximums verzögert. Pilocarpin scheint beim Diabetiker die alimentäre Hyperglykämie häufig zu verstärken, was beim Gesunden nicht vorliegt. (Journ. Biochemistry **5**. 359—89. 1925. Tokio, mediz. Klin.) HÜCKEL.

P. Rona und H. A. Krebs, *Physikalisch-chemische Untersuchungen über die Isoagglutination*. I. Mitt. *Die Bedeutung der Elektrolyte bei der Isohämagglutination*. Isoagglutinine sind bei Elektrodialyse sowohl in der ausfallenden Euglobulinfraktion wie im „Serumrest“ vorhanden. Für die Rk. ist ein Elektrolytgehalt von $\frac{1}{3}$ des n. bei Erhaltung der Isotonie durch Traubenzucker notwendig, unterhalb desselben tritt zwar starke aber unspezif. Agglutination auf, die durch Elektrolytzusatz reversibel ist. Bei Verwendung von Na_2SO_4 oder CaCl_2 anstatt isoton. NaCl -Lösung oder bei Zusatz von nicht fallender Lanthankonz. wird die Rk. kaum beeinflusst. Nur ein geringer Einfluß, wenn Änderungen des Serumweißes auftreten. Durch Opto-kinet. wird die Agglutination ohne sichtbare Schädigung beeinflusst, Urethan ist ohne Wirkung, Chinin, Vucin, Eucupin hämolysieren in hoher Konz., sonst ohne Einfluß. (Biochem. Ztschr. **169**. 266—80. Berlin, Chem. Abt. d. Pathol. Instituts.) MEIER.

Kosei Misumi, *Über den Einfluß der Injektion neutraler, saurer und alkalischer Lösungen auf die Harnsekretion*. Bei der Injektion von 20 ccm Ringerlsg. zeigte die

Harnsekretion eines hungernden Kaninchens keine besondere Veränderung. Bei Injektion von 20 ccm saurer Phosphatlg. dagegen wurde die Harnsekretion deutlich geringer, bei Injektion von alkal. Phosphatlg. vermehrt. (Journ. Biochemistry 417—39. 1925. Tokio, biochem. Inst.) HÜCKEL.

Kosei Misumi, Studien über den Einfluß der CaCl_2 - und MgCl_2 -Injektion auf die Harnsekretion. Bei der intravenösen Injektion der CaCl_2 - oder MgCl_2 -Lsg. beobachtet man ganz verschiedenartige Wrkgg. Die erstere Lsg. zeigt zwar die Neigung, die Nierensekretion mehr oder weniger zu steigern, ihre Wrkg. bleibt jedoch ziemlich beschränkt, während die MgCl_2 -Lsg. in der Wrkg. weit das alkal. Phosphat übertrifft u. dem NaHCO_3 gleichzusetzen ist. (Journ. Biochemistry 5. 441—48. 1925. Tokio, biochem. Inst.) HÜCKEL.

R. E. Havard und **G. A. Reay**, Der Einfluß von Körperarbeit auf die anorganischen Phosphate des Blutes und Harns. (Vgl. S. 2817.) Nach 4—5 Min. dauernder 5—6-maligem schnellsten Anstieg einer Treppe bis zur Erschöpfung am Morgen ohne vorheriges Training steigt im Blut das anorgan. Phosphat zuerst ein wenig, fällt dann stark unter die Norm. Dieser Abfall ist bei Leichtathletiktraining viel weniger ausgesprochen. — $\frac{3}{4}$ Stde. lang nach starker Arbeit erfolgt Phosphatausschwemmung im Harn, dann hört sie manchmal auf. Weniger konstant ist sie begleitet von der stärkeren NH_4 -Ausscheidung. Regelmäßig sinkt die Cl-Ausscheidung. — Diese Fluktuationen in der Nierenausscheidung sind eine Folge vorübergehender Acidose infolge B. von Milchsäure. Die Schwankungen im Blutphosphat sind möglicherweise Folge wechselnden Lactacidogehalts der Muskeln. (Journ. of Physiol. 61. 35—40. Cambridge.) MÜLLER.

Yuzo Sendju, Über das Verhalten der lebenswichtigen Aminosäuren bei der Bebrütung des Hühnereies. Bei 3-tägiger Bebrütung, wo man fast plötzlich den Blutfarbstoff auftreten sieht, erfolgt im Hühnerei eine starke Abnahme des Tryptophans bei längerer Bebrütung, während der die Gallenfarbstoffe auftreten, erfolgt eine weit geringere Abnahme der Tryptophanmenge, so daß anscheinend das im Hühnerei frei u. gebunden vorhandene Tryptophan für die B. der Blut- u. Gallenfarbstoffe von Bedeutung ist. Der Tyrosingehalt nimmt bei der Bebrütung allmählich ab, während sich die im Hühnerei frei u. gebunden vorhandenen Purinstickstoffformen mit fortschreitender Entwicklung des Embryos vermehren. Die freien u. gebundenen Hexonbasen zeigten keine bemerkenswerte Veränderung. Ebenso bleibt die Menge der durch Phosphorwolframsäure nachweisbaren N-Verbb. bei der Bebrütung fast konstant. (Journ. Biochemistry 5. 391—400. 1925. Nagasaki, physiolog.-chem. Inst.) HÜCKEL.

Bernard E. Kalwaryjski, Über Samenfädenagglutination unter Einwirkung chemischer Agenzien. Die Agglutination von Samenfäden von *Rana temporaria* durch CO_2 ist von der $[\text{H}^+]$ abhängig, mit einer unteren Grenze von $\text{pH} = 5,5$, die Erscheinung tritt bei toten u. lebenden Samenfäden ein. Ein- u. zweiwertige Kationen verschiedener Konz. wirken hemmend ($\text{Li} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Na} > \text{K} > \text{NH}_4$) kein Einfluß haben Br , Cl , J , SO_4 , CNS bei $\text{pH} > 2,5$. Säuren u. saure Puffergemische hemmen in höheren Konzz. die Agglutination, während kleine Agglutination hervorruft. Ähnliche Erscheinungen werden bei anderen Spermienarten gefunden. (Biol. Ztschr. 169. 355—408. Lwów, Med. chem. u. embryol. histolog. Institut.) MEIER.

Georg von Martos und **Bodo Schneider**, Beeinflussung der Leberzellatmung durch Traubenzuckerzufuhr zum Gesamtorganismus. Leberbrei von mit Traubenzucker gespritzten Meerschweinchen reduziert in gleicher Zeit ca. die doppelte Menge N. anthrachinon wie Leberbrei n. Tiere. (Biochem. Ztschr. 169. 494—97. Berlin med. Klinik.) MEIER.

H. v. Euler, Neue Beobachtungen über fettlösliche Wachstumsfaktoren. (Vgl. S. 117.) Vf. berichtet über die Wrkg. von Substanzen auf das Wachstum bei Ratten, die sich unter dem Einfluß von ultravioletten Strahlen auf gewisse Körper u. Körpergruppen

ders Pflanzenstoffe, gebildet haben. Während nach täglicher Fütterung von be-
 tetem Steinnußöl, dem 1% Cholesterin zugesetzt war, bei einem Tiere nach 37 Tagen
 ie Anzeichen von Rachitis (histolog. Unters. der Molaren u. Epiphysen u. Best.
 PO₄-Gehaltes im Blut) nachweisbar waren, zeigte *Cholesterinacetat*, das in festem
 pulverisiertem Zustand u. auch in wenig Arachisöl emulgiert belichtet wurde,
 ie Zuwachswrkg. Ein Versuchstier ging in 32 Tagen an deutlicher Rachitis zugrunde.
 Also negativ verliefen Verss. mit *Cholesterinpalmitat*; eine tägliche Eingabe von
 g belichteten Palmitates rief kein Wachstum hervor. Nach Zugabe von belichtetem
 i von Nebennieren des Rindes (0,1 g pro die) zur A-freien Grundkost wurde eine
 k positive Wrkg. erzielt (Tranwert 0,02), wobei allerdings zu berücksichtigen ist,
 der Tranwert des unbelichteten Breies etwa 0,01 beträgt. Ferner wurden gereinigtes
Cholesterin aus Weizenkeimlingen mit dem *Atherextrakt aus Weizenkeimlingen* u. dem
Extrakt aus Hefe (Oberhefe R) verglichen. Hinsichtlich der Wachstumswrkg. der
 parate nach der Bestrahlung ist der Tranwert des reinen Weizensterins etwa pro-
 portional dem Steringehalt. Auffallend war die gute antirachit. Wrkg. beider Extrakte.
 Sterinen wurden hinsichtlich der Bestrahlungsaktivierung untersucht: β -Amyrin,
Ulin u. *Gallensäuren*. Sowohl β -Amyrin als Betulin erwiesen sich nach Bestrahlung
 ichtlich des Wachstums unwirksam; Betulin zeigte eine undeutliche antirachit.
 g. (Arkiv för Kemi, Min. och. Geol. **9**. No. 28. 1—6.) HIRSCH-KAUFFMANN.

J. C. Drummond, *Neue Tatsachen über die fettlöslichen Vitamine*. Vf. glaubt
 t an die Labilität des Vitamins A, da es bei der Gewinnung aus Lebertran durch
 eingreifende chem. Prozeduren (Verseifung, Destillation bei Temp. von über
) nicht zerstört wird. Möglicherweise ist das Vitamin A ein höher wertiger un-
 tt. Alkohol. Bei der Bestrahlung von Cholesterin resp. Phytosterin mit Höhensonne
 en Substanzen frei, die eine starke antirachit. Wrkg. aufweisen, auf das Wachs-
 aber keinen Einfluß üben. Die beiden fettlöslichen Vitamine A u. D sind also
 verschieden voneinander. (Lancet **210**. 272—73. 1926. London, Univ.) HIRSCH-K.

C. W. Carrick, *Bestrahlung von Kücken mit Lebertran*. Die antirachit. Substanz
 m Lebertran in einer Form von ultravioletter Energie enthalten. Bestrahlung
 er Kücken mit Lebertran hat einen günstigen Einfluß auf die Rachitis, wenn
 die Erkrankung nicht dadurch verhütet oder geheilt werden kann. (Amer. Journ.
 iol. **74**. 534—38. 1925. Lafayette, Indiana, Purdue Univ.) HIRSCH-KAUFFMANN.

A. Bickel, *Weitere Untersuchungen über den Stoffwechsel bei der Avitaminose*.
 S. 157.) Bei der Avitaminose steigt der dysoxydable Harnkohlenstoff allmählich
 . bei anfangs gleichbleibender, sich später verstärkender N-Ausfuhr geht der Harn-
 ent C:N langsam in die Höhe. Dieser Quotient wird in allen Stadien der Krank-
 verfolgt. Bei der Avitaminose finden sich ferner folgende Veränderungen: Gesamt-
 durch den Harn nimmt allmählich zu, insbesondere werden P u. Ca vermehrt
 schieden. Durch Insulininjektionen wird die patholog. erhöhte Ausscheidung
 dysoxydablem C durch den Harn herabgedrückt. Diese Insulinwrkg. läßt sich
 bei Ggw. von P- u. Ca-Ionen auslösen. (Biochem. Ztschr. **166**. 251—94. 1925.
 n, patholog. Inst.) HÜCKEL.

N. R. Dhar, *Ursache der Bildung von Ablagerungen bei der Gicht und anderen
 kheiten und über die Anschwellung bei der Beri-Beri*. (Vgl. auch S. 1441.) Als
 igste Ursache für die Ablagerung von Harnsäure, Ca-Phosphat, Ca-Oxalat wird
 etention von W. angesehen. Bei der Gicht spielt die Harnsäure u. nicht die Urato
 lauprolle für die Bldg. der Ablagerungen. Bei der Beri-Beri liegt eine Störung des
 ehydratstoffwechsels vor, die in Zusammenhang mit dem Mangel an Vitamin B
 r Nahrung gebracht wird. Die infolge ungenügender Oxydation entstehenden
 en unterstützen die Wasserretention u. verursachen Schwellungen der verschie-
 en Teile des Körpers. (Journ. Physical Chem. **30**. 277—81. 1926.) HIRSCH-K.

R. Nakashima, *Über die Verdaulichkeit der Desaminoproteine durch proteolytische Fermente*. Die optimale Acidität der pept. u. trypt. Verdauung der mit salpetrischer Säure behandelten Proteine ist, obwohl ihr saurer Charakter ausgeprägt ist, im Vergleich mit der natürlichen Proteine bald nach der sauren, bald nach der alkal. verschoben. Das mit salpetriger Säure behandelte Zein ist durch Pepsin schlecht, durch Trypsin besser verdaulich. Dies zeigt, daß die anorgan. Säure neben der Hauptrolle der Desaminierung irgendeine chem. Wrkg. auf das Eiweiß ausgeübt hat, die Natur dahinsteht, die aber sicher keine einfache Säurewrkg. ist. Man darf bei enzymat. Forschung der chem. denaturierten Proteine nicht über ihre Verdaulichkeit sprechen, ohne die $[H^+]$ des Mediums zu berücksichtigen. (Journ. Biochemistry 293—310. 1925. Chiba, medizin.-chem. Inst.) HÜCKE

Shu Nagasuye, *Experimentelle Untersuchungen über die Assimilation der Lävulose und der Glykose bei Hunger und Eiweißfasten*. Der Blutzuckeranstieg nach Einnahme von Lävulose ist kleiner als nach Glucose. Der Blutzuckerspiegel liegt nach Einnahme von Galaktose erheblich höher als nach Glucose. Der Blutzucker sinkt nach Zufuhr von Glucose in der Periode des Hungers bzw. der Eiweißfasten erheblich höher als nach Einnahme bei gewöhnlicher Ernährung, während Lävulose in dieser Beziehung unwirksam ist. Nach Einnahme von Galaktose in der Hungerperiode nimmt der Blutzuckergehalt deutlich zu, aber der Grad ist viel geringer als bei Glykose. Der Glykogenansatz in der Leber ist nach Glucoseeinnahme im Hungerzustand gering, fast ebenso wie bei Galaktose. Allein Lävulose vermag im Hungerzustand u. bei Eiweißfasten Glykogen in der Leber noch erheblich zu bilden. (Journ. Biochemistry 5. 449—63. 1925. Tokio, medizin. Klin.) HÜCKE

Fritz Lasch, *Resorptionsversuche am isolierten, überlebenden Darm*. I. Methodik. Methodik zum Wechseln der Innenfl. eines isolierten Darmstücks. Austritt von Stoffen aus diesen wird durch Analyse des Inhalts ermittelt. Verschwinden von Ca ist von dem daneben vorhandenen NaCl-Gehalt abhängig. NaCl (0,9%) begünstigt, wenig NaCl hemmt das Verschwinden von Ca. (Biochem. Ztschr. 169. 292—300. Wien, Biolog. Abt. des Pharmakognost. Instituts.) MEHNER

Fritz Lasch, *Resorptionsversuche am isolierten, überlebenden Darm*. II. Der Einfluß von Saponin auf die Resorption von Calcium. (Vgl. vorst. Ref.) Saponin befördert das Verschwinden von Ca aus dem Darminhalt unabhängig vom NaCl-Gehalt. (Biochem. Ztschr. 169. 301—7.) MEHNER

J. Risler und Foveau de Courmelles, *Über die physiologische Wirkung der gebräuchlichen leichten Gläsern durchgelassenen ultravioletten Strahlen*. Die von einer Lichtquelle im Innern einer Glasröhre emittierten ultravioletten Strahlen sind allgemein unschädlich. Vff. berichten über starke Hautrötungen bei Benutzung von Lampen aus leichtem Glas. Die benutzte Glasröhre war ein Al-Borosilikat von 1,2 mm Dicke. Das leuchtende Gasgemisch wurde durch Elektronenbombardement von Anthrachinon erhalten. Diese Lampe ließ nur Strahlen mit $\lambda > 2960 \text{ \AA}$ durch, insbesondere $\lambda = 3050 \text{ \AA}$ u. $\lambda = 3075 \text{ \AA}$. Um das Gebiet, in dem die phot. (erythemat.) Wrkg. stattfindet, festzustellen, wurde eine Vergleichslampe mit Anthrachinon u. aus weniger transparentem Glas (deutsches Glas, 1 mm dick, durchgelassen Ultravioletten bis $3120 \text{ \AA}$) benutzt. Es zeigte sich, daß das Licht dieser Lampe keine schädlichen Wrkgen hervorruft, bei einer Gesamtbestrahlung von 350 J bei 8 Stdn. pro Tag. Die Verss. zeigen, daß die erythemat. Wrkg. des Ultraviolett auf menschliche Zellengewebe durch die Absorption von Strahlen zwischen $\lambda = 2960 \text{ \AA}$ u. $\lambda = 3120 \text{ \AA}$ hervorgerufen wird. Ein Maximum der spezif. Wrkg. tritt zwischen $\lambda = 2960 \text{ \AA}$ u. $\lambda = 3050 \text{ \AA}$ für Hg-Dampf, u. $\lambda = 3050 \text{ \AA}$ für Anthrachinon.

DANIEL BERTHELOT bemerkt zu obigen Beobachtungen, daß dieselben für die Beobachtungen bestätigen u. ergänzen. Nach CORNU erstreckt sich das Sonnenspektrum in einem Alpental bis $2970 \text{ \AA}$, bei 2400 m Höhe bis $2940 \text{ \AA}$. Während

nenlicht auf dem flachen Lande im allgemeinen unschädlich ist, ruft es bei Alpi-
ten erythemat. Wrkgg. hervor. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 173—75.) K. W.

Carl Bachem, *Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie*. (Oktober bis
Zemember 1925.) (Vgl. S. 1596.) (Zentralblatt f. inn. Med. **47**. 201—24. 233—48.) H.

O. Schiemann und **A. Feldt**, *Heilversuche an Mäusen mit Goldpräparaten*.
Sanocrysin u. mehrere andere Goldverbb. zeigten im Vers. an Mäusen eine deutliche
Wirkg. auf akute bakterielle Infektionen. Am stärksten wurden Streptokokken
einflusst, doch zeigte Sanocrysin auch bei Infektionen mit Rotlauf u. Mäusetyphus
Wirkg. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. **106**. 83—95. Berlin, Institut „ROBERT
KCH.“.) HÜCKEL.

Alfonso Cruto, *Intravenöse Ölinjektionen*. Die mit Kaninchen ausgeführten Verss.
haben, daß der tier. Organismus in verschiedenen Organen Fett speichern kann, das
leicht in die Blutbahn eingeführt wird. Es wird als Reservefett abgelagert. In einigen
Fällen wurde eine geringe Acidose beobachtet, wohl entstanden durch Einw. oxydierender
Substanzen u. Lipasen. (Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. **25**. 40—47.) GRIMME.

Chr. J. Gremmée, *Über Gynergen, ein Secalepräparat*. Gynergen, *Ergotamin-
präparat* der Chem. Fabrik, vorm. SANDOZ in Basel, erwies sich als zuverlässig, wirkte
stärker als andere Secalepräparate u. bedingte bei Einspritzungen keine Infiltrate;
es war aber keine Überlegenheit gegenüber anderen Prodd. zu bemerken. (Nederl.
Tijdschr. Geneeskunde **70** I. 1387—89. den Haag, Frauenklinik „Bethlehem.“) GROSZ.

J. W. Tjeenk Willink, *Behandlung des Kindbettfiebers mit Rivanol*. Bericht
über 4 günstig verlaufene Fälle, deren Verlauf nur durch die Wirkg. des Rivanols
erklärbar ist. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde **70** I. 1170—77. Zwolle.) GROSZ.

W. Löwenstein, R. Müller und **R. Willheim**, *Über Venecin*. Das Venecin stellt
ein künstliche, vorwiegend erdig-sulfat. Lsg. dar, die mit Vorteil bei Fällen von
Dünndarmstörungen sowie bei rheumat. Leiden neben sonst zu treffenden therapeut.
Maßnahmen gereicht werden kann. Die Beurteilung manifester Heilresultate be-
trifft großen Schwierigkeiten, größte Reserve in der Wertung des Venecins ist am
Orte. (Wien. med. Wchschr. **76**. 473—75. Wien, Medizin. Abt. der allgem. Poli-
klinik.) HÜCKEL.

G. Analyse. Laboratorium.

J. J. Manley, *Über die Aufbewahrung kleiner Gasmengen bei niedrigen Drucken*.
beschreibt u. skizziert eine Anordnung zur Aufbewahrung kleiner Mengen reiner
Gase unter Vermeidung einer Verunreinigung mit Luft. Der App. ist mit einer
Vakuumpumpe derart verbunden, daß das Gas aus einem Versuchsapp. völlig in
eine Aufbewahrungskolben verbracht oder aus diesem wieder ganz oder teilweise in
den Versuchsapp. eingefüllt werden kann. (Proc. Physical Soc. London **38**. 129
131.) FRANKENBURGER.

Arno Müller, *Eine neue Pipette*. Die Pipette (Hersteller: A. PRIMAVESI, Magde-
burg N.) besitzt oben eine Kugel zur Aufnahme überreichlich aufgesaugter Fl. Mittels
eines Diff. ist ein Ansaugerohr angesetzt mit Hahn u. einer Erweiterung zur Aufnahme
von Absorptionsmitteln. (Chem.-Ztg. **50**. 229. Magdeburg.) JUNG.

K. Zwicknagl, *Eine neue Säurepipette*. An die Pipette ist oben eine Erweiterung
angeblasen, in der ein Schwimmer das Saugrohr beim Hochsteigen der Fl. verschließt.
(Chem.-Ztg. **50**. 258.) JUNG.

—, *Verbesserte Analysenwagenbeleuchtung*. Die Vorr., die auf die Wage gesetzt
werden, besteht aus einer Soffittenbeleuchtung, bei der mittels eines Glasplattensatzes
durch Luftkühlung die Erwärmung der Wage vermieden wird. Ein Spiegel dient zur
Beleuchtung der Skala. Hersteller: STRÖHLEIN & Co., G. m. b. H., Düsseldorf,
Münster, Stuttgart u. Braunschweig. (Chem.-Ztg. **50**. 229.) JUNG.

L. Dunoyer, *Kondensationspumpe mit mäßigem Vorvakuum*. Die mit Hg-Dampf arbeitende Kondensationspumpe, für welche ein Vorvakuum von 20 mm Hg genügt hat die aus der Fig. 6 ersichtliche Konstruktion. Das Glasgefäß Hg wird mit Bunsen-




Fig. 6.

brenner erhitzt, bis der Dampfdruck des Hg 20–40 mm beträgt. D. Arbeitsgeschwindigkeit: 370 cm/sec. Das höchste erreichbare Vakuum: 10^{-5} mm Hg. (C. r. d. l'Acad. de sciences **182**. 686–88.) BIKERMAN

A. Gutbier und Berta Otterstein, *Über einen Schnelldialysator für klinische Zwecke und für die ärztliche Praxis*. Die Erhöhung der Dialysiergeschwindigkeit wird dadurch erreicht, daß die Dialysishülse in oder um einen Körper angebracht ist, welches in der Außenrotiert. Genaue Apparaturbeschreibung. Hersteller: Mineral

chemie A.-G. Oeslau b. Coburg. (Biochem. Ztschr. **169**. 427–31. JEN MEIER.)

August C. Röttinger, *Ein Absaugkühler*. Der Absaugkühler (Hersteller: Glasbläserei HANS STEPAN, Wien IX, Van Swietengasse 1) ermöglicht auch die Wiedergewinnung sehr kleiner Mengen Lösungsm. beim Abdampfen (z. B. bei mikrochem. Arbeiten), Abbildung im Original. Man saugt über den Flüssigkeitsspiegel mittels eines Glasrohrs den Luftstrom durch den Kühler. Wenn die Spitze des Glasrohrs tiefer liegt als der Schalenrand, wird das Überkriechen der Substanz verhindert. (Österr. Chem.-Ztg. **29**. 44. WIEN.) JUNG.

K. B., *Gestell zum Aufbewahren von Kühlern*. Das Gestell für Kühler (D. R. G. 1866353, MÖBIUS & FRITSCHKE, Dresden, Wölfnitzstr. 3) ist nach dem Prinzip der Schirmständer konstruiert. (Chem.-Ztg. **50**. 229; Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 51. DRESDEN.) JUNG.

N. Schoorl, *Ein Lichtfilter für die Polarimetrie*. (Pharm. Weekblad **63**. 21–2. UTRECHT, Univ. — C. 1926. I. 2389.) GROSZFIELD.

M. Duyster, *Die Hanauer-Analysen-Quarzlampe*. Bei dieser werden durch ein besonderes Glasfilter die sichtbaren Strahlen absorbiert, während die durchgehenden ultravioletten bei bestimmten Stoffen Fluoreszenz erregen. Anwendungen: Unterscheidung von Baumwolle u. Seide, pflanzlichen Ölen u. Mineralölen, echten Diamanten von unechten, Spermaflecken, Nachweis von Kunstzähnen, Urkundenfälschungen, Casein neben Gelatine, Reisstärke neben Weizenmehl, Aceton in A., Spuren von Chinin u. a. (Pharm. Tijdschrift voor Nederlandsch Indie **3**. 127–31.) GROSZFIELD.

Hugo Maria Kellner, *Voraussetzungen einer einwandfreien photographischen Spektralphotometrie*. Haupterfordernisse sind: Herst. zweier ident. Strahlenbündel, die genaue Messung der Lichtschwächung im Vergleichsstrahlenbündel; der Vergleich zweier photograph. Schwärzungen auf gleiche Dichte. Beide Strahlenbündel müssen gleichzeitig wirken u. von einer einzigen Lichtquelle gespeist werden, die Spektrallinien unmittelbar übereinander liegen. Zur Schwächung der Vergleichslichtquelle kann die Zeit verändert werden, zu diesem Zweck muß der Schwarzschildsche Exponent der verwendeten Platte bekannt sein. Für die Benutzung des rotierenden Sektors ist die Einsetzung der auf S. 2939 erwähnten Schwärzungsformel notwendig. Mit Vorteil verwendet man ausphotometrierte Blenden u. Drahtnetze u.

chiedener Maschenweite. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photo-
nie 24. 79—84.)

KELLERMANN.

W. Mozolowski und J. K. Parnas, *Über eine neue Form der Chinhydronelektrode*.
Chinhydronelektroden nur dann richtige Werte u. schnelle Einstellung des Po-
tials ergeben, wenn die Elektrode ganz von ungel. Chinhydron umgeben ist, wird
Elektrode durch eine Vergoldung des Bodens des Elektrodengefäßes gebildet,
durch Übersichtung mit Chinhydron den obigen Anforderungen voll entspricht.
chem. Ztschr. 169. 352—54. Lwów, Med. chem. Inst. d. Univ.)

MEIER.

Wm. Mansfield Clark, *Die Bestimmung der H- u. OH-Ionenkonzentrationen und
Bedeutung*. Vortrag. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 544—64.
)

MEZEY.

F. W. Horst, *Hochempfindliches Kongopapier*. 2. Mitt. (I. vgl. S. 444.) Man
die Empfindlichkeit des Kongopapiers noch steigern, wenn man eines der beiden
Atome des neutralen Farbstoffs durch Säure bindet. Das geschieht am besten
h Verwendung eines sauer reagierenden Rohpapiers oder Zusatz von einer zur B.
Halbsäure nicht ganz ausreichenden Menge Säure zur Farblsg. Zur Herst. der
Lsg. benutzt Vf. Betainchlorhydrat. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 432—33.)

JUNG.

Elemente und anorganische Verbindungen.

E. Cattelain, *Über Verwendung einiger metallorganischer Komplexe in der Ge-
sanalyse*. Der Vf. gibt eine Zusammenstellung der gebräuchlichen organ. Fäl-
reagenzien. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 2. 485—91. 525—35. 1925.)

HARMS.


Otto Ruff und Bruno Hirsch, *Studien über die fraktionierte Fällung*. III. Vom
rißen. Scheinbare Widersprüche mit theoretischen Voraussetzungen. Feigls Hypo-
von der Bildung der Sulfide. (II. vgl. S. 1602.) Die von FEIGL (Ztschr. f. anal. Ch.
55; C. 1925. I. 261) angenommene Löslichkeit des Ti_2S von $21500 \cdot 10^{-6}$ Mol./l
nrichtig, die Originalarbeit von BÖTTGER (Ztschr. f. physik. Ch. 46. 602 [1903])
den Wert $48,75 \cdot 10^{-6}$ Mol./l ($0,215 \cdot 10^{-1}$ g in 1000 ccm) an. Die Folgerungen
ls bzgl. des theoriwidrigen Verh. von Ti_2S weisen Vff. aus diesem Grunde zurück.
die Arbeit von SCHÜRMANN (LIEBIGS Ann. 249. 326 [1888]), auf welche sich
L stützt, hält einer eingehenden Kritik nicht stand. FEIGL hat ferner zur Stützung
Hypothese eine Reihe von Mischsulfiden hergestellt, welche Vff. einer ein-
den Nachprüfung unterzogen haben, ohne jedoch die Feiglschen Resultate be-
gen zu können. Aus ihren Verss. erklären Vff. die induzierten Fällungen (Mit-
i von Metallsulfiden) durch Anlagerung oder Adsorption von H_2S an das primäre
l, bzw. durch B. einer undurchlässigen Hülle aus dem primären Sulfid mit dem
ren um das sekundäre mit dem größeren Löslichkeitsprod. (Ztschr. f. anorg. u.
Ch. 151. 81—95. Breslau, Techn. Hochschule.)

TAUBE.

K. Hegel, *Über eine Methode zur Bestimmung von gasförmigem Schwefelkohlen-
und Schwefelwasserstoff*. (Vgl. HERZOG, GAEBEL u. HEGEL, Kolloid-Ztschr. 35.
C. 1925. I. 941.) Zur Best. des CS_2 in den Zers.-Prodd. der Viscose mit Säuren
er in Form seiner Additionsverb. mit Triäthylphosphin, gewonnen durch Durch-
durch eine auf -10° gekühlte Lsg. in Ä., gewogen. Der H_2S wurde durch Ein-
der Gase in $\frac{1}{10}$ -n. J-Lsg. u. Titrieren des J-Verbrauchs bestimmt. (Ztschr. f.
v. Ch. 39. 431—32. Berlin-Dahlem.)

JUNG.

Josef Bicskei, *Über den Nachweis des Jodations*. Auf Grund der Rk.



f. einen Nachweis für Jodation an. Die zu prüfende Lsg. wird mit verd. H_2SO_4
äuert, mit Stärkelsg. versetzt u. 1—2 Tropfen einer 1% ig. KCNS-Lsg. hinzu-
t. Bei Anwesenheit des Jodations tritt dann — abhängig von der Konz. — die

blaue Färbung momentan oder nach einigen Sekunden auf. Ein Überschuß an K ist zu vermeiden, die KCNS-Menge darf das 40-fache, bei größerer Verdünnung 20-fache des K-Jodats nicht übertreffen. Der Nachweis gelingt noch mit einer welche in 10 ccm neben 0,00005 g KJO_3 noch 0,01 g $KBrO_3$ oder 0,6 g $KClO_3$ b 2,5 g KNO_3 enthält. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **151**. 127—28. Budapest, Univ.)

Georg Leimbach, *Ein direktes gewichtsanalytisches Verfahren zur Bestimmung des Perchlorats im Chilesalpeter*. Nach Ausfällen der größten Menge des Na konz. HCl u. mehrfachem Abdampfen mit konz. HCl kann man $KClO_4$ bis auf 1/10 genau mit Nitron bestimmen. In Ggw. merklicher Mengen K ist abweichend zu fahren. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 432. Geisenheim a. Rh.) JUN

Louis Jordan und **James R. Eckman**, *Bestimmung von Sauerstoff und Wasserstoff in Metallen durch Schmelzen im Vakuum*. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 279. Washington [Dc.]. — C. **1926**. I. 2025.) GRIMM

J. J. Manley, *Der spektroskopische Nachweis winziger Quecksilbermengen*. beschreibt eine Vorr., um in einer vertikal stehenden engen Glasröhre auf das handensein von Spuren von Hg-Dampf spektroskop. zu prüfen. Zur Erzeugung Entladung sind mit dem Glasrohr 2 senkrechte U-Röhren verbunden, diese tauche in ein isoliertes W.-Gefäß, durch welches die Zuführung der Spannung eines kl Induktoriums erfolgt. Ein Durchblick längs der Achse des, von den Entladungen durchsetzten Glasrohres wird dadurch erzielt, daß auf deren oberem Kopfend total reflektierendes Prisma aufgeschmolzen ist u. das hierdurch in horizontale Richtung abgelenkte Licht der Glimmentladung mittels eines Spektrometers unterworfen werden kann. (Proc. Physical Soc. London **38**. 127—28.) FRANKENBURG

I. M. Kolthoff und **H. A. Kuylman**, *Die gewichtsanalytische Bestimmung Kupfers als Cuprojodid*. Die Best. nach WINKLER (Ztschr. f. anal. Ch. **63**. 32. 1924. II. 733) gibt auch in stark saurer Lsg., aber nur dann genaue Ergebnisse, wenn man nach dem Fällen u. Aufkochen unter CO_2 abkühlen läßt. Bei Ggw. von erfolgt Oxydation, wobei CuJ_2 in Lsg. geht. Wertvoll ist, daß das Verf. selbst in Ggw. der 50-fachen Menge Fe noch gute Resultate liefert. (Chem. Weekblad **185**—86. Utrecht, Univ.) GROSZFE

J. Wada und **S. Kato**, *Über die Trennung des Germaniums*. Vff. haben Grund eingehender Verss. über das analyt. Verh. des Ge ein Verf. zu seiner Trennung von den es begleitenden Elementen ausgearbeitet, welches aus den folgenden Operationen besteht: Lösen der Substanz in 6-n. HNO_3 , des ungel. Rückstandes in 4-n. HF; Einleiten von H_2S in die gemischten Lsgg., wodurch As, Sb u. Se fast vollständig gefällt werden; Ansäuern mit H_2SO_4 u. Eindampfen, bis die freie Säure zu entweichen beginnt, dann Zusatz von NH_3 bis zur schwach alkal. Färbung; Zusatz von $(NH_4)_2S$, wodurch Ti, Zr, Co u. Ta vollständig gefällt werden. In der Filtrat bleibt Ge mit ursprünglich vorhandenem Sn u. W, sowie den durch H_2S nicht gefällt Elementen As, Sb, Mo u. Se; Dest. des eingedampften Filtrats mit $(NH_4)_2S$ -Nd. mit wss. HBr (D. 1,40) im Br-haltigen Luftstrom, wobei die Br von Ge, As, u. Se übergehen; Fällen des Se durch Einleiten von SO_2 ; Eindampfen des Filtrats vom Se-Nd. u. Destillieren mit rauchender HCl unter Einleiten von H_2 , wobei nur $GeCl_4$ übergeht. Die zahlreichen Einzelangaben u. -vorschriften geben keine auszugsweise Wiedergabe. (Scie. Papers Inst. Phys. Chem. Res. **3**. 243—61.)

J. Hanuš, **A. Jilek** und **J. Lukas**, *Benzoylmethylglyoxim als Fällungsmittel für Palladiumoxydsalze*. (Fortsetzung von S. 1676.) An einer Anzahl Verss. wird die Brauchbarkeit des Verf. gezeigt. Das Pd läßt sich quantitativ trennen von den Pt-Metallen, Au, Cu, Bi, Cd, Hg, As, Sb, Sn, Mo, W, V, Fe, Ni, Co, Zr, Mn u. U. Meist wird in HCl-Lsg. verschiedener Konz. gearbeitet. Bei Sb wird HCl besser durch Weinsäure, bei Mo, W u. V durch H_3PO_4 (Zusatz von KH_2PO_4 in HCl-Lsg.) ersetzt. (Chem. News **132**. 1—4. Prag, Techn. Hochsch.) LINDENBA

Organische Substanzen.

Otto Dafert, *Notiz über die Veraschung kleiner Substanzmengen*. Zur Veraschung er Substanzmengen eignen sich am besten ungefähr 5 g schwere Pt-Schälchen 20 mm Durchmesser u. 15 mm Höhe, die Veraschung wird am bequemsten in n elektr. Tiegelofen vorgenommen. Vf. macht ferner Angaben über ein neues schlußgestell für die Mikrokjeldahlbest. (Biochem. Ztschr. **164**. 444—45. 1925. , Univ.)

FRANK.

G. Denigès, *Studie über das Millonsche Reagens*. Vf. konstatiert, daß es notwendig bei der Darst. des Reagens bestimmte Bedingungen bzgl. der Mengenverhältn. Säurekonz., Temp. etc. einzuhalten u. daß mit dem nach der ursprünglichen nschen Vorschrift hergestellten Reagens sowohl beim Nachweis von Eiweiß-n, als auch von Phenolen die eindeutigsten Resultate erzielt werden. (Bull. pharm. Bordeaux **64**. 3—15.)

ROJAHN.

J. J. Diekmann, *Über die Trocknung kleiner Alkoholmengen*. Es empfiehlt die Trocknung durch Durchleiten des Dampfes durch das Trockenmittel (BaO, CaO) wirken. Bei einem in der Quelle hierzu abgebildeten App. ist der BaO-Behälter einem Dampfmantel umgeben; die durchstreichenden Dämpfe werden seitlich n Kühler geführt. Das Kondensat gelangt nach Durchlauf eines nach unten ge- n Röhrcbens (Dampfabschluß!) in das Kochkölblehen zurück. CH₃OH war 2 Stdn. völlig wasserfrei. Bei A. wird am besten das CaO-Rohr nach 1½ Stde. l erneuert u. dann noch 30 Min. weiter gekocht; in einer Probe nur noch 0,2% W. n. Weekblad **23**. 169—70. Amsterdam, Univ.)

GROSZFEELD.

Waldemar M. Fischer und Arvid Schmidt, *Über eine neue quantitative Be- ung der Alkohole*. II. *Die Bestimmung des Äthylalkohols und seiner Homologen, die Trennung derselben von anderen Stoffen*. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **93**; C. **1924**. I. 2617.) Die früher mitgeteilte Nitritmethode wurde für die Best. u. u. seiner Homologen angewendet u. vereinfacht. Der Harnstoffzusatz zu der ung des NaNO₂ u. des zu bestimmenden Alkohols kann fortbleiben; die Essig- kann auf einmal nach Verdrängung der Luft zugegeben werden u. die höheren oxyde werden durch eine konz. NaHCO₃-Lsg. vollständig absorbiert, wogegen lkylnitrite unverseift bleiben. — Bei Best. der Alkohole bis zum Amylalkohol wo es nicht auf absolute Genauigkeit ankommt, die Best. auf ¾—1 Stde. abz- t werden. — Es wird die Best. u. Trennung des Äthylalkohols, auch bei Ggw. Aceton, Äther u. Acetaldehyd u. des *i*-Butyl- u. *i*-Amylalkohols, auch bei Ggw. oetaldehyd u. Aceton beschrieben. — Bestst. von hochsd. Alkoholen, wie Benzyl- ol, Glykol, Glycerin usw., gelangen nicht, weil die sich hier bildenden Nitrite rsetzlich u. der Dampfdruck derselben zu klein ist. — Die Methode konnte auch mikroanalyt. Best. der Alkohole ausgearbeitet werden; bis zu 3 mg CH₃·OH u. OH konnten in 10 cem Fl. bestimmt werden. — Cocain läßt sich als Methyl- des Benzoylegkonins in je 1 Mol. CH₃OH, Benzoesäure u. Ekgonin spalten u. Best. des hierbei entstehenden CH₃OH nach der Nitritmethode bestimmen. — ndung der Nitritmethode zur Best. der primären aliph. Amine nach der ung R·NH₂ + HNO₂ = R·OH + H₂O + N₂ u. Best. des gebildeten Alkohols itrit gelang nicht, da die Zers. anscheinend nicht quantitativ verläuft. (Ber. Chem. Ges. **59**. 679—82. Riga, Univ.) *

BUSCH.

Mark Walker und C. J. Marvin, *Bestimmung der Stärke flüssiger Blau- mittels des spezifischen Gewichts*. Die Verss. ergaben, daß die gravimetr. ode von LIEBIG bei hochkonz. HCN-Lsgg. zu umständlich vor allem für Werks- sen ist. An ihre Stelle tritt mit Vorteil die Best. der Konz. aus der D. Ein prakt. wird an mehreren Figg. beschrieben, eine Tabelle, welche Konz. u. Temp. be-

rücksichtigt, ist beigegeben. Genauigkeit der Resultate $\pm 0,1\%$. (Ind. and Eng. Chem. 18. 139—42. El Monte [Calif.]) GRIMM

Quarzlampen-Ges., Hanau, *Apparat zum Prüfen von ultravioletten Strahlen*, bestehend aus einer ventilierten, lichtdichten Kammer mit einer Quarzlampe, ultraviolette Strahlen aussendet u., einer Besichtigungsabteilung in dieser Kammer (E. P. 244 407 vom 4/7. 1925, Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 10/12. 1924.)

H. D. Murray, London, *Gasanalysenapparat*, bestehend aus einer Bürette, ein zwischengelagertes Gefäß u. einer Pipette, wobei diese so angeordnet sind, daß letztere beschickt oder entleert werden kann, ohne von den anderen Teilen getrennt zu werden. (E. P. 246 665 vom 30/1. 1925, ausg. 25/2. 1926.) KAUSCH

H. Angewandte Chemie.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Hilpert, *Die Haffkrankheit*. Als Ursache kommt Vergiftung durch As in Betracht, nicht in Frage. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. Papieringenieure 162—63.) SÜVER

Fritz Glaser, *Über die Verunreinigung der Röstgase mit Arsen und die Haffkrankheit*. Das Auftreten von AsH_3 in den Röstgasen der Kiese ist unmöglich. Dabei bildet sich in Ggw. von HCl $AsCl_3$, das durch die Filter geht. Führt man einen Luftstrom durch konz. H_2SO_4 mit As_2O_3 u. ein Wattefilter, läßt sich hinter dem Filter kein AsH_3 nachweisen, fügt man eine geringe Menge $NaCl$ hinzu, so ist hinter Watte AsH_3 nachweisbar. Diese beim SO_3 -Prozeß gemachten Beobachtungen legen die Vermutung nahe, daß das As aus den Sulfitecellulosefabriken auch als $AsCl_3$ ins Haff gelangt. (Chem.-Ztg. 50. 185. Wiesbaden.) JUN

I. Guelman, *Vergiftung durch Arsenwasserstoff in der Technik*. Vf. beschreibt 12 Fälle von Vergiftungen mit AsH_3 . Er wirkt hämatolyt. Im Anhang eine Literaturübersicht. (Journ. Ind. Hygiene 7. 6—16. Moskau.) JUN

David Mc Kail, *Vorbeugungsmittel gegen gewerbliche Bleivergiftung*. Nach OLIVER wird das Blei durch den Verdauungstraktus aufgenommen, nach LEITCH durch Einatmen von Staub oder Dämpfen, u. zwar kann eine chron. Bleivergiftung entstehen, wenn täglich mindestens 2 mg eingeatmet werden. Es wird nun folgende Prophylaxe empfohlen: Waschen u. sorgfältige Reinigung des Mundes u. der Zähne vor jeder Mahlzeit u. nach Beendigung der Arbeit (2—3 mal täglich). Durch Mundspülwasser soll alles l. Blei niedergeschlagen u. die heruntergeschluckten Mengen sollen im Magen in unl. Verb. überführt werden, indem die Hälfte des Mundwassers heruntergeschluckt wird. Als Mundwasser wird eine Lsg. von Epsomssalz ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$), Glaubersalz u. aromatis. Schwefelsäure (British Pharmacopeia) empfohlen, deren jedesmal verwendete Menge 175 mg Bleicarbonat äquivalent ist. (Journ. Ind. Hygiene 8. 74—77.) K. BÖRNSTEIN

Frederick B. Flinn, *Über einige durch den Gebrauch von Äthylgasolin entstehende Gesundheitsschädigungen des Publikums*. Äthylgasolin (vgl. C. 1925. I. 2051) enthält Bleitetraäthyl, dessen gesundheitsschädliche Wrkg. im Tierexperiment untersucht wurde. Es wurde festgestellt, daß aus dieser Verb. Blei 1. durch die Haut u. 2. durch die Atemluft aufgenommen wird, u. zwar trat die Wrkg. bei der letzteren Applikationsmethode schneller ein. Das resorbierte Blei wird im Körper gespeichert — die verschiedenen Bleimengen sind nicht so groß wie die absorbierten. So erklärt es sich, daß bei Menschen, die nicht dauernd der Wrkg. des Bleiäthyls ausgesetzt sind, erst nach Jahren so viel Blei gespeichert ist, daß Schädigungen der Gesundheit merkbar werden. (Journ. Ind. Hygiene 8. 51—66.) K. BÖRNSTEIN

Margarete Quast, *Die Milben vom Standpunkt der Wohnungshygiene und ihre Empfindung*. (Der prakt. Desinfektor 17. 84—89.) ROJAHN.

Rob. Meldau, *Raumbelüftung und Hygiene*. (Der prakt. Desinfektor 17. 120 22.) ROJAHN.

V. Anorganische Industrie.

Robert Hazard, *Die Darstellung des Natriumhyposulfites*. Zusammenfassende Rechnung der Verff. zu seiner Herst. (Rev. chimie ind. 34. 334—38. 365—70.) RÜHLE.

J. C. Mc Donnell und Leslie Hart, *Verschlechterung von handelsüblich verpacktem Kalk*. Unterss. über den allmählichen Chlorverlust von Chlorkalk in handelsüblicher Verpackung. Die Verschlechterung der Präparate hängt nur wenig von der Form der Behälter ab; die größeren Metallbehälter sind vor den anderen ausbleichen Packungen vorzuziehen; die in gutverschlossenen Glasgefäßen aufbewahrten Proben halten sich besser als die in Kannen verpackten. In der warmen Jahreszeit sind die Chlorverluste etwas größer; auch scheint sichtbares Licht dieselben zu beschleunigen. (Journ. Franklin Inst. 201. 355—56.) FRANKENBURGER.

Hugo Menzen, Bochum, *Verfahren und Einrichtung zur Aufarbeitung der bei Benzolreinigung anfallenden Abfallschwefelsäure im kontinuierlichen Betriebe*. 1. mittels W. u. NaOH u. Öl, dad. gek., daß die Aufarbeitung in kontinuierlichem Gange durchgeführt wird. — 2. Einrichtung, bestehend aus der Kombination eines Mischbehälters (Waschbehälter) mit untergebauter Scheideflasche u. Vortrögen für Abfallschwefelsäure, NaOH u. h. Öl sowie einem Dämpfekühler mit untergebauter Scheideflasche. (D. R. P. 426 387 Kl. 12i vom 23/3. 1924, ausg. 1926.) KAUSCH.

Lansfeld-Akt.-Ges. für Bergbau und Hüttenbetrieb und Karl Wagenmann, *Verfahren zur schnellen und vollständigen Zersetzung beliebiger selenhaltiger Verbindungen unter Destillation des Selen*, dad. gek., daß das Ausgangsmaterial mit NaHSO₄, H₂SO₄ u. Alkalisulfat über 700° erhitzt wird, worauf das überdestillierende Selen auf bestimmter Weise in Kondensationsvorr. aufgefangen werden kann. — 2. für Anodenkathode, dad. gek., daß die trockenen Schlämme ohne weiteres mit so viel konz. H₂SO₄ erhitzt werden, als zur Sulfatisierung der in H₂SO₄ l. Bestandteile erforderlich ist, worauf der weitere Aufschluß durch Zuschlag von Alkalibisulfat oder H₂SO₄ u. Alkali unter Steigerung der Temp. bis zum vollständigen Überdestillieren des vorliegenden Se vorgenommen wird. (D. R. P. 426 669 Kl. 12i vom 22/7. 1925, ausg. 1926.) KAUSCH.

Luigi Casale, Rom, *Ammoniaksynthese*. Man verwendet den bei der Elektrolyse von W. erzeugten O₂ allein oder in Mischung mit Luft zum Verbrennen von Brennstoff, scheidet den N₂ von der gleichzeitig erhaltenen CO₂ u. vereinigt den N₂ mit elektrolyt. erzeugten H₂ katalytisch zu NH₃. (Aust. P. 18 527 vom 4/7. 1924, ausg. 23/7. 1925.) KAUSCH.

Amag-Meguinn Akt.-Ges., Berlin, *Kolonnenapparat zum Abtreiben von Ammoniak aus Gaswasser*. 1. dad. gek., daß in den Kolonnen zum Abtreiben des freien Ammoniak große Verdampfungsflächen dad. erzeugt werden, daß die Zackenglocken durch Überläufe ganz unter den Wasserspiegel verlegt werden u. in den Kolonnen Ammoniak durch Anordnung von Leitstegen, die parallel der Glockenperipherie verlaufen, enge Flüssigkeitswege geschaffen werden, um dadurch eine innige Mischung von Kalk u. W. zu erreichen. — 2. dad. gek., daß eine zylindrische Kolonne durch eine schräge Wand in zwei getrennte Abteilungen geteilt ist, von denen die obere als Abtreibraum u. die untere als Speicherraum für das abgetriebene NH₃-W. u. zur Aufheizung eines Vorwärmers für das frische NH₃-W. dient. — 3. dad. gek., daß inner-

halb der Kolonne in einem von der zu verarbeitenden Fl. abgetrennten Raum Dämpfe vor ihrem Austritt aus dem App. durch Umkehr u. Stoß die mitgeris Fl. abscheiden, die direkt durch ein Tauchrohr in die nächsttiefer gelegene Kolonne abgeführt wird. (D. R. P. 426 863 Kl. 12k vom 27/8. 1924, ausg. 20/3. 1926.) KAUSCH

Vulcan Detinning Co., Sewaren, N. J., übert. von: **John Augustus LaSewaren**, *Trennung und Gewinnung von Arsenik und (oder) Antimon und Zinn.* As₂O₃ u. Sn in Form der Oxysalze enthaltende Lsg. wird eingedampft, gekühlt, die Oxysalze des As₂O₃ werden zum Auskrystallisieren gebracht. Enthält das Ausgangsmaterial auch Sb, so geht dieses Oxysalz nicht mit in Lsg. (A. P. 1 575 217 vom 6/5. 1925, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, *Entfernung kolloidal gelöst Kieselensäure aus Erzlaugen.* 1. dad. gek., daß das entstandene Gel mit zugesetzten pulverförmigen, unl. Stoffen gerührt wird, wodurch die SiO₂ in filtrierbare Lösung übergeführt wird. — 2. dad. gek., daß das Verf. in der Wärme ausgeführt wird. (D. R. P. 427 102 Kl. 40a vom 12/1. 1924, ausg. 23/3. 1926.) KAUSCH

Carborundum Co., Niagara Falls, N. Y., übert. von: **Miner L. Hartman**, *Niagara Falls, Zirkoncarbide.* Man schmilzt Zirkonsilicaterz (gegebenenfalls in Verbindung mit Kohle) unter reduzierenden Bedingungen in einem elektr. Ofen u. sammelt das erhaltene Prod. (A. P. 1 576 275 vom 13/3. 1924, ausg. 9/3. 1926.) KAUSCH

General Electric Co., New York, übert. von: **Sylvester Boyer**, Lynn, Massachusetts, *Raffinieren von Galliummetall.* Man bildet eine Haut einer Halogenverbindung auf der Oberfläche einer Galliumcharge u. erhitzt diese im Vakuum derart, daß die Halogenverbindung verdampft. (A. P. 1 576 083 vom 12/8. 1925, ausg. 9/3. 1925.) KAUSCH

K. Ebers, Ahrensburg, Holstein, *Bariumsulfat.* Kalkstein, Fe, Mn usw. haltender Schwerspat wird gebrannt u. dann mit W. zu einem Brei verwandelt, aus dem man das BaSO₄ durch Sedimentation u. Dekantation abscheidet u. mit verd. Säure (HCl) reinigt. (E. P. 246 498 vom 22/1. 1926, Auszug veröff. 24/3. 1926.) Prior. 22/1. 1925.) KAUSCH

Francesco Giordani und **Umberto Pomilio**, Neapel, *Gewinnung von Ton und Kalisalzen aus leucitischen Gesteinen*, dad. gek., daß das Gestein zunächst mit einer Säure aufgeschlossen wird, deren Menge etwas unterhalb der theoret. für die Bindung des im Gestein vorhandenen Al u. K in Betracht kommenden liegt, so daß fremde Elemente nur in geringer Menge gelöst werden, zu welchem Zwecke eine kleine Menge der erforderlichen Säurelsg. anfänglich angewendet wird, u. dann im Laufe des Verf. konz. Säure hinzugefügt wird in dem Maße, wie die Säure durch die Gesteine gebunden wird. (D. R. P. 426 832 Kl. 12m vom 10/9. 1921, ausg. 20/3. 1926.) KAUSCH

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelfstoftaktieselskab, Oslo, übert. von: **Thor Thordell**, Skoien b. Oslo, und **Öystein Ravner**, Oslo, *Reinigen von Aluminium* von Fe-Verbb. Man mischt eine h. Al(NO₃)₃-Lsg. mit einer verhältnismäßig konz. solchen Lsg., von denen wenigstens eine eine Fe-Verb. enthält. Dann krystallisiert aus den Lsgg. das Al(NO₃)₃ aus. (A. P. 1 575 634 vom 27/2. 1922, ausg. 9/3. 1926.) KAUSCH

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung

Ulick R. Evans, *Anlaßfarben, Anlauffarben und andere Färbungen auf Metall.* Krit. Zusammenstellung des Schrifttums über Entstehung, Dicke u. Änderung der Färbungen. (Chemistry and Ind. 45. 211—15.) WILLIAMS

John F. Keller, *Weshalb Werfungen und Sprünge in Metallen?* Von den verschiedenen möglichen Ursachen wird nur die ungleichmäßige Erwärmung u. Abkühlung des Metalls besprochen u. an Zeichnungen u. Fabriksunterss. usw. gezeigt, daß gewisse Defekte sich auf diese Ursache zurückführen lassen u. daß eine solche Deformation der Hauptgründe des Werfens u. der Ribbildung ist. Die Arbeit ist für die Praxis

leben. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 373—402. Lafayette, Indiana, Purdue v.) WILKE.

D. Welge, *Kontrolle der Alkalinität oder Acidität der Flotationstrübe*. Bei der Flotation komplexer Erze ist die Aufrechterhaltung einer bestimmten Alkalinität bzw. Acidität der Trübe für den Flotationsvorgang von Bedeutung. Vf. beschreibt eine einfache Anordnung zur Best. der Leitfähigkeit der Trübe, die sich aus der von einem Amperemeter angezeigten Strommenge ergibt. Für jeden Betrieb ist die Anordnung empir. zu ziehen, entsprechend dem Ablesungsbereich des Amperemeters der D. der Trübe. (Eng. Mining Journ.-Press 121. 409. San Francisco.) K. WOLF.

E. Hirschbrich, *Mechanische Puddelanlagen in Amerika*. Da das Schweißeisen gewöhnlichen Stählen in manchen seinen Eigenschaften überlegen ist, so suchte man in Amerika die Erzeugung des Schweißeisens durch mechan. Öfen rationeller zu gestalten. Folgende Ofenarten werden betrieben: Ofen von Roe: Der Ofen wird mechan. geschaukelt. Das Futter der Seiten- u. Stirnwände besteht aus Magnesiten, der übrige Teil aus gewöhnlichen feuerfesten Steinen. Geheizt wird der Ofen mit Gas. Man gibt gewöhnlich Hochofenschlacke (22—25%) auf, um den Herd vor starken Angriffen zu schützen, die Tüpfugen abzudichten u. die H_3PO_4 aufzunehmen. Der Ofen wird als Sauerstoffträger eingesetzt (25—30%). Das gewonnene Material ist frei von Gasblasen sein u. 45 kg/qmm Festigkeit u. 23% Dehnung haben. Der Hibbard-Ofen: Der Ofen hat kleine Abmessungen, so daß auch die Anlagekosten verhältnismäßig gering sind. Im Hibbard-Ofen (1,83 m ϕ u. 1,67 m lang) wird eine innige Durchmischung von fl. Metall u. Schlacke dadurch erzielt, daß man das Material wiederholt über den „Damm“ fließen läßt, wodurch es rasch in den teigigen Zustand übergeht. Eine solche Anlage ist bei der Titan Iron & Steel Co., Newark, N. J. in Betrieb. Bei der Youngstown Steel Co., Ohio, soll eine Anlage gebaut werden, die Drehöfen benutzt. Anders wie vorstehende Verff. arbeitet das Aston-Verf., da hier das Schweißeisen „synthet.“ hergestellt wird. (Zentralbl. d. Hüttenw. 30. 111—13. Riesa.) WILKE.

Earl F. Rogers, *Mechanisches Beschicken des Kupolofens*. (Iron Age 116. 1514—1515. 1925. PEERLES FOUNDRY Co., Cincinnati.) WILKE.

Reinhold, *Der Elektroöfen in der Eisenhütten- und Metallindustrie*. Über die bisher in der Praxis bewährten Öfen, deren Systematik, konstruktive Eigenart u. betriebliche Ergebnisse wird berichtet. Von den Lichtbogenöfen werden zuerst die indirekten Strahlungsöfen besprochen, die sich wieder in feststehende, um senkrechte Achse drehende, um horizontale Achse rollende u. schaukelnde Öfen einteilen lassen. Ihre Anwendung empfiehlt sich bis zu Größenordnungen von 100—300 kg. Die direkten Lichtbogenöfen kann man ganz allgemein als Elektroöfen der Eisenhüttenindustrie einteilen: in Öfen mit oberen Elektroden allein u. mit oberen u. unteren Elektroden. Von der zweiten großen Gruppe der Elektroöfen, den Widerstandsöfen, haben eigentlich nur die Induktionsöfen Fuß gefaßt, die sich in Öfen mit gleichem Querschnitt u. Öfen mit Querschnittsveränderungen im Sekundärkreis unterteilen lassen. Von einigen Öfen werden die Leistungen gegeben. (Zentralbl. d. Hüttenw. 30. 131—38. Groß-Berlin.) WILKE.

B. Kjerrman, *Die Wirkung von Mangan, Silicium und Phosphor auf das Perlit*. Der Ac_1 -Punkt liegt in einem Temperaturbereich u. nicht bei einer bestimmten Temp. bei Stählen, die Mn, Si u. P enthalten. Der Einfluß dieser Elemente auf den Perlit wurde durch die Änderung des elektr. Widerstandes beim Erwärmen bestimmt. Die durchgegangene Wärmebehandlung, die Gleichmäßigkeit der Struktur bewirkte, vergrößert den durch Mn verursachten Bereich, beeinflußt aber nicht die durch Si u. P verursachten Bereiche. Im allgemeinen erniedrigt Mn u. erhöht Si. Diese Wrkg. kann durch die Perlitbildung erklärt werden, daß Mn u. Si bei derselben Temp. entsprechend mehr oder weniger im Austenit als im Ferrit l. sind. Aus dieser verschiedenen Löslichkeit kann

durch die Abkühlungsgeschwindigkeit in verschiedenen Zeitabschnitten Ungleichheit des voreutektoiden Ferrits in bezug auf den Mn oder Si-Gehalt folgen u. auch Unterschiede in Zus. dieses Ferrits u. des lamellaren Ferrits im Perlit entstehen. Stähle mit genügend hohem Mn- u. Si-Gehalt (0,76 u. 1,86%) zeigen nach der Widerstandsmethode zwei verschiedene Temperaturbereiche. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 430—51. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) WILKE

J. Laissus, *Zementation der Ferrolegierungen durch das Wolfram*. Das als Zementationsmittel verwendete fein vermahlene Ferro-Wolfram hatte die Zus. C = 0,9, W = 81,52%. — 1. Einfluß der Zeit u. Temp.: es wird eine deutlich sichtbare Zementation einer festen Lsg. bei Zementationen von langer Dauer (10 Stdn.), ferner eine aufglänzende Schicht festgestellt, die wahrscheinlich durch das W-Carbid gebildet wird u. deren Dicke mit der Zeit u. Temp. wächst. — 2. Einfluß der Zus. der Zementationslegierung; bei Stählen nimmt die Dicke der zementierten Zone mit dem C-Gehalt zu bemerken ist, daß graues Gußeisen sich zementieren läßt. — 3. Widerstand gegen oxydierende Einflüsse bei hoher Temp. u. gegen Korrosion durch W. u. Säuren: einem 10 Stdn. langen bei 1100° zementierten sehr weichen Stahl ergab sich: in eingetaucht ist die gebildete Oxydmenge sehr gering. Die Korrosion in Salpetersäure ist sehr schnell, in Schwefelsäure sehr langsam u. in Salzsäure geringer als bei nicht zementiertem Stahl. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 465—67.) KALPER

Theodor Klingenstein, *Über hochwertigen Grauguß*. Von den 3 Verff. zur Herstellung von hochwertigem Grauguß a) das Verf. nach THYSEN-EMMEL, b) Verf. der Maschinenfabrik Eßlingen im Wüstenofen u. c) das Verf. durch Schmelzen oder Feinen im Elektroofen wird kurz das der Maschinenfabrik Eßlingen behandelt. Der benutzte Wüstenofen stellt einen Flammenofen dar, auf dessen einer Seite der Ölbrenner eintritt, während am entgegengesetzten Ende ein Füllschacht aufgesetzt ist. Als Heizöl dient Stöckholmlötl mit einem Heizwert von rund 9200 kcal/kg (s. auch Stahl u. Eisen 1914/15; C. 1925. II. 2186). Zwei weitere Verff., das von SCHÜTZ u. das von PIWOWARS werden zum Schluß kurz erwähnt. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 70. 387—90. Maschinenfabrik Eßlingen.) WILKE

Th. Meierling und W. Denecke, *Über die Entschwefelung des Gußeisens*. Auf Seigerung beruhende Entschwefelung fl. Eisenbäder ohne Einw. von chem. Entschwefelungsmitteln wurde näher untersucht. Dabei konnte ein Einfluß von Erschütterungen des Eisenbades auf die Entschwefelung nicht festgestellt werden. Bei hochschmolzenem Gußeisen tritt nach einem gewissen Temperaturabfall eine deutliche Entschwefelung ein, die auf Ausseigerung oder Ausfrieren von an Eisen u. Mangelsulfid reichen Mischkrystallen zurückzuführen ist. Die Entschwefelung tritt sowohl bei hochschwefelhaltigen Legierungen, als auch bei Gußeisen mit n. S-Gehalt ein. Nur bei matt erblasenen Gußeisenbädern tritt keine Entschwefelung ein, weil die sich bildenden Mn- u. Fe-Sulfide durch die Dickfl. des Bades am Aufsteigen verhindert werden. (Gießereiztg. 23. 175—78.) WILKE

P. Ludwik, *Streckgrenze, Kalt- und Warmsprödigkeit*. Es wird versucht, das merkwürdige Verh. von Flußstahl an der Streckgrenze beim gewöhnlichen Zugvers., bei „Altern“ u. bei „Blauwärme“ mit der Abhängigkeit der Sprödigkeit von Geschwindigkeit, Temp. u. Spannungszustand in Beziehung zu bringen u. auf die Änderung des Gleit- u. Reißwiderstandes zurückzuführen. So werden die Streckgrenze von Elektroflußstahl u. deren Änderung, sowie die Blaubrüchigkeit u. die Vorgänge bei der Stahlhärtung u. bei der Vergütung von Al-Legierungen als Nachhärtungserscheinung aufgefaßt u. auf Löslichkeitsänderungen zurückgeführt. Aus der Änderung des Gleit- u. Reißwiderstandes u. des Spannungszustandes werden die Kältsprödigkeit, die Abhängigkeit der Kerbzähigkeit von der Kerbart u. Probenform, der Schlaggeschwindigkeit u. der Temp., sowie die Möglichkeit eines Trennungsbruches vor Fließbeginn, Kerbwirkg., Reck- u. Wärmespannungen abgeleitet. An Beizverss. mit Flußst.

gezeigt, daß durch H₂-Aufnahme die Reißfestigkeit stark abnimmt, während die Streckgrenze u. Zugfestigkeit nicht ändern. Die kaus. Sprödigkeit tritt bei Erniedrigung der Reißfestigkeit durch H₂-Aufnahme u. Erhöhung des Gleitwiderstandes durch Altern besonders hervor. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **70**. 379—86. 1926.)

WILKE.

F. T. Sisco, *Die Schlagwerte eines Nickelstahles*. Der Stahl enthält 0,24% C, 0,61% Mn, 0,016% S, maximal 0,040% P u. 3,52% Ni, Si ist nicht bestimmt worden. Bei verschiedenen Tempp. abgeschreckte Stücke wurden ebenfalls auf verschiedene Tempp. erhitzt u. dann untersucht. Bei einer Abschrecktemp. von 845—775° u. Erwärmen auf 425° liegen die Schlagwerte zwischen 47 u. 51 ft./lb., mit höherer Abschrecktemp. (auf 885°) fallen die Werte auf 41 ft./lb. Bei einer Abschrecktemp. von 775° u. Erwärmen auf 535° erhält man 82 ft./lb., bei höherer Abschrecktemp. fällt der Wert wieder, ist nicht bedeutend. Beim Erwärmen auf 650° spielt die Abschrecktemp. gar keine Rolle mehr; die Werte liegen zwischen 93,6 u. 97,1 ft./lb. (Iron Age **116**. 1513—14. 1925. Air Service, McCook Field, Dayton [O.])

WILKE.

T. Spooner, *Temperaturkoeffizient der magnetischen Permeabilität von Stahlblech*. In den Verss. dienenden Stahlbleche enthielten 0,9 bis 4,0% Si. Die Temperaturkoeffizienten wurden in dem Intervall von —20° bis +46° untersucht. Es ergab sich bei diesen Verss., daß gering u. mittelhochprozentige Si-Stähle große positive Permeabilitäts-Temp.-Koeffizienten für geringe Induktionen besitzen, u. daß sie negative Koeffizienten für hohe Induktionen, d. h. bis zu 14 Kilogauss besitzen. 4%ig. Si-Stahlblech hat im allgemeinen für alle Stärken der Induktion negative Temp.-Koeffizienten. Vf. erklärt die Neigung der Koeffizienten zur negativen Seite mit zunehmendem Si-Gehalt mit einem spezif. Einfluß des Si auf die Kohle oder auf die anderen Verunreinigungen. Das Maximum der Permeabilität wurde bei 6 bis 8 Kilogauss erzielt. Minimum bei 10 Kilogauss. Dieses Minimum entspricht auch 2 Gilbert/cm u. ist um so ausgeprägter, je höher der Si-Gehalt ist. Diese Ergebnisse zeigen, daß der Temp.-Koeffizient in engerer Beziehung zur Induktion als zur Permeabilität steht. (Physical Review [2] **27**. 183—88. East Pittsburgh [Pa.], Westinghouse Res. Lab.)

Charles Grand, *Einfluß der thermischen Arbeitszone auf die Wahl der Stähle für die Ple von Flugzeugmotoren*. Es handelt sich um 3 Gruppen von Cr-Si-Stählen mit 0,5—1,920 bzw. 2,440—2,900 bzw. 3,885—4,100% Si u. 11,620—14,210 bzw. 14,0—14,000 bzw. 11,610—14,080% Cr. Von diesen Stählen erwies sich der Stahl mit 0,4% C, 2,5% Si, 12% Cr als der geeignetste. Nach Härtung an der Luft bei 900° u. Anlassen bei 900° besitzt er folgende Eigenschaften: oberer krit. Punkt bei Erwärmung 900°, Dichte 7,8, Zerreißeigenschaft 92 kg/qmm, Dehnung 12%, Einwirkungszeit 4%, Brinellhärte 280 (kalt), bei 900° etwas unter 40. Derartige Cr-Si-Stähle sind auf einem 450 PS-Lorraine-Motor in einem Dauervers. von 50 Stdn. ohne geringsten Zwischenfall erprobt worden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1143—145. 1925.)

KALPERS.

F. S. Fuller, *Brüchigkeit von Kupfer durch heiße reduzierende Gase*. An einer großen Anzahl Beispiele aus der Praxis wird der schädliche Einfluß reduzierender Gase auf Oxyde enthaltendes Kupfer gezeigt. (Metal Ind. [New York] **24**. 100—01. 1925. Nectady, N. Y., General Electric Company.)

WILKE.

Adolph Bregman, *Die Aufarbeitung von Abfallkupfer*. Reines, erstklassiges Cu wird in jedem Ofen unter einer Holzkohlendecke geschmolzen werden, u. U. auch ohne Oxydationsmittel. Bei Kupferdrähten wird die Gummiisolierung abgebrannt, der Rest in Cu getretene S durch Oxydation entfernt u. schließlich das Cu desoxydiert; geschieht durch Luftdurchblasung durchs Bad u. anschließendes Polen mit Holz. Schwieriger ist die Entfernung metall. Verunreinigungen. Allgemein wird dazu O₂ verwendet, die gebildeten Oxyde steigen zur Oberfläche oder verflüchtigen sich. Als Alternative wird Luft oder auch Kupferhammerschlag benutzt. Bei der Al-Entfernung

haben sich auf 1 t Metall 100 lb. von folgendem Flußmittel bewährt: Flußspat 30 T. Kalk 13 Teile, Kieselgur 50 Teile u. 7 Teile Natriumsalz. Die Raffination von Messing abfällen gelingt am besten mit Bleioxyd. Zu der geschmolzenen M. wird ein Flußmittel gegeben u. Luft durchgeblasen, Zn, Fe, Al u. Mn werden hierbei sehr schnell oxydiert u. verschlackt u. dann wird Bleioxyd zugesetzt, das das restliche Zn entfernt. Man erhält dadurch Pb-haltiges Cu. Aus Beizlsgg. wird das Cu durch Fe-Späne wieder gewonnen, brikettiert u. geschmolzen. (Metal Ind. [New York] **24**. 102—04.) WILK

E. A. Owen und **G. D. Preston**, *Der Einfluß des Walzens auf die Krystallstruktur des Aluminiums*. Vf. untersucht die Krystallstruktur gewalzten Al röntgenographisch sowohl mittels des Ionisierungsspektrometers als auch mittels photograph. Methode um eine eindeutige Entscheidung über die bisher voneinander abweichenden Feststellungen betr. der Orientierung der Krystalle im gewalzten Material zu erhalten. Es zeigt sich, daß beim Walzen eines größeren, wahllos orientierte Einzelkrystalle enthaltenden Al-Stückes die Krystalle zu einer großen Anzahl sehr kleiner Krystalle zerbrechen. Mit fortschreitender Dickenverminderung des gewalzten Bleches nehmen die kleinen Krystalle allmählich eine bestimmte Orientierung an, indem ihre Radien diagonale sich in die Walzrichtung u. eine (211)-Fläche in die Walzebene einstellt. Nach dem Walzen befinden sich 2 Gruppen von Krystallen im Material, wovon eine das opt. Spiegelbild der anderen in der Walzebene bildet. Die Beobachtung mittels des Ionisierungsspektrometers zeigen, daß das Krystallgitter des Al unverändert bleibt u. die Gitterkonstante eines lange bearbeiteten Materials von der massiven Stückerde um sicher nicht mehr als 0,5% verschieden ist. Die mittels photograph. Methode erhaltenen Folgerungen sind in dieser Beziehung nicht ganz so eindeutig. (Proc. Physical Soc. London **38**. 132—47.) FRANKENBURGER

W. Feitknecht, *Krystallwachstum in rekristallisierten kaltbearbeiteten Metallen*. Die Unterss. haben die Strukturänderungen zum Gegenstand, die nach der beendeten Rekristallisation einsetzen. Es wurden hierzu reines Al (99,6%), sowie sehr reines Al (99,98%) u. sehr reines Ag benutzt. Nachdem die Rekristallisation beendet ist, finden weitere Strukturänderungen bei längerem Anlassen durch Wachsen der vorhandenen Krystalle statt u. zwar sowohl bei konstanten, wie auch bei steigenden Temperaturen. Es wurden keine Krystalle beobachtet, die sich aus neuen Keimen gebildet hätten. Auch keine Beziehung war festzustellen zwischen der Größe u. Gestalt der Krystalle u. der Wachstumsmöglichkeit; das Wachstum war um so größer, je mehr die Bleche vor der Rekristallisation bearbeitet waren. In reinem Al wurden bei den mittelmäßig bearbeiteten Stücken sehr große Krystalle festgestellt. Unter einer bestimmten Transformationsgrenze fand keine bemerkenswerte Änderung nach erfolgter Rekristallisation statt. In Blechen, die dünner als 0,75 mm waren, nahm die Krystallgröße mit fallender Stärke der Bleche ab u. in sehr dünnen Blechen fand überhaupt kein bemerkenswertes Wachstum nach vollendeter Krystallisation statt. In sehr reinem Al war das Wachstum ausgeprägter als im gewöhnlichen; das sehr reine Ag verhielt sich dem sehr reinen Al ähnlich, nur das Krystallwachstum war nicht so stark. Zum Schluß versucht der Vf. die Beobachtungen zu erklären. (Metal Ind. [London] **28**. 268.) WILK

K. L. Meißner, *Die Veredelungsvorgänge in vergütbaren Aluminiumlegierungen*. Eine krit. Zusammenstellung des bisherigen Schrifttums wird gegeben. (Ztschr. Dtsch. Ing. **70**. 391—401. Berlin-Adlershof, Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt.) WILK

Léon Guillet und **Jean Galibourg**, *Über das Härten der Aluminium-Kupfer-Legierungen mit über 5% Kupfer*. (Vgl. S. 2048.) Schon 1921 wurde die Aufmerksamkeit auf die Härtung von Al-Cu-Legierungen gerichtet, die ohne Übergang durch eine Umwandlungslinie lediglich durch die Veränderung des Bestandteilverhältnisses erfolgt. Seitdem durchgeführte Arbeiten haben zu einer Legierung geführt, die 5% u. 1% Mn einschließt u. die nach Härtung bei 565° u. einer 200 stdn.-langen Erhit-

110° eine Zerreifestigkeit von 43,5 kg/qmm u. eine Dehnung von 22% ergibt. s. mit einer Legierung zu 12—13% Cu u. 88—87% Al, die hufig Verwendung fr die Herst. von Kolben fr Explosionsmotore findet, zeigen: 1. den betrchtlichen Einflu des Hrtens u. des Anlassens auf die Hrte der Legierung, die im gnstigsten Falle sehr hufig verdoppelt wird u. 2. den Einflu der therm. Behandlung auf den Widerstand, der nicht allein mit der Hrtung, sondern auch bei gewissen Legierungen mit dem Anlassen wchst. Die mikrograph. Unters. zeigt Erscheinungen beim Duralumin bekannten Art. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1107—08.)

KALPERS.

George Mortimer, *Spritzgu von Aluminiumlegierungen*. Die normierten Legierungen (3L 11, 2L 8, 2L 5 u. L 24 [Y]), ihre Vorteile, sowie die verschiedenen Gumethoden werden besprochen. (Metal Ind. [London] **28**. 247—49. 269—70. 298—99.)

WILKE.

J. R. Vilella, *Untersuchen von Metallstrukturen*. Fe-Cr-Legierungen, die auch V u. Mo enthalten knnen, werden durch Knigswasser plus Glycerin im Schliffgut getzt. Das tzmittel besteht aus 1 Vol-Teil HNO₃, 2 Vol-Teilen HCl u. 3 Vol-ten Glycerin; die Suren werden getrennt zum Glycerin zugefgt. Es werden Schliffprparate einer Legierung mit 25% Cr u. 0,25% C (auf 1100° erhitzt, im W. abgeschreckt) getzt, die zuerst mit Knigswasser + Glycerin getzt, dann poliert, hierauf in kochender 10%ig. HCl getzt, wieder poliert u. zum Schlu in Murakamis Reagenz getzt sein wren. Die neue Lsg. bringt alle Strukturnderungen, die durch Wrmebehandlung entstanden sind, zum Vorschein, was bei den bisher bekannten tzflssigkeiten der Fall ist. Die Schwierigkeit mit der Lsg. ist die, da oft ein gewhnliches Einwirken nicht zum Erfolg fhrt; in diesen Fllen — bei niedrig C-enthaltenden Legierungen — mu 3 oder mehrmals tzen u. Polieren abgewechselt werden, um die wnschten Strukturzeichnungen zu erhalten. — Bei der Unters. von Cu-Legierungen, die Nickelide des Ni, Co, Cr oder Fe enthalten, gab nur 15%ig. Chromsure mit einigen Tropfen konz. HCl gute tzfiguren. Der gnstigste HCl-Gehalt schwankt mit der Legierung; Bronzen u. Messing wurden zufriedenstellend mit 10%ig. Chromsure, Tropfen HCl auf 50 cem Lsg. enthielt, innerhalb 5—10 Sek. getzt. Legierungen mit mehr als 95% Cu, Ni-Cu-Legierungen u. reines Cu bentigen eine lngere Einwirkungszeit. Bronze u. Messing; diese Legierungen werden am besten nach der oben erwhnten Methode des abwechselnden tzens u. Polierens getzt. In Cu-Sn-Legierungen wird die Lsg. durch die tzflssigkeit nicht angegriffen, whrend die δ -Lsg. braun oder schwarz wird, entsprechend der Dauer des tzens. Bei Zn-Cu-Legierungen wird die β -Lsg. nicht angegriffen, die α -Krystalle bleiben unverndert. (Iron Age **117**. 761—63. 834—36. Island City [N. Y.], Union Carbide & Carbon Research Lab.)

WILKE.

Richard Baumann, *Die Hrte weicher Metalle*. Bei weichen Metallen ist die Kugeldruckprobe u. das Rcksprungsverf. nach SHORE nicht zufriedenstellend, dagegen liefert die Schlaghrteprfung gute Werte. Die Schlaghrtezahlskala, die sich ergibt, wenn die aufgewendete Schlagarbeit durch den Inhalt des erzeugten Kugeleindrucks geteilt wird, wobei sie innerhalb weiter Grenzen von der Legierungshrte unabhngig ist. Die mit dem Schlaghrteprfer (Bauart BAUMANN-SCHLG) erhaltene Eichlinie verluft fr eine groe Zahl von sehr verschiedenen Metallen stets stetig. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **70**. 403—04. Stuttgart, Techn. Hochschule.)

WILKE.

S. N. Petrenko, *Ein elastischer Ring zur Prfung der Untersuchungsmaschinen im Ringhrte*. Es werden die Kugeleindrcke der zu prfenden Maschine u. einer genaueren beladenen Maschine am Ring verglichen. Gut hat sich dabei fr Stahl bewhrt: 0,81% C, 1,11% Mn, 0,021% P, 0,019% S, 0,24% Si, 0,50% W., er wurde von 815° in l abgeschreckt u. bei etwa 480° getempert.

207*

(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 420—29. Washington, D. C., U. S. Bureau Standards.)

O. E. Harder, R. L. Dowdell und A. C. Forsyth, *Dilatometrische Methode der Wärmebehandlung*. Zwei neue Apparate werden beschrieben. Der erste, der ein dilatometr. Ofen für Wärmebehandlung bezeichnet werden kann, soll auch die Praxis geeignet sein, u. zwar besonders für Werkzeuge, Matrizen usw., da er mit großer Genauigkeit in bezug auf die endgültige Form gehärtet werden kann u. weil die Größe der Gegenstände während der gesamten Wärmebehandlung messen wird. Besonders eignet sich der Ofen für gleichartiges Material, da es keine Schwierigkeit bereitet, gleichzeitig 3 Öfen zu bedienen. Der zweite App. ist ein dilatometr. Pyrometer, das man auch im Laboratorium leicht u. billig herstellen kann. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 403—19. 520—21. Bethlehem [Pa.], School of Mining Univ. of Minnesota, Bethlehem Steel Co.)

R. S. Kerns, *Schmelzen von hochchromhaltigen Legierungen im sauren Ofen*. Erfahrungen bei der Herst. der Legierung: 25—30% Cr, 0,40—0,60% C, nicht über 0,50% Si, 0,60—0,80% Mn, nicht über 0,05% S u. nicht über 0,05% P werden mitgeteilt. Die erwarteten hohen Cr-Verluste trafen nicht ein, nur 0,38% gingen verloren. Folgendes erwies sich als günstig bei der Herst.: rund 30% des Ferrochroms sollen mit dem Schrott eingetragen u. der Rest in kurzen Zeiträumen u. kleinen Mengen zugegeben werden. Nach Vfs. Meinung kann ein Legierungsstahl im sauren Ofen eben zufriedenstellend hergestellt werden wie im bas. (Foundry 54. 229—31. Pennsylvania State College, Pa.)

H. Y. Carson, *Bronzeschweißung von Gußeisenrohr*. Aus den Unterss. folgt, daß die Breite der außen anhaftenden Schweißung in einem direkten Verhältnis zur Dicke des Rohres stehen soll, u. daß für eine maximale Festigkeit der Wert zwischen $1\frac{1}{4}$ und $1\frac{1}{2}$ der Dicke des Rohres liegt. Ebenso soll die Dicke der Bronzeschweißung sich mit der Dicke des Rohres ändern u. soll für maximale Festigkeit zwischen $\frac{3}{16}$ u. $\frac{1}{4}$ liegen. Die Schweißstelle wird im Laufe von 2—3 Stdn. nach Schweißung fester, so daß sie nach einer starken Beanspruchung sofort nach der Schweißung zu vermeiden ist. Vf. gibt eine Tabelle, aus der man aus der Dicke des zu schweißenden Rohres, die Breite u. die Dicke der bronzenen Schweißstelle u. die dazu beste Schweißdauer entnehmen kann, daneben neben einer sorgfältigen Reinigung des Rohres ist auch die Schweißdauer von großer Bedeutung. (Acetylene Journ. 27. 429—35. Birmingham [Ala.], American Cast Iron Pipe Co.)

—, *Das Crapo-Verzinkungsverfahren*. Die Indiana Steel and Wire Company, Muncie, Indiana, hat ein neues Verzinkungsverf. für Fe-Drähte eingeführt, das einen Draht ergibt, der nur festanhaftendes Zn haben soll. Der Draht geht durch ein Bad geschmolzener Salze (Zus. nicht angegeben), dann durch ein Bad, in dem die anhaftenden Salze entfernt werden, hierauf wird verd. HCl u. eine h. Phosphorsäurelösung passiert, um schließlich ins Zn-Bad zu führen. (Metal Ind. [London] 28. 315.)

C. L. Mantell, *Wiedergewinnung des Zinns aus Weißblechdosen*. Vf. wendet sich gegen die Ausführung von ISMAR GINSBURG, die die europäischen Verhältnisse widerspiegeln, aber für die Vereinigten Staaten nicht zutreffen. (Iron Age 115. 1545. 1925. Pratt Inst., Brooklyn [N. Y.])

Walter G. Whitman, *Eisenkorrosion*. Die elektrochem. Theorie ist jetzt allgemein anerkannt worden, da sie am zwanglosesten die Korrosionserscheinungen bei gewöhnlicher Temp. erklärt. Die Anwesenheit von gel. O₂ ist für bemerkbare Korrosion in so vielen Fällen notwendig, daß seine Rkk. von größter Bedeutung sind. Die Diffusion des O₂ an einer wirksamen Kathodenoberfläche bestimmt oft die Korrosionsgeschwindigkeit. Unterschiede in der O₂-Konz. an verschiedenen Punkten der Oberfläche führen, während dieser längere Zeit aufrecht erhalten bleibt, zu lokaler Korrosion u. punktförmiger Fressung. Die übliche Wrkg. der Bewegung besteht in Vergrößerung der Korrosion durch

gel. O₂, sowohl durch erhöhte Diffusion wie auch durch Zerstörung anhaftender Zersetzungsprodukte. Die Wrkg. gel. Salze kann allgemein in Beziehung gebracht werden mit ihrer Löslichkeitsbeeinflussung des Korrosionsprod. Gel. Salze erhöhen oft die Neigung zu punktförmiger Anfressung, was sich zurückführen läßt sowohl auf erhöhte Löslichkeit der Lsg., als auch im Falle der Salze, die die Korrosion vermindern, die Neigung größerer Oberflächenteile, sich selbst zu schützen u. den Angriff auf die ungeschützte anod. Flächen zu konzentrieren. (Chem. Rev. 2. 419—35.) WIL.

Hans Ludwig Meurer, *Stoffverfall und Stofferhaltung*. Die Notwendigkeit der Stofferhaltung wird betont u. festgestellt, daß der Farbanstrich nur kurze Zeit schützende Wrkgg. entfalten kann u. daher einen dauerhaften Rostschutz ohne Substanzverlust nicht gewährt. Hierauf werden die gebräuchlichsten Verzinkungsverff., ihre Anwendung u. Anwendung besprochen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 70. 461—67. Köln.) WIL.

Alfons Wagner, Duisburg, und **Kurt Thomas**, Duisburg-Meiderich, *Verfahren zur Erhöhung des prozentualen Sauerstoffgehaltes der Gebläseluft für metallurgische Öfen*. 1. Verf., dad. gek., daß der atmosphär. Gebläseluft in den Leitungen, die hinter dem Gebläse N₂ durch Diffusion entzogen wird. — 2. Vorrr., dad. gek., in den Weg der Gebläseluft poröse Rohrstücke verlegt sind. — 3. dad. gek., daß diese poröse Leitungsstücke zu- u. abschaltbar parallel geschaltet sind, zum Zweck, das prozentuale O₂-Gehalte der Gebläseluft verändern zu können. (D. R. P. 438 18a vom 20/9. 1922, ausg. 16/3. 1926.) KAUSCH.

William J. Diederichs und **Anson Hayes**, Ames, Iowa, *Hämmerbares Eisen*. Man unterwirft Gußeisen 15 Min. bis 5 Stdn. u. mehr einer über der krit. liegenden Temp. (etwa 740°), kühlt das Fe auf eine nahe der krit. liegende Temp. ab, schließlich auf gewöhnliche Temp. ab. (A. P. 1574 374 vom 21/8. 1922, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

William J. Diederichs und **Anson Hayes**, Ames, Iowa, *Raffinierung von Gußeisen*. Man erhitzt das Gußeisen auf etwa 740°, kühlt dann beträchtlich ab, erhitzt wieder u. kühlt dann langsam (etwa 5° in der Stunde) ab. (A. P. 1574 375 vom 21/8. 1922, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

William J. Diederichs und **Anson Hayes**, Ames, Iowa, *Raffinierung von Eisen*. Man erhitzt das Gußeisen 15 Min. bis 5 Stdn. auf etwa 740°, bis das Eisenkarbid von der festen Lsg. absorbiert ist u. kühlt dann (nicht weniger als 5° in der Stunde) ab. (A. P. 1574 376 vom 21/8. 1922, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

William J. Diederichs und **Anson Hayes**, Ames, Iowa, *Raffinieren von weißem Eisen*. Das Gußeisen wird auf etwa 900° erhitzt, dann wird es auf eine über der krit. liegende Temp. (gewöhnliche Temp.) abgekühlt, dann nochmals erhitzt (etwa 850°) u. schließlich nochmals abgekühlt. (A. P. 1574 377 vom 21/8. 1922, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

H. Curtius & Co., Duisburg, *Gewinnung des Kupfergehaltes von Schwefelkies*. (D. R. P. 427 011 Kl. 40a vom 11/3. 1924, ausg. 23/3. 1926. — C. 1925. II. 2028.) KAUSCH.

H. Curtius & Co., Duisburg, *Gewinnung des Kupfergehaltes von Schwefelkies*. (D. R. P. 427 011 Kl. 40a vom 11/3. 1924, ausg. 23/3. 1926. — C. 1925. II. 2028.) KAUSCH.

Kristiansands, *Nickelraffineringsverk.*, Kristiansands, Norwegen, übert. von: **Ed. Giertsen**, Kristiansands, *Trennen von Metallen*. Cu wird aus Cu u. Ni entzogen, indem man diese mit bessemerisierter Kupfer-Nickellsgg. abgeschieden, indem man diese mit bessemerisierter Kupfer-Nickellsgg., die weniger als 10% S enthält, behandelt. (A. P. 1575 160 vom 26/9. 1921, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH.

Max Stern, Essen, Ruhr, *Gewinnen von Nickel oder Ferronickel aus nickelhaltigem Eisensinter*, dad. gek., daß der Walzensinter zusammen mit Fe- oder Stahlspänen,

ohne weiteren als in den Spänen vorhandenen C brikettiert u. in einem beliebigen Ofen niedergeschmolzen wird. (D. R. P. 426 836 Kl. 18b vom 29/3. 1918, a. 17/3. 1926.) KAUSC

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: **Walter Friedrich**, Berlin-Niederschöneweide), *Veredelung von Kupferlegierungen mit Eisen (etwa 3— und Aluminium (etwa 8—15%)*, indem man der fertig geschmolzenen Legierung vor dem Vergießen Alkalisalz zusetzt, dad. gek., daß in dieser Weise Alkalichlorid u. Alkalifluoride einzeln oder gleichzeitig in Mengen von 0,5—3% des Metalleins verwendet werden. (D. R. P. 426 564 Kl. 40b vom 20/6. 1923, ausg. 13/3. 1926.)

Robert Siller, Duisburg, *Hartgußlegierung, die gegen Säuren und Laugen widerstandsfähig ist*, 1. dad. gek., daß der Gattierung gleichzeitig Mo, Wo, Ni u. C in kleinen Mengen zugesetzt wird. — 2. dad. gek., daß der Mo- u. Wo-Gehalt u. Co-Gehalt den Ni-Gehalt übertrifft. (D. R. P. 426 835 Kl. 18b vom 16/11. 1922, ausg. 17/3. 1926.) KAUSC

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: **Bruno Fetscher**, Karlshorst), *Herstellung von Legierungen für Geräte (Werkzeuge usw.) großer Härte*, 1. dad. gek., daß das Wolframcarbid in ein geschmolzenes Metall als eine Metallegierung eingetragen wird. — 2. Anwendung des Verf. zur Herstellung von Legierungen aus Cr, Co, Wo u. C, dad. gek., daß in die geschmolzene Cr-Co-Legierung aus 1 Teil Cr u. 1—2 Teilen Co 1—20% Wolframcarbid eingetragen werden. (D. R. P. 427 074 Kl. 40b vom 25/3. 1922, ausg. 23/3. 1926.) KAUSC

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., *Überzug von Metallen*. Al, Ca u. Mg werden durch einen Überzug von Cd oder seiner Legierung mit Se, Pb, Cr, Wo, Mo, Mn, Co, Bi, Zn, Sb oder Sn oder Mischungen dieser vor Verrosten geschützt. (E. P. 245 723 vom 29/6. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. 1. 9/1. 1925.) KAUSC

I. Kreidl, Wien, *Emaillen*. Weiße, für gewöhnlich nicht opakmachende Metalloxyde für Emaillen werden für diesen Zweck brauchbar gemacht, indem man sie in Gelform (am besten in Kolloidmühlen) überführt. (E. P. 245 757 vom 29/12. 1924, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 10/1. 1925.) KAUSC

Acme Steel Co., Chicago, Ill., übert. von: **William C. Kronquest**, Chicago, *Behandlung von Metall vor seiner Weiterverarbeitung (Elektroplattierung)*. Das Metall taucht in eine Lsg. aus Säure in W. u. Hindurchschicken eines elektr. Stromes. Das Metall bildet dabei die Anodenplatte einer elektrolyt. Zelle u. setzt die Metalle des Elektrolyten an sich ab. Die Kathode besteht aus Pb oder einem anderen Metall, das in der Säure gewöhnlich nicht reagierenden Material. (A. P. 1 574 823 vom 27/5. 1925, ausg. 2/3. 1926.) KAUSC

IX. Organische Präparate.


J. T. Conroy, *Über die Verwendung des Chlors in der organischen chemischen Industrie*. Vf. gibt eine zusammenfassende Darst. über die Bedeutung des Chlors in der organ. chem. Industrie im besonderen. (Trans. Amer. Electrochem. Soc. 49. 18 Seiten. Sep.) LINDENBAUM

Stefan Bakonyi, *Die Fortschritte der Acetonfabrikation durch Gärung*. Vf. beschreibt ein in der Praxis durchgeführtes Verf. zur Herst. von Aceton durch Gärung von Zucker. (Chem.-Ztg. 50. 257—58. Budapest.) JU

V. Toja und U. Ceva, *Die elektrolytische Herstellung von Glykolsäure*. Die Herstellung von Glykolsäure erfolgt am besten durch elektrolyt. Red. von Oxalsäure gemäß der Gleichung $(\text{COOH})_2 + 4\text{H} = \text{CH}_2(\text{OH})\cdot\text{COOH}$. Die besten Methoden werden in der Schrifttum beschrieben. Rentabilitätsberechnungen sind beigegeben. Die Herstellung da zu empfehlen, wo billige Elektrizität u. billige Oxalsäure zu haben ist. Nur

in sie in der Technik mit Weinsäure konkurrieren. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8. 7. Mailand.) GRIMME.

F. J. Metzger, Calciumcyanid — „gepulverte Blausäure“. Ein neues Handelsprodukt. Calciumcarbid reagiert mit HCN gemäß der Formel:



bedingung ist möglichst geringer W.-Gehalt der HCN (höchstens 2% des anrunden CaC_2). Das Endprod., dem auch die Formel $\text{CaH}_2(\text{CN})_4$ zugeschrieben werden kann, enthält 52—58%, im Mittel 55% CN, entsprechend 103,56% NaCN, in W. unter Wärmeentw. ll., ebenso in A. u. CH_3OH , ist bis 100° beständig, Beginn Zers. bei ca. 120°, ist lagerfest bei Temp. zwischen 0 u. 60°. W. zers. es gemäß der Gleichung $\text{CaH}_2(\text{CN})_4 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + 4\text{HCN}$. Es kann als Insektizid gasförmige l. HCN in allen Fällen ersetzen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 161—63. New York [Y.]) GRIMME.

—, *Synthetischer Campher*. Kurze Beschreibung der neueren Ergebnisse. (Metallbörse 16. 90—91.) BEHRLE.

—, *Die Verwendung von Nopinen zur Campherherstellung*. Kurze Darst. des jetzigen Standes des Problems, daß von einer rationellen Fabrikation mittels Nopinen noch nicht gesprochen werden kann. (Metallbörse 16. 202—03.) BEHRLE.

Hans Bucherer, Charlottenburg, *Verfahren zur Reduktion organischer Verbindungen*. Hydrosulfiten, dad. gek., daß die Red. bei Ggw. von organ. Lösungsm., vorzugsweise von Eg. u. homologen aliph. Monocarbonsäuren, zur Ausführung gelangt. — Verf. ermöglicht die Red. in W. unl. organ. Verb. mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$. An Stelle von HCO_2H , Stearin- oder Ölsäure, die letzteren beiden besonders bei der Red. von Mono- u. Dinitronaphthalinen, als Lösungsm. verwenden. Stearin- u. Ölsäure lassen sich infolge ihrer Unlöslichkeit in W. nach beendeter Rk. leicht wieder abtrennen. Die zu reduzierende Verb. wird mit Eg. oder dessen Homologen u. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ im Rückflußkühler zum gelinden Sieden solange erhitzt, bis sie gel., bzw. bis die Wärmeentw. nahezu beendet ist. Folgende Beispiele sind angegeben: Aus Nitrobenzol erhält man in der angegebenen Weise Acetanilid u. Sulfanilsäure, — aus α -Nitronaphthalin ein α -Acetylaminonaphthalin ein diazotierbares u. kuppelungsfähiges Gemisch von i. verschiedenen Aminonaphthalinsulfosäuren, von denen die eine sich mit NaHSO_3 entsprechenden Oxynaphthalinsulfosäure umkochen läßt u. vermutlich die 1-Aminonaphthalin-4-sulfonsäure ist, während die andere, vermutlich 1-Aminonaphthalin-2-sulfonsäure, mit p-Nitranilin einen in goldbronzefarbenen, im durchfallenden Licht leuchtend blauviolett erscheinenden Blättchen krystallisierenden Azofarbstoff liefert, — aus 1,8-Dinitronaphthalin eine in W. ll. 1,8-Diaminonaphthalindisulfonsäure (die bei 1,8-Diaminonaphthalin-4-monosulfosäure ist in W. wl.), neben geringen Mengen Perimidinverbb., deren B. auf die Ggw. der aliph. Carbonsäure zurückzuführen — aus Isatin ein 9,15% N enthaltendes, schwach gelblich gefärbtes Reduktionsprod., welches beim Auskochen mit verd. HCl bei 210° schmilzt, swl. in W., wl. in Eg. u. A., unl. in w. Pyridin l., beim Erkalten jedoch nicht wieder auskrystallisierend, im Gegensatz zu Isatin in wss. NaHSO_3 unl., beim Erhitzen mit verd. HCl beständig, beim Erwärmen mit Alkali leicht in Lsg., aus der sich beim Ansäuern Isatin abscheidet, — aus Acenaphthenchinon eine in braunroten Krystallen sich abscheidende Verb., dem Kondensationsprod. aus 1 Mol. Acenaphthenchinon + 1 Mol. Acenaphthenon entsprechend, in konz. H_2SO_4 mit grüner Farbe l., die nach Zusatz eines Tropfens HNO_3 sofort Braun umschlägt (während das Acenaphthenchinon sich in H_2SO_4 mit rotbrauner Farbe löst). (D. R. P. 423 029 Kl. 12q vom 1/12. 1922, ausg. 18/12. 1925.) SCHOTTL.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Nicodemus, Otto Ernst, Höchst a. M.), *Formaldehyd aus Methylenchlorid und Wasserdampf*.

(D. R. P. 426 670 Kl. 12o vom 26/11. 1921, ausg. 17/3. 1926. — C. 1923. II. [E. P. 189432].)

SCHOTTLÄNDER

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Darstellung von dicyclischen Basen*, d. gek., daß man β -Phenyläthylamin bzw. γ -Phenylpropylamin, sowie Derivv. die Verbb. in beliebiger Reihenfolge mit α -Halogencarbonsäuren oder deren Estern, so einem Säurehalogenid kondensiert u. aus den der Abscheidung nicht bedürftig Säurehalogeniden der derart hergestellten Säuren bzw. Ester mit Kondensationsmitteln, wie AlCl_3 oder ZnCl_2 unter Ringschlußbildung CO u. HCl abspaltet, worin man aus den so entstandenen N-Acylderivv. der dicycl. Basen den Säurerest durch Verseifung abspaltet. — Das Verf. ermöglicht die unmittelbare techn. Darst. tetrahydrierter dicycl. Basen mit mehr als 3 C-Atomen im hydrierten heterocycl. Kern. Folgende Beispiele sind angegeben: *Monobromessigester* u. β -Phenyläthylamin liefert in glatter Rk. den *Phenyläthylaminoessigester*, Öl, Kp.₁₂ 157—159°, der beim Erhitzen dampfen mit HCl in das *Phenyläthylglycin*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{NH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}_2\text{H}$, F. 24° übergeht. Dieses wird durch Einw. von Alkali u. *Benzolsulfoclorid* in das *N-Benzolsulfonylphenyläthylglycin*, aus Bzl. Krystalle, F. 122°, umgewandelt, hierauf in einem indifferenten Lösungsm., wie Nitrobenzol, mit PCl_5 behandelt u. nach Zugabe von AlCl_3 bis zur Beendigung der CO- u. HCl-Entw. erwärmt. Man gießt auf Eis, trennt das Nitrobenzol mit Wasserdampf ab u. löst das zurückbleibende *N-Benzolsulfonylhydro-i-chinolin* aus A. um, F. 154°. Dieses gibt beim Verseifen reines *Tetrahydro-i-chinolin*. — Behandelt man *m-Methylphenyläthylamin* mit *Chloressigsäure*, so erhält man das *Chlorhydrat* des *m-Tolyläthylglycins*, F. 212—214°, dessen *N-Benzolsulfonyl* mit PCl_5 u. AlCl_3 das *N-Benzolsulfo-6-methyltetrahydro-i-chinolin* u. beim Verseifen *6-Methyltetrahydro-i-chinolin*, Kp. 255—256°, liefert; *Chlorhydrat* F. 197°, — *N-Nitroverb.* F. 98°, — *Jodmethylat* der *N-Methylverb.* F. 145°. — γ -Phenylpropylglycin, F. 20° aus γ -Phenylpropylamin u. $\text{Cl}\cdot\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$ dargestellt, liefert mit Alkali u. *p-Toluolsulfoclorid* die bei 93—94° schm. *N,p-Toluolsulfoverb.*, die durch aufeinanderfolgende Behandlung mit PCl_5 u. AlCl_3 in das *N,p-Toluolsulfohomotetrahydro-i-chinolin*, F. 131° übergeführt wird. Dieses gibt beim Verseifen das *Homotetrahydro-i-chinolin*. (D. R. P. 423 027 Kl. 12p vom 14/3. 1924, ausg. 18/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *Darstellung organischer Verbindungen des dreiwertigen Vanadins*. Man läßt entweder V_2O_3 oder dessen Salze auf Salze mehrbas. organ. Säuren oder organ. Oxyssäuren bzw. Thiooxyssäuren einwirken oder behandelt die freien Säuren erst mit V_2O_3 oder dessen Salzen u. neutralisiert die erhaltenen sauren Lsgg. mit Alkali- oder Erdalkalihydroxyden oder -carbonaten. — Die meist gefärbten, in W. mit fast neutraler Reaktion, antiluet. wirkenden u. sich vor den bekannten Verbb. des 5-wertigen V durch geringere Giftigkeit auszeichnenden Prodd. finden therapeut. Verwendung. Beispiele sind angegeben für die Herst. des *Na-V-Komplexsalzes* der *Nitrilotriessigsäure* (hier vgl. auch A. P. 1 517 003; C. 1925. I. 1105), — des *Na-V-Salzes* der *Weinsäure*, violett in W. mit gleicher Farbe l. M., durch Erwärmen des sauren *Na-Salzes* der *Weinsäure* mit V_2O_3 , — des *komplexen Na-V-Salzes* der *Thioglykolsäure*, graues, in W. mit grünl. Farbe l. Pulver, durch Erwärmen von *Thioglykolsäure* mit V_2O_3 u. W., Neutralisieren der sauren grünen Lsg. mit NaOH u. Eindampfen zur Trockne, — des *komplexen Na-V-Salzes* der *Salicylsäure*, hellgraues, in W. mit grünlicher Farbe l. Pulver, aus *Na-Salicylat* u. V_2O_3 durch Erwärmen in Ggw. von W., — sowie des *komplexen Na-Salzes* der *Mandelsäure*, graublaues, in W. mit violetter Farbe l. Pulver, aus dem *Na-Salz* der Säure u. V_2O_3 . (Oe. P. 101685 vom 28/7. 1924, ausg. 25/11. 1925.)

X. Farben; Färberei; Druckerei.

R. Haller, *Beiträge zur Kenntnis der bügelunechten Farbstoffe*. J. MÜLLER glaubt die Ursache der Bügelunechtheit in der Existenz von einer W.-haltigen u. einer W.

Form des Farbstoffes gefunden zu haben. — Vf. fand, daß *Diaminblau 3 R* in Lsg. schon durch Kochen eine Verschiebung des Farbtones nach Rot erleidet, daß die vegetabil. Faser in der h. Lsg. korinthrot gefärbt war. Alle Farbstoffe, erartige Färbungen liefern, sind in wss. Lsg. in zwei Phasen von verschiedener Dispersität anwesend, von denen die höher disperse die tier. Faser korinthrot, die niedriger disperse die vegetabil. Faser blau anfärbt. — Vf. untersucht ungefähr 100 verschiedene u. blaue *Benzidin*farbstoffe, insbesondere *Brillantbenzoviolett B* u. *BL*, *Brillantviolett B*, *Oxaminblau 4 R*, *Oxydiaminblau R*, *Diaminblau 3 R*, *Benzoazurin G*, *Brillantazurin 5 G*, *Brillantazurin B*, *Azoblau*, *Dianilviolett BE*, *Dianilviolett B*, deren Baumwollfärbungen beim Berühren mit h. Metallflächen einen Umschlag des Farbtones im entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers auf dem Ostwald'schen Farbkreis zeigen. In demselben Sinne ändert sich die Farbe im Exsiccator. Vollfärbungen entsprechen meist dem Farbton, den Baumwolle bei Berührung mit Metall annimmt. — Durch fraktionierte Fällung oder Adsorption können die dispersen Anteile von den niedrig dispersen getrennt werden. Die niedrige Dispersionsphase unterscheidet sich von der höheren nicht nur vermutlich in chem., sondern auch in dispersoid-chem. u. färber. Hinsicht von der höher dispersen. Dafür spricht u. a. erh. bei der Adsorption u. beim Färben von Baumwolle, Wolle u. Acetatseide. Es wurde eine große Labilität der niedrig dispersen Phase bei Temp.-Änderungen beobachtet. Anwendung verschiedener Dispersionsmittel beobachtet. — Bei der Färbung spielt die Oberfläche der Adsorbenten eine große Rolle. — Die Müllersche Hypothese hat nur für den niedrig dispersen Anteil des Farbstoffes Geltung u. die Dehydration ist stets verbunden mit dem Übergang der niederen Dispersität in die höhere. Bei spontanem Eintritt des früheren Zustandes tritt die umgekehrte Umwandlung ein. Da beide Dispersitäten an der Färbung der Baumwolle teilnehmen, ist der Effekt durch Berührung mit h. Metall als Vertiefung der ohnehin vorhandenen Färbung in dem hoch dispersen Anteil durch Dehydratation des niedrig dispersen Anteils aufzufassen. — Die Veränderung des Farbtones durch Hitze geht nach dem von O. OSTWALD aufgestellten Satz vor sich, nach dem mit steigender Dispersität das Adsorptionsmaximum nach der kürzeren Wellenlänge verschoben wird. Die Dispersität substituierten Farbstoffe, insbesondere die mit Methoxyl- u. Äthoxylgruppen im Benzidinrest ergeben auf Zusatz von Hydrazinhydrat einen Umschlag zum Korinthrot. Da *Benzoazurin R*, das nach SCHULTZ-JULIUS (Tabellen 1914, S. 131) eine Mischung von *Benzoazurin G*, $[-C_6H_3(OCH_3)^3(N:N^2C_{10}H_5[OH]^{1'}[SO_3Na]^{3'})^4]_2$, und *blau* $[-C_6H_3(CH_3)^3(N:N^2C_{10}H_5[OH]^{1'}[SO_3Na]^{3'})^4]_2$, sein soll, von Hydrazinunbeeinflusst bleibt, während die beiden angeblichen Komponenten reagieren, ist die Angabe von SCHULTZ-JULIUS auf einem Irrtum beruhen. (Kolloid-Ztschr. 1935—53. Großenhain.)

LASCH.

cob Richter, *Verschiedene Hypochloritbleichmittel*. Herst., Eigenschaften u. Anwendung von $HClO_3$, $Ca(ClO_3)_2$, $KClO_3$ (Eau de Javel), $NaClO_3$ (Eau de Labar), $Al(ClO_3)_3$ (Wilson'sche Lsg.), $Mg(ClO_3)_2$ (Ramsays Bleichfl. oder Grouvellesche), $Zn(ClO_3)_2$ (Warrentrapps Bleichsalz) u. Chlorozon (Eau de Boulogne) werden angegeben. (Chemicals 25. No. 9. 31—32.)

SÜVERN.

Salt, *Färben von Leder*. I. Es wurden vergleichende Färbverss. an sumach- u. Schafnarbenspalten angestellt, um die Einw. von H_2SO_4 , Essigsäure, $NaCl$ u. Na_2SO_4 auf den erhaltenen Farbton zu untersuchen. Bei Anwendung von sauren Farbstoffen hat sich Essigsäure mindestens so gut wie H_2SO_4 , manchmal aber auch besser bewährt. Zusatz von $NaCl$ zu sauren Farbstofflsgg. verringert die Farbtiefe. Vegetabil. Leder. Viele saure Farbstoffe vermögen auch ohne Säurezusatz vollen Färbton zu erzeugen. Na_2SO_4 wirkt wie $NaCl$. Na_2SO_4 mit H_2SO_4 gibt den gleichen Färbton wie H_2SO_4 allein. (Journ. Soc. Leather Trades' Chemists 9 518—20. 1925.) MEZ.

D. Mc Candlish und **H. Salt**, *Färben von Leder*. II. (Vgl. vorst. Ref.) Sogar bezw. Cr-gare Schafnarbenspalte wurden systemat. geleiteten Vergleichsverss. unterworfen. Zur Anwendung kamen typ. saure, substantive u. bas. Farbstoffe. Das Ergebnis der Verss. zeigt folgendes überraschendes Bild: 1. Ungebeiztes Cr-Leder besitzt eine größere Affinität zu sauren u. substantiven Farbstoffen, als vegetabil. Leder. 2. Die OH-Gruppe des Farbstoffes spielt nicht so eine entscheidende Rolle wie es ihr sonst zugemutet wird. 3. Das Beizen von Cr-Leder mit vegetabil. Farbstoff reduziert die Farbanziehung u. veranlaßt hellere Farbtöne. 4. Das Beizen von Leder gibt dagegen einen besseren „Griff“. 5. Das Färben von Cr-Leder mit Farbstoffen ohne vorheriges Beizen ist unzufriedenstellend. 6. Falls der angew. Farbstoff rotstichig ist, neigt die Farbe von Cr-garem Leder eher zum Rot. (J. Soc. Leather Trades' Chemists 9. 520—25. 1925.) MEZ

Valentin Kartaschoff, *Das Phänomen des Färbens der Celluloseacetatseide* (Vgl. S. 2062.) Die von CLAVEL entwickelte chem. Theorie des Färbens der Acetatseide steht nicht in Einklang mit den Versuchsergebnissen des Vf. Es handelt sich vielmehr um das Lösen des Farbstoffes in der Faser, ein Gedanke, wie er früher von WITT, KNOEVENAGEL, GREEN u. BADDILEY u. neuerdings von KURT H. M. (S. 1040) ausgesprochen ist. Der Färbevorgang ist aber infolge von Begleiterscheinungen sehr kompliziert. Die oberflächliche Fällung macht eine klare Scheidung zwischen Suspensoidkolloiden u. krystallin. makroskop. Suspensionen schwierig. Beide Klassen verhalten sich gegenüber der Faser ähnlich u. ergeben Irrtümer bei den Messungen des Aufziehens der Farbstoffe. Die Affinität des Farbstoffes wird bestimmt durch die Gruppen, die die Löslichkeit in einem organ. Lösungsm. bedingen. Je leichter ein Farbstoff sich in W. löst, desto weniger färbt er Acetatseide. Je kleiner der Verteilungskoeffizient in dem System W.-organ. Lösungsm. ist, desto geringer ist die Affinität. Durch Trockenfärben wurde erwiesen, daß die Größe der Partikel eine wichtige Rolle spielt, sie beeinflußt höchstens die Schnelligkeit des Lösens des Farbstoffes in der Faser. Beim Färben durch Entwickeln wird die Faser übersättigt, der Farbstoff, der sich im Innern abscheidet, unl. u. daher seif- u. waschschwierig. (Helv. chim. Acta 9. 152—73. Basel.) SÜVE


Louis A. Olney, *Allgemeine Übersicht über das Färben von Acetatseide oder Rayon*. Angaben über die verwendbaren Farbstoffe, Überfärben u. Mehrfarbeneffekte, Färben u. Fertigmachen zu beachtende Maßnahmen. (Amer. Dyestuff Report 109—14.) SÜVE

P. Castan, *Die neuen Farbstoffe*. Als neue Prodd. der Société Anonyme des matières colorantes et produits chimiques de Saint-Denis erwähnt *Acridinorange*, *Victoriablau B*, *Thiazolgelb DP* u. *Direktechtorange*. *Dispersolgelb 3G* Paste der British Dyestuffs Corporation dient zum Färben von Acetatseide. — Von den Setacyldirektfarben der Firma J. R. GEIGY werden erwähnt *Setacyldirektgelb 2G*, *GR*, *R* u. *2R*, *Setacyldirektorange G* u. *2G*, *Setacyldirektscharlach G* u. *2G*, *Setacyldirektrot G* u. *B*, *Setacyldirektblau G* u. *2G*, *Setacyldirektschwarz G*, *B* u. *R*. Für Wolle u. Seide brachte die Firma Novazolblau *Novazolviolett B*. — Neue Cibanonfarbstoffe der Gesellschaft für Chemische Industrie, Basel, sind *Cibanonblau B*, *Cibanonorange 3R* u. *6R*, *Cibanonrot 3R* u. *6R*. Die Reihe der Cibafarbstoffe wurde ergänzt durch *Cibarat 3B* u. *Cibagelb CAW*, *Chlorantinitlichtfarben* durch *Chlorantinitlichtgrün B*, *Chlorantinitlichtblau 8GL*, *Chlorantinitlichtbraun BRL*, *Chlorantinitlichtblau 4GL* u. *Chlorantinitlichtrot 5BL*. Von Alizarinfarbstoffen der Firma werden genannt *Alizarinechtgrün G*, *Alizarinsaphir* u. *BGA*, als Cr-Farbstoffe *Chromechtblau IB* u. *IR*. Die neue Marke *Neolangelb* steht zwischen *Neolangelb R* u. *G*. Ferner werden erwähnt *Brillantsäureblau G*, *Neolangelb L* u. *GL*, eine Reihe *Paramitranilinbraun* u. *Diazobraun*, *Chromblauschwarz*.

Teolanblau 2G. Neue Netz- u. Fettlösungsmm. der Firma sind *Solapolöl* u. *Hydro-nine S*. — Die Fabrik chemischer Produkte vorm. Sandoz, Basel, brachte *arinlichtblau R* u. *BGA*, *Azorubinol 3GS* u. *Xylenechtblau BL*. (Moniteur scient. 16. 25—29.)

SÜVERN.

Ugo Perret, *Oxydationsvorgänge beim Schwefelschwarz und seine Konstitution*. crss. an einem nach D. R. P. 208 377 hergestellten *Schwefelschwarz* sowie an anderen demspräparaten von Schwefelschwarz zeigten, daß diese infolge Autoxydation im Mol. enthaltenen Schwefels H_2SO_4 bilden, die das Na des Farbstoffs als Na_2SO_4 Teil als $NaHSO_4$ ausscheidet u. im übrigen als freie H_2SO_4 vorhanden bleibt. e Autoxydation wird noch durch den pulverförmigen Zustand der Präparate instigt, während die entsprechenden Farbstoffpasten diese Erscheinung wegen geringeren Oberfläche nicht zeigen. Unter entsprechend umgeänderten Bedingungen 1 Mol. *2,4-Dinitrophenol* 1,5 Mol. Na_2SO_4 , 16 Stdn.) wurde ein Herst.-Vers. im oratorium wiederholt. Trocknen an der Luft bei gewöhnlicher Temp. u. im Ofen 75° beeinflusste ungünstig die Fähigkeit des Farbstoffs, auf der Faser zu haften. n 2 Wochen langem Aufbewahren an feuchter Luft bei 50° konnte bei verschiedenen araten nur eine sehr schwache Acidität festgestellt werden. Die Behandlung ines Anteils der verschiedenen Farbstoffproben mit einer sehr verdünnten Lsg. S in CS_2 zeigten, daß der in den Präparaten fein verteilte S für die oxydative B. H_2SO_4 nicht in Frage kommt, sondern diese Rk. nur katalyt. einleitet. Die Hauptze H_2SO_4 ist auf Oxydation des chem. gebundenen S zurückzuführen. Na-Bestst. en, daß Farbstoffe von gleichem Ausgangsmaterial u. gleichen färber. Eigenschaften verschiedene Zus. haben u. daß die Na-Atome im Schwefelschwarz der Einw. der H_2SO_4 verschiedenen Widerstand leisten. Aufbewahrung in feuchter Um- ung begünstigt die äußerlich durch Auswitterung erkenntliche Autoxydation, war sie bei dem von Vf. im Laboratorium hergestellten Präparat weit geringer um Beispiel bei einem *Schwarz SCL* der Firma BIANCHI. Die bisher in der Konst. iel angenommenen Thiazinringe erklärten nicht, weshalb der S ohne wesentliche



Veränderungen der chem. u. färber. Eigenschaften aus dem Mol. entfernt werden kann. Wahrscheinlicher ist es, daß an Stelle des S im Thiazinring eine Kette von S-Atomen steht entsprechend I, wenn x Mol S in Rk. traten. Wahrscheinlich liegt in der Schwefelnatriumlsg. eine instabile Verb. des Farbstoffs

Na_2S vor, die beim Oxydieren von Na_2S oder Einw. von Säuren ebenfalls zers. Vf. unterscheidet 3 Oxydationsphasen, 1. beim Ausfällen, wobei die Oxy- n sich nur auf das Na_2S oder das Polysulfid erstreckt, 2. eine Oxydation Farbstoffs mit möglicher Umwandlung der SH-Gruppen in Sulfongruppen, die scheinlich auch während der Fällung vor sich geht; diese Gruppen geben an- end ihr Na nicht ab, wenn sie mit hinreichend verd. H_2SO_4 behandelt werden, ydation des kettenförmig im Mol. gebundenen S zu H_2SO_4 . Ganz zu vermeiden ie Autoxydation nicht; einen bemerkenswerten Einfluß hat der bei Fällung mit Farbstoff niedergeschlagene S. Eine genaue Dosierung der S-Menge ist daher dingt erforderlich. (Annali Chim. Appl. 16. 69—83. Rom, Lab. der Ingenieur- le.)

LEHMANN.

—, *Über Leuchtfarben*. Angaben über Zustandekommen der Phosphoreszenz, aktive Leuchtfarben u. die prakt. Verwendung von Leuchtfarben. (Farben-Ztg. 401—03. 1925.)

SÜVERN.

—, *Wasserglas als Anstrich- und Imprägnierungsmittel*. Angaben über Herst. u. endung von Na_2SiO_3 u. seine Verarbeitung zu Anstrichfarben für Kalkputz. be u. Lack 1925. 554.)

SÜVERN.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Richard Dietzel und Kurt Täufel, *Die neuere Entwicklung der Lebensmittelchen* 3. Bericht. (2. vgl. Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 158; C. **1924**. I. 2216.) Bericht über Forschungen auf dem Gebiet der *Fette u. Öle, Kohlehydrate, Eiweißstoffe, Vitamine* der Backfähigkeit des *Mehles*, *Milchunters.*, der *Würzstoffe* mit Literaturnachw. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 413—21. München.) JUN

W. W. Skinner, *Der Wassergehalt des Mehles*. Unter Wassergehalt ist nur soviel W. zu verstehen, daß nicht chem. gebunden (bei 100° flüchtig) ist. Die amtliche Festsatzung des Höchstwassergehaltes auf 13,5% hat zur Folge gehabt, daß der mittl. Wassergehalt der Handelsmehle von 12—12,5 auf 13—13,5% gestiegen ist. (Bak. Technology **5**. 72—77.) GROSZFELD

C. M. Morison und M. R. Reeser, *Der Calcium- und Phosphorgehalt von Weizenmehlen des Handels*. In 12 Mehproben wurden 0,0066—0,0181% Ca u. 0,1080—0,1230% P gefunden. (Baking Technology **5**. 86—87.) GROSZFELD

Carolina Barro, *Über eine einfache und praktische Methode zur Herstellung von Eilecithin*. 180 g Eigelb wurden mit gewaschenem u. ausgeglühtem Bimsstein verrieben u. im Vakuum bei einer Temp. unter 50° getrocknet. Mit Aceton bis zum fasten Ablauf extrahieren, darauf dreimal mit je 300 ccm A. (95°) k. behandeln. Alk. Lsg. verdampfen, wobei eine neutrale, wachsähnliche M., das *Lecithin* zurückbleibt. Zur Entfernung etwaiger Fettsuren kann man nochmals mit Aceton extrahieren. Rückstand im Vakuum über H₂SO₄ trocknen, Ausbeute 16,50 g = 9,16%. Das gewonnene *Lecithin* ist noch mit etwas *Cephalin* u. *Lutein* verunreinigt. Der von MOREAU angegebene Faktor von 11,40, zur Umrechnung von P₂O₅ auf *Lecithin* ist zu hoch, weil er für *Distearinlecithin* gilt. Bei *Eilecithin* muß er verringert werden auf 10,95, entsprechend *Palmitinoleinlecithin*. Hiernach enthielt das erhaltene Produkt 94,68% *Lecithin*. (Giorn. Farm. Chim. **75**. 59—61.) GRIMME

T. Moran, *Einwirkung niedriger Temperatur auf das Hühnerei*. Unter — tritt eine irreversible Veränderung des Eidotter ein. Beim Auftauen ist der Dotter eine zähe, teigige M. (vermutlich infolge Fällung des *Lecithovitellins*), das Eierkern ist in einen viscosen u. einen flüssigen Teil getrennt. (Proc. of the roy. soc. **98**. 436—1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 833. Ref. RUNNSTRÖM.) OPPENHEIMER

J. F. Mc Clendon, *Einrichtung zum Niederschlagen von Rauch bei der Jodananalyse von Nahrungsmitteln*. Einrichtung beruht darauf, daß der mit W.-Dampf gesätt. Rauch gezwungen wird, zwischen einem durch ihn selbst erhitzten u. einem durch W. abgekühlten Zinnrohr hindurchzuziehen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 558—1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 268. 1925. Minnesota, Lab. of physiol.-chem. Univ. Minneapolis. Ref. KAISER.) OPPENHEIMER

Harry Snyder und Betty Sullivan, *Bestimmung von Wasser in Weizen und Weizenmehl*. IV. (III. Mitt. vgl. Ind. and Engin. Chem. **17**. 311; C. **1925**. II. 103.) Weizenmehl in einem Strom von trockenem H₂-Gase getrocknet, so erhält man Weizenmehl für W., welche im Mittel 0,54% höher liegen als bei Bestst. im Vakuum bei 100°/600 mm Druck. Vorbedingung ist absol. Trockenheit des H₂. Man erreicht sie leicht mit dem Wintonschen Trockenapp. Die Mehproben befinden sich in lang ausgezogenen Wägeggläschen (Figur im Original), welche in dem Trocknungssofen liegen u. ein Durchleiten von H₂ ermöglichen. An Stelle von H₂ kann auch trockner N oder erhitzte Luft bei gleicher Genauigkeit der Resultate treten. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 272—1926; Minneapolis [Minn.].) GRIMME

Alfred Mehlitz, *Die Ermittlung des Pektin gehaltes in Roh- und Fertigwaren nach der modifizierten Calciumpektatmethode*. (Vgl. S. 2154.) Die Zerkleinerung von Beeren u. Steinfrüchten geschieht am besten durch Verreiben in Porzellanschalen u. Herabsetzen einer Lsg. 1:10, bei stark pektinhaltigen Apfelmückständen 1:20. Zur Pektinbestimmung

st (vgl. CARRÉ u. HAYRES, *Biochemical Journ.* **16.** 60; C. **1922.** IV. 615) dienen
in genannter Lsgg. Für das im Nd. enthaltene Ca werden 8% abgezogen. (Kon-
sen-Ind. **13.** 149—50 u. 159—60.)

GROSZFELD.

O. Patzau, *Einige Methoden zur Untersuchung der Milch*. Best. des Milchezuckers
rimetr. in dem mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ erhaltenen Serum, Ca durch Titration des Ca-
lates in der mit NH_4NO_3 dargestellten Asche, $(N \times 6,25)$ mikrochem. in dem
h Kochen mit Essigsäure aus 2 ccm Milch erhaltenen Nd., Cl nach VOLHARD
em mit 50% A. erhaltenen Serum, organ. Säuren durch Best. der l. Ba-Salze (als
D₄) gegebenenfalls nach Vorbehandlung mit Pb-Zucker, Katalaseprobe nach
KEL. (Österr. Chem.-Ztg. **29.** 53—54.)

GROSZFELD.

J. Flach, Heidelberg, *Konservieren von Früchten, Vegetabilien usw.* Diese Stoffe
werden zuerst mit einem keimtötenden Gas, u. dann mit einem frischen sterilen in-
ten Gas (N_2) behandelt, wobei sein Flüssigkeitsgehalt entsprechend der Beschaffen-
der zu behandelnden Stoffe geregelt wird. (E. P. **245 671** vom 2/7. 1925, ausg.
1926.)

KAUSCH.

Appo-Krisp Ltd., Kentville, Nova Scotia, Canada, übert. von: **George F. Hum-**
ay, Bridgetown, *Nährmittel*, welches dadurch erhalten wird, daß man einen Frucht-
mit Zucker, Hefe u. Mehl vermischt, die Mischung einem Backprozeß unterwirft,
Prod. zu Flocken verarbeitet u. diese dann röstet. (A. P. **1 568 162** vom 4/2.
ausg. 5/1. 1926.)

OELKER.

Harry E. Mali, Chicago, Ill., *Brotbereitung*. Die aus dem Teig geformten Brot-
werden mit einer dünnen Teigschicht umgeben, welche auf der Innenfläche mit
Fettschicht bestrichen ist, u. dann in üblicher Weise gebacken. Es wird auf
Weise ein Brot erhalten, dessen Kruste durch einen Zwischenraum von der
e getrennt ist, so daß beim Schneiden des Brotes die Kruste sich von selbst
unt. (A. P. **1 575 855** vom 1/10. 1924, ausg. 9/3. 1926.)

OELKER.

Paul Didier, Frankreich (Seine-Inférieure), *Gewinnung von Säften aus Früchten*
Die Früchte werden einer gleichzeitigen Pressung u. Auslaugung mit W.
worfen. (F. P. **600 165** vom 10/6. 1925, ausg. 1/2. 1926.)

OELKER.

Internationale Nahrungs- und Genußmittel Akt.-Ges., Schaffhausen, Schweiz,
omatisieren von Kaffee. Man treibt die im gerösteten Kaffee enthaltenen α -Di-
e durch Erhitzen des Kaffees im Vakuum eventuell unter Zufuhr von wenig
rdampf aus u. verdichtet die Dämpfe bei Temp. unter -20° . (E. P. **246 454**
1/1. 1926, Auszug veröff. 24/3. 1926. Prior. 23/1. 1925.)

KAUSCH.

ihon Chasei Kabushiki Kwaisha, Kyoto-Fu, Japan, übert. von: **S. Haya-**
und T. Hayashiya, Kyoto-Fu. *Verwendung von Tee-usw. staub*. Man knetet
taub mit einer Galaktose oder ähnlichem gelatinösen Stoff aus Seegras o. dgl.
knetet dann das Prod., das sich nun zum Kochen eignet. (E. P. **244 439** vom
1925, Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 9/12. 1924.)

KAUSCH.

Tharton B. Mc Laughlin, New York, *Behandlung von Kakaobohnen*. Man
nt die frischen Kakaobohnen unter Luftabschluß auf eine Temp. ($120-130^\circ \text{F.}$),
leher die organisierten Fermente nicht wachsen u. die Enzyme der Bohne nicht
t werden, u. hält diese Temp. so lange aufrecht, bis die purpurrote Farbe der
a in eine rotbraune übergegangen ist. (A. P. **1 575 372** vom 28/12. 1923,
2/3. 1926.)

OELKER.

avid D. Peebles, Eureka, Calif., *Milchpräparat*, zu dessen Herst. man eine
Menge der nicht fetthaltigen Bestandteile aus der frischen Vollmilch entfernt,
r übrig bleibende Teil etwa der Menge der fetthaltigen Bestandteile gleich ist,
Prod. hierauf so weit eindampft, daß der Wassergehalt etwa 20% beträgt.
1 574 165 vom 24/12. 1923, ausg. 23/2. 1926.)

OELKER.

Norman Henry Christensen, Windsor, Victoria, Australien, *Milchpulver*. Entfernt aus der Milch zunächst einen Teil des darin enthaltenen Ca durch Fä mit Natriumoxalat, versetzt sie danach mit kleinen Mengen von citronensaurem u. Alkalicarbonat u. trocknet sie schließlich in dünner Schicht auf h. Walzen. (A. 1574233 vom 23/4. 1925, ausg. 23/2. 1926.) OELKE

Amos Neuhauser, Bluffton, Indiana, V. St. A., *Kondensierte Sauermilch*, wodurch erhalten wird, daß man Magermilch im Vakuum konz., danach bei 80—110° der Säuerung unterwirft u. das Prod. homogenisiert u. sterilisiert. (A. P. 1576 vom 19/1. 1924, ausg. 9/3. 1926.) OELKE

H. M. Hardcastle, Manchester, *Futtermittel*. Man vermischt Knochenmehl dem im E. P. 163 628 (C. 1922. II. 402) beschriebenen Futtermittel. (E. P. 236 vom 3/2. 1925, ausg. 23/7. 1925.) OELKE

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Carl A. Puller, *Praktische Gesichtspunkte für das Beschweren von Seide und Färben beschwerter Seide im Stück*. Das Beschweren mit SnCl_4 u. Na_2HPO_4 u. Färben ist näher beschrieben. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 123—25.) SÜVER

Otto Brandt, *Ventilatoren und Exhaustoren in der Papierindustrie*. Angaben über Aufstellung, Schmierung u. Antrieb. (Zellstoff u. Papier 6. 124—25.) SÜVER

Arthur St. Klein, *Kraftpapier*. Angaben über Herst. des Zellstoffs u. s. weitere Verarbeitung. (Zellstoff u. Papier 6. 114—18.) SÜVER

Schrohe, *Umschau auf dem Gebiet der Patentliteratur der chemischen Verfab zur Herstellung reiner und veredelter Zellstoffe*. Die Patente über Fasergewinnun-veredlung sowie über Zellstoffherst. (deutsche Patentklassen 29 u. 55) sind zusammen gestellt. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingeni 655—58. 665—68. 1925.) SÜVER

Carl G. Schwalbe, *Sulfitlaugenverkohlung vermittelt Beizsalzlösungen*. Die Fe- u. Cr-Salze der Lignosulfosäure spalten sich beim Erhitzen auf 180° unter Dr wirken verkohlend u. nehmen die organ. Bestandteile der Sulfitlauge auf. N teilig ist der hohe Aschegehalt der erhaltenen Kohle. (Zellstoff u. Papier 6. Eberswalde.) SÜVER

Katsumoto Atsuki, *Die Stabilität des Celluloids*. (Ztschr. f. d. ges. Schief Sprengstoffwesen 20. 115—16. — C. 1925. I. 2517.) KAS

R. Gabillion, *Analyse der Nitrocellulosen*. Angaben über Farbe, Klarheit Collodiums, Feuchtigkeit, N-Best., Löslichkeit, Viscosität, Asché, Gehalt an Ca Säure, Cl_2 , Feinheit, Gehalt an unnitrierter Cellulose, Stabilität. (Rev. Plast 81—92.) SÜVER

A. B. Shearer, *Die Verwendungen von Kunstseide zur Herstellung von T stoffen*. Nach Schilderung des gewaltig gestiegenen engl. Kunstseideverbrauchs die Kunstseide als dritte wichtigste Rohfaser der Textilindustrie hingestellt. (J Textile Inst. 17. P 24—25.) SÜVER

Walter Bruckhaus, *Mattieren und Beschweren der Kunstseide*. (Österr. Chem. 29. 44—45. Krefeld. — C. 1926. I. 1738.) JUN

Maurice Deschiens, *Die Anwendungen des Celluloseacetats*. Die Verwen für künstliche Schwämme, Glühlichtfäden, Sprengstoffe, Hartspiritus, Phonograf platten u. -zylinder, Zemente, Klebmittel, Factis, Verstärkung künstlicher Fä künstliche Haare, Tülle u. Bänder, Baykogarne ist kurz geschildert. (Rev. Plas 99—100.) SÜVER

H. R. Hirst und A. T. King, *Eine neue Methode zur Bestimmung von A besonders angewendet auf Wolle*. (Vgl. S. 2746.) Eine genaue Best. des Gesamtal

olle läßt sich mit keiner der bekannten analyt. Methoden durchführen. Bringt Wolle in W., welches Terephthalsäure suspendiert enthält, so geht das gesamte i als Terephthalat in Lsg. Die Lsg. kann gravimetr. oder volumetr. untersucht n. Eine gemessene Menge NaOH, Na₂CO₃ oder Seife, die zu Wolle gesetzt ist, so quantitativ wiedergewonnen werden. (Journ. Textile Inst. **17**. T 94—100.) SÜ.
I. R. Hirst und **A. T. King**, *Die Bestimmung von Schwefelsäure in Wolle*. Be- lt man schwefelsäurehaltige Wolle in der Wärme mit terephthalsaurem Na, rd Terephthalsäure frei, die sich titrimetr. bestimmen läßt. (Journ. Textile **17**. T 101—03.) SÜVERN.

Robert Cornely, *Die Prüfung von Löschpapieren*. Das Dalénsche Prüfungsverf. er Oberfläche her (Mitt. Materialprüfungs-Amt Berlin-Dahlem **40**. 238; C. **1923**. **19**) gibt für den täglichen Gebrauch zuverlässigere Bilder als die Saughöhe. menstellung von Untersuchungsergebnissen. (Zellstoff u. Papier **6**. 120—22.) SÜ.
Corn, *Papierprüfung*. Einzelheiten über Festigkeitsprüfung, chem. u. mkr. Zell- rüfung. (Papierfabr. **23**. 649—52. 668—71. 1925. Verein der Zellstoff- u. Papier- ker u. -Ingenieure.) SÜVERN.

Latilde Postiglione, Treviso, Italien, *Aufbereiten pflanzlicher Faserstoffe zu fasern mittels einer gemischten chemisch-mechanischen Behandlung*. (D. R. P. **50** Kl. 29b vom 5/4. 1923, ausg. 20/3. 1926. — C. **1924**. II. 258.) KAUSCH.
Richard Wolfenstein, Berlin-Dahlem, und **Arthur Marcuse**, Berlin, *Wasser- nachen von Cellulose, Filtrierpapier o. dgl.*, dad. gek., daß man auf die Cellu- sw. Thionylchlorid einwirken läßt. (D. R. P. **426 428** Kl. 55f vom 30/5. 1914, 11/3. 1926.) OELKER.

Villy Manger, Elberfeld, *Präparieren eines Tagalfadens zwecks Anfertigung sten Tagalstoffgeweben*. 1. dad. gek., daß der Faden vor dem Aufspulen durch erwärmte Lsg. von Paraffin, Erdöl u. ungekochtem Leinöl gezogen wird. — l. gek., daß zur Lsg. 50 Teile Paraffin, 40 Teile Erdöl u. 10 Teile ungekochtes verwendet werden. (D. R. P. **426 504** Kl. 29b vom 24/4. 1924, ausg. 12/3. KAUSCH.

G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Rudolf Fuchs**, Dessau- k), *Herstellung von Formlingen aus geschwefelten Faserstoffen*, dad. gek., daß as Fasermaterial in geschmolzenem S mechanisch auflockert, die so entstandene nach den Verff. der Pappefabrikation unter Verwendung von Sieben formt icheitig den überschüssigen S entfernt. (D. R. P. **427 109** Kl. 12i vom 15/3. ausg. 23/3. 1926.) KAUSCH.

Albert C. Lathrop, Philadelphia, Pa., und **Treadway B. Munroe**, Forest Glen, und, *Konservierung von zur Papierbereitung u. dgl. dienenden Faserstoffen*. Die agsstoffe, wie z. B. Bagasse, werden in Haufen geschichtet der sauren Gärung rufen, wodurch die Fasern weich werden, u. andererseits eine Hitze in der reugt wird, welche ausreicht, den Wassergehalt zu verringern u. eine Sterili- der Fasermasse zu bewirken. (A. P. **1 572 539** vom 20/6. 1924, ausg. 9/2. OELKER.

Albert C. Lathrop, Philadelphia, Pa., und **Treadway B. Munroe**, Forest Glen, und, *Konservieren von Faserstoffen für die Papierbereitung*. Um die Faserstoffe, B. Bagasse, während der Lagerung vor schädlichen Gärungen zu schützen, htet man sie etwa bis zur Sättigung mit W., um das Wachstum unerwünschter men zu unterdrücken, die Milchsäuregärung dagegen zu fördern. (A. P. **540** vom 20/6. 1924, ausg. 9/2. 1926.) OELKER.

Alfred Tingle, Ottawa, Canada, *Herstellung von gepreßten Gegenständen aus rohstoff*. Man behandelt die Gegenstände, um sie undurchlässig für Farben,

Firnis u. dgl. zu machen, oberflächlich mit H_2SO_4 . (A. P. 1575 290 vom 24/9. ausg. 2/3. 1926.) OELKI

Process Engineers Inc., New-York, übert. von: **J. A. de Cew**, Mount Ve N. Y., V. St. A., *Verhinderung des Schäumens von Papierbrei auf den Sieben der Papiermaschinen*. Der mit Harzleim u. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ behandelte Papierbrei wird mit einer Fe-Salzes, z. B. FeSO_4 , vermischt. (A. P. 1573 814 vom 14/12. 1921, 23/2. 1926.) OELKI

Commercial Alcohol Co., Ltd., London, übert. von: **Alexander Cla** Aachen, *Herstellung von Celluloselösungen*. Man läßt bei gewöhnlicher Temp. cellulosehaltige Substanzen HCl in Ggw. von metall. Katalysatoren einwirken, w. von HCl nicht leicht angegriffen werden, wie z. B. die Metalle der Pt-Gruppe. (A. P. 1570 553 vom 18/8. 1924, ausg. 19/1. 1926.) OELKI

Adolf Kämpf, Premnitz, Westhavelland, *Kunstseide u. dgl.* Ungereifte V. wird in einem sauren Spinnbade von 4° versponnen. (A. P. 1575 210 vom 7/5. ausg. 2/3. 1926.) KAUS

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

D. J. W. Kreulen, *Über das Verhalten einer jungen Kohlesorte bei langs. Erhitzen auf 110°*. Bei 4000-std. Erhitzen trat bis 1275 Stdn. Gewichtszunahme dann Gewichtsabnahme ein. Graph. Darst. in Form von Spiralen (1 Kreisgr. 1 Stde.) in der Quelle. (Chem. Weekblad 23. 186—87. Rotterdam, Lab. v. brandstof-onderzoek, „Glückauf.“) GROSZFEI

Armin Balogh, *Das Erdgas als Brennstoff*. Techn. Behandlung der Frage der Verwertung der Erdgase als Brennstoff. Zahlenmäßige Unterlagen. (Petroleum 332—34. „Nitrogen“ A. G. Diciosáumártin.) REINI

Franz Fischer und Hans Tropsch, *Über die direkte Synthese von Erdöl-Kohlenwasserstoffen bei gewöhnlichem Druck*. 1. Mitt. Bei der katalyt. Red. von CO zu Oxyd bei gewöhnlichem Druck mit Fe-ZnO oder anderen Katalysatoren wurde ein Gemisch von CH_4 mit seinen Homologen erhalten. Ein Gemisch von Co u. Ni lieferte bei 270° nicht nur gasförmige Homologe des CH_4 , sondern sogar fl. u. fest. Aus dem CO wird zuerst C aufgenommen, offenbar unter B. von C -reichen Carbiden, die bei relativ niedriger Temp. existieren; diese in feinsten Verteilung vorhand. Carbide werden durch den H des Gemisches in der Weise zerlegt, daß das M regeneriert u. der C als mehrgliedrige Homologe des CH_4 fortgeführt wird. Im Gegensatz zu Beobachtungen bei der Hochdruckkatalyse (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2428; C. 1924. I. 899) geht die Synthese der KW-stoffe nicht über CH_2O oder CH_2 , es treten nie O-haltige organ. Verbb. auf. Bei gewöhnlichem Druck u. hohen Temp. wird mit den Katalysatoren ausschließlich CH_4 erhalten. — Aus 1 cbm Wasser (man ist nicht an ein bestimmtes Mischungsverhältnis von CO u. H gebunden) erhält man bei mehrmaligem Überleiten über einen Kontakt, der durch Red. eines Gemisches von Fe - u. Co-Oxyd erhalten wurde, ca. 100 g fl. u. leicht verflüssigbare, z. T. schon feste KW-stoffe. Die fl. haben vorwiegend Benzin-Charakter. Auftreten von CH_4 kann fast ganz verhindert werden. Der O des CO findet sich als H_2O u. H_2O_2 wieder. — Es sind jetzt also 4 Prodd. aus CO u. H herstellbar: 1. CH_3OH , 2. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, 3. das CH_4 , 4. seine Homologen, die Erdöl-KW-stoffe. Für die Entstehung dieser in der Natur ist damit eine neue Möglichkeit gefunden worden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 830—31.) BUSC

Franz Fischer und Hans Tropsch, *Über die direkte Synthese von Erdöl-Kohlenwasserstoffen bei gewöhnlichem Druck*. 2. Mitt. (1. vgl. vorst. Ref.) Es wird Näheres über Ausführbarkeit u. Theorie der Erzeugung von Benzin-KW-stoffen bekannt gegeben. — Stellt man erst die Carbide her u. behandelt diese nachträglich mit H

geht anfangs etwas Öl von Petroleumcharakter, in der Gasphase findet sich aber CH_4 ; leitet man dagegen CO u. H gleichzeitig über den Kontaktkörper, findet man reichlich Bzn. u. wenig CH_4 , auch verhältnismäßig wenig Öl von Petroleumcharakter. — Als Katalysatoren sind Metalle der 8. Gruppe in fein verteilter Formksam; aus fein verteiltem Oxyd durch Red. mit H bei Temp. von $350\text{--}500^\circ$ herstelltes, mit mehr oder weniger Oxyd vermischtes Fe ist sehr träge, besser verhält sich fein verteiltes Co , beim Ni ist die Fähigkeit zur B. höherer Homologe des CH_4 sehr abgeschwächt; die Metalle werden zweckmäßig mit Zusätzen wie Cr_2O_3 , BeO , seltenen Erden, UO_3 , SiO_2 , Al_2O_3 , MgO , Mn_2O_3 , aktiver Kohle u. amorphem Fe verwendet; die am Anfang dieser Reihe stehenden Oxyde haben sich besonders am erwiesen, aber auch Kombinationen mit Pd , Cu u. Fe_2O_3 (letzteres bei Ni) haben Vorteile; auch durch schwaches Alkalisieren der Fe -Metalle wird eine Erhöhung der katalyt. Wirksamkeit erzielt; die Mischungsverhältnisse von Metall u. Oxyd. Zusatz wie 1:1 bis 3:1 sind günstig; bei Überschuß des oxyd. Zusatzes sinkt die Wirksamkeit des Katalysators. Die Zusätze gewährleisten auch während der Red. ein Zustand des Katalysators die Aufrechterhaltung hoher Dispersion u. verhindern eine Verhinderung der Verkleinerung der wirksamen Oberfläche, teilweise auch eine spezif. Wrkg.: Beschleunigung der Carbidbildung, Änderung der Temperatur. Die Katalysatoren wurden durch Mischen der entsprechenden Oxyde oder durch Auflösen in el. oder geschm. Salze u. Überführen in Oxyde durch Glühen oder Fällen mit Ammoniumcarbonaten oder durch Zusammenschmelzen von Salzen mit den Oxyden hergestellt, gepreßt, gekörnt, unter Zusatz von Stärke geformt oder auf Träger, wie Al_2O_3 , MgO , SiO_2 , Asbest, Tonscherben, Bimsstein oder akt. Kohle aufgebracht; es kommt auch auf Abwesenheit von vergiftend wirkenden S-Verbb. an. — Die Red. der Katalysatoren wurde mit reinem H bei 350° durchgeführt. — Als Ausgangsgase wurden H u. CO aus HCOOH , später techn. Gase, besonders Wassergas nach Entfernung der S-Verbb., aber auch CO -reichere oder -ärmere Gase, angefeuchtetes CO aus techn. Generatorgas u. dem Hochofengichtgas entsprechende Gasgemische verwendet; immer wurde Bzn. erhalten. — Wichtig ist weitgehende Senkung der Temp.; beim Fe -Kontakt bis ca. 300° , beim Co vorteilhaft bis 270° ; Ni ist noch bei 300° aktiv, liefert aber CH_4 . — Bei Temp.-Erhöhung tritt nur CH_4 auf. — Ein Gemisch von *Pentan* u. H bei 270° über Co geleitet, gibt CH_4 . — Je höher die Strömungsgeschwindigkeit ist, um so mehr läßt sich die CH_4 -B. unterdrücken, wobei aber die Erhaltung des Gases ungünstiger wird. — Die Gewinnung der Benzindämpfe aus Wassergas erfolgt durch Abkühlung oder Adsorption durch akt. Kohle. — Die sich abendenden, höher sd. KW-stoffe sind je nach den Umständen Leichtöle vom Charakter von *Leuchtpetroleums*, gelegentlich krystallisiert festes *Paraffin* aus; die gewonnenen Paraffine gleichen dem pennsylvan. Bzn., enthalten nur wenig Substanzen, die mit H_2SO_4 reagieren, sind beim Aufbewahren unveränderlich; das aus akt. Kohle hergestellte Rohprod. hatte D.¹³ 0,68 u. ist frei von S-Verbb. Auch die B. von *vaselin*-artigen Prodd. wurde nachgewiesen. — Die Analyse des Rk.-Gases zeigte, daß auch das reich rauchende H_2SO_4 absorbierten Bestandteile aus höheren Paraffin-KW-stoffen bestehen. Aus dem Unterschied in der Menge des Ausgangs- u. Endgases, der Konzentration, kombiniert mit den Ergebnissen der Gasanalyse, konnte die Menge der Homologe des CH_4 ermittelt werden; wie sich diese auf die einzelnen Siedeintervalle verhält, wurde nach TROPSCH u. DITTRICH (Brennstoffchemie 6. 169; C. 1925. II. 1404) ermittelt. — Theorie des Prozesses: Primär B. C-reicher Carbide, die auf 1 At. 2-wert. C, mindestens 1 At. C enthalten; Überführung des C durch H in die CH_2 -Gruppe, die dann polymerisiert u. zu einem gesätt. KW-stoff fertig hydriert wird. Wesentlich ist, daß die Polymerisation der CH_2 -Gruppe sich schneller vollzieht, als die hydrierende Wrkg. des H auf diese; ist letzteres der Fall, wird die CH_2 -Gruppe in CH_4 überführt. Die hydrierende Wrkg. darf also nicht zu stark sein u. das katalyt. wirksame

Metall muß C-reiche Carbide bilden, Eigenschaften, die im Co vereinigt sind. (Dtsch. Chem. Ges. 59. 832—36. Mülheim-Ruhr, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Kohlenforsch.)

v. d. Heyden und Typke, *Die Aufbereitung gebrauchter Öle*. (Vgl. S. 545.) Behandlung mit Bleicherde wird meistens vollkommen genügen. Nur die Entsäure sehr stark saurer Öle u. besonderer Spezialöle ist schwierig. Das dann aber gewonnene Schmier- oder Isolieröl ist oft sogar wertvoller als solches, das aus Rohöl gewonnen wird, weil die am leichtesten oxydierbaren Stoffe, die während des Gebrauches angegriffen worden sind, bei der Aufbereitung völlig entfernt werden. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 70. 401—02. A. E. G., Transformatorenfabrik Berlin-Schöne-weide.) WILB

R. Nowotny, *Über Erfahrungen bei der Holzimprägnierung nach dem Cobravfahren*. Bei der Besichtigung von 4000 nach dem Cobravverfahren imprägnierten Material des Überlandwerkes Osterode, die $3\frac{1}{2}$ —4 Jahre standen, zeigten sich keine Fäulstellen an der Grenzzone. Querschnittsbilder u. eine Zusammenstellung zeigen, auch bei der schwer durchtränkaren Fichte eine erhebliche Diffusion des Imprägnmittels stattfindet. Die Diffusion des NaF u. $ZnCl_2$ geht schneller vor sich als die des Dinitrophenols. Die Ausbreitung überschreitet nur um ein geringes die Tiefe der Anstiche in radialer Richtung. Derartig tiefe Imprägnierung ist bei Fichte durch Kesseltränkung nur bei Anwendung hoher Drucke durch lange Zeit erreichbar. Einem nach dem Boucherieverfahren getränkten, eingebauten Stamm konnte Vf. nach 16 Jahren NaF durch Entfärbung von Rhodaneisen nachweisen. (Ztschr. angew. Ch. 39. 428—31. Wien.) JUN

F. Jacobsohn, *Klopfende und nicht klopfende Treibmittel für Automobilmotoren*. Ausführliche Besprechung über Motorenbetriebsstoffe u. über die Bedeutung von Doping, d. h. Zusätze, die schon in minimaler Menge das Klopfen von Kraftstoff in Motoren verhindern. (Auto-Technik 15. Nr. 6. 5—9.) REIN

Wa. Ostwald, *Motyl und Motalin*. Einleitend bespricht Vf. die Unterschiede zwischen Vor- u. Nachkriegsbenzins. Die Nachkriegsbenzine sind wesentlich schlechter geworden. Verursachen das Klopfen. Um das Klopfen zu vermeiden, wird zu dem Benzol zugesetzt. Da aber Benzol für diese Zwecke zu teuer wäre, war die Frage, ob ein Antiklopfmittel sehr wesentlich. Der B. A. S. F. ist es gelungen, in Benzolcarbonyl einen Körper zu finden, welcher das Bleitetraäthyl, wegen dessen giftiger Wirkung vollkommen ersetzt hat. In mancher Beziehung sind noch einige weitere Fragen offen geblieben. (Auto-Technik 15. Nr. 4. 5—9. Bochum, Mittlg. wiss. Abt. Benzolverb.) REIN

—, *Motalin*. (Mitt. aus dem Werke Oppau der J. G. Farbenindustrie A. G.) Motalin ist ein von der J. G. großindustriell hergestellter völlig nichtklopfender Motorentreibstoff. Er besteht aus Bzn., das frei von Crackprodd. u. hochsd. Antiklopf ist u. 0,20 bis 0,25% Eisenpentacarbonyl enthält, sich freiwillig nicht zersetzt u. im Dunkeln unbegrenzt haltbar ist. Das Klopfen, d. h. die zur Detonation gesteierte Verbrennung im Motor, wird, wie zweijährige sehr ausgedehnte Verss. zeigten, durch Motalin ausbeseitigt. Das bei der Verbrennung entstehende Fe-Oxyd ist von kolloidaler Teilchengröße, geht mit dem Auspuff fort u. beeinflusst den Motor nicht ungünstig. Ebenso wenig Schmieröl u. Zündkerzen. An Hand mehrerer Abbildungen u. Diagramme wird die Wrkg. des Stoffes verdeutlicht. (Auto-Technik 15. Nr. 7. 7—9.) HEI

Wm. Hale Charch, Edward Mack jr. und Cecil E. Boord, *Antidetona*. Vf. bestimmen zunächst nach der Methode von MIDGLEY u. BOYD (Journ. Soc. Chem. motive Eng. 10. 7 [1922]) den „antiknock coefficient“ einer Reihe von Verb., den reziproken Wert der Anzahl Mole einer gegebenen Verb., die nötig sind, um denselben Grad detonationsverhindernder Wrkg. zu erreichen, die ein Mol Tetraäthyl in einem konstanten Vol. desselben Brennstoffs ausübt. Es haben Tetraäthylblei

knock coefficient 100, *Tetraphenylblei* 59, *Diäthylbleidichlorid* 67, *Dimethyldiphenyl-*
 $(\text{CH}_3)_2(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Pb}$, 97, *Diäthylidiphenylblei* 93,5, *Diphenylbleidichlorid* ca. 72, *Di-*
äthylbleidibromid ca. 80, *Diphenylbleidijodid* 80, *Tri-p-xylylblei* 64,7, *Bleiäthylxantho-*
 $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OCS}_2)_2$, 7,1, *Bleiethioacetat*, $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COS})_2$, 8,4, *Triphenylwismut* 18,2,
nethylwismut 20,2, *Triäthylwismut* 20,2, *Zinntetrachlorid* 3,5, *Zinntetrajodid* 12,8,
äthylzinndijodid 12,3, *Dimethylcadmium* 1,05, *Titantetrachlorid* 2,7, *Titantetrajodid*
2,7 (infolge des J-Gehalts), *Triphenylantimondijodid* ca. 4, *Phenylarsin*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{AsH}_2$,
s. oben 1 u. 2, *Triphenylarsin* ca. 1,4, *Methyltriphenylarsoniumjodid*, $\text{CH}_3(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{AsJ}$,
s. oben 0,7 u. 1, *Aluminiumäthyljodid*, $\text{Al}_2(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{J}_3$, sehr schwach (infolge des J-
alts).

An Luft- C_2H_2 -Gemischen wurde festgestellt, daß Explosionsverss. in einem offenen
r keine richtige Vergleichsmöglichkeit mit detonationsverhindernder Wrkg. im
or geben. — Mit Tetraäthylblei angestellte Verss. ergaben, daß zwischen der Inten-
der Detonation u. der elektr. Leitfähigkeit (oder Ionisation) der Zylinder gasen
rend der Verbrennung eine direkte Beziehung besteht, was sich vielleicht zu einer
n Methode zur Best. der Detonation in Verbrennungsmaschinen ausgestalten läßt.
Im Gegensatz zu früheren Anschauungen stellen Vff. die Theorie auf, daß die
klopfmittel so wirken, daß sie sich bei genügend hoher Erhitzung der zu ver-
nenden Mischung durch die Zündung bzw. die adiab. Kompression spontan
tzen z. B. nach $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4 \rightarrow \text{Pb} + 2\text{C}_4\text{H}_{10}$, worauf die vielen kleinen Metall-
hen durch sofortige Oxydation ihre Temp. auf 1000—2000° erhöhen, dadurch eine
e von Zentren hoher Temp. in den unverbrannten Gasen bilden, eine Hilfsver-
nung vor der fortschreitenden Zündungsflamme einleiten u. so normale Verbrennung
ner Brennstoffregion zu erhalten streben, die anderenfalls der Detonation unter-
n würde. — Die beste Wirksamkeit hat ein Antidetonator mit einem Kp. unter
der bei der Zers. in h. Luft alles Metall frei werden läßt (Zers.-Temp. zwischen
1. 300°), wonach bei der spontanen Oxydation der möglichst kleinen (kolloidalen)
lteilchen eine gegenüber der Verbrennungstemp. des Brennstoffs hohe Temp.
ht wird.

Die Theorie wird dadurch gestützt, daß *Organo-Hg-Verbb.* keine detonations-
ndernden Eigenschaften zeigen, was daher rührt, daß sich Hg nicht bei der Temp.
aufenden Motors unter Wärmeentw. oxydieren läßt. Ebenso sind auch Bleidi-
stratearat u. die entsprechenden Acetate unwirksam, da das Metall schon in der
oxydiert vorliegt. Wie die Bindung des detonationsverhindernden Metalls auf
Fähigkeit, sich im Motor zu oxydieren, wirkt, erhellt aus einem Vergleich der
rennungswärmen in 1 g Mol. Calorien (bestimmt im Parr-Verbrennungscalorimeter)
Antidetonantien *Tetraphenylblei* 3480 u. *Triphenylantimon* 2220 gegenüber der
unwirksamen Verbb. *Diphenylbleidinitrat*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, 1340, *Diphenylblei-*
at, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$, 1570 u. *Triphenylantimonsulfid*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SbS}$, 965. —
stark für die Theorie spricht auch das Verh. der *Bi-Alkyle* wie auch einzelner
lkyle, die sich bei etwas über 100° zers., schon während des Kompressionshubes
r der Zündung im laufenden Motor beträchtliche Metallabscheidung zeigen u.
zeitig besonders hohe Zylinderdrucke registrieren lassen, obgleich kein Klopfen
erwendung eines Brennstoffs zu verzeichnen war, der sonst heftiger Detonation
lag. — Die detonationsverhindernde Wrkg. *aromat. Amine* erklärt sich daraus,
der Eintritt des N-Atoms den Verbb. einen unstabilen Charakter verleiht, wodurch
oxydierbarkeit viel größer wird als die der einfachen KW-stoffe. — *Jod* wirkt
ntklopfmittel infolge seiner Fähigkeit, Sauerstoff leicht zu übertragen — also
atalysator — was auch daraus hervorgeht, daß verhältnismäßig viel davon (2—3%)
nterdrückung der Detonation nötig ist. (Ind. and Engin. Chem. 18. 334—40.
nbus [O.], Ohio State Univ.)

BEHRLE.

Trent Process Corporation, Washington, *Behandlung von fein zerteiltem kohlenstoffhaltigem Material*. (D. R. P. 423 382 Kl. 1a vom 24/5. 1922, ausg. 23/1. 1923, A. Prior. 20/7. 1921. — C. 1923. IV. 425 [Schwz. P. 103384].) OELKER

Alfred Arthur Lockwood, London, *Aufbereitung von Kohle o. dgl.* Die Kohle o. dgl. wird auf einen Schüttelherd aufgetragen, der in der Nähe des Abtragendes heblich schmaler ist als der übrige Teil des Herdes. Die Scheidung wird dabei durch eine Trennwand bewirkt, welche quer über das Abtragende führt, das vorzugsweise aus einer Öffnung im Herdboden besteht. Ein Luft- oder Gasstrom wird in den Raum zwischen Herd- u. Trennwand dem Gut entgegengeblasen, was den doppelten Zweck hat, die Abscheidung zu begünstigen u. den Auslaß frei von Verstopfung zu halten. Gleichzeitig kann die Luft noch zum Trocknen von Kohle o. dgl. benutzt werden, welchem Zweck sie erwärmt wird. (D. R. P. 423 653 Kl. 1a vom 29/11. 1923, ausg. 8/1. 1926.) OELKER

Jacob Shotwell Robeson, Pennington, N. J., *Für die Brikettherstellung ein verwendbares Bindemittel*, welches aus einer Mischung von etwa 48% Sulfita blaue 38% Melasse u. 14% Teer besteht. (A. P. 1 576 248 vom 3/8. 1921, ausg. 1/1. 1926.) OELKER

Milon James Trumble, V. St. A., *Destillation von Kohlen u. dgl.* Man führt in die Kohlenmasse überhitzten Wasserdampf u. H₂ ein. (F. P. 600 362 vom 1/1. 1925, ausg. 5/2. 1926.) KAUSCH

J. C. Jolly und **R. V. Wheeler**, Sheffield, *Verschwelen von bituminöser Kohle*. Zur Herst. eines Kokes mit geringem S-Gehalt für metallurgische Zwecke setzt man der zu verschwelenden Kohle ein Material zu, das beim Erhitzen eine große Menge H₂ oder ein anderes reduzierendes Gas erzeugt. (E. P. 236 002 vom 1/5. 1924, ausg. 23/7. 1925.) OELKER

J. Rude, London, *Kokserzeugung in zwei Stufen*, deren erste einem Vorerhitzen des kohlenstoffhaltigen Materials auf 360° durch direkte Einw. von h. Gas dient, während die zweite Stufe im Erhitzen in Retorten besteht. (E. P. 244 337 vom 11/5. 1925, ausg. 7/1. 1926.) KAUSCH

Josef Plassmann, Deutschland, *Verkohlung von bituminösen Brennstoffen*. In übereinander gelagerten ringförmigen Verkohlungskammern mit Öffnungen am Umfang, die mit geschlossenen Kammern abwechseln. Ein Gehäuse ist vorgesehen. (F. P. 600 177 vom 22/6. 1925, ausg. 1/2. 1926. D. Prior. 30/9. 1924.) KAUSCH

Charles Auguste Antoine Marie Roux, Frankreich, *Verkohlung, Destillation und Vergasung von Brennstoffen*. Man vergast den mittleren Teil der Brennstoffmasse und benutzt dabei die strahlende Wärme dieser Vergasung zum Erhitzen der äußeren Teile. (F. P. 600 472 vom 2/10. 1924, ausg. 8/2. 1926.) KAUSCH

F. Krauss, Wien, *Destillieren oder Vergasen von Brennstoffen*. Die h. Gase aus einer zentralen Brennstoffkammer werden in eine zweite solche konz. Kammer geleitet u. dann, wenn erforderlich, durch eine oder mehrere Brennstoffkammern, die die erste umgeben. (E. P. 243 534 vom 8/12. 1924, ausg. 24/12. 1925.) KAUSCH

Eugène Albert Prudhomme, Frankreich, *Flüssiger, dem Petroleum ähnlicher Brennstoff*. (CO, reiner H₂, Gemisch beider.) Man läßt einen h. Gasstrom durch eine erhitzte M. von Brennstoff hindurchgehen u. läßt auf die entstehenden KW-stoffe einen Katalysator einwirken. (F. P. 601 163 vom 21/10. 1924, ausg. 24/2. 1926.) KAUSCH

Eugene P. Schoch, Austin, Texas, *Herstellung von entwässertem Lignit in Stückerform*. Man überzieht die Stücke des Rohmaterials mit einem KW-stofföl, indem man sie in dieses eintaucht, erhitzt sie hierauf auf eine Temp., welche zur Austreibung des W. genügt u. entfernt hierauf das nichtabsorbierte u. auch einen Teil des absorbierten Öles durch Verdampfung. (A. P. 1 574 174 vom 18/8. 1924, ausg. 2/1. 1926.) OELKER

Humphreys & Glasgow, Ltd., Westminster, übert. von: **J. A. Perry**, Swarthmore, Pennsylvania., *Gasherstellung*. Man stellt ein Gemisch von Kohlengas u. Generatorgas von einer D. u. einem Wärmewert her, daß es dem Wassergas gleicht u. gibt, wenn erforderlich, eine geringe Menge von carburiertem Wassergas ähnlicher Eigenschaften (**E. P. 246 459** vom 7/1. 1926, Auszug veröff. 24/3. 1926. Prior. 20/1. 1925.) **KA.** **Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz**, kreisch, *Entbenzolieren des Gases*. Man läßt das Waschöl unter Luftabschluß zirkulieren. (**F. P. 596 498** vom 9/4. 1925, ausg. 24/10. 1925.) **KAUSCH.**

Soc. des Établissements Barbet, Paris, *Destillation von Rohbenzol* in einer Apparatur für die kontinuierliche Rektifikation von Rohbenzol, die zwei Rektifikationsstufen aufweist, in deren erster Bzl., Toluol u. Xylol u. in deren zweiter unter Minderdruck Solventnaphtha u. Xanthen abgetrennt werden. (**E. P. 244 130** vom 7/12. 1925, Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 5/12. 1924.) **KAUSCH.**

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, übert. von: **Pierre Raynes**, Buffalo, N. Y., *Brenngasgemische*. Man verflüssigt durch Druck eine Naturgasaktion, in der Propan vorherrscht, das bei 40° F. gasförmig ist, u. bringt das verflüssigte Gas dorthin, wo ein geringwertiges Brenngas vorhanden ist, verdampft es dort und mischt es mit dem geringwertigen Gas. (**Can. P. 250 544** vom 23/2. 1925, ausg. 1925.) **KAUSCH.**

Friedrich Haas, Wien, *Herstellung von Brenntorf aus Rohtorf*. Wollgrashaltiger, trockener Torf von seiner bindigen (schrumpffähigen) Beschaffenheit durch Überwintern auf Trockenflächen oder durch zeitweise Selbsterhitzung befreit u. danach entertorft wird mit bindig gebliebenem Rohtorf u. gegebenenfalls mit von der Torferzeugung herrührenden Rückständen vermischt u. zu Brenntorf verarbeitet. (**P. 102 275** vom 30/3. 1921, ausg. 11/1. 1926. D. Priorr. 31/8. 1917 u. 29/11. 1917.) **OELKER.**

Judfeldt & Co., Melle i. Hann., (Erfinder: **M. Gelbke**, Melle i. Hann.), *Gewinnung leichtwertvoller Produkte aus den bei der Raffination von Mineral-, Teer- und Schiefererzeugnissen anfallenden alkalischen Abfallprodukten*. Die Abfallprodd. werden in möglichst reinem Zustand im Vakuum mit überhitztem Wasserdampf so lange destilliert, bis alle flüchtigen Bestandteile, insbesondere die nicht sulfurierten Öle, übergegangen sind, worauf man den Rückstand mit verd. Säuren zers. — Die überdest. Öle können als Emulgierungsmittel, als Ersatz für Seifen u. Türkischrotöl, insbesondere als Fettspalter benutzt werden können. (**D. R. P. 426 947** Kl. 23d vom 27/4. 1926, ausg. 20/3. 1926.) **OELKER.**

Ernest Schultz, East Melbourne, Austr., *Leichtöl oder Petroleumessenz*. Rohes Schieferöl oder Schieferöl wird in einer Retorte o. dgl. vergast u. die Gase werden in einen Konverter geleitet, in dem Leichtöl erzeugt wird, das in einen Kondensator geleitet wird. Das Kondensat wird angesäuert u. fraktioniert. (**Aust. P. 16 273** vom 5/2. 1924, 21/5. 1925.) **KAUSCH.**

Robert Henry Crozier, London, *Vorrichtung zur Fraktionierung von Kohlenwasserstoffen* u. dgl., gek. durch die Verb. von durch Heizschlangen erwärmte Säulen für aufsteigende Dämpfe u. durch Kühlschlangen gekühlte Säulen für den Niedergang der absteigenden Dämpfe mit Sammelkästen, derart, daß diese sich unterhalb der aufsteigenden Säulen erstrecken u. die abfließenden Kondensate getrennt empfangen, der freie Raum oberhalb der Sammelkästen aber durch in das Kondensat eintauchende Scheidewände geteilt ist, daß die in einer Säule absteigenden Dämpfe nach der nächsten Säule aufsteigende Dämpfe übertreten. — Es wird bei Zuführung von Dampf von einer bestimmten Temp. in die Schlangen der Säulen vermieden, daß niedrig sied. Fraktionen in den Teilen der Anlage kondensieren, wo diese Kondensierung nicht erwünscht ist. Es ist gestattet der App. die Rektifikation durch Rückführung des Kondensats in

Berührung mit den heißeren eintretenden Dämpfen. (**D. R. P. 425 759** Kl. 23b. 16/9. 1925, ausg. 23/2. 1926.) OELKE

Pierce Petroleum Corporation, New York, übert. von: **James M. Wadsworth**, Fort Worth, Texas, *Destillieren von Öl*. Man erhitzt das Öl in aufeinanderfolgender Stufen, hält die Dämpfe einer jeden Erhitzungsstufe getrennt von denen der vorhergehenden u. erhält von jeder Stufe Fraktionen verschiedener Flüssigkeit. Dann werden die zurückbleibenden nichtkondensierten Dämpfe aller Stufen vereinigt, kondensiert u. destilliert. (**A. P. 1 572 584** vom 27/12. 1921, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH

Harold R. Berry, Brooklyn, N. Y., *Umwandlung von Kohlenwasserstoffen*. KW-stoffe von höherem Kp. werden in solche von niedrigerem Kp. dadurch umgewandelt, daß man in einem begrenzten Raum h. H₂-enthaltendes Gas mit fl. KW-stoffen in innige Berührung bringt, wobei eine verschiedene Regelung der Temp. u. des Drucks zu verschiedenen Prodd. führt. (**A. P. 1 571 994** vom 18/9. 1922, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH

Clive Morris Alexander, New York, *Zersetzen von Ölen in zerstäubter Form* u. der Oberfläche von auf die Zersetzungstemp. der leichteren Öle erhitzten Schwerölen. (**A. P. 1 573 532** vom 9/10. 1919, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH

J. F. Donnelly, Lemont, Illinois, *Cracken von Kohlenwasserstoffen*. KW-stoffe werden auf Cracktemp. unter Druck erhitzt in einer Rohrschlange u. dann unter geringem Druck mit kühlerem Öl gemischt. (**E. P. 243 339** vom 10/11. 1925, Auszug vom 20/1. 1925. Prior. 21/10. 1924.) KAUSCH

Deutsche Erdöl Akt.-Ges., Berlin, *Cracken von Kohlenwasserstoffen*. Schwere KW-stoffe (Teere, Bitumen, Rohmineralöl usw.) werden durch eine Pumpe durch ein Vorwärmerrohr u. eine auf die Cracktemp. erhitzte Rohrschlange in eine gut Wärme isolierte Kammer, in der die Temp. erhalten bleibt, gedrückt. (**E. P. 244 444** vom 3/12. 1925, Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 3/12. 1924.) KAUSCH

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin, *Konservierung von Transformatorölen* während des Betriebes des Transformators, dad. gek., daß Oxyde, Carbonate, Silicate bas. u. amphoterer Natur in das Transformatorensystem oder eine zu diesem Zwecke in den Ölumlaufl eingeschaltete besondere App. hineingebracht werden. 2. gek. durch die Verwendung von Raffinationserden, wie Fullererde usw. — Die bei Veränderungen des Öles auftretende B. saurer Stoffe wird aufgehalten. (**D. R. P. 426 996** Kl. 23c vom 13/4. 1923, ausg. 23/3. 1926.) OELKE

American Demulsifying Co., Muskogee, Oklahoma, übert. von: **Wadsworth D. Leeper**, New York, *Entemulgieren von Mineralölen*. Man spritzt das Öl in W. u. dessen Oberfläche. (**A. P. 1 573 321** vom 7/12. 1921, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH

Benzol-Verband Ges., Bochum, übert. von: **P. Probst**, Essen, *Carburieren von Naphthalin*. Verbrennungskraftmaschinen werden mit durch Naphthalin carburierter Luft betrieben. Zur Carburierung bringt man die Luft mit überschüssigem Naphthalin bei der Sättigungstemp. der Mischung (90—100°) zusammen. (**E. P. 245 752** vom 16/12. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 7/1. 1925.) KAUSCH

O. Leonori, Narni, Italien, *Motortreibmittel usw.* Man behandelt A. mit CaC₂ setzt Petroleum, Bzn., Schieferöl, Terpentin, Bzl., Toluol, Xylol, Naphtha u. Naphthalin dem A. vor der Behandlung mit Carbid zu. (**E. P. 245 460** vom 31/12. 1925, Auszug veröff. 24/2. 1926. Prior. 31/12. 1924.) KAUSCH

General Motors Corporation, Detroit, Michigan, *Motortreibmittel*, bestehend aus einem Gemisch von Gasolin, Kerosin o. dgl., einem antiknocking Mittel (Pb(C₂H₅)₂ u. einem Schmiermittel (Halogenisiertes aromatisches Öl, z. B. chloriertes Naphthalin, Bzl. oder Toluol) u. einer Halogenverb. (Äthylendibromid, Propylendibromid, Bromanilin usw.). (**E. P. 245 281** vom 20/1. 1925, ausg. 28/1. 1926.) KAUSCH

General Motors Corp., Detroit, Michigan, übert. von: **Thomas Midgley**, Dayton, Ohio, V. St. A., *Mittel zur Verhütung des Klopfens in Verbrennungsmaschinen (Antiklopfmittel)*. Das Mittel, welches dem Motortreibmittel vor der

ennung zugesetzt wird, besteht aus einer Mischung von *Anilin*, ungesätt. *Gasolin* *toluidin*. (A. P. 1571 862 vom 26/10. 1920, ausg. 2/2. 1926.) OELKER.

General Motors Corp., Detroit, Michigan, übert. von: **Thomas Midgley, jr.**, n, Ohio, V. St. A., *Motortreibmittel*, welches aus Petroleum oder Gasolin u. kleinen Menge einer flüchtigen Verb. besteht, welche das sogen. Klopfen des s verhindert. Als derartige Verbb. können z. B. verwendet werden Alkylverbb. e, Te, As, P, Cd u. Sn, insbesondere $\text{Se}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$, $\text{Te}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$, $\text{As}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$, $\text{P}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$, $\text{Bi}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$, $\text{Sn}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$. (A. PP. 1 575 436, 1 575 437, 1 575 438, 1 575 440, 1 575 441, 1 575 444 vom 18/9. 1923, ausg. 2/3. 1926.) OELKER.

General Motors Corp., Detroit, Michigan, übert. von: **Thomas Midgley, jr.**, n, Ohio, V. St. A., *Motortreibmittel*, welches aus Petroleum, Gasolin o. dgl. u. kleinen Menge einer flüchtigen Verb. des Sb oder des Bi, wie z. B. $\text{Sb}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$, $\text{Bi}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$, zusammengesetzt ist. Durch den Zusatz dieser Verbb. soll das Klopfen otors verhindert werden. (A. PP. 1 575 439 u. 1 575 442 vom 18/9. 1923, 2/3. 1926.) OELKER.

General Motors Corp., Detroit, Michigan, übert. von: **Thomas Midgley, jr.**, n, Ohio, V. St. A., *Motortreibmittel*, welches aus Petroleum, Gasolin o. dgl. dem Zusatz von TiCl_4 besteht. Man löst z. B. in einer Gallone Gasolin 1000 cem Der Zusatz dieser Verb. bezweckt, das Klopfen des Motors zu verhindern. (A. PP. 1 575 443 vom 18/9. 1923, ausg. 2/3. 1926.) OELKER.

XX. Schieß- und Sprengstoffe; Zündwaren.

Alfred Stettbacher, *Das Sprengstoffwesen in den Jahren 1914—23*. (Chem.-Ztg. 41—22. 642. 646—47. 666—67. 682—84. 713—16. 729—32. 737—40. 1925. 1.) KAST.

Gärtner, *Fabrikation von Trinitrotoluol*. Ergänzungen zur Beschreibung von **Stettbacher** (vgl. vorst. Ref.). (Chem.-Ztg. 49. 808. 1925.) JUNG.

Stettbacher, *Bemerkung zu der Ausführung von R. Gärtner: Fabrikation von Toluol*. (Vgl. vorst. Ref.) (Chem.-Ztg. 49. 808. 1925.) JUNG.

H. Killeffer, *Pflugschare im chemischen Kampfe*. Beschreibung der drei n Sprengstofffabriken Nordamerikas, ihre Anlage u. Schutz vor feindlichen en. (Ind. and Engin. Chem. 18. 253—58. New York [N. Y.].) GRIMME.

C. Knight und **D. C. Walton**, *Verbrennungsprodukte von rauchlosem Pulver. analytische und physiologische Studie*. Bei der Verbrennung von rauchlosem entstehen neben wenig Acetylen u. Nitrilen vor allem CO u. nitrose Gase. Die letzteren sind hauptsächlich für etwaige Vergiftungen verantwortlich zu machen. erkend bei ihrer Wrkg. kommt noch die hohe Verbrennungstemp. hinzu. (Ind. ngin. Chem. 18. 287—91. Edgewood Arsenal [Md.].) GRIMME.

Joesten, *Die Wirkungen der verschiedenen Besatzarten beim Schießen mit hand-Sprengstoffen*. Krit. Unterss. des Vfs. an Hand von theoret. Betrachtungen über sparnis an Sprengstoff, bezw. die Erhöhung der Sprengleistung durch bestimmte ung des Besatzes. (Glückauf 61. 898—901. 1925. Berlin-Friedenau.) KAST.

Heyer, *Die Wirkungen der verschiedenen Besatzarten beim Schießen mit hand-Sprengstoffen*. Kritik an den Ausführungen **JOESTEN**'s (vgl. vorst. Ref.). Durch ischenschaltung von Hohlräumen vergrößert man die Angriffsfläche der Spreng- t. erzielt mit kleinerer Ladung denselben Erfolg wie früher bei Überladung. Das erk wird weniger zerkleinert. Verss. mit Hohlraumschießen mit Außenbesatz ünstig verlaufen. Am besten ausgebildet scheint das Kruskopfverf. zu sein. auf 61. 1441—43. 1446. 1925. Eisleben.) JUNG.

Wostall, *Die Wirkungen der verschiedenen Besatzarten beim Schießen mit hand-Sprengstoffen*. (Vgl. **JOESTEN**, vorvorst. Ref.) Die Frage läßt sich nicht einseitig eoret. Überlegungen aus beurteilen. Aber auch aus theoret. Erwägungen heraus

ist zu erwarten, daß die durch den Hohlraum bewirkte Abnahme des spezif. Dr. u. damit der Brisanz eine vorteilhafte Nutzung der Sprengwrkg. ergibt. Sie beginnt erst Arbeit zu leisten, wenn der Druck der Explosionsgase sich dem Maximum theoret. Wertes nähert. Dem Vorschlag, Sprengstoffe von geringerer Brisanz u. Ladedichte mit n. Besatz in Anwendung zu bringen, ist durch die Lücke zwischen Schupulver u. Ammonsprengstoff eine Grenze gesetzt. Mit Ladedichte ist wohl kub. D. gemeint, da Verringerung der Ladedichte nur durch Anwendung eines Hohlraums möglich wäre. Ladedichte stellt das Verhältnis der Sprengstoffladung zum Explosionsraum dar. (Glückauf **61**. 1443—44. 1925. Krywald bei Gleiwitz.) JUN

J. Joesten, *Die Wirkungen der verschiedenen Besatzarten beim Schießen mit festen Sprengstoffen*. Entgegnung an HEYER u. an WOSTALL (vgl. vorst. R.). Die Zwischenschaltung von Hohlraum setzt die Ladedichte herab u. vermindert die Brisanz u. Leistung. Der scheinbare Vorteil beim Hohlraumschießen mit schlechtem wirtschaftlichen Effekt erzielt. Anscheinende Ersparnisse sind früheres Überladen oder weniger entsprechende Wahl des Sprengstoffs zu zuführen. — Die nutzbare Sprengwrkg. steht in ursächlichem Zusammenhang mit dem Brisanzwert. An Stelle des Hohlraums außerhalb der Sprengpatronen wirkt Hohlraum innerhalb der h. Verringerung der kub. Dichte günstiger. Wenn der Explosionsdruck rascher die Höhe erreicht, die zur Zerteilung der Wände genügt, also theoret. Höchstwert, so ist der Schuß überladen. Die günstigste Ausnützung beim Eindämmen auf kleinsten Raum erreicht. (Glückauf **61**. 1444—46. 1925. B. Friedenau.) JUN

Renner Kodolanyi Victor und Helle János, *Versuche zur Erklärung des Nitrationsmismus des Nathan-, Thomson- und Rintoulschen Verfahrens*. Unterss. über das in englischen Patenten 15983 (1901) u. 3020 (1903) beschriebene Verf. (vgl. auch LU Ztschr. f. d. ges. Schieß- u. Sprengstoffwesen **1**. 393 [1906]) zur Vermeidung einer Nachscheidung der bei der Nitroglycerindarst. sich ergebenden Abfallsäure durch Zugabe von 2% W., wodurch sich diese ohne die sonst erforderliche Aufbewahrung, denitrieren u. konzentrieren lassen. Verss. ergaben, daß durch Zugabe von 5% W. zu der nach Trennung vom Nitroglycerin verbliebenen Abfallsäure die Menge des durch Chlf. ausziehbaren Tri- bzw. Diesters zurückgeht. Es scheint hierbei nicht nur Gleichgewichtsverschiebungen, sondern auch Oxydationsvorgänge eine Rolle zu spielen. Die Verss. sind nicht als erschöpfend anzusehen. (Ztschr. f. d. ges. Schieß- u. Sprengstoffwesen **20**. 89—91. 98—100. 1925. Magyaróvár.) K

Gh. Pande, *Schießbaumwolle der Infanterie und Artillerie aus Holzzellulose*. *„Letea“*. Nach einer geschichtlichen Einleitung über die Entdeckung der Nitrocellulose behandelt Vf. die chem. u. physikal. Eigenschaften der Nitrocellulose, ihres Ausgangsstoffs, der Cellulose, die Zus. der in den verschiedenen Staaten für Infanterie- u. Artilleriepulver verwendeten Schießbaumwolle. Im Hauptteil wird die Verwendung des Holzzellulosestoffs verschiedener Herkunft für diesen Zweck, die Darst., Reinigung u. Nitrierung, die chem. Unters. der Holznitrocellulose u. die Prüfung auf Stabilität nach den verschiedenen Methoden (BERGMANN-JUNK, Puffungsprobe, ABEL-, VIEILLE-Test) im Vergleich zu Baumwollnitrocellulose behandelt. (Bulet. Societ. de Ştiinţe din Bucureşti **27**. 79—128. 1924.) KA

Eugen Spitalsky und E. Krause, *Untersuchung über die Chlorat- und Perchloratsprengstoffe*. Unterss. über einen Zusammenhang zwischen Eigenschaften explosiver Chlorat- u. Perchloratmischungen u. ihrer Zus. zur Klärung der bekannten nachteiligen, auf selbsttätige Erhöhung der Ladedichten zurückzuführenden Brisanzverminderung beim Lagern. Die Abhängigkeit der Brisanz von der Ladedichte wird an einer Reihe von Chlorat- u. Perchloratgemischen nach der Bleizylinderstammprobe untersucht u. die für jedes Chlorat- bzw. Perchlorat dem Brisanzoptimum entsprechende Ladedichte festgestellt. Sie ist für Mischungen mit Kaliumchlo-

mit Na-Chlorat 1,40 u. mit Ammonperchlorat 1,20. Die Komprimierfähigkeit der Sprengstoffgemische ist bei gleichem Gesamtgehalt an organ. Beimengungen (Vff. verwenden Kolophonium, Vaseline + Paraffin in verschiedenem Verhältnis) durch die Anwesenheit des Zusatzes stark beeinflusst u. bestimmt. Jedes Chlorat u. Perchlorat wirkt zur günstigsten Sprengwirkung eine besondere Zus. der organ. Beimengungen. In einer Reihe von Sprenggemischen werden die durch Änderung in der Zus. der einzelnen Bestandteile sich ergebenden Dichten festgestellt, außerdem der Einfluß der organ. Zus. auf die Brisanz. Bei der Unters. der verschiedenen Gemische ergab sich folgende als sehr brauchbar, da sie erst bei sehr starker, in der Praxis nicht auftretender Nachpressung (mit der Hand) ihre oben angegebenen günstigsten Dichten erreichen: „*Kaliumalmatrit N 55*“: 88% KClO_3 , 12% organ. Substanz (5% Vaseline, 30% Paraffin, 65% Kolophonium). „*Natriumalmatrit N 19*“: 90% NaClO_3 , 10% organ. Substanz (5% Vaseline, 92,5% Paraffin, 2,5% Kolophonium). „*Ammonalmatrit N 98*“: 89% NH_4ClO_4 , 11% organ. Substanz (8% Vaseline, 27% Paraffin, 65% Kolophonium). Die Gemische besitzen etwa die Reib- u. Stoßempfindlichkeit der Pikrinsäure, sind wärme- (40°) u. kälte- (—20°) beständig u. zeigen nach 6-jähriger Lagerung keine Verminderung der Brisanz. Die Sprengkraft des „*Ammonalmatrits*“ nähert sich der ungepreßten, krystallisierten Pikrinsäure, die des „*Natriumalmatrits*“ der des krystallisierten Trinitrotoluols. (Ztschr. f. d. ges. Schieß- u. Sprengstoffwesen **20**. 103—07. 119—23. 133—35. 1925. Moskau, Univ.) KAST.

Otto Schulze, *Einiges über die Initiierung von Sprengstoffen*. Verss. über den sicheren Übertragung der Explosion erforderlichen Höchstabstand zwischen Sprengkapselboden u. Dynamitpatrone in eisernen Röhren von 25 mm lichter Weite am Wandstärke. (Ztschr. f. d. ges. Schieß- u. Sprengstoffwesen **20**. 113. 1925. Lwow, Univ.) KAST.

Jennett Grotta, *Entwicklung und Anwendung der Initialsprengstoffe*. Die verschiedenen gebräuchlichen Sprengkapselsätze, sowie ihre Vor- u. Nachteile werden beschrieben. Knallquecksilber ist sehr leicht entzündlich, doch feuchtigkeitsempfindlich u. verliert durch hohen Preßdruck seine explosiven Eigenschaften. Die Herstellung von Knallquecksilberkapseln mit Tetryl- bzw. Trotylbeiladung ist infolge der Notwendigkeit einer Verwendung von Innenkapseln teuer. Ein Nachteil dieser Kapseln besteht weiterhin in einer, die Wirkung der Kapselladung ungünstig beeinflussenden Ausscheidung geringer Mengen öligler Substanz beim Pressen des Trotyls. Bleiazid ist den Fulminaten an Brisanz überlegen u. deshalb bessere Initiatoren. Bei Verwendung von Bleiazid zu kombinierten Kapseln kann die Innenkapsel entbehrt werden. Die geringere Entzündlichkeit des Bleiazids hat man durch Zugabe von Quecksilber zu erhöhen versucht. Die B. von hochexplosivem *Kupferazid*, des *Prod.* des Bleiazids auf die Kupferhülse, kann durch Verwendung von Al-Hülsen vermieden werden, doch halten diese Hülsen dem Angriff von Knallquecksilber nicht stand. Diese Nachteile werden durch folgende Anordnungen vermieden: Verwendung von Tetrylkapseln aus Al mit Bleiazidaufladung, dem zur Erhöhung der Entzündlichkeit Bleitritinitroresorcinat zugesetzt wird, oder Verwendung von Tetryl in Kupferhülsen mit Quecksilberazid- u. Knallquecksilberaufladung. Quecksilberazid mit dem Kupfer kein Kupferazid.

Eine vergleichende Prüfung der verschiedenen Kapseln ist durch Initiierung von Nitroglycerin in einer Kupferhülse u. Beobachtung des Eindrucks auf einer Platte möglich, oder durch Feststellung des Maximalgehaltes von dem Trinitroresorcinat zugesetzten Eisenoxyd, bei dem eben noch Detonation eintritt. Ein Vergleich der Brisanz ist weiterhin durch Abfeuern der Sprengkapsel in einer mit Salz gefüllten Röhre möglich. Nach Auflösen des Salzes, Sammeln u. Trennen der Splitter nach Größe läßt sich ein Vergleich ermöglichen. Bei allen diesen Methoden er-

weist sich die Tetrylkapsel als wirksamer wie die Knallsatzkapsel. (Ind. and Eng. Chem. **17**. 134—38. 1925. Tamaqua, Pa. Atlas Powder Co.) KAS

J. Frère, *Die hydraulische Klassifizierung von Pulvern nach dem Verfahren L. Andrews*. (Vgl. Chem. Trade Journ. **74**. 403; C. **1924**. I. 2806.) (Rev. des procéd. chim. **29**. 181—84.) JUN

Charles R. Franklin, Dover, N. J., V. St. A., *Herstellung von Schießpulver*. Man vermischt Nitrocellulose mit einem N-Gehalt von etwa 12,60% mit einer richtigen Menge W., gibt dann unter starkem Rühren Nitroglycerin hinzu, entfernt Überschuß an W. durch Auspressen, versetzt die M. mit einem Stabilisierungsmittel, einem das Mündungsfeuer verhindernden Mittel, führt sie durch erhitze Preßwalzen, vermischt sie darauf mit einem flüchtigen Lösungsm., behandelt sie dann noch in den Preßwalzen u. verarbeitet das so erhaltene, gleichmäßig gelatinierte Produkt in Blättchen o. dgl. (A. P. **1 564 549** vom 19/12. 1923, ausg. 8/12. 1925.) OEL

Bernhard Jacques Flürscheim, Rushmoor Fleet, Hampshire, *Brisantepulverherstellung*. *Tetranitroanilin* wird mit einer geschmolzenen Nitroverb. (Trinitrotoluol) gemischt u. abkühlen gelassen. (E. P. **226 913** vom 26/10. 1923, ausg. 8/12. 1925.) KAUSCH

Wilhelm Eschbach, Troisdorf b. Köln a. Rh., *Herstellung von Sprengkapseln*. Es werden an Stelle von Al dessen Legierungen benutzt. (N. P. **39 446** vom 4/4. 1924, ausg. 4/8. 1924.) OELKE

L. Wöhler, Darmstadt, *Anordnung zur quantitativen Messung der Initialwirkung von Sprengkapseln*. (D. R. P. **421 867** Kl. 42k vom 17/6. 1924, ausg. 20/11. 1925. C. **1926**. I. 1494.) KÜHLIN

XXI. Leder; Gerbstoffe.

J. Gordon Parker und **J. T. Terrell**, *Versuche mit verschiedenartigen mit Pufferlösung vom $p_H = 4,6$ vorbehandelten Hautpulvern*. Je 13 g Hautpulver verschiedener Herst. wurden mit 150 ccm einer Pufferlsg. vom $p_H = 4,6 \frac{1}{2}$ Stde. geschüttelt, über Nacht stehen gelassen, nochmals geschüttelt, ausgewaschen u. gewöhnlich nachchromiert. Verss. zur Ermittlung der Nichtgerbstoffgehalte Kastanienholz-, Eichenholz- u. sulfitiertem Quebrachoextrakt mit so behandelten Hautpulvern ergaben gut übereinstimmende Ergebnisse ($\pm 0,4\%$). (Journ. Leather Trades' Chemists **9**. 479—80. 1925. London, Leathersellers' Coll.) LOE

Madge Kaye und **Robert Henry Marriot**, *Das Verhalten von angesäuertem Schmelz beim Enthaaren*. I. Mikroskopische Untersuchung über die enthaarende Wirkung von kaustischen Alkalien und Schwefelnatrium. untersucht mkr. die Wrkg. von $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaOH, Na_2S u. NaSH sowie von Gemis aus NaOH u. NaSH auf getrocknete Ziegen- sowie frische Ochsen- u. Kalbshäute. Stets wurde zuerst das Gewebe der Haarwurzeln u. Haarbälge sowie die untere Schicht der Epidermis angegriffen u. zerstört. (Mikrophotographien.) Na_2S war am wirksamsten.

II. Die enthaarende Wirkung von Sulfiden und Polysulfiden. (F. MARRIOT.) Aus den Verss. schließt der Verf., daß in den untersuchten Systemen die enthaarende Wrkg. bei maximaler S²⁻-Ionenkonz. am größten war, sie sollen in einer Linie für die enthaarenden Wrkgg. von Lsgg. von Sulfiden verantwortlich sein. Polysulfide, die gleiche Wrkg. haben Na_2S , K_2S , BaS u. CaS , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ u. MgS enthaaren nicht. Polysulfiden kommen ähnliche enthaarende Eigenschaften zu wie den Sulfiden, die Wrkg. nimmt mit steigender Konz. zu u. mit zunehmender Komplexbildung des Polysulfidmoleküls ab. Durch Vorbehandlung mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$ oder NaOH wurde die Enthaarung bei nachfolgender Behandlung mit Sulfiden oder Polysulfiden behindert.

Einfluß war eine Vorbehandlung mit Säuren. (Journ. Soc. Leather Trades Chemists **9**. 591—620. 1925.)

LOEWE.

Madge Kaye und **Robert Henry Marriot**, *Die Wirkung von kaustischen Alkalien, den und Polysulfiden auf Haare*. III. Bei der Hydrolyse von Haaren durch NaOH vornehmlich Cystin aus dem Keratin gel. Na₂S wirkt eher lösend als hydrolytisch auf Haare ein, wobei eine Rk. zwischen dem S der Haare u. dem S der Sulfide stattfinden soll. Bei Einw. von Ca(OH)₂ auf Haare werden Sulfide in der Lsg. getrennt. (Journ. Soc. Leather Trades' Chemists **9**. 591—620. 1925. Lab. of British Leather Manufacturers Research-Association.)

LOEWE.

D. Woodroffe, *Die Überwachung von Chrombrühen bei der Einbadchromgerbung*. (Sektion Chromleder-Analysen-Unterkommission.) Die Befunde von **PICKERING** (Journ. Soc. Leather Trades' Chemists **1921**. 177) u. von **DHAVALÉ** u. **DAS** (Journ. Soc. Leather Trades' Chemists **1920**. 225), daß die Titrationsacidität von verd. Chrombrühen durch NaCl-Zusatz vergrößert wird, werden bestätigt. Es wird weiter gefunden, daß die gerbenden Eigenschaften von Cr-Brühen eher durch den p_H als durch die Basizitäts- u. Ausflockungszahlen charakterisiert werden. (Journ. Soc. Leather Trades' Chemists **9**. 480—85. 1925.)

LOEWE.

Donald Burton, *Chromgerbung*. IX. Teil IV. *Bibliographie der Chromgerbung*. III. vgl. Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **20**. 158; C. **1925**. II. 505.) Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **21**. 33—36.)

LOEWE.

Aug. C. Orthmann, *Säuregehalt von chromgarem Leder*. Gepickelte Kalbsblöße (be- zogen auf Trockengewicht) wurde mit 35% (be- zogen auf Pickelgewicht) einer 8% Cr₂O₃ enthaltenden Cr-Brühe von Basizitätsgrad 10 erhalten durch Red. von Dichromat mittels Zucker, 5 Stdn. gegerbt. Danach wurde 1% NaHCO₃ (bezogen auf das ursprüngliche Gewicht) hinzugefügt u. weitere 24 Stdn. gegerbt, 24 Stdn. über den Bock geschlagen u. nach dem Spalten u. Falzen mit 1% NaHCO₃ neutralisiert. Nach dem Färben, Fetten mit einer Emulsion aus Öl u. Seife, Trocknen u. der Zurichtung wurde der Gehalt des Leders an Chrom gemäß der vorläufigen Methode der American Leather Chem. Assoc. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **21**. 30—33. Milwaukee, Lab. PFISTER & VOGEL Leather Co.)

LOEWE.

P. Pawlowitsch, *Über den Gerbstoffgehalt der Eiche*. Aus Analysen von kaukas. u. russ. Eichen (Tabelle) verschiedenen Alters geht hervor, daß der Gerbstoffgehalt mit dem Alter über der Erde ein wenig größer ist als in Brusthöhe, zur Mitte u. zum Stamm nimmt der Gerbstoffgehalt stark zu. (Collegium **1925**. 627—29. Taganroy.)

LOE.

E. Crede, *Die Adstringenz vegetabilischer Gerbstoffe*. Obwohl die Adstringenz ein sehr wichtiges Charakteristikum für vegetabil. Gerbstoffe ist, konnte sie bis heute nicht eindeutig definiert werden. An Stelle theoret. Betrachtungen schlägt Vf. eine neue Meßmethode der Adstringenz vor. Nach seiner Auffassung ist die Adstringenz: [Gerbstoffgehalt nach Methode WILSON-KERN] dividiert durch [Gerbstoffgehalt nach der offiziellen Methode]. Im Zähler steht der irreversibel gebundene Anteil des Gerbstoffes seitens von Hautpulver. Im Nenner der irreversibel + reversibel gebundene Gerbstoff. Die erhaltenen Verhältniszahlen für Quebracho (72,5), Hemlock (63,0), Eichenrinde (53,1), Mimosa (54,0), Valonea (37,5), Divi-Divi (21,3) u. Myrobalan entsprechen in der Reihenfolge der Adstringenz der angeführten Gerbmaterien. (Amer. Leather Chem. Assoc. **20**. 573—76. 1925.)

MEZEY.

Walter Bruckhaus, *Sulfitzellstoffablauge als Gerbextrakt in der Leder- und Textilindustrie*. Entbastete Seide nimmt aus Lsgg. von reinem Catechu u. von Gemischen aus Catechu u. Sulfitablauge gleichviel auf, beim Färben zeigten sich keine Nachwirkungen der mit Catechusulfitablauge gebeizten Seide. Vorschriften für Mischgerbungen mit Sulfitablauge u. mineral. oder pflanzlichen Gerbstoffen werden mitgeteilt. Aus verd. Sulfitablauge u. CH₂O läßt sich ein zur Erzeugung von Wasch- u. Hand-

schuhleder geeigneter Gerbextrakt gewinnen. (Wchbl. f. Papierfabr. **57**. 310-Krefeld.)

SÜVER

John Arthur Wilson und **Henry B. Merrill**, *Methoden zur Bestimmung der enzymatischen Aktivität von Beizpräparaten*. Zur Best. des Wertes von Beizpräparaten ermitteln Vff. ihre enzymat. Wrkg. auf Keratose, Elastin, Kollagen, Casein u. i. Eine Funktion der Beize besteht darin, die in den Blößen vorhandenen Keratose beim Äschern entsteht, enzymat. abzubauen, so daß sie nicht mehr durch S. ausgefällt werden u. aus den Blößen leicht herausgewaschen werden kann. V. die Keratose nicht abgebaut, so leidet die Qualität des Leders, insbesondere der Narben ungünstig beeinflußt. Die Aktivität von Beizpräparaten in bezug Keratose wird definiert als der reziproke Wert des Prod. aus der Einwirkung in Std. u. der Menge des Beizpräparates in g, die notwendig sind, um innerhalb der Zeit 2 g Keratose, in einem Liter W. gel., bei 40° bei einem p_H von 7,9 zu 40% zersetzen. Keratose erhält man durch 18 Std. lange Einw. von 2-n. NaOH bei 100 g weißer Kalbshaare. Der p_H der Lsg. wird dann auf 4,1, den isoelekt. Pt. der Keratose, gebracht, sie wird auf diese Weise gefällt, gewaschen u. durch Erhöhung des p_H auf 8,0 wieder in Lsg. gebracht. Die Konz. von Lsgg. von Keratose wird durch Ausflocken in einem aliquoten Teil u. Wägen des ausgewaschenen Nd. r. Trocknen über Nacht bei 100° ermittelt. Unter den angegebenen Bedingungen man geeignete Mengen des Beizpräparates auf 2 g Keratose einwirken u. ermitteln die zersetzte Menge als Funktion der Zeit. Den Zeitwert, bei dem 40% zers. worden sind, interpoliert man. Durch Blindvers. ist die Korrektur für in Lsg. gegangenes mit ausfällbares Enzym zu ermitteln. Die enzymat. Wrkg. von Beizpräparaten auf *Elastin* wird definiert als der reziproke Wert der Anzahl g Beizpräparat, die notwendig sind, um alle elast. Fasern aus geäschelter, enthaarter u. gewaschener Kalbsblöße zu entfernen. Die Elastinentfernung wird mkr. verfolgt. (Journ. Ind. Engin. Chem. **13**. 1137; C. **1922**. II. 1119.) Die enzymat. Wrkg. von Beizpräparaten auf *Kollagen*, die sich als „Überbeizen“ unliebsam bemerkbar machen kann, wird definiert als der reziproke Wert der Anzahl g Beizpräparat, die notwendig sind, um 2 g nach einer besonderen Vorschrift gereinigten Hautpulvers, die in einem Liter W. verteilt sind, bei p_H = 7,9 u. 40° zu 20% in Lsg. zu bringen. Das Hautpulver wird vor der Behandlung mit dem Beizpräparat 1 Stde. in eine Pufferlsg. vom p_H = 7,9 gebracht; die während dieser Operation in Lsg. gehende Kollagenmenge muß berücksichtigt werden. Das gel. Kollagen wird durch N-Best. als Funktion der Konz. des Beizpräparates ermittelt, die Konz. bei der 20% Kollagen gel. sind, läßt sich interpolieren. Durch Blindverss. mit Beizpräparat, das durch Kochen während 15 Minuten inaktiviert worden ist, muß die Korrektur ermittelt werden, die für in Lsg. gegangenes Beizpräparat u. Kollagen anzubringen ist. Die Wrkg. von Beizpräparaten auf *Casein* wird entweder nach der Methode FULD-KROSS oder nach der Methode NORTHROP (Journ. Gen. Physiol. **5**. 263; C. **1923**. I. 782) ermittelt. Für die W. auf Fette wird eine von WILLSTÄTTER ausgearbeitete Methode benutzt. (Ztschr. physiol. Ch. **125**. 93; C. **1923**. I. 1133.) (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **21**. 2-Milwaukee, A. F. GALLUN & Sons Co.)

LOEWI

L. Balderston, *Das Vorbereiten des Leders für die Analyse*. Bericht über Erfahrungen, die mit verschiedenartig vorbereiteten Lederproben in der Analyse gemacht wurden. Die Art der Zerkleinerung der Lederproben beeinflusst merklich das Ergebnis der Analyse. Verschiedenartig zerkleinerte Proben gaben Differenzen in Feuchtigkeit, Fettgehalt, Gerbstoff- u. Nichtgerbstoffgehalt. Vf. benutzt seit drei Jahren mit gutem Erfolg eine direkt zu diesem Zwecke konstruierte Zerkleinerungsmaschine für Einzelheiten im Original. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **20**. 583—87. 1925.)

Chemisches Zentralblatt.

26 Band I.

Nr. 21.

26. Mai.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Edmund O. von Lippmann, *Weitere Mitteilungen zur Geschichte des Alkohols.* *Entgegen den irrthümlichen Behauptungen R. EISLERS („Orph.-Dionys. Mysterien —* *Denken in der christlichen Antike“, Leipzig 1925) über die Kenntniss der Antike* *er Dest. des A. entgegen, desgleichen den Behauptungen P. HAUPTS (Zirkular* *7 der „Johns Hopkins Philological Association, Juli 1916). Weder Ägypter,* *noch sonstige asiat. Völker kannten den A., bevor sie im Mittelalter von Europa* *von seiner Darst. empfielen. (Chem.-Ztg. 50. 237—39.)* JUNG.

Anton Skrabal, *Über den Säuerungsgrad und seine Bedeutung für das chemische* *Verhalten.* *Durch Vergleiche mit Beispielen aus dem Leben wird eine allgemein ver-* *stehende Darst. des Begriffs Säuerungsgrad entwickelt u. seine Bedeutung bei chem.* *Reaktionen erörtert. (Akad. d. Wissenschaften in Wien 1925. 21 Seiten. Sep.)* ENSZ.


A. V. Butler, *Koordination und Kovalenz.* *Vf. unterscheidet zwischen Ko-* *ordination (B. einer neuen Elektronengruppe aus gewissen Elektronen der koordi-* *nierten Moleküle außerhalb des Elektronensystems des Zentralions) u. Kovalenz* *„als von Elektronen zwischen 2 Atomen unter Vervollständigung schon existie-* *render Elektronengruppen). Die Bindung koordinierter Moleküle beruht nicht auf* *dem Bestreben des Zentralions, die Elektronenkonfiguration des im period. System* *des Edelgases zu erreichen. Die maximale Koordinationsvalenz (= Koordi-* *nationszahl) entspricht der Regel von SIDGWICK (Chemistry and Ind. 42. 901; C. 1924.* *Die effektive hängt von der Symmetrie des Kraftfeldes des Zentralions u. seiner* *Koordinationsvalenz ab. Vf. bespricht die Konst. der Anionen vom Typus XO_4 ($X = P,$* *As, Cr, Mn u. a.) (Trans. Faraday Soc. 21. 349—54. 1925. Swansea, Univ.)* KRÜ.

Berthoud, *Über die Additionsregel bei den gemischten photochemischen Reaktionen.* *Vf. berichtet über verschiedene Autoren betreffend die Regel, daß bei chem. Umsetzungen* *photochem. u. die therm. Rk. unabhängig voneinander sind u. sich in ihren Wrkgg.* *unterscheiden, werden erörtert. PLOTNIKOW (Ztschr. f. physik. Ch. 58. 214 [1907]) hat* *versucht, zwischen O_2 u. H_2 untersucht, ist dabei aber von der irrthümlichen Annahme* *ausgegangen, daß der photochem. Effekt proportional der Lichtintensität wächst. —* *Beispiele für die Gültigkeit der Regel werden die Unterss. von LUTHER u. FORBES* *(Americ. Chem. Soc. 31. 770 [1909]) über die Oxydation von Chinin durch* *Sauerstoff, sowie die Oxydation von K_2CO_3 durch Br_2 nach Verss. von BERTHOUD* *u. LENOT (Journ. de Chim. physique 21. 308; C. 1925. I. 468) angeführt. Fälle* *gegenseitiger Beeinflussung der photochem. u. therm. Rk. sind nach Verss. von* *REY u. BÖHM (Ztschr. f. physik. Ch. 90. 189. [1915]) die Photolyse von H_2O_2* *u. von $K_4[Fe(CN)_6]$ u. $K_3[Fe(CN)_6]$, die Oxydation von Jodoform durch O_2 u. a.* *erörtert. (Journ. de Chim. physique 23. 251—55. Neuchatel, Univ.)* R. SCHMIDT.


W. R. Wulf, *Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein angeregter Moleküle* *bei chemischen Reaktionen.* *Vf. zeigt, daß die bei der Zers. von Ozon entstehende* *Reaktion, wenn man sie vom Standpunkt der Quantentheorie betrachtet, die An-* *wesenheit von höher aktivierten Ozonmolekülen in einem höheren Energiezustand er-* *fordert. Die angeregte Wellenlänge entspricht nämlich einem höheren* *Energielevel als sich aus der Wärmetönung des Vorganges $2 O_3 = 3 O_2$ ergeben würde.* *(National Acad. Sc. Washington 12. 129—32. California, Inst. of Techn.)* HAASE.

I. 1.

E. Bekier und St. Trzeciak, *Die Auflösungsgeschwindigkeit von Kupfer in wäßriger Ferrichloridlösung*. Es wird angenommen, daß die Rk. sich in 2 Phasen abspielt:



(an der Oberfläche des Metalls) u. $\text{CuCl} + \text{FeCl}_3 \longrightarrow \text{CuCl}_2 + \text{FeCl}_2$ (im Innern d. Lsg.). Das entstandene CuCl_2 reagiert mit Cu nach Gleichung $\text{Cu} + \text{CuCl}_2 = 2\text{CuCl}$. Der ganze Vorgang stellt also eine komplexe Rk. in einem heterogenen System dar.



Wenn k die für beide Rkk. gleiche Geschwindigkeitskonstante ist, ergibt sich

$$k = v/O \cdot \Delta t \cdot \ln(2a - x_1)/(2a - x_2);$$

darin ist v das Volumen der Lsg. in ccm, O die Oberfläche der Cu-Platte in qcm, a Anfangskonz. von FeCl_3 , x_1 bzw. x_2 die Änderung der Konz. von FeCl_3 in einem bestimmten Zeitintervall. — Durch Titration mit KMnO_4 -Lsg. wird die Konz.-Abnahme des FeCl_3 während der Rk. bestimmt. Bei Ggw. von metall. Cu ergibt die Hälfte verbrauchten ccm die Konz.-Abnahme an CuCl. Um Oxydation durch Luft auszuschließen, wurde in einer CO_2 -Atmosphäre gearbeitet. Eine mit NH_4Cl u. Cu-Sp. versetzte FeCl_3 -Lsg. wurde im Verlaufe einer Woche fast völlig reduziert. Durch Zusatz von NH_4Cl bis zu einer bestimmten Grenzkonz. wird die Geschwindigkeitskonstante der Rk. erhöht. Mehr als 130 g NH_4Cl auf 1 l Lsg. haben keinen Einfluß. Durch dieses Salz werden die im Verlauf der Rk. entstehenden schwer l. Salze des B. leicht l. Komplexsalze in Lsg. gehalten. — Die Geschwindigkeitskonstante ist abhängig von dem Gehalt an FeCl_3 u. CuCl. — Durch Rühren wird die Rk. stark beschleunigt, ebenso durch Temp.-Erhöhung; der Temp.-Koeffizient von k ist 1,35 für FeCl_3 (Journ. de Chim. physique **23**. 242—50. Wilna, Univ.) R. SCHMIDT.

H. J. Prins, *Der Reduktionsmechanismus. V. Das System Blei, Nitromethan und Essigsäure*. (Vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas **42**. 942; C. **1924**. I. 2091.) Blei reduziert sich in einer Lsg. von Nitromethan in Essigsäure leichter als bei Ersatz von CH_3NO_2 durch Nitrobenzol. Die gemessene Reaktionsgeschwindigkeit ist tatsächlich eine solche im Gegensatz zum Nitrobenzol, wo eine Diffusionsgeschwindigkeit gemeint wurde. Die krit. Konz. kann aus der krit. Geschwindigkeit errechnet werden. Letztere ist der Maximalwert des pro Min. in Essigsäure von einer gegebenen Konz. gel. bei Ggw. einer reduzierbaren Verb., deren Oberfläche frei von absorbiertem Iodacetat sein muß. Die Aktivität der Nitrogruppe im Nitrobenzol ist 65-mal größer als die der Nitrogruppe im Nitromethan. Die Differenz muß dem positiv geladenen C-Atom des Benzolkerns zugeschrieben werden. Verbb. mit den positiv geladenen Gruppen: $\text{C}\equiv\text{C}$, $\text{C}=\text{C}$, CO_2H , COH , SO_3H u. NO_2 sind leichter reduzierbar, während die Gruppen unter sich gebunden sind, als wenn die Verb. eine von ihnen mit einer Methylgruppe zusammen enthalten. Die Red. der Nitrogruppe tritt wahrscheinlich zwischen dem aktivierten Wasserstoff der absorbierten Essigsäure u. dem N-Atom der Nitrogruppe ein, deren Aktivität von der Größe der positiven Ladung des N-Atoms abhängt. Die Red. des positiv geladenen C-Atoms ungesätt. Hydrocarbonsäuren findet nahezu ebenso leicht statt, wie die der $\text{C}=\text{O}$ -Gruppe in Ketonen u. Aldehyden. Ein sprechendes Beispiel für den reziproken Einfluß der positiven Gruppen ist die Red. des Diacetylendicarbonsäurediäthylesters (vgl. BAYER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **18**. 2270 [1885].) (Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**. 1051—55. 1925. Hilversum.) H. J. PRINS.

Jas. P. Andrews, *Elastizität und Schmelzpunkt*. Kritik der Arbeit von W. WIDMANN (S. 566.) (Physikal. Ztschr. **27**. 210—11. London. East London Coll.) ENSLEY.

W. Herz, *Volumkontraktionen bei der Bildung aliphatischer Verbindungen am Nullpunkt*. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **119**. 221; C. **1922**. I. 113.) An Hand einer größeren Zahl tabellar. zusammengestellter aliphat. Verbb. (gesätt. KW-stoffe, Säuren, Alkohole u. Ester) zeigt Vf., daß die Summe der Nullpunktsatomvolumen größer ist als das Nullpunktsmolvol. Innerhalb jeder homologen Reihe steigen die Kontrakti-

ebenso wie die Nullpunktsmolvoll. — mit wachsendem C-Gehalt. Dagegen zeigen prozentualen Kontraktionen keinen regelmäßigen Gang. (Ztschr. f. anorg. u. Ch. **152**. 99—100. Breslau, Univ.)

ULMANN.

John Arnold Cranston und **Alexander Young Livingstone**, *Vergleich einiger physikalischer Eigenschaften der Alkalicyanate und -azide*. Vff. bestimmen D. u. Brechungsindex verd. Lsgg. von KN_3 , NaN_3 , KCNO u. NaCNO in 50 Vol %ig. A., die u. der festen Salze, ihre Löslichkeit in sd. Bzl. u. in k. u. h. A., u. die elektr. Leitfähigkeit in Methylalkohol. Die Azide werden durch W. bei Ggw. von Platinschwarz oder B. von N_2 u. NH_3 zers. Für die D.D. der festen Salze bei 20° wird gefunden: NaN_3 : 2,056; KCNO : 2,056; NaN_3 : 1,846; NaCNO : 1,937. Die untersuchten Eigenschaften sind für NaN_3 u. NaCNO bzw. für KN_3 u. KCrO sehr ähnlich, woraus auf gleiche Elektronen- u. Atomgruppierung in den Cyanat- u. Azidionen geschlossen wird. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 501—03. Glasgow, Royal Techn. Coll.) KRÜ.

Robert Stumper, *Die Löslichkeit des Calciumcarbonats*. Es wurde die Löslichkeit des CaCO_3 in reinem, CO_2 -freiem W. durch Schütteln von CaCO_3 mit W. bei 17° Titration mit HCl u. Methylrot als Indikator bestimmt. Sie beträgt im Mittel 5 Verss. 14,47 mg pro l. In einer Lsg. von Na_2SO_4 steigt die Löslichkeit beträchtlich. Es tritt ein Gleichgewicht $\text{CaCO}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{CaSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ ein. Die Löslichkeit in CO_2 -haltigem W. hat BODLÄNDER eine Gleichung aufgestellt, die die Abhängigkeit vom Partialdruck der CO_2 (p.), darin aber eine falsche Dissoziationskonstante für die H_2CO_3 eingesetzt, so daß die errechneten Werte nicht mit bestimmten übereinstimmen. Wird der richtige Wert ($K_2 = 6,0 \cdot 10^{-11}$, anstatt 10^{-11}) eingesetzt, so stimmt die Formel. (Bull. Soc. Chim. Belgique **34**. 422—27. 5. Burbach.)

ENSZLIN.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

G. Aminoff, *Die Struktur von BeO*. (Vgl. S. 40.) Berichtigung eines Rechenfehlers u. Besprechung einer Arbeit von ZACHARIASEN. (Ztschr. f. Krystallogr. **63**. 1—76. Stockholm.)

ENSZLIN.

Ralph W. G. Wyckoff und **E. D. Crittenden**, *Herstellung und Krystalstruktur von Wüstit (FeO)*. (Ztschr. f. Krystallogr. **63**. 144—47. C. **1926**. I. 1760.) HAASE.

H. Ott, *Das Gitter des Carborunds (SiC)*. III. (III. Modifikation und das „amorphe Siliciumcarbid“.) Die Struktur der Modifikation III. (II. vgl. S. 826.) Das Lauebild eines Einkristalles der III. Modifikation senkrecht zu 0001 ergab dihexagonale Symmetrie; alle Splitter dieses Kristalls wurden erneut untersucht, um sicher zu sein, daß sie der III. Modifikation gehören. Die Struktur besitzt eine hexagonale Translationsperiode. Die Größe der hexagonalen (Bravaischen) Achsen sind $a = 3,095 \text{ \AA}$, d. h. der gleiche Wert wie in der I. u. II. Modifikation u. für $c = 10,09 \text{ \AA}$ (d. h. $\frac{2}{3}$ des Wertes der II. Modifikation). Auf das Elementarparallelepiped treffen vier Moleküle, deren Koordinaten lauten: C: 000, $00\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \frac{1}{4}$, $-\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{3}{4}$; Si: $00 p$, $00\frac{1}{2} + p$, $-\frac{1}{3} \frac{1}{4} + p$, $-\frac{1}{3} \frac{1}{3} \frac{3}{4} + p$; $p = \frac{3}{16}$. Die für die I. u. II. Modifikation charakteristische tetraed. Anordnung bleibt auch hier erhalten, u. zwar in gleicher Größe Tetraeder. Ebenso bestätigt sich auch hier die Annahme ungeladener Atome. Der kleinste Abstand C—Si beträgt 1,90 Å. Die Unters. des sogenannten „amorphen“ Siliciumcarbids, welches eine weichere Modifikation des Carbids darstellte u. bequem zerlegt werden konnte, wurde mit Hilfe von Debye-Scherrer-Aufnahmen vorgenommen. Pulveraufnahmen erfolgten mit Cu-K-Strahlung unter Vorschaltung eines Niveauelements, um die gesamte Cu-K β -Strahlung zu absorbieren. Die Auswertung der Aufnahmen ergab, daß das „amorphe“ Siliciumcarbid aus regellos orientierten Mikrokristallen von Diamanttyp besteht, vermischt mit einem geringen Prozentsatz von Kristallen der II. Modifikation. Zum Schluß gibt der Vf. noch an Hand von Modellen

eine Übersicht über alle vier Modifikationen. (Ztschr. f. Krystallogr. **63**. 1—München, Univ. Inst. f. theoret. Physik.)

HAASE

William Zachariasen, *Die Krystalstruktur der Telluride von Zink, Cadmi und Quecksilber. ZnTe, CdTe u. HgTe* kristallisieren im Zinkblendetypus. Die Gitterkonstanten u. die daraus berechneten Dichten sind:

	ZnTe	CdTe	HgTe
$a \text{ \AA}$	6,07	6,41	6,36
$D_{\text{ber.}}$	5,72	6,06	8,42

(Norsk geol. tidsskrift. **8**. 5 Seiten. 1925. Sep.)

BECKER

Tom. Barth und Gulbrand Lunde, *Beitrag zur Untersuchung der Struktur Mischkrystallen*. Vorl. Mitt. Es wurden röntgenograph. die Systeme TiBr-TiJ , AgBr-AgJ u. CuJ-AgJ untersucht. Die Mischkrystalle wurden aus Lsg. niedergeschlagen u. v. schieden hoch durch längere Zeit hindurch erhitzt. Das zweitemal wurden sie geschmolzen u. nachgekühlt, bzw. einer längeren Wärmebehandlung unterworfen. Bei System TiBr-TiJ treten bei geringer Konz. von TiJ Mischkrystalle vom kub. raumzentriertem Typus des TiBr auf, bei höherer Konz. des TiJ dagegen Mischkrystalle von rhomb. Typus des TiJ. Das Nebeneinanderbestehen der kub. u. rhomb. Mischkrystalle war etwas von der Wärmebehandlung abhängig. Beim System AgBr-AgJ treten ebenfalls die beiden Gittertypen der Komponenten nebeneinander auf. Bei einer geringen Konz. von AgJ waren die Mischkrystalle kub. flächenzentriert wie AgBr, bei einer hohen Konz. von AgJ zeigten sie nur dessen Diamanttypus. CuJ-AgJ bilden eine kontinuierliche Mischkrystallreihe, da beide im Diamanttypus kristallisieren. Die Gitterkonstanten der jeweiligen Mischkrystalle waren proportional ihrer Zusammensetzung. Sie zeigten eine geringe Abhängigkeit von der vorangegangenen Wärmebehandlung. (Norsk geol. Tidsskrift. **8**. 9 Seiten. 1925. Sep.)

BECKER

A. E. van Arkel, *Über den Bau von Mischkrystallen. W-Mo* bilden eine kontinuierliche Mischkrystallreihe. Die Gitterkonstante der Mischkrystalle ist proportional dem jeweiligen Mengenverhältnis. Die Gitterkonstanten des W u. Mo wurden neu bestimmt. Für W ergab sich $a = 3,157 \text{ \AA}$, für Mo $a = 3,140 \text{ \AA}$. (Physica **64—69**. Eindhoven, Philips Gloelampenfabrieken.)

BECKER

Leiv Harang, *Über die Krystalstruktur der Heuslerschen Legierungen*. Die ferromagnet. Heuslerschen Legierungen wurden nach der Debye-Scherrer methode untersucht, um einen etwaigen Zusammenhang zwischen der Krystalstruktur u. dem Ferromagnetismus festzustellen. Die *Al-Mn-Bronzen* zeigen 3 verschiedene ineinander gestellte Gitter, zwei kub. raumzentrierte mit der Kantenlänge $2,975 \text{ \AA}$ u. $2,903 \text{ \AA}$ u. ein kub. flächenzentriertes mit variabler Kantenlänge. Teils treten alle 3, teils zwei oder eins dieser Gitter auf. Die Intensitäten der Linien sind so, als ob es ein homogenes Gitter wäre. Das raumzentr. Gitter mit $2,975 \text{ \AA}$ besteht aus einem Al- u. einem Mn-Atom, während das zweite mit $2,903 \text{ \AA}$ aus 2 Cu-Atomen zu denken ist. Das Gitter mit variabler Kantenlänge ist schwer zu denken. (Physikal. Ztschr. **204—05**. Oslo, Physikal. Institut.)

ENSZLIN

William Bragg, *Moleküle mit langen Ketten*. Zusammenfassender Bericht über die Ergebnisse der Röntgenunterss. von MÜLLER u. SHEARER an aliphatischen Kohlenstoffketten. (Chemistry and Ind. **45**. 245—48.)

BECKER

Arthur J. Dempster, *Die freie Weglänge der Protonen im Helium*. Zum Helium aus Nature auf S. 1365 ist nachzutragen: Protonen wurden bis zu beschleunigten Potentialen von 14 V gefunden, jedoch mußte der Heliumdruck hierbei auf $0,03 \text{ mm}$ herabgesetzt werden. Durch Rechnung ergibt sich, daß die Protonen bei dem hohen Heliumdruck zumindest 120 Atome getroffen haben müssen, ohne daß ihre Richtung dadurch wesentlich beeinflußt werden konnte; bei dem niedrigen Druck waren es nur 7 Zusammenstöße. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 96—98. Chicago, Univ., Ryerson Phys. Lab.)

HAASE

W. H. Mc Curdy und **P. Dalton**, *Niedrig gespannte Entladungen in Helium*. (Z. S. 1938.) Im Anschluß an frühere Arbeiten eines der Vff., die in Hg-Dampf durchgeführt wurden, untersuchten die Vff. die Entladungserscheinungen in reinem Helium bei 0,01—2,9 mm Druck. Auf einem Glasgestell wurde eine Hitzdrahtkathode gebracht, sowie im Abstände von 10—12 cm eine Plattenanode. Das ganze Gestell wurde mit einem Magnet in einem Rohr von 4 cm Weite zu bewegen. Messungen der Spannungsteilung, der mittleren Energie u. der Elektronenkonz. wurden bei Drucken von 0,01, 0,5 u. 2,9 mm ausgeführt. Das angewendete Helium war trotz großer Vorkehrungen nicht abs. neonfrei zu erhalten. — Die mittlere Elektronenenergie erreichte ihr Minimum jenseits des negativen Glimmlichtes u. ihr Maximum jenseits des positiven Glimmlichtes. — Der Beginn des ersten leuchtenden Streifens. Die Elektronenkonz. besitzt ihr Maximum im negativen Glimmlicht u. ihr Minimum auf der Kathodenseite des ersten leuchtenden Streifens. In bezug auf die Elektronenkonz. stellten Vff. fest, daß diese innerhalb der Versuchsfehler in einem bestimmten Entladungsgebiet mit zunehmendem Druck zunimmt u. proportional der Stromdichte der Entladung bei einem bestimmten Druck ist. (Physical Review [2] **27**. 163—72. Princeton, Palmer Phys. Lab.) HAASE.

F. M. Penning, *Über die intermittierende Glimmentladung im Neon*. Ne zeigt mindestens 4 verschiedene geschichtete Entladungsformen. Eine davon ist intermittierend. Sie wurde von GEFFCKEN (Physikal. Ztschr. **26**. 241) untersucht, dessen Formel für die Ladungszeit nicht mit den Beobachtungen übereinstimmt. Die Differenz läßt sich durch Einführung der Maximal- u. Minimalspannung an der Röhre während einer Periode reduzieren. Der Rest der Differenz wird auf das Abklingen der Entladung zurückgeführt, deren Verlauf man durch Messungen mit verschiedenen Stromstärken beobachten kann. Die Leuchterscheinungen wurden mit dem rotierenden Spiegel u. dem Stroboskop untersucht. Der Übergang von der kontinuierlichen Entladung zur intermittierenden zeigt, daß die Kaufmannsche Formel nicht stimmt. (Physikal. Ztschr. **27**. 187—96. Eindhoven, Philips Glühlampenfabr. A.-G.) ENSZLIN.

Rajendralal De, *Über Uran X. Darstellung und quantitative Bestimmung*. Vf. schildert zunächst die bereits bekannten Arbeits- u. Meßmethoden. Bei der Herstellung von ca. 0,01 mm dicken U_3O_8 -Schichten (zum Zwecke annähernder Best. des UX₁-Gehaltes durch Messung der β -Strahlung) erzielt Vf. eine gleichmäßige Dicke, indem er das feine Pulver mit Chlf. in einem unten u. oben durch anschraubbare Kupferhülse abgeschlossenen (Korkdichtung) Kupferzylinder schüttelt, absetzen u. nach Entfernung des oberen Bleches das Chlf. verdampfen läßt. Sodann gibt Vf. eine Methode zur Abtrennung von UX aus größeren Mengen Uranylнитрат an, die eine Wiederholung der Abtrennung ohne vorangehende Reinigung des Uransalzes gestattet. Zu einer Lsg. von 5 g Uranylнитрат wird ein aus 5—20 mg $FeCl_3$ (durch Tropfen in lebhaft kochendes W.) dargestelltes $Fe(OH)_3$ -Sol gegeben. Nach Zusetzen einer gesätt. Lsg. von 1,5 g Na_2F_2 — Gesamtvolumen jetzt 75 cm — flockt $Fe(OH)_3$ ab, das bis 90% UX mitreißt. Nach einigen Std. wird abfiltriert u. gewaschen. Durch weiteres Zufügen von $Fe(OH)_3$ -Sol zum Filtrat kann die Abtrennung beliebig wiederholt werden. Anwendung von CH_3COONa an Stelle Na_2F_2 ist weniger günstig, $NaCl$, $NaNO_3$ u. Na_2SO_4 sind unbrauchbar. An dieses Ergebnis knüpft Vf. längere theoret. Überlegungen. (Journ. de Chim. physique **23**. 197—204. Journ. Science Assoc. Maharashtra's Coll. Vizianagaram **2**. 43—52. Paris, Radiuminst.) ERBACHER.

D. A. Mac Innes und **Theodore Shedlovsky**, *Die relativen Reflexionsintensitäten der Röntgenstrahlen an den Hauptatomebenen des Fluorits*. Vff. benutzen zu ihren Verss. den gewöhnlichen Bragg'schen App., den sie durch Hinzufügen eines abtastenden zweiten Krystalles u. einer zweiten Ionisationskammer mit den dazugehörigen Vorrichtungen modifizierten. Die zunehmende Ionisation wurde, während der Krystall durch einen Motor regelmäßig gedreht wurde, bei einer bestimmten Linie des Spektrums gemessen. Eine Korrektur für die Gesamtstrahlung wurde an-

gebracht. Die relativen Intensitäten der Pd- α - u. β -Linien wurden gemessen, wofür diese an den drei Hauptebenen des Calciumfluorids reflektiert wurden. In einer Tabelle sind die Linien, die Winkel u. die relativen Intensitäten der beiden Strahlen zusammengestellt. Quantitative Beziehungen zwischen den Intensitäten der einzelnen Linien konnten von den Vff. nicht gefunden werden. Als Grund hierfür wird die noch unbekannte Stärke der Absorption dieser Strahlen in den verschiedenen Ebenen der Krystalle angegeben. (Physical Review [2] **27**. 130—37. Massachusetts, Inst. Techn.) HAASE

William Duane, Über die Reflexion der eigenen charakteristischen Strahlung durch einen Krystall. Vf. führt die von ihm beobachteten Effekte bei der Anregung der Eigenstrahlung des Br in KBr-Krystallen u. die Reflexion der Br-Strahlung durch den KBr-Krystall auf Krystallfehler zurück. (Proc. National Acad. Sc. Washington **14**—43. Harvard-Univ.) BECKER

S. K. Allison, Notiz über die „selektive Reflexion“ von Röntgenstrahlen durch Krystalle von Kaliumbromid. (Vgl. vorst. Ref.) Besprechung der Literatur über selektive Reflexion von Röntgenstrahlen durch KBr. Früher beobachtete Effekte sind auf Krystallfehler zurückzuführen. Neuere Verss. ergaben keinerlei selektive Reflexion. (Proc. National Acad. Sc. Washington **12**. 143—44. Washington, Geophysical Lab.) BECKER

P. Job, Spektrographische Untersuchung der Trihalogensalze des Kaliums. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1932; C. **1925**. II. 1247.) Es wurden Absorptionsspektren von wss. Lsgg. von Kaliumhalogeniden mit Halogenen untersucht u. festgestellt, daß sich in wss. Lsgg. Verbb. bilden, deren Gleichgewichtskonstanten u. Affinität des Halogens gegen das Halogenion (A) in Calorien berechnet werden. Für KJ_3 ist $k = 1,25 \cdot 10^{-3}$ bei 16° u. $A_{16^\circ} = 3880$ cal, für KBr_3 ist $k = 3,5 \cdot 10^{-2}$ u. $A_{16^\circ} = 2030$ cal, für $KBrJ_2$ ist $k = 5,5 \cdot 10^{-2}$ u. $A_{16^\circ} = 1670$ cal, für $KClBr_2$ ist $k = 1,8 \cdot 10^{-1}$ u. $A_{16^\circ} = 990$ cal u. für $KClJ_2$ ist $k = 3 \cdot 10^{-1}$ u. $A_{16^\circ} = 695$ cal. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 632—34.) ENSZLIN

Robert Schwarz und Karl Dieffenbacher, Beitrag zur Photochemie des Chlor- und Rhodansilbers. (Vgl. SCHWARZ u. GROSS, Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **133**. 389; C. **1924**. I. 2090.) Vff. untersuchen die Wrkg. von Fremdstoffen auf die photochemische Zersetzlichkeit von $AgCl$. Es zeigt sich, daß die Kationen Pb, Cu, Tl u. Ba, wenn als Nitrate der Ag-Lsg. vor der Fällung mit NaCl zugegeben wurden, eine erhebliche Herabsetzung der Empfindlichkeit bewirken. Die Anionen Sulfat, Borat, Acetat, Tartrat u. Citrat haben keinen nennenswerten Einfluß. Weitere Verss. zeigten, daß H^+ auf den Cl- u. Neutralkörper nicht wirkt, wohl aber auf den Ag-Körper, es bewirkt eine kleine Erhöhung des Cl-Wertes ein. — Unterss. der Vff. an $AgCNS$ zeigen, daß es in photochem. Hinsicht mit den eigentlichen Ag-Halogeniden nicht verglichen werden kann, da der Schwellenwert der Primärschwärzung erst bei 400 000 M. K. liegt; $AgCl = 8350$ u. $AgBr = 2080$. — Zur Aufklärung der Solarisation des $AgCl$ im bindemittelfreien Zustande belichten Vff. eine kreisrunde, mit $AgBr$ bedeckte Scheibe sektorenweise mit wachsenden Intensitäten, wonach die Gesamtschicht auf einem Hydrochinonentwickler entwickelt wird. Es zeigt sich, daß beim Br-Körper bis zu $12 \cdot 10^3$ M. K. S. Intensität u. Schwärzung parallel gehen, bei $18,7 \cdot 10^3$ tritt ein deutlicher Rückgang der Schwärzung ein, der sich bei $75 \cdot 10^3$ noch wesentlich verstärkt. Die Schwärzung im letzten Falle ist mit einer bei 2080 M. K. S. erhaltenen vergleichbar. Der Ag-Körper verhält sich nur graduell etwas abweichend, bei 10^4 M. K. S. wird die Solarisation erst bei $33,3 \cdot 10^3$ M. K. S. erreicht. Abgesehen von diesem hohen Schwellenwert ist auch die Farbvertiefung beim Ag-Körper bedeutend größer. Gleiche Schwärzung wird erreicht, beim Br-Körper mit 8300, beim Ag-Körper mit 480 M. K. S. In bezug auf die Primärschwärzung ist kein solarisationsartiger Rückgang bei stärkerer

chtung zu beobachten, woraus Vff. schließen, daß die Solarisation an die Red. unersetzten AgBr durch den Entwickler gebunden ist, worauf auch einige Verss. weisen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **152**. 91—98. Freiburg i. B., Univ.) ULMANN.

J. Frenkel, *Zur Theorie des Faradayeffektes*. Der Faradayeffekt (magnet. Drehung Polarisationssebene) besteht aus einem diamagnet. u. paramagnet. Anteil nach Auffassung von LADENBURG. Das Rotationsvermögen einer Substanz ist nun mit ihren Atomen verbundenen Vektor charakterisiert, der vom Vf. als „magnet. Vektor“ bezeichnet wird. Diesen Vektor sucht Vf. nach der klassischen Theorie u. nach der Quantentheorie zu berechnen. Die beiden Resultate decken sich nicht; die Quantentheorie führt zu ungenauen Ergebnissen, wenn nicht das orientierende Magnetfeld berücksichtigt wird. Mit Hilfe der so erhaltenen Beziehungen berechnet Vf. die Größe des Faradayeffektes für die Atome des *Natriums* u. *Thalliums*. (Ztschr. f. Physik **36**. 215—50. Hamburg.) HANTKE.

H. W. B. Skinner, *Über die polarisierte Emission von Quecksilberlinien*. Die Polarisation der Linien eines Hg-Spektrums, das durch einen gerichteten Elektronenstrom aus einem mit Oxyd bedeckten Draht angeregt wurde, wird untersucht. Bei gelben Linien 5570 u. 5791 nimmt der Polarisationsgrad ab, wenn die Geschwindigkeit der Elektronen zunimmt. Bei 20 V beträgt die Polarisation etwa 20%, bei 70 V 100%. Das Licht, das direkt auf dem Wege der Elektronen emittiert wird, ist stärker polarisiert, als das außerhalb des gerichteten Elektronenstrahls. Das führt zu dem Schluß, daß die Polarisation durch den gerichteten Charakter des Elektronenstroms bedingt wird. Die Polarisation der gelben Linien wird durch ein Magnetfeld von 20 Gauß vollständig zum Elektronenstrom u. in der Beobachtungsrichtung auf Null reduziert, wenn nur auf die Hälfte, wenn das Feld sich senkrecht zum Strom u. zur Beobachtungsrichtung befindet. (Nature **117**. 418. Cambridge, CAVENDISH Labor.) JOSEPHY.

W. Perschke, *Zum Studium der Triboluminescenz*. ZnS kann sowohl phosphoreszieren wie tribolumineszierend auftreten. Die erste Eigenschaft wird durch Spuren von In, Ga u. Ge, die letztere durch Spuren von Mn oder Bi hervorgerufen, welche auch geringe Phosphorescenz bedingen. Es wurde aus reinem ZnSO₄ über das ZnO durch Einleiten von H₂S in der Hitze ZnS gefällt u. nach dem Auswaschen mit 105° getrocknet. Dieses Präparat zeigt keinerlei Triboluminescenz. Setzt man etwas Mn(NO₃)₂ zu u. erhitzt zur Rotglut, so tritt deutlich eine orange Triboluminescenz auf. Es wurde nun eine Serie mit dem Verhältnis ZnS:Mn = 1,0:0,5 bis 1,0:0,00165 untersucht. Diese zeigt bei 1:0,00165 ein Maximum der Triboluminescenz. Die Steigerung der Temp. u. die Geschwindigkeit der Abkühlung haben keinen Einfluß auf die Stärke. Durch direkte Fällung von ZnSO₄ mit H₂S erhält man ein ZnS, welches phosphoresciert u. auf Zusatz von Mn-Salzen keine Triboluminescenz zeigt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 630—32.) ENSZLIN.

Paul Pauthenier, *Photographische Messungen der Elektrostriktion bei Tetrachlorkohlenstoff*. (Vgl. BRUHAT u. PAUTHENIER, (Journ. de Physique et le Radium [6] **6**. 1; **1925**. I. 2146.) Kurze Beschreibung der benutzten Anordnung. Vf. untersuchte die Elektrostriktion. Die Auswertung der erhaltenen photograph. Aufnahmen führt zu dem Ergebnis, daß die Elektrostriktion als adiabatisch aufzufassen ist. Durch dieses Resultat wird die Theorie im Falle des CCl₄ bestätigt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 121—123.) K. WOLF.

B. Anorganische Chemie.

C. Bonnier, *Beitrag zum Studium der Ammoniumcarbonate*. Mittels Dreiecksgammagramms wird die Zus. der verschiedenen bekannten Ammoniumcarbonate veranschaulicht; diese sind: Bicarbonat NH₄HCO₃, neutrales Carbonat (NH₄)₂CO₃, Sesqui-

carbonat (2 Bicarbonat, 1 neutr. Carbonat) $3\text{CO}_2 \cdot 4\text{NH}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$, Carban $\text{CO}_2 \cdot \text{NH}_2 \cdot \text{NH}_4$ u. Handelscarbonat (Bicarbonat-Carbaminat) $2\text{CO}_2 \cdot 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Die bei der Zers. des Bicarbonats durch Erwärmen sich einstellenden Dissoziationsspannungen wurden gemessen. Bei $25,4^\circ$ beträgt der Druck 5,9, bei $59,25^\circ$ 81,5 cm. Die Gleichgewichtseinstellung dauert bei 34° 2 Tage, bei $25,4^\circ$ 6 Tage. An der verdampft das Bicarbonat ohne seine Zus. zu ändern, d. h. die Partialdrucke der Dissoziationsprodd. NH_3 , CO_2 u. H_2O sind gleich. Oberhalb 33° beträgt aber die Dissoziationsspannung mehr als das 3-fache von der Tension des W. u. mit steigender Temp. kondensiert sich W. aus den Dissoziationsgasen. Die Anwendung des M. W. G. auf die Gleichgewichtsverhältnisse bei der Zers. des Ammoniumbicarbonats ergibt für den Druck als Funktion der Temp. die Formel $\log P = 27,5 - 7680/T$. — Im 2. Teil der Arbeit wird der Einfluß der Konz., des relativen Volumens der Gasphase u. der Temp. auf die Dampfspannungen von wss. Ammoniumbicarbonatlsgg. untersucht. Die erhaltenen Kurven ergeben eine Löslichkeit von 22,2 g bei 20° , von 25,6 g bei 25° u. 28,2 g bei 30° in 100 g W. u. zeigen, daß W. nicht als bloßes Lösungsm., sondern auch als Reaktionspartner wirkt. — Die Unters. des Einflusses von überschüssigem NH_3 auf die Temp. der Bicarbonatlsgg. ergab einen steilen Abfall der Tensionskurve bei Zusatz einer kleinen Menge NH_3 . In einer Lsg. von 1 g Bicarbonat in 5 g W. verursachte ein Zusatz von 0,215 g NH_3 einen äußerst starken Druckabfall auf 3,3 cm, bei weiterem Zusatz von NH_3 stieg der Druck wieder. Diese NH_3 -Menge entspricht derjenigen, die zur Überführung von Bicarbonat in neutrales Carbonat erforderlich ist. — Die gewonnenen Resultate werden mittelst der Gesetze der chem. Kinetik erörtert. (Ann. de Chimie [10] 5. 37—94.) R. SCHMIDT

A. P. Thompson, W. B. Holton und H. C. Kremers, *Die Darstellung und Eigenschaften von metallischem Yttrium. Beobachtungen an den seltenen Erden*. X (XXI. vgl. WIERDA u. KREMERS, C. 1925. II. 2253.) Das Metall wurde durch Schmelzelektrolyse von YCl_3 unter Zusatz von NaCl gewonnen. Die elektrol. Zelle bestand aus Graphit, hatte 5 cm inneren Durchmesser u. 7,5 cm Tiefe. Die Wände waren mit Mo-, der Boden mit W-Blech ausgelegt, um Carbidbildung zu verhindern. Die Zellen fungierten als Kathoden, als Anoden Graphitplatten mit 2,5 cm Durchmesser. Die Stromstärke betrug 10—150 Amp., die Spannung 5—10 Volt. Das Metall wurde als Pulver abgeschieden; um die Oxydation durch Luft zu verhindern wurden während der Hauptzeit der Elektrolyse niedrige zuletzt hohe Temp. angewendet, um das Metall zusammenzuschmelzen. — Die Entzündungstemp. in Luft ist 470° , in Cl_2 200° ; das spezif. Gewicht ist 4,57, F. $1450\text{—}1500^\circ$. Von alkal. Lsgg. wird es angegriffen, dagegen löst es sich schnell in verd. Mineralsäuren. (Trans. Amer. Electrochem. Soc. 49. 10 Seiten. Sep. Urbana, Univ. of Illinois.) R. SCHMIDT



R. Weinland und Anton Höhn, *Über Verbindungen mit Ferriacetato-(propionat-)komplexen*. Alle durch Einw. von Eg. auf FeCl_3 entstehenden Ferriacetat- und Ferripropionatkomplexe sind als Tetrachloroferriate des Hexaacetatotriferrikations anzusehen. Es gelingt auch ein früher (WEINLAND, KESSLER u. BAYERL, Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. 209; C. 1924. I. 1015) als Hexaacetatotriferritrichlorid gedeutetes Salz durch gelinde Erwärmen mit A. in das Hexaacetatodihydroxotriferrittetrachloroferriat überzuführen, was nachgewiesen ist, daß es ein Hexaacetatotriferriidiacetat-tetrachloroferriat darstellt.

analyt. Werte entsprechen der Formel $[\text{Fe}_3 \text{ac}_6]_{(\text{FeCl}_4)}^{\text{ac}_2} + 4\text{H}_2\text{O}$, doch unterscheidet es sich von dem früher gefundenen Salz mit 5 H_2O durch größere Widerstandsfähigkeit gegen A. Das l. c. als $[\text{Fe}_3 \text{ac}_6]\text{Cl}_3 + 1\text{CH}_3\text{COOH} + 5\text{H}_2\text{O}$ formulierte Salz ist vermutlich auch ein Tetrachloroferriat: $[\text{Fe}_3 \text{ac}_6]_{(\text{FeCl}_4)}^{\text{ac}_2} + 1,5 \text{ac} + 7\text{H}_2\text{O}$.

Pentaacetatodihydroxotriferriidinitrat erwies sich als ein Gemisch von gewöhnlichem Hexaacetatotriferriidinitrat u. wenig NaNO_3 . Komplexe, welche aus den Lsgg. der gewöhnlichen Sesquiacetates auskrystallisieren, sind nicht, wie früher (l. c.) angegeben,

verb. des Hexaacetatotriferrinitrates mit Nitraten des vermeintlichen Pentaacetatotriferrinitrates, sondern sämtlich *Hexaacetatodihydroxotriferrinitrat*.

Bei Einw. von HBr auf Ferrihydroxyd bildet sich *Ferriferribromid*, $\text{Fe}_3\text{Br}_8 + \text{I}_2\text{O}$ oder $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{OH})_6][\text{Fe}^{\text{III}}\text{Br}_4]_2$, fast schwarze Krystalle mit grünem Oberflächenanflug, hygroskop., Lsg. in W. tiefrot, l. in A. Mit Eg. zum Sieden erhitzt: *Hexaacetatotetratetrabromoferritbiacetat* (I.), tiefrote Krystalle; mit Natriumacetatlsg. beim Eindunsten: *Hexaacetatodihydroxotriferribromid* (II.), braunrote Krystalle, l. in W. A., verwittert an der Luft. Lsgg. von Ferriperchlorat u. Natriumacetat geben beim Eindunsten *Hexaacetatodihydroxotriferriperchlorat* (III.), granatrote Krystalle,



u. Eg. u. W. — Durch Zusatz von Oxalsäure bzw. K-Oxalat zu einer Lsg. des gewöhnlichen Ferriacetats wird stets das gleiche *Ferriacetatoxalat* der Zus. $\text{Fe}_4\text{ac}_8(\text{C}_2\text{O}_4)(\text{OH})_2 + \text{I}_2\text{O}$ erhalten, braunrote Krystalle u. Mk., wl. in W., A. u. Pyridin. — Alkalirhodanid mit Ferriacetat ein *Ferriacetatorhodanid*, dessen Unters. auf eine Doppelverb. (IV.) hindeutet; dunkelbraunrote Krystallaggregate, l. in A. u. W. Läßt man auf diese Verb. Pyridin einwirken, so wird *Hexaacetatodihydroxotripyridintriferrirhodanid* (V.) erhalten, gelbgrüne Täfelchen u. Mk.; in W. langsam l., daraus nicht umkrystallisierbar. *Hexapropionatodihydroxotriferrichlorid* (VI.), durch tropfenweise Zugabe von tripropionatmonohydratlsg. zu FeCl_3 -Lsg.; rote glänzende Blättchen, l. in W. A. Das von BENRATH (Journ. f. prakt. Ch. [2] **72**, 228; C. **1905**, II. 1231) erhaltene tripropionat der stöchiometr. Zus. $\text{Fe} \cdot \text{prop}_2 \cdot \text{Cl}$ muß analog den Hexaacetatotriplettkomplexen gebaut sein. (VII.). (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **152**, 1—15. Würzburg, 1924.)

ULMANN.

A. Bernardi und G. Piacentini, *Neue Verbindungen von Kobalt mit Nitrophenolen*. — Durch Einw. alkoh. Lsgg. von *Nitrophenolen* auf reines, frisch gefälltes $\text{Co}(\text{OH})_2$ entstehen Vff. gut krystallisierte, krystallwasserfreie Verbb. im Gegensatz zu den bisher bekannten Metallverbb. der Nitrophenole, die fast alle Krystallwasser enthalten. Das $\text{Co}(\text{OH})_2$ wurde aus $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ durch Fällung mit unzureichender Menge NaOH hergestellt, sorgfältigst ausgewaschen u. für jede Synthese in frisch gefälltem, noch feuchtem Zustande verwandt. o-Mono- u. 2,4,6-Trinitrophenol geben neutrale Salze mit Co. *Co-o-nitrophenolat*, $\text{Co}[\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)\text{O}]_2$, aus o-Nitrophenol in Lsg. von CH_3OH , dunkel granatrote Tafeln, die durch Waschen mit CH_3OH gereinigt werden, in der Kälte wl. in W., unl. in CH_3OH , A., Ä.;

der Wärme l. in W., wl. in A., unl. in Ä. — Bas. *Co-2,4-dinitrophenolat*, $[\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2\text{O}]_2 \cdot \text{Co}[\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2\text{O} \cdot \text{OH}] \cdot 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, mit alkoh. Lsg. von 2,4-Dinitrophenol. Reguläre orangerote Prismen aus A., l. in h. W., h. A. Das Salz enthält Moll. Krystallalkohol, ist bas. u. hat nach Annahme des Vffs. die nebenstehende Formel eines mehrkernigen Komplexsalzes. Bei mehrstd. Erhitzen auf 100° verliert es den Krystallalkohol. — *Co-2,4,6-trinitrophenolat*, $\text{Co}(\text{C}_6\text{H}_2\text{N}_3\text{O}_7)_2$ mit alkoh. Lsg. von Pikrinsäure dunkelrote Prismen, wl. in k. W., l. in A. In der Wärme l. in W., ll. in Ä. Alle drei Salze werden durch Mineralsäuren zers., mit H_2S oder $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ wird S niedergeschlagen. Die Salze haben keinen F., sondern verpuffen beim Erhitzen. Gazz. chim. ital. **56**, 126—30. Bologna, Univ.)

LEHMANN.

Clément Duval, *Darstellung des cis-Dinitrotetramminnitrils und einiger and Körper, welche sich davon ableiten.* Beim 5-std. Durchleiten von Luft durch eine Lsg., welche nach dem Eindampfen unter zeitweiligem Zusatz von festem $(\text{NH}_4)\text{H}$ u. Erkalten, mit einem Überschuß von A. 2 Körper niederschlägt, von denen n dem Waschen mit A. u. Ä. u. nach dem Trocknen der eine in W. l. ist. Der Körper ist das *Kobalttrinitrotetrammin* $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$. Der l. Körper wird neuem mit A. gefällt u. gewaschen. Es ist das *cis-Dinitrotetramminkobaltini* $[\text{Co}(\text{NO}_2)_2(\text{NH}_3)_4]\text{NO}_2$. Dasselbe hydrolysiert leicht u. gibt das Dihydratotetram H_2SO_4 entfernt das gesamte Nitrit, während bei der trans-Verb. nur das ionogene l ersetzt wird. Die Nitrate u. Chloride sind ident. mit dem entsprechenden cis-Ver von JÖRGENSEN. Mit konz. HCl erhält man bei -10° das *cis-Dichlorotetramm kobaltichlorid*, $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}$, mit theoret. Ausbeute. Mit Alkalinitrit gibt es h. wss. Lsg. einen Nd. von *Nitropentamminkobaltinitrit*. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 636—37.)

ENZLIN

Alfred Stock, *Die Gefährlichkeit des Quecksilberdampfes.* Vf. macht auf die fahren des Arbeitens mit metall. Hg aufmerksam u. schildert die Krankhe erscheinungen bei einer schleichenden Hg -Vergiftung. Nach den Verss. des gibt Silberamalgam bei Mundtemp. Hg ab; Vf. hält deshalb Zahnfüllungen mit Amalg für gesundheitsschädlich. Wahrscheinlich waren FARADAY u. PASCAL (Mitteil von E. JAENSCH) Opfer schleichender Hg -Vergiftungen. (Ztschr. f. angew. Ch. 461—66. Berlin-Dahlem.)

JUN

V. M. Goldschmidt, *Über das krystallochemische und geochemische Verhalten Germaniums.* Wie nach den bekannten krystallochem. Beziehungen zwischen menten der Hauptreihen u. der zugehörigen Nebenreihen des period. Systems erwarten ist, zeigt das *Ge* nahe krystallochem. Verwandtschaft zum *Si*. Die gewö liche, wasserlösliche Modifikation des GeO_2 erwies sich bei krystallograph. u. röntg graph. Unterss. stets als trigonale oder pseudotrigonale Krystallart, welche in be auf Gitterdimensionen u. Atomanordnung dem trigonal trapezoe dr. *Quarz* am näch verwandt ist. Die krystallochem. Analogie zwischen GeO_2 u. SiO_2 kommt auch physikal. u. chem. Verh. des GeO_2 zum Ausdruck (vgl. DENNIS u. LAUBENGAY Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1945; C. 1925. II. 2290). — Auf Grund der bisher Erfahrungen über die Krystallstruktur der Dioxyde vermutet Vf., daß *Ge* in Natur nicht immer chalkophil auftritt, sondern daß es auch als Vertreter von *S* oxyd. Verbb. vorkommt. Es wäre möglich, daß ein sehr wesentlicher Teil des in der Erde auf diese Weise sozusagen im *Si* versteckt ist, u. daß die bisher angenomm außerordentliche Seltenheit dieses Elements nur eine scheinbare sei. Für solch borgen es Auftreten eines relativ seltenen Elements in einem relativ häufigen hat die Bezeichnung „Camouflage“ (Tarnung) vorgeschlagen. Camouflage oder *Tarn* tritt ein, wenn Expansion u. Kontraktion der Elektronenhüllen gerade zur K pensation der Gitterunterschiede führen, z. B. *Hf* in *Zr*, *Ga* in *Al*. *Ge* müßt pegmatit. Mineralien, basalt. Zeolithen, Chalcedon u. Opal u. in Quellwässern zu fin sein. (Naturwissenschaften 14. 295—97. Oslo.)

JOSEPH

D. Organische Chemie.

Friedrich Richter, *Zur Nomenklatur der Salze organischer Basen.* Der wendungsbereich der von STECHE (vgl. S. 1753) vorgeschlagenen Nomenklatur d Anhängung der Silbe „ium“ für Bezeichnung der Salze N-haltiger organ. Basen stark eingeschränkt. Sie ist nicht anwendbar auf N-haltige Verbb., deren Na nicht auf -in ausgeht (Aminophenol usw.); solche Salze als -phenoliumchloride u zu bezeichnen, ist unzweckmäßig; gegen Namen wie salzsaures Aminophenol

dsätzlich nichts einzuwenden. — Bezeichnungen wie Chininmethyliumbromid abzulehnen, da gerade die Gruppe zum Träger der Endung -ium gemacht wird, las komplexbildende Zentralatom nicht enthält; einwandfrei ist die Bezeichnung ethylchininiumbromid. — Zu vermeiden sind -inium-Namen, wo bereits -onium- en vorhanden sind oder ihre B. aus Analogiegründen möglich u. erwünscht er- nt. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 377. Berlin.)

BUSCH.

Ch. Courtot und **J. Bonnet**, *Beitrag zur Untersuchung des π der Sulfonierung*. der Sulfonierung mit H_2SO_4 wird infolge des gebildeten H_2O ein Punkt erreicht, die Säure gerade nicht mehr zu weiterer Sulfonierung imstande ist. Den $\%$ - ult dieser verd. Säure an SO_3 hat REGNAULT (1837) als π der Sulfonierung be- met. Ist x die zur Monosulfonierung eines organ. Mol. nötige Säure u. α ihr ehalt an SO_3 , so ergibt sich:

$$\frac{x \cdot \alpha}{100} = 80 + (x - 80) \frac{\pi}{100}; \text{ daraus } x = \frac{80(100 - \pi)}{\alpha - \pi}.$$

OT (Chimie et Industrie **2**. 879; C. **1920**. I. 565) hat sich vom π unabhängig icht, indem er Benzoldampf durch H_2SO_4 geleitet hat, wobei ersterer das W. ortreibt. Dies Verf. eignet sich jedoch nur für flüchtige Substanzen. Man kann π aber auch dadurch ausschalten, daß man mit reinem SO_3 (d. h. $\alpha = 100$) itet. Dies gelingt, wenn man die Substanz in Chlf. löst u. bei $0-10^\circ$ allmählich u 1 Mol. SO_3 zugibt. *Bzl.*, *Toluol*, *Chlorbenzol* u. *Naphthalin* geben so vorzügliche euten an Monosulfonsäuren. Die Disulfonierung verläuft indessen komplizierter. n man nach B. der *Naphthalinmonosulfonsäure* mehr SO_3 (Vff. haben im ganzen ll. angewendet) einträgt, so bildet sich ein weißer Nd. Dieser wird unter Luft- luß abgesaugt, mit Chlf. gewaschen, mit Eis zerlegt, Lsg. mit BaCO_3 bis zur ralen Rk. versetzt. Das gebildete BaSO_4 entspricht etwas mehr als 1 Mol. SO_3 , Filtrat liefert *Naphthalin-1,5-disulfonsäure* mit 50% Ausbeute. Das Chlf.- at enthält nur sehr wenig SO_3 , hauptsächlich *Naphthalinmonosulfonsäure*. Der der Sulfonierung entstehende Nd. besteht also aus 1 Mol. *Naphthalindisulfon-* e u. 2 Moll. SO_3 . Er wirkt langsam sulfonierend, denn nach 24-std. Stehen des rünglichen Gemisches erreicht die Ausbeute an Disulfonsäure ca. 65%. — Ähn- e Komplexe bildet *Anthrachinon*, sowohl mit 1 als mit 2 SO_3 . — Sulfonierung der theoret. Menge SO_3 ist nur dann möglich, wenn das π der Sulfonierung einzig gebildetem H_2O abhängt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 855—57.) LB.

L. Leers, *Über die Darstellung einiger neuer Dialkyläthinyldicarbinole*. Dieselbe ge nach dem Verf. von LOCQUIN u. SUNG (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. C. **1924**. II. 1185 u. vorhergehende Arbeiten). Die Verbb. besitzen die allgemeine mel $\text{R}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{OH})\cdot\text{C}:\text{CH}$. — *Methyl-i-propyläthinyldicarbinol*, $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}$, Kp. 133° , d_4^{20} 0,876, $n_D^{15} = 1,459$. *Allophanat*, $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2$, Nadeln aus A., F. 144° . — *Methyl- äthinyldicarbinol*, $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$, Kp. 12 63° , D_4^{20} 0,860, $n_D^{14} = 1,439$. *Allophanat*, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}_2$, Nadeln aus A., F. $126-127^\circ$. — *Methyl-i-butyläthinyldicarbinol*, $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$, d_{16}^{20} 1,480, Kp. 10 $51-52^\circ$, D_4^{12} 0,859, $n_D^{12} = 1,438$. *Allophanat*, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}_2$, amorphes er aus PAe.-A., F. 114° . — *Methyl-n-amyläthinyldicarbinol*, $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}$, Kp. 10 75° , d_{10}^{20} 0,863, $n_D^{10} = 1,443$. *Allophanat*, $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_3\text{N}_2$, Nadeln aus PAe.-A., F. 120° . ll. Soc. Chim. de France [4] **39**. 421—23.)

LINDENBAUM.

L. Leers, *Über einige neue α -Oxyketone*. Diese wurden aus den im vorst. Ref. chriebenen Dialkyläthinyldicarbinolen (in derselben Reihenfolge) mit saurer HgSO_4 nach dem verbesserten Verf. von LOCQUIN u. SUNG (Bull. Soc. Chim. de France **35**. 604; C. **1924**. II. 1185) dargestellt u. besitzen die allgemeine Formel $\text{R}(\text{CH}_3)\text{H}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_3$. — *2,3-Dimethylpentanol-(3)-on-(4)*, $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2$, Kp. $163-165^\circ$, Kp. 16 58° , d_4^{20} 0,951. *Semicarbazon*, $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_3$, Krystalle aus A., F. 134° . — *3-Methylheptanol-n-(2)*, $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$, Kp. 10 74° , D_4^{20} 0,931. *Semicarbazon*, $\text{C}_9\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}_3$, körnige Krystalle A.-Lg., F. 152° . — *2,4-Dimethylhexanol-(4)-on-(5)*, $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$, Kp. 12 $69-70^\circ$,

D.₄ 0,930. *Semicarbazon*, $C_9H_{13}O_2N_3$, Krystalle aus A., F. 154°. — *3-Methylhexan-(3)-on-(2)*, $C_9H_{18}O_2$, Kp.₉ 85–86°, D.₄¹¹ 0,914. *Semicarbazon*, $C_{10}H_{21}O_2N_3$, Na aus A.-Lg., F. 139°. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 423–24.) LINDENBAUM

L. Leers, *Über einige neue Pinakone*. Dieselben wurden aus dem 3-Methylhexan-(3)-on-(2) (vgl. LOCQUIN u. SUNG, Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 605; C. 1912. II. 1185) u. den im vorst. Ref. beschriebenen α -Oxyketonen (in derselben Reihenfolge mit CH_3MgJ nach dem Verf. von LOCQUIN u. SUNG (C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 682; C. 1923. III. 901) dargestellt u. besitzen die allgemeine Formel $R(C(OH) \cdot C(OH)(CH_3)_2$. Man muß während der Mischung der Komponenten rühren u. die Temp. unter 0° halten, darauf 6–8 Stdn. gelinde kochen, schließlich mit verd. Essigsäure zerlegen. Man erreicht so Ausbeuten bis zu 85%. — *Trimethyl-n-propylglykol*, $C_8H_{18}O_2$, Kp.₁₁ 96–97°, F. ca. 38°. — *Trimethyl-i-propylglykol*, $C_8H_{18}O_2$, Kp.₁₄ 93–96°, F. ca. 39°. — *Trimethyl-n-butylglykol*, $C_9H_{20}O_2$, Kp.₉ 103°, F. ca. 28°. — *Trimethyl-i-butylglykol*, $C_9H_{20}O_2$, Kp.₁₃ 102°. — *Trimethyl-n-amylglykol*, $C_{10}H_{22}O_2$, Kp.₉ 115°, F. ca. 29–30°. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 424–26.) LINDENBAUM

R. Locquin und **L. Leers**, *Über die Dehydratisierung einiger neuer Pinakone*. (Theoret. Teil.) (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 426–32. — C. 1924. II. 614.)

R. Locquin und **L. Leers**, *Über die Dehydratisierung einiger Pinakone und neue Pinakoline*. (Experimenteller Teil.) (Vgl. vorst. Ref.) Kurze Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 1924. II. 614. 1173. Nachzutragen ist: Die bei der Dehydratation des 4,4-Dimethylhexanons-(5) in geringer Menge erhaltene Oxysäure $C_8H_{16}O_3$ ist *Dimethylpropylmilchsäure*, $(C_3H_7)(CH_3)_2C \cdot CH(OH) \cdot CO_2H$. Über einen analogen Fall vgl. NYBERGH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 1963; C. 1922. III. 711). — 2,2-Dimethylhexanon-(3) wird von NaOBr zur *Pivalinsäure* oxydiert. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 433–38.) LINDENBAUM

Charles Prévost, *Über die katalytische Dehydratisierung der Vinylalkylcarbinole*. LESPIEAU u. PRÉVOST (Bull. Soc. Chim. de France [4] **37**. 710; C. 1925. II. 1185) erhielten bei der Dehydratisierung des Methylvinylcarbinols mittels Al_2O_3 [im Ref. irrtümlich Al; d. Ref.] nur ca. 25% Erythren. Vf. hat die Verbesserung des Verfahrens am Äthylvinylcarbinol ausgearbeitet. Das Al_2O_3 wurde durch Einw. von CO_2 in ein Aluminat hergestellt; Rk.-Temp. 350–365°; Schnelligkeit 60 g in der Stunde. Das Al_2O_3 öfters erneuern. Ausbeute an *Pentadien-(1,3)* 60–70%. Außerdem erhalten 25–35% Alkoholgemisch, Kp. 112–118°; einige Tropfen Butenylcarbinol zugeben, Kp. 138–139° (vgl. DELABY, C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 1899; C. 1924. I. 1185). ca. 5% höher sd. Prodd. — Obiges Pentadien besaß Kp. 42°, D.₄¹⁸ 0,683, $n_D^{18} = 1,41$ (Exaltation 1,25). Addiert schnell 2 Br bei –20° u. weitere 2 Br langsam bei –10°. Folgende Derivv. wurden dargestellt: Zwei *Dibromide*, Kpp.₁₁ 70 u. 88°. — Das zweite Dibromid entsprechende *Glykoldiacetat*, Kp.₁₁ 112,5°. — Das bekannte *Tetrabromid*, F. 114,5°, u. ein fl. *Tetrabromid*, Kp.₃ 121–125°, wahrscheinlich ein Gemisch. Dieselben liefern mit 2 Moll. alkoh. NaOH *2,3-Dibrompentadien-(1,3)*, Kp.₁₂ 60–62°, mit überschüssiger konz. alkoh. KOH *Methyldiacetylen*, $CH_3 \cdot C_4H$ (als Ag-Verb. analysiert). — *Propylvinylcarbinol* verhält sich bei der Dehydratisierung ähnlich, es entsteht ein Gemisch von Erythrenhomologen. Isoliert wurden die Fraktionen Kpp. 77–78 u. 80,5–82°. Erstere besteht aus *Hexadien-(1,3)* u. -(2,4); denn das Gemisch der Tetrabromide gibt zwei Diacetylene, ein echtes, wahrscheinlich *Äthyldiacetylen*, $C_2H_5 \cdot C_4H$, Kp. ca. 80°, u. das bekannte *Dimethyldiacetylen*, $CH_3 \cdot C_4H$, F. 65°, Kp. 129–130°. Die zweite Fraktion ist fast reines Hexadien-(2,4) (*Tetrabromid*, F. 183°; *Dibromid*, Kp.₁₃ 94°). Außerdem entstehen Spuren eines Erythrenhomologen. — *Butylvinylcarbinol* liefert ein KW-stoffgemisch vom Kp. 100–105°. Die Fraktion 104–105° ist *Heptadien-(2,4)*. Die aus dem Gemisch erhaltenen *Tetrabromide* geben sehr wenig *Propyldiacetylen*, $C_3H_7 \cdot C_4H$ (als Ag-Verb. analysiert).

s mehr *Methyläthylldiacetylen*, $C_2H_5 \cdot C_4 \cdot CH_3$, Kp. ca. 143° . (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 853—55.)


LINDENBAUM.

Raymond Delaby und **Georges Morel**, *Über die Einwirkung von Ameisensäure auf Methyläthylglycerine*. (Vgl. DELABY, C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 1898; **184**. I. 32.) Das l. c. für Äthylglycerin beschriebene Verf. wurde auf *Dimethyläthylglycerin* übertragen. Nach dem l. c. für die Abspaltung von H_2O u. gegebenen Schema müssen die beiden Monoformine des Dimethylglycerins das *enylmethylcarbinol*, $CH_3 \cdot CH : CH \cdot CH(OH) \cdot CH_3$, u. die beiden Diformine das *diat* dieses Carbinols liefern. Es hat sich gezeigt, daß sich außer *Triformin*, welches bei der therm. Zers. unverändert bleibt, wesentlich *Diformin* u. nur Spuren *Moniformin* bilden. — Aus den je drei Mono- u. Diforminen des a. gebauten Methylglycerins können *Propenyläthylcarbinol*, $CH_3 \cdot CH : CH \cdot CH(OH) \cdot C_2H_5$, u. *Butenyläthylcarbinol*, $CH_3 \cdot CH(OH) \cdot CH : CH \cdot C_2H_5$, u. ihre Formiate entstehen. Der Versuch bestätigt, aber die Materialmengen waren bisher zu gering, um eine scharfe Trennung der beiden Carbinole durchführen zu können.

Versuche. *Dimethylglycerin* gibt mit HCO_2H ein Gemisch von Kp.₁₉ $151,5-163^\circ$. Dieses wird langsam bis auf 200° erhitzt. Der Rückstand erstarrt beim Abkühlen u. besteht aus *Dimethylglycerintriformin*, $C_8H_{12}O_6$, Kp.₁₅ $130-134^\circ$, seidige Masse, schmilzt aus PAe., F. 85° . Das Destillat besitzt nach dem Trocknen die VZ. 34,40,3 für $CH_3 \cdot CH : CH \cdot CH(O \cdot COH) \cdot CH_3$ u. liefert mit sd. 50%ig. KOH *Propenylmethylcarbinol*, Kp. $120-122^\circ$; *Allophanat*, F. $158-159^\circ$. — *Methyläthylglycerin* mit HCO_2H ein Gemisch vom Kp.₁₈ $150-165^\circ$ u. dieses bei der therm. Zers. (bis 300°) als Rückstand *Methyläthylglycerintriformin*, $C_9H_{14}O_6$, Nadeln aus PAe., F. $94,5^\circ$, u. ein Destillat von der VZ. 21,5 (ber. 35), also ein Gemisch der Monoformine u. des gesätt. Alkohole $C_8H_{12}O$ mit diesen selbst. Verseifung u. Rektifikation lieferten Fraktionen $135-138^\circ$ (*Propenyläthylcarbinol*) u. $138-143^\circ$ (wesentlich *Butenyläthylcarbinol*). (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 416—21. Paris, Fac. de Pharm., 1902.)

LINDENBAUM.

Ad. Grün, **Ernst Ulbrich** und **Franz Krczil**, *Beiträge zur Synthese der Wachse. Ketonisierung hochmolekularer Fettsäuren* war nur die Methode von EASTERFIELD u. LAYLOR (Journ. Chem. Soc. London **99**. 2297 [1911]) geeignet. Es genügten schon kleine Mengen gewisser Eisensorten, u. a. auch das Erhitzen in eisernen Gefäßen. Die Temp. bis höchstens 300° war die Rk. quantitativ. Die Red. der Ketone geschah quantitativ durch Umsetzung mit dem etwa doppelten Gewicht der berechneten Menge A. in höchstkonzentrierter NaOH nach:



bei genügend hoher Temp. — Die Darst. hochmolekularer *Olefine* gelang leicht durch Erhitzen der Alkohole mit 1% Naphthalinsulfonsäure auf 200° . Es bildeten sich nur die *cis-trans-Isomere*. Der Beweis für das Vorliegen alloisomerer *Olefine* konnte beim *Heptakosen* durch Umwandlung der niedriger schmelzenden *Olefine* in die höherschm. mittels HNO_2 gebracht werden. — Die Hydrierung von *Pentatriakontanon* zu Paraffin erfolgte durchaus nicht leicht. Zur Erzielung aus reiner Verb. mußte 2—3-mal hydriert werden. Dagegen war die Hydrierung von *Olefine* u. Alkohole leicht zu erzielen.

Versuche. 1. Darst. der Ketone: Die Ketonisierung kleinerer Mengen *Palmitinsäure* war innerhalb 3 Stdn. bei 300° beendet, *Palmitinsäure* erforderte 295° , *Stearinsäure* 285° , *Laurinsäure* 270° . — *Pentatriakontanon-(18)-oxim* schmolz entgegen KIPPING (Journ. Chem. Soc. London **57**. 985 [1890]) bei $66-67^\circ$ statt 59° . — *Heptakontanon-(22) (Behenon)*, $C_{21}H_{43} \cdot CO \cdot C_{21}H_{43} = C_{42}H_{86}O$, mattweiße undeutliche Kristalle, wl. in organ. Lösungsm., F. 92° . — 2. Darst. der sek. Wachsalkohole: Günstigste Rk.-Bedingungen: Verwendung von Keton u. A. im molekularen Verhältnis von ca. 1:2, Verwendung der berechneten Menge NaOH ($\frac{1}{2}$ Mol),

gel. in der höchstens gleichen Menge W. (ca. 1,1 Mole). Temp. ca. 300°, Rk.-I 6—8 Stdn. Die Red. von Behenon, Stearon u. Oleon geht bis 80—90%, die der rigen Homologen weniger weit. — *Pentatriakontanol*-(18); $(C_{17}H_{35})_2:CHOH = C_{35}$ Kryställchen, ll. in Chlf., h. CCl_4 , Bzl., Amylalkohol u. sd. A., F. 92° (korr.). Bei des Pentatriakontanons mit Na u. Amylalkohol (Ausbeute wie auch mit anderen tonen 96—97%) bildete sich in sehr geringer Menge ein Nebenprod. vom F. 114 (Pinakon?) *Acetylderiv. des Pentatriakontanols*, F. 58—59°, *Benzoylderiv.*, F. 55°. Äußerst schwer verseifbar. — *Hentriakontanol*-(16), $(C_{15}H_{31})_2:CHOH = C_{31}H_{64}O$, sd Nadelchen, F. 85,6° (korr.).

3. Darst. der Olefine: *18-Chlorpentatriakontanon*, $C_{35}H_{71}Cl$, durch rierung mit Thionylchlorid. Krystalle aus Essigester, F. 48—49°. *Pentatriakonten* $C_{35}H_{70}$, aus der Chlorverb. mit 5%ig. NaOH, besser mit dem doppelten Überschu entwässertem Na-Acetat bei 300° nach:

$(C_{17}H_{35})_2:CHCl + CH_3COONa = NaCl + CH_3COOH + C_{17}H_{35}:CH:CH:C_{16}H_{33}$
Die beiden alioisomeren Formen erhält man aber nur durch Erhitzen mit β -thalinsulfosäure (s. o.) mit 98—99% Ausbeute. Höherschm. (cis?)-Form vom F. durch Umkrystallisieren aus Essigester, in dem sie wl. ist. Silberglänzende Kry schuppen, ll. in $CHCl_3$, CCl_4 , nicht in A. u. Eg. Aus der höchstkonz. Mutter bei —15° krystallisierte *Pentatriakonten*-(17) vom F. 45—46°, das eventuell nicht ganz „ster. rein“ ist u. nur bei möglichst kurzer Rk.-Dauer entsteht, Kp.₁ 26°. *17,18-Dichlorpentatriakontanon*, $C_{35}H_{70}Cl_2$ aus dem Olefin in CCl_4 u. Cl_2 , F. 47°. Alkalien selbst bei 300° ausnehmend beständig. — *17,18-Dibrompentatriak* $C_{35}H_{70}Br_2$, aus der hochschm. Form, kleine harte Krystalle vom F. 63—63,5° (l. Unl. in A. u. Eg., sonst ll. — *cis*- u. *trans*-*Hentriakonten*-(15), $C_{14}H_{29}:CH:CH:C_{15}H_{31}$ $C_{31}H_{62}$. Mengenverhältnis der Isomeren (aus Essigester) wie oben ca. 2:3. Die Form bildet silberglänzende Blättchen, Kp.₁ 245—246°, F. 45,2—45,4° (eine l. eventuell verunreinigte, Fraktion hatte F. 47,5°). Die Mutterlauge hinterließ andere Isomere nur als Fl. vom Kp.₂ 241—42°. — *15,16-Dibromhentriakontan*, $C_{31}H_{62}$ aus der festen Verb. Spröde Kryställchen, F. 43—43,5° (korr.). Ll. in Ä., Lg. Essigester; unl. in Eg. u. A. Das Br reagiert nur träge. — *cis*- u. *trans*-*Heptakosen* $C_{27}H_{54}$. Feste Verb.: silberglänzende Kryställchen aus Eg. F. 34,2° nach Entfe einer bei 47° schm. Verunreinigung. Leichter l. als die Homologen, nur nicht u. Eg. Aus der Mutterlauge das Isomere als wenig viscose Fl., Kp.₁ 210°, er bei —2° breiartig u. ist bei 4—5° klar geschm. — *13,14-Dibromheptakosan*, $C_{27}H_{54}$ Harte Kryställchen, F. 38,5—39°. — Oxydative Spaltung des festen Heptakosen das erwartete Gemisch von Tridecan- u. Tetradecansäure. — *cis*- u. *trans*-*Trikosen* $C_{23}H_{46}$. Das Gemisch der Isomeren hatte den Kp.₁ 175°. Aus konz. Essiges schieden sich bei —20° silberglänzende Krystallblättchen ab. F. 17—18°. E. Aus der Mutterlauge wurde eine wenig viscose Fl. erhalten, die bei —0,5° brei starrrte u. bei 1—2° klar geschm. war. Oxydative Spaltung führte zu äquimoleku Gemisch von Undecen- u. Laurinsäure. — *11,12-Dibromtrikosan*, $C_{23}H_{46}Br_2$, harte Kryställchen, unl. in A. u. Eg., sonst ll. F. 35,5° (korr.). Das 2. Br-Atom sehr fest gebunden.

4. Darst. von *n*-*Pentatriakontanon* $C_{35}H_{72}$ (s. o.). 5. Darst. Wachse stern. Für die techn. Veresterung war Zusatz gewisser Metalle, w der 4. Gruppe von Vorteil. Bei einigen Säuren bewirkte schon das Verrühre etwas geschmolzenem Sn eine schnellere Rk. Die nachfolgenden Verbb. wurden Einw. von Säurechlorid auf im W.-Bade erhitzte Alkohole unter Durchleiten vo u. nachherige Aufarbeitung nach HÖNIG u. SPITZ (Ztschr. f. angew. Ch. 4. 565) erhalten. Ausbeuten mindestens 90%. Alle Ester sind mattweiße, mikrokry Aggregate von geringer Plastizität, sl. in Ä., PAe., Bzl.-KW-stoffen, Chlf., CCl_4 u. unl. in k. A. Das beste Krystallisationsmittel ist Essigester. — Die FF. lieg

see
errata
p. 3977

omeren Paaren (z. B. Trikosylpalmitat u. Heptakosyllaurinat beide $C_{39}H_{78}O_2$), bei Verbb. mit größerem Alkyl höher; bei 2 isomeren Paaren aber liegt der F. bei der b. mit größerem Acyl, also kleinerem Alkyl, höher.

Trikosyl-(12)-laurinat, $(C_{11}H_{23})_2 \cdot CH \cdot O \cdot CO \cdot C_{11}H_{23} = C_{35}H_{70}O_2$, F. 21,5—22,5°; *Tripl-(12)-myristinat*, $(C_{11}H_{23})_2 \cdot CH \cdot O \cdot CO \cdot C_{13}H_{27} = C_{37}H_{74}O_2$, F. 25—25,5° (korr.); *Tripl-(12)-palmitat*, $(C_{11}H_{23})_2 \cdot CH \cdot O \cdot CO \cdot C_{15}H_{31} = C_{39}H_{78}O_2$, F. 27,5—28° (korr.); *Tripl-(12)-stearat*, $(C_{11}H_{23})_2 \cdot CH \cdot OCOC_{17}H_{35} = C_{41}H_{82}O_2$, F. 29,5—30,5°; *Heptakosyllaurinat*, $(C_{13}H_{27})_2 \cdot CH \cdot OCOC_{11}H_{23} = C_{39}H_{78}O_2$, F. 34—35°; *Heptakosyl-(14)-myristinat*, $C_{41}H_{82}O_2$, F. 37,5—38° (korr.); *Heptakosyl-(14)-palmitat*, $C_{43}H_{86}O_2$, F. 41,5—42° (korr.); *Heptakosyl-(14)-stearat*, $C_{45}H_{90}O_2$, F. 39,5—40,5° (korr.); *Hentriakontyllaurinat*, $(C_{15}H_{31})_2 \cdot CH \cdot O \cdot CO \cdot C_{11}H_{23} = C_{43}H_{86}O_2$, F. 39,5—40,5°; *Hentriakontyllmyristinat*, $C_{45}H_{90}O_2$, F. 45,5—46,5°; *Hentriakontyl-(16)-palmitat*, $C_{47}H_{94}O_2$, F. 48,5—49,5° (korr.); *Hentriakontyl-(16)-stearat*, $C_{49}H_{98}O_2$, F. 50,5—51° (korr.); *Pentatriakontyl-(18)-laurinat*, $(C_{17}H_{35})_2 \cdot CH \cdot OCOC_{11}H_{23} = C_{47}H_{94}O_2$, F. 42,5—43,5° (korr.); *Pentatriakontyl-(18)-myristinat*, $C_{49}H_{98}O_2$, F. 49—50° (korr.); *Pentatriakontyl-(18)-palmitat*, $C_{51}H_{102}O_2$, F. 54—55° (korr.); *Pentatriakontyl-(18)-stearat*, $C_{53}H_{106}O_2$, F. 56—57° (korr.). (Z. schr. f. angew. Ch. **39**. 421—28. Aussig a. E., GEORG SCHICHT A.-G.) HARMS.

H. O. Halvorson, *Die Bereitung von reinem Natriumricinoleat*. Die rohe, auf dem Verseifungsweg gewonnene Ricinolsäure, eine braune, dickfl. Fettsäure, wird durch 2-wöchigem Sedimentieren dekantiert. Es wird mit $BaCl_2$ gefällt, der Nd. mit A. genommen, da das Salz der Ricinsäure in h. A. im Gegensatz zu den Stearaten unauflöslich ist. Nach Auskrystallisieren bei 5° Behandlung mit 10% HCl. Entfernung der HCl u. der letzten Spuren Ba mit H_2SO_4 . Abzentrifugieren der $BaSO_4$. Überführen in die Na-Seife durch die erforderliche Menge NaOH. Klärung durch Schmelzen, Einengung auf $\frac{1}{4}$ Vol. Die sich ausscheidende Seife wird bei 35° getrocknet. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 553—55; Ber. ges. Physiol. **33**. 26—27. 1925. Minneapolis, Dep. of bacteriol. a. immunol. univ. of Minnesota. Ref. KADISCH.) OPP.

Griffith Glyn Jones und Thomas Martin Lowry, *Studien über dynamische Isomerie*. XXI. *Die Geschwindigkeit der Mutarotation der Tetramethylglucose und Tetraacetylglucose in wässrigem Aceton*. (XX. vgl. S. 1970.) Vff. untersuchen die Einw. von Aceton auf die katalyt. Wirksamkeit des W. bei der Mutarotation u. finden, daß das Aceton diese Wirksamkeit in bedeutend größerem Maße herabsetzt, als der Konz. entspricht. So ist die Geschwindigkeit der Mutarotation in einem 50%ig. Aceton-Gemisch nur noch 20% derjenigen in reinem W. Ein Vergleich der Geschwindigkeit der Mutarotation mit dem partiellen Dampfdruck wss. Acetons bei 30° ergab keine Beziehungen zwischen diesen beiden Größen. Vff. nehmen an, daß die katalyt. Wirkung des W., die der gesamten Konz. nicht proportional ist, auch keine einfache Funktion des partiellen Dampfdruckes darstellt.

Versuche. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London **127**. 1387; C. **1925**. II. 1951.) Anfangsdrehung der sorgfältig gereinigten Tetramethylglucose beträgt 117°, Enddrehung 95°, der Geschwindigkeitskoeffizient ist 0,0128. Reine Tetracetylglucose schmilzt schnell erhitzt bei 123°, bei langsamem Erwärmen bei 110°. $[\alpha]_{5461} = 0$ für eine 5%ig. Lsg. von Tetracetylglucose in wasserfreiem Aceton bei 20°. Eine Hydrolyse der Tetracetylglucose in wss. Aceton wurde innerhalb einer Woche bei 18° nicht beobachtet; nach 10 Tagen betrug sie ca. 0,5%, nach 7 Monaten 5%. Sie ist daher ohne wesentlichen Einfluß auf die Geschwindigkeit der Mutarotation. — 1 g Tetramethylglucose oder 0,5 g Tetracetylglucose werden zu den opt. Messungen in wss. Aceton verschiedener Konz. gel. Die Geschwindigkeit der Mutarotation der Tetramethylglucose wurde für 0—95%ig. Acetonlsgg. untersucht, für Tetracetylglucose nur infolge ihrer geringen Löslichkeit in W. von 5%ig. Lsgg. aufwärts. Zum Schluß geben Vff. eine tabellar. Übersicht der Versuchsergebnisse. Diese Resultate stehen in Ein-

klang mit den Angaben IRVINES (vgl. Journ. Chem. Soc. London **103**. 584; C. 19 II. 245), daß in wasserfreiem Aceton keine Mutarotation stattfindet. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 720—23. Cambridge, Univ.)

H. Colin und **A. Chaudun**, *Änderungen der Hydrolysekonstanten mit der Zuckerkonzentration*. (Vgl. S. 1391.) Die anfängliche Hydrolysegeschwindigkeit der Saccharose durch Säuren ist nicht nur von der Konz. des Zuckers abhängig, sondern auch von der Art des anwesenden Katalysators, d. h. der Säure. Mit abnehmender Stärke der Säure nimmt auch das Verhältnis k/k' der Hydrolysekonstanten, worin k die Hydrolysenkonstante für die Zuckerkonz. von 40 g auf 100, k' die von 5 g auf 100 bedeuten. Ebenso wie Erhöhung der Saccharosekonz. wirkt die Zugabe von Glycerin. Verss., die an $1/10$ -n. Lsgg. von Salzsäure, Trichloressigsäure, Schwefelsäure, Oxalsäure, Ameisensäure, Citronensäure u. Essigsäure ausgeführt wurden (Lsgg. enthielten 5 g Zucker u. 48 g Glycerin auf 100) ergaben, daß die Zugabe von Zucker wie von Glycerin die gleichen Effekte hervorbringt: eine Zunahme der WHELMYschen Konstanten bei starken Säuren u. eine Verminderung bei schwachen Säuren. Vf. folgert, daß nicht nur das H-Ion, sondern auch das Kation die Hydrolysegeschwindigkeit beeinflusst. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 775—76.) HAA

E. Carrière, *Betrachtungen über die Nitrierung der Cellulose*. Vf. hat folgende Beobachtungen gemacht: Das zur Fabrikation von CP_1 (Schießbaumwolle mit 13,4% N) nach dem Turbinierungsverf. von SELWIG dienende H_2SO_4 - HNO_3 -Gemisch wurde vor u. nach der Nitrierung analysiert. Aus der verbrauchten HNO_3 u. dem gebildeten H_2O u. unter Berücksichtigung aller Begleitumstände berechnet sich für das primäre Rk.-Prod. die Formel $C_{24}H_{24}O_5(NO_3)_{14}$, welche einen viel höheren Nitrierungsgrad repräsentiert als die Formel $C_{24}H_{29}O_9(NO_3)_{11}$ des schließlich erhaltenen CP_1 . Etwa Ähnliches ergab sich bei der Fabrikation des CP_2 (mit 12% N); dem primären Rk.-Prod. kommt hier die Formel $C_{24}H_{30}O_{10}(NO_3)_{10}, 2HNO_3$ zu gegenüber der Formel $C_{24}H_{31}O_{11}(NO_3)_9$ des fertigen Prod. Diese Pernitrocellulosen sind nicht stabil und werden von W. in HNO_3 u. CP_1 bzw. CP_2 zerlegt. Tatsächlich enthalten die Waschlfl. der abgesaugten Prodd. mehr HNO_3 als die Säuregemische, in denen die nitrierten Prodd. schwimmen. — CP_1 u. CP_2 besitzen sehr verschiedene Eigenschaften. Einem Gemisch von 2 Teilen Ä. u. 1 Teil A. löst sich CP_1 nur zu 10, CP_2 jedoch mindestens 94%. Dementsprechend sind auch die beiden Pernitrocellulosen voneinander verschieden. Die des CP_2 enthält wesentlich addierte HNO_3 u. bleibt im Festiger beim Absaugen als die des CP_1 , welche überschüssige HNO_3 nur in Form von Estergruppen, außerdem anscheinend — infolge Anhydroisierung zweier alkalischer Gruppen — eine Ätherfunktion enthält. Eine Folge dieser verschiedenen Konstitution ist, daß sich CP_2 viel leichter (schon mit k. W. fast vollständig), CP_1 dagegen schwerer (erst mit sd. W.) stabilisiert. — Die ermittelten Tatsachen erklären auch weshalb das nach dem Verf. von THOMSON hergestellte CP_1 leichter stabilisiert ist als das nach dem Verf. von SELWIG hergestellte. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 438—43.)

LINDENBAUM

J. R. Katz, *Über die Bildung von „Alkali-Cellulose-Verbindungen“, wenn das Medium ein Gemisch von Wasser und Alkohol ist (statt Wasser allein)*. (Röntgenspektrographische Beobachtungen.) (Vgl. Ztschr. f. Elektrochem. **31**. 157; C. **1925**. I. 22.) Nach VIEWEG (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1917; C. **1925**. I. 41) soll sich in wss.-alkoh. Lsg. keine Alkalicelluloseverb. bilden, während HESS (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 2; C. **1925**. I. 1974) chem. Bindung annimmt, die Quellung jedoch durch den A. zurückgedrängt wird. Vf. hat deshalb die Einw. wss.-alkoh. Alkalilsgg. auf Cellulose nochmals röntgenograph. untersucht u. findet in beiden Fällen das typ. Röntgenspektrogramm der in wss. NaOH gequollenen Cellulose. Daraus geht hervor, daß auch bei der Quellung in wss.-alkoh. Lsg., wo das flache Stück der Viewegschen Kurve so auffällig fehlt, dennoch die gleiche röntgenspektrograph. Veränderung auftritt, die

Lsgg. ungefähr bei der gleichen Konz. auftritt, wo der Knickpunkt der Viewegschen Ve liegt. Vf. zieht daraus den Schluß, daß auch in der wss.-alkoh. Lsg. sich die Celluloseverbb. bildet u. zwar nimmt die Cellulose aus einer 50%ig. alkoh. Lsg. 16% NaOH etwa 40% ihres Gewichtes, aus einer 10%ig. alkoh. Lsg. etwa 13% H auf. Diese Mehraufnahme aus wss.-alkoh. Lsg. ist noch ungeklärt. (Ztschr. f. trochem. **32**. 125—28.)

BRAUNS.

G. Klein, *Aldehydabspaltung aus Zuckerarten*. NEUBERG (Biochem. Ztschr. **67**. 127; C. **1914**. I. 591. 605) u. SPÖHR (Biochem. Ztschr. **57**. 95; C. **1914**. I. 158) len, daß viele organ. Säuren bei ultraviolettem Licht oder mit Katalysatoren hyd abspalten. ROSENTHALER (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **251**. C. **1914**. I. 956) erhielt ebenfalls Aldehyd aus Zuckern u. mehrwertigen Alkoholen i Behandlung mit etwas KMnO_4 u. H_2SO_4 . Vf. untersuchte eine große Reihe n. Verbb. u. fand, daß Glucose bei der Dest. in saurer, neutraler oder alkal. Lsg. naldehyd abspaltet, der als *Formaldomedon* bestimmt wurde. Ebenso gaben *Fruct-Galaktose*, *Mannose*, *Saccharose*, *Lactose*, *Maltose*, *Raffinose*, *Arabinose*, *Glykogen*, *In*, *Dextrin*, *Lichenin*, *Stärke*, *Agar*, u. *Cellulose* ferner Glucoside wie *Äsculin*, *rhidzin*, *Coniferin*, *Salicin* u. *Hesperidin*, besonders nach der Hydrolyse, dann *colsäure* u. *Glycerin* Formaldehyd ab. *Rhamnose* u. *Quercitrin* gaben *Acetaldehyd*. chem. Ztschr. **169**. 132—38. Wien, Univ.)

BRAUNS.

Samuel Coffey, *Die Mercurierung aromatischer Verbindungen*. II. *o-Nitrotoluol*. (vgl Journ. Chem. Soc. London **127**. 1029; C. **1925**. II. 545.) Mercuriacetat u. nitrotoluol geben im Laufe einer Stde. von 110 auf 150° erhitzt, 12 Stdn. bei dieser p. gehalten u. die entstehenden Acetoxymercuriverbb. mit NaCl umgesetzt, *lormercuri-2-nitrotoluol*, $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2\text{NClHg}$, aus Aceton Nadeln vom F. 220,5—221° r.), swl. in allen organ. Lösungsm. mit Ausnahme von Aceton u. Eg. Mit Br chl. behandelt entsteht 4-Brom-2-nitrotoluol vom F. 44,5—45°, mit J analog u. 12 Tagen 4-Jod-2-nitrotoluol vom F. 60,5—61°. In verd. Aceton mit KBr umtzt entsteht aus der Mercuriverb. 4-Brommercuri-2-nitrotoluol, aus Aceton, F. 241° r.). Analog mit KJ 4-Jodmercuri-2-nitrotoluol, aus Aceton, F. 286° (korr.). Die esenheit von 6-Chlormercuri-2-nitrotoluol in obigem Reaktionsgemisch läßt sich h Überführen in das 6-Brom-o-toluidin bzw. sein Acetylderiv. beweisen, des- hen auch durch Überführen in m-Brombenzoesäure 3(5)-Chlormercuri-2-nitro- ol nachweisen. 4-Chlormercuri-2-nitrotoluol liefert mit einer wss. Lsg. von Na- id 3 Stdn. geschüttelt das farblose Sulfid u. dieses 2 Stdn. auf dem Wasserbad zt u. in geeigneter Weise vom Mercurisulfid getrennt 4-Mercuribis-2-nitrotoluol, $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_2\text{N}_2\text{Hg}_2$, aus Aceton Nadeln vom F. 291° (korr.). 6-Nitro-m-toluidin liefert . mit SO_2 behandelt u. mit KNO_2 oder gasförmiger salpetriger Säure zur Rk. acht 2-Nitrotolyl-2-nitrotoluol-5-sulfazid, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_6\text{N}_4\text{S}$, aus Eg., F. 157—158° e.). Das Sulfazid gibt mit Baryt gespalten 2-Nitrotoluol-5-sulfinsäure, $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_4\text{NS}$, alz. Die Sulfinsäure liefert mit 50% alkoh. Mercurichlorid eine Woche erhitzt lormercuri-2-nitrotoluol, aus Aceton, F. 210°. Analog wie oben läßt sich auch 6-Nitro-p-toluidin 2-Nitrotoluol-4-sulfinsäure vom F. 95° herstellen. Journ. Chem. London **1926**. 637—43. London, RALPH FORSTER Lab.)

TAUBE.

Marston T. Bogert und **Ralph L. Evans**, *Über neue Farbstoffzwischenprodukte: Diaminophenylloxyl, 2-Nitro-4-aminophenylloxyl und 2,4-Diaminophenylsulfid*. e Verbb. sind in der Literatur bisher nicht beschrieben, obwohl die notwendigen gangsmaterialien (2,4-Dinitrochlorbenzol u. Phenol) billig sind u. das 2,4-Dinitro- ylloxyl seit langem bekannt ist. Die Red. des letzteren ist COOK nicht gelungen, Amin soll sich nach ihm an der Luft sofort zers. Vff. haben sowohl die partielle ie völlige Red. erzielt u. die Amine als ganz stabil befunden. Mehrere Azofarbstoffe en aus ihnen dargestellt. Dieselben Synthesen wurden auf die S-Reihe übertragen.

VIII. 1.

210

2,4-Dinitrophenyloxyd. 2,4-Dinitrochlorbenzol u. K-Phenolat (geringer schuß) werden miteinander verrieben, zunächst in kleinen Mengen (Phenolat ste Überschuß). Anderenfalls ist die Rk. so heftig, daß Entzündung erfolgt. Nach S über Nacht wird unter W. pulverisiert u. mit verd. NaOH gewaschen. Hellgelbe N aus A.-Aceton, F. 69—70° (korr.). — **2-Nitro-4-aminophenyloxyd**, $C_{12}H_{10}O_3N_2$, alkoh. Lsg. des vorigen gibt man allmählich $SnCl_2$ u. konz. HCl (Temp. unter 6° fällt das Filtrat mit NH_4OH . Granatrote Prismen oder orangerote Platten aus F. 107—108° (korr.), l. in starken Säuren, mit W. fällbar. Durch Eliminieren NH_2 entsteht 2-Nitrophenyloxyd (Konst.-Beweis). — **Acetylderiv.**, $C_{14}H_{12}O_4N_2$ Acetanhydrid in Eg. Hellgelbe Nadeln aus A., F. 118° (korr.). Einmal wurden net diamantähnliche Prismen, F. 124° (korr.), erhalten, die ebenfalls zum Nitroamin zu verseift wurden. — **4-Phenoxy-3-nitrophenyldiazoniumchlorid.** Das Nitroamin leicht diazotiert, besonders in Ggw. von etwas Eg. Die Diazoverb. ist auffaller ständig u. kuppelt noch nach 1 Min. langem Kochen, mit α -Naphthol fuchsinro β -Naphthol braun. — **Phenoxyalizaringelb GG.** Durch Kuppeln mit Salicylsä Soda, dann aussalzen. Na-Salz gelb, färbt Seide citronengelb. — **2,4-Diaminophenyloxyd**, $C_{12}H_{12}ON_2$. Aus der Dinitro- oder Nitroaminoverb. mit Fe u. HCl (80—10—12 Stdn.). Isolierung über das *Hydrochlorid*, perlenglänzende Platten aus A. F. ca. 210° nach Erweichen bei ca. 190°, ll. in W., A., unl. in Bzl. Dasselbe wi NaOH (+ etwas Hydrosulfit) zerlegt, Amin in h. Bzl. aufgenommen. Diamantäh Krystalle aus Bzl., F. 67° (korr.), swl. in W., zl. in A., Ä., Bzl., im Vakuum destill beständig. — **Diacylderiv.**, $C_{16}H_{16}O_3N_2$, Krystalle aus W. oder 50%ig. A., l. (korr.). — **Phenoxybismarckbraun.** Aus obigem Hydrochlorid mit Nitrit u. verd aussalzen. Blaubraune Krystalle aus A. (+ etwas HCl), wl. in W., verd. Säur in A. Färbt Seide rotbraun. — **Phenoxychrysoidin.** Durch Kuppeln von Phen niumchlorid mit obigem Diamin in verd. HCl, dann Na-Acetat zusetzen, koche salzen. Rotbraune Krystalle, wl. in W. Färbt Wolle u. Seide gelbbraun bis bra **2,4-Dinitrophenylsulfid.** Aus 2,4-Dinitrochlorbenzol u. K-Thiophenolat. Gelbe 1 aus 80%ig. A., dann A.-Aceton oder A.-Bzl., F. 117°, ll. in Aceton, Bzl., wl. unl. in W. — **2,4-Diaminophenylsulfid**, $C_{12}H_{12}N_2S$. Aus dem vorigen wie ober Hydrochlorid wurde nicht isoliert. Hellgelbe Prismen aus Bzl. oder A., F. 107 A., Bzl., swl. in W. — **Phenylmercaptochrysoidin.** Darst. wie oben. Tiefrote F wl. in W., verd. Säuren, ll. in A. Färbt Wolle u. Seide orange gelb. Das Hydro krystallisiert gut aus verd. A. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 299—302. New Columbia-Univ.)




LINDENBAU

Charles Dufraisse und René Chaux, *Über die α -Alkoxybenzalacetop* (Vgl. DUFRAISSE u. Mitarbeiter, Ann. de Chimie [9] **17**. 138; C. **1925**. I. 37 d. l'Acad. des sciences **178**. 948. **180**. 1946; C. **1924**. I. 2348. **1925**. II. 1596, u gehende Arbeiten.) Im Laufe der stereochem. Studien in der Benzalacetop reihe wurde die Alkoxygruppe bisher nur in der β -Stellung untersucht. I einiger Zeit (C. **1925**. II. 1596) beschriebene Nachweis des α -Oxybenzalacetop hat es erforderlich gemacht, auch die α -Alkoxybenzalacetophenone, $C_6H_5 \cdot CO \cdot CH \cdot C_6H_5$, in den Kreis der Unterss. einzubeziehen. Auch von diesen Verbb. bisher nur je eine einzige Form gewonnen werden. Umlagerungsverss. werden die niedrigen F.F. (ca. 35°) u. große Löslichkeit der Verbb. erschwert. α -benzalacetophenone sind inzwischen auch von MALKIN u. ROBINSON (Journ Soc. London **127**. 369; C. **1925**. I. 2072) beschrieben worden, jedoch verfolg andere Ziele als genannte Autoren. Bzgl. der Hydrolyse dieser Verbb. zu benzylglyoxal, $C_6H_5 \cdot CO \cdot CO \cdot CH_2 \cdot C_6H_5$, ist die auch von den engl. Autor gewandte Behandlung mit NaOH nicht etwa nebensächlich, sondern notwen Erzielung eines krystallisierten Prod. auf dem Wege über das Enolsalz (l. c.), sonst, besonders wenn Wärme in Anwendung kommt, stets die fl. Form erl

Konst.-Beweis für die α -Alkoxybenzalacetophenone wurde einmal durch Über-
 ung in α -Bromphenylbenzylglyoxal, $C_6H_5 \cdot CO \cdot CO \cdot CHBr \cdot C_6H_5$, sodann durch
 ltung in Benzoesäure u. ω -Alkoxy-styrole, $C_6H_5 \cdot CH : CH(OR)$, geführt.

Versuche. ω -Methoxyacetophenon, $C_6H_5 \cdot CO \cdot CH_2(OCH_3)$. Aus Methoxy-
 onitril u. C_6H_5MgBr . Nach ca. 2-std. Kochen wird die äth. Lsg. abgegossen, die
 Verb. schnell unter Ä. zerkleinert, mit Ä. gewaschen u. mit verd. H_2SO_4 zerlegt.
₁₃ 117—118°, F. 7—8°, D.₄¹⁸ 1,096, D.₄²⁰ 1,0939, $n_D^{20,2} = 1,5338$, sehr luft-
 findlich. Semicarbazon, $C_{10}H_{13}O_2N_3$, Krystalle aus Bzl., F. 126—127°. — α -Meth-
 enzalacetophenon, $C_{16}H_{14}O_2$. Zur Mischung des vorigen mit Benzaldehyd tropft
 unter Kühlung $NaOCH_3$ -Lsg., läßt 8 Stdn. bei Zimmertemp. stehen, wäscht
 wenig W. u. säuert mit HCl an. Dickes Öl, Kp.₃ 184—186°, bald erstarrend,
 ach gelbliche Tafeln aus CH_3OH , F. 34—35°, sl. außer in W., oxydabel. [Aus
 Mutterlauge wurden in äußerst geringer Menge Nadelbüschel, F. 103—105°, er-
 en.] — Phenylbenzylglyoxal. In die wss.-alkoh. Suspension des vorigen leitet
 HBr u. kocht 20 Min., verd. mit W., äthert aus u. gibt zur äth. Lsg. Na. Die
 te Lsg. des Na-Salzes wird mit verd. HCl zerlegt. F. 86°. Weitere Eigenschaften
 l. c. — α -Bromphenylbenzylglyoxal. Aus dem α -Methoxybenzalacetophenon-
 mid (MALKIN u. ROBINSON) u. HBr wie oben. Hellgelbe Krystalle (vgl. JÖR-
 DER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **50**. 417; C. **1917**. I. 759). — α -Methoxybenzal-
 phenon, in methylalkoh. Lsg. im evakuierten Rohr einige Tage dem Sonnen-
 ausgesetzt, verwandelt sich in ein unkrystallisierbares Harz. — ω -Äthoxyaceto-
 n, Kp.₃ 99—100°, Kp.₁₃ 124—125°, F. 8—9°, D.₄¹⁸ 1,059, D.₄^{20,9} 1,0563, $n_D^{20,9} =$
₁₂ 1,52. — α -Äthoxybenzalacetophenon, $C_{17}H_{16}O_2$, Kp.₂₅ 175—176°, schwach gelbliche
 italle aus sehr wenig A., F. 34—35°, sl., oxydabel. Wird durch Erhitzen mit
 m Ätzalkali in Benzoat u. ω -Äthoxystyrol gespalten. (Bull. Soc. Chim. de
 ce [4] **39**. 443—51. Paris, Collège de France.) LINDENBAUM.

Leon Rubenstein, *Substitution in vicinal trisubstituierten Benzolderivaten*. IV.
 (vgl. S. 906.) Untersucht wurde die Substitution an vicinal substituierten Verbb.
 Typus I, wo X eine schwach o,p-dirigierende Gruppe darstellt. Die Bedingung
 von den Dialkyloxybenzylalkoholen II erfüllt, o-Veratrylalkohol, 2,3-Diäthoxy-
 ylkohol u. 3-Methoxy-2-äthoxybenzylalkohol geben bei der Nitrierung gute Aus-
 n des 5-Nitroderiv. Die Bromierung verläuft unbefriedigend, doch entstehen
 falls geringe Mengen der 5-Bromderiv. Die Dialkyloxyzimtsäuren III, in denen X
 o,p-dirigierende u. ungesätt. Gruppe darstellt, liefern im Falle der 2,3-Diäthoxy-
 Methoxy-2-äthoxyzimtsäuren die 5-Nitroderiv. 2,3-Dimethoxyzimtsäure liefert
 gen ein Gemisch mit 85% des 5-Nitro- u. 15% des 6-Nitroderiv.



Versuche. 2,3-Dimethoxybenzylalkohol (aus o-Veratrumaldehyd nach CAN-
 ARO) liefert in Eg. bei 40—50° nitriert 5-Nitro-2,3-dimethoxybenzylalkohol,
 $C_{10}H_{13}O_5N$, aus Methylalkohol, F. 67°. Durch Oxydation mit $KMnO_4$ 5-Nitro-o-vera-
 säure vom F. 176°. 3-Methoxy-2-äthoxybenzaldehyd gibt nach CANNIZZARO
 thoxy-2-äthoxybenzylalkohol, Kp.₁₃ 148° u. dieser in Eg. nitriert 5-Nitro-3-meth-
 2-äthoxybenzylalkohol, $C_{10}H_{13}O_5N$, aus A., F. 132°. Durch Oxydation 5-Nitro-3-
 oxy-2-äthoxybenzoesäure vom F. 169°. 2,3-Diäthoxybenzylalkohol, $C_{11}H_{16}O_3$,
_{163°}, Kp.₁₉ 167°, aus PAe., F. 35° (wie oben hergestellt) gibt nitriert 5-Nitro-2,3-
 oxybenzylalkohol, $C_{11}H_{15}O_5N$, aus A. F. 75°. Durch Oxydation 5-Nitro-2,3-diäthoxy-
 oesäure vom F. 118°. o-Veratrylalkohol liefert in Eg. bei Ggw. von Na-Acetat
 niert 5-Brom-2,3-dimethoxybenzylalkohol, $C_9H_{11}O_3Br$, aus PAe., F. 82°. Durch
 lation 5-Brom-o-veratrumsäure vom F. 120°. Analog 5-Brom-3-methoxy-2-äthoxy-

benzylalkohol, $C_{10}H_{13}O_3Br$, aus PAe., F. 55—56° u. 5-Brom-2,3-diäthoxybenzylal., $C_{11}H_{15}O_3Br$, aus PAe., F. 60°. 2,3-Dimethoxyzimtsäure gibt mit konz. HNO_3 ein Gemisch der Nitroderiv., welches durch fraktionierte Krystallisation der Sä. u. Ester zerlegt werden kann. 1. 5-Nitro-2,3-dimethoxyzimtsäure, $C_{11}H_{11}O_6N$, aus F. 229°, Äthylester, $C_{13}H_{15}O_6N$, aus A., F. 111°. Durch Oxydation 5-Nitro-o-veratensäure; u. 2. 6-Nitro-2,3-dimethoxyzimtsäure, aus verd. A., F. 210—215° (Zers.), 2-Ester, aus verd. A., F. 86°. Durch Oxydation mit $KMnO_4$ bei 90° 6-Nitro-3-methoxybenzoesäure. 3-Methoxy-2-äthoxyzimtsäure, $C_{12}H_{14}O_4$, aus A., F. 151°. 3-Methoxy-2-äthoxybenzaldehyd u. Malonsäure in Pyridin) liefert nitriert 5-N-methoxy-2-äthoxyzimtsäure, $C_{12}H_{13}O_6N$, aus A., F. 200—201°. Analog 2,3-Diäthoxyzimtsäure, $C_{13}H_{16}O_4$, aus A., F. 161° u. 5-Nitro-2,3-diäthoxyzimtsäure, $C_{13}H_{11}O_6N$, F. 199°. Ferner aus 5-Nitro-o-veratrumssäure durch Red. mit Sn u. HCl 5-Am-veratrumssäure, $C_9H_{11}O_4N$, F. 250° (Zers.) u. durch Ersatz der NH_2 -Gruppe durch 5-Brom-o-veratrumssäure vom F. 120° (s. o.) (Journ. Chem. Soc. London 1926 bis 53. Oxford, DYSON PERRINS Lab.)

G. Weissenberger, F. Schuster und L. Piatti, Zur Kenntnis der Resorganischer Verbindungen. Wss. Lsgg. von Essigsäure, deren Titer bekannt wurden mit gemessenen Mengen von Kresol oder cyclo-Hexanol bei 18° heftig geschüttelt u. nach einigen Stdn. die Eg.-Konz. der wss. Lsg. durch Titration bestimmt. Da die Eg. in beiden Medien dasselbe Mol.-Gew. besitzt, ergibt sich der Verteilungskoeffizient für konstante Temp. als innerhalb der Versuchsfehlergrenze konstant. Im Falle Kresol-W. wurde der Koeffizient zu 1,02, im Falle cyclo-Hexanol-W. zu 1,00 gefunden. Die Tatsache, daß Eg. mit Kresol eine Molekülverb. eingeht, drückt sich somit in den Verteilungskoeffizienten aus u. es ergibt sich hieraus eine neue Methode zur Unters. des Restfeldes organ. Verbb. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151. 7 Wien, Univ.)

Pierre Bedos, Beitrag zur Kenntnis der geometrischen Stereoisomerie in der Hexanreihe. V. Über die o-cyclo-Hexyl-cyclo-hexanole. (IV. vgl. S. 2910.) I. Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 1924. I. 479. Nachzutragen ist Einw. von $C_6H_{11}MgCl$ auf cyclo-Hexenoxyd verläuft wieder in zwei Phasen. Vollendung der Rk. wird 1 Stde. auf ca. 200° erhitzt. Neben dem cis-o-cyclo-Hexyl-cyclo-hexanol bildet sich stets eine gewisse Menge cyclo-Hexanol, wahrscheinlich bei Oxydation des $C_6H_{11}MgCl$ zu $C_6H_{11}O \cdot MgCl$. — Das o-cyclo-Hexyl-cyclo-hexanol semicarbazon ist nur bei Anwendung von freiem Semicarbazid u. verd. Essigsäure in krystallisierter Form erhältlich. — α -cyclo-Hexenyl-cyclo-hexanol, $C_6H_9(OH)$: [Wohl richtiger als α -cyclo-Hexyliden-cyclo-hexanol zu bezeichnen. D. Ref.] α -cyclo-Hexyliden-cyclo-hexanon mit Na u. A. Kp.₁₃ 138—139°, erstarrt bei -130° in Kühlung, Krystalle aus Lg., F. 34—35°. Phenylurethan, $C_{19}H_{25}O_2N$, Krystal. A., F. 117° (vgl. WALLACH, LIEBIGS Ann. 381. 85 [1911]). — Die Hydrierung von Alkohols in Ä. (+ Pt) verläuft sehr langsam u. unvollkommen, das Pt muß mehrmals erneuert werden. Das Gemisch der o-cyclo-Hexyl-cyclo-hexanole zeigt Kp.₁₆ 140°. Phenylurethane, $C_{19}H_{27}O_2N$; Trennung durch fraktionierte Krystallisation aus Ä.; FF. 111—112° (unreines trans-Deriv., das reine vgl. unten) u. 122° (reines cis-Deriv. mit dem Prod. aus cyclo-Hexenoxyd). WALLACH hat nur ein Phenylurethan vom F. 117° erhalten. — Der umgekehrte Weg, nämlich katalyt. Hydrierung von α -cyclo-Hexyliden-cyclo-hexanon in Ä. (+ Pt), die ebenso unvollkommen verläuft, obige verläuft, zum o-cyclo-Hexyl-cyclo-hexanon u. Red. dieses mit Na u. A. gibt dieselben Endresultate. Die völlige Trennung der Phenylurethane gelang hier noch nicht. — trans-o-cyclo-Hexyl-cyclo-hexanol, $C_{12}H_{22}O$. Nach dem etwas veränderten Verfahren von GUERBET (C. r. d. l'Acad. des sciences 155. 1156 [1912]) aus 500 g cyclo-Hexenol mit 200 g festem KOH, 10 Stdn. kochen, dann in W. Ausbeute sehr gering, da der Rest unverändert bleibt. Kp.₁₃ 136—138°, erstarrt bei starkem Abkühlen u. schmilzt bei -130°.

hen 0 u. 10^0 , D_{18}^{18} 0,9956, $n_D^{18} = 1,509$. *Phenylurethan*, $C_{10}H_{17}O_2N$, Nadeln A., F. scharf 114^0 . Dieser Alkohol liefert bei der CrO_3 -Oxydation ebenfalls o-cyclohexyl-cyclo-hexanon. — Letzteres Keton, im Laufe dieser Arbeit auf verschiedenen en erhalten, zeigte immer Kp_{12} $128-130^0$, sein Semicarbazon F. $181-182^0$. Es nt verschieden zu sein von der von WALLACH (l. c.) unter der gleichen Bezeichnung riebenen Verb. vom Kp_{12} 137^0 , Semicarbazon F. 203^0 . (Bull. Soc. Chim. de ce [4] 39. 473—87. Fac. des Sciences de Montpellier.) LINDENBAUM.

Thomas Martin Lowry und **Glyn Owen**, *Untersuchungen über Valenz. V. Ab- sionsspektren von Halogen- und Sulfonsäurederivaten des Camphers: Ursache der nabsorptionsbande.* (IV. vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 1921; C. 1924. II. .) Nach der in der vorhergehenden Mitt. (l. c.) beschriebenen Methode wurden rsucht: 1. In cyclo-Hexan: α - u. α' -Chlorcampher, α -, α' - u. β -Bromcampher, Dichlor-, Dibrom- u. Bromchlorcampher, α -Chlor- β -brom- u. α -Brom- β -chlorcampher, Dibromcampher, $\alpha\pi$ -Dichlor- u. Dibromcampher, α -Brom- π -chlorcampher u. $\alpha'\pi$ -Di- campher. 2. In W.: Campher- β -sulfonsäure, K - α -Chlorcampher- β -sulfonat, K - α -campher- β -sulfonat, NH_4 - α -Chlorcampher- π -sulfonat u. NH_4 - α -Bromcampher- π - nat. Die Beobachtung, daß die Lage der Ketonbande weitgehend von der Natur Ketons unabhängig ist, bestätigt sich; die Maximalabsorption steigt von Campher = $\text{\AA}$ auf $\alpha\alpha'$ -Dibromcampher $3230 \text{ \AA}$, $\lg \epsilon$ von 1,4 auf 2,0. Bei den $\alpha\alpha'$ -Derivv. in Ersatz von Cl durch Br von einem Wachsen der Bandenwellenlänge begleitet, end der Extinktionskoeffizient nahezu konstant u. auf einem Mittelwert zwischen Werten für je ein α -Cl u. α -Br stehen bleibt. Andererseits bewirkt der Ersatz von arch Br in der $\alpha\beta$ -Reihe ein Anwachsen des Extinktionskoeffizienten bei konstant ender Wellenlänge. Allgemein läßt sich aussagen, daß Halogenatome in α -Stellung hl die allgemeine wie auch die selektive Absorption des Camphers verstärken. gene u. Sulfongruppen in β - oder π -Stellung sind verhältnismäßig unwirksam der selektiven Absorption, obwohl sie wesentlich zur allgemeinen Absorption agen können. Die Ursache der Ketonbande erklären Vff. aus einer Aktivierung Valenzelektronen der Carbonyldoppelbindung, welche die Strahlung absorbierend C zum O verrückt werden u. schließlich zur B. einer semipolaren Doppelbindung $=O \rightleftharpoons \overset{+}{C}-\overset{-}{O}$ führen würden, vorausgesetzt, daß der Prozeß lange genug fort- tzt wird. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 606—22.) TAUBE.

Thomas Martin Lowry und **Rose Rachel Sass**, *Untersuchungen über Valenz. Allgemeine und selektive Absorption von Halogenderivaten des Methans. Ursache allgemeinen Absorption.* (V. vgl. vorst. Ref.) Die allgemeine Absorption der Chlor- vv. des Methans ist außerordentlich schwach, für *Chloroform* bei $2400 \text{ \AA}$ $\lg \epsilon = 0$, für *Tetrachlorkohlenstoff* bei $2700 \text{ \AA}$ $\lg \epsilon = 0,0$. Die Br-Derivv. absorbieren er als die Cl-Verbb., *Methylbromid* absorbiert nahezu ebenso stark wie CCl_4 , die orption wächst in der Reihenfolge CH_3Br , *Methylenbromid*, *Bromoform*, *Tetra- kohlenstoff*. Im Falle des *Methyljodids* tritt zuerst eine Absorptionsbande auf u. riekelt sich in der Reihenfolge CH_3J , *Methylenjodid* u. *Jodoform*, bis im Falle CH_3J_3 Bandenkopf sich über das halbe sichtbare Spektrum erstreckt u. die Kurve zwei ima von 3450 u. $2940 \text{ \AA}$ mit $\lg \epsilon = 3,5$ zeigt. Die Unters. des KJ_3 zeigt eine große lichkeit des Absorptionsspektrums mit demjenigen des CH_3J_3 , u. zwar ebenfalls Maxima 3500 u. $2900 \text{ \AA}$, $\lg \epsilon = 3,9$ sowie Erstrecken des Bandenkopfes ins Sicht-. Die ultraviolette Absorption des CH_3J erklären Vff. aus der Annahme, daß die Bindung schwach genug ist, um durch verhältnismäßig geringe Energiequanten iert zu werden (vgl. vorst. Ref.). Die allgemeine Absorption der Halogenderivv. Camphers u. Methans sowie die Verstärkung der allgemeinen Absorption durch äufung von negativen Atomen ließe sich demnach durch Aktivierung oder be- ende Ionisation einer einfachen Bindung erklären, wie sich die Ketonbande des

Camphers aus der Aktivierung der C=O-Doppelbindung (l. c.) erklären läßt. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 622—30. Cambridge, Univ.)

Harold Gordon Rule und **John Smith**, *Optische Aktivität und Polarität substituierender Gruppen*. III. *Acetophenon-o-carbonsäurementhylester*. (II. vgl. S. 913.) untersuchen die Drehung des *Acetophenon-o-carbonsäurementhylesters* für Na-Licht die drei Hg-Linien in geschmolzenem Zustande sowie in Bzl., Aceton oder A. gel. Verb. zeigt in dem untersuchten Teil des Spektrums n. u. einfache Rotationsdispersion. Für geschmolzenen Ester $[M]_D^{94} = -261^\circ$; in Bzl. (5%) $[M]_D^{20} = -284^\circ$; in (20%) $[M]_D^{19.5} = -267^\circ$; in Aceton (5%) $[M]_D^{18.8} = -253^\circ$. Die Acetylgruppe erweist somit, wie auch andere positive o-Substituenten, die Drehung des Menthylbenzoats. Auffallend ist die nahe Beziehung zwischen der Reihe für den Einfluß von Substituenten auf die Drehung des Menthylbenzoats $\text{NO}_2 > \text{COOH} > \text{COCH}_3 > \text{H} > \text{CH}_3 > \text{Br} > \text{Cl} > \text{F} > \text{OCH}_3$ u. der Reihe für Benzolsubstitution $\text{NO}_2, \text{COOH}, \text{COCH}_3, \text{H}, \text{CH}_3, \text{Br}, \text{J}, \text{Cl}, \text{F}$.

Versuche. Nach GABRIEL u. NEUMANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **26**. [1893]) hergestellte Acetophenon-o-carbonsäure vom F. 112° liefert mit HCl verestertes *Acetophenon-o-carbonsäurementhylester*, $\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{O}_3$, aus PAe., F. 92° , l. in Bzl., w. in den übrigen organ. Lösungsm. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 553—56. Edinburgh, Univ.)

Bawa Kartar Singh und **Amar Nath Puri**, *Untersuchungen über die Abhängigkeit der optischen Rotationskraft von der chemischen Konstitution*. VI. *Die Rotationskraft von Phenyl-, o-, m- und p-Tolyl- und β -Naphthylderivaten des d-Campherimids und der d-Campheramidsäure*. (V. vgl. Journ. Chem. Soc. London **125**. 1895; C. 1916. II. 2466.) Untersucht wurde die Drehung einer Anzahl von Arylderiv. des *d-Campherimids* u. der *d-Campheramidsäure* in verschiedenen Lösungsm. u. bei verschiedenen Konz. Substitution einer Arylgruppe am Imido-H erhöht die Drehung, u. zwar hauptsächlich Substitution der Benzylgruppe (l. c.). Der Einfluß des Lösungsm. ist im Falle der *d-Campheramidsäure* bedeutend, u. zwar im gleichen Sinne wie die Drehung in der Lösungsm.: Methylalkohol (32,5) > Äthylalkohol (26,0) > Aceton (21,2). Im Falle der *d-Campher-p-tolylamidsäure* in A. u. Methylalkohol fällt die Drehung mit steigender Konz. Entgegen der sonst beobachteten Regelmäßigkeit, daß die Drehung cycl. Deriv. höher ist als diejenige der entsprechenden offenen Verbb., erhöht die Drehung der Arylderiv. des *d-Campherimids* beim Öffnen zu *Campheramidsäure* beträchtlich, am meisten im Falle *Campher- β -naphthylimid* 60° — *Campher- β -naphthylamidsäure* 229° . — **Versuche**. *Camphersäureanhydrid* u. *Anilin* liefern 4—5 Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt *d-Campherphenylamidsäure* (*Campheranilsäure* aus verd. A. F. 209—210°. Analog *d-Campher-p-tolylamidsäure*, F. 214—215°, *d-Campher-m-tolylamidsäure*, F. 208—209° u. *d-Campher-o-tolylamidsäure*, F. 196—197°, *d-Campher- β -naphthylamidsäure*, F. 212—213°. Ferner aus *Camphersäureanhydrid* und den substituierten Aminen 2—3 Stdn. bei 215—230° *N-Phenylcamphersäureimid*, verd. A. F. 117—118°, *N-o-Tolylcamphersäureimid*, F. 105—106°, *N-m-Tolylcamphersäureimid*, F. 121—122°, *N-p-Tolylcamphersäureimid*, F. 127—128° u. *N- β -Naphthylcamphersäureimid*, F. 171—172°. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 504—08. R. A. Shaw Coll. Cuttack.)

G. Dupont, **L. Desalbres** und **A. Bernette**, *Beitrag zur Kenntnis der krysallisierten Salze der Abietinsäure*. I. Über die Darstellung eines krysallisierten Natriumabietats und seine Benützung für die Bestimmung der Abietinsäure in den Harzen. Setzt man eine alkoh. Lsg. der *Abietinsäure* mit $\frac{1}{4}$ der für die Neutralisation notwendigen Menge NaOH, so erstarrt nach einiger Zeit bei genügender Konz. die ganze Fl. bei geringerer Konz. scheiden sich Nadelbüschel aus. Das Salz ist ein saures Natriumabietat der Formel $3\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2 \cdot \text{C}_{20}\text{H}_{29}\text{O}_2\text{Na}$, F. 170 — 175° , $[\alpha]_D^{25} = -80^\circ$ (2,5%ig. Lsg.), unl. in w. sd. A., sonst swl. Wird erst durch überschüssige starke Essigsäure zerlegt. — Die

n Terpentinsäuren (Lävo- u. Dextropimarsäure, Sapinsäuren, Aleppinsäure) kein unl. Na-Salz, wohl aber die Zwischenstufen zwischen ihnen u. der Abietinsäure, die man bei ihrer Isomerisierung durch starke Säuren oder Erhitzen erhält, Gemische von Aleppoabietinsäure u. Abietinsäure. Die reinen Zwischenstufen, bekanntlich mit der Abietinsäure isomorph sind, geben dagegen keine sauren Salze. — Das Salz gestattet die Trennung der Abietinsäure von anderen, nicht mit ihr isomeren Harzsäuren u. selbst ihre quantitative Best. in den Harzen, wie die folgenden zeigen. — Gewöhnliches Kolophonium gibt zunächst nur Spuren, dagegen nach Isomerisierung durch HCl reichlich saures Salz. Verss. mit 1 Teil Kolophonium Teilen sd. A. haben ergeben, daß für eine gegebene Säurekonz. die Ausbeute mit Dauer der Einw. zuerst wächst, ein Maximum durchschreitet u. wieder fällt, indem Abietinsäure durch die HCl weitergehend verändert wird. Die Höchstausbeute 75% an saurem Salz wurde bei 3% HCl in ca. 12 Min. erreicht, u. zwar mit Kolonium aus *Pinus maritima*, das ca. 9% nicht in Abietinsäure übergehende Dextrosäure enthält. Aleppokolophonium, welches nur Aleppinsäure enthält, gab da 86% Ausbeute. — Dieses neue Salz hat vielleicht auch techn. Bedeutung. (Bull. Chim. de France [4] 39. 488—92.)


LINDENBAUM.

G. Dupont und L. Desalbres, *Beitrag zur Kenntnis der krystallisierten Salze der Abietinsäure*. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Eine Anzahl neuer Salze der Abietinsäure dargestellt. — $3\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2$, $\text{C}_{20}\text{H}_{29}\text{O}_2\text{K}$. Wird erhalten wie das Na-Salz. Seidige Ln, F. 180° , $[\alpha]_D = -90^\circ$ (in A.), leichter l. als das Na-Salz, besonders in W. u. $\text{C}_{20}\text{H}_{29}\text{O}_2\text{NH}_4$. Beim Verdampfen der mit NH_4OH neutralisierten alkoh. Lsg. erleidet eine gelatinöse M., die sich langsam in kleine Prismen umwandelt. F. gegen $[\alpha]_D = -90^\circ$ (in A.). — $\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2$, CH_3NH_2 , nach Verdampfen der alkoh. Lsg. Ln aus Bzl., F. 110° , swl. in Bzl., PAe., ll. in A., unl. in W. — $\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, Ln, F. 102° , $[\alpha]_D = -95,7^\circ$, l. in A., Ä., Bzn. — Die folgenden Salze entstehen durch doppelte Umsetzung aus dem sauren K-Salz in alkoh. Lsg. — $(2\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2)_2\text{Ca}$, weißes Pulver, F. gegen 190° (Zers.), zl. in A., wl. in Bzn. — $(2\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2)_2\text{Sr}$, F. 155° , l. in h. A., k. Bzn. — $(\text{C}_{20}\text{H}_{29}\text{O}_2)_2\text{Ba}$, Zers. gegen 200° , unl. in Bzn. — $(\text{C}_{20}\text{H}_{29}\text{O}_2)_2\text{Zn}$, F. 190° , wl. in A., l. in Bzn. — $(\text{C}_{20}\text{H}_{29}\text{O}_2)_2\text{Pb}$, Nadeln, bei 150° , l. in h. A., ll. in Bzn., sehr oxydabel. — $(\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2)_2\text{Cu}$, grünes er. — *Ni-Salz*, neutral, amorph, l. in A., ll. in Bzn. — Vff. geben eine Erklärung die B. der verschiedenartigen Salze; hydrolyt. Vorgänge sind dabei von besonderer Bedeutung. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 492—95.)

LINDENBAUM.

Harold Ainsworth Harrison und Harold Wood, *Unsymmetrisch substituierte Nitro- und Diaminoderivate in der Stilben- und Tolanreihe*. I. Die Eliminierung Chlorwasserstoff aus 3,4'-Dinitrostilbendichlorid. Dichloride ungesätt. α,β -Säuren entstehen beim Entziehen von HCl stets das β -Cl. Vff. untersuchen, wie sich die Verhältnisse gestalten, wenn dem 3,4'-Dinitrostilbendichlorid HCl entzogen wird u. finden Übereinstimmung mit der Polaritätstheorie, daß stets α -Chlor-4,3'-dinitrostilben entsteht. CULLINANE (Journ. Chem. Soc. London 123. 2053; C. 1923. III. 1610) für sein 3,4'-Dinitrostilben F. 155° u. Löslichkeit mit grüner Farbe in verschiedenen n. Lösungsmm. an. Vff. haben jedoch nach seiner Vorschrift die Verb. vom F. 217° erhalten u. konnten nur schwach gelb gefärbte Lsgg. beobachten. Als Nebenprodd. Rk. entstehen p-Nitrotoluol u. die Piperidinsalze der beiden stereoisomeren 3,4'-Di- α -phenylzimtsäuren. Letztere konnten zu obigem Dinitrostilben entcarboxyliert werden. Das Nitrostilben liefert mit Cl ein Gemisch der Dichloride, aus welchem sich Pyridin nur ein Monochlordinitrostilben, I oder II herstellen läßt. Das Chlorstilben reagiert mit w. konz. H_2SO_4 zers. 4-Nitrophenyl-3-nitrobenzylketon (III). Die Konst. Verb. folgt aus der Tatsache, daß das intermediär gebildete Aldol, 3,4'-Dinitro- α,β -phenyläthylalkohol, als Nebenprod. bei der Stilbenkondensation isoliert, u. aus diesem die Konst. V besitzend, bei der Oxydation das isomere 3-Nitrophenyl-4-nitro-


benzylketon (IV) liefert. Beide Ketone konnten mit PCl_5 in die Monochlordinitrostilbene übergeführt werden u. hieraus läßt sich ableiten, daß dem obigen Monochdinitrostilben Konst. I zukommt.



Versuche. p-Nitrophenylessigsäure u. m-Nitrobenzaldehyd geben mit Piperidin 1 Stde. auf 110° erhitzt 3,4'-Dinitrostilben, $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2$, aus Eg., Nitrobenz. Pyridin gelbe Nadeln vom F. 217° , wl. in Bzl., Aceton u. Chlf., swl. in A. Als Nebenprod. entstehen 1. 3,4'-Dinitro- α,β -diphenyläthylalkohol, $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_5\text{N}_2$ (V), aus Eg. u. F. 147 — 148° , l. in A., Eg. u. Aceton, wl. in Ä. u. Bzl. Erhitzen mit Piperidin u. Behandlung mit k. konz. H_2SO_4 liefert das obige Nitrostilben. 2. Die Piperidinderivate der zwei stereoisomeren 3,4'-Dinitro- α -phenylzimsäuren, $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_6\text{N}_3$ von den FF. bis 169° (freie Säure F. 221°) u. 204 — 205° (Zers.) (freie Säure F. $205,5^\circ$). 3,4'-Dinitrostilben gibt in Chlf. suspendiert u. mit Cl behandelt α -3,4'-Dinitrostilbendichlorid, $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2\text{Cl}_2$, aus Eg., F. 207° u. β -3,4'-Dinitrostilbendichlorid, nicht ganz rein, F. bis 138° . Das Gemisch der Dichloride bildet mit Piperidin 90 Stdn. erhitzt α -Chlor-dinitrostilben, $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{O}_4\text{N}_2\text{Cl}$ (I), aus Eg., F. 161° , wl. in A., Ä. u. CCl_4 . I gibt mit k. H_2SO_4 1 Stde. auf 50° erwärmt 4-Nitrophenyl-3-nitrobenzylketon, $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_5\text{N}_2$ (IV), aus A. u. Eg., F. 134° , ll. in organ. Lösungsmitt. mit Ausnahme von Ä., PAe. u. Semicarbazon, aus A., F. 219° . Die Oxydation von V (s. o.) führt zu 3-Nitrophenyl-nitrobenzylketon, $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_5\text{N}_2$ (IV), aus 95% A., F. 102° , Semicarbazon, aus A., F. 219° . IV gibt mit PCl_5 α -Chlor-3,4'-dinitrostilben, $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{O}_4\text{N}_2\text{Cl}$ (II), aus Eg., F. 162° , Mischmelzpunkt mit I 142 — 145° . (Journ. Chem. Soc. London 1926. 577—83. Manchester, Univ.)

TAUB

Harold Archibald Scarborough und William Alexander Waters, Die Chlorierung und Bromierung des 4-Aminodiphenyls. Die Chlorierung des 4-Acetylaminodiphenyls mit NaOCl führt zu N-Chlor-4-acetylaminodiphenyl (I), welches sich leicht zu 3-Chlor-4-acetylaminodiphenyl (II) umlagert. Aus II läßt sich durch weitere Chlorierung wieder ein N-Chlorderiv. erhalten, welches jedoch unbeständig ist u. zerfällt, ohne daß Ringsubstitution einträte. Das entsprechende N-Brom-4-acetylaminodiphenyl entsteht nur mit Schwierigkeiten u. in unreinem Zustande. Die direkte Chlorierung der Acetylbase gibt II u. weiter 3,5,4'-Trichlor-4-acetylaminodiphenyl (III). Die Bromierung der freien Base führt zu 3,5-Dibrom-4-aminodiphenyl u. 3,5,4'-tribrom-4-aminodiphenyl; das Acetylderiv. der Base bildet bromiert 4'-Brom-4-acetylaminodiphenyl; bzw. sein Acetylderiv., indem auffallenderweise der erste Substituent an die 4'-Stellung eintritt.



Versuche. 4-Acetylaminodiphenyl gibt mit NaOCl chloriert N-Chlor-4-acetylaminodiphenyl, $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{ONCl}$ (I) aus CCl_4 , F. $129,5^\circ$. Beim Erhitzen in A. + Eg. geht daraus 3-Chlor-4-acetylaminodiphenyl, (II), aus verd. A., F. 147° . (Die Verbindung entsteht auch durch direkte Chlorierung des 4-Acetylaminodiphenyls.) Durch Erhitzen mit HCl 3-Chlor-4-aminodiphenyl, $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{NCl}$, aus verd. A., F. 71° , Hydrochlorid.

(Zers.). Aus der Aminoverb. *3,4-Dichlordiphenyl*, $C_{12}H_8Cl_2$, Kp.₁₅ 195—200°, u. weiter durch Oxydation *3,4-Dichlorbenzoesäure*. Die direkte Chlorierung *Acetylaminodiphenyl* mit gasförmigem Cl führt zu *3,5,4'-Trichlor-4-acetylaminodiphenyl*, $C_{14}H_{10}ONCl_3$ (III), aus Aceton, F. 236°; hieraus durch Hydrolyse *3,5,4'-Trichlor-4-aminodiphenyl*, $C_{12}H_8NCl_3$, aus A., F. 128°. *4-Acetylaminodiphenyl* liefert in verd. Eg., F. 145° u. *3,4'-Dibrom-4-acetylaminodiphenyl*, $C_{14}H_{11}ONBr_2$, aus Aceton, F. 119°, *Acetylderiv.*, $C_{14}H_{11}ONBr_2$, aus A., F. 162°. Durch Eliminierung der Bromgruppe *3,5-Dibromdiphenyl*, $C_{12}H_8Br_2$, Kp.₁₅ 208°, F. 15°, durch Oxydation *3,5-Dibrom-4-aminodiphenyl*, $C_{12}H_8NBr_2$, aus verd. Aceton, F. 149°, *Acetylderiv.*, $C_{14}H_{10}ONBr_2$, aus Aceton, F. 256°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 557—62. Cambridge, England.)

TAUBE.

Leon Pinto, *Über Benzidinderivate des Thioharnstoffs*. Kurzes Ref. nach C. r. Acad. des sciences vgl. S. 1643. Es ist nur nachzutragen, daß der *Dibenzidinderivat* maßanalyt. mittels $NaNO_2$ -Lsg. (Tetrazotierung) bestimmt werden kann. Temp. kann dabei auf 12—13° steigen, ohne daß Zers. eintritt. (Bull. Soc. Chim. France [4] 39. 470—73.)

LINDENBAUM.

Louis Desvergues, *Über einige physikalische Eigenschaften der Nitronaphthaline*. Bestimmt die FF. verschiedener Nitronaphthalinderiv. u. ihre Löslichkeiten in H_2CO_3 , C_2H_5 , Aceton, CH_3OH , A. 96%, A. absol., Bzl., $CHCl_3$, Ä., Pyridin, CS_2 , Toluol. — *α-Mononitronaphthalin*, F. 56,7° (BEILSTEIN u. KUHBERG finden AGUIAR bezw. RICHTER 61°) fast unl. in W. wl. in A., CH_3OH ; ll. in den übrigen Lösungsm. — *1,5-Dinitronaphthalin*, F. 217,5° (RICHTER 216°, BEILSTEIN u. KURW 217°). Fast unl. in W.; swl. in den organ. Lösungsm. — *1,8-Dinitronaphthalin*, F. 171,5°. Fast unl. in W.; wl. in Aceton u. Pyridin, swl. in den übrigen Lösungsm. — *1,3,8-Trinitronaphthalin*, F. 216,5—217°. (BEILSTEIN u. KUHBERG fanden WÜRTZ 218°.) Fast unl. in W.; swl. in den organ. Lösungsm. — *1,4,5-Trinitronaphthalin*, F. 147,2°, fast unl. in W.; ll. Aceton; swl. in den übrigen Lösungsm. Mit W. tritt teilweise Rk. ein. (Moniteur scient. [5] 16. 73—80.)

BRAUNS.

Mario Passerini, *Bildung von Nitrilen aus Oximen durch Kaliumcyanid*. (Vgl. 4.) Während Ketoxime auch durch längere Einw. von wss.-alkoh. KCN-Lsg. bei Wärme nicht verändert werden, reagieren *Aldoxime* mit wss.-alkoh. KCN-Lsg. bei Wärme unter B. von Nitrilen. Ein Teil des Oxims tritt nicht in Rk., da es mit dem KCN Blausäure freimacht u. das K-Salz des Oxims bildet, welches mit KCN nicht mehr reagiert. Der Rk. selbst geht nach Annahme des Vfs. ähnlich wie bei der Anlagerung von KCN an die $C \equiv N$ -Gruppe in den Pernitrosoderiv. (vgl. 4) die intermediäre B. eines Additionsprod. zwischen dem Aldoxim u. KCN, aus dem durch W.-Abspaltung das Nitril entsteht. Die Existenz dieses Zwischenprod. erklärt auch die Tatsache, daß die Nitrilbildung in gleicher Weise bei α - u. β -Aldoximen vor sich geht. Wss.-alkoh. Lsgg. von K_2CO_3 oder HCN geben keine Rk. nicht. — *Benzonitril* aus *α-Benzaldoxim* in wss.-alkoh. Lsg. mit KCN. — *Äurennitril*, C_8H_7ON , aus *α*- ebenso wie aus *β-Anisaldoxim* in wss.-alkoh. Lsg. mit KCN, F. 59—60°. — *2-Oxy-naphthyl-1-carbonsäurenitril*, $C_{11}H_7ON$, aus *β-2-Oxy-naphthyl-1-aldoxim* mit KCN, aus Bzl. Nadelchen, F. 154—155° unter Bräunung. (Rend. chim. ital. 56. 122—26. Florenz, Univ.)

LEHMANN.

Paul Sabatier und **J. F. Durand**, *Über einen Versuch der katalytischen Hydrierung von Äthylenoxyd*. Vff. hofften Äthylenoxyd über Ni bei niedriger Temp. zu C_2H_5OH hydrieren zu können, da die Isomerisierung zu $CH_3 \cdot CHO$ erst gegen 400° beginnt. Tats. erfolgt schon bei 125—150° Rk., aber es wurden erhalten: 66% *Acetaldehyd*, H_2O , 19% *Crotonaldehyd* u. 7% höhere Kondensationsprodd. des Acetaldehyds.

Ni verhält sich also hier ähnlich wie Al_2O_3 , das bekanntlich die Isomerisierung des Äthylenoxyds zu $\text{CH}_3 \cdot \text{CHO}$ auf ca. 200° herabdrückt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 826.)

LINDENBAU

Cedric Stanton Hicks, *Tautomerie des Thyroxinmoleküls*. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 771; C. 1925. II. 178.) Gemessen wurde die Absorption von *Ac thyroxin* in 75% A., *Ketothyroxin* (durch Lösen von Thyroxin in 75% A. mit Äquivalenten HCl) u. von einem Thyroxin in 60% A., welches durch Einleiten CO_2 in eine Lsg. von Thyroxin in seinem Äquivalent NaOH (l. c.) erhalten worden war. Die Absorptionskurven machen das Vorliegen einer Ketoenoltautomerie Lactim-H wahrscheinlich. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 643—45. Cambridge Univ.)

TAUB


C. A. Rojahn, *Über die Isomerieverhältnisse in der Pyrazolreihe*. Wie früher getan (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2959; C. 1923. I. 439) bilden sich bei der Methylierung des 3-Methyl-5-chlorpyrazols zwei isomere Dimethylchlorpyrazole. Da sich nach bisherigen Anschauungen nur das 1,3-Dimethylpyrazol hätte bilden dürfen, muß durch den Eintritt des negativen Cl die Stabilitätsverhältnisse im Pyrazolkern verändert worden sein. Vf. fand nun, daß sich auch bei Anwesenheit einer COOH -Gruppe Pyrazolkern stets die zwei möglichen isomeren 1-Methylpyrazolcarbonsäuren bilden.

Versuche. 1,5-Dimethylpyrazolcarbonsäure-3. I. Aus Na-Acetonoxal-Methylhydrazinsulfat u. wss. NaOH. Aus h. W. F. 176—178°. II. Durch Methylierung der 3(5)-Methylpyrazolcarbonsäure-5(3) (LIEBIGS Ann. 279. 217 [1894]) mit Dimethylsulfat u. wss. NaOH, neben der isomeren 1,3-Dimethylpyrazolcarbonsäure vom F. 207° . Bei der Alkylierung mittels p-Toluolsulfonsäuremethylester u. CH₃OH auf Wasserbad konnte nur die Säure vom F. 207° gefaßt werden. — 1,3-Methylpyrazol. Aus Säure 176—178° durch Erhitzen über den F. Öl, Kp. 145—151°. — Platin-salz, F. 253° . — Jodmethylat, F. 251° . — Pikrat, F. 172° . — 1-Methylpyrazolcarbonsäure-5, durch Oxydation des 1,5-Dimethylpyrazols mittels KMnO_4 -Lsg. W. F. 222° . — Pikrat des 1,3-Dimethylpyrazols. Aus dem durch Erhitzen der 1,3-methylpyrazol-carbonsäure-5 (F. 207°) über den F. entstehenden öligen Pyrazol. F. 171° , aus dem entsprechenden Ester (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 3593; C. 1900. 324) mit Dimethylsulfat u. wss. NaOH. Ausbeuteverhältnis: 3-Carbonsäure: 5-Carbonsäure = 6:1. — Pikrat des 1,4-Dimethylpyrazols, aus dem durch trockne Destillation der beiden Säuren entstehenden öligen Pyrazol. Aus W. F. 165° . — 1,5-Dimethyl-3-phenylpyrazolcarbonsäure-4 (I). Benzoylacetessigeste u. Methylhydrazinsulfat in NaOH-Lsg. Der zunächst entstehende ölige Ester wird verseift. Aus verd. A. Nadeln, F. bis 198° . — 1,5-Dimethyl-3-phenylpyrazolcarbonsäureester-4, durch Methylierung der 3(5)-Phenyl-5(3)-methylpyrazolcarbonsäure (LIEBIGS Ann. 279. 251 [1894]) mit PAe. F. 63—64°. Bei Verseifung entsteht vorige Säure. — 1,3-Dimethyl-5-phenylpyrazolcarbonsäure-4. Neben dem vorigen festen Ester wurde Öl erhalten, das bei Verseifen Säure vom F. 176—177° gab. — Pikrat des 1,5-Dimethyl-3-phenylpyrazols. Aus dem nicht isolierten öligen Pyrazol, das durch Erhitzen von I über den F. entsteht. Aus verd. A. Nadeln, F. 182° . — Pikrat des 1,3-Dimethyl-5-phenylpyrazols. In analoger Weise aus der 1,3-Dimethyl-5-phenylpyrazol-carbonsäure-4. Aus verd. A. lange Nadeln, F. 168—170°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 607—11. Braunschweig, Pharmaz. Techn. Hochschule.)

ROJAH


Isidore Elkanah Balaban, *Die Einwirkung von Alkaliarseniten auf einige halogenierte organische Verbindungen*. (Vgl. S. 1809.) Aliphatische u. aromatische Sulfonsäuren lassen sich durch Einwirkung von Alkalisulfiten auf entsprechende, halogenierte Verbindungen herstellen. Vers., auf diesem Wege Arsenverbindungen zu erhalten, schlugen in keinem Falle konnte die Bildung solcher nachgewiesen werden. 4-(5)-Methyl-5(4)-methylglyoxalin (I) u. 5-Chlor-1-methyl-2-chlormethylglyoxalin (II) geben mit A

nur die entsprechenden Alkohole. 5-Chlor-4-nitro-1-methylglyoxalin (III) mit K-Arsenit erhitzt 4-Nitro-5-oxy-1-methylglyoxalin (IV). 2,4-Dinitrobrom liefert analog 2,4-Dinitrophenol, 8-Chlorcafein in A. mit K-Arsenit erhitzt u. 8-Äthoxycfein. Phthalbrommethyimid gibt in Aceton mit K-Arsenit Artet Äthylendiphthalimid (V), während mit 20% Na-Sulfit Phthalimidomethansäure neben Phthalsäure entsteht. Verss., die Sulfonsäure zur Aminomethansäure zu verseifen, verliefen resultatlos.



Versuche. 4(5)-Methyl-5(4)-chlormethylglyoxalin u. 5-Chlor-1-methyl-2-chlorglyoxalin geben in absol. oder verd. A. mit K-Arsenit behandelt 4(5)-Methylmethylglyoxalin, Pikrat, F. 180° u. 5-Chlor-1-methyl-2-oxymethylglyoxalin, F. 148—149°. 5-Chlor-4-nitro-1-methylglyoxalin liefert in absol. A. mit 8 Stdn. rückfließend erhitzt 4-Nitro-5-oxy-1-methylglyoxalin, (IV), Lieberche Rk. positiv, in alkoh. Lsg. mit FeCl₃ braune Färbung. Die sehr unbeständige gibt ein K-Salz, C₄H₄O₃N₃K. 1/2 H₂O, Zers. bei 292° u. Na-Salz, C₄H₄O₃N₃Na, bei 320°. 2,4-Dinitrobrombenzol gibt wie oben 2,4-Dinitrophenol vom F. 113—114°, 8-Chlorcafein—8-Oxycafein, F. 335° u. 8-Äthoxycfein, F. 140—142°. Brommethyimid bildet mit K-Arsenit in Aceton rückfließend erhitzt Äthylendiphthalimid, C₁₈H₁₂O₄N₂ (V), aus Eg., F. 230°, wl. in h. W., unl. in Ä. Die Br-Verb. mit 20% Na-Sulfit 13/4 Stdn. erhitzt Phthalimidomethansulfonsäure, C₉H₇O₅NS, mit 5 H₂O, wasserfrei kein F. bis 320°, ll. in W., swl. in A., Ba-Salz. (Journ. Soc. London 1926. 569—73. London, Nat. Inst. für Med. Unterss.) TAUBE.



Robert Fergus Hunter, Halogenierung des 2,6-Dimethylbenzbisthiazols und des phenylimino-2,4-diphenyltetrahydro-1,2,4-thiodiazols. Der schwach ungesätt. Charakter N-Atome in den heterocycl. Ringen von I u. die hieraus folgende Unedigkeit des Tetrabromids II (vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 1318; C. 1925. 68) führt Vf. auf die Tatsache zurück, daß die beiden Thiazolringe sich gegenabsättigen. Diese Verhältnisse müßten sich bei einer Verb., in der die Thiazolgetrennt sind, ändern. 2,6-Dimethylbenzbisthiazol (III) liefert ein verhältnismäßig ediges Hexabromid (IV), welches sein Br an der Luft erst nach einigen Stdn. zersetzt. 3,5-Diphenylimino-2,4-diphenyltetrahydro-1,2,4-thiodiazol gibt mit Br ein Bromid (V). Wenn die angenommene Struktur richtig ist, so sollte eine analoge Verb. weniger J enthalten, indem die Affinität des J zum S geringer, andererseits die Bildung zu —J₃-Bildg. größer ist als beim Br. In der Tat entsteht mit J nur ein Jodid (VI).



Versuche. 2,6-Dimethylbenzbisthiazol gibt in Chlf. mit Br behandelt 2,6-


Dimethylbenzisthiazolhexabromid, $C_{10}H_8N_2Br_6S_2$ (IV), F. 117—118° (Zers.), l. in an der Luft einige Stdn. beständig. Das Thiodiazol (s. o.) gibt in Chlf. mit Br 3,4-phenylimino-2,4-diphenyltetrahydro-1,2,4-thiodiazoloctabromid, $C_{26}H_{20}N_4Br_8S$ (V), F. bis 105°. Die Lsg. in Eg. verliert beim Kochen Br u. HBr u. gibt eine Verb. F. 200° (Zers.), wahrscheinlich ein Bromsubstitutionsderiv. Das Thiodiazol liefert Eg. mit J 3,5-Diphenylimino-2,4-diphenyltetrahydro-1,2,4-thiodiazolhexajodid, $C_{26}H_{20}N_4J_6S$, schwarze Prismen, F. 122° (Zers.), ll. in Ä., Essigester u. A. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 533—37.)

Robert Fergus Hunter, *Bromierung einiger 5-substituierter 1-Phenylbenzthiazole*. (Vgl. vorst. Ref.) BOGERT u. ABRAHAMSON (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. C. 1922. III. 150) haben aus 1-Phenylbenzthiazol ein Tetrabromid I erhalten, welches beim Kochen mit verd. Eg. 5-Brom-1-phenylbenzthiazol liefert. Vf. untersucht mehr den Einfluß, welchen der 5-Substituent in II auf die Fähigkeit zur B. von Additionsprodd. ausübt. Bei $R=NO_2$ geht der ungesätt. Charakter so weit zu, daß in Eg. überhaupt kein Br addiert wird, in Chlf. unter Schwierigkeiten ein bromid III entsteht. $R=Br$ erlaubt die B. eines sehr unbeständigen Tetrabromids $R=NH_2$ mit Leichtigkeit die B. eines stabilen Tetrabromids.



Versuche. 1-Phenylbenzthiazol (l. c.) gibt in Chlf. mit Br behandelt 1-Phenylbenzthiazoltetrabromid, $C_{13}H_9NBr_4S$, F. 126° (Zers.) u. aus dem Filtrat ein Tetrabromid vom F. 153° (Zers.). 5-Nitro-1-phenylbenzthiazol vom F. 188° gibt in Chlf. mit verd. Eg. digeriert 5-Nitro-1-phenylbenzthiazoldibromid, $C_{13}H_8O_2N_2Br_2S$, Sintern bei 120°, F. Das Bromid verliert an der Luft Br, beim Kochen in Eg. entsteht das ursprüngl. Nitrothiazol zurück. 5-Brom-1-phenylbenzthiazol liefert in Chlf. 5-Brom-1-phenylbenzthiazoltetrabromid, $C_{13}H_8NBr_5S$, F. 206—208° (Zers.), verliert an der Luft sofort ferner ein Tribromid, $(C_{13}H_8NBr_4S)_2$, F. 208° (Zers.). Verfärbung bei 85°, Br-V bei 175°. 5-Amino-1-phenylbenzthiazol, F. 208° (nicht untersuchtes Benzyliden vom F. 190°) gibt in Chlf. mit Br 5-Amino-1-phenylbenzthiazoltetrabromid, $C_{13}H_{10}N_2Br_4S$, F. 216°, Verfärbung bei 180—190°; aus dem Filtrat ein Tetrabromid vom F. bis 211°. Das erste Bromid ist gegen Luft außerordentlich beständig, in sd. Eg. steht das zweite Bromid vom F. 210°. Dieses liefert bei weiterem Erhitzen mit verd. Eg. ein Dibromid, Sintern bei 170°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 537—41. Kensington, Imp. Coll. of Science & Techn.)

W. J. S. Naunton, *Beitrag zum Reaktionsmechanismus bei der Bildung von phenylguanidin und Phenylsenföl aus Thiocarbanilid*. Vf. wendet sich gegen die gemein übliche Annahme, daß das Triphenylguanidin bei obiger Rk. durch Kombination von unverändertem Thiocarbanilid u. durch Zerfall eines Teils desselben gebildetem Anilin entstehe. Vf. schreibt vielmehr der Natur des jeweils zur Entschweifung angewendeten Mittels entscheidenden Einfluß auf Verlauf u. Ausbeute der Rk. zu. Er nimmt an, daß speziell bei Einw. von HCl aus dem Thiocarbanilid freier H_2S abgespalten wird u. das so entstandene Carbodiphenylimid mit der Mercaptoform von unverändertem Sulfocarbanilid, von der Salze bereits erhalten worden sind, eine unbeständige Schwefelverbindung bildet, die in Triphenylguanidin u. Phenylsenföl zerfällt. Für das hyp. Zwischenprod. nimmt Vf. Formel I an. — In ähnlicher Weise, nämlich durch



mediäre B. eines Schwefelkomplexes, erklärt Vf. auch das Auftreten von Anilinthiazol im Rk.-Gemisch bei der Darst. von Mercaptobenzthiazol durch Erhitzen


carbanilid mit Schwefel im Autoklaven. Vf. nimmt an, daß gleichzeitig mit der trk., in der direkt unter Abspaltung von Anilin der Thiazolring gebildet wird, eil der Mercaptoform des Sulfocarbanilids sich mit dem Schwefel zu einem Thio-carbanilid verbindet von der Formel II, das in der Hitze unter Abspaltung von in Anilino benzthiazol zerfällt. (Journ. Soc. Chem. Ind. **45**. T. 34—35. Manchester.)

GRUNERT.

Jh. Courtot und C. Pomonis, *Untersuchung in der Reihe des Diphenylensulfids. enylensulfid (I)* wird von einem Gemisch aus 38% HNO_3 , 50% H_2SO_4 u. 12% W. tsächlich zu *Diphenylensulfinon* oxydiert, gelbliche Krystalle, F. 188—188,5°, k., ll. in sd. A., Bzl. Wird von $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ fast ganz wieder zu I reduziert, von MgBr nicht angegriffen. — Löst man jedoch I in 4 Teilen Eg. bei 60°, kühlt unter en auf 30—40° ab (fein verteilte Ausscheidung) u. gibt 1,5 Mol. 90—93%ig. HNO_3 erhält man durch Fällen mit W. außer 10% unverändertem I nur 40% Sulfinon. Berdem 40% *Nitrodiphenylensulfid*. Trennung durch h. A., in dem letzteres fast ist. Hellgelbe Nadeln aus Bzl., F. 183,5—184°. — *Aminodiphenylensulfid*. Mit 1 sd. ammoniakal.-alkoh. Lsg. Reinigung durch Extraktion der äth. Lsg. mit g. HCl u. Fällung mit Soda. Silberweiße Nadeln aus A., F. 131,5—132°, leicht tierbar. Kuppelt mit Naphthol AS rot, mit R-Salz bläulichrot, mit H-Säure t. *Acetylderiv.*, äußerst zarte hellgelbe Krystalle aus Bzl., F. 167—168°. — *rodiphenylensulfid*. 1. Durch Eintragen des Mononitroderiv. in 90—93%ig. HNO_3 90. 2. Man löst I in Acetanhydrid-Eg. (1:2) u. gibt bei 20—40° 2 Moll. 90%ig. HNO_3 Durch Trennung mit A. u. Bzl. erhält man 10% Sulfinon, 40% Mononitroderiv. 0% Dinitroderiv. Letzteres bildet Krystalle aus Eg., F. 324—325° (Zers.), meist — *Diaminodiphenylensulfid*. Mit Sn u. HCl bei 50—60°, Nd. in W. lösen, mit chüssiger NaOH 1:1 fällen. Aschgraue mkr. Nadeln aus A., F. 178° (Zers.), diazotierbar. Die Farbstoffe sollen mit denen aus Thiobenzidin (angeblich Diaminodiphenylensulfid) verglichen werden. — *Diacetylderiv.*, bräunlichgelbes er, F. 237—239° (Zers.), ll. in h. A., Bzl., unl. in Ä., Lg. Wird von CrO_3 in Eg. *iacetaminodiphenylensulfon*, F. 378°, oxydiert. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. -95.)

LINDENBAUM.

K. F. Schmidt, *Die Einwirkung von Sulfurylazid auf Benzol*. (Vgl. Ber. Dtsch. u. Ges. **55**. 1581; C. **1922**. III. 992.) Der schon früher untersuchte therm. Zerfall *Sulfurylazids* in Bzl. wurde in geräumigen Cu-Autoklaven durchgeführt. Bei reich- Verd. des Sulfurylazids mit Bzl. (50-fache Menge) trat in keinem Fall Explosion. Der bei 1-std. Erhitzen auf 140° entstehende Druck betrug durchschnittlich 14 at. entstandene Base wurde einwandfrei als *Pyridin* identifiziert; durch Vergleich len bei den früheren Verss. erhaltenen Prodd. ergab sich, daß das früher als „*Pseudo-*“ bezeichnete Prod. ebenfalls Pyridin war. Diese Ergebnisse erfahren eine Be- gung durch die Unterss. von CURTIUS u. BERTHO (S. 1995.) über die Einw. von onylazid auf aromat. KW-stoffe, wobei ebenfalls Pyridinbasen erhalten wurden. Zwischenprod. ist in beiden Fällen ein siebengliedriges, valenztheoret. ungesätt. gerungsprod. anzunehmen, das dann unter Abspaltung einer CH -Gruppe in Pyridin geht:



größte Teil des Ausgangsmaterials geht in humusartige u. harzige Prodd. über. (Dtsch. Chem. Ges. **58**. 2409—12. 1925. Åbo [Finnland], Schwed. Univ.) ZANDER.


R. Ciusa und G. Barattini, *Über die Doebnersche Reaktion*. V. (IV. vgl. Gazz. ital. **52**. II. 43; C. **1923**. I. 1091.) Besser als mit HCl u. SnCl_2 , wie bereits nnt, läßt sich die Red. der *Chinolinsäuren* zu *Py-Tetrahydrochinolinsäuren* mit g. Na-Amalgam durchführen. *Py-Tetrahydro- α -phenyl- β -naphthocinchoninsäure*,

$C_{20}H_{17}O_2N$, aus α -phenyl- β -naphthocinchoninsäurem Na mit Na-Amalgam, aus NaOH mit Eg., F. 224°. — Auch für die Red. des Chinolins u. seiner Homolog Tetrahydrogenverb. empfiehlt sich die Anwendung von Na-Amalgam. Py-Tetra- α -phenyl- β -naphthochinolinhydrochlorid, $C_{19}H_{17}N \cdot HCl$, aus α -Phenyl- β -naphthoch. mit 30/100ig. Na-Amalgam aus A. mit HCl weiße Blättchen, F. 234°, wl. in W. l. in h. Essigsäure, reduziert $KMnO_4$ u. $AuCl_3$, gibt in Lsg. von Essigsäure mit K. einen rotbraunen Nd. — Chloroplatinat, $(C_{19}H_{17}N \cdot HCl)_2PtCl_4$, gelbes mikrokry. Pulver. — Die nicht hydrierte Base gibt unter gleichen Bedingungen kein Hydroch. das entsprechende Chloroplatinat enthält ein Mol. Krystall-W. — α -Phenyl- β -naphthochinolin, aus Py-Tetrahydro- α -phenyl- β -naphthochinolin mit $KMnO_4$ in saurer L. sehr schlechter Ausbeute, fast quantitativ aus dem Hydrochlorid der Tetrahydrob. Eg. mit $K_2Cr_2O_7$, über das Chromat der nicht hydrierten Base u. daraus mit K_2CO_3 sd. A. zur freien Base, glänzende Blättchen, F. 186°. — Die Tetrahydrobase ka. Form ihres Chlorids auch aus Py-Tetrahydro- α -phenyl- β -naphthocinchoninsäure Erhitzen auf 230° im Vakuum u. Behandlung mit HCl hergestellt werden. Blättchen, F. 234°. (Gazz. chim. ital. 56. 131—34. Bari, Pharmaz. Inst. Univ.)

LEHMA

Otto Dischendorfer, Über das anomale Oxim des Dehydrodi- β -naphtholme. Der Vf. lehnt die Formeln I (J. ABEL, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 3477 [1892]) (KOLM u. OSTERSETZER, Monatshefte f. Chemie 39. 299; C. 1918. II. 620) schreibt dem Oxim des Dehydrodi- β -naphtholmethans die Konst. IV, also eines 3, Dibenzacridons zu. Dabei würde sich, unter Zugrundelegung der wahrscheinl. Formel für das Dehydrodi- β -naphtholmethan zunächst das n. Oxim III bilden, v. der Sauerstoff zum C-Atom wandern müßte (Analog: o-Nitrodiphenylmethan Acridon) u. Schließung zum Acridonring erfolgte. Eine Stütze für diese Auffa. ist die B. von Di- β -naphthylamin bei der Zn-Staubdest., das auch aus 3,4,7,8-D. acridon analog entsteht (STROHBACH, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 4157 [1901]).


Das Einw.-Prod. von Hydroxylamin auf Dehydro-[benzaldi- β -naphthol] i. n. Oxim. Der Eintritt von nur einer Phenylgruppe hat also die Bildungsmögl. des anomalen Oxims aufgehoben. Die im Ausgangsmaterial am mittelständ. Atom vorhandenen ein oder zwei H-Atome müssen bei der B. des anomalen Oxims umgesetzt werden. Dies ungezwungen nur durch die Acridonformel des „Oxims“ klärt werden.



Versuche. 3,4,6,7-Dibenzacridon, $C_{21}H_{13}ON$, nach der Vorschrift von (l. c.) erhalten, bildet orangefarbene rhomb., vielfach unter schiefen Winkeln verwach. Tafeln, fl. in alkoh. KOH, läßt sich aus Nitrobenz., Anilin oder Pyridin umkrystallisieren. Mit wss. HCl intensive Rotfärbung, alkoh. HCl löst zum T. Dehydrobenzaldi- β -naphthol, $C_{27}H_{19}O_2$, aus Phenyl-di- β -naphtholmethan (Benz. naphthol) mit Bromlauge, gelbe Nadeln aus Eg., F. 210—11° (unkorr.); unl. in Ä. u. Lg., wl. in A., gut in h. Eg. u. Aceton, fl. in Bzl., Pyridin u. Anilin. In H_2SO_4 mit gelbroter Farbe l. Oxim, $C_{27}H_{19}O_2N$, Nadelchen aus verd. Aceton, F. (Zers.). Unl. in verd. NaOH, CCl_4 , Lg. u. CS_2 , zl. in Ä., fl. in h. Bzl., Eg., A.


lin. Konz. H_2SO_4 löst nach anfänglicher Gelbfärbung zu rotgelber Lsg. (Ber. Chem. Ges. **59**. 774—77. Graz, Techn. Hochsch.) HARMS.

Monmohan Sen und Jñanendra Nath Rây, *N-alkylierte Amidine*. HOFN (Jahresber. Fort. Chem. **1865**. 414 u. Monatsberichte Berl. Akad. **1865**. 640) durch Kondensation von Anilin mit Acetanilid bzw. Benzanilid bei Ggw. von oder PCl_5 Diphenylacetamidin bzw. Diphenylbenzamidin erhalten. Vff. finden, diese Rk. eine allgemeine Herstellungsmethode für N-alkylierte Amidine dar- u. beschreiben eine Reihe neuer Amidine, welche durch Kondensation mit PCl_5 , P_2O_5 in sd. Xylol hergestellt sind. Die Rk. läßt sich auch auf sekundäre Amine anwenden. Acetanilid u. *m*-Toluidin geben dasselbe Reaktionsprod. wie Aceto-*m*-tolu- u. Anilin, ebenso verhalten sich Acetanilid—*p*-Nitroanilin u. *p*-Nitracetanilid- n. Acetanilid u. Phenylhydrazin geben wie oben kondensiert Diphenylacetamidin H_3 . Acetanilid u. Urethan kondensieren sich mit P_2O_5 in sd. Xylol zu I. Ferner n Vff. die Rk. auf die Beckmannschen Umlagerungsprodd. angewandt, wobei I Acetophenonphenylhydrazon, aus III Diphenylacetamidin entstehen sollte. Das Experiment zeigt, daß ausschließlich letzteres gebildet wird.




Versuche. Wie oben beschrieben wurden hergestellt u. wenn nicht anders angegeben, aus A. umkrystallisiert: $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_3$ (m), F. 103° ; $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_3$ (p), F. 90° ; $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_3$ (o), F. 138° ; $\text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2$ (p), aus Methylalkohol, F. 189° ; $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{H}_4\text{OC}_2\text{H}_5$ (p), F. 102° ; $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{N} : \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} : (\text{C}_6\text{H}_5)_2$, F. 92° ; (m) $\text{CH}_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{NH} \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$, F. 103° , ident. mit 1.; (m) $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_3$ (o), 101° ; (p) $\text{CH}_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_3$ (p), aus verd. A., F. 120° ; (p) $\text{CH}_3 \cdot \text{NHC}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2$ (m), aus verd. A., F. 134° ; (p) $\text{CH}_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{N} : \text{C}(\text{CH}_3) : (\text{C}_6\text{H}_5)_2$, F. 122° ; (p) $\text{C}_2\text{H}_5\text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{OC}_2\text{H}_5$ (p), F. 117° ; $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH} \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$; $\text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_3$ (o), F. 107° ; (p) $\text{BrC}_6\text{H}_4 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$ (o), F. 122° ; $(\text{C}_6\text{H}_5) : \text{N} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$ (m), die Base ist ein Öl, Pikrat, F. 157° ; (p) $\text{NO}_2 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$, F. 189° , ident. mit 4. Aus Acetamid u. Phenylhydrazin $\text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3) : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 646—48. Kalkutta, u. Manchester, Univ.) TAUBE.

T. M. Lowry, *Asymmetrische Stickstoffatome in natürlichen Produkten*. Alle in Natur vorkommenden opt.-akt. Verbb. verdanken ihre Aktivität einem asymm. om. Vf. weist darauf hin, daß die Salze des Nicotins außer dem asymm. C-Atom, dem die opt. Aktivität der freien Base herrührt, noch ein asymm. N-Atom enthalten, während im allgemeinen Verbb. mit asymm. N-Atomen nur synthet. hergestellt en. Die Formeln werden insofern bestätigt, als die Salze des Nicotins ein viel



Nicotin (Base)



Nicotinium-Ion

eres Rotationsvermögen, das auch von entgegengesetztem Vorzeichen ist als das freien Base, besitzen. Acetat $[\alpha]_D = +18,85^\circ$, Base $[\alpha]_D = -169^\circ$. Auch die Tatsache, daß die Rotationsdispersion „komplex“ u. die der Base einfach ist (vgl. LOWRY UNGH, S. 1114) wird durch die Formeln des Vfs. erklärt. (Nature **117**. 417. Cambridge, Univ.) JOSEPHY.

R. Willheim, *Über Nucleinsäuren aus Krebsgewebe*. (Auf Grund gemeinsam **A. Grünberg** ausgeführter Unterss.) Aus drei großen, je 1—2 kg schweren Tumoren wurden nach NEUMANN (Arch. f. Phys. 1899. 552) u. LEVENE u. JAKOBS (Biochem. Ztschr. 28. 127 [1910]) Nucleinsäure u. Guanylsäure isoliert. Für die Nucleinsäure aus den vorliegenden Krebsgeweben konnte die Formel $C_{48}H_{64}O_{32}N_{10}P_4$ aufgestellt werden, während die Zus. der n. Thymonucleinsäure $C_{43}H_{57}O_{30}N_{15}P_4$ ist. Die Herleitung des Verhältnisses P:N von 4:15 auf 4:10 erklärt sich, wie durch Hydrolyse nach FEULGEN (Ztschr. f. physiol. Ch. 102. 244; C. 1918. II. 862) festgestellt, durch das Fehlen der Pyrimidinbasen Cytosin u. Thymin. Andererseits kommen aber auch je eine Purinbase (Guanin u. Adenin) 2 Phosphorsäuremoll., während in der Thymonucleinsäure gesunder Organe auf ein Mol Base nur 1 Mol Phosphorsäure kommt. Die Natur des Kohlehydrats der vorliegenden Nucleinsäure konnte nicht exakt geklärt werden. Nur ist durch Ausbleiben der Orcinrk. das Vorhandensein eines Kohlehydrats mit 6 C-Atomen wahrscheinlich gemacht. Bemerkenswert ist, daß das Hydrolysat deutliche Phenolrk. zeigte (nach MILLON Rotfärbung, mit $FeCl_3$ Grünfärbung). Die der Guanylsäure des normalen Gewebes entsprechende Verb. gab positive Kohlenhydratrk. nach MOLISCH-UDRANSKY, positive Bialische Orcinprobe, positive Murexide- u. negative Biuret- u. Dagegen führte die Elementaranalyse zu Werten, die von Guanylsäure bedeutend abwichen, nämlich $C_{36}H_{45}O_{23}N_7P_2$ statt $C_{10}H_{13}O_8N_5P$. Die Hydrolyse mit Sulfitleauge führte zur Isolierung von Guanin u. Thymin in wahrscheinlich 1:1 molekularem Verhältnis. Auch in diesem Hydrolysat waren phenolartige Körper nachweisbar. — Die Färbung bei der Tollensschen Naphthoresorcinprobe ließ Glucose vermuten, jedoch waren das spektrale Verh. u. die p-Bromphenylhydrazinprobe nicht eindeutig, so daß die Natur des Kohlehydrates noch nicht feststeht. Eine Klärung der auffallenden Tatsache, daß an Stelle der erwarteten Guanylsäure Gemenge oder eine Verb. gefunden wird, die aus einem Guanin- u. einem Thymin-Mononucleotid besteht, könnte darin gesehen werden, daß durch die Kalilaugung der Aufarbeitung statt der Guanylsäure allein ein Thyminnucleotid mit ihr zusammen abgesprengt wird, da FEULGEN festgestellt hat, daß ursprünglich das große Mol. Guanylnucleinsäure vorliegt. (Biochem. Ztschr. 163. 488—501. 1925. Wien, Univ.)

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

L. Michaelis, *Die Bedeutung des Massenwirkungsgesetzes für die Kinetik der Saccharase*. Die Abhandlung stellt eine Antwort u. Zurückweisung der Kritik dar, welche HEDIN (S. 126) an der Anwendung des Massenwirkungsgesetzes auf enzymatische Rk. übte. (Vgl. a. JOSEPHSON, S. 688.) Da das Massenwirkungsgesetz ein Gleichgewichtsgesetz für unendliche kleine Konz. ist u. nur so lange gilt, als für jede der beteiligten Molekülarten das Prod. aus molarem Vol. u. Druck bzw. osmot. Druck gleich ist, kann man streng genommen noch weiter gehen als es HEDIN tut, u. die Gültigkeit dieses „auf Konz. bezogenen“ Massenwirkungsgesetzes nicht nur für Enzymrk., sondern überhaupt ablehnen. Nur dadurch, daß die Abweichungen von diesem Grenzgesetz erst bei verhältnismäßig hohen Konz. die Grenzen der Anwendbarkeit überschreiten, wird dieses Idealgesetz zu einem unter gewissen Bedingungen brauchbaren Gesetz. Ein allgemein gültiges Gesetz kann durch Einführen der „Aktivitäten“ (LEWIS, BJERRUM) erhalten werden; man multipliziert die Konz. mit einem von der Konz. abhängigen so gewählten Faktor, daß K für beliebige Konz. konstant bleibt. In den meisten Fällen können allerdings diese Aktivitätsfaktoren prakt. gleich 1 gesetzt werden. Die Wahl dieser rein empir. Korrekturfaktoren muß stets so erfolgen, daß das Massenwirkungsgesetz richtig bleibt; die beteiligten Substanzen müssen homogen (im weiteren Sinne) in der Lsg. verteilt sein, brauchen jedoch

III. 1.

zwischen Enzym u. Substrat verwendet wird. Diese Ausdrücke sind für folgende Enzymrkk. angewendet worden: Saccharosespaltung durch Hefesaccharase (Inversionsfähigkeit), Stärkespaltung durch Malzamyrase (Sf = Stärkespaltungsfähigkeit, Verzuckerungsfähigkeit), β -Glucosidasewrkg. des Emulsins (Sal. Salicinspaltungsfähigkeit), Katalasewrkg. von Leberkatalasepräparaten (Kat. f.), F. sin aus Schweinedarm (Gl. f. = Glycylglycin-Spaltungsfähigkeit). — Zur Best. enzymat. Wirksamkeit von Zellen bestimmt man nicht, wie oben, die Reaktionsgeschwindigkeit pro Gramm Trockengewicht, sondern die mittlere enzymat. V. einer Zelle. In die oben gegebenen Formeln tritt dann an Stelle von „g Enzympräparat“ die Zellenzahl: (3) $X_1 v = k/\text{Zellenzahl}$ bzw. (4) $X_2 v (k \times g \text{ Substrat})/\text{Zellenzahl}$; v ist abgeleitet aus dem „Vermögen“ der Zellen zu der betreffenden Enzymrkg. Die Ausdrücke $X f$ u. $X v$ sind durch folgende Gleichungen verbunden: $X v = X f$ (g Enzympräparat)/Zellenzahl bzw. $X v = X f \times$ (mittleres Gewicht einer Zelle). Diese u. ähnliche Ausdrücke können nur als Beschreibung der enzymat. Aktivität nicht aber als Maße für den Reinheitsgrad dienen. Würden derartige Ausdrücke dem letzten Zweck benutzt, so werden mindestens 2 Hypothesen eingeführt, nämlich die Annahme, daß nur eine Art des betreffenden Enzyms u. zwar von konstanter Wirksamkeit besteht, u. zweitens, daß das gesamte Enzym in akt. Form vorhanden ist bzw. daß der inakt. Teil vernachlässigt werden darf. Diese Annahmen treten aber nicht allgemein zu (vgl. S. 3063). — Der Aktivitätsgrad eines Enzympräparats wird definiert zu $X f/X f_{\max} = k/k_{\max}$. — Enzymat. Wirksamkeit u. Reinheitsgrad haben folgenden Zusammenhang: $X f = (\text{akt. Enzym})/(\text{g Trockensubstrat})$. Reinheitsgrad = $\frac{\text{Gesamtmenge des Enzyms (akt. + inakt. E.)}}{\text{g Trockensubstanz}}$. Für die Gärungserscheinungen sind die angegebenen Maße noch nicht verwendet, da die Gärungsarten keine einheitlichen Enzymrkk. sind. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 770–73. 8. 1926, Holm, Hochsch.)

Saburo Imai, Über das Vorkommen von Urease in den Samen der Cucurbitaceen. Urease ist im Samen der Wassermelone stärker vertreten als in Sojabohnen. Die Wassermelone enthält weniger, andere Melonenarten nur Spuren. (Journ. of orient. med. 3. 5. 1926, Ber. ges. Physiol. 33. 681. Dairen, Bioch. Laborat. Hosp. der Süd-Mandschurei.)

Heinrich Wieland, Über den Mechanismus der Oxydationsvorgänge. IX. (VII. LIEBIGS Ann. 439. 196; C. 1924. II. 1788.) I. Einige Beiträge zur Wirkungsweise der Katalase von **Heinrich Wieland** u. **Hans Haussmann**. Vff. teilen die Auffassung mit, daß die Katalasen, die man in allen O₂-bedürftigen Zellen von Pflanze u. Tier angetroffen hat, beim Atmungsprozeß funktionell beteiligt sind. Die Theorie der Dehydrogenation, die den H der biolog. Brennstoffe durch die Atmungsenzyme aktivieren u. in dem molekularen O₂ sich zu W. vereinigen läßt, erwartet als erste Stufe der Veratmung von H₂O₂. — Es ist dem Vf. mit G. REVEREY nicht gelungen, H₂O₂ in der Atmung nachzuweisen. — Der Auszug von frischen Blättern mit verd. Säuren gibt mit verd. schwefelsäure die gleiche Farbrk. wie H₂O₂; sie wird durch einen anderen unbek. Stoff, der kein Peroxyd ist, hervorgerufen. — Auch Vers., H₂O₂ im tier. Stoffwechsel festzuhalten, versagten. Diese negativen Befunde sagen nichts gegen die biolog. Existenz des H₂O₂. — Vff. haben die Empfindlichkeit der Katalasen gegen HCN u. die Wirkungsweise des Enzyms in Abhängigkeit von verschiedenen Einflüssen studiert. — Es wurde mit Leberkatalase gearbeitet. — Der Grad der Hemmung der Katalasewrkg. durch HCN wurde festgestellt. — Während nach SENTER (Ztschr. f. physik. Chem. 309; C. 1903. II. 453) u. a. die antikatalyt. Wrkg. der HCN durch Lufttrocknung gehoben u. das Zersetzungsvermögen wieder hergestellt werden kann, ergaben die Vers. von Vff., daß die Hemmung durch HCN sich dadurch außerordentlich, fast totalen Passivierung des Enzyms steigerte. — Es mußten hier neue schädigende

e zur Geltung gekommen sein. — Beim Durchleiten von CO₂-freier Luft durch he Katalaselsg. ging die Aktivität des Enzyms im gleichen Maß zurück wie beim I-Vers.; wie nach früheren Angaben reiner O, wirkt auch reiner H in gleichem le hemmend; die Wrkg. von reinem N ist von gleicher Größenordnung, die von ergeblich größer; hier addiert sich zu der Gasschädigung noch die dem Ferment igliche Erhöhung der H-Ionenkonz. Auch das bloße Evakuieren einer Katalaselsg. die mechan. Mitwirkung eines capillar eingeleiteten Gases schädigt die Katalase. — e Fermentschädigungen sind zweifellos zu einem großen Teil auf Veränderungen Verteilungszustand zurückzuführen, wie sie auch durch Schüttelwrkg. herbei irt werden. — Die im Vakuum herbeigeführte Hemmung läßt sich nicht durch heriges Sättigen der Lsg. mit Luft etc. wieder aufheben. — Diese Ferment- ligung ist auf die Verkleinerung der wirksamen Oberfläche zurückzuführen. — Entscheidung der Frage, ob, phylogenet. betrachtet, der Zustand des Katalasesols ftgesätt. wss. Lsg., also unter n. Bedingungen der biolog. Funktion ein Optimum ie relative Beständigkeit u. damit für die Wirksamkeit bildet, ob also der N-O- g der wirksamen Oberfläche auf der einen Seite zwar deren volle Ausnutzung en enzymat. Vorgang ausschließt, andererseits aber den günstigen Verteilungs- nd aufrecht erhält, deren Aufhebung Vff. für eine Folge der völligen Entfernung adsorbierten Gasschicht in der evakuierten Enzymllsg. halten, wurde die Wirk- eit einer Katalaselsg. unter verschiedenem Gasdruck untersucht. Die Schädigung nzyms durch das Vakuum ist irreversibel. Bei einem N-Überdruck von 600 mm ird die Enzymwrkg. ebenfalls erheblich beeinträchtigt; die Hemmung ist aber um- ar; bei Atmosphärendruck gewinnt das Ferment zum größten Teil seine Aktivität er: das Gas hat einen Teil der wirksamen Oberfläche blockiert, seine Adsorption er, abhängig vom Druck, umkehrbar. Anscheinend bedingt die in der Nähe des sphär. Drucks vom Enzym adsorbierte Luft einen für seine Wirksamkeit günstigen ngszustand. Bei einem Luftdruck von 350 mm Hg tritt eine deutliche Schädigung Katalase ein. — Daß die HCN-Hemmung der Katalase ein reiner Adsorptions- ung ist, nur dem Grad nach verschieden von der Schädigung durch indifferente e, geht daraus hervor, daß die HCN-Schädigung durch Zurückdrängung der Ad- ion quantitativ meßbar zu mindern ist; was sich beim Gas durch Herabsetzung Druckes erreichen ließ, konnte hier durch Verdünnung der durch HCN geschä- n Enzymllsg. erreicht werden. — Da vielleicht ein Zusammenhang zwischen der en Adsorbierbarkeit der HCN u. ihrem stark ungesätt. Charakter als Methylen- . C:NH besteht, haben Vff. auch die Wrkg. des *Methyl-i-cyanids* C:N·CH₃ gegen lase quantitativ untersucht (aus AgCN + CH₃J, Kp. 58—60°) u. festgestellt, ie Katalaseschädigung durch die beiden CH₂-Derivv. von gleicher Größenordnung — Die Hemmung durch CO ist nur gering u. nur von der Art, wie sie andere Gase eken. — Die Verss. widerlegen für die Katalase die von O. WARBURG geäußerte tellung, daß es sich bei der Hemmung der Fermentwrkg. durch HCN um labile plexverbb. zwischen ihr u. der eisenhaltigen Oberfläche des Enzymsols handle. — urden die kinet. Verhältnisse bei der katalyt. H₂O₂-Zers. durch kolloidales Ferri- oxyd in gleicher Weise wie beim Ferment geprüft u. grundsätzlich dasselbe wie festgestellt. Auch Ferrihydroxydsol wird durch HCN nicht chem. irreversibel, ern rein adsorptiv u. daher umkehrbar geschädigt.

II. Zur Reaktionsweise des *Hydroperoxyds* (von **Heinrich Wieland** u. **Herman nskiold**). Für die früher (LIEBIGS Ann. 436. 248; C. 1924. II. 934) über die Einw. H₂O₂ auf Carbonsäuren geäußerte Annahme wird der experimentelle Beweis er- igt: α,β -Dioxybuttersäure wird, mit wss. NH₃ neutralisiert, durch Dest. mit 6% ig. mit hoher Ausbeute zu *Acetaldehyd* oxydiert, ohne daß gleichzeitig Aceton ent- . — *Crotonsäure* gibt mit 30% ig. H₂O₂ bei 40° α,β -Dioxybuttersäure. — Dadurch der Reaktionsverlauf, der aus α,β -ungesätt. Carbonsäuren Aldehyde entstehen

läßt, mit voller Schärfe bewiesen u. zum erstenmal gezeigt, daß sich H_2O_2 in Ges. zweier OH-Gruppen an die C-Doppelbindung anzulagern vermag. Für das Auftreten
 $\text{R}\cdot\text{CH}:\text{CH}\cdot\text{COOH} \rightarrow \text{R}\cdot\text{CH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{COOH} \rightarrow \text{R}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{COOH} \rightarrow \text{R}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} +$
 $\text{O}\cdot\text{OH}$

der Ketone bleibt demnach kaum eine andere Erklärung übrig als wie sie durch stehende Gleichung gegeben ist. (LIEBIGS Ann. **445**. 181—201. 1925. Freiburg Univ.) BUSCH

Otto Warburg, *Atmungstheorie und Katalase*. Was sich bisher beim Studium Katalase ergeben hat, ist eher geeignet, die Schwermetalltheorie der Atmung stützen, als sie zu widerlegen. — WIELANDS (vorst. Ref.) Schluß, daß der HCN-W keine Rk. mit Schwermetall zugrunde liegt, indem er voraussetzt, daß Carbylamine nicht instande sind, mit Schwermetallen komplexe Verbb. einzugehen, ist unrichtig, weil die Carbylamine zur B. komplexer Schwermetallverbb. nicht minder geeignet sind als freie HCN. — Auch der Beweis von HENNICHs (vgl. S. 2361) kann durch einfache Modellverss. widerlegt werden; HENNICHs übersah, daß die Eigenschaften der Elemente je nach der Art ihrer Bindung verschieden sind u. man nicht $\text{C}=\text{Fe}=\text{Fe}$ setzen darf. Wie andere Rkk. des Fe, ist auch die Rk. des Fe mit HCN von der Bindung des Fe abhängig. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 739—40.) BUSCH

A. Lebedew, *Notiz über die Wirkung der Oxydoredukase auf Methylglyoxal*. hat nachträglich beobachtet, daß auch Methylglyoxal, allerdings 30-mal schwächer als Glycerinaldehyd, durch Oxydoredukase in Ggw. von Methylenblau oxydiert werden kann. (Biochem. Ztschr. **169**. 501. Moskau, I. Univ.) HESSE

Hans v. Euler und **Karl Josephson**, *Zur Kenntnis der Temperaturinaktivierung der Saccharase*. (Vgl. S. 2006.) Die Hitzeinaktivierung der Saccharase trifft auf diejenigen Gruppen, welche die Affinität bestimmen. — Da zwei verschiedene Affinitätsgruppen vorhanden sind, wird untersucht, ob diese durch die Hitzeinaktivierung verschieden beeinflusst werden. Eine solche verschiedene Beeinflussung, die dann möglich wäre, wenn die Affinitätsgruppen an sich nicht von der Hitzeinaktivierung betroffen werden, wurde nicht beobachtet. Es ergab sich nämlich, daß dem Erhitzen angestellte Hemmungsverss. mit den verschiedenen Formen der Glucose u. mit Fructose keine Änderung der Affinitätsverhältnisse anzeigten. — Auch die Wärmeinaktivierung bei Ggw. von Glucose oder Fructose als Schutzstoff hat keine nachweisbare Änderung der Affinitätsverhältnisse zur Folge. Die Unterschiede in der Stabilität der verschiedenen Anteile der Saccharase dürften zurückzuführen auf Verschiedenheiten der kolloidalen Träger dieser Anteile bzw. auf Ungleichheiten in der Stabilität solcher Teile des Enzyms, welche die Zerfallsgeschwindigkeiten beeinflussen. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 254—62. Stockholm, Hochschule.) HESSE

Tamura Shizuaki, *Über das Histozym*. Histozympreparat aus Schweinehirn u. Hundemuskel dargestellt. Dibenzoyl-L-Tyrosin u. Dibenzoyl-L-leucin werden in schwächerem Grade als Hippursäure durch Histozym gespalten. (Acta scholae Kioto **6**. 467—70. 1924; Ber. ges. Physiol. **33**. 203. 1925. Kioto, Med.-chem. Kais. Univ. Ref. JACOBY.) OPPENHEIM

P. Rona und **H. Kleinmann**, *Nephelometrische Untersuchungen über fermentative Eiweißspaltung*. V. (IV. vgl. Biochem. Ztschr. **159**. 146; C. **1925**. II. 1366.) In der III. Mitt. (Biochem. Ztschr. **155**. 34; C. **1925**. I. 2169) aufgestellte Bestimmungsmethode wird ausführlich beschrieben u. Beispiele für die Anwendung gegeben. Trypsinpräparate verschiedener Herkunft (Pankreatin Rhenania, Pankreas Krause) haben die größte Beständigkeit bei $\text{pH} = 1,7$. Die Schädigung beträgt beim Stehenlassen der mit Puffer versetzten auf 1:7000 verd. Lsg. nur 3—4% 1 Stde. Im Gebiet von $\text{pH} = 3$ —11 betrug die Schädigung 20—30%; bei $\text{pH} = 11$ wurde eine rasche völlige Zerstörung des Fermentes beobachtet. — Prakt. ergibt

Pankreaspräparate bei der Acidität des Magensaftes auch ohne „Schutzmittel“ ihrer Wirksamkeit nicht geschädigt werden. (Biochem. Ztschr. **169**. 320—43. n, Univ.) HESSE.

B. Lustig, *Versuche über den Eiweißabbau mit Trypsin unter gleichzeitiger Dialyse*. Versucht wurde die Einw. von *Trypsin* auf Eiweiß „in Nachahmung der Vorgänge Organismus“, indem man die Fermentwrkg. in einer Dialysehülle bei 37—38° 1 W. von 38° vornahm. Das Dialysat wurde auf Eiweißabbauprodd. untersucht. Ergab sich folgendes. *Trypsin* bildet gleich im Anfang der Rk. größere Mengen Aminosäuren (vgl. WALDSCHMIDT-LEITZ, S. 1664 [Der Ref.]). — Bei *Casein* auch bei Serumalbumin u. Globulin konnten frühzeitig geringe Mengen *Histidin* nachgewiesen werden. Die S-haltigen Bausteine blieben in den Verdauungsrückständen. *Casein* wird stärker als Albumin u. Globulin abgebaut. Peptone, Albumosen, Aminosäuren u. andere durch Phosphorwolframsäure fällbare Stoffe treten in den Dialysaten verhältnismäßig spät auf. (Biochem. Ztschr. **169**. 139—48. Wien, Lab. Kollidspital“.) HESSE.

E. Lagrange, *Gerinnung des Eigelbs durch Mikrobendiastase*. Das aus China importierte Eigelb ist zuweilen geronnen. Als Urheber dieser Veränderung wurde in früheren Jahren u. a. ein als *B. sinicus* bezeichneter Mikrobe nachgewiesen, der ebenso wie andere Arten neben einer Diastase Essig- u. Buttersäure produziert. Die Diastase wird durch Filtration der Bouillonkultur gewonnen u. wird, da sie das Vitellin des Eies zur Gerinnung bringt, als *Vitellase* bezeichnet. Für den Eiweißstoff des Gelbes bei der Gerinnung könnte man nach Analogie der Verhältnisse in Milch u. Plasma den Namen *Vitellogen* einführen u. erst den geronnenen Stoff *Vitellin* benennen. Die katalysierende Wrkg. der Vitellase äußert sich in physiol. Lsg. stärker als in dest. W. Die Konzz. von Salzen können sie hindern, besonders von Schwermetallsalzen. Sie fördert die Gerinnung nicht u. hemmt sie sogar schon in Konzz., bei denen Na⁺ übermäßig ist. (Ann. Inst. Pasteur **40**. 242—51.) SPIEGEL.

S. Hallheimer und H. R. Schinz, *Der Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Indol- und Blauoxydasen im Gewebe und in Leukocyten*. Mikroskopisch-histolog. Unterss. über die Methode von GRÄFF mit α -Naphtholdimethylparaphenylendiaminchlorid, aus denen vom fermentchem. Standpunkt hervorzuheben ist, daß die labilen und instabilen Zelloxydasen strahlenresistent sind. (Strahlentherap. **20**. 331—41. 1925. Ges. Physiol. **33**. 773. Zürich, Chir. Klin. Ref. HARTMANN.) OPPENHEIMER.

David I. Macht, *Der Einfluß des polarisierten Lichtes auf einige Fermente. Ein Beitrag zur Pharmakologie des Lichtes*. Wrkg. der *Takadiastase* u. von *Lab* wird durch polarisiertes Licht verstärkt. *Katalase* des Blutes zeigt keine konstanten Beeinflussungen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**, 473—74. 1925; Ber. ges. Physiol. **201**. Baltimore, Pharmac. labor. John Hopkins univ. Ref. JACOBY.) OPP.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Th. Bokorny, *Allerlei aus der Literatur und Laboratoriumspraxis über die Mikroorganismen und die Keimung der Samen*. NaCl beeinflusst in Konzz. von 0,5 u. 1% die Vermehrung der Hefe, während 2% hemmen u. 4% die Vermehrung völlig verhindern, ohne die Gärung zu stören. — Infusorien werden durch 2,5%ig. Dikaliumphosphatlg. zu Schrumpfungerscheinungen gebracht. 0,5—2%ig. Lsgg. von Na₂HPO₄ töten die Hefe nicht. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. **66**. 445—47.) HESSE.

Th. Sabalitschka und C. Jungermann, *Der absolute und prozentuale Alkaloidgehalt der einzelnen Teile von *Lupinus luteus* L. während der Vegetation*. Da die alleinige Beachtung des prozentualen Alkaloidgehalts leicht zu Trugschlüssen führt, wurde der absol. Gehalt von jeweils 100 Pflanzen u. ihren Teilen zu verschiedenen Zeiten festgestellt, u. zwar 2, 4, 6, 13, 14 u. 18 Wochen nach der Aussaat. Im einzelnen wurden Keimblätter, Samenschalen, Hypokotylen, Wurzeln, Laubblätter, Stengel,

Hülsen u. junge Samen untersucht u. die Ergebnisse graph. dargestellt. Die in Samen ursprünglich enthaltenen 0,1063 g = 0,77% Alkaloid sanken nach 14 Ta um ca. 20% — berechnet aus den Gesamtpflanzen — u. hatten nach 14 Wochen Maximum mit 0,8 g in den 100 Pflanzen erreicht. Nach 16 Wochen sank der Gehalt auf 0,68 g, u. zwar 0,29 g in den neuen Samen, 0,22 g in den Blättern, 0,01 in den Stengeln, 0,05 in den Hülsen u. 0,03 g in den Wurzeln. In den Keimblättern nahm der Gehalt zwar ab, jedoch war ein völliges Verschwinden nicht festzustellen. Während der Hauptvegetationszeit war die größte Alkaloidmenge in den Blättern die kleinste in den Wurzeln enthalten. Aus der nur geringen Abnahme des Alkaloidgehalts während der Keimung ist zu schließen, daß das Alkaloid nicht als typ., größtenteils ausgenutzter Nährstoff anzusehen ist. Die Kurve des prozentualen Gehalts ist sehr wechselnd u. unübersichtlich. Auch hier sinkt der auf die ganze Pflanze bezogene Gehalt in den ersten 2 Wochen von 0,77 auf 0,59%, um nach weiteren 2 Wochen auf 1% zu steigen, wieder zu fallen, mit 13 Wochen das Maximum von 1,06% zu erreichen u. dann steil abzufallen. Bei den einzelnen Organen ist das Bild noch deutend komplizierter. Der prozentuale Gehalt der Keimblätter, des Hypokotyls des Sprosses erfährt eine Zunahme im Gegensatz zum absoll., da die Trockensubstanz während der Keimung abnimmt. Während der Hauptvegetation schwankt der prozentuale Gehalt der Blätter zwischen 1,21 u. 1,57%. Nach 18 Wochen ist der prozentuale Gehalt der jungen Samen 1%. Das Alkaloid scheint also in den reifen Samen zuerst schneller abgelagert zu werden als die Nährstoffe, wie auch FELDHAUS (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **243**. 335 [1905]) für Samen von *Datura stramonium* feststellte. (Biochem. Ztschr. **163**. 445—56. 1925.) HARM

V. Lubimenko, Über die physiologische Rolle der in dem grünen Parenchym der Blätter niedergeschlagenen Stärke. Unter Mitarbeit von **S. S. Fichtenholz**, **E. R. Chabenet**, **L. G. Gavriloff** u. **A. I. Kokine**. Es wurde täglich die Aufspeicherung der Stärke bei verschiedenen Pflanzen mkr. in verschiedenen geograph. Breiten u. zu verschiedenen Tageszeiten bestimmt. Zu diesem Zweck wurden die Stärkekügel mit J₂ angefärbt. Sowohl die Anreicherung wie die Lsg. wird stark durch die Intensität des Lichts u. die Temp. beeinflusst. Unter 60° nördlicher Breite leert sich das Parenchym nur selten während der Nachtzeit ganz. Das Blatt beginnt schon vor vollständiger Entleerung neu aufzuspeichern. Unter 50° nördlicher Breite u. südlicher tritt vollständiges Verschwinden der Stärke während der Nacht häufig ein. Allgemein erreicht der Stärkegehalt in den ersten Morgenstunden einen Höhepunkt, nimmt dann ab u. gegen Abend wieder zu. Einzelne Pflanzen (*Nicotiana glauca*) zeigen im Verlauf eines Tages nur im Maximum, andere (*Phaseolus vulgaris*) zweimal, wieder andere (*Robinia pseudacacia*) mehrere. (C. r. d. l'Acad. des sciences **1925**. 651—53.) ENSZL

H. Lagatu und **L. Maume**, Diagnostik der Ernährung einer Pflanze durch chemische Untersuchung eines geeignet gewählten Blatts. Ausgehend von dem Gedankensatz, daß das an einem fruchttragenden Zweig sitzende Blatt ein Indicator für die Wasserströme ist, welche durch den Zweig gehen (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. C. **1925**. II. 195) wurden an Weinstöcken mit 6 bzw. 9 Nebenästen Bestst. des Stickstoffgehalts zu verschiedenen Zeiten in solchen Blättern gemacht u. gefunden, daß der höchste Gehalt an N₂ im Frühjahr vorhanden ist u. daß derselbe bis zur Blüte abnimmt, direkt danach sich etwas erhöht, um weiter abzunehmen. Stöcke mit 6 Nebenästen liefern einen höheren Stickstoffgehalt als solche mit 9. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 653—55.) ENSZL

J. C. Waller, Pflanzliche Elektrizität. I. Photoelektrische Ströme in Verbindung mit der Tätigkeit des Chlorophylls bei Pflanzen. Mit unpolarisierbaren Elektroden angelegt an den beiden Hälften der Blattunterseite, kann, wenn die eine Hälfte des Blattes beleuchtet, die andere verdunkelt ist, ein Strom abgeleitet werden.

umblätter werden nach einer Belichtungszeit von 5 Min. negativ, nach erneuter Umklung positiv. Andere Pflanzen zeigen die gleiche Rk., aber mit umgekehrten Zeichen. Ohne Verdunklung kann bei Anlage der Elektroden an eine grüne u. farblose Stelle ebenfalls ein elektromotor. Vorgang abgelesen werden. Es handelt um Ströme, deren Natur von der Chloroplastenfunktion ausschlaggebend bedingt wird. Veränderungen der Bedingungen für die Photosynthese ändern auch photoelektr. Ströme. (Ann. of botany **39**. 515—38; Ber. ges. Physiol. **33**. 683. WEBER.) OPPENHEIMER.

F. Tallo, *Einfluß des frischen Pflanzensaftes (vegetabilische Vitamine) auf die Entwicklung von Bakterien*. Citronensaft (Vitamin C), Erbsen (Vitamin B), Erdnüsse (min A) verflüssigtem Agar zugesetzt, können die Wachstumsbedingungen für diese Bakterien verbessern. (Policlinico, Sez. prat. **32**. 979—81. 1925; Ber. ges. Biol. **33**. 777. Palermo, Istit. d'hyg. univ. Ref. GÜNTHER.) OPPENHEIMER.

Victor E. Levine, *Die reduzierenden Eigenschaften von Mikroorganismen unter besonderer Berücksichtigung der Selenverbindungen*. H_2SeO_4 , SeO_2 , Na_2SeO_3 hemmen Bakterienwachstum (Strept. pyogenes), Na_2SeO_4 u. $KCNSe$ hemmen dagegen nicht. Besonders empfindlich sind Anaerobier. Der Wachstumsintensität parallel mit der Red. von SeO_2 , Na_2SeO_3 u. H_2SeO_4 zu freiem, ziegelrotem, zum Teil zu schwarzem sinkenden, zum Teil kolloidal gel. Se. H_2SeO_4 wird langsamer reduziert, Na_2SeO_3 , woraus geschlossen wird, daß die Red. der ersteren über die zweite verläuft. Na_2SeO_4 u. $KCNSe$ wird nicht zu Se reduziert. Beziehungen der Red. zu der Entw. der Bakterien bestehen nicht. Betrachtung einzelner Bakterienklassen (Typhus-, Typhusgruppe usw.) auf ihr Red.-Vermögen. Se-Verbb. scheinen daher nicht zu dienen, in zuckerfreiem Medium als Reagens auf das Leben der Bakterien zu dienen. Umgekehrt können Bakterien als Reagens für den Nachweis von Se in Geweben verwendet werden, wenn das Se in Geweben durch HNO_3 vorher in SeO_2 überführt worden ist. Es konnten noch 0,5 mg Selenit, die einem Kaninchen injiziert wurden, nachgewiesen werden. (Journ. of bacteriol. **10**. 217—63. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 683. Omaha, Dep. of biol. chem. a. nutrition, school of med. Ref. GOTTSCHALK.) OPP.

Jos. van Caeckenberghe, *Chloramin*. Verss., aus denen die Konz. hervorgehen, verschiedene Bakterienarten abtöten. Vergleichende Prüfung mit $HgCl_2$ -Lsgg., Methyleneblau, Lysamol, Lysaldol, Jodonascin u. Lugolscher Lsg. Gegenüber Dakin-Lsg. ist Chloramin, abgesehen von der größeren Stabilität, durch eine 4—5-fache Wirksamkeit einer äquimolaren Lsg. ausgezeichnet. Dichloramin wirkt noch stärker, aber nahezu in W. unl. u. giftiger. Best. letaler Dosen für Chloramin bei verschiedenen Tieren. (Vlaamsch geneesk. tijdschr. **6**. 353—61. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 683—34. Gent, Labor. gynaekol. Klin. Ref. RISSE.) OPPENHEIMER.

Alessandro Alessandrini, *Der Einfluß der Veränderungen der Reaktion des Mediums auf die Aktivität des Bakteriophagen*. Vorläufige Mitteilung. (Vgl. S. 422.) Nach Vf. ist die Ursache, aus der der Bakteriophage sich in organ. Kolloiden zuweilen schlecht oder gar nicht entwickelt, in den Reaktionsänderungen zu suchen, welche diese Medien durch Erwärmen auf 37° erfahren. Es kann dabei eine unerwartete Acidität auftreten, über die man erwarten würde, daß sie die übertragbare Lyse zu hemmen vermag. Diese „potentielle Acidität“ ist am geringsten in Bouillon u. Agar, stärker in Blutserum u. Ascites, recht stark in Gelatine u. noch höher in Bouillon mit Tragantgummi. (Annali d'Igiene **35**. 1—32. 1925. Rom, Univ.) SPIEGEL.

Georges Truffaut und N. Bezssonoff, *Einfluß des metallischen Aluminiums auf die Aktivität von Stickstoff bindenden Bakterien*. Gelegentlich von Versuchskulturen von Mais in reinem Sand, welcher nur mit Stickstoffbakterien geimpft war, entdeckten sie, daß die Pflanzen, welche mit metall. Al in Berührung waren, eine höhere Stickstoffaufnahme zeigen als die anderen. Es betrug im Mittel der Gesamtstickstoff 11 mg pro 14,2 mg mit, gegen 8,10 bzw. 12 mg ohne Al. Das metall. Al hat also eine

sehr günstige Einw. auf die Entw. der Stickstoffbakterien. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 663—65.)

G. Guittoneau, *Über die Oxydation des Schwefels durch Mikroben.* (Vgl. S. 1) Es werden die Verss. über die Oxydation des S mit anderen Nährsgg. fortgesetzt. Als solche wurden Lsgg. von *Ammoniumacetat*, *Ammoniumlaktat*, *Ammoniumcitrat*, *Ammoniumtartrat*, *Acetamid*, *Alanin*, *Asparagin* u. *Pepton*, welche der Bakterie *M. acidophilus* als Nährboden dienen, u. *Glycerin*, *Glucose* u. *Amidon*, welche *ET₂* ernährten, angewandt. Diese beiden Mikrobenarten oxydieren den S zu Hyposulfit, welches durch das Hinzukommen einer Bakterie *b₂* zu Sulfat weiter oxydiert wird. In einer Tabelle sind die gebildeten Mengen *S₂O₂* u. *SO₃* für die einzelnen Nährsgg. angegeben. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 661—63.)

Leo Kempf Campbell, *Der Alanin- und Histidinstoffwechsel des Tuberkelbakteriums.* Auf alaninhaltigem, *NH₄*-freien Nährboden bildet der Tuberkelbazillus flüchtige Säuren, unter denen Essigsäure vorherrscht. Bei *(NH₄)₃PO₄* als N-Quelle fehlt Essigsäure, u. die übrigen flüchtigen Säuren sind in geringer Menge vorhanden. Histidin bildet sich wahrscheinlich Imidazolessigsäure. (Journ. of dairy science 370—89. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 778. Madison, Dep. of agricult. bacteriol. Univ. of Wisconsin. Ref. KADISCH.)

Josef Warkany, *Über die Kohlehydrate der Tuberkelbazillen.* Mit W. ausgekultivierte Tuberkelbazillen ergaben auf Trockensubstanz berechnet: 7,1% *Cellulose*, 4,3% *Furfurol* liefernde Substanz, 4,1% *Glykogen*. Für *Chitin*, *Pektin*, *Hemicellulose* etc. deren hydrolysierbare *Pentosane* kein Anhaltspunkt. (Ztschr. f. Tub. 42. 184—192. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 209. Wien, Physiol. Inst. u. staatl. serotherap. Inst. Ref. VON GUTFELD.)

W. P. Larson und Edmond Nelson, *Die antigenen Eigenschaften mit ricin-saurem Natrium behandelter Pneumokokken und Streptokokken.* Na-Ricinoleat behandelte Bakterien u. Toxine entgiften, aber die mit dem Salz behandelten Keime erzeugen Agglutinine. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 357—58. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 215. Minneapolis, Dep. of bacteriol. univ. of Minnesota. Ref. SEIDENMANN.)

W. P. Larson und H. O. Halvorson, *Der Einfluß der Konzentration auf die Toxinneutralisation durch Natriumricinoleat.* (Vgl. vorst. Ref.) Gemische von Diphtherietoxin u. Seifenlsg. wirken am Meerschweinchen nur dann nicht giftig, wenn die Konz. der Seifenlsg. 5% beträgt. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 550—52. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 215—16. Minneapolis, Dep. of bacteriol. Univ. of Minnesota. Ref. KADISCH.)

W. P. Larson, E. W. Hancock und Howard Eder, *Immunisierung gegen Diphtherie unter Benutzung von Natriumricinoleat als entgiftendem Mittel.* (Vgl. vorst. Ref.) Mischung von Diphtherietoxin u. Na-Ricinoleatlsg. werden zur Immunisierung von Kindern gegen Diphtherie verwendet. 50,2% der so behandelten Fälle heilen nach 4 Wochen negative Schicklkrk. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 553. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 216. Minneapolis, Dep. of bacteriol. a. de pediatr. Univ. of Minnesota. Ref. KADISCH.)

F. Vissert Hooft, *Biochemische Untersuchungen über das Genus Acetobacter.* Auszug. Unterss. über die Oxydierbarkeit organ. Verb. durch das Sorbosebakterium u. diesem in biol. Hinsicht verwandte Bakterien. Mit der Ausnahme des Äthylglykols, das nach Vf. oxydiert wird, wurden die Ergebnisse von BERTRAND bestätigt. (Dtsch. Essigind. 30. 92—93. Delft.)

L. G. M. Baas-Becking, *Studien über Schwefelbakterien.* Neue Systematik der S-Bakterien auf Grund der Fähigkeiten, S innerhalb oder außerhalb der Zelle zu binden. Als 3. Gruppe werden die angeschlossenen, die S zu Sulfaten oxydieren können. (Botan. of botan. 39, 613—50. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 777. Ref. KADISCH.)

Artturi I. Virtanen und Brita Bärland, *Die Oxydation des Glycerins zu Dioxy- durch Bakterien*. Vff. gelang die Isolierung eines Bakteriums, B. dioxyaceticum, sie frischen Rübensaft 2 Wochen bei Zimmertemp. unter Watteverschluß auftrugen, dann etwas Essigsäure zusetzten, nach 5 Tagen auf Molkegelatine von 5,0 Plattenkulturen anlegten u. von da in 5%ig. Glycerinbouillon überimpften. Wirkungsoptimum des Bakteriums liegt bei 25—28° u. pH etwa 5,0. 4,3%ig. rübs. gab nach 30 Tagen mit $\frac{1}{20}$ -n. Phosphatpuffer 71%, mit $\frac{1}{30}$ -n. Citrat- 27% u. mit Glykokollpuffer bei pH = 4,2. 84% Dioxyaceton. Für die Best. ben wurde eine besondere Tabelle ausgearbeitet. (Biochem. Ztschr. **169**. 169 77. Labor. d. Valio G. m. b. H. Helsingfors.) BRAUNS.

Stefan Bakonyi, *Versuche zur Theorie der aceton-äthylalkoholischen Gärung*. Da Verss. des Vf. Acetaldehyd, Acetaldol u. essigsäures Ca, letzteres ausschließlich Aceton, vollständig vergoren werden, kommt Vf. zu folgender Ansicht des Gärungs- stufes: Ein kleiner Teil des nach der Neubergschen Gärungstheorie bei der aceton- Gärung als Zwischenprod. auftretende Acetaldehyd, der sich auch durch NaHSO₃ gen läßt, wird zu A. reduziert; der größte Teil wird zu Acetaldol kondensiert, s zu A. u. Essigsäure dismutiert u. letztere zu Aceton weitervergoren. (Biochem. r. **169**. 125—28. Budapest.) BRAUNS.

E. Elion, *Zur Kenntnis der Acetoinbildung bei der Vergärung von Zucker durch* Es wurde nachgewiesen, daß bei der von NEUBERG u. REINFURTH (Biochem. r. **143**. 553; C. **1924**. I. 1396) aufgefundenen B. von Acetoin (Acetylmethyl- ol) ein Abfangen des Aldehyds erfolgt, so daß bei Verminderung des Gehaltes eine Zunahme des Gehaltes an Glycerin eintritt. (Biochem. Ztschr. **169**. 471—77. -Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst.) HESSE.

Martin Behrens und Nikolai Nikolajewitsch Iwanow, *Neue Versuche über die ligase*. (Vgl. ELION, vorst. Ref.) *p*- u. *o*-Toluylaldehyd können durch die Einw. arboligase in die entsprechenden Acyloine übergeführt werden. Die Ausbeuten gering. Gleichzeitig erfolgt phytochem. Red. der Aldehyde zu den zugehörigen alkoholen u. phytochem. Red. des Ketonalkohols zum entsprechenden Glykol. — *p*-Phenylosazon des *p*-Toluylacetylcarbinols, C₂₂H₂₀O₄N₆, rote Nadelchen aus h. benzol mit Eg. gefällt, F. 282°. — *p*-Nitrophenylosazon des *o*-Toluylacetylcar- binols, C₂₂H₂₀O₄N₆, F. 299°, unl. in sd. A., umkrystallisierbar aus h. Nitrobenzol + Eg. (Berl. Ztschr. **169**. 478—81. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst.) HESSE.

Hans v. Euler und Ragnar Nilsson, *Über Galaktosevergärung durch Hefe nach Vor- dung mit dieser Zuckerart*. II. (I. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. **143**. 89; C. **1925**. 7.) Es wird betont, daß die bei frischer u. bei getrockneter Hefe beobachtete ebnung der Fähigkeit zur Galaktosevergärung bei Vorbehandlung mit diesem r keine „Anpassung“ im älteren Sinne der Erwerbung einer Fähigkeit ist; es ist ehr so, daß diese als Anpassung bezeichnete Erscheinung nunmehr in den Bereich tochem. Forschung „in vitro“ gekommen ist. — Verschiedene Rassen u. Stämme efe werden bei Vorbehandlung mit Galaktose nicht in gleicher Weise beeinflusst; d die erreichten Endgeschwindigkeiten verschieden u. es sind die erforderlichen andlungszeiten verschieden. Es zeigt sich, daß die Oberhefen verhältnismäßig am die Fähigkeit der Galaktosevergärung erwerben. Untersucht wurden Bren- oberhefe R. u. Brauereiunterhefe H. Die Resultate dürften für die meisten ehen u. schwed., nicht aber ohne weiteres für die engl. Oberhefen zutreffen. r. f. physiol. Ch. **152**. 249—53. Stockholm, Hochsch.) HESSE.

Hans v. Euler und Ragnar Nilsson, *Zur Kenntnis der Reduktase (Dehydro- e) der Hefen*. III. (II. vgl. S. 2480.) Die Arbeit bezweckt die Feststellung der Be- ngen, unter denen Aktivität bzw. Konz. der *Co-Reduktase* gemessen bzw. egeben werden muß. — Bei kleiner Enzymmenge ist die Reaktionsgeschwindigkeit Konz. des Enzyms proportional. Bei größeren Hefemengen per Vol. Reaktions-

mischung strebt die Reaktionsgeschwindigkeit einem Maximum zu. Dabei ohne Zugabe eines besonderen Wasserstoffdonators (Succinat) gearbeitet, so daß den Verss. gleichzeitig der Reduktionskatalysator u. der Wasserstoffdonator vari wurden. — Die Reaktionsgeschwindigkeit ist innerhalb gewisser Grenzen der Konz. an Co-Reduktase proportional. — Bei geringer Konz. an Methylenblau besteht Proportionalität zwischen Konz. an Methylenblau u. der Reaktionsgeschwindigkeit. Innerhalb der in Figur angegebenen Grenzen, in denen Proportionalität zur Reaktionsgeschwindigkeit herrscht, wird die Wrkg. von Co-Reduktase durch den Ausdruck $ACoRed = mg \text{ Methylenblau} / \text{Entfärbungszeit} \times g \text{ Trockengewicht}$ wiedergegeben, bei sich das Trockengewicht auf die (enzymfreie) Lsg. des Co-Reduktasepräparats bezieht. (Ztschr. f. physiol. Ch. **152**. 264—70. Stockholm, Hochsch.) HESSI

N. Slobodska-Zaykowska, *Zur Frage nach der konservierenden Wirkung Milchehefe auf Milchsäurebakterien*. Die Verss., welche angestellt wurden, um jenen Faktoren zu ermitteln, die für die konservierende Wrkg. der Hefezellen Milchsäurebakterien bei gemeinsamem Wachstum verantwortlich sind, müssen Original nachgelesen werden. (Biochem. Ztschr. **169**. 77—91. Wologda, Milchschafsinst.) HESSI

Erik Hägglund, Arne Söderblom und Bølge Troberg, *Über die Abhängigkeit der alkoholischen Gärung von der Wasserstoffionenkonzentration*. III. (Vgl. S. 22) Während in dem Gebiet $pH = 4-6$ die Verfolgung der Gärung durch Messung gebildeten CO_2 zuverlässig ist, darf man in den mehr alkal. Gebieten wegen stärkeren Zurückhaltens der CO_2 durch die gärende Lsg. die Gärung nur durch Messung des Zuckerzerfalls bestimmen. Mißt man bei frischen u. bei getrockneten Hefen Zuckerverbrauch, so ergibt sich, daß die Geschwindigkeit der Gärung im Gebiet $pH = 4-8,5$ gleich bleibt. Das Optimum umfaßt also eine sehr breite Zone. — Gärung von Sulfid verzögert bei $pH = 8$ im Anfang der Gärung den Zuckerabbau nicht, später tritt, wohl infolge der Anreicherung der vermutlich gärungshemmenden Ammoniak-Sulfidverb. eine Verlangsamung ein. — Die B. von CO_2 bei der Gärung erfolgt optimal bei $pH = 5-6$. — Bei $pH = 10$ tritt keine Gärung ein. (Biochem. Ztschr. **169**. 200—07. Åbo, Finnland, Akad.) HESSI

E. B. Fred, W. H. Peterson und H. R. Stiles, *Die Biochemie des gekörnten Milchsäurebacillus der Getreidepflanzen*. Beschreibung von Kultur u. Verh. Glucose, Fructose u. Mannose werden leicht, Galaktose langsamer vergärt. Hauptprodukt der Gärung ist opt. akt. (l-) Milchsäure. (Journ. of bacteriol. **10**. 63—78. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 206—07. Madison, Dep. of agricult. bacteriol. a. agricult. chem. Univ. of Wisconsin. Ref. HIRSCH.) OPPENHEIMER

E₅. Tierphysiologie.

Walter P. Kennedy, *Corpus-luteumextrakte und Ovulation beim Kaninchen*. Extrakte mit NaCl-Lsg. angesetzte Extrakte frischer u. getrockneter Corpora lutea von Kaninchen hemmen in 10 u. 40% Lsg., intravenös injiziert, die Ovulation für die Dauer von 3 Monaten. (Quart. journ. of exp. physiol. **15**. 103—12. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 197. Edinburgh, Dep. of phys., Univ. Rev. RISSE.) OPPENHEIMER

Vittorio Zagami, *Weiterer Beitrag zum Studium der Beziehungen zwischen Funktion der Parathyreoideae und Darmabsonderung*. Vorl. Mitt. Am n., mit Thyreoideafistel versehenen Hunde haben 1. Ca-Salze keinen Einfluß auf Menge u. Fermentgehalt des Darmsaftes. Bei Tieren, denen Schild- u. Nebenschilddrüse entfernt wurde, vermindern sich beide Werte ohne Ca-Salzgaben rascher als mit solchen. (Ber. ges. Physiol. **33**. 157. 1925.) OPPENHEIMER

Reid Hunt, *Auswertung von Schilddrüsenpräparaten*. Wrkg. der Schilddrüsenpräparate geht sehr stark dem J-Gehalt parallel. Mit Hilfe der Acetonitril-Rk. wurde eine Verfälschung mit unspezif. J scharf quantitativ feststellbar. (Arch. of int.

- 35.** 671—86. 1925; Ber. ges. Physiol. **33.** 229—30. Boston, Dep. of pharmac. and univ. Ref. FROMHERZ.) OPPENHEIMER.
- J. P. Grabfield und A. M. Prentiss**, *Die Wirkung von Hypophysenpräparaten auf den N-Stoffwechsel*. Weder Hypophysenvorder- noch -hinterlappen läßt (bei Einwirkung entsprechender Präparate) einen Einfluß auf die N-Ausscheidung oder den N des Blutes erkennen. (Endocrinol. **9.** 144—49; Ber. ges. Physiol. **33.** 154. Boston, Psychopath. hosp. Ref. ADLER.) OPPENHEIMER.
- Edwin St. Faust**, *Über weibliche Sexualhormone*. Durch Ausfrieren bei tiefer Temp. u. nachfolgende Hochvakuumdest. gewinnt Vf. aus Placenta u. Corpus luteum ein hellgelbes N-freies, physiolog. wirksames Öl, dessen Hauptmenge bei 150—200° Siedet. Durch Digitonin läßt sich Cholesterin abtrennen. Höhere ungesätt. Fettsäuren (Homologe der Ölsäure bis zur Clupanodonsäure) lassen sich ohne Wirksamkeitsverlust durch Kohleadsorption (alkal.) entfernen. Es resultiert nach diesen Vorarbeiten ein nicht weiter zerlegbar, offenbar einheitlicher Körper. Das Destillat sd. im Hochvakuum bei 170—180° u. ist ein in W., Alkalien u. Säuren unl. Öl, das aus C₂₀—C₂₈ O zusammengesetzt ist. Aus 50 kg Placenta erhält man höchstens einige g. Beträgt die physiol. Wrkg. (Uterus-Vagina-Mamma-Wachstum). Pharmakolog. wird die Wirkung durch Phlogotoxinen zugerechnet u. hat Verwandtschaft mit den Sapotoxinen. (Ztschr. med. Wehschr. **55.** 575—79; Ber. ges. Physiol. **33.** 163—64. 1925. Ref. ADLER.) OPPENHEIMER.
- Pierre Mauriac und E. Aubertin**, *Der Mechanismus der Insulinwirkung und die Entstehung des Pankreasdiabetes*. (Vgl. S. 2593.) Zusammenfassung u. Entw. einer Theorie auf einer, nach Ref. recht unvollständigen Literaturkenntnis. (Paris méd. **412—22.** 1925; Ber. ges. Physiol. **33.** 691. Ref. LESSER.) OPPENHEIMER.
- R. S. Allen und J. R. Murlin**, *Inaktivierung und Reaktivierung von Insulin*. Bei H reduziertes Insulin verliert seine Wrkg., gibt aber mitunter bei subcutaner Injektion eine Erhöhung des Blutzuckers. Der Luft oder reinem O₂ ausgesetzt, wird reduziertes Insulin wieder wirksam. Fortgesetzte Behandlung mit O₂ unter Druck ist zerstörend. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22.** 492—93; Ber. ges. Physiol. **33.** 92. 1925. Rochester, Dep. of vital economics. Ref. LAQUER.) OPPENHEIMER.
- Erwin Brand und Marta Sandberg**, *Mitteilung über die Beziehung zwischen Trypsin und Trypsin*. Insulin hemmt die Trypsinwrkg. nicht. Die Insulinwrkg. wird durch Trypsin erst reversibel, dann irreversibel, wahrscheinlich unter Verdauung des Insulins aufgehoben. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22.** 428—31; Ber. ges. Physiol. **33.** 92. 1925. New York, Div. of laborat. Montefiore hosp. Ref. LAQUER.) OPP.
- Federico Alzona und G. Battista Orlandi**, *Über die blutzuckererniedrigende Wirkung von lebenden Hefepilzen, sowie Säften und Extrakten aus Bierhefe*. Einwirkter Mazerationssaft aus Bier- u. Weinhefen senkt den Blutzucker. Die gleiche Wrkg. haben lebende Hefesuspensionen u. Trockenpräparate (Zymin). (Rif. med. **529—32;** Ber. ges. Physiol. **33.** 130. 1925. Bologna, Istit. di chir. med. Ref. LAQUER.) OPPENHEIMER.
- Franz Schmidt**, *Die Wasserstoffionenkonzentration im Blute bei experimenteller Tuberkulose*. Messungen mittels der Chinhydronelektrode zeigen keine Veränderung des n. pH-Wertes (7,32), so lange der tuberkulöse Prozeß rein lokaler Natur ist. Bei weiterer Entw. findet sich eine geringe Verschiebung nach der alkal. Seite (pH = 7,45), die lediglich von den tuberkulösen Veränderungen der Milz u. der Leber abhängt. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I. **46.** 386—98. Königsberg, Univ.) SPIEGEL.
- M. Suzue**, *Studien über Hämolyse*. Besprechung des Wirkungsmechanismus von Natriumchlorid, Alkali, Saponin, A., Galle, hypoton. Fll. auf Blutzellen. (Journ. of biophysics **1—III.** 1923; Ber. ges. Physiol. **33.** 123. 1925. Ref. BORGER.) OPPENHEIMER.

K. Kikawa, *Über den Einfluß einiger Salze auf Hämolyse*. Der Einfluß scheidener Konzz. von KCl , $NaCl$ u. $CaCl_2$ allein u. in Mischungen auf die Resistenz der Blutkörperchen gegenüber Hypertonie, Saponinen u. A. wird geprüft. (*J. of biophysics* **1**. LIII—LIV. 1923; *Ber. ges. Physiol.* **33**. 123—24. 1925. Ref. KAWA.)

OPPENHEIM

A. Kotzareff, *Veränderungen des Blutes bei Kaninchen und Meerschweinchen hervorgerufen durch intravenöse und lokale Injektionen von Radiumemanation*. Intravenöse Injektion von $16\frac{1}{2}$ Millicuries Ra-Emanation haben keine Blutveränderungen abgesehen von einer vorübergehenden Eosinophilie, zur Folge. Hämoglobinnachweis, Verminderung der roten u. weißen Blutkörperchen, Gerinnungsbeschleunigung ein, wenn ein Radiumträger 24 Stdn. unter der Haut angebracht wird. (*Schweiz. med. Wechs.* **55**. 537—39. 1925; *Ber. ges. Physiol.* **33**. 123. Genf, Gynäk. Ref. LÜDIN.)

OPPENHEIM

Guido Tizzoni und Plinio Bardelli, *Ist das Neutralisierungsvermögen des tetanuserums in vitro in direkter Beziehung zu seiner immunisierenden und heilenden Wirkung?* Diese Frage muß nach den Verss. an Pferden sowohl mit Seren gleicher Herkunft, als auch mit solchen aus verschiedenen Quellen verneint werden. Die Untersuchung des Wirkungswertes durch Titration mit Toxin ist daher für die Praxis wertlos. Dagegen ergab sich ein konstantes Verhältnis zwischen immunisierender u. heilender Wrkg., so daß der Tiervers. bzgl. der ersten zu brauchbaren Daten auch bzgl. der zweiten Wrkg. führt. (*Annali d'Igiene* **36**. 165—96. Bologna, Univ.)

SPIEGEL

J. Furth, *Über Anaphylaxie mit erhitztem Serum*. Das auf 100° erhitzte Serum (vgl. S. 972) vermag bei damit sensibilisierten Meerschweinchen auch anaphylaktischen Shock hervorzurufen. Uterusstreifen solcher Meerschweinchen reagieren auch empfindlich auf sonst harmlose Dosen des genannten Antigens. (*Journ. Immunology* **215**—19. Philadelphia [Pa.], Univ. of Pennsylvania.)

SPIEGEL

Lloyd D. Felton und G. Howard Bailey, *Die immunologischen Charakteristika eines wasserunlöslichen Eiweißes in Antipneumokokkenserum vom Typus I*. Ein aus dem durch Injektion der Bakterienzellen vom Pferde gewonnenen Antipneumokokkenserum erhaltenes in W. unl. Eiweiß zeigte noch nach 10-maliger Umfällung die Fähigkeit, Mäuse gegen virulente Pneumokokken zu schützen, den gleichen Pneumokokkentypus zu agglutinieren, positive Präzipitintrk. auszulösen, Komplement zu binden, die Phagocytose der Pneumokokken durch Phagocytenzellen anzuregen. Alle diese Reaktionen ließen eine gewisse Relation zu dem N-Gehalt der Präparate erkennen, der schützende Antikörper bis zu stärkeren Verdünnungen sich geltend macht. Nach diesen Verss. nicht gelungen, das unl. Eiweiß in Fraktionen zu zerlegen, von denen jede eine bestimmte immunolog. Eigenschaft besitzt. Doch ist diese Möglichkeit nicht völlig auszuschließen, u. einige neuere Beobachtungen weisen auf eine Trennung des schützenden Antikörpers von den anderen hin oder auf eine Veränderung des Eiweißmol., bei der die Reagensglasrkk. der Antikörper aufgehoben werden, ohne daß der Schutzwert abnimmt. (*Journ. Immunology* **11**. 197—214. Boston [Massachusetts], HARVARD Med. school.)

SPIEGEL

Bruno Poletti, *Anaphylaxie durch Bakterien-Nucleoproteide*. Nucleoproteide aus Choleravibrien, Typhus u. ähnlichen Bakterien verursachen keine spezifische Anaphylaxie. (*Sperimentale* **79**. 289—307. 1925; *Ber. ges. Physiol.* **33**. 219—20. Rom, Istit. di patol. gen. Ref. WINKLER.)

OPPENHEIM

M. Wierzechowski, *Verschwinden der Acetonkörper bei Gegenwart von nicht verwertbarem Zucker bei vollständig phlorrhizinvergifteten Hunden*. Bei hungernden, phlorrhizinvergifteten Hunden werden durch Glucose oder Lävulose die Acetonkörper 9—24 Stdn. je nach Menge des Zuckers vollständig oder teilweise zum Verschwinden gebracht, ohne daß der Zucker, der quantitativ im Harn wieder erscheint, verbraucht wird. Die Acetonkörper verschwinden auch aus dem Blut, also kann von einer

oder Nierenschwäche nicht die Rede sein. Nicht die Verbrennung der Kohlenhydrate („Feuer der Kohlehydrate“) beseitigt die Prodd. des Fettstoffwechsels, um die Ggw. kleiner Zuckermengen genügt, um die Fette vollständig zu verbrennen, Eiweiß zu sparen u. das diabet. Koma zu bessern. (Proc. of the soc. f. exp. a. med. **22**. 425—26; Ber. ges. Physiol. **33**. 98—99. 1925. New York, Physiol. at. Cornell univ. Ref. SCHULZ.) OPPENHEIMER.

J. K. Lewis, A. W. Hewlett und G. D. Barnett, *Der Einfluß des Trainings auf die Milchsäureausscheidung im Harn*. Die bei Muskelarbeit im Harn erscheinende Milchsäure nimmt mit dem Training ab. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 38; Ber. ges. Physiol. **33**. 105. 1925. S. Francisco, Dep. of internat. med. Stanford med. Ref. HERBST.) OPPENHEIMER.

Teiichi Nishiura, *Über die Ausscheidung von Porphyrinen durch den Urin nach Aufnahme von extrahiertem und nichtextrahiertem Chlorophyll*. Vergleichende Untersuchungen über die Resorbierbarkeit von Chlorosan-Tabletten (extrahiertes Chlorophyll) u. dem grünen frischen Gemüse, durch Best. der ausgeschiedenen Porphyrinmenge, das ziemlich konstant bleibender Bruchteil der resorbierten Substanz als Porphyrin im Urin erscheint. Die Resorption extrahierter Chlorophyllpräparate ist 20—30-mal größer als die aus grünen Gemüsen. (Schweiz. med. Wchschr. **55**. 431—33. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 237. Bern, pharmakol. Inst. Ref. SCHÜBEL.) OPPENHEIMER.

Vilfi Scheiner, *Toxische Stoffe im Harn*. Nach Behandlung mit Bleiessig wird der Urin schwefelsaurer als alkal. Harn mit Ä. extrahiert; der Extrakt eingedunstet, hinterläßt in W. gel., wieder ausgeäthert u. der Ä. neuerdings verjagt. Beide Arten (alkal. u. alkal.) geben Fällungsreakk. mit Phosphorwolfram- u. -molybdänsäure u. rufen an der Maus Vergiftungserscheinungen hervor. Der Harn von Leukämiekranken enthielt mehr tox. Stoff als n. (Sborník lékařský **26**. 23—41. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 153.) OPPENHEIMER.

Weigert, *Neue Wege der Diabetestherapie: Ersatzkohlehydrate*. Karamelzucker, Saccharosane oder Zuckeranhydride (Anhydrozucker) bewirken bei der Verabreichung an Diabetiker keine Erhöhung des Blut- u. Harnzuckergehaltes, bringen Acetonurie zum Verschwinden u. können daher vorteilhaft als Ergänzung der Kost gegeben werden. Unter dem Namen *Salabrose* bringen die Chemischen Werke Grenzach ein Tetrasaccharan, das durch Polymerisation von Traubenzucker gewonnen wird u. die Ciba, Pharm. Gesellschaft für Chemische Industrie, Basel, das *Saccharosan* (Mellitose), aus Saccharose dargestellt, in den Handel. 50—150 g werden anstandslos vertragen. Auch das *Oxanthin*, eine Triose, das Dioxyaceton der Höchster Farbwerke, wird bei leichteren Fällen ohne Erhöhung des Zuckerspiegels aufgenommen u. verwertet. (M. Ztg. **71**. 437—38. Berlin.) ROJAHN.

J. Hepner, *Adrenalin- und Hypophysenwirkung auf die Atmung der Wirbeltiere*. Nach Adrenalininjektion verschwinden zuerst die Kehlatembewegungen des Frosches, später auch nach einer vorübergehenden Zunahme die Lungenatembewegungen. Die Apnoe kann stundenlang anhalten. Mit Hypophysin werden ähnliche Bilder beobachtet, nur daß die Apnoe noch länger anhält (2 Tage). (Biologické listy **11**. 1—69. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 738—39. Ref. BABAK.) OPPENHEIMER.

A. Frank, *Über den Wert der Bezssonoffschen Farbreaktion auf Vitamin C*. Die Farbreaktion hat keinen allgemeinen Wert u. ist nur mit Vorsicht zu gebrauchen. Die Widersprüche der Rk.-Ergebnisse mit dem Tiervers. (Jahrb. f. Kindhlk. **109**. 3. F. 37—95; Ber. ges. Physiol. **33**. 689. Leipzig, Kinderklin. Ref. DAVIDSOHN.) OPP.

J. A. Collazo und Kazimierz Funk, *Der Stoffwechsel des Vitamins B als Bestandteil der Nahrung und seine Ausscheidung bei Tauben*. Verss. an Tauben in geordneter Anordnung lassen erkennen, daß Vitamin B nicht als ein durch den Organismus ablaufender Katalysator zu betrachten ist, sondern daß es im Stoffwechsel ver-

braucht wird. (Med. doświadczalna i społeczna **3**. 359—66. 1924; Ber. ges. Ph. **33**. 90. 1925. Warschau, Chem. Abt. staatl. Schule f. Hygiene. Ref. PARNAS.)

C. di Gioia, *Bedeutung der Thymus bei der experimentellen Avitaminose*. Thymektomie hat keinen Einfluß auf die Reisavitaminose. (Ann. di clin. med. e di sperim. **15**. 158—86; Ber. ges. Physiol. **33**. 155. 1925. Palermo, Istit. di anat. Ref. SCHULZ.)

OPPENHEIM

S. Burt Wolbach und **Percy R. Howe**, *Der Einfluß des skorbutischen Zustandes auf die Bildung und Erhaltung der intercellulären Substanzen*. Dem Skorbut kommt wesentliches Merkmal die Eigenschaft zu, daß der Organismus unfähig wird, intercelluläre Substanzen zu bilden u. besonders diese (z. B. Dentin, Knochenmatrix) zu verkalken. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 400—02; Ber. ges. Physiol. **33**. 90. 1925. Ref. LANGE.)

OPPENHEIM

W. H. Hoffmann, *Experimentelle Beriberi bei den Batrachiern*. Beobachtung über die Entw. der Larven bei der Froschart *Hyla septentrionalis* unter Ernährung mit Mangofrüchten u. mit Brot, wobei im zweiten Falle beriberiartige Erscheinungen auftraten, lassen Vf. annehmen, daß Beriberi keine Folge einer Infektion ist, sondern zu den Folgen von Vitaminmangel gehört. (Vox Medica **6**. 136—38. Habana [Cuba]. 1925.)

N. Schepilewskaja und **N. Jarussowa**, *Zur Frage nach dem experimentellen Skorbut der Meerschweinchen*. Bei ausschließlicher Hafernahrung starben die Meerschweinchen nach kurzer Zeit. Anfangs fraßen die Tiere den Hafer gern, bald zeigte sich eine erhebliche Gewichtsabnahme u. Verlust des Appetits. Bei Beifütterung von Kohl war die Lebensdauer der Tiere je nach der Menge des Zusatzes verschieden. So konnten kleine Dosen von Winterkohl (5—10 g) die Gewichtsabnahme nur für kurze Zeit aufhalten u. den Tod nicht abwenden. Der Sommerkohl wirkte stärkeres Gegenmittel gegen Skorbut u. daher haben dessen kleinere Dosen eine ähnliche Wirkung. Bei 3 Tieren wurden genaue Untersuch. des N-Stoffwechsels angestellt u. festgestellt, daß die N-Bilanz negativ wird bei ausschließlicher Haferfütterung. Der Zusatz von kleinen Dosen Kohl (20 bis 5 g) nicht sich wesentlich ändert. Eine positive N-Bilanz wurde nur beim Zusatz großer Mengen von Kohl (40 g) beobachtet. Möglicherweise spielen hierbei die im Kohl enthaltenen Eiweißstoffe eine Rolle, die zusammen mit dem Eiweiß des Hafers eine weit günstigere Kombination für ihre Ausnutzung seitens des Organismus darbieten als die Eiweißstoffe des Hafers allein. (Biochem. Z. **167**. 245—64. 1926. Moskau, Wissenschaftl. Inst. f. Ernährungsphys.)

HIRS

Harry J. Deuel, jr., **William H. Chambers** und **James Evengen**, *Einwirkung auf den Stoffwechsel von Hunden unter Amytalnarkose*. Narkot. Dose Amytal (*i-Amylthylbarbitursäure*) verursachen keine Stoffwechselveränderungen. Erst Dosen, die zu tiefer Narkose führen, setzen den Stoffwechsel um 10% gleichzeitig mit der Temp. herab. Ein mit Amytal narkotisiertes Tier reagiert gleichzeitig Insulininjektion mit einer leichten Steigerung des respirator. Quotienten u. neben der Blutzuckersenkung mit einer Steigerung der Wärmeproduktion, was auf eine unmittelbare Einw. des Insulins auf die Fettverbrennung zu schließen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 424—25; Ber. ges. Physiol. **33**. 94—95. 1925. New York, Physiol. laborat. Cornell univ. Ref. LAQUER.)

OPPENHEIM

Juan Cuatrecasas, *Zum Studium der Kreatininausscheidung durch die Niere*. Kreatiningehalt des Harns wurde im Mittel mit 0,62‰ gefunden. Im Blut wurde ein Kreatiningehalt von über 25 mg-% als patholog. anzusprechen. Je höher der Kreatiningehalt, desto ungünstiger muß die Prognose einer Nierenerkrankung lauten. Es wird eine „kreatininsekretorische Konstante“ entsprechend der von AMBARD zu finden. (Rev. med. de Barcelona **3**. 196—216; Ber. ges. Physiol. **33**. 150. 1925. Barcelona, Hosp. de Santa Cruz. Ref. FREUDENBERG.)

OPPENHEIM

Laurence Irving und **John Ferguson**, *Der Einfluß der Acidität des Darminhalts auf die Aufnahme von Calciumsalzen durch das Blut*. Serum-Ca-Gehalt steigt, wenn

in den Darm (Hundeverss.) gebracht werden, dann am meisten an, wenn die führte Lsg. sauer ($p_H = 3,0$) gepuffert ist. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 527—30; Ber. ges. Physiol. **33**. 127. 1925. Stanford, Lab. of physiol. Ref. R. ER.) OPPENHEIMER.

W. R. Bloor und Ethyln M. Gilette, *Ausnutzung von Fett bei Diabetes*. Pan-diabet. Tiere zeigen gegenüber n. Tieren einen auffallend lang anhaltenden Anstieg des Fettgehalts nach Zufuhr von 100 cem Olivenöl. (Proc. of the soc. f. exp. a. med. **22**. 251—53. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 723. Rochester, School of med. ntist. Ref. GOTTSCHALK.) OPPENHEIMER.

J. A. Collazo, *Insulin und der intermediäre Kohlenhydratstoffwechsel*. 1. Mitt. *wirkung des Insulins. Hypoglykämie. Glykolyse. Glykogen*. Nach Vf. fördert lin die Glykogenbildung in der Leber. Die Hypoglykämie ist als eine Störung Insulin-Adrenalin-Gleichgewichts aufzufassen. (Arch. des malad. de l'appar. et des malad. de la nutrit. **15**. 532—53. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 690—91.) OPP.

J. Shaw Dunn und Nora A. Jones, *Die Ausscheidung von Wasser, Harnstoff Chloriden bei der experimentell erzeugten Oxalatnephritis*. Nach Oxalatinjektionen die Ausscheidung von W. Durch intraperitoneal beigebrachte NaCl-Lsg. läßt aber die Diurese anregen. Der prozentuale Harnstoffgehalt des Harns sinkt. stoffzulagen werden retiniert. Im Blut wird Anstieg festgestellt. Der proale NaCl-Gehalt des Harns steigt zu Beginn der Vergiftung, später sinkt er hfalls. Die Veränderungen in den Nieren beschränken sich auf die Kanälchen. st anzunehmen, daß der Harnstoff durch die Glomeruli ausgeschieden wird, die rädigten Epithelien aber die Fähigkeit verloren haben, seine Rückresorption en Tubuli zu verhindern. (Journ. of pathol. a. bacteriol. **28**. 483—506. 1925; ges. Physiol. **33**. 736—37. Manchester, Dep. of pathol., univ. Ref. BLOCH.) OPP.

A. Wassiljew, *Zur Resorption einiger Vitalfarbstoffe durch den Froschdarm*. *Blau u. Lithioncarmin* sind für das Darmepithel des Frosches z. T. durchgängig, en aber auch Zellschädigungen hervorrufen. (Ztschr. f. wiss. Biol. Abt. B. Ztschr. ellsforsch. u. mikr. Anat. **2**. 257—63; Ber. ges. Physiol. **33**. 39. 1925. Leningrad, f. allg. u. exp. Pathol. milit.-med. Akad. Ref. RUHEMANN.) OPPENHEIMER.

L. Avellone und G. di Macco, *Über die Funktion der durch Durchschneidung motorischen Nerven immobilisierten Muskeln*. IV. *Gesamtstickstoff, Purinkörper, nosäuren, Kreatin*. Der entervte Muskel hat weniger Gesamt-N, Purinkörper reatin, dagegen mehr Aminosäuren als der homologe Muskel der n. anderen Seite. h. di scienze biol. **7**. 150—56; Ber. ges. Physiol. **33**. 78—79. 1925. Palermo, Istit. atol. gen. Ref. WACHHOLDER.) OPPENHEIMER.

Giuseppe Rotolo, *Über die Funktion gelähmter Muskeln durch die Durchschneidung rischer Nerven*. V. *Wirkung des Veratrins*. (IV. vgl. vorst. Ref.) Gelähmte Muskeln rscheiden sich von n. in bezug auf ihre Reaktionsart auf Veratrin durch die chiedene Latenzzeit der Giftwrkg., durch die Dauer der Veratrinkontraktion u. chiedene Erscheinungen beim Abklingen der Wrkg. (Ann. di clin. med. e di . sperim. **15**. 47—49. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 535. Palermo, Istit. di patol. gen. KOLMER.) OPPENHEIMER.

W. Horowitz, *Über die Funktion der durch Nervendurchschneidung immobilisierten skeln*. VI. *Wirkung des Nicotins*. (Vgl. vorst. Ref.) Die Nicotinkontraktur des chgastrocnemius ist um so stärker, je längere Zeit der Muskel entnervt war. h die erhöhte farad. Erregbarkeit des Muskels durch Nicotin erlischt nach Nervschneidung. (Arch. di scienze biol. **7**. 157—68; Ber. ges. Physiol. **33**. 79. 1925. ermo, Istit. di patol. gen. Ref. WACHHOLDER.) OPPENHEIMER.

J. Meßner, *Atomgewicht und pharmakologische Wirkung*. Vf. verwirft den neuer- gs wieder auftauchenden Gedanken eines Zusammenhangs zwischen At.-Gew. der

Elemente resp. ihrer Stellung im period. System u. der pharmakolog. u. therapeut. Wrkg., da sich ebensoviele Gründe gegen als für eine solche Hypothese anführen lassen (Pharm. Zentralhalle **67**. 228—32.) ROJAN

A. H. Roffo, *Die Wirkung gewisser metallischer Ionen auf die Entwicklung maligner und neoplastischer Gewebe in vitro*. Prüfung der Einw. von KCl, CaCl₂ u. MgCl₂ (Bol. del inst. de med. exp. **1**. 307—323; Ber. ges. Physiol. **33**. 68. 1925. Ref. ROFFO.)

Guido Guerrini, *Über die Wirkung des Cytolysins während des Lebens*. Auf das Gift von *Crotalus terrificus* u. Bienenstacheln gewonnenes Cytolysin hat in 1% auf das Froschherz keinen Einfluß, beim Hund führt es zu schweren Hämorrhagien (Atti d. soc. lombarda de scienze med. e biol. **14**. 11—22. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 217—18. Ref. KAISER.) OPPENHEIM

Bohuslav Bouček, *Wirkung der Unterkühlung auf Narcotica*. Als Ergebnis seiner schlagiger Arbeiten seiner Schüler lehrt Vf., daß der Tod der Tiere auf Narkose hin vermutlich die Folge der Abkühlung des Atemzentrums ist. (Biol. listy **1**. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 233. Ref. BABAK.) OPPENHEIM

D. M. Rosyisky, *Narkose durch Äthylidenchlorid, Methylenchlorid und Mischungen*. (Japan med. world **5**. 51—53. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 227. Moskau Pharmakol. Abt., med. Inst.) OPPENHEIM

W. Arnold, *Eine experimentelle Prüfung der Wirkung des Pfefferminz-, Fenchel- und Kamillentees auf den Magen-Darmkanal*. In der Reihenfolge, in der sie gegeben sind, abnehmend, wirken die Tees lähmend auf den Magen u. erregend auf den Darm, besonders Dickdarm. (Röntgenolog. Unterss.) Eine besondere Wrkg. der isolierten äth. Substanzen konnte nicht festgestellt werden. (Ztschr. f. Kindh. **30**. 225—26. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 110. 1925. Köln, Kinderklin. Ref. DOLLINGER.) OPPENHEIM

P. M. Niccolini, *Wirkung des Aconitins auf den Darm*. Aconitintartrat bewirkt Zunahme der Kontraktionen u. Tonuserhöhung. Konzz. 6:10⁶ bis 2:10⁵ lassen Tonus unbeeinflusst, führen aber zu wellenförmigen Kontraktionen. Konzz. 3:10⁵ bis 2:10⁴ geben plötzlichen Tonussturz. Verss. am isolierten Darm der Maus (Arch. di fisiol. **22**. 357—62. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 236. Florenz, Istit. di medicina med. e farmacol., univ. Ref. RENNER.) OPPENHEIM

Fred M. Smith, G. H. Miller und V. C. Graber, *Die Wirkung von Adrenalin, Pituitrin und Acetylcholin auf die Coronararterien des Kaninchens*. Adrenalin (1:2000) u. Pituitrin (1:50 000) vermindern die Durchflußgeschwindigkeit im Coronarkreislauf, ersteres unter gleichzeitiger Erregung der Herztätigkeit, letzteres unter Frequenz- u. Amplitudenverminderung. Acetylcholin 1:200 000 vermehrt die Durchflußgeschwindigkeit bei ausgesprochener Vaguswrkg. am ganzen Herzen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 507—08. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 228. Iowa, Univ. of internal med. state univ. Ref. FROMHERZ.) OPPENHEIM

G. Coronedi und P. M. Niccolini, *Sitz der Herzwirkung des Aconitins, Wirkung des Kaliums und seiner Homologen auf das akonitisierte Herz*. Aconitinsulfat tropfenweise auf den Herzsinus gebracht, verursacht atrioventrikuläre Dissoziation. Dosis 0.5 mg isoton. K-Rb- oder Cs-Lsgg. kann Ventrikelstillstand nach Aconitineinw. genau nach Stanniusligatur aufgehoben werden. Mit Uranylacetat gelang das nicht. (Arch. di fisiol. **22**. 347—56. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 236. Florenz, Istit. farmacol. u. med. Ref. RENNER.) OPPENHEIM

I. J. Kligler und I. Weitzman, *Die Wirkungsweise von Bayer „205“ auf Trypanosomen*. Auch In-vitro-Einw. von „Germanin“ hebt die Infektiosität von Trypanosomen auf. (Ann. of trop. med. a. parant. **19**. 235—41. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 227. Haifa, Labor. malaria res. unit. dep. of health. Ref. ROLF MEIER.) OPPENHEIM

J. Laigret, *Behandlung der menschlichen Trypanosomiasis mit Tryparsamid*. Tryparsamid ist das Na-Salz der Phenylglycinamidarsinsäure. Vf. hat es in einem Versuchsbiete, in dem die menschliche Trypanosomiasis einheimisch ist, verwendet. Es v

er 1. Periode wenigstens ebenso gut wie Atoxyl, in der 2. Periode weit besser u. es in der prophylakt. Bekämpfung der Schlafkrankheit sehr vorteilhaft ersetzen. Die Zwischenfälle dürften nur bei schon sehr schweren klin. Zuständen drohen. Bei vorsichtigem Vorgehen mit kleinen Anfangsdosen sehr selten vorkommen. Das Mittel ist auch gegen „pian“ u. Syphilis wirksam. (Ann. Inst. Pasteur **40**. 173—93. G. Raville, Inst. PASTEUR.) SPIEGEL.

A. E. Tsakalotos, Die trypanocide Wirkung der Chinaalkaloide in vitro. In vitro die trypanociden Konzz. bei 2-std. Einw. für die salzsauren Salze von *Chinin* 1:100, *Hydrochinin* (Methylhydrocuprein) (I) 1:800, *Optochin* (Äthylhydrocuprein) 1:5000, *i-Propylhydrocuprein* 1:1400, *i-Butylhydrocuprein* 1:1500, *i-Amylhydrocuprein* (III) 1:1000. II besitzt neben seiner stärkeren auch eine gut konstante Wirksamkeit. *Hydrochinoxin* (IV) wirkt in 2 Stdn. schon bei 1:10 000. In vivo: I besser, IV schwächer als in vitro. In Vergiftungsverss. an Kaulquappen erwies das wirksamere II nicht wesentlich giftiger als Chinin u. I; bei III u. vor allem die sehr stark giftig waren, überlagert die tox. Komponente fast vollkommen die f. Wirksamkeit. (Biochem. Ztschr. **169**. 454—70. Berlin, Pathol. Inst. d. Univ. Göttingen.) LOHMANN.

Albert Demnitz, Ein Beitrag zur Rolle des *B. proteus* bei bakteriellen Nahrungsvergiftungen. Bei einer Selbsterkrankung wies Vf. sowohl im Patientenstuhl als in einer Probe der verzehrten Wurst *B. proteus* nach. Die aus Wurst u. Stuhl kultivierten Stämme verhielten sich morpholog., kulturell u. tierpathogen gleich; Patientenserum beeinflusste den aus dem Stuhle gezüchteten Stamm spezif. u. unverg. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I. **98**. 141—45. Marburg, Inst. f. experimentelle Therapie „Emil v. Behring.“) GROSZFELD.

H. Peeters, Die ärztliche Bedeutung der chemischen Waffe. Besprechung der Gase. Nichts Neues. (Geneesk. gids **3**. 609—16. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 40. Ref. ZEEHUISEN.) OPPENHEIMER.

Malcolm J. Harkins, Chemotherapeutische Versuche mit Tollwut. Sulpharsen-Salvarsan, Neosalvarsan, Fulmerin, Hydroxymercuri-o-nitrophenol, Gentiana-säure, weinsaures Bi, Äthylhydrocuprein, Chinin, salzsaurer Harnstoff, Merurochrom 220 in Emulsionen des Tollwutgifts nicht unschädlich machen. Tiere, die Mischungen des Virus fixe mit diesen Stoffen intracerebral injiziert bekamen, erkrankten wie die Kontrolltiere. (Journ. of the amer. med. ass. **84**. 1797—98. 1925; Ber. ges. Physiol. **40**. Philadelphia, Res. inst. of cutaneous med. Ref. WINKLER.) OPP.

Joseph Thomas und Robert Fialip, Über die Bedeutung der Oxydations- und Reduktionsercheinungen für die Entstehung des Carcinoms. Neue Hypothesen und Begründungen dafür. Diese Hypothese für die Krebsgenese nimmt ein Gleichgewicht zwischen reduzierenden Anteilen der Zellen (Globuline) u. oxydierenden (metall. Kationen) für die Norm an. Durch Verschwinden der oxydierenden Metallkerne (Mn, Fe) oder deren Ersatz durch der Oxydation unfähige Metalle (K, Zn) werde das Gleichgewicht zerstört u. Carcinombldg. sei die Folge davon. (Ross. internaz. di clin. exp. **6**. 217—23; Ber. ges. Physiol. **33**. 67. 1925. Ref. KAISER.) OPPENHEIMER.

Desider Engel, Über Vitalfärbung von Impftumoren mit Säurefarbstoffen. Lebende Tumorzellen reichern Fuchsin S, Rotviolett, Lichtgrün ST u. Isaminblau in der Carcinomform stark an. (Zeitschr. f. Krebsforsch. **22**. 365—72; Ber. ges. Physiol. **33**. 67. Kiel, Physiol. Inst. Ref. VON MÖLLENDORF.) OPPENHEIMER.

F. Pharmazie. Desinfektion.

W. Wratschko, Methoden der technischen Arzneimittelherstellung. Es wird die Herstellung des südamerikan. Rohkokains angegeben u. die Laboratoriumsmethode zur Bestimmung von Kokains u. der amorphen Basen erörtert. (Pharm. Presse **31**. 96—97.) ROJAHN.

O. Zeckert, *Das indische Opium*. Zusammenfassender Bericht mit Tal über Geschichte des Opiumanbaus, die verschiedenen Produktionsgebiete, Größ Anbauflächen u. der Ausfuhr. Über die Güte des in Indien erzeugten Opiums wir merkt, daß der Morphinumgehalt zwischen 2,77 u. 7,75% schwankt, also niedrige als der des pers. u. türk. Opiums. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 237—48. Wien.) ROJAI

L. Rosenthaler, *Moderne Drogenkunde*. Zusammenfassender Vortrag besonderer Hervorhebung der Notwendigkeit in der Pharmakognosie, der chem. U der Drogen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. (Pharm. Zentralhalle 67. 225 Bern.) ROJAI

G. Wolff, *Die Bedeutung des Teers in der Heilmittelindustrie*. Die aus kohl- u. Holzteer gewonnenen Prodd., sowie Ichthyol u. seine Ersatzpräp sind hinsichtlich ihrer Zus., Eigenschaften u. Verwendung beschrieben. (Seifens Ztg. 52. 327—28. 349—51.) HELL

Bernard F. Howard und Oliver Chick, *Einige Beobachtungen über leichtes W carbonat des Handels*. Vff. stellen fest, daß nach der von A. J. JONES 1925 der mazeut. Konferenz mitgeteilten Methode spezif. leichtes Carbonat darstellba Von den im Handel befindlichen Marken entsprachen nur 3 den P. B. Anforder bzgl. des Bi-Gehaltes, alle anderen enthielten mehr oder weniger CaCO_3 . Nur Marke hielt alle Proben des P. B. 1914 aus. (Pharmaceutical Journ. 115. 661 1925.) ROJAI

Clément Genot, *Einige Versuche über die Identifizierung des Adalins*. $\text{A} (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{C}(\text{Br}) \cdot \text{CO} \cdot \text{NH} \cdot \text{CO} \cdot \text{NH}_2$, F. 117—118°, aus A.; die verschiedenen Darstell methoden werden angegeben. — 5,5-Diäthylhydantoin, $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_2$, aus vorigem Kochen mit Pyridin. — [Äthylcrotonyl]-harnstoff, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH} : \text{C}(\text{C}_2\text{H}_5) \cdot \text{CO} \cdot \text{NH} \cdot \text{CO}$, aus Adalin durch Einw. von wss. Alkali in der Hitze; daneben entsteht ein Ö 283—286°, das der Analyse nach aus zwei Adalinresten besteht, dessen Konst. j noch nicht festgestellt wurde. — Vf. beschreibt weiterhin eingehend die Löslic des Adalins in den gebräuchlichen Lösungsmm., die Mischschmelzpunkte mit zur Verfälschung des Adalins verwandten Verbb. (Bromural, Chloralose, Heo Sulfonal, Tetronal, Trional, Urethan u. Veronal), die Refraktionsindices in ver denen Lösungsmm., mikrochem. Identifizierungsrkk. u. Farbenrkk. mit einer von organ. u. anorgan. Verbb. (Chimie et Industrie 14. 679—85. 1925. Liège, Univ.)

F. Zernik, *Die neuen Arzneimittel und pharmazeutischen Spezialitäten des J 1925*. Aflavol (CASELLA, Frankfurt a. M.), Reinigungsmittel für Trypaflavinflecke Perogen (Dr. NOLL u. Co., Unterschwarzach), Na-Percarbonat mit 15% akt. C Rhinosan (von derselben Firma), Percarbonatpräparat zur Nasenbehandlung Septoforma (jetzt Elberfelder Farbenfabriken), β -Naphthol-Formaldehyd- densationsprod. in Seifenspiritus. — Confidol (Pharmasal, Hannover), er Chinosol, Al. acetico-tartar. u. Borsäure in schleimiger Grundmasse. Antikonzipier Cignolin (BAYER), 1,8-Dioxyanthranol, Ersatz für Chrysarobin. — Ektobron Tosse, Hamburg), 10% NaBr in steriler Invertzuckerlsg. Juckreizstillend. — cophthin (Sächs. Serum-Werk), sterile 20%ig. NaCl-Lsg. mit einem Anästhetiku Stryphnongaze (PAUL HARTMANN A.-G., Heidenheim), mit Methylaminoacetob catechin, Blutstillungsmittel. — Homorenon (Höchstes Farbwerte), Äthylal brenzcatechin. — Diocain (Ciba), ein Homologes des Acoins: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(\text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}(\text{CH}_3)=\text{N}(\text{HCl}) \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{O} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}=\text{CH}_2$. Anästhetikum in der A heilkunde. — Disalgin (Dr. G. HENNING, Berlin), o-Oxybenzylalkohol. Lokalanä tikum für die Chirurgie. — Masernschutzserum nach Prof. Degkwitz (Höchst), Se mittel für ungemaserte Kinder. — Neoreargon (KAHLBAUM), Silbersalze mit An chinonglucosiden, mit 15% Ag-Gehalt. Antigonorrhöikum. — Bismin (WITT u. Co., Münster), Jod-Bi-Chinin in Lecithin u. Cholesterin enthaltender ölige

ion. 6% Bi. — *Bisuspen für Kinder* (HEYDEN), Suspension von 2% Bi-sub-
ylat in Olivenöl mit 1,2% Bi. — *Trépol*, angeblich K-Na-Bi-Tartrat, nach WARREN
ch Gemisch von 36,7% Bi-subcarbonat, 49% bas. Bi-Tartrat, 8% K-Na-Tartrat,
% CaCO_3 u. 2,5% W. (Pharm. Ztg. **71**. 249—52.) ROJAHN.

T. C. Taylor, C. E. Braun und E. L. Scott, *Untersuchungen über Ultrafiltration*
Elektrodialyse von Insulinlösungen. Durch Elektrophorese u. Dialyse ließ sich
elsinsulin in eine sehr akt. u. fast inakt. Fraktion trennen. Beide hatten einen
halt von 14,5%, S enthielt nur der akt. Teil, dessen isoelekt. Punkt bei $\text{pH} =$
-5,2 lag (der der inakt. Fraktion: 4,8—5,0). Bei $\text{pH} = 3,6$ wird der wirksame
il an der negativen Membran niedergeschlagen. Der unwirksame bleibt in Lsg.
Nd. enthielt nur 2% des Gesamtrockengewichts. Die Asche, die auch durch
ällen nicht zu beseitigen war, bestand aus Silicaten. Auf Gew.-Einheit bezogen
die physiolog. Wrkg. nur 100% höher als die des Ausgangsmaterials. Das auf
angedeutete Weise gereinigte Issulin ließ sich in $\text{A} + 25\% \text{H}_2\text{SO}_4$ lösen. Bei
en in Zimmertemp. schied sich die Substanz in Form mikrokristallin. Nadeln ab.
e. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 453—54; Ber. ges. Physiol. **33**. 91. 1925.
York, Div. of chem. a. dep. of physiol. Columbia univ.) Ref. LAQUER. OPP.
C. A. Rojahn und Fr. Gewehr, *Vialonga-Wurmperlen*. 1. Gelatine-
seln, die entgegen der Angabe des Fabrikanten (Vitalonga-Werke, Düren,
nland) neben geringen Mengen Betanol je 0,1 g mit etwa 15—20% Oleum Ricini
tztes Oleum Eucalypti (Ol. Cajeputi) enthalten dürften. 2. Tabletten ent-
n als Hauptbestandteil neben Füllstoffen je etwa 0,08 g Phenolphthalein u. viel-
dazu wenig Chrysophansäure. (Apoth.-Ztg. **41**. 361—62. Braunschweig, Pharmaz.
der Techn. Hochsch.) ROJAHN.

C. A. Rojahn und F. Struffmann, *Bronchiol*. In als Hustenmittel benutztem
arat wurden 7% Kalium sulfogujacolic. festgestellt. (Apoth.-Ztg. **41**. 388.) ROJ.
Paul Unna jr., *Zur Frage der Salbengrundlagen*. Vf. bezeichnet es als äußerst
zmäßig, wenn ein Salbenvehikel das Arzneimittel leicht wieder abgibt, denn wenn
rauf ankommt, eine möglichst langsame oder milde Wrkg. zu erzielen, so wird
im allgemeinen von Salben absehen u. Schüttelmixturen oder dergl. wählen.
en sind aber in allen Fällen so zu gestalten, daß sie das Arzneimittel rasch wieder
ich geben, hierzu eignet sich nach den Verss. des Vf.s am besten Schweineschmalz.
Problem der Rancidität u. der schnelleren Resorbierbarkeit durch die Hornschicht
ermittelt keineswegs gelöst. Um mit Salbengrundlagen möglichst tief in die Horn-
t einzudringen, kann man entweder einem Fett mit hohem F. eins mit beweg-
tem F. hinzufügen, beispielsweise Kakaobutter u. Mandelöl, oder man leitet
Zusatz von Kaliseife zur Salbengrundlage eine gewisse Verseifung der Grund-
ein. Vf. empfiehlt, nicht so viel Gewicht auf die Reinheit der Salbengrundlage
uf rationale u. dem Zweck der Behandlung angepaßte Mischung verschiedener
el zu legen. (Dtsch. med. Wchschr. **52**. 197—99. Hamburg.) FRANK.

Herman Brody, *Die Frage der Seifen in Zahnputzmitteln*. Auf Grund eigener u.
ler Unterrs., deren Literatur mitgeteilt ist, empfiehlt Vf. die Verwendung neu-
oder schwach alkal. Seifen in den Zahnputzmitteln zur Prophylaxe von Caries
deren Zerstörungen der Zähne infolge Unreinigkeit. Saure Zahnpasten sind zu
erfen. (Amer. Perfumer **21**. 55—57.) HELLER.

J. Brusser, *Über Urgon, ein neues Antihidrotikum*. *Urgon* (Herst. *Urgon* n-
rik, München-Danzig) besteht aus 36,3% A., 30% Maismehl, 10% ZnO , 1,7%
ylsäuremethylester u. 1,5% Formalin. Das Präparat bewährte sich bei Behand-
von Schweißfuß. (Dtsch. med. Wchschr. **52**. 153. Berlin, Poliklinik f. Haut-
ch. Prof. MAX JOSEPH.) FRANK.

Josef Schumacher, *Zur Chemie der Desinfektion und über Beziehungen zwischen*
schwerer Konstitution und pharmakologischer Wirkung. Zugleich ein Beitrag zur

Vitalfärbung. (Vgl. S. 2369.) Die Erörterung der vom Vf. gemachten Beobachtung führt zu dem Schlusse, daß für die Desinfektion es darauf ankommt, daß das Infiziens stärker l. in Lipoiden oder Lipoproteiden als in W. ist u. daß der Fixier des Desinfektionsmittels chem. eine Salzbildung zugrunde liegt, mithin der Infektionsprozeß ein chem. Vorgang ist. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk., Abt. I. 98. 67—81. 2 Tafeln. Berlin.)

SPIEGEL

Agoleum Gesellschaft m. b. H., Wien, *Herstellung von haltbaren kolloidalen Lösungen von Silber bzw. von Quecksilber neben Silber in Ölen, Fetten oder Fettsäuren*. 1. dad. gek., daß man Ag-Verbb., die verseifbare Öle, Fette oder Fettsäuren in Kälte oder beim Erhitzen in Ag-Seifen überführen, in diese Öle, Fette oder Fettsäuren bei Tempp. zwischen 200 u. 300° einträgt, die erhaltene Lsg. filtriert u. durch H₂ an kolloidalem Ag anreichert. — 2. dad. gek., daß man die Öle, Fette u. Fettsäuren vor Eintragung der Ag-Verb. mit etwas in Öl l. Reduktionsmitteln, wie Hydrochinon, versetzt. — 3. dad. gek., daß man die kolloidale Ag-Lsg. in Ölen, Fetten oder Fettsäuren nach 1. u. 2. mit Hg oder HgO oder einer anderen Hg-Verb., gegebenenfalls unter Anwendung von Wärme, behandelt. — Man erhitzt z. B. *Olivennöl, Ricinöl oder Schweinefett* auf 200°, trägt hierauf Ag₂O-AgOH-Gemisch, erhalten durch Fällung einer Ag-Salzlsg. mit NaOH, unter Umrühren u. Steigerung der Temp. bis 300° erwärmt ½ Stde. weiter, filtriert u. leitet in das h. Filtrat H₂ ein, bis die Schwärze der Lsg. nicht mehr zunimmt. Durch Zugabe von *Hydrochinon* vor der Verseifung werden höhere Ag-Konz. erhalten. — Analog verfährt man bei Verwendung einer *hochmolekularen Fettsäure*. — Versetzt man eine *kolloidale Ag-Lsg.* in *Olivennöl* mit 1,5% Ag mit einigen Tropfen Hg, erhitzt ½ Stde. auf ca. 200° u. trennt das ungelöste Hg ab, so entsteht eine wesentlich dunklere Lsg., die neben 1,5% Ag, 2% Hg kolloidal gel. enthält. — Schüttelt man eine *kolloidale Ag-Lsg.* in *Schweinefett* enthaltend 4% Ag mit HgO bei ca. 80—100°, erhitzt ½ Stde. auf 200° u. filtriert, so erhält man eine kolloidale Ag-Hg-Lsg. mit 2,5% Hg. Die kolloidalen Lsgg. finden *therapeut.* Verwendung, die in Ölen hergestellten sind leichtfl. (**E. P. 212 914** vom 11/3. 1924, ausg. 7/5. 1924. Oe. Prior. 14/3. 1923. **Oe. P. 101 031** vom 14/3. 1924, ausg. 25/9. 1925. **Schwz. P. 111 237** vom 10/3. 1924, ausg. 1/8. 1925. Oe. P. 14/3. 1923.)

SCHOTTLÄNDER

George Louis Cousineau, Long Beach, California, V. St. A., *Zu Injektionszwecken geeignete, beständige und wirksame Drüsenauszüge. Schilddrüsen oder Ovarien* oder andere Drüsen mit innerer Sekretion werden frisch geschlachteten, jungen Säugetieren entnommen, zerkleinert u. zu einem feinen Brei zermahlen. Der Brei wird mit physiol. NaCl-Lsg. vermischt, mit einem Antisepticum, wie absol. A., reinem Phosphorw. H₃BO₃ oder in W. suspendierter Salicylsäure versetzt u. das Ganze in Ampullen gefüllt. Die Prodd. enthalten sowohl die l. als auch die unl. Bestandteile der Drüsen unl. Anteil in der Fl. suspendiert. Sie lassen sich subcutan oder intramuskulär dem menschlichen Organismus einverleiben. (**A. P. 1 579 086** vom 8/12. 1924, ausg. 30/3. 1926.)

SCHOTTLÄNDER

Charles Wesley Monroe, Parkersburg, West-Virginia, V. St. A., *Mittel gegen Pyorrhoe*, bestehend aus einem l. Alkalijodid u. einem Enzym. — Man reibt das Zahnfleisch entweder mit einer wss. Alkalijodidlsg. ein oder verreibt eine wss. Lsg. des Jodids, z. B. NaJ, mit Zusätzen, wie Pfefferminzöl, Süßholzextrakt u. Pepsinessenz, innerlich. (**A. P. 1 567 974** vom 1/6. 1923, ausg. 2/10. 1925.)

SCHOTTLÄNDER

Gustav Rothe, Frankfurt a. M., *Träger für Sondernähr- und Heilmittel*. Dem Ref. nach Schwz. P. 111 663; C. 1926. I. 2604 (Döring) ist nachzutragen, daß die porösen Träger sich insbesondere für ätzende fl. Arzneimittel, wie HCl oder H₂SO₄, eignen, deren Wrkg. vom Darm aus erfolgen soll. Um ein Eintrocknen

zu verhindern, überzieht man die Träger außen mit Wachs oder anderen geeigneten Stoffen. (E. P. 224 529 vom 4/11. 1924, ausg. 7/1. 1925. Blg. Prior. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

G. Analyse. Laboratorium.

Ralph E. Terry, *Eine einfache Methode zur Trennung unmischbarer Flüssigkeiten*. Vf. beschreibt eine einfache Vorr., bestehend aus einem Cylinder, in den die rennenden Fl. kommen u. einem Dest.-Kolben, der mit dem Ansatzrohr in die e Schicht eintaucht. Mit Hilfe der Pumpe wird die Fl. in den Kolben gesaugt. (Ann. Amer. Pharm. Assoc. 15. 203. Universität von Süd-Californien.) ROJAHN.

M. I. Istrati, *Über die Bestimmung des Koeffizienten des inneren Wärmeleitmögens des Quecksilbers*. Vf. gibt eine besondere Methode zur Messung der inneren leitfähigkeit des Hg an, die erhaltenen Werte für den Leitfähigkeitskoeffizienten ergeben im Mittel 0,020 mit einer Genauigkeit von etwa 10%. (Ann. scient. Jassy 14. 23—27.)

FRANKENBURGER.

J. R. H. Coutts und **E. M. Crowther**, *Eine Fehlerquelle bei der mechanischen Analyse von Sedimenten durch kontinuierliches Wägen*. (Vgl. COUTTS, S. 603.) Sedimentationsverss. an bestimmten Fraktionen von Böden mit der Odénschen Wage (Soil Science 19. 1; C. 1925. II. 598) ergaben beträchtliche Differenzen zwischen gefundenen u. berechneten Gewichten des Sediments. Als Fehlerquelle wurde B. von Flüssigkeitsströmungen erkannt, die kurz nach Beginn der Sedimentation h die geringe D. der Suspension unterhalb der Wagschale verursacht werden. (den gebräuchlichen großen Schalen mit schmalen Rand nimmt die Ausbeute h aus beobachtetem u. theoret. Gewicht des Sediments) mit steigender Entfernung h der Schale vom Boden des Sedimentationszylinders ab (besonders schnell in einem h), u. zwar für die feinsten Fraktionen am stärksten; die aus den Gewichten hnehete Verteilungskurve wird also verzerrt. Bei kleineren Schalen mit höheren h sind die Abweichungen geringer; einige Schalenformen geben Ausbeuten h. (Trans. Faraday Soc. 21. 374—80. 1925. Rothamsted, Exp. Stat.) KRÜ.

Donovan Werner, *Eine einfache Methode zur Bestimmung der Größenverteilung Teilchen in Böden und Niederschlägen*. Die betreffende ca. 1%ig. Suspension wird in langes, enges zylindr. Glasrohr gefüllt u. mittels Lupe u. Skala die Höhe h des Sediments zu verschiedenen Zeiten t abgelesen. Aus der t-h-Kurve kann die Größenverteilung nach der Theorie von FISHER u. ODEN (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 44. 1924; C. 1925. I. 414) berechnet oder graph. ermittelt werden. Das graph. Verf. vereinfacht sich, wenn die Suspension in einem besonderen, oberhalb des Sedimentationsgefäß befindlichen Mischraum hergestellt wird, aus dem es durch einen Hahn h mit Fl. gefüllte Sedimentationsrohr eintreten kann. Die erforderliche Apparatur ist sehr einfach; die Methode beansprucht wenig Material u. ist auch bei grobteiligen Suspensionen (bis zu 150 μ u), wo der Gebrauch der automat. Wage versagt, anwendbar. Beispiele werden die Sedimentationskurven von Sand, Ton, Zement u. der Kornverteilungen stimmen mit den nach anderen Verff. (Siebanalyse, mkr. Bestimmung, automat. Wage) erhaltenen Resultaten gut überein. (Trans. Faraday Soc. 21. 381—89. 1925.)

KRÜGER.

A. Bouwers, *Messung der Intensität von Röntgenstrahlen*. Prinzip der Methode. (Ztschr. f. Physik 14. 374; C. 1923. III. 101). Zur Vermeidung von Fehlerquellen Rolle des Instruments mittels monochromat. Strahlen (K-Strahlen von Pt, W, Mg, Mo). Messung mit einem Bolometer. (Acta radiol. 4. 368—76. 1925; Ber. Physiol. 33. 657. Ref. WRESCHNER.)

OPPENHEIMER.

Ernest Little, *Die Bestimmung der Acidität*. Ausführlicher Bericht über Best. von p_H . (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **15**. 178—89.) ROJAHN

Frank Maurice Cray und **George Meredyth Westrip**, *Die Herstellung von Lösungen von bestimmter Wasserstoffionenkonzentration und die Messung von Indicatorbereich in einem Aceton-Wassergemisch mit 10 Vol.-% Wasser*. Die $[H^+]$ von Puffergemischen aus Phthalsäure + Na-Phthalat, Essigsäure + Na-Acetat, Glykolsäure + Na-Glykol, Monochloressigsäure + monochloressigsäurem Na wird mit Hilfe der Kette: (Pt) | Chinhydron | gesätt. KCl-Lsg. | Pufferlsg., Chinhydron | (Pt) bestimmt, das Lösung ist Aceton mit 10 Vol.-% W. Bis $p_H = 12,2$ gibt die Chinhydronelektrode gut reproduzierbare u. konstante Werte, die, wie Messungen der $[H^+]$ in Essigsäure + Na-Ac zeigen, mit denen der H-Elektrode gut übereinstimmen. Die H-Elektrode neigt Aceton-W. zu Vergiftung. Mit den kalibrierten Puffergemischen wird der Umschlagbereich folgender Indicatoren in Aceton-W. ermittelt: Phenolrot, α -Naphtholbenz, Bromthymolblau, Rosolsäure, o-Carboxybenzolazobenzyl- α -naphthylamin, Äthylrot, Bromkresolgrün, i-Pikraminsäure, Bromphenolblau, o-Carboxybenzolazodiäthyl- α -naphthylamin, Propylrot, Bromkresolpurpur, o-Carboxybenzolazo- α -naphthylamin, Alizarin, o-Carboxybenzolazophenyl- α -naphthylamin, alizarinsulfosaures Na, 1-Oxy-2,6-dinitrobenzylaminobenzol, β -Nitroalizarin, o-Carboxybenzolazo-m-phenyldiamin, Magdala, m-Kresolpurpur, Benzoylauramin, Nitrooxyalizarin, Benzolazo- α -naphthylamin, Thymolblau, Benzolazodiäthyl- α -naphthylamin, Methylrot, Äthyl- u. Methylorange, Benzolazodiäthylanilin, Dimethylaminoazobenzol, m-Carboxybenzolazodiäthylanilin, Amino- benzol, Chloraminoazobenzol u. Oxyaminoazobenzol. Für einen Teil der Indicatoren wird auch die scheinbare Dissoziationskonstante nach einem einfachen colorimetrischen Verf. gefunden. Das Verh. der Indicatoren in verschiedenen Standardlsgg. stimmt mit der elektrometr. gemessenen p_H mit Ausnahme von Bromkresolpurpur gut überein. (Trans. Faraday Soc. **21**. 326—37. 1925. Woolwich, Royal Arsenal.) KRÜGER

E. Collard, *Halbbarkeit titrierter Lösungen von Natriumhyposulfit*. (Ann. Ch. analyt. appl. [2] **8**. 65. — C. 1926. I. 1238.) SÜVERI

W. Jaeger und **H. v. Steinwehr**, *Über die Verbrennungswärme der Benzoesäure*. Antwort an VERKADE u. COOPS (S. 984; vgl. auch SWIETOSLAWSKI, S. 2440). Die elektr. Eichung des Calorimeters von E. FISCHER-WREDE entzieht sich völliger Beurteilung durch andere Beobachter. Das Joule von FISCHER-WREDE ist anders als das jetzt angenommene; die spezif. Wärme des W. ist von der „internationalen“ anders angenommen als von der PTR. Um wie viel sich die Werte von 1906 u. von 1922 unterscheiden, ist nicht genau bekannt. FISCHER-WREDE haben ihre Benzoesäure wochenlang über P_2O_5 getrocknet, VERKADE ein- bis zwei Tage, DICKINSON gibt nichts darüber an. Es ist weder bewiesen, daß die deutsche Benzoesäure unrein, noch daß die Eichung durch die PTR. ungenau war, daß aber die Fehler zum Teil aufheben. (Ztschr. f. physik. Ch. **119**. 214—18. Phys. Techn. Reichsanstalt.) W. A. ROTH

Louis Hackspill und **Georges d'Huart**, *Über einige sehr genaue gasvolumetrische Bestimmungsmethoden*. Es wird 1. eine neue Methode der organ. Elementaranalyse, 2. eine direkte Best. des W.-Dampfes in Gasen aus dem Druck, 3. eine neue volumetrische Best. von Kohlenstoff in Stahl beschrieben. — 1. Die bei der Verbrennung entstehenden Gase, CO_2 , N_2 u. H_2O werden volumetrisch bestimmt; H_2O wird bei -80° aus dem Gemisch herauskondensiert, $CO_2 + N_2$ werden entweder zusammen bestimmt u. dann CO_2 aus dem Gemisch durch K_2CO_3 -Lsg. absorbiert oder CO_2 wird vorher durch CaH_2 herauskondensiert. H_2O wird darauf verdampft, durch CaH_2 gebunden u. die sich dabei entwickelnde H_2 gemessen. Mit Substanzmengen von nur 10—20 mg wurden sehr gute Resultate erzielt. — Apparatur: 1 einseitig geschlossenes Quarzrohr, 350 mm lang, 5 mm weit, ist in vertikaler Stellung durch Schliff mit den übrigen aus gewöhnlichem Glas bestehenden Teilen verbunden, nämlich W.-Kondensationsgefäß, Ca-

mit Umgehungsleitung u. Hahn, Manometer u. Vakuumpumpe nach GERMANN-DOSO (Journ. de Chim. physique **10**. 306 [1912]), die die Messung der abgesaugten Gase gestattet. — Ausführung: Die getrocknete Substanz wird auf den Boden des Quarzrohres gebracht, 10 cm hoch mit CuO u. einem Pfropfen aus feinem Cu-Draht bedeckt. Die Apparatur wird evakuiert, die Substanz gekühlt, dann das Quarzrohr mittels eines übergeschobenen elektr. Ofens allmählich von oben her bis auf 800° erhitzt. Die Gase werden über Hg in auf $\frac{1}{100}$ cm graduierten Eudiometerröhren aufgesaugt. Zur Absorption von CO₂ aus dem CO₂-N₂-Gemisch läßt man mittels einer mit W. gefüllten Röhre W. u. ein Stückchen K₂CO₃ in das Eudiometerrohr treten u. ebenso vor der Messung des N₂ etwas Hydrosulfitslg. zur Absorption von freiem O₂, die durch Dissoziation des CuO im Vakuum entstehen. — 2. Mit derselben Apparatur, mit der Änderung, daß an Stelle des Quarzrohres ein Glasballon von genau bekanntem Vol. verwandt u. das W.-Kondensationsgefäß fortgelassen wurde, konnte der Feuchtigkeitsgehalt von Gasen gemessen werden. — 3. Zur Best. von C im Stahl: Ein Stück dieser in einen mit Rückflußkühler versehenen Kolben gebracht, mit HCl u. Salzsäure zers., die entweichenden KW-stoffe u. CO₂ im Wasserstrahlvakuum über ein mit CuO geleitet u. bei —190° kondensiert. Darauf wird der Kolben von der Apparatur durch einen Hahn abgeschlossen, diese auf $\frac{1}{100}$ mm evakuiert, das Kondensationsgefäß auf —80° gebracht; das entweichende CO₂ wird hinter der Röhre aufgefangen u. gemessen. (Ann. de Chimie [10] **5**. 95—133. Straßburg, Fac. Sciences.)

R. SCHMIDT.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Giuseppe Cappelli, *Untersuchung über die Milchsäure im Magensaft und ihre chemische Feststellung*. Der Nachweis von Milchsäure durch Überführung in Aldehyd mittels konz. H₂SO₄ u. dessen Farbrkk. mit Phenolen wird einer genauen chem. Prüfung unterzogen. Bei Verss. die in einer Porzellanschale mit 5 ccm konz. H₂SO₄, dem Phenol u. einem Tropfen Milchsäurelg. ausgeführt wurden, zeigten Anisol, Anetol, α -Naphthol, β -Naphthol, Eugenol, i-Eugenol u. Oxyhydroxyacetone aus, da die Färbungen, die man mit u. ohne Acetaldehyd erhielt, gleich oder sich ähnelten. Von den übrigen Phenolen gaben die folgenden sofort charakteristische Farbrkk.: Phenol, p-Kresol, Thymol, Brenzcatechin, Resorcin, Hydrochinon, Guajacol, Pyrogallol, Phloroglucin. Die Färbungen gingen nach 2 Min. langem Erhitzen im Wasserbade in Rotbraun über mit Ausnahme von Brenzcatechin, Guajacol, Phloroglucin, die nach 2 Min. fuchsinrote oder orangerote Färbungen zeigten. Wiederholungen der Verss. im Reagenzglas wurden nach Prüfung durch entsprechende Leerverss. mit alkoh. Lsgg. der Phenole nach DENIGÈS ausgeführt. Nach diesen Verss. waren die Färbungen infolge Nebenrkk. nicht mehr deutlich, nur bei Phloroglucin zeigte sich eine Stabilität der Färbungen. Die brauchbaren Phenole werden in ihren Empfindlichkeitsgrenzen geordnet angegeben; das empfindlichste Reagens ist p-Kresol mit 1:100 000 für Milchsäure u. 0,49:100 000 für Acetaldehyd.

Für die diagnost. Feststellung von Milchsäure im Magensaft ist die bisher allein angewandte Rk. von UFFELMANN unzuverlässig, da sie auch mit Citronensäure, Oxalsäure, Malonsäure, A., Glykose u. sogar mit Salzsäure eintritt. Für die Anwendung der oben genannten Farbrkk. ist zuvor die Abscheidung der Milchsäure unbedingt erforderlich, da bei direkter Anwendung der Rk. auf den Magensaft Störungen möglich sind. Der Magensaft wird unter Zusatz von BaCO₃ oder Na₂CO₃ verdampft, mit H₃PO₄ angesäuert, mit Ä. unter Zusatz von A. ausgeschüttelt u. mit äther. Lsg. mit W. eingedampft: Lsg. „A“. Nachweis der Milchsäure 1. als Zinklactat mit ZnO oder ZnCO₃, das dabei isolierte Zinklactat wird mit H₂SO₄ u. W. durch Erhitzen im Bombenrohr (8 Stdn.) zersetzt, aus dem Rk.-Prod. der Aldehyd abdestilliert u. mit p-Kresol identifiziert. 2. Aus Lsg. „A“, K-KJ-Lsg. u. NaOH fällt bei

Ggw. von Milchsäure Jodoform, das durch Geruch oder Carbylaminrk. nachgewiesen wird. 3. Farbkrk. nach Überführung der Milchsäure in Acetaldehyd bei 100° Wasserbad geben 3 Tropfen 1%ig. alkoh. Lsg. von p-Kresol (Capelli) rote, 1% alkoh. Lsg. von Brenzcatechin fuchsinrote, u. 1%ig. alkoh. Lsg. von Guajacol (DENIG) fuchsinrote Färbung. 4. Nachweis durch das bei Überführung in Acetaldehyd wickelte CO (bläuliche Flamme oder Ag-Abscheidung aus ammoniakal. oder be- natron-ammoniakal. AgNO₃-Lsg.) Schließlich wird die Einführung dieser Prüfung auf Milchsäure an Stelle der bisher angewandten in die amtliche Pharmakopö e- fohlen. (Annali Chim. Appl. 16. 53—68. Florenz, Militär-Sanitätsschule.) LEHMA

L. Utkin-Ljubowzow und **Xenia Utkin-Ljubowzow**, *Eine neue Methode Bestimmung der Serumtrypsinen*. Die Methode beruht darauf, daß man Serumprot, an Casein adsorbiert, welches aus der Lsg. durch ein Acetatgemisch ausgefällt v. Nachdem so u. durch Waschen mit W. Serumreste u. Antitrypsin entfernt sind, we- das Casein + Protease in Sodalsg. gel., mit Phosphatpuffer versetzt u. sofort s- nach 24 Stdn. der N bestimmt. — Es werden 1 ccm Serum + 3 ccm 1%ig. neut. Caseinlsg. mit 0,5 ccm Acetatgemisch (1/1-n. Essigsäure: 1/1-n. Acetat = 1:1) s- setzt, der sofort entstehende Nd. abzentrifugiert u. zweimal mit hundertfach v. Acetatgemisch gewaschen. Der Nd. wird in 5 ccm 0,2%ig. Na₂CO₃-Lsg. gel., 6,5 W. zugesetzt u. in 1 ccm der Fl. der N (Mikrokjeldahl) bestimmt. Je 5 ccm wer- zwei Erlenmeyerkolben mit je 5 ccm m/3-Phosphatpuffer pH = 7,1 vermischt u. in ei- Kolben sofort, im zweiten nach 24 Stdn. bei 37° der N nach Enteiweißen mit E- hydroxyd u. K₂SO₄ ermittelt. (Biochem. Ztschr. 169. 100—04. Moskau, Staatl. Ch- Pharmaz. Forschungsinst.) HESS

Morie Aoki, *Modifikation der Widmarkschen Mikromethode zur Bestimmung Blut-Alkohols*. Geringe Modifikation der Widmarkschen Methode. (Journ. Biochemi 5. 327—31. 1925. Hokkaido, Imperial Univ.) HÜCKE

Charles E. Brunton, *Der Blutharnstoff und seine Bestimmung bei Diabetes mell.* Harnstoffbest. nach TWORT u. ARCHER (Umwandlung durch Urease.) w- brauchbar befunden. Insulin ist ohne Wrkg. auf den Blutharnstoffgehalt. (Qu- journ. of med. 18. 241—49; Ber. ges. Physiol. 33. 130. 1925. Red. LAQUER.)

Henry J. John, *Glykolyse*. Glykolyse erfolgt im Diabetikerblut langsamer im n. u. geht bei Zimmertemp. energ. vor sich als bei Eisschrantemp. Berücksichtig- der Glykolyse bei den *Blutzuckerbest.* erforderlich. (Ann. of clin. med. 3. 667— 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 128. Ref. SCHULZ.) OPPENHEIME

A. Jakowlewa, *Die Bestimmung des Ca-Gehaltes im Blute bei verschiedenen krankungen*. Aufzählung von patholog. Zuständen, bei denen der Ca-Gehalt des Bl- n., erhöht oder erniedrigt ist. (Russkaja Klinika 4. 165—73. 1925; Ber. ges. Phy 33. 719. Ref. JAKOWLEWA.) OPPENHEIME

A. H. Roffo, *Reduzierende Kraft des Serums von Mäusen mit malignen Tum-* Nach Zusatz von Dinitrobenzol wird nach 24 Stdn. auf colorimetr. Wege der Ge- des Blutes an Metanitrophenylhydroxylamin bestimmt. Serum von Tumorkra- Tieren besitzt eine viel größere Red.-Kraft als das n. Tiere. (Bol. del inst. de m- exp. 1. 24—27; Ber. ges. Physiol. 33. 67—68. 1925. Ref. HARTMANN.) OPPENHEIME

Luigi Condorelli, *Mikromethode zur Bestimmung von Ca und Mg in organis- Flüssigkeiten*. (Rendiconto Accad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3.] 31. 73—83. 1- — C. 1926. I. 451.) GRIMM

Karl Hermann Voitsel, *Die Theorie der Langeschen Goldsolreaktion*. Vf. die Goldsolrk. für eine Ausfällungsrk., die mit kolloidalen Schutzwkkg. nicht- tun hat. (Dtsch. Ztschr. f. Nervhik. 85. 180—95. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. Leipzig, Med. Klin. Ref. SELIGMANN.) OPPENHEIME

G. B. Belloni und **M. Peserico**, *Die Silbernitratreaktion in der Wärme im- Geisteskranker*. Bei Dementia praecox kommt bei stark ermüdeten n. Menschen

ende „Schwarzrk.“ so häufig vor, daß pathogenet. Beziehungen der Erkrankung Stoffwechsel angenommen werden. (Riv. sperim. di Frenatr., arch. ital. per la t. nerv. e ment. **49**. 160—65. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 733. Padua, Clin. d. t. nerv. e ment. Ref. KAFKA.)

OPPENHEIMER.

George B. Wallace und Joseph S. Diamond, *Die Bedeutung des Urobilinogens rin als Zeugnis für die Leberfunktion. Mit einer Beschreibung einer einfachen quanten Methode der Urobilinogenbestimmung.* Die Rotfärbung des n. Harn mit dem phischen Aldehydreagens dient als Vergleichsgrundlage. Urobilinogenreicher Harn so lange verd., bis die Rotfärbung gerade noch angedeutet ist. Der Verdünnungs- dient als Maßstab des Urobilingehalts. Anwendung der Methode bei verschiedenen nungen, besonders Leberveränderungen. (Arch. of internal med. **36**. 698—725. ; Ber. ges. Physiol. **33**. 735—36. Ref. HORSTERS.)

OPPENHEIMER.

Jans Ryser, *Über ein Verfahren zur schätzungsweisen Bestimmung der Wasser- menkonzentration im Mageninhalt mit Hilfe des Kongopapiers.* (Schweiz. med. chr. **55**. 357—59; Ber. ges. Physiol. **33**. 108. 1925. Ref. DRESEL.)

OPP.

L. Ekkert, *Ein Beitrag zu den Reaktionen des Antipyrins (1), Amidopyrins (2) und midons (3).* Zur Unterscheidung von 1 u. 2 gibt Vf. 2 Rkk. an: I. 0,05 g Substanz em W. lösen, mit 2 cem 2%ig. Nitroprussid-Na-Lsg. versetzen. 2 sofort dunkel- dann violett, weinrot, granatrot. 1 nur schwach grünlich. Durch eine Messer- (0,05 g) Salicylsäure schlägt Färbung in lebhaft blutrot um. 1 auch nach Zusatz Salicylsäure nur schwach grün. Pyramidon wie 2. — II. 0,05 g Substanz in 2 cem sen, 5 Tropfen 2%ig. $K_2Cr_2O_7$ -Lsg. zugeben u. mit Messerspitze Salicylsäure an- n. 1 keine auffallende Färbung, 2 grünlichbraun, dann dunkelgrün, weinrot, rot, granatrot. Pyramidon wie 2. (Pharm. Zentralhalle **67**. 196—97. Budapest, . Inst. d. Univ.)

ROJAHN:

A. Rojahn und F. Struffmann, *Über den Nachweis und die Bestimmung talium sulfoguaiajolicum in Hustensäften usw.* Bei stark gefärbten zuckerhaltigen raten wird K sulfoguaiajolic. folgendermaßen nachgewiesen: 5 cem mit 5 cem W., Bleiessig u. 5 cem A. versetzen, zentrifugieren oder absaugen, Nd. mehrmals e 10 cem W. waschen. Nd. mit 10 cem verd. H_2SO_4 u. Messerspitze Tierkohle nuten auf Wasserbad erwärmen, farbloses Filtrat prüfen: 1. ammoniakal. $AgNO_3$ - wird in der Wärme reduziert. 2. $HCHO + H_2SO_4$ violette Zone. 3. 5 cem Filtrat verd. NH_4OH neutralisieren u. eindampfen. Wss. Lsg. des Rückstandes wird verd. $FeCl_3$ -Lsg. blau. Tritt hierbei durch vorhandene Gerbstoffe tintenartige ung auf, so muß zunächst anstatt mit Bleiessig mit Pb-Acetat Gerbstoffe gefällt, t alsdann mit Bleiessig wie oben behandelt werden. Die quantitative Best. ge- it durch Best. von SO_4^{--} in der mit Soda veraschten Substanz. (Apoth.-Ztg. **41**. 399.)

ROJAHN.

Julius v. Mikó und Stefan v. Mikó, *Gehaltsbestimmung der Guarana.* Vf. be- tit die Methoden zur Coffein-Best. in Guarana, nach dem amerikan., österreich. gar. Arzneibuche. Er stellt fest, daß nach dem Verf. des zuerst genannten der e Coffeinerückstand erhalten wird, daß aber die schwach bräunliche Färbung des den anderen Vorschriften erhaltenen Rückstandes das Resultat nicht beeinträch- Vf. vereinfacht das Verf. der ungar. Pharmakopöe dadurch, daß er das alkoh. mpfen wegläßt u. den Abdampfrückstand der Chlf.-Ausschüttelung durch Lösen W. u. nachfolgendes Eindampfen reinigt. Vf. gibt ferner folgendes Verf. zur ativen Identifizierung der Guarana mit Hilfe der Murexidrk. an: 0,1 g Pulver eagensglas mit 10 cem Chlf., 5 Tropfen 5-n. NH_4OH 1 Minute schütteln, Filtrat rzellanschale eindunsten, Rückstand mit 3 cem 3%ig. H_2O_2 u. 5 Tropfen 5-n. eindampfen. Orangeroter Amalinsäurerückstand wird mit 1 Tropfen NH_4OH terist. kupferrot. Probe ist noch eindeutig mit 0,05—0,075 g 4% Coffein ent- der Guarana u. kann durch Vergleichsverss. auch zur quantitativen Best. dienen.

(Pharm. Zentralhalle **67**. 193—96. Debrecen, Ungarn, Apotheke der Stefan I Univ.) ROJAF

L. Rosenthaler, *Bemerkungen zu Flores Cinae*. Da seit 1912 oft santonin- oder -arme, also verfälschte Droge in den Handel kommt, wird ein Verf. zur ras u. sicheren Unterscheidung angegeben: Man befeuchtet wenig grob gepulvertes Material auf Objektträger mit wenig W., bedeckt mit Deckglas u. läßt bei leicht schief gestelltem Objektträger Chlf. zwischen dieses u. das Deckglas treten. Nach Abdunsten des Chlf. befeuchtet man die Randschicht mit wenig alkoh. KOH. Bei echter Droge tritt das eine stark orangerote Färbung (Santonin) auf, bei santoninfreier eine gelbgrüne. Pflanzenselbst darf nicht mit Lauge in Berührung kommen, da sonst auch falsche Cina orangerote Färbung gibt. Vf. bespricht die anderen für die Santoninengewinnung in kommenden Artemisiaarten u. weist auf Zweckmäßigkeit u. Möglichkeit des Anbaues in Europa hin. (Pharm. Zentralhalle **67**. 211—12. Bern.) ROJAF

J. B. Berardi und M. C. Canan, *Chemische und biologische Prüfung von Digitalis Cascara Sagrada*. Die vom amerikan. Arzneibuch vorgeschriebene Farbrk. auf Cascara (1) ist unbrauchbar, da auch andere Emodindrogen, wie *Frangula* (2), *Aloë*, *Rhabarber* (4) u. *Senna* ähnliche Rkk. geben. Vff. extrahieren Fluidextrakte von Digitalis mit I. Äther: Farb- u. Bitterstoffe, sowie abführend wirkende Stoffe werden vollständig aufgenommen; äth. Lsg. gibt beim Schütteln mit NH_4OH folgende Farbrkk.: 1 orangegelb, 2 purpurrot, 3 orangerot, 4 kirschrot. Intensität der Färbung steht in direkter Beziehung zur Konz. II. Essigester: Rkk. mit NH_4OH : 1 rosarot, 2 kirschrot, 3 Fällung u. kirschrote Fl., 4 Essigester tiefrot, NH_4OH hellgelb. — Die Fluidextrakte werden mit Bleiessig gefällt, Ndd. abfiltriert, mit W. gewaschen u. Ndd. in Essig gelöst. Beim Schütteln mit NH_4OH folgende Färbung: 1 rosarot, 2 hellrosa, 3 orangegelb, 4 purpurrot.

Verss. zur Trennung des akt. Prinzips, der Bitter- u. Farbstoffe im Cascarapulver: 100 g werden mit Ä. extrahiert, mit W. versetzt, Ä. abdest., Bitterstoff (1) löst sich orangegelb in W., gleichzeitig scheidet sich tieferer gummiartiger, nicht bitterer Körper (2) aus. Beide sind therapeut. akt. 1 wird mit NH_4OH orangebraun, 2 kirschrot. Verhältniss von 1:2 wie 2,41—3,06 : 4,89—7,1 g. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **189**—93. Pharmazeut. Lab. Univ. Illinois.) ROJAF

Edward L. Griffin, *Abänderungsvorschlag für die offizielle Methode zur Bestimmung des Kresols in Liqueur Cresoli compositus*. Die Methode des amerikan. Arzneibuchs gibt zu hohe Werte, da das abgeschiedene Kresol mit K_2CO_3 getrocknet wird u. wahrscheinlich als Kal. kresolat aufnimmt. Vf. schlägt deshalb als Trocknungsmittel entwässertes CuSO_4 vor. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **15**. 196—98. Washington, D. C.) ROJAF

Bohrisch, *Mitteilungen aus der Praxis*. Zur schnellen Unters. von Tinkturen wird die Capillaranalyse empfohlen. Bei Jodtinktur schlägt Vf. vor, einen KJ-Zusatz entsprechend der französ. Pharmakopöe im neuen Arzneibuche vorzuschreiben, sich dann J schneller löst u. Tinktur haltbarer ist. Es wird die Notwendigkeit der Gehaltsbest. von Tinct. Opii betont u. auf die von BOHRISCH u. KÜRSCHNER (Apoth. Ztg. **31**. 53. C. 1916. I. 588) ausgearbeiteten vereinfachten Methoden hingewiesen. Genaue Vorschrift wird angegeben. Morphinbest. ist auch mit 25 statt 50 g Tinktur gut ausführbar. (Apoth.-Ztg. **41**. 386—88. Dresden.) ROJAF

H. W. Vahlteich, *Die Haltbarkeit der officinellen Pepsinpräparate*. Vf. untersuchte die Haltbarkeit von Pepsin-Glycerinlsgg. u. Pepsinelixiren N. F. IV für 1916 u. mit Zusätzen von HCl u. verschiedenen Purinderivv. bei 2-jähriger Aufbewahrung. Vf. findet, daß sich die Glycerinlsgg. unverändert halten, während die Elixire ihre verdauende Kraft teilweise verlieren. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **15**. 193.)

Sidney H. Katz, Pittsburgh, Pennsylvan., *Quantitative Gasbestimmung*. Man wirft die zu untersuchenden Gase der Einw. akt. Kohle, dann wird über einen Analysator geleitet u. zuletzt die Temperatursteigerung gemessen. (A. P. 1578 666 12/3. 1925, ausg. 30/3. 1926.) KAUSCH.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

Blaschke, *Wärmewirtschaft in chemischen Betrieben*. Zusammenfassende Erörterung des Problems unter spezieller Berücksichtigung der Hanomag-Steilrohrkessel, Zerkessel u. Heizdampfgegendruckmaschinen. (Chem.-Ztg. 50. 189—91. 226 7. Charlottenburg.) JUNG.

Heinz Winkelmann, *Wärmekleider aus Glasgespinst*. Vf. weist auf die Wichtigkeit der Wärmeisolierungen u. auf die Vorteile des Glasgespinstes als Isoliermaterial hin. a. Apparatur 13. 68—69. Charlottenburg.) JUNG.

Emil Hahn, *Die Wärmewirtschaft im Trocknereibetriebe*. Es werden die Wärmeisolation des Betriebes einer Trockentrommel u. etwa zu machende Ersparnisse erörtert u. ein neues Verf. zum Trocknen mit Feuergasen (vgl. Die Wärme 48. 319; 25. II. 1299) nach Ausführung u. Wirkungsgrad beschrieben. (Dtsch. Zuckerind. 23—24. Berlin SW 61.) RÜHLE.

L. Brüggemann, *Ein neues Extraktionsverfahren*. Bei dem Extraktionsapp., Abg. im Original (D. R. P. 397599, 399293; C. 1924. II. 1379, 2195) wird das im Vakuum kondensierte Lösungsm. durch einen hohlen Rührer in der zu extrahierenden Substanz verteilt. (Chem.-Ztg. 50. 248—49. Hamburg.) JUNG.

B. Firth, *Katalysatoren und Enzyme: industrielle Verwendung*. Kurze Übersicht. (Chem. Age 14. 324—25. 348—49.) BEHRLE.

Voff & Co., Walsrode, **Emil Czapek** und **Richard Weingand**, Bomlitz, *Zum Abtrennen von festen Stoffen in Flüssigkeiten dienende Vorrichtung*, bestehend aus zwei übereinander in Verb. stehenden Gefäßen, gek. durch ein an der unteren Verbindungsstelle der beiden Gefäße angeordnetes, gegebenenfalls aus einem Kegelform bestehendes, regelbares Ventil. (D. R. P. 414 852 Kl. 12c vom 28/3. 1923, ausg. 1926.) KAUSCH.

Gesellschaft für Förderanlagen Ernst Heckel m. b. H., Saarbrücken, *Zum Abtrennen von heißen Salzlösungen u. dgl. dienende Vorrichtung* mit in Form von Stufen übereinander angeordneten, mittels einer Kühlfl. kühlbaren Flächen, dad. gek., daß die Stufen in der Richtung von oben nach unten an Ausdehnung zunehmenden Stufen von treppenförmig gestalteten Mantel einer kon. Trommel gebildet werden. (D. R. P. 414 852 Kl. 12c vom 11/6. 1924, ausg. 18/3. 1926.) KAUSCH.

Maschinenfabrik Baum Akt.-Ges. (Erfinder: **Georg Riedel**), Herne i. W., *Vorrichtung zum Zerteilen, Rühren oder Mischen von Stoffen durch Rührwerke*, dad. daß in einem um die Achse des Gefäßes umlaufenden Gitterrührwerk zwischen den Rührarmen in senkrecht zur Drehebene des Gitterrührwerks stehender Ebene Räder angeordnet sind, deren in an sich bekannter Weise auf festen Zahnrädern laufende Achsen in den Rührarmen des Gitterrührwerks drehbar gelagert sind. (D. R. P. 426 777 Kl. 12e vom 6/5. 1923, ausg. 18/3. 1926.) KAUSCH.

International Precipitation Co., Los Angeles, übert. von: **Evald Anderson**, Santa Barbara, Californ., *Behandlung von Flüssigkeiten mit dunklen elektrischen Entladungen*, insbesondere zum Entemulgieren von Emulsionen von W. u. Öl. Man dispergiert ein wenig Öl in einer schwach leitenden Fl. (W.) u. unterwirft die entstandene Emul-

sion zwischen entgegengesetzt wirkenden Elektroden einem magnet. Feld in Gasatm. (**A. P. 1 578 624** vom 20/11. 1923, ausg. 30/3. 1926.) KAUS

S. Cabot, Boston, *Kolloidale Dispersionen*. Man knetet feste Körper mit n dispergierbaren Schutzkolloiden u. macht das Gemisch durch Zusatz der Disper mittel plastisch. Bei Verwendung von fl. KW-stoffen u. Ölen verwendet ma Dispersionsmittel trocknende oder halbtrocknende Öle, die durch Hitzebehan polymerisiert sind oder fossilen Gummi. (**E. P. 246 874** vom 1/2. 1926, veröff. 31/3. 1926. Prior. 31/1. 1925.) KAUS

Harold Montague Alexander, Bexley Heath, England, *Trennen von Fl keiten von unterschiedlichem spezifischen Gewicht*. (**D. R. P. 423 613** Kl. 23a 3/5. 1923, ausg. 11/1. 1926. E. Prior. 15/8. 1922. — C. 1925. I. 2029.) OEI

Kali-Industrie Akt.-Ges., Cassel, *Mit Schwimmer versehener Behälter selbsttätigen Abführen von mehreren Fraktionen in Bewegung befindlicher Flüssig mit wechselndem Salzgehalt*, dad. gek., daß unterhalb des am Behälter befind Abflusses eine schwenkbare, durch den Schwimmer gesteuerte Rinne angeordne wobei gegebenenfalls zwischen dem Schwimmer u. der Rinne eine an sich beka die Steuerwrkg. verstärkende Hilfsvorr. eingeschaltet ist, während die Steu zwecks Aufhebung des Einflusses von Temperaturschwankungen auf die D. d mit einem in diese eintauchenden Thermostat in Verb. steht. (**D. R. P. 42 Kl. 12d** vom 22/5. 1924, ausg. 17/3. 1926.) KAUS

Otto Schmidt, Oberneisen b. Diez a. d. Lahn, *Vorrichtung zum Absci fester Stoffe aus Emulsionen, Schlämmen u. dgl. mit engen, schräg nach unten geric Hohlräumen*, 1. dad. gek., daß diese von zickzackförmig verlaufenden Leiste bildete Kanäle besitzen, 2. dad. gek., daß die Leisten an der Unterseite einer I angeordnet sind, welche die obere Spitze eines in einen Trichter eingebauten, d kegelförmigen oder doppelpyramidenförmigen Körpers bedeckt, dessen untere S in geringem Abstand von der Trichterwandung angebracht ist. (**D. R. P. 42 Kl. 12d** vom 7/1. 1923, ausg. 15/3. 1926.) KAUS

H. N. McLeod, Wellington, Neuseeland, *Trennen fester Körper von Fl keiten*. Die die festen Stoffe enthaltenden Fll. werden in einer ummantelten Kar nachdem sie in einem Wärmeaustausch durch die die Kammer verlassender oder daraus entwickelte Gase vorgewärmt worden sind, erhitzt. Auch werde Vorwärmung Abgase von der Erhitzung der Kammer verwendet. Der fallend ist sterilisiert u. desodoriert. Das Verf. eignet sich zur Behandlung von S Buttermilch o. dgl. in Butter u. Käsefabriken.- (**E. P. 248 081** vom 28/11. 1923, ausg. 25/3. 1926.) KAUS

Stanislaw Prus Szczepanowski, Polen, *Trennen von Gasgemischen*. Gen von Gasen u. Dämpfen werden in Fraktionen verschiedener Mol.-Geww. getu Dies geschieht auf Grund der Differenz des Potentialdrucks, den man auf die kulare M. einwirken läßt. Hierbei wird die Zentrifugalkraft benutzt. (**F. P. 60** vom 22/7. 1925, ausg. 15/3. 1926. Poln. Prior. 22/7. 1924.) KAUS

Karl Seligmann, Offenbach a. M., *Reinigung von Filtertüchern und ähnl stark verunreinigten Geweben unter Anwendung von Bürsten, Schabern u. dgl. un dünnter Natronlauge*, dad. gek., daß die Gewebe nach einer derartigen Behan unter nochmaliger Verwendung verd. Lauge mit Sand, Schmirgel-, Glas- oder steinpulver oder gesiebter Asche u. dgl. bestreut werden u. sodann die ganze bekannter Weise durch Abspritzen u. Auswaschen ganz entfernt wird, worau Gewebe ebenfalls in bekannter Weise nach Auswringen halbtrocken in stark HCl getaucht u. nach vollständigem Auswaschen bezw. Auswässern getrocknet (**D. R. P. 427 222** Kl. 12d vom 31/3. 1922, ausg. 26/3. 1926.) KAUS

Carborundum Co., Niagara Falls, N. Y., übert. von: **Harry C. Martin**, gara Falls, *Filtriermittel* poröser Struktur, bestehend aus Mineralkörnern, die

KAUSCH.

KAUSCH.

KAUSCH.

KAUSCH.

KAUSCH.

KAUSCH.

OELKER.

OELKER.

OELKER.

KAUSCH.

N. V. Algemeene Chemische Produktenhandel, Haag, Holl., *Wiedergewinnung flüchtiger Lösungsmittel*. Mit flüchtigen Lösungsmitteln wegen Entfettung behandelte Textilstoffe werden durch eine Kammer mit Wasserverschlüssen geführt, wo sich der Dampf unter Luftverdünnung behandelt werden. (**E. P. 247 997** vom 22/2. Auszug veröff. 21/4. 1926. Prior. 21/2. 1925.) KAUS

Hjalmar Löfquists Elektriska Aktiebolag, Stockholm, *Erwärmung, Verdampfung oder Eindampfung von Flüssigkeiten mit Hilfe von elektrischem Strom*. Dem die behandelte Fl. in einem mit Zulauf u. Ablauf versehenen, aber im unteren geschlossenen Gefäß oder Behälter dazu gebracht wird, in einem oder mehreren Strahlen auszuströmen, welchen elektr. Strom in der Weise zugeführt wird, daß die Wärmeentw. in den Flüssigkeitsstrahlen selbst stattfindet, dad. gek., daß die Mundstücke selbst oder die Rohrmündung, durch welche die Fl. ausströmt, u. somit die freien Flüssigkeitsstrahlen gebildet werden, aus elektr. isolierendem Material hergestellt sind u. daß der elektr. Strom der Fl. entweder direkt von den Wänden des Gefäßes bzw. des Rohres, von welchem bzw. durch welches die Fl. zugeleitet wird, oder in dem Gefäß oder Rohr oder beiden angebrachten Elektroden zugeführt wird, so daß die Fl. aus dem oder den genannten, die freien Strahlen formenden, aus elektr. isolierendem Material hergestellten Mundstücken ausströmt, zu dem Zwecke, den Verlauf des Stromes auf die Fl. auf einer relativ großen Fläche im Vergleich zum Querschnitt des Strahles zu ermöglichen, bevor die Fl. in Form von freien Strahlen durch die Mundstücken strömt. — Über eine Vorr. zur Ausführung des Verf. vgl. die Pat. (**D. R. P. 427 167** Kl. 21h vom 25/4. 1923, ausg. 25/3. 1926. Schwed. Prior. 1922.) KÜHL

Philip A. Kober, Hastings-on-Hudson, N. Y., übert. von: **Joseph M. Loomis**, Somerville, Mass., *Dialysier- und Verdampfmembranen*. Man mischt Nitrocellulose mit A., löst sie durch Mischen des Gemisches mit Ä., rührt um u. setzt einen i. l. Ester (Äthylacetat) zu, zerstäubt die Lsg. u. entfernt das Lösungsm. (**A. P. 1577 187** vom 23/11. 1921, ausg. 16/3. 1926.) KAUS

Humbert Valiante, Ugo Valiante und Guglielmo Valiante, Italien, *Industrielle Benutzung der Exothermie, die bei Reaktionen zwischen Metallsalzen und Sauerstoff-oxyden auftritt*. Man bringt die Metallverbb. in feiner Zerteilung in Säcken oder Geweben, die von einer undurchlässigen Hülle umgeben sind, in Ggw. von Wasser u. regelt diese. (**F. P. 602 226** vom 29/7. 1925, ausg. 15/3. 1926. It. Prior. 19/1. 1925.) KAUS

Silica Gel Corporation, Baltimore, Maryland, übert. von: **Walter A. Patterson**, Baltimore, *Katalytische Stoffe*. Man stellt ein Gel (SiO_2) aus dem Hydrogel mittelst einer verd. Alkalilsg. her u. imprägniert es mit einem oder mehreren Katalysatoren, indem es erst mit einer verd. Alkalilsg. u. dann mit einer auf letztere reagierenden Metallverbb. salzlg. behandelt. (**A. P. 1577 187** vom 18/11. 1922, ausg. 16/3. 1926.) KAUS

Silica Gel Corporation, Baltimore, Maryland, übert. von: **Walter A. Patterson**, Mount Washington, Maryland, *Katalysatoren*. Man behandelt ein Gel, das Wasser in Poren aufweist, daß der Wassergehalt bei 30°, sobald er im Gleichgewicht mit Wasserdampf u. einem Partialdruck von 22 mm Hg ist, wenigstens 21% des Gelgewichts beträgt u. die Poren mit W. gefüllt sind mit einer kolloidalen Lsg. eines katalyt. Stoffes u. entfernt dann das W. (**A. P. 1 577 188** vom 18/11. 1922, ausg. 16/3. 1926.) KAUS

Gulf Refining Co., Pittsburgh, Penns., übert. von: **Almer Mc Duffie Mc Duffie**, Port Arthur, Texas, *Entfernung der Aluminiumchloridrückstände aus den Gefäßen*. Zur Entfernung der AlCl_3 -Rückstände aus Gefäßen, in denen es als Katalysator bei der Behandlung von Petroleum-KW-stoffen gedient hat, werden diese Rückstände durch Zugabe von Wasser gebrochen u. die Anteile aus den Gefäßen mit W. herausgespült. (**A. P. 1 577 188** vom 13/12. 1923, ausg. 23/3. 1926.) KAUS

E. F. Rousseau, Paris, *Durchführung photokatalytischer Reaktionen*. Die Lsg. resonierenden Substanz, d. h. einer solchen, die die photochem. Intensität, die ihr zugeführt hat, zu konservieren u. zu sammeln vermag, wird der Einw. ultrater Strahlen ausgesetzt u. dann der Lsg. der Substanz zugesetzt, die einer photochem. Behandlung ausgesetzt werden soll. So wird z. B. eine Lsg. eines *Ur*-, *Mn*- oder *Fe*-zugesetztes zu Fermenten (Hefe) zugesetzt. Derartige Lsgg. dienen z. B. zur Durchführung photochem. Rkk. in Zucker- oder CH_2O -Lsgg. (**E. P. 226 534** vom 13/12. 1924, vgl. veröff. 11/2. 1925. Prior. 17/12. 1923.) KAUSCH.

IV. Wasser; Abwasser.

K. Kappeller, *Ein typisches Beispiel für die Selbstreinigung fließender Gewässer*. Durch eine Stadt von 11 000 Einwohner bei nur kleinem Vorfluter bewirkte Verunreinigung ging nach 3—5 km in noch starke Verschmutzung, nach 7—12 km in noch leichte Verunreinigung über. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel **51**. 1925. Magdeburg, Städt. Nahrungsmittel-Untersuchungsamt.) GROSZFELD.

C. P. Mom, *Ausflockungsvorgänge bei der Reinigung von Flußwasser*. Das Problem der Reinigung des Tjiliwongflusses in Batavia zu Versorgungszwecken ist die Beseitigung des kolloidalen Tons. Die Reinigung geschieht durch Ausflockung mit FeCl_3 . Die Bedingungen u. Änderungen physikal. u. chem. Art, die Rolle der $[\text{H}^+]$, des kolloidalen Aluminiumoxydions während des Koagulationsvorganges, der Einfluß der W-Bestandteile (Schlamm, unvollkommene organ. Zersetzungsprodd.) im allgemeinen werden besprochen. (Mededeel. v. d. burgerlijken geneesk. dienst in Nederl. Indië **1925**. 27—71. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 656—57. Manggarai, Exp. f. water purificat. Ref. KAISER.) OPPENHEIMER.

H. Wiegleb, *Die Reinigung und Abführung von Abwasser*. Übersicht über die verschiedenen Verff. u. ihre Wrkg. sowie Beschreibung von Kläranlagen für abgelegene Betriebe. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. **66**. 314—16.) HAHN.

L. Liebeherr, *Filteranlagen für Abwässer*. Beschreibung u. Abbildung eines Filterbehälters, der billiger ist als die aus Beton ausgeführten großen Stofftrichter. (Z. f. Papierfabr. **57**. 297—98. Vevce, Jugoslawien.) SÜVERN.

E. Greenfield und **A. L. Elder**, *Einfluß der Temperatur auf den Verlauf des Sauerstoffverbrauchs von verdünnten Abwässern*. Bei niederen Temp. (2—6°) bettet man 2 typ. Phasen des O_2 -Verbrauches, eine mit geringem Verbrauch in den ersten 2—5 Tagen u. eine mit hohem Verbrauch daran anschließend. Die Länge der ersten Phase hängt von der Konz. der Abwässer ab. Der Gesamtverbrauch an O_2 ist bei niedriger u. hoher (14—20°) Arbeitstemp. ist prakt. gleich. Er entspricht gut den Angaben von THERIAULT, STREETER u. PHELPS. Die Ansichten PHELPS, die Erregung des O_2 -Verbrauchs in der zweiten Phase beruhe auf einem Nitrifikationsprozeß, ist nicht richtig. Sie ist vielmehr durch Anwachsen von faulender Materie u. Absterben von Planktonmassen zu erklären. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 291. 1926. Urbana [Ill.].) GRIMME.

J. C. Moor und **W. P. Wayne**, *Die Behandlung von Packhausabwässern*. Bedeutung der Abwasserkläranlagen der ARMOUR u. SWIFT-Co. in Fort Worth. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 239—42. Fort Worth [Texas].) GRIMME.

John H. Hoyt, *Reinigung von Papierfabrikabwässern durch das amerikanische Filter*. Durch die Verwendung eines rotierenden Siebfilters, durch den das Abwasser durchläuft u. bei welchem der abfiltrierte Stoff bei jeder Drehung abgewaschen wird, läßt sich der Faserverlust auf 1% der Produktion herabsetzen. (Paper Industry Journ. **82**. No. 6. 50—54. Paper Industry **7**. 1765—68.) SÜVERN.

W. C. Cunningham, *Das System Hardinge zur Behandlung faserhaltiger Abwässer*. Durch das Abtrennen von Fasern u. Schleimstoffen zu befreiende Wasser geht durch ein Filter, welches das Abwasser abfängt. Sie werden von Zeit zu Zeit abgekratzt u. nach außen befördert.

Ein zweites Filter reinigt dann weiter. (Paper Trade Journ. **82**. No. 8. 223—25. P. Industry **7**. 1993—95.)

Ad. Peltzer, *Wasseranalyse*. Die üblichen qualitativen Bestst. werden kurz schildert, ferner das Ausfärben zur Prüfung von Brunnen-, Leitungs- u. dest. (Ztschr. f. ges. Textilind. **29**. 77—78. 89—90.)

Ed. Spaeth, *Zur Untersuchung und Beurteilung von Wasser*. Vf. bespricht Anforderungen, die an Trink- u. Gebrauchswasser zu stellen sind unter besonderer Berücksichtigung der auf Fe u. Mörtel zerstörend wirkenden gasförmigen Bestand (CO₂, O₂) u. die Schutzmaßnahmen zur Entfernung u. Unschädlichmachung d. Stoffe, wie Rieselung, Regnung, Belüftung, Entgasung u. Verff. durch chem. Bind. (Süddtsch. Apoth.-Ztg. **66**. 173—74. 187—88. 195—97.)

F. Egger, *Die colorimetrische Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration der Wasseranalyse*. Vf. gibt Begriffsbest. für p_H, erläutert die elektrometr. u. colorimetr. Best.-Methoden, die Anwendung von Puffergemischen, bespricht die Indicatoren u. die Verwendung der verschiedenen Colorimeter. Er empfiehlt die von E. MEYER in Darmstadt zusammengestellten Puffergemische u. Indicatoren u. das Doppelcolorimeter nach BJERRUM-ARRHENIUS. (Süddtsch. Apoth.-Ztg. **66**. 188—189. Chemisches Untersuchungsamt Stuttgart.)

H. N. Murphy, London, *Behandeln von Brauereiwässern*. Die zur Herstellung von Bier usw. zu verwendenden Wässer werden mit verd. Milchsäure digeriert u. ganz oder zum Teil neutralisiert (mit CaCO₃, Ca[OH]₂, CaO usw.). (E. P. **246278** 18/12. 1924, ausg. 18/2. 1926.)

Rud. A. Hartmann, Berlin, *Kühler bezw. Wärmeaustauschkörper für Wassersterilisation*, welcher aus einer Reihe von einzelnen Kammern besteht, die aus je einem Stück Blech mit an den Seiten abgebogenen Rändern hergestellt sind u. an den Enden abwechselnd nach der einen u. der anderen Seite Falze abgebogen sind, so daß die einzelnen Elemente seitlich eingeschoben werden können u. beim Löten in dieser Lage gehalten werden. — Es wird eine absol. Sicherung des Wärmeaustauschkörpers gegen Undichtwerden erzielt. (D. R. P. **427 221** Kl. 85a vom 15/5. 1924, ausg. 1926.)

Hermann Bach, Essen, *Biologische Reinigung von phenolhaltigen Abwässern* aus Gasanstalten, Kokereinebengewinnungsanlagen, Kohlschwelereien, Gasräucheranlagen, Teer- oder Urteerverarbeitungsanlagen u. ähnlichen Betrieben, welchen das Abwasser, gegebenenfalls nach geeigneter Vorbehandlung (Entschlackung, Verdünnung), mit oder ohne Unterbrechung in Füllkörpern der Luft einverleibt ausgesetzt wird, dad. gek., daß zur Beseitigung der Phenole aus den Abwässern an sich bekannter Weise Preßluft von der Sohle des Füllkörpers aus eingeblasen wird, der zuvor mit Bakterien aus häuslichen Abwässern, Bodenauszügen, Tierdung u. dergl. beimpft worden ist. (D. R. P. **426 422** Kl. 85c vom 11/12. 1924, ausg. 1926.)

Karl Imhoff, Essen, *Abwasserreinigung mit belebtem Schlamm*, bei welcher das Abwasser zunächst ein oder mehrere Vorklärbecken, darauf Belüftungsbecken, schließlich Absitzbecken durchfließt u. einen Teil des bakterienhaltigen, also belebten Schlammes dem Abwasser zwischen Vorklär- u. Belüftungsbecken zugeführt wird, dad. gek., daß der Rest des belebten Schlammes des Absitzbeckens in den Zulauf des Abwassers zu dem Vorklärbecken gebracht wird, welches z. B. nach Art der Entwässerung von Brunnen gebaut sein kann. — Die Klärwrkg. im Vorreinigungsbecken wird verbessert. (D. R. P. **426 429** Kl. 85c vom 16/7. 1924, ausg. 11/3. 1926.)

Karl Imhoff, Essen, *Biologische Reinigung von Abwasser mit belebtem Schlamm in Lüftungsbecken* mit schraubenförmiger Wasserbewegung, dad. gek., daß die Wasserbewegung durch das dem Abfluß aus dem Lüftungsbecken entnommene gerei-

sser bewirkt wird, welches oberhalb oder unterhalb der Wasseroberfläche in unter Weise eingespritzt wird. (D. R. P. 426 766 Kl. 85 c vom 19/9. 1924, ausg. 1926.) OELKER.

Fermann Bach, Essen, *Biologische Reinigung von organisch verschmutzten, sauren zur Säuerung neigenden Abwässern, z. B. von Brauereien, Brennereien, Preßhefen u. dgl. in Füllkörpern*, wobei die die biologische Behandlung erschweringe Rk. des Abwassers durch Zufuhr von Luftsauerstoff beseitigt wird. dad. gek., die Belüftung durch Einpressen von Luft von der Sohle des Füllkörpers aus erfolgt. Es wird eine ausreichende u. rasche Beseitigung der organ. Säuren erzielt. (P. 426 765 Kl. 85 c vom 20/1. 1925, ausg. 17/3. 1926.) OELKER.

John Charles Hoveman und **Charles Robert Hoveman**, Frankreich, *Wiederverwendung und Regenerierung des Abwassers aus Badeanstalten, Fischbehältern usw.* Abwasser wird chem. gereinigt, filtriert, sterilisiert, belüftet u. wieder in die Anstalt eingeführt. (F. P. 572 545 vom 2/11. 1923, ausg. 7/6. 1924.) KAUSCH.
John Charles Hoveman und **Charles Robert Hoveman**, Frankreich, *Wiederverwendung und Regenerierung von Wasser aus Badeanstaltsabwässern u. dgl.* Man las Wasser durch Belüftungs-, Filter-, Wiedererhitzungs-, Sterilisations- u. Begasapp. zirkulieren mittels einer Vorr., unterhalb des Niveaus des Spülwassers, die eine Vereinigung einer Pumpe u. eines Belüfters darstellt. (F. P. 29 960 vom 4/1. 1925, ausg. 11/12. 1925. Zus. zu F. P. 572 545; vorst. Ref.) KAUSCH.

V. Anorganische Industrie.

Waeser, *Gasreinigungsmassen als Rohmaterial der Schwefelsäureindustrie.* (Metallbörse 16. 705—06. 761. Berlin.) BEHRLE.

A. Pritchard, *Wirtschaft des Chlors.* Vf. gibt einen histor. Überblick über die wirtschaft des Cl_2 von ihrem Beginn an, stellt einige unkorrekte Angaben über das Verhältniß des Cl_2 zur Chlor-Alkaliindustrie richtig u. beschreibt den Markt für H_2 bezüglich der Synthese von HCl , NH_3 , Alkoholen u. der Fetthärtung. (Trans. Electr. Soc. 49. 13 Seiten. Canada, Windsor Ont., Sep.) R. SCHMIDT.

Yuichiro Ochi, *Chlor in Japan.* Die Entw. der Cl_2 -Industrie in Japan wird geschildert. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 4 Seiten. Hatagaya, Tokyo, Imperial Industrial Sep.) R. SCHMIDT.

Edgar Knowles, *Wasserstoff zur Hydrierung von Ölen.* Zur Hydrierung von Kohlen muß der verwandte H_2 sehr rein sein, damit keine Vergiftungen des Katalysators eintreten. Prakt. kommt dafür nur elektrolyt. hergestellter H_2 in Betracht. Im folgenden wird eine neue Anlage zur Darst. desselben beschrieben, welche etwa 1 g. H_2 liefert. (Chemistry and Ind. 45. 121—23. 137—39.) ENSZLIN.

Heinrich Molitor, *Die Fabrikation des Kalisalpers.* (Metallbörse 16. 257—58. 46. 425—26. 481—82. 650—51. 706—07. 762.) BEHRLE.

P. Sidney, *Beryllium: seine Quellen, Produktion und Eigenschaften.* Kurze Übersicht. (Chem. Age 14. Monthly metallurgical Sect. 25—27.) BEHRLE.

Aul S. Brallier, *Die Chlorierung von Metallen.* Die Darst. von SiCl_4 , TiCl_4 , SbCl_3 , ZnCl_2 u. AlCl_3 aus den entsprechenden Metallen, im Falle des Si u. Ti in Carbiden mittels Cl_2 wird beschrieben. Bei der Darst. von SiCl_4 u. TiCl_4 ergaben Materialschwierigkeiten wegen der Aggressivität des Chlors bei den erforderlichen Tempp. u. der Wärmeentw. bei der B. der Verbb. Ein vertikaler Schachtofen mit W. gekühltem Stahl oder Gußeisen mit Kohleplatten belegt wurde benutzt. Um die Verstopfung der Kondensatoren durch das in den Ofendämpfen enthaltene FeCl_3 u. AlCl_3 zu verhindern, wurden dieselben mit SiCl_4 durchspült, durch das die Verunreinigungen entfernt werden. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 7 Seiten. Niagara Falls, N. Y., Corp. Sep.) R. SCHMIDT.

*see
ersta
V. 97
P. 3438*

E. L. R. Cailliet und **M. L. J. Bourdais**, Paris, *Ozon*. Der tragbare O₃-Erzeuger vermag unter verhältnismäßig geringer Spannung (1000 V oder weniger) zu arbeiten und besitzt eine O₃ hervorbringende Oberfläche, die mit dem Pb eines Transformators verbunden ist. Die höherer Spannung ausgesetzten Teile des App. sind nicht zugänglich von außen angeordnet. (**E. P. 246 841** vom 26/1. 1926, Auszug veröff. 31/3. Prior. 29/1. 1925.) KAUS

Georges André Tabarly, Frankreich, *Reiner Sauerstoff*. Man führt flüssiges O₂ enthaltendes W., das schwach angesäuert u. mehr oder weniger ist, ein wasserfreies Alkali- oder Erdalkalioxyd oder Gemische dieser in Form kompakter Blöcke von beschränkter Kontaktfläche ein. (**F. P. 602 283** vom 23/5. 1925, 16/3. 1926.) KAUS

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Karl Hahn**, J. H. Kusen), *Herstellung von Schwefelsäure* durch Kombination des Kontakt- u. Kammerprozesses, dad. gek., daß die gereinigten u. getrockneten SO₂-Gase mit Hilfe von sehr wenig Wasser zum größten Teil in SO₃ übergeführt werden u. nach dessen Entfernung der Rest SO₂ mit HNO₃ zu H₂SO₄ 60° oxydiert wird. (**D. R. P. 427 650** Kl. 12i vom 1923, ausg. 14/4. 1926.) KAUS

Gustav Baum, Weissenstein, Österreich, *Destillation von Perschwefelsäure* in wässrigen Lösungen ihrer Salze. Man erhitzt die Fl. in einer Anzahl von Apparateinheiten mit einem Wechselstrom, dessen Perioden weniger als 500 in der Sek. betragen unter Verwendung von Kohleelektroden. (**A. P. 1 577 201** vom 5/5. 1924, ausg. 16/3. 1926.) KAUS

Verein für Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig a. E., *Herstellung reiner Salzsäure* aus bei der Chlorierung organ. Substanzen entstehendem HCl durch Führen des letzteren über mineral. Gele (SiO₂, Edelerden-, TiO₂, ZrO₂) hinweg. (**F. P. 30 237** vom 9/3. 1925, ausg. 30/3. 1926. **Zus. zu F. P. 564 963; C. I. 2392.**) KAUS

Emil Edwin, Trondjem, Norwegen, *Herstellung von aus Stickstoff und Wasser bestehenden Gasmischen*, dad. gek., daß in einer elektr. Hochspannungsflamme die Umsetzungen gasförmiger, fester oder fl. C-haltiger Stoffe mit Wasserdampf hergeleitet aus CO u. H₂ neben eventuell etwas N₂ u. etwa noch unzersetztem Wasserdampf zu CO₂ bestehende Gasmische derart verwendet werden, daß ihre fühlbare Wärme in Ggw. dieser stattfindenden gaserzeugenden, mittels Luft bezw. mittels Luft erfolgenden Rkk. ausgenutzt wird, worauf das durch diese Behandlung resultierende Gasmisch nachträglich von den neben H₂ u. N₂ anwesenden Gasen befreit wird. — 2. dad. gek., daß die aus elektr. Hochspannungsflammen kommenden Gasen durch einen Gaserzeuger geleitet werden, der gleichzeitig Luft u. Wasserdampf in einem Mengenverhältnis zugeführt erhält. — 3. dad. gek., daß dem vom Gaserzeuger kommenden, N₂ enthaltenden u. an CO u. H₂ angereicherten Gasmisch nachträglich weitere Mengen Wasserdampf bezw. zerstäubtes W. zugeführt wird. — 4. dad. gek., daß ein Teil des Gases nach Zufuhr von Wasserdampf oder CO₂ im Kreislauf zur Hochspannungsflamme zurückgeführt wird, während der erzeugte Überschuss an Gas mit Luft Kontakt zugeleitet wird, durch den das CO mittels Wasserdampf zu H₂ u. CO₂ umgesetzt wird, worauf letzteres in an sich bekannter Weise entfernt wird. (**D. R. P. 427 650** Kl. 12i vom 6/4. 1925, ausg. 10/4. 1926.) KAUS

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., und **Frederik Wechselsen de Vries**, Stockton-on Tees, *Katalytische Erzeugung von Ammoniak*. Das Gasmisch u. die erforderlichen Gase werden vor der Katalyse mit verflüssigtem wasserfreiem N₂ in Berührung gebracht, wodurch die Verunreinigungen des Gasmisches bezw. des N₂ zur Ausscheidung gebracht werden. (**Aust. P. 18 940** vom 1/8. 1924, ausg. 1925.) KAUS

Luigi Casale, Rom, *Ammoniaksynthese*. Die zu katalysierenden Gase werden mit NH₃ unter Druck behandelt, um sie von den Kontaktgiften, insbesondere CO, zu befreien.

(Aust. P. 19 120 vom 12/8. 1924, ausg. 14/5. 1925 u. 19 351 vom 27/8. 1924, 17/9. 1925. It. Prior. 29/3. 1924.) KAUSCH.

W. Cederberg, Steglitz, *Salpetersäure*. Bei der katalyt. Oxydation von NH₃ u. der Kondensation der erhaltenen Stickoxyde wird der geringstmögliche Überan O₂ über die theoret. Menge angewendet u. die Gase ohne W. kondensiert. 246 889 vom 1/10. 1924, ausg. 4/3. 1926.) KAUSCH.

Stacey, Birmingham, *Stickoxyde*. Der zur Herst. von NO₂ zum Bleichen von bestimmte App. besteht aus einem Glasrohr mit einer Einschnürung, Elektroden, t einem Magneten gekuppelt sind, u. einer Düse, die mit einer Zuführungsvorr. impr. Luft in Verb. steht u. in Front der Elektroden angeordnet ist. (E. P. 9 vom 5/1. 1925, ausg. 4/3. 1926.) KAUSCH.

Uhde, Bövinghausen, Westfalen, *Ammoniaksynthese*. Die Katalysatoren, vor- rse komplexe Verbb. der Eisengruppe werden in wasserfreien organ. Lösungsmm. tellt, vorzugsweise in Essigsäureanhydrid oder wasserfreier HCOOH. (E. P. 5 vom 8/2. 1926, Auszug veröff. 8/4. 1926. Prior. 9/2. 1925.) KÜHLING.

Uhde, Bövinghausen, Westfalen, *Ammoniaksynthese*. Das zur Synthese er- iche Gasgemisch oder die Einzelgase werden bei 200—300°, vorzugsweise unter ktem Druck durch eine Lsg. eines Alkali- oder Erdalkalimetalls in geschmol- Alkaliamid geleitet. (E. P. 247 226 vom 8/2. 1926, Auszug veröff. 8/4. 1926. 9/2. 1925.) KÜHLING.

G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Chemische Fabrik sheim-Elektron, Frankfurt a. M.), *Phosphorsäure*. H. P u. P₂O₅ ente Ofengase werden durch eine Filterkammer, die auf einer über dem Taupunkt iegenden Temp. gehalten wird, geleitet. (E. P. 247 219 vom 6/2. 1926, Auszug 8/4. 1926. Prior. 6/2. 1925.) KAUSCH.

omingo Lopez, St. Albans, West-Virginia, *Arsenate*. Man läßt Cl₂ als Oxydations- auf ein in w. W. suspendiertes Gemisch von As₂O₃ u. einem Erdalkalihydroxyd en. Dabei dürfen nicht weniger als 5% des Erdalkalihydroxyds frisch gefällt u. (A. P. 1 578 150 vom 2/5. 1924, ausg. 23/3. 1926.) KAUSCH.

asselli Chemical Co., Cleveland, Ohio, V. St. A., *Herstellung von kieselfluor- stoffsaurem Natrium* aus Lösungen, welche H₂SiF₆ sowie Fe u. Al-Verbb. ent- mit Alkaliverbb., 1. dad. gek., daß diesen Lsgg. Alkali (z. B. Na₂CO₃) in solcher zugesetzt wird, daß wenigstens ein Teil der H₂SiF₆ in Form eines kieselfluor- stoffsauren Alkalis niedergeschlagen wird, aber nicht so viel, daß wesentliche i von Fe- oder Al-Verbb. ausfallen. — 2. dad. gek., daß als H₂SiF₆, sowie Fe- erbb. enthaltende Lsg. eine H₃PO₄ enthaltende rohe Lsg. verwendet wird, wie ß Behandlung von natürlichem Phosphat mit H₂SO₄ erhalten wird. — 3. dad. ß der Lsg. so viel Alkali, z. B. 50—75%, zugesetzt wird, daß ein Monoalkali- bildet wird. (D. R. P. 427 651 Kl. 12i vom 25/4. 1923, ausg. 14/4. 1926.) KA.

E. D. Kilburn, London (Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelfstofaktieselskab, *Alkalisilicate*. Man erhitzt ein Gemisch eines Alkalinitrats oder -nitrits mit sierter SiO₂, die man durch Behandeln von sauerlöslichen Silicaten wie Labra- eucit, Kieselgur mit Säuren erhält. Die Temp. darf dabei nicht bis zum F. ge- werden u. die frei werdenden Stickoxyde werden gewonnen. (E. P. 247 439 3/5. 1925, ausg. 18/3. 1926.) KAUSCH.

ctor M. Weaver, Harrisburg, Pennsylv., *Graphit*. Man erhitzt Kalk u. kohlen- tiges Material in einem geeigneten elektr. Ofen. Hierbei bildet sich ein fl. Carbid; hitzen wird solange fortgesetzt, bis das kohlenstoffhaltige Material in Graphit angen u. das Ca verdampft ist. (A. P. 1 576 883 vom 2/3. 1923, ausg. 16/3. KAUSCH.

andard Development Comp., übert. von: Otis G. Messenger, Cranford, A., *Herstellung von Ruß*. Gas- oder dampfförmige KW-stoffe, vorzugsweise

solche mit nicht mehr als 3 Kohlenstoffatomen werden mit regelbaren Luftm auf 320—540° erhitzt. Zweckmäßig wird die Luft dem Reaktionsgefäß durch eine A parallel geschalteter, mit Hähnen versehener Röhren zugeführt, vorzugsweise i Weise, daß die der Eintrittsstelle der KW-stoffe benachbart liegenden Röhren gerin die entfernter liegenden Röhren größere Mengen Luft zuleiten. Die Rk. wird äußere Wärmezufuhr eingeleitet, später genügt die Reaktionswärme, um die bildung zu bewirken. (A. P. 1 577 481 vom 18/10. 1923, ausg. 23/3. 1926.) KÜ

Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *Veri von Stoffen*. Holzmehl, Torf, Braunkohle, gemahlene Knochen werden mit S Lsgg. von Alkalien oder Salzen imprägniert, geformt u. verkohlt. (E. P. 24 vom 26/11. 1925, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 16/1. 1925.) KAUS

Artificial Coal Co. (Hamon Process), Ltd., und **Count L. Le W. Ha** London, *Kohle*. Ein Gemisch von Kalk, MgO o. dgl. u. Papierpulpeabfälle unter eventuellem Zusatz von Torf o. dgl. bis zur Verkohlung erhitzt u. die erha aktive Kohle wird mit Säure u. W. ausgewaschen u. getrocknet. (E. P. 246 954 2/12. 1924, ausg. 4/3. 1926.) KAUS

J. N. A. Sauer, Amsterdam, *Aktive Kohle*. Man überzieht Teilchen von Kohle mit akt. Kohle oder einem anorgan. Adsorptionsmittel. Letztere dien Bindemittel. Die zusätzliche akt. Kohle wird durch Imprägnieren der akt. Koh einer verkohlbaren Lsg., Glühen u. Aktivieren erzeugt. Das Prod., eignet sich besc zum Verschicken von Gasmasken. (E. P. 247 241 vom 13/8. 1924, ausg. 1926.) KAUS

H. H. Ward, London, *Kohle*. Ein Gemisch von gemahlenem Torf u. getrock Knochennmehl wird in einer Retorte verkohlt, das erhaltene Prod. mit k. W. abge getrocknet u. mit Ruß u. Seifenpulver gemischt u. gemahlen. Das Prod. dien gemahlen zum Stiefelputzen u. als Druckfarbe. (E. P. 247 364 vom 22/1. 1925, 11/3. 1926.) KAUS

Vereinigte Chemische Werke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, *Aktive*. Akt. Kohle wird am besten in Ggw. von W. so lange gemahlen, bis die Teilchen w als 1,5 Mikromillimeter groß sind. (E. P. 247 560 vom 9/2. 1926, Auszug veröff. 1926. Prior. 12/2. 1925.) KAUS


Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., *Kohle*. Man imprägniert hartes Holz, Kokosnußschalen o. dgl. mit ZnCl₂-Lau erhitzt es hierauf. (F. P. 602 272 vom 19/8. 1925, ausg. 16/3. 1926. D. Prior. 1924.) KAUS

Emil Hene, Staßfurt, *Herstellung von Alkalicarbonaten bzw. Dicarbonate Alkalihydroxyden aus Blausäure, Kalk und Alkalisulfat*, dad. gek., daß man über C Lsgg. der Cyanalkalien herstellt, diese nach Behandlung mit CO₂ in die Alkalicarb bzw. -dicarbonate u. freie HCN trennt u. letztere, wie vorstehend, erneut in Rk. l (D. R. P. 427 087 Kl. 121 vom 11/1. 1924, ausg. 26/3. 1926.) KAUS

Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co., Leverkusen b. Cöln a. Rh., *Alkalibisulfite*. Bei der Herst. von Alkalihyposulfit aus Alkalibisulfit u. Alkaliamalgam Alkalithiosulfat durch weitere Red. gebildet u. dieses weiterhin zu Polythionat Bei dem Verf. wird period. oder kontinuierlich ein Teil der Mutterlauge abge durch W. oder eine Salzlsg. (NaCl u. wenig Alkalibisulfit) ersetzt. (E. P. 24 vom 12/12. 1925, Auszug veröff. 14/4. 1926. Prior. 13/2. 1925.) KAUS

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Cöln a. Rh., *Alkalihyposulfit*. Alkalibisulfite werden mit Alkaliamalgam behandelt u. dabei dafür getragen, daß sich über 45 g im l. Alkalisulfit ansammelt. Dies erreicht man Einführen einer Säure (SO₂). (E. P. 247 524 vom 12/12. 1925, Auszug veröff. 1926. Prior. 13/2. 1925.) KAUS

Aktien-Gesellschaft für Stickstoffdünger, Köln a. Rh. (Erfinder: **Hans Hert-Knapsack**, Bez. Köln), *Darstellung von kaustischer Soda*, dad. gek., daß man $\text{C}_2\text{S-Lsg.}$ mit CaC_2 umsetzt:



(**E. P. 427 086** Kl. 121 vom 22/1. 1924, ausg. 26/3. 1926.) KAUSCH.
Burnham Chemical Co., Reno, Nevada, übert. von: **Alfred W. Gauger** und **Y Herman Storch**, Westend, Californ., *Kochsalz aus Soolen*. Man verdampft Sool, wobei NaCl u. andere Salze auskrystallisieren, trennt die Krystalle ab, mahlt zu feinem Pulver u. wäscht sie mit der ursprünglichen Lsg. aus. (**A. P. 1 576 739** vom 16/2. 1925, ausg. 16/3. 1926.) KAUSCH.

G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Ernst Heinze**, Chemnitz), *Elektrolytische Darstellung von Alkali- und Erdalkalihydroxyden mit Hilfe von Quecksilberkathoden*, 1. dad. gek., daß die Zers. der Amalgame mit W. bei Ggw. von Alkalien vorgenommen wird, die gegenüber Amalgam, W. u. Lauge unangreifbar sind. — 2. dad. gek., daß eine Legierung von Fe mit Cr u. Ni als Hauptbestandteile der Kathode verwendet wird. (**D. R. P. 427 236** Kl. 121 vom 18/8. 1922, ausg. 29/3. 1926.) KAUSCH.
Chemischer Verein Fabriken, Aachen, **J. Marwedel** und **J. Looser**, Aachen a. Rh., *Entschwefelung von technischem Bariumcarbonat*, 1. dad. gek., daß die bekannte Fällung des BaCO_3 durch CO_2 aus BaS-Lsg. unter Zusatz von Alkalien vorgenommen wird u. das gefällte BaCO_3 durch Auswaschen mit W. von seinen l. gelösl. S-haltigen Verunreinigungen befreit. — 2. dad. gek., daß man das in üblicher Weise durch Fällung mit CO_2 aus BaS-Lsg. erhaltene BaCO_3 mit Alkalihydroxyd mit W. unter Zusatz von Alkalicarbonat auf Temp. von über 100° erhitzt u. das Reaktionsprodukt durch Auswaschen mit W. von seinen l. gewordenen S-haltigen Verunreinigungen befreit. — 3. dad. gek., daß man beide Verf. nacheinander anwendet. (**D. R. P. 427 223** vom 5/1. 1922, ausg. 26/3. 1926.) KAUSCH.

Industriale Azogeno Soc. an. per la Fabbricazione dell'Ammoniaca Sintetica e Prodotti Derivati und **C. Toniolo**, Mailand, *Aufschluß von Calciumphosphaten*. Unlösliches Calciumphosphat wird in Form einer Suspension oder eines Schlammes mit Stickstoffgas behandelt, welche mit Luft oder O_2 verd. sind, zweckmäßig mit den bei der Oxydation von Luft oder NH_3 gewonnenen Erzeugnissen. (**E. P. 247 230** vom 1/1. 1926, Auszug veröff. 8/4. 1926. Prior. 7/2. 1925.) KÜHLING.

Aluminum Refining Co., Pittsburgh, Penns., übert. von: **Almer Mc Duffie Mc Afee**, Arthur, Texas, *Aluminiumchlorid*. Bei der Gewinnung von AlCl_3 aus Bauxit o. dgl. wird eine Lsg. von Cl_2 in Ggw. von Kohle verwendet man Abgase des Verf., nachdem aus diesen das AlCl_3 abgeschieden ist. Man kann sie auch mit Kohle zunächst noch reduzieren. (**A. P. 1 578 052** vom 1/3. 1923, ausg. 23/3. 1926.) KAUSCH.

Soc. Italiana Potassio, Rom, *Aluminiumnitrat* scheidet man aus auch noch aus Nitrate enthaltenden Lsgg., die man durch Behandeln von Al-Mineralien mit W. erhält, durch Zusatz von HNO_3 ab. (**E. P. 246 827** vom 18/1. 1926, Auszug veröff. 31/3. 1926. Prior. 28/1. 1925.) KAUSCH.

L. Spence, W. B. Llewellyn und **P. Spence & Sons, Ltd.**, Manchester, *Aluminiumsalze*. Al_2O_3 -haltige Stoffe werden mit Mineralsäure behandelt u. dabei zerfällt, indem man zuerst die Stoffe in durchlässige SiO_2 -Prodd. überführt u. dann mit W. oder die sauren Al-Salzlsgg. durch die MM. zirkulieren läßt. (**E. P. 247 078** vom 3/8. 1924, ausg. 4/3. 1926.) KAUSCH.

Louis Gabriel Patrouilleau und **Soc. an. Alumine et Dérivés**, Frankreich, *Aluminiumsalze und Aluminiumsulfat*. Man schließt Bauxit o. dgl. mit H_2SO_4 auf, führt in verd. Lsg. die Fe^{III} -Salze in Fe^{II} -Salze über, elektrolysiert die Lsg. u. versetzt mit W. zwecks Fällung von bas. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ mit verd. Alkali- oder Erdalkalicarbonatlsgg. (**E. P. 247 170** vom 13/3. 1925, ausg. 29/3. 1926. **Zus. zu F. P. 586 684; C. 1925. II.**) KAUSCH.

Alfred Stuart Cachemaille, London, *Gewinnung von Metallen*. Metal (z. B. UO_2) wird mit Ca-Metall u. CaCl_2 erhitzt. (E. P. 238 663 vom 7/7. 1924, 11/9. 1925.) KAUS

Westinghouse Lamp Co., Bloomfield, N. J., übert. von: **J. W. Marden**, Orange, N. J., *Uran*. Man stellt nach dem Verf. des E. P. 230 865 (C. 1925. II ein U-Doppelsalz her, reduziert dieses in Ggw. von CaCl_2 durch Ca gemäß E. P. 23 (vorst. Ref.), worauf das erhaltene U-Pulver in einem Induktionsofen erhitzt (E. P. 246 147 vom 13/1. 1926, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 13/1. 1925.)

L. Cassella & Co., Frankfurt a. M., *Goldnatriumthiosulfat*. Man löst zusammen $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ u. $\text{AuNa}_3(\text{S}_2\text{O}_3)_2$ oder löst beide getrennt u. mischt die Lsgg. Die Lsgg. w in Ampullen gefüllt u. sterilisiert. Das Prod. dient zu Injektionen bei Lupus u. an Tuberkulose. (E. P. 246 809 vom 17/12. 1925, Auszug veröff. 31/3. 1926. 27/1. 1925.) KAUS

Herman Fleck, Golden, und **William G. Haldane**, Denver, V. St. A., *Aufbereitung radiumhaltiger Erze*. Die zerkleinerten Erze werden mit NH_4F u. H_2SO_4 gem digiert u. das SiF_4 abgetrieben. Der Rückstand wird mit BaCl_2 versetzt, ge u. ausgewaschen. Aus dem Filtrat wird U, V u. NH_3 gewonnen, das auf dem gebliebene Gemisch auf Ra verarbeitet. (A. P. 1 577 217 vom 8/8. 1922, ausg. 1926.) KÜHL

William A. J. Bell, übert. von: **Karl B. Thews**, Denver, V. St. A., *Gewinnung von Vanadium, Uran und Radium aus Carnotit*. Das zerkleinerte Erz wird m eines festen, fl. oder gasförmigen Stoffes reduziert, bei Ggw. des Red.-Mittels die Red.-Temp. abgekühlt u. noch h. mit W. u. Säure, besonders HCl , beha wobei die metall. Bestandteile bis auf zu vernachlässigende Mengen in Lsg. g (A. P. 1 577 411 vom 12/7. 1921, ausg. 16/3. 1926.) KÜHL

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung

J. Wagner, *Die luxemburgische Eisenhüttenindustrie vor der Entdeckung der Metall- Erzlagerstätten*. (Rev. de Métallurgie 23. 121—25.) KALPE

M. Ludwig, *Die bisherigen Versuche zur Aufbereitung des Kupferschiefers*. bisherigen Verss., den Kupferschiefer naßmechan. oder durch Flotation aufzubereit schlugen fehl. Es werden die Schwierigkeiten der Aufbereitung besprochen. (M u. Erz 23. 146—49. Eisleben.) ENSZL

K. Wagenmann, *Einige Grundlagen und wesentliche Gesichtspunkte zur Frage günstigeren Verarbeitung Mansfeldscher Minern unter besonderer Berücksichtigung Aufbereitungsprozesses*. Es werden die bis jetzt unternommenen Aufbereitungs krit. beleuchtet. Die Aufbereitung wird durch den hohen Dispersitätsgrad des sehr schwierig. Die einzige Möglichkeit böte ein Flotationsprozeß. Die Frage, ob das Ag geht, ist noch ungeklärt. (Metall u. Erz 23. 149—54. Eisleben.) ENSZL

—, *Die Stahlerzeugung im Bofhardtofen*. (Metallbörse 16. 565—66. 621 678—79.) BEHR

—, *Elektrostahlöfen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika*. Übersicht Zeichnungen. (Metallbörse 16. 680—81. 736—37.) BEHR

Joseph Laissus, *Beitrag zur Studie der metallischen Zementationen*. Zementation der Ferrolegierungen durch das Chrom. (Rev. de Métallurgie 23. 155—78. — C. I. II. 1215.) KALPE

L. Grenet, *Bemerkungen, die sich auf das Gleichgewichtsdiagramm Eisen-Nickel beziehen*. Unumkehrbarkeit der kristallinen Umwandlungen. Fast Grenzzustand in den kristallisierten Körpern. (Vgl. S. 2284.) Wenn die Eigentümlichkeiten stabiler oder instabiler homogener Phase sich an einer Stelle des Diagramms finden, die in der Nähe des Kurvenpunktes mit fast vertikaler Tangente liegt, so man oft Unregelmäßigkeiten vom Temp.-Gesetz als Eigenschaften der Phase v

nen. Diese Unregelmäßigkeiten erfolgen in dem Sinne der Annäherung an die Eigenschaften der benachbarten Phase. In den *Fe-Ni-Legierungen* geht die α - in γ -Umwandlung stets unter Kontraktion vor sich u. die Umwandlungstemp. sinkt mit steigendem *Ni-Gehalt*; in den *Fe-Co-Legierungen* erfolgt der α - in den γ -Zustand unter Kontraktion, wenn der *Fe-Anteil* hoch ist. In den *Fe-Ni-Legierungen* sinkt die magnet. Umwandlungstemp. der γ -Phase durch ein Maximum für einen *Ni*-Gehalt von annähernd 65%, der ungefähr der Permalloylegierung entspricht. In den *Fe-Co-Legierungen* sinkt die magnet. Umwandlungstemp. ständig mit zunehmendem *Fe-Gehalt*. (Rev. de Métallurgie **23**. 143—54.) KALPERS.

J. Jungbluth und **H. Gummert**, *Über den Einfluß der Gießtemperatur und des Phosphorgehalts auf Größe und Ausbildungsform des Phosphideutektikums*. Die Menge des Phosphideutektikums ist von der Gießtemp. insofern abhängig, als sie mit zunehmender Temp. geringer wird. Auch das Glühen oberhalb der Gießtemp. vermindert die Menge des Eutektikums, da der P in den Ferrit diffundiert. Die Menge des Eutektikums ist von der Gießtemp. unabhängig, durch Glühen dagegen wird sie gröber. (Zeitschrift für Eisenhüttenkunde **7**. 41—46. Essen.) LÜDER.

J. Saemann, *Die Entwicklung der Schweißstahlerzeugung in England und Amerika*. Vf. gibt einen Überblick der geschichtlichen Entwicklung der Produktion von Schweißstahl in England u. Amerika. Insbesondere werden die mechan. Puddelwerke beschrieben u. eine moderne Anlage beschrieben. Schließlich werden die Eigenschaften des Puddelstahles erörtert. (Stahl u. Eisen **46**. 436—41. Berlin.) LÜDER.

H. H. Andrew, **M. S. Fisher** und **J. M. Robertson**, *Einige physikalische Eigenschaften des Stahles und ihre Bestimmung*. Vf. haben die Messung der Elektrodenpotentiale des elektr. Widerstandes u. die Widerstandsänderung während des Temperns an Stählen vorgenommen. Die Potentiale einer Reihe von einfachen C-Stählen wurden gegen solche mit Cr- u. Ni-Gehalten in getempertem u. in abgeschrecktem Zustand gemessen. Am gleichen Material wurde der elektr. Widerstand u. mit Hilfe einer besonderen Versuchsanordnung die Widerstandsänderung während des Temperns bestimmt. Die Ergebnisse sind in einer Reihe von Tabellen zusammengestellt. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **110**. 391—422. London.) LÜDER.

F. Rapatz, *Schneidfähigkeit der Werkzeugstähle*. (Metallbörse **16**. 677—78. Düsseldorf.) OBERKASSEL, Gebr. BÖHLER u. Co.) BEHRLE.

J. Cournot und **K. Sasagawa**, *Über die Veränderlichkeit der Schlagzugfestigkeit von weichen und harten Stählen mit der Temperatur*. Bis zu Temp. von 200° steigt ein leichtes Ansteigen der Festigkeitskurven; das Maximum für weiche Stähle liegt bei 625°, für harte Stähle bei 700°, mit folgendem, sehr schnellem Fallen. Die Dehnung der Dehnung ist in ihrer Gesamtheit gleichverlaufend, nur verhältnismäßig ausgeprägter. Die Versuchsstähle enthielten 0,04% C (weicher Stahl) bzw. 0,1% C (harter Stahl). Die Ergebnisse bei der Unters. eines Ni-Stahles mit 25% Ni erwiesen sich als verwickelter. (C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 1065—66. Paris.) KALPERS.

Léon Guillet und **Jean Galibourg**, *Untersuchungen über die thermische Behandlung von Aluminium-Kupfer-Legierungen*. (Vgl. S. 2048.) Zweck der Unters. war, die zur Erhöhung der Härte von Legierungen mit 11—14% Cu für Automobile zu finden. Die therm. Behandlung schien geeignete Wege zu weisen. Die durchgeführten Arbeiten, die sich auf das Härten u. Anlassen einer Reihe von Legierungen beziehen, führten denn auch zu der Erkenntnis der Möglichkeit, den Härtegrad zu steigern. So besaß eine Legierung nach Härtung an der Luft bei 450° eine Härte von 62 Einheiten, nach Glühen u. langsamer Abkühlung dagegen eine solche von 45 Einheiten. Die therm. Behandlung erwies sich als sehr wirksam u. die

von Anfang an erhaltene Verbesserung hat sich auch an den Motorteilen im B erhalten. (Rev. de Métallurgie 23. 179—90.) KALPE

D. Bunting, *Über Sprödigkeit der Bronze*. Die Bronzen (reine Cu-Sn-Legierung mit höherem Sn-Gehalt, 20%, sind in der Kälte spröde, lassen sich aber in der Schmieden. Vf. hat durch Kerbschlagproben die Sprödigkeitsbereiche von gegossener u. von geglühter Bronze festgestellt u. fand unter anderem, daß die eutektoiden Legierungen oberhalb des Umwandlungspunktes schmiedbar sind. Die Ergebnisse wurden in 2 Kurventafeln zusammengestellt. (Metallbörse 16. 624. London.) LÜD

P. Aulich, *Formstoffuntersuchung im Stahlgießereibetriebe*. Vf. behandelt Unters. von Formsand im Stahlgießereibetriebe. Natürliche Sande u. künstliche Gemische werden auf ihr Verhalten gegen hohe Temp. geprüft. Durch Schlämme wird die Korngröße u. der Tongehalt bestimmt. Schließlich sind Gasdurchlässigkeit u. Druckfestigkeit wichtig. Es wird ein Verf. zur dauernden Betriebsüberwachung angegeben. (Stahl u. Eisen 46. 393—96. Düsseldorf.) LÜD

—, *Dauerformguß von Aluminium*. Kurze Charakterisierung der verschiedenen Dauerformgußverfahren, des kernlosen Hohlgußes, des gewöhnlichen Gusses (Schwerkraft), des Schleudergusses, des sogenannten Cothiasgusses u. des Spritzgußes. (Metallbörse 16. 679—80.) BEHR

Thompson & Co. (Castlemaine) Proprietary Ltd. und **Henry Vicesinurs G.** Castlemaine, Victoria, *Siebsetzvorrichtung zur Konzentration metallhaltiger Stoffe*, bestehend aus einer tiefen, engen Büchse oder Kammer, die unten kon. zuläuft, Materialzuführungsvorr. u. -abführungsvorr. oben an dem Behälter u. einem Rohr, das das Innere des Behälters mit dem Zylinder einer Pumpe oder Pulsators verbindet. Letzterer treibt W. u. Material in den Behälter, aus dem unten das Konzentrat fließt. (Aust. P. 19 225 vom 19/8. 1924, ausg. 27/8. 1925.) KAUS

H. Lavers und Minerals Separation, Ltd., London, *Konzentrieren von Erzen*. Um eine Trennung der verschiedenen in Erzen enthaltenen Sulfide zu bewirken, versetzt man die Erze, bevor sie dem Flotationsprozeß unterworfen werden, zu einem dicken Brei ein Cyanid u. ein Alkali oder ein Alkalierdmetall enthaltendem wss. Brei, der während der Flotation mit einem Alkalisilicat versetzt wird. (E. P. 240 929 vom 12/7. 1924, ausg. 5/11. 1925.) OELK

Eisenwerk-Ges. Maximilianshütte, Rosenberg, Oberpfalz, *Stahllegierung*. Eisenbahnschienen u. andere Zwecke, enthaltend 1,25—2,5% Mn u. 0,3—0,7% Si. Die Menge des Si u. C darf zusammen nicht mehr als 0,7% betragen. (E. P. 241 929 vom 11/11. 1924, ausg. 11/3. 1926.) KÜHL

Norske A./S. for Elektrokemisk Industri Norsk Industri Hypotek Oslo, *Kondensieren von Zinkdampf* aus feststehenden elektr. Öfen mit rotierender Trommel, 1. dad. gek., daß die Trommel liegend gelagert ist u. von den Gasen der Drehachse durchströmt wird. — 2. Vorr. nach Anspruch 1, dad. gek., daß unmittelbar an die Trommel ein feststehendes Rohr in lotrechter oder schräger Stellung geschlossen ist, so daß die fl. u. festen Prodd., die noch in den Gasen vorhanden sind, dort ausscheiden u. von selbst in die Trommel zurückfallen. — Die Trommel ist mit dem Ofen durch ein umgeknicktes kurzes Rohr angeschlossen. (D. R. P. 427 929 vom 1/3. 1922, ausg. 7/4. 1926.) KÜHL

H. Harris, London, *Bleiraffination*. Man verwendet hierbei ein Oxydationsmittel (Oxysalz eines oder mehrerer sich mit den Metallmassen verbindender Metalle). (E. P. 244 424 vom 17/10. 1925. Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 11/12. 1924.) KAUS

Nichols Copper Comp., übert. von: **Marion H. Merriss**, New York, *Kupfer aus unreinem Kupfer oder Kupferlegierungen*. Rohkupfer, welches beträchtliche Mengen metall. Beimengungen, wie Pb, Sn, Zn, Ni, Co, Fe, As oder Sb, enthält, f. B. Messing, Bronze u. andere kupferreiche Stoffe werden im Konverter unter Z

Brennstoff u. Flußmitteln zunächst ganz oder teilweise geschmolzen u. dann ver-
n, wobei die Beimengungen vergast werden oder verschlacken u. reines Cu zu-
bleibt. (**A. P. 1 576 776** vom 1/8. 1925, ausg. 16/3. 1926.) KÜHLING.

Westinghouse Lamp Co., V. St. A., *Herstellung und Behandlung widerstands-
er Metalle*, wie Cr, Zr, Th u. dgl. Reines Metallpulver wird zu Barren geformt,
größtmöglichen Vakuum erhitzt, um eine kompakte M. zu bilden, die dann weiter-
erhitzt wird in einem größtmöglichen Vakuum. Dies wird so lange fortgesetzt,
das Metall bearbeitungsfähig ist. (**F. P. 601 840** vom 10/7. 1925, ausg. 8/3.

KAUSCH.

G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Ernst Heinze**,
dorf), *Erzeugung eines Quecksilberkreislaufes bei elektrolytischen Amalgamprozessen*,
gek., daß man an Stelle der vertikalen hier eine geneigte Rührachse verwendet.

P. 427 543 Kl. 121 vom 16/2. 1924, ausg. 8/4. 1926. **Zus. zu D. R. P. 390792;**
24. I. 2008.)

KAUSCH.

Ernst Pokorny, Halle a. S., *Reinigung von Molybdänglanz von anhaftenden
er- und Wismutverbindungen* nach Anspruch 3 des D. R. P. 425364, 1. dad. gek.,
die Chlorierung während der Ölflotation durch Cl₂-Einleitung in den Flotationsapp.
t. — 2. dad. gek., daß die Veränderung der Oberfläche der Cu- u. Bi-Mineral-
telchen durch Cl₂ zwecks Abscheidung bei der Flotation noch dadurch verstärkt
daß man das Erz nach oder bei der Chlorierung mit Alkali behandelt. (**D. R. P.**
31 Kl. 1c vom 14/7. 1923, ausg. 9/3. 1926. **Zus. zu D. R. P. 425364; C. 1926.**

KAUSCH.

J. V. Philips' Gloeilampenfabrieken und Johannes Antonius M. van Liempt,
roven, Holl., *Hochfeuerbeständige Stoffe*. Man geht von dem Pulver eines hoch-
esten Metalls aus oder einer Verb. dieses Metalls (W) setzt *Hafniumoxyd* oder
solches ergebende Hf-Verb. zu u. preßt das Pulver zu Stäben zusammen, die letzteren
n in einer reduzierenden at. auf 1200° erhitzt. Dann bringt man die Stäbe in
it H₂ oder einem anderen reduzierenden Gas gefüllte Glocke u. erhitzt sie sodann
. auf Weißglut. (**Aust. P. 19 367** vom 27/8. 1924, ausg. 26/2. 1925.) KAUSCH.

Michel, Bagneux, Frankreich, *Reinigen von Magnesium und Magnesium-
ungen*. Unter einer Schutzdecke, z. B. von NH₄Cl, wird das geschmolzene Metall
0,05—0,3% zweckmäßig in dünnen Magnesiumröhrchen eingeschlossenem Ca u.
ig versetzt. (**E. P. 247 149** vom 17/10. 1925, Auszug veröff. 8/4. 1926. Prior.
1925.)

KÜHLING.

David H. Donegan, Plaurville, V. St. A., *Gewinnung von Edelmetallen aus sie-
nden Sanden*. Die Sande werden in W. aufgeschlämmt u. die aufgeschlammte M.
Richtung von unten nach oben durch mit Kugeln verschiedener Größe gefüllte
ter von der Form sich nach oben erweiternder Kegelstümpfe geleitet. An der
fläche dieser Behälter befindet sich ein Rost, oberhalb desselben Abflußröhren
ichte Metalle, nicht metall. Bestandteile u. W. Die Edelmetalle sinken während
durchfließens der Aufschlämmung zu Boden u. sammeln sich in einem der Zufluß-
benachbarten Hohlraum, von dem sie durch eine mittels Schraube verschließbare
ng abgezogen werden. (**A. P. 1 576 954** vom 21/3. 1925, ausg. 16/3. 1925.) KÜ.
h. Goldschmidt A.-G., Essen, Ruhr, *Lagermetalllegierung mit Bronzegrundlage*
Patent 420068, bestehend aus etwa 14—16% Pb, 2,5—3,5% Ni, 2—6,5% Sn,
Cu, wobei auch das Sn teilweise durch Sb u. Zn ersetzt werden kann. — Härte,
festigkeit, Plastizität u. Gleiteigenschaften der Legierungen nähern sich sämtlich
Höchstwert. (**D. R. P. 423 292** Kl. 40b vom 8/6. 1923, ausg. 24/12. 1925.
u **D. R. P. 420068; C. 1926. I. 1038.)**

KÜHLING.

Metals Refining Corp., New York, übert. von: **Howard G. Lapsley**, Plainfield,
A., *Reinigen geschmolzener Metalle*. Die Metallbäder, z. B. solche von Fe, Stahl,
i- u. Kupfer- oder Nickellegierungen werden mit aus 90—40% Al u. 10—60% B

bestehenden Verbb. oder Legierungen vermischt, welche nur geringe Beimengungen von C, Fe, Si, Mn, Ti, Ca oder Mg enthalten sollen. Der Zusatz bewirkt Entfernen des chem. gebundenen, gel. oder absorbierten O₂, H₂, N₂, Schwefel, P, As u. CO mit dem Zusatz leicht schmelzbare, in dem Metall unl. Schlacken bilden, die sich an der Badoberfläche sammeln u. von dort abgeschöpft werden. (A. P. 1 578 044 4/8. 1925, ausg. 23/3. 1926.) KÜHLI

G. A. Méker, Courbevoie, Frankr., *Überziehen von Metallen*. Man verwendet dabei eine geringe Menge an Salzen (wie NH₄Cl oder ZnCl₂), um mit dem Fe oder bei 700—1000° flüchtige Verbb. (Chloride) zu erhalten. (E. P. 245 746 vom 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 8/1. 1925. Zus. zu E. P. 211122; C. 19 596.) KAUS

Pio Rossi, Bern, *Lötmittel für das autogene Schweißen von Aluminium*, besteht aus NaCl, KCl, AlF₃ u. Kryolith. (Schwz. P. 102 078 vom 1/6. 1923, ausg. 1924.) KÜHLI

X. Farben; Färberei; Druckerei.

H. A. Morrison, *Waschen gebleichten Stoffs auf Vakuumtrommelwäschern*. Eine geeignete Einrichtung ist beschrieben. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 219—21.)

R. G. Meade, *Beizen und ihre Anwendung*. Die Verwendung der W.-, S.- u. chem., Pigment- u. Ölbeizen, sowie der in der Holzbearbeitung verwendeten Farbmittel ist beschrieben. (Paint, Oil and Chemical Review 1925. 26/10.; Farbe u. Lack 1926. 136—37.) SÜVE

D. M. Amalsad, *Bedrucken und Bemalen von Baumwolle in Madras*. Die vorwiegend benutzten Malgeräte, Handdruckformen u. die Farbenzubereitung werden besprochen. Eine Verbesserung der Handdruckform wird vorgeschlagen. Die Einführung synthet. Farbstoffe ist zu fördern. (Indian Textil Journ. 36. 141—44. 1925. Chester.) SÜVE

William D. Baird, *Das Herrichten von Pelzen*. I. Nach Besprechung der hauptsächlichsten Pelzarten, der Einw. des Klimas u. der Struktur der Felle werden verschiedene Gerbverff. beschrieben. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 115—17.) SÜVE

F. M. Rowe und Esther Levin, *Die Zusammensetzung einiger für die Herstellung unlöslicher Azofarbstoffe gebrauchter Produkte*. (Vgl. S. 505.) Brenthol H, 1. 50%ig. der BRITISH SYNTHETICS, Ltd. ist eine wss. Paste einer ll. Kombination von Naphthalin A S u. Pyridin. Es bietet den Vorteil, daß damit angesetzte Bäder unbegrenzt benutzt werden können, ohne daß Oxydation oder Polymerisation eintritt. Anstatt über Naphthol AS-Prodd. werden gemacht. Monolitrot 2G (BDC) ist der Azofarbstoff aus diazotiertem m-Dinitranilin u. β-Naphthol. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 354—56. 1925. Manchester.) SÜVE

C. P. van Hoek, *Die Teilchengröße von Körperfarben und deren Einfluß auf Anstrichfarben und Farbschichten*. Die Arbeit behandelt das Schutzvermögen von Anstrichschichten, Totaloberfläche der Farbenkörner u. Adhäsion gegenüber Bindemitteln, kolloidale Lsg. von Körperfarben, Ausflockung, Größenbest. u. Größe der Körperfarbenteilchen, Einfluß der Bereitungsweisen auf die Teilchengröße der Körperfarben, das Mahlen der Anstrichfarben. (Farben-Ztg. 31. 1237—39. 1295—97. 1350—52. 1399—1401. Hilversum, Holland.) SÜVE

United Fruit Co., Boston, Mass., übert. von: **Gustavus J. Esselen, jr.**, Swanton, Mass., *Entfärbungsmittel*. Der aus Zuckerrohr isolierte markartige Anteil wird mit Alkali (Kalk) innig gemischt. (A. P. 1 575 561 vom 6/10. 1922, ausg. 1926.) KAUS

Alfred Edward Morgans, Perth, West Australien, *Behandeln von Bleichzwecken Herstellung eines Farbstoffes*. Man treibt Luft von oben nach unten

glühende M., die aus Brennstoff u. Bleiglanz besteht u. sich in einem oben offenen befindet. (Aust. P. 18 759 vom 21/7. 1924, ausg. 10/9. 1925.) KAUSCH.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. (Erfinder: **Karl ss**, Höchst a. M.-Sindlingen), *Darstellung von Aminoazoverbindungen*, gekennzeichnet durch Einw. von diazotiertem *m*-Aminobenzaldehyd u. dessen Derivv. auf lungsfähige aromat. Mono- oder Diamine. — Die erhaltenen Aminoazoverbb. entweder selbst Farbstoffe oder sie können zur Herst. von Farbstoffen verwendet en. (D. R. P. 423 090 Kl. 22a vom 26/7. 1923, ausg. 29/12. 1925.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Darstellung von lensationsprodukten der Anthrachinonreihe*. Zu den Reff. nach E. P. 205502; 124. I. 710 u. D. R. P. 423720; C. 1926. I. 2848 ist folgendes nachzutragen: Das 9-Dibenzopyren-5,10-chinon u. dessen Substitutionsprodd. lassen sich auch er- n, indem man 1,5-Diaroynaphthaline längere Zeit mit AlCl₃ auf höhere Temp. pt, gegebenenfalls unter Zufuhr von Luft oder O₂, u. Nachbehandlung der entstan- Rohprodd. mit NaOCl oder anderen Oxydationsmitteln. — Z. B. wird 1,5-Di- glynaphthalin, F. 186,5°, mit frisch sublimiertem CaCl₂ allmählich in einem mit -Rohr verschlossenen Behälter auf 170—195° bis zur Beendigung der Farbstoff- ng erhitzt. Nach Zers. der M. mit W. u. Extraktion des Rückstandes mit sd. HCl wird der Farbstoff in üblicher Weise gereinigt. Er schm. bei ca. 385°, l. in Nitrobenzol u. in konz. H₂SO₄ mit violettblauer Farbe. (F. P. 30 109 vom 10/2. ausg. 27/3. 1926. Zus. zu F. P. 578690; C. 1925. I. 3033.) SCHOTTLÄNDER.

Shosaku Ishiyama, Los Angeles, Calif., *Anstrichentfernungsmittel für Auto- e*. Man mischt 1 $\frac{1}{8}$ Gallonen W., $\frac{1}{2}$ Pfund NaOH, $\frac{1}{2}$ Pfund Lauge, 2 Unzen 2 $\frac{1}{2}$ Unzen NH₃ (70%ig.), 1 Unze käufliches CHCl₃, 2 Unzen Citronensaft u. zen Getreidestärke. (A. P. 1577 824 vom 18/8. 1925, ausg. 23/3. 1926.) KA.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

I. Baclesse, *Die Elektrolyse des Kautschuks*. Vf. beschreibt ein Verf., nur mit des elektr. Stromes aus Latexlsg. Kautschuk sowohl unvulkanisiert als auch nisiert abzuschneiden. (Kautschuk 1926. 67—68.) EVERS.

N. de Visser, *Kalander- und Schrumpfeffekt von unvulkanisiertem Kautschuk*. unvulkanisierter Kautschuk auf dem Kalander zu Platten ausgezogen, so zeigt häufig, daß Proben, die parallel zur Längsrichtung ausgestanzt sind, eine größere ißfestigkeit haben als solche Proben aus der Querrichtung. Umgekehrt ist die nale Dehnung beim Bruch bei den Querproben größer als bei den Längsproben ndereffekt). Dementsprechend nimmt die Länge der Proben ab, die Breite ke aber zu, wenn die Proben erwärmt werden oder quellen. Zeigen Proben ohne dereffekt diese Erscheinung, so spricht Vf. vom Schrumpfeffekt. Die experi- alle Durcharbeitung ergibt die Bestätigung der Theorie u. Vf. kommt zum Schluß m Ergebnis, daß der Kalandereffekt in bestimmter Weise von der Temp. ab- g ist; ferner, daß bei Fellen mit Kalandereffekt Doppelbrechung, Dichroismus, e D. u. deutliches Debye-Scherrerdiagramm zu beobachten ist. Erklärt wird uftreten des Kalandereffekts mit einer Veränderung der inneren Struktur des schuks, wahrscheinlich ist die B. sehr kleiner gerichteter Kryställchen. (Gummi- 10. 457—58. 511—13. 1925.) EVERS.

J. R. Park, *Versuche über künstliche Alterung*. Vf. untersucht krit. die neuen kan. Methoden zur Best. der künstlichen Alterung von Gummimischungen. ellt eine Reihe Mischungen mit verschiedenen Beschleunigern her u. prüft die liche Alterung (12 Monate), die Alterung im Geerofen u. in der Bombe von ER-DAVIS. Das Ergebnis ist, daß bei der natürlichen Alterung Vorgänge auf- , die der künstlichen Alterung fehlen. Man muß also bei Auswertung der Er-

gebnisse größte Vorsicht walten lassen, da keine Methode besteht, die natür-
Alterung ersetzen kann. (Kautschuk 1926. 57—62.) EVE

W. Cecil Davey, *Das Zerstäuben von Kautschuklatex mit Schutzkolloiden, beso*
Leim. Vf. untersucht den Zusatz von Leim zum Latex beim Verstäuben. Der erha-
Kautschuk ist härter als auf gewöhnliche Weise koagulierter. Unvulkanisierter
erfordert höhere Zusätze von Schutzkolloiden als vulkanisierter. Aus vulkanisier-
Latex erhaltener verstäubter Kautschuk läßt sich schon bei verhältnismäßig nie-
Drucken pressen. Auf der Walze wird Leim am besten als Leim-Latexpulver in
schuk eingewalzt. All zu langes Lagern von Leimkautschukmischungen muß
mieden werden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 515—17. 1925.) EVE

W. Greinert und J. Behre, *Über die Vulkanisation in Lösung*. Vff. untersu-
die Gelbildungszeit von Kautschuklsgg. durch Chlorschwefel. Sie finden, daß
Vorgänge des Knetens u. Erholens von Kautschuk sich gut wiedergeben la-
Ferner gestattet die Methode eine brauchbare Beurteilung von Rohkautschuk (C)
Die Verschlechterung der mechan. Eigenschaften von Vulkanisaten durch län-
Kneten läßt sich auch erkennen durch die Verlängerung der Gelbildungszeit.
Methode der Messung der Gelbildungszeit u. die der Messung der Aufstiegsgeschi-
keit von Bzl.-Kautschuklsgg. bringen nicht dieselben Eigenschaften zum Ausd-
(Kautschuk 1926. 63—64.) EVE

D. F. Cranor, *Ein technischer Vergleich neuzeitlicher Verstärkungsmittel für*
schuk. Die Einw. feinkörniger *Verstärkungsmittel*, ZnO, thermatom. Kohle (Th-
atomic Black), Micronex (Gaskohlenschwarz) u. Lampenschwarz, auf die
beanspruchungskurve ist in Diagrammen wiedergegeben. Micronex zeigte sich
sichtlich Zugfestigkeit, größerer prozentualer Dehnung bis zum Bruchpunkte
legen. Bei 20% gibt Micronex genügend Steifheit u. Festigkeit für gute Laufflä-
für Reifen; durch geringes äußerstes Dehnungsvermögen wird die geringe Widerst-
fähigkeit gegen Abreibung erklärbar. Bei 50% üben ZnO u. Lampenschwarz
teilige Einw. aus, weniger thermatom. Kohle. Nur beim Micronex wird der
festigkeitsbruchpunkt über die übrigen Kurven hinausgelegt; die Kurve ges-
sich fast geradlinig. Diese hervorragende Eigenschaft eröffnet neue Möglichk-
(Chem.-Ztg. 50. 264—65. New York.) JUN

Lothar Hock, *Über ein faktisähnliches, durch stille Entladungen gewonnene*
produkt (Vollfaktis). Bei der Behandlung von Mineral- oder fetten Ölen mit Gl-
entladung scheiden sich bei längerer Einw. der Hochspannung unl. Prodd. ab
sog. Vollfische oder Vollfaktis. Vf. hält sie für ähnlich mit Faktis u. nimm-
daß sie aus höhermolekularen Triglyceriden bestehen. Bei dem Ersatz von F-
durch den Vollfaktis findet Vf., daß Vollfaktis sich nur zur Kaltvulkanis-
eignet, dagegen nicht für Heißvulkanisate. Der Vollfaktis stellt ein Vorprod.
Schwefelfaktis in bezug auf Polymerisation dar. Es ist vielleicht möglich, V-
faktis durch S-Aufnahme in ein Prod. zu verwandeln, das sich als Füllmittel für
schuk eignet. (Kautschuk 1926. 65—67.) EVE

H. P. Gurney und F. F. Cameron, *Technische Probleme, die mit Gumm*
zügen von eisernen Rollen zusammenhängen. (India Rubber Journ. 71. 554—64.) EV

H. Rimpel, *Aus der Praxis der Regenmäntelfabrikation*. Vf. untersucht
schiedene Proben Gummilsg. auf ihr Verh. gegen O₂ bei höherer Temp., da sich ge-
hatte, daß die Gummierung von Regenmänteln verschiedener Herkunft schlecht
worden war. Die zur Probe benutzten Stoffe zeigten, mit reinen Gummilsgg.
miert, keine Schäden. Sobald aber mit Kolophonium versetzte Gummilsgg.
gebracht wurden, traten die Zers.-Erscheinungen wieder auf. Vf. führt diese
eine Wechselwirkung von Kolophonium u. der Gummierung des Mantelstoffs zu
(Kautschuk 1926. 71—72.) EVE

Hermann Beckmann, Zehlendorf, Wannseebahn, *Herstellung von Kautschuk mit großer Anzahl mikroskopisch kleiner Poren.* (D. R. P. 425 770 Kl. 39b vom 28/9. 1926, ausg. 24/2. 1926. — C. 1926. I. 2748 [E. P. 240 430].) FRANZ.

Phadeloid Chemical Company, West-Virginia, übert. von: **Norris Boehmer**, *clair, Firnis aus chlorierten Kautschuk enthaltendem Harz.* Der Firnis besteht aus einer Lsg. von Harz (z. B. Cumaronharz) u. chloriertem Kautschuk; als Lösungsmittel benutzt werden: KW-stoffe, CS₂ usw. (A. P. 1 572 065 vom 11/10. 1923, ausg. 9/2. 1926.) RÖHMER.

Augatuck Chemical Co., V. St. A., *Verzögerer der Zerstörung des Kautschuks.* bringt äquivalente Mengen eines aliphat. Aldehyds u. eines aromat. Amins in saurer Lsg. zur Vereinigung. (F. P. 599 411 vom 14/5. 1925, ausg. 12/1. 1926, ausg. 23/9. 1924.) KAUSCH.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Waldemar Zieser**, Elberfeld), *Vulkanisieren von Kautschuk bei niedrigen Temperaturen*, darin bestehend, daß man Kautschukmischungen, die neben Salzen von *piperidylthiocarbaminsäure* als Vulkanisationsbeschleuniger noch ZnO u. eine geringe Menge unter den üblichen liegende Schwefelmenge enthalten, vulkanisiert. — Die Vulkanisation erfolgt unter 100° in kurzer Zeit, die Schwefelmenge beträgt 2 bis 5%, die Schwefelaufnahme erfolgt quantitativ, eine zur Übervulkanisation führende Vulkanisation kann nicht eintreten. (D. R. P. 423 101 Kl. 39b vom 11/9. 1920, ausg. 21/12. 1925.) FRANZ.

British Dyestuffs Corp. Ltd., übert. von: **Victor Lefebure** und **Anthony Hailwood**, Manchester, England, *Vulkanisationsbeschleuniger.* Man versetzt das Einwirkungsprod. von 1 Mol. eines *p*-Nitrosoalkylarylamins auf 2 Moll. Naphthol; man vermischt z. B. 1 Mol. *p*-Nitrosodimethylanilin mit 2 Moll. *β*-Naphthol zu pulverisiertem Zustande, zweckmäßig in einer Mühle. (A. P. 1 570 752 vom 11/10. 1923, ausg. 26/1. 1926.) FRANZ.

Jacob Horowitz, Brooklyn, New York, V. St. A., *Leinölersatz.* 25 Teile Rohkautschuk werden in 75 Teilen raffiniertem Leuchtpetroleum gel., dann werden 100 Teile 10 Teile PCl₃ u. so viel Alkali zugesetzt, daß die Mischung alkal. Rk. zeigt. (A. P. 1 552 252 vom 18/9. 1924, ausg. 19/1. 1926.) RÖHMER.

F. Goodrich Co., V. St. A., *Kautschukprodukte.* Man mischt H₂SO₄ u. einen Anteil wie Fichtenteer mit Rohkautschuk u. erhitzt das Gemisch, damit eine Reaktion den Substanzen eintritt. Es entsteht ein künstliches, nicht homogenes Gestein, in der Wärme plast. Prod., das chem. nicht so gesätt. ist wie Kautschuk. (O. P. 599 561 vom 11/4. 1925, ausg. 15/1. 1926. A. Prior. 14/4. 1924.) KAUSCH.

Rudolf Koller, Schwechat b. Wien, *Aufbringen einer Gummischuttschicht auf Sohlen und Absätze.* Die Sohlen werden mit einer harzhaltigen Kautschuklsg. beschichtet, nach dem Trocknen wird die Sohle so oft mit einer Kautschuklsg. bestrichen, bis die Poren des Leders gefüllt sind u. eine Schicht als Überzug auf der Oberfläche verbleibt, die Schicht kann nach ihrer Abnutzung durch wiederholtes Bestreichen erneuert werden. (Oe. P. 101 943 vom 17/11. 1921, ausg. 10/12. 1925.) FR.

Paul Meyersberg, Preßburg, *Herstellung von Kautschuklösungen in nicht flüchtigen Lösungsmitteln.* Man erhitzt Kautschukmilch u. versetzt in dem Maße, wie er verdampft, mit den nicht flüchtigen Lösungsmitteln, wie Ölen; die Lsgg. kann mit Paraffin, Harzen usw. vermischt, die Mischungen geben mit W. haltbare Emulsionen. (Oe. P. 101 952 vom 12/2. 1924, ausg. 10/12. 1925.) FRANZ.

Paul Barta, Baden b. Wien, *Herstellung von Schuhsohlen.* Innerhalb des Filzes wird ein heterogenes Gemisch verschieden vulkanisierter oder vulkanisierbarer Kautschukarten erzeugt; man vermischt das Filzfasergewirr mit zerkleinertem Hartkautschukabfall, trinkt mit einer Kautschuklsg. u. vulkanisiert auf Weichkautschuk. (O. P. 102 294 vom 2/3. 1925, ausg. 11/1. 1926.) FRANZ.

Alexis Sokolow, Rußland, *Gewinnung von Säften durch Diffusion*. Die aus-
gehenden Substanzen, z. B. Zuckerrübenschnitzel, werden zunächst im Gegenstrom
er Extraktionsfl. behandelt u. dann zwischen Sieben der Einw. eines h. Saft-
es ausgesetzt, dessen Richtung period. geändert werden kann. (**F. P. 597 408** vom
1925, ausg. 20/11. 1925.) OELKER.

Kessler, San Fernando, Argentinien, *Zuckerkrystallisation*. Man läßt Zucker-
durch eine Reihe wagerechter Krystallisiergefäße zu einer Zentrifuge strömen.
245 712 vom 25/3. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 7/1. 1925.) KAUSCH.

Amille Deguide, Enghien, Frankr., *Gewinnung von Zucker aus Melasse und
Säften*. Man behandelt die Melasse bzw. Zuckersäfte mit $\text{SiO}_2 \cdot \text{BaO}$ oder $2 \text{SiO}_2 \cdot$
wodurch Glucose u. Lävulose, sowie organ. Verunreinigungen ausgefällt werden,
t den Nd. ab u. behandelt das die Saccharose enthaltende Filtrat mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$,
ch Bariumsaccharat abgeschieden wird, das man durch CO_2 in Saccharose u.
zerlegt. (**A. P. 1 579 090** vom 3/11. 1925, ausg. 30/3. 1926.) OELKER.

Stanley Dean Wilkins, Edward Charles Gould und Harry Chauncey Reiner,
A., *Zuckerprodukt*, bestehend aus einem entwässerten, innigen Gemisch *Melasse*,
t Dampf behandelt worden ist, mit einem Stabilisator (*Casein*). (**F. P. 599 950**
2/6. 1925, ausg. 25/1. 1926.) KAUSCH.

Citizens of the United States of America, übert. von: **Howard S. Paine**,
Chase, Maryland, **Charles F. Walton, jr.**, Washington, Col., und **Victor**
ier, Oxon Hill, Maryland, *Herstellung von Rohrzucker aus Melasse*. Man ent-
len Invertzucker aus der Melasse durch selektive Gärung, fällt aus dem Rück-
die Sucrose als Saccharat, zers. letztere durch CO_2 , filtriert das CaCO_3 ab u.
das Filtrat bis zur Krystallisation. (**A. P. 1 572 359** vom 8/2. 1924, ausg. 9/2.
OELKER.

orn Products Refining Co., New York, übert. von: **W. B. Newkirk**, River-
linois, *Glucose*. Konvertierte Glucose aus Stärke wird in übersätt. reiner Lsg.
krystallisation gebracht. Letztere beginnt, sowie die Übersättigung erreicht
P. 246 098 vom 11/8. 1925, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 17/1. 1925.) KA.

Rosemary Creamery Co., New York, übert. von: **Henry V. Dunham**, Mount
t, N. Y., V. St. A., *Milchzucker*. Man konz. Molke über direktem Feuer bei
lichem Druck u. Aufblasen eines Luftstromes auf die Oberfläche der Fl., um
ermäßige Schäumen zu verhindern. Sobald die Molke eine D. von 20° Bé.
0° F. zeigt, filtriert man die ausgeschiedenen Eiweißstoffe ab u. konz. dann
lratat weiter bis zur Krystallisation. (**A. P. 1 571 626** vom 30/1. 1923, ausg.
1926.) OELKER.

J. Perl & Co., Kommanditgesellschaft, Berlin-Tempelhof, *Herstellung*
nach basische Salze nicht ausfällbaren Stärkelösungen. Man läßt auf in W. aufge-
mte Stärke in der Wärme ganz geringe Mengen von sauer reagierenden Stoffen
en u. erhitzt die M. alsdann mit kaust. Alkali im Überschuß so lange, bis die
aufgeschlossen ist, worauf man schließlich das Alkali durch Säure neutralisiert.
P. 113 725 vom 19/11. 1924, ausg. 1/2. 1926.) OELKER.

XV. Gärungsgewerbe.

Guinot, *Die technische Herstellung des absoluten Alkohols*. Die Verff. der Be-
ng des Alkoholdampfes mit CaO , Einw. von K_2CO_3 -haltigem Glycerin u. Dest.
uum sind heute prakt. durch die Dest. mit Bzl. verdrängt. Das Verf. ge-
wie näher beschrieben wird, Gewinnung von reinem, auch von Bzl. freiem
A. zu einem nicht höheren Preise als von 96%ig. A. nach bisherigem Verf.,
n quantitative Abtrennung von CH_3OH , Amylalkohol, Aceton, nicht aber
m bei 82° sd. *I-Propanol*. Letzteres ist daher an Stelle von CH_3OH als *De-*
runungsmittel zu empfehlen. (Chimie et Industrie 15. 323—30.) GROSZFELD.

M. Glaubitz, *Die Einsäuerung der Kartoffeln. Anleitung zur Vorbehandlung Lagerung der Kartoffeln sowie zur Züchtung der Milchsäurebakterien. Hinweis die Verwendung als Viehfutter.* (Ztschr. f. Spiritusindustrie **49**. 53. Berlin N 65, f. Gärungsgewerbe.)

G. de Belsunce, *Verwertung der Erdnußschalen für die Herstellung von Al Essigsäure und anderer Nebenprodukte.* Bericht über einen befriedigend ausgef. Vers., nach dem Verf. von MEUNIER die Cellulose der Schalen in vergärbaren u. die daraus zu gewinnenden Prodd. überzuführen. (Bull. Matières Grasses 1—3. Marseille, Institut Colonial.)

Marc H. van Laer, *Die Reaktion der Masse; ihre Bedeutung für die Bierbrau* Zusammenfassende Erörterung der Einw. der Rk. der M. auf die Keimung der (u. die diastat. Wirksamkeit des Malzes beim Brauen, auf das Kochen der Würz den Gang der Säuerung während der alkoh. Gärung, auf die enzymat. Vorgänge Gären u. auf die Beständigkeit des fertigen Bieres. (Chimie et Industrie **14**. 5. 518. 1925.)

W. Tschakaroff, *Zusammensetzung bulgarischer Naturweine.* Analysenerge der Jahrgänge 1923/24 u. einiger älterer Jahrgänge (1903—1922). (Ztschr. f. U d. Lebensmittel **51**. 61—71. Plevn, Bulgarien, Weinbauversuchsstation.)

A. Kreutz und **C. Büchner**, *Die Zusammensetzung der Moste und Wein Jahres 1924 aus dem Weinbaugebiet der hessischen Provinz Starkenburg.* Statist über Mostgewichte u. Säuregehalte, Zus. von 15 Weinen. — Trotz des schle Jahrganges haben sich die Weine besser als erwartet entwickelt. (Ztschr. f. U d. Lebensmittel **51**. 58—61. Darmstadt, Hess. Chem. Prüfungsstation.)

Richard Schmitt, *Untersuchung von Branntwein und Branntweinerzeugn auf Phthalsäurediäthylester.* Das Verf. des Reichsmonopolamtes mit Pyrogallol (sich infolge des Auftretens von Färbungen auch in reinen Branntweinen als brauchbar. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel **51**. 56—57. Würzburg.)

A. R. Ling und **D. R. Nanji**, Birmingham, *Gärverfahren.* Man läßt die G der zur Erzeugung von A. erforderlichen Maische in Ggw. von Enzymen vo gehen, die die n. nicht vergärbaren β -Dextrine u. Zucker hydrolysieren ode Organismen, die diese Enzyme (Emulsin usw.) enthalten. (E. P. 221 592 vom 1923, ausg. 9/10. 1924.)

Josef Szücs, Wien, *Herstellung von Citronensäure durch Gärung mit Hilt* Fadenpilzen unter Verwendung von fl. Nährsubstraten, dad. gek., daß tau Stämme der Gattungen *Citromyces*, *Mucor*, *Aspergillus* u. *Penicillium* durch e mentelle Vergleichung ihres Vermögens zur B. von Citronensäure bei verhältnis niedriger Temp. nach den bekannten Methoden der mycolog. Analyse ausgewä diese Stämme unter Verwendung von *Melasse* als Nährlsg. zur Citronensäureerze verwendet werden. — Die günstigste Temp. ist z. B. bei *Aspergillus* gegen 20°, wo eine Oxydation der Citronensäure zu Oxalsäure verhindert wird. Gegebenenfalls die *Melasse* mit Phosphaten versetzt oder durch Reinigung von K-Salzen befreit w Aus der Nährfl. wird die *Citronensäure* zweckmäßig durch Neutralisation mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ oder BaCO_3 gewonnen. Das *Ba-Citrat* fällt bereits in der Kälte aus u. dann durch H_2SO_4 zers. (Oe. P. 101 009 vom 19/12. 1923, ausg. 25/12. 1925. 589 936 vom 3/12. 1924, ausg. 8/6. 1925. Oe. Prior. 19/12. 1923.)

Fleischmann Company, New York, *Herstellen von Dauerhefe.* (D. R. P. 42 Kl. 6a vom 18/5. 1922, ausg. 18/1. 1926. A. Prior. 4/6. 1921. — C. 1924. I [E. P. 181 334].)

T. P. Hodge, Park Ridge, Ill., V. St. A., übert. von: **Ludolf Lindemann**, A Bahrenfeld, Deutschland, *Konservieren von Hefe.* Man wäscht frische Hefe in

iltem Zustande so lange mit 35/45° w. W. aus, bis das Glykogen größtenteils
ent ist. (A. P. 1574 494 vom 3/8. 1923, ausg. 23/2. 1926.) OELKER.

Richard Willstätter, München, und **Harry Sobotka**, New York, *Hefepräparat*.
vermischt Hefe mit wenigstens $\frac{1}{3}$ ihres Gewichtes eines anderen Disaccharids
Mehrzucker, z. B. Maltose, um die Plasmolyse der Hefe einzuleiten u. vollendet
stere dann durch Erhitzen der Mischung auf Temp. über 60°. Es wird ein
in- u. enzymreiches Prod. erhalten. (A. P. 1574 776 vom 16/1. 1925, ausg.
1926.) OELKER.

Fleischmann Company, New York, übert. von: **Charles Hoffmann**, Tuckahoe,
an **Minton Gregor**, New York, und **Harry Davett Grigsby**, Brooklyn, N. Y.,
Zur Herst. einer Bäckerhefe bereitet man aus entölten, stärkehaltigen Sub-
en durch Verkleistern eine Maische, verzuckert diese mit Hilfe von Malz, setzt
se hinzu, kocht die Mischung mit Papain, filtriert, versetzt das Filtrat mit
l u. CaCO_3 u. propagiert Hefe in dieser Fl. nach dem Lüftungsverf. (A. P.
761 vom 22/3. 1922, ausg. 9/3. 1926.) OELKER.

Fleischmann Company, New York, übert. von: **Charles Hoffmann**, Tuckahoe,
, und **Charles N. Frey**, Warren, Ohio, *Hefepräparat*, welches in der Weise
en wird, daß man die Hefe mit einer gesätt. Salzlsg., z. B. einer $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -
behandelt, um das Protoplasma zu koagulieren, die M. danach auf etwa 85°
s Abtötung der Hefe erhitzt u. nach Entfernung eines Teils der Salzlsg. trocknet.
1575 762 vom 15/9. 1923, ausg. 9/3. 1926.) OELKER.

Vereinigte Mautner'sche Preßhefefabriken Ges. m. b. H., Wien, und **Eugène**
-Springer, Paris, *Herstellung von Hefe, insbesondere von Lufthefer*, neben Spiritus
faische oder Würze, bei welchem der stark verd. gärenden Lsg. während der
g period. oder kontinuierlich eine konz. Lsg. zugeführt wird, dad. gek., daß diese
e Lsg. von solcher Konz. und die Zuführungsgeschwindigkeit derart ist, daß
ahrungsstoffverbrauch nicht nur ausgeglichen, sondern überschritten wird u.
rung in der für die Hefefabrikation bekannten Art, jedoch so durchgeführt wird,
n Verlaufe der Gärung neben der Hefenvermehrung eine steigende Alkoholmenge
gärenden Lsg. gebildet wird. (Oe. P. 102 274 vom 20/9. 1919, ausg. 11/1.
OELKER.

oc. Ricard, Allenet & Cie., *Distilleries des Deux-Sèvres*, Deux-Sèvres,
reich, *Entwässern von Alkohol*. Man dest. den käuflichen A. in Ggw. einer Fl.
t dem A. u. W. ein konstant sd. Flüssigkeitsgemisch bildet, dessen Kp. niedriger
Kp. eines jeden ihrer Komponenten liegt. Außerdem bildet es bei der Kon-
tion der Dämpfe zwei Schichten. (E. P. 214 581 vom 22/1. 1924, Auszug veröff.
1924. Prior. 16/4. 1923.) KAUSCH.

istilleries des Deux-Sèvres, Deux-Sèvres, Frankreich, *Alkoholentwässerung*
Dest. in Ggw. einer mit dem W. u. A. eine azeotrop. Mischung bildenden Fl.
214 581; vorst. Ref.) (E. P. 243 368 vom 19/11. 1925, Auszug veröff. 20/1.
Prior. 20/11. 1924.) KAUSCH.

aston Léon Marzia, Frankreich, *Schwefeln von Weinen während des Abziehens*
n Fässern. Ein App. zur Erzeugung von SO_2 wird durch eine Leitung mit dem
des Fasses verbunden, indem diese Leitung durch den Faßspund hindurch-
t wird. Beim Abziehen des Weines wird dann die SO_2 in das Faß hineingesaugt.
600 868 vom 17/7. 1925, ausg. 17/2. 1926.) OELKER.

Charles Aigrot, Frankreich (Jura), *Behandlung von Wein und anderen genieß-*
Flüssigkeiten. Man führt unter Druck Ozon oder ozonhaltige Gase in die Fl.
odurch jeder unangenehme Geschmack beseitigt wird. (F. P. 602 446 vom
1925, ausg. 18/3. 1926.) OELKER.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

A. Widmer, *Über den gegenwärtigen Stand der Konservierung von Obstsäften*. *Natriumbenzoat*. Vf. bespricht das Für u. Wider der Konservierung mittels Na-Ben. Er hält die Verss. zur eindeutigen Entscheidung der Frage noch nicht für abgeschlossen, doch glaubt er eine Konservierung der scharf filtrierten Säfte durch Zugabe von bis 0,7 g Na-Benz. pro l u. 20—25 g K-Metasulfit oder der entsprechenden M. wss. 5%ig. H₂SO₃ pro hl u. bei säurearmen Säften außerdem von 2—2,5%₀₀ G. milchsäure befürworten zu können. Konservierung in Glasgefäßen ist sicherer als in Holzfässern, filtrierte Säfte sind hierbei haltbarer als unfiltrierte. Gleichzeitiger Milchsäurezusatz verhindert Stichigwerden. (Schweiz. Apoth.-Ztg. **64**. 123—27. C. 1925.) ROJAN

H. Kufferath, *Chemische, mikroskopische und bakteriologische Untersuchungen von Kindernährmitteln*. Mitteilung von Analysen- u. Untersuchungsergebnissen. Vf. unterscheidet: 1. Kindermehle aus einem einzelnen Rohmehle; 2. dgl. aus 2 Mehlen unter Zusätzen (Zucker, Fett, Kakao); 3. dgl. aus gepulvertem Zwieback; 4. dgl. aus Gemischen verschiedener Mehle mit Zusätzen von Zucker, Kakao usw.; 5. dgl. mit Milchpulver als Grundstoff ohne oder mit Zusätzen. (Chimie et Industrie **1925**. 331—48. Brüssel, Lab. Intercommunal.) GROSZFE

Paul Francis Sharp, *Weizen und Mehln Untersuchungen. V. Plastizität eines Mehls in Wasser-Suspensionen*. (III. vgl. Cereal Chemistry **2**. 12; C. 1925. II. 1.) Nach Besprechung hierüber bereits vorliegender Arbeiten erörtert Vf. an Hand von Abbildungen den von ihm ausgearbeiteten, gegenüber dem bisher gebrauchten verbesserten u. kostbaren App. von BINGHAM viel einfacheren u. genügend genauen App., der zu den vorliegend beschriebenen Unterss. verwendet werden kann. ist. Hierzu muß auf das Original verwiesen werden. Es zeigte sich, daß eine Mehlsuspension in Wasser plastisch war, wenn sie 9% u. mehr Mehl, bezogen auf Trockengewicht, enthielt. (Cereal Chemistry **3**. 40—56. Bozeman [Montana].) RÜHM

Alice M. Child und Daisy I. Purdy, *Verfahren für eine graphische Darstellung des Gefüges, des Volumens und der Oberfläche von Kuchen*. Es beruht auf dem Aufnehmen einer Schnittfläche des Kuchens mit einem geeigneten, näher angegebenen Faß. Das Gemisch u. Übertragen der Abbildung der Schnittfläche auf Papier. Das so erhaltene Bild kann jederzeit zum Vergleiche u. zur Beurteilung von Schnittflächen von Kuchen dienen. (Cereal Chemistry **3**. 57—60. St. Paul [Minn.].) RÜHM

C. G. Harrel, *Einige wechselnde Einwirkungen auf das Brotbacken*. Das Mischen von Brot im großen u. beim Backvers. ist nicht immer auf das verwendete Mehl zu beziehen, sondern oft auch auf das Auftreten wechselnder Umstände, die, wie z. B. die Absorption (Wasseraufnahme des Mehles beim Einteigen), das Einbringen des Mehles in den Backraum (panning) u. das Einfetten dieses (pan greasing), die Zeit während der u. die Eile mit der das Mischen des Teiges erfolgt u. die Temp. des fertigen Teiges beständig im Auge behalten werden müssen, sowohl bei Backverss. wie auch im industriellen Betriebe. Der wichtigste Umstand für das Brotbacken ist die Gärung des Teiges, zu deren wissenschaftlicher Erörterung, die Vf. vornimmt, die Teige zunächst in 3 Arten eingeteilt werden, nämlich 1. in die üblichen Teige (straight doughs), in denen sämtliches Mehl u. die Hefe, sowie zugesetzte Backmittel während der ganzen Gärungszeit zusammenwirken, u. 2. in Schwammteige (sponge doughs), bei denen zunächst ein Teil des Mehles mit sämtlicher Hefe zusammenwirkt während eines Teiles der gesamten Gärzeit u. erst dann der Rest des Mehles u. die übrigen Backmittel zugegeben werden. An solchen Backmitteln werden neben NaCl verwendet ein „kady“ genanntes Mittel, das ein Hefenährmittel ist u. aus NH₄Cl, CaSO₄, Na₂CO₃, KBrO₃ besteht u. beschleunigend auf die Gärung wirkt, u. ferner ein „Pani“ genanntes Mittel, das auf das Gluten befördernd einwirkt u. aus einem mit

yd u. zwei anorgan. Phosphaten besteht. Von großer Bedeutung für den Teig
h die Wrkg. der Säuren, denen gegenüber die Teigbestandteile teils hemmend
(Pufferwert des Teiges), teils befördernd, indem sie danach streben, den
wert zu überwinden. Messungen beiderlei Einww. auf die Säurewrkg. der Teige
n gegeben. (Cereal Chemistry 3. 1—18. Chicago [III.]) RÜHLE.

Tomander, *Die Fischabfallverwertung, Fischmehlfabrikation und Extraktion*
utschland. Die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der Fischmehle. Sie
hell u. von folgender Zus. sein: 58—68% Rohprotein, 12—14% W., 2—4%
t, 18—24% Asche, entsprechend 16—23% Ca-Phosphat, 1—2% NaCl. Das
aterial, seine Sterilisation, Trocknung sowie die Extraktion sind ausführlich
eben. Hervorgehoben werden insbesondere App. u. Verff. der Firma SCHLOTTER-
& Co., Wesermünde. (Seifensieder-Ztg. 53. 188—89. 208, 226—27. 242—43.
9.) HELLER.

F. Tocher, *Schwankungen in der Zusammensetzung von Milch*. Ergebnisse
ters. von 676 Proben Milch einzelner Kühe verschiedener Stämme in Schottland
d der Jahre 1921—1922. Auszug aus einem umfangreichen Berichte. Der
e Gehalt der untersuchten Milche betrug (%) an: Fett 3,953, fettfreie Trocken-
nz 8,864, Lactose 4,635, Asche 0,700, Gesamt-N 0,508, Casein-N 0,380, Albu-
0,116, Gefrierpunkt 0,548, Refraktion bei 20° 38,275, D.^{15,5} 1,03152. Von den
für die fettfreie Trockensubstanz lagen 24,7% unter 8,5%; die Schwankungen
n dem höchsten u. niedrigsten Werte davon waren etwa 5%. Diese Schwan-
lagen bei Lactose zwischen 2,7—5,5%, Asche 0,47—0,99, Gesamt-N 0,31—0,94,
N 0,26—0,64, Albumin-N 0,07—0,22, D. 1,0255—1,0361, Refraktion 35,9—40,6,
punkt 0,50—0,61°, Fett 1,66—7,50. (Analyst 51. 146—49.) RÜHLE.

Herzfeld, *Über die Unschädlichkeit von Melassefutter*. Eine Probe solchen
s, an dem ein Pferd u. ein Fohlen eingegangen sein sollte, erwies sich nach der
von **Mangold** als einwandfrei. Sporen des Weizensteinbrandes wurden nur
nger, ungefährlicher Menge gefunden. Wahrscheinlich hat der Futterwechsel
Verabreichung zu großer Mengen dieses Futters zu den Todesfällen geführt.
Zuckerind. 51. 249.) RÜHLE.

H. Fairchild und **J. W. Wilbur**, *Entöltes Sojabohnenmehl und gemahlene*
inen als Eiweißersatz für die Milchproduktion. Entöltes Sojabohnenmehl hat
reichen Futterwert wie Leinsamenmehl, bei ölhaltigen gemahlenden Bohnen liegt
ert 2—3% höher. (Journ. of daisy science 8. 238—45; Ber. ges. Physiol. 33.
. 1925; Lafayette, Indiana, Dep. of daisy husbandry. Ref. KAPPHAMMER.) OPP.

bert K. Epstein und **B. R. Harris**, *Nachweis kleinster Mengen Naphthalins in*
Die Geruchsp. führt man in Anlehnung an JAGO aus, indem man
ehl mit 30 ccm W. anfeuchtet u. dann die M. im verschlossenen Gefäße bei
ährend 2 Stdn. stehen läßt. Dann öffnet man u. riecht. Zum chem. Nach-
e gibt man zu 50 g Mehl in einem 500-ccm-Kolben 100 ccm 10%ig. H₂SO₄,
sofort mit Dampf zu destillieren u. schüttelt, um ein gleichmäßiges Gemisch
lten. Den Kolben erhitzt man dabei in einem sd. Wasserbade, bis das Destillat
n beträgt; man zieht es mit 5 ccm Chlf. aus u. trocknet die Lsg. in Chlf. mit
. CaCl₂. Dann gibt man wenig anhydr. AlCl₃ in ein Becherglas u. erhitzt bis
ublimieren. Nach dem Abkühlen gibt man den getrockneten Chlf.-Auszug
u. bringt ihn mit dem Sublimat des AlCl₃ in Berührung. Ist Naphthalin vor-
, so entsteht in kurzer Zeit eine Violettfärbung. Das Verf. läßt noch 1,0 bis
le Naphthalin in 100 000 Teilen Mehl, bei Verwendung von 50 g, erkennen.
Chemistry 3. 60—62. Chicago [III.]) RÜHLE.

Eckart und **A. Diem**, *Beiträge zur Untersuchung von Fruchtsäften*. (Ztschr.
rs. d. Lebensmittel 51. 48—56. — C. 1926. I. 2519.) GROSZFELD.

J. Kuhlmann und **J. Großfeld**, *Eine neue Kennzahl für MilCHFett*. Zur Schärfung der MilCHFettbest. in Fettgemischen (vgl. S. 1898) wurde eine neue Buttersäure sehr, von Caprylsäure prakt. nicht beeinflusste Kennzahl, die „*LSäurezahl*“, ausgearbeitet: 5 g Fett werden wie bei der RMZ. verseift, Seife in 10 W. gel. mit 50 ccm verd. H_2SO_4 zers., Fettsäuren durch Zusatz von 15 g N. ausgesalzen, Lsg., dann mit 10 ccm Cocosseifenlsg. (10%ig.) versetzt, filtriert. Filtrate 125 ccm + 50 ccm W. dest. u. Destillat (110 ccm) mit $\frac{1}{10}$ -n. Laugen Phenolphthalein titriert. Ergebnis $\times 1,4$ nach Abzug des Leervers. ergibt die B. säurezahl. Im Destillate befinden sich etwa 96% der vorhandenen Butter. Die Zahl beträgt für MilCHFett im Mittel 20, für Cocosfett nur 0,9 (wahrscheinlich durch Capronsäure bedingt), sie ist in Fettgemischen dem Gehalte an MilCHFett Cocosfett prakt. proportional. Aus neuer Buttersäurezahl u. VZ. ist der MilChgehalt bei kleinen Mengen bis $\pm 1\%$ genau feststellbar; Tafel zur Ablesung u. a. Hilfstabellen in der Quelle. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel **51**. 31—42. Reichhausen.)

GROSZKE

P. J. Wohl, Frankfurt a. M., *Konservieren von Därmen*. Die frischen Därme werden von innen u. außen mit W. gewaschen, gesalzen u. nach Ablaufenlassen des W. mit der fetten Seite nach außen in ein dichtes, mit einer Öffnung versehenes Gefäß gepackt, in welches geschmolzenes Fett in solcher Menge eingeführt wird, daß die Zwischenräume zwischen den Därmen von dem Fett ausgefüllt werden. Danach wird die Öffnung des Fasses dicht verschlossen. (E. P. **241 561** vom 14/10. 1925, A. P. 1639 veröff. 16/12. 1925. Prior. 14/10. 1924.)

OELKE

F. H. Loring, London, *Konservieren von Mehl oder anderen Nahrungsmitteln*. Um das Ranzigwerden der Nahrungsmittel oder die Entwicklung von Pilzen zu verhindern, behandelt man sie mit sterilisierend wirkenden Gasen oder Dämpfen wie Stickoxyd, Cl, Sulfurylchlorid, Ozon o. dgl., welche man abwechselnd u. in bestimmten mäßigen Zwischenräumen an verschiedenen Stellen der Lagerräume für die Nahrungsmittel einführt. (E. P. **235 930** vom 15/3. 1924, ausg. 23/7. 1924.)

OELKE

Établissements „Nektahr“, Frankreich (Basses-Pyrénées), *Konzentrierter, unveränderlicher Kaffeeextrakt*. 50—70% eines konz. Kaffeeauszuges werden mit 20% karamelisiertem Zucker u. 5—20% Süßholzextrakt vermischt. (F. P. **602 793** vom 31/8. 1925, ausg. 26/3. 1926.)

OELKE

Soc. Française des Produits Alimentaires Azotés, Paris, *Fischpräparate*. Fische werden 1—5 Tage bei 37—55° unter Zusatz von 5—10% NaCl einer künstlichen Verdauung unterworfen. Das Fischöl sammelt sich dann auf der Oberfläche der Fl. an u. kann von dort entnommen werden. (E. P. **246 148** vom 13/1. 1926, Auszug veröff. 17/3. 1926. Prior. 14/1. 1925. Zus. zu E. P. **231 864**; C. 1925 **1639**.)

KAUSCH

T. F. Aston und **W. H. Stevens**, Bath, Engl., *Konservieren von Eiern*. Die Eier werden mit einer Paste überzogen, welche aus einer Mischung von 10 Teilen Borax in Pulverform, 87,3 Teilen Paraffin u. 2,7 Teilen Bienenwachs besteht. (E. P. **242 148** vom 22/11. 1924, ausg. 10/12. 1925.)

OELKE

Kraft Cheese Company, Chicago, Ill., übert. von: **Clarence M. Gere**, Brodway, Wisconsin, V. St. A., *Herstellung von Magerkäse*. Man läßt Magermilch gerinnen, trennt den Quark von der Molke, arbeitet den Quark gut durch, sättigt ihn so mit der auf 70° abgekühlten Molke, scheidet den überschüssigen Teil derselben wieder ab, erwärmt die Käsemasse u. verarbeitet sie in üblicher Weise auf Käse. (A. P. **1 578 820** vom 18/5. 1925, ausg. 30/3. 1926.)

OELKE

Edward William Coon, Philadelphia, Pa., V. St. A., *Verfahren zum Reifen von Käse*. Man unterwirft den Käse bei einer Temp. von 55° F. der Einw. von feuchter Luft. (A. P. **1 579 196** vom 27/2. 1926, ausg. 30/3. 1926.)

OELKE

Harry Holger Hertz, Dänemark, *Herstellung von Futtermitteln in Form von Briketten, Pillen u. dgl.* Abfälle von Brauereien, Brennereien, Konservenfabriken usw. werden im feuchten Zustande einer Pressung unterworfen, bis ihr Wassergehalt etwa 50% beträgt. Hierauf vermischt man sie mit anderen Nähr- u. Füllstoffen, z. B. mit geeigneten Nährsalzen u. bringt sie durch Komprimieren in die gewünschte Form. (F. P. 600 900 vom 18/7. 1925, ausg. 17/2. 1926.) OELKER.

Theodor Schweizer, Zürich (Schweiz), *Verhütung von nachträglichen Zersetzungen der Futtermasse, die in einem Silo aufgespeichert ist.* Der in der Futtermasse frei enthaltene Pflanzensaft wird verhindert, durch die Futtermasse zu fließen u. zwar dadurch, daß man in der Höhenausdehnung des Silos eine Anzahl von Ableitungsröhren für den Pflanzensaft derart vorsieht, daß gleichzeitig ein Eintreten von Luft nach außen durch diese Arbeitsstellen vermieden wird. (Schwz. P. 112 553 vom 19/1. 1926, ausg. 16/2. 1926.) OELKER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

F. Mariani, *Die Rentabilität in modernen Anlagen zur Raffination von pflanzlichen Ölen.* Beschreibung moderner Anlagen. Erparnisse lassen sich machen bei Arbeiten mit hohem Druck, bei Verwendung von Turbinen zur Dampfbehandlung. Der Wasserdampf muß durch Oberflächenkondensatoren u. Kühltürme wieder gewonnen werden, die Neutralisationsmittel durch Aussalzen der entstandenen Seifen u. Ausfällungen. (Giorn. di. Chim. ind. ed appl. 8. 8—11.) GRIMME.

Hecking, *Neueres auf dem Gebiete der Fettchemie.* Kurze Zusammenstellung der neuesten Ergebnisse zur Ölhärtung u. Oxydation von Mineralölen. Letztere ist noch ohne techn. u. wirtschaftliche Bedeutung. (Österr. Chem.-Ztg. 29. 54—56.) GROSZFELD.

L. Lifschütz, *Verfahren zur Bleichung des Wollfettes.* In Trockenseife überführtes Wollfett (D. R. P. 324667; C. 1920. IV.512) läßt sich durch Einw. von Luft u. Licht bleichen. Das Prod. eignet sich zur Herst. von Toiletteseifen. (Chem.-Ztg. 50. 1925. 46. Hamburg.) JUNG.

Clarence W. Benedict, *Beruhet die Bleichwirkung von Fullererde auf Oxydation?* Von WESSON geäußerte Ansicht, daß der Adsorption eine Oxydation der Farbstoffe voraussetzt, sucht Vf. durch Verss. zu bekräftigen. In CO₂-haltigem W. wurden Erdenproben mit 1/20-n. Lsgg. von Mohrschem Salz geschüttelt u. durch Titration mit KMnO₄ der O-Verbrauch gemessen. Er steigt mit der Temp. in ziemlich derselben Weise wie die Bleichwrkg. Mit H behandelte Erden oxydierten nicht mehr u. zeigten keine Bleichwrkg. Vf. betrachtet die Oxydationskraft als ein Maß der Bleichkraft, was an Hand einer Tabelle verschiedener Erden erläutert wird. (Journ. Oil Fat Ind. 2. 62—64. 1925.) HELLER.

George S. Jamieson und **Walter F. Baughman**, *Die chemische Zusammensetzung von kalifornischem Olivenöl.* Die Kennzahlen des Öles stimmen mit denen n. italien. Olivenöles überein. Trennung der Säuren nach der Pb-Salz-Äthermethode. Die Saponifikation der gesätt. Säuren geschah durch fraktionierte Dest. der Methyl ester unter hohem Druck. Es ergibt sich danach folgende Zus.: Glyceride der Ölsäure 84,4%, der Linolensäure 4,6%, der Myristinsäure Spuren, der Palmitinsäure 6,9%, der Stearinsäure 2,3%, der Arachinsäure 0,1%, ferner 1,0% Unverseifbares. (Journ. Oil Fat Ind. 2. 40—44. 1925.) HELLER.

Walter F. Baughman und **George S. Jamieson**, *Die chemische Zusammensetzung von kalifornischem Bitonto-Olivenöles.* Ein Vergleich mit den Zahlen von kaliforn. Öl (vgl. Journ. Oil Fat Ind. 2. 110—11. 1925. Bureau of Chemistry.) Ref.) zeigt nur geringe Unterschiede. Das italien. Öl enthält 2% mehr gesätt. Fettsäuren, seine Zus. ist: Glyceride der Ölsäure 83,1%, der Linolensäure 3,9%, der Myristinsäure Spuren, der Palmitinsäure 9,2%, der Stearinsäure 2,0%, der Arachinsäure 0,1%, ferner 1,1% Unverseifbares. (Journ. Oil Fat Ind. 2. 110—11. 1925. Bureau of Chemistry.) HELLER.

Ad. Grün, *Über chinesisches Holzöl. Bemerkungen zum Aufsatz von W. Nagel J. Grüß*. Polemik gegen NAGEL u. GRÜSS (vgl. S. 2158). Die Voraussetzung d. Autoren, die Eläostearinsäure sei zweifach-ungesätt., ist durch BÖESEKEN u. RAVIWAAY (Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**. 241; C. **1925**. II. 107) u. durch eigene Bef. des Vf. widerlegt. Die Eläostearinsäure ist $C_{18}H_{30}O_2$. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. Schreckenstein.) HELLE

C. K. Mc Williams, *Farbenänderungen in Olivenöl*. Die Farbe des Olivenöles h. zunächst ab vom Reifegrad der Früchte u. der Art der Ölgewinnung. Vf. zeigt d. zahlreiche Verss., daß außerdem die Verpackungsart von großem Einfluß sein k. Alle nicht völlig neutralen Öle, selbst solche mit 0,1% freier Säure, verändern gelbe Farbe in Grün, wenn sie mit metall. Sn in Berührung sind. Die Tiefe der gri. Verfärbung wächst mit dem Gehalt an freier Säure u. ist durch einen Redukti. prozeß bedingt, denn im Licht kehrt die gelbe Farbe wieder. Daher tritt in (flaschen keine Farbenänderung ein, während in Weißblechbüchsen immer Grünfärl. auftritt, wenn nicht sehr hellgelbes oder neutrales Öl gefüllt wurde. (Journ. Oil Ind. **2**. 112—19. 1925. San Francisco [Calif.], CURTIS & TOMPKINS.) HELLE

C. A. Lathrop, *Die Macadamianuß und ihr Öl*. Die in Queensland beheimat. „Busch-“ oder „Possum“-Nuß von *Macadamia ternifolia* F. v. M. wird neuerd. auch auf Hawaii angebaut. Auf 70,9% der sehr harten Schale entfallen 29,1% Flk. von der Zus.: Rohprotein 8,6%, Rohfett 76,5%, Rohfaser 1,7%, Asche 1,9%, K. hydrate 8,2%, Feuchtigkeit 3,1%. Das Preßöl ist fast farblos, fast neutral, K. punkt 0, $D_{15,5}$ 0,9141, n_D = 1,4698, VZ. 193,7, Jodzahl 74,2, E. —12,2°, 0,32% verseifbares. (Journ. Oil Fat Ind. **2**. 44—46. 1925. San Francisco, Calif., CURTIS & TOMPKINS.) HELLE

L. Margailan, *Chemische Untersuchung einiger tropischer Ölfrüchte, insbesondere aus französischen Kolonien*. Unter Mitarbeit von Gontard, Martin, A. Moites, Blaquier, Corrieras, Meyer, G. Moitessier und Neyret. Es sind mitgeteilt die der Früchte u. die gesamten Kennzahlen ihrer Öle bezw. Fette von: Indochinesis Copra, Babassu, Baillonella toxisperma, Tamanu (*Calophyllum Inophyllum*), St. (Sclerocarya Caffra), Lorbeer, Katoka (*Treculia Perrieri* Jum.), Voandzu (*Voandza subterranea*). Einzelheiten im Original. Hervorzuheben ist der Unterschied der verschiedenen Copravarietäten Indochinas, der nicht in der Trocknung, sondern in Frucht selbst begründet ist. (Ann. du Musée Colonial Marseille [4] **3**. Nr. 2. 5—1925. Marseille.) HELLE

A. Eibner, *Zum Öltrocknen*. Kritik der Arbeit von L. AUER (S. 2854). Wer techn. in die Prüfung u. Anwendung von Mal- u. Anstrichmitteln eingearbeitet ist nicht mehr unbedingter Anhänger der alten Auto-Oxydationshypothese, wenn auch noch nicht zu ihrem Leugner geworden ist. (Farben-Ztg. **31**. 1398—99.)

Pietro Saccardi, *Über eine sehr scharfe Reaktion auf Sulfuröle*. 5 g Bleis. werden in 100 ccm reinstem Bzl. gel. Andererseits löst man 30 g KOH in 100 g A. (S. Zu 1 ccm Öl gibt man je 1 ccm alkoh. KOH u. Pb-Lsg. u. erhitzt zum Sieden. Anwesenheit von Sulfuröl tritt zunächst Schwärzung, darauf Nd. von PbS ein. I. pfindlichkeitsgrenze 1%. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. **8**. 11. Camerino.) GRIMMI

Archibald Rayner, *Die Ranzidität von Seifen und Ölen und die spontane Erhitz. von Seifen*. Übersicht über neuere diesbezügliche Arbeiten, vorwiegend der deutsc. Literatur. Neutralität der Seife begünstigt die Ranzidität, tier. Fette werden wen. leicht ranzig als vegetabil., von denen nur die hochgepreßten Stearine beständig s. was Vf. auf das Vorhandensein der Isoölsäure zurückführt. Die Selbsterhitzung wahrscheinlich eine gesteigerte Ranzidität, die möglicherweise von Metallspr. (Fe) katalyt. beeinflußt wird. (Perfumery Essent. Oil Record **17**. 120—23.) HELLE

Julius Schaal, *Zur Seifenherstellung, insbesondere zur Seifentrocknung*. Die Deutschland häufige Ranzidität u. Fleckenbildung, die in Amerika bei schon

ist mit großen Suden fast unbekannt ist, führt Vf. auf die Trocknung zurück, langsam und bei mäßigen Tempp. geschehen soll. Aus weiteren polem. Erörterungen erwähnenswert, daß die von BEIERSDORF & Co., A.-G., hergestellte *Niveaseife* dermatolog. Gründen mit 10% Ricinusöl, aber mit höchstens 3% Cocosöl hergestellt wird. (Seifensieder-Ztg. 53. 239—40.)

HELLER.

Ernst Schiffan, *Die Parfümierung der Toiletteseifen*. Die die Qualität des Duftes begünstigenden Umstände, seine Haltbarkeit, für billige Seifen vorwiegend in Betracht kommende Duftstoffe u. die chem. Veränderungen im fertigen Stück werden beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 53. 240—42. 256—57. Charlottenburg.)

HELLER.

O. Hausmann, *Zur Destillation der Fettsäuren*. Bei Kühlung mit W. erhält man so helle u. stärker duftende Destillate als bei Luftkühlung. Luftkühlung mit mehreren Ausläufen erlaubt fraktioniertes Auffangen des Destillates, so daß die zuletzt entstehenden farbigen u. duftenden Anteile getrennt gehalten werden können. Beschreibt u. bildet ab einen liegenden Luftkühler, der demgemäß arbeiten soll. (m.-Ztg. 50. 41—42. Disentis.)

HELLER.

C. Stiepel, *Neuerung auf dem Gebiet der Krystalsodafabrikation*. Kurze Beschreibung eines von der Firma FRIEDR. HECKMANN, Berlin SO 16, gebauten App. zur kontinuierlichen Krystallisation von Na_2CO_3 . (Seifensieder-Ztg. 53. 224—25.)

HELLER.

Fr. Ortner, *Selbsttätige Waschmittel und die Herstellung haltbarer Seifenpulver aus Sauerstoff entwickelnden Zusätzen*. Wichtig ist ein Schutz der O abgebenden Stoffe, von Perborat, gegen die organ. Seifenanteile beim Lagern. Die Firma KIRCHNER & NEIRATH, Berlin, vertreibt deshalb ein durch dünne Wasserglasumhüllung isoliertes Perborat. Das D. R. P. 415124 (C. 1925. II. 1400) bedient sich ebenfalls Wasserglases zum Schutz von Seife. Vf. glaubt, daß seine Methodik auch der t. von Persil zugrunde liegt u. skizziert den wahrscheinlichen Fabrikationsgang des Waschmittels. (Seifensieder-Ztg. 52. 635—36.)

HELLER.

H. P. Kaufmann, *Weitere Versuche zur Bromometrie der Fette*. Lsgg. von Br_2 in CH_2 nahmen in 56 Tagen um 1%, in Eg. um 1,6%, in CS_2 um 22,1%, in Chlf. um 1% im Titer ab; bei CH_3OH u. A. verlangsamte sich die anfangs schnelle Titernahme allmählich, Ursache B. von HBr ; dagegen war Br_2 in mit NaBr gesättigtem CH_2 weitgehend titerbeständig, hellgelb von Farbe u. fast geruchlos. Die Lsg. enthält eine für die Bromometrie hervorragend geeignete Titerfl., die folgendes Gleichgewicht enthält: $\text{Br}_2 + \text{Br}' \rightleftharpoons \text{Br}_3'$. Bei Bromierungen mit dieser Lsg. ist auch Einfluß des Lichtes gegenüber anderen Lsgg. gering. Herst. der Lsg.: CH_3OH mit NaBr sättigen, Br_2 bis 0,1-n. zusetzen, Einstellung jodometr. oder mit As_2O_3 . der bromometr. Jodzahl: 0,1—1 g Fett in 15 ccm Chlf. lösen, 40 ccm Br -Lsg. zusetzen, nach 20 Min. bis 2 Stdn. (je nach zu erwartender Jodzahl) jodometr. oder As_2O_3 zurückmessen. Bei Zimtsäure, Antipyrin, β -Naphthol, Salicylsäure theoret. Werte, bei Fetten ähnliche Zahlen wie nach HANUS. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51: 3—14. Jena, Univ.)

GROSZFELD.

C. Baumann, J. Kuhlmann und J. Großfeld, *Die Cocosfett- und MilCHFettbestimmung nach Bertram, Bos und Verhagen*. Nachprüfung der Methode an Gelen von Cocosfett mit MilCHFett bestätigten die Angaben von BERTRAM, BOS und VERHAGEN (Chem. Weekblad 20. 610; C. 1924. II. 563). Das Verf. ist besonders für MilChzuckerwaren u. MilChgebäck geeignet. Kakaofett hat eine sehr niedrige Vernetzung (vgl. KUHLMANN u. GROSZFELD, S. 1900 u. 1898). Hinweis auf mögliche Verunreinigungen (vgl. BERTRAM, VAN DER STEUR u. VERHAGEN, S. 1325). Nachteile des Verf. sind Benötigung von wenigstens 20 g Fett, Zeitdauer der Ausführung. (hr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 27—31. Recklinghausen.)

GROSZFELD.

Glenn H. Pickard, *Bestimmung der Jodzahl und der Satzbildung von Leinöl*. Beschreibt über Arbeiten der AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS. Die Methode von WIJS ist allgemeiner anwendbar u. wird empfohlen. Die damit

gefundenen Jodzahlen liegen durchweg ca. 4,5% höher als die ebenfalls wohlver-
baren Zahlen nach HANUS. — Eine exakte u. befriedigende Methode zur Best-
satzbildenden Bestandteile von Leinöl ist bislang nicht gefunden worden. (J.
Oil Fat. Ind. 2. 57—62. 1925.) HELLE

W. H. Simmons, *Die Bewertung von Seifen im Handel*. Die rein chem. K-
zeichnung der Zus. von Seifen kann nicht allein als Wertmaßstab dienen. Wi-
ist die Best. der Reinigungswrkg. mittels Oberflächenspannung der Seifenlsg.
HILLYER (Journ. Americ. Chem. Soc. 25. 1256) oder mittels der Kohlezahl
MC BAIN (Journ. Soc. Chem. Ind. 1923. 373; C. 1923. III. 1127), deren Er-
lung kurz beschrieben ist. (Perfumery Essent. Oil Record 17. 118 bis 119.) HELLE

Akt.-Ges. für Chemiewerte, Mainz, *Reinigen von Ölen*. Zur Reinigung
Öle werden poröse Substanzen, wie Kieselgur, kolloidale SiO₂ usw., verwendet, w-
mit kleinen Mengen H₂SO₄ imprägniert sind. (E. P. 239 169 vom 6/4. 1925, Au-
veröff. 21/10. 1925, Prior. 27/8. 1924.) OELKE

Georges Felizat, Frankreich (Bouches-du-Rhône). *Gewinnung des Öles aus Öl-*
ölpreßrückständen. Man trennt den Rückstand von den Holzigen Bestandteilen
Kerne, trocknet das Fruchtfleisch u. führt es durch eine kontinuierlich arbeit-
Presse. Man erhält auf diese Weise fast die Gesamtmenge des in dem Rücks-
noch enthaltenen Öles. (F. P. 602 650 vom 3/12. 1924, ausg. 23/3. 1926.) OELKE

K. K. Stamsó, Stockholm, *Veredelung von Ölen u. Fetten*. Um die antira-
u. Wachstumswrkg. von Ölen u. Fetten für Nahrungsmittel zu steigern, werden
Öle u. Fette in fl. Zustände in dünnen Schichten mit ultravioletten Strahlen
anderen Strahlen kurzer Wellenlänge höchstens eine Stde. lang ausgesetzt. (I.
246 473 vom 20/1. 1926, Auszug veröff. 24/3. 1926. Prior. 26/1. 1925.) KAUF

Mary Fulford Foster, Washington, Col., übert. von: **Hermann Bollma-**
Hamburg, *Verbesserung der Haltbarkeit von Speiseölen u. dgl.* Man setzt den in übli-
Weise raffinierten Ölen eine kleine Menge Lecithin (0,05—1%) zu. (A. P. 1575
vom 28/5. 1925, ausg. 2/3. 1926.) OELKE

Fr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, *Gewinnung von Tran-*
anderen Fischölen. Das Wallfischfleisch o. dgl. wird zwischen mit Zähnen besetzten P-
walzen hindurchgeführt. (E. P. 235 550 vom 28/5. 1925, Auszug veröff. 6/8. 1926.
Prior. 10/6. 1924.) OELKE

Chemical Engineering (Manchester), Ltd., J. W. Spensley und J. W. Batt-
by, Manchester, *Gewinnung von Tran oder anderen animalischen Ölen aus Walfi-*
speck u. dgl. Das in Stücke geschnittene Rohmaterial wird in einer Stiftschei-
mühle, welche in der Min. etwa 3000 Umdrehungen macht, u. an ihrem ganzen Umf-
mit einem Austrittsschlitz versehen ist, behandelt. Das dadurch größtenteils
Öl befreite Material wird dann noch einer Pressung unterworfen. (E. P. 241
vom 16/7. 1924, ausg. 12/11. 1925.) OELKE

Carl Albert Henry, Charles Gaisford Curtis, Edgar Nicholas van Ber-
Phillip Tuggles Clay, Andrew G. McCarthy, Ezra T. Stimson und Eug-
Alphonse Sprague, San Francisco, Calif., *Seifenpräparat*. Seifenspäne u. Na₂-
werden in sd. W. gelöst, worauf man die Lsg. mit einer Wasserglaslsg. vermischt u.
Mischung durch Kochen bis zur gelatinösen Konsistenz konz. (Aust. P. 18 688 v-
15/7. 1924, ausg. 6/8. 1925.) OELKE

W. C. H. Pataky, Haag, und **F. J. Nellensteijn**, Delft, Holland, *Fettsäu-*
Bei der Herst. von Fettsäuren durch Oxydation von KW-stoffen mittels oxydier-
wirkender Gase, werden die Fettsäuren während des Prozesses abdestilliert. Zu die-
Zweck wird das oxydierende Gas mit einem h. Verdünnungsmittel, z. B. überhitzte
Dampf, gemischt, oder es wird hochoverhitzte Luft verwendet, deren N als Verdünnu-

el wirkt. Die Rk. wird vorzugsweise bei Tempp. zwischen 200 u. 250° durchgeführt. **P. 239 178** vom 21/7. 1925, Auszug veröff. 21/10. 1925. Prior. 27/8. 1924.) OEL.

Frank Harol Clause, London, *Reinigungsmittel*, bestehend aus einem wasser-
n Al-Silicat u. einer (neutralen) *Seife* in konz. Lsg. Das Prod. dient zum Reinigen
olieren von Metallen (insbesondere Ag). (**Aust. P. 18 789** vom 24/7. 1924, ausg.
1925.) KAUSCH.

H. C. Wilson, Kendal, Westmoreland, *Reinigungsmittel*, welche dadurch erhalten
len, daß man eine Lsg. eines Alkalis mit einer Lsg. eines Harzes oder einer Fett-
e in einem Chlorkohlenwasserstoff, z. B. *Trichloräthylen*, vermischt. (**E. P. 235 265**
3/3. 1924, ausg. 9/7. 1925.) OELKER.

Hertha Harries, Berlin-Grünwald (Erfinder: **C. Harries**, Berlin-Grünwald),
nigung von Seifenlösungen, 1. dad. gek., daß man die zu reinigende Lsg. zwischen
Elektroden der Einw. des elektr. Stromes unterwirft. 2. dad. gek., daß die zu
ndelnde Fl. zur Erleichterung der Ölabscheidung erwärmt wird. Man erhält hier-
h aus schlecht schäumender Seifenlsg. solche mit ausgezeichnetem Schaumver-
en. (**D. R. P. 424 409** Kl. 23 e vom 23/8. 1922, ausg. 30/3. 1926.) OELKER.

Louis G. Bourgoin, Montreal, Quebec, Canada, *Herstellung von Kondensations-
ukten aus Acetylen und Fetten*. Man behandelt tier. oder pflanzliche Fette, bezw.
säuren u. Glycerin mit Ca-Carbid in Ggw. von W. oder Dampf, bei erhöhter Temp.
r gewöhnlichem oder erhöhtem Druck. — Z. B. werden die Fette oder Fettsäuren u.
erin mit Ca-Carbid u. Wasserdampf 2 Stdn. im Autoklaven auf 180—250° erhitzt.
bei lagert sich das naszierende C_2H_2 unter Abscheidung von $Ca(OH)_2$ an das bzgl.
an. Man kühlt auf ca. 80° ab u. entfernt das viscose *Reaktionsprod.* aus dem Auto-
en. Beim Erkalten erstarrt es zu einer *plast.*, in der Wärme knetbaren u. form-
n, in W., Aceton, A., NH_3 unl., in CCl_4 , CS_2 u. Ä., l. M. Die Prodd. finden als
r. *Isoliermittel* oder als *Kautschukersatz* techn. Verwendung. (**A. P. 1 567 785**
23/10. 1924, ausg. 29/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

K. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

C. Still, *Bestimmung des Wärmeverbrauches bei der Verkokung*. (Glückauf 62.
—58. Recklinghausen.) BEHRLE.

Louis Burgess, *Das Chlor in der Petroleumindustrie*. Die in den Rohgasolin- u.
sindestillaten enthaltenen übelriechenden Mercaptane werden durch NaOCl oder
 Cl_2 unschädlich gemacht, wobei sich Alkyldisulfide, W. u. NaCl bezw. $CaCl_2$ bilden.
 Cl_3 bildet mit den im Petroleum enthaltenen KW-stoffen der Paraffin- u. Naphthen-
braune bis schwarze Additionsverb. Durch Hydrolyse wird daraus nicht das
üngliche, sondern ein dunkles viscose Öl gewonnen. — Beim Erhitzen zerfallen
dditionsverb. in einfachere KW-stoffe u. ein Teil des $AlCl_3$ wird wiedergewonnen.
Ggw. von überschüssigem Öl findet ein Kreisprozeß statt, bei dem ein großer Teil
öls in KW-stoffe von niedrigerem Kp. umgewandelt wird; er wird zur Gewinnung
asolin benutzt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 4 Seiten. Elizabeth, N. J., Standard
o. Sep.) R. SCHMIDT.

E. Belani, *Billigere Kälte für die Paraffinfabrikation*. Rechner. Betrachtungen,
die Überlegenheit einer Abdampfkältemaschine zeigen, die von einer Auspuff-
hine betrieben wird. Beschrieben u. empfohlen werden die „Abdamos“-Anlagen
J. SENSSENBRENNER. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 46. 161—63. Villach.) HELL.

A. E. Dunstan und **R. W. L. Clarke**, *Schmieröle. Ihre Eigenschaften und An-
wendungen*. Vortrag über die Gewinnung u. Nomenklatur der mineral. Schmieröle,
u. Bedeutung der Viscosität, hydroaromat. Bestandteile u. ihre Wrkg., sowie
die Haupttheorien des Schmiervorgangs. (Chem. Trade Journ. 78. 375
77.) HELLER.

Bernard Jousset, *Kontrolle der Verbrennung in den Explosionsmotoren und Analyse der Auspuffgase u. die Verbrennungsdiagramme.* (Chaleur et Ind. 7. bis 126.)

BÖRNSTEIN

—, *Vorschriften, vorgeschlagen in Verfolg der Tetraäthylbleiuntersuchung.* Es werden die Vorschriften zur Regelung der Art u. Weise des Zusatzes von Tetraäthylbleibrennstoffen wiedergegeben, die einheitlich in den Vereinigten Staaten zur Anwendung sollen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 432—33.)

BEHRLE

J. Dautrebande, *Flüssige Brennstoffe: Masut und Palmöl.* Bespricht die bekannten Untersuchungsmethoden der beiden Öle. (Chaleur et Ind. 7. 187—90.)

A. de Zawaritzky, *Graphische Methode zur Heizwertbestimmung der Kohle.* Acht Kurventafeln, die unter Zugrundelegung der Heizwertformel von GOUTAL konstruiert sind, soll aus den Zahlen für den Geh. der Kohlen an Asche u. flüchtige Bestandteilen der Heizwert abgeleitet werden. (Chaleur et Ind. 7. 191—99.)

Hans Broche, *Schmelzpunkte von Kohlenaschen.* Berichtet über neuere Untersuchungen auf diesem Gebiete, insbesondere über die Arbeit von SINNAT, OWLES u. SIMPSON. (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T 266; C. 1924. II. 776). (Arch. f. Wärmewirtsch. 99—102.)

BÖRNSTEIN

Gustav Egloff und **Jacque C. Morrell**, *Bestimmung von ungesättigten, aromatischen, hydroaromatischen und Paraffinkohlenwasserstoffen in Motorbrennstoffen und in automotiven Äquivalente.* Vff. beschreiben ein Verf. zur Best. obiger 4 Arten von Kohlenstoffen in Ggw. voneinander, insbesondere in Motorbrennstoffen, u. zur Ermittlung ihrer detonationsverhindernden Eigenschaften. Ungesätt. KW-stoffe werden bestimmt mittels H₂SO₄-Absorption u. Polymerisation; arom. KW-stoffe durch Nitrierung Naphthene mittels des Anilinindex u. die Paraffine aus der Differenz. Die arom. KW-stoffwerte von Mischungen u. die höchstmögliche Kompression wurden nach RICARDOS Angaben für Toluol (Inst. of Petroleum Techn., Report of Empire Motor Fuels Committee, SS. 84, 85, 145) ermittelt. An Motorverss. wurde die Antiklopfwirkung einiger Gasoline in Bestätigung der chem. Analyse festgestellt. (Ind. and Engin. Chem. 18. 354—56. Chicago [Ill.], Universal Oil Prod. Co.)

BEHRLE

Fritz Seidenschneur, Freiberg i. Sa. und **Hermann Pape**, Oker a. Harz, *Agglomerieren von Kohle*, dad. gek., daß man h. neutrale Gase auf kurze Zeit in solcher Menge durch die Kohle hindurchdrückt oder hindurchsaugt, daß die in der Kohle enthaltenen flüchtigen Bestandteile, insbesondere die Teerbildner, sich rasch zersetzen u. bei der Zers. festen Kohlenstoff in genügender Menge ausscheiden, um eine wirksame Zusammenbindung der einzelnen Kohlenteile hervorzurufen. (D. R. P. 427 272 Kl. 10 b vom 5/7. 1924, ausg. 29/3. 1926.)

OELKER.

Friedrich Wilhelm Brandes, Sölvesborg, Schweden, *Herstellung eines für Staubeuerung geeigneten Brennstoffs.* (D. R. P. 427 272 Kl. 10 b vom 10/5. 1923, ausg. 30/3. 1926. — C. 1926. I. 2272.)

OELKER.

Leland L. Summers, New York, *Künstlicher Brennstoff*, welcher dadurch erhalten wird, daß man ein kohlenstoffhaltiges Material, z. B. Staubkohle, mit einer Lösungsm., z. B. Phenol, behandelt, um die l. Elemente zu extrahieren, die erhaltene Lsg. mit Pech vermischt, den Extraktionsrückstand der Dest. unterwirft u. die zurückbleibende komprimierte M. mit jener Mischung überzieht. Es wird ein Brennstoff von anthracitähnlicher Beschaffenheit erhalten. (A. P. 1 576 253 vom 29/9. 1919, ausg. 9/3. 1926.)

OELKER.

L'Air Liquide, Soc. an. pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude, Paris, *Gewinnung von Wasserstoff und Methan gegen Ende der Steinkohledestillation.* Man spült gegen Schluß der Dest. die Retorten oder Öfen durch einen Strom von am besten überhitztem N₂ oder Luft aus. (F. P. 602 419 vom 28/11. 1919, ausg. 18/3. 1926.)

KAUSCH.

Aktiengesellschaft für Brennstoffvergasung, Berlin (Erfinder: **Otto Hubn**, Frankfurt a. M.), *Schwelverfahren für backende Steinkohle*, dad. gek., daß die Beschickung des Schwelers auf etwa 300° vorgewärmt u. sodann, bevor sie in Schwelzone gelangt, zwecks Beseitigung der Backfähigkeit der Steinkohle in einer genügend lang bemessenen Zwischenzone ausreichend lange auf jener Temp. ten wird, wozu der h. Wrasen aus der Vorwärme herangezogen wird. (**D. R. P.** 390 Kl. 10 a vom 1/11. 1921, ausg. 16/1. 1926.) OELKER.

J. R. Illingworth, Glamorgan, und **Illingworth Carbonization Co. Ltd.**, Manchester, *Verkohelter Brennstoff*. Man benutzt zu dessen Herst. einen Retortensatz Retorten aus Backstein, die durch Eisenplatten in einzelne Retorten geteilt sind, die abgemessenen Mengen Kohle aufnehmen. (**E. P.** 223 624 vom 23/5. 1923, 20/11. 1924.) KAUSCH.

International Combustion Engineering Corporation, New York, übert. von: **Lunge**, East Orange, N. J., V. St. A., *Verschwelen von Kohle*. Man unterwirft risierte Kohle an der Luft einer Vorwärmung bei etwa 650° F. u. läßt sie dann in verteilter Form durch einen aufsteigenden Gasstrom hindurchfallen, welcher Temp. von 850 u. 1175° F. besitzt. (**E. PP.** 242 621 u. 242 622 vom 26/10. 1925, 18. veröff. 6/1. 1926. Prior. 6/11. 1924.) OELKER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Kühlen von Koks und winnung*. Man läßt CO₂ oder ein an solchem reiches Gas durch den glühenden strömen. (**E. P.** 245 702 vom 15/10. 1925, ausg. 4/2. 1926.) KAUSCH.

Kohlenscheidungs-Ges., Berlin, *Behandlung von Halbkoks*. (Kurzes Ref. nach 583 694; C. 1925. II. 119.) Der von Asche u. Verunreinigungen befreite, pulverge Halbkoks wird briкетiert oder zu Bogenlampenkohlen, Elektroden usw. beitet. (**E. P.** 241 262 vom 11/7. 1924, ausg. 12/11. 1925.) OELKER.

Filion James Trumble, Amerika, *Herstellung von Koks*. Man beschickt eine te mit einem kohlenstoffhaltigen Material, z. B. Lignit, u. führt h. Dämpfe in tetorte ein, deren Temp. ausreicht, um die Beschickung von ihren flüchtigen ndteilen zu befreien; danach leitet man einen fl. KW-stoff in die M. u. bringt auf eine Temp., bei welcher eine Spaltung des fl. KW-stoffs erfolgt. (**F. P.** 21 vom 8/7. 1925, ausg. 6/2. 1925.) OELKER.

Evence Coppée & Cie., Belgien, *Entfernen von Kohle aus den Gasverteilungsrohren koksöfen*. Durch einen Ventilator wird Luft unter Druck in ein Rohrsystem einrt, das mit den Verteilungsrohren durch eine Reihe von Hähnen in Verb. steht. (**E. P.** 601 946 vom 10/8. 1925, ausg. 10/3. 1926. Belg. Prior. 12/9. 1924.) KAUSCH.

Max Klötzer, Dresden, *Erzeugung von brennbaren Gasen aus einem Gemisch von stoffhaltigem Staub und Sauerstoffträgern in einer geschlossenen Kammer*. (**D. R. P.** 663 Kl. 24 e vom 19/8. 1922, ausg. 5/12. 1926. — C. 1926. I. 1341.) OELKER.

Friedrich Jahns, Georgenthal, Thür., *Vergasen von wasserreichen Brennstoffen hrkammerigen Ringgaserzeugern* zur Gewinnung wasserdampfarmer Schwelgase, gek., daß die älteste Kammer nach Beendigung des Schwelens u. nach ihrer rbeschickung aus dem Ring ausgeschaltet u. als Vortrockenkammer unter Ausg der Gase u. Dämpfe betrieben u. darauf nach Wiedereinschaltung in den an die Schwelleitung angeschlossen wird. (**D. R. P.** 427 115 Kl. 24 e vom 26/1. 1926, ausg. 23/3. 1926.) OELKER.

Coppers Co., Pittsburgh, Pennsylvan., übert. von: **Frederick W. Sperr jr.**, urgh, *Beseitigung von Schwefelwasserstoff aus Kohlengasen*. Um die Luft, die I₂S aus Kohlengas beim Regenerieren der Na₂CO₃-Lsgg. aufgenommen hat, die dsorption der H₂S gedient haben, vom H₂S zu befreien, wird sie mit einer Fl. chen, die frisch gefälltes Fe enthält. (**A. P.** 1578 560 vom 6/6. 1924, ausg. 1926.) KAUSCH.

Serban George Cantacuzène, Rumänien, *Verhinderung der Verluste Verdampfung von Rohpetroleum und seiner Derivate in Metallbehältern*. Außen w. die Behälter mit 4 Schichten von Anstrichen versehen. (F. P. 601 786 vom 1925, ausg. 8/3. 1926. Rumän. Priorr. 31/5. u. 2/6. 1924.) KAUS

A. Riebeck'sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., *Raffination von K. wasserstofften*. Die KW-stoffe, wie Mineralöle, werden mit Antimonhalogeniden fein verteilter oder verd. Form behandelt. — Es wird der gleiche Erfolg erzielt bei Anwendung von Zinntetrahalogeniden oder den Halogenverbb. des Titans g. dem Hauptpat. (D. R. P. 427 285 Kl. 23 b vom 22/3. 1925, ausg. 27/3. 1926. zu D. R. P. 421 858; C. 1926. I. 1343.) OELKE

K. Cox, London, und **P. J. Mc Dermott**, Manchester, *Reinigen von K. wasserstoffölen* von ihren gummiartigen Bestandteilen durch Dest. in Ggw. Adsorptionsmittel (Bauxit, Kaolin, Seifenstein, Erden, Ton usw.). (E. P. 24 vom 21/10. 1924, ausg. 18/2. 1926.) KAUS

Chestnut and Smith Corporation, Tulsa, Oklahoma, übert. von: **Ge Grover Oberfell, Albert M. Ballard, Richard C. Alden, Edward L. Utsinger, William R. Lentz**, Tulsa, *Behandlung von Naturgasgasolinen*. Man löst in der S u. leitet dann die Gasoline durch eine Lsg. von PbO enthaltendem NaOH, wo eine Reinigung der Gasoline erzielt wird. (A. P. 1 574 507 vom 22/4. 1921, ausg. 1926.) KAUS

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschapij, Haag, und **F. R. M. Amsterdam**, *Bituminöse Präparate*. Asphalt, Bitumen usw. werden emulgiert dann koaguliert. (E. P. 245 418 vom 26/10. 1925, Auszug veröff. 24/2. 1926. 2/1. 1925.) KAUS

Prodor Fabrique de Produits Organiques S. A. und Marcel Lévy, Sch Hartpech. Man destilliert Goudron u. bituminöse Stoffe unter starkem Vakuum schnell als möglich u. führt gegen Ende der Dest. überhitzten Wasserdampf ein. Zwecks Abscheidung der Kohle werden die Rohstoffe mit Lösungsmm. behandelt die den freien Kohlenstoff fällen. (F. P. 596 331 vom 23/12. 1924, ausg. 2 1925.) KAUS

De Laval Separator Co., New York, übert. von: **Selden H. Hall**, Poughke N. Y., und **Cyrus Howard Hapgood**, New York, *Abscheiden des Wachses aus Mineraldestillaten*. Das Wachs wird durch Abkühlung der Destillatlg. krystallin. ausgeschieden, abzentrifugiert unter Anwendung einer die Mischung umgebenden warmen W. hülle, die die äußere Wachsschicht schm. Getrennt werden auf diese Weise das W. das geschmolzene Wachs u. W. (A. P. 1 571 943 vom 8/9. 1921, ausg. 9/2. 1926.)

George W. Acheson, Caldwell, N. J., V. St. A., *Reinigen und Entfärben Kohlenwasserstoffen, Mineralölen, Wachsen u. dgl.* Man behandelt die Ausgangsprod. mit einem adsorbierend wirkenden Material, welches dadurch erhalten daß man entflochten u. aus seiner kolloidalen Suspension wieder ausgeflochten kalziniert, setzt eine Säure, z. B. H₂SO₄, hinzu, entfernt nach einiger Zeit den sa. Schlamm, läßt MgO auf das so behandelte Prod. einwirken u. filtriert. (A. P. 1 574 vom 8/10. 1924, ausg. 2/3. 1926.) OELKE

H. Bollmann, Hamburg, *Ölreinigung*. Beim Bleichen der Mineral- oder Petroleum. o. dgl. mit Fullererde werden Öl u. Erde in kleinen Mengen miteinander auf ein innig gemischt. (E. P. 245 745 vom 2/12. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 1925.) KAUS

J. L. Biggart, Paisley, Renfrewshire, *Reinigen von Ölbehältern*. Öltanks werden innen mit einer Lsg. von Na₂SiO₃ u. eventuell CaCO₃ bestrichen u. dann der Dampf von Dampf oder W. ausgesetzt. (E. P. 247 047 vom 13/5. 1925, ausg. 4/3. 1926.)

Chemisches Zentralblatt.

926 Band I.

Nr. 22.

2. Juni.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

A. Jouniaux, *Über die Temperaturänderung der Molekulargewichte der chemischen ente.* Zusammenfassung früherer Ergebnisse (vgl. Bull. Soc. Chim. de France 7. 67. 513. 1525. 1534; C. 1925. I. 1931. II. 795. 1926. I. 1633. 1625). Das Mol.-gewicht eines Elementes nimmt mit steigender Temp., solange die Temp. tief ist, ab, ist „mittleren“ Temp., d. h. in der Gegend seines F. konstant, u. zwar meistens in dem At.-Gew., steigt bei weiterer Temperaturerhöhung, geht durch ein Maximum und fällt bei extrem hohen Temp. wieder mit dem At.-Gew. zusammen. Diese angenommene Regel hat viele Ausnahmen (Na, Hg usw.) (Bull. Soc. Chim. de France [4] 1925. 50—58. Lille, Fac. des sciences.)

BIKERMAN.

Théodore William Richards, *Atomgewichte und Isotope.* (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 109—41. — C. 1924. II. 911.)

BIKERMAN.

Paul Rosbaud, *Metalleinkrystalle.* Kurze Beschreibung der bisherigen Methoden zur Darst. von Metalleinkrystallen u. ihrer Verwendungsmöglichkeit sowie ihres Verh. zu mechan. Beanspruchung. (Umschau 30. 277—78.)

FRANKENBURGER.

N. Tanzow, *Über die Krystallisation der übersättigten Lösungen von Natriumsulfat und Soda.* (Vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 342; C. 1925. II. 515.) Der Versuch zeigt, wonach aus übersätt. Na_2SO_4 - u. Na_2CO_3 -Lsgg. bei mechan. Auslösung der Krystallisation sofort die Dekahydrate ausscheiden, widerspricht sowohl der Ostwald-Stufenregel, wie auch der Regel des Vfs, wonach die Salze mit geringerem Temperaturkoeffizient der Löslichkeit sich zuerst ausscheiden sollen. Bei der Nachprüfung ergab sich aber, daß aus Na_2SO_4 -Lsg. sich primär das instabile Heptahydrat abscheidet, aus Na_2CO_3 -Lsgg. ein Hydrat unbekannter Zus., welches leicht ins Heptahydrat (unterhalb 15°) übergeht. — Die übersätt. Lsgg. wurden abgestellt, indem man eine bei 100° gesätt. Lsg. in einem Destillierkolben bei $0-25^\circ$ dauerndem Auspumpen verdunsten ließ. Am Rande des Flüssigkeitsspiegels traten dann Krystalle des unbeständigen Hydrates auf, die beim Aufhören der Dest. zu wuchsen. Das dabei entstehende Hydrat des Na-Carbonats bildet Nadeln, die einem Vfs. die Zus. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 4,2\text{H}_2\text{O}$ hatten. Beim Abkühlen der Lsg. wuchsen neugebildeten Krystalle nur sehr wenig, was auf einen geringen Temperaturkoeffizienten ihrer Löslichkeit schließen läßt. — Das Verdunsten im Destillierkolben kann durch langsames Abkühlen der übersätt. Lsg. im geschmolzenen Rohr ersetzt werden. — Die Gefäße müssen unmittelbar vor dem Vers. mit Chromschwefelsäure und Wasserdampf gewaschen werden. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 215—20. Smolensk, Univ.)

BIKERMAN.

John Oglethorpe Wakelin Barratt, *Kurven der hydrolytischen Dissoziation.* Entwickelt die nach dem Massenwirkungsgesetz geltenden Formeln für die Gleichgewichte zwischen starken Basen und schwachen Säuren bzw. starken Säuren u. schwachen Basen mit den entsprechenden, hydrolyt. gespaltenen Salzen u. weist experimentell ihre Gültigkeit nach. (Biochemical Journ. 19. 875—81. 1925. London, Cambridge Inst.)

FRANKENBURGER.

J. Wosnessenski und K. Tschmutow, *Über die Verteilung der Elektrolyte unter flüssigen Phasen.* Es wurde die Verteilung von HCl u. Pikrinsäure zwischen W. und M. bei 17° untersucht. Die extremen Konz.: 0,05672 Mol HCl im Liter W. u.

VIII. 1.

215

0,000128 Mol HCl im Liter Bzn., bzw. 0,00584 u. 0,000036 Mol./l.; 0,05045 Mol HCl im Liter W. u. 0,000626 im Liter Bzn., bzw. 0,00189 bzw. 0,000011. Zur Berechnung des Verteilungskoeffizienten brauchen wir die Konz. des „undissoziierten“ Anteils, die sie mit Hilfe der Aktivitätskoeffizienten finden. Der Verteilungskoeffizient bleibt nur bei den geringsten Konz. konstant. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 343—46. 1925. Moskau, Techn. Hochschule.)

Alexander von Philippovich, *Über die Zersetzung des Kohlenoxyds mit unedlen Katalysatoren*. Übersicht über die vorhandene Literatur. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 37—43. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.)

Hans Tropsch und Alex. von Philippovich, *Vergleichende Versuche über die Zersetzung von Kohlenoxyd an Kontaktsubstanzen*. Gereinigtes u. getrocknetes Kohlenoxyd wurde bei 400° über Kontaktsubstanzen geleitet. Seine Zers. nach $2\text{CO} \rightarrow \text{CO}_2$ wurde durch Best. der CO_2 gemessen. Am wirksamsten ist Ni, doch läßt sich auch Fe katalyt. Wirksamkeit durch Legierung mit 50% Sn fast ganz vernichten. Bei verschiedenen Fe-Sorten zeigen sich große Unterschiede. Im einzelnen wurden Strömungsgeschwindigkeit von 400 ccm/Stde. folgende %-Gehalte CO_2 im Endgas festgestellt: Ni 36,4, Fe aus Oxyd 10,4, Ferr. reduct. 2,3, ZnO 0,9, MnO 0,8, Cr_2O_3 0,3, NiSn 0,3—0,6, Al_2O_3 0,4, BaSO_4 0,4, Fe verzinkt 0,4, MgO 0,2, Cu 0,0. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 44—45. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.)

A. Schellenberg, *Über die Zersetzung des Methylalkohols an Metallen und Metalloxyden*. Zusammenstellung der Literatur über die therm. Zers. des CH_3OH an verschiedenen Kontakten. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 9—12. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.)

Hans Tropsch und Albert Schellenberg, *Über die Zersetzung von Methylalkohol an Eisen, Zinn und Aluminium*. CH_3OH -Dampf wurde über die erhitzten, in ein Verbrennungsrohr ausgebreiteten Metalle geleitet. Bei 520° fand an Fe Rußabscheidung u. Zers. zu einem Gase mit 4—7% CO_2 , 20—25% CO, 55—60% H_2 u. 3—12% CH_4 statt. Das in geringer Menge anfallende Kondensat war neutral u. enthielt C. An verzinnem Fe war die Zers. des CH_3OH unter den gleichen Bedingungen nur gering. An Al bildete sich bei 520° ein Gas von 5% CO_2 , 23% CO, 60% H_2 , 4% CH_4 während bei 270° das Gas 2% CO_2 , 5% CO, 52% H_2 , 30% CH_4 enthielt u. in mit fl. Luft gekühlten Vorlage ein Al-haltiges Reaktionsprod. kondensiert wurde (anscheinend Al-Trimethyl). (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 13—14. 1925. Mülheim-Ruhr.)

Hans Tropsch und Otto Roehlen, *Über die katalytische Zersetzung des Formaldehyds*. Der durch Verdampfen von Paraformaldehyd oder von wss. CH_2O -erhaltene CH_2O -Dampf wurde bei höheren Temp. (meist 400°) über Kontaktsubstanzen (Na_2CO_3 [300—500°], CaCO_3 , BaCO_3 , ZnO, Al_2O_3 , ThO_2 , Cr_2O_3 , UO_2 , alkalisches Fe, Sb, Pb [195°], Quarz [600°], akt. Kohle) geleitet. Die Zers. war außer an Sb u. Quarz meist sehr schnell. CH_3OH -Bildung war beträchtlich an Na_2CO_3 , BaCO_3 , Al_2O_3 (bis 44% des zers. CH_2O), ThO_2 , UO_2 u. akt. Kohle, bei den erstgenannten unter starker Kohleabscheidung aus H_2O -freiem CH_2O . Die B. von CH_4 fand besonders an Cr_2O_3 (8%) u. akt. Kohle (9%), die von ungesätt. KW-stoffen an Al_2O_3 (5%), von HCOOH an UO_2 (5%) statt. ZnO gab wenig höhermolekulare Reaktionsprodd.; es zers. trocknen CH_2O glatt zu CO u. H_2 , feuchten zu CO_2 u. H_2 . Fast stets wurde das Auftreten eines terpenartig riechenden Öles u. mehrfach aromatisierte MM. beobachtet. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 15—36. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.)

Hans Tropsch, *Über die katalytische Zersetzung der Ameisensäure*. H_2O - HCOOH wurde in Dampfform über erhitzte Kontaktsubstanzen geleitet. Bei 400° findet die Zers. zu $\text{CO}_2 + \text{H}_2$ am leichtesten an Fe u. verzinnem Fe, schwieriger an Cu u. am geringsten an Al statt. Ein Teil der HCOOH wurde stets zurückerhalten.

zersetzen die verzinnnten Fe-Späne auch zu $\text{CO} + \text{H}_2\text{O}$ u. bilden geringe Mengen Glaswolle, Asbest u. Bimsstein zersetzen die HCOOH bei 355° in beiden Richtungen, u. zwar in steigendem Maße in der angegebenen Reihenfolge. Ebenso wirken Li_2CO_3 ($255\text{--}410^\circ$) u. ThO_2 (355°) unter gleichzeitiger B. gelber, reduktionsprodd. (anscheinend CH_3OH enthaltend). Al_2O_3 bildet bei 305 u. 435° nur $\text{CO} + \text{H}_2\text{O}$, auch bei Ggw. von H_2O -Dampf. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle -8. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.)

V. WANGENHEIM.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

A. Einstein, *Vorschlag zu einem die Natur des elementaren Strahlungs-Emissions- und Absorptionsgesetzes betreffenden Experiment*. Vf. beschreibt eine einfache Versuchsanordnung, deren Hilfe entschieden werden kann, ob die Interferenzfähigkeit der Strahlung mit der Periodizität des emittierenden Atoms in irgend einem Zusammenhang stehen. (Zur Physik und Experimentalphysik 14. 300—01. Berlin.)

JOSEPHY.

M. Palacios, *Theorie der Lichtemission nach dem Modell von Rutherford-Bohr*. Entwickelt im Anschluß an die experimentellen Unterss. von WIEN über das Verhalten von Kanalstrahlen eine Theorie für die Lichtemission der Einzelatome. Ihr soll die Lichtaussendung eines Atoms nicht gedämpfte Wellenzüge hervorgehen u. die Elektronenübergänge durch die Gesetze des Zufalls bestimmt werden. Es ergibt sich, daß die Ausstrahlungsdauer bei der Erzeugung der Linien H_β u. H_γ dieselbe ist; es scheint danach, daß das Plancksche Wirkungsquantum h als Produkt zweier universeller Konstanten, eines Zeit- u. eines Energiequantums, betrachtet werden kann. Weiterhin führt die Theorie zur Annahme, daß im Atom mehrere Vorratsbahnen für Elektronen bestehen, die entfernt vom Kern u. der größten Stabilität entsprechen. Ein weiterer Teil der Arbeit befaßt sich mit den bei den experimentellen Unterss. von WIEN mit in Betracht zu ziehenden Zusammenstößen, welche die zum Leuchten angeregten Atome erfahren. (Anales de la Fisica 14. 79. 55—80. Madrid, Lab. de Investigaciones Fisicas.)

FR.

K. W. F. Kohlrausch, *Neue Forschungen über den Atombau*. Populäre Darst. der heutigen Ansichten über die Struktur der Atome, den Aufbau ihrer äußeren Elektronenschalen u. ihrer Kerne. (Umschau 30. 245—48. 269—71.)

FRANKENB.

H. Friedel, *Über die Röntgenogramme von Mischkrystallen*. Mischkrystalle, die aus isomorphen Stoffen entstanden sind, liefern durch Brechung von Röntgenstrahlen Röntgenogramme, die sich nicht von denen eines einheitlichen Kristalls unterscheiden. Eine Erklärung hierfür sei nach der Auffassung des Vf. nicht in der Kristallstruktur zu suchen, sondern mit größerer Wahrscheinlichkeit in dem opt. Verh. der Röntgenstrahlen. Auf Grund theoret. Überlegungen kommt Vf. zu dem Schluß, daß es sehr schwierig ist, das mittlere Röntgenogramm eines solchen Mischkrystalls vorherzusagen, sicher sei nur bei Auftreten einer Kristallstruktur, daß diese nicht dem mittleren Parameter zugeschrieben werden kann. Die Richtungen der abgelenkten Röntgenstrahlen werden auch dieselben sein, wie bei einem einheitlichen Kristall, über die Intensitäten dagegen kann theoret. keine Aussage gemacht werden. Nicht nur bei der Ausdeutung isomorpher Gemische, sondern auch bei pseudo-paramorphen Kristallstrukturen sei die größte Vorsicht zu walten. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 741—44.)

HAASE.

W. Kolhörster, *Bericht über die durchdringende Strahlung in der Atmosphäre*. Enthält eine zusammenfassende Darst. der seit 1915 veröffentlichten Arbeiten über die durchdringende Strahlung in der Atmosphäre, zu denen Vf. einen großen Teil beigetragen hat. Die zu den Ionisationsmessungen benutzten Instrumente sind genau beschrieben, dann folgen die Ergebnisse der verschiedenen Beobachtungen, u. daran schließt sich die über die durchdringende Strahlung aufgestellten Hypothesen. (Naturwissenschaften 14. 290—95. 313—19. Berlin.)

JOSEPHY.

G. Hoffmann, *Über den Comptoneffekt bei γ -Strahlen*. Die Messungen COMPTON über die Veränderung der Härte sekundärer γ -Strahlen werden von Vf. erweitert. Als Strahler diente ein Radiumpräparat von 30 mg Ra-Gehalt. weiche Strahlung wurde durch einen 1 cm dicken Bleimantel zurückgehalten. Streustrahler diente ein zylindr. Kohlestab. Die Messungen ergaben hinsichtlich der Abhängigkeit der Wellenlänge (aus der Änderung des Absorptionskoeffizienten bestimmt) von der Richtung der Strahlung eine sehr gute Übereinstimmung der Compton-Debyeschen Theorie. (Ztschr. f. Physik **36**. 251—58. Königsberg Univ., Phys. Inst.) HAAS

V. Posejpal, *Quantitative experimentelle Kontrolle der Resonanzabsorption Röntgenstrahlen*. Wie in der vorhergehenden Unters. (S. 2074) benutzte der Vf. Wolfram als Strahler u. ein Wolframblech, das er in einer Entfernung von 1 cm der photograph. Platte aufstellte, als Absorbens. Außerdem noch eine Anzahl verschieden starker Cu-Bleche, die ebenfalls als Absorbens dienen sollten. Die Intensität der Cu-Bleche schwankte zwischen 0,0109 u. 0,1006 cm; die des W-Blechess betrug 0,010 cm. Durch Vorschalten verschieden starker Cu-Bleche konnte der Vf. Absorptionskoeffizienten für die $W K \alpha_1, \alpha_2$ -Strahlung feststellen u. vergleichen mit den Werten, die nach der Formel von BRAGG-PEIRCE berechnet werden konnten. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 767—69.) HAAS

Pierre Auger, *Über die Fluoreszenzausbeute im Gebiete der Röntgenstrahlung*. Vf. gibt im Anschluß an seine vorhergehende Arbeit (S. 585) eine Definition der Fluoreszenzausbeute, u. zwar als Beziehung der Zahl der ausgesandten charakteristischen Quanten durch die angeregten Atome zur Zahl der einfallenden absorbierten Quanten. Mit Hilfe der Wilsonschen Kondensationsmethode wurde die Ausbeute an Fluoreszenzstrahlung bestimmt. Die Versuche an *Ar* ergaben, daß der einfache photoelektr. Effekt des *K*-Niveaus gleich dem des *L*-Niveaus ist. Anders beim *Kr*, das unter bestimmten Anregungsbedingungen drei sehr unterschiedliche Strahlen bzw. photoelektr. Effekte aufweist, u. zwar bei 11 KV, bei 14 KV u. bei 18 KV. Die Ausbeute der Fluoreszenz im *K*-Niveau ergab für *Kr* den Wert 0,51; das Verhältnis der Quantenzahlen der einfallenden, absorbierten Strahlung in den *K*- u. *L*-Niveaus wies den Wert 7,58 auf. Diese Werte stimmen sehr gut überein mit den Rechnungen von AUGER. (Physical Review [2] **24**. 1. [1924]). (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 773—75.)

Reinhold Maunkopff, *Über die Auslöschung der Resonanzfluoreszenz von Natriumdampf*. Die Messung der Auslöschung der *D*-Linienresonanz erfolgte photographisch. Um die sekundäre Fluoreszenz in ausreichendem Maße herzustellen, benutzte der Vf. ein Quarzentladungsrohr, das mit Na u. Edelgas gefüllt war. Zur Auslöschung der Natriumresonanz diente ein Ne-He-Gemisch, Wasserstoff u. Stickstoff, von denen die beiden letzteren Gase sehr stark auslöschten, in sehr viel geringerem Maße gegen das Ne-He-Gemisch. Vf. diskutiert die erhaltenen Kurven u. zeigt, daß aus ihnen die Ausbeute an Stößen zweiter Art entnehmen läßt. Diese Ausbeute verhalten sich beim Ne-He, H_2 u. N_2 wie 0,017 zu 0,5 zu 1,0. Der Stoßradius der angeregten Na-Atome ergibt sich hieraus als 1,7-mal so groß, wie der der von THOMSON errechneten Bahnfläche des Leuchtelektrons in der $2 p_1$ - u. $2 p_2$ -Bahn. Als Fehlerquelle bei diesen Messungen wird angegeben, daß es nie vollständig gelungen war, die Vergleichshelligkeit frei von zerstreutem Lichte der Ladenburglampe zu erhalten. (Ztschr. f. Physik **36**. 315—24. Göttingen, Univ., II. Phys. Inst.) HAAS

M. Holweck, *Kritische K-Potentiale der leichten Atome*. Im Anschluß an eine frühere Veröffentlichung (S. 1766) bespricht der Vf. die beobachteten Diskontinuitäten in der Hauptsache darin bestehen, daß eine oder mehrere Linien der eigentlichen Absorptionsbande vorhergehen u. daß diese Struktur von der chem. Natur, in der das Element gebunden ist, abhängt. Die Potentiale für die erwähnten Linien von Stickstoff, Sauerstoff, Stickoxydul u. beim Borwasserstoff werden mitgeteilt. WIR

K-Potential durch die erste Diskontinuität definiert, so kann man die gefundenen mit großer Genauigkeit auf einer Kurve auftragen nach Art der Moseleyschen e. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 779—81.) HAASE.

A. Sommerfeld und A. Unsöld, *Über das Spektrum des Wasserstoffs*. Vff. Ben. sich der Auffassung von GOUDSMIT u. UHLENBECK (Physica 5. 266 [1925]) indem auch sie das Spektrum des Wasserstoffes nach dem Schema der Alkalien essen. Durch Beibehaltung der relativist. Formel für die Niveaudifferenzen, Niveaus aber mit Quantenzahlen bezeichnet, war es möglich, die Intensitäten häufig zu berechnen in guter Übereinstimmung mit PASCHENS experimentellen Vers. in bezug auf He⁺, $\lambda = 4686$. Eine von GEHRCKE, LAU u. HANSEN festgestellte Intensitätsanomalie der Balmerlinien wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Metastabilität des 2s-Terms zurückgeführt. Der Paschen-Back-Effekt bei wird erklärt u. dabei gefunden, daß die bei 10000 Gauss zu einer Linie verlorene π -Komponente nicht in der Mitte des feldfreien Dubletts liegt, sondern der langwelligen Seite hin verschoben ist. Dies entspricht der Alkaliauffassung Wasserstoffstruktur. (Ztschr. f. Physik 36. 259—75. München.) HAASE.

George S. Monk, *Sekundäre Wellenlängennormen in den Spektren von Neon und* . Vf. arbeitet nach der Interferenzmethode. Als Primärnormen dienen die mit Cd-Röhre erhaltenen Wellenlängen, die mit denen einer Michelson-H-Röhre einstimmen. Die angenommenen Werte für zwei Ne-Linien bei 5852 u. 6402 Å fraglich. Die bei Fe im Rot erhaltenen Werte liegen systemat. um 0,002 Å niedriger als bisher angenommenen. (Astrophys. Journ. 62. 375—86. 1925.) LESZYNSKI.

Alfred Coehn und Gerd Heymer, *Photochemische Äquivalenz und Kettenreaktion*. erklären die Tatsache, daß Cl₂ u. H₂ bei Ggw. von Feuchtigkeit im schon sichtb. Licht reagieren, während sie im trockenen Zustand nur bei Bestrahlung mit violettem Licht reagieren, durch folgende Kettenrk.:

a) feucht: Cl₂ + $h\nu$ (klein) = Cl'₂; Cl'₂ + Cl₂ = Cl₂ + 2Cl;
Cl + H₂O = HCl + OH; OH + H₂ = H₂O + H; H + Cl₂ = HCl + Cl
bis H auf Cl bzw. Cl auf Cl trifft. Der Vorgang in den trockenen Gasen wird dermaßen dargestellt:

b) trocken: Cl₂ + $h\nu$ (groß) = Cl''₂; Cl''₂ + H₂ = Cl₂ + 2H;
(2-mal) H + Cl₂ = HCl + Cl; Cl + Cl = Cl₂.

Experiment ergab: daß feuchtes Chlorknallgas für ein Quant absorbiert Strahlung waren u. auch kurzwelligen ultravioletten Lichts ca. 10000 Moll. HCl liefert, daß schend getrocknetes Chlorknallgas auch bei mehrere Wochen andauernder Einw. über keine Vereinigung erkennen läßt, u. daß im trockenen Chlorknallgas bei Bestrahlung mit kurzwelligem Ultraviolett deutliche Vereinigung statt hat, deren Messung mit reiheit aussagen läßt, daß für 1 absorbiertes Quant weniger als 7 Moll. HCl entsteht. Es wird angenommen, daß dem Äquivalenzgesetz folgend nicht mehr als 2 Moll. pro absorbiertes Quant gebildet werden. Aus diesen Ergebnissen folgt, daß im waren Licht das W. nicht nur die Chlordissoziation einmalig auslöst, sondern daß es ein integrierender Bestandteil für das Fortbestehen der Kette ist. Die Erklärung FORRISH (vgl. S. 1367) für den großen Umsatz im sichtbaren Licht wird zurückgesen. (Naturwissenschaften 14. 299—300. Göttingen, Physikal.-chem. Inst.) JOS. Th. Cathala, *Photochemische Synthese des Chlorwasserstoffs*. (Vgl. S. 2173.) ge eines Rechenfehlers wurde die Konz. von ClO₂ viel höher angenommen als der Tat ist. (Journ. de Chim. physique 23. 255.) BIKERMAN.

P. Bechterew, *Über die photochemische Reaktion von Eder und einige Eigenschaften der daran beteiligten Salze*. Nach KISTIAKOWSKI (Journ. Russ. Phys.-Chem. 14. 431; C. 1901. II. 1194) wird die Lichtempfindlichkeit der Ederschen [(NH₄)₂· u. HgCl₂] u. ähnlicher Lsgg. durch B. von Komplexsalzen des Hg bedingt. Vf. vorläufige Verss. an, um Existenz derartiger Komplexe nachzuweisen. Methode:

Löslichkeitsbestst. der Salzgemische. Es wurde ein ausgezeichneter Punkt gefunden, wo das W. gleichzeitig mit KCl , K_2HgCl_4 u. einem oxalathaltigen Salz gesättigt (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 161—88. 1925. St. Petersburg, Polytechn. Inst.)

L. Marchlewski und **A. Nowotowna**, *Absorption des violetten Lichtes durch organische Substanzen*. VII. (VI. vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] **37**. 404; C. **1925**. II. 295.) (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 159—67. — **C. 1926**. I. 588.)

Sadayuki Hamano, *Photoaktivierung von Cholesterin, Fetten und anderen Substanzen durch X-Strahlen*. (Vgl. S. 2717.) Cholesterin, Borneol, Elaidinsäure wurden nach Bestrahlung mit X-Strahlen photoaktiv, bei Lebertran u. Ölsäure die Photoaktivität verstärkt. Wenn die Substanzen in CO_2 -Atmosphäre bestrahlt werden, bleibt die Aktivierung aus. (Biochem. Ztschr. **169**. 432—34. Tokio, Biochem. Lab. d. Inst. f. physik. u. chem. Forsch.)

W. V. Evans und **E. M. Diepenhorst**, *Weitere Untersuchungen über lumineszierende Grignardsche Verbindungen*. (Vgl. DUFFORD, CALVERT u. NIGHTINGALE, Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 2068; C. **1924**. I. 1746.) Vff. haben 90 Organomagnesiumverbindungen untersucht u. gefunden, daß die meisten bei der Oxydation Chemilumineszenz zeigen; nur bei Verbb., in denen das Mg an ein Radikal von niedrigem Mol.-Gew. gebunden ist, wurde keine Lumineszenz beobachtet. Mit steigendem Mol.-Gew. w. die Leuchtkraft. Im allgemeinen leuchten die Verbb. $RMgBr$ stärker als die Verbb. $RMgJ$. Verbb. $RMgCl$ ließen sich schlecht darstellen, nach ihrer Leuchtkraft ließen sie zwischen den Br- u. J-Verbb. einzuordnen. Bei den aromatischen Verbb. hängt die Leuchtintensität auch von der Stellung etwaiger Substituenten ab; sie ist sehr schwach, wenn die Phenylgruppe nicht substituiert ist (z. B. bei Phenylmagnesiumhalogeniden). Stärker ist sie bei m-substituierten, noch stärker bei o- u. am stärksten bei p-substituierten. Es wurde ferner der Einfluß verschiedener Lösungsmittel untersucht u. Lumineszenz in allen Lösungsmitteln festgestellt, in denen die Verbb. bereit werden konnten. Spektren von p-Chlorphenylmagnesiumchlorid, α -Naphthylmagnesiumbromid u. p-Tolylmagnesiumbromid wurden photographiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 715—16. Evanston [Illinois], Northwestern Univ.)

Herbert E. Ives und **A. L. Johnsrud**, *Elektrische und photoelektrische Eigenschaften dünner Rubidiumhäute auf Glas*. (Vgl. S. 2297.) Im Hochvakuum wurden dünne Häute von Rb auf Glas niedergeschlagen. Im Dunkeln zeigen diese Häute einen dem Ohmschen Gesetz gehorchenden Widerstand. Bei Belichtung ist der Unterschied zwischen n. u. selektivem Photoeffekt nicht so ausgeprägt, wie bei den f. Metallen (Astrophys. Journ. **60**. 209; C. **1925**. I. 822) untersuchten auf Metalloberflächen niedergeschlagenen Häuten. Da für das Auftreten eines vom n. deutlich unterschiedenen selektiven Photoeffekts eine Orientierung vorausgesetzt wird (l. c.), ist zu schließen, daß sich diese Orientierung nur auf einer leitenden Unterlage einstellt. (Astrophys. Journ. **62**. 309—19. 1925.)

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Robert Saxon, *Wasser und Metalle unter dem Einfluß der Elektrolyse*. Vff. beschreiben Verss., bei welchen sich W. bei der Elektrolyse einerseits als Säure, andererseits als Base verhält. In den Stromkreis gebrachte Metalle können gleichzeitig Kathode u. als Anode wirken. (Chem. News **132**. 170—71.)

W. Persson, *Das Katalyseprinzip in der Elektrochemie*. Vf. zeigt, daß elektrolyt. Vorgänge als katalyt. aufgefaßt werden können: so beschleunigt das Daniellelement die Auflösung des Zn in H_2SO_4 ; so spielt MnO_2 im Leclanchéelement eine Katalysatorrolle, desgleichen das PbO_2 im Plantéakkumulator. Zers. katalyt. $H_2S_2O_8$ in H_2O_2 u. H_2SO_4 (vgl. PETRENKO, Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **36**. 1081; C. **1905**. I. 6), wobei das entstehende H_2O_2 das Potential der A.

ht. Vf. versuchte (mit **E. Lewinson**) diese Eigenschaft zu verwerten, indem er Element „Zn | H₂SO₄ | PbO₂ auf Kohle“ baute. Die EK. der Kette beträgt 2,5 V., Wirkungsdauer ist größer als die des Leclanchéelementes. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 189—205. 1925.)

BIKERMANN.

L. Wolstein, *Elektrodenpotential des Thalliums*. Die EK. der frisch bereiteten $\text{e Tl} | \text{gesätt. TlCl} | 0,1\text{-n. KCl} | \text{HgCl} | \text{Hg}$ betrug $0,7782 \pm 0,0006$ V., sie nahm während der Tl-Elektrode (2—8 Umdrehungen/Sek.) meistens ab, stieg aber bald dem Aufhören der Drehung auf $0,7813 \pm 0,0009$ V., um bei weiterem Ruhen allmählich auf den Anfangswert (oder einen noch tieferen) zu sinken. Bei einem neuen Umdrehen der Elektrode wiederholt sich das Spiel; es wird erst 4—5 Tage nach Umdrehen der Kette reproduzierbar. Erklärung: die Tl-Elektrode wird durch Ggw. O₂ edler (EK. gegen Hg also geringer), die Drehung der Elektrode, die das Umdrehen derselben mit immer neuen O₂-haltigen Lösungsmassen bewirkt, erniedrigt die EK. noch stärker, die Lsg. wird aber an O₂ ärmer; in der Ruhe bedingt dieser Umdrehen eine höhere EK., die wieder abnimmt in dem Maße, wie die Luft in die Elektrode diffundiert. In der Tat wird die EK. durch geringe Mengen Oxydationsmittel (1% Na₂S₂O₈) herabgesetzt, u. zwar während des Rotierens viel stärker als in der Ruhe. Durch Amalgamieren vor der Oxydation geschützte Elektrode (in gesätt. Lsg. ohne Zusatz) zeigte keine Abhängigkeit der EK. vom Rotieren. — Die Tl-Elektrode wurde hergestellt, indem man unter Paraffin geschmolzenes Tl in ein Glas einbrachte; es war also nur der Querschnitt als Elektrode tätig. — Für das Normalpotential von Tl gegen n. Kalomelektrode ergibt sich der Wert 0,6181 V. (25°) in Übereinstimmung mit JONES u. SCHUMB (Proc. National Acad. Sc. Washington **56**. 1925). (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 265—75. 1925. St. Petersburg, Polytechn. Inst.)

BIKERMANN.

V. Schottky, *Der Abkühlungseffekt an Oxydkathoden*. Notiz zu der Arbeit von MICHEL und H. J. SPANNER. MICHEL u. SPANNER (S. 1945) ziehen die Theorie des Effekts zur Erklärung der von ihnen gefundenen prakt. Koinzidenz von Abkühlungseffekt u. Austrittsarbeit an oxydbedeckten Pt-Kathoden heran u. weisen auf verschiedene Schwierigkeiten hin. Vf. tritt dem entgegen u. erörtert, weshalb die Elektronenabkühlungswärme eines reinen Stoffes beim Auftragen von Fremdschichten in der nächsten Näherung ebenso variieren muß, wie die Elektronenaustrittsarbeit. An der Anode tritt ein der Abkühlung äquivalenter Wärmeeffekt auf. (Ztschr. f. Physik **111**—14. Rostock.)

HAASE.

Karl Ippisch, *Die Leistungspolarität bei Ventileffekten*. Vf. setzt die Verss. von H. J. WINTZ u. WESSELY (Physikal. Ztschr. **21**. 316; C. **1920**. III. 436) über die uni- und bipolarer Leitung an Krystallen fort u. findet bei der Unters. von natürlichen Krystallen zwischen zwei Metallplatten die Bestätigung, daß das Prod. $U \cdot V$, worin U die Unität u. V das Ladungspotential ist, innerhalb bestimmter Spannungsintervalle konstant ist. Das Prod. bedeutet die *Leistungspolarität*. Sie beträgt für *Rotzinkerz* zwischen 2 u. 12 V 2,003 (4% Fehler), für *Si-Stahl* zwischen 2 u. 10 V 0,651 (Fehler), für *Bleiglanz-Karborund* zwischen 7,72 u. 25,72 V 4,674 (2% Fehler), für *Rotzinkerz-Bleiglanz* zwischen 3,96 u. 9,9 V 2,29 (7% Fehler) u. zwischen 8,12 u. 17,82 V 2,552 (4% Fehler) u. für *Chalkopyrit-Rotzinkerz* zwischen 5,84 u. 17,82 V 1,1% (Fehler), ein andermal zwischen 5,05 u. 13,66 V 4,277 (8% Fehler). Alle Effekte scheinen dem Gesetz der Leistungspolarität zu folgen. Dies konnte auch bei einer in KOH, welches durch eine Tonzelle von der Kohlelektrode getrennt ist, bei 100 u. 140 V nachgewiesen werden. Die Leistungspolarität betrug $27,33 \pm 0,1$ u. wird mit steigender Stromstärke größer. (Physikal. Ztschr. **27**. 199—202.) ENS.

Adolf Smekal, *Die elektrische Leitfähigkeit im Einkrystall und in Krystallaggregaten*. (S. 2285.) Vf. wendet sich gegen die Auffassung von JOFFÉ u. ZECHNOWITZER (Ztschr. f. Physik **120**) in bezug auf die Unwirksamkeit des mikrokristallinen Baues verformter

Krystalle für die elektrolyt. Leitfähigkeit. Die von den genannten Forschern gefundenen experimentellen Daten lassen sich nach Ansicht des Vf. mit den Folgerungen der Oberflächentheorie der elektrolyt. Stromleitung in krystallisierten Körpern einbaren. Wesentlich erscheint dem Vf. der Befund zu sein, daß die zum Ein- des Gleitvorganges notwendige mechan. Arbeitsleistung eine Lockerung der in Gleitebene gelegenen Gitterionen bewirkt, u. somit vorübergehend eine erhöhte fähigkeit bedingt. (Ztschr. f. Physik **36**. 288—91. Wien, Univ., II. Phys. Inst.) HAAS

S. Jakobson und **M. Rabinowitsch**, *Die elektrische Leitfähigkeit einiger Krystallhydrate*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 251—64. 1925. — C. 1 II. 1587.) BIKERMA

S. Jakobson, *Die elektrische Leitfähigkeit in Benzollösungen*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 276—82. 1925. — C. 1926. I. 1118.) BIKERMA

H. Sack, *Über die Dielektrizitätskonstante von Elektrolytlösungen*. Es werden u. Berücksichtigung der Dipole des W. die DEE. für ein-einwertige Salzlgg. besprochen. Die DE. ist $D = 80 (1 - 3,0 \gamma)$, worin γ die Konz. in Mol pro l ist. Daraus berechnet sich die Sättigungssphäre eines Ions zu 8,6 Å Radius. Dieses Ergebnis gilt für Ionenradien von 1—3,5 Å. (Physikal. Ztschr. **27**. 206—08. Zürich.) ENSZLI

A. Chatillon, *Über die verschiedenen magnetischen Zustände des Kobaltchlorids* (Vgl. S. 1119.) Der magnet. Zustand fester Kobaltsalze ist durch ein Moment von 25 Magnetonen charakterisiert. In Kürze werden an Hand früherer Arbeiten die Zustände besprochen, deren Moment 24 u. 26 Magnetonen entspricht. Neu ist das magnet. Moment der Kobaltsalze von nur 23 Magnetonen. Bei 300° calciniertes Kobaltchlorid wird in reinem Amylalkohol u. in A. gel., die Lsgg. sind rein leitend. Sie weisen mit ganz geringen Abweichungen von der Ganzzahligkeit auf 23 Magnetonen hin. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 765—67.) HAAS

H. Forestier und **G. Chaudron**, *Thermomagnetische Studie einiger Ferrite*. Anschluß an frühere Verss. über Magnesiumferrit (S. 843) werden nunmehr Ferrite von dem Typus $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{MO}$ untersucht, wobei M die Metalle Ni, Cu, Pb, Ca, Cd u. Zn bedeuten soll. Alle Verbb. werden durch den Magneten angezogen. Durch die Verss. konnten die Verbb. in 3 Gruppen geteilt werden. 1. Die Ferrite des Ni, Mg, Ba u. des Pb verhalten sich wie der Magnetit ($\text{Fe}_2\text{O}_3\text{FeO}$). Die Magnetisierbarkeit dieser Stoffe nimmt mit zunehmender Temp. ab, bei dem Curiepunkt ist sie gleich Null. Die Abkühlungskurve deckt sich mit der Erhitzungskurve. Es abweichend von dem normalen Schema verhalten sich das Pb- u. das Ba-Ferrit, welche eine Kurve aufweisen, die auf ein mehr kontinuierliches Abnehmen der Magnetisierbarkeit hinweisen. 2. Die Ferrite des Ca u. des Cd. Werden diese Verbb. bis zu ihrem Curiepunkt erhitzt, so weisen auch sie Abkühlungskurven auf, die sich mit den Erhitzungskurven vollständig decken. Wird aber diese Temp. überschritten, erhält man abweichende Abkühlungskurven; hält man die Stoffe eine längere Zeit auf der hohen Temp., so verlieren diese Verbb. vollständig ihre Magnetisierbarkeit. 3. Das Ferrit des Zinks. Dieses Ferrit zeigt bis zu 1200° nicht die geringste Diskontinuität. Die Magnetisierbarkeit ist vollständig reversibel. — Ferner stellen die Vff. fest, daß Calciumferrit keine permanente Magnetisierbarkeit besitzt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 777—79.) HAAS

Maurice Prud'homme, *Über die absoluten kritischen Temperaturen*. II. (I. S. 1497.) Vf. versucht, die die krit. Temp. T_c darstellenden Zahlen in von einzelnen Valenzen herrührende Beträge zu zerlegen u. schließt aus dem Vorzeichen der Differenz T_c (ber.) — T_c (beob.) auf das Vorzeichen der Bildungswärme der Substanz. (Journ. Soc. Chim. de France [4] **39**. 145—50.) BIKERMA

C. Matignon und **G. Marchal**, *Thermochemie des Berylliums*. Deckt sich mit der Arbeit von MARCHAL (Journ. de Chim. physique **22**. 325; C. 1925. II. 1937)

is C. r. d. l'Acad. des sciences, die auf S. 2301 wiedergegeben ist. (Bull. Soc. de France [4] 39. 167—90.)

BIKERMAN.

Braune und W. Tiedje, *Über die Dissoziation des Antimonpentachlorids*. Bestimmen das Dissoziationsgleichgewicht von $SbCl_5$ durch Messung der Drucke, die bestimmte Menge Substanz in einem bekannten Vol. zwischen 120—260° C. Als Reaktionsgefäß diente eine elektr. geheizte Quarzbirne. Es wird gefunden: $\lambda = -3570/T + 9,740$. Hieraus folgt für die Wärmetönung der Rk. $SbCl_3 + SbCl_5$ der Wert 16 320 cal. (mittlere Temp. 200°). Aus den aufgenommenen Druckkurven von $SbCl_5$ u. $SbCl_3$ berechnen Vff. die Verdampfungswärmen. $\lambda = 11 050$ cal. (mittlere Temp. 70°), $SbCl_3$ $\lambda = 11 450$ cal. [in einer Zusammenfassung 11 550, der Referent] (mittlere Temp. 120°). Aus dem von THOMSEN gegebenen Wert der Wärmetönung der Rk. $SbCl_{3fest} + Cl_{2Gas} = SbCl_{5fl.}$ ergibt sich Berücksichtigung der Verdampfungswärme, sowie der Sublimationswärme des $SbCl_3$ die Wärmetönung der Gasrk. zu 17 000 cal. Die Reaktionsgeschwindigkeit bei tieferen Temp. relativ gering, so daß ein messendes Verfolgen des Reaktionsgleichgewichtes möglich ist. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 39—51. Hannover, Techn. Hochschule.)

ULMANN.

Poloman Széll, *Über die Rotationsentropie der zwei- und mehratomigen Gase*. (Ztschr. f. Physik 36. 292—99. Cluj-Kolozsvár-Klausenburg.)

HAASE.

Carl Jellinek, *Die chemischen Konstanten des Broms*. (Vgl. S. 2780.) Vf. ermittelte die chem. Konstante des Br_2 aus den Bromtensionen von $PbBr_2$, die durch wss. Bromzinnchloridflüssige Ketten oder aus Reduktionsgleichgewichten erhalten sind, sowie die Bromtensionen von festem Br_2 zu $J_{Br_2} = 2,5 \pm 0,25$. Aus dem Dissoziationsgleichgewicht von Br_2 folgt weiter $J_{Br} = 1,89 \pm 0,20$. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 156—24. Danzig, Techn. Hochschule.)

ULMANN.

van Roy Mc Haffie, *Die Wirkung der Gegenwart eines „indifferenten“ Gases auf die Konzentration und Aktivität eines Dampfes, der mit einer kondensierten Phase oder einem System kondensierter Phasen im Gleichgewicht steht*. (Vgl. Mc Haffie u. Strebel, S. 330.) Die Wrkg. der Ggw. eines indifferenten Gases auf die Konz. u. Aktivität eines Dampfes, der mit einer kondensierten Phase oder einem System kondensierter Phasen im Gleichgewicht steht, wird thermodynam. behandelt; unter der Annahme, daß die Wrkg. nur auf die durch steigende D. des indifferenten Gases herbeigeführten Abweichungen des Dampfes von den Gesetzen idealer Gase beruht, werden die Gesetze abgeleitet, die den „relativen Aktivitätskoeffizienten“ des Dampfes zuordnen gestattet, wenn die Konz. c des Dampfes als Funktion des Druckes P des indifferenten Gases experimentell bestimmt wird. — Als Beispiel mißt Vf. die Konz. von Wasserdampf im Gleichgewicht mit $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ - Na_2SO_4 bei 25° in Ggw. von Luft bis zu 100 at Druck. Die c - P -Kurve hat zwischen 0 u. 23,8 at ein Maximum bei 23,8 at u. steigt oberhalb 77,6 at linear mit P ; zwischen 24 u. 77,6 at sind bei P 2 c -Werte möglich. Wird das Gemisch von $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ u. Na_2SO_4 mit Glaswolle vermennt, so hat die c - P -Kurve ein sehr steiles Maximum bei 25 at u. ein Minimum bei ca. 45 at; in Abwesenheit von Glaswolle fällt für $P > 19$ at bis zu einem Minimum bei 33 at. In beiden Fällen wurde außerdem unter anderen Bedingungen ein linearer Kurventeil zwischen 44 u. 76 at erhalten, der die Verlängerung des oberen geradlinigen Stückes darstellt u. wahrscheinlich einem gasförmigen Zustand entspricht. — Aus den Daten von POLLITZER u. STREBEL (Ztschr. f. physik. Ch. 110. 768; C. 1924. II. 1307) wird der relative Aktivitätskoeffizient von Wasserdampf im Gleichgewicht mit fl. Wasser bei 50° in Ggw. von Luft bis zu 100 at Druck berechnet. Die beobachteten Dampfkonzz. sind größer als die Theorie erfordert. (Philos. Magazine [7] 1. 561—83. London, Univ.)

KRÜGER.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

Otto Blüh, *Untersuchung von Kolloidpartikeln in Wechselfeldern verschiedener Frequenzen*. (Vgl. S. 2446.) Vf. klärt (von Prof. ORNSTEIN darauf hingewiesen) eine Unstimmigkeit in seiner Unters. über Abhängigkeit der Beweglichkeit von Kolloidpartikeln von der Frequenz auf. Es hatte sich eine Zunahme der Beweglichkeit mit zunehmender Frequenz ergeben, was durch Änderung der angewandten Differentialgleichung erklärt werden kann. (Ann. der Physik [4] **79**. 14. 1924. Prag.) LAS

A. Steopoe, *Beobachtung über den Mechanismus der Liesegangschen Erscheinungen*. Vf. beobachtete u. Mk. die Ag_2CrO_4 -Ringe in sehr dünner Gelatineschicht. Es sieht sich, daß die sichtbaren Ringe ihrerseits aus mehreren Ringen bestehen, so daß der Krystallisationsvorgang von Ag_2CrO_4 sich doppelt rhythm. abspielt. Eine Erklärung dafür gibt Vf. unter der Annahme (neben anderen üblichen), daß die bei Nucleusbildung entwickelte Wärme die Viscosität der Gelatine herabsetzt, wodurch die Diffusionsgeschwindigkeit der Ionen erhöht wird. (Bull. de Chimie pure et appl. **27**. 3—10. 1924. Sep.) BIKERM

A. Sivarama Menon, D. L. Shrivastava und Sheo Prasad, *Der Einfluß von Schutzmitteln auf die Größe koagulierter Teilchen*. Es wird der Einfluß der Schutzmittel *Akazien-gummi, Gummi arabicum, Natriumoleat* u. Zucker auf die Teilchengröße von koagulierten Teilchen der Sole des Arsens u. Antimonhydrosulfids u. des Mangan-dioxyds untersucht. Die Größenmessung der Teilchen geschah mit Hilfe des Ultramicros. Es zeigte sich, daß die Elutriationsgeschwindigkeit u. damit die Größe der Teilchen in einem aus geschützten Solen erhaltenen Koagulum stets beträchtlich größer sind als die aus ungeschützten Solen, u. daß die Teilchengröße mit der Menge des Schutzkolloids zunimmt. Außerdem ist die Teilchengröße im Koagulum abhängig von der ursprünglichen Größe der Kolloidteilchen u. von der Menge des koagulierenden Elektrolyten. — Man kann sich vorstellen, daß das Schutzkolloid eine Hülle um das Kolloidteilchen bildet, bei der Koagulation nicht durchbrochen wird, u. so die Größenvermehrung der Teilchen bewirkt. — Bei geschützten Kolloiden gilt bei der Koagulation durch ein-, zwei- u. dreiwertige Elektrolyte nicht die Beziehung zwischen den Größen, wie im Fall der ungeschützten Sole. Wahrscheinlich ist dies auf B. von Adsorptionsverbb. zwischen Schutzmittel u. Kolloidteilchen zurückzuführen. (Kolloid-Ztschr. **38**. 242—46. Benares, Indien.) LAS

Marcel Guichard, *Statische Untersuchungen über das System Wasser-Aluminiumhydroxyd*. Ein aus Nitrat durch NH_3 gefälltes Aluminiumhydroxyd enthielt nach Trocknung im Vakuum bei 18° 44 Teile W. auf 100 Teile Al_2O_3 , verlor einen Teil davon bei 180°, nahm aber bei der darauffolgenden Abkühlung eine geringere Menge W. auf, so daß sein W.-Gehalt nur 38% betrug. Diese Irreversibilität der W.-Al-Beziehung bzw. -Aufnahme ist noch ausgeprägter, sobald man von völlig entwässertem Material ausgeht. — Vf. unterscheidet zwischen dem Hydrat- u. dem absorbierten W. Das bei Zimmertemp. entstehende Trihydrat ist äußerst instabil, das Dihydrat zers. sich bei ca. 200° (unter 26 mm Druck Wasserdampf). (Vgl. Bull. Soc. Chim. de France **37**. 381; C. 1925. I. 2681.) (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 190—94.) BIKER

N. Isgaryschew und M. Bogomolowa, *Die Koagulation der Eiweißstoffe durch verschiedene organische Säuren im Zusammenhang mit deren Struktur*. (Vgl. S. 3300.) Eine alkal. Caseinlsg. wird mit HCl in Ggw. von Phenolphthalein neutralisiert u. mit der fraglichen Säure bis zur deutlichen Ausflockung titriert. Die dazu benötigte Säuremenge hängt von der Geschwindigkeit der Titration nicht ab. Die Reihe der Säuren nach steigender Koagulationsfähigkeit: Brenztraubensäure < Maleinsäure < Glutaminsäure < Mellitsäure < Eg. < Bernsteinsäure < Crotonsäure < Propionsäure < M.

< *i*-Buttersäure < Citronensäure < Capronsäure < Buttersäure < *p*-Oxybenzoesäure < Äpfelsäure < Milchsäure < Valeriansäure < *m*-Oxybenzoesäure < Fumar- < Asparagin < Weinsäure < Benzoesäure < Glykolsäure < Salicylsäure < Oxalsäure < Trichloressigsäure < Monochloressigsäure < Bromessigsäure < Oxalsäure < Trichloressigsäure < Monochloressigsäure < Bromessigsäure

Ein Zusammenhang mit der Stärke der Säure besteht nicht. Vff. bekennen zur Meinung, daß die Ausflockung von der B. unlöslicher Verbb. zwischen dem d u. dem Ausflockungsmittel herrührt. (Kolloid-Ztschr. 38. 238—42. Moskau, wiss. Inst.)

BIKERMAN.

Fürth, R. Pechhold, mit einem Anhang von R. Keller, Weitere Untersuchungen physikalischer Eigenschaften des Serums beim Zusatz wasserbindender Stoffe. (Biochem. 164. 9—17. — C. 1926. I. 325.)

LASCH.

William C. Arsem, Gelstruktur. Normale Gele bestehen aus einer assoziierten freien Phase; die erstere unterscheidet sich von einem Krystallgitter dadurch, die molekularen Einheiten nicht orientiert sind u. nur ein Teil der verfügbaren Valenzen zum Aufbau der Struktur verbraucht wird. Die assoziierte Phase ist als ein gedehnter fester Körper aufzufassen, dessen zahlreiche Hohlräume von molekularen Dimensionen mit der freien (fl.) Phase gefüllt sind. In segregierten Gelen sind die molekularen Einheiten ungleichmäßig verteilt u. die Zwischenräume erheblich. Die Erscheinungen der Syneresis, Segregation, Quellung u. Schrumpfung, Gang in den krystallisierten Zustand u. a. beruhen teils auf Änderung der Orientierung der Strukturelemente, teils auf Änderung in der Art u. dem Grade der Abhängigkeit der Restvalenzen. (Journ. Physical Chem. 30. 306—11. Schenectady, N. Y.)

KRÜGER.

Boutaric und G. Perreau, Einfluß einiger stabiler Kolloide auf die Ausbreitung von Solen und Suspensionen. (Rev. gén. des Colloids 4. 33—39. — C. 1926. I.)

BIKERMAN.

S. Burdon, Die Ausbreitung einer Flüssigkeit auf der Oberfläche einer anderen. Vgl. frühere Unterss. über die Ausbreitung von Fl. auf einer Hg-Oberfläche zu. en. Allerreinstes „Leitfähigkeitswasser“ breitet sich in Ggw. von Luft nur sehr langsam auf dem Hg aus. Spuren von Säuren beschleunigen den Vorgang sehr merklich, von Alkalien wird er völlig verhindert. Alle untersuchten Neutral- und auch HgCl₂ u. AgCl bewirken rasche Ausbreitung. Durch Veränderung der Konzentration kann die Geschwindigkeit variiert werden; Vf. beschreibt diese Erscheinungen photographisch. Darst. derselben. Die rasche Ausbreitung der sauren Lsgg. verläuft vermutlich auf chem. Reaktionen derselben mit dem Hg zurückzuführen. Ein Hg-Salz auf 10 Millionen Teile W. beschleunigt die Ausbreitung deutlich u. verleiht sich ein Tropfen verdünnter Säure rasch bis zu einem ganz bestimmten Grad aus u. hält dann an, um ebenso langsam wie reines W. sich weiterhin auszubreiten. Die während des raschen Stadiums der Ausbreitung bedeckte Hg-Fläche ist unabhängig von der Natur der Säure ab; sie ist proportional der Zahl der vorhandenen Moleküle u. bedeutend (etwa 10-mal) größer als sie sich bei B. einer monomolekularen Schicht des entsprechenden Hg-Salzes ergeben müßte. — Tropfen alkal., oder ammoniakal. Lsgg. breiten sich nach einer gewissen Induktionszeit aus, vermutlich auf CO₂-Aufnahme aus der Luft zurückzuführen ist. Elektrostatische, zur Oberfläche gerichtete Felder bis zu 4000 V sind ohne Einfluß auf die Ausbreitung; direkte Verb. mit Elektroden bewirkt folgendes: Wird ein Pt-Draht einer Batterie mit dem Hg, der andere mit dem W.-Tropfen verbunden, so breitet er sich auf alkal. Lsgg. aus, falls das Hg positiver Pol ist, ist es dagegen negativ, so wird die Ausbreitung verdünnter Säuren verhindert. Dadurch, daß der sich ausbreitende Tropfen den Kontakt mit der Elektrode verliert u. sich dann wieder zusammenziehen kann, können period. Oszillationen der Tropfen sich ausbilden; auch mit reinem W. tritt dies bei Anlegung von 400 V Spannung. Photograph. Aufnahmen dieser

Phänomene, auch der Ausbreitung eines Öltropfens auf einer W.-Oberfläche zu, daß eine gut sichtbare „Randzone“ dem sich ausbreitenden Tropfen vorausseilt wird auf verwandte Erscheinungen beim „Kriechen“ von W. über Glasflächen gewiesen. (Proc. Physical Soc. London **21** 148—60.) **FRANKENBURG**

Francis L. Usher, *Die Natur der Grenzflächenschicht zwischen einer wässrigen und einer nichtwässrigen Phase*. Wird eine wss. Gummiguttsuspension mit Teilchen von $1,3 \cdot 10^{-5}$ cm Radius mit der zur Flockung, d. h. zur Neutralisation der Teilchenladung erforderlichen Menge Eisenalaun versetzt, so ergibt sich aus der im Ndl. gehaltenen Fe-Menge für die Ladung eines einzelnen Teilchens $e = 1,45 \cdot 10^{-8}$ elektr. Einheiten. Aus der bei 23° bestimmten Beweglichkeit $v = 1,14 \cdot 10^{-4}$ cm/sec berechnet sich jedoch nach der Gleichung $v = 4\pi \eta v/K$. (DE.) (η = Viskosität, K = Ionenstärke), je nach den Annahmen über die Art u. die Dicke der das Teilchen umgebenden Doppelschicht Werte von der Größenordnung 10^{-5} bis 10^{-8} . Verss. an *Cuprocyanid*- u. *CdS*-Sol u. verschiedenen Elektrolyten zeigen, daß mit Ausnahme der wertigen Ionen das Flockungsvermögen in der gleichen Reihenfolge fällt wie das Löslichkeitsprod. der Verb. aus den flockenden u. den stabilisierenden Ionen steigt. Ein Maß für die Abnahme der Konz. der $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ -Ionen in Ggw. verschiedener Kationen dient die Verminderung der elektr. Leitfähigkeit, die beim Mischen gleicher Vol. Lsgg. von $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ u. KCl , MgSO_4 , BaCl_2 , PbCl_2 , MnSO_4 , ZnSO_4 , CdSO_4 , NiSO_4 , CuSO_4 , AgNO_3 , FeSO_4 , $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2$ u. FeCl_3 , verglichen mit der Summe der elektr. Leitfähigkeiten, eintritt. Für Suspensionen von *Mastix* u. As_2S_3 wächst der Flockungswert von KCl mit der Verd., während derjenige von CaCl_2 bzw. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ unverändert bleibt bzw. fällt. Der Flockungswert von *HCl* für *Mastixsol* ist von der Verdünnung unabhängig. Die Dauer der Flockung spielt dabei keine Rolle. Best. der Gleichgewichtskonz. der Elektrolyte in den geflockten Gemischen von *Mastixsol* u. KCl , $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ oder As_2S_3 -Sol u. PbCl_2 oder CaCl_2 ergeben, daß weniger die Konz. des flockenden Ions als der tatsächliche Flockungswert die Abhängigkeit des Flockungswerts von der Solkonz. entscheidet. Der Flockungswert nimmt mit der Verdünnung ab, wenn Anfangs- u. Gleichgewichtskonz. des Elektrolyten nahezu gleich sind, u. wenn der zugesetzte Elektrolyt nahezu vollständig von den Solteilchen gebunden wird; bei *Mastixsol* stehen H^+ u. die zweiwertigen Ionen in der Mitte. Die pro A. Partikel gebundene PbCl_2 -Menge steigt mit der Verdünnung. — Die experimentellen Ergebnisse lassen sich weder durch die Helmholtz'sche, noch durch die Gouy-Chapman (Journ. de Physique [4] **11**. 457 [1910]) Theorie über die Natur der elektr. Doppelschicht erklären. Vf. nimmt an, daß die Oberflächenschicht einer nicht wss. Fl. die sich in wss. Lsg. elektr. auflädt, ganz oder teilweise von elektrolyt. dissoziierten Molekeln gebildet wird, deren positive bzw. negative Atome oder Atomgruppen an der Oberfläche gegen die Fl. gerichtet sind. Bei der elektrolyt. Dissoziation halten die ursprünglich in der Oberfläche eingebetteten Ionen ihre Lage, während die entgegengesetzt geladenen in die umgebende Fl. diffundieren. Der — stets geringe — Dissoziationsgrad hängt von der Natur der Moll. der Oberflächenschicht u. ihrer Lage ab. Die bei Zusatz von stark adsorbierbaren Nichteлектроlyten u. von anderen Elektrolyten oder bei Verdünnung von Solen beobachteten Veränderungen der Stabilität u. Teilchenbeweglichkeit lassen sich durch Veränderungen der Zus. u. des Dissoziationsgrades der Oberflächenschicht erklären. (Trans. Faraday Soc. **21**. 406—24.) **Mysore [Bangalore], Univ.**

Rosalie M. Cobb und Frank S. Hunt, *Die Dispersion von gepulvertem Eigelb*. Vff. suchen durch vorsichtigen Zusatz von Alkali die schlechte Emulgierbarkeit getrocknetem, gealtertem Eigelb zu verbessern; sie nehmen an, daß die Absorption von freier Säure aus dem Lecithinmolekül beim Altern für die schlechte Emulgierbarkeit verantwortlich zu machen ist in Analogie zu Alterungserscheinungen bei Solen. (Vgl. S. 1486.) Die Quellbarkeit von Eigelb wurde durch Alkalizugabe beträchtlich

hrt; bei $p_H = 8,0$, bei der sich der ursprüngliche W.-Gehalt um 100% erhöht hatte das Eigelb seine körnige Struktur verloren, bei $p_H = 8,6$ ähnelte die Emulsion fl., gewöhnlichem Eigelb. Schon geringer Zusatz von Säure, der den p_H beeinflusste, flockte indessen die Emulsion aus. Vff. glauben, daß Alkali das chem. verändert u. daß der entstehende Körper durch große Quellbarkeit ausanet ist. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **21**. 18—22. Peabody, Research Hunt-Rankin Leather Comp.)

LOEWE.

van der Grinten, *Adsorption und Kataphorese*. Die Adsorption von Krystallan verschiedenen Körpern wurde untersucht u. gefunden, daß der Farbstoff in monomolekularer Schicht adsorbiert wird; vgl. PANETH u. VORWERK (Ztschr. physik. Chem. **101**. 445; C. **1922**. III. 857). Als Kolloide wurden benutzt: *Se*, *S*, *Au*, u. As_2S_3 . — 3 Arbeitsmethoden: 1. Einer Elektrolytlsg. von bestimmter Konz. eine Kolloidmenge zugesetzt, darauf die kolloiden Teilchen mit dem adsorbierten Elektrolyten entfernt u. die Konz.-Verminderung des Elektrolyten gemessen. — 2. Auf einer Seite einer Konz.-Kette von bestimmter EK. wurde eine Kolloidlsg. zugesetzt, auf der anderen dieselbe Menge W.; dann wurde die Änderung der EK. gemessen. — 3. Die Geschwindigkeitsdifferenz der Kataphorese einer Glassuspension in Elektrolyten verschiedener Konz. wurde gemessen, insbesondere in Lsgg. von Krystallviolett. Best. der adsorbierten Schichtdicke wurde diese Methode mit der colorimetr. Best. in einer bekannten Glasoberfläche adsorbierten Menge Krystallviolett kombiniert. Die Entfernung der kolloiden Teilchen aus der Lsg. erfolgte durch Zentrifugieren, Ultrafiltration oder durch Kataphorese. — Zur Best. der an den Glaslamellen adsorbierten Menge Krystallviolett wurden 30 kleine Objektdeckgläschen von 15·25 mm in. in 5 cm Lsg. getaucht. Darauf wurde die Lsg. durch Vergleich der Absorptionen colorimetr. untersucht. In einer $\frac{1}{20000}$ -n. Lsg. wurden $1,1 \cdot 10^{14}$ Moleküle $0,48 \cdot 10^{-7}$ g Krystallviolett pro qcm adsorbiert. Zur Messung der Geschwindigkeit der Kataphorese von verschiedenen Suspensionen bei Ggw. von Krystallviolett wurden die Bewegungen der Teilchen mit einem Ultramikroskop beobachtet. Die relative Geschwindigkeit der suspendierten Teilchen in bezug auf W., der Einfluß der Konz. des Krystallvioletts auf die Geschwindigkeit der Kataphorese einer Glassuspension u. von kolloidalem *Au* u. *Se* wurde gemessen. (Journ. de Chim. physique **19**—37.)

R. SCHMIDT.

Freundlich, *Über Adsorption*. Die Beziehungen zwischen *Oberflächenspannung* (*O.*) und *Adsorption* (*Ad.*) werden dargelegt. Stoffe, die die *O.* einer Fl. erniedrigen, sammeln sich an der Oberfläche an. Nach der Traubeschen Regel erniedrigen organ. Stoffe einer homologen Reihe die *O.* um so mehr, je höher sie in einer solchen Reihe stehen. Die Regelmäßigkeiten der *Ad.* werden als Gleichgewichtsvorgänge an Beispielen erläutert, die durch die „Adsorptionsisotherme“ $a = \alpha \cdot c^{1/n}$ darstellen lassen, worin a die adsorbierte Menge, c die Gleichgewichtskonz. in der Lsg., α u. $1/n$ Konstanten sind. — Nach HABER (Ztschr. f. Elektrochem. **50**. 521 [1914]) u. LANGMUIR beruht die *Ad.* auf Absättigung freier Restvalenzen an den Oberflächen der Körper. — Die relative Wirksamkeit hydrophober (Kohle) u. hydrophiler Stoffe (Silicagel) wird verglichen. — In der Streitfrage, ob es sich bei der *Ad.* von Elektrolyten, bei der eine Spaltung stattfindet, um einen einfachen chem. Austausch oder um eine spaltende Reaktion handelt, vertritt Vff. auf Grund mehrerer Erfahrungstatsachen die letztere Auffassung. — Die Best. der spezif. Oberflächen von Adsorbentien mittels radioaktiver Stoffe nach PANETH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1221; C. **1924**. II. 923) wird erörtert. — Verschiedene Erklärungen für die Ursache der Wirksamkeit einiger wichtiger Adsorbentien, wie Kohle, Silicagel u. Cellulose werden angeführt. Die Unters. von Adsorptionsvorgängen an Stoffen, die außer dem Adsorptionsvermögen auch eine katalytische chem. Reaktionsfähigkeit besitzen, wie die von KAUTSKY dargestellten

Oxyhydride des Si, wird als wünschenswert bezeichnet. (Cellulosechemie 7. 57. Beil. zu Papierfabr. 24. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie.) R. S.

F. G. Tryhorn und **W. F. Wyatt**, *Adsorption I. Adsorption aus Alkohol-B und Aceton-Benzolgemischen durch Cocosnußkohle*. Die Adsorption durch Cocosnußkohle von A. u. Bzl. bzw. Aceton u. Bzl. aus fl. Gemischen von A. u. Bzl. bzw. A. u. Bzl. u. den Gemischen der gesätt. Dämpfe wird bei 20° untersucht. Die Zus. gesätt. Dampfes über fl. Gemischen bestimmter Zus. wurde besonders ermittelt. A.-Bzl.-Gemischen ist die Zus. von Fl. u. Dampf bei 30,2 Mol-% A. ident.; im S. Aceton-Bzl. existiert keine konstante sd. Mischung. Werden die adsorbierten M. A. u. Bzl., bzw. Aceton u. Bzl. gegen die molare Zus. der Fl. oder des Dampfes getragen, so entstehen Kurven mit mehr oder minder deutlichen Knickpunkten. Besonders die Adsorptionskurve von A. aus A.-Bzl. hat einen scharfen Knick bei dem Gemisch mit 30,2 Mol-% A. A. wird durchweg selektiv adsorbiert. Die aus A.-Bzl. (Dampfphase) adsorbierte Acetonmenge ist bis zu 44 Mol-% Aceton dem Acetongehalt proportional, bis 72 Mol-% Aceton im Dampf wird Aceton, später Bzl. selektiv adsorbiert. Die Adsorption aus der Dampf- u. aus der fl. Phase ist — bis auf kleine Unterschiede — wahrscheinlich durch Capillarkondensation bewirkte Unterschiede — dieselbe Folgerung der Thermodynamik, daß ein adsorbierter Film, der im Gleichgewicht mit dem gesätt. Dampf steht, auch mit dem mit dem Dampf in Berührung befindlichen Dampf im Gleichgewicht sein muß, bestätigt sich also. (Trans. Faraday Soc. 21. 399—409. 1925.)

L. Gurwitsch, *Ein neues Verfahren zur Regeneration gebrauchter Entfärbepulver. (Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Adsorption.)* Die Arbeit deckt sich mit der von GURWITSCH u. GURWITSCH, S. 1781. (Kolloid-Ztschr. 38. 247—48. Baku.)

H. Freundlich und **H. Jores**, *Über die Viscosität und Elastizität von Seifenlösungen*. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 36. 241; C. 1925. II. 274.) Lsgg. von Na-Oleat mit 20% Konz. von ca. 20% sind nur zäh, nicht elast., unter dem Ultramikroskop klar u. zeigen keine erkennbare Strömungsdoppelbrechung. Lsgg. von Na-Stearat mit 20% Konz. zeigen ein verschiedenes Seifenkolloidverhalten, sind bis zu einer Konz. von 0,1% falls unelast., bei höheren Konz. ausgesprochen elast. u. zeigen merkliche Hysteresis. Die Fließelastizität im Sinne von SZEGVARI (Ztschr. f. physik. Ch. 108. 177; C. 1925. I. 2077) ist nicht konstant. Beim Altern der Stearatlsgg. nimmt Zähigkeit, Fließelastizität (nach einem anfänglichen Maximum) u. Hysteresis ab; bei Temp. ca. 20° verschwindet die Elastizität. 1%ige Lsgg. von Na-Ricinolat u. 0,2%ige von Na-Stearolat sind unelast. Gemischte Lsgg. von Na-Oleat u. Na-Stearat durch Erhitzen der Fettsäuren mit der berechneten Menge NaOH hergestellt und abgedampft, erweisen sich bei Konz., in denen die reinen Lsgg. der einzelnen Säuren völlig unelast. sind, als stark elast., bei konstantem Gehalt an Na-Oleat wächst die Elastizität mit dem Stearatgehalt, mit steigender Oleatkonz. nimmt die Elastizität ab, dann zu. Beim Altern sinkt Zähigkeit u. Elastizität. Na-Palmitat + Na-Ricinolat + Na-Stearat verhalten sich analog wie Na-Stearat + Na-Oleat. Bei Temperaturerhöhung geht die Elastizität stets verloren. Gemische von Na-Palmitat mit Na-Stearat bzw. Na-Palmitat zeigen starke positive Strömungsdoppelbrechung, die proportional mit dem Stearatgehalt wächst, beim Erhitzen verschwindet, beim Abkühlen wiederkehrt. Ultramkr. Beobachtung der reinen Lsgg. von Na-Oleat u. Na-Stearat u. ihrer Gemische ergibt, daß das Auftreten von Elastizität mit dem Ggw. stäbchen- oder fadenförmiger Teilchen zusammenhängt, die wahrscheinlich eine mesomorphe unbeständige Form des Na-Stearats darstellen, die allmählich in die beständigen flachen Krystalle übergeht. Die Beständigkeit der Fäden wird durch das Oleat, das selbst zur B. dieser Form neigt, erhöht. Außer den Fäden enthalten die Lsgg. kleine Kolloidteilchen, die längs eines Fadens eindimensionale Brownische Bewegungen ausführen; die Kraftwirkg. zwischen den Teilchen ist offenbar als Ur-

lastizität anzusehen. Zusatz von *Glycerin* zu Na-Stearatlsgg. begünstigt die örmige Abscheidung, *Lecithin* wirkt der Gelatinierung entgegen. Beim Stehen emische von Na-Stearat u. Na-Oleat an der Luft geht die positive Strömungs- brechung in negative über, die beim Erhitzen nicht verschwindet u. auf Ab- ung kleiner Mengen unl. Fettsäuren unter dem Einfluß von CO₂ beruht. (Kolloid- Beihefte 22. 16—37. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. für physikal. Chemie & trochemie.)

KRÜGER.

W. Mc Bain, C. E. Harvey und L. E. Smith, *Die scheinbare Viscosität der ren von Schießbaumwolle in verschiedenen Lösungsmitteln*. (Vgl. S. 2550.) Die ende Mitt. enthält die Ergebnisse der eingehenden Unterss., die die Vff. mit iedenen Mitarbeitern in den letzten Jahren ausgeführt haben. Es zeigte sich, r dieselbe *Nitrocellulose* u. ein bestimmtes Lösungsm. die Viscosität von folgenden ren abhängt: Vorgeschichte der *Nitrocellulose* (z. B. Trocknungsdauer u. -temp.) r Herst. (Temp., mechan. Behandlung) u. Aufbewahrung der Lsgg., Reinheit sungs- m. Es ergab sich ferner, daß entgegen den Angaben von DUCLAUX u. MAN (Bull. Soc. Chim. de France 22. 414; C. 1920. III. 233) der Anstieg der tätätskurve $\log(\eta/\eta_0)/c$ (η u. η_0 = absol. Viscosität der Lsg. bzw. des Lösungsm.) von der Natur des Lösungsm. abhängt. — Vff. verwenden eine in Ä.-A. 1. Nitro- se mit 12,10% N; die Lsgg. werden im allgemeinen durch 22-std. Schütteln o unter genau definierten mechan. Bedingungen hergestellt, u. die absol. Vis- bei 55° gemessen. Der Logarithmus der Viscosität ist der Konz. auch in den nteren Lsgg. nur annähernd proportional, in den konzentrierteren merklich als der Proportionalität entspricht. Der Temp.-Koeffizient der Viscosität r hoch. Beim Erhitzen der *Nitrocellulose* auf 60° steigt die Viscosität ihrer in *Äthylformanilid* bis zu einem Maximum nach ca. 12-std. Erhitzen u. fällt allmählich. *Nitrocellulose*, die aus *Aceton*lsgg. durch Eindampfen oder durch g mit W. wiedergewonnen wurde, ist schwerer l. u. gibt höhere Viscosität als sprüngleiche *Nitrocellulose*. Starkes mechan. Schütteln der Lsgg. vermindert viscosität; die Unterschiede zwischen vorsichtig u. stark geschüttelten Lsgg. i auch nach längerer Zeit bestehen. Einw. von Tageslicht verringert die Vis- etwas, ultraviolettes Licht zers. die *Nitrocellulose*. Erhitzen der Lsgg. auf Temp. vermindert die Viscosität dauernd. Beim Stehen bei 55° nimmt die ität etwa proportional mit dem Logarithmus der Zeit ab; nur in *Benzylform-* trat nach monatelangem Viscositätsabfall plötzlich Gelatinierung ein. In Ä.-Ä., Zus. von dem optimalen Gemisch stark abweicht, nimmt die Viscosität zunächst in solcher, auch in der Literatur bei anderen Lösungsm. erwähnter Anstieg langsame Adsorption des Lösungsm. u. Solvation, der Abfall auf Teilchen- nerung der kolloiden *Nitrocellulose* zurückzuführen; chem. Vorgänge (NO- tung u. Nitrierung des Lösungsm.) treten nicht ein. Die Alterungsgeschwindig- mmt stark mit der Temp. zu; Altern erfolgt jedoch auch noch bei Temp., bei das Lösungsm. erstarrt ist. In gealterten Lsgg. gilt die Proportionalität zwischen η_0 u. der Konz. in einem weiteren Bereich.

f. messen die absol. Viscosität der *Nitrocellulose*lsgg. in folgenden besonders gten Lösungsm.: *Aceton*, *Acetophenon*, *Benzophenon*, *Benzylformanilid*, *Ben- ylurethan*, *Diäthylphthalat*, *Äthylformanilid*, *Äthylphenylurethan*, *Formanilid*, *o-Toluidid*, *Methylphenylurethan*, *Methylcyanilid*, *Methyläthylketon*, *o-Tolyl-*, *o-Tolyloxaminsäureester*, *Phenylurethan*, *Phenoxyessigsäureester*, *Triacetin* u. *nylphosphat*. Der Quotient $\log(\eta/\eta_0)/c$ liegt zwischen 0,5 u. 2,2; je kleiner der nt, desto besser das Lösungsvermögen, d. h. desto größer die Fähigkeit des sm., die Restvalenzen, die die *Nitrocellulose*micellen zusammenhalten, unter B. olvaten zu lösen. Bei gleicher Konz. ist die zur vollständigen Auflösung erforder- Zeit dem Quotienten annähernd proportional. Die *Formanilide* sind bessere

Lösungsmm. als die Urethane u. die reinen Ester; in den homologen Reihen fällt das Lösungsvermögen mit steigendem Mol.-Gew. Das hohe Lösungsvermögen der Ester beruht auf der Ggw. kleiner Mengen von Verunreinigungen. Wird der Quotient $\log(\eta/\eta_0)/c$ gegen den Logarithmus der Alterungsdauer der Lsgg. aufgetragen, entstehen für die verschiedenen Lösungsmm. untereinander parallele Gerade. Nitrocellulose löst die Nitrocellulose bei sehr tiefen Temp. vollkommen, die Sole gelatinieren beim Erwärmen. Der Übergang $\text{Sol} \rightleftharpoons \text{Gel}$ ist reversibel, die Gele sind bei Zimmertemp. beständig. Bei längerem Erhitzen von Nitrocellulose mit absol. A. auf 120° entsteht eine gelbe Lsg.; die lösende Wrkg. ist wahrscheinlich der B. von Äthylnitrat zuzuschreiben. Ä. löst auch bei tiefen Temp. Nitrocellulose nicht. — Unter den Gemischen von Aceton-W., Methyläthylketon-W., Äthylphthalat-Benzophenon, Phenylurethan-urethan, Benzylformanilid-o-Methylecyanilid existieren Optima, bei denen die Viscosität ein Minimum hat; bei Gemischen von Formanilid-Form-o-toluidid u. Phenylurethan-Äthylphthalat tritt kein Minimum auf, die Viscosität ist aber höher, als sich nach der Viscosität der Lsgg. in den einzelnen Komponenten erwarten ließe. Zusatz von Bzl. zu Aceton (6:1) erhöht die Viscosität sehr stark. Das hohe Lösungsvermögen von Gemischen ist dadurch zu erklären, daß sie eine größere Mannigfaltigkeit von molekularen Gruppen, die mit gewissen Gruppen im Nitrocellulose reagieren können, enthalten, als die einzelnen Fl. (Journ. Physical Chem. 30, 1925, 1 bis 52. Bristol, Univ.)

Krü

C. Mineralogische und geologische Chemie.

Paul Niggli, *Baugesetze krystalliner Materie*. Es wird eine ausgedehnte systematische Morphologie der Krystalle gegeben. (Ztschr. f. Krystallogr. 63. 49—121. Zürich.)

G. Tschernik, *Chemische Analyse eines Eudialits und seines Umwandlungsprodukts (Chibinsk-Tundra)*. Das Mineral kommt in Nephelinsyenit vor u. ist ausnahmslos Ägirin. Durchsichtig, rot (von violettrosa bis braunrot), Glasglanz, von rosa bis fleischroter Strich. Härte 5—6. Wird durch HCl leicht zers. Zus.: 0,71% Na_2O , 13% Na_2O , 0,02% MgO , 12,1% CaO , 1,4% MnO , 7,2% FeO , 1,5% Fe_2O_3 , 11,9% TiO_2 , 1,8% TiO_2 , 47,6% SiO_2 , 0,96% Cl , 1,07% W . An der Luft zerfällt Eudialit allmählich zu einem braungelben Pulver, welches weniger Chlor, Alkali u. FeO , mehr Fe_2O_3 , Mg , Ca u. Mn enthält. — Eine chem. Ähnlichkeit mit dem Eudialit zeigt das braune Mineral, *Eukolit*. (Bull. Acad. St. Petersburg [6] 1925. 711—20. Moskau, Univ.)

E. Tschirwa, *Scorodit aus der Beresowski-Mine (Ural)*. An drei Scoroditkrystallen wurde im Mittel das Achsenverhältnis $a:b:c = 0,86785:1:0,9611$ gefunden. (Bull. Acad. St. Petersburg [6] 1925. 731—42. St.-Petersburg, Univ.)

Wilhelm Adolphi, *Über russisches Platinerz*. Zusammenfassender Bericht über die Produktion von Pt u. Analysen von Platinerz. (Chem.-Ztg. 50. 232—33.)

Y. Brière, *Über das Vorkommen von Uraninit (Pechblende) in gewissen Pegmatiten von Madagascar*. Pechblende wurde in einem Glimmerpegmatit bei Fianarantsoa neben anderen Pegmatitmineralien (hauptsächlich Titanotantalaten u. Niobaten) u. bei Vohémar in Stücken, welche wahrscheinlich auch aus einem solchen Pegmatit stammen, gefunden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 641—42.)

H. Schneiderhöhn, *Erzführung und Gefüge des Mansfelder Kupferschiefers*. (Erz 23. 143—46. Freiburg i. Br.)

R. Bärtling, *Über metasomatische Schwerspattlagerstätten in Deutschland*. (Dtsch. Geol. Ges. Abt. B 78. 32—43. Berlin.)

A. Bigot, *Kaoline, Tone usw. Bildung der ölhaltigen Tonschiefer*. Die sedimentären Tone, welche meist organ. Substanz (bis 1,5%) enthalten, erhärten beim Erhitzen auf 400° , ohne daß sie vollständig entwässert sind. Beim Behandeln mit W . u. HCl werden sie dann nicht mehr plast. Eine andere schieferartige Reihe der Tone ist von

hart u. erweicht beim Behandeln mit W. nicht. Bei der Behandlung eines plast. unter Druck wird ein Teil des W. ausgepreßt u. der Ton nimmt schiefrige Befenheit an. Manche Tone blättern nach der Behandlung mit 6000 kg/qcm Druck Glimmer. Die ölhaltigen Tonschiefer können sich aus den Tonen mit organ. en durch Druckerhöhung, wobei wahrscheinlich auch eine Erhöhung der Temp. treten ist, gebildet haben. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 634—35.) ENSZLIN.

A. Lacroix, *Die Systematik der Leucitgesteine: Die Typen der syenitischen Klasse.* Ordnung der Gesteine in ein System. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 597 bis ENSZLIN.

Th. Moureu, A. Lepape, H. Moureu und M. Geslin, *Zusammensetzung (ge-liche Gase und Edelgase) der Gase einiger Thermalquellen von Madagascar und Réunion.* Vff. haben von den Gasen von 11 Quellen genaue Analysen angefertigt. Hauptmenge ist CO_2 . Mit Ausnahme bei einem Fall beträgt der Gehalt derselben —99,33%. Der Gehalt an O_2 ist von Spuren bis 0,146%, an brennbaren Gasen 26%, an N_2 0,63—10,14%, an Ar + Spuren von Kr u. Xe 0,011—0,237%, e + Ne 0,00005—0,012%. Eine Ausnahme macht die Quelle de la Montagne r 0,55% CO_2 , Spuren O_2 u. brennbaren Gasen, 97,55% N_2 , 1,35% Ar + Kr + Xe 6% He + Ne. Der Gehalt an Edelgasen wird mit dem n. Luft verglichen. d. l'Acad. des sciences 182. 602—05.) ENSZLIN.

Leinrich Mache und Felix Kraus, *Über den Radiumgehalt der Thermen von Gastein Karlsbad.* Es wurden Messungen des Radiumgehalts an den Gasteiner u. Karls- Thermen vorgenommen. In Gastein schwankt der Gehalt an Ra bei den ver- enen Quellen sehr stark. Er beträgt 0,2—154 Billionstel g im l. In Karlsbad r für alle Quellen eine ziemliche Konstanz. Der Gehalt beträgt 34,7—53,9 Bil- l g im l. Daraus wird der Schluß gezogen, daß die Karlsbader Quellen alle gemeinsamen Urquelle entstammen, während die Gasteiner Quellen nicht so usammengehören. (Physikal. Ztschr. 27. 205—06. Wien. Techn. Hochschule, sikal. Inst.) ENSZLIN.


D. Organische Chemie.

Thomas-Martin Lowry, *Experimentelle Beweise der Existenz von semipolaren Bindungen.* (Vgl. S. 1129.) Nachzutragen ist, daß die Hypothese, wonach $>\text{C}$ im normalen Zustande stets apolar, im aktivierten Zustand dagegen stets lar ist, aber in den aktivierten Zustand nur bei Ggw. von polaren Moll. über- t werden kann, durch die Verss. von NORRISH u. JONES (S. 2525) bestätigt Die apolare $>\text{C}=\text{O}$ wird durch ultraviolettes Licht semipolar gemacht; Vf. , daß die Energie dieser Umwandlung mit einem ultravioletten Energiequantum stimmt. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 203—06.) BIKERMAN.

Krawetz, *Neue Wege der komplizierten organischen Synthese aus Elementen.* umfassende Abhandlung. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 335—37.) BIK.

I. Faworski und T. Salesskaja-Kibardina, *Über die Dehydratation der pri- Alkohole mit tertiären Radikalen.* (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 287—96. — C. 1926. I. 873.) BIKERMAN.

Dolgorukowa-Dobrijanskaja, *Über die Dehydratation der α -Glykole.* Nach SKI (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 38. 741; C. 1907. I. 15) bildet Äthylen- bei Dest. mit konz. H_2SO_4 Diäthylenäther u. seine Zersetzungsprodd., Acetaldehyd en Äthylenacetal. Vf. untersuchte die Veränderungen des *i*-Butylenglykols, $\text{C}(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\text{OH}$, (Kp. 174—176°) bei Dest. mit konz. H_2SO_4 (3 Tropfen auf 35 g) bei 65—95° oder mit rauchender HBr (4 Tropfen auf 48 g Glykol) bei 85—93°. iden Destillate wurden vereinigt. Das Gemisch bestand aus ca. 18 g *i*-Butyr-



aldehyd, 5 g Zwischenfraktion u. ca. 34 g V
 $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$, die, durch Dest. über Na gereinigt, K
 136—137°, D.²⁰₀ 0,84 609, D.₀ 0,90 661 hatt

mit 20/ig. KMnO_4 (3 O auf 1 Mol. Substanz) bei Zimmertemp. Aceton, Amei
 Essig- u. i-Buttersäure lieferte. Das Entstehen der i Buttersäure macht die ne
 stehende Formel für die Verb. wahrscheinlich. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges.
 283—86. 1925. St.-Petersburg, Univ.)

BIKERMA

I. Mazurewitsch, Darstellung der primären aliphatischen Amine durch Redu
 der Phenylhydrazone und Oxime von Ketonen und Aldehyden. (Journ. Russ. Pl
 Chem. Ges. 57. 221—33. 1925. — C. 1925. II. 2254.)

BIKERMA

I. Mazurewitsch, Über die Reduktion der aliphatischen und aromatischen Alde
 und Ketazine mittels Aluminiumamalgams. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57.
 bis 250. 1925. — C. 1926. I. 2335.)

BIKERMA

C. Sannié, Der Mechanismus der Synthese von α -Aminosäuren mittels der Stre
 schen Reaktion. II. Über das Verschwinden von Ammoniak und die Zwischenreaktie
 (I. vgl. S. 2195.) Vf. sucht den tatsächlichen Verlauf der durch die Bruttogleich
 $\text{CH}_3 \cdot \text{CHO} + \text{HCN} + \text{NH}_3 = \text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{NH}_2) \cdot \text{CN} + \text{H}_2\text{O}$ ausgedrückten Rk. d
 kinet. Messungen aufzuklären. Er titrierte im Reaktionsgemisch gleichzeitig
 (in Ggw. von Phenolrot) u. α -Aminopropionsäurenitril (in Ggw. von Helianthin).
 den ersten Std. entsprach bei 0° die verschwundene NH_3 -Menge ungefähr der gebild
 Nitrilmenge u. der (aus I bekannten) verschwundenen HCN -Menge, später (n
 24—48 Std.) fing aber die NH_3 -Menge wieder anzusteigen an, die Nitrilmenge dag
 abzunehmen, während HCN schon beinahe vollständig verbraucht ist. Bei 20°
 HCN vom Anfang an schneller verbraucht als NH_3 u. das Nitril in einer gering
 Menge gebildet, als dem HCN -Verbrauch entsprechen sollte; das Minimum der N
 Konz. u. das Maximum der Nitrilkonz. findet bereits nach 12 Std. statt. Man f
 also zwei Reaktionsstadien unterscheiden: das der Aminonitrilbildung u. das se
 Zerfalls. Im ersten sind zwei Reaktionswege denkbar:

- (1) $\text{CH}_3 \cdot \text{CHO} + \text{NH}_3 = \text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{NH}_2$ mit
 $\text{CH}_3 \cdot \text{CHOH} \cdot \text{NH}_2 + \text{HCN} = \text{CH}_3 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{CN} + \text{H}_2\text{O}$
- (2) $\text{CH}_3 \cdot \text{CHO} + \text{HCN} = \text{CH}_3 \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CN}$ mit
 $\text{CH}_3 \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CN} + \text{NH}_3 = \text{CH}_3 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{CN} + \text{H}_2\text{O}$


Die Rk. des Aldehydammoniaks mit HCN hat aber einen anderen Verlauf
 die vorher untersuchte unter gleichen Konzentrations- u. Temperaturbedingun
 Sie ist beträchtlich früher beendet; eine zu hohe NH_3 - u. eine zu geringe Aminon
 konz. (im Vergleich mit der HCN -Konz.) herrscht vom Anfang an, was mit der Ami
 DELÉPINES übereinstimmt, wonach aus Aldehydammoniak u. HCN gleichzeitig
 das Amino- u. das Iminonitril entstehen. Das Oxynitril bildet sich in alkal. Lsg.
 in Bedingungen der Streckerschen Rk., nur mit KOH statt NH_4OH) nach der Rk.
 so langsam, daß es ein wesentliches Zwischenprod. nicht zu sein schien, aber sein U
 gang ins Aminonitril hat eine so große Ähnlichkeit mit dem in der Bruttork. gemess
 Vorgang (man erhält zahlenmäßige Übereinstimmung der Reaktionskonstanten)
 daß das Vorherrschen der Rk. (2) unzweifelhaft erscheint. Es muß also angenom
 werden, daß die B. des Oxynitrils durch NH_3 katalyt. beschleunigt wird. — Der Zei
 des Aminonitrils kann sich gleichfalls auf zweifache Weise vollziehen (im Dunkl
 (3) $2 \text{CH}_3 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{CN} = \text{NH}_3 + \text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{CN}) \cdot \text{NH} \cdot \text{CH}(\text{CN}) \cdot \text{CH}_3$ u.
 (4) $\text{CH}_3 \cdot \text{CHNH}_2 \cdot \text{CN} + \text{CH}_3 \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CN} = \text{H}_2\text{O} + \text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{CN}) \cdot \text{NH} \cdot \text{CH}(\text{CN}) \cdot \text{CH}_3$

Das α -Aminopropionitril (aus dem Sulfat, F. 206—208° auf dem Maquennese
 Block, dargestellt) kondensiert sich in einer bimolekularen Rk.; $K_2 = \text{ca. } 0,0113$
 (Min., Mol./l, 20°). Die Rk. (4) ist gleichfalls bimolekular, $K_2 = \text{ca. } 0,0113$. Obw
 sie die raschere ist, muß die Abnahme der Aminonitrilkonz. in der Bruttork. d

k. (3) bewerkstelligt sein, da dabei auch NH_3 entsteht. (Bull. Soc. Chim. de France 9. 254—73.)

BIKERMANN.

1. Sannié, *Der Mechanismus der Synthese von α -Aminosäuren mittels der Strecker-Reaktion*. III. (II. vgl. vorst. Rf.) Vf. meint, daß auch die B. vom Oxynitril in 3 Stufen erfolgt:



die erste Rk. durch NH_3 beschleunigt wird. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 74—78. Paris, Fac. de médecine.)

BIKERMANN.

Kurt Maurer, *Synthese des Sarkosin-glucosids*. (I. Mitt. über Reaktionen zwischen α -Aminosäuren und Aminosäuren.) Zucker u. Aminosäuren wurden in *N*-glucosid. Bindung eingeleitet. Ob solche Glucoside den in biolog. Hinsicht wichtigen Glucoproteiden, bei Hydrolyse Zucker u. Eiweißstoffe gefunden wurden, zugrunde liegen, bleibt noch zweifelhaft, da dort meistens 2-Aminoglucose erhalten wurde. Als gangbar ist der von SABALITSCHKA (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 31. 439; C. 1922. I. 542) vorgeschlagene Weg über *Acetobromglucose*. Diese wurde in *Glykokollester* bzw. *Sarkosinester* übergeführt. Das Bromhydrat des im Überschuß angewandten Esters krystallisiert dabei als Glucosid, das durch Extraktion mit Ä. gewonnen werden kann. Die Rk. verläuft einheitlich, was auf die Reaktionsfähigkeit der beiden H-Atome am Glykokol zurückzuführen ist. Der isolierte Sirup bräunt sich deshalb beim Stehen unter Luft. Mit Sarkosinester wurde das gut krystallisierende *O*-Tetraacetylsarkosinester erhalten. Eine Verseifung war nicht durchführbar, dagegen wurde das Amid sarkosin-glucosids erhalten. Das Glucosid ist gegen Säuren u. Alkali sehr empfindlich und wird sofort zerlegt. Hieraus, wie aus der Synthese wird die Konst. abgeleitet. Auflösen in 0,1-n. HCl nahm die Drehung den Wert für die bei der Hydrolyse entstehende Glucose an. Die Titration des in 0,1-n. NaOH gel. Glucosides mit Hypochlorit nach WILLSTÄTTER u. SCHUDEL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 780; C. 1918. II. 123) gab fast quantitativ die bei der Hydrolyse entstehende Menge Traubenzucker. Die Lsg. wurde reduziert. — *O*-Tetraacetylsarkosinester-glucosid, $\text{C}_{19}\text{H}_{29}\text{O}_{11}\text{N}$. Nadeln aus Methanol. F. 87—88°, ll. in A., Ä., Chlf., Bzl., unl. in W. u. Lg. — *Inamidglucosid*, $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{O}_6\text{N}_2$, aus vorst. Verb. u. methylalkoh. Ammoniak, harte Nadeln, aus absol. A., F. 169—170° unter Aufschäumen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 77—79. Jena, Univ.)

KAHN.

Carl Neuberg und Martin Behrens, *Über die enzymatische Abspaltung von Rohrzucker aus Salzen der Saccharosephosphorsäure*. Saccharosephosphorsäure (Fructose-6-Phosphorsäure) zeigt in der Konst. eine Analogie zu Raffinose (Fructose-Glucose-6-Phosphorsäure), so daß es von Interesse ist, die der Spaltung der Raffinose zu Rohrzucker + Glucose (NEUBERG, Biochem. Ztschr. 3. 519 [1907]) entsprechende Hydrolyse zu Rohrzucker + anorgan. Phosphorsäure zu untersuchen. Diese Spaltung kann mit der Saccharase freien *Phosphatase* der Niere durchgeführt werden. Aus 58,5 g *Natriumhexaphosphat* (wasserfreies Salz) wurden im besten Falle 10,64 g (entsprechend der Theorie) Rohrzucker erhalten; diese Spaltung erfolgte in Ggw. von Toluol (100 ccm) mit 1300 ccm Fermentlsg. aus Pferdenieren (290 g Nieren + 580 ccm 0,85% ig. Lsg.) in einem Monat bei $\text{pH} = 7,3$ u. 37°. — Calciumsaccharophosphat wird nach dieser Weise gespalten. (Biochem. Ztschr. 170. 254—64. Berlin Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst.)

HESE.

Kretow, *Über die Herstellung von Cyanverbindungen aus Calciumcyanamid und Dicyandiamid*. Die Ausbeute an Dicyandiamid kann gesteigert werden, wenn man nicht mit reinem W., sondern mit wss. Al_2SO_4 -Lsg. zersetzt; sie erreicht dann 90%. Auch bei Verwendung von verd. H_2SO_4 wird 90% CaCN_2 in Dicyandiamid überführt. Übrigens geht auch bei der gewöhnlichen Zers. mit W. der gebundene

N nicht verloren, weil er hauptsächlich als NH_3 entweicht, das leicht absorbiert v kann. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 350—52.)

R. F. Hunter, Ringkettentaotomerie. II. Das Vorkommen von Tautomen Dreikohlenstofftyps zwischen einer homocyclischen Verbindung und ihrem ungesätt. Isomeren. Vf. diskutiert die theoret. Seite der Michaelrk. (Kondensation zw α, β -ungesätt. Estern u. Cyanessigestern) bzgl. der verschiedenen Isomeriefälle. News 132. 181—86. Highbury New Park.)

Philip William Benson Harrison, Joseph Kenyon und John Robert She Untersuchungen über die Abhängigkeit der Drehung von der chemischen Konst XXVIII. *d*-sek-Butylbenzol. (XXVII. vgl. S. 1538.) Vff. beschreiben eine M zur Herst. des akt. sek-Butylbenzols in anscheinend opt. einheitlichem Zustand Herst. gelingt über das *p*-Nitro-*sek*-butylbenzol u. *p*-Amino-*sek*-butylbenzol, aus w sich durch fraktionierte Krystallisation der sauren Tartrate die akt. Aminov weiter durch Elimination der NH_2 -Gruppe *d*-sek-Butylbenzol gewinnen läßt. C FELD u. WERTHEIM (Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 2682; C. 1922. II. 352) für ihr akt. *p*-Amino-*sek*-butylbenzol einen 60-mal zu kleinen Wert der Drehu Die Dispersionskraft ist für das Amin $\alpha_{4350}/\alpha_{5461} = 1,87$ u. 1,81 für den KW Die hohe Dispersionskraft ist vielleicht durch den Benzolkern hervorgerufen, diesen zum cyclo-Hexan zu reduzieren, schlugen fehl.

Versuche. *sek*-Butylbenzol vom Kp. 168—173° (nach KLAGE, Ber. Chem. Ges. 35. 2641 [1902]) liefert bei 15—20° nitriert im wesentlichen *p*-Ni butylbenzol neben wenig der *o*-Verb. Das Gemisch gibt mit Sn u. HCl reduz über die neutralen Oxalate fraktioniert *d, l*-*p*-Amino-*sek*-butylbenzol, Kp.₁₅ 118° 0,949, Acetylderiv., F. 123°. Aus dem Aminoderiv. läßt sich mit d-Weinsäure 30-faches Fraktionieren über das saure Tartrat *d*-*p*-Amino-*sek*-butylbenzol her Kp.₁₂ 114°, D.₄²⁰ 0,945, $[\alpha]_{5461}^{20} = +40,98^{\circ}$ (homogen); *d*-*p*-*sek*-Butylacetanilid, F. $[\alpha]_{5461}^{20} = +28,0^{\circ}$ (Chlf.). Aus dem Amin über das *d*-sek-Butylbenzoldiaz chlorid *d*-sek-Butylbenzol, Kp. 172°, D.₄²⁰ 0,8639, $n_{5461}^{25} = 1,4915$. Dem Einwan während der NH_2 -Eliminierung eine Racemisation eintritt, begegnen Vff. in der daß sie partiell aufgelöste Aminofractionen desamidieren u. ein konstantes Ver der Drehung desamins zum resultierenden KW-stoff finden. (Journ. Chem London 1926. 658—63. London, Polytechn.)

H. Shipley Fry und Irvine W. Grote, Ein Muster für die Sandmeyerreakti spezielle Anwendungen. Vff. geben eine allgemeine Arbeitsvorschrift für die meyerreaktion an, die sich besonders für aromat. Amine eignet. Es erwies si vorteilhaftesten, 1 Mol.-Äquivalent desamins in 10 Mol.-Äquivalenten 50%ig. säure zu lösen u. 1 Mol.-Äquivalent Cuprosalz zu benutzen. Ob man bei 0— bei 100—105° arbeitet, ist von keinem nennenswerten Einfluß auf die Ausbeu wurde Cl, Br u. J in *p*-Chloranilin, *p*-Bromanilin u. *p*-Jodanilin eingeführt. beute ca. 76%. Statt der Cuprosalze ließen sich auch Cupriversb. verwend Cuprichlorid war die Ausbeute um 20—30% geringer, mit Cupribromid aber um höher. Ferner wurde Cl u. Br in *o*- u. *m*-Chloranilin u. in *o*-, *m*- u. *p*-Nitro eingeführt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 710—14. Cincinnati [O.], Univ.)


L. Galatis, Über den Essigsäureester des *p*-Aminophenols. Am O acetyl *p*-Aminophenol kann durch direkte Acetylierung nicht gewonnen werden, w Acetylierungsmittel entweder auf die Aminogruppe allein einwirken oder das Di deriv. liefern. Es gelang, die O-Acetylverb. darzustellen durch Acetylierung der verb. mit Essigsäureanhydrid in alkal. Lsg. u. nachfolgende Abspaltung der l gruppe. Die Schwierigkeit, die Hydrolyse der Benzalverb. ohne gleichzeitige Absp der Acetylgruppe zu bewirken, wurde dadurch beseitigt, daß der Prozeß in der durchgeführt wurde, indem man zwar in Ggw. einer Mineralsäure arbeitete, d stehenden Benzaldehyd aber, der wegen der Umkehrbarkeit der Rk. entfernt

nicht, wie sonst üblich, mit Dampf abdestillierte, sondern durch Ä. oder Bzl. rnte. Beim Schütteln der Bzl.-Lsg. des *acetylierten Benzal-p-aminophenols* mit beliebig verd. Mineralsäure entsteht das dieser Säure entsprechende Salz des *acetyl-p-aminophenols*, u. aus diesem durch NaHCO_3 der freie Ester. — *Acetylbenzal-p-aminophenol*, Nadeln aus Bzl., F. 92° . Gegen 20% ig. Alkali in der Kälte ziemlich ndig. — *O-Acetyl-p-aminophenol*, $\text{CH}_3\cdot\text{CO}\cdot\text{O}\cdot(1)\text{C}_6\text{H}_4\cdot(4)\text{NH}_2$, Blättchen aus PAe., F. 75° , Kp.₁₄ $173\text{—}174^\circ$. Die wss. Lsg. zerfällt beim Erhitzen auf 150° in inophenol u. Essigsäure, sie liefert mit Essigsäureanhydrid das *Diacetyl-p-aminophenol* (F. 152°). — *O-Acetyl-p-oxybenzal-p-aminophenol*, aus *O-Acetyl-p-aminophenol* *Oxybenzaldehyd*, F. $181\text{—}182^\circ$, gelbe Krystalle aus Toluol. — *p-Oxybenzal-p-aminophenol*, ziegelrotes Pulver, aus Xylol, F. 208° . (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 848—50. Phaleron bei Athen, Chem. Lab. des Marineministeriums.) KAHN.

Zuckermann, *Chlorbenzol und seine wichtigsten Derivate*. Es wurden folgende ationen eingehend studiert: 1. Nitrieren des Chlorbenzols nach SCHAARSCHMIDT (Dtsch. Chem. Ges. **57**. 2065; C. **1925**. I. 362). 2. Trennung von o- u. p-Chlorbenzol. 3. Überführung des *o-Chlornitrobenzols* in *o-Nitroanisol* (vgl. BLOM, Helv. Acta **4**. 298; C. **1921**. III. 1232) bei Einw. von alkoh. NaOH. Vf. fand, daß die entrationserhöhung unter 3—4 at Druck die Rk. beschleunigt, aber auch die eute am Nebenprod. (*o-Chlorazoxybenzol*, $\text{CC}_6\text{H}_4\cdot\text{N}\begin{array}{c} \diagup \text{O} \\ \diagdown \end{array}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}$) erhöht, daß die

Azoxyverb. der von Nitroanisol zeitlich vorangeht, u. daß man am zweckmäßigsten ohne Überdruck arbeitet u. denselben nur wirken läßt, wenn die Alkalinität sg. um ca. 50% abgenommen hat. 4. Red. des *o-Nitroanisols* zum *o-Anisidin* u. *azoanisol*. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] **2**. 338—42.) BIKERMAN.

Arthur J. Hill und **Isadore Rabinowitz**, *Einige Amidine vom Holocaintypus*. I. eventuell die physiol. Eigenschaften des *Holocains* (I) zu verbessern, haben Verb. hergestellt, in denen Teile des Holocainmol. durch andere Gruppen ersetzt u. zwar A) Verb., in denen die Methylgruppe des Holocains durch Äthyl-, Propyl-, i-Butyl- u. Benzyl-, ferner solche, in denen eine Phenetidingruppe B) Amino (II), C) durch Dialkylamino- (III) ersetzt ist, endlich D) Kombinationen u. B. Zur Identifizierung werden einige der neuen Amidine in die entsprechenden Glyreide (IV) übergeführt.








Experimentelles. Aus den entsprechenden Imidoätherhydrochloriden u. l.-Äquivalent p-Phenetidin in Ä. wurden nach 21-tägigem Stehen bei Zimmer erhalten: *Bis-[p-äthoxyphenyl]-acetamidin* (*Holocain*) in $12,3\%$ ig. Ausbeute, $7\text{—}118^\circ$, l. in A., unl. in W., *Bis-[p-äthoxyphenyl]-valeramidin* in $6,7\%$ ig. Ausbeute, F. 96° , l. in A., Ä., Bzl., unl. in W. u. *Bis-[p-äthoxyphenyl]-phenylacetamidin* in 5% ig. Ausbeute, F. 111° , l. in A., unl. in W. — Durch Behandlung der freien äther mit 1 Mol.-Äquivalent p-Phenetidin in Ä. erhielt man: *p-Äthoxyphenyl-nitramidin*, in 30% ig. Ausbeute, F. $111\text{—}113^\circ$, l. in A., Ä., Bzl., unl. in W., *p-Äthoxyphenyl-valeramidin* in 31% ig. Ausbeute, F. 86° , l. in A., Ä., Bzl., unl. in W. u. *p-Äthoxyphenyl-phenylacetamidin* in 15% ig. Ausbeute, F. $88\text{—}89^\circ$, l. in A., Ä., Bzl., unl. in W. us 20 g p-Phenetidin u. 2 Mol.-Äquivalent Propion-, Butter- oder i-Valerian wurden folgende Acylphenetidine gewonnen, die sämtlich in Platten krystallin, swl. in W. u. l. in A. waren: *Propionyl-p-phenetidin*, F. 120° , *n-Butyryl-p-phenetidin*, F. $108\text{—}110^\circ$, *i-Valeryl-p-phenetidin*, F. 122° . — Diese Acylverb. er mit p-Phenetidin in Bzl. bei Ggw. von PCl_3 folgende symmetr. Amidine, die

in Nadeln krystallisierten, in A. l. u. in W. unl. waren: *Bis*-[*p*-äthoxyphenyl]-*pr*-amidin, F. 84°, *Bis*-[*p*-äthoxyphenyl]-*butyramidin*, F. 106°, *Bis*-[*p*-äthoxyphenyl]-*i*-*valerianamidin*, F. 108°. Wenn anstatt *p*-Phenetidin Diäthylamin verwandt wurde, entstand *p*-Äthoxyphenyldiäthylacetamidin (III) in 24%ig. Ausbeute, F. 119–121 in Ä., A., Aceton, Bzl., unl. in W. — Aus den Amidinen u. Phenyl-*i*-cyanat werden folgende Phenylureide als Nadeln erhalten: *Bis*-[*p*-äthoxyphenyl]-*acetanilid*-phenylureid, F. 164–165°, *Bis*-[*p*-äthoxyphenyl]-*propionamidin*-phenylureid, F. 166–167°, *Bis*-[*p*-äthoxyphenyl]-*butyramidin*-phenylureid, F. 105°, *Bis*-[*p*-äthoxyphenyl]-*n*-*amidin*-phenylureid, F. 102–103°, *Bis*-[*p*-äthoxyphenyl]-*phenylacetamidin*-phenylureid, F. 118°, *p*-Äthoxyphenylacetamidinphenylureid, F. 164° u. *p*-Äthoxyphenyl-*n*-*amidin*-phenylureid, F. 158°, sämtlich l. in A., unl. in W. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 732–37. New Haven [Conn.], Yale Univ.) WINKELMANN


Tudor Williams Price, Die Zerlegung substituierter Carbamylchloride durch Oxyverbindungen. II. Der Einfluß der Oxyverbindung. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 1925. 115; C. 1924. I. 2777.) Untersucht wurde die Rk. zwischen Phenylmethylcarbamylchlorid u. verschiedenen Oxyverb. Das Carbamylchlorid wurde in einem Reaktionsgefäß der Oxykomponente im Rohr eine gemessene Zeit auf 100° erhitzt u. die Rk. durch Best. des jeweilig unveränderten Carbamylchlorides verfolgt. Die Best. folgten entweder nach der in I. (l. c.) beschriebenen Methode oder in der Weise, daß die Reaktionslg. mit 1/10-n. KOH titriert, darauf ammoniakal. gemacht, mit PAc. versetzt, die wss. Lsg. mit HNO₃ angesäuert u. mit 1/10-n. AgNO₃ titriert wird. Aus der Differenz zwischen Gesamt-Cl u. HCl-Cl läßt sich die Menge des Carbamylchlorids berechnen. Nach der beschriebenen Methode wurde eine Reihe von aliph. u. arom. Oxyverb. untersucht u. die Resultate diskutiert. (Journ. Chem. Soc. London 1925. 653–58. Bradford, Techn. Coll.) TAYLOR

$$\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_3 \cdot \text{N} \cdot \text{COCl} + \text{ROH} = \text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_3 \cdot \text{N} \cdot \text{COOR} + \text{HCl}$$

H. Gelissen und P. H. Hermans, Organische Peroxyde. X. Einteilung der Reaktionen der Diacylperoxyde. XI. Einwirkung von Dibenzoylperoxyd auf *hexan*. (IX. vgl. S. 3036.) Vff. unterscheiden folgende Rkk.: I. Die pyrolytische Zersetzung der Diacylperoxyde unter Abspaltung von 2 Moll. CO₂; sie tritt ein, wenn das Diacylperoxyd für sich oder in einem Lösungsm. über seinen Zers.-Punkt erhitzt wird. II. Die Rkk. nach dem R·H-Schema unter Abspaltung von 1 Mol. CO₂ u. Einwirkung des Lösungsm. Bei ihrer Einw. auf KW-stoffe u. -lösungen reagieren sie nach II. — III. Die Rkk. bei welchen eine s. Aufspaltung der O-Brücke ohne CO₂-Entw. stattfindet. Sie tritt ein, wenn auf bei der Hydrierung der Diacylperoxyde, bei der Einw. auf sekundäre Amine u. Alkohole sowie bei der Einw. auf Substanzen, die gegen eine Dehydrogenisation empfindlich sind, u. verlaufen nach IIIa. Auch die Rk. zwischen organ. Peroxyden u. organ. Halogeniden, magnesiumhaloiden verläuft nach IIIb, ferner bei Einw. von Diacylperoxyden auf Alkalijodide u. -bromide. — IV. Rkk., bei denen die Diacylperoxyde als Säureanhydride reagieren. Bei der Einw. von Diacylperoxyden auf W., Basen, primäre Amine u. Alkohole usw. tritt Hydrolyse bzw. Aminolyse u. Alkoholyse ein nach IVa u. IVb. Es ist auf das Nebeneinanderlaufen der verschiedenen Rkk. immer Bedacht zu nehmen, weiter können Katalysatoren die Rk. zwischen Dibenzoylperoxyd u. KW-stoffen in einen bestimmten Gang bringen.



Bei der Einw. von *Dibenzoylperoxyd* auf *cyclo-Hexan* bei Siedetemp. erfolgt V, die nach dem R·H-Schema verläuft. Die fettgedruckten Prodd. wurden



rt, nämlich *Benzoessäure*, *Phenylcyclohexan*, *Benzol* u. CO_2 . — Andeutungen für Ggw. höherer Ester waren vorhanden. Im Rk.-Gemisch konnte die *p*-*Phenylsäure* aufgefunden werden; die Harzbildung ist ziemlich bedeutend. — *Phenylcyclohexan*, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{C}_6\text{H}_{11}$, Kp.₁₇ 80°; Kp.₇₅₀ 239°; E. +7°; $n_D^{18} = 1,5274$; gibt mit sd. O_4 -Lsg. *Benzoessäure*. — Die Rk. verläuft wenigstens zu $\pm 15\%$ nach Va, zu meistens 24% nach Vb. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 662—66. Deventer, Labor del. Breda, Labor. d. Holl. Kunstzjde Ind.)

BUSCH.


A. A. Rojahn und Ferdinande Rühl, *Aufklärung der Konstitution eines im Holzestillat vorkommenden Methylcyclopentenolons*. MEYERFELD u. OHLGART (Chem.-36. 549; C. 1912. II. 117) isolierten aus dem Holzeßig einen Körper, den sie als ätt. Ketonalkohol der Pentamethylenreihe ansahen. Die Konst. konnte nicht klärt werden, es wurde vielmehr die Wahl zwischen den 6 theoret. möglichen Methylcyclopentenolonen gelassen. Da die Meyerfeldschen „Alkohol“-eln aber nicht mit den Rkk. in Einklang stehen, geben Vff. dem Körper die Konst. Ketonols, mit —CO u. —OH in Nachbarschaft zueinander, u. zwar bezeichnen sie ihn als *Δ⁵-1-Methylcyclopenten-5-ol-4-on* (I). Hierfür spricht die mit FeCl_3 eintretende Färbung, die Salzbildung, Gelbfärbung durch Alkali, saure Rk. gegen Lackmus, B. eines Mono-Acetats, -Benzoats, -Phenylurethans, -Methyläthers, *p*-Nitrophenylhydrazons u. Osazons. Da bei der Red. 1 H_2 aufgenommen wird, ist eine Doppelbindung vorhanden. Die beiden CH_2 -Gruppen werden durch B. einer Dibenzylidenverb. bewiesen, wobei einmal die Gruppe, das anderemal die in α, β -Stellung befindliche Doppelbindung auflockernd. Die Formel eines Diketons, resp. Tautomerie dürfte für gewöhnlich nicht in kommen, da durch Titration nach KAUFMANN 100% Enolisierung festgestellt. Gegen Hydroxylamin u. Semicarbazid verhält die Verb. sich jedoch wie ein on.

Versuche. *1-Methylcyclopenten-5-ol-4-on* (I). Ausgangsmaterial bildet schwach ehe Krystalle. F. aus W. 72—76°, aus absol. A. F. 105—106°, aus Chlf. 100—106°, skuum sublimierbar, F. des Sublimats 105—107°. — *Dibenzylidenverb.*, aus 90% ig. 207—208°. — *Dianisylidenverb.*, aus A. F. 216—223°. — *Phenyllosazon* in verd. Eg. absol. A. F. 138—139°. — *p*-*Nitrophenylhydrazon*, nach Auskochen mit A. F. 227°. — *Phenyllosazon*. Nach Auskochen mit A. F. 262—263°. — *β*-*Naphthyllosazone*, in Eg. Wasserbad. Es entstehen 2 Körper gleicher Zus. F. 214—217°, ll. in A., Ä., Bzl., PAe., graugrün, F. 178—180°, fast farblos, swl. Bzl., l. in Eg. Vielleicht stereoisomere en. — *Disemicarbazone*, es entstehen 2 Körper gleicher Zus. F. 250° aus W., unl. l., Aceton, A., swl. in Chlf. Der in W. unl. Teil aus Eg., F. 238° unter Zers. — m, aus absol. A. F. 173—174°, während MEYERFELD ein Dioxim vom F. 145—146° t. — *Salpetersaures Aminoguanidon*, aus h. W. F. 207° unter Zers. — *Benzoat*, l. Lsg. unter Zusatz von Pyridin. Kp.₂₀ etwa 210°, F. 37—41°. — *Salpetersaures oguanidon des Methylcyclopentenolonacetats*. (Acetat nach MEYERFELD, F. 64—65°) V. F. 212—213°. — *p*-*Nitrophenylhydrazon* desselben Acetats, in essigsaurer Lsg. 0—201°. — *Phenylurethan des Methylcyclopentenolons*, aus Bzl. F. 140—142°. — *Phenylurethan des Methylcyclopentenolons* (?), aus vorigem durch Pd u. H_2 , F. 90—95°. — *Methyläther des Methylcyclopentenolons*, mittels Dimethylsulfat u. 10% ig. NaOH. 85—92°. — *Semicarbazon*, Nadeln aus CH_3OH , F. 228—229°. — *Salpetersaures oguanidon des vorstehenden Methyläthers*, F. 225°, Aufschäumen 230—231°. —

Methylcyclopentanolonmethyläther, aus dem Pentenolonäther mittels Pd u. H_2 , *O* *Semicarbazon*, aus H_2O , F. 206—207°. — *Methylcyclopentanolon*, durch Red. des *tenolons* mit Pd u. H_2 , Kp.₂₃ 97—98°. — *Phenylhydrazon*, in 50%ig. Eg., aus abso krystallisiert, F. 183—184°. Bei Wiederholung des Vers. nicht mehr erhalten. — *p-N phenylosazon*, ident. mit dem des Pentenolons. — *Acetat*, Kp.₄₄ 120—130°. (Arch. Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 211—27. Braunschweig, Pharmaz. Inst. Techn. Hochsch.)

ROJA

John William Baker, *Die Chemie polycyclischer Strukturen in Beziehung zu i homocyclischen ungesättigten Isomeren*. VI. *Einige Reaktionen des i-Phorons*. (V. Journ. Chem. Soc. London **123**. 3303; C. **1924**. I. 644.) KERP u. MÜLLER (LIE Ann. **299**. 193 [1898]) haben für das *i-Phoron* ein Gleichgewicht zwischen den For I u. II vorgeschlagen. III, das Enol von II, besitzt die Möglichkeit, durch intraann Umlagerung das Tricyclohexanderiv. IV zu geben. Dieses würde sich dann w scheinlich über den Ring zu V ketonisieren u. V dann schließlich wie üblich das der Brückenform des *i-Phorons*, VI, geben. IV ist hierbei lediglich als Überga form gedacht, indem nur einer der dreigliedrigen Ringe durch eine Dimethylgr stabilisiert ist. *i-Phoron* gibt in k. CCl_4 mit berechneten Mengen Br ein *Dibromid* welches an der Luft sofort HBr verliert u. *Monobrom-i-phoron* (VIII) liefert. Ob die Möglichkeit der Br-Addition an die enolische Doppelbindung mit nachfolgen HBr-Verlust zu einem α -Bromketon in Erwägung zu ziehen ist, formulieren Vff. Vorgang wegen der Stabilität des Zwischenprod. in der geschilderten Weise. Red. des *i-Phorons* nach CLEMMENSEN gibt einen gesätt. *KW-stoff* $C_{18}H_{28}$, welc die Formel IX zukommt. Diese Konst. läßt sich durch die Oxydation zu tr Caronsäure bestätigen. Es liegt somit hierin eine Bestätigung der angenomm Brückenmodifikation des *i-Phorons*. Die Red. mit Na u. feuchtem Ä. liefert Gemisch von zwei isomeren Verb. $C_{18}H_{30}O_2$ von den FF. 126° u. 162°, welchen die Formeln X u. XI zuschreiben.



Versuche. Nach KNOEVENAGEL u. FISCHER (LIEBIGS Ann. **297**. [1897]) hergestelltes *i-Phoron* zeigt Kp.₁₄ 99°, *Oxim* F. 79,5°, *Semicarbazon* F. 18 (Zers.), *Monopiperonylidenderiv.*, $C_{17}H_{18}O_3$, aus Essigester F. 145—146°. *i-Ph* liefert in CCl_4 mit der berechneten Menge Br in CCl_4 ein *Dibromid* vom F. ca. 40

an der Luft *Monobrom-i-phoron*, $C_9H_{13}OBr$ (VIII). Die erschöpfende Bromierung Phorons gibt 1,3,4,5 (?) *Tetrabrom-3,3,5-trimethyl-cyclo-hexan-1-on*, $C_9H_{12}OBr_4$, Essigester + Lg., F. 135°. Die Red. von I mit Na u. feuchtem Ä. führt zu 3,3',3' (*Trimethyl-dicyclo-hexyl-5,5'-dion*, $C_{18}H_{30}O_2$ (X u. XI), α -Form, aus Essig- + Lg., F. 162°, *Disemicarbazon*, $C_{20}H_{36}O_2N_6$, aus Eg., F. 259—260° (Zers.), O_4 wird nicht entfärbt, u. β -Form, Kp.₂₀ 220—240°, F. 126°, *Disemicarbazon*, 90% Methylalkohol, F. 220° (Zers.). $KMnO_4$ wird beim Erhitzen langsam ent-

Die Red. des i-Phorons nach CLEMMENSEN mit amalgamiertem Zn u. HCl einen KW-stoff $C_{18}H_{28}$ (IX) aus verd. A., F. 112°, gegen $KMnO_4$ in der Kälte unempfindlich, Br in CCl_4 wird jedoch entfärbt. Die Oxydation mit $KMnO_4$ in der Hitze zu *trans-Caronsäure*, aus Ä., F. 212—213°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 663) (O. Leeds, Univ.)

TAUBE.

Louis Longchambon, Über die Rotationsdispersion des Camphers. Vf. stellt die Beobachtung von LUCAS (S. 2579) in seinen Schlüssen als zu weitgehend hin; es sei bisher nicht erwiesen, daß bei dem Campher in Lsg. ein rechts- wie ein linksdrehender Campher vorhanden ist, u. somit sei es überflüssig, Folgerungen aus dem abweichenden Verhalten von Campherlsgg. bei der Drehung polarisierten Lichtes ziehen zu wollen. (Bull. l'Acad. des sciences 182. 769—71.)

HAASE.

F. Blicke, Die Bildung von Triphenylmethyl bei der Acetessigsäureäthylesterse. Triphenylbrommethan reagiert mit dem Mononatriumderiv. des Acetessigsäureäthylesters in Ä. unter B. von Triphenylmethyl, das in Form seines Peroxyds (F. 185—186°) isoliert u. identifiziert wurde. Aus dem Monotriphenylmethylsubstitutionsprod. des Acetessigsäureäthylesters, das bei dieser Rk. ebenfalls entsteht, wird durch Hydrolyse β,β,β -Triphenylpropionsäure (F. 177—178°) erhalten. (Journ. Chem. Soc. 48. 738—39. Ann Arbor [Mich.], Univ.)

WINKELMANN.


Danilow und E. Venus-Danilowa, Isomerisation der Aldehyde zu Ketonen. (Ztsch. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 347—56. 1925. — C. 1926. I. 2793.)

BIKERMAN.

George Hallatt Christie, Albert Holderness und James Kenner, Molekularuraktionen mehrkerniger aromatischer Verbindungen. VI. β -Dinitrodiphenylsäure; Konstitution und Auflösung in die optisch aktiven Komponenten. (V. vgl. S. 3045.) SCHMIDT u. KÄMPF (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 3745 [1903]) haben die β -Dinitrodiphenylsäure als 6,6'-Dinitrodiphenylsäure (I) angesprochen, indem sie bei der Dest. von I mit Sand 2,2'-Dinitrodiphenyl (II) erhielten u. aus der Verb. Carbazol (III) darstellen konnten. Vff. erhielten jedoch bei der Nachprüfung der Verss. nicht II, sondern 2,4'-Dinitrodiphenyl (IV) vom F. 93°, demnach würde die Säure I ein 4,6'-Dinitrodiphenyl besitzen. Für diese Konstitution spricht 1. Dasselbe 2,4,7-Trinitrophenanthrachinon entsteht sowohl aus dem 2,5-Dinitro- wie auch aus dem 2,7-Dinitrophenanthrachinon, u. Verss., 2,4,5,7-Tetranitrophenanthrachinon durch weitere Nitrierung herzustellen, schlugen stets fehl. 2. Es ist wahrscheinlich, daß, wenn 4,5- u. 2,7-Dinitrochinone aus dem Phenanthrachinon durch Nitrierung entstehen würden, sich auch das 2,5-Deriv. bilden sollte. Es lassen sich jedoch nur zwei Isomere beobachten. 3. Die Dinitrierung des Diphenyls liefert hauptsächlich 2,4'- u. 4,4'-Dinitroderiv. 4. Die Aminogruppe in der 6-Aminodiphenylsäure ist nicht diazotierbar, während eine der Aminogruppen der fraglichen Säure diazotierbar ist. Die Auflösung der Säure in die opt. akt. Komponenten gelingt mit Hilfe der Chininsalze, wodurch eine Beziehung zur 4,6,4'-Trinitrodiphenylsäure VI (CHRISTIE u. KENNER, Journ. Chem. Soc. London 123. 779; C. 1923. III. 136) hergestellt werden ist.

Versuche. Nach SCHMIDT u. KÄMPF (l. c.) hergestellte β -Dinitrodiphenylsäure liefert: Chlorid, $C_{14}H_6O_6N_2Cl_2$, aus Bzl. + PAe., F. 120°, Äthylester, $C_{18}H_{16}O_6N_2$, F. 115°, Amid, $C_{14}H_{10}O_6N_4$, aus verd. A., F. 247,5°. Die Säure gibt mit Natronlsg. bei 30 mm u. 285° destilliert eine Verb. vom F. 93°, welche mit 2,4'-Dinitro-

diphenyl keine Depression zeigt. Nach KENNER u. STUBBINGS (Journ. Chem. London **119**, 593; C. **1921**, III, 414) behandelt, liefert die β -Dinitrodiphenylsäure Hydrazid, $C_{14}H_8O_6N_4$, aus Aceton + PAe., F. 294—295° (Zers.); Fehlingsche wird nicht reduziert, bildet kein Acetylderiv. u. gibt mit HNO_3 erwärmt Din



diphenylsäure vom F. 300—301°. Das Hydrazid der 6,6'-Dinitrodiphenylsäure, Aceton + PAe., F. 310° (Zers.), bildet analog 6,6'-Dinitrodiphenylsäure vom F. bis 253° zurück. Eine Umlagerung der Säuren über die Hydrazide tritt somit ein (vgl. KENNER u. STUBBINGS, l. c.). Verss., die Dinitrosäure über die Br salze aufzulösen, gaben $C_{12}H_6(NO_2)_2(COOH)_2 \cdot 2C_{23}H_{26}O_4N_2 = C_{60}H_{60}O_{16}N_6$, aus mit $2\frac{1}{2} H_2O$, F. 207—209° (Zers.). Eine Lsg. des aus dem Brucinsalz hergest. Na-Salzes erwies sich als inaktiv. Die Auflösung mit Chinin liefert ein Chinin $C_{54}H_{56}O_{12}N_6$, aus A. mit C_2H_5OH , F. 178—179° (Zers.), in Chlf. $[\alpha]_D^{16} = -2$ u. ein Salz vom F. 162—163° in Chlf. $[\alpha]_D^{16} = -62,10^\circ$. Hieraus α - β -Dinitrodiphenylsäure, F. 296°, in Ä. $[\alpha]_D^{14} = +26,90^\circ$, Na-Salz in W. $[\alpha]_D^{15} = -186,4^\circ$ u. β -nitrodiphenylsäure, F. 296°, in Ä. $[\alpha]_D^{15} = -26,46^\circ$, Na-Salz in W. $[\alpha]_D^{15} = +1$ (Journ. Chem. Soc. London **1926**, 671—76. Sheffield, Univ.)

Ch. Courtot und P. Petitcolas, *Optische Untersuchung von Benzyl- und Indolbasen*. (Vgl. COURTOT u. DONDELINGER, Bull. Soc. Chim. de France [4] **37**, C. **1925**, I, 1563 u. S. 1168.) In Fortsetzung der l. c. begonnenen Arbeit haben die nachfolgenden sekundären u. tertiären Amine auf ihre Mol.-Refr. u. Lichtabsorption untersucht. — *Benzylanilin*. Aus 2 Moll. Anilin u. 1 Mol. Benzylchlorid, erst Eiskühlung, dann bei Zimmertemp. Nebenher bildet sich Dibenzylanilin. Aus F. 39°, Kp.₁₀ 171,5°, D.₄⁶⁵ 1,0298, n_D⁶⁵ = 1,59 562. — *Benzyl-o-toluidin*. Darst. an Rk. träger (24 Stdn.). Es bildet sich nur wenig tertiäres Amin. Kp.₁₀ 176°, T. aus A., dann Ä., F. 60°, D.₄⁶⁵ 1,01 416, n_D⁶⁵ = 1,58 611. — *Benzyl-m-toluidin*, C₁₄H₁₃N. Rk. lebhafter. Außerdem entsteht reichlich tertiäres Amin (vgl. unten). Schmelztemp. gelbliche Fl., Kp.₁₀ 179,5°, erstarrt nicht bei -20°, D.₄⁶⁵ 1,00 833, n_D⁶⁵ = 1,58 322, ll. in Ä., Bzl., Chlf., wl. in k. A., luft- u. lichtbeständig. — *Benzyl-p-toluidin*, C₁₄H₁₃N, krystallisierbares, schwach gelbliches Öl, Kp.₁₀ 181°, D.₄⁶⁵ 1,00 641, n_D⁶⁵ = 1,58 322. Wird am Licht schnell braun. — *Dibenzylanilin*, Nadeln aus A., F. 69,5°, Kp.₁₀ 181°, D.₄⁸⁰ 1,04 436, n_D⁸⁰ = 1,60 647, lichtbeständig. — *Dibenzyl-o-toluidin*, C₂₁H₂₁N, Benzyl-o-toluidin u. Benzylchlorid (90—95°, 12 Stdn.). Kp.₁₀ 222—223°, Pri aus Lg.-A. bei langsamem Verdunsten, F. 42°, D.₄⁶⁵ 1,02 347, n_D⁶⁵ = 1,58 322 in Ä., Chlf., Bzl., Lg., wl. in A., lichtbeständig. Neigt sehr zur Überschmelzung. — *Dibenzyl-m-toluidin*, C₂₁H₂₁N, Nadeln aus A., F. 78°, Kp.₁₁ 229°, D.₄⁸⁰ 1,0265, n_D⁸⁰ = 1,59 603, ll. in Ä., Bzl., Chlf., wl. in k. A., lichtbeständig. — *Dibenzyl-p-toluidin*, C₂₁H₂₁N, Nadeln aus A., F. 56°, Kp.₁₁ 233°, D.₄⁶⁵ 1,03 721, n_D⁶⁵ = 1,60 109, ll. in Ä., Bzl., Chlf., wl. in k. A. — *Benzylindanylanilin*, C₂₂H₂₁N. Aus Benzylanilin u. Indolchlorid (48 Stdn. bei Zimmertemp., dann 2 Stdn. bei 70—75°). Prismen aus A. bei langsamem Verdunsten, F. 75°, Kp.₁₆ 255°, D.₄⁸⁰ 1,06 321, n_D⁸⁰ = 1,61 108, lichtbeständig. Neigt sehr zur Überschmelzung. — *Benzylindanyl-o-toluidin*, C₂₃H₂₃N, Darst. analog. Reinigung durch Vakuumdest., dann über das Hydrochlorid. F. 253—255°, zarte Krystalle aus A., F. 95°, D.₄⁸⁰ 1,04 157, n_D⁸⁰ = 1,58 774, ll. in Ä., Bzl., Lg., zl. in h. A., recht luft- u. lichtbeständig. Neigt sehr zur Überschmelzung. — *Benzylindanyl-m-toluidin*, C₂₃H₂₃N, zunächst sehr viscoses, grünlichgelbes

see
errata
v. 991
P. 3494

261—262°, das allen Krystallisationsverss. trotzte, schließlich nach 6 Monaten allg. krystallisierte. Nadeln aus A., F. 57,5—58°, D.₄²⁰ 1,0486, n_D²⁰ = 1,60412. *Indanyl-p-toluidin*, C₂₃H₂₃N. Bildet sich leichter als die vorigen. Zunächst gelbe Fl., Kp.₁₆ 264—266°, dann Krystalle aus A., F. 76°, D.₄²⁰ 1,0493, n_D²⁰ = 1,6048, ll. in Ä., Bzl., Lg. Neigt zur Überschmelzung.

Um mit den bei 15° ermittelten Zahlen der ersten Arbeit (l. c.) vergleichbare n für die Mol.-Refr. zu erhalten, wurden die Amine bei 65 bzw. 80° untersucht, indem an den beiden bei Zimmertemp. fl. Aminen die anzubringenden Korrekturen für die Red. auf 15° ermittelt worden waren. Diese betrugen 0,59 für 65° u. 0,64 für 80°. Den Berechnungen wurden die Brühlschen Inkremente zugrunde gelegt. — Die sekundären Amine zeigen folgende Exaltationen: Benzylanilin 0,12; *o*-Toluidin 0,26; Benzyl-*m*- u. -*p*-toluidin 0,5. Benzyl exaltiert weniger als Anilin, sonst sind die Benzyltoluidine den Indanyltoluidinen vergleichbar. — Die tertiären Dibenzylamine zeigen fast dieselben Exaltationen, ausgenommen das *o*-Toluidinderiv., welches eine Depression von —0,67 aufweist. — Bei den tertiären Benzylaminen finden sich höhere Exaltationen (bis zu 0,94), nur das *o*-Toluidinderiv. zeigt wieder eine Depression von —0,64. — Die durch das von N o-ständige CH₃ bewirkte Depression entspricht den Beobachtungen von LEY u. PFEIFFER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**. 365; C. **1921**. I. 785), ist aber nur den tertiären Aminen eigen, und sich bei den sekundären Aminen die Wrkg. desselben CH₃ auf eine mehr oder weniger starke Verminderung der Exaltation beschränkt. — Dasselbe CH₃ drückt die Kpp. herab, die der tertiären Amine wieder stärker als die der sekundären, sind die Differenzen hier bei weitem geringer als bei LEY u. PFEIFFER. — Die Dispersionkurven (vgl. Original) der 12 Amine sind sich im großen u. ganzen recht ähnlich. Die feinen Unterschiede der einzelnen Spektren lassen sich hier nicht wiederholen. Das Radikal Indanyl wirkt im allgemeinen chromogener als Benzyl, aber der Unterschied ist hier weniger deutlich als zwischen Indanylmethylbenzylamin u. Dimethylamin. Das o-ständige CH₃ wirkt bei den sekundären Aminen hypsochrom, im Gegensatz zum *m*- u. besonders *p*-ständigen, welches letzteres stark bathochrom wirkt. Bei den tertiären Aminen wirkt das o-ständige CH₃ bald hypsochrom (Indanylp-toluidin), bald nur hypochrom (Dibenzyl-*o*-toluidin), schwächt aber nicht merklich den chromogenen Wert des Mol. — Diese Beziehung zwischen Absorptionsspektrum u. Mol.-Refr. muß mit Vorsicht angewendet werden. Einer Depression der Mol.-Refr. entspricht nicht allgemein eine schwächere Absorption als die einer Exaltation mit n. oder exaltierter Mol.-Refr. Die Beziehung gilt vielmehr nur für Verbb., in denen durch die Stellung des Substituenten in einem u. demselben Kern unterscheiden.

(Soc. Chim. de France [4] **39**. 452—69.)

LINDENBAUM.

Fritz Zetzsche und **Plinio Zala**, *Eine Dehydrierungsmethode für Alkohole*. In Fortsetzung früherer Verss. (ZETZSCHE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**. 1092. 1923; Z. **21**. III. 162. 1279) haben Vff. die Ausbeuten ihrer Dehydrierungsmethode von 90% auf 93% der Theorie verbessert, indem sie den gasförmigen O₂ durch gasförmigen Wasserstoff ersetzen. 5 g Benzylalkohol werden z. B. in einem Kragenkolben mit 1 g Nitrobenzol, 5,97 g Chinolin, 4,8 g Dinitrobenzol u. 8 g Kupferoxyd (pro 1 g 1/2 Stde. auf 190—200° erhitzt. Man filtriert, entzieht das Rk.-Prod. mit verd. H₂SO₄ aus u. gewinnt den Aldehyd durch Bisulfit-Addition als Bisulfitverb. Folgende Aldehyde bzw. Ketone wurden aus ihren Alkoholen dargestellt: Benzaldehyd aus Benzylalkohol bei 200—205° (93,5% der Theorie); Benzaldehyd aus *o*-Chlorbenzylalkohol (86,4%) bei 205—210°; *o*-Nitrobenzaldehyd (87,3%) bei 200—205°; Zimtaldehyd bei 190—195° (87,6%); Furfural bei 185° (76,3%); Geranial bei 160—170° (33,1%); *i*-Butylaldehyd bei 160° (27,6%); Phenon bei 220° (75%); Benzil aus Benzoin bei 210—220° (50%); Campher bei 220—225° (85%); Cyclohexanon aus Cyclohexanol bei 155—160°; im


Einschlußrohr *Naphthalin* bei 240—245° aus *Tetralin* u. *Dekalin* (19 bezw. 18). Bei der Red. des *i-Butylalkohols* scheint in erster Linie *i-Butylen* zu entstehen. (F. chim. Acta 9. 288—91.)

TRÉNE

George Norman Burkhardt und **Arthur Lapworth**, *Arylschwefelsäuren*. untersuchen die Methoden zur Herst. von Alkalisalzen der Arylschwefelsäuren. Verleys Methode (Bull. Soc. Chim. Paris 25. 46 [1901]) zur Gewinnung von *Phenylschwefelsäure* läßt sich verbessern, wenn das in CS₂ gel. Phenol in eine auf —10° gekühlte Lsg. von Chlorsulfonsäure u. Diäthylanilin (Dimethylanilin) eingetropft wird. Die Ausbeuten steigen so auf 90% der Theorie. Ersatz der Chlorsulfonsäure durch SO₃ gelingt, wenn fl. SO₂ als Lösungsm. u. Diäthylanilin als Base angewendet werden. Die Ausbeuten betragen 60%. Mit **Frank Ashworth**. Bei Anwendung von Bzl. als Lösungsm. u. Pyridin als Base lassen sich mit SO₃ *p-Nitrophenylschwefelsäure* in 90—94%, *Eugenylschwefelsäure* in 70% u. *o-Nitrophenylschwefelsäure* in 60% der Theorie herstellen. (Pyridin-SO₃ wirkt auf Bzl. auch in der Hitze nicht.) Die Methode von BAUMANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 11. 1907 [1878]) läßt sich in der Weise modifizieren, daß ein Gemisch von Phenol u. Dimethyl- bzw. Diäthylanilin auf dem Wasserbade mit K-Pyrosulfat erhitzt wird. Hierbei entstehen 80—90% der Theorie an Phenylschwefelsäure. Die Methode eignet sich ebenfalls für *α-* u. *β-Naphthol*, *Eugenol* u. *i-Eugenol*. Die Alkalisalze der genannten Säuren in neutraler wss. Lsg. bei 100° beständig u. werden bei Ggw. von Mineralsäuren beim Kochen hydrolysiert. Das Ba-Salz wird in wss. Lsg. bei 100° in 1½—2 Stdn. zersetzt, NH₄- u. Mg-Salze nehmen eine Zwischenstellung ein. Bei Ggw. von Acetat sind sämtliche Salze beständig, auch bei Anwesenheit von viel Eg. St. Alkali zersetzt das K-Salz bei 150° in 4 Stdn. Diazoverbb. kuppeln in alkal. Lsg. mit phenylschwefelsauren Salzen nicht, HNO₂ ist ohne Wrkg., konz. HNO₃ zersetzt schnell unter B. der Nitroderivv. *K-Phenylsulfat*, C₆H₅O₄SK, l. zu 0,7% in A. u. 14% in W. (Sämtliche Löslichkeiten in W. beziehen sich auf 17°.) *Na-Phenylsulfat*, C₆H₅O₄SNa, mit 3 H₂O, l. zu 7% in A. u. 31% in W. Ferner Ba-, NH₄- u. Mg-Salze u. *p*-, *o*- u. *m*-Tolylsulfate. *p-Toluidin-o-tolylsulfat*, F. 125—127° (Zers.) u. *p-Tolylsulfat*, F. 149—151°. Die Oxydation des *m*-Tolylsulfats mit KMnO₄ liefert *K-m-Carboxyphenylsulfat*, C₇H₅O₆SK, 3,2 T. lösen sich in 100 T. W. Die Hydrolyse liefert *m*-Oxybenzoesäure u. *K-Bisulfat*. Ferner *K-α-Naphthylsulfat*, C₁₀H₇O₄SK, l. in 40 T. W. u. *K-β-Naphthylsulfat*, mit 4 H₂O, l. in 70 T. W. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 684—90. Manchester, Univ.)

TAU


A. Hantzsch und **W. Bucerius**, *Über die Konstitution der Dithiocarbonsäuren und ihrer Salze*. Die Konst. der Dithiocarbonsäuren (vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 194; C. 1924. II. 2221), sowie ihre opt. u. chem. Beziehung zu ihren Estern u. Alkalisalzen sind folgendermaßen darzustellen:



Die Ester absorbieren stets ein wenig stärker als die zugehörigen Pseudosäuren — Diese fast vollständige opt. Identität zwischen den Alkylestern u. den freien Pseudosäuren als Wasserstoffestern in indifferenten Medien besteht nicht in der Reihe der Xanthogensäuren C_nH_{2n+1} O·CS₂H; aus diesem Grunde lehnt v. HALBAN die Theorie des Vf. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 612; C. 1925. I. 1837) ab; indessen ist die Anomalie der Xanthogensäuren durch eine chem. Modifikation ihrer Strukturformel zu erklären. — Auch die übrigen Dithiocarbonsäuren wurden chem. u. physikalisch untersucht; es wurden ihre Dissoziationskonstanten ermittelt, ihre opt. Eigenschaften mit denen ihrer Salze u. Ester verglichen u. die Alkyl- u. Aryldithiocarbonsäuren

pt. normal, d. i. ident. mit ihren Estern gemäß dem obigen Schema erwiesen u. die chem. Ursache der opt. Anomalie der Xanthogensäuren erkannt. Drittens ist von V. HALBAN rein physikochem. untersuchte Zerfall der Xanthogensäuren u. katalyt. Wrkg. der Lösungsmmm. chem. zu erklären u. viertens nachgewiesen worden, sämtliche Schwermetallsalze dieser Säuren esterähnliche Pseudosalze sind, die zum Teil in wss. Lsg. durch Hydratation in echte Salze übergehen. — Die Dithiocarbonsäuren zerfallen in 2 Untergruppen: 1. Die stabilen Alkyl- u. Aryldithiocarbonsäuren, die gleich den entsprechenden Carbonsäuren nicht intramolekular zerfallen u. die mit ihren Estern opt. fast ident. sind; 2. die instabilen Dithiocarbonsäuren, die zwar erheblich beständiger sind als die entsprechenden Carbonsäuren, doch leicht intramolekular zerfallen. Ihre Instabilität steigt von den relativ wenigsten Säuren mit Bindung der Gruppe $-\text{CS}_2\text{H}$ an N, der *Azidodithiokohlensäure*, $\text{N}_3 \cdot \text{CS}_2\text{H}$, u. den *Dithiocarbaminsäuren*, $\text{R}_2\text{N} \cdot \text{CS}_2\text{H}$, bis zu den instabilsten Säuren, in denen die Gruppe $-\text{CS}_2\text{H}$ an O gebunden ist, den *Xanthogensäuren* $\text{RO} \cdot \text{CS}_2\text{H}$, denen sich die Dithio- u. Trithiokohlensäure anschließen. Diese Säuren sind mit ihren Estern opt. nur ähnlich, aber nicht mit ihnen ident. u. auch chem. u. konstit. etwas verschieden. — *Ammoniumdithioacetat* wird in reinster Form durch Überleiten von trockenem NH_3 über die absol.-äther. Lsg. der Säure erhalten: blaßgelbes Pulver; sll. in W.; aus diesen opt. reinen Salzen wurden die opt. reinen Säuren u. Ester mit HCl bzw. $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ erhalten. *Dithioessig- u. -benzoesäureäthylester* ist im geschlossenen Gläschen nach wochenlangem Stehen opt. mit dem frisch bereiteten Ester ident. — Von den instabilen Säuren wurde die *Dithiocarbaminsäure*, $\text{NH}_2 \cdot \text{CS}_2\text{H}$, aus dem NH_4 -Salz + HCl , u. die *Azidodithiocarbonsäure*, $\text{N}_3 \cdot \text{CS}_2\text{H}$, aus Aceton, F. 51° erhalten; die *Xanthogensäuren* wurden aus den wss. Lsgg. der K-Salze + HCl in Freiheit gesetzt u. in $1/1000$ -n. u. $1/10000$ -n. wss. Lsgg. bei 0° photographiert.


Um die Dissoziationskonstanten der Dithiocarbonsäuren einheitlich beurteilen zu können, wurden mit Ausnahme der besonders schwachen Dithiocarbaminsäure nur k -Werte für $v = 100$ errechnet. — *Dithioessigsäure*, $k (v = 100) = 2,8 \times 10^{-3}$. — *Äthylxanthogensäure*, $\text{C}_2\text{H}_5\text{O} \cdot \text{CS}_2\text{H}$, $k (v = 100) = 2,8 \times 10^{-2}$. — Die *Dithiocarbaminsäure*, $\text{NH}_2 \cdot \text{CS}_2\text{H}$ ist die schwächste der Dithiosäuren, aber noch so stark, daß die k -Werte der Dissoziationskonstanten mit steigender Verd. merklich fallen. — Die *Azidodithiokohlensäure*, $\text{N}_3 \cdot \text{CS}_2\text{H}$, ist die stabilste dieser zersetzlichen Dithiosäuren, weil sie nicht normal in N_3H u. CS_2 zerfällt, sondern nach der Gleichung: $\text{N}_3\text{H} \cdot \text{CS}_2\text{H} \rightarrow \text{N}_2 + \text{S} + \text{HSCN}$. $k \sim 2,4 \times 10^{-2}$. — *Trithiokohlensäure*, $k \sim 1 \times 10^{-3}$. — Die *Trithiokohlensäure* zerfällt in wss. Lsg. so rasch, daß eine Best. der Leitfähigkeit unmöglich war. — Die Zerfallskonstante der Trithiokohlensäure in W. konnte auch approximativ zu $k^0 \sim 0,27$ ermittelt werden, dürfte aber ebenso wie die Dissoziationskonstante zu niedrig sein. — *Äthyltrithiokohlensäure*, $\text{C}_2\text{H}_5\text{S} \cdot \text{CS}_2\text{H}$, $k (v = 100) = 1 \times 10^{-2}$. — Die Stärke aller Dithiocarbonsäuren, d. i. ihre Tendenz zur B. von Hydroxoniumsalzen, wird von der Natur der Substituenten nur sehr wenig beeinflußt. Die stabilen, opt. n. Dithiocarbonsäuren der aliph. u. aromat. Reihe sind im Gegensatz zu den instabilen Säuren dunkelorange bzw. tiefrot; sie zeigen auffallende Veränderungen u. erstarren bei tiefen Temp. zu schwach rötlichen oder gelben Pulvern; da die Dithiosäuren u. ihre Ester in Lsg. monomolar sind, so wird ihre Farbveränderung beim Erstarren auf einer Assoziation oder Polymerisation beruhen; der Vorgang führt zu nebenstehender dimeren Formel der festen Säuren u. Ester. Analog wird auch das fl. rote Thiocarbonylchlorid CSCl_2 beim Erstarren in die hellgelben Krystalle dimolar werden. — In wss. Lsg. werden die Säuren Hydroxoniumsalze mit derselben gelben bzw. orange-gelben Farbe wie ihre NH_4 -Salze. — Die Alkyl- u. Aryldithiocarbonsäuren u. deren Ester sind zwar im sichtbaren Spektralgebiet intensiver farbig als ihre nur gelben bis gelbroten Salze,



absorbieren aber im Ultraviolett umgekehrt schwächer als ihre Salze. — Opt. Unan *Dithioessigsäure*, *Dithiobenzoesäure*, *p-Methoxydithiobenzoesäure* u. α -*Dithionaptsäure* zeigten, daß die stabilen Alkyl- u. Aryldithiocarbonsäuren die normalsten Pseudosäuren sind; denn sie sind in allen nichtwss. Lsgg. als monomolare Wasserstoff $R \cdot C(:S) \cdot SH$, opt. fast ident. mit ihren Alkylestern, werden aber in wss. Lsgg. genügender Verd. opt. völlig ident. mit ihren Alkalisalzen, da sie über Lösungsgewichte schließlich vollständig in echte Säuren oder richtiger durch Addition W. in deren Hydroxoniumsalze $R \cdot C < S_2[H_3O]$ übergehen. Dieser Übergang um so früher vollständig, je größer die durch die Leitfähigkeitsmethode gemessenen angeführten Dissoziationskonstanten sind. Denn diese sind chem. ihren Dissoziationskonstanten symbat, zeigen also ihre Tendenz zur B. von Hydroxoniumsalzen zahlenmäßig an. Die k -Werte der Dithiocarbonsäuren liegen zwischen 10^{-2} u. 10^{-4} sind also ca. 100-mal stärker als die zugehörigen Carbonsäuren. — Die opt. Anomalien der Xanthogensäuren, d. i. ihre merkliche opt. Verschiedenheit von ihren Estern (vgl. v. HALBAN, Ztschr. f. Elektrochem. 29. 445; C. 1924. I. 167) ist chem. durch


Erweiterung ihrer Strukturformel zu der Nebenvalenzformel $S: C \begin{smallmatrix} \nearrow SH \\ \searrow OR \end{smallmatrix}$ zu erklären.

Letztere erklärt auch, daß die Xanthogensäuren sich weniger leicht zu Disulfoxiden oxydieren als die O-freien Dithiosäuren u. deutet auch bereits ihre Tendenz zum intramolekularen Zerfall in A. u. CS_2 an; deshalb sind auch diese opt. Anomalien der instabilen Säuren um so größer, je größer ihre Zerfallstendenz ist. — In wss. Lsgg. werden auch sie mit ihren Alkalisalzen opt. ident. u. durch den Übergang in Hydroxoniumsalze $[R \cdot CS_2][H(OH)_n]$ so stabilisiert, daß ihre Dissoziationskonstanten gemessen werden können. Hieraus folgt, daß nur die Pseudosäuren nicht aber die echten Säuren bzw. deren Säureionen zerfallen. — Die anscheinend opt. Anomalien der Xanthogensäure sind hiermit so befriedigend durch deren Sonderstellung erklärt, daß sie keine Beweise gegen die chem. Säuretheorie liefern sind. — Entsprechend dem opt. Nachweis, daß die Dithiocarbonsäuren Pseudosäuren sind, ist auch ihr Verh. gegen Diazoessigester. *Dithioessigsäure* u. *Dithiobenzoesäure* sind darin ohne N-Entw. l., während sie in wss. Lsgg., die die echten Säuren in l. ihrer sehr leicht zerfallenden Oxoniumsalze enthalten, lebhaft reagieren. Auch *Xanthogensäure* zers. den Diazoester in Toluollsg. nur sehr langsam, während allerdings die halogenisierte Benzyltrithiokohlensäure nach v. HALBAN (l. c.) merklich aber in verschiedenen Lösungsmmm. verschieden schnell reagieren soll. — Der katalyt. Zerfall der Xanthogensäuren in Alkohole u. CS_2 in den nach v. HALBAN (Ztschr. f. physik. Ch. 82. 325; C. 1913. I. 1269) „langsamsten“, O-freien Medien wird wahrscheinlich nur durch Spuren von W. eingeleitet. Sicher katalyt. wirken nur O-freie Lösungsmmm., die langsam wirkenden Medien Ä. u. Aceton wohl durch B. von Additionsprodd., unter Bindung des O an das Thiocarbonyl, die schnellsten Medien, Alkohole u. an der Spitze das W. dadurch, daß die primär analog gebildeten Additionsprodukte sekundär in spontan zerfallende Orthokohlensäurederivv. übergehen:




Nur so kann erklärt werden, daß die *Methylxanthogensäure* in A. u. die *Äthylxanthogensäure* in CH_3OH fast gleich schnell zerfallen, u. daß die Zerfallskonstanten beider Systeme zwischen derjenigen der Äthylsäure in A. u. Methylsäure in CH_3OH liegen. — Die chem. Wrkg. der langsamen Lösungsmmm., zu denen Ä. u. Aceton gehören, auf die Xanthogensäuren beruht anscheinend darauf, daß sie mit diesen Anlagerungsprodukte bilden, die, weil sie zwischen den relativ stabilen unveränderten Säurederivv. ihren mit OH-Verbb. erzeugten, spontan zerfallenden Orthokohlensäurederivv. stehen, auch eine mittlere Zersetzungsgeschwindigkeit erzeugen. Daß die Addition am Thiocarbonyl gemäß der Formel I erfolgt, wird nach Verss. von H. Schw

cheinlich gemacht. Nach opt. Verss. desselben hydratisiert sich das Carboxyl der Carbonsäuren als auch ihrer Ester durch W. gemäß den Formeln II u. III.



Die Schwermetallsalze, die wegen ihrer auffallenden Eigenschaften als innere Salze aufgefaßt wurden, sind homöopolare Pseudosalze, $\text{R} \cdot \text{C}(\text{S}) \cdot \text{SMe}_u$, u. von den heteropolaren echten Salzen der Alkali- u. Erdalkalimetalle mit ionogener Lig., $[\text{R} \cdot \text{CS}_2]\text{Me}$, konstitutiv verschieden. So ähneln sie als „Metallester“ den Säuren als „Wasserstoffestern“ physikal. durch ihre Löslichkeit u. ihren molaren Zustand in indifferenten Medien, opt. durch esterähnliche Absorption u. durch das Fehlen der Ionenrk., die erst langsam durch Säuren oder Alkalien, durch „Verseifung“ auftreten. Diese Eigenschaften werden natürlich durch die der Schwermetalle dahin modifiziert, daß die Stabilität (chem. Indifferenz) Pseudosalze symbat der Stabilität der zugehörigen Sulfide steigt. Die Salze u. des Ni gehen durch Addition von W. mehr oder weniger leicht, analog wie Pseudosäuren in Hydroxoniumsalze, so durch B. von Aquokationen in anders-, echte Salze, meist vom Typus $\text{R} \cdot \text{C} < \text{S}_2 [\text{Me}(\text{H}_2\text{O})_6]$ über. Sie sind auch keine „inneren Komplexsalze“, da solche gegen W. stabil sind. Die Existenz Aquosalze ist dadurch bewiesen, daß sie im Ultraviolett wie die Alkalisalze wirken; sie sind aber meist so instabil, daß sie, wie die des Ni, schon durch Ä. als Pseudosalze ausgeschüttelt werden können, ebenso wie hierdurch aus der wss. Lsg. der echten Säuren wieder die orangefarbigten oder roten Pseudoregeneriert werden können. — Besonders charakterist. verhalten sich die Salze des Zn u. Pb stehenden zweiwertigen Metalle, vor allem des Ni. — *Nickelgenat* bildet braune Blättchen mit gelbem Strich; l. in allen Lösungsm. außer mit intensiv gelber Farbe. Die verd. alkoh. Lsgg. werden + viel W. ebenso hellgrün wie die gewöhnlichen Ni-Salze, noch leichter durch NH_3 u. Pyridin, die echten Salze mit dem Hexammin- bzw. Hexapyridinonen gebildet u. Analog werden also auch in wss. Lsgg. die Hexaquoionen des echten Salzes $\text{R} \cdot \text{C} < \text{S}_2 [\text{Ni}(\text{OH}_2)_6]$ gebildet sein; dieses Salz ist aber noch unbeständiger in NH_3 -Atmosphäre haltbare Hexamminsalz u. wird schon durch Ausschütteln g. mit Ä. zers. nach dem Schema:




Pseudosalz, gelb

echtes Aquosalz, blaugrün.

uch beim Erwärmen dieser Lsg. geht das Aquosalz unter W.-Verlust wieder gelbe Pseudosalz über. — Ebenso verhält sich *Nickeldithiobenzoat*, das als Pseudosalt ist u. sich in allen nichtwss. Medien mit derselben Farbe löst. Die verd. Lsgg. nehmen auf W.-Zusatz die gelborange Farbe der Lsgg. der K-Salze an; u. Pyridin erzeugen schon in konz. Lsgg. diesen Farbumschlag. — *Nickelacetat* wird von A. u. Ä. mit braunroter Farbe gel., absorbiert in beiden Medien u. verschieden vom NH_4 -Salz, wird durch Zusatz von wss. NH_3 -Lsg. zur alkoh. mit der des NH_4 -Salzes ident. Analog verhält sich das *Ni-Salz der Dithiocarbure*, dessen Absorption sich wie die des Xanthogenats verändert. — Opt. auf verschieden sind die Thiosalze ein- u. derselben Dithiosäure, deren O-Salze sind, vor allem die des Zn u. Pb. So ist dithiobenzoesaures Pb opt. normal, mit derselben Farbe l. in Pyridin; dagegen ist *Zn-Dithiobenzoat* gelb, l. in A., Bzl., Lg. mit derselben Farbe. Seine gelbe Farbe könnte chem. dadurch erklärt u., daß das Zn, weil es positiver als Pb ist u. Salze mit Nebenvalenzbindung kann, auch in diesem Pseudosalz eine Nebenvalenzbindung gemäß der Formel $\text{S} \begin{array}{c} \text{S} \\ \text{S} \end{array} \text{Zn}^{1/2}$ erzeugt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 793—814.)

BUSCH.



W. Borsche und E. Feske, Über β -Polynitroarylhydroxylamine. III. (II. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 1939; C. **1923**. III. 1313.) Nach dem früher beschriebenen Verf. wurden die Verbb. **I**, **II**, **IV** u. **V** hergestellt; **III** konnte aus dem Rohprod. rein herausgearbeitet werden. — **2,4-Dinitronaphthol-1-methyl-** u. **-phenyläther**, **2,4-Dinitro-1-chlornaphthalin** u. **Na-Phenolat** in Phenol bei 100° ; gelbe Nadeln, A., F. $183,5^{\circ}$; konnten nicht in 1-Hydroxylamino-2,4-dinitronaphthalin umgewandelt werden. — **I**, **II**, **III** u. **IV** reagieren mit w. verd. NH_3 oder in Ä. mit Anilin nach Gleichung: $2\text{C}_7\text{H}_5(\text{NO}_2)_2 \cdot \text{NH} \cdot \text{OH} = \text{C}_7\text{H}_5(\text{NO}_2)_2 \cdot \text{NH}_2 + \text{C}_7\text{H}_5(\text{NO}_2)_2 \cdot \text{N}(\text{OH})_2$. — **V** durch verd. NH_3 in anderer Weise zers.



I, $x = \text{Br}$

II, $x = \text{CH}_3$


III, $x = \text{OCH}_3$



Versuche. **1-Hydroxylamino-2,4-dinitro-6-brombenzol**, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_5\text{N}_3\text{Br}$ (**I**), **2,4-Dinitro-6-bromanisol** in 10 Teilen A. + h. alkoh. Hydroxylaminchlorhydrat; gelbes, krystallin. Pulver, F. 93° (Zers.); verschmiert beim Aufbewahren; l. in Alkali oder NH_3 -W. mit dunkelrotbrauner Farbe; durch Säuren unverändert nicht zu zuerhalten. — **Dibenzoylverb.**, $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{O}_7\text{N}_3\text{Br}$, gelbliche Nadeln, aus A., F. $143-144^{\circ}$. — **2,4-Dinitro-6-bromanilin**, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_4\text{N}_3\text{Br}$, aus **I** mit w., verd., wss. NH_3 ; hellgelbe Nadeln, durch Sublimation u. aus A., F. 153° . — **1,2-Diamino-4-nitro-6-brombenzol**, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2\text{N}_4$, aus **I** mit Schwefelammonium; rote Nadeln, aus verd. A. oder verd. Aceton, F. $203-204^{\circ}$. — Gibt mit Phenanthrenchinon ein **Nitrobromphenanthrophenazin**, $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_3\text{Br}$, grüne Nadeln, F. 245° ; swl. in A. — **1-Nitroso-2,4-dinitro-6-brombenzol**, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5\text{N}_3\text{Br}$, in Eg. bei 0° mit Chromtrioxyd in W.; dunkelgelbe Kryställchen, aus Eg. + W., l. zu einer grünen Fl.; l. in w. Eg. mit tiefgrüner Farbe. — **1,2,4-Trinitro-6-brombenzol**, $\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_6\text{N}_3\text{Br}$, aus **I** in w. HNO_3 (D. 1,52); gelbliche Kryställchen, aus A. oder Essigsäure, F. 101° . — Bei der Darst. von 3,5-Dinitro-2-chlortoluol aus Dinitro-o-kresol u. Toluol-p-sulfochlorid nach ULLMANN u. SANÉ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **44**. 3730; C. **1**. I. 229) entsteht nebenher **Toluol-p-sulfonsäuredinitro-o'-tolylester**; dieser gibt mit Na-Phenolat Dinitro-o-kresol-Na u. den Phenylester der Toluol-p-sulfonsäure, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_5\text{N}_3$, weiße Krystalle, aus A., F. 93° . — **Phenyläther des Dinitro-o-kresols**, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_5\text{N}_3$, aus 3,5-Dinitro-2-chlortoluol mit Na in geschmolzenen Phenol auf dem Wasserbade; Nadeln, aus A., F. $108,5^{\circ}$. — **2-Hydroxylamino-3,5-dinitrotoluol**, $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_5\text{N}_3$ (**II**), aus dem Methyläther des Dinitro-o-kresols mit alkoh. w. Hydroxylaminlsg.; F. 107° (bei raschem Erhitzen); l. in verd. NaOH mit dunkelbrauner Farbe; verd. H_2SO_4 zersetzt es daraus (gelbe Krystallflocken, F. 110°); zers. sich beim Aufbewahren. — **2-Amino-3,5-dinitrotoluol**, $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_5\text{N}_3$; braune Nadelchen, aus Aceton + A., F. 214° . — **2-Benzoyl-3,5-dinitrotoluol**, $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{N}_3$, braune Krystalle, aus sd. A. (ll.), F. $121,5^{\circ}$. — **2-Dibenzoylverb.**, $\text{C}_{21}\text{H}_{15}\text{O}_7\text{N}_3$, hellbraune Aggregate, aus A., F. 178° . — **2-Methylverb.**, $\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_5\text{N}_3$, aus **II** in n. N. mit Dimethylsulfat; braune Blättchen, aus CH_3OH , F. 85° ; daneben entsteht 3,5-dinitrotoluidin-2, braune Nadeln, aus CH_3OH , F. 213° . — **2-Amino-3,5-dinitrotoluol**, $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_4\text{N}_3$, aus **II** mit sd. verd. NH_3 oder in Ä. mit Anilin; braune Nadeln, aus A., F. 178° . — **2,3-Diamino-5-nitrotoluol**, $\text{C}_7\text{H}_9\text{O}_2\text{N}_3$, aus **II** mit Schwefelammonium; sll. in w., rote Nadeln, aus h. W., F. 175° . — **Diacetylverb.**, gelbe Nadeln, aus A., F. 236° . — Gibt mit Benzil **5-Methyl-2,3-diphenyl-7-nitrochinoxalin**, $\text{C}_{21}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}_3$, gelbe Krystalle, aus A., F. 193° . — **2-Nitroso-3,5-dinitrotoluol**, $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_5\text{N}_3$, aus **II** in Eg. mit CrO_3 ; Blättchen, aus Eg. + W., F. 133° (Zers.) zu einer grünen Schmelze. — **2,3,5-Trinitrotoluol**, $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_6\text{N}_3$, aus **II** in HNO_3 (D. 1,5); aus A. + W., F. 97° . — **4-Hydroxylamino-3,5-dinitrotoluol**, $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_5\text{N}_3$ (**IV**), aus 3,5-Dinitro-4-methoxytoluol (aus Dinitro-p-kresol Diazomethan) mit Hydroxylamin; goldgelbe Blättchen, aus Bzl. + Lg., F. 87° (Zers.). zers. sich beim Aufbewahren; l. in k. verd. NaOH oder verd. wss. NH_3 mit tiefgrüner

ner Farbe, die sich über Dunkelgrün u. Rotbraun zu Gelbbraun aufhellt; wird mit H_2SO_4 wieder dunkelblau, dann braun u. schließlich hellgelb, indem das Hydroxyl-
n ausfällt. Gibt mit sd. NH_3 3,5-Dinitrotoluidin-4, Nadelchen, F. 168°. — β -4-Di-
oxylhydroxylamino-3,5-dinitrotolol, $\text{C}_{21}\text{H}_{15}\text{O}_7\text{N}_3$; weiße Krystalle, aus A., F. 175,5°. —
wird durch h. HNO_3 (D. 1,5) sehr leicht zers. Eiswasser gab geringe Mengen eines
in dem 3,4,5-Trinitrotolol nicht sicher nachgewiesen wurde. — 3,5-Dinitro-
tol, $\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_6\text{N}_2$, aus 3,5-Dinitroguajacol + Diazomethan; F. 99°. — 3,5-Dinitro-
acol-2-phenyläther, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_6\text{N}_2$, aus 3,5-Dinitro-2-chloranisol mit Na u. w. Phenol
Überschuß; weiße Nadeln, aus A., F. 123°. — Beide Verbb. gaben mit Hydroxyl-
n Prodd. (braunes Pulver, Zers. 155°), die beim Aufkochen mit verd. NH_3 2-Amino-
nitroanisol, $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_5\text{N}_3$, gaben; rotbraune Nadelchen, aus A., F. 177°. — 2,4,6-Tri-
o-3-methoxytolol, F. 92°, gibt in h. A. mit h. Hydroxylamin 3-Hydroxylamino-
3-trinitrotolol, $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_7\text{N}_4$ (V); dunkelgelbe Krystalle, aus A. durch Verd., F. 99°
s.); wird durch längeres Kochen in ein dunkelbraunes Harz verwandelt, aus dem
3-Amino-2,4,6-trinitrotolol nicht abscheiden läßt; ist lange haltbar; l. in Alkali-
e u. NH_3 mit tief rotbrauner Farbe. — 3-Acetylverb., $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_6\text{N}_4$, gelbe Nadeln,
A., F. 121°. — V gibt mit HNO_3 (D. 1,5) 2,3,4,6-Tetranitrotolol, $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_6\text{N}_4$, weiße
tchen, aus Eg. + W., F. 135°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 683—90.) BUSCH.

W. Borsche und E. Feske, Über β -Polynitroarylhydroxylamine. IV. Über Dihydroxylamino-4,6-dinitrobenzol. (III. vgl. vorst. Ref.) Verss., aus I über II
II zu kommen, gelangen bei $\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5$. — Verbb. II verhalten sich Basen gegenüber
t wie die in vorst. Ref. beschriebenen kernsubstituierten β -Dinitrophenylhydroxyl-
e, sondern vereinigen sich mit ihnen zu salzartigen Verbb. — Verss., zum 1,3,5-Tri-
oxylaminodinitrobenzol zu kommen, gelangen nicht.




Versuche. β -4,6-Dinitro-3-methoxyphenylhydroxylamin, $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_6\text{N}_3$ (II, $\text{R} = \text{CH}_3$),
Hydroxylaminchlorhydrat in A. mit Na in A. + h. 4,6-Dinitroresorcindimethyl-
(I) (aus 1,3-Dinitro-4,6-dichlorbenzol + Na-Methylat, F. 157°); gelbe Nadelchen,
Essigester + Lg., F. 103° (Zers.); wochenlang aufzubewahren; l. mit tiefbrauner
e in verd. NaOH, daraus durch verd. H_2SO_4 fällbar. — O-Benzoylverb., $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_7\text{N}_3$,
ne Krystalle, aus h. A., F. 131°. — Methyläther, $\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_6\text{N}_3$, aus II mit NaOH u.
ethylsulfat; ll. in CH_3OH , daraus grünlichbraune Kryställchen, F. 135° (Zers.). —
Verb. $2\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_6\text{N}_3, \text{NH}_3$, aus II mit sd. ammoniakal. Ammoniumacetatlg.; schwarz-
ne Nadelchen, F. 113° (Zers.) — Anilinverb. $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{O}_6\text{N}_4$, aus II mit w. Anilin;
Nadeln, F. 116°; verwandeln sich allmählich wieder in das gelbe Hydroxylamin
ck. — Hydrazinverb. $\text{C}_7\text{H}_{11}\text{O}_6\text{N}_5$, aus II in w. A. + Hydrazinhydrat; violett schim-
nde Nadelchen, F. 170° (Zers.); werden vorher braun. Gibt beim Kochen in A.
Hydrazino-4,6-dinitrophenylhydroxylamin. — II gibt mit Schwefelammonium
Diamino-4-nitro-5-methoxybenzol, $\text{C}_7\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_3$; dunkelrote Nadeln, aus h. W., F. 184°.
gibt in Eg. mit CrO_3 3-Nitroso-4,6-dinitroanisol, $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_6\text{N}_3$; orangegelbe Krystalle,
Eg., schm. bei 158° zu einer grünen Schmelze. — II gibt mit h. HNO_3 (D. 1,52)
-Trinitroanisol, $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$; dunkelgelbe Krystalle, aus Eg. + W., F. 104°. —
Dinitroresorcindiphenyläther, $\text{C}_{18}\text{H}_{12}\text{O}_6\text{N}_2$, aus Na in Phenol u. 4,6-Dinitro-1,3-di-
benzol; farblose Nadeln, aus sd. CH_3OH , F. 129°. — Gibt bei der Umsetzung
2 Moll. Hydroxylamin wie oben β -4,6-Dinitro-3-phenoxyphenylhydroxylamin,
 $\text{C}_9\text{O}_6\text{N}_3$ (II, $\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5$) neben Dihydroxylaminodinitrobenzol; gelbe Nadeln, aus
VIII. 1.

Bzl. + Lg., F. 116° (Zers.); unbeständig; überläßt man sie in der Mutterlauge selbst, so entstehen (sofort, wenn man mit der stabilen Form impft) leuchtend Nadeln, F. 108°; können aus Bzl. + Lg. wieder in die höher schmelzbare Form gewandelt werden. Ist rein unverändert haltbar; l. in konz. H_2SO_4 mit gelbbrauner Farbe, die über Dunkelbraun in Tiefgrün umschlägt. — *O-Acetylverb.*, $C_{14}H_{11}O$ gelbe Nadeln, F. 149°. — Gibt in A. bei 40–50° + konz. NH_3 stahlblau schimmernde schwarze Krystalle der *NH₄-Verb.*, F. 114° (Zers.); sind nur in NH_3 -Atmosphäre längere Zeit beständig; verwittern an der Luft. Etwas haltbarer ist die *Hydrazinverb.*, $C_{12}H_9O \cdot N_2H_4$; schwarze Krystalle mit violetter Oberflächenreflex; F. 193° (Zers.). — I. Kochen der mit 1 Mol. Hydrazinhydrat versetzten alkoh. Lsg. des Hydroxylamin entsteht *3-Hydroxylamino-4,6-dinitrophenylhydrazin*, $C_6H_5O_5N_5$, orangefarbene Nadeln aus Nitrobenz., zers. sich explosionsartig bei 214°. — II gibt mit w. HNO_3 (D. 1,12) *1,2,4-Trinitro-5-2',4'-dinitrophenoxybenzol*, $C_{12}H_5O_{11}N_5$ (IV); bräunlichgelbe Krystalle aus Eg., F. 186,5°. — β,β' -4,6-Dinitrophenylen-1,3-dihydroxylamin, $C_6H_6O_6N_4$ (III), wenn man die beiden C_6H_5O -Gruppen nacheinander gegen $\cdot NH(OH)$ austauscht; bräunlichgelbe Nadeln, aus A. + W., zers. sich explosionsartig bei 184°; enthalten 1 Mol. H₂O rein monatelang haltbar; ist dimorph; läßt man die Lsg. in verd. A. stehen, scheitert sie ziegelrote Tafeln ab, F. 172° (Zers.), lassen sich aus A. + W. in die Nadeln F. 184° zurückverwandeln; mit konz. H_2SO_4 dieselbe Farbenrk. wie die Phenoxyverb. l. in verd. NaOH oder verd. NH_3 mit tief rotbrauner Farbe; die ammoniakal. Lsg. scheidet beim Erwärmen 1,3-Diamino-4,6-dinitrobenzol ab. — Gibt in n. Essigsäureanhydrid gelbe Nadeln von *Diacetyldinitrophenyldihydroxylamin*, $C_{10}H_{10}O_8N_4 = C_6H_2(NO_2)_2 \cdot (NH \cdot O \cdot CO \cdot CH_3)_2$ (?); aus A., F. 171°. — III wird durch CrO_3 zers.; 1,3-Dinitroso-4,6-dinitrobenzol scheint sich vorübergehend zu bilden, wenn man III in k. HNO_3 (D. 1,12) einträgt; darin l. mit grüner Farbe, die beim Erwärmen über Braun in Gelb übergeht, hält man die Lsg. über diesen Punkt hinaus bei Wasserbadtemp., entsteht *1,2,4,5-Tetrinitrobenzol*, $C_6H_2O_8N_4$; hellgelbe Krystalle, aus verd. A., F. 188°. — *Dinitrophenylglucintriphenyläther* ist dimorph; Form 1: aus sd. A., bei langsamem Erkalten, F. 171°; Form 2, durch rasches Abkühlen abgeschieden, F. 87°; Form 2 erstarrt nach Erwärmen auf dem Wasserbade zu Form 1 (F. 107°); Form 2 ist stark lichtempfindlich; b. im Dunkeln unverändert, färbt sich schon im zerstreuten Tageslicht dunkel blaugrau. *Dinitrophenylglucintrisdinitrophenyläther*, $C_{24}H_{10}O_{18}N_8$ (V), aus Dinitrophenylglucintriphenyläther in HNO_3 (D. 1,52) auf dem Wasserbade; gelblichweiße Nadeln, aus Nitrobenz. + A., F. 279°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 815–21. Göttingen, Univ.)

K. v. Auwers und H. Hollmann, Über die Isomerieverhältnisse in der Pyrazolreihe. VI. Über Alkylderivate der 3,5-Methylpyrazolcarbonsäure und des 3(5)-Methylpyrazols. (V. vgl. v. AUWERS u. DANIEL, Journ. f. prakt. Ch. [2] 110. 235; C. 112. 1759.) 3(5)-Methylpyrazol gab bei der Alkylierung bisher nur eine Art Dialkylderiv., als 1,3-Deriv., angesehen (v. AUWERS u. BROCHE, 1. Mitt.). 3,5-Methylchlorpyrazol gibt dagegen beide möglichen Alkylderiv., von denen die mit den Alkylgruppen Nachbarschaft die stabileren sind (v. AUWERS u. NIEMEYER, 3. Mitt.). Es erhebt sich die Frage, ob jeder negative Substituent eine derartige Stabilitätsverschiedenheit hervorbringt. Zunächst wurde der 3,5-Methylpyrazolcarbonsäureester (I.; die Stellung des H ist willkürlich) untersucht, weil es nicht ausgeschlossen war, von ihm aus die bisher vergeblich gesuchten 1,5-Dialkylpyrazole zu gewinnen. I. liefert bei Äthylierung zwei isomere N-Äthylmethylpyrazolcarbonsäureester, die durch Dest. leicht getrennt werden können. Von dem höher sd. Ester (II.) erhält man 2–3-mal so viel von dem tiefer sd. (III.). Die Konst. beider geht aus folgenden Umwandlungen hervor: Die II. u. III. entsprechenden Carbonsäuren wurden bromiert u. die Bromderiv. mit methylalkoh. HCl behandelt. Hierbei gibt nur die II. entsprechende Säure einen Methylester, besitzt also Formel IV., das Isomere Formel V. (ster. Hinderung). Eliminierung des $CO_2C_2H_5$ aus I. u. II. führt zu zwei verschiedenen N-Äthylmet-

colen, u. zwar erhält man aus II. die bereits bekannte Base, die somit nicht das sondern das 1,5-Deriv. ist. III. liefert das bisher unbekannte echte 1,3-Deriv. — analoge Resultate ergab die Methylierung von I. — Die Dialkylpyrazole verlieren die Sonderstellung, die sie bisher einzunehmen schienen. Doch bleibt die Tatsache bestehen, daß bei ihrer B. Alkylverschiebung eintreten kann. Die Umsetzung Hydrazinen mit ungesätt. Aldehyden u. Ketonen ist, worauf schon V. AUWERS TENS (S. 663) hinwiesen, von einer Anzahl Faktoren abhängig, weswegen Analogieschlüsse zu Irrtümern führen können. Die früheren Synthesen u. die Alkylierung (5)-Methylpyrazols sind nachzuprüfen.




Versuche. Die Äthylierung von I. (dargestellt nach KNORR, LIEBIGS Ann. 219 [1894]) erfolgt mit C_2H_5Br in sd. $NaOC_2H_5$ -Lsg. unter Hg-Verschluß u. dreifache Rektifizierung. — 1-Äthyl-5-methylpyrazol-3-carbonsäureäthylester, $C_9H_{14}O_2N_2$, dickes, charakterist. riechendes Öl, Kp_{12} 154° , $Kp.$ ca. 285° , D_4^{20} 1,079, $n_{He}^{20} = 1,421$, l. in konz. HCl, mit W. fällbar. Gibt kein Pikrat. — 1-Äthyl-3-methylpyrazol-5-carbonsäureäthylester, $C_9H_{14}O_2N_2$ (III.), Kp_{12} $101,5^\circ$, $Kp.$ ca. 235° , D_4^{20} 1,040, $n_{He}^{20} = 1,413$, stärker bas., l. in verd. HCl. Pikrat, aus $CH_3OH + W.$, F. $68-69^\circ$, wird von Bzl. oder Lg. gespalten. — 1-Äthyl-5-methylpyrazol-3-carbonsäure, $C_7H_{10}O_2N_2$, l. mit sd. 15%ig. alkoh. KOH. Körnchen aus W. oder Bzl., F. $136-137^\circ$, ll. in A., W., Ä., Bzl., l. in konz. HCl, mit W. fällbar. — 4-Bromderiv., $C_7H_9O_2N_2Br$ (IV.), Nadeln aus wss. Aceton, F. $148,5-149^\circ$, ll. in Aceton, swl. in W., Ä., Bzl. — 5-Methylester, $C_8H_{11}O_2N_2Br$. Mit sd. 3%ig. methylalkoh. HCl (3 Stdn.). Nadeln aus Lg. W., F. $65-66^\circ$. — 1-Äthyl-3-methylpyrazol-5-carbonsäure, $C_7H_{10}O_2N_2$, krystallin. r aus W. oder Bzl., F. $141-142^\circ$. — 4-Bromderiv., $C_7H_9O_2N_2Br$ (V.). Über das Hydrobromid (F. 194°) durch Zerlegen mit W. Aus wss. Aceton, F. 159° , swl. in Ä., W., Ä., Bzl. — 1-Äthyl-5-methylpyrazol. Durch Erhitzen der Säure vom F. 137° . $Kp.$ 161° , D_4^{20} 0,951, $n_{He}^{20} = 1,4741$. Pikrat, F. $142-143^\circ$. Der in der 1. Mitt. für vermeintliche 1-Äthyl-3-methylpyrazol angegebene $Kp.$ 152° (unkorr.) ist zu g. — 1-Äthyl-3-methylpyrazol, $C_6H_{10}N_2$, charakterist. riechendes Öl, $Kp.$ 152° , D_4^{20} 0,936, $n_{He}^{20} = 1,4675$, ll. in W. Pikrat, citronengelbes Pulver, F. $114,5-115,5^\circ$, zerfällt als das Isomere, zers. sich auf dem Wasserbad. — Bei der Methylierung von I. gleichzeitig das C_2H_5 durch CH_3 ersetzt. — 1,5-Dimethylpyrazol-3-carbonsäure-äthylester, $C_8H_{10}O_2N_2$, Kp_{11} 144° , aus Bzl., F. $71,5-72,5^\circ$, ll. in Ä., zl. in Bzl. — 1,5-Dimethylpyrazol-5-carbonsäuremethylester, $C_7H_{10}O_2N_2$, dickes Öl, Kp_{11} 91° . — 1,5-Dimethylpyrazol-3-carbonsäure, $C_6H_8O_2N_2$, Kryställchen aus A., F. $175-176^\circ$, zl. in W., swl. in W. — 4-Bromderiv., $C_6H_7O_2N_2Br$, krystallin. Pulver aus W., F. $194-195^\circ$. — Methylester, $C_7H_9O_2N_2Br$, krystallin. Pulver aus Lg., F. 79° . — 1,3-Dimethylpyrazol-5-carbonsäure, $C_6H_8O_2N_2$, Kryställchen aus A., F. 207° , zl. in Eg., wl. in W. — 4-Bromderiv., $C_6H_7O_2N_2Br$, Pulver aus W., F. 232° , ll. in Aceton, wl. in W. — 1,3-Dimethylpyrazol, $C_5H_8N_2$, $Kp.$ 153° (korr.), also höher als in der 1. Mitt. angegeben. — 4-Bromderiv., $C_5H_7N_2Br$. Durch Erhitzen der bromierten Säure im Vakuum oder durch Bromieren der Base in Eg. über das Hydrobromid (F. $125-126^\circ$). f. Kryställchen, F. $38,5-39,5^\circ$, ll. außer in W., Lg. Pikrat, hellgelbes Pulver aus A., F. $122-122,5^\circ$. — 1,3-Dimethylpyrazol, $C_5H_8N_2$, charakterist. riechendes Öl, $Kp.$ 136° , l. in W. Pikrat, citronengelbe Kryställchen, F. 137° , leichter l. in A., als das Isomere. — 4-Bromderiv., $C_5H_7N_2Br$, Kp_{10} 75° , ll. Pikrat, hellgelbes Pulver,

F. 116°, leichter l. in Ä. als das Isomere. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. bis 607.)

LINDENBAUM

K. v. Auwers und **H. Maub**, *Über die Isomerieverhältnisse in der Pyrazolreihe*. VII. *Über Methyl-diphenylpyrazol und einige andere Pyrazolderivate*. (VI. vgl. vor. Ref.) In vorliegender Arbeit wird die Konst. der von KNORR u. BLANK (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 18. 311. 931 [1885]) entdeckten beiden *Methyl-diphenylpyrazole* endgültig festgestellt. Die eine Verb. (F. 63°) war aus Benzoylacetessigester, die andere (F. 72°) aus Benzalacetessigester u. Phenylhydrazin gewonnen worden. Ein sicherer Schluss auf die Konst. ließ sich aus diesen Synthesen nicht ziehen. Später aber erhielt KNORR (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 1096 [1887]; 26. 113. Anm. [1893]) durch Dest. des Benzalacetophenylhydrazons ein Pyrazolin u. ein Pyrazol, welches letzteres, obwohl es blieb, mit der Verb. 63° ident. sein mußte, da das Pyrazolin mit dem durch Red. Verb. 63° erhaltenen ident. war. Nach dieser Bildungsweise mußten das 3-Methyl-diphenylpyrazolin (I.) u. -pyrazol (II.) vorliegen, u. die Verb. 47° mußte das 5-Methyl-diphenylpyrazol (III.) sein. — Zunächst wurde der Knorrsche Konst.-Beweis für I. u. II. noch sicherer gestaltet, indem das Benzalacetophenylhydrazon (I.) dargestellt u. verseift wurde. Das Verseifungsprod. war ident. mit dem Benzalacetophenylhydrazon, dessen Natur somit unzweifelhaft feststeht. Dieses läßt sich gut in I. überführen. Daß das aus ihm nach KNORR erhältliche, ölig bleibende II. wirklich die Verb. 63° ist, wurde durch Darst. des Pikrats bewiesen, das ident. war mit dem Pikrat des aus Benzoylacetessigester dargestellten II. Der Verlauf dieser letzteren Synthese über V. ist leicht ersichtlich. — Das nach KNORR u. BLANK aus Benzalacetessigester dargestellte III. schmolz nicht bei 47°, sondern bei 77°. Mit Na u. HNO₃ erhielten auch Vff. daraus ein nicht krystallisierendes Pyrazolin, das mit HNO₃ dieselbe indigoblaue Färbung gibt wie ein nach v. AUWERS u. LÄMMERHIRT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 1011; C. 1921. III. 329) gewonnenes reines Präparat u. wahrscheinlich Verunreinigungen enthält, welche die Krystallisation verhindern. Während das Phenylhydrazin beim Benzalacetan an der CO-Gruppe angreift, lagert es sich beim Benzalacetessigester erst an die C-Doppelbindung an; dann erfolgt H₂O-Abspaltung. Demnach wäre das Pyrazolinderiv. VI. zu erwarten, während tatsächlich gleich das um 5° ärmerere Pyrazolderiv. erhalten wird, auch wenn man unter Ausschluß von O arbeitet. Da im allgemeinen die Pyrazoline, in denen man die Doppelbindung zwischen C₃ u. C₄ annimmt, ziemlich beständig sind, so könnte die spontane H-Abspaltung aus VI. in der andersartigen Lage der Doppelbindung ihre Ursache haben. — Als Nebenprod. bei der Kondensation von Benzalacetessigester mit Phenylhydrazin bildet sich das Benzaldehydphenylhydrazon. Bei Verss., diese Rk. aufzuklären, haben Vff. ein wahrscheinliches Zwischenprod. erhalten, dessen Analysen auf VII. oder VIII., dessen M.-Gew.-Best. in Campher u. Bzl. auf VII. stimmen. Letztere ist nicht entscheidend, da die Substanz nicht unverändert zurückgewonnen wurde u. wahrscheinlich in VI. zerfallen war. Da sie außerdem schon an k. HCl Phenylhydrazin abgibt, ist VII. wahrscheinlicher. — Anders verläuft die Kondensation des Benzalacetessigesters mit Phenylhydrazin in saurem Medium, am besten Eg. Es entsteht das Phenylhydrazon IX., dessen freie Säure bei der KMnO₄-Oxydation reichlich Benzoesäure liefert (Knorrs Beweis). IX. läßt sich mit Eg. glatt zum Pyrazolinderiv. X. isomerisieren, das im Gegensatz zu VI. keine Neigung zur H-Abspaltung zeigt. Um so auffällender ist es, daß bei eintägigem Stehen von IX. mit alkoh. KOH keine Verseifung, sondern Reduktion u. Oxydation zu V. erfolgt. Der Ester X. läßt sich über die zugehörige Säure zu I. abbauen, womit seine Konst. bewiesen ist. — Anschließend wurden die bekannten Dicarbonsäuren XI. u. XII. auf Esterbildung untersucht. Unter gleichen Bedingungen liefert XI. 70–80%, XII. nur ca. 10% Dimethylester, was die Formeln bestätigt lassen. — Durch Zufall wurde gefunden, daß II. auch in einer Form vom F. 72° auftreten kann, u. zwar stellt diese die stabile Form dar, in welche die vom F. 63° darge-


fen übergeht. Liegt die stabile Form einmal vor, ist die andere infolge Keimwrgk. wiederzuerhalten. Es handelt sich wie in ähnlichen Fällen um eine feinere, noch klärliche Isomerie. Vielleicht beruht die oben erwähnte Abweichung im F. der . III. auf der gleichen Erscheinung. — Das aus Äthylidenacetessigester u. Phenyl-
azin von KNORR (l. c.) erhaltene Öl, das bei der Dest. unter H-Abspaltung in
-Phenyl-3,5-dimethylpyrazol-4-carbonsäureester übergeht, ist das Phenylhydrazon
Ausgangsesters u. liefert demgemäß bei der KMnO_4 -Oxydation Essigsäure.



Versuche. 3-Methyl-1,5-diphenylpyrazolin (I.) Aus Benzalacetophenylhydr-
mit sd. Eg., F. 114—116°. — Benzalacetophenylhydrazon, $\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$ (IV.).
den Komponenten in h. A. Gelbliche Blättchen aus CH_3OH , F. 127,5—128,5°,
Aceton, Bzl., zl. in A., Ä. Mit sd. alkoh. KOH wird nur das Benzoyl abgespalten,
d. Eg. + HCl entsteht I., mit sd. Eg. allein (1 Stde.) 1-Acetyl-2-benzoyl-2-phenyl-
zin, $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2$, aus CH_3OH , F. 151—152°. — 5-Methyl-1,3-diphenylpyrazol,
 $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{N}_2$ (III.), Kp. 340—345° (niedriger als bei KNORR u. BLANK), rhomb. Krystalle
g., F. 77—77,5°, meist ll. Pikrat, gelbe Prismen aus CH_3OH , F. 108—109°. —
ethylat, $\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{J}$. Im Toluolofen. Aus A., F. 188°. — 4(?) -Bromderiv., $\text{C}_{16}\text{H}_{13}$
In Chlf. Nadelchen aus PAe., F. 58—59°, meist ll. — 5-Methyl-1,3-diphenyl-
ol-4-carbonsäuremethylester, $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_2$. Aus der Säure (KNORR u. BLANK)
d. 30%ig. methylalkoh. HCl. Prismen aus CH_3OH , F. 100—101°, ll. außer in A.,
— 1,3-Diphenylpyrazol-4,5-dicarbonsäuredimethylester, $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_4\text{N}_2$. Aus der Säure
(Darst. nach KNORR u. DUDEN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 26. 114 [1893]) wie
ehend. Nadelchen aus CH_3OH oder Bzl. + PAe., F. 150,5—151,5°, ll. außer in
— 1,3-Diphenylpyrazol-4-carbonsäure, $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_2$. Durch Erhitzen von XII.
a. 200°. Krystallin. Pulver aus Essigsäure, F. 202—203°, ll. in A., Aceton, wl.
Bzl., Lg. — 1,3-Diphenylpyrazol. Aus XII. bei 230°. Kp. 330—335°, aus Lg.,
°. — Benzalacetessigsäureäthylesterphenylhydrazon, $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$ (IX.). Aus den
ponenten in Eg. bei Zimmertemp. Gelbe Tafeln aus CH_3OH , F. 149—150°, ll.
eton, Chlf., zl. in A., Ä. Bzl. Färbung mit HCl tiefgelb, mit H_2SO_4 orange. —
Säure, $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_2$. Mit sd. alkoh. Lauge, aus alkal. Lsg. umfällen. F. unscharf
6° unter CO_2 -Abspaltung, ll. in A., Ä., Eg., Bzl., wl. in W., Lg. Gibt frisch
nach einigen Tagen deutliche Pyrazolinrk. — 3-Methyl-1,5-diphenylpyrazolin-4-
säureäthylester, $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$ (X.). Aus IX. mit sd. Eg. (1 Stde.). Nadelchen
 H_3OH , F. 83—84°, ll. in Ä., Aceton, Bzl., zl. in A., Lg., unl. in konz. HCl. Pyr-
rk. schwach rotviolett, vergänglich. Entsteht auch direkt aus Benzalacetessig-
u. Phenylhydrazin in h. Eg. — Freie Säure, $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_2$, krystallin. Pulver aus
+ PAe., F. 123—124° unter Gasentw., ll. in A., Ä., Aceton, Eg., wl. in Bzl.,
wl. in W., sehr zersetzlich. Gibt beim Erhitzen über den F. I. — Phenylhydrazon
-[α' -Phenylhydrazinobenzyl]-acetessigsäureäthylesters, $\text{C}_{25}\text{H}_{28}\text{O}_2\text{N}_4$ (VIII.). Aus
lacetessigester u. Phenylhydrazin in Ä. unter starker Kühlung neben 5-Methyl-1,3-
nylpyrazol-4-carbonsäureester. Nach Waschen mit CH_3OH F. unscharf 118

bis 128°. — 3-Methyl-1,5-diphenylpyrazol (II.). Aus Benzoylacetessigester. Aus P. F. 62—63°. Pikrat, gelbe Prismen aus CH_3OH , F. 124°. — Jodmethylat, F. 186°. 1,5-Diphenylpyrazol-3,4-dicarbonensäuredimethylester, $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_4\text{N}_2$. Aus der Säure (Darst. nach KNORR u. LAUBMANN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **22**. 175 [1889]) wie o Nadeln aus CH_3OH , F. 97—97,5°, ll. in Ä., Aceton, Bzl., zl. in A., Eg. — 1,5-Diphenylpyrazol-4(?)-carbonsäure, $\text{C}_{18}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_2$. Durch Erhitzen von XI. entstehen Py. von verschiedenen FF. Eine Probe besaß, aus verd. Essigsäure, F. 162—164°. Äthylidenacetessigsäureäthylesterphenylhydrazon, $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}_2$. Mit $1\frac{1}{2}$ Mol. Ph. hydrazin, Überschuß mit verd. HCl entfernen. Öl, nicht unzers. destillierbar. (schon bei 70° H ab. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 611—24. Marburg, Univ.) L

Harold Atkinson und Isidor Morris Heilbron, *Styrylpyryliumsalze*. VI. *Styrylpyryliumsalze des 9-Methylxanthylumchlorids und 3,6-Dioxy-9-methylxanthylumchlorids* (V. vgl. Journ. Chem. Soc. London **127**. 690; C. **1925**. II. 37.) Die Leichtigkeit mit welcher 6-Oxy-9-methylfluoron (II) mit HNO_2 zum i-Nitrosoderiv. reagiert (K. MANN, LIEBIGS Ann. **372**. 287 [1910]) macht es wahrscheinlich, daß die Methylgruppe eines Xanthylumkernes in 9-Stellung dieselbe Reaktionsfähigkeit zeigen würde, wie die α - oder γ -Methylgruppe der Benzopyryliumreihe besitzen. DECKER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **38**. 2493 [1905]) hat 9-Methylxanthylumchlorid als FeCl_3 -Doppsalz aus Methyl-MgJ u. Xanthon erhalten. Das freie Chlorid ist schwer zugänglich, doch kann an seiner Stelle eine äth. Lsg. des leicht zugänglichen 9-Methylxanthylumchlorids (III) angewandt werden, u. es entsteht hieraus mit Benzaldehyd u. HCl 9-Styrylxanthylumchlorid (I), welches bereits von ZIEGLER u. OCHS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 2257; C. **1922**. III. 1130) beschrieben worden ist. Analog lassen sich auch Kondensationen mit p-Oxybenzaldehyd, p-Methoxybenzaldehyd, Piperonal u. Vanillin ausführen. Die im Styrylrest substituierten Styrylxanthylumsalze sind tief gefärbt. Verbb., ll. in HCOOH . 4'-Oxy-9-styrylxanthylumchlorid (IV) gibt in HCOOH eine rotviolette Lsg., welche beim Verdünnen mit W. langsam in blau umschlägt. Diese Farbererscheinungen auf die B. einer chinoiden Anhydrobase V zurückzuführen während im Falle des 4'-Methoxyderiv., wo eine solche Umlagerung ausgeschlossen ist, die Carbinolbase VI entsteht. ZIEGLER u. OCHS (l. c.) geben an, daß beim Erhitzen von I mit A. 9-Styrylxanthylumäthyläther (VII), beim Kochen 9-Styrylxanthylum (VIII) entstehen. Vff. finden, daß die am Styrylrest substituierten Chloride, wenn sie mit A. in Berührung gelassen werden, farblose krystallinische Substanzen bilden, welche für die genannten Formeln zu hohe Kohlenstoffgehalte aufweisen. Die Kondensation von 3,6-Dioxy-9-methylxanthylumchlorid in A. mit dem entsprechenden Aldehyd u. HCl lassen sich 3,6-Dioxy-9-styrylxanthylumsalze herstellen, welche A. ohne Veränderung l. sind.



Versuche. Xanthon liefert mit $\text{CH}_3\text{-MgJ}$ u. nachfolgender Behandlung

tionsprod. mit HCl 9-Methylxanthylumchlorid, aus wasserfreier HCOOH u. Ä., 5°, FeCl₃-Doppelsalz, F. 204°. Die Herst. des 9-Styrylxanthylumchlorides geht in der Weise, daß in eine äth. Lsg. von 9-Methylxanthenol u. dem entstehenden Aldehyd trockener HCl eingeleitet wird. Mit Benzaldehyd 9-Styrylxanthylumchlorid, Platten vom F. 95° u. rote Nadeln vom F. 66—92° (unscharf). Doppelsalz, F. 188°, Äthyläther, F. 168—169°. Mit p-Oxybenzaldehyd 4'-Oxyxanthylumchlorid, C₂₂H₁₅O₂Cl, aus HCOOH mit 1·HCOOH, in Eg. violette Nadeln. Aus HCOOH mit W. die Anhydrobase V, mit A. eine farblose Verb. vom F. 228° (in Aceton). Mit p-Methoxybenzaldehyd 4'-Methoxy-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₂H₁₇O₂Cl, aus Chlf. mit HCl grüne Nadeln vom F. 98°, ll. in HCOOH u. Eg. mit gleicher Farbe. Mit A. eine Verb. vom F. 194°, FeCl₃-Doppelsalz, Verfärbung bei Zers. bei 212°. 4'-Oxy-3'-methoxy-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₂H₁₇O₃Cl, aus OH mit 1·HCOOH, F. 135°. 3',4'-Methylenedioxy-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₂H₁₅O₃Cl, als ZnCl₂-Doppelsalz analysiert. Resacetophenon u. Resorcin geben bei -150° mit gasförmiger HCl behandelt 3,6-Dioxy-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₂H₁₅O₄Cl, aus mit p-Oxybenzaldehyd wie oben 3,4',6-Trioxy-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₂H₁₅O₄Cl, aus HCOOH Nadeln, rot im durchfallenden, grün im auffallenden Licht, Zers. bei 273—274°. 3,6-Dioxy-4'-methoxy-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₂H₁₇O₄Cl, aus HCOOH gelbe Platten, F. 282° (Zers.). 3,4',6-Trioxy-5'-methoxy-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₂H₁₅O₅Cl, aus HCOOH Nadeln, violett mit grünem Glanz, stark hygroskopisch, Zers. bei 244—245°. 3,6-Dioxy-4',5'-methylenedioxy-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₂H₁₅O₅Cl, HCOOH bronzegrüne Nadeln, Zers. bei 316°. Mit p-Dimethylaminobenzaldehyd 4'-dimethylamino-9-styrylxanthylumchlorid, C₂₃H₂₀O₃NCl, aus viel A. grüne Nadeln, welche sich beim Erhitzen rot färben. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 84. Liverpool, Univ.)


TAUBE.

A. Tschitschibabin und **G. Menschikow**, Alkylierung des α -Pyridylnitrarnids. Eine neue der Kishner-Wolffschen analoge Reaktion. (Journ. Russ. Phys.-Chem. 57. 315—18. 1925. — C. 1925. I. 1498.)

BIKERMAN.

A. Tschitschibabin und **N. Posdnjakow**, α, β_1 -Diaminopyridin. Da der Bau 2,5-Diaminopyridins dem von p-Phenyldiamin analog ist, so erwarteten Vff. Kondensation desselben mit Phenol bei Einw. von PbO₂; es trat aber keine

Rk. ein. Dagegen konnte der Farbstoff C₁₅H₁₂ON₄ (vgl. nebenstehende Formel) aus dem diazotierten 2,5-Diaminopyridin (man löst 2 g salzsaures Diamin in 60 ccm W. auf, setzt 1,4 g konz. H₂SO₄ u. bei Eiskühlung 1 g NaNO₂ in 30 ccm W. hinzu) u. β -Naphthol dargestellt werden: braune




Kristalle (aus verd. A.), F. 188—189°, swl. in h. W., ll. in A. u. Säuren, färbt im Wasserbad die Seide goldgelb, die Wolle braungelb. — Außerdem wurde aus α -Aminopyridin u. 3 Moll. Acetanhydrid auf dem Wasserbad am Rückflußkühler das α -Acetamino- β_1 -aminopyridin, C₇H₇O₃N₃, synthetisiert: fast farblose Krystalle (aus h. W.), F. 196°, konnten nicht zum α -Acetamino- β_1 -aminopyridin reduziert werden. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 297—99. 1925.)

BIKERMAN.

A. Tschitschibabin und **R. Perssitz**, Benzoldiazo- α -aminopyridin. Benzoldiazo- α -aminopyridin, C₆H₅·N:N·NH·C₅H₄N (vgl. TSCHITSCHIBABIN u. SEIDE, Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 46. 1226; C. 1915. I. 1064) gibt bei Erwärmung mit Anilin u. Anilinhydrochlorid Aminoazobenzol u. α -Aminopyridin, bei intensiver Erwärmung mit α -Aminopyridin u. α -Aminopyridinhydrochlorid α -Anilinopyridin u. andere Prodd. unter N₂-Entw. — Benzoldiazo- α -aminopyridin, aus 5 g diazotiertem Anilin u. 5 g α -Aminopyridin in gesätt. NaHCO₃-Lsg., schwach gelbliche Nadeln (aus h. W.), F. 176°. 10 g Substanz liefern mit 5 g Anilinhydrochlorid u. 25 g Anilin

bei 100—105° 10,5 g salzsaures Aminoazobenzol u. 3,5 g α -Aminopyridin. (Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 301—04. 1925. Moskau, Techn. Hochsch.) BIKER

M. Oparina, *Untersuchung der Kondensationsprodukte aus i-Valeraldehyd Ammoniak in Gegenwart von Aluminiumoxyd*. Bei der Kondensation von i-Valeraldehyd mit NH_3 haben sich 3 Verbb. gebildet: *Valeritrin* (vgl. TSCHITSCHIBABIN Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **37**. 1229; C. **1906**. I. 1438) (**I**), γ -i-Butyl- β -i-propylpyridin (**II**) u. β , β -Di-i-propylpyridin (**III**), deren Konst. folgendermaßen bestimmt wurde: Aus dem Bildungsschema, das auch von TSCHITSCHIBABIN, MIKIN u. TJASHELOWA (Journ. f. prakt. Ch. **107**. 132; C. **1924**. II. 308) u. von TSCHITSCHIBABIN u. OPARINA (Journ. f. prakt. Ch. **107**. 145; C. **1924**. II. 308) bestätigt wird, folgt die β , β -Stellung der i-Propylgruppen. Bei Oxydation mit HNO_3 , die die i-Propylgruppen nicht angreift (sie läßt **III** unverändert), erhält man aus **I** die Säure **V**, wozu durch KMnO_4 **VI** u. **VII** entstehen. Die Konst. von **VI** wird durch Überführung von β -i-Propylpyridin bei Dest. über $\text{Ca}(\text{OH})_2$, durch für die α -Carboxyle charakteristische Farbrk. mit FeSO_4 u. durch Unfähigkeit, ein Anhydrid zu bilden, bewiesen. Der Substitutionsbeweis für **VII**: B. von β -i-Propylpyridin bei Dest.; Erhöhung der Acetone auf das doppelte durch Erwärmen mit NaOH ; Farbrk. mit FeSO_4 . Dadurch wird auch die Formeln **V** u. **I** gesichert. Bei der HNO_3 -Oxydation von **II** entsteht **VIII**. Man könnte für **II** auch die Formel **IV** erwägen, die aus dem die Ausgangssubstanz verunreinigenden opt.-akt. Aldehyd $\text{C}_2\text{H}_5 \cdot \text{CH}(\text{CH}_3) \cdot \text{CHO}$ entstehen könnte, die Oxydation von **IV** hätte zu **VI** geführt. Die Formel **VIII** wird nicht weiter bewiesen, man stellte aber fest, daß die Säure keine Rk. mit FeSO_4 gibt. Die Konst. von **III** folgt daraus, daß die Base zu **IX** oxydiert werden kann. **III** entsteht augenscheinlich




NH_3 , 2 Moll. i-Valeraldehyd u. 1 Mol. Formaldehyd, der bei der Wärmezers. des Valeraldehyds gebildet wird.

Versuche. Aus 1250 g techn. i-Valeraldehyd wurden beim Überleiten über bei $360\text{--}370^\circ$ mit NH_3 402 g Basen gewonnen, die fraktioniert u. mit Pikrinsäure gefällt wurden. Die Fraktionen $220\text{--}258^\circ$ ergaben 258 g Pikrat von **I**, die von $240\text{--}250^\circ$ lieferte auch 17 g Pikrat von **II**, die von $200\text{--}220^\circ$ u. $220\text{--}240^\circ$ Pikrat von **III**. — α -Valeritrin (neue Bezeichnung) (**I**), aus dem Pikrat, Kp. 258° , D.₄⁰ 0,8981. Wird durch KMnO_4 zu einem Gemisch von Fett- u. von Amino-carbonsäuren oxydiert. Bei 19 Stdn. langem Kochen mit viel HNO_3 (D. 1,4) geht **XI** (als Nitrat) u. **V**. Pikrat von **I**: gelbe Prismen (aus A.), F. 133° . — Verb. $\text{C}_{15}\text{H}_{23}\text{O}_4\text{N}_3$ (**XI**), gelbes Öl, geht bei Dest. unter vermindertem Druck in **XII**, bei Red. mit Fe u. verd. Eg. in **XIII** über. Gibt ein langsam krystallisierendes Nitrat, l. in H_2SO_4 , beständig gegen sd. 10% ig. KOH ; Pikrat: $\text{C}_{15}\text{H}_{23}\text{O}_4\text{N}_3 + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, gelbe Nadeln (aus Äthylacetat), F. 187° . Chloroplatinat: $2\text{C}_{15}\text{H}_{23}\text{O}_4\text{N}_3 + \text{H}_2\text{PtCl}_6$, gelbe Nadeln (aus A.), F. 208° , swl. in W. — α -i-Butyl- β , β -1-diacetylpyridin (**XII**), aus **XI** in geringer Ausbeute; Pikrat, $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N} + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, Krystalle (aus A.), F. $139\text{--}140^\circ$. — α -i-Butyl- β -1-propyl- β -acetylpyridin (?) (**XIII**), Pikrat, $\text{C}_{14}\text{H}_{21}\text{ON} + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, F. $142\text{--}143^\circ$. — β , β -Di-i-propylpyridyl- α -essigsäure (**V**), Ausbeute: 40 g 10 g **I**, Reinigung über das Cu-Salz. Krystalle (aus 50% ig. A.), F. 146° . Ll. in A., l. in W. Färbt sich mit FeSO_4 nicht. Ag-Salz, $\text{AgC}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}$ unl. in W., Nadeln. Säure wurden dreimal mit je 60 g KMnO_4 in 1 l W. gekocht; die mit A. entfärbte wurde nach Filtrieren eingedampft u. angesäuert; der Nd. wurde mit h. W. ausgewaschen, das beim Abkühlen zuerst Nadeln, dann Pulver absetzt, aus welchem letzterem die in h. W. unl. M. besteht. — Das Pulver stellt **VI** dar, fällt pulverig auch g. u. 2% ig. HCl aus, F. 208° . Gibt, in Soda gel., mit sd. wss. KMnO_4 die Lacton-**VII**. — Die Nadeln bestehen aus der Verb. **VII**, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$, F. 283° . Beständig gegen sd. wss. KMnO_4 u. sd. HNO_3 (D. 1,4). — β -i-Propylpyridin, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}$, welches aus **VII** bei Dest. mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$ entsteht, wurde auch synthet. dargestellt durch des β -Pyridyldimethylcarbinols, $\text{NC}_5\text{H}_4 \cdot \text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$, (2,5 g) mit 5 g konz. HJ in rotem P bei 16-std. Kochen am Rückflußkühler. Ausbeute: 1,8 g., Kp. $177\text{--}178^\circ$, D.₄⁰ 0,9328, D.₁₆¹⁶ 0,9227. Chloraurat, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N} + \text{HAuCl}_4$, hellgelbe Prismen (aus verd. HCl), F. 100° . Chloroplatinat, $2\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N} + \text{H}_2\text{PtCl}_6$, Nadeln (aus verd. HCl), F. 152° . Pikrat, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N} + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, längliche Prismen (aus A.), F. 136° . Gibt anwendung ein Doppelsalz mit ZnJ_2 . — Dimethyl- β -pyridylcarbinol, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{ON}$, aus Nicotinenethylester, $\text{NC}_5\text{H}_4 \cdot \text{CO}_2\text{CH}_3$, u. Methylmagnesiumjodid in Ä., F. 58° , Kp.₁₂ $140\text{--}141^\circ$. Schimmelriechend, l. in Chlf. Pikrat, Blättchen (aus A.), F. 150° . — 8 g β -i-nonylpyridin, $\text{NC}_5\text{H}_4 \cdot \text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2$, welches dargestellt wurde, weil man bei Dest. **II** mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$ seine B. erwartete. Kp. $187\text{--}188^\circ$, Kp.₂₀ 110° , D.₂₀²⁰ 0,9771. Chloroplatinat, $2\text{C}_8\text{H}_9\text{N} + \text{H}_2\text{PtCl}_6$, orangefarbene Nadeln (aus verd. HCl), F. 152° . Pikrat, $\text{C}_8\text{H}_9\text{N} + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, orangefarbene Nadeln (aus A.), F. 156° . — α -Methyl- β , β -1-propylpyridin (?), $\text{C}_{12}\text{H}_{19}\text{N}$, aus **V** bei Dest. mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Kp. $220\text{--}222^\circ$, D.₄⁰ 0,9002; wird durch sd. HNO_3 , durch HCHO oder Benzaldehyd + ZnCl_2 in geschmolzenem Zustand nicht angegriffen, durch KMnO_4 unter B. von aliph. Oxyssäuren oxydiert. Chloroplatinat, $2\text{C}_{12}\text{H}_{19}\text{N} + \text{H}_2\text{PtCl}_6$, gelbe Nadeln, F. 205° (Zers.), swl. in verd. HCl . Pikrat, Prismen (aus A.), F. $98\text{--}100^\circ$. — γ -Valeritrin (**II**), aus dem Pikrat, F. $55\text{--}256^\circ$ (unkorr.), riecht schwächer als α -Valeritrin, D.₄⁰ 0,9005, D.₁₅¹⁵ 0,8888. Chloroplatinat, $2\text{C}_{15}\text{H}_{25}\text{N} + \text{H}_2\text{PtCl}_6$, orangefarbene Prismen (aus verd. HCl), F. 210° . Pikrat, $\text{C}_{15}\text{H}_{25}\text{N} + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, hellgelbe Prismen (aus Äthylacetat), F. 210° . — β , β -Di-i-propylpyridin, (**III**), aus dem Pikrat, F. 46° (es ist die erste feste Base!), Kp. $223\text{--}224^\circ$. Riecht pfefferminzartig. Chloroplatinat, $2\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{N} + \text{H}_2\text{PtCl}_6$, orangefarbene Nadeln (aus verd. HCl), F. 185° (Zers.). Pikrat, $\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{N} + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, orangefarbene Nadeln (aus verd. HCl), F. 185° (Zers.).

$C_6H_3O_7N_3$, goldgelbe Nadeln (aus Äthylacetat), F. 131—132°. **III** tritt als Haupt- auf beim Überleiten über Al_2O_3 bei 380—390° eines Gemisches aus 1 Teil $C_2H_5 \cdot CO \cdot C_2H_5$ mit 2 Teilen i-Valeraldehyd u. NH_3 . — Bei Oxydation von **II** mit sd. (D. 1,4) entsteht anscheinend ein *Dinitroderiv.*, $C_{15}H_{23}O_4N_3$ (?), dessen unreines bei 152—155° schm., u. die Säure **VIII**, die, über Cu-Salz gereinigt, in großen P. krystallisiert, in A., Ä. u. W. l. ist u. die Formel $C_{13}H_{19}O_2N$ hat. — Bei Oxydation von **III** mittels 3%ig. $KMnO_4$ auf dem Wasserbad wurde in 70—80%ig. A. die Verb. **IX** dargestellt, $C_{11}H_{17}O_2N$, Krystalle (aus A.), F. 146°, enthält 20H. mit CH_3MgBr , kann nach SCHOTTEN-BAUMANN nicht benzoyliert werden, mit sd. HNO_3 (D. 1,4) fast quantitativ *Dinicotinsäure* (F. 323°), mit rotem P. u. HJ fast quantitativ **III**. Die Verb. **IX** wurde auch aus dem Dimethylester der nicotinsäure, $CH_3 \cdot OOC \cdot C_5H_4N \cdot COO \cdot CH_3$, u. CH_3MgJ gewonnen; als Neben- erscheint dabei die Verb. **X**, $C_{10}H_{13}O_3N_2$, F. 128°. — β, β -Di-i-propenylpyridin $C(CH_3)_3 \cdot C_5H_3N \cdot C(CH_3) : CH_2$, aus 8 g **IX** mit 30 ccm Eg. u. 5 ccm H_2SO_4 beim Aufkochen; Reinigung über das Pikrat. F. 5°, Kp. 242—243°. Ausbeute: 5 g färbt $KMnO_4$ u. Brom sofort. Wird durch sd. HNO_3 (D. 1,4) zur Dinicotinsäure diert. *Pikrat*, gellgelbe Nadeln (aus A.), F. 156°. (Journ. Russ. Phys.-Chem. 57. 319—41. 1925. Moskau, Techn. Hochschule.)

A. Tschitschibabin, D. Witkowski und M. Lapschin, Über die Nitro- von α - und γ -Aminochinolin. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 305—13. 1925. C. 1925. II. 298.)

Ward J. Mac Neal und John A. Killian, Chemische Untersuchungen über chrome Methylenblaufarbstoffe. Es werden einige Derivv. des Methylenblaus sucht, wodurch etwas Licht in die Strukturverhältnisse desselben geworfen — *Dimethylenblauchromat*, $(C_{16}H_{18}N_3S)_2CrO_4 \cdot 6H_2O$ (**I**), entstand bei Beha- einer warmen verd. Methylenblaulsg. mit Kaliumdichromat. — *Methylenazur*. *Trimethylthionin*, aus **I** durch 5-std. Erhitzen mit verd. Salzsäure u. Form-



Luftabschluß, ist unbeständig u. zerfällt sich beim Erhitzen. Es wurde das $C_{15}H_{16}N_3SJ$, das *Bromid*, *Chlorid*, *W.* u. *Zinkchlorid-Doppelsalz* dargestellt. Für das Jodid nehmen Vff. die Struktur an. — *Methylenazur* a. *Dimethylthionin* wurde entwede-

Erhitzen von Methylenblau u. Kaliumdichromat in verd. Salzsäure oder in verd. Form aus dem Chromat des *Methylenazurs B* mit verd. Säure gewonnen. Es ist unlöslich als Trimethylthionin u. kann leicht als *Chlorid* ausgesalzen werden. Z. Analyse wurde das *Jodid*, $C_{14}H_{14}N_3SJ$ verwandt. — *Methylenviolett* oder *Dimethylenol*, $C_{14}H_{12}ON_2S$, konnte aus Methylenblau, Methylenazur B oder A durch Erhitzen in verd. alkal. Lsg. in Ggw. eines komplexen löslichen Ammoniak- oder Kupfersalzes oder in Ggw. von alkal. Zinkat oder Chromat erhalten werden. — Die geschilderten Rkk. sprechen für die Annahme von BERNTHSEN u. HANTZSCH (LIEBIGS Ann. 230. 73 [1885]; Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 1804) daß die Struktur des Methylenblaufarbstoffes p-chinoider Art ist. (Journ. Chem. Soc. 48. 740—47. New York, Post-Graduat Med. School and Hospital.)

P. Aschmarin, Über den Aminosäuregehalt einiger Proteine. Von der Überzeugung ausgehend, daß ein Eiweißmolekül nur eine ganze Zahl von Aminosäureradikale enthalten kann, korrigiert Vf. die experimentell gefundenen Zahlen für die 23 Proteine. So wird z. B. im Casein 1,5% Tryptophan gefunden, was für 1 Mol. (= 8888 g; VAN SLYKE u. BOSWORTH, Journ. Biol. Chem. 14. 228; C. 1913. 0,65 Mol. *Tryptophan* entspricht; Vf. rundet auf 1 Mol. ab, was für den Tryptophan-gehalt des Caseins 2,3% ergibt. Die Differenz 2,3—1,5 soll bei der Analyse

gen sein. Die Berechnungen werden mit den Versuchsangaben von OSBORNE
hen, der den Tryptophan-, Lysin- u. Cystingehalt der Proteine aus ihrem Nähr-
olgerete. (Arch. Sc. biolog. St. Pétersb. **23**. 327—46. 1924. St. Petersburg, Inst.
r. Med.) BIKERMAN.

E. Biochemie.

obert Chambers, *Die Wirkung der Elektrolyte auf den physikalischen Zustand*
otoplasmas. Experimente, die zeigen, daß ein Einblick in den Zustand des Proto-
is nur dann erreicht werden kann, wenn es gelingt, experimentell in dem Proto-
a einer Zelle zwischen „einzelnen Regionen“ zu unterscheiden. (Amer. Naturalist
1—23. New York-City, CORNELL-Univ.) HÜCKEL.

Wilhelm Starlinger, *Über das Verhalten neutraler Natriumcaseinate bei Membran-*
yse. Nach POLANYI (vgl. FISCHENICH u. POLANYI, Kolloid-Ztschr. **36**. 275;
25. II. 642) sind Caseinionen in *Na-Caseinat*lsgg. (I) am Stromtransport nicht
gt. Vf. lehnt nach seinen Verss. diese Schlußfolgerung als zu weitgehend ab.
PLATTNER, Kolloid-Ztschr. **33**. 98; C. **1923**. III. 1027.) Durch Elektrolyse
igte I verringerten unter Toluol in mehreren Monaten nicht ihr Leitvermögen
setzten sich nicht autolyt., während durch bakterielle Einw. (auch in Ggw. von
her) das Leitvermögen um ein Vielfaches vermehrt wird. Bei der Membran-
e neutralen Na-Caseinats (mit Toluol) hat infolge membranhydrolyt. Vorgänge
einem geringen autolyt. Zerfall des Caseins, wodurch im Dialysat je nach der
1. Durchlässigkeit der Membran mehr oder weniger nichtkoagulable u. auch
lable N-Verbb. auftreten, ein bedeutender Übertritt von Na statt. Die [OH']
r wenig im Dialysat erhöht; als Anionen des Na⁺ werden die dialysierten N-Körper
'O₃' angesehen. Aus dem Na- u. N-Gehalt u. den spezif. Leitfähigkeiten der
- u. Außenfl. nach der Dialyse wird gefunden, daß der Caseinüberschuß in der
zelle eine stärkere Inaktivierung des Na⁺ im Gefolge hat. (Biochem. Ztschr. **170**.
Wien, Lab. f. physik.-chem. Biologie, Univ.) LOHMANN.

E₂. Pflanzenchemie.

Arthur Harris, *Die Anhäufung von Chloriden in den Blattgewebssäften von*
ischer Baumwolle mit dem Vorrücken der Jahreszeit. (Vgl. S. 1901.) Verfolgung
l-Gehalts in verschiedenen Wachstumsstadien. (Proc. of the soc. f. exp. biol.
d. **22**. 415—17; Ber. ges. Physiol. **33**. 83—84. 1925. Minneapolis, Dep. of botan.
of Minnesota. Ref. ARNBECK.) OPPENHEIMER.

Iobuzo Nakamura, *Über das Vorkommen von Methylmercaptan in frischer Ra-*
iswurzel (Daikon, Raphanus Sativus, L.). Vf. hat in der frischen Raphanuswurzel
ylmercaptan nachgewiesen, indem er die zerriebene Wurzel im Vakuum dest. u.
ämpfe in A. leitete. Diese Lsg. zeigt alle Rkk. des Methylmercaptans. Es wurde
die Hg-Verb. isoliert u. durch Rkk. u. Elementaranalyse identifiziert. Aus 40 kg
er Wurzel wurden 3 g Roh-Hg-Verb. = 0,31 g Mercaptan isoliert. (Biochem.
r. **164**. 31—33. 1925. Agrikulturchem. Inst. d. Univ. Tokio.) LASCH.

B. Sanjiva Rao und John Lionel Simonsen, *Das Vorkommen von Silvestren.*
n. of the Indian Inst. of Science **8**. 287—94. — C. **1926**. I. 1421.) FALKENTHAL.

l. Fosse, *Über einen neuen natürlichen Pflanzenstoff: Allantoinsäure*. (Vgl.
62.) Vf. glaubte zunächst, daß das l. c. festgestellte Ureid Allantoin sei. Dies
ich aber als unzutreffend erwiesen, da eine wss. Lsg. desselben beim Erhitzen
e Min.) oder bei Zimmertemp. (einige Tage) weder Harnstoff noch eine die Hydr-
k. zeigende Substanz liefert, sondern erst nach Einw. von Mineralsäure. Wohl
wird nach SIMON (C. r. d. l'Acad. des sciences **138**. 426 [1904]) Allantoinsäure
W. schon in der Kälte zu Harnstoff u. Glyoxylsäure hydrolysiert. Daß dieselbe


in den l. c. angegebenen Blattsäften tatsächlich enthalten ist u. die beschriebenen Erscheinungen hervorruft, wurde mittels eines neuen Deriv., der *Dixanthylallantoin-säure*, $(C_{13}H_9O \cdot NH \cdot CO \cdot NH)_2CH \cdot CO_2H$, bewiesen. Man ist der Allantoinsäure in keinem Lebewesen begegnet. — Der mit Pb-Acetat gereinigte Preßsaft der grünen Bohne wird mit Xanthidol gefällt u. der Nd. mit sd. CH_3OH erschöpfend extrahiert. Aus der Lsg. erhält man nach Einengen *Xanthyllallantoin* (vgl. FOSSE u. HÉRISSEY, C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 199; C. **1923**. III. 1019). Die Ggw. von Allantoin in dieser Pflanze war bisher unbekannt. — Extrahiert man denselben Nd. erst mit sd. A., dann mit Pyridin, so liefert letztere Lsg. eine voluminöse Substanz, die nach Umkrystallisieren aus Pyridin reine Dixanthylallantoinsäure vorliegt. — Es muß nun die Frage gel. werden, ob die Allantoinsäure als solche oder in Form eines noch unbekannten Verb. in der Pflanze bzw. in anderen Lebewesen vorkommt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 869—71.) LINDENBAUM

Theodor Lipmaa, Über die physikalischen und chemischen Eigenschaften der *Rhodoxanthins*. Das *Rhodoxanthin* (I), ein Pigment aus der Gruppe der Carotinoide, wird als ein Isomeres des *Xanthophylls*, $C_{40}H_{56}O_2$ (II), angesehen. Vf. hat ein Verfahren für die Trennung beider aufgefunden. Von dem System PAe.- $CaCO_3$ wird I adsorbiert, nicht aber das Carotin. Löst man sie dann in CS_2 , so wird bei neuer Behandlung mit $CaCO_3$ nur II adsorbiert. I besitzt folgende Eigenschaften: Das Absorptionsspektrum in CS_2 zeigt bei 15 mm dicker Schicht eine scharfe, schmale Bande zwischen 652—642, bei dünneren Schichten zwei sehr deutliche Banden zwischen 575—552 u. 530—515 u. eine weniger deutliche zwischen 490—480. Die Krystalle halten sich im Dunkeln gut, sind nicht oder sehr wenig autoxydabel. I gibt mit alkoh. KOH grünlichschwarze, reguläre Krystalle (meist Würfel) einer K-Verbindung. Dem Reagens von MOLISCH (20%ig. Lsg. von KOH in 40%ig. A.) läßt sich I im Gegensatz zu II u. Carotin nicht nachweisen. — I u. II unterscheiden sich wie folgt: Krystalle von I schwarz, undurchsichtig, von violettrottem Reflex, metallglänzend, von II zellförmig gelb; Absorptionsspektrum von I weist 4, das von II nur 2 Banden auf; I färbt leichter l. in CS_2 , weniger l. in PAe. als II; mit konz. H_2SO_4 gibt I indigoblaue, II färbung; I gibt Alkaliverbb., II nicht; I ist kaum, II leicht autoxydabel. Die Isomerie von I u. II ist unwahrscheinlich, I dürfte wie das Fucoxanthin ein höher oxydiertes Carotinoid sein. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 867—68.) LINDENBAUM

H. Hérisséy, Über die Auffindung des *Asperulosids* in den Pflanzen. Extrahiert man dieses Glykosid aus *Galium Aparine* L. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1925. II. 659.) Die l. c. angegebenen Erscheinungen bei der sauren Hydrolyse des *Asperulosids* sind auffallend genug, um dessen V. in den Pflanzen mit Leichtigkeit nachweisen zu können. Folgende Rubiaceen gaben ein positives Resultat: *Asperula tinctorum* L., *R. peregrina* L., *Galium cruciata* Scop., *G. verum* L., *G. mollugo* L., *G. Aparine* L., *Asperula tinctoria* L., *Sherardia arvensis* L. Isoliert wurde das Asperulosid aus *G. Aparine*, obwohl nicht in absol. reiner Form, aber rein genug, um mit Sicherheit an Hand der l. c. beschriebenen Eigenschaften identifiziert werden konnte. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 865—67.) LINDENBAUM

Felix Ehrlich und **Friedrich Schubert**, Über die Chemie der Inkrusten des Flachses (Vgl. S. 2367.) Durch h. W. wird das unl. Pektin des Flachses (*Linum usitatissimum*) hydrolysiert u. bis zu 18% *Hydropektin* gewonnen. Dieses besteht aus einem als *Hexopentosan* bezeichneten Kohlehydratanhydrid u. einem Ca-Mg-Salz der Pektinsäure, die mit 70%ig. A. voneinander getrennt werden können. Da aus Flachs mit A. nicht herausgelöst wird, müssen beide Bestandteile im Pektin in chem. Bindung vorhanden sein. Aus dem alkoh. Auszug vom *Hydropektin* erhält man das *Hexopentosan* $[\alpha]_D = -23,1^\circ$, das die Orcinrk. gibt, Fehlingsche Lsg. schwach, nach der Hydrolyse stark reduziert. Mit A. fallender Konz. extrahiert, erhält man Präparate von $[\alpha]_D = -144^\circ$. Hydrolyse mit verd. H_2SO_4 gab ein Zuckergemisch mit 55% *Pentosen*,

lose, 20% d-*Fructose*. In den Pentosen wurde *l-Arabinose* nachgewiesen. Andere u. Methylpentosen wurden im Gegensatz zu CORRENS (Faserforschung 1. 1922. I. 696) nicht gefunden. Danach müßte das Hexopentosan des Flachses Moll. Pentosan, 1 Mol. d-Galaktose u. 1 Mol. d-Fructose aufgebaut sein. Auf der Drehung von +32,6° statt der aus 5 Moll. Zucker errechneten von +55,5°, en Vff. auf das Vorhandensein von 1 Mol. *Xylose*, die in der Pektinsäure nach- werden konnte. Danach wäre das Pentosan, wenn ein einheitlicher Körper, ein *Galaktan-Fructosan-Xylan-Di-Araban*. — Neben dem Zuckergemisch der A.-Auszug noch eine *Ligninharzsäure*, die nicht weiter untersucht wurde. Ca-Mg-Salz der Pektinsäure wird aus der wss. Lsg. des A.-Rückstandes durch alten, reagiert neutral, $[\alpha]_D = +93^\circ$, mit ca. 3,6% OCH_3 -Gehalt. Die freie at $[\alpha]_D = +93-120^\circ$ mit einem Gehalt von 3,8—4,1% OCH_3 u. 8,6% Acetyl, de durch Säuren u. Alkalien, teilweise schon durch h. W. abgespalten werden. r Pektinsäure konnte durch Hydrolyse mit HCl zu 10% das dimolekulare An- der d-Galakturonsäure, $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_{12}$. $[\alpha]_D = +236^\circ$, das mit der Digalakturon- aus Rübensaft ident. ist, u. zu 40% die kristallisierte monomolekulare d-Galak- ure, $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_7$, mit $[\alpha]_D = +52,7^\circ$ erhalten werden. Ob noch Glykuronsäure den ist, ist unsicher. Aus dem ganzen chem. Verh. schließen Vff., daß im säuremolekül ein aus Arabinose, Xylose u. Galaktose aufgebautes Trisaccharid- x in glykosid. Bindung vorhanden ist. Nach der prozentualen Zus. hätte die ektinsäure die Formel $\text{C}_{46}\text{H}_{68}\text{O}_{40}$, dessen Hydrolyse nach folgender Gleichung :



E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

hiel Davidson, *Veränderungen im Stickstoff-, Kalium- und Phosphorgehalt von sämlingen während der Keimung und ersten Entwicklung*. 3—4 Tage nach der ag war der N-Gehalt um 10% gestiegen, die Schwankungen im P-Gehalt waren . Die ungekeimten Samen verloren mehr K, N u. P als die keimenden. Die ne an K u. N trat bei den gekeimten Samen nicht immer ein. (Botanical Gazette —94. Washington, Bur. of Chem.) TRÉNEL.

erseng, Jaloustre und Maurin, *Entwicklung von Ricinus in Gegenwart radio- Thoriumpräparate, durch Zugabe von Thorium X*. Verss. an Ricinus (Ricinus nis) wurden auf kalkarmen Sandboden in der Nähe von Toulouse ausgeführt, günstige Einwirkung von Thoriumpräparaten auf das Wachstum sowie auf ltebeständigkeit von einigen Pflanzen zu untersuchen. Die Vergleichsprobe nur reines W., während die Untersuchungspflanzen demselben Quantum W. Tage 10 Mikrogramm Thorium X zugesetzt erhielten. Nach Verlauf von einigen n konnte man deutliche Unterschiede feststellen, sowohl in bezug auf kräf- Entwicklung, wie auf früheres Blühen u. Ausreifen. Im Winter vertrugen Th X behandelten Pflanzen sogar etwas Frost, sie gingen jedoch bei anhaltendem ein. Vf. hofft, die Pflanzen durch Behandlung mit Th X-Präparaten soweit zu können, daß sie gefahrlos überwintern können. (C. r. d. l'Acad. des sciences 04—05.) HAASE.

tonin Némec und Mihovil Gračanin, *Einfluß des Lichtes auf die Phosphor- und Kaliabsorption durch die Pflanzen*. (Vgl. S. 213.) Um den Einfluß ver-

schiedenfarbigen Lichtes auf die Absorption von *Phosphorsäure* u. *Kali* durch Pflanzen zu untersuchen, bediente sich der Vf. des bekannten Verfs. der Neubauer. Als Versuchspflanze diente Roggen, der unter verschiedenfarbigen Glasglocken was gelassen wurde. Es ergab sich, daß das grüne Licht gegenüber dem Sonnenlicht eine Verminderung des Kaligehaltes herbeiführte; rotes u. violettes Licht das verstärkten sehr beträchtlich den Kaligehalt der Pflanzen. Der Phosphorsäuregehalt wurde in keinem Falle so beeinflusst, daß die Abweichung außerhalb der Fehlermöglichkeiten lag. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 806—08.) HAA

Martin Schieblisch und **Manfred Schulze**, *Beiträge zur Einwirkung des trischen Stromes auf Bakterien*. Bei Durchströmung von Bakterienkulturen in Nährlösung mit Wechselstrom von ca. 12—15 V, 0,2 A läßt sich keine Schädigung der Bakterien feststellen („lange“ Milchsäurebakterien, *Bacillus vulgatus*, *Bac. amylobacter*) feststellen, manchen sogar eine Wachstumssteigerung, die teilweise durch die Temperaturerhöhung bei der Durchströmung hervorruft, bedingt ist. (Biochem. Ztschr. **168**. 192—193. Leipzig, Veterinär-physiol. Inst.) MEI

K. Kressling, *Zur Herstellung des Tuberkulins*. Vf. teilt Ergebnisse seiner 32-jährigen Erfahrung in Herst. von Tuberkulin zur Tuberkuloseerkennung von Tieren mit. Als Nährboden benutzte er Fleischbouillon mit 0,5% Salz, 1% Pepton, 5% Glycerin. Die von getöteten Bazillen abfiltrierte Nährfl. ist um so weniger wirksam, um so stärker immunisierend, je länger die Bazillen in der Fl. gezüchtet wurden. Deswegen erhöhte Vf. die Züchtungszeit von 6—8 Wochen (Koch) auf 5—7 Monate. Ein Maß für den Reifegrad der Kultur bildet die noch gebliebene Glycerinmenge und das Gewicht der entstandenen Bazillen. (Arch. Sc. biolog. St. Pétersb. **23**. 71. 1923. St.-Petersburg, Inst. f. exp. Med.) BIKERM

Erik Hägglund und **Anne Marie Augustsson**, *Über die Abhängigkeit der alkoholischen Gärung von der Wasserstoffionenkonzentration*. IV. (III. vgl. S. 3246.) In dieser Arbeit wird die Abhängigkeit der Vergärung der Brenztraubensäure von der [H⁺] bei der Methodik der früheren Arbeiten. Als Versuchsmaterial dienten Ober- u. Unterhefe in lebendem u. in getrocknetem Zustande. Lebende Oberhefe vergärt die Brenztraubensäure am besten bei $p_H = 3$; bei $p_H = 1,8$ bzw. 3,9 werden etwa 60% der maximalen Gärungsgeschwindigkeit beobachtet, während bei $p_H = 7,4$ —7,6 überhaupt keine Vergärung mehr beobachtet wird. Die Gärungsgeschwindigkeit ist aber nicht nur von der [H⁺], sondern auch von der absol. Menge Säure abhängig. Lebende Unterhefe zeigt die beste Vergärung bei $p_H = 4$ —5; die Wrkg. erstreckt sich hier mit einer steilen Kurve bis zu $p_H = 7$. Bei getrockneter Ober- u. Unterhefe wird das Optimum noch weiter nach der alkalischen Seite verschoben u. liegt bei $p_H = 5,5$ —6,5; auch bei $p_H = 2,2$ u. 8,0 wird noch eine geringe, aber deutliche Wrkg. beobachtet. Die Verss. deuten darauf hin, daß bei der Gärung die Zellmembran langsamer von der Säure passiert wird als bei Unterhefe u. mehr bei Trockenhefe. — In Ggw. von Sulfid wird in schwach alkal. oder neutralen Lsg. die Brenztraubensäure von Trockenhefe aus Oberhefe langsam oder auch gar nicht vergoren. — Acetonhefe verhält sich wie die anderen Hefen u. zeigt ein Optimum der Gärung bei $p_H = 6$. — Hefeextrakt aus Unterhefe nach Lebedew vergärt in alkal. Gebiet, etwa vom Neutralpunkt anfangend, die Brenztraubensäure nicht. Die Gärung der Brenztraubensäure, welche langsamer als die Vergärung von Zucker verläuft, erfolgt in der ersten Zeit wesentlich rascher als kurz darauf. (Biochem. Ztschr. **170**. 102—25. Abo, Finnland, Akad.) HES

Jos. Fuchs, *Schimmelpilze als Hefebildner*. Bei Züchtung von *Aspergillus* in mit Würze nahezu gefüllten u. durch einen Gäraufsatz luftdicht abgeschlossenen Kolben beobachtet man zunächst nur ein mäßiges Wachstum. In dem an sich sterilen Kolben tritt nach etwa 3 Wochen Gärung ein. Nach weiteren 2 Wochen hat sich ein pulveriger Bodensatz gebildet, dessen Unters. u. Mk. zeigte, daß ein erheblicher Teil der Konidien Sproßzellen gebildet hatte, die sich durch weitere Sprossungen zur

rl Neuberg und Fritz Windisch, Über die Essiggärung und die chemischen
gen der Essigbakterien. (Bereits referiert nach Naturwissenschaften [vgl. S. 1667]).
tragen sind folgende experimentelle Einzelheiten. Zu jedem Vers. wurden
kterientrockensubstanz angewandt, zu deren Gewinnung 90 große Drigalski-
mit insgesamt 28338 qcm Oberfläche dienten. Die Einzelheiten der Züchtung
sigbakterien u. die Anordnung der Verss. werden genau beschrieben. — Die
ng von Alkohol u. Säure erfolgte so, daß der Alkohol aus der mit CaCO_3 zur
g der Säure versetzten Lsg. mittels Wasserdampf übergetrieben wurde. — Aus
rgleich der Verbrennungswärmen folgt, daß bei der Dismutation von CH_3CHO
10% der Energie frei werden, die bei der initialen Oxydation des A. zu CH_3COH
en (nämlich statt 50,4 Cal. nur 15,2 Cal.). — Es wurden noch orientierende Verss.
Glycerinaldehyd ausgeführt; diese zuckerähnliche Substanz wurde von Bact. as-
angegriffen u. restlos zum Verschwinden gebracht, wobei in den Umwandlungs-
kein Glycerin gefunden wurde; möglicherweise ist Glycerinsäure vorhanden. —
aldehyd u. *i-Valeraldehyd* liefern unter aeroben u. anaeroben Bedingungen den
schenden Alkohol sowie Säure. — Da Essigbakterien Zucker nicht desmolysieren,
sie ein gutes Material für das Studium zymasefreier *Carboxylase* dar. — Im-
werden noch Verbesserungen der Methoden zur Darst. von β -*Chlorpropion-*
diäthylacetal, $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{O}_2\text{Cl}$, Kp.₂₀ 73—74°, u. von *Glycerinaldehyddiäthylacetal*,
Öl vom Kp.₂₀ 130°, gegeben. (Biochem. Ztschr. **166**. 454—81. 1925.) HESSE.

B. Forbes und **Raymond W. Swift**, *Der Eisengehalt des Fleisches*. Auf 100 mg enthält das Fleisch vom Schwein, Lamm, Rind, Kalb (Schinken, Vorderviertel, ca. 7,5—12 mgr Fe, die inneren Organe vom Rind weit mehr, Gehirn 50 mgr, 9 mgr, Milz 72 mgr, Niere 116,6 mgr u. das Blut 247,5 mgr. (Journ. Biol. Chem. 1—21. Pennsylvania State College, Inst. of Animal Nutrition.) MEIER.

Kaufman, Eine experimentelle Untersuchung über den partiellen Albinismus alaja-[Russen]-Kaninchen. Das Chromogen in der Haut des Russenkaninchens ist Tyrosin, da dieses nur unter Mitwirkung spezif. Enzyme oxydiert werden. Dagegen liegt die Vermutung nahe, daß Dioxyphenylalanin, das durch Alkali erzeugt wird, als Chromogen vorliegt u. daß die Rk. der Tiere bei Kälte auf einer Art der Alkalinität beruht. (Biologia generalis 1. 7—21; Ber. ges. Physiol. 33. 1921. Pulaway, Poland. Governmentinst. f. agricult. research. Ref. SÜFFERT.) OPP.

Charles F. Bodecker und **William J. Gies**, *Der histochemische Nachweis Proteinsubstanzen im Zahnschmelz*. Nach Formalinfixierung u. Entkalkung in HNO_3 u. Celloidin enthielten Schnitte von Schmelz menschlicher Zähne eine unl. sauer reagierende M., die die Biuretrk. gab u. bei Erwärmen mit Millons sich rot färbte. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 175—76. 1924; Ber. Physiol. **33**. 20. 1925. New York, Lab. of histol. a. biol. chem. school of den. lumbia univ. Ref. LEHNER.) OPPENHEIM

Karl Harpuder, *Physikalisch-chemische Untersuchungen am normalen Knorpel*. Die Permeabilität des Knorpels ist sowohl für Anionen als Kationen gering, der der Durchlässigkeit der Stellung der Ionen in der Hoffmeisterschen Reihe entsprechend. Nichtelektrolyte gehen gut durch bei großer Fettlöslichkeit (Aceton) schlecht geringer (Glucose). Quellung des n. bei 37° 24 Stdn. getrockneten Knorpels ist lich unabhängig von $[\text{H}^+]$ 350—400%. Eigenschaften einzelner Knorpelbe- teile: Chondromukoid (Moerner) ist fällbar mit 33% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ u. Sättigung mit Kochen u. A. keine Koagulation. Flockungsmaximum durch $[\text{H}^+]$ bei pH 1,9. minoid: nicht fällbar durch Säure oder Alkali, NaCl , FeCl_3 , HgCl_2 + HCl , fällb: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ A., Phosphorwolframsäure + HCl . A.-Fällung braucht bei pH 6,4 d ringsten Zusatz von A. Glutin verhält sich wie andere Glutine. Chondroitinsch- saures Na ist fällbar mit A., Maximum bei pH 10,5, bei 75% A., bei pH > 40% A. Die Dissoziationskonstante der Chondroitinschwefelsäure wird au Pufferwrkg. als zwischen Harnsäure u. H_2CO_3 liegend bestimmt. (Biochem. Z **169**. 308—19. Wiesbaden, Innere Abt., Städt. Krankenhaus.) MEIN

Ferdinand Lebermann, *Ein Beitrag zur Mikrochemie der Augenflüssigkeit*. (Die Bestimmung der Kationen: Natrium, Kalium und Calcium.) Methodik: sprechend früheren Angaben (vgl. Biochem. Ztschr. **150**. 548; Klin. Wehsc **2196**; C. **1925**. I. 139. 266). Blutserum enthält die Kationen in größerer Men die Augenfl. Im Kammerwasserregenerat steigen die Kationen, besonders Na- weit schwächer als das Eiweiß an. Subkonjunktivale Salzinjektionen erhöhe Na- oder K-Spiegel des Kammerwassers nicht. (Arch. f. Augenheilk. **96**. 354 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 758—59. Würzburg, Augenklinik. Ref. GAI SCHLÄGER.) OPPENHEIM

Martin Cohen, **John A. Killian** und **Nannette Metzger**, *Die chemisch- sammensetzung der Glaskörperflüssigkeit bei Tieraugen*. Für das Auge des C- ergaben sich folgende mg-Werte für 100 ccm des filtrierbaren Glaskörperper- Trockensubstanz 1,11%, Gesamt-N 21,5, Nichteiweiß-N 15,7, Eiweiß-N 6,9, Ge- eiweiß 39,3, Harnstoff-N 9,9, Aminosäure-N 1,8, Harnsäure 2,8, Kreatinin 1,1, K- 1,6, Zucker (Glucose) 39,0, NaCl 678,0, Gesamt-S 4,0, Gesamt-P 2,0, Na 301 7,9, K 27,9, Ätherextrakt 10,0, Milchsäure 14,8. Spezif. Gew. 1,004. Etwas- änderte Werte für Schwein u. Pferd. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **2** bis 446. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 759. New York, Dep. of ophthalm. a. l postgraduate med. school a. hosp. Ref. SCHULZ.) OPPENHEIM

E₅. Tierphysiologie.

Hans J. Fuchs, *Über proteolytische Fermente im Serum*. I. Um eine Entsche- über die einander widersprechenden Verss. von ABDERHALDEN (Abwehrfermente, Berlin) u. STEPHAN u. WOHL (Ztschr. f. d. ges. exper. Medizin **24**. 391; C. **1921** 1215) herbeizuführen, wird das Verh. von Serum gegenüber arteigenem u. artfrem- Fibrin untersucht, da in der Verwendung dieser beiden Substrate der method. Unter- der angeführten Arbeiten liegt. — Die verwendeten Dialysiergefäße sowie eine besch- Apparat zur Best. des N nach einer Modifikation der Mikrokjeldahlmethod BANG sind genau beschrieben u. im Original abgebildet. Der App. zur Best. erlaubt Zugabe der Lauge, ohne daß NH_3 entweichen kann, u. gewährleistet ein sich-

ner Beobachtung bedürftiges Arbeiten. Ferner wird eine Spezialbürette mit zwei Armen beschrieben. Die ganze Apparatur ermöglicht die Herabsetzung der Fehlergrenze auf 0,0007 mg N. — Die Sera von Pferd, Hammel u. Rind enthalten ein Ferment, welches die Fibrine der anderen Blutarten abbaut, nicht aber das arteigene Fibrin. Der Abbau kommt bald zu einem Stillstand, geht jedoch bei Entfernung der Spaltprodd. durch Dialyse bald weiter. Dabei kann man, wenn man nicht gegen dest. W., sondern gegen eine die Salzkonz. des Serums möglichst konstant haltende Lsg. dialysiert, den Abbau bis zu völligem Verbrauch des Substrates treiben. — Serum, welches $\frac{1}{2}$ Stde. bei 50° gehalten wurde, hat sein Abbauvermögen für Fibrin verloren. — Eiweiß gibt gegen ein Neutralsalzlsgg. von der ungefähren Konz. des Plasmas dialysable N-haltige Prodd. ab; die frei werdenden Mengen sind bedeutend geringer als die beim fermentativen Abbau entstehenden. — Es ist möglich, aber nicht bewiesen, daß die für die einzelnen Blutarten spezif. *Fibrinasen* aus einer gemeinsamen unspezif. Vorstufe hervorgehen. (Biochem. Ztschr. **170**. 76—101. Breslau, Univ.) HESSE.

L. Rosanow, *Einfluß der Galle auf die Eiweißverdauung durch den pankreatischen Saft*. Verss. in vitro. Die Galle verhindert die Selbsterstörung des akt. Trypsins u. beschleunigt dadurch die Eiweißverdauung. Sie verlangsamt aber die Aktivierung des zymogenen Pankreassaftes durch Darmsaft, wodurch die Verdauung in den ersten 10 min. verlangsamt wird. Das Aufkochen der Galle ändert ihr Verh. nicht. (Arch. Sc. Nat. St. Pétersb. **23**. 137—42. 1923. St.-Petersburg, Inst. f. exp. Med.) BIKERMAN.

J. L. Brakefield und **Carl L. A. Schmidt**, *Untersuchungen über die Synthese und Ausscheidung gewisser Gallenbestandteile bei Verschlus-Ikterus*. Die Ausscheidung von N, P u. anorgan. H_2SO_4 , Gallensäuren u. Gallenfarbstoffen nach Unterbindung des Ausführungsganges der Gallenblase wird untersucht. N u. H_2SO_4 steigen an u. sinken nach einiger Zeit auf n. Wert. Gallensäuren werden zuerst in großer Menge ausgeschieden, nach kurzer Zeit nur noch sehr kleine Mengen, Gallenfarbstoffe bleiben längere Zeit auf hohem Wert. Die Fähigkeit, Benzoesäure an Glucuronsäure zu koppeln, ist herabgesetzt. Leber ist mkr. verändert. (Journ. Biol. Chem. **67**. 523—45. Berkeley, Univ. of Biochemistry. Univ. of California.) MEIER.

George Eric Simpson, *Der Einfluß des Schlafes auf die Chloride und die (H^+) Konzentration im Urin*. Nach dem Erwachen aus n. Schläfe findet ein Ansteigen der Chloridausscheidung u. des Urin-pH statt unabhängig von der Vermehrung des Vol. (Journ. Biol. Chem. **67**. 505—16. Philadelphia, Dep. of Phys. Chem. Univ. of Pennsylvania.) MEIER.

A. H. Roffo und **J. Landaburu**, *Die Radioaktivität des Rubidiums und ihre Verteilung in normalen und neoplastischen Geweben*. Nach Injektion von $RbCl$ u. Veraschung der Gewebe ergab sich, daß neoplast. Gewebe stets eine größere Radioaktivität aufwies als n. (Bol. del inst. de med. exp. **1**. 83—92; Ber. ges. Physiol. **33**. 68. 1925. Ref. HARTMANN.) OPPENHEIMER.

Armand J. Quick, *Untersuchung über die Bindung von Benzoesäure im Organismus des Hundes mit einer direkten quantitativen Methode für Hippursäure*. Bei Zuführung von Benzoesäure werden die Ausscheidungsprodd., Hippursäure (nach Extraktion mit u. Hydrolyse mit HCl als Glycin), Benzoylglycuronsäure (Reduktion) u. Benzoesäure bestimmt. 75—95% werden im Urin wiedergefunden, davon bei Dosen von 1—5 g ca. 0,8—1 g als Hippursäure, der Rest an Glycuronsäure gebunden, freie Benzoesäure sehr wenig. Fütterung von Glykokoll erhöht den als Hippursäure ausgeschiedenen Teil nur wenig. (Journ. Biol. Chem. **67**. 477—89. Philadelphia, Dep. of Phys. Chem. Univ. of Pennsylvania.) MEIER.

Cyrus H. Fiske, **Robert A. Goodell**, **Louis E. Hathaway, jr.** und **Edward West**, *Weitere Beobachtungen über das Schicksal der Säure im Körper*. Wird hungerrnde Katzen einmalig eine größere Menge Säure (HCl) per os zugeführt, so wird in den ersten 24 Stdn. der größte Teil als Na u. K-Salz, weniger als NH_4 -Salz ausgeschieden, der Rest wird in den nächsten Tagen an NH_4 gebunden ausgeschieden, außerdem Na

u. K gegenüber der Normalperiode eingespart. (Journ. Biol. Chem. **67**. 385—96. Biochem. Lab. Harvard Medic. School.)

Alexander Tscherkes und **Henriette Gorodissky**, *Über die Einwirkung von Narkotica auf die chemische Zusammensetzung der Großhirnrinde*. In der Hirnrinde n. Kaninchens wird in % der frischen Substanz im Durchschnitt gefunden: Gesamt-N 2,21%, Gesamt-P 0,346%, Cholesterin 0,815%, P ungesätt. Phosphatide 0,08%, Lipide des A. Auszuges 2,67%. Nach der Narkose durch CHCl_3 , Ä., Chloralhydrat die klin. das gleiche Bild bietet, sind diese Werte in verschiedener u. für jede Substanz in charakterist. Weise verändert. Chloralhydrat ändert besonders den Gehalt an Cholesterin u. ungesätt. Lypoiden, Ä. bes. die gesätt. CHCl_3 setzt den Gesamt-N am stärksten herab, Ä. mehr Gesamt-P. 24 Stdn. nach der Narkose sind diese Veränderungen nicht zur Norm zurückgekehrt. (Biochem. Ztschr. **168**. 48—68. Charkow, Physiolog. chem. Lab. des med. Inst.)

Muneo Yabusoe, *Über Hemmung der Tumorglykolyse durch Anilinfarbstoffe*. Von zahlreichen untersuchten Farbstoffen setzen einzelne aus der Triphenylmethanreihe (besonders Äthylviolett, Krystallviolett, Malachitgrün, ortho-Chlor-Malachitgrün, Firnblau) u. aus der Chinolinreihe (Cyanin, Pinachrom) die Glykolyse von Krebszellen am meisten herab, ca. 60—75% bei Konz. 10^{-4} in Ringerlsg., 10^{-3} in Serum. (Biochem. Ztschr. **168**. 227—30. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Institut für Physiologie.)

G. Analyse. Laboratorium.

J. Campardou, *Vereinfachter Gasentwickler*. Eine unten mit mehreren Lötlöchern versehene u. mit einem Hahn verschlossene Flasche enthält auf dem Boden (unter Quarzkörnern) u. darüber die feste Reaktionskomponente (Zn, FeS) befindet sich in einem tubulierten Zylinder mit der fl. Komponente (HCl , H_2SO_4 u. dgl.). (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 337—40. Toulouse, Fac. des sciences.)

Fr. Müller, *Schüttelmaschine*. Bei der Schüttelmaschine werden 2 Hebel, an denen sich abschraubbare Stativstangen zur Befestigung der Schüttelgefäße befinden, mittels Rollen durch eine Taumelscheibe in Aufwärtsbewegung gesetzt. Der App. ermöglicht intensives Schütteln ohne Erschütterung der Umgebung; wegen des geringen Platzbedarfes ist Einleiten von Gasen, Erwärmen mit Bunsenbrenner oder Heizgefäß oder Kühlung leicht möglich. Die Stativstangen können um 180° gedreht u. als Rührer verwendet werden. Zu beziehen von W. VETTER, Heidelberg. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 1920. Karlsruhe.)

Th. Steche, *Ein Extraktionsapparat mit Jenaer Glasfilterplatte für kleine Mengen und kontinuierliche Extraktion*. Der Extraktionsapp. mit Glasfilterplatte (PRAUSNITZ, S. 995) eignet sich besonders zur Extraktion sehr kleiner Mengen Pflanzensamen. Die Extraktion ist eine kontinuierliche, die Menge Fl. im Stehkolben beliebig gleich groß, so daß man den Kolben viel kleiner nehmen kann als beim Soxhlet. Bei dem App. können Störungen auftreten, wenn bei zu großer Verdampfungsgeschwindigkeit die zurücklaufende Fl. den Querschnitt des Steigrohrs erfüllt. Zur Vermeidung werden 2 Rohre angebracht: ein Steigrohr für den Dampf u. ein Überlaufrohr, dessen Ein- u. Ausschnitt tiefer liegen muß, als der des Steigrohrs. Nach Beendigung der Extraktion kann man die gesamte Fl. in den Kolben abfließen lassen. Die App. können von dem Jenaer Glaswerk SCHOTT & Gen. bezogen werden. (Ztschr. f. angew. Ch. **509**—10. Göttingen, Univ.)

Miramond de Laroquette, *Ionometrische Messung der pro Flächeneinheit auffallenden Röntgenstrahlen und der pro Volumeneinheit absorbierten Röntgenstrahlen*. Für die Strahlungstherapie ist es von Bedeutung, den Gehalt an Röntgenstrahlung mit ausreichender Genauigkeit zu kennen, u. zwar möglichst auf die Flächeneinheit

gen. Die pro Flächeneinheit auffallenden Röntgenstrahlen werden mit Hilfe abgeänderten Ionometers gemessen, u. zwar wird durch einen Bleimantel ert, daß nur ein bestimmter Ausschnitt seine wirksamen Strahlen auf die Blättchen instrumentes fallen läßt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 771—73.) HAASE.

André Blondel, *Messung der photometrischen Ausbeute optischer Apparate (Objekte, Linsen usw.)*. (Vgl. S. 731.) Die Messung der Durchlässigkeit opt. App., Objektive, Okulare, Linsen u. Mikroskope kann mit Hilfe eines einfachen, kleinen ometers erfolgen, welches mit einer Hohlkugel von 15—20 cm Durchmesser inden ist (sie ist innen geweißt u. besitzt zwei Beobachtungsöffnungen). Zum eich dient eine Lichtquelle von bekannter u. konstanter Helligkeit. (C. r. d. d. des sciences 182. 739—41.) HAASE.

L. Malaprade, *Potentiometrische Titrierung einiger oxydierender Säuren*. Stark ierende Säuren, die mit einer H_2 - oder einer Chinhydronelektrode nicht titrierbar können mit einer „Sauerstoffelektrode“ (vgl. FURMAN, Journ. Americ. Chem.

44. 2685; C. 1923. IV. 76) titriert werden, deren Rolle ein in die oxydierende eingetauchter vergoldeter Pt-Draht übernehmen kann. Mit Chromsäure erhält zwei Wendepunkte bei $K_2Cr_2O_7$ bzw. K_2CrO_4 , mit Jodsäure einen bei $NaJO_3$, *Perjodsäure* zwei bei $NaJO_4$ (oder H_4NaJO_6) bzw. $H_3Na_2JO_6$. Die übrigen Per- e sind also so weitgehend hydrolyt. gespalten, daß sie in der Lsg. potentiometr. auffindbar sind. (vgl. GIOLITTI, C. 1905. II. 409). Es gelingt auch, ein Gemisch HJO_3 u. H_5JO_6 zu titrieren. Ein in ein Oxydationsmittel eingetauchter, mit W. pspüler u. in eine (nicht oxydierende) Säurelsg. eingeführter Pt-Draht ist gleich- eine zur potentiometr. Titrierung geeignete Sauerstoffelektrode; so wurde HCl ert mit einem in einer HJO_3 -Lsg. gewesenen Pt-Draht. Die Fehlergrenze der ode: ± 30 millivolts. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. [4] 39. 325—36. Nancy, Fac. eiences.) BIKERMAN.

see errata v. 991² p. 3494
Elemente und anorganische Verbindungen.

F. Henrich, *Methoden der Mikrochemie*. Vortrag. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 7-50.) JUNG.

Rudolf Ehrenberg, *Radiometrische Mikroanalyse*. Es werden die ersten Anwen- en einer mikroanalyt. Methode dargelegt, die auf Grund der Verwendung radioakt. atoren entwickelt worden ist. Als „Indicator“ bezeichnet PANETH das radioakt. p eines Elementes, das, da es sich nach Mischen mit der stabilen Form des Ele- es in konstantem Verhältnis zu derselben erhält, unbeeinflussbar durch alle chem. utionen, die chem. u. physikal. Eigenschaften des Elementes in Fällen zu ermitteln tttet, wo die Empfindlichkeit der andern Methoden nicht ausreicht. — Es wurden chiedene Wege eingeschlagen: 1. wurde die Regel benutzt, wonach ein Radio- ent in äußerster Verdünnung von einem Nd. mitgefällt bzw. von einer krystallin. rtragenen Substanz adsorbiert wird, wenn das Radioelement mit dem Anion des in schwer l. Salz bilden würde, wenn es in wägbaren Mengen in Lsg. wäre. Dieser ist anwendbar bei der Best. des *Calciums* als Oxalat mit dem *Thorium B* als ator. Die Übertragung auf die $AgCl$ -Rk. ist wegen der relativ großen Löslichkeit $PbCl_2$ bisher nicht möglich. 2. Das zu bestimmende Kation u. das Pb fallen mit Anion, das Pb ist — mit dem akt. Thorium B — in zur Fällung ausreichender . zugegen. Die Konz. von Pb u. dem fällenden Anion werden konstant gehalten, e wechselnden Mengen des fraglichen Kations ändert sich der Pb-Gehalt des Nd. mit in die der Lsg. verbleibende Aktivität. Für Ca-Best. brauchbar. 3. Es ist nion zu bestimmen, das ein schwer l. *Pb-Salz* gibt. Die Pb-Konz. wird gerade allung hinreichend gewählt, ebenso wird die Anionenkonz. durch Zufügen einer mten Menge erst über die lösliche des Pb-Salzes gebracht. Dieses Verf. ist für phat- u. *Sulfatnachweis* brauchbar. In gleicher Anordnung auch für NH_3 -Best.

brauchbar, da die Löslichkeit des $\text{Pb}(\text{OH})_2$ hinreichend genug ist. Daraus läßt sich eine Mikro-N-Best. u. eine allgemeine Mikrotitration der Säuren u. Basen entwickeln. 4. Das Pb wird als gesätt. Lsg. des zu bestimmenden Anions mit dem Thorium versetzt, die zu bestimmende Substanz wird zusätzlich eines Salzes vom gleichen Anion in einem kleinen Vol. der Pb-Thoriumlsg. gel. infolge Überschreitung des Löslichkeitsprod. fällt ein entsprechender Anteil des Pb-Salzes — gemessen an der Aktivitätsabnahme der Lsg. — aus. Diese Methode ist brauchbar für Chloride, aber noch nicht sehr empfindlich. — Die allgemeine Voraussetzung für alle Unterarten der Methode ist das Auftreten eines abzentrifugierbaren Nd., der aber unterhalb der Menge der Sichtbaren bleiben kann. Durch Vermeiden jeglichen Umfüllens, Filtrierens usw. ist die Methode einfacher als die üblichen Mikroanalysen, doch muß gleichzeitig mit jeder Analysenserie eine Eichungsreihe aufgenommen werden, um einige Punkte der Kurve festzulegen. Es wird noch eine genaue Beschreibung des Verf. gegeben. (Biochem. Ztschr. **164**. 183—90. 1925. Göttingen, Physiol. Inst. d. Univ.) LASCH.

E. J. Kraus, *Quantitative Bestimmung von Metallen auf jodometrischem Wege*. Das von LUKSCH („Leitfaden für analyt.-chem. Übungen“ **1913**. 64) angegebene Verfahren ist auch auf die Metalle der H_2S -Gruppe anwendbar. Vf. erhielt bei Pb u. Cd vorzügliche Resultate bei Anwendung von konz. HCl, $\frac{1}{2}$ -n. J-Lsg. u. Rücktitration mit $\frac{1}{10}$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$. Cu ergab schlechte Resultate, weil CuS keine Waschung mit reinem W. verträgt. Auch bei Fällung mit $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ an Stelle von H_2S waren die Resultate befriedigender, das Auswaschen des Nd. ist schwieriger. Verss. mit Gliedern der $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ -Gruppe versagten ganz. (Chem.-Ztg. **50**. 281.) JUNG.

K. Scharrer, *Zur Bestimmung des Chlorates und Perchlorates*. Zur Reduktion ClO_3^- u. ClO_4^- zwecks quantitativer Best. erwies sich Cu-Pulver („Kupferpulver reduziert extrafein“ C. A. F. KAHLBAUM) als sehr geeignet. Ausführliche Vorschrift im Original (Chem.-Ztg. **50**. 274. München, Hochsch. f. Landw.) JUNG.

Charles Jungblut, *Bestimmung des Ammoniaks in ammoniakalischem und Betriehwasser*. Um das zeitraubende Abdestillieren von NH_3 zu vermeiden, versetzt Vf. das NH_3 -haltige W. mit NaOH u. BaCl_2 , filtriert, neutralisiert das CO_2 -freie Filtrat mit HCl, bindet NH_3 mit Formaldehyd u. titriert mit NaOH den Überschuß von H. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 336—37.) BIKERMAN.

P. Budnikow, *Vergleichende Studien über die Methoden der quantitativen Bestimmung des Schwefelnatriums*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **57**. 207—14. 1925. C. **1926**. I. 1859.) BIKERMAN.

Hans Schulten, *Zur Bestimmung der freien Ca-Ionen nach Brinkman und van Dorp*. Es wird theoret. u. experimentell nachgewiesen, daß bei der Ca-Ionenbest. nach BRINKMAN u. VAN DAM (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Nat. Afd. **28**. 417; C. **1920**. II. 515) übersättigte Lsgg. entstehen, daß also auf diese Weise das Löslichkeitsprod. nicht gefunden werden kann u. daß man bei den Messungen mit einem unbekannten, vielleicht sehr wechselnden Fehler rechnen muß. Es wird der Weg gezeigt, wie sich dieser Übelstand beseitigen läßt, indem man nämlich v. Lsgg. mit Bodenkörper ausgeht u. mit der unbekannten Lsg. bis zum Verschwinden des Nd. titriert. Einstweilen hindern techn. Schwierigkeiten die Ausführung. (Biochem. Ztschr. **164**. 47—52. 1925. Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst. d. Univ.) LASCH.

E. Schiffer, *Die Bestimmung des Kohlenstoffs in Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen durch Verbrennen im Sauerstoffstrom*. Es wird zuerst die gasanalyt. Best. des C behandelt, u. zwar die Grundlagen des Verf., die Bedingungen der volumetrischen Messung, der Einfluß dieser Bedingungen auf Apparatur u. den Arbeitsgang, die Eichung, die Sperrfl., das Korrektionsdiagramm, die Zuschläge, das Verh. des S u. das Anwendungsbereich. Das Verf. ist am besten als Schnellbestimmung zur Betriebskontrolle des Stahlwerkes geeignet. Für Ferrolegierungen ist es weniger geeignet. Das maßanalyt. Verf. wurde ebenfalls genau durchgearbeitet, u. Vf. beschreibt

ist Grundlage u. Apparatur, dann die beiden Ausführungsformen, das CO_2 durch $(\text{OH})_2$ oder durch NaOH zu absorbieren, u. schließlich noch die Möglichkeit, die Verbrennung ohne äußere Erhitzung einfach durch Zündung herbeizuführen. (Stahl *Anal.* 46. 461—68. Essen.) LÜDER.

W. Geilmann und **R. Höltje**, *Beiträge zur mikrochemischen Bleibestimmung*. (Vgl. *Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch.* 146. 324; C. 1925. II. 1701.) Vff. unters. zwei Methoden *Pb-Best.* auf mikrochem. Verwendbarkeit. Direkte Titration von durch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ gem. u. in Säuren gel. PbCrO_4 liefert ungenaue Werte, dagegen werden zufriedenstellende Resultate erhalten bei Best. durch jodometr. Rücktitration des überschüssigen I_2O_7 . Die in einem Zentrifugierfläschchen befindliche *Pb-Lsg.* wird im sd. Wasser mit einem Überschuß der Chromatlsg. gefällt, bis zum Krystallinwerden des Nd. erhitzt u. dann 2 Stdn. unter häufigem Umschütteln stehengelassen, hernach mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt, u. 10 Min. zentrifugiert. In einer herauspipettierten Menge der klaren Lsg. wird 0,2 g KJ gegeben, mit 2 ccm 2-n. HCl auf 100 ccm Lsg. setzt u. mit $\frac{1}{100}$ -n. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -Lsg. titriert (Indicator: Stärke). Die Fehlergrenze beträgt von 0,1—5 mg Pb beträgt $\pm 0,01$ mg. — Zur Best. des Pb als $\text{Pb}(\text{JO}_3)_2$ versuchen Vff. dessen Löslichkeit in reinem W. bei einem Überschuß von JO_3^- ; Löslichkeitsprod. bei Zimmertemp. ergab sich der Wert $3,2 \cdot 10^{-13}$. — Die Fällung mit überschüssigem KJO_3 der mit Eg. angesäuerten *Pb-Lsg.* wird wieder in einem Zentrifugierfläschchen vorgenommen, der $\text{Pb}(\text{JO}_3)_2$ -Nd. über Nacht stehen gelassen, dann nach dem Waschen unter den gleichen Bedingungen wie oben zurücktitriert. Die Jodatmethode liefert auch bei sehr kleinen Mengen gute Werte u. übertrifft die Chromatmethode an Genauigkeit. — Um den Anschluß an den üblichen Analysengang zu erreichen, fällen sie eine *Pb-Lsg.* durch H_2S u. bestimmen das in Säuren gelöste PbS nach der Chromatmethode. Die Resultate gleichen der unmittelbaren Best., während die Jodatmethode unter diesen Verhältnissen versagte. (*Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch.* 152. 59—72. Göttingen, Techn. Hochschule.) ULMANN.

Alfred Stock und **Richard Heller**, *Die Bestimmung kleiner Quecksilbermengen*. Zum Nachweis kleiner Mengen Hg wird das Hg in oxalsaurer Lsg. auf einem Cu-Draht abgeschieden, abdestilliert u. in das HgJ_2 übergeführt. Die Abscheidung auf dem Draht läßt sich zur quantitativen Best. benutzen. In Ggw. von Mineralsäuren oder Acetat entstehen ohne Oxalatzusatz kleine Mengen unl. Cu-Salze, die den Nachweis stören. Auch mit KCN-haltigen Lsgg. erhält man reine Hg-Kondensate. Das niedergeschlagene Hg ist in größeren Luftmengen flüchtig. $\frac{1}{10}$ — $\frac{2}{10}$ μ lassen sich leicht erkennen. — Die quantitative Best. erfolgt durch Elektrolyse in oxalsaurer Lsg. Das auf dem Gold der Kathode sitzende Hg verflüchtigt sich an der Luft kaum merklich. Zum Nachweis u. Best. in *Harn* u. *Speichel* wird die Fl. mit Cl behandelt, nach Zugabe von CuSO_4 mehrere Male mit H_2S ausgefällt u. in Chlorwasser wieder gelöst, dann wie oben verfahren. Zum Nachweis in der Luft wird der Hg-Dampf aus 100 l Luft in 2 U-Röhren durch Kühlen mit fl. Luft niedergeschlagen. (*Ztschr. f. angew. Ch.* 39. 466—68.) JUNG.

Wilhelm Moldenhauer, *Elektroanalytische Bestimmung für Kupfer neben Wismut*. Eine vollständige Trennung des Cu vom Bi konnte in phosphorsaurer Lsg. mit Wismutphosphat als Bodenkörper erreicht werden. Der Nd. darf während der Elektrolyse nicht aufgewirbelt werden. (*Ztschr. f. angew. Ch.* 39. 454. Darmstadt.) JUNG.

R. F. Smith, *Eine schnelle und genaue Analysenmethode für Messing*. 0,2 g der Probe (61/39 Messing) werden in einem 400 ccm Becherglas in möglichst wenig HNO_3 gelöst, die Dämpfe weggekocht, Wände u. Urglas mit W. abgespült, nach dem Abkühlen mit NH_3 u. $\text{CH}_3\text{-COOH}$ gerade sauer gemacht, 2,5 ccm KJ-Lsg. zugefügt u. mit einer verdünnten $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -Lsg. u. Stärke titriert. Die Analyse ist, wenn alles gut bereitet, in 3—5 Min. beendet. (*Metal Ind.* [New York] 24. 148. The Hoyt Metal Company of Canada, Ltd.) WILKE.

C. C. D., *Die vollständige Messinganalyse. VI. Anwendung der Elektrolyse.* (V. v. S. 2393.) Bei Anwendung feststehender Elektroden wird die Best. des Cu u. Pb wie folgt ausgeführt: Das Filtrat des Sn-Nd. wird in ein 300 ccm Becherglas gegossen mit W. auf 250 ccm aufgefüllt, genau mit NH_3 neutralisiert u. ein Überschuß von 5% HNO_3 zugesetzt. Bei 2 Amp. u. 4 V wird in rund $1\frac{1}{2}$ Stde. das gesamte Cu u. Pb auf die Pt-Elektroden niedergeschlagen. Liegt Mn-Bronze oder -Messing vor, so müssen sauerere Lsgg. angewandt werden, damit sich kein Mangansuperoxyd an dem Pb abscheidet. — Bei Anwendung einer rotierenden Elektrode wird 1 g der Legierung in rund 30 ccm HNO_3 gekocht, verdünnt, die Oxyde vom Sn u. Sb abfiltriert u. das Filtrat elektrolysiert. (Metal Ind. [London] 28. 344—45.) WILKE.

H. Angewandte Chemie.

III. Elektrotechnik.

—, *Neue elektrische Heizvorrichtungen.* Es wird eine Heizplatte, die aus einem Quadrat Chromnickeldraht-Heizkörper in Eisenblechfassung (80×80 u. 60×60 mm) besteht, beschrieben; sie erreicht bei sehr geringem Stromverbrauche Oberflächentemp. bis zu 400° . Als sehr prakt. haben sich auch Heizgitter von 150×200 bis 300×380 mm u. darüber, auch 60×300 mm bewährt, die ebenfalls an der Oberfläche bis 400° erreichen. 4 Abbildungen. Für Spannungen von 110 u. 220 Volt von der Firma STRÖHLEIN & Co., G. m. b. H., Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart u. Braunschweig, zu beziehen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 225.) RÜHLE.

Zellstoffabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof, und **Rudolf Taussig**, Wiesbaden, *Elektrolyse von Chloralkalien mit horizontalen Diaphragmen*, dad. gek., daß als Anoden hochkantig gestellte Platten verwendet werden, deren Oberfläche gegebenenfalls durch Anbringung von Kanälen, Kerben, Rippen, Rillen u. dgl. vergrößert ist. — 2. dad. gek., daß Graphitanoden verwendet werden, welche durch Teeren, nachfolgendes Abbrennen u. Glühen bezw. Graphitieren dichter bezw. widerstandsfähiger gemacht sind. — 3. dad. gek., daß die Kathode als Kühlelektrode ausgebildet wird. (D. R. P. 427 085 Kl. 121 vom 16/8. 1922, ausg. 23/3. 1926.) KAUSCH.

Niederländische Technische Handel Maatschappij „Giro“, s'Gravenhage, übertr. von: **Wolfgang Otto**, Neumühlen bei Kiel, *Elektrische Widerstände*. Kautschuk wird mit nicht sehr großen, z. B. 20% betragenden Mengen äußerst fein gepulverten Graphits gemischt u. die M. zu größerer oder geringerer Härte vulkanisiert. Die Leitzugnisse können mit isolierenden Überzügen, z. B. von reinem Kautschuk u. r. Stromzuleitungsteilen aus Kupfer versehen werden. (A. P. 1 577 981 vom 14/12. 1924, ausg. 23/3. 1926.) KÜHLING.

International General Electric Company, Inc., New York, und **Gustav Frederic Dreher**, Schenectady, N. Y., V. St. A., *Isoliermaterial*, welches dadurch erhalten wird, daß man ein poröses Material, wie Asbest, Pappe, Kunststein bei einer Temp. von etwa 220° mit einem Wachs imprägniert, dessen Fließpunkt durch Erhitzen von 45 auf etwa 50° erhöht worden ist. (Aust. P. 19 096 vom 11/8. 1924, ausg. 12/2. 1925.) OELKER.

Ernest Henry Jones und **Alloy Welding Processes Ltd.**, London-Islington, *Metallelektroden für die elektrische Lichtbogenlötung*, die mit einem Zusatz von anderen Metallen, wie Ni, Al o. dgl. versehen sind, dad. gek., daß die Zusatzmetalle auf das Grundmetall durch ein elektrogalvan. Verf. aufgebracht werden, um eine möglichsinnige Vereinigung der Metallzuschläge in dem erforderlichen Verhältnis mit dem Grundmetall während des Lötvorganges zu erhalten. (D. R. P. 427 072 Kl. 2a vom 1/1. 1921, ausg. 23/3. 1926. — E. Prior. 13/10. 1915.) KAUSCH.

Deutsche Gasglühlicht-Auer-Ges., Berlin, *Zirkonoxydmaterialien*. Man sintert bas. Zr-Sulfaten erhaltenes ZrO_2 bei Temp. über 1800° u. verarbeitet es dann widerstandsfähigen Gegenständen. (**E. P. 246 480** vom 21/1. 1926, Auszug veröff. 3. 1926. Prior. 23/1. 1925.) KAUSCH.

Kaneshi Kawakami, Hongo-Ku, Tokio, *Bleiakkumulator*. Das Batterieelement hält eine feste Lsg. von 1,8% Hg, 97,8% Pb u. 4% damit legiertem Sb u. stellt eine große Platte dar. (**A. P. 1 575 167** vom 3/10. 1921, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH.

Soc. Anon. Le Carbone, Levallois-Perret, Frankreich, *Bleiakkumulatoren*, bei denen die Elektroden aus Pb- oder PbO-Pulver u. einem körnigen, porösen Leiter großer Gasabsorptionskraft bestehen u. letztere den Dämpfen von Fettstoffen gesetzt oder mit Fettsäure behandelt sind. (**E. P. 244 399** vom 21/4. 1925. Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 11/12. 1924.) KAUSCH.

J. Pellini, Marseille, *Galvanische Batterien*. Eine Zwei-Flüssigkeiten-Zelle weist eine Zn-Elektrode auf, die in eine Lsg. von NaOH u. KOH, u. eine Kohleelektrode, in eine Lsg. von W., H_2CrO_4 , Na_2SO_4 u. H_2SO_4 oder eines Ferrochromsalzes oder Cr_2O_7 , $FeSO_4$, H_3BO_3 , $KMnO_4$ u. H_2SO_4 eintaucht. (**E. P. 243 374** vom 20/11. 1925, Auszug veröff. 20/1. 1926. Prior. 22/11. 1924.) KAUSCH.

V. L. Williams und L. L. Williams, Aberbeeg, Mammouthshire, *Galvanische Batterien*. Für Sammelbatterien benutzt man einen Elektrolyten, der aus 80 Gallonen Na_2SO_4 (D. 1,2), 20 Pfund Na_2SO_4 , 10 Pfund $MgSO_4$ u. 10 Pfund NH_3 besteht. (**E. P. 243 537** vom 9/12. 1924, ausg. 24/12. 1925.) KAUSCH.

Wireless Dry Cells Ltd., übert. von: **William Micon Turnley**, Toronto, Kanada, *Trockenelement* mit einem $AlCl_3$ enthaltenden Elektrolyten. (**Can. P. 250 607** vom 24/11. 1924, ausg. 9/6. 1925.) KAUSCH.

Soc. Anon. Le Carbone, Levallois-Perret, Frankreich, *Galvanische Batterien*. Man verwendet für galvan. Batterien als absorbierendes u. depolarisierendes Material ein entwässertes kolloidales Gel (z. B. SiO_2). (**E. P. 244 417** vom 22/9. 1925, Auszug veröff. 3/2. 1926. Prior. 10/12. 1924.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

P. Nicolardot, *Nomenklatur und Klassifikation der optischen Gläser*. (Vgl. S. 2733.) Er setzt die Aufzählung der verschiedenen Möglichkeiten der Klassifikation der opt. Gläser fort. (Rev. gén. des Colloids 4. 39—50.) JOSEPHY.

Wiede's Carbidwerk Freyung m. b. H., Zwickau i. Sa., *Befestigung von Edelsteinen auf keramischen Gegenständen* (Porzellan, Steingut), dad. gek., daß die Steine in der keram. M. oder einem Schmelzfluß nur am äußersten Rande gehalten sind, während ihr Körper aber frei in einer Aushöhlung der M. sitzen. (**D. R. P. 426 761** vom 28/8. 1924, ausg. 16/3. 1926.) KAUSCH.

A. V. Heyer G. m. b. H., Stützerbach, Thür., *Herstellung geätzter Inschriften, besonders auf Glas*, unter Einschreiben der Inschrift in den Deckgrund mit einem feinen Art einer Rundschriftfeder gestalteten, breiten, zugespitzten Ende. (**D. R. P. 430 181** Kl. 32b vom 22/2. 1925, ausg. 19/3. 1926.) KAUSCH.

Gilbert Josiah Pickett, Largs, Australien, *Zementherstellung*. Man mischt die erforderlichen Mengen an Kalkstein, SiO_2 , Al_2O_3 u. Fe_2O_3 u. unterwirft das Gemisch einer Erhitzung in einem Drehofen, um gebrannte Klinker der gewünschten Härte zu erzeugen, die man bis zu der notwendigen Feinheit für den Zement mahlt. (**Aust. P. 249 549** vom 10/9. 1924, ausg. 24/9. 1925.) KAUSCH.

Harbison Walker Refractories Comp., übert. von: **William F. Rochow**, Pittsburgh, V. St. A., *Zementmischung*. Feuerfester Ton, SiO_2 , vorzugsweise gegläht, mit kieselsäurereiche Stoffe, wie Quarzit, werden fein gepulvert u. mit 5—20% ebenfalls fein gepulvertem Natriumsilicat gemischt. Der Zement muß in luftdichten

Behältern versandt werden. Er bindet innerhalb weniger Stdn. zu einer sehr harten festen M. ab. (**A. P. 1 576 550** vom 26/8. 1921, ausg. 16/3. 1926.) KÜHLING.

M. Lantz, Gotland, Schweden, *Zement*. Klinkermehl wird zweimal oder öfter mit 2—3% eines Calciumsalzes, wie CaSO_4 vermischt. Die Mischung oder ihre Bestandteile werden fein gemahlen. (**E. P. 247 097** vom 22/8. 1925, ausg. 4/3. 1926.) KÜHLING.

Jakob Adolf Hermann, Offenbach a. M., *Herstellung von mit einem dauerhaften Farbanstrich versehenen Zementmassen*, dad. gek., daß dem Zement außer dem üblichen Sand eine der Zementmenge vorteilhaft gleiche Menge von Ton beigegeben wird, bevor diese Mischung zu einer erdfeuchten M. verarbeitet wird. (**D. R. P. 426 621** Kl. 80b vom 10/12. 1924, ausg. 13/3. 1926.) KAUSCH.

Allis-Chalmers Manufacturing Co., Milwaukee, übert. von: **R. C. Newhouse**, Wauwatosa, V. St. A., *Schlackenzement*. Hochofenschlacke u. Kalkstein werden zusammen vermahlen u. das Mahlgut entweder mittels Kühlschlangen oder mittels k. V. abgekühlt. (**E. P. 246 792** vom 7/9. 1925, Auszug veröff. 31/3. 1926. Prior. 30/1925.) KÜHLING.

Arnold Vobach, Brandenburg, Havel, *Setzen und Brennen von Ziegelsteinen im Ringofen*, 1. dad. gek., daß die Heizschlitze schräg u. beiderseits s. zur Mittelachse des Brennkanals liegen. — 2. dad. gek., daß der in der Mittelachse liegende Scheitel des winkelförmigen Heizschlitzes in der Zugrichtung am meisten nach vorn liegt. (**D. R. P. 426 728** Kl. 80c vom 20/8. 1924, ausg. 18/3. 1926.) KAUSCH.

Max Claasz, München, *Herstellung künstlicher Steinmassen aus Gips*, dad. gek., daß Dolomit mit SO_2 behandelt u. mit gebranntem Gips vermischt wird. (**D. R. P. 426 760** Kl. 80b vom 3/4. 1925, ausg. 16/3. 1926.) KAUSCH.

Carl Marczinczek, Oakland, Californ., *Leichte poröse Isolierwände*, bestehend aus einer M., die 40% vulkan. Asche, 20% Bimsstein, 20% Kalk, 20% Gips enthält. (**A. P. 1 574 252** vom 1/6. 1925, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

Otto Aram, Philadelphia, *Feuerbeständige Steine für Ofenfutter*. Man überzieht das Futter mit metallischem Al. (**A. P. 1 576 021** vom 14/9. 1922, ausg. 9/3. 1926.) KÜHLING.

Vesuvius Crucible Comp., Swissvale, übert. von: **Arthur J. Jackman**, Forest Hills Borough, V. St. A., *Feuerfeste Massen*. Mischungen von Graphit, einem porzellanartigen Bindemittel u. gegebenenfalls einem inerten, sehr schwer schmelzbaren Stoff wie Siliciumcarbid, Tridymit, Zirkonsilicat oder Al_2O_3 werden unter Zusatz von V. geformt. Man verwendet z. B. 45 Teile Graphit, 15 Teile feinpulvriges Siliciumcarbid u. 40 Teile porzellanartiges Bindemittel, welches z. B. aus 25 Teilen Ton, 5 Teilen Kaolin u. 10 Teilen Feldspat, MgO , Kryolith, Borax, Dolomit, Kalkstein o. dergl. besteht. Die geformte Mischung wird in einer reduzierenden Atm. bei etwa 650° vorgebrannt, kurze Zeit oxydierend erhitzt u. dann in einer inerten, zweckmäßig reduzierenden Atm. bis zur völligen Verglasung des porzellanartigen Bindemittels, z. B. bei 1200—1500° gebrannt. Die Tiegel sind unmittelbar gebrauchsfertig, sie bedürfen keiner Nacherhitzung oder Ausglühens vor dem Gebrauch. (**A. P. 1 577 124** vom 26/5. 1923, ausg. 16/3. 1926.) KÜHLING.

Fred E. Greene, Berkeley, Californ., *Pflastermaterial*, bestehend aus mit Dampf raffiniertem Asphalt, erhitzten Füllstoffbrocken aus Sand u. Gestein u. zum Asphalt überschüssigem Kalkstein, welches Gemisch 5—25 Min. auf 300—600° F. erhitzt wird. (**A. P. 1 576 045** vom 21/9. 1921, ausg. 9/3. 1926.) KAUSCH.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

D. Drushinin, *Flüssige Phosphorsäure als Phosphorquelle für die Pflanzen*. Auf dem sandigen Podsolboden mit wenig adsorbiertem Ca (0,03%) wird der Haferertrag durch 0,25 g fl. H_3PO_4 pro Vegetationsgefäß merklich erniedrigt, durch 6 g CaCl_2 um ca. $\frac{1}{2}$ erhöht, durch $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{CaCO}_3$ noch stärker gesteigert. Auf dem lehmigen Podsolboden mit 0,08% adsorbiertem Ca ist die Wrkg. von H_3PO_4 auch an sich günstig.

ird durch CaCO_3 sogar etwas geschmälert. Eine ca. dreifache Ertragserhöhung
kt die Düngung mit NaNO_3 u. H_3PO_4 , obwohl NaNO_3 allein wenig wirksam ist. —
schädliche Wrkg. von H_3PO_4 auf kalkarmen Böden erklärt sich durch die An-
nung des Bodens durch die Phosphorsäure u. die damit zusammenhängende Hem-
g der bakteriellen Nitratbildung. Im Gemisch mit NaNO_3 wirkt H_3PO_4 noch
ischer als entsprechende Superphosphatmenge. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2.
-85. Moskau, Wiss. Inst. f. Düngemittel.) BIKERMAN.

Hans-Joachim Keuhl, *Messungen der Kohlensäurekonzentration der Luft in und
landwirtschaftlichen Pflanzenbeständen*. Die CO_2 -Aushauchung des Bodens ist
rößten, wenn Stall- u. Mineraldünger gemeinsam gegeben wurden. Die CO_2 -
ktion des Bodens ist am Tage für die Assimilation unzureichend; die freie Luft
deshalb mehr oder weniger in Anspruch genommen. Das Bornemannsche Verf.,
Stallmist so spät wie möglich zu geben, wird abgelehnt. Eine Erhöhung des
faktors auf positive Werte ist nicht erwünscht; eine Erhöhung wäre auch auf
n Gütern unrationell. Der CO_2 -Faktor ist abhängig von Standweite u. Dichte
bestandes sowie vom Klima. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A. 6.
-77.) TRÉNEL.

J. Ruschmann, *Über die Biologie des heißvergorenen Mistes*. Diskussion der
n, die für die Beurteilung des heiß vergorenen Mistes entscheidend sind. (Mitt.
utschen Landwirtschafts-Ges. 1926. 4 Seiten. Sep.) TRÉNEL.

J. Bredemann, *Weitere Versuche über Saatgut-Stimulierung*. Stimulationsverss.
„Stimula“ u. den „Original-Popoffischen Stimulations-
steln“ zu Gerste, Buschbohnen u. Buchweizen ergaben, daß eine ertragsteigernde
g. in keinem Falle zu erzielen ist. Die beobachtete Triebkraftbeschleunigung
te auch mit gewöhnlichem Leitungswasser erreicht werden, woraus folgt, daß
Problem rein keimungsphysiolog. zu betrachten ist. Verss. von R. LEONHARDS
Düngerstelle 2 der D. L.-G. bestätigen das Gesagte; für die Praxis ist daher die
ulation ohne Bedeutung. (Landw. Jahrb. 63. 369—86.) TRÉNEL.

H. Niklas, K. Scharrer und A. Strobel, *Phosphatlöslichkeit und Azotobakter-
stum*. Es bestehen deutliche Zusammenhänge zwischen der Löslichkeit der
phate u. der physiolog. Ausnützung durch Azotobakter, doch können aus den
-Resultaten keine weitergehenden Schlüsse gezogen werden. (Landw. Jahrb. 63.
387—410.) TRÉNEL.

William W. Johnston, *Die Erzeugung und Nutzen des Sulfats in humiden und
n Böden in ihren Beziehungen zum Pflanzenbau und zur Schwefeldüngung*. Vf.
sucht im Gewächshaus 1. den Einfluß des Pflanzenbaus auf die Sulfatentstehung
umiden u. ariden Böden, 2. den Einfluß des Sulfats auf die Rk. des Bodens, auf
Pflanzenwuchs u. auf den Schwefelgehalt der Ernte; Versuchspflanzen: Soja-
e und Luzerne. Auf dem Boden aus Westamerika wurde durch den Pflanzen-
s die Sulfatbildung verzögert; auf den humiden Böden wurde der Sulfatgehalt
ößert. Es scheint, daß humiden, sauren Böden mehr Schwefel durch die Ernte
ngen wird als semiariden; humide Böden regenerieren auch ihren Sulfatgehalt
er als semiaride, woraus sich der Erfolg der Schwefeldüngung zu Luzerne in
miariden Regionen erklärt. (Soil Science 21. 233—43. Oregon, Agr. Coll. Exp.
) TRÉNEL.

H. Astruc und A. Radet, *Untersuchung des alpinen Diluviums vom Standpunkt
Bodenacidität*. Hinweis auf die Bedeutung der Bodenrk. für Geologen, Agro-
n u. Bergleute. (Ann. science agronom. 42. 440—48. 1925.) TRÉNEL.

J. S. Joffe und H. C. Mc Lean, *Kolloidale Eigenschaften der Böden und Boden-
barkeit*. II. Der „austauschfähige“ Komplex und Bodenacidität. (I. vgl. Soil
ce 20. 169; C. 1925. II. 2292.) Die „Bodenacidität“ ist eine Frage des Sättigungs-
undes der „austauschfähigen“ Bodenkomplexe. Die $[\text{H}^+]$ der wss. Extrakte ist

belanglos für die Kenntnis dieses Sättigungszustandes. Vf. nimmt an, daß Wasserstoffionen sich direkt am Basenaustausch beteiligen. — Die „Zeitkurven“ stellen typische Adsorptionskurven dar. Durch Temperaturerhöhung koaguliert der kolloidale Anteil im Boden, wodurch die Stärke der „Austauschrk.“ herabgesetzt wird. (Soil Science 21. 181—94. New Jersey, Agr. Exp. Stat.) TRÉNEAU

Ch. Granvigne, *Die Bedeutung der kolloidalen Silicate und der kolloidalen Kieselsäure*. Literaturübersicht. (Ann. science agronom. 42. 484—500. 1925.) TRÉNEAU

Chr. Barthel und N. Bengtsson, *Zersetzung von inkrustierter Cellulose im Boden*. I. Stroh und Sägespäne im Lehm- und Sandboden. Vf. untersucht die Zers. von Haferstroh- u. Sägespänecellulose im Lehm- u. Sandboden. Die Verss. zeigen, daß die Ink. des Bodens für die Gärung der inkrustierten Cellulose von ebenso geringer Bedeutung ist, wie für reine Cellulose. Sie kann nicht mit der Gärung anderer Kohlehydrate verglichen werden. Besonders bei der Papiercellulose steht die Zers. im direkten Verhältnis zu der für die Gärungsbakterien günstigen Menge an Stickstoffverb. Das wichtigste Resultat hat die Unters. im Sandboden ergeben. Sie zeigt, daß Haferstroh die für die Entw. der Gärungsbakterien erforderlichen Stickstoffverb. in genügendem Maße enthält, so daß die Zers. in dem an N armen Sandboden schneller vor sich geht als bei reiner Cellulose. Das ist auch die Ursache der raschen Verwesung von Wurzel- u. Stoppeln im Boden. (Mitt. No. 300 der landwirtschaftl. Zentralversuchsanst. [Schweiz], Bakteriolog. Abhandlung Nr. 40. 1926. 1—19. Sep.) BRAUN

H. Lehrecke, *Die Bekämpfung der Schädlinge der Apfelsinenbäume mit Blausäure*. Beschreibung des Verf. mit „Blausäuregas“ u. mit „Cyklon“. (Umschau 30. 1926. bis 312.) TRÉNEAU

N. L. Alcock, *Vorläufige Notiz über eine Phytophthoraerkrankung von Tollkirschenpflanzen*. Vf. beschreibt die durch eine Phytophthoraart an der Tollkirsche (Atropa belladonna) hervorgerufene Krankheit u. schlägt zur Bekämpfung eine wss. Lsg. eines Gemisches von 2 Teilen CuSO₄ u. 11 Teilen Ammoniumcarbonat vor. (Pharmaceutical Journ. 116. 232.) ROJAHN

A. Auguet, *Über die Analyse neuer Harnstoffdüngemittel und Kalkcyanamverbindungen*. Literaturübersicht u. krit. Besprechung der verschiedenen Methoden. (Ann. science agronom. 42. 501—22. 1925.) TRÉNEAU

F. Chastellain, *Über die Bestimmung des Ammoniak-Stickstoffs in künstlichen Düngemitteln*. Krit. Stellungnahme zu den Best.-Methoden mit Hilfe von Formaldehyd, MgO, Ätznatron u. Mg-Phosphat. In zahlreichen Fällen haben sich beiden zuerst genannten Methoden bewährt; doch ist Sorgfalt bei Übertragung auf neue Düngemittel am Platze. (Helv. chim. Acta 9. 205—16.) TRÉNEAU

Gerlach, *Die Bestimmung des Düngerbedürfnisses der Böden*. (Vgl. Ztschr. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. B. 4. 273; C. 1925. II. 1557.) Krit. Stellungnahme zu den Verff. von SPRENGEL, WOLFF u. vornehmlich von NEUBAUER u. MITSCHERLICH. Mit Ausnahme der Niedermoorböden sind sämtliche Böden Deutschlands N-bedürftig. Ein größerer Teil der Böden enthält genügende Mengen an K u. P. Die Methode nach NEUBAUER u. die Citratmethode geben wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung des P₂O₅-Bedarfs. Der „Kalkbedarf“ kann durch die Best. des Bodenrk. erkannt werden; sinnentsprechende Anwendung der physiol. sauren u. alkal. Düngemittel wird empfohlen. Die mathemat. Behandlung des Problems durch MITSCHERLICH wird abgelehnt, weil 1. der Wirkungswert c der Wachstumsfaktoren nicht konstant ist, 2. weil es gleichgültig sei, ob in die Gleichung c , $2c$ oder $c/2$ eingeführt wird, 3. weil lediglich der Feldvers. brauchbar ist, 4. weil die Bodenrk. eine große Rolle in der Nährstoffaufnahme spielt. (Landw. Jahrb. 63. 339—68.) TRÉNEAU

Ch. Brioux, *Saure Böden, Bestimmungsmethoden, Kalkbedarf und p_H* . Beschreibung der colorimetr. u. elektrometr. Methoden zur Bestimmung der Bodenrk. (Ann. science agronom. 42. 416—39. 1925. Stat. agron. Seine-infér.) TRÉNEAU

L. D. Bayer, *Der Gebrauch der Chinhydronelektrode zur Bestimmung der Wasserionenkonzentration von Böden*. Wissenschaftliche Grundlagen u. Gebrauchsweisung. Vf. empfiehlt als Bezugselektrode die gesätt. Calomelektrode. Auf 100 cm Lsg. sind 0,05 g Chinhydrone zu nehmen. Vergleichende Messungen mit der Elektrode ergaben Abweichungen bis zu pH 0,2. Das Verhältnis Boden zu Wasser : 1. Die Chinhydronelektrode ist brauchbar bis zu einer alkal. Rk. von pH 8,0. Science **21**. 167—179. Ohio, Ag. Exp. Stat.) **TRÉNEL**.

N. Bengtsson, *Bestimmung von inkrustierter Cellulose im Erdboden*. Zur Best. Cellulose aus Stroh, Sägespäne, Dünger u. Moos im Erdboden werden 20 g des n mit einer Lsg. von 80 g NaHSO₃ in 100 ccm W. u. 200 ccm n. HCl in einer Druckkammer auf 100° 72 Stdn. erhitzt. Bei Sägespänen u. Moos werden nach 92 Stdn. weitere 100 ccm NaHSO₃-HCl-Lsg. zugefügt u. 192 Stdn. erhitzt. Nach dem Absaugen u. Waschen wird der Rückstand bei 50° getrocknet, mit 100 ccm Schweitzers Reagens (100 ccm des Filtrats wird mit 200 ccm 80%ig. A. gefällt u. nach dem Absitzen auf einem Filtertiegel gebracht. Nach der Entfernung des Cu durch Waschen mit HCl, 5%ig. NaOH, 2%ig. HCl, W., A., Ä. wird 1/2 Std. bei 50°, dann 1 Stde. bei 100° getrocknet. Der Rückstand wird in einen Platintiegel gebracht, gewogen, verascht u. wieder gewogen. Die Differenz beider Wägungen gibt den Cellulosegehalt in 10 g Erde an. Bei ungenauen Bestst. muß eine Korrektur angebracht werden, wegen des Wasseranteils des Nd. vor der Behandlung mit Schweitzers Reagens. Bei Braunkohle werden 10 g mit 150 ccm NaHSO₃-HCl-Lsg. erhitzt u. der Rückstand mit 1/5-n. HCl u. 3-mal mit W. gewaschen u. nach dem Trocknen mit 2 g ungelöschtem Kalk u. 100 ccm Schweitzers Reagens 4 Stdn. geschüttelt. Weitere Aufarbeitung wie vorher. Nach der Korrektur für Feuchtigkeit u. Verlust an Schweitzers Reagens durch den Kalk erhält man den Cellulosegehalt in 5 g Braunkohle. (Mitt. Nr. 279 der landwirtschaftl. Zentralversuchsanstalt [Schweden], Bakteriolog. Abhandlung Nr. 37. **1925**. 1—13. Sep). **BR.**

Eli H. Armstrong, Savannah, Georgia, *Apparat zur Behandlung von saurem Material* zwecks Verminderung des Wassergehalts, der unl. H₃PO₄ u. der freien HCl. Der App. besteht aus einem Turm (einem Gefäß), einer Anzahl kon. getrockneter Vorr. zum Herabführen der M., einer Drehvorr. für Rührflügel in dem Turm u. einer Vorr. zum regelbaren Einführen eines Stromes von h. Luft durch den Turm. (P. **1576 022** vom 6/8. 1921, ausg. 9/3. 1926.) **KAUSCH**.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, *Düngemittel*. Man bringt Cl₂ u. NH₃ zur Rk. miteinander. Man bildet zunächst COCl₂ u. bringt eine gesätt. Lsg. von NH₃ in der Reaktionskammer zur Rk. miteinander. Es bildet sich *Harnstoff*, *Cyanamid*, *Cyanursäure* o. dgl. neben NH₄Cl. (E. P. **245 768** vom 5/1. 1926, ausg. veröff. 3/3. 1926. Prior. 9/1. 1925.) **KAUSCH**.

E. I. du Pont de Nemours and Co. (Erfinder: **Max Engelmann** und **Allan H. Albright**), Wilmington, Delaware, V. St. A., *Nicht hygroskopische Saatgutbeizen*, bestehend aus Gemischen von kernmercurierten Phenolen oder Benzolcarbonsäuren, Natriumcarbonaten u. Oxyden oder Hydroxyden der Erdalkalimetalle. — Man mischt fein gemahlenes Oxymercuri-o-chlorphenolacetat bzw. Mercuri-o-chlorphenolsulfat mit Na₂(OH)₂ u. trockenem Na₂CO₃. Das feine Pulver zers. sich beim Behandeln mit W. in das Na-Salz des Oxymercuri-o-chlorphenols u. CaCO₃, das ausfällt. Die Salze des Oxymercuri-o-chlorphenols lassen sich durch das Sulfat, Acetat oder andere Salze des Oxymercuri-p-chlorphenols, des mercurierten 2,4-Dichlor-1-oxybenzols, des Oxymercuri-o-chlorphenols bzw. -p-nitrophenols, der Mercuribenzoessäure, der Mercurichlorbenzoessäure oder des Oxymercuriphenols, das Na₂CO₃ durch K₂CO₃ u. das Ca(OH)₂ durch CaO, Ba(OH)₂, MgO, Mg(OH)₂, Al₂O₃ oder Al(OH)₃ ersetzen. Die in mäßig feuchter Luft beliebigen Prodd. finden für sich oder im Gemisch mit anderen l. oder unl. indifferenten

Stoffen, Farbstoffen oder anderen Desinfektionsmitteln zum Bestäuben von Saaten Verwendung. (Aust. P. 18 916 vom 31/7. 1924, ausg. 14/7. 1925.) SCHOTTLÄNDI.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

H. F. Moore, *Was ereignet sich, wenn das Metall durch Ermüdung versagt?* gibt keine Theorie über die Ermüdungserscheinungen an Metallen, sondern entwickelt ein Bild, von dem er annimmt, daß es beim Betrachten dieses Gegenstandes gefördert sein wird. Es wird Gleitung innerhalb der Metallkörner angenommen, die genau Oberflächen u. damit vergrößerten Widerstand gegen weitere Gleitung bewirkt; andererseits wird auch eine allmähliche „Feilwirkung“ angenommen, die zum Sprung u. Bruch führt, wenn sie größer als die Verfestigungswirkung wird. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 539—52. Univ. Illinois, Urbana [Ill.]) WILKE

Sam Tour, *Abmessung und Handhabung von Öfen für Salzbäder*. Die Art der Erwärmung, die Zerstreung u. Ausstrahlung der Wärme u. die Vermeidung von Überhitzung sind wesentliche Faktoren bei diesen Öfen. 20 allgemeine Regeln werden aufgestellt, denen die Öfen genügen sollten u. an 12 Offenbeschreibungen werden verschiedenen Wege, auf denen dies erreicht werden kann, beschrieben. Der Weg zur Entw. besserer Öfen wird angegeben u. die allgemeinen Regeln besprochen, die bei Arbeiten mit Salzbadöfen zu beobachten sind. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 553—70. Doehler Die Casting Company, Batavia [N. Y.]) WILKE

Th. Metzger, *Hochleistungs-Lichtbogenöfen in der Eisen- und Stahlindustrie*. Hochleistungs-Drehstrom-Lichtbogenöfen mit abgedichteten Elektroden, Fassungsvermögen 3—5 t, bei der Rheinmetall A.-G. gebaut, wird beschrieben. Die Elektrodenanordnung ist nach System „HÉROULT“ getroffen, bei welchem der Lichtbogen zwischen Elektrode u. Schmelze spielt. Der Elektrodenbewegungsmechanismus ist unabhängig von der Ofenwanne auf Mannesmannstahlmaste, die auf der Kippwange des Ofens befestigt sind, angeordnet. Ein solcher Ofen, der seit 1/4 Jahren in Betrieb ist, benötigt für das Einschmelzen einer 3—4 t Charge 450 kWh/t bei nur Tages- u. 425 kWh bei Tag- u. Nachtbetrieb für unlegierten Schrott; die Schmelzdauer beträgt 1 1/4 bis 1 3/4 Stdn. Der Ofen eignet sich besonders zur Herst. von hoch beanspruchtem Guß. (Zentralbl. d. Hütten u. Walzw. 30. 87—91. Eberswalde.) WILKE

Bengt Kjerrman, *Einige Bemerkungen über schwedische Eisenpraxis*. Eine kurze Beschreibung der schwed. Eisenerzlagerrstätten, der benutzten Öfen zur Eisengewinnung u. der verschiedenen Verff. wird gegeben. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 596 bis 596.) WILKE

H. Hanemann und A. Schrader, *Über den Martensit*. Im wesentlichen ist die Arbeit der S. 2740 referierten gleich; die Erörterungen über diesen Gegenstand sind hier angefügt. (Berichte der Fachausschüsse des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, Werkstoffausschuß, Nr. 61. 1—25. Sep. Techn. Hochschule Berlin.) WILKE

Jerome Strauss, *Schneiduntersuchungen an Werkzeugstählen*. Vf. untersuchte 3 Klassen Werkzeugstähle u. beschreibt die verschiedenen Untersuchungsverfahren, die Fehler ermitteln u. bespricht die allgemeinen Vorsichtsmaßregeln, die hierbei zu beachten sind. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 571—84. 648. U. S. Naval Ordnance Factory, Washington [D. C.]) WILKE

A. H. Kingsbury, *Wolframstähle*. Es gibt verschiedene Gruppen W-Stähle, die in ihren Eigenschaften beträchtlich voneinander abweichen, entsprechend der Menge des enthaltenen Legierungsmetall. Diejenigen, die 1—1 3/4% W enthalten, sind allgemein anwendbar als Werkzeuge, die mit 2 1/4—7% sind für Schneidestähle zu verwenden, besonders wenn sehr fein bearbeitetes Gut verlangt wird oder auch wenn besonders hartes Material bearbeitet wird. Mit der alleinigen Ausnahme des permanenten Magnetstahls, der rund 5% W besitzt, enthalten die anderen W-Stähle noch ein oder zwei andere Legierungselemente z. B. Cr, Co, V in größeren Mengen. Heutzutage

halten alle W-Stähle prakt. etwas Cr. In der vorliegenden Arbeit werden nun allem die Stähle behandelt, bei denen Cr als Hilfsmittel zur Lsg. von Wolframid dient. Die Wrkg. des W in den betrachteten Stählen liegt im Anwachsen der Säurefestigkeit u. in einer Strukturverfeinerung, so daß hieraus sich erhöhte Festigkeit u. etwas erhöhte Schnelligkeit gegenüber den C-Werkzeugstählen ergibt. Die Trägheit, mit der Wolframcarbid in Lsg. geht, macht es notwendig, die Abschrecktemp. mit steigendem W.-Gehalt zu erhöhen. Die beobachteten Transformationen in dieser Stahlgruppe dürfen nicht als Hinweis auf die Abschrecktemp. benutzt werden wie es bei den C-Werkzeugstählen geschieht. Übersteigt der W-Gehalt bestimmte Grenze, so steigt die Härtetemp. über den Lösungspunkt des vorkommenden Zementits. Dieser Bestandteil ist brüchig u. kann nicht in übereutekten C-Stahl gelöst werden, ohne ihn als Werkzeug ungeeignet zu machen, es scheint, daß dies bei W-Stahl zur Hebung der Schneidfestigkeit direkt günstig ist. Diese Stähle sind wegen des schnellen Kornwachstums sehr empfindlich gegen langes Erhitzen bei oder nahe an ihrer Abschrecktemp. Langsames Anheizen mit folgendem schnellem Erhitzen auf Abschrecktemp. ist allein zu empfehlen. (Trans. Amer. Soc. of Treating 9. 597—603. Crucible Steel Co. of America.) WILKE.

A. Sanson, *Die Entwicklungsbedingungen der norwegischen Zink-Elektrometallurgie*. RYDER schätzt die nach dem einen oder anderen elektr. Verhüttungsverf. je Pferdestärke erzeugbare Zn-Menge auf 1700 kg, wobei er annimmt, daß die Elektrolyse den Vorteil aufweist, unmittelbar ein sehr reines Zn zu ergeben, auf der anderen Seite ein reiches Erz von konstanter Beschaffenheit bedingt. RAEDER bringt Kosteneinsparungen für Röstanlagen nach dem alten Verf., für elektrotherm. u. Elektrolyse. Die Verteuerung der Kohle u. Handarbeit hat vor allem die beiden letzten Verhüttungsmöglichkeiten gefördert; dabei wird die Entscheidung über Elektrometallurgie oder Elektrolyse von den örtlichen Verhältnissen abhängen. Die Elektrometallurgie wäre in Norwegen vorzuziehen, weil sie kleinere Einheiten gestattet u. weniger Brennstoffverbrauch abhängig ist. LEPSON vertritt auf Grund seiner Beobachtungen an amerikanischen Werken die Ansicht, daß es für Norwegen zweckmäßig wäre, die Zinkmetallindustrie des Landes auf Elektrolyse aufzubauen. Damit weichen die Angaben RAEDERS u. LEPSON voneinander ab. (Rev. de Métallurgie 23. 126—131.) KALPERS.

J. S. Sunderland, *Bemerkungen über starke und schnelle Kupferabscheidung*. Allgemein wird in der Praxis die Temp. auf 22°, u. U. auch höher gehalten, aber nie niedriger. Die D. der Lsg. von 19—20° Bé hat sich am besten bewährt, da Lsgg. stärkerer Z. entsprechend des größeren Widerstandes des Elektrolyten das Cu langsam abscheiden, außerdem ist die Qualität des abgeschiedenen Metalles nicht gut. Wird Strom von 15 A/sq. foot u. 1½ V bei ruhender Lsg. angewandt, so erhält man in ½ Stdn. einen Cu-Nd. von 0,01—0,015 cm Stärke. Dieselbe Stärke wird in ½ Stde. bei 50 A/sq. foot u. 6 V erreicht. (Metal Ind. [London] 23. 367—68.) WILKE.

Marcel Fourment, *Die Quellen an Mineralen auf der Welt (auf die verschiedenen Arten sich beziehende Monographien.)* 7. Das Vanadin. (6. vgl. S. 481.) Vf. bespricht die Arten von V-Erzen, ihre mineralog. u. chem. Eigenschaften, sowie ihre Vorkommen. Der größte Teil des Weltbedarfes (80%) wird durch eine Grube in Brasilien gedeckt, die Minas Ragra, die ein schwefelhaltiges, in der Welt sonst nicht vorkommendes Erz liefert. Dieses schwer erreichbare Grubenfeld gehört einer amerikanischen Gesellschaft, der Vanadium Corporation of America, deren Bemühungen sich sowohl auf die planmäßige Ausbeutung der Grube als auch auf die Verbesserung der Transportverhältnisse erstrecken. Die Verhüttung des Erzes erfolgt in einem besonderen Werke der Vereinigten Staaten. Andere wichtige Erzvorkommen befinden sich in Südafrika u. in den Vereinigten Staaten. (Rev. de Métallurgie 23. 132—42.) KALP.

J. B. Johnson, *Die Beziehung zwischen der Metallurgie und der Entwicklung der Flugwesens*. Die Entw. der Metallstruktur der Flugzeuge in den Ver. St. u. der v. verschiedenen Typen in Europa, besonders in Deutschland u. Frankreich während d. Weltkrieges wird beschrieben. Es wird auf die große Schwankung in den physikal. Eigenschaften u. chem. Analysen des benutzten Materials hingewiesen u. hervorgehoben, daß große Gewichtsparsnis schon erreicht worden ist. Hauptsächlich werden folgende *Al-Legierungen* benutzt: 1. 10% Cu, 0,5% Mg, 1,25% Fe, 2. 4,0% Cu, 2,0% Ni, 1,5% Mg, 3. 2,5% Cu, 0,5 Mg, 1,25% Fe, 4. 5,0% Cu, 1,0% Si, außerdem in bearbeitetem Zustande 1. 4,0% Cu, 0,6% Mg, 0,6% Mn u. 2. 4,0% Cu, 0,6% Mn, 0,75% Si. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating **9**. 517—38. Air Service, McCook Field, Dayton, Ohio.) WILKINSON

—, *Bor enthaltende Legierungsmetalle*. Die „Boronic“ genannten Legierungen bestehen aus Cu oder Legierungen, die gasförmige Borverbb. okkludiert enthalten. Das benutzte Metall ist in jedem Fall von der größten Reinheit, so daß keine Verunreinigungen in das herzustellende Metall gelangen, wenn Boronic zugesetzt wird. Nur ein kleiner Teil, etwa 1,10—2% der Gesamtmasse, wird zugegeben, der als Flammmittel, Desoxydationsmittel u. a. wirken kann. Die Gase des Legierungsmetalls werden im Bad frei, verbinden sich mit den anwesenden Oxyden, reduzieren sie das Metall u. verursachen ein lebhaftes Mischen der Metallmasse, wodurch diese gleichmäßig wird. Dieses Legierungsmetall wird in der Nichteisenmetallurgie angewandt u. soll unter bestimmten Umständen $2\frac{1}{2}$ -mal mehr O₂ als die gleiche Al-Menge, $3\frac{1}{2}$ -mal mehr als Ti u. über 3-mal mehr als Mg absorbieren, außerdem soll das herzustellende Metall von H₂ u. N₂ ebenfalls befreit werden. (Metal Ind. [London] **28**. 378.) WILKINSON

R. de Fleury, *Die Kolben aus Aluminium, Silumin und Magnesium*. Vergleichen man die wichtigsten Eigenschaften von *Al-Cu*, so weit sie für die Herst. von Kolben zu berücksichtigen sind, mit denen von *Silumin* u. *Mg*, so ergibt sich, daß die geringe D. des Silumins u. Mg eine Verstärkung des Kolbenkörpers gestattet, ohne sein Gewicht zu vergrößern. Vom mechan. u. thermodynam. Gesichtspunkte aus wird dasjenige Metall zur Ausführung eines Kolbens von bestimmtem begrenztem Gewicht dasjenige sein, dessen spezif. physikal. Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit/Ausdehnbarkeit $\times$ messende Zahl größer ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 628—30.) KALPER

Léon Guillet und Jean Cournot, *Über den Einfluß der thermischen Behandlung auf einige Silberlegierungen*. Die Unterss. lehnen sich an die Arbeiten von CARPENTIER, WHITELEY u. GÜRTLER an u. wurden mit Legierungen vorgenommen, die folgenden Ag-Gehalt aufwiesen:

	Ag-Zn-Legierungen		Ag-Cd-Legierungen	
	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 1	Nr. 2
Im Barrenkopf . . .	69,77	62,28	59,96	49,47
Im Barrenfuß . . .	69,77	62,28	59,96	49,02

In metallograph. Hinsicht ergab sich: im Glühzustand 2 Bestandteile in gleichen Mengen, von denen der eine nicht angegriffen, der andere stark gefärbt ist, die aber kein Eutektikum zu sein scheinen; bei 400° gehärtet Zunahme um fast die Hälfte des dunklen Teiles, bei stärkeren Härtungen vollständiges Verschwinden des hellen Bestandteiles. Beim Anlassen ist ein sehr fein verteilter Nd. im Inneren des gefärbten Teiles wahrnehmbar, während an der roh gegossenen Barre ein Mittelgefüge zwischen dem Gefüge der bei 400° gehärteten u. angelassenen Probe u. der bei 500° gehärteten u. angelassenen besteht. Es scheint, daß das Diagramm nicht genau ist. Die beiden wichtigsten Merkmale sind: kein Martensit u. ein fein verteilter Bestandteil. Die Zunahme der Härte ist ähnlich wie beim Duralumin. Die Ag-Cd-Legierungen sind nicht so bemerkenswert wie die Ag-Zn-Legierungen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 606—09.) KALPER

F. Körber, *Der heutige Stand der Werkstoff-(Metall)Forschung*. Ein kurzer Überblick. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **70**. 491—96. Düsseldorf.) WILKINSON

- G. Sachs**, *Die optische Untersuchung von Metallen*. Es werden einige Neuheiten Firma C. REICHERT, Wien, beschrieben. (Metal Ind. [London] **28**. 341—43.) **WILKE.**
- J. R. Vilella**, *Untersuchen von Metallstrukturen*. (Vgl. S. 3179.) Von den bisher bekannten Ätzmitteln für Al u. die Leichtmetalle hat jedes Mittel einen besonderen Reiz, aber keins ist vollkommen zu nennen. So erscheinen beim Ätzen mit 25%ig. HNO_3 -Lsg. bei 70° Kupferaluminid schwarz, Eisenaluminid violett u. der X-Beitell leicht grau. 1%ig. alkoh. HNO_3 -Lsg. färbt in Al-Mg-Legierungen Al_3Mg_3 n. Ferrisulfat-Lsg. (R. J. ANDERSON) mit 5—10% Ferrisulfat wird zum Untersuchen von Kupfer- (schwarz) u. Eisenaluminid (grau) gebraucht. Verdünnte wss. alkoh. NaOH-Lsgg. werden zur Feststellung von Kupferaluminid neben Fe-, Mn-Aluminid, die gleich gefärbt werden, gebraucht. Außerdem wird noch HF zum Auflockern der Mikrostruktur benutzt. Das neue Ätzmittel soll nun sowohl die Mikrostruktur als auch die einzelnen Verbb. unterscheiden lassen. Es besteht aus 1 Teil H_2O u. 2 Teilen HF, die in Glycerin gelöst werden. Die Stärke der Säuren u. die Dauer kann nicht angegeben werden, da verschiedene Legierungen auch verschiedene Stärken der Ätzfl. verlangen. Für eine große Anzahl von Legierungen genügt die Zusammenstellung: 1 Vol.-Teil HNO_3 , 2 Vol.-Teile HF u. 3 Teile Glycerin. Bei dieser Fl. hat sich wie bei den früheren abwechselndes Ätzen u. Schleifen im Verlauf der Kornstruktur gut bewährt. Die Auffindung des Fe in den 6 verschiedenen Formen u. die Unterscheidung zwischen Fe-, Ni- u. Mn-Aluminiden mit demselben Ätzmittel wird besprochen. (Iron Age **117**. 903—07.) **WILKE.**
- Paul Heymans**, *Interpretation von Kerbschlagbiegeprobenergebnissen*. Die Untersuchung mittels der photoelast. Methode der Zugverteilung um die Kerben, wie sie in verschiedenen Biegeproben benutzt werden, ausgefüllt worden. Die Gestalt u. die Ausbreitung der Kerben wurden unter gleichen physikal. Bedingungen analysiert. Es ist festgestellt, daß das örtliche Versagen beim stärksten Zug u. das Sichausbreiten über die allgemeine Verteilung u. auch von den elast. Eigenschaften des Materials abhängt. Bei duktilem Material kann ein starker örtlicher Zug nur örtliches Fließen verursachen, andernfalls tritt Sprung ein. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating **9**. 604—14. Inst. f. Techn. Cambridge [Mass.]) **WILKE.**
- Heinz Bablik**, *Das Preece-Verfahren*. (Vgl. S. 1882.) Das Verf. wurde von 1848 bis 1897 von PETTENKOFER zur Unters. von verzinktem Draht benutzt, es ist bis jetzt aber noch kein neues u. besseres ersetzt worden, trotzdem die damit erhaltenen Resultate oft u. oft irreführend sind, was Vf. durch Verss. beweist. (Metal Ind. [London] **28**. 69—70. Wien.) **WILKE.**
- M. U. Schoop**, *Über ein neues Metallisierungsverfahren*. An Stelle des in der sog. Schmelzmetallurgie mittels einer kleinen Druckluftturbine sich automat. verschiebenden Drahtes wird fein zerteiltes Metallpulver verwendet. Dadurch wird die Apparatur vereinfacht, die im wesentlichen nur noch aus einer Düse mit einer zentralen Öffnung u. zwei konzentrischen darum angeordneten Ringschlitzen besteht. Die Öffnungen sind sehr fein u. eine Nachbehandlung, wie Schleifen u. Polieren, kann unterbleiben. Da mit reduzierender Flamme gearbeitet wird, kann oxydhaltiges Pulver benutzt werden. (Montan. Rundschau **18**. 160. Zürich.) **WILKE.**
- Edwin Bremer**, *Brüchigkeit im Tempergußeisen wird vermieden*. Die Ausführung nach L. H. MARSHALL (S. 2964) angegebenen Verf. in der Praxis wird beschrieben. (Iron Age **54**. 212—15. 231.) **WILKE.**
- L. L. Mantell**, *Die Benutzung von Chlor zur Wiedergewinnung von Zinn und Zinnpulver aus Zinnblechabfällen*. (Vgl. S. 3180.) Verschiedene Ausführungsformen der Zinnrückgewinnung mit Cl_2 werden besprochen. Die Temp. des Reaktionsraumes muß unterhalten werden, da sonst das Fe der Kammer angegriffen wird. Das entzinnete Fe neigt stark zum Rosten, weil sich auf seiner Oberfläche eine unsichtbare dünne Schicht FeCl_3 bildet, die W. anzieht. Durch Waschen wird diese Schicht entfernt. — Die

Kosten einer Entzinnungsanlage werden besprochen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 9 Seiten. Brooklyn [N. Y.], Pratt. Inst. Sep.)

R. SCHMID

Wilh. Palmaer, *Die Korrosion der Metalle, Theorie und Versuche*. Vorl. I

Es wird ein zusammenhängender Bericht über die Arbeiten vom Vf. an der techn. Hochschule zu Stockholm gegeben, die während der letzten 5 Jahre ausgeführt worden sind. Um den Verlauf bei der Korrosion der Metalle kennenzulernen, wurde die Lösungsgeschwindigkeit beim Auflösen von Metallen in Säuren bzw. W. oder Lsgg. untersucht. Die Geschwindigkeit der Auflösung ist bedingt durch den Unterschied der EMK., durch die Leitfähigkeit der Lsg. u. durch die Widerstandskapazität der Lokalelemente oder bei passender Wahl der Einheiten ist sie gleich der gesamt Intensität der Lokalströme. Für gewöhnliches Zn ist das Bild wie folgt: Zn bildet die Anoden, von diesen Zentren gehen Stromlinien aus, die auf den Pb-Teilchen als Kathoden wirken, endigen u. an denen H₂ abgeschieden wird. Es wird nun u. a. Verss. an Zn, Al u. Fe (von verschiedenen Qualitäten) berichtet, die die Theorie der Lokalelemente stützen sollen. Ein Fall betrifft das Auftreten einer Induktion: die Reaktionsgeschwindigkeit steigt anfangs bis zu einem Maximum, darauf nimmt sie wiederum ab, je nachdem das Metall oder die Säure verbraucht werden. Nach der Theorie der Lokalelemente befinden sich anfangs nur wenige Partikel mit kleiner Oberfläche, von den als Kathoden wirksamen fremden Metallen, an der Oberfläche des Metalles. Durch allmähliche Auflösung des Grundmetalles werden eine große Anzahl von Verunreinigungen freigelegt u. deren Gesamtoberfläche dadurch vergrößert. Alles in allem kann gesagt werden, daß mit Ausnahme der Widerstandskapazität beinahe alles auch quantitativ berechenbar ist. Ist nun hiernach die Theorie der Lokalelemente für den Verlauf der Auflösung der Metalle maßgebend, so muß sie in erster Linie für die eigentliche Korrosion u. speziell für das Rosten des Fe angenommen werden. — Für die scheinbar vorliegenden Gründe zur Annahme, daß ein absolut reines u. auch physikal. homogenes Metall nicht löst, wird die Erklärung gegeben, daß ein metastabiler Zustand dadurch geschaffen ist, daß die EMK. an verschiedenen Punkten der Oberfläche gleich ist, so daß also kein bevorzugter Punkt vorhanden ist, an dem die Rk. nicht anfangen kann. Zum Schluß wird die eigentliche Korrosion, speziell das Rosten des Eisens besprochen. Vf. kommt auf Grund seiner Unterss. zur Überzeugung, daß die Kohlensäure an u. für sich einen kaum merkbaren Einfluß auf die Rostungsgeschwindigkeit ausübt, vorausgesetzt, daß der Luft-O₂ nicht als Depolarisator vorhanden ist. Vor allem scheint aber die elektr. Leitfähigkeit des Flüssigkeitshäutchens auf dem Fe von stark beschleunigendem Einfluß auf das Rosten zu sein. (Korrosion u. Metallschutz 2. 3—8. 33—38. 57—62. Stockholm.)

WILH.

M. Werner, *Korrosionsbeispiele aus der Praxis*. Es werden einige besonders interessante Fälle aus der chem. Industrie beschrieben. So greift NaOH Flußeisen (besonders an der Berührungsstelle Rohr u. Ring) an, neutrales benzolsulfosaures Natrium stimmt Blechstreifen (mit 0,1% Cu), Mischsäure aus 9 Teilen HNO₃ u. 1 Teil H₂SO₄ die Seigerungen. Besonders stark tritt Korrosion infolge von Kaltdeformation ein. Hierbei brauchen keine besonders scharfen Reagenzien zu wirken, es genügt das Kesselwasser. Meistens findet man dabei die Ätzfurchenkorrosion ausgeprägt, die umso ausgeprägter ist, je stärker der „Elektrolyt“ wirkt. Z. B. sind H₂SO₄ vor allem Mischsäure gefährlich. Ungeklärt ist ein Korrosionsfall, bei dem die Dampferverteilerrohre eines Benzolverdampfers verschieden stark angegriffen wurden. Ein Schweißrohr hielt vorzüglich (19 Jahre), während die nahtlos gebogenen Rohre, die keine zurückgebliebene Kaltdeformation zeigten, nach 2—3 Jahren versagten. Bei einer besprochenen Gasleitungskorrosion muß man vagabundierende Ströme zur Erklärung mit heranziehen. (Korrosion u. Metallschutz 2. 6. 1. 1925. Leverkusen, Farbwerke vorm. FR. BAYER & Co.)

WILH.

Madsenell Corporation, New York, übert. von: **Arthur Z. Pedersen**, West-
 nge, N. J., *Metallplatten durch elektrolytisches Niederschlagen von Metallen*. Man
 rt die Richtung des elektr. Stromes im Niederschlagsbade mehrere Male um. (**A. P.**
74 055 vom 15/5. 1920, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

Westinghouse Lamp Co., Bloomfield, übert. von: **J. W. Marden** und **M. N.**
h, East Orange, V. St. A., *Auspressen von Metallen*. Dünne Stücke von Metallen
 Cäsiumgruppe, besonders Mischmetalle werden bei etwa 500° aus einer Düse ge-
 st. Die Düse befindet sich zwischen 2 elektr. geheizten, durch Schraubenpressen
 ummehgehaltenen Metallblöcken. Die Erzeugnisse werden in Radoröhren, Glüh-
 pen u. dergl. verwendet. (**E. P. 246 860** vom 29/1. 1926, Auszug veröff. 31/3.
 5. Prior. 29/1. 1925.) KÜHLING.

Paul Jeanneret, Bern, *Mittel zum Reinigen von Aluminiumgegenständen*, be-
 end aus Harzseife u. Fe_2O_3 u. gegebenenfalls CaCO_3 . (**Schwz. P. 112 571** vom
 1. 1925, ausg. 16/11. 1925.) KAUSCH.

T. W. Coslett, Birmingham, *Rostschutz*. Eisen- oder Stahlgegenstände werden
 icht mit einer h. oder k. Lsg. von H_3BO_3 u. dann mit einer wss. Lsg. behandelt,
 he $\text{Zn}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ u. H_3BO_3 enthält. Die B. des rostschützenden Belages aus dieser
 kann durch Durchleiten eines elektr. Stromes unterstützt werden. (**E. P. 247 071**
 26/6. 1925, ausg. 4/3. 1926.) KÜHLING.


IX. Organische Präparate.

P. Bruère, *Der komprimierte Metaldehyd oder die weiße Kohle*. Er ist die
 asform des trimeren Acetaldehyds u. ist im Gegensatze zum Paraldehyd fast
 chlos, unl. in W., gegen 110° sublimierbar. Er ist leicht zu handhaben u.
 mt im Handel in opaken, weißen Stücken (Tabletten, Blöcken u. a.) vor, die
 dem Stempel „*Meta*“ versehen sind; er ist nicht hygroskop., entflammt
 it ohne Explosion u. verbrennt mit schwachleuchtender, nicht rußender Flamme;
 estellt in der Schweiz durch die Lonzawerke, demnächst auch in Frankreich
 h die Kuhlmannwerke in Villiers-Saint-Paul bei Creil. Der aus Ca-Carbid ge-
 nene Paraldehyd wird durch Dest. im sauren Mittel in Acetaldehyd gespalten,
 man in gekühlten Rohren auffängt u. in gußeisernen Gefäßen unter der Einw.
 s Katalysators (z. B. H_2SO_4) bei -15° zu *Metaldehyd* kondensiert. Das Ausfällen
 Metaldehyds hierbei soll behutsam erfolgen, damit sich die kleinen prismat. Kry-
 e nicht zusammenballen u. dann Bestandteile der Reaktionsmasse, wie Acet-
 hyd, Paraldehyd, der sich auch bildet, u. Katalysator, umschließen. Solche Ver-
 einigungen befördern die Depolymerisation u. beeinträchtigen die Beständigkeit
 „*Meta*“. (F. P. 547152; C. 1923. II. 1152.) Der Verbrennungswert ist 270 Calorien
 ein g-Molekül Acetaldehyd, entsprechend 6136 Calorien für 1 kg *Meta*. (Ann.
 Falsifications 19. 70—73.) RÜHLE.

General Motors Corporation, Detroit, Michigan, übert. von: **Carroll Alonzo**
hwalt, Dayton, Ohio, V. St. A., *Herstellung von Dialkylseleniden und -telluriden*.
 läßt auf Alkaliselenide bzw. -telluride Dialkylsulfate einwirken. Z. B. gibt man
 n einem mit Rückflußkühler versehenen Gefäß befindlichem Na_2Se in kleinen
 eilen *Diäthylsulfat*, bis die exotherme Rk. beendet ist u. erhitzt das Gemisch im
 serbade 3 Stdn. auf 100°. Nach Zugabe von W. wird das *Diäthylselenid* mit Dampf
 dest. Das Na_2Se kann durch K_2Se bzw. die entsprechenden *Alkalitelluride*, das
 hylsulfat durch andere Dialkylsulfate ersetzt werden. (**A. P. 1 578 731** vom
 . 1923, ausg. 30/3. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Établissements Poulenc Frères und **Carl Oechslin**, Paris, Frankreich, *Her-
 ung von organischen Derivaten des Zinns*. Man läßt SnCl_2 in Ggw. von Alkalihydr-
 VIII. 1.

oxyden auf Chlor- oder Bromhydrine einwirken. — Z. B. wird eine wss. SnCl_2 -Lsg. langsam zu einer eiskalten NaOH -Lsg. 36°Bé gegeben. Nach beendeter Lsg. läßt man Äthylenchlorhydrin einfließen. Hierbei verschwindet die Zinnsäure unter B. d. Na-Salzes der *Oxyäthylstannonsäure* nach der Gleichung:



Das Prod. wird aus der wss. Lsg. mit BaCl_2 gefällt, filtriert, mit H_2S gesätt., neutralisiert, über Nacht stehen gelassen, erneut filtriert u. durch $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ als *Oxyäthylstannonsäure* der Zus. $\text{OH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{SnS} \cdot \text{S} \cdot \text{SnS} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{OH}$, in W. wl., in Alkalien selbst in Na_2CO_3 ll., sich bei 80° unter Entw. von C_2H_4 zers. Pulver, gefällt; verd. Säuren zersetzen das Prod. ebenfalls unter Gasentw., der gelbe Rückstand ist frei von C. Analog erhält man aus SnCl_2 u. *Glycerinmonobromhydrin* die *Dioxypropylstannonsäure*. Die aus ihr gewonnene *Dioxypropylthiostannonsäure* ist in starken Säuren l., wird saurer Lsg. schnell zers., hat keinen F. u. zers. sich beim Erhitzen unter B. von $\text{Sn} \cdot \text{SnOS}$. (A. P. 1 573 738 vom 4/9. 1924, ausg. 16/2. 1926. F. P. 582 412 vom 12/12. 1923, ausg. 18/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Emil Hene, Staßfurt, *Herstellung von Cyaniden des Kaliums oder Natriums* durch Umsetzung von Lsgg. von $\text{Ca}(\text{CN})_2$ oder Cyancalciumbildungsgemischen mit K_2SO_4 oder Na_2SO_4 , 1. dad. gek., daß zunächst so viel Alkalisulfat zugesetzt wird, daß sich ein wesentlich syngenitfreier Gipsschlamm absetzt, der durch Filtern vom Lösungsgemisch getrennt wird, worauf die in diesem vorhandenen Cyanverbindungen durch Zufügen eines Überschusses des Sulfates oder des Carbonates des betreffenden Alkalis vollständig in Alkalicyanid umgesetzt werden. — 2. dad. gek., daß der in der zweiten Stufe der Umsetzung mit Alkalisulfat erhaltene Syngenitschlamm zum Zweck der Rückgewinnung seines Alkalisulfatgehaltes mit W. oder einer Lsg. von $\text{Ca}(\text{CN})_2$ zers. wird. — Der Verbrauch an Alkalisulfat ist erheblich geringer als bei dem bekannten Verf. (D. R. P. 427 156 Kl. 12k vom 11/1. 1924, ausg. 25/3. 1926.) KÜHLING

American Cyanamid Co., New York, übert. von: **Guy H. Buchanan**, Westfield, V. St. A., *Halbarmachen von Blausäure*. CNH des Handels, welche 3–10% W. H_2O enthält, wird mit einem Cyanhalogenid, zweckmäßig Chloreyan, versetzt. Die Verwässerung wirkt schon in sehr geringen Mengen, sollen aber vorzugsweise in Mengen von 10–15% zugesetzt werden, sie erniedrigen dann den F. der CNH auf $-45,5^\circ$ u. wirken in verdünnter Lösung tränenerregenden Eigenschaften wegen als Warnungsmittel. (A. P. 1 577 057 vom 16/9. 1925, ausg. 16/3. 1926.) KÜHLING

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, übert. von: **Earl A. H. Weltz**, Penns Grove, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von Nitromethoxybenzolen*. Man erhitzt ein Nitrochlorbenzol mit CH_3OH in Ggw. von W. u. einem Alkalihydroxyd unter Druck auf $105\text{--}110^\circ$. — Z. B. wird in 80–90% ig. CH_3OH gel. NaOH mit *o-Nitrochlorbenzol* im Autoklaven auf $105\text{--}110^\circ$ 4–5 Stdn. erhitzt, der überschüssige CH_3OH abdest., das *o-Nitranisol* abgezogen u. zur Entfernung von Natrium u. Nitrophenolnatrium mit h. W. gewaschen. Bei dem Verf. wird die B. von Azonitrophenol vermieden, außerdem verläuft die Umsetzung in Ggw. von W. wesentlich schneller als mit absol. CH_3OH . — Analog erhält man aus dem *p-Nitrochlorbenzol* das *p-Nitranisol* — u. aus dem *2,4-Dinitro-1-chlorbenzol* das *2,4-Dinitro-1-methoxybenzol*. (A. P. 1 578 943 vom 17/9. 1920, ausg. 30/3. 1926.) SCHOTTLÄNDER

Émilien A. O. Viel, Rennes, Frankreich, *Herstellung von Piperazyltheobromin*. Man läßt Halogensubstitutionsprod. des Theobromins auf in W. gel. Piperazin einwirken. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von Piperazinhydrat mehrere Stdn. mit Theobromin zum Sieden erhitzt. Aus der filtrierten Lsg. krystallisiert beim Erkalten das Piperazyltheobromin, Nadeln, F. 247° , Mol.-Gew. 264, gibt mit Säuren krystallisierende Salze. (F. P. 584 735 vom 17/10. 1923, ausg. 12/2. 1925.) SCHOTTLÄNDER

XI. Harze; Lacke; Firnis.

M. Jakschin und **A. Pirjatinski**, *Über das Drehungsvermögen russischer Handels-terpentinöle*. Das Drehungsvermögen ist für jedes Produktionsgebiet charakteristisch; je älter, teilweise verharzte Terpentinöle weisen die ihrer Herkunft entsprechenden Drehungen auf. Die extremen Werte: + 7,75 u. + 24,72°. (Journ. f. chem. Ind. Russl. 2. 352—54. Trust „Russ. Harz“.) BIKERMAN.

S. Mahdihassan, *Beiträge zum wissenschaftlichen Studium der Lackindustrie. Frühe Erkennung des Geschlechts bei den Lackinsekten*. (IX. u. X. vgl. FOWLER, MAHDIHASSAN u. SREENIVASAYA, Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 285. 24.) (Journ. of the Indian Inst. of Science 9. 1—24. Bangalore, Indian Inst. of Science.) FALKENTHAL.

H. Rasquin, *Neue Wege der Celluloselackierung*. (Vgl. S. 1056.) Da eine gute Lackanlage teuer ist, ist anzustreben, die Celluloselackierung so auszugestalten, daß bei der Verarbeitung der Lacke mit dem Pinsel in althergebrachter Weise nichts im Wege steht. Beschrieben wird Arbeiten mit: Pb-Weißvorstrich oder Grundieren mit reinem, ölfreiem Cellulosefirnis, Streichspachtelaufstrich, Cellulosemesserspachtel, Celluloseöllack. Die Möglichkeit einer vollständigen Lackierung auf Cellulosebasis ist Tatsache geworden. (Farben-Ztg. 31. 1293—95.) SÜVERN.

Hans Rebs, *Glänzend trocknende Firnisse aus Holzöl*. (Vgl. RASQUIN, S. 265; PENHEIMER, S. 2627.) Holzöl liefert von allen fetten Ölen den am wenigsten durchlässigen Film, es ist im Fe-Schutz berufen, den Leinölfirnis zu verdrängen. Bei Leinöl bewirkt erst die Kombination mit dem Farbkörper den Rostschutz, reines Holzöl besitzt aber bereits ohne Farbkörper rostschützende Eigenschaften. Durch Verkochen allein ohne fremden Zusatz wird beim Holzöl kein wasserfreies Trocknen erzielt. Das Präparat HANKOWIN der Firma ROGLER, BS & Co. G. m. b. H., Godesberg a. Rh. dient zur Herst. normaltrocknender Holzfirnisse. Seine Vorteile werden besprochen. (Farbe u. Lack 1926. 128.) SÜVERN.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Extraktionsmittel für Harze, Fettstoffe aller Art* nach D. R. P. 320807, gek. durch Verwendung der Chlorierungsprodd. des *Tetranaphthalins*, gegebenenfalls unter Anwendung von Druck, als Extraktions- u. Reinigungsm. (D. R. P. 425 511 Kl. 22h vom 25/1. 1925, ausg. 19/2. 1926. **Zus. zu D. R. P. 320807; C. 1920. IV. 225.**) RÖHMER.

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: **Erich Riedel** und **Willy O. Herrmann**), München, *Veredlung von Harzen*, dad. gek., daß man an Harze Cl oder HClO anlagert u. diese Prodd. darauf mit wss. Alkalilsgg. so behandelt, bis das eingeführte Cl wieder abgegeben ist. — 2. dad. gek., daß man das erhaltene Rohprod., um es wasserbeständig zu machen, in einem Lösungsm. löst u. wieder ausfällt oder einer Nachbehandlung mit W., zweckmäßig bei Ggw. von Alkali, unterwirft. (D. R. P. 426 283 Kl. 22h vom 21/2. 1922, ausg. 8/3. 1926.) RÖ.

Erwin Saxl, Wien, *Künstliches Altern von Bernstein*. Bernstein wird bei Ggw. von katalyt. wirkenden Stoffen, wie Basen, Säuren, Salzen usw., mit Wasserdampf u. Wärme unter Druck behandelt; man behandelt z. B. Bernstein mit 70—90%ig. W. u. dann mit 4—10%ig. HCl, hierauf wird unter Druck auf Temp. über 100° erhitzt. (Oe. P. 101 950 vom 29/1. 1924, ausg. 10/12. 1925.) FRANZ.

Clayton C. Monger, Camden, V. St. A., *Terpentinersatz*. Zu geschmolzenem Terpentin, das man längere Zeit höher erhitzt hat, wird, gegebenenfalls nach Zusatz eines Verdünnungsmittels, Bzn. u. eine Säure (H₂SO₄) zugefügt u. die Mischung durchgerührt. Nach dem Absetzen wird die überstehende Fl. abgezogen, mit Alkali neutralisiert u. der Rückstand dest. (A. P. 1 572 902 vom 6/1. 1925, ausg. 16/2. 1926.) RÖHMER.

Barrett Co., New York, übert. von: **S. P. Miller**, Philadelphia, *Synthetisch Harze*. Öle, wie Naphtha, werden in einer Apparatur, in die man bestimmte Menge Öl u. Polymerisationsmittel einbringt u. das erhaltene Prod. abzieht, polymerisiert (E. P. 246 491 vom 22/1. 1926, Auszug veröff. 24/3. 1926. Prior. 23/1. 1925.) K.

Cella Drahtwerk G. m. b. H., Hamm, Westf., *Herstellung ofentrocknender Lack* mit Hilfe von Acetylcellulose für die Emailliedrahtfabrikation, dad. gek., daß man in Phenol u. Trichloräthylen gel. Acetylcellulose mit Asphalt-, Harz- oder Pechlack mischt. (D. R. P. 426 262 Kl. 22h vom 8/4. 1923, ausg. 5/3. 1926.) RÖHMER.

Colloisil Colour Co. Ltd. und **Carl Ernst Julius Goedecke**, Manchester, *Farbstoffemulsionen*. Man vermischt einen Farbstoff auf mechan. Wege mit einer zu Lösen des Farbstoffes unzureichenden Menge eines Lösungsm. u. gibt hierzu einen Stoff der mit dem Farbstoff keinen Lack bildet, u. das Ganze in eine kolloidale Lsg. od. Emulsion überzuführen vermag. Man vermischt z. B. den Farbstoff mit W., A., Säuren oder Alkalien u. gibt dann Öle, Fette, Mineralöle, Wasserglas, Seife, Dextrin, Stärkleim usw. zu. Die so erhaltenen Emulsionen können z. B. durch Vermischen mit Grünerde zur Herst. von *Lacken* verwendet werden. (E. P. 241 331 vom 16/8. 1922, ausg. 12/11. 1925.) FRANZ.

Albert Akermann, Frankreich, *Lack aus Kunstharz*. Das Kunstharz, (z. B. Phenol-Formaldehydharz) wird in einem pflanzlichen Öl, gegebenenfalls unter Zusatz eines bekannten Lacklösungsm. gel. Der so hergestellte Lack kann auch als Isolierlack angewendet werden. (F. P. 600 733 vom 11/10. 1924, ausg. 13/2. 1926.) R.

Maison Breton, Jean Fichot & Cie. und **Georges Louis Auguste Cru**, Frankreich, *Industrieprodukte aus Früchten des Rhamnus*. Man läßt die Extrakte von *Rhamnus infectoria* oder *catharica* mit einer Säure kochen. Man erhält das *Rhamnetin*, das man in der Malerei zur Herst. von *Lacken* mittels Al_2O_3 , SnO_2 usw. mit u. ohne Beizen verwenden kann. (F. P. 598 078 vom 21/8. 1924, ausg. 5/11. 1925.) KAUSCH.

Ernest Bornand, Bern, *Siegellack*. Zu dem Ref. nach Schwz. PP. 107858 109248; S. 1058 ist nachzutragen, daß das Verlöschen des brennenden Siegellacks durch Anordnung des dochtartigen Gebildes aus polymerisierten Aldehyden verhindert wird. (Oe. P. 102 288 vom 30/7. 1924, ausg. 11/1. 1926. Schwz. Prior. vom 8/1. 1923, F. Prior. 6/12. 1923.) RÖHMER.

XV. Gärungsgewerbe.

Dietrich Wiegmann, *Einige Sude mit und ohne Hopfenentlauger*. Die Untersuchungen nach Ausführung u. Ergebnissen besprochen werden, lassen erkennen, daß Bitterstoffe beim Hopfenkochvorgange nur zum Teil in Hartharze übergeführt werden. Was mit dem Reste der Bitterstoffe geschieht, ist unbekannt. Zur Best. der Bitterstoffe (Weichharze) empfiehlt Vf. Bzn. u. erörtert die Vor- u. Nachteile anderer vorgeschlagener Lösungsm. (PAe., CCl_4 , Chlf., Ä.). (Ztschr. f. ges. Brauwesen 41—45.) RÜHLE

Wallace Montgomery, *Alkoholgewinnung aus Melassen*. Vf. verweist auf Verarbeitung von Abfallmelassen auf A. u. bespricht kurz die Vergärung in theoret. u. prakt. Beziehung. (Sugar 28. 107—08.) RÜHLE

Fonzes-Diacon und Laforce, *Die Salicylsäure als Erhaltungsmittel für der Untersuchung unterworfenen Weine*. Die Salicylsäure ist ein ausgezeichnetes Erhaltungsmittel für Weinproben, die zur Unters. dienen sollen, u. es empfiehlt sich ihre Anwendung zu diesem Zwecke sowohl für amtlich entnommene Proben als auch im Handel u. Verkehr. (Ann. des Falsifications 19. 99—102.) RÜHLE

Wüstenfeld, *Der Langbildner der Essigfabrik Gebr. Möllgaard, Kiel*. Bericht über das Ergebnis einer Besichtigung des App. zum Zwecke der Feststellung seiner Einrichtung u. Betriebsweise. (Dtsch. Essigind. 30. 97—99.) RÜHLE

Fr. Schrank, *Die Wärmeverhältnisse der Essigbildner und ihr Einfluß auf die Produktion*. (Vgl. S. 1314.) Aus beliebig gewählten Bildnerabmessungen u. den zuträglichen calorimetr. Daten lassen sich die für die Alkoholverarbeitung wärmetechn.-log. günstigsten Fabrikraumtemp. u. Bildnerformen u. -größen theoret. feststellen (kleines Span-Vol. bei großer Bildneroberfläche). Für *Großraumbildner* ist Vermeidung der schädlichen Wärmestauung eine recht breite, lange, sehr niedrige oder eine sehr schmale, lange, hohe Form am geeignetsten, für Normalbildner in kleineren Regionen (Raumtemp. 15°) 1 qm Grundfläche u. 2 m Höhe.

GRASZMÉ bemängelt einige der zugrunde gelegten Daten u. mißt daher den erhaltenen Zahlen nur eine mehr relative vergleichende Gültigkeit zu. (Dtsch. Essigsäure 30. 61—62. 70—72. Wiesbaden.)

HAHN.

Pouget und Bonnier, *Die Moste algerischer Trauben der Ernte 1925*. Es wurden 10 Proben untersucht, von denen 20 aus dem Departement Constantino, 56 aus Algerien, 35 aus Oran stammten. Die Ergebnisse der Unterss. werden in Tabellen zusammengefaßt gegeben, zusammen mit zweckentsprechenden Angaben über Bodenbeschaffenheit, Art der Weinstöcke, klimat. Verhältnisse, Zustand der Trauben, Umfang der Ernte, Art des Kelterns u. etwaige dabei erfolgte Zusätze. Die Unterss. ergeben, daß die Weine der Ernte 1925 an Güte erheblich hinter den Weinen der Ernten 1922, 1923 u. 1924 zurückblieben. (Ann. des Falsifications 19. 88—99. Alger.)

RÜHLE.

Jules Ventre und Émiles Bouffard, *Zuckereinfluß auf die Ammoniakmenge in Traubenmost*. Vf. suchte die Erscheinung, daß Traubenmost trotz seines Mangels an Ammoniak u. seines Zuckerreichtums eine vorzügliche Gärung zuläßt, zu erklären, indem er zunächst den Einfluß der Zuckerkonz. auf die Absorptionsfähigkeit des Ammoniaks hin untersuchte. Er fand hierbei, daß die Absorption sehr erheblich mit der Zuckerkonz. zunimmt, daß aber ferner nicht alle Zuckerarten in gleicher Weise absorbieren, u. zwar absorbiert *Lävulose* am besten, dagegen *Glucose* am schlechtesten. Die freie Säure, wie die Menge des anwesenden Mg spielt keine Rolle. Das Ammoniak wird in dem Zucker zurückgehalten u. tritt daher in dem Most nicht in Erscheinung. (C. r. l'Acad. des sciences 182. 784—86.)

HAASE.

G. Bonifazi, *Die Bestimmung der Milchsäure im Weine*. Vf. bestimmt die Milchsäure, ohne vorher die Essigsäure abzutreiben, wie es nach dem Verf. von MÖSSNER (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 1901. 1120) geschieht. Nach Neutralisierung mit 25 cem Wein genau mit einer gesätt. Barytlsg., gibt 2,5 cem 1/10 g. BaCl₂-Lsg. zu, ergänzt mit A. von 95° auf 100 cem, schüttelt kurz u. überläßt zur Ruhe. Dann filtriert man, verdampft 80 cem vorsichtig, glüht den Rückstand, wäscht mit 20 cem 1/10-n. HCl auf u. titriert zurück. Man erhält so die Summe Milchsäure + Essigsäure. Diese wird besonders nach dem üblichen Verf. bestimmt; der Unterschied beider Bestst. ist die Milchsäure. Das Verf. hat sich in der Mehrzahl der Fälle bewährt; bei stark geschwefelten Weinen muß man die SO₂ zuvor durch mäßiges Erhitzen auf höchstens 30° u. Hindurchsaugen von Luft vertreiben, was bei 50 cem in z. B. schnell erledigt ist. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 17. 9—14. Lausanne.)

RÜHLE.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Raoul Lecoq, *Die Untersuchung der vitaminhaltigen Erzeugnisse des Handels*. Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse der Vitamine gestattet noch nicht eine verbindliche Regelung des Handels mit vitaminhaltigen Erzeugnissen, wie sie RANDOIN in des Falsifications 18. 325; C. 1925. II. 1819) u. andere nach Verff. befürworten, die mehr theoret. als prakt. anwendbar sind. Das einzige, was jetzt geschehen könnte, wäre, der mißbräuchlichen Verwendung des Ausdrucks „vitaminhaltig“ entgegenzutreten. (Ann. des Falsifications 19. 76—79.)

RÜHLE.

H. P. Averill und **C. G. King**, *Der Phytin Gehalt von Nährstoffen*. Der Phytin Gehalt von 57 Nährstoffen (verschiedene Gersten-, Hafer-, Roggen-, Weizensorten, Hanf-, Hirse-, Rapssamen, Sojabohnen u. Nüsse) wurde nach der titrimetr. Methode von HEUBNER u. STADLER (Biochem. Ztschr. **64**. 422; C. **1914**. II. 590) untersucht. 2%ig. Salzsäure erwies sich am geeignetsten zur Extraktion. Die gefundenen Werte liegen zwischen 0,68 u. 3,33% Phytin u. sind in einer Tabelle angegeben. — Durch 2-std. Erhitzen auf 105° im elektr. Ofen, durch 1/2-std. Behandlung mit Wasserdampf u. längere Einw. von Feuchtigkeit wurde das Phytin teilweise zers. — Aus Weizenkle extrahiertes Phytin wurde nach der Methode von ANDERSON (Journ. Biol. Chem. **44**. 429; C. **1921**. I. 456) gereinigt u. der Reinheitsgrad nach den verschiedenen Fällungen bestimmt; das gereinigte Prod. enthielt schließlich 99% Phytin. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 724—28. Pittsburgh, Univ.) WINKELMANN.

C. F. Muttelet, *Siebung und Reife eingemachter Erbsen*. Vf. schließt sich den Folgerungen, die LASAUSSE (S. 2633) aus seinen Arbeiten zieht, an; diese hätten aber auch schon a priori abgeleitet werden können, wie Vf. zeigt. (Ann. des Falsifications **19**. 74—76.) RÜHLE.

M. Rakusin und **Galina Pekarskaja**, *Über das Legumin der Hülsenfrüchte*. Das Legumin entspricht in seinen Haupteigenschaften dem Casein der Milch, daher die Bezeichnung Pflanzencasein zutreffend: Es enthält wie Casein P, gibt dieselbe N- u. Kohlenhydratrk., weist dieselben opt. Eigenschaften u. Löslichkeitsverhältnis auf u. bildet mit NH₃ u. Alkalien wasserlösliche Leguminate von demselben Drehsinn; schließlich wird es wie Casein durch verd. Säuren gefällt u. dargestellt. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel **51**. 43—45. Moskau.) GROSZFELD.

M. Rakusin und **B. Maschkileisson**, *Über das Legumin der süßen Mandel*. Aus dem Auszuge mit NaOH wurde das Legumin mit 5%ig. Essigsäure abgeschieden. $[\alpha]_D$ der Lsg. in Pepsin-HCl = -42,9°. Die Leguminate wurden ebenso wie Caseinate aber durch Erhitzen in der Druckflasche, dargestellt. Ebenso wie bei den Leguminaten der Hülsenfrüchte dreht das NH₄-Salz ($[\alpha]_D$ = -64°) stärker als das Legumin selbst die Li-, Na- u. K-Salze dagegen infolge von Racemisierung schwächer (-34 bis -42,5). Das von RITTHAUSEN 1869 dargestellte *Amandin* ist wahrscheinlich auch Mandellegumin gewesen. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel **51**. 45—47. Moskau.) GROSZFELD.

J. Ruffy, *Nachweis von Cocosfett in Kakaobutter und in Schokolade*. Es wird hier die Best. der „Übergangszahl“ nach HÄRTEL u. MARANIS (Ztschr. f. Unters. Nahrung u. Genußmittel **47**. 205; C. **1924**. II. 1139) empfohlen. Vf. verfährt danach darauf, daß er nach der Verseifung mit 4 ccm Glycerin u. 2 ccm KOH (1:1) destilliert und bei Best. der Reichert-Meißschen Zahl, dann die 110 ccm Destillat in einen 300 ccm Kolben filtriert unter Nachspülen des 110 ccm-Kolbens, dann 15 Min. am Rückflußkühler sd. (CO₂) u. titriert. Dann säuert man die titrierte Fl. leicht an, ergänzt auf 200 ccm u. destilliert wieder 100 ccm ab, man titriert das Destillat (B) u. bildet die Übergangszahl 100 B/(R—M); diese darf bei Kakaobutter u. Schokolade ohne Milchzusatz nicht höher als 60 sein, bei Milchsokolade nicht höher als 80. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. **17**. 15—19.) RÜHLE.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

H. B. Shroff, *Die Seidenindustrie von Benares*. Die verschiedenen Seidenstoffe, die Herrichtung u. das Färben der Seide durch die Weber, die Herst. der goldenen oder silbernen Effektfäden u. die Arbeit der eingeborenen Färber ist beschrieben. (Ind. Textil Journ. **36**. 145—46.) SÜVERN.

A. D. Merrill, *Bleichen bei hoher Dichte*. Als vorteilhaft wird eine Dichte von 12—14% hingestellt. Bei im übrigen gleichen Bedingungen wurde ein Unterseiden-

Verbrauch an Bleichmittel oder in den wesentlichen Eigenschaften des gebleichten
ffs bei Dichten zwischen 12 u. 17% nicht festgestellt. (Paper Trade Journ. **82**.
8. 161—62. Paper Industry **7**. 2025—27.) SÜVERN.

Ogden Minton, *Thermodynamischer Vergleich von Papiertrocknungsmethoden*. Die
rmodynam. Verhältnisse bei verschiedenen Papiertrocknern werden untersucht.
per Trade Journ. **82**. No. 8. 152—57.) SÜVERN.

J. D. Rue und **W. Mousson**, *Ein neues Kochverfahren zur Gewinnung von Stroh-
ype aus Stroh*. Ein Aufschließungsverf. mit Na_2CO_3 u. Na_2SO_3 ist beschrieben, als
stigstes Chemikalienverhältnis wird 7,5 lb Na_2CO_3 u. 1,5 lb Na_2SO_3 auf 100 lb Stroh
gegeben. Im Vergleich mit dem Kalkaufschluß gibt das Verf. ein weniger riechendes
zeugnis bei größerer Ausbeute u. besseren physikal. Eigenschaften, das weniger
he enthält u. größere Widerstandsfähigkeit gegen 1%ig. NaOH zeigt. (Papierfabr.
Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 169—72. Nach Paper Trade
rn. **81**. Nr. 15. 52—53. u. Nr. 20. 49.) SÜVERN.

C. de Neyman, *Kleine Laboratoriumsversuche*. Zur Gewinnung von pulverförmiger
lulose scheint sich eine Kochung bei 100° mit H_2SO_4 von 7—10° Bé am besten
eignen. Bei der Einw. von Cl_2 auf Cellulose tritt nicht nur Hydrolyse, sondern
h B. von chlorierter Hydrocellulose ein, die ein vorzüglicher Rohstoff zur Darst.
i Celluloseacetat ist; Angabe einiger Verf. zu deren Bereitung. (Chimie et Industrie
349—52.) GROSZFELD.

E. Belani, *Vorschläge zum Bau einer modernen Sulfite-Zellstoff-Fabrik*. Die neuesten
richtungen werden besprochen, für das Kocherfüllverf. Bauart „Fresk“ werden
riebsergebnisse mitgeteilt. (Papierfabr. **24**. Verein der Zellstoff- u. Papier-Che-
ker u. -Ingenieure 173—77. Villach.) SÜVERN.

William Cauldwell Munro, *Einrichtung einer modernen Natronzellstofffabrik*.
Holzbearbeitung, Herst. der Kochlauge u. ihre Kaustizierung, das Kochen u.
schen, das Aufarbeiten der Schwarzlauge u. das Bleichen, wie es bei der T o n a n -
n d a P a p e r C o m p a n y ausgeführt wird, ist beschrieben. (Paper Industry **7**.
9—71.) SÜVERN.

E. P. Wood, *Eine moderne Natronzellstofffabrik*. (Vgl. W. C. MUNRO, vorst. Ref.)
per Trade Journ. **82**. Nr. 8. 147—50.) SÜVERN.

D. E. Cable, **R. H. McKee** und **R. H. Simmons**, *Apparate und Methoden zur
perimentellen Untersuchung der Herstellung von Natronzellstoff*. Eine Holzzerklei-
ungsvorrichtung, die Stücke gleicher Länge liefert, ein umlaufender Digestor mit
sbeheizung u. die mittels dieser Vorrichtungen erzielten Ausbeuten sind beschrieben.
per Trade Journ. **82**. No. 8. 158—61.) SÜVERN.

C. L. Wagner, *Ortsfester Wiedergewinnungssofen Wagner für Natron- und Sulfat-
uloseanlagen*. Die Vorteile eines stehenden Ofens vor Drehöfen u. Eindampfanlagen
den erörtert. Der Ofen wird mit Öl, Gas oder Holz angeheizt, ist der F. des Na_2CO_3
eicht, so wird die aufzuarbeitende Lauge vorgewärmt eingespritzt. Die in der oberen
nzone entwickelten Gase entzünden sich, die Ölzufuhr wird dann abgestellt, die
hle verbrennt, wenn sie unten angelangt ist, geschmolzenes Na_2CO_3 läuft in die
ungsgefäße ab. (Paper Trade Journ. **82**. No. 8. 177—79.) SÜVERN.

W. A. Taylor, *Die Anwendung der Wasserstoffionenkontrolle bei der Herstellung
Zellstoff und Papier*. Die Wichtigkeit einer genauen pH-Best. für alle Teile der
ierherst. wird dargetan, die auszuführenden Unterss. werden theoret. erläutert u.
ter beschrieben. (Paper Trade Journ. **82**. No. 8. 166—77. Paper Industry **7**. 1983
1991.) SÜVERN.

M. L. Griffin, *Die Kupferzahl ein Exponent für die Beschaffenheit der Cellulose*.
Methode von BRAIDY mit CuSO_4 , NaHCO_3 u. Na_2CO_3 ist vorteilhafter als das
eiten mit Fehlingscher Lsg. Einzelheiten für die Ausführung der Best. werden
geteilt. (Paper Trade Journ. **82**. No. 8. 150—51.) SÜVERN.

F. Kiefer, *Über die Betriebskontrolle im Rohcelluloidbetrieb.* (Kautschuk 1926 73—74.) EVERS.

Abel Caille, *Merkwürdige Eigenschaften der Schwefelsäureester der Cellulose.* Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Forschern, die das starke Anfärben von Celluloseestern der Anwesenheit von Oxycellulose zuschreiben, glaubt Vf. die Ursache in der Vorhandensein von Schwefelsäureestern gefunden zu haben. Er findet, daß *Sulfoxycellulose*, *Sulfonitro-* u. *Sulfoacetylcellulose* von bas. Farbstoffen, wie *Methylenblau*, *Rhodamin*, *Methylviolett* u. *Malachitgrün* im Gegensatz zu unveränderter Cellulose stark angefärbt wird, dagegen nicht von saueren. In quantitativen Verss. zeigt Vf. daß sowohl bei den Nitro- wie bei den Acetylcellulosen die Farbstoffaufnahme mit dem Schwefelgehalt steigt, jedoch nicht proportional, woraus hervorgeht, daß die Färbung kein chem. Vorgang ist. Bei der sog. stabilisierten Cellulose, die frei von Sulfogruppen ist, ist die Farbstoffaufnahme viel geringer. Vf. schließt daraus, daß man dies bei der Best. von Oxycellulose mit Methylenblau berücksichtigen muß und daß die Sulfogruppen in der Nitrat- u. Acetylcellulose eine wichtige Rolle bei der Färbung spielen, die man mit dem Gehalt an Sulfogruppen variieren kann. (Chimie et Industrie 15. 189—92.) BRAUNS.

F. T. Carson, *Eine kleine Untersuchungskammer mit konstantem Feuchtigkeitsgehalt.* Die Einrichtung einer solchen Kammer ist beschrieben, die Vorteile beim Arbeiten in ihr für genaue Papierunterss., besonders Falzbarkeitsprüfungen, verdeutlicht. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 231—37.) SÜVERN.

A. R. Harvey, *Automatische Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts.* Die zu prüfende Papierbahn geht über eine Rolle, die in der Mitte elektr. beheizt wird. Ihre Temperatur ist eine Funktion des Feuchtigkeitsgehalts der Papierbahn. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 227—29. Paper Industry 7. 2009—11.) SÜVERN.

Th. Bentzen, *Wertung von Sulfizellstoff.* Angaben über die Best. von α -, β - u. γ -Cellulose. Cellulosezers.-Prodd. finden sich bereits in der natürlichen Cellulose der größte Teil davon wird aber bei der Verarbeitung gebildet. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 197—203. Paper Industry 7. 2003—05.) SÜVERN.

John L. Parsons, *Die Wichtigkeit der Alpha-Cellulosebestimmung für die Zellstoffindustrie.* Es wird erörtert, welche Umstände bei den bekannten Methoden zur Best. der α -Cellulose zu abweichenden Ergebnissen führen können. Eine Abänderung der JENTGENschen Methode wird beschrieben, die bei verschiedenen Zellstoffproben durchschnittliche Abweichungen von 0,13, bei gereinigten Baumwollen von 0,04 im α -Cellulosegehalt ergab. Die chem. Zus. der Sulfizellulose wird besprochen. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 211—15. Paper Industry 7. 2019—23.) SÜVERN.

J. A. H. Itier, Lyons, *Behandeln von Fasern mit Fll. zwecks Degummierung.* Bleichung, Waschung, Spülung oder Färbung unter vorheriger Evakuierung. (E. P. 247 975 vom 18/2. 1926, Auszug veröff. 21/4. 1926. Prior. 18/2. 1925.) KAUSCH.

Victor Roche, Frankreich, *Biologisches Röstverfahren von Pflanzenfasern.* Kurz Ref. nach E. P. 239 161; S. 794. Nachzutragen ist folgendes: Zur Herst. der Bakterienkulturen kocht man die zerteilte Pflanze lange Zeit u. benutzt die dabei erhaltenen Lsgg. der l. Bestandteile der Pflanzen u. ihrer Gummiarten. Diese Lsgg. werden durch Kohle filtriert. (F. P. 602 362 vom 28/8. 1924, ausg. 17/3. 1926.) KAUSCH.

Charles Jaloux, Iles Baléares, *Reinigung und Extraktion der in den Wollschuwwässern enthaltenen Pottasche.* Diese Fll. werden method. dekantiert, filtriert, zentrifugieren gelassen u. an der Luft unter Wrkg. der Sonnenstrahlen eingedampft. (F. P. 602 659 vom 1/12. 1924, ausg. 24/3. 1926.) KAUSCH.

Charles Jaloux, Iles Baléares, *Gewinnung des Schweißes und Fettes aus der Schurwolle.* Die Wollflöße werden über ein Gewebe gespannt u. mit diesem in einen Gewebesack eingerollt, dann in einen Behälter mit bewegtem, zirkulierenden W. gebracht.

- n läßt man die Fließe trocknen u. führt sie in ihre ursprüngliche Gestalt zurück.
P. 602 660 vom 1/12. 1924, ausg. 24/3. 1926.) KAUSCH.
- Judson A. de Cew**, Mount Vernon, New York, *Behandlung von Cellulosefasern bei Papierbereitung*. Die Cellulose wird vor der Leimung in einem Holländer o. dgl. Einw. von k., NaOH oder KOH gelöst enthaltendem W. unterworfen. (**A. P. 8 405** vom 20/1. 1925, ausg. 30/3. 1926.) OELKER.
- Henry Dreyfus**, England, *Lösungen für die Textilindustrie*, bestehend aus einem mehreren Salzen oder Seifen von Harzsäuren oder dgl. (z. B. Ca-, Mg-, Zn-, Al-gl.-Salze, Naphthensäuren) u. Ölen, Fetten, Wachsen, fl. Fettsäuren. Die Prodd. en zum *Leimen von Textilstoffen*. (**F. P. 599 127** vom 5/6. 1925, ausg. 5/1. 1926. Prior. 27/6. 1924.) KAUSCH.
- Henry Dreyfus**, England, *Lösungen für die Textilindustrie*, bestehend aus einem mehreren Fetten, Ölen, Wachsen, fl. oder festen Fettsäuren u. Dammar-, Mastix-einem anderen Harz. Sie dienen zum Leimen von Fäden o. dgl. (**F. P. 599 128** 5/6. 1925, ausg. 5/1. 1926. E. Prior. 27/6. 1924.) KAUSCH.
- Maison Breton, Jean Fichot & Cie. Successeurs und Société de Recherches le Perfectionnements Industriels**, Frankreich (Seine), *Färben von stärke- oder losehaltigen Produkten*. Die Ausgangsprodukte, wie Stärke, Mehl, Papierstoff gl. oder deren Mischungen werden in eine wss., den Farbstoff in Lsg. oder Suspension altende Fl., welcher man ein Beizmittel zugesetzt hat, eingetaucht. Anstatt dem bad das Beizmittel hinzuzufügen, kann man auch die Ausgangsstoffe vor dem en mit einer Beize behandeln. (**F. P. 596 801** vom 28/7. 1924, ausg. 2/11. 1925.) OE.
- Valdemar Willemoes d'Orby**, Godesberg, Rheinland, *Herstellung von ungebleichtem ier, Pappe u. dgl.* Gräser, Schilf, Getreidehalme u. dgl. werden im trockenen Zu-de unter Druck gedämpft u. dann in Ggw. von W. in geeigneten Maschinen in rn zerlegt. Der so erhaltene Faserbrei wird direkt auf der Papiermaschine zu Papier, e usw. verarbeitet. (**Aust. P. 19 067** vom 11/8. 1924, ausg. 5/2. 1925.) OELKER.
- L. E. Granton**, London, *Gewinnung von Papierstoff aus Abfallpapier*. Der Abfall, hen man bei der Entfernung der Druckerschwärze aus Zeitungspapier erhält, mit Sulfitzellstoff o. dgl. vermischt u. dann zur Herst. von Packpapier u. dgl. lertwertigen Papieren benutzt. (**E. P. 240 924** vom 10/7. 1924, ausg. 5/11.) OELKER.
- Karl Sveen**, Norwegen, *Agglomeration der festen Bestandteile in der Papier-e*. Man verleiht der M. eine Beize ($\text{Al}_2[\text{SO}_4]_3$) u. sodann ein Kolloid (Leimlsg.) (**F. P. 600 932** vom 20/7. 1925, ausg. 18/2. 1926. N. Prior. 21/7. 1924.) KA.
- Carl G. Schwalbe**, Eberswalde, *Aufarbeitung von Sulfitzellstoffablauge*, dad. gek., man die n. oder eingedickte Sulfitablauge mit Salzen, wie MgCl_2 , CaCl_2 , NaCl gl. vermischt u. unter Druck auf Temp. zwischen 150 u. 200° erhitzt. — Neben Sulfitablauge kann man Salzlgg., wie z. B. Kaliendlauge oder eingedampftes wasser verwenden; ferner kann man diesem Gemenge Abfälle pflanzlichen Materials, Holzabfälle, Sägemehl, Stroh etc. zwecks leichter Filtration beimischen. — organ. Substanz scheidet sich in Form feingepulverter Kohle aus der Lauge ab ann nach dem Trocknen zur Staubfeuerung unter Dampfesseln verwendet werden. Salzlg. wird nach dem Filtrieren durch Verdampfung auf die ursprüngliche zentration gebracht. (**D. R. P. 414 772** Kl. 55 b vom 7/11. 1923, ausg. 30/3.) OELKER.
- Aktiengesellschaft für Zellstoff- und Papierfabrikation und Max Stein-leider**, Aschaffenburg, *Verwertung von Sulfitablauge* auf S, H_2S bzw. organ. erb. u. KW-stoffe, dad. gek., daß die Ablauge in einer H_2 -Atm. mit oder ohne k auf höhere Temp. erhitzt wird. (**D. R. P. 427 540** Kl. 12i vom 7/11. 1924, . 9/4. 1926.) KAUSCH.

J. Brandwood, Southport, Lancashire, *Imprägnieren von Zellstoff*. Der hier verwendete App. besteht aus einem Troge, durch den der Zellstoff hindurchgeleitet wird, u. einer Presse, über die das Förderband läuft u. einer Preßplatte. Der Zellstoff wird in diesem App. mit Fl. imprägniert, ohne das an dem Troge Handgriffe vorgenommen werden. (E. P. 247 307 vom 16/8. 1924, ausg. 11/3. 1926.) KAUSCH

Valdemar Willemoes d'Orby, Godesberg, Rheinland, *Halbstoff für die Herstellung von Cellulose*. Gräser, Schilf u. ähnliche Pflanzen werden im frischen Zustande chemisch-mechan. Behandlung in gewöhnlichem W. in Rohfasern zerlegt. Nach dem Waschen mischt man diese Fasern mit einer sterilisierend wirkenden Substanz u. preßt sie dann zu Ballen o. dgl. zusammen. (Aust. P. 19 068 vom 11/8. 1924, ausg. 5/2. 1925.) O

William Mendel, Beverly, N. J., *Fäden und Filme aus Viscose*. Man entfeuchtet S u. seine Verbb. aus den Fäden usw., indem man diese der Einw. von Na_3PO_4 aussetzt. (A. P. 1 576 529 vom 29/4. 1925, ausg. 16/3. 1926.) KAUSCH

William Mendel, Beverly, N. J., *Fäden und Filme aus Viscose*. Die Viscose wird mit einem Fällbad gefällt, das ein saures Salz enthält. Alsdann werden die Prodd. mit Na_3PO_4 behandelt. (A. P. 1 576 530 vom 29/4. 1925, ausg. 16/3. 1926.) KAUSCH

William Mendel, Beverly, N. J., *Fäden und Filme aus Viscose*. Die Viscose wird durch Hitze gefällt u. alsdann der Einw. von Na_3PO_4 u. wss. Lsg. ausgesetzt. (A. P. 1 576 531 vom 29/4. 1925, ausg. 16/3. 1926.) KAUSCH

Pathé Cinema anc. Établissements Pathé Frères, Paris, *Kunstfäden, Filme u. Kunstseide*. Man koaguliert Celluloseester oder -äther, die in organ. Lösungsmitteln gel. sind, mit einem wss. Fällmittelbades, trocknet gegebenenfalls die koagulierten Fäden usw. unterwirft sie sodann der begrenzten Behandlung mit einem Lösungsmittel für die Cellulose-derivate in fl. oder Gasform, wodurch sie aus dem opaken in den transparenten Zustand übergehen. (E. P. 247 974 vom 18/2. 1926, Auszug veröff. 21/4. 1926. Prior. 2/12. 1925.) KAUSCH

Silver Springs Bleaching & Dyeing Co., Ltd., und **A. J. Hall**, Congleton, Cheshire, *Kunstseide und Filme*. Den Glanz von Textilstoffen, Filmen u. dgl. Produkten, die ganz oder teilweise aus Celluloseacetat bestehen, werden konserviert in Bleifarben, Druckverfärbungen u. gedämpft bei über 85° in Ggw. einer Lsg. eines Schutzsalzes (Alkali-, Ammonium- u. Erdalkalisalze). (E. P. 246 879 vom 31/7. 1924, ausg. 1926.) KAUSCH

Henri Lumière, Frankreich, *Kunstseide aus Cellulosexanthat*. Man verwendet als Fällmittel für die Cellulose aus den Xanthogenatslsgg. NaHCO_3 , gegebenenfalls gleichzeitig mit Neutralsalzen [Na_2SO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, MgSO_4]. (F. P. 602 711 vom 13/12. 1924, ausg. 25/3. 1926.) KAUSCH

Société Chimique des Usines du Rhône, Paris, übert. von: **Jean Altmann** und **Édouard Fau Chermette**, Lyon, Frankreich, *Herstellung von Kondensationsprodukten aus aliphatisch-aromatischen Ketonen und mehrwertigen Alkoholen*. Man läßt aliphat.-aromat. Ketone auf mehrwertige Alkohole in Ggw. von mit geringen Mengen einer Mineralsäure versetzten prim. Alkoholen einwirken. — Z. B. gibt man unter Eiskühlung zu einem Gemisch von Glycerin, A. u. etwas H_2SO_4 bezw. Glycerin, CH_3OH u. gasförmiger HCl , Acetophenon, läßt 24 bezw. 12 Stdn. bei —5° bis —10° stehen, neutralisiert gegebenenfalls mit Na_2CO_3 , dest. unter gewöhnlichem Druck den A. bezw. CH_3OH u. dann im Vakuum das überschüssige Acetophenon ab, beläßt den Rückstand durch Auswaschen mit W. von etwas Glycerin u. rektifiziert unter vermindertem Druck. Das Acetophenonglycerin, Kp.₅ 134°, D.₁₅ 1,159, ist ein visköses Öl. — Das aus Glycerin u. Propiophenon analog erhaltliche Propiophenonglycerin, D.₁₅ 1,1255, sd. unter 5 mm Druck bei 140°. — Durch Einw. von Äthylenglykol, $\text{CH}_2(\text{OH})_2$, u. gasförmiger HCl bei 15° auf Acetophenon entsteht das Acetophenonglykol, aus dem Nadeln, F. 62°, Kp.₄₀ 130°. — Das aus Glycerinmonochlorhydrin u. Acetophenon gewonnene Acetophenonmonochlorhydrin ist eine sirupartige Fl., Kp.₄₀ 153—153,3°.

h 2-n. HCl bei 60° in *Acetophenon* u. *Monochlorhydrin* gespalten wird. Die sedative schwach hypnot. Wrkg. besitzenden Prodd. finden einerseits *therapeut.* Verwendung, andererseits dienen sie als Lösungsm. für viele organ. Verbb., sowie als *Weichmachungs-*mittel für *Fäden, Filme* oder *plast. MM.* aus *Celluloseestern.* In den meisten organ. Lösungsm., wie Ä., Bzl. u. dessen Homologen, sind sie l., in W. unl. (A. P. 1 572 176 19/3. 1924, ausg. 9/2. 1926. F. P. 589 731 vom 7/2. 1924, ausg. 4/6. 1925.) SCHOT.

K. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

Geoffrey Weyman, *Prüfung und Bewertung von Kohlen für Verkokungszwecke.* (S. 2988.) Art u. Weise der Bewertung der Kohlen auf Grund der in der kleinen Versuchsanlage erzielten Ergebnisse, Ermittlung eines Roh- u. Feinwertes, sowie des Ertragsfaktors, Einfluß des Feuchtigkeits- u. Aschegehalts sowie der Verkokungsgeschwindigkeit, Beurteilung der Ergebnisse auf Grund der Zusammenstellung. (Gas. 1. 173. 746—47.) WOLFFRAM.

Robert Fodermayer, *Über die Verflüssigung der Steinkohle durch Druckhydrierung.* Berechnung der im Schrifttum bekanntgegebenen Laboratoriumsverff. zur Umwandlung der ungesätt., zur Verharzung neigenden KW-stoffe der Crackbzn. in t. durch Anlagerung von H₂ mittels Kontaktsubstanzen bzw. zu gleichzeitiger Verflüssigung der hochmolekularen Verbb., Einfluß von Druck u. Temp. auf die Hydrierung, Anwendung der entsprechenden Rkk. zur Verflüssigung der Kohle unter Beihilfe eines Suspensionsmittels durch BERGIUS, der Arbeitsbedingungen u. Ergebnisse, der Verss. von FISCHER-Mülheim a. Rh. u. BUNTE in dieser Richtung. — Tabelle über bisher erprobten techn. Verff. für Verwertung der Kohle zur Gas- u. Ölgewinnung, die dabei erzielten Erzeugnisse aus 100 kg: Entgasung von Steinkohle, bei Hochdruck (mit Bzl.-Wäsche, W.- u. Generatorgaszusatz), Gaserzeugung mit Urteerung aus Steinkohle u. Braunkohle in der Drehtrommel u. bei restloser Verwertung, Verf. von BERGIUS allein u. kombiniert nach BUNTE. (Ztschr. Ver. Gas- u. K. Fachmänner Ost. 66. 41—49.) WOLFFRAM.

N. Gawrilow, *Über die neuen Errungenschaften in der Technik der Brennstoffdestillation bei tiefen Temperaturen in Deutschland.* (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 1935.) BIKERMAN.

G. Stadnikow, N. Gawrilow und W. Rakowski, *Befreiung der Kresole und sauren Fraktionen von darin befindlichen Schwefelverbindungen.* (Vgl. S. 3111.) Man nutzt die große Geschwindigkeit der Kondensation von *Thiokresolen* mit Aldehyden, verglichen mit der von Kresolen, aus. 100 g *Rohkresol* wird mit 1 g Formalin (40%ig. wss. Formylslsg.) u. 1 g *Naphthensulfosäuren* (als Kondensationsmittel) 12—15 Stdn. lang in geschlossenen Gefäß erhitzt (120—130°); bei der darauffolgenden Vakuumdest. dem Ölbad nicht über 140—150° erhält man ca. 85 g Destillat mit 0,02% (Kresol dem Steinkohlenteer, 2,25% Schwefelgehalt) bzw. 0,03% (Phenolfraktion des Teers, 0,34% S) Schwefel. Formaldehyd kann durch Glucose ersetzt werden, die zum des Kartoffelsirups gebraucht wird. Vorschrift: man vermischt 3 Teile *Kartoffelsirup* u. 1 Teil *Naphthensulfosäuren* mit 4 Teilen *Rohkresol* u. läßt das Gemisch 10 Teilen 120° h. *Rohkresols* eintropfen; dann wird unter vermindertem Druck dest. Das Destillat enthält 0,01% (Kresol aus dem Steinkohlenteer) bzw. 0,002% (Phenolfraktion) S. Dagegen gelingt das Entfernen von S aus dem Kresol oder dem Teeröl des Braunkohlenteers nicht, weil die Destillate des Braunkohlenteers viel mehr S-Verbb. enthalten, die nicht nur selbst mit Aldehyden nicht reagieren, sondern auch das Reagieren der Thiokresole erschweren. Aus einem Gemisch gleicher Teile *Rohkresol* u. leichtem Öl wird nach dem Verf. weniger S entfernt als aus dem *Rohkresol* des Gemischs allein. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 315—19. Moskau.) BKM.

C. B. Tully, *Gleichzeitige Erzeugung von billigem Gas und Elektrizität.* Beschreibung einer Anlage von TULLY u. YEO, bestehend aus einer Vertikalretorte u. einem direkt

darunter befindlichen Wassergasgenerator oder drei solchen, jeder in direkter Verbindung mit der Retorte, einem Karburator u. Abhitzekeßel. Die Wärme des im Generator erzeugten Wassergases entgast direkt u. indirekt durch die umgebenden schachbrettartig ausgeführten Heizkammern die Kohle in der Retorte, der Koks gelangt dann in die Generatoren, das erzeugte Mischgas wird carburiert u. dient einmal durch seine Eigenwärme u. weiter durch Verbrennung eines gewissen Anteils zur Erzeugung von Dampf, mittels dessen dann Elektrizität hergestellt wird. Es handelt sich also um eine Art restloser Vergasung, die nach Ansicht der Erfinder das von LEWES vorgestellte Verkokungsideal verwirklicht. (Gas Journ. 173. 751—52.) WOLFFRA

L. Fokin, *Kreisprozeß zum Auffangen des Ammoniaks aus den Koksofengasen*. Statt das NH_3 durch immer neues W. zu absorbieren, das dann mit Kalkmilch geklärt werden muß, läßt Vf. eine u. dieselbe M. dest. W. in Skrubbern das NH_3 auffangen, es in einer Destillationskolonne abgeben, wieder in Skrubbern herabrieseln usw. Durch diese Vorrichtung wird die Verunreinigung der Skrubber durch Kalk u. Magnesia aus dem wendenden W. u. die der Destillationskolonne durch Kalk aus der Kalkmilch vermindert, die Entstehung lästiger Abwässer beseitigt, die Einführung von Wärmerekuperatoren ermöglicht u. der Kalk gespart. — Mit dem W. aus den Skrubbern wird durch die Destillationskolonne auch das Gaswasser durchgeleitet; außerdem wird die Leuchte der Destillationskolonne durch den Heizdampf verd. ; das mit NH_3 zugleich abdestillierende W. kann dem dadurch bewirkten Flüssigkeitszuwachs bei weitem nicht Genüge gewährt werden. Die überschüssige Fl., die 0,2—0,5% NH_3 (meist als Sulfat) enthält, wird zur Befeuchtung der Kohle in Koksöfen verwendet, so daß darin befindliches NH_3 nicht verlorengeht; die Vollständigkeit seiner Ausnutzung ist aber nicht untersucht worden u. wird es bei den Kalkulationen nicht berücksichtigt. Das die Skrubber umspülende W. des Kreisprozesses, welches „fixe“ NH_4 -Salze enthält, absorbiert jedenfalls nicht schwächer als das frische W. bei dem üblichen Verf. Zum „fixen“ NH_3 gehört allerdings nur das an H_2SO_4 gebundene, weil NH_4Cl sich als flüchtig bei Wasserdämpfen erwies. Da das aus der Destillationskolonne abgehende h. W. in festen Teilchen mitträgt, kann es durch ein Röhrenrekuperator geleitet werden, so es die aus den Skrubbern kommende Fl. vorerwärmt. — Das Verf. wurde (mit **E. L.**) in mehreren Kokereien seit Frühjahr 1925 durchgeführt. Die NH_3 -Ausbeute betrug von ca. 0,14% (auf trockene Kohle bezogen) auf 0,21%; der Selbstkostenpreis für NH_3 nahm um ca. 20—30% ab. Die jährliche Produktion der nach dem neuen Verfahren arbeitenden Kokereien: ca. 3000 Tonnen NH_3 . (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 1925. 319—29.) BIKERM.

Gareis, *Erfahrungen mit der Benzolgewinnung im Vakuumverfahren*. In der Zeichnung des Vakuumverf. zur Gewinnung von Bzl. nach RASCHIG u. der dabei bedingten wesentlichen Ersparnis an Dampf, W. u. Öl; Vers.-Ergebnisse u. Vergleich mit anderen Anlagen, Aufstellung, Auswaschung des Naphthalins u. Reinigung des Benzols. (Gas- u. Wasserfach 69. 269—72. Elberfeld.) WOLFFRA

F. C. Gaisser und **H. Bader**, *Über württembergische Ölschiefer*. II. (I. vgl. C. Ztg. 45. 837; C. 1921. IV. 1022.) An Stelle des Aufschlusses im Autoklaven ermöglicht die Behandlung mit schmelzendem NaOH eine einfache Best. der organ. Substanz im Ölschiefer mit befriedigendem Ergebnis (Tabelle von 8 Bestst. mit Gesamtanalysen im Original). Nach den Ergebnissen ist Ölschiefer als Sapropelith aufzufassen, die Bezeichnung „bituminöser Schiefer“ nicht zutreffend. Bei der Schwelung im Fischer'schen App. wurde die größte Ausbeute an Teer erzielt, annähernd gleichviel bei raschen Erhitzen in eiserner Retorte, bei langsamem Erhitzen etwas weniger. Vakuumdest. in einer Glasretorte ergab geringste Ausbeute. Die Verschwelung nach dem Aufschluß gibt wärmetechn. bessere Resultate. Vf. teilt die Ergebnisse der Untersuchung des Schwelwassers mit. Die Gewinnung des NH_3 als $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ würde die Rentabilität der Ölschieferverwertung erhöhen. (Chem.-Ztg. 50. 277—80. Stuttgart.) JU

Richard v. Dallwitz-Wegner, *Das Schmierungsproblem vom thermodynamischen Standpunkt und die Messung der Schmierergiebigkeit*. (Vgl. Ztschr. f. Physik 6. 221; C. 1925. II. 2038.) Es wird gezeigt, daß auf der Materie relativ Kohäsionsdrucke K_{at} lasten, deren Größe für den Aggregatzustand der Materie ebend ist. Der Kohäsionsdruck von etwa 35 000—45 000 at ist die Grenze zwischen dem fl. u. festen Aggregatzustand. Die Schmiermetalle haben einen Kohäsionsdruck von einigen 100 000 at, während der Kohäsionsdruck der Schmiermittel 300—400 at beträgt. Durch die molekulare Anziehung wird in der Schmiermittel aus dem Kohäsionsdruck der Schmiermittel ein Benetzungsdruck K_b at erzeugt u. im allgemeinen gibt der „Kosinus des Randwinkels“ an, welcher Betrag Kohäsionsdruckes K in den molekularen Benetzungsdruck K_b umgewandelt ist. Randwinkel ist der Winkel, den das Schmiermittel ausbildet, wenn es gegen geschmierte Metall frei ansteht u. es ist $K_b : K = \cos \Theta$, wenn Θ den Randwinkel bedeutet. Der $\cos \Theta$ ist also der Wirkungsgrad des Schmiermittels in bezug auf die Schmierwirkung. Denn von dem Benetzungsdruck K_b , der einige hundert at beträgt, ist die Schmierergiebigkeit des Schmiermittels u. auch die Schmierreibung abhängig ist aber auch das geschmierte Metall von Einfluß. Es wird eine Maschine angegeben, mit der man diese Verhältnisse prakt. demonstrieren kann. Will man einem Schmiermittel Viscosität „machen“, so muß man die Wirkungssphäre λ seiner Moleküle vergrößern, was nach der Gleichung $\lambda = 3\alpha : K$ durch Vergrößerung der Oberflächenspannung α oder Verkleinerung des Kohäsionsdruckes K geschehen kann. Vergrößerung der Oberflächenspannung wirkt anscheinend ungünstig. Die Teerarten besitzen z. B. eine relativ große Oberflächenspannung, sind aber keine sehr guten Schmiermittel (Randwinkel relativ klein). Man muß demnach K verkleinern, λ groß zu bekommen. (Kolloid-Ztschr. 38. 193—208. Heidelberg-Neckarland.)

LASCH.

Ad. Rabanus, *Bemerkungen über neuzeitliche Holzimprägnierung mit wasserlöslichen Salzen*. Einige Verss. mit dem von BASILIUS MALENKOVIC gefundenen Präparat, anfänglich Bellit, später Basilit genannt worden ist, u. aus rund 89% NaF u. rund 11% Dinitrophenolanilin besteht, werden mitgeteilt. NaF dringt bei der Imprägnierung in das Holz ein als das Anilinderivat, was zusammen mit der Schwerherausbarkeit des letzteren von großer Bedeutung ist, da das Dinitrophenolanilin im äußeren Teil des Holzes sitzt. Bei CuSO_4 - u. ZnCl_2 -Hölzchen trat schon nach 1 u. in warmem Wässern ein kräftiges Pilzwachstum ein, bei NaF erst nach 7 u. bei Basilit nach 16 Tagen kein Wachstum festzustellen. Bei Imprägnierung mit Dinitrophenolanilin war noch nach 16 Tagen kein Wachstum festzustellen. Bei Imprägnierung von wasserlöslichen Substanzen in eisernen App. besteht die Gefahr, daß die App. korrodiert wird, was bei vorliegendem Präparat nicht der Fall ist, ebenso die pilzwidrige Kraft dabei nicht herabgemindert. (Korrosion u. Metallschutz 2. 1926.)

WILKE.

E. R. Hayhurst, *Kohlenoxyd und Automobilauspuffgase*. Die Formen der CO-Vergiftung, die möglichen Nachschädigungen u. die Möglichkeit zu solcher Vergiftung in verschiedenen Industriebetrieben u. im Automobilbetrieb werden erörtert. Anhangsweise wird ausgeführt, daß die Verwendung von Bleiäthyl als Benzolzusatz keine ernstlichen Befürchtungen in bezug auf Pb-Vergiftung bisher gegeben hat. (Amer. Journ. Health 16. 218—23. Ohio State Univ.)

MEIER.

XX. Schieß- und Sprengstoffe; Zündwaren.

Heyer, *Das Gesteinsstaubverfahren zur Bekämpfung von Kohlenstaubexplosionen*. Die behördliche Regelung seiner Anwendung. Nach einer einleitenden Bemerkung über Entstehung u. Bedeutung der Kohlenstaubexplosionen in Bergwerken u. einer Besprechung der verschiedenen Verff. zur Bekämpfung dieser Explosionen (Verdünnungs-, Berieselungs-, Gesteinsstaubverf.) geht Vf. auf die Entw. des zuletzt

genannten wichtigsten Verf. u. seine bergpolizeiliche Regelung in Deutschland (Ztschr. f. d. ges. Schieß- u. Sprengstoffwesen **21**. 22—23.) KAS

G. St. J. Perrott, *Sprengungen unter Tag in Erzgruben mit Flüssigluftsp. stoffen*. (Vgl. S. 1492.) Entw., Vor- u. Nachteile der Flüssigluft-Sprengstoffe, Einfluß der Stopfdichte u. des Patronendurchmessers auf die Lebensdauer der Patrone aus Lampenruß, der Wartezeit u. des Sauerstoffgehalts auf die Sprengkraft im Vergleich zu 40%ig. Gelatinedynamit, gemessen mit dem ballistischen Pendel. Stellung der Bedingungen für Untertagsprengungen zur Vermeidung der CC Vorsichtsmaßregeln für die Zündung u. Besetzung der Schüsse. Beschreibung Sprengverss. in verschiedenen Minen. Kostenberechnung. (Eng. Mining Jour. Press **121**. 357—65. Pittsburgh Experimental Station, Bureau of Mines.) KAS

F. Blechta, *Über Salpetrigsäureester der Cellulose*. Nach einer Kritik der Angaben von NICOLARDOT u. CHERTIER (C. r. d. l'Acad. des sciences **151**. 719; C. **112**. 1888) über denselben Gegenstand kommt Vf. auf seine Dissertationsarbeit „Über die Unstabilität der Schießbaumwolle u. ein neues Stabilisierungsverf.“ zu sprechen, worin er den Nachweis führt, daß die unstabilen Verbb. in der Nitrocellulose durch Kochen mit 1%ig. Sodalslg. in kurzer Zeit zerstört werden. In Fortsetzung dieser Verss. wandte der Vf. die Methode von MEISSENHEIMER u. HEIM (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **38**. 3834; C. **1906**. I. 84. 499) zur Best. der Nitrite neben Nitraten an, nach der die von CARRON (Ann. chim. anal. appl. [2] **1**. 235; C. **1919**. IV. 850) vorgeschlagene Umwandlung der Nitrate in NO u. der Nitrite in N₂ mit Formaldehyd sich nicht durchführbar erwiesen hatte. Er zersetzte somit die Nitrate in Ggw. von lufttrockener KJ-Lsg. mit luftfreier verd. Schwefelsäure u. konnte aus dem entwickelten NO den Nachweis des Vorhandenseins von Salpetrigsäureestern in der Nitrocellulose u. in B. durch den Untersalpetersäuregehalt der Nitriersäure führen. (Ztschr. f. d. Schieß- u. Sprengstoffwesen **21**. 38—41.) KAS

S. H. Kershaw, *Die Sicherheit in der Herstellung von Salpeter-, Schwefel- Mischsäuren und von Ammonnitrat bei Verwendung in der Sprengstofffabrikation*. Besprechung der Gefahrmöglichkeiten u. Schutzmaßnahmen gegen giftige Dämpfe, Verbrennungen durch Überlaufen, Spritzen u. Leckwerden, Explosionen durch hohe Rkk. u. Überdrucke, Abfallsäuren der Nitroglycerinfabrikation, Korrosionsvorgänge, Instandsetzungen, maschinelle Einrichtungen, Brände durch Säuren u. Natronsalz u. im besonderen der bei der Fabrikation von Ammonsalpeter auftretenden Gefahren. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 4—9. Hercules Powder Co.) KAS

Arthur B. Ray, *Die Herstellung von gefärbten Rauchsignalen*. Beschreibung der in den Jahren 1917—1918 ausgeführten Verss. mit Rauchsignalen. Am besten eignen sich für gefärbten Rauch das Verf. der Verflüchtigung organ. Farbstoffe mit einer Mischung von Kaliumchlorat u. Milchsüßholz, für schwarzen Rauch ein lang abbreitendes Gemisch aus Hexachloräthan, Magnesium u. Anthracen. Als Träger der Signale wurden verwendet gewöhnliche u. Fallschirmraketen, Gewehrgranaten, Signalpistolen, Fliegerhandgranaten, Rauchtöpfe. Auch Zerstäuben fein gepulverter anorgan. Farbstoffe wie Englischrot u. Ultramarin erwies sich unter gewissen Bedingungen als brauchbar. Ein gutes gelbes, aber sich leicht verflüchtigendes Signal erhielt man bei Verwendung von Arsensulfid. Jod u. Jodverbb. waren nicht befriedigend. Beschreibung der Konstruktion einiger Signale. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 10—17. Washington, Brandsektion der chem. Untersuchungsabteilung des Bureau of Mines an der amerikan. Universitätsversuchsstation.) KAS

J. Tagliabue, Buenos Aires, *Sprengstoff*, welcher aus NaNO₃, KNO₃ oder NH₄NO₃ oder einer Mischung dieser Nitrate, einem Schwefelmetall u. Kohle zusammengesetzt ist. (E. P. **236 413** vom 4/9. 1924, ausg. 30/7. 1925.) OELKE

Edmund von Herz, Charlottenburg, *Herstellung von Zündsätzen*. (D. R. P. 424 380 vom 24/10. 1924, ausg. 27/1. 1926. — C. 1926. I. 2766.) OELKER.

XXI. Leder; Gerbstoffe.

J. Zender, *Über die Einwirkung der Peroxydase auf die Gerbstoffe*. Tannin, chu, Gambir, Pistaze, Eichenrinde, Musacatechin u. Mate werden 1. H_2O_2 , 2. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{xydase}$, 3. Peroxydase allein, 4. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{Alkali} + \text{Peroxydase}$, 5. Alkali + Peroxydase u. 6. Alkali allein ausgesetzt. Am stärksten wirkt 4. bei $\text{pH} = 6,4-7,0$. Die macht sich als Fällung oder Färbung in einer für die einzelnen Gerbstoffe charakteristische bemerkbar. Peroxydase allein verändert nur Mate. Die Intensität der Rk. ist Verhältnis Peroxydase: H_2O_2 abhängig. Optimum liegt bei 1 Teil Peroxydase : 1,4 Teil H_2O_2 (0,5%). Bei dem Braun- bzw. Schwarzwerden der Pflanzen, -blättern, Schalen, Blätter spielt die Einw. der Peroxydase eine große Rolle. (Compt. rend. des seances de la soc. de physique et d'hist. nat. de Genève 42. 56; Ber. ges. Physiol. 661. Genf, Institut. de bot. univ. Ref. GERNGROSS.) OPPENHEIMER.

Aug. C. Orthmann, *Maschine zur Bereitung von Lederproben für Analysenzwecke*. Von C. P. BOSSERT, bei den Lederwerken PFISTER u. VOGEL, Milwaukee konstruierte Maschine wird an Hand von Zeichnungen u. photograph. Abb. beschrieben. Zerkleinern von vegetabil. u. Cr-Leder wird von der Maschine einwandfrei besorgt. (Ann. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 579—83. 1925.) MEZEY.

Ludwig Jablonski, *Mechanische Lederuntersuchungen*. Zur Ermittlung der Durchlässigkeit von Leder für Feuchtigkeit, läßt Vf. W. unter bestimmtem Druck auf einer bekannten Fläche des zu untersuchenden Leders ruhen (Abb.) u. misst die Zeit bis zum ersten Durchdringen von W. (durch elektr. Kontaktapparat) sowie die in einer bestimmten Zeit hindurchfließende Wassermenge. Die Durchlässigkeit von Leder für Luft wird auf ähnliche Weise ermittelt (Abb.). Aus dem Verh. eines einseitig gehaltenen Lederstückes (Abb.) ermittelt Vf. den Elastizitätsmodul. Die Senkung eines solchen Freitragers ist direkt proportional dem Druck u. der Länge u. umgekehrt proportional dem Querschnitt u. dem Elastizitätsmodul. Gute Übereinstimmung so erhaltener Werte ergab sich mit solchen Dehnungswerten bei nicht übermäßiger Belastung. (Collegium 1925. 616—20.) LOE.

Ludwig Jablonski, *Histologische Lederuntersuchungen*. Um im lohgaren Leder Gewebeteile durch Färbungen differenzieren zu können, zers. Vf. die Gerbstoffe durch Behandlung mit 5—7% Lsg. von Hydrosulfit oder 10—15% alkoh. H_2O_2 -Lsg. findet, daß die Beize die elast. Fasern nicht zerstört, bei Cr-Leder als auch bei lohgarem Handschuhleder lassen sie sich in voller Klarheit u. scheinbar auch in unendlicher Fülle beobachten. Bei lohgaren Ledern, die bis zu 3 Wochen mit einem Na_2S angeschräften Äscher behandelt worden waren, war keine nachteilige Wrkg. zu beobachten. (Collegium 1925. 620—23.) LOEWE.

A. Colin-Russ, *Beitrag zur Ermittlung des Fettgehaltes und des Wasserlöslichen im Leder*. Vf. findet, daß sich zwischen fetthaltigem Leder u. einem Lösungsm. für Fett ein Gleichgewicht einstellt, bei welchem das Verhältnis der Konz. des vom Leder entzogenen Fettes zu der des Fettes im Fettlösungsm. konstant ist. Diese Tatsache gibt ein Mittel an die Hand, um Fett in Leder zu ermitteln, ohne dieses vollständig zu entfetten. Eine bekannte Menge Leder wird nacheinander mit dem gleichen Lösungsm. bei Zimmertemp. unter gelegentlichem Umschütteln 24 Stdn. stehen gelassen. Im Lösungsm. wird die extrahierte Fettmenge durch Abdestillieren und Trocknen des Rückstandes bei 100° bis zu Gewichtskonstanz ermittelt. Die gesamte im Leder vorhandene Fettmenge F ist dann, wenn E_1 die zuerst u. E_2 die darauf extrahierte Fettmenge bedeutet: $E_1^2/(E_1 - E_2)$. Ohne Einfluß auf das Ergebnis ist die Menge, in der das Leder extrahiert wird, beeinflußt wird von dieser nur die Konstante, die das Gleichgewicht bestimmt. — Versucht man das Wasserlösliche auf die gleiche

Weise zu ermitteln, so ergeben sich insofern Schwierigkeiten, als durch Hydrol ebenfalls Stoffe im W. gel. werden. Vf. ändert die offizielle Methode dahin ab, er die das Leder durchlaufende Fl. fortlaufend untersucht. Er erhält so eine Kurve für die Abhängigkeit der ausgelaugten Mengen von der Zeit. Diese Kurve besteht falls man die Logarithmen der Variablen als Koordinaten wählt, aus zwei Geraden. Der Schnittpunkt beider ergibt den Wert für den wasserl. Anteil. Bei der Ausführung der offiziellen Methode werden zu hohe Werte erhalten, da auch hydrolyt. abgespalten Stoffe als Wasserl. mit bestimmt werden. (Journ. Soc. Leather Trades' Chemists 455—78. 1925. London, City Road 50.)

LOEWE

R. Faraday Innes, Bericht der Internat. Kommission für Analyse von Chromle und Chrombrühen. In Anlehnung an die provisor. offiziellen Analysenmethoden (Barcelona 1923) werden kleine Abänderungen vorgeschlagen. Die allgemein angenommene Schorlemmersche Ausdrucksweise der Basizität hat auch bereits in England Eingang gefunden. (Journ. Soc. Leather Trades' Chemists 9. 508—09. 1925.)

de la Bruère, Die p_H -Messung von Gerbestrukturen. II. (Le Cuir Technique 351—53. 1925. — C. 1926. I. 554.)

GERNGROSSE

John Arthur Wilson, Vergleich der Prallwiderstände von Leder- und Gummiabsätzen. Zwecks Widerlegung der allgemeinen Ansicht, wonach der Prallwiderstand von Gummiabsätzen größer sei, als der von gewöhnlichen Lederabsätzen, werden diese Stoffe einer vergleichenden Prüfung unterworfen. Der zu untersuchende Absatz wird auf einem Holzblock befestigt; ein kurzer Metallstab fällt durch ein Glasrohr von einer bestimmten Höhe auf den Absatz u. wird von diesem in dem Glasrohr wieder nach oben zurückgeworfen. Die Höhe des Zurückspringens ist ein Maß für den Prallwiderstand. Für handelsübliche Sohlederabsätze fand Vf. 37—39% Rückspr. der Fallhöhe, für Gummiabsätze 20—37%, für Chromlederabsätze 17 bzw. 19% (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 576—79. 1925.)

MEZEY

Egon Meier, Friedberg, Hessen, Entgerbung und Entchromung von mit Zinn- oder Formaldehyd gegerbten Chromlederabfällen und zur Vorbereitung derselben für Gelatine- und Leimbereitung. (D. R. P. 425 131 Kl. 22i vom 13/1. 1923, ausg. 1. 1926. — C. 1926. I. 1915.)

RÖHMEKE

Baptiste Brun und **Robert Guillard**, Frankreich, Kälken von lohgarem Leder. Das Leder wird zum Entgerben in Körben oder dergl. in Kalkwasser eingebracht. (F. P. 601 274 vom 23/7. 1925, ausg. 26/2. 1926.)

RÖHMEKE

Willy Moog, Deutschland, Gefärbte Zeichnungen auf Leder. Eine Schablone o. dgl. wird gegen das Leder gepreßt, dann der fl. Farbstoff auf die freien Stellen aufgebracht, hierauf der Farbstoffüberschuß weggenommen, das Leder gewaschen u. dann erst die Schablone abgehoben. (F. P. 597 572 vom 4/5. 1925, ausg. 24/6. 1925. D. Prior. 26/6. 1924.)

KAUSCH

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: **Arthur Voß**), Höchst a. M., Herstellung von in Wasser leicht löslichen, sulfonierten Kondensationsprodukten aus Aldehyden und aromatischen Kohlenwasserstoffen oder deren Derivaten, dadurch, daß man aromat. KW-stoffe, deren Derivv. oder Substitutionsprodd. mit Sulfosäuren von aromat. Aldehyden kondensiert. — Die Kondensation erfolgt in Ggw. von katalytischen Säuren als Katalysatoren. Beispiele sind angegeben für die Herst. von Kondensationsprodd. aus: Phenol u. Benzaldehyd-m-sulfosäure, — techn. Kresol u. Benzaldehyd-disulfosäure (durch Oxydation von 1-Methylbenzol-2,4-disulfosäure mit MnO_2 erhalten) — p,p'-Dioxydiphenyläthan (aus Phenol u. Paraldehyd erhalten) u. Benzaldehyd-o-sulfosäure, — Naphthalin u. Benzaldehyd-o-sulfosäure, sowie Phenanthren u. Benzaldehyd-m-sulfosäure. Die harzartigen, in W. ll. Prodd. finden zum Gerben tier. H. Verwendung. Sie liefern schwach gefärbtes Leder von guter Reißfestigkeit, gu-

ben u. genügender Kochechtheit. (D. R. P. 423 033 Kl. 12q vom 4/6. 1922, z. 18/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.

Albert Brylinski, *Unlöslichmachen von Gelatine durch Formaldehyd bei mäßiger Temperatur in Gegenwart von Sulfuricinat*. Ein neutrales, bei gewöhnlicher Temp. machendes Mittel wurde im Sulfuricinat gefunden. Geht man mit einem Stück in Gelatinelsg., dann in eine mit Formaldehyd versetzte Ammoniumsulfuricinat-so erhält man durch einfaches Trocknen in der Hänge eine in W. unl. Appretur. h Behandeln mit Sulfuricinat u. Formaldehyd u. danach Gelatinelsg. gibt beim eknen eine unl. glänzenden Appretur. (Bull. Soc. ind. Mulhouse 91. 611 bis 1925.) SÜVERN.

M. Gottlöber, *Ein Beitrag zur Analyse des Harzleims*. Statt des bisher zur Best. „Gesamtharzes“ üblichen Ausätherns des mit H₂SO₄ ausgeflockten Harzes wird Trennung von Harznd. u. Fl. mittels getrockneten u. gewogenen Filters vor- schlagen. Dabei werden prakt. auch die anderen leimenden Kolloide mit erfaßt. pierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure 125.) SÜ.

Aktiengesellschaft für chemische Produkte vorm. H. Scheidemandel, Berlin, **niel Sakom**, Wiesbaden, und **Paul Askenasy**, Karlsruhe, *Verfahren, durch Ein- fassen von Leimlösung in ein Kühlbad erzeugte Leimperlen von anhaftender Kühl- sigkeit zu reinigen*, dad. gek., daß man die Leimperlen unmittelbar nach dem hlvorgang in eine mit der Kühlfl. nicht mischbare Fl. bringt. — 2. bei Verwen- g einer Kühlfl., die leichter ist als die Reinigungsfl., dad. gek., daß die beiden unmittelbar übereinander geschichtet werden. (D. R. P. 408 192 Kl. 22i vom 0. 1922, ausg. 16/11. 1925.) RÖHMER.

Aktiengesellschaft für chemische Produkte vorm. H. Scheidemandel, Berlin, **niel Sakom**, Wiesbaden, und **Paul Askenasy**, Karlsruhe, *Verfahren, durch Ein- fassen von Leimlösung in ein Kühlbad erzeugte Leimperlen von anhaftender Kühl- sigkeit, die schwerer als Wasser ist, zu befreien*, dad. gek., daß zwischen das eigentliche hlbad (z. B. Tetrachloräthan) u. das Reinigungsbad (z. B. W.) ein Zwischenbad einer Kühlfl. (z. B. Bzl.) geschaltet wird, die leichter ist als die Reinigungsfl. — dad. gek., daß der Reinigungsfl. (z. B. W.) in ihr l. Stoffe (z. B. Salze) in solcher nge zugesetzt werden, daß sie schwerer wird als die verwendete Kühlfl. (D. R. P. 408 192 Kl. 22i vom 15/10. 1922, ausg. 11/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 408 192; vorst.) RÖHMER.

Casein Manufacturing Company, New York, übert. von: **Andrew A. Dunham**, **inbridge**, V. St. A., *Wasserfester Caseinleim*. Dem Casein werden 5—20% Holz- hl zugesetzt. (A. P. 1 571 662 vom 28/4. 1924, ausg. 2/2. 1926.) RÖHMER.

Ellenberger & Schrecker, Frankfurt a. M. und **Oskar Huppert**, Passau, *Dar- lung von Leim aus Chromleder*, dad. gek., daß Chromleder bzw. Chromlederspäne er Chromlederpulver zunächst mit Säuren von einer Normalität 0,02—0,1 gekocht rd, worauf das erhaltene zerkleinerte Gut gerade mit so viel CaO versetzt wird, als twendig ist, um Cr als unl. Cr-Verb. niederzuschlagen bzw. die noch vorhandene ure zu neutralisieren u. einen Alkalitätsgrad der erhaltenen Leimbrühe von 0,05 zw. 0,01 zu erreichen, worauf entweder sofort oder nach längerem Stehen mit W. Leim verkocht u. die Leimbrühe von den unl. Cr- u. Ca-Verbb. getrennt wird. (D. R. P. 426 471 Kl. 22i vom 5/5. 1923, ausg. 10/3. 1926.) RÖHMER.

Arthur Alfred Bergin, Westminster, *Herstellung von Gelatine und Leim aus Chrom- erabfällen*. (E. P. 226 722 vom 15/4. 1924, ausg. 22/1. 1925. — C. 1925. II. 2119 .P. 590 950.) OELKER.

Kristian Holter und **Sverre Thune**, Norwegen, *Extraktion von Öl, wäßr. Gelatine und fester Stoffe aus rohen tierischen oder pflanzlichen Stoffen*. Die Stoffe werden in Ggw. von Wasserdampf oder h. W. in einem App., in dem sie gegen eine drehende Walze gepreßt werden, zerkleinert. (F. P. 596 645 vom 15/4. 1925, a 28/10. 1925. N. Priorr. 16/4 und 13/9. 1924.) KAUSCH

Adolf Leszynski, Berlin-Wilmersdorf, *Herstellung von Klebstoffen aus Stärke stärkehaltigen Rohstoffen*, dad. gek., daß man die Rohstoffe bei niedriger Temp. (etwa 45°) mit CaCl_2 oder MgCl_2 oder einem Gemisch dieser Stoffe oder deren Lsg. aufschließt u. nach dem Aufschließen das CaCl_2 bzw. MgCl_2 durch chem. Umsetzung in unl. Verbb. überführt u. die M. auf h. Zylindern o. dgl. in an sich bekannter Weise trocknet. — Der Klebstoff ist in k. W. restlos l. u. ergibt einen fast für alle Zwecke brauchbaren Pflanzenleim. (D. R. P. 424 391 Kl. 89k vom 18/4. 1923, a 22/1. 1926.) OELKE

Walter Leonhardt, Berlin-Friedenau, *Darstellung von weißem Pflanzenleim* (D. R. P. 412 125 Kl. 89 k vom 17/1. 1922, ausg. 11/3. 1926. — C. 1926. I. 2422.) ()

Katsunaga Tamanaha, Tokyo, Japan, *Imprägnierungs- oder Klebmittel*, pulverte Knollen von Pflanzen der Gattung der *Araceen*, wie *Amorphophallus* konf. der als Hauptbestandteil *Mannan* enthält (vermutlich handelt es sich also um *Tu. Salep!* der Referent) werden innig mit einer Säure, wie Borsäure, Salicylsäure, förmiger HCl , SO_2 oder einem sauer reagierenden Salze, wie NaHSO_3 , gemischt. Bei der Anwendung gasförmiger Säure leitet man die Säure in einen das Pulver enthaltenden geschlossenen Raum. Man erhält ein völlig geruchloses Prod., dessen Fähigkeit beim Vermischen mit W. nicht verloren geht. Es findet in dieser Form *Schlichte* in der *Textilindustrie*, zum *Leimen von Papier* sowie als *Kitt* Verwendung. (A. P. 1 574 638 vom 12/10. 1923, ausg. 23/2. 1926.) RÖHME

O. Johnson, San Francisco, *Behandlung von Sojabohnen*. Man extrahiert gemahlene Bohnen oder das Preßkuchenmehl derselben mittels einer wss. Alkal. Lsg., befreit den Extrakt von den festen Bestandteilen u. dem Öl, u. scheidet aus dem Saft durch Zusatz von Säuren o. dgl. die Eiweißstoffe ab, die man wäscht, bleicht u. trocknet. Das Prod. kann als *Kleb- u. Bindemittel* verwendet werden. (I. 241 249 vom 10/6. 1924, ausg. 12/11. 1925.) OELKE

Mark W. Nelson, Lincoln, und **Walter F. Nelson**, College View, Nebraska, *Fensterkitt*. Man vermischt Gips u. Bleiglätte mit Firnis. (A. P. 1 570 169 vom 19/1. 1926, ausg. 19/1. 1926.) FRANZ


Madeleine Ross, Montreal, Quebec, Canada, *Verhinderungsmittel für das Anhaften von Feuchtigkeit in Tropfenform auf Glas u. dgl.* Man behandelt Glas mit konz. HNO_3 u. Chromsäuren. (A. P. 1 576 363 vom 22/12. 1924, ausg. 1926.) KAUSCH

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.

Heinz vom Berge, *Treibriemenschutz durch Riemenfette*. Treibriemenschutzmittel sollen die Lebensdauer der Riemen auch unter ungünstigen Umständen (z. B. in feuchten h. Räumen) verlängern, das Leder weich erhalten u. das Gleiten der Riemen an den Scheiben verhindern. Vf. bespricht Mischungen verschiedener Stoffe, die nach diesen Richtungen hin bewährt haben. (Allg. Ztschr. f. Bierbrauerei u. Malzfabrik. 54. 34—36.) RÜHL

Stan. Ljubowski, *Glycerinleim-Massen*. Die für die Herstellung erstklassiger Buchdruckwalzen- sowie Hektographiermassen, die vorwiegend aus Gelatine u. Glycerin bestehen, wichtigen Anforderungen u. Arbeitsbedingungen sind durch die Aufbereitung gebrauchter MM. Eine Reihe von Rezepten für verschiedene Verwendungszwecke. (Seifensieder-Ztg. 53. 215—16. 231.) HELLE

Jinkichi Inouye, Japan, *Herstellung einer schwarzen, säure- und wasserbeständigen* e. Tetra- oder Hexanitrosubstitutionsprodd. des Dinaphthylendioxyds werden, benenfalls nach vorheriger Sulfonierung, in wss. NH₃ gel. — Das *Dinaphthylendioxyd* entsteht durch Erhitzen von β -Naphthol mit CuO oder MnO₂ unter Druck im e folgender Gleichung:



ztzt man das *Dinaphthylendioxyd* 2—5 Stdn. mit konz. HNO₃, D. 1,38, auf 100°, ht es in das *Tetranitroderiv.*, rote Krystalle, über. Die mit W. gewaschenen u. ge- neten Krystalle werden in konz. H₂SO₄ gel. u. die Lsg. 3—4 Stdn. auf 170—180° ztzt, wobei die Farbe der Lsg. in Dunkelviolettschlägt. Beim Eingießen der sg. in W. scheidet sich die *Sulfosäure* als schwarzer Nd. ab, der nach dem Aus- hen mit W. in verd. wss. NH₃ gel. eine kolloidale, schwarzpurpurfarbige *Tinte* rt. — Beim Erhitzen des *Dinaphthylendioxyds* mit konz. HNO₃, D. 1,38, während tdn. auf 110° erhält man ein *Hexanitroderiv.*, orangefarbene rhomb. Plättchen, in diesem durch Einw. von konz. H₂SO₄, D. 1,8, auf 220—230° während 2—3 Stdn. nttsprechende *Sulfosäure*, schwarzes, in W. unl. Pulver, die, in wss. NH₃ gel., eben- eine schwarzpurpurfarbige *Tinte* gibt. — Auch aus dem *Hexanitroderiv.* selbst i man beim Erhitzen mit NH₃, D. 0,956, eine dunkelpurpurfarbige Fl. erhalten, nach dem Abdestillieren des überschüssigen NH₃ u. Ansäuern ein in W. zu einer arzen, kolloidalen *Tinte* l. schwarzes Pulver liefert. Die völlig neutrale Lsg. greift edern nicht an, setzt keinen Nd. ab u. liefert beim Schreiben u. nach dem Trocknen n W. u. Säuren beständige Schriftzüge. (F. P. 600 390 vom 7/7. 1925, ausg. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Wilhelm Scheffer, Berlin-Wilmersdorf, und **Paul Knoche**, Charlottenburg, *Her- ung von Hektographenmasse mit Agar-Agar* als wesentlichem Bestandteil, dad. gek., Agar-Agar mit W. unter Druck auf Temp. über 100° erhitzt wird u. dann hygroskop. fe hinzugesetzt werden. — 2. dad. gek., daß hygroskop. Stoffe, die ohne schädigen- Einfluß auf das Kolloid sind, schon vor dem Erhitzen zugefügt werden. (D. R. P. 667 Kl. 151 vom 8/4. 1924, ausg. 24/2. 1926.) RÖHMER.

Kaumagraph Co., New York, übert. von: **Winthrop Stanley Lawrence**, klyn, N. Y., *Kopiertinte*, bestehend aus einer schmelzbaren Grundsubstanz (olin), einem Emulgiermittel (Türkischrotöl) u. einem Farbstoff. (A. P. 1 573 976 vom 29/9. 1924, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

Herbert W. Becker, Milwaukee, Wisconsin, *Entfernungsmittel für Tinte*, be- end aus 21 Teilen HCOOH, 3 Teilen Glycerin, 1 Teil Schwefelsäureester, $\frac{1}{10}$ Teil eeröl u. $\frac{1}{20}$ Teil Köln. W. (A. P. 1 571 313 vom 13/5. 1925, ausg. 2/2. 1926.) KAU.

Albert Schwenke, Deutschland, *Reinigungs-, Konservierungs- und Desinfektions- el für Fußböden durch Mischen (Kochen) von W. mit Bienenwachs, Natrolith, alin, Bzn., CCl₄, Leinöl, Oxalsäure, Benzaldehyd u. Formaldehyd.* (F. P. 602 329 vom 21/8. 1925, ausg. 17/3. 1926. D. Prior. 10/7. 1925.) KAUSCH.

M. M. H. Cudworth, Bradford, *Poliermittel für Elfenbein, Papiermaché, Silber usw.*, ehend aus NaCl, Borax, Leinöl, Glycerin, Paraffinöl, denaturiertem Spiritus u. entin. (E. P. 246 380 vom 3/7. 1925, ausg. 18/2. 1926.) KAUSCH.

Johanne Johansen, Newport, Rhode Island, *Politur*. Die Politur besteht aus m Gemisch von Leinöl, Campherspiritus, Weinessig, Terpentin u. raffiniertem oleum. (A. P. 1 572 021 vom 2/8. 1924, ausg. 9/2. 1926.) RÖHMER.

Charles J. Wagner, Fort Lupton, Colorado, *Reinigungsmittel* für Kleider, stehend aus $\frac{3}{5}$ Teil Na_2CO_3 , $\frac{1}{5}$ Teil S, $\frac{1}{10}$ Teil Terpentin u. $\frac{1}{10}$ Teil Waschb (A. P. 1578 487 vom 8/3. 1922, ausg. 30/3. 1926.) KAUSCH

Frank Edwin Wieser und **Roy R. Palmer**, San Luis Obispo, Californ., *handeln von Bremsfuttern* mit einem Gemisch von 96 Teilen Terpentin, 16 Te Ricinusöl, 8 Teilen Graphit u. 1 Teil Citronellöl. (A. P. 1573 468 vom 16/7. 1925, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH

XXIV. Photographie.

L. Vanino und **A. Menzel**, *Zur Anwendung der Sidotschen Blende in der Lum graphie*. (Vgl. Chem.-Ztg. 49. 545; C. 1925. II. 1120.) Vergleichende Unterss. gaben, daß auch mit *Sidotscher Blende* (Firma GAMBA, DIEHL u. Co., Heidelb Hauptstr. 107; radioaktive Blenden Radium-Chemie A.-G., Frankfurt a. M.) Resultate erzielt werden. Das Maximum der Einw. ist in kürzerer Zeit erreicht. Wrkg. auf größere Entfernungen wirkt die *Balmainsche M.* stärker infolge des l sameren Abklingens. Das beste Negativ ergab die grünleuchtende Tafel von R SCHILD. (Chem.-Ztg. 50. 225—26.) JUN

A. Reyhler, *Photochemische Studien*. VI. *Mechanische Wirkungen auf die p graphische Platte*. (V. vgl. S. 1628.) VI. untersucht mkr. nach dem Fixieren r feuchte Platten u. bestätigt so den Befund von WULFF (Ztschr. f. wiss. Photograp Photophysik u. Photochemie 23. 145; C. 1925. II. 380), daß nur Druck verbun mit Reibung schwärzend wirkt, Druck allein desensibilisierend. (Bull. Soc. C Belgique 34. 293—95. 1925.) LESZYNSK

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin, übert. von: **Gu Friedrich Wilmanns**, Wolfen, Kr. Bitterfeld, *Klischee für photomechanischen Dr* bestehend aus einer Schicht (Film), auf deren Vorderseite die Druckplatte u. auf anderen Seite eine kolloidale Schicht mit geeigneter Oberfläche für die Reto vorgesehen ist. (Can. P. 251 942 vom 17/3. 1925, ausg. 21/7. 1925.) KAUSCH

Hermann Zimmermann, Heidelberg, *Photographische Platten*, 1. dad. g daß am Rande eine Fahne aus Papier o. dgl. für Notizen angebracht ist. — 2. gek., daß die Fahne aus einem schmalen Stoffstreifen u. einem breiteren Teil Aufnahme der Notizen besteht. (D. R. P. 426 660 Kl. 57b vom 9/1. 1925, a 13/3. 1926.) KAUSCH

Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y., übert. von: **Samuel E. Shepp** Rochester, *Lichtempfindliches photographisches Material*, bestehend aus einer S enthaltenden Fraktion eines biochem. Extrakts (Nebenprodd. der Haut-, Knoe behandlung, Gelatineherst., ferner der Cerealienbehandlung usw.) in einem o Lösungsm. Die erhaltenen Prodd. erhöhen die gewöhnliche Lichtempfindlich der Gelatine-Silberhalogenidemulsionen. (A. P. 1574 943 vom 6/6. 1924, a 2/3. 1926.) KAUSCH

Wadsworth Watch Case Co., Dayton, Kentucky, übert. von: **A. Mu C. Beebe** und **Alexander Murray**, Cincinnati, Ohio, *Mittel zur Herstellung p graphischer Papiere*, bestehend aus einem hydrophoben Schutzkolloid (Asphalt einer darin dispergierten halogenabspaltenden Verb. (Jodoform) u. gegebener einer organ. Metallverb. (Bleitriäthyljodid). (A. P. 1575 143 vom 18/11. 1925, ausg. 2/3. 1926.) KAUSCH

Westland-Film G. m. b. H., Charlottenburg, *Sensibilisieren von Kinofilmer Positivkopien mit Chromatlösungen*. (D. R. P. 427 082 Kl. 57b vom 6/1. 1924, a 23/3. 1926. — C. 1925. II. 1244.) KAUSCH

Chemisches Zentralblatt.

926 Band I.

Nr. 23.

9. Juni.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Richard Lorenz und **M. Mannheimer**, *Bemerkungen über das neue Massenwirkungsgesetz. II. Zur Diskussion der Gleichungen.* (I. vgl. S. 1754.) Weitere Diskussion des „Massenwirkungsgesetzes, dessen „Konstante“ von der Konz. abhängt. Graph. st. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **150**. 343—49.) CASSEL.

Florence Fenwick, *Das Gleichgewicht zwischen Cupriion, Cuproion und metall. Cu*. Vf. untersucht das Gleichgewicht zwischen Cu^{++} , Cu^+ u. metall. Cu perchloratlg., weil darin die Neigung zur B. von Komplexionen am geringsten ist. $(\text{ClO}_4)_2$ wurde durch Auflösen von reinem elektrolyt. Cu in HNO_3 u. Eindampfen einem HClO_4 -Überschuß dargestellt. Eine Lsg. von $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2$ wurde 4—5 Tage metall. Cu bei 25° in Berührung gebracht u. nach Erreichung des Gleichgewichts le der Gesamtgehalt an gebildeten Cu^+ -Ionen in der Lsg. durch elektrometr. ation mit KMnO_4 bestimmt. Die Oxydation des Cu^+ wurde durch Arbeiten in .Atm. vermieden. Analoge Verss. wurden auch in Sulfatlg. ausgeführt. In den chloratlgg. wurde die Cu^{++} -Salzkonz. zwischen 0,18 u. 0,82-mol. variiert, die CuSO_4 -z. betrug 0,22, 0,33 u. 0,67 Mol/l. Die Gleichgewichtskonstante $K_1 = [\text{Cu}^{++}]/[\text{Cu}^+]^2$ le aus der EK. der Kette $\text{Cu} | \text{Cu}^{++}$ in der Gleichgewichtslsg. $| \text{Cu}^+$ in der Gleichgewichtslsg. $| \text{Cu}$ berechnet. Hierzu war erforderlich, das mol. Elektrodenpotential Cu gegen Cu^+ zu bestimmen, wofür bei 25° $-0,522$ V gefunden wurden. Das mol. trodenpotential Cu^+ gegen Cu^{++} wurde bei 25° zu $0,167$ V bestimmt. Diese Bestst. gten durch Messung der EKK. der Ketten $\text{Hg} | \text{Hg}_2(\text{ClO}_4)_2 + \text{HClO}_4 | \text{HClO}_4 + \text{IO}_4 | \text{Ag}; \text{H}_2 | \text{HClO}_4 | \text{HClO}_4 + \text{Hg}_2(\text{ClO}_4)_2 | \text{Hg}$ u. $\text{Cu} | \text{Cu}^+$ in der Gleichgewichts- Hg_2^{++} in der Gleichgewichtslsg. $| \text{Hg}_2\text{SO}_4$ (fest) $| \text{Hg}$ sämtlich bei 25° . Die Meß- n sind in Tabellen angegeben. Die Gleichgewichtskonstante K_1 wird sowohl unter Voraussetzung der Einwertigkeit des Cu^+ -Ions als auch unter Voraussetzung von en Zweiwertigkeit berechnet. Ein Vergleich der Ergebnisse spricht jedoch für Einwertigkeit des Cu^+ -Ions, unter dieser Voraussetzung ist K_1 1×10^6 mit einer leren Abweichung von 10%. — Aus obigen Messungen wurde auch das Verhältnis Quadrate der Aktivitätskoeffizienten von H^+ zu Hg_2^{++} für die Ionenstärke von 0,16 t, 17 Mol berechnet. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 860—70. New Haven [Conn.], e Univ.) JOSEPHY.

Jens Anton Christiansen, *Das Gleichgewicht zwischen Methylformiat und Methyl- hol und einige verwandte Gleichgewichte.* Vf. bestimmt die Gleichgewichtskon- ten der Rkk.:

(1) $\text{H} \cdot \text{COOCH}_3 + 2 \text{H}_2 = 2 \text{CH}_3\text{OH}$ u. (2) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{CO} = \text{H} \cdot \text{COOCH}_3$; $K_1 = [\text{H}_2]^2 \cdot [\text{H} \cdot \text{COOCH}_3] / [\text{CH}_3\text{OH}]^2$ ergibt sich bei 200° in Ggw. von Cu_2O - alsator in guter Übereinstimmung $\log K_1 = -3016/T + 3,61$. Die Werte für $[\text{CO}][\text{CH}_3\text{OH}] / [\text{H} \cdot \text{COOCH}_3]$ bei 100° in Ggw. von festem Na-Methylat sind n Absorption von etwas CO durch den Katalysator weniger zuverlässig:

$$\log K_2 = -1880/T + 4,82.$$

Hilfe der in der Literatur angegebenen therm. Daten ergibt sich für die Reaktions- nen $W_1 = 13,80$ Cal; $W_2 = 8,60$ Cal u. aus den Gleichgewichtskonstanten: $[\text{H}_2\text{O}][\text{CO}] / [\text{CO}_2][\text{H}_2] = -1854/T + 1,66$ (vgl. HAHN, Ztschr. f. physik. Ch. **48**. C. **1904**. II. 491);

VIII. 1.

221

$$\log [\text{CH}_4]/[\text{H}_2]^2 = 5450/T + \log T - 7,42;$$

$$\log [\text{CO}_2]/[\text{CO}]^2 = 8620/T + \log T - 9,89$$

(vgl. JELLINECK u. DIETHELM, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **124**. 220. 1922; **1923**. IV. 509) folgt unter Benutzung der gefundenen Werte K_1 u. K_2 :

$$\log [\text{CO}_2][\text{H}_2]^3/[\text{CH}_3\text{OH}] \cdot [\text{H}_2\text{O}] = -3042/T + 6,77;$$


$$\log [\text{CH}_4][\text{CO}_2]/[\text{CH}_3\text{OH}] \cdot [\text{CO}] = 9170/T + 2 \log T - 8,88;$$

$$\log [\text{CO}] \cdot [\text{H}_2]^2/[\text{CH}_3\text{OH}] = -4896/T + 8,43.$$

Die B. von Methylalkohol aus CH_4 u. CO_2 findet danach erst bei Temp. statt, denen CH_4 nicht beständig ist, dagegen können beträchtliche Mengen Methylalkohol aus $\text{H}_2 + \text{CO}$ oder $\text{H}_2 + \text{CO}_2$ bei mäßigen Temp. erhalten werden. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 413—21. Kopenhagen, Univ.) KRÜGE

Alec Duncan Mitchell, Die Reaktion zwischen Hydroxylamin und Ferrichlorid.


Die Kinetik der Rk. zwischen FeCl_3 u. Hydroxylamin wird bei 25° untersucht. Umsetzung erfolgt im wesentlichen nach der Gleichung:



außerdem entstehen Spuren höherer Oxyde des N u. in sehr schwach sauren Lsg. etwas N_2 . In Gemischen, die ursprünglich nur FeCl_3 u. NH_3OHCl enthalten, ist Anfangsgeschwindigkeit sehr hoch, fällt aber außerordentlich schnell ab; die Reaktionsgeschwindigkeit wirkt offenbar stark hemmend. Wird von vornherein HCl oder Ferrozucker zugesetzt, so ist die Reaktionsgeschwindigkeit bedeutend geringer, sinkt aber ebenfalls noch erheblich während der Rk.; bei gleichzeitiger Ggw. von HCl u. Ferrozyanid verläuft die Umsetzung nahezu termolekular. Die Ergebnisse lassen sich — Anfangsstadium ausgenommen — durch die empir. Gleichung:

$$d x/d t = k_2 \cdot (a - x)^2(b - x)/(h + 3 x/2)^2(f + x)$$

darstellen, worin $a = [\text{Fe}^{+++}]$, $b = 2 [\text{NH}_3\text{OH}']$, $f = [\text{Fe}^{++}]$, $h = [\text{H}']$ u. k_2 der Grö. 2. Ordnung nach bei allen Verss. übereinstimmt; k_2 steigt etwas während der Rk. Gleichung läßt sich auch theoret. verstehen, wenn man annimmt, daß zunächst $1 \text{NH}_3\text{OH}'$ durch 2Fe^{+++} zu der Stufe des „Nitroxyls“ HNO oxydiert wird, u. sich dann intermediär ein Komplex gemäß dem Gleichgewicht:



bildet. Für ein intermediäres Gleichgewicht spricht auch der hohe Temperaturkoeffizient (6,5 zwischen 15° u. 25°). $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ u. $(\text{NH}_4)_2\text{Zn}(\text{SO}_4)_2$ senken die Reaktionsgeschwindigkeit herab. — Fe^{+++} kann in Ggw. von $\text{NH}_3\text{OH}'$ durch Titration mit J_2 , das aus KJ in n. H_2SO_4 -Lsg. bei Ggw. von Cu_2J frei gemacht wird, bestimmt werden. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 336—50. London.) KRÜGE

E. Jouguet, Reaktionsgeschwindigkeit und Thermodynamik. Gedanken über Theorie von Marcellin. Es wird versucht, den Marcellinschen Ansatz für die Geschwindigkeit (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **157**. 1419; C. **1915**. II. 994) auf verschiedene Weise phänomenologisch plausibel zu machen u. thermodynamisch zu stützen. (Ann. de Physique [10] **5**. 5—72.) CASSE

Robert Christie Smith, Betrachtungen über die Gleichung der Reaktionsgeschwindigkeit und eine einfache Methode zur Bestimmung des Endpunktes. Einfaches Reciprocity-Verf. zur Auswertung von Geschwindigkeitskonstanten monomolekularer Rk. (Philosophical Magazine [7] **1**. 496—99. Univ. Glasgow.) CASSE

P. W. Bridgman, Einige Ausblicke bei Versuchen unter hohen Drucken. Beschreibung der Wirkg. hoher Drucke auf einige physikal. Konstanten u. atomtheoret. Deutung derselben. Besprechung von Arbeiten auf diesem Gebiete. (Journ. Franklin Inst. **200**. 147—60.) ENSZLI

Jitsusaburo Sameshima, Bestimmung der Dichte und Kompressibilität von Acetylen. 1 l reines, durch Lsgg. von CuSO_4 , CrO_3 , KOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ gereinigtes Acetylen über P_2O_5 getrocknetes Acetylen wiegt bei 0° u. 0,5341 at 0,6241 g u. bei 1 at 1,17 g u. bei 25° u. 1 at 1,0740 g. Es folgt dem Boyle-Mariotteschen Gesetz bei di-

app. nicht. p v beträgt bei 0° u. 0,5 at 1,0057 u. bei 12 at 0,926, bei 25° u. 0,5 at 0,89 u. bei 12 at 1,0139. (Bull. Chem. Soc. Japan 1. 41—43. Tokyo, Univ.) ENSZL.
Friedrich Rinne und **Robert Höltje**, *Versuche über die Lösung von gepreßtem ungepreßtem Steinsalz*. Die Lösungsgeschwindigkeit von gepreßtem u. ungepreßtem Salz in W. wurde bestimmt. Die verschieden vorbehandelten Krystalle zeigen gewisse Unterschiede der Lösungsgeschwindigkeit, welche aber keinen bestimmten Verlauf erkennen lassen. Im allgemeinen zeigt gepreßtes NaCl eine höhere Lösungsgeschwindigkeit, doch trifft auch der umgekehrte Fall ein. Ein Spaltstück, welches während des Versuchs gepreßt wurde, zeigte eine höhere Lösungsgeschwindigkeit, ungepreßtes. Ebenso verhält sich fein zerriebenes NaCl gegenüber fein ausbleitem. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A 1926. 49—54.) ENSZLIN.

Kwantaro Endo, *Die Molekularassoziation von Phenol in Benzol und Wasser*. Bei der Messung des Verteilungskoeffizienten von Phenol zwischen Bzl. u. W. wird berechnet, daß das Phenol in der Bzl.-Lsg. zum größten Teil in der trimolekularen Form vorhanden ist. Es besteht das Gleichgewicht $3\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons (\text{C}_6\text{H}_5\text{O})_3$, welches weit nach der rechten Seite verschoben ist. Aus der Gefrierpunktserniedrigung von Phenol in W. wird gefunden, daß auch in wss. Lsgg. das Phenol in trimolekularer Form auftritt u. zwar nimmt die Anzahl der Tripelmoleküle mit der Konz. der Lsg. ab. (Bull. Chem. Soc. Japan 1. 25—29. Tokyo, Univ.) ENSZLIN.

David Glynwyn Robert Bonnell und **William Jacob Jones**, *Das Gleichgewicht zwischen Äthylalkohol und den Salzen der Alkalien und alkalischen Erden*. I. Vff. untersuchen die Löslichkeit von NaBr, BaBr₂, BaJ₂, CaBr₂ u. LiBr in A. bei verschiedenen Temp. In den Systemen A.-NaBr, A.-BaBr₂ u. A.-BaJ₂ besteht die feste Phase stets aus NaBr bzw. BaBr₂, BaJ₂, im System A.-CaBr₂ unterhalb 17,0° $\text{CaBr}_2 \cdot 4\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, zwischen 17,0° u. 73,9° $\text{CaBr}_2 \cdot 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, oberhalb 73,9° $\text{CaBr}_2 \cdot \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; die Form der Löslichkeitskurve des CaBr₂ in A. ist derjenigen von CaCl₂ in W. u. Methylalkohol analog. LiBr löst sich in A. unter starker Wärmeerzeugung zu einer schwach braunen, bei 25—30° sehr viscosen Fl. Zwischen 13,2°, dem Schmelzpunkt für das anhydr. Salz u. das Alkoholat, u. 23,8° ist $\text{LiBr} \cdot 4\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ der feste Körper, bei höheren Temp. LiBr. LiBr $\cdot 4\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ krystallisiert in flachen, der Luft sehr zerfließlichen Krystallen. BaJ₂ löst sich in A. unter Gelbfärbung bei starker Erwärmung. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 318—21. Cardiff. V.) KRÜGER.

David Glynwyn Robert Bonnell und **William Jacob Jones**, *Die Dissoziationskonstanten von Alkoholaten*. I. Die Dampfdrucke von Methylalkohol, A., n-Propylalkohol u. n-Butylalkohol über Gemischen von $\text{CaCl}_2 \cdot 4\text{CH}_3\text{OH}$ — $\text{CaCl}_2 \cdot 3\text{CH}_3\text{OH}$, $\text{CaBr}_2 \cdot 3\text{CH}_3\text{OH}$ — $\text{CaBr}_2 \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$, $\text{CaCl}_2 \cdot 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ — CaCl_2 , $\text{CaBr}_2 \cdot 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ — $\text{CaBr}_2 \cdot 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $\text{CaCl}_2 \cdot 3\text{n.-C}_3\text{H}_7\text{OH}$ — CaCl_2 , $\text{CaBr}_2 \cdot 3\text{n.-C}_3\text{H}_7\text{OH}$ — CaBr_2 , $\text{CaCl}_2 \cdot 3\text{n.-C}_4\text{H}_9\text{OH}$ — CaCl_2 , $\text{CaBr}_2 \cdot 3\text{n.-C}_4\text{H}_9\text{OH}$ — CaBr_2 bei verschiedenen Temp. werden durch die dynam. Methode bestimmt. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 321—28. Cardiff, Univ.) KRÜGER.

A. Ginsberg und **C. Nikogosian**, *Über feste Lösungen der Bisilicate von Natrium und Natrium*. Es wurde das System Na_2SiO_3 (F. 1093°) — CaSiO_3 (F. 1512°) untersucht, welches bei 1255° ein Maximum entsprechend der Verb. $2\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 3\text{CaSiO}_3$ und zwei Minima bei 1042° u. 1230° zeigt. Es besteht unbegrenzte Mischbarkeit der Komponenten untereinander u. mit der angegebenen Verb. (Nachr. geochem. Sektion der d. Metallurgen u. Chemiker Polytechn. Inst. Leningrad 1924. 36—38; N. Jahrb. Mineral. Abt. A. 1926. I. 115. Ref. P. TSCHIRWINSKY.) ENSZLIN.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

A. Gaschler, *Die Umwandlung von Gold in Quecksilber*. (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 1927; C. 1925. II. 1677.) Vff. erklärt die B. von Au aus Hg durch Abspaltung eines

Wasserstoffkerns aus dem Hg u. untersucht umgekehrt die Einw. von Wasserstoffkernen hoher Geschwindigkeit (hergestellt im 50 cm langen Kanalstrahlenrohr 4 cm lichter Weite, das mit Pd-Os-Regenerierung versehen ist, stiftförmige Anodenplattenförmige Siebkathode aus Al enthält) auf Au. Ein der Siebkathode gegenüberliegendes Feingoldblech wurde in 3 cm Abstand von der Siebkathode im Kanalstrahlenraum isoliert befestigt. Unter Berücksichtigung gewisser Vorsichtsmaßnahmen Vermeidung von Hg-Pumpen, Verdrängung der Luft durch H₂ u. Ausglühen der Apparatur, zeigten die photograph. Aufnahmen der Röhre bei Inbetriebsetzung zahlreiche Linien des H₂ u. Al aber keine des Hg, während nach 30-stünd. Betrieb Linien des Hg nachgewiesen wurden. Besonders die Linien 6152, 5461, 5670 u. 4487 konnten als Hg-Vf. festgestellt werden. — Nach Ansicht des Vf. stellt Quecksilber einen Goldwasserstoff dar, bei dem der Wasserstoffkern durch Tiefenelektronen gebunden wird. Vf. erklärt die B. von Au aus Hg nun so, daß durch intensive Anregung des Hg-Atoms ein Überschuß positiver Ladung auftritt, der sich durch Abgabe einer positiven Ladungseinheit in Form des locker gebundenen H-Kerns ausgleichen soll. (Ztschr. f. Elektrochem. 186—87. Berlin.) JOSEPH

W. Mund und W. Koch, *Die chemische Einwirkung von α -Teilchen auf Acetylen*. (Vgl. S. 831, auch 2431.) Es wird experimentell u. rechner. festgestellt, daß bei Polymerisation von Acetylen durch unter dem Einfluß von α -Teilchen erzeugte Ionenpaare, weder verschiedene Drucke, noch verschiedene Temp. (0—100°), noch geringe Luftmengen einen Einfluß auf die Zahl der polymerisierten Molekeln haben. Nimmt man den Durchschnittswert aus 11 Messungen, die in dieser Arbeit ausgeführt wurden, so ist das Verhältnis der Anzahl polymerisierter Molekeln zu der Zahl erzeugten Ionenpaare 20,2. (Journ. Physical. Chem. 30. 289—93. Louvain, La physique. Chemie d. Univ.) LASCO

W. Ehrenberg und H. Mark, *Über die natürliche Breite der Röntgenlinien*. Der Winkelbreite der Reflexion monochromat. MoK α -Strahlung an einem ausgesuchten Diamanten von oktaed. Gestalt, dessen natürliche Krystallfehler so klein waren, seine Reflexionsbreite an (111) mit der EWALDschen Breite (vgl. EWALD, Phys. Ztschr. 26. 29; C. 1925. I. 1561) hinreichend übereinstimmt, ergab sich für die natürliche Breite der MoK α -Linie der Wert $\Delta\lambda = 0,15 \text{ X E}$. Mit Hilfe der üblichen Formeln berechnet sich daraus die Lebensdauer des in der K-Schale angeregten Atoms zu 10^{-14} sec. (Naturwissenschaften 14. 322—23. Berlin-Dahlem.) JOSEPH

W. Bothe, *Ein Versuch zur Strahlungsstatistik*. (Vgl. BOTHE u. GEIGER, Ztschr. f. Physik 32. 639; C. 1925. II. 1584.) Vff. geben eine Skizze u. eine eingehende Beschreibung des zur statist. Unters. der Fluoreszenzstrahlung benutzten Doppelzählers bei Bestrahlung in der Achsenrichtung mit FeK α -Strahlung etwa auf jedes 2. einfallende Quant anspricht. Damit ist die natürliche Empfindlichkeitsgrenze für den Nachweis von Wellenstrahlung im wesentlichen erreicht. Die Unters. ergab, daß sicher weniger als $\frac{1}{5}$ der Koinzidenzen auftreten, welche nach der Bohrschen Statistik zu erwarten wären. Das Bild der Lichtquanten erscheint als Ausdruck für die Erhaltung der Energie bei den Elementarprozessen der Emission u. Absorption prakt. ebe mit Wellen als angemessen. Die Frage nach einer lokalisierbaren Energie in dem allgemeinen Strahlungsfeld kann durch den Vers. nicht beantwortet werden. Nebenresultat ergab sich, daß bei einer Fluoreszenzemission von nur 5 Elementarprozessen pro sec. die Strahlung sich noch genau so verhält, wie bei starker Emission. Die Zahl der erzeugten Photoelektronen ist proportional der Intensität. (Naturwissenschaften 14. 321. Berlin-Charlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanst.) JOSEPH

B. T. Barnes, *Interferometermessungen der Druckveränderung der Linien im Bogenspektrum des Nickels*. Es werden die Wellenlängen von 72 Linien des Bogenspektrums des Ni bei 760 mm u. 6 mm Druck gemessen. Der Druckkoeffizient

en beträgt meist weniger als 0,005 Å pro at, kann aber bis 0,03 Å pro at steigen. (Astrophys. Journ. **63**. 127—32. New Haven, Conn., Univ.) ENSZLIN.

René Déchéne, *Untersuchung des Spektrums von explodierenden Fäden*. Es werden die Emissions- u. Absorptionsspektren von Metallfäden, welche durch einen Kondensator zerstäubt werden können, bestimmt. Die Intensität wächst mit der Stärke der Verbrennung. Auf einem kontinuierlichen Bande erscheinen die einzelnen Linien. Eine Methode zur Unterscheidung von Flammen-, Bogen- u. Funkenpektren wird angegeben. Diese beruht darauf, daß die Linien des Bogenspektrums am leichtesten, die des Flammenspektrums mit großer Schärfe erscheinen. Die Linien des Funkenpektrums können auch hervortreten, aber nur, wenn die Gewalt der Verbrennung sehr groß ist. Die Unters. erstreckt sich auf Fäden von *Cu*, *Ni*, *u. Fe*, deren Linien für die verschiedenen Arten von Spektren geordnet wurden. (Journ. de Physique et le Radium [6] **7**. 59—64. Paris, Ecole Normale Supérieure.) ENSZ.

Félix Esclagon, *Trennung der Spektren verschiedener Ordnungen beim Cadmium*. Nach der von LÉON BLOCH beschriebenen Methode werden die Linien für die verschiedenen Ionisationszustände des Cd geordnet. Durch das evakuierte Gefäß aus Quarz mit Cd wird ein Hochfrequenzstrom gesandt. In einem Spektrographen werden die Wellenlängen bestimmt. Dabei entsprechen die kurzwelligsten Strahlen dem höchsten Ionisationszustand des Cd. Eine Erhöhung der Temp. macht sich zugunsten der kurzwelligen Strahlen bemerkbar. Es gelingt so, durch geeignete Einstellung langwelligen Strahlen von Cd I—III zu erhalten. Die Strahlen von Cd IV sind sehr kurzwellig. Die Wellenlängen mit den Intensitäten sind in einer Tabelle angegeben. (Journ. de Physique et le Radium [6] **7**. 52—58. Paris, Ecole Normale Supérieure.) ENSZLIN.

Sigmund W. Leifson, *Absorptionsspektren einiger Gase und Dämpfe im Schumanngebiet*. Mit einem Vakuumspektrographen mit Fluoritfenstern wurden die Absorptionsspektren von *O₂*, *N₂*, *N₂O*, *NO*, *NO₂*, *CO*, *CO₂*, *HCl*, *CH₄*, *H₂O*, *CCl₄* u. A. in dem Gebiet zwischen 1000 u. 2000 Å untersucht. (Astrophys. Journ. **63**. 73—89. California Univ.) ENSZLIN.

Richard Alan Morton und William Charles Victor Rosney, *Absorptionsspektren und Tautomerie. I. Ketoenoltautomerie. Acetessigester, Acetylaceton und Benzoylcampher*. (Vgl. auch S. 1807.) Dämpfe von Acetessigester, auf —80° abgekühlt, zeigen eine Absorptionsbande bei $\lambda_{\max} = 2381 \text{ Å}$, $\epsilon_{\max} = \text{ca. } 1000$, dünne Schichten des fl. Esters $\lambda_{\max} = 2430 \text{ Å}$, $\epsilon_{\max} = 367$. Dieselben Banden lassen sich auch in Lsgg. von Ä., A. u. Hexan beobachten. Da das Verhältnis $\epsilon_{\text{Alkohol}}/\epsilon_{\text{Hexan}}$ (100/9100) mit dem Verhältnis der Enolgehalte in denselben Lösungsmitteln (durch Titration bestimmt) gut übereinstimmt, kann die Bande bei 2430 Å dem Enol zugeschrieben werden. Die Bande verschiebt sich für Äthylacetessigester nach 2550 Å, β -Äthoxycrotonsäureäthylester nach 2348 Å. Weitere Unterss. machen eine schwache Absorptionsbande bei 2700 Å wahrscheinlich. Acetylaceton zeigt in wss. u. alkoh. Lsgg. eine starke Bande bei 2750 Å, das Verhältnis der molekularen Extinktionskoeffizienten $20/2200 = 4,05$ stimmt mit dem Verhältnis 4,2 der Enolgehalte in diesen Lösungsmitteln überein. Es scheint wahrscheinlich, daß die Absorptionsbande der Ketoform die gleiche Wellenlänge besitzt wie die Enolform, während die Alkalisalze eine vom Enol abkommene verschiedene Absorption zeigen. Die molekularen Extinktionskoeffizienten der Ketoform des α -Benzoylcamphers u. Camphers sind von derselben Größenordnung (—100), ebenso die Extinktionskoeffizienten der Enolmodifikation u. des Dibenzoylcamphers (10 000—14 000). Alkalizusatz zu Lsgg. von α -Benzoylcampher erzeugt eine neue Bande. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 706—13.) TAUBE.

Richard Alan Morton und Edward Rogers, *Absorptionsspektren und Tautomerie. II. Mesityloxydoxalsäureäthylester, Formylphenylessigsäureäthylester und Ditylbernsteinsäureäthylester*. (I. vgl. vorst. Ref.) Mesityloxydoxalsäureäthylester bildet

nach FEDERLIN (LIEBIGS Ann. **356**. 261 [1907]) drei Modifikationen, α -F. 21°, β -F. bis 60° u. eine dimere Form, F. 175°. Die dimere Form zeigt keine selektive Absorption u. stört die Absorption der β -Form nicht. Die β -Form zeigt in A., Hexan oder (eine gut ausgebildete Bande von hohem Extinktionskoeffizienten mit einem, mit Lösungsm. variierenden $\lambda_{\max}$. Die Enolform besitzt eine andere Bande von hohem Extinktionskoeffizienten u. einer schwächeren Verschiebung mit dem Lösungsm. In der α -Form in irgend einem der Lösungsmm. aufbewahrt zeigen eine Verschiebung der Absorptionsmaxima nach dem Ultraviolett, während die gemessene Absorptionskurve die Summe der Kurven für die α - u. β -Formen ergibt. Bei Ggw. von Alkali sitzt die β -Form drei Banden bei $\lambda_{\max} = 3512, 2867$ u. $2450\text{--}2500$ Å. Die Kurve ist die Summe zweier Kurven u. zwar derjenigen des β -Esters mit einem Maximum bei 2825 Å u. derjenigen des Na-Deriv. des α -Esters mit Maxima bei 3510 u. 2457 Å. Unterss. machen es wahrscheinlich, daß die Isomerie $\alpha \rightleftharpoons \beta$ des Mesityloxydoxales ein Fall von Ringkettentautomerie darstellt. *Formylphenylessigsäureäthylester* Kp.₁₀ 127°, F. 70° u. F. 100° besitzen keine Maxima der Absorptionskurven, weisen aber untereinander ähnliche Extinktionskoeffizienten (7500 bei 2600 Å) zeigen. Mit Alkali entsteht eine definierte Bande bei 2740 Å. Die spektrograph. Unters. spricht für die cis-trans-Isomerie. *Diacetylbernsteinsäureäthylester* von den FF. 92 u. 31° zeigen $\lambda_{\max} = 2490$ Å bei $\epsilon_{\max} = 7600$ u. 6250 , mit Alkali eine Bande $\lambda = 2750$ Å. Auch hier liegt wahrscheinlich cis-trans-Isomerie vor. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 713—18.)

TAUB

Richard Alan Morton, *Absorptionsspektren des Mesityloxyds*. (Vgl. vorst. I. HARRIES (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **32**. 1329 [1899] u. LIEBIGS Ann. **330**. 189 [1899]) gibt an, daß Mesityloxyd mit 40% Na-Bisulfit 36 Stdn. geschüttelt 30% des Mesityloxyds unverändert zurückläßt. Vf. untersucht diese Verhältnisse mit einem techn. Mesityloxyd vom Kp. 128°, welches sich in seinen spektrograph. Eigenschaften mit einem synthet. hergestellten Präparat ident. erwies. Die Unterss. ergaben: 1. Das gesättigte Mesityloxyd reagierte mit Na-Bisulfit; 2. Die Ausbeute an Bisulfitverb. war nahezu quantitativ; 3. Das aus der Bisulfitverb. regenerierte Keton war mit dem Ausgangsmaterial bzgl. des Kp. u. Absorptionsspektrums in fl. Zustände wie in alkoh. Lsg. ident.; 4. Es ließen sich vier Absorptionsbanden feststellen. Verschiebungen durch das Lösungsmittel konnten beobachtet werden; während das fl. Keton u. sein Dampf die Frequenz der Maximalabsorption zeigten. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 719—724.)

TAUB

W. H. Martin und **A. F. W. Cole**, *Die Zerstreuung von Licht in gasförmigen und flüssigem Chlor*. (Vgl. S. 2285.) Durch ein mit Cl₂ gefülltes Gefäß wurde das Licht eines Kohlebogens mit einem CeO₂-Kern geschickt u. die Zerstreuung des Lichtes mit der des Ätherdampfes verglichen. Dieses Verhältnis beträgt 0,99, was gut mit der Rayleighschen Formel übereinstimmt. Die Polarisation des Lichts beträgt 0,41 für Chlordampf u. 0,24 für fl. Cl₂. (Trans. Amer. Electr. Soc. **49**. 6 Seiten. Sep.)

EN

Abraham Lincoln Marshall, *Die photochemische Reaktion zwischen Wasser und Chlor*. (Vgl. S. 1110.) Ausführliche Besprechung der Literatur über die photochem. Rk. zwischen H₂ u. Cl₂, unter besonderer Berücksichtigung der modernen physikal.-chem. Theorien des Reaktionsmechanismus. Vf. nimmt an, daß die Halogenmoleküle durch Absorption von Strahlung soviel Oscillationsenergie aufnehmen, daß sie in ein normales u. in ein erregtes Atom dissoziieren. Aus der langwelligeren Grenze der kontinuierlichen Spektren des Cl₂ ($480 \mu\mu$) u. Br₂ ($520 \mu\mu$) u. der Kurvenverengungsgrenze des J₂ ($500 \mu\mu$) (vgl. MECKE, Ann. der Physik [4] **71**. 104; C. 1. I. 127) folgt für die Erregungsenergie des einen bei der Trennung des Halogenmoleküls entstehenden Atoms: Cl₂ 0,3 V; Br₂ 0,5 Volt; J₂ 1 V. (Trans. Amer. Electr. Soc. **49**. 36 Seiten. Sep. Princeton N. J., Univ.)

KRÜGE

Eric K. Rideal und **Herbert S. Hirst**, *Durch Resonanzstrahlung hervorgerufene mechanische Wirkungen*. (Vgl. S. 1362 u. H. S. TAYLOR, S. 2652.) Vff. stellen die Punkte dar, in denen sie mit TAYLOR übereinstimmen u. die, in denen die Meinungen auseinandergehen. (Naturwissenschaften 117. 449—50. Cambridge, Lab. of Physical Chem.)

JOSEPHY.

San-ichiro Mizushima, *Über die anomale Dispersion und Absorption von elektrischen Wellen*. I. Bei verschiedenen Wellenlängen u. Temp. wurde die anomale Dispersion u. Absorption von Aceton, Glycerin, Methyl-, Äthyl-, n- u. iso-Propyl-, u. iso-Butyl- u. n-Amylalkohol bestimmt. Und zwar kamen Wellenlängen von 10 m in Anwendung. Bei Glycerin verändert sich die D.E. (ϵ) mit steigender Temp. erreicht bei 24° ein Maximum ($\epsilon = 41$) u. fällt wieder. Bei Methylalkohol beträgt bei —84° 62 u. erreicht fallend bei 45° den Wert 28. A. zeigt bei —30° ein Maximum ($\epsilon = 32$). Ähnlich verhalten sich die anderen Alkohole. Die D.E. sind in Tabellen gegeben. (Bull. Chem. Soc. Japan 1. 47—53. Tokyo, Univ.)

ENSZLIN.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

W. W. Taylor, *Die Präzipitation von Solen durch mehrwertige Ionen*. Vf. stellt ein systemat. Unters. an über die Flockung von Eisenhydroxydsol durch die dreiwertigen Anionen von Kaliumtrisulfomethan, $\text{CH}(\text{SO}_3\text{K})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ u. Natriumtrisulfonaphthalin, $\text{C}_{10}\text{H}_5(\text{SO}_3\text{Na})_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ u. vergleicht diese mit der Flockung durch NaCl , Na_2SO_4 u. Na_2HPO_4 . — Beim Zusatz von positivem Eisenhydroxydsol zu einer Lsg. von Kaliumtrisulfomethan oder Na-Trisulfonaphthalin entsteht nur eine Präzipitationsschicht, die bei einer Konz. von 0,0002-n. beginnt u. bis zu hohen Konz. (n. oder 25%) bestehen bleibt. — Beim Zusatz von Na_2HPO_4 treten zwei Flockungszonen auf, zwischen denen eine Zone der Nichtflockung liegt. Diese Erscheinung ist offenbar hervorgerufen durch die Anwesenheit von OH-Ionen, die bei der Hydrolyse des Salzes entstanden sind. Wenn dem so ist, so ist auch die ähnliche Erscheinung, die bei negativen Solen u. den dreiwertigen Kationen Fe^{+++} u. Al^{+++} auftritt, der Ggw. von durch Hydrolyse entstandenen H-Ionen zuzuschreiben. — Mehr oder weniger periodische Änderungen im Ausmaß der Flockung treten besonders bei niedrigen Konz. hervor. — Die Wertigkeitsregel, welche das Flockungsvermögen eines Ions von seiner Wertigkeit abhängig macht, ist für die untersuchten normalen Anionen u. beiden Trisulfonsäuren nicht gültig. (Proc. Roy Soc. Edinburgh 45. 323—33. 1915. Physiolog. Abteilung d. Univ. Edinburgh.)

LASCH.

C. Paal und **Leonardo di Pol**, *Über kolloides Wismuthydroxyd*. Die obere Grenze des Schutzwirkg. von protalbinsaurem u. lysalbinsaurem Natrium auf kolloidales Wismuthydroxyd liegt bei einem ungefähr 20% Wismut enthaltenden Gehalt an Metahydroxyd. Durch Erwärmung der beiden Schutzkolloidsäuren mit Natronlauge vor Zugabe des Wismutnitrats gelingt es wie beim koll. Kupferhydroxyd (Kolloidchem. 30. 2; C. 1922. III. 424) höherprozentige Wismuthydroxydhydrosole herzustellen, die an sich beständig sind, jedoch in feste Form gebracht mehr oder weniger vollständig in die irreversiblen Gele übergehen. Die auch anderweitig beobachtete stärkere Schutzwirkg. des protalbinsauren Na im Vergleich zu der des Lysalbinats wurde auch hinsichtlich des Wismuthydroxyds festgestellt. Für die Darst. von kolloidem Wismuthydroxyd ($\text{BiO} \cdot \text{OH}$) ist die Vorbehandlung der beiden Schutzkolloide mit NaOH der Wärme nicht anwendbar, da die in feste Form gebrachten Kolloide rasch irreversibel werden. — Kolloides Wismutmetahydroxyd mit protalbinsaurem Natrium. Aus 2 g protalbinsaurem Na in 50 ccm W. 12 ccm NaOH u. Wismutlsg. Das im Vakuum bei 50° eingeeingte u. im evakuierten Exsiccator über H_2SO_4 zur Trockne brachte Prod. bildet gelbe, schwach glänzende, spröde Krusten, die sich im W. leicht vollständig zum Hydrosol lösen. — Kolloides Wismutmetahydroxyd mit lysalbinsaurem Natrium. Aus 2 g lysalbinsaurem Na, 50 ccm W. 12 ccm n. NaOH u. 17,7 ccm

Glycerin-Wismutnitratlsg. wurden 2,547 g gelbe, glänzende amorphe, leicht brechliche Lamellen u. Körner erhalten, die sich in W. leicht u. vollständig zu Hydrosol lösten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 874—77.) W. HAA

C. Paal und **Leonardo di Pol**, *Über kolloides Wismut*. (Vgl. vorst. Ref.) Präparat von kolloidem *Wismutmetahydroxyd* (u. zwar mit protalbinsaurem u. lysalbinsaurem) wurden mit verschiedenen Reduktionsmitteln auf ihre Eignung zur Herst. möglichst harter, in feste Form überführbarer *Wismuthydrosole* geprüft. Es erwiesen sich Hydroxylamin u. Natriumhypophosphit in der Wärme als wirkungslos. Freie unphosphorige Säure lieferte ein rasch sich reoxydierendes Wismuthydrosol, das in das irreversible Gel überging. Zinnchlorür in alkoh. Lsg. des Wismuthydrosols bewirkte Red. zu kolloidem Bi, das mit den freien Schutzkolloidsäuren ausfiel, in alkalihaltigem W. zur Wismuthydrosol löst, das aber stets adsorbiertes Zinnsäurehydrosol enthält. Alkoh. Traubenzuckerlsg. reduziert in der Wärme glatt zu Wismuthydrosol, das sich leicht in feste, kolloidlösliche Form überführen läßt. Als geeign. Red.-Mittel zur Darst. von in feste, kolloidlösliche Form überführbaren Wismuthydrosolen erwies sich alkoh. Formaldehydlsg. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 877—882. Leipzig, Univ.) W. HAA

S. Ghosh und **N. R. Dhar**, *Der Einfluß von Ionen mit der gleichen Ladung wie dispergierten Teilchen auf die Umwandlung von Emulsionen*. (Vgl. Journ. Phys. Chem. **29**. 659; C. **1925**. II. 1513.) Es wird gezeigt, daß eine Ölemulsion große Ähnlichkeit mit einer kolloiden Suspension besitzt, u. daß die für Sole aufgestellten allgemeinen Regeln auch für Emulsionen gelten. Die Trennung einer Öl- in Wasseremulsion in zwei Schichten kann als eine Koagulation der dispersen Ölteilchen angesehen werden. Die Umkehrung der Phasen von Öl- in Wasseremulsionen beruht wahrscheinlich auf Dispergierung der Wasserteilchen, die im Öl positiv geladen sind. — Aus den Versuchsergebnissen verschiedener Forscher wird geschlossen, daß Salze wie *NaCl*, *KCl*, *Citrat*, *NaOH* die B. von Emulsionen vom Typus Öl- in -W. begünstigen. Daraus folgt, daß die Anionen wie *Cl'*, *Citrat'''*, *OH'* etc. von den Ölteilchen vorzugsweise adsorbiert werden. — Es wird bewiesen, daß die Adsorption der Anionen für die gegensätzliche Wrkg. verantwortlich zu machen ist, die einwertige Salze wie *NaCl*, *KCl* etc. gegen zwei- u. dreiwertigen wie *Ba(NO₃)₂*, *AlCl₃*, *Al₂(SO₄)₃* auf die Phasenumwandlung einer Ölemulsion haben. — Ferner wird gezeigt, daß der abnormale Verdünnungseffekt, darin besteht, daß man zur Koagulation einer verd. Emulsion mehr Elektrolyt braucht als für eine konz., u. die erwähnte antagonist. Wrkg. von ein u. mehrwertigen Salzen eng zusammenhängen u. Hand in Hand gehen. — Schließlich wird gezeigt, daß die Haltbarkeit einer Ölemulsion in Ggw. von Seifen von der elektr. Ladung der so adsorbierten Seifenmizellen abhängt. (Journ. Physical Chem. **30**. 294—305. Allahabad, Indien, Univ.) LASCH

N. K. Adam und **G. Jessop**, *Die „Gasgesetze“ in Oberflächenlösungen*. Sie wenden sich gegen die Erklärung von MARCELIN (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **1922**; C. **1925**. II. 1662), welche dieser für das von den Gasgesetzen abweichende Verhalten der Oberflächenhäute von *Ölsäurelsgg.* u. *Benzylbenzoat* gegeben hat. Die Untersuchungen der Vff. (S. 2548) weisen solche Abweichungen nicht auf, es sind auch keine Anzeichen für stärkere Assoziation der Moll. vor der Kondensation vorhanden. Vff. wiederholen die Verss. mit den beiden genannten Substanzen; besonders die Ölsäurefilme verhalten sich ebenso wie die der übrigen Fettsäuren (l. c.). Die Benzylbenzoathäutchen sind sehr unbeständig. Die Diskrepanz der Ergebnisse von MARCELIN, an dessen Methoden Vff. scharfe Kritik üben, von denen der Vff. bleibt unerklärt. (Nature **117**. 484—485. Sheffield, Univ.) JOSEPH

L. Jendrassik, *Beeinflussung der Oberflächenspannung durch Adsorption*. Kommen wss. Lsgg. von Kolloiden u. Krystalloiden mit Filtrierpapier in Berührung, so wird ihre mittels der Ringmethode von BRINKMANN (Münch. med. Wchschr.

); C. 1922. II. 298) gemessene Oberflächenspannung beträchtlich gesenkt. Diese Lsg. kann mittels stalagmometr. Messung bei den meisten Lsgg. nicht nachgewiesen werden. Beim Durchgang am Stalagmometer oder an andern Capillaren wird die Lsg. zum Teil oder ganz rückgängig gemacht. Talkum wirkt bei einzelnen Lsgg. herabsetzend; bei andern steigend auf die Oberflächenspannung. Die Verss. wurden geführt an Lsgg. von *Eiereiweiß*, *Pferdeplasma*, *Gelatine*, *Pepton*, *Hämoglobin*, ferner an Alkaloiden wie *Eucupin*, *Cocain*, *Novocain* u. deren Salzen, an anorgan. Salzen CaCl_2 u. KCl u. an *Na-Oleatlsgg.* W., A. u. Ä. zeigen die Erscheinungen nicht. — Wird bei diesen Einflüssen der physikal. Zustand der Lsg. verändert, vielleicht auch die Konz. in der Oberflächenschicht. (Biochem. Ztschr. 169. 178—85. Budapest, physiolog. Inst. Univ.) LASCH.

René Fabre und **Henry Penau**, *Über ein beschleunigtes Dialysierverfahren und seine Verwendung bei der Bereitung von dialysiertem Eisenoxyd.* Die Dialyse wird durch beschleunigt, daß in den Dialysierschlauch ein Glasrohr eingeführt wird, dessen kugelige Erweiterung 4 s. Löcher besitzt, durch die ein indifferentes Gas gegeben wird. Die 14 Tage in Anspruch nehmende Dialyse von Eisenoxyd (bis zur Freiheit) wird auf diese Weise auf 3—4 Tage verkürzt, wenn das Außenwasser häufig gewechselt wird. Die Bereitung des Eisenoxyds nach dem Verf. der Vff. unterscheidet sich von dem Verf. von MICHAELIS nur dadurch, daß statt $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ CO_3 genommen wird. (Bull. Soc. Chim. Biol. 8. 199—202.) OPPENHEIMER.

Alois Gatterer, *Die Absorption von Gasen durch kolloidale Lösungen.* Die Absorption von CO_2 u. C_2H_2 durch Sole verschiedener Konz. von *Preußischblau* u. besonders hochdisperssem $\text{Fe}(\text{OH})_3$ wird zwischen 5° u. 25° untersucht u. zur Charakterisierung der Sole ihre Zus., D., elektr. Leitfähigkeit u. Gefrierpunktniedrigung bestimmt. Die Löslichkeit von CO_2 ist in beiden Solen größer als in W., die von C_2H_2 kleiner als in W. Die beträchtliche Absorption von CO_2 durch $\text{Fe}(\text{OH})_3$ -Sol l auf chem. Vorgänge — B. kolloider Komplexe von $[\text{x Fe}(\text{OH})_3]_y \text{Fe}'_2(\text{y CO}_3)_3$ zurückgeführt. Der numer. Wert des negativen Temperaturkoeffizienten nimmt mit sinkender Temp. schnell zu. Verss. mit $\text{Fe}(\text{OH})_3$ -Solen verschiedener Dispersität und verschiedenem Gehalt an Peptisationsmitteln zeigen, daß das Absorptionsvermögen mit weniger dispersen Sole mit steigender Temp. besonders stark abfällt. Die inerte Natur des C_2H_2 wird durch Messung der elektr. Leitfähigkeit von W., das mit C_2H_4 gesätt. ist, bestätigt. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 299—316. Innsbruck.) KRÜGER.

Elisabeth Dingemans und **Ernst Laqueur**, *Über die Adsorption von Giften an Kohle.* III. Mitt. *Über die Verteilung von Giften zwischen Magen- bzw. Darmwand und Kohle.* (II. vgl. Biochem. Ztschr. 160. 407; C. 1925. II. 1663.) Bei der therapeut. Verwendung von Kohle zur Bestreitung eines an den Körper per os eingebrachten Giftes handelt es sich um die Verteilung des Giftes zwischen Kohle u. Eingewand. wurde daher in frische Magen oder Därme die Giftlsg. eingefüllt u. nach einiger Zeit, wobei Magen oder Darm bewegt wurden, das Adsorbens, die Kohle, bei anhaltender Bewegung zugesetzt. Durch Vergleich der Giftmengen in der Lsg. ohne Zusatz von Kohle u. mit solchem, erhält man eine Vorstellung von der Leistung der Kohle. — Verss. wurden mit *Supra-Norit-Kohle* u. zwei mit *Merckscher Kohle* angestellt. — Beim Schütteln einer Sublimatlsg. im Schweinemagen wurden nach 10 Min. 32,5%, nach 45 Min. 42%, nach 55 Min. 47% vom Magen adsorbiert; ohne Schütteln werden nach 10 Min. nur 12% adsorbiert. Beim Schütteln mit Kohle geht fast das gesamte vom Magen adsorbierte Sublimat an die Kohle. Nur ein kleiner Anteil bleibt im Magen u. zwar in der Magenfl. zurück. Durch wiederholtes Schütteln mit neuer Kohle gelingt es nicht, das Filtrat sublimatfrei zu erhalten. Auch beim Schütteln mit Sublimat, das an Kohle adsorbiert ist, wird vom Darm ein kleiner Teil losgelöst. Dieses wird im Filtrat wiedergefunden. — Ebenso wie bei den Verss. in vitro zeigte sich bei

den Magenverss. die Supra-Norit-Kohle der Merekschen Kohle in bezug auf das sorptionsvermögen überlegen. — Bei analogen Verss. mit *Strychnin* wurden nach nütgendem Kohlezusatz nur Spuren Strychnin im Filtrat der Magenfl. nachgewiesen. Wurde das von der Kohle adsorbierte Strychnin im Darm geschüttelt, so wurde der Darmfl. kein Strychnin gefunden. (Biochem. Ztschr. **169**. 235—44. Amsterd. Pharmako-therapeut. Lab. d. Univ.)

Kshitish Chandra Sen, *Über die chemische Natur der Adsorption*. Es zeigt, daß der Grad der Adsorption bei chem. akt. Oberflächen in hohem Maße von der chem. Natur des adsorbierbaren Stoffes abhängt. Die experimentellen Ergebnisse umfassen die Adsorption von Säuren u. Basen durch bas. u. saure Stoffe, ferner die Änderung der Ionenadsorption eines Salzes u. seine Abhängigkeit von der Natur der Oberfläche. Zugleich wird eine Übersicht über einige bei elektroosmot. Messungen erhaltenen Resultate gegeben. — Als Adsorbentien wurden verwendet: $Cr(OH)_3$, $Al_2(OH)_3$, MnO_2 , $Fe(OH)_3$ u. *Mn-Dioxydhydrat*, als adsorbierbare Stoffe, H_2SO_4 , $NaOH$, K_2CO_3 , CH_3COOH , As_2O_3 , ferner die Chloride u. Sulfate des *Cu*, *Mn*, *Cd*, *Mg*, *Zn*. — Es wurde gefunden, daß die Ggw. eines leicht adsorbierbaren Anions den Grad der Adsorption des Kations erhöht. Negative Ionen werden oft durch negativ geladene Oberflächen adsorbiert, gemäß der chem. Affinität, die zwischen beiden herrscht. — Die Adsorption eines negativen Ions stabilisiert ein negativ geladenes Sol in Koagulationsverss., während es auch die Gesamtadsorption des Salzes erhöht. Ferner braucht das gleichgeladene Ion nicht in der gleichen Weise in Salzlsgg., die verschiedene Kationen enthalten, adsorbiert zu werden. FREUNDLICH'S Auffassung, daß äquivalente Mengen verschiedener Ionen zur Ladungsneutralisation notwendig sind, ist nicht haltbar. (Biochem. Ztschr. **169**. 192—99. Allahabad, Indien, Univ.)

B. Anorganische Chemie.

Christina Cruickshank Miller, *Die langsame Oxydation des Phosphortrioxyd*.
I. *Die Einwirkung von Wasserdampf auf Phosphortrioxyd*. Die langsame Oxydation von P_2O_3 kann ohne u. mit Leuchterscheinung vor sich gehen. Es wurde die letztere untersucht u. dabei die Spektren des P_2O_3 aufgenommen u. die Wrkg. des Wasserdampfgehalts untersucht. P_2O_3 wurde bei 30 mm Druck dest. Es erstarrt bei gewöhnlicher Temp. u. schmilzt bei $22,5^\circ$. Analysiert wurde es durch Einbringen in $HCCl_3$, fügen von W. u. Br_2 , bis das $HCCl_3$ braun blieb, Kochen mit konz. HNO_3 bis zum Flockenwerden u. Bestimmen als $Mg_2P_2O_7$. In einem besonderen App. wurde die Einwirkung von P_2O_3 bei 25° untersucht. Die nötigen Tensionen des W. (1—23 mm) wurden durch Hydratgemische erhalten. Es gelang dabei das Glühen 12—24 Stdn. zu beobachten. Bei der Einw. von W. tritt eine beträchtliche Druckerhöhung ein unter Bildung von Phosphinen u. zwar wurde im Gasraum 80—98% PH_3 gefunden. An den Wänden setzt sich ein gelber Körper ab, welcher in geschmolzenem P nur wenig löslich ist u. selbst bei 250° nicht verbrennt. Außerdem wurden Krystalle von P_2O_5 erhalten. Nach der starken Druckerhöhung tritt ein Druckabfall ein, welcher auf Zersetzung des PH_3 mit P_2O_3 zurückgeführt wird. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh **46**. 76—85.)

Alexander Findlay und **James Cruickshank**, *Das reziproke Salzpaar (Na, Ba) (Cl, NO_3) in wässriger Lösung bei 20°* . Die Gleichgewichte im System $NaNO_3 - BaCl_2 - W.$ werden bei 20° bestimmt. Es ergibt sich, daß zur Herst. von $Ba(NO_3)_2$ durch doppelte Umsetzung von $BaCl_2$ u. $NaNO_3$ möglichst hohe Anfangskonzn. von $NaNO_3$ vorteilhaft sind. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 316—18. Aberdeen Univ.)

N. Juschewitsch und **M. Lewin**, *Überführung des Natriumchromats in Chromat mit Hilfe der Kohlensäure*. Die in einer früheren Arbeit theoret. nachgewiesene Möglichkeit, Chromate in Bichromate mit Hilfe von CO_2 unter Druck überzuführen, wurde

! nun durch Verss. festgestellt. Läßt man eine Na_2CrO_4 -Lsg. (16,98% Cr) bei 23° dn. unter auf 4 at komprimierter CO_2 stehen, so erhält man 66% Cr in der Bimatform. Bei geringerer Versuchsdauer ist die Ausbeute geringer, wohl weil bei Verss. die Sättigung der Lsg. mit CO_2 zu langsam vor sich ging. Unter 8 at wird die in 2 Stdn. beendet; eine 14,3%ig. (auf Cr bezogen) Lsg. wurde dabei zu 65% umandelt. Durch Einengen der sich dabei ergebenden Lsgg. wird ein Teil von Na_2CrO_4 schieden u. das Verhältnis Bichromat-Cr zum Gesamt-Cr auf 0,77 erhöht. Beim andeln dieser Lsg. mit CO_2 unter 8 at Druck steigt dieses Verhältnis auf 0,85. ur Vervollständigung der Bichromatbildung muß also noch mit H_2SO_4 angesäuert len, der Verbrauch von H_2SO_4 beträgt aber nur ca. $\frac{1}{5}$ des bei ausschließlicher endung von H_2SO_4 stattfindenden, wie auch die Menge des Abfallsprod., Na_2SO_4 . chfalls wird nur eine Hälfte von Soda verbraucht. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. -32. Moskau, Mendelejew-Inst.)

BIKERMAN.

Sydney Raymond Carter und **Norman Holt Hartshorne**, *Das System Ferroxidosphorsäure—Wasser und einige seiner Oxydationsprodukte.* (Vgl. Journ. Chem. London 123. 2223; C. 1923. III. 1505.) Das Gleichgewicht zwischen Fe u. wss. O_4 mit 7,4—57,5% P_2O_5 wird bei 70° in CO_2 -Atm. untersucht. Mit steigender rekonz. treten nacheinander folgende, hellgrüne Phosphate als Bodenkörper auf: noch nicht beschriebene Phosphat $2\text{FeO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (längliche Prismen, opt. achsig, positiv), $2\text{FeO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ u. $\text{FeO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Das Salz $2\text{FeO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{O}$ existiert in 2 Formen, einer leichter l., sehr fein krystallinen Form u. in schwerer it ausgebildeten sechsseitigen Platten, vielleicht tritt es noch in einem 3. Habitus — Die H_3PO_4 -armen Gemische werden sehr leicht oxydiert; die entstehenden raunen Krystalle von *Ferriphosphat*, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, können durch kurze n. von verd. HCl von beigemengtem Ferrophosphat getrennt werden. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ bildet 2 Modifikationen; die braune β -Form (rechteckige Prismen) ist hoher, die schwach rosa α -Form bei geringer Konz. an Ferroionen beständig. β -Form ist wahrscheinlich wahres Ferriphosphat $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, die α -Form komplexe Verb. $[\text{Fe}(\text{PO}_4)_2]\text{Fe} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 363 374. Edgbarton, Birmingham, Univ; London, Univ.)

KRÜGER.


A. Raynaud, *Über die Bromierung des Zinks in Gegenwart verschiedener organischer Lösungsmittel.* Vf. untersucht die Rk. zwischen Zn u. Br_2 in Ggw. organ. ungsmm., wie Ä., Bzn., Lg., CCl_4 , Octan, PAe. Nur in denjenigen dieser Lösungsmm. sinigen sich Zn u. Halogen, welche gleichzeitig sowohl Br_2 als auch das gebildete Br_2 lösen, wie z. B. W. u. Ä. Diese Lösungsmm. bilden Verb. mit ZnBr_2 . Die Verb. $\text{Br}_2 \cdot (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$ wurde isoliert, weiße blattartige Krystalle. (C. r. d. l'Acad. des nces 181. 1069—71.; Bull. Soc. Chim. de France [4] 39. 195—201. Montpellier, . des sciences.)

JOSEPHY.



H. Pélabon, *Über die zwei Formen des Mercurioxydes und die direkte Bildung Oxychloride und Oxybromide.* (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 1500; Bull. . Chim. de France [4] 37. 854; C. 1925. II. 714. S. 40). Man kann die chem. Veredenheit des gelben u. des roten HgO mit Hilfe von HgCl_2 bzw. HgBr_2 beweisen. rschichtet man das Oxyd mit HgCl_2 (beide feucht), so bildet sich im Falle des roten) eine schwarze Grenzschicht mit der Geschwindigkeit von 0,22 mm/Tag, im Falle) gelben eine dunkelgelbe mit der Geschwindigkeit von 0,7 mm/Tag. Werden die ver statt mit W. mit NaCl- oder KCl-Lsg. befeuchtet, so steigt die Geschwindigkeit mentlich der B. vom dunkelgelben Körper) stark an. Aus trockenen Substanzen steht in beiden Fällen u. mit sehr geringer Geschwindigkeit nur die schwarze Sub. z. Sie entsteht auch aus der dunkelgelben bei 150°. Die schwarze Verb. ist wohl $\text{HgO} \cdot \text{HgCl}_2$, die dunkelgelbe wahrscheinlich $2\text{HgO} \cdot \text{HgCl}_2 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ (RAY, LIEBIGS n. 316. 250; C. 1901. II. 90). Mit HgBr_2 gibt das rote Oxyd nur das orangegelbe $\text{HgO} \cdot \text{HgBr}_2$, das gelbe Oxyd daneben auch das schwarze $4\text{HgO} \cdot \text{HgBr}_2$. — Diese

Differenzen in der Reaktionsfähigkeit können wohl durch keine Unterschiede Dispersitätsgrades usw. erklärt werden, deuten vielmehr auf eine tiefere Verschiedenheit der beiden Formen von HgO hin. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **39**. 201—02.)


Cecil William Rogers, *Die Reaktion zwischen Kupfer und Schwefelsäure*. Einw. von konz. H_2SO_4 auf Cu -Folie im CO_2 -Strom wird bis zu Temp. von untersucht. Die einzige primäre Rk. ist stets:



daneben treten folgende sekundäre Rkk. ein:



Das Metall überzieht sich zunächst mit einer dunklen, aus Cu_2S u. CuS in wechselndem Verhältnis bestehenden Schicht, die oberhalb 130° mit merklicher Geschwindigkeit unter SO_2 -Entw. zers. wird; bei 270° verlaufen die Nebenrkk. fast momentan, daß hier scheinbar die Umsetzung unmittelbar nach der Gleichung:



erfolgt. Aus den schwefelsauren Lsgg. scheidet sich ein krystalliner Nd. von an CuSO_4 ab. Die unterhalb 200° gebildeten Krystalle sind rhomb. u. infolge seiner Einschlüsse grau; oberhalb 200° entstehen rein weiße, unvollkommen entwickelte rhomb. u. gut ausgebildete monokline Krystalle; beim Abkühlen solcher Lsgg. ca. 180° treten prismat., trikline oder monokline Krystalle auf. CuSO_4 ist also dimorph oder sogar trimorph. Bei Temp. oberhalb 130° wurden auch grüne, anscheinend monokline Krystalle, vielleicht aus saurem Sulfat beobachtet. (Journ. Chem. London **1926**. 254—69. Moor Park, Preston, Grammar School.) KRÜGER

T. Karantassis, *Doppelte Umsetzungen zwischen den Halogeniden des Zinnarsens, Wismuts, Siliciums und Titans*. (Vgl. S. 1957.) Die Halogenide des Sn, Bi, Si u. Ti sind in der Lage, ihre an sie gebundenen Halogene nach dem Schema $4 \text{AsBr}_3 + 3 \text{SnJ}_4 \rightleftharpoons 4 \text{AsJ}_3 + 3 \text{SnBr}_4$ miteinander zu vertauschen. Dies läßt sich durch die Dest. eines Gemisches von AsBr_3 u. SnJ_4 beweisen. Das Destillat bei 220 — 240° enthält 17,18% As, 74,9% J_2 , 1,52% Sn u. 6,4% Br u. bildet beim Abkühlen neben einer fl. Krystalle, während das Destillat von 240 — 315° vollständig erstarrt u. aus AsJ_3 mit 2,48% Br besteht. Die Umsetzung ist also nicht vollständig, sondern es bildet sich ein Gleichgewicht aus. AsCl_3 u. SnJ_4 geben bei 115 — 134° an der Luft rauchende fl. von SnCl_4 . Der Rückstand dest. bis 345° u. besteht in der Hauptsache aus AsJ_3 . Umgekehrt wurde bei der Dest. eines Gemisches von SnJ_4 u. SnCl_4 beim ersten Destillat 54% AsCl_3 u. 46% SnCl_4 erhalten, während der Rückstand SnJ_4 enthielt. Die Umsetzung des SbCl_3 u. SnJ_4 verläuft sehr weit zu Gunsten der B. von SbJ_3 , ist aber nicht vollständig. Bei der Einw. von SbCl_5 auf SnJ_4 verläuft folgende Rk. ab: $2 \text{SbCl}_5 + \text{SnJ}_4 = 2 \text{SbCl}_3 + \text{SnCl}_4 + 2 \text{J}_2$. Die Umsetzung des BiCl_3 mit SnJ_4 , sowie die des PbCl_2 mit SnJ_4 verläuft vollständig zugunsten der B. des BiJ_3 bzw. PbJ_2 . Ebenso findet der Austausch der Halogenatome zwischen SnCl_4 u. TiJ_2 , unter starker Wärmeentw. vollständig statt. Das J tauscht sich in gegen Br oder Cl aus, wenn der metalloide Charakter des an das J primär gebundenen Elements ausgeprägter ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 699—701.) ENSZ

A. S. Russell, *Luftoxydation von Titanosulfatlösung. Vanadosulfat, ein wirksames Reduktionsmittel*. $\frac{1}{10}$ -n. Lsgg. von Titanosulfat in 4-n. H_2SO_4 werden durch Luft nicht oxydiert. Zwecks Verwendung als Reduktionsmittel in der volumetrischen Analyse wird am besten eine Lsg. von Titanisulfat in 4-n. H_2SO_4 unmittelbar nach dem Gebrauch ca. 1 Min. mit Zn-Amalgam red. u. mit KMnO_4 -Lsg. eingestellt. Bei Titrationen in sd. Lsg. findet keine Oxydation statt; die Reduktionswirkung ist ebenso stark wie die des Chlorids. — $\frac{1}{10}$ -n. Lsgg. von VSO_4 in 10-n. H_2SO_4 reduzieren kräftiger als Titanosulfatlsgg. Die Herst. erfolgt analog; bei nicht zu lange (bi-

(le.) dauernden volumetr. Arbeiten ist Luftausschluß nicht erforderlich. (Journ. Soc. London 1926. 497—98. Oxford, Dr. LEES Lab.) KRÜGER.

D. Organische Chemie.



W. Ploeg, Über die Anwendung der Friedel-Craftsschen Reaktion auf Keten. VAN ALPHEN, Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 838; C. 1925. II. 1957, DE WITT D., S. 927.) Als Versuchsmaterial hat Vf. das Veratrol gewählt u. zuvor einige rv. des zu erwartenden Acetoveratrons (F. 46⁰) dargestellt, um das beste Verf. Identifizierung desselben zu ermitteln. — *p*-Nitrophenylhydrazon, C₁₆H₁₇O₄N₃. t. in Eg. Rotbraune Nadeln aus A., F. 227⁰, l. in Bzl., zl. in Ä., wl. in W., A., — Phenylhydrazon, C₁₆H₁₅O₂N₂, gelblichweißes Pulver, F. 131⁰, ll. in Bzl., h. Ae., wl. in W., Ä. — Semicarbazon, C₁₁H₁₅O₃N₃, krystallin. Pulver aus A., F. 218⁰, in Bzl., W., wl. in Ä., l. in h. A. — Azin, C₂₀H₂₄O₄N₂. Mit Hydrazinsulfat u. Acetat in sd. verd. A. Gelbes Pulver aus A., F. 203⁰, unl. in Ä., PAe., wl. in h. A. — Das *p*-Nitrophenylhydrazon ist für genannten Zweck am geeignetsten. — Die stark gekühlte Lsg. von 10 g Veratrol in CS₂ wird Keten u. von Zeit zu Zeit eingeleitet; im Laufe einer Stde. werden unter Rühren 10 g AlCl₃ eingetragen. Die rote Lsg. wird abgegossen, CS₂ abdest. Aus dem Rückstand konnte 0,5 g obigen *p*-Nitrophenylhydrazons erhalten werden. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 342—44. Gron., Univ.) LINDENBAUM.

Marcel Bouis, Synthese des Äthylallens. Man stellt aus Acrolein u. C₂H₅MgBr Äthylcarbinol, CH₂:CH·CH(OH)·C₂H₅, dar u. behandelt dieses mit PBr₃ in von 20% Pyridin (zur Bindung des stets entstehenden HBr). Man erhält nicht dem Carbinol entsprechende Bromid, sondern infolge Umlagerung das 1-Brom-*n*-(2), CH₂Br·CH:CH·C₂H₅, Kp.₇₆₀ 123—124⁰, Kp.₂₅ 35⁰, D.₂₀ 1,2545, n_D²⁰ = 1,1; denn dieses liefert mit Na-Acetat in Eg. nicht das bei 132⁰ sd. Vinyläthyl-*n*-olacetat, sondern β -Äthylallylacetat, CH₂(O·COCH₃)·CH:CH·C₂H₅, Kp. 149 51⁰, D.₂₂ 0,9019, n_D²² = 1,4219 (vgl. BAUDRENHIEN, Bull. Soc. Chim. Belgique 337; C. 1924. I. 414). Daraus durch Verseifung β -Äthylallylalkohol, CH₂(OH)·CH·C₂H₅, Kp. 138—139⁰, D.₂₃ 0,8444, n_D²³ = 1,4359 (vgl. DELABY, S. 1132). Das Bromid addiert glatt Br u. gibt 1,2,3-Tribrompentan, CH₂Br·CHBr·CHBr·, Kp.₁₈ 122—124⁰, D.₁₉ 2,0714, n_D¹⁹ = 1,5580 (vgl. DELABY, C. r. d. l'Acad. sciences 176. 589; C. 1923. III. 924). Festes KOH im Überschuß entzieht diesem Br unter B. von 2,3-Dibrompentan-(1), CH₂:CBr·CHBr·C₂H₅, Kp.₇₆₀ ca. 173⁰ r teilweiser Zers., Kp.₁₂ 75—76⁰, D.₁₉ 1,7442, n_D¹⁹ = 1,5316. Daraus mit Zn-*b* u. A. Äthylallen oder Pentadien-(1,2), CH₂:C:CH·C₂H₅, bewegliche, nach Geruch riechende Fl., Kp. 44—45⁰, D.₂₀ 0,6890, n_D²⁰ = 1,4149; fällt HgCl₂-Lsg. mit Br 1,2,2,3-Tetrabrompentan, CH₂Br·CBr₂·CHBr·C₂H₅, Kp.₃ ca. 120⁰, 2,2839, n_D²² = 1,5916. Die Ausbeuten sind durchweg gut. Das Verf. ist allgemeiner Anwendung fähig. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 788—90.) LINDENBAUM.

Albert Jaeger, Die Reduktion von Kohlenoxyd zu Formaldehyd und Methyl-*n*-ol bei gewöhnlichem Druck. Literaturübersicht. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 54. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.) v. WANGENHEIM.

Stefan Goldschmidt und Wilhelm Beuschel, Über die Oxydation aliphatischer *n*- und Aminosäuren. X. Mitt. über Aminoxydation. (IX. vgl. GOLDSCHMIDT, ZIGS Ann. 437. 194; C. 1924. II. 950.) GOLDSCHMIDT u. VOETH (8. Mitt.) es wahrscheinlich gemacht, daß aliphat. primäre u. sekundäre Amine durch NO₂ in Aceton zuerst am N dehydriert werden, konnten dies aber wegen weiterer Oxydation nicht beweisen. Um bei primären Aminen die erste Oxydationsstufe, Aldehyd- oder Ketonimine, festhalten zu können, haben Vff. einige Amine gewählt,

von denen die Existenz dieser Stufe bekannt war: *Benzhydrylamin* u. *9-Aminofluoren*. Das aus ersterem erhaltene *Benzophenonimin* wurde zwar wegen großer Zersetzlichkeit nicht rein dargestellt, aber mit Sicherheit nachgewiesen. Dagegen wurde *Iminofluoren* isoliert. — *tert.-Butylamin* hat sich nicht oxydieren lassen. — Bei Aminosäuren war wenig Aussicht vorhanden, primär gebildete Iminosäuren zu fassen, diese einerseits leicht Hydrolyse erleiden, andererseits leicht CO_2 abspalten. Deshalb wurden die Ester oxydiert. Die Isolierung der Iminostufe gelang zwar in keinem Falle, wohl aber ihr Nachweis. — Das Oxydationsprod. des *Alaninäthylesters* kohlensäure in NH_3 u. *Brenztraubensäureester* zerlegt werden, muß also *Iminopropionsäure*, $\text{CH}_3 \cdot \text{C}(\text{:NH}) \cdot \text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$, sein. — *Phenylaminoessigester*, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}(\text{NH}_2) \cdot \text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$, liefert als Hauptprod. den *2,5-Diphenylimidazolidon-(4)-2-carbonsäureäthylester*, gebildet durch Zusammenlagerung von je 1 Mol. Amino- u. Iminoester, denn er wird durch alkal. Verseifung zerlegt in NH_3 , *Phenylaminoessigsäure* (F. 265°) u. *Benzolameisensäure* (Phenylhydrazon, F. 160°). I. könnte auch so entstanden sein, daß der Iminoester in NH_3 u. Benzoylameisenester zerlegt wird u. diese Spaltstücke mit Aminoester kondensieren. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da beim Einleiten von NH_3 in die aceton. oder äth. Lsg. der beiden Komponenten nur *benzoylameisensäure* NH_4 erhalten wird. Daß ein Teil des Iminoesters obige Spaltung tatsächlich erleidet, wurde nachgewiesen. — Neben I. entsteht in etwas kleinerer Menge ein Verb., die aus Amino- u. Iminoester unter gleichzeitiger Verkettung mit Aceton entstanden gekommen ist. Vielleicht kommt ihr Formel II. zu. — Vff. halten es für erwiesen, daß auch die Oxydation der freien Aminosäuren über die Iminostufe verläuft. Gegen die Annahme einer Oxyaminostufe sprechen die Vers. von KNOOP u. OESTERLIN (S. 1157).



Versuche. Sämtliche Operationen werden unter Ausschluß jeder Feuchtigkeit in einer geeigneten Apparatur vorgenommen. Man gibt zur aceton. Lsg. Substanz geglühtes Na_2SO_4 (zur Bindung von entstehendem W.) u. bei wechselndem Temp. allmählich KMnO_4 (fest oder in Aceton), läßt bis zur Entfärbung stehen, filtriert u. dest. das Aceton im trocknen Luftstrom im Vakuum ab. — *Benzhydrylamin*. Oxydation bei 0°. Öliges Prod. liefert mit sd. NaOH die für *Benzophenonimin* berechnete Menge NH_3 u. *Benzophenon* (Phenylhydrazon, F. 137°). — *9-Aminofluoren* (vgl. Anhang). Oxydation bei 0°. Die eingeeingte Acetonlsg. gibt mit Pikrinsäure *Iminofluorenpikrat* (Nadeln), dieses mit NH_4OH *Iminofluoren*, aus A.-Lsg., F. 124°. — *Alaninäthylester*. Oxydation bei Zimmertemp., Zerlegung des ölig. Prod. durch feuchten Luftstrom, Nachweis des *Brenztraubensäureäthylesters* als Phenylhydrazon, F. 117—118°, u. p-Nitrophenylhydrazon, F. 188°. Der MnO_2 -Ndl. ließe sich mit verd. H_2SO_4 *Brenztraubensäure* u. *Essigsäure*. — *Phenylaminoessigester*. Oxydation bei 5—10°. Öliges Prod. in Ä. lösen, verdunsten lassen. Rückstand krystallisiert nur, wenn jede Feuchtigkeit ausgeschlossen war. Trennung beider Verbb. durch Umkrystallisieren aus verd. A., Essigester, Bzl. — Verb. $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_4$ (II.), Plättchen, F. 135°, sl. in Chlf., Acetylentetrachlorid, Dichloräthylen, CCl₄, Bzl., ll. in Essigester, A., Eg., swl. in Ä., unl. in W., PAe. Spaltet mit sd. Lauge wasser in NH_3 noch Aceton ab. — *2,5-Diphenylimidazolidon-(4)-2-carbonsäureäthylester*, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_4$ (I.), Nadeln aus A., dann Bzl., F. 148—149°, Löslichkeit wie beim vorigen, wasser unl. in Bzl. — *Freie Säure*, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2$. Mit wenig h. verd. NaOH. Nadeln aus F. 181° unter Gasentw., ll. in CH_3OH , zl. in A., Essigester, swl. in W., unl. in l. Chlf., CCl_4 , PAe. — *Benzoylameisensäureäthylesterphenylhydrazon*, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_2$, aus dem öligen Rückstand des Oxydationsprod. Aus A., F. 94°. — *Benzoylameisensäure* NH_4 , $\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_3\text{N}$, aus A.-Ä., F. 140—141°, ll. in A., wl. in Aceton, unl. in Ä., Bzl.


Anhang. Über ein Radikal aus 9-Aminofluoren. Darst. diesesamins durch von Fluorennoxim, Zerlegung des Hydrochlorids mit NH_4OH . Es entsteht eine Form, aus PAe., F. 61—63° (vgl. KUHN u. JACOB, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 432; C. 1925. II. 2207). — Läßt man das rohe, feuchte Amin ca 14 Tage an Luft stehen, so zers. es sich unter NH_3 -Entw. Das Prod. wird nach Verreiben A., Chlf., PAe. in viel sd. Bzl. gel., tiefgrüne Lsg. in Lg. von 0° hineinfiltriert. einiger Zeit fallen hellgelbe Prismen der Zus. $(\text{C}_{26}\text{H}_{18}\text{N})_2$ oder $(\text{C}_{26}\text{H}_{16}\text{N})_2$ mit Eigenschaften eines Radikals aus. F. 215° (Zers.), swl. in k., etwas mehr in h. Chlf., Toluol, Nitrobenzol. Die h. Lsgg. sind sattgrün, entfärben sich beim Erhitzen sowie durch Br, Phenylhydrazin u. α, α -Diphenyltrinitrophenylhydrazyl, gehen nicht dem Beerschen Gesetz. Die k. Lsgg. zers. sich über Nacht, so daß nun rüne Färbung beim Erhitzen ausbleibt. (LIEBIGS Ann. 447. 197—210. Karlsruhe. Techn. Hochsch.)

LINDENBAUM.

Hubert Thomas Stanley Britton, Untersuchungen der Reaktionen zwischen Lösungen von Salzen schwacher metallischer Basen und Natriumacetat, Natriumoxalat und Natriumtartrat mit Hilfe der Wasserstoffelektrode, mit einer Bemerkung über die Wirkung Dextrose auf Zirkonchloridlösung. (Vgl. S. 2313.) Die Rkk. zwischen Na-Acetat, Na-Oxalat u. Na-Tartrat u. den Lsgg. von Salzen schwacher Basen u. Basen, die 1. Salze bilden, wird durch elektrometr. Titration mit der H-Elektrode untersucht. — mol. ZrCl_4 -Lsgg. werden durch $1/10$ -n. $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ -Lsg. nicht gefällt; die klaren Alkalien fällbaren Gemische enthalten offenbar stark bas. durch Kochen allmählich zersetzbares Chlorid, etwa der Zus. $\text{ZrCl}_{0,36}(\text{OH})_{3,64}$ in kolloider Form. In mol. Th-Sulfatlsgg. entsteht vorübergehend (bei $\text{pH} = 3,4$) ein Nd. von bas. t, $1/100$ -mol. Th-Chloridlsgg. bleiben klar, obwohl die für die Abscheidung von $(\text{H})_4$ charakterist. pH überschritten wird. Im späteren Verlauf der Titration sind pH -Kurven in beiden Fällen ident., es bilden sich offenbar ziemlich reaktionsträge, bas. Th-Acetatzemischungen mit mindestens 2 Äquivalenten $(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)$ auf 1 $\text{Th}(\text{OH})_4$. n. Lsgg. von Cr-Alaun werden durch $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ nicht gefällt, die Gemische enthalten eine beträchtliche Menge $(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)'$ -Ionen, die wahrscheinlich durch Rk. der lose gebundenen SO_4 -Gruppe mit $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ u. durch Dissoziation kolloider bas. acetate geliefert werden. Farbe u. Fällbarkeit der Gemische von Cr-Alaun u. H_3O_2 durch Alkalien hängen von der Behandlung (Kochen, Stehenlassen der Lsgg.) Beim Stehen unterliegen offenbar die kolloiden Komplexe, analog $\text{Cr}(\text{OH})_3$, Alterungsvorgängen, die ihre Reaktionsfähigkeit erniedrigen u. zugleich mit der Teilchenzahl die Lichtabsorption ändern. Die Annahme der B. von Salzen einer „Acetatombase“ (vgl. WEINLAND u. BÜTTNER Ztschr. f. anorgan. u. allg. Ch. 75. 293; 912. II. 583) wird abgelehnt.

Bei der Titration von Zr-Chlorid mit $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ entsteht vorübergehend ein gelber Nd. von bas. Zr-Oxalat, Zr-Sulfatlsgg. werden nicht gefällt. Die klaren, gegen Li ziemlich beständigen, aber durch KCl oder KNO_3 koagulierbaren Lsgg. enthalten anscheinend kolloides $\text{Zr}(\text{OH})_4$, das durch lose chem. Bindung oder durch Addition von $(\text{HC}_2\text{O}_4)'$ -Ionen in Lsg. gehalten wird. Die pH -Kurve bei der Titration $1/100$ -mol. Lsgg. von Cr-Alaun mit $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ hat einen schwachen Knick bei $3\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ $1\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$; die zur Abscheidung von $\text{Cr}(\text{OH})_3$ erforderliche pH wird nicht erreicht; Farbe geht gegen Ende der Titration von grün in rot über. Bei Zusatz von NaOH klaren Titrationsgemischen beginnt bei $\text{pH} = 5,4$ Fällung eines bas. Cr-Oxalats, das später weiter zers. Gemische von Cr-Alaun u. $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ sind nach dem Kochen nach einigem Stehen durch Alkali in der Kälte nicht fällbar, werden aber durch tt. KCl-Lsg. koaguliert; ihre Farbe stuft sich nach dem Oxalatgehalt, der die pH immt, ab. Die Kurve der Titration der roten oxalsäuren Lsg. von $\text{Cr}(\text{OH})_3$, deren WERNERS dreibas. Chromoxalsäure $\text{H}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 1; C. 1912. II. 1895) entspricht, mit NaOH bestätigt die Existenz einer dreibas.

Säure nicht, sondern besteht gemäß den beiden Dissoziationsstufen der Oxalsäure in 2 Abschnitten. Der 1. Abschnitt entspricht wahrscheinlich der Rk.:



der 2. der B. von bas. Oxalat $\text{Cr}(\text{OH})_{3x}(\text{NaC}_2\text{O}_4)_{3-3x}$; bei der für die Abscheidung $\text{Cr}(\text{OH})_3$ charakterist. pH erfolgt keine Fällung, aber Farbenumschlag in grüne plötzliche Änderung des Absorptionsspektrums. Die Koagulierbarkeit der Lsgg. d. gesätt. KCl-Lsg. u. die Beobachtungen von LAPRAIK (Journ. f. prakt. Ch. **47**. 305 [1900]) über die Lichtabsorption von $\text{Cr}(\text{OH})_3$ Solen u. von Lsgg. von $\text{Cr}(\text{OH})_3$ in verschiedener organ. Säuren spricht für die kolloide Natur der Cr-Oxalate. Die $[\text{H}^+]$ wss. Lsgg. GREGORYS Salz $3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ steigt nach der Auflösung schnell an, erreicht nach ca. 20 Stdn. einen konstanten Wert, der der zur Fällung von $\text{Cr}(\text{OH})_3$ erforderlichen pH entspricht. Die geringe $[\text{C}_2\text{O}_4]''$ -Konz. der Lsgg. führt Vf. nicht auf die B. komplexer Anionen, sondern auf die B. kolloider Aggregate zurück. Bei der Fällung der Doppeloxalate vom Typus $3\text{R}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{M}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ ($\text{R} = \text{Alkalimetall}$, $\text{M} = \text{Fe}$, Al) reagieren offenbar die schwachen Basen mit $(\text{HC}_2\text{O}_4)'$ -, die Alkalien mit $(\text{C}_2\text{O}_4)''$ -Ionen. Die pH bei der Titration von 0,005-mol. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ -Lsgg. mit 0,1-n. $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ist während des Zusatzes der ersten $3\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ auf $1\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ von der für die Fällung von $\text{Al}(\text{OH})_3$ charakterist. pH wenig verschieden u. steigt dann langsam an, was auf Gleichgewicht zwischen $(\text{C}_2\text{O}_4)''$ - u. $(\text{HC}_2\text{O}_4)'$ -Ionen hinweist; die Gemische sind gegen Alkalien ziemlich beständig.

Bei der Titration mit $1/10$ -n. Lsgg. von $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ scheidet sich aus $1/100$ -mol. Lsg. von Zr-Chlorid zunächst (bei $\text{pH} = 1,66$) gallertartiges bas. Zr-Tartrat, aus Th-Chlorid unterhalb der für die Abscheidung von $\text{Th}(\text{OH})_4$ charakterist. pH flockige, hoch bas. Th-Tartrate unbestimmter Zus. aus $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ -, BeSO_4 - u. ZrSO_4 -Lsgg. werden nicht gefällt. Die Ndd. gehen wieder in Lsg., wenn $2\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ auf 1ZrCl_4 bzw. 1ThCl_4 kommt. Weinsäure fällt aus Zr- u. Th-Chloridlsgg. ebenfalls bas. Tartrate, löst sie aber im Überschuß schwerer wieder auf. Die $[\text{H}^+]$ von Th-Chlorid- u. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ -Lsgg. steigt zunächst auf Zusatz von $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$. Die gegen Alkalien beständigen Lsgg. der bas. Tartrate in überschüssigem Na-Tartrat oder Weinsäure enthalten Komplexe der Zus. $(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6)_{0,35}(\text{OH})_{3,3}$; $\text{Th}(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6)_{0,69}(\text{OH})_{2,62}$; $\text{Al}(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6)_{0,3-0,1}(\text{OH})_{2,4-2,3}$; $\text{Be}(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6)_{0,1}(\text{OH})_{1,35}$. Die Gründe für die Existenz komplexer Th- bzw. Be-Weinsäuren von ROSENHEIM, SAMMTER u. DAVIDSOHN (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **35**. 424; C. **1903**. 330) u. ROSENHEIM u. ITZIG (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **32**. 3424; C. **1900**. I. 170) sind nicht zwingend. Cr-Alaunlsgg. geben mit $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ je nach der Behandlung u. der Menge des Tartrats Lsgg. komplexer Cr-Tartrate mit verschiedenen Eigenschaften, im Gegensatz zu den Oxalaten im allgemeinen auch beim Kochen alkalibeständig. Die pH in Lsgg. von ZnSO_4 sinkt durch $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ nahezu auf die charakterist. pH für die Fällung von $\text{Zn}(\text{OH})_2$; bei Zusatz von mehr als $3\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ auf 1Zn werden die Lsgg. in der Kälte durch Alkali nicht gefällt u. enthalten bas. Zn-Tartrate der Zus. $\text{Zn}(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6)_{0,49-0,41}(\text{OH})_{1,03-1,19}$. $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ fällt aus $\text{La}(\text{NO}_3)_3$ -Lsg. zwischen $\text{pH} = 4,5$ ein flockiges, in überschüssigem $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6$ oder Weinsäure l. bas. La-Tartrat, desgleichen aus Weinsäure aus La-Acetatlsgg., die bas. Tartrate werden durch Alkalien weiter zerlegt. In Fehlingscher Lsg. sind ebenfalls bas. Cu-Tartratkomplexe anzunehmen. — Die Fällung von Dextrose bei der Titration von Zr-Chloridlsgg. mit NaOH verschiebt die Fällung von bas. Tartrat bis zu $\text{pH} = 6$, verzögert also anscheinend das Wachstum der kolloiden Aggregate. Bei der Wiederauflösung des Nd. tritt offenbar eine Rk. zwischen Zr(III) u. den schwach sauren OH-Gruppen der Dextrose ein. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 269—99. London, Imp. Coll. of Science and Techn.) KRÜGE

M. Bridel und **C. Béguin**, Über die biochemische Synthese des α -Äthyl-l-arabinosids mit Hilfe von Mandelemulsin. (Vgl. S. 3024.) Der nach l. c. gegebener Methode hergestellte Ansatz von l-Arabinose u. Emulsin in A. wurde nach 173 Tagen filtriert, im Vakuum zur Trockne verdampft, aus dem Rückstand die Arabinose

roh A. fällbare Ca-Verb. entfernt. Das verbleibende α -Äthyl-l-arabinosid bildet mkr. Delchen aus Essigester von erst süßem, dann bitterem Geschmack, wasserfrei, F. 122–123° (boc), $[\alpha]_D = +9,95^\circ$ (1,2344 g in 25 cem), reduziert nicht. Wird von 3%ig. SO_4 bei 105° leicht u. glatt in Arabinose u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ gespalten. Dieselbe Hydrolyse bek. Emulsin in wss. Lsg.; bei 33° waren nach 14 Tagen ca. 66% gespalten. — Dieses Glykosid ist das erste auf biochem. Wege erhaltene Pentosid, das erste mittels Emulsins thetisierte Glykosid eines Zuckers der l-Reihe u. das erste so gewonnene α -Glykosid. Emulsin verhält sich gegen l-Arabinose, obwohl es das α -Deriv. derselben bildet, genau gegen d-Glykose u. d-Galaktose, indem es alle drei Zucker in Glykoside überführt, weniger rechts drehen als die Zucker selbst. Bei d-Glykose u. d-Galaktose schlägt Drehungsrichtung um, d. h., die Glykoside u. Galaktoside sind linksdrehend. Emulsin wirkt auch auf rechtsdrehende Glykoside, während man es bisher als spezif. Agent auf linksdrehende Glykoside ansah. Vielleicht enthält es ein neues spezif. Agent, das man α -l-Arabinosidase nennen könnte. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 7–14.)

LINDENBAUM.

Henry Berlin, *Die Identität der Isomaltose mit Gentiobiose*. Die Unterss. früherer Forscher über Isomaltose stimmen nur darin überein, daß dieselbe unvergärb. ist ein krystallisiertes Phenylsazon gibt. Da sie bisher nicht krystallisiert erhalten wurde, finden die einzelnen Autoren keinen einheitlichen Wert für $[\alpha]_D$. Vf. erhält dem nach FISCHER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **28**. 3024; C. **96**. I. 153) u. FRIEDRICH (Arkiv för Kemi, Min. och Geol. **5**. Nr. 4 [1913]) dargestellten Sirup im Gegensatz zu ZEMPLÉN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **48**. 234; C. **1915**. I. 528) ein krystallisiertes Acetylderiv., das mit der Octacetylgentiobiose ident. ist. Das daraus erhaltene Verseifungsprod. gibt ein Osazon, das im rohen Zustand F. 156–158° u. 42,9° Endrehung zeigt. FISCHER findet F. 158° u. $[\alpha]_D = +7^\circ$. Nach dem Umkrystallisieren findet Vf. F. 179–181° u. $[\alpha]_D = -70,8^\circ$ in Pyridin-A.-Lsg. sofort nach der Lösung u. $[\alpha]_D = -48,2^\circ$ nach 18 Stdn. ZEMPLÉN fand für Gentiobiosephenylsazon, F. 160–170° u. $[\alpha]_D = -74,8^\circ$. Da ZEMPLÉN, wie der unscharfe F. zeigt, unreines Osazon in den Händen hatte, glaubt Vf., daß dieses mit seinem aus ähnlicher Isomaltose erhaltenen Osazon ident. ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 107–11. Washington.)

BRAUNS.

Arnold E. Pratt, *Über die Darstellung des d-Arginincarbonats*. Das von KOSSEL GROSS (Ztschr. f. physiol. Ch. **135**. 167; C. **1924**. II. 335) angegebene Verf. besitzt eine Reihe von Nachteilen, so daß die Ausbeute an rohem Arginincarbonat aus Gelatine nur ca. 25% beträgt. Vf. hat das Verf. auf Grund der Beobachtungen verbessert, daß Dinitronaphtholsulfonat des Arginins sich aus einer verd. H_2SO_4 von geeigneter Konz. so gut wie ohne Verlust umkrystallisieren läßt, u. daß Dinitronaphtholsulfonat in n-Butylalkohol II. ist u. aus schwach schwefelsaurer Lsg. leicht extrahiert werden kann. Man verfährt wie folgt: 500 g Protein mit 1 l HCl (D. 1,18) 18 Stdn. stehen, HCl im Vakuum auf Dampfbad entfernen, gummiartigen Rückstand in 1 l W. lösen, mit wenig Tierkohle behandeln, Filtrat mit Dinitronaphtholsulfonsäure 1 Teil auf 1 Teil Arginin versetzen. Nd. nach 24-std. Stehen im Eisschrank absaugen, mit wenig Eiswasser waschen, in ca. 2 l h. verd. H_2SO_4 (enthaltend 50 cem Säure von 1,84 im l) lösen, nach 24-std. Stehen im Eisschrank goldgelbe Blättchen absaugen, mit Eiswasser waschen, im Vakuum trocknen. Salz (nicht über 25 g) in h. verd. H_2SO_4 1:1iger Konz. lösen, h. mit n-Butylalkohol ausschütteln, bis die wss. Schicht fast farblos ist, butylalkoh. Extrakte mit wenig W., diese wss. Lsg. wieder mit Butylalkohol ausschütteln. Wss. Lsgg. langsam mit gesätt. reiner Ba(OH)₂-Lsg. in geringem Überschuß versetzen, mit CO_2 sättigen, nach Stehen über Nacht filtrieren, waschen, zu dünnem Sirup eindampfen. Letzterer krystallisiert beim Reiben mit Glasstab leicht. Ausbeute nach Trocknen im Vakuum 85–90%. 500 g Gelatine liefern 35–40 g Arginincarbonat. Das daraus hergestellte Pikrolonat schmeckt ohne Umkrystallisieren

bei 237,5° (Zers.); es enthält 1H₂O. — Die Dinitronaphtholsulfonsäure kann aus Naphtholgelb S mit h. 33%ig. H₂SO₄ abgeschieden u. aus W. umkrystallisiert werden. (Journ. Biol. Chem. **67**. 351—56. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) LINDENBAUM.

N. A. Lange und W. Robert Reed, Einige aus *p*-Phenoxyanilin hergestellte *p*-Phenoxyharnstoffe und -thioharnstoffe. Die Wirkung der Phenoxygruppe auf den Geschmack. Vff. stellen einige dem Dulcin (*p*-Äthoxyphenylharnstoff) analoge Phenoxyverbind. dar, um den Einfluß der Phenoxygruppe auf den Geschmack zu studieren. Ausgehend vom Phenyläther wurde durch Nitrierung *p*-Nitrophenyläther dargestellt, dieser zu *p*-Aminophenyläther reduziert u. dieser dann durch Einw. auf Thiocyanat u. Cyanat in die Thioharnstoff- u. Harnstoffderiv. übergeführt. Dabei zeigt sich, daß durch Einführung der Phenoxygruppe sowohl der süße wie der bittere Geschmack abnimmt. — *p*-Nitrophenyläther, C₁₂H₉O₃N. Durch Zutropfen eines Gemisches von 1 Teil HNO₃ (D. 1,5) u. 1 Teil Eg. zur sd. Lsg. von 1 Teil Phenyläther in 2,5 Teilen Eg. Kp.₃₀ 225°. F. 56—57° (korr.). — *p*-Aminophenyläther, C₁₂H₁₁ON. Kp.₃₀ 315—320°. F. 82° (korr.). Chlorhydrat, C₁₂H₁₁ON·HCl. F. 222° (korr.). — *p*-Phenoxyphenylharnstoff, C₁₃H₁₂O₂N₂. F. 178° (korr.). — *p*-Phenoxycarbanilid (*p*-Phenoxyphenyl-β-phenylharnstoff), C₁₉H₁₆O₂N₂. F. 201° (korr.). — *p*-Phenoxy-*p*-methylcarbanilid (α-*p*-Phenoxyphenyl-β-*p*-tolylharnstoff), C₂₀H₁₈O₂N₂. F. 204° (korr.). — α-*p*-Phenoxyphenyl-β-α-naphthylharnstoff, C₂₃H₁₈O₂N₂. F. 216° (korr.). — *p*-Phenoxyphenylthioharnstoff, C₁₃H₁₂ON₂S. F. 184° (korr.). — *p*-Phenoxythiocarbanilid (α-*p*-Phenoxyphenyl-β-phenylthioharnstoff), C₁₉H₁₆ON₂S. F. 140° (korr.). — *p,p'*-Diphenoxythiocarbanilid (*s-p*-Phenoxyphenylthioharnstoff), C₂₅H₂₀O₂N₂S. F. 172° (korr.). (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1069—74. Cleveland [O.])

BRAUNS.

Herbert O. Calvery, Reaktion von Quecksilberdiphenyl mit einigen Säurehalogeniden. Vf. fand, daß bei der Einw. von Chlorameisensäureäthylester, Chloracetyl- u. Benzoylchlorid auf Diphenylquecksilber Phenylquecksilberchlorid entsteht unter B. von Aceto- bzw. Benzophenon. Chlorameisensäureäthylester gibt keinen Benzoessäureester, was dafür spricht, daß Quecksilberdiphenyl kein Zwischenprod., sondern ein Nebenprod. bei der B. von Benzoessäureester nach WURTZ (C. r. d. l'Acad. des sciences **64**. 1298 [1869]) ist. Ferner wurde die Löslichkeit von Phenylquecksilberchlorid in 10%ig. NaOH sichergestellt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1009—12. Baltimore, Maryland.)

BRAUNS.

Frank C. Whitmore, E. R. Hanson und G. J. Leuck, Mercurierte Hydrazobenzole. Vff. stellten durch Kupplung von *o*-Chlormercuriphenol u. 2,6-Diacetoxymercuri-*p*-kresol mit Sulfanil-, Metanil-, Naphthion-, Anthranil-, *m*- u. *p*-Aminobenzoesäure Verbb. dar, von denen sie hofften, daß durch die Zunahme des Mol.-Gew. u. die Änderung der Natur des Moleküls die chem. Aktivität des Quecksilbers geändert würde. Dies war jedoch nicht der Fall. — 3-Chlormercuri-4-hydroxyazobenzol-4'-sulfosaures Na, C₁₂H₈O₄N₂ClSHgNa. — 3-Chlormercuri-4-hydroxyazobenzol-3-sulfosaures Na, C₁₂H₈O₄N₂ClSHgNa. — 3-Chlormercuri-4-hydroxyazonaphthalin-4'-sulfosaures Na, C₁₆H₁₀O₄N₂ClSHgNa. — 3-Chlormercuri-4-hydroxyazobenzol-*o*-carbonsäure, C₁₃H₉O₃N₂ClHg. — 3-Chlormercuri-4-hydroxyazobenzol-*m*-carbonsäure, C₁₃H₉O₃N₂ClHg. — 3-Chlormercuri-4-hydroxyazobenzol-*p*-carbonsäure, C₁₃H₉O₃N₂ClHg. — Anhydro-2-hydroxy-3-hydroxymercuri-5-methylazobenzol-4'-sulfosaures Na, C₁₃H₉O₄N₂SHgNa. — Anhydro-2-hydroxy-3-hydroxymercuri-5-methylazobenzol-2'-carbonsäure, C₁₄H₁₀O₃N₂Hg. — Anhydro-2-hydroxy-3-hydroxymercuri-5-methylazobenzol-4'-carbonsäure, C₁₄H₁₀O₃N₂Hg. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1013—16. Evanston, Illinois.)

BRAUNS.


W. R. Kirner, *p*-Nitrobenzoesäureester des β-Phenyläthyl-, γ-Phenylpropyl- und δ-Phenylbutylalkohols. Zur besseren Charakterisierung der bei der Darst. von ω-Phenylalkylchloriden als Zwischenprodd. erhaltenen Alkohole hat Vf. außer den schon bekannten Phenylurethanen die Nitrobenzoyl-ester derselben hergestellt. *p*-Nitrobenzoesäure-[β-phenyläthyl]-ester, C₁₅H₁₃O₄N. Aus dem Alkohol, *p*-Nitrobenzoylchlorid u.

yrudin. F. 62—63°. — *p*-Nitrobenzoesäure- $[\gamma$ -phenyl-*n*-propyl]-ester, $C_{16}H_{15}O_4N$. 45—46°. — *p*-Nitrobenzoesäure- $[\delta$ -phenyl-*n*-butyl]-ester, $C_{17}H_{17}O_4N$. F. 18—20°. Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1111—12. Inst. Houston, Texas.) BRAUNS.

Arnold J. Gelarie und **Frederick R. Greenbaum**, *Über die Zersetzlichkeit des Natriumsalzes vom Benzoylwasserstoffperoxyd*. Vff. untersuchten das Verh. dieses Salzes (dargestellt nach BAEYER u. VILLINGER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **33**. 8; C. **1900**. I. 1022) gegenüber verschiedenen Stoffen u. finden, daß sich das Salz sowohl für sich allein, als auch vor allem bei Ggw. von katalyt. beschleunigenden Körpern, wie Harnstoff, Chinin, Hexamethylentetramin, $CuSO_4$, zimmturem Na oder Seifen innerhalb 24—48 Stdn. vollständig unter Entw. von O_2 zu α -Benzoat zersetzt. Diese Zers. wurde durch Titration des aus angesäuertem KJ-Ing. ausgeschiedenen J_2 verfolgt. (Amer. Journ. Pharm. **98**. 163—66. New York, Philadelphia.) ROJAHN.

J. Bougault, *Ein Beispiel eines Ketonhydratoxyds*. (Vgl. S. 2686.) Die l. c. erwähnte Oxyssäure aus dem Lacton vom F. 82° besitzt F. 142°, ist unl. in W., l. in A., wl. in Ä., Bzl. Im Moment ihrer Abscheidung aus alkal. Lsg. wird sie von Ä. sogleich aufgenommen, scheidet sich aber schnell aus. Erhitzt man sie mit Acetylhydrid, so erhält man zwei Anhydride, die durch verd. NaOH trennbar sind. Das eine löst sich darin, das andere wird in Ä. aufgenommen. Aus der alkal. Lsg. fällt die Säure das Lacton vom F. 82°. Die äth. Lsg. liefert eine Verb. vom F. 74°, in welcher das Anhydrid der Benzylphenyläthylbernsteinsäure vom F. 125° (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **181**. 247; C. **1925**. II. 2140) vorliegt. Diese Säure (nebensteh.) ist durch Umlagerung der Oxyssäure entstanden, eine Rk., die sich auch mit verd. HCl vollzieht. — Das Ketonhydratoxyd (Amidsäure $C_{20}H_{23}O_6N$) kann also beide isomeren Benzylphenyläthylbernsteinsäuren übergeführt werden (Umwandlung in die Säure vom F. 170° vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 1944; C. **1925**. 1597). (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 786—88.) LINDENBAUM.


Reynold C. Fuson, *Darstellung von Orthophthalaldehydsäure*. Bromierung von Toluolnitril zu *o*-Cyanbenzalbromid u. Verseifung desselben führt zu keiner befriedigenden Ausbeute an Phthalaldehydsäure. Vf. stellt diese dar, indem er Naphthalin mit alkal. $KMnO_4$ -Lsg. zu Phthalonsäure oxydiert, diese in das Anilinderiv. überführt, es nicht wie GILLIARD, MONNET u. CARTIER (D. R. P. 97 241) angeben, die Formel I, sondern nur zwei Anilinreste enthält. Beim Erhitzen spaltet es Anilin u. CO_2 unter B. von *o*-Carboxybenzilydenanilin ab, dem, da unl. in Na_2CO_3 -Lsg., die Formel II kommt. Daher schreibt Vf. der Phthalonsäuredianilinverb. die Formel III zu. Durch Hydrolyse von II wird *o*-Phthalaldehydsäure erhalten.




Anilinderiv. der Phthalonsäure, $C_{21}H_{18}O_4N_2$. Die nach der Oxydation von Naphthalin erhaltene Lsg. von Phthalonsäure wird direkt mit Anilin versetzt u. die ausgeschiedene Anilinverb. aus A. umkrystallisiert. F. 165°. Die Umwandlung in II schiebt durch Kochen in absol. trockenem Xylol. — *o*-Cyanbenzalbromid, $C_8H_5NBr_2$. Starke Nadeln aus A., F. 62—63°. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1093—96. Cambridge, Mass.) BRAUNS.

F. Salmon Legagneur, *Über gemischte Ketone aus α -Camphernitrilsäure*. (Vgl. ALLER u. LEGAGNEUR, C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 883; C. **1925**. I. 2305.) m zu unterscheiden, ob das l. c. beschriebene Ketoncarbonsäureamid vom F. 172° die l. c. angenommene Formel I. oder vielleicht Formel II. besitzt, hat Vf.

α - u. β -Camphernitrilsäurechlorid mit C_6H_6 u. $AlCl_3$ kondensiert. Das α -Chlorid liefert nicht das erwartete Ketonnitril, sondern unter quantitativer CO-Abspaltung das Nitril $C_{15}H_{19}N$ (III.), $Kp_{3,5}$ 153—155°, $[\alpha]_D^{14} = +21^\circ 12'$ (in A.). Daraus durch



Verseifung die bekannte Säure $C_{15}H_{20}O_2$ (BLANC, Bull. Soc. Chim. Paris [3] 2. 838 [1899]), deren Konst. jedoch wegen möglicher Retropinakolinumlagerung zweifelhaft ist. — Das β -Chlorid (Kp_{17} 148—149°) liefert das erwartete 1-Cyan-1,2,2-trimethyl-3-benzoyl-cyclopentan (IV.), F. 58—59°. Das aus diesem dargestellte Carbonsäureamid sowie dessen Oxim u. die Carbonsäure sind ident. mit der Verb. von F. 172—175° u. ihren l. c. beschriebenen Derivv. Diese Verb. besitzt demnach Formel II. eines 1,2,2-Trimethyl-3-benzoyl-cyclopentan-1-carbonsäureamids. Den Verlauf der Einw. von C_6H_5MgBr auf α -Camphernitrilsäuremethylester stellt sich V. wie folgt vor:



(C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 790—92.)

LINDENBAUM.

E. Ott, Über die Molekülgröße von Kautschuk und Guttapercha. (Vgl. S. 3028 Vf. wendet seine röntgenometr. Untersuchungsmethode zur Abgrenzung des Mol. Gew. polymerer, krystallisierter Substanzen auf Kautschuk u. Guttapercha an. Ve. hältnismäßig reiner Crêpe-Kautschuk lieferte beim Durchstrahlen mit Röntgenlicht sehr schöne Krystallinterferenzen ohne „amorphen Ring“. Dieser Kautschuk ist als prakt. vollständig krystallisierbar (daß die Interferenzen nicht von Verunreinigungen herrühren, ist nachgewiesen worden). Dabei sind die elast. Eigenschaften die für Kautschuk üblichen. Danach wäre die von KATZ (Naturwissenschaften 13. 410; C. 1922. II. 692) angegebene Erklärung der Dehnbarkeit des Kautschuks durch gleichzeitiges Vorhandensein zweier chem. verschiedener Substanzen, wovon die eine amorph, die andere krystallisierbar ist, nicht allgemein zulässig. Aus der innersten Linie des Röntgendiagramms nach DEBYE-SCHERRER wird die maximale Formel $(C_5H_8)_6$ für Kautschuk berechnet. — Zum erstenmal wird nachgewiesen, daß Guttapercha krystallisiert ist. Die maximale Formel für Guttapercha ergibt sich zu $(C_5H_8)_{12}$. Aus diesen Befunden ergibt sich, daß die Annahme eines enorm hohen Polymerisationsgrades auch in der Chemie des Kautschuks nicht haltbar ist. (Naturwissenschaften 14. 320. Zürich, Eid. Techn. Hochsch.)

JOSEPHY.


László Zechmeister und **Paul Rom**, Über die Reduktion von Nitro- zu Azokörpern mit Magnesium und Salmiaklösung. Vff. verwenden den bei der Lsg. von Mg in NH_4Cl frei werdenden Wasserstoff zur Red. von substituierten Nitrobenzolen. Die Verss. wurden in wss.-methyalkoh. Lsg. ausgeführt, da hierbei das Ammoniumchlorid zahlreiche Verbb. in Lsg. hält. Beim o-, m- u. p-Nitrotoluol wurden 61 bzw. 69 bzw. 71% Ausbeute festgestellt, bei Nitrobenzol nicht über 40%. Für die Herstellung von Hydroxylaminen erwiesen sich die angeführten Reaktionsbedingungen als unvorteilhaft. Zahlreiche Nitrokörper, wie Halogennitrobenzole, liefern auch mit Mg u. CH_3OH in guter Ausbeute Azoxyverbb. Mittels der Salmiakmethode können auch Ketone reduziert werden, wie z. B. Benzophenon zu Benzhydrol.

Versuche. Es wurden bei den folgenden Verss. 12 g Nitrokörper in 300 ccm CH_3OH am Rückflußkühler mit 160 ccm gesätt. Chlorammonlsg. u. 6 g Mg (in Form

n Spänen) versetzt. — 2,2'-Dimethylazoxybenzol, $C_{14}H_{14}ON_2$, aus o-Nitrotoluol, 59°. — 3,3'-Dimethylazoxybenzol, $C_{14}H_{14}ON_2$, aus m-Nitrotoluol, F. 37°. — 4,4'-methylazoxybenzol, $C_{14}H_{14}N_2O$, aus p-Nitrotoluol, F. 70°. — 2,2'-Dichlorazoxybenzol, $H_8ON_2Cl_2$, aus o-Chlornitrobenzol. Gelbe Nadeln mit hellrötlichem Stich. F. 56°. — 4,4'-Dichlorazoxybenzol, $C_{12}H_8ON_2Cl_2$, aus m-Chlornitrobenzol. Goldgelbe Nadeln bezw. gestreckte Prismen. F. 97°. — 4,4'-Dichlorazoxybenzol, $C_{12}H_8ON_2Cl_2$, aus p-Chlornitrobenzol. F. 156°. — 2,2'-Dibromazoxybenzol, $C_{12}H_8ON_2Br_2$, aus o-Bromnitrobenzol. Gelbe Blättchen. F. 112°. — 3,3'-Dibromazoxybenzol, $C_{12}H_8ON_2Br_2$, aus m-Bromnitrobenzol. Gelbe Nadeln. F. 172°. — Bei der Red. von Nitrobenzol schwankte die Ausbeute aus unbekannten Gründen zwischen 10—65%. Das Reaktionsprod. ist in der Regel frei von Anilin, Hydrazobenzol u. Nitrobenzol; bei Zimmertemp. erhält es Phenylhydroxylamin. — Hydrazobenzol wurde aus Azoxybenzol in 99% aus Azobenzol in 91% Ausbeute gewonnen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 867 874. Pécs, Univ.)

W. HAAS.

R. Lantz und A. Wahl, Über neue Naphthochinonderivate. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 1509; C. 1925. II. 1156.) Es war i. c. gezeigt worden, daß die in 1 befindliche Gruppe des 2-Oxy-1,4-naphthochinondiphenylimids (I.) bei Einw. von Mineralsäuren leicht durch O ersetzt wird. Es war von Interesse, zu erfahren, ob auch die Beweglichkeit dieser Gruppe auch bei der einfacheren Verb. II. wiederfindet.



Diese ist bisher nicht bekannt geworden, ebensowenig wie das 1,2-Naphthochinon-1-imid oder dessen 4-Sulfonsäure, offenbar deswegen, weil man die Oxydation des Aminonaphthols oder seiner Sulfonsäure in saurem Medium ausgeführt hat, in welchem NH durch O ersetzt wird. Von diesem Gedanken ausgehend,

1 Vff. wie folgt zum Ziel gelangt: Zu einer wss., mit $NaHCO_3$ alkal. gemachten Lsg. von Anilin gibt man langsam unter kräftigem Durchmischen mit Luft 1,2,4-Aminonaphtholsulfonsäure. Es bildet sich ohne weiteres 2-Oxy-1,4-naphthochinon-1-imidiphenylimid, $C_{16}H_{12}ON_2$ (II.), gelbe Nadeln aus A., schm. unter Zers. Wird schon in k. Mineralsäuren in 2-Oxy-1,4-naphthochinon-4-phenylimid übergeführt (Konst.-veis), verhält sich hierin also wie I. Das obige Verf. läßt sich bzgl. beider Komponenten verallgemeinern u. ist durch F. P. 593 916 geschützt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 976—78.)

LINDENBAUM.

J. E. Zanetti und C. O. Beckmann, Brenzschleimsäureester. Vf. stellt einige Ester der Brenzschleimsäure aus primären u. sekundären Alkoholen dar, durch Erhitzen der alkoh. Lsgg. auf 120—135° während 12—25 Stdn. unter Einleitung von trockenem HCl-Gas. Brenzschleimsäure-n-butylester, $C_9H_{12}O_3$. Kp_{-1} 83—84°. D_{-4}^{20} 1,055. — n-Amylester, $C_{10}H_{14}O_3$. Kp_{-1} 95—97°. D_{-4}^{20} 1,0335. — n-Hexylester, $C_{11}H_{16}O_3$. Kp_{-1} 105—107°. D_{-4}^{20} 1,0170. — n-Heptylester, $C_{12}H_{18}O_3$. Kp_{-1} 116—117°. D_{-4}^{20} 1,0005. — n-Octylester, $C_{13}H_{20}O_3$. Kp_{-1} 126—127°. D_{-4}^{20} 0,9885. — sek.-Butylester, $C_9H_{12}O_3$. Kp_{-1} 67—69°. D_{-4}^{20} 1,0465. — sek.-Amylester, $C_{10}H_{14}O_3$. Kp_{-1} 75—77°. D_{-4}^{20} 1,039. — sek.-Hexylester, $C_{11}H_{16}O_3$. Kp_{-1} 86—88°. D_{-4}^{20} 1,012. (Journ. Americ. Chem. Soc. 1907—69. New York, Columbia Univ.)

BRAUNS.

Raymond M. Hann und Klare S. Markley, Kondensation von Aldehyden mit Phenylisothiohydantoin. Das von LANGE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 12. 595) dargestellte Diphenylisothiohydantoin enthält in der Gruppierung $S-CH_2-CO-$ eine tionsfähige Methylengruppe, die u. a. auch mit Aldehyden Kondensationsprodd. ergibt. Vff. stellen eine Reihe solcher Verbb. dar. — 3-Methoxy-4-hydroxy-5-chloraldehyd (Chlorvanillin), $C_8H_7O_3Cl$. F. 164—165°. — 5-Benzal-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{22}H_{19}ON_2S$. F. 215—216° (korr.). — 5-(o-Nitrobenzal)-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{22}H_{15}O_3N_3S$. Gelbbraune Krystalle. F. 196—197° (korr.). — 5-Cinnamal-

see errata p. 3494 v. 100
see errata v. 97² p. 3438

2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{24}H_{18}ON_2S$. Gelbe Nadeln aus Eg. F. 225—226° (korr.). — 5-Furfural-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{20}H_{14}O_2N_2S$. Nadeln aus Essigsäure F. 221—222° (korr.). — 5-Salicylal-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{22}H_{16}O_2N_2S$. Gelb Nadeln. F. 249—250° (korr.). — 5-(3,5-Dichlorsalicylal)-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{22}H_{14}O_2N_2Cl_2S$. F. 234—235° (korr.). — 5-(3,4-Dihydroxybenzal)-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{22}H_{16}O_3N_2S$. Schmilzt nicht unter 300°. — 5-(3-Methoxy-4-hydroxybenzal)-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{23}H_{18}O_3N_2S$. Gelbe Blättchen. F. 250—251° (korr.). — 5-(5-Chlorvanillal)-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{23}H_{13}O_3N_2SCl$. Gelbe Nadeln aus Essigsäure. F. 132—134° (korr.). — 5-(5-Nitrovanillal)-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{23}H_{13}O_5N_3S$. F. 100—102° unter Zers. — 5-(5-Bromvanillal)-2,3-diphenylisothiohydantoin, $C_{23}H_{13}O_3NSBr$. Fängt bei 100° an sich zu zersetzen. (Journ. Washington Acad. of. Sciences **16**. 169—75. Washington, Univ.) BRAUNS.

Etsuo Miyamichi, Über Thiazolringschluß bei acylierten Aminosäureestern (Vgl. KARRER, MIYAMICHI, STORM u. WIDMER, *Helv. chim. Acta* **8**. 205; C. **1926** I. 2228.) Es war l. e. gezeigt worden, daß sich α -Acylaminosäureester (I.) mittel PCl_5 leicht zu Oxazolderivv. anhydrisieren lassen. Bei Anwendung von P_2S_5 an Stelle von PCl_5 entstehen ebens leicht Thiazolderivv. (II.), hellgelb bis orangefarbige, eigentümlich riechende, schwach bas. Fll., II. in A Ä., wl. in W., beständig gegen Lauge

I.
$$\begin{array}{c} \text{NH} \text{---} \text{CH} \cdot \text{R}' \\ | \quad \quad | \\ \text{R} \cdot \text{CO} \quad \text{CO} \cdot \text{OR}'' \end{array}$$

II.
$$\begin{array}{c} \text{N} \quad \quad \text{C} \cdot \text{R}' \\ | \quad \quad | \\ \text{R} \cdot \text{C} \quad \quad \text{C} \cdot \text{OR}'' \\ \quad \quad \quad \text{S} \end{array}$$

u. Säuren. — 2-Phenyl-5-äthoxythiazol, $C_{11}H_{11}ONS$. Aus Hippursäureäthylester. Nach Reinigung über das Pikrat Kp.₁ 125—128°. Pikrat, hellgelbe Nadeln, F. 104—105°. — 2-Methyl-5-äthoxythiazol, C_6H_5ONS . Aus Acetylglykokolläthylester. Kp.₁₂ 85—86°. Pikrat, gelbes krystallin. Pulver, F. 122°. — 2-Phenyl-4-methyl-5-äthoxythiazol, $C_{12}H_{13}ONS$. Aus Benzoylalaninäthylester. Kp.₂ 152—153°. Pikrat, hellgelbe Blättchen, F. 139°. (Journ. Pharm. Soc. Japan **1926**. No. 528. 16—18.) LINDENBAUM

Henri Wunschendorff, Vollkommene Fällung der Proteine durch die Hydrate der dreiwertigen Metalle. I. u. II. Mitt. I. Verwendung des Aluminium-Kaliumalaun (Vgl. S. 2613.) Mit kolloidalem Al gelingt es nicht, die Proteine vollkommen auszufällen, hingegen zeigen die Verss. mit Eierklar u. Serum, daß bei ausreichendem Alaunzusatz die vollkommene Ausfällung möglich ist. Bei genügenden Alaunmengen (z. B. 28 cem Alaun 5% bei 2 cem Serum + 20 cem W.) ist ein Laugenzusatz bis zur neutralen Rk. nicht nötig; aber die neutrale Rk. gibt eine gewisse Garantie für die Vollkommenheit der Enteiweißung.

II. Verwendung von Chrom- und Eisenalaun. $Cr_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24 \text{ aq.}$ u. $Fe_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24 \text{ aq.}$ werden selbst bereitet, da die handelsüblichen Alaune auch NH_4 -Salz enthalten. Mit beiden Alaunen läßt sich vollkommen enteiweißen, wenn diese in Überschuß zugesetzt werden. Beispiele: 2 cem Serum mit 20 cem W. verd. werde mit 15 cem Cr-Alaun (5%) u. 7 cem $\frac{1}{2}$ -n. NaOH oder 5 cem Fe-Alaun (5%) u. 2,4 cem $\frac{1}{2}$ -n. NaOH vollkommen enteiweißt. Die N-Best. im Filtrat ergibt gute Übereinstimmung mit den Fällungen durch kolloidales Fe. (Bull. Soc. Chim. Biol. **8**. 18 bis 191. 192—98. Alger, Fac. de méd. Lab. de chim. biolog.) OPPENHEIMER.

G. B. Zanda, Über den im Eiereiweiß enthaltenen Zucker. Durch Extraktion des koagulierten oder Dialyse des genuinen Eiereiweißes läßt sich ein Zuckersäure gewinnen, die nicht vergärbbar ist u. eine essigsäure Lsg. von essigsäurem Cu nicht reduziert, also nicht Glucose, dagegen Lactose sein kann. Auch die Osazonprobe fällt in diesem Sinne aus. Diese in nicht gebundenem Zustand vorliegende Lactose ist unabhängig von dem gebundenen, erst durch Hydrolyse des Albumins oder Ovarialmucoids gewinnbaren Zuckers. (Biochim. e terap. sperim. **12**. 350—54. 1925; *Beiz. ges. Physiol.* **34**. 20. Sassari, Istit. di materia med. e farmacol. Ref. SCHULZ.) OPPENHEIMER.

E. Biochemie.

Charles Dhéré, *Die Elektrodialyse in der Biochemie*. Übersicht der Leistungen der Elektrodialyse für die Forschung auf dem Gebiet der Eiweißkörper, Zucker, Fermente, Hormone u. Antikörper. Ältere eigene Verss. (1910) mit Gelatine u. Serum. *Ill. Soc. Chim. Biol.* **8**. 144—59. Freiburg/Schweiz, Inst. de physiol.) OPP.

J. Needham und **D. M. Needham**, *Beobachtungen über p_H im Zellinnern*. *r. soc. de biologie* **94**. 833—35. — C. **1926**. I. 1817.) OPPENHEIMER.

E₁. Enzymchemie.

Hans Pringsheim und **Jesaja Leibowitz**, *Über die Spezifität der Amylasen*. *Beiträge zur Chemie der Stärke*. XV.) (XIV. vgl. LEIBOWITZ u. SILMANN, *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **58**. 1889; C. **1926**. I. 55.) Gemeinsam mit **Rahel Perewosky** und anderen Vff. ein Optimum der Mischung von Pankreas- u. Malzamyase (α - u. β -Amylase) für die Umwandlung von Stärke in Glucose (vgl. *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **58**. 1889; C. **1925**. II. 1363). Sie fanden es nicht in der Vereinigung beider Amylasen, sondern in der gleichzeitigen Gegenwart beider. Die empir. gefundenen besten Gemische zeigten quantitative Verzuckerung zu Glucose. Bei Übertragung der so für die Stärke gefundenen optimalen Verhältnisse auf die getrennten Bestandteile, *Amylose* und *Amylopektin*, ergaben sich keine Unterschiede. — Verss. unter Mitarbeit von **Wilhelm Kusenack** zeigten, daß auch *Speichelamylase* im Verein mit Pankreasamylase die Aufspaltung der Stärke zu Glucose bewirken kann. Jene kann aber nicht als α -Amylase aufgefaßt werden, da sie, wie nochmals in Bestätigung früherer Verss. (*Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **57**. 884; C. **1924**. II. 315) festgestellt wurde, das charakterist. Substrat dieser Amylasen, die Amylobiose, nicht zu spalten vermag. Der Wirkungsmechanismus der stärke-spaltenden Fermente fordert danach eine feinere Differenzierung als nur die Einteilung in den α - u. β -Typus. Es ist danach auch möglich, ob das stärke-spaltende Ferment des *Emulsins* dem Typus der α -Amylasen zuzurechnen ist (für diese ist ein spezif. Substrat nicht bekannt). Direkte Umwandlung von Stärke in Glucose erfolgt auch durch „Biolase“ (vgl. nachst. Ref.) u. durch die Fermente von *Saccharomyces Ludwigii* (vgl. GOTTSCHALK, S. 2931), die beide Maltose und Amylobiose nicht spalten. Zur Erklärung der Variationsmöglichkeiten des amylolyt. Prozentsatzes wird die Möglichkeit erwogen, daß ein u. dasselbe Spaltstück der Stärke durch eine Verknüpfung mit dem einen oder dem anderen Ferment in statu nascendi, d. h. am Augenblick seiner Freisetzung aus dem Stärkemol., auf sehr verschiedene Bahnen zu weiteren Abwandlung gedrängt werden kann. (*Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **59**. 1889—95. Berlin, Univ.) SPIEGEL.

Hans Pringsheim und **Eugen Schapiro**, *Über den fermentativen Abbau der Stärke durch „Biolase“*. (*Beiträge zur Chemie der Stärke*. XVI.) (XV. vgl. vorst. Ref.) „Biolase“ ist ein Fermentpräparat unbekannter Herkunft (nach Ansicht der Vff. vielleicht Diastase des *Bac. mesentericus vulgatus*), das von der Firma KALLE & Co. aus Entschlachten von Geweben in den Handel gebracht wird u. Stärke bei hohen Temp. außerordentlich schnell auflösen soll, ohne dabei reduzierenden Zucker in nennenswerter Menge zu bilden. Biolase ist in wss. Lsg. außerordentlich haltbar, auch bei alkal. Rk. dieser Lsg. ($p_H = 7,2$). Die Aktivität zeigt eine breite optimale Zone, $p_H = 5,4$ — $7,0$, nach dem alkal. Gebiet noch energ. Wrkg. bis $p_H = 7,6$, nach dem sauren Verminderung auf die Hälfte schon bei $p_H = 4,7$. Auffallend ist ferner die große Hitzebeständigkeit. Das Stärkemol. wird bei 80° mit größter Schnelligkeit in das Sol verwandelt, auch bei 90 — 95° noch momentan. Gerade bei diesen hohen Temp. ist die B. von Zucker gering. Bei 37° wird dagegen vorwiegend Glucose gebildet, obwohl Maltose (u. auch Amylobiose) durch das Ferment nicht angegriffen wird. Ebenfalls bei niedriger Temp. bildet sich neben Glucose ein reduzierendes Tri-

saccharid, das bei 70° zum Hauptprod. (neben wenig Glucose u. etwas eines reduzierenden, aber kein Osazon liefernden Dextrins, des Hauptprod. bei 80°) wird. Außer bei 70° vorgenommenen Amylolyse kann es am besten durch Vergärung der Glucose mittels *Saccharomyces marxianus* (gewöhnliche Bierhefe spaltet es) gewonnen werden. Es zeigt in wss. Lsg. starke Mutarotation von der durch Interpolation berechneten Anfangsdrehung von +160° bis +165° innerhalb 24 Stdn. zu +128—129°. Wahrscheinlich ist es ident. mit der β -Glucosidomaltose von LING NANJI (Journ. Chem. Soc. London **127**. 629; C. **1925**. II. 646). Es teilt mit ihr die von den genannten Forschern allein angegebene Anfangsdrehung, den Zersetzungspunkt des Osazons, die Spaltbarkeit durch *Hefemaltase* u. durch *Emulsin* unter Abspaltung von 1 Mol. Glucose. Die Wrkg. des Emulsins dürfte auf dessen Amylase nicht auf der β -Glucosidase beruhen. Auch maltasefreie *Pankreatinpräparate* spalten aus dem Trisaccharid Glucose ab. Dieses wird ferner gespalten durch die α -Amylase u. Maltase enthaltende *Takadiastase* u. durch glucosemaltasehaltigen Malzauszug. — *Acetylderiv. des Trisaccharids*, $C_{18}H_{21}O_{16} \cdot (C_2H_5O)_{11}$, $[\alpha]_D = +120,8^\circ$ bis $121,7^\circ$ (in Chlf.), Mol.-Gew. 846—863 (in Bzl.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 996—1000. Berlin Univ.) SPIEGEL.

Wilhelm Lücking, *Über das Verhalten der Speicheldiastase des Menschen und verschiedener Haustiere gegen Glykogen*. Glykogen wird nur durch die Speicheldiastase der Omnivoren (Mensch u. Schwein) einer amyolyt. Wrkg. unterworfen; eine diastat. Wrkg. des Speichels der Herbivoren konnte Vf. nicht konstatieren. Die diastat. Kraft des Speichels war am wirksamsten in schwach saurer Rk. (Dtsch. tierärztl. Wchschr. **34**. 257—59. Hannover, physiolog. Inst. der Tierärztl. Hochschule.) HÜ

I. Smorodinzew und V. Danilow, *Spaltung des Triacetins durch die Pankreaslipase in Gegenwart einiger Verbindungen von Chinin und Harnstoff*. (Bull. Acad. St. Petersburg [6] **1926**. 3—24. — C. **1925**. II. 1987.) BIKERMAN.

E₅. Tierphysiologie.

V. Kogan, M. Kamenew und N. Mantz, *Die Mehrphasenwirkung der Hormone*. Die Speicheldrüsen eignen sich ausgezeichnet für die Unters. einer ganzen Reihe von Fragen über den Einfluß verschiedener Faktoren auf die drüsigen Organe u. das vegetative Nervensystem. Sowohl *Insulin* allein als auch K u. Ca für sich können die *Adrenalinsalivation* herabsetzen, indem sie bei geeigneten Kombinationen ungefähr die gleichen Sekretwerte liefern. Andererseits aber können gewisse Kombinationen dieser Substanzen nur sehr wenig auf die Adrenalinssekretion einwirken ohne dieselbe in entgegengesetzter Richtung zu beeinflussen. Vff. nehmen an, daß die Hormone, indem sie die verschiedenen Organe oder deren Systeme beeinflussen, eine Mehrphasenwrkg. besitzen, die von der Gesamtheit der Bedingungen, unter denen die Inkrete ihre Tätigkeit zu entfalten haben, abhängig ist u. welche charakterisiert ist durch eine, wenn auch nicht quantitativ, so doch qualitativ verschiedene Rk. (Klin. Wchschr. **5**. 221—24. Charkow, Veterinärinstitut.) FRANK.

E. Peserico, *Humoraler Mechanismus und nervöser Mechanismus der Pankreassekretion*. Isolierte, überlebende Pankreasdrüse secerniert weder bei Durchblutung mit Ringer-, noch Blutringerlsg., wohl aber bei Zusatz von *Pilocarpin* oder *Acetylcholin*. *Atropineinw.* verhindert auch die Sekretion bei nachfolgender pilocarpinhaltiger Blutringerlsg. Hier setzt die Sekretion erst wieder ein, wenn der Durchströmungsfl. *Sekretin* zugesetzt wird. (Arch. di fisiol. **22**. 473—78. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 61—62. Padua, Istit. di fisiol. Ref. SCHULZ.) OPPENHEIMER.

Renato De Nunno, *Der Einfluß des Natriumsulfats auf die Gallensekretion*. Na_2SO_4 ist kein Chologogun. Es vermindert die Gallenmenge u. deren Bestandteile. Es macht die Galle aber flüssiger u. darauf kann in gewissen Fällen der therapeut.

t beruhen. (Folia med. **11**. 281—95. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 562. Neapel, patol. spec. med. Ref. JASTROWITZ.)

OPPENHEIMER.

ternhard Zondek und **S. Aschheim**, *Zur Funktion des Ovariums. I. Die Lokalisation des Hormons im menschlichen Ovarium. II. Die funktionelle Bedeutung der ovariellen Zellen. III. Die Entstehung des Follikelsaftes.* Prüfung der Funktion menschlichen Ovariums. Das zu untersuchende frische Gewebe wurde in kleine Stücke geteilt u. in die Oberschenkelmuskulatur der Maus implantiert. Beim kastrierten (weiße Mäuse) kann man die Brunst nur durch das spezif. Hormon des Ovariums rufen. Durch Injektion einer hormonhaltigen Fl. kann man bei Mäusen nach 24 Stdn. die Brunst auslösen. Man braucht nicht von einer besonderen interovariären Drüse zu sprechen, sondern nur von dem Hormon produzierenden folliculären App. Es gibt nur ein Ovarialhormon, daß alle hormonalen Funktionen steuert. Der Follikelsaft ist ein Sekret der Thecazellen, die Fl. stammt, wie jede Follikelfl., aus dem Blutserum oder aus der Lymphfl., aber erst durch die Abgabe des Ovarialhormon seitens der Thecazellen wird sie zum wirksamen Liquor folliculi. (Webschr. **5**. 400—404. Berlin, Charité.)

FRANK.

Schaus und **J. P. Bouckaert**, *Der Stoffwechsel des Froschherzens unter dem Einfluß von Adrenalin.* Die Stoffwechselzunahme geht nicht streng parallel den Veränderungen der Frequenz u. der Kontraktionen. Es muß unabhängig von den übrigen Adrenalinwrkgg. auch ein spezif. Stoffwechsel erregender Einfluß des Adrenalins auf das Herz angenommen werden. (C. r. soc. de biologie **94**. 800—803. Louvain, Inst. de physiologie.)

OPPENHEIMER.

Steppuhn und **K. Sargin**, *Über die Beeinflussung der peripheren Adrenalinwirkung durch Organextrakte.* Verss. am überlebenden Kaninchenohr u. Meerschweinchen. Placentaextrakt aktiviert unwirksame Konzz. von Adrenalin u. Hypophysent. Die wirksame Substanz muß in der Placenta präformiert sein; es kann sich um ein Aminwrkg. (Histamin) handeln, denn die aktivierenden Verdünnungen von Placentaextrakt liegen in einer anderen Größenordnung. Andere Organextrakte zeigen keine Wrkg., jedoch in wesentlich stärkeren Konzz. Die Histidin- u. Argininfraktion des Placentaextrakts ist wirksam, die Lysinfraktion unwirksam. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **112**. 1—16. Moskau, Abt. f. exp. Path. u. Pharmak. d. staatl. Chemo-pharmac. Forsch.-Inst.)

OPPENHEIMER.

L. E. Lamers, *Das Glucose-Insulinäquivalent.* Erweiterung der Studien von **BOUCKAERT** u. **STRICKER** (C. r. soc. de biologie **91**. 100; C. **1924**. II. 1365). Der Blutzucker wird längere Zeit u. auch bei intravenösen Injektionen sowohl eines Glucosegemischs, wie 2-zeitiger Insulin- u. Glucoseeinspritzungen verfolgt. Hypotonie wechselt je nach Art des Vorgehens in ihrer Dauer u. Intensität. (C. r. soc. de biologie **94**. 792—95.)

OPPENHEIMER.

L. E. Lamers, *Der Stoffwechsel des Kaninchens unter dem Einfluß der kombinierten Injektion von Glucose und Insulin.* (Vgl. **BOUCKAERT** u. **STRICKER**, C. r. soc. de biologie **91**. 102; C. **1924**. II. 1365.) Bei intravenöser Einspritzung des Gemischs von Glucose u. Insulin wird der Stoffwechsel doch zu (0,007 cal. pro Min.). Nichtsdestoweniger werden die eingeführten Zuckers nicht verbrannt. (C. r. soc. de biologie **94**. 795—97. Paris, Inst. de physiologie.)

OPPENHEIMER.

G. Danielson, *Wirkung des Insulins auf die Pikrotoxinhyperglykämie.* 1. u. 2. *Pikrotoxin* wirken antagonist. auf den Blutzucker. Gleichzeitig eingespritzt mit Insulin wird letzteres die hypoglykäm. Rk. des ersten unterdrücken. (C. r. soc. de biologie **94**. 1—53. Upsala, Inst. de pharmacol.)

OPPENHEIMER.

Kaufmann, *Die Bedeutung des Calciums und Thrombins für die Fibringerinnung.* 1. u. 2. *zur Gerinnungslehre.* Eine Fibringerinnung kann auch in vollständig Ca-freiem Plasma zustandekommen. Mit Gummilsg. trat in Ca-freiem Plasma eine mehr oder

minder intensive Gerinnung ein, während isoton. CaCl_2 -Lsg. unwirksam blieb. (Wehschr. 5. 453—55. Köln, Univ.)

Anneliese Wittgenstein und **Hans Adolf Krebs**, *Die Abwanderung intravenös eingeführter Substanzen aus dem Blutplasma. (Ein Beitrag zum Permeabilitätsproblem und zur Theorie der Giftwirkung. I. Mitt.)* Die Abwanderungsgeschwindigkeit der Farbstoffe aus dem Blut von verschiedenen Teerfarbstoffen ordnet sich in folgender Reihe: *Fuchsin* > *Safranin* > *Brilliantkresylblau*, *Methylenblau* > *Neutralrot*, *Methylenblau* > *Prunellblau* > *Uranin*, *Patentblau V* > *Echtgelb* > *Orange G* > *Eriocyanin*, *Chrysolin*, *Säurefuchsin* > *Lichtgrün SF*, *Kongorot* > *Trypanblau* > *Wasserblau*. Demnach wandern Farbstoffe schneller als saure ab u. innerhalb der Reihe der letzten die hochkolloidalen am langsamsten. Die bas. Farbstoffe üben eine starke Giftwrg. aus, während saure ohne ernsthafte Schädigung vertragen werden. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 268—81.)

OPPENHEIM

Hans Adolf Krebs und **Anneliese Wittgenstein**, *Die Abwanderung intravenös eingeführter Substanzen aus dem Blutplasma. (Ein Beitrag zum Permeabilitätsproblem und zur Theorie der Giftwirkung. II. Mitt.)* (I. vgl. vorst. Ref.) Die Theorien der Farbfärbung werden unter Bezugnahme auf die obigen Ergebnisse besprochen u. der Frage gemacht, die „Reaktionstheorie“ BETHES, die „Lipoidtheorie“ NIERENSTEIN u. schließlich die Oberflächenaktivitätstheorie TRAUBES zusammenzufassen in eine allgemeinere gehaltenen „Adsorptionstheorie“. Nach ihr ist die Aufnahme eines Farbstoffs durch die Zelle abhängig von der Adsorbierbarkeit des Farbstoffs am Protoplasma. In weiterem Verfolg dieser Gedanken kommen Vff. zu einer neuen Vorstellung von der Bedingungen der Permeabilität der Zellen, verweisen auf Zusammenhänge mit der Giftigkeit der Farbstoffe u. legen sich schließlich die Frage vor, ob die Giftwrg. an Farbstoffe mit den an den Farbstoffen gewonnenen Resultaten in Übereinstimmung gebracht werden kann. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 212. 282—99. Berlin, II. Klin.)

OPPENHEIM

Anneliese Wittgenstein und **Hans Adolf Krebs**, *Studien zur Permeabilität der Meningen unter besonderer Berücksichtigung physikalisch-chemischer Gesichtspunkte. I.—IV. Mitt. I.* Die Unters. wird angeregt durch die Angaben von LEHMANN MEESMANN (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 210; C. 1924. II. 2768) über das Bestehen eines Donnan'schen Gleichgewichts zwischen Blut u. Liquor cerebrospi. Wird die Barriere zwischen beiden Fl. als semipermeable Membran aufgefaßt, so müßten nach der Donnan'schen Theorie die diffusiblen Anionen in den Liquor eingezeißte Fl. „abgestoßen“, dagegen die Kationen „angezogen“ werden. Die H. ob die Meningen für beiderlei Ionen durchdringlich u. ob sie für Kolloidelektrolyten undurchdringlich sind, wurde in den folgenden Unterss. geprüft.

II. *Die Permeabilität der Meningen für diffusible Anionen.* Als Versuchstiere zeigten sich Hunde am besten geeignet. Die zunächst geprüften sauren Farbstoffe wurden in für das Körpergewicht äquimolekularen Mengen intravenös injiziert. Zur Unters. des Effektes dienenden Mengen des Liquors durch Suboccipitalstich gewonnen. Diese Farbstoffe waren *Uranin*, *Chrysolin*, *Eriocyanin*, *Äsculin*, *Patentblau*, *Orange G*, *Lichtgrün SF*, *Säurefuchsin*. Sie wurden sämtlich an Gelatine gepriegt u. gut diffusibel gefunden. Es zeigte sich, daß sie sämtlich in den Liquor übergehen können. Von organ. As-Verbb. scheinen nach den Literaturangaben die diffusiblen anod. sich wie die anod. Farbstoffe zu verhalten, kathod. oder kolloid gel. bedingt schlechter in den Liquor überzutreten. Auch *Salicylsäure*, *HCNS*, $\text{H}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$, können in ungiftigen Dosen gegeben, unter physiol. Bedingungen in den Liquor übergehen u. gleiches gilt für anorgan. Ionen, wie Br , Cl , J , NO_3 . Voraussetzung ist in allen Fällen, daß die betreffenden Ionen im Blute längere Zeit u. in nicht zu geringer Konzentration vorhanden sind.

1. *Die Permeabilität der Meningen für diffusible Kationen.* Es gelang nicht, Farbstoffe in etwa gleicher Konz. wie die sauren im Blute zu erhalten. Sie verdrängte die Blutbahn mit enormer Geschwindigkeit, u. der Vers., sie durch höhere Konz. im Blute anzureichern, scheiterte an ihrer tox. Wrkg. Diese größere Giftigkeit ist kathed. Farbstoffe dürfte eben auf ihrer Anreicherungsfähigkeit am Eiweiß beruhen, die sich nun schon gegenüber den Körperzellen geltend macht, die durchweg Eiweiß als das Blutplasma enthalten. Benutzt wurden die folgenden, durch Versuchsvers. als gut diffusibel erwiesenen Farbstoffe: *Neutralrot, Methylengrün, Indulin, Methylblau, Fuchsin, Methylgrün, Toluidinblau, Brillantkresylblau, Pyronin G, Eosin, Rhodamin B, Rhodamin 3B extra.* Ein Übertritt in den Liquor ließ sich nicht in den Rhodaminen nachweisen, die im Körper zu anderen Farbstoffen (Fluoreszenzen?) von wahrscheinlich saurer Natur umgewandelt werden. Von anderen organ. Substanzen scheinen sich *Alkaloide* durchaus ebenso wie die bas. Farbstoffe zu verhalten, u. auch *anorgan. Kationen* können die Scheidewand zwischen Blut und Liquor weniger gut als die Anionen durchdringen, da sie im Liquor nur einen geringen Proz.-%-Satz des Blutwertes erreichen.

2. *Die Impermeabilität der Meningen für Kolloide.* Kolloidale saure Farbstoffe (Indulinblau, Kongorot, Wasserblau), ferner *Immunkörper* u. *Hämoglobinderivate*, können beim gesunden Organismus die Meningen nicht passieren. Es finden sich dabei Versuchsvers., die aber nur bestätigen, daß die Durchdringungsfähigkeit auch von dem Konzentrationsgrad der Substanzen abhängt, das Donnan'sche Gleichgewicht also nicht maßgebend ist. Jedenfalls erscheint die Annahme einer besonderen „Schutzschicht“ des Plexus chorioideus (GOLDMANN) unnötig. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 33—622. Berlin, Univ.)

SPIEGEL.

3. *O. Guillaumin, Über eine Ausdrucksart der Veränderungen der Wasserstoffkonzentrationen im organischen Milieu, mit besonderer Berücksichtigung des Blutes.* Der Neutralpunkt ($pH = 6,77$, $pOH = 6,77$) ist in der vorgeschlagenen Skala der Nullskala hier ist $[OH^-]$ (Konz. der OH^- -Ionen) $1,7 \times 10^{-7}$. Bei der n. Reaktionslage des Blutes also bei $pH = 7,35$, $pOH = 6,125$ ist $[OH^-] = 7,5 \times 10^{-7}$. Die Differenz von $7,5 - 5,8$ wird mit dem Punkt 100 belegt. Die dazwischen liegenden Punkte entsprechen dieser Differenz der OH^- -Ionenkonz. vom Neutralpunkt berechnet. Bei $pH = 7,6$ erhält folglich bei einer $[OH^-]$ von $11,63 \times 10^{-7}$ ($= 2 \times 5,8$) die Skala 100. (Bull. Soc. Chim. Biol. 8. 160—64. Saint Antoine, Lab. de la clin. méd.)

4. *Opp. Jean La Barre, Ein Beitrag zu den Veränderungen des Blutzuckers nach intravenöser Injektion von Histamin.* Die Hyperglykämie nach *Histamininjektionen* am Kaninchen ist vermutlich auf eine Adrenalinausschüttung durch Sympathikusreizung zurückzuführen. Durch *Ergotamin* läßt sie sich unterdrücken. (C. r. soc. de med. exp. 94. 779—81. Brüssel, Inst. de therap.)

OPPENHEIMER.

5. *Farber, Über die Wirkung von Cholin, Pilocarpin und Ergotamin auf den Blutzucker beim normalen und beim splanchnicotomierten Kaninchen.* Die Befunde BERNARDI, daß nach subcutaner Injektion größerer Dosen von Pilocarpin, in geringerem Maße auch von Cholin bei Kaninchen Hyperglykämie eintritt, werden bestätigt. Durch Durchschneidung des Splanchnicus hindert das Zustandekommen dieser Wrkg. nicht. Die Herabsetzung des Blutzuckers nach größeren Gaben von Cholin war auch nach Ausschaltung der zentralen u. peripheren sympath. Reize nicht festzustellen. Pilocarpin bewirkte beim gesunden Tiere Hyper-, nach Splanchnicusdurchschneidung Hypoglykämie. Vff. führen danach die Hyperglykämie nach größeren Gaben von Cholin u. Sympath. Mitteln auf die tox. Schädigung der Leberzellen zurück; nach ganz kleinen Gaben dieser Mittel kann durch Vaguswrkg. Hypoglykämie auftreten. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 525—37. Berlin, Charité.)

SPIEGEL.

6. *W. Koks, Über die hämolytische und hämopoetische Wirkung von Milz- und Lebermarksextrakten.* Die hämolyt. Substanz der genannten Extrakte verträgt

Trocknung, Temp. bis zu 50°, ist l. in W., A. u. Ä.; sie wirkt sowohl bei subcut wie intravenöser Injektion. Die hämatopoet. Substanz verhält sich fast genau so wie in Ä. Angaben über die Trockensubstanz, den Refraktionswert, N-Gehalt u. die Aschenbestandteile der verschiedenen Milz- u. Knochenmarkextrakte (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **212**. 229—38. Debreczen, Physiol. Inst.) OPPENHEIM.

W. Asbelew, *Zur Frage des Zusammenwirkens lipoider Substanzen mit Chinin in ihrer hämotoxischen Wirkung in Verbindung zur Hämoglobinuriepathogenese.* Prüfung u. Erörterung der Angaben von KRITSCHESKY u. MURATOFFA (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I **38**. 38; C. **1924**. I. 1231) sprechen für deren Annahme, daß die Hämoglobinurie bei Malaria auf Zusammenwirken von Chinin mit Lipoidstoffen des Organismus zurückzuführen sei. Lipide Substanzen können im Organismus die hämolyt. Wrkg. des Chinins nicht aktivieren. Auch *in vitro* beeinflußt Lecithin die Chininhämolyse nur so weit, als es selbst (durch Sauerstoff- oder Fettsäuregehalt) hämolyt. auf serumfreie Blutkörperchen wirkt. Im Blutserum sind keine als Aktivatoren der Chininhämolyse dienenden Stoffe nachgewiesen. Beobachtungen KRITSCHESKYS bei Chininkonz. von 0,25—0,4% sind wahrscheinlich den physikal. Veränderungen des Mediums infolge Wrkg. des Chinins zuzuschreiben. Das Blutserum von Malaria-kranken im akuten Stadium hat meist antihämolyt. Eigenschaften. Nach diesen Feststellungen beruht Chininkur keine Gegenanzeige gegen intravenöse Behandlung mit Lecithin. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I **47**. 89—96. Staraja Buchara [Zenit], Inst. f. Tropenkrankh.) SPIEGEL.

Bernhard Steinberg und **E. E. Ecker**, *Die Wirkung von Antiserum gegen lösliche toxische Substanz von Bacillus coli bei Peritonitis durch Bacillus coli.* Kaninchen, denen genügende Mengen Colibacillen in die Bauchhöhle injiziert wurden, starben nach einer Inkubationszeit von 1—1½ Stdn. innerhalb weniger Stdn., wobei das Peritoneum nur geringe Veränderungen aufwies. Die gleiche Wrkg. ließ sich erreichen mit jungen Bouillonkulturen, die zentrifugiert u. zur Abtötung der zurückgebliebenen Bakterien erhitzt waren, doch ist die Wirksamkeit der so gewonnenen l. Toxine schwankend. Durch intravenöse Injektion der bacillenfreien Bouillonkulturen ließen sich von Kaninchen ein Antiserum gewinnen, das, unmitelbar oder ½ Stde. nach der intraperitonealen Injektion der fünffachen gewöhnlichen Dosis von Colibacillen injiziert, die Tiere in 10 von 12 Verss. rettete. (Journ. Exp. Med. **43**. 443—50. Columbia Univ., land, Western Res. Univ.) SPIEGEL.

I. Snapper, **A. Grünbaum** und **S. van Crefeld**, *Ein Fall von Lävulosurie.* Lävulosurie war alimentärer Natur, verschwand bei Entziehung lävulosehaltiger Nahrung u. wurde durch Darreichung von Lävulose verstärkt, wobei der Blutzuckergehalt nur sehr wenig anstieg. Der Glucosestoffwechsel war n., hierfür bestand kein n. Blutzuckerschwellenwert. *Insulin* war ohne Einfluß. Hieraus u. aus dem Umstand, daß pankreaslose Hunde aus Lävulose noch Glykogen zu bilden vermögen, ist zu schließen, daß echte Lävulosurie nicht auf Pankreasinsuffizienz beruht, sondern auf Minderwertigkeit einer besonderen Leberfunktion. — Die Angehörigen der Patientenfamilie ließen keine Neigung zu Lävulosurie erkennen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde **I**. 1600—1612. Amsterdam.) SPIEGEL.

Erwin Leube, *Über die Resorption von Calciumdiuretin und seinen Einfluß auf die Harnzusammensetzung beim gesunden Menschen.* Obwohl Calciumdiuretin im Gegensatz gleich zu Diuretin ausgesprochen wasserlöslich ist, zeigt die Resorptionsfähigkeit nach peroraler Verabreichung nur geringe Abweichungen. Seine diuret. Wrkg. zeigt sich beim gesunden Organismus in starker NaCl-Ausschwemmung. Nachträgliche intensive Einsparung von W. u. NaCl läßt die Diurese beim n. Menschen in den 24-stündl. Ausscheidungsmengen nicht zum Ausdruck kommen, wohl aber bei Betrachtung stündlich oder 2-stündlich gelassenen Harnmengen. Nach der Anwendung von Calcium-

in wird die Perspiratio insensibilis beim Gesunden in gleicher Weise angeregt
e renale Abgabe von W., folgende starke Abnahme jener entspricht der Ein-
g von W. u. NaCl. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 480—86. Ludwigshafen
, KNOLL A.-G.)

SPIEGEL.

1. Richet fils und R. Monceaux, I. *Grundstickstoffgehalt des Harns. Der
alt des Harns bei einer N-freien Nahrung unterworfenen Hunden.* II. *Grundstick-
halt des Blutes.* Die neuen Grundwerte sind Harnstoffwerte u. werden im Harn
Blut bei N-freier Nahrung erhalten. Der Grund-N-Wert im Harn ist (als Mittel
er Bestst.) mit 7,2 g pro l., im Blut mit 0,21 g Harnstoff pro l. angegeben. (C. r.
biologie **94**. 840—41.)

OPPENHEIMER.

urt Friedländer und Walter G. Rosenthal, *Über den Einfluß des Phosphor-
ms auf den Blut- und Harnzucker des normalen und des diabetischen Organismus.*
n. Menschen u. Hund sind iso- u. hyperton. alkal. oder neutrale Phosphatlsgg.
Wrkg. auf den Blutzucker. Diabetiker, u. zwar schwere stärker als leichte, reagieren
ner Senkung des Blutzuckerspiegels. Auch die Zuckerausscheidung ist dann
esetzt. Die Wrkg. ist dem PO_4 -Ion eigen u. an die Anwesenheit gewisser Mengen
usulin gebunden, denn alkal. u. neutrale Lsgg. zeigen keinen Unterschied, u. an
aslosen Tieren bleibt die Wrkg. aus. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **112**.
Breslau, Med. Klin.)

OPPENHEIMER.

Frank Fremont-Smith und M. Elizabeth Dailey, *Der Zucker in der Cerebro-
lüssigkeit.* Im Liquor cerebrospinalis kommen u. U. (10% des Zuckers ausmachend)
erende Substanzen vor, die hydrolysierbar sind. Diese sind bei Zuckerbestst.
ücksichtigen. Parallelität zwischen Blut- u. Liquorzucker nicht feststellbar.
of neurol. a. psychat. **14**. 390—95. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 69—70. Boston,
husselts gen. hosp. Neurol. labor. Ref. ELLINGHAUS.)

OPPENHEIMER.

Carnot und Z. Gruzewska, *Der durch Natriumbicarbonatinjektion hervor-
Überschuß in der Alkalireserve des Blutes vermehrt die Alkaleszenz der Galle
ren CO_2 -Gehalt.* (C. r. soc. de biologie **94**. 756—58.)

OPPENHEIMER.

Wislicki, *Über den Zusammenhang zwischen Blutzerfall und Gallensäuren-
bildung.* An einem Gallenfistelhund, dem als blutzerstörendes Mittel Phenyl-
in injiziert wurde, konnte keine den Blutzerfall begleitende Vermehrung der
säureausscheidung beobachtet werden. Auch Milzentfernung änderte an diesem
is nichts. Zwischen Blutzerfall u. Gallensäurebildung sind somit keine unmittel-
Beziehungen nachweisbar. Will man angesichts der chem. Verwandtschaft
en Cholesterin u. Gallensäuren einen Zusammenhang zwischen Blutzerfall u.
säurebildung annehmen, so bleibt nur die Vermutung, daß die Gallensäuren
las physiolog. Endprod. des Blutuntergangs sind. (Arch. f. exp. Pathol. u. Phar-
112. 122—28. Breslau, Med. Klin.)

OPPENHEIMER.

les Amar, *Wachstum und Nahrungsmiteleinwirkungen.* (Vgl. TERROINE u.
ER, S. 2486.) Das Körperwachstum ist die Resultante der Einnahmen u. Aus-
des Organismus, aber gerade diese lassen sich durch die Qualität der Nahrung
lich beeinflussen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 544—45.)

OPPENHEIMER.

vzeff Heller, *Chemische Untersuchungen über die Metamorphose der Insekten.*
tt. *Über die „subitane“ und „latente“ Entwicklung.* (II. vgl. S. 2395.) Die Ge-
verlust- u. Sauerstoffverbrauchskurve charakterisieren die Entw. während der
zeit. Es wurden diese Kurven ermittelt: für Subitanentw. bei *Argynais Paphia*
tephila Euphorbiae, für Latententw. bei *Deilephila Euphorbiae*. Die Überein-
ing aller dieser Kurven beweist, daß die beiden Entwicklungsweisen als ein
selbe Vorgang von verschiedener Zeitdauer aufzufassen sind. — Bei *Deilephila*
rbiae wurden 2 Arten Raupen gefunden; die einen lieferten Puppen, deren
klungsgeschwindigkeit mit der Höhe der Temp. ab- u. zunahm, bis zu einer
entw. bei 22—23°. Die andern ergaben Puppen, die trotz erhöhter Temp.

(bis 30°) überwintern. Da die ersten Raupen anfangs überwiegen (im Juli bis dann aber selten angetroffen werden, u. da in warmen Jahren die zur Subitartät nötige Temp. erreicht wird, so kann diese Erscheinung als eine fakultative zweite ration gedeutet werden. (Biochem. Ztschr. **169**. 208—34. Lwów, Medizin.-chem. Univ.)

Umberto d'Ancona, *Über die Einwirkung von Salzlösungen auf die Widerfähigkeit gegen das Hungern bei jungen Aalen*. In 1‰ig. Lsgg. verschiedener hielten junge Aale das Hungern länger aus, sie verloren dabei weniger an Gewicht. Trocken- u. Aschengewicht als in reinem W. In 5‰ig. Lsgg. bestand bei niedriger Temp. ein solcher Unterschied nicht, wohl aber wieder in höherer. Unter Berücksichtigung früherer Beobachtungen über Knochen u. Schuppen der Fische usw. Vf., alle diese Erscheinungen so deuten zu sollen, daß der durch das Hungern erzeugte Zustand von Acidose eine Entkalkung der Skeletteile herbeiführt, die vermieden werden kann, wenn die Acidose durch Zufuhr von Metallionen neutralisiert wird. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] **2**. 443—49. 1925. Rom, Univ.) SPIEGEL

R. West und **E. M. Benedict**, *Ketogenese nach Verfütterung von t-Oxystearinäthylester*. Nach Verfütterung des Äthylesters der t-Oxystearinsäure an acidot. Diabetiker geht die Acetonausscheidung, nicht aber die Ausscheidung der organ. Säuren zu. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 280—81. 1925; Ber. ges. Physiol. **3**. New York, Dep. of med. coll. of physic. a surg. Columbia univ. Ref. SCHMITZ.)

P. György, *Weitere Erfahrungen über Behandlung und Verhütung der Rachitis bestrahlter Milch*. Bestrahltes Milchpulver ist ein zuverlässig wirkendes halbsynthet. antirachit. Heilmittel. (Klin. Wchschr. **5**. 747—49. Heidelberg, Kinderklinik.)

Kl. Gollwitzer-Meier, *Die Regulierung des Säurebasengleichgewichts*. Zusammenfassende Darst. der im Körper zur Aufrechterhaltung des normalen Säurebasengleichgewichts wirkenden Mechanismen u. Organe. (Klin. Wchschr. **5**. 736—40. C. G. Schwab, Medizin. Klinik.) HÜCK

Rudolf Jaffé, *Cholesterinstoffwechsel und Haarwuchs*. Es gelingt, beim Kanarienvogel durch äußere Applikation verschiedener Substanzen das Haarwachstum derart zu regeln, daß vorher kahle, unpigmentierte Stellen in pigmentierte Wachstumszone umgewandelt werden, so mit reinem Cholesterin, Teer u. anderen Substanzen. Vf. nimmt an, daß die Wrkg. dem Cholesterin zukommt, beim Teer beispielsweise wird dann durch den entzündlichen Reiz u. die dadurch erfolgende Hyperämie die Talgdrüsen zu stärkerer Tätigkeit angeregt werden u. mehr Cholesterin abscheiden, das wiederum auf den Haarwuchs wirkt. Mit Cholesterin gefütterte Tiere zeigten gegenüber den Kontrolltieren keinen erhöhten Haarwuchs. (Klin. Wchschr. **5**. 507—08. Frankfurt a. M., Univ.) FRAU

Marcelle Lapique und **M. Nattan-Larrier**, *Antagonistische Wirkungen von Calcium und Kalium auf die Wasseraufnahme und die Chronaxie des Muskels*. KCl- u. CaCl₂-Lsgg. eingelegte Muskeln nehmen an Gewicht zu, u. zwar im ersten Stadium stärker. Legt man in NaCl-Lsg. ein u. ersetzt graduell unter Beibehaltung des osmot. Drucks einmal einen Teil des NaCl durch KCl u. das andere Mal durch CaCl₂, so tritt die entgegengesetzte Wrkg. der beiden Kationen in Erscheinung. KCl verstärkt, CaCl₂ vermindert die W.-Aufnahme. Die Chronaxie wird durch CaCl₂ vermehrt, durch KCl vermindert. (C. r. soc. de biologie **94**. 808—09. Paris, Labor. de physiologie, Coll. de la Sorbonne.) OPPENHEIM

Hans Popper, *Zur Frage der Phosphorretention in den Organen parathyreoidealer Katzen*. Bei Katzen war nach Entfernung der Schilddrüse u. Nebenschilddrüsen der P-Gehalt der Organe nicht wesentlich verändert, in Muskeln 2,3—3,2% der Trockensubstanz gegen n. 2,5—2,6%, in Leber 2,3—3,2 gegen 2,6—2,8%. Der Ca-Gehalt der betreffenden Organe, nach dem Verf. von HEUBNER u. RONA (Biochem. Ztschr. **135**. 248; C. **1923**. III. 682), war durch die Operation nicht verändert. Somit

eine wesentliche Verschiebung des Verhältnisses Ca/P in den Weichteilen, doch dieser Schluß in Anbetracht der Unsicherheit der für Best. des Ca verfügbaren Daten nicht endgültig. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 547—52. Wien, Univ.) Sp. **Rabbeno**, *Die Einwirkung von Magnesiumsalzen auf den Gasstoffwechsel des Or-
us*. Bei intraperitonealer Injektion isoton. Mg-Salzlsgg. steigt die CO₂-Ausscheidung O₂-Verbrauch fällt. Bei hyperton. Lsgg. ist das Verh. des O₂-Verbrauchs in-
nt. Bei intravenösen Injektionen steigen CO₂- u. O₂-Werte. In allen Fällen sinkt
mp. (nach 10 Min. bis zu 1—2 Stdn. um 1—2°). (Kaninchenverss.) (Arch. ital.
l. **75**. 44—49. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 59. Turin, Laborat. de physiol. Ref.
ING.)

OPPENHEIMER.

Alan Winter Rowe und **Joseph Chandler**, *Galaktosestoffwechsel. II. Blut-
kurven*. (Vgl. Arch. of internal med. **34**. 388; C. **1925**. II. 63.) Verss., aus denen
hängigkeit der Kurven von der Reisdosis hervorgeht. (Endocrinology **8**. 803—31.
Ber. ges. Physiol. **33**. 552—53. Ref. LANGE.)

OPPENHEIMER.

Sierens und **A. K. Noyons**, *Der Einfluß des Thyroxins auf den Stoffwechsel
ube*. Nicht nur die Intensität der Stoffwechselerhöhung, sondern auch der Wir-
beginn ist von der Dosis abhängig. Je größer die eingespritzte Menge, desto
setzt die Steigerung ein, scheint aber auch früher abzuklingen u. eine negative
nach sich zu ziehen. (C. r. soc. de biologie **94**. 789—92. Louvain, Inst. de phy-
OPPENHEIMER.

Alfred Gigon und **Wilhelm Brauch**, *Aufbau und Abbau der Kohlenhydrate im
smus*. III. Mitt. (II. vgl. Helv. chim. Acta **8**. 97; C. **1925**. I. 2235.) Die früheren
wurden fortgesetzt u. dadurch ergänzt, daß in einigen Verss. auch der W.-Gehalt
ates berücksichtigt wurde, wobei die Apparatur von MÜLLER u. WILLENBERG
. f. prakt. Ch. [2] **99**. 34; C. **1919**. IV. 246) für C- u. H-Best. benutzt wurde.
ergebnisse lassen sich unter Berücksichtigung der bereits früher mitgeteilten
ermaßen zusammenfassen: Zufuhr von Dextrose (ähnlich auch von Maltose
ulose) erzeugt im Nüchternzustande starke Steigerung des Gesamt-C, Sinken
esamt-N u. vorübergehendes Sinken des W. im Blute, im Hungerzustande
n von Gesamt-C u. Gesamt-N u. leichte Alkalosis. Der gesunde Mensch verhält
uf Dextrosezufuhr wie das gesunde nüchterne Kaninchen, der zuckerkrank
rne Mensch wie das gesunde Hungertier. — Injektion von *Insulin* bei gesunden
en u. Kaninchen erzeugt starkes Sinken des C, meist leichtes Sinken des N
übergehende Steigerung des W. im Blute, beim Hungertier ebenfalls Sinken
aber regelmäßig Steigerung des Gesamt-N. Bei Diabetikern finden sich in auf
klin. günstig reagierenden Fällen deutliches Sinken des Gesamt-C bei unver-
em oder leicht gesteigertem N u. ansteigendem W.-Gehalt des Blutes, in klin.
auffallend stark reagierenden (meist leichten) Fällen kann man Steigen des
en Blut-C trotz stark herabgesetzten Blutzuckers konstatieren. Die Schwän-
des C im Blute sind bedeutend gewaltiger als die des Zuckers. — In Mus-
r der Kaninchen ergab sich nach Insulininjektionen Sinken des Gesamt-C
igen des W., in der Leber umgekehrt Steigen des Gesamt-C u. Sinken des
haltes. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 688—702. Basel, Univ.) SPIEGEL.
Asao Fujihara und **Koken Ito**, *Ein Beitrag zum fermentativen Abbau von
monophosphorsäure durch Knochenextrakt*. Anhang: *Der Einfluß von hexosemono-
orsaurem Natrium auf Knochenbrüche*. Hexosemonophosphorsäureester wird
Knochenextrakte gespalten. Injektion des Esters bei Tieren mit experimentellen
ren zeigte auf die Frakturheilung keinen Einfluß, dagegen nahmen die Tiere
zu als die Kontrollen. (Okayama-Iggakkai-Zasshi **1925**. 603—11; Ber. ges.
l. **33**. 620. Ref. GOTTSCHALK.)

OPPENHEIMER.

Bürgi und **T. Gordonoff**, *Zur Pharmakologie des Schwefels*. Bei längere Zeit
gefütterten Kaninchen war der Glykogengehalt der Leber stark vermehrt, um

etwa das 2—3-fache der Lebern von Kontrolltieren. Es ist anzunehmen, daß in stärkeren Glykogenspeicherung in der Leber der Blutzuckerspiegel sinken (Klin. Wchschr. 5. 466. Bern, Univ.)

Paul Pulewka, *Zur Kenntnis der Acetylenwirkung*. VII. Mitt. *Versuche über die Beziehungen zwischen Stoffwechselintensität und Empfindlichkeit gegen Acetylen* (VI. vgl. FÜRST, Ztschr. f. physiol. Ch. 144. 76; C. 1925. II. 69.) Mit gesteigertem Stoffwechsel nimmt die Empfindlichkeit gegen Acetylenbetäubung ab. Der Nachweis wird durch die Stoffwechselsteigerung bei der Ratte nach Schilddrüsenfütterung durch die jahreszeitlichen Stoffwechselschwankungen bei der Maus, die auf Thyroxinzufuhr nur undeutliche Änderung der Stoffwechsellage zeigt, erbracht. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 112. 82—99. Königsberg, Pharmak. Inst.)

Raymond Hamet, *Über die vasodilatorische Wirkung von Acetylcholin an der Niere*. Verss. an Hunden. An der Hand von Kurven wird die Zunahme des Nierenvolumens nach intravenöser Acetylcholininjektion gezeigt. (C. r. soc. de biologie 1925. 727—29. Paris, Lab. de pharmac. Fac. de méd.)

N. Waterman, *Wirkung einiger Bleiverbindungen auf das Sarkom*. Nach intravenöser Injektion von Pb-Salzen ungesätt. Säuren (Ölsäure, Undecylensäure) entwickeln sich die Tumoren bei Kaninchen schlecht, u. die Übertragungsverss. mit anderen Geschwülsten auf Hühner fallen fast ausnahmslos negativ aus. (C. r. soc. de biologie 1925. 724—25. Amsterdam, Lab. Anthoni van Leeuwenhoekhuis.)

M. Loeper und G. Marchal, *Die Wirkung des Zuckers im Magen*. Zucker steigert zwar die Magensaftproduktion an, er schwächt aber in Lsg. genommen durch Verdünnung die schädigende Wrkg. der HCl. Er steigert die gastr. Leukopedese, damit die lokal schädigende Wrkg. einiger Arzneimittel auf. Deshalb ist Zuckerzusatz zu Medikamenten recht zweckmäßig. (Progr. med. 759—61 u. Bull. et mém. de la Fac. de méd. des hôp. de Paris 41. 726—34. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 560—61. Ref. 1925. BAUER.)

Juzuru Mita, *Zur Wirkung der Nichtelektrolyte aufs Herz*. Wird in Ringpräparat NaCl durch Saccharose, Dextrose oder Harnstoff ersetzt, so macht sich keine akt. pharmakolog. Wirksamkeit dieser Nichtelektrolyte bemerkbar, u. zwar im Gegensatz zu einer Ca-Wrkg. Die Nichtelektrolytwrkg. ist durch einen Antagonismus gegen Na- u. K-Wrkg. charakterisiert. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 112. 17—21. Königsberg, Pharmak. Inst.)

P. Carnot und R. Coquoin, *Die Lokalisation des Natriumsalicylats im Gewebe (und besonders im Gebiet der Gelenke)*. Zum Nachweis des Na-Salicylats in den Geweben wird die Erscheinung der Fluorescenz bei ultravioletter Bestrahlung benutzt u. eine entsprechende Apparatur angegeben. Das Ergebnis der Untersuchungen ist, daß Salicylate (per os wie parenteral gegeben) sich ziemlich gleichmäßig im Organismus verteilen, daß aber Sehnen, Aponeurosen, Knorpel u. schließlich auch Muskeln einen gewissen Prädispositionsort zur Ablagerung darstellen. (C. r. soc. de biologie 1925. 850—52.)

Bo Claeson, *Wirkung der Zimtsäure auf die korpuskulären Elemente des Blutes*. Intravenöse Injektion von zimtsauren Salzen hinterläßt eine Leukocytose. (C. r. soc. de biologie 1925. 949—50. Upsala, Instit. de pharmac.)

G. Billard, *Daphnien und neurotrope Gifte*. Feststellung der tödlichen Konzentrationen von Morphin, Cocain, Aconitin, Strychnin, Nicotin, Adrenalin, Atropin, HgCl₂. (C. r. soc. de biologie 1925. 736—37.)

T. Komiyama, *Die Wirkung der Adstringentien auf die Rattenschwanzsehne*. Zn, Al u. Pb-Acetat verkürzen die Rattenschwanzsehne. A., Phenol u. HgCl₂ sind unwirksam. Tannin ist wenig wirksam, wirkt aber der Säurequelle entgegen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 112. 22—28. München, pharmak. Inst.)

L. Fournier und **A. Schwartz**, *Präventivwirkung des Wismuts gegen die experimentelle Kaninchensyphilis*. 3—6 Monate lassen sich mit l. wie unl. Bi-Verbb., intramuskulär eingespritzt werden, Kaninchen gegen Syphilisinfektion schützen. (d. l'Acad. des sciences **182**. 545—46.) **OPPENHEIMER**.

Werner Baumgartner, *Zur Therapie der Lues mit „Albert 102 S“*. Nach Zufuhr Arsenobenzols „Albert 102 S“ verschwanden die Spirochäten nach längstens tdn., die klin. Erscheinungen bei recenter u. tertiärer Lues gingen schnell zurück, Na.Rk. wurde günstig beeinflusst, so daß dem Präparat ein beachtenswerter Platz er antiluet. Therapie zukommt. Nach seinen Erfahrungen hält Vf. es für zweckig, bei reinen „Albert“-Kuren die Einzel- u. die Gesamtdosierung zu steigern. (n. Wehschr. **5**. 357—59. Marburg, Univ.) **FRANK**.

C. Levaditi und **S. Nicolau**, *Tellur als ein neues, gegen experimentelle Syphilis wirkendes Element*. Verss. mit Na-Tellurit, 4-Äthylcyclotelluropentandion (vgl. GAN u. DREW, Journ. Chem. Soc. London **125**. 1601; C. **1924**. II. 1924). Te int weniger wirksam zu sein als Bi. Vff. haben jedoch andere Te-Verbb. in der d, über die berichtet werden soll, u. die Te sehr wohl in die Reihe der antisypilit. enden Elemente (Va, As, Pt, Au, Hg, Bi) einreihen lassen. (C. r. soc. de biologie **827**—28.) **OPPENHEIMER**.

F. Pharmazie. Desinfektion.

Georg Edmund Dann, *Die pharmazeutische Nomenklatur*. Besprechung der in verschiedenen Ländern üblichen pharmazeutischen Nomenklatur u. Vorschlag, die Länder, die die german. Nomenklatur benutzen, die Bezeichnungen des neuen ed. Systems von 1925 als Nebennamen einführen möchten. (Pharm. Ztg. **71**. —99.) **ROJAHN**.

Karsten-Salmony, *Haltbarmachung von Wasserstoffsperoxydlösungen sowie auch oraten*. Zusammenstellung der verschiedenen Verf. nach der Patentliteratur. (m.-Ztg. **50**. 280—81. Berlin.) **JUNG**.

Scheermesser, *Neue Methode zur fabrikatorischen Herstellung von Yoghurt-Bakterien ablettenform*. Von der Beobachtung ausgehend, daß der zum Pressen von Yoghurt-ten gewöhnlich verwendete Milchezucker nur schwer von fremden Pilzsporen zu sien ist, versetzte Vf. eine durch Trypsinverdauung teilweise hydrolysierte u. dann lisierte Caseinlg. mit Reinkulturen von Yoghurtbakterien, CaCl_2 u. Na_2HPO_4 . sich ausscheidende Calciumphosphat reißt durch Adsorption fast alle Yoghurt-erien mit nieder. Aus der Fällung lassen sich haltbare Tabletten formen. (Pharm. **71**. 499.) **ROJAHN**.

Erich Ebstein, *Zur Geschichte der Kataplasmen*. Kleine histor. Skizze mit Literaturbe. (Ztschr. f. medizin. Chemie **4**. 12—13. Leipzig, Städt. Pfl. Haus.) **FRANK**.

R. N. Chopra und **N. N. Ghosh**, *Einige medizinale Pflanzen, die im Himalaya sen*. Analysen der Wurzeln u. Blätter von Belladonna, von Hyosciamus, Podolum emodi, Artemisia maritima, Valeriana officinalis u. Digitalis purpurea. Der ult an wirksamen Substanzen entspricht den europ. oder amerikan. Erfahrungen. (ian Journ. Medical Research **13**. 533—37. Calcutta, School of trop. med. rg.) **OPPENHEIMER**.

F. Sternon, *Die Darstellung der offizinellen Tinkturen durch Perkolation*. Vf. gt vor, die Tinkturen nicht durch Mazeration, sondern durch Perkolation herellen. Wie an den Beispielen der Coca-, Ipecacuanha-, China-, Opium- u. Strychnosur gezeigt wird, sind die Alkaloide bereits nach zwei Tagen restlos extrahiert. (rn. Pharm. de Belgique **8**. 227.) **ROJAHN**.

U. Hintzelmann und **G. Joachimoglu**, *Über die Haltbarkeit wässriger Digitalis-kte*. Im Digitalisinfus entstehen innerhalb weniger Tage saure Prodd. Die VIII. 1. **223**

Wirksamkeitsabnahme ist im angesäuerten Infus am geringsten, in alkalischen (NaHCO_3 -Zusatz) am stärksten. Der unbehandelte Infus hält die Mitte. (Arch. exp. Pathol. u. Pharmak. **112**. 56—59. Berlin, Pharmak. Inst.) OPPENHEIMER

A. H. Clark, *Die Alkaloide von Ceanothus americanus*. Vf. bespricht V. u. Anwendung des wilden Schneeballs, *Ceanothus americanus*, einer zu den *Rhamna*-gehörigen Pflanze gegen Asthma, Bronchitis, Krebs, Geschlechtskrankheiten u. a. Leiden. Neuerdings wurde von TAYLOR u. anderen (unveröffentlichte Arbeiten) gefunden, daß die Pflanze den Blutdruck senkt u. per os verabreicht, hämostypt. w. Die Wurzelrinde enthält ein stechend riechendes Öl, „Resin“, Tannin, mehrere Alkaloide aber offenbar keine Glucoside. Die Alkaloide wurden der mit Kalk vermischten Dm. mittels Ä. entzogen. Das amorphe Alkaloidgemisch schm. bei ca. 190° . Durch fraktionierte Lsg. wurde es zerlegt in amorphe, zwischen 140 u. 241° schm. Anteil u. einen krystallinen Körper vom F. 255° . Letzterer ist weniger bitter als die amorphen Alkaloide, prakt. unl. in W. u. weniger l. in A. als die übrigen Fraktionen. Mit Alkalireagenzien geben alle wenig charakterist. amorphe Ndd. Nur der Körper vom F. 255° gibt ein krystallines Pikrat u. Pt-Salz. Es werden keine Angaben über Analyse gemacht. (Amer. Journ. Pharm. **98**. 147—56. Pharmaz. Labor. d. Univers. Illinois, Chicago.) ROJAHN

J. Planelles, *Pharmakologische Grundlagen der Digitalisdarreichung*. Sammelw. (Arch. de cardiol. y hematol. **6**. 193—203. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 640. Paris.) FLURY.) OPPENHEIMER

W. Heubner, *Über „organische“ Eisenpräparate*. Umfassende Darst. der verschiedenen therapeut. Fe-Präparate. Vf. glaubt auch ohne genaue Unters. aller einzelnen Handelsprodd. auf Grund der heutigen Erkenntnisse u. eigener Verss. sagen zu dürfen, daß es sich bei den meisten Formen von Eiweißverb., ebenso wie bei Eisenzucker, um nichts anderes handelt als um kolloidales Eisenoxydhydrat, das die Ggw. der organ. Substanzen u. durch Aufladung gegen Koagulation geschützt ist. Es werden die Einteilungen der Fe-Präparate nach MORAWITZ, FISCHLER u. F. u. nach HEUBNER aufgeführt. (Klin. Wehschr. **5**. 588—93. Göttingen.) FRANK

L. A. P. Anderson und **J. F. Caius**, *Wirkung der Lagerung auf Schlangengift Antiserum*. I. Abschwächung nach 6—9 Monaten, später wieder Anstieg des Titers. Direktes Tropensonnenlicht hat zerstörende Wrkg. (Indian Journ. Medical Research **13**. 113—19. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 632. Bombay, Bacteriol. lab. Ref. GUTTFELD.) OPPENHEIMER

—, *Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften*. **Agomensin**, eine aus *Corpus luteum* dargestellte Substanz, Tabletten mit 0,02 g u. Ampullen mit 0,02 g. Bei funktioneller Amenorrhöe, Menopause, Unfruchtbarkeit usw. — **Antithyreobin**, bei Ödemen u. Ascites im Gefolge von Herzklappenfehlern, Herzkonstruktionen, Morb. Bright. u. Nephrosklerose mit ausgesprochen diuret. Wrkg. in Fällen in denen Digitalis, Theobromin u. Novasurrol versagen. — **Atochinol**, Phenyleincholsäureallylester in Form dragierter Tabletten u. in Salbe. Bei Rheumatismus, Gicht, Bronchialkatarrh, Migräne, Neuralgie, Polyneuritis usw. — **Desinfex** (Merz-Weinmann, Frankfurt a. M., Rödelshausen), enthält nach Unters. von C. A. ROJAHN u. F. STRASSMANN wahrscheinlich 12,5 g Glycerin, je 1 g Kaliseife u. Pottasche, 0,3 g Chloroform u. 58 gewichts-%ig. A. ad 100 g. — **Didial** (Gesellschaft für chemische Industrie, Basel), Tabletten mit 0,1 g Dial (Diallylbarbitursäure) u. 0,025 g Diallylbarbitursäure. — **Äthylmorphin**, Schlafmittel bei seel. Erregung. — **Frigalin** (Dr. med. H. SCHULZ, G. m. b. H., Berlin), enthält nach Unters. von C. GRIEBEL Lecithin Calciumlactat, Eiweiß, Milchzucker, Eisenoxyd, Saccharose u. Talcum, als hochwertiges Nerven- u. Blutnährpräparat bezeichnet. — **Igarsan äußerlich u. innerlich** (HELLMUTH SCHMIDT, chem. pharm. Präparate, Berlin W. 35), nach Unters. von C. A. ROJAHN u. F. STRASSMANN I. äußerlich: 9—10%ig. Lsg. von Salicylsäure in 80—85 gewichts-%ig. Glycerin.

Salbei, Arnika oder ähnlich parfümiert. II. innerlich: etwa 1,3⁰/₀ig. alkoh. aro-
sierte Salicylsäurelsg. Gegen Rheumatismus angepriesen. — *Peroform* (LÜDY
n., Burgdorf, Schweiz), deklariert als „Alumin. chloric. sol. comp. c. boromenthol.“,
i. u. Gurgelwasser. (Pharm. Zentralhalle **67**. 248—49.) ROJAHN.

J. G. Breugelmans, *Über einen neuen Fall, der beweist, daß Markenschutzpackungen
bedingte Gewähr für den Inhalt bieten.* Vf. berichtet über eine in Belgien unter
nahme der Originalpackung in den Handel gelangte Verfälschung des *Luminals*
ER, das sich als Veronal herausstellte. Zur Identifizierung führt er folgende unter-
dlliche Rkk. an. Bei der Alkalischmelze gibt Veronal Geruch nach Buttersäure,
u. HCN, während bei Luminal aromat. Geruch auftritt. Der Rückstand des
uszuges der Schmelze ist beim Veronal ölig, beim Luminal fest u. riecht aromat.
inal läßt sich nitrieren u. zu einem Amin reduzieren, das mit Phenolen Farbstoffe
t, Veronal nicht. (Journ. Pharm. de Belgique **8**. 207—09.) ROJAHN.

R. J. De Motte, *Die Behandlung unwesentlicher Wunden.* (Journ. Ind. Hygiene **8**.
93. Chicago.) HÜCKEL.

I. Makrinow und **K. Strohbindner**, *Fraktionen von Steinkohlenteerkreosotöl und
antiseptische Wirkung.* Das Kreosotöl wurde in 5 Fraktionen zerlegt: 98—150⁰,
—235⁰, 235—300⁰, 300—355⁰ u. 355—387⁰. Die 3. u. die 4. Fraktion sind gegen
nmelpilze u. Merulius giftiger als die übrigen u. als das rohe Kreosotöl. (Arch.
biolog. St. Pétersb. **23**. 87—96. 1923. St.-Petersburg, Inst. f. Transportwege u.
f. exp. Med.) BIKERMAN.

G. Analyse. Laboratorium.

George M. Green, *Ein automatischer Heber-Zirkulationsapparat für Gase.* Ein-
r App., mit dem eine Zirkulationsgeschwindigkeit von ca. 50 ccm Gas pro Minute
ht wird. (Journ. Chem. Soc. London **1926**. 500. Huddersfield, Techn. Coll.) KR.

R. Kingslake, *Eine neue Form von Nephelometer.* Der Grad der Trübheit einer
wird durch vergleichende Beobachtung der Lichtstreuung gleichgerichteter
len festgestellt. Die Fl. steht in einem Rohr von 80 mm Höhe u. 12 mm Dicke.
leichlsg. eine Chlorsilberlsg., die wie die Fl. von unten beleuchtet wird. Eine
quelle mit Spiegelanordnung für beide Röhrchen. Hebung u. Senkung (mit
getriebe), bis beide Flüssigkeitssäulen gleiche Lichtstreuung zeigen. Ablesung
reigeteilten Feld eines Nuttingprismas, in dem die Seitenansichten der beiden
en unmittelbar nebeneinander erscheinen. (Transact. of the opt. soc. **26**. 53—62.
Ber. ges. Physiol. **34**. 1—2. London, Opt. engineer. dep., imp. coll. of science a.
ol. Ref. ERGGELET.) OPPENHEIMER.

I. Spomer, *Probleme und Methoden der Vakuumspektroskopie.* Nach einer ein-
den allgemeinen Übersicht über die verschiedenen Wellenlängenbereiche des ge-
en Spektralgebietes geht Vf. auf die Fragestellungen der Vakuumspektroskopie,
en Bereich zwischen 1850 Å u. Röntgengebiet umfaßt, ein. Die wichtigsten Er-
sse der Arbeiten über Absorptions- u. Emissionsspektren in diesem Gebiet werden
zusammengefaßt. An den theoret. Teil schließt sich eine ausführliche Beschreibung
die Methoden u. Versuchsanordnungen, die zur Vakuumspektroskopie angewandt
en sind, nebst zahlreichen Literaturangaben. (Naturwissenschaften **14**. 356—64.
ngen.) JOSEPHY.

William H. Stoner, *Vereinfachte colorimetrische Berechnung.* Zur Vermeidung
Berechnungen bei colorimetr. Best.-Methoden wird ein Verf. angegeben, das
entsprechende Einstellung der Standardlsgg. gestattet, die Konz. der unter-
en Lsg. sofort abzulesen. (Journ. of labor. a. clin. med. **10**. 574—78. 1925;
ges. Physiol. **33**. 483. Philadelphia, Gen. hosp. a. grad. school of med., Bioch.
Ref. KLEINMANN.) OPPENHEIMER.

Eugène Cattelain, *Verwendung von Hydrazinsulfat zur Titration von Jodlösungen* (Ann. des Falsifications **19**. 145—48. — C. **1926**. I. 983.) GROSZFELD

W. Böttger, *Über Fixanalsubstanzen*. Vf. weist die Vorwürfe K. SEILERS (S. bzgl. Ungenauigkeit der Fixanalssgg. als nicht stichhaltig u. auf unsachgemäß Arbeiten zurückzuführen, zurück. Er führt Beleganalysen von beliebig herausgegriffenen Fixanalampullen an, bei denen die Abweichung zwischen berechneter gefundenem Quotienten 0,3 bis höchstens 1,7‰ beträgt. — K. SEILER weist in einer Erwiderung seinerseits die Vorwürfe BÖTTGERS zurück u. hält seine Feststellung aufrecht. (Schweiz. Apoth.-Ztg. **64**. 145.) ROJAHN

Organische Substanzen.

Walter Austen, *Schnellmethode zur Bestimmung der Jodzahl mit Jod und Alkohol*. Vf. prüft die von B. M. MARGOSCHES, W. HINNER u. L. FRIEDMANN (Ztschr. angew. Ch. **37**. 334; C. **1924**. II. 772) angegebene Schnellmethode der Jodzahlbestimmung bei der KJ erspart wird, nach u. findet, daß bei genauer Einhaltung der Bedingungen gute Übereinstimmung mit den Resultaten der Hüblschen Methode erzielt wird. (Pharm. Zentralhalle **67**. 209—10. Breslau, Chem. Untersuchungsamt.) ROJAHN

Armas Vartiainen und Yrjö Jäderholm, *Eine Methode zur quantitativen Bestimmung des Methylalkohols*. Nachweis kleiner CH_3OH -Mengen durch Oxydation mit alkoh. H_2SO_4 (21 ccm A. (95‰) + 40 ccm H_2SO_4 (konz.) + W. ad 200,0) KMnO_4 -Lsg. (5‰), von denen für 3 ccm Fl. je 1 ccm genommen u. das Ganze 2 Minuten stehen gelassen wird. Es kommt dann 1 ccm Oxalsäure 8‰ u. 0,25 ccm H_2SO_4 (konz.) hinzu. Sobald die Lsg. farblos geworden ist, setzt man das methylgrün-schwefel-Säurereagens hinzu, das aus 5 g Methylgrün, 12 g Na-Bisulfit, 200 ccm n. H_2O u. W. ad 1000 besteht. Positive Rk. ist noch bei Abwesenheit von A. bei einer Verdünnung 1:5000, in Ggw. von A. bei 1:2000 zu erwarten. Zur quantitativen Bestimmung werden Verdünnungen hergestellt, nachdem man die zu prüfende Fl. auf 10‰ gebracht hat, u. setzt die Verdünnung, die eben noch positive Rk. zeigt = 1:2000. Statt KMnO_4 kann bei der qualitativen Probe auch PbO_2 verwendet werden. (Acta societatis medicorum Fennicae „Duodecim“ **6**. 1—8. 1925; Ber. ges. Physiol. **16**—17. Helsinki, Med.-chem. Lab. Ref. SCHMITZ.) OPPENHEIMER

E. Arbenz, *Zur Vanillinbestimmung in Vanillinzucker*. Das titrimetr. Verf. nach PRITZKER u. JUNGKUNZ hat große Vorzüge. Da verschiedene Vanilline nicht rein angesprochen werden können, behalten sich PRITZKER u. JUNGKUNZ kleine Änderungen ihres Verf. vor. Diese Schwankungen in der Reinheit der Vanilline werden sich wahrscheinlich auch bei den anderen Verff. zur Best. des Vanillins auf gravimetrisch u. auf refraktometrische Wege (vgl. S. 2153) bemerkbar machen. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. **17**. 19.) RÜHL

S. L. Jodidi, *Die Formoltitration einiger Aminosäuren*. Vff. haben einige Aminosäuren nach der Formoltitrationsmethode von SÖRENSEN untersucht (vgl. Biochem. Ztschr. **25**. 1; C. **1910**. I. 1994 u. JODIDI, Journ. Americ. Chem. Soc. **40**. 1611; C. **1918**. II. 761). *Cystin* wurde in 0,2-n. Natronlauge gel. u. mit 0,2-n. Salzsäure-Phenolphthalein als Indikator titriert, wobei genaue Werte erhalten wurden. Die Titration der *Hippursäure* mit 0,2-n. Alkali gab ebenso gute Resultate wie die Formoltitration. Ferner wurde *Tryptophan* titriert, das 13,02% N enthielt (theoret. 13,73%). Die Titration ergab ungefähr 87% Tryptophan. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 751—53. Washington.) WINKELMANN

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Fred Vlès, *Mikrocolorimeter zur mikroskopischen Bestimmung von pH oder Beschreibung eines App. zur Best. der intrazellulären Rk.* (C. r. soc. de biologie **1926**. 879—81. Straßburg.) OPPENHEIMER

C. R. H. Rabl, *Histologischer Nachweis löslicher Calciumverbindungen. Zu den Erkrankungen Freudenburgs. Entgegnung auf FREUDENBERG* (vgl. S. 2025). (Klin. schr. 5. 365. Heidelberg.)


FRANK.

Lawrence T. Fairhall, *Die Bestimmung von Zink in biologischem Material. Berechnung der Veraschung u. der zur ferneren Best. anzuwendenden gravi- u. netr., turbidometr. u. colorimetr. Methoden mit Angaben über zweckmäßige Föhrung, Reinigung der Reagenzien usw. Von den als bestgeeignet bezeichneten Methoden ist jede für Material gewisser Art besonders zu empfehlen, keine für alle e.* (Journ. Ind. Hygiene 8. 165—76. Boston [Mass.], Harvard School of Public Hth.)

SPIEGEL.

John Vernon Steinle und Louis Kahlenberg, *Über ein neues Verfahren zur Identifizierung und Bestimmung des Cholesterins und gewisser anderer Verbindungen.* (LENBERG (Journ. Biol. Chem. 52. 217; C. 1922. III. 382) hat gefunden, daß Cholesterin mit $SbCl_5$ eine gummiartige braune M. gibt. Versetzt man eine Lsg. von Cholesterin in $CHCl_3$ mit einigen Tropfen einer $CHCl_3$ -Lsg. von $SbCl_5$, so fällt ein schmieriger Niederschlag aus; bei Zusatz von mehr $CHCl_3$ entsteht eine kobaltblaue Lsg. Das $SbCl_5$ muß absol. Cl -frei sein; Cl -haltige Präparate werden durch etwas $SbCl_3$ bereinigt. Die primäre B. des braunen Nd. ist notwendig, damit sich hinter der Lsg. eine blaue bildet. Bestimmte Konz. müssen eingehalten werden. Ein gutes Resultat erhält man, wenn man 0,1 ccm einer Lsg. von 1 g Cholesterin in 100 ccm $CHCl_3$ mit 0,5 ccm $CHCl_3$ verd., 0,2 ccm $SbCl_5$ -Reagens (20 ccm $SbCl_5$ mit $CHCl_3$ zu 100 ccm verd.) zugibt, 5 Min. im Licht stehen läßt u. mit 10 ccm $CHCl_3$ verd. — Der braune Nd. kann mit CCl_4 in dem er unl. ist, rein isoliert werden u. trocknet an der Luft zu einer fast schwarzen, sehr spröden M. ein. Bestst. von Sb (nach dem vom H. modifizierten Verf. von HENZ, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 37. 18 [1903]), Cl u. ferner des Mol.-Gew. in sd. Ä. ergaben, daß die Verb. $C_{27}H_{46}O$, $SbCl_5$ vorliegt. Die blaue $CHCl_3$ -Lsg. dieses reinen Prod. zeigt sehr deutlich das Tyndallphänomen, man darf daraus nicht auf das Vorliegen einer kolloidalen Lsg. schließen, da das Ultramikroskop keine festen Teilchen entdeckt werden konnten; wenn solche vorhanden sind, so sind sie jedenfalls kleiner als $5 \mu\mu$. — Da der blauen Farbkr. eine wohldefinierte Verb. zugrunde liegt u. die Rk. quantitativ verläuft, so kann zur colorimetr. Best. des Cholesterins benutzt werden (über die Ausführung vgl. H. anal.). Z. B. wurde der Cholesteringehalt von Ochsenblut u. -serum mit gutem Resultat bestimmt. — Eine ähnliche Farbkr. mit $SbCl_5$ gibt *Phytosterin*, doch bleibt es länger Zeit auf bläulich purpurrot stehen, u. eine blaue Färbung erscheint erst später. Auch diese Rk. eignet sich zur colorimetr. Best. — Mittels dieser Farbkr. kann man die Reinheit von Cholesterin u. Phytosterinpräparaten bestimmen. — Andere Chloride ($SbCl_3$, $AsCl_3$, PCl_3 , $SiCl_4$, $TiCl_4$, $SnCl_4$, $SOCl_2$, CrO_2Cl_2) geben keine ähnliche Farbkr. mit Cholesterin. Ebensowenig kann das $CHCl_3$ durch ein anderes Lösungsm. ersetzt werden. Der braune Nd. obiger Zus. bildet sich zwar auch in $CHCl_3$, ist aber in diesem nur schwach mit lachsroter Farbe. Die Lsg. in A. ist schön grün, für die colorimetr. Best. weniger geeignet. Ferner löst sich der Nd. reichlich in $CHCl_3$ mit brauner Farbe. — Eine Anzahl Fette u. Öle wurde mit dem $SbCl_5$ -Reagens auf Cholesterin untersucht. Pflanzliche Öle geben eine braune Färbung, u. in infolge ihres hohen Gehalts an ungesätt. Fettsäuren, wie die Unters. der Fette selbst zeigte. Hydrierte Öle geben daher die Braunfärbung nicht. Fischöle u. die blaue Cholesterinrk., andere tier. Fette (Butter, Schmalz) mehr oder weniger Braunfärbung. Gewisse Mineralöle scheinen etwas Cholesterin zu enthalten. Cholesterin u. Cholesterinbenzoat reagieren wie Cholesterin, nicht dagegen die Cholesterin u. Lipide wie Lecithin u. Cephalin. — Da auch einige äth. Öle mit $SbCl_5$ unter bestimmten Bedingungen reagieren, wurden mehrere Verbb. aus der Gruppe der Terpene untersucht, ferner einige Phenole u. Phenoläther der Benzolreihe auf ihr Verh. gegen

SbCl_5 untersucht. Alle diese Verbb. geben Farbrkk., aber nur die des *Pinens*, *Linens* u. *Borneols*, besonders des letzteren, sind einigermaßen der Cholesterinrk. gleichbar. Vf. stellt daher Formel I. für das Cholesterin zur Diskussion,




welcher der Zusammenhang mit dem Borneol deutlich zum Ausdruck kommt. SbCl_5 -Verbb. des *Pinens* u. *Borneols* wurden in der gleichen Weise wie die des Cholesterins isoliert u. analysiert. Sie besitzen die analogen Formeln $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$, SbCl_5 , $\text{C}_{10}\text{H}_{17}(\text{OH})$, SbCl_5 . — Auch *Abietinsäure*, *Kolophonium*, *Kautschuk* u. *Isopren* ge mit SbCl_5 blaue Färbungen, letzteres wahrscheinlich infolge primärer Polymerisieru. Beim *Cedrol* ist die Farbrk. purpurrot. (Journ. Biol. Chem. **67**. 425—67. Madison Univ. of Wisconsin.)

LINDENBAUM

B. Pohorecka-Lelesz, *Gleichzeitige Bestimmung von Harnstoff und Ammon mit einer Mikromethode. Ein Verfahren mit Hilfe des synthetischen Zeolits „Permut“* Harnstoffbest. vgl. S. 2613. Zur NH_4 -Best. wird die Eigenschaft des Permut sich in Salzlsgg. umzusetzen, d. h. das Na-Salz in NH_4 -Salz übergehen zu lassen u. umgekehrt, benutzt. Die Fähigkeit des Permutits, auch Histamin, Äthylamin, Cholin u. Adrenalin zu adsorbieren, spielt prakt. eine unbedeutende Rolle. (Bull. Soc. Chim. Biol. **8**. 178—83. Poznan, Lab. de chim. physiol., Fac. de méd.)

P. Aschmarin, *Über eine neue gasometrische Methode der quantitativen Bestimmung der Acidität (oder des sogenannten freien Aminostickstoffs) von Proteinen und ihrer Hydrolyseprodukten*. Man versetzt die zu untersuchende Lsg. mit Formaldehyd u. KHCO_3 u. bestimmt die nach der Gleichung



entwickelte CO_2 . Der App. wird im voraus mit CO_2 gefüllt, um die eventuell in KHCO_3 vorhandene Pottasche in das Bicarbonat überzuführen. Nach dieser Methode wurde *Alanin* (95—97% der eingeführten Menge; nach KJELDAHL wurde 95,8% gefunden), *Tyrosin* (94,3%; nach KJELDAHL: 100,8%), *Glykokoll* u. *Leucin* aus Aminosäuren sowie *Casein* u. *Peptone* bestimmt in gutem Einklang mit anderen Methoden. (Arch. Sc. biolog. St. Pétersb. **23**. 347—53. 1924. St.-Petersburg, Inst. f. exp. Med.)

F. Sternon, *Das Opacimeter von C. Pagel und A. Simon*. Vf. empfiehlt zur Bestimmung des Eiweißgehaltes von Lsgg. obiges Opacimeter (Abbildung im Original, Bezugsquelle: Dr. M. C. PAGEL, Nancy, rue Rangraff 10.). In die trübe Eiweißlsg. wird ein unten zugeschmolzenes graduiertes Glasrohr, das auf der plangeschliffenen Bodenfläche ein graviertes Merkzeichen besitzt, soweit eingesenkt, bis beim Durchschneiden gerade ein Auslöschen des Zeichens erfolgt. Da die Schichthöhe eine umgekehrte Funktion des Eiweißgehaltes der Lsg. ist, läßt sich dieser so quantitativ ermitteln. (Journ. Pharm. de Belgique **8**. 229—30.)

ROJAHN

Emerich v. Fazekas, *Über die Hagedornsche Blutzuckerbestimmung. Änderungen und Vorschläge in betreff Kochdauer u. Enteiweißung*. (Biochem. Ztschr. **168**. 175—180. Budapest, Innere Klinik der Univ.)

MEIER

Karl Doppler und Karl Steinmetzer, *Die Senkung des Blutzuckers nach Ausschaltung der sympathischen Innervation des Pankreas durch Phenol*. Durch chemisch gesetzte arterielle Pankreashyperämie (Sympathicusausschaltung der Pankreasgefäße mittels 8%ig. Phenollsg.) konnte bei Hunden eine Senkung des Blutzuckerspiegels

st werden, die aber nicht sofort, sondern erst nach längerer Zeit in Erscheinung
Aus dieser Latenzzeit läßt sich schließen, daß die Senkung nicht auf nervös-
tor. Einflüsse, sondern auf eine sich nur langsam entwickelnde Hyperfunktion
nselepp. als Folge der Dauerhyperämie zurückzuführen ist. (Wien. klin. Wehschr.
41—42. Wien, physiolog. Inst. d. Tierärztl. Hochschule.) HÜCKEL.

Max Adler, *Zur Methodik der Blutzuckerbestimmung*. Verbesserung der Original-
ode (Titration mit $\frac{1}{10}$ -n. Fehling'sg.) des Vf. (Klin. Wehschr. 5. 757—58.) HÜ.
Otto Folin, *Die Bestimmung des Zuckers im Blut und normalem Urin*. Eine Ab-
rung der Zuckerbestimmungsmethode nach FOLIN-WU gibt kleinere Reduktions-
e, d. h. Zuckerwerte. Es wird angenommen, daß in dieser neuen Methode nicht
erartige reduzierende Substanzen, die in der früheren mit bestimmt wurden, bei
neuen nicht mehr eingehen. Die neue Methode wäre also mehr Traubenzucker
f. (Journ. Biol. Chem. 67. 357—70. Boston, Biochem. Lab. Harvard Medical
ol.) MEIER.

Ernst Krafft, *Chemie und Mikroskopie des Eiweißharns*. Vf. gibt einen Überblick
die chem. u. mkr. Untersuchungsmethoden für Eiweißharn u. Fingerzeige für
Bewertung der Befunde. (Pharm. Ztg. 71. 478—80. Chem. bakteriolog. Lab. Bad
ingen.) ROJAHN.

G. A. Harrison, *Über die differenzierende Bestimmung von Fett in Faeces*. Durch
eifung mit saurem A. können Irrtümer entstehen. Da das durchschnittliche
Gew. der Fettsäuren in den Faeces 268 betrug, wird für die Best. von aufgespaltenem
als Faktor 1 cem $\frac{1}{10}$ -n. Na_2CO_3 -Lsg. (= 0,0268 g Fettsäure) vorgeschlagen.
Journ. of exp. pathol. 6. 139—46. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 562. London,
hem. dep. hosp. f. sick childr. Ref. BACHSTEG.) OPPENHEIMER.

A. Policard, *Verwendung von Plasma, das durch vorangehende Nucleininjektion
rinnbar gemacht wurde, zur Gewebeskultur*. Durch Nucleininjektionen (Leber-
akt) wird das Blut des Tieres ungerinnbar. Dieses Blut ist für Gewebskulturen
met. (C. r. soc. de biologie 94. 867—68. Lyon, Lab. d'histolog.) OPPENH.

J. Toscano Rico, I. *Über die Brauchbarkeit von Ascaris lumbricoides als pharma-
risches Reagens. Nikotinwirkung*. II. *Über die Empfindlichkeit des Ascaris lum-
ides auf die Einwirkung einiger Drogen*. I. Zur pharmakolog. Prüfung wird statt
rer Würmer ein Ascaris, der Parasit des Schweinedarmes ist, genommen. Die
achtungen über Nicotinwrkg. bringen nichts Neues. II. Durch besondere Prä-
tion eines Segments werden besonders empfindliche Präparate für *Santonin*,
m chenopodii, *Pilocarpin* usw. erhalten. (C. r. soc. de biologie 94. 918—20.
—23. Lissabon, Institut. de pharmac. et therapeut.) OPPENHEIMER.

J. Lukeš und **V. Jelinek**, *Einige Bemerkungen zur Darstellung der Spirochäten
Schnitte durch die Silberimprägnation*. Aus den vielerlei Bemerkungen zu der
editischen Methode u. ihren Modifikationen heben Vff. als wichtigste hervor,
die Reifung in Formol bei der Ag-Imprägnation bedeutenden Einfluß zu haben
int. Die Schnellmethoden gelingen schlecht, weil meist mit unreifem Material
beitet wird. Überimpfung in Formol hindert die Nachfärbung mit Hämatoxylin
nderen Farbstoffen, besser sind mildere Mittel zur Red. zu benutzen, wie Trauben-
ter u. andere organ. Stoffe, von denen u. a. ein Zwiebschalendekokt empfohlen
l. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I 47. 83—88. Brunn, Tier-
l. Hochsch.) SPIEGEL.

S. Tschetschulin, *Zur Frage der Wertbestimmung von Secale cornutum*. Die
hode läuft auf einen Vergleich mit der Wrkg. bekannter Histaminmengen am
inellen Meerschweinchenuterus hinaus. Die Unbeständigkeit der Uterusrk. auf
ule wird ausführlich besprochen u. die Bedingungen festgelegt, unter denen
gleichbare u. annähernd zuverlässige Resultate gewonnen werden. Das Bestimmungs-
bnis läßt sich in einem „Valor“ ausdrücken, der sich aus den in der Wrkg. gleich-

stark befundenen Histamingaben u. Secalegaben errechnet. (Arch. f. exp. Pat. u. Pharmak. **112**. 100—12. Moskau, Abt. f. exper. Pathol. u. Pharmak. d. sta Chemo-pharmac. Forsch.-Inst.)

William Figdor, *Anwendung von Mikromethoden zur Untersuchung pharmazeutischer Zubereitungen*. Bezugnehmend auf die vorläufige Mitteilung von GESELL u. DITTM (S. 183) teilt Vf. mit, daß er den dort gemachten Vorschlag, mikrochem. Methode zur Unters. anzuwenden, geprüft habe. Bei sorgfältigem Arbeiten sind die Resultate genau u. die Analysen in kürzerer Zeit auszuführen. Vf. gibt Beleganalysen für folgende Bestst. an: 1. *Alkaligehalt von Salzen organ. Säuren*, Einwage 0,04—0,05 g. 2. *Alkaligehalt von Drogen*, mit 0,02—0,04 g. 3. *Abdampfrückstand von Tinkturen u. Fluidextrakten*, 2 ccm 3 Stdn. bei 110° trocknen. 4. *Ester- u. Mentholgehalt im Pfefferminzöl*, mit 2 ccm Öl. 5. *Ä.- u. PAe.-Extrakt*, mit 1 g. 6. *Alkaloidgehalt von Drogen u. Alkaloidzubereitungen*, mit 0,5 g Droge oder Fluidextrakt bzw. 2 ccm Tinktur. Die Methode von A. DIETERLE (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **261**. 77; C. **1923**. IV. 5) wird hierzu abgeändert. An Stelle von Ä.-PAe. wird wegen Emulsionsbildung reiner bezw. Chlf. genommen. Methode war nicht brauchbar zur Best. von Morphin im Opium. Zu allen Bestst. wurde gewöhnliche Analysenwaage mit $\frac{1}{10}$ mg Empfindlichkeit benutzt. (Amer. Journ. Pharm. **98**. 157—62.)

W. Peyer, *Die Bestimmung von Rohfilicin in Extractum Filicis*. Es wird die Frage aufgeworfen, warum in der Frommeschen Vorschrift zur Best. des Rohfilicins bei Ausschüttelung der das Filicin enthaltenden Barytlg. 86 g genommen werde. Eine Erhöhung von 80 auf 84 g sei wohl durch den aufgenommenen Äther zu erklären, nicht aber auf 86 g. Es wird zur Nachprüfung angeregt. (Apoth.-Ztg. **41**. 424. CAESAR u. LORETZ A.-G., Halle a. S.)

George F. Reddish, *Bestimmung der keimtötenden Wirkung von Desinfektionsmitteln*. Vorschlag zu einer Eichung von Desinfektionsmitteln. (Amer. Journ. Public Health **16**. 283—86. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.)

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

H. R. Banks und **C. A. Remington**, *Anzeiger und Aufzeichner für die Dicken von Breien*. (Eng. Mining Journ.-Press **121**. 569.)

E. Rohde, *Trommeltrockner-Rieseleinbau Sauber-Büttner*. Beschreibung der Vorrichtung an Hand zweier Abbildungen u. Besprechung der vom Vf. während mehrerer Jahre damit gemachten günstigen prakt. Erfahrungen. (Dtsch. Zuckerind. **51**. 297—300. Zentralblatt f. Zuckerind. **34**. 324—25. Sobbowitz-Danzig.)

August Wolfsholz, Italien, *Feuer- und säurefeste Erzeugnisse*. Zr, ZrO₂, ThO₂ u. dgl. werden mit mineral. Leimen, die man durch Lösen von Metallsalzen in den entsprechenden Säuren, z. B. durch Lösen von Calcium-, Aluminium- oder Magnesiumphosphat in H₃PO₄ erhält, gemischt, die Mischungen geformt u. bei Rotglut gebrannt. Besonders günstige Eigenschaften besitzen die unter Verwendung von kolloid. ZrO₂ u. ThO₂ erhaltenen Erzeugnisse. (F. P. **602 475** vom 25/8. 1925, ausg. 1926.)

Surface Combustion Co., Inc., New York, übert. von: **Arthur W. Peters**, New York, *Mischen von Gasen in konstantem Verhältnis*. Man verwendet eines der Gase unter verhältnismäßig hohem Druck zum Einführen, führt die Druckenergie Geschwindigkeitsenergie unter Herabsetzung des Druckes über u. läßt das Gas unter geringem Druck u. mit hoher Geschwindigkeit aus einem Raum mit schmalen Kanälen in einen solchen mit großem Durchmesser einfließen, wobei die Geschwindigkeitsenergie wieder in Druckenergie übergeht. Dann wird das andere Gas unter verhältnismäßig

gem Druck am Rande des einführenden Gases zugeführt, in einem Punkte hoher Windigkeit u. niederen Druckes. (**A. P. 1 574 107** vom 7/12. 1921, ausg. 23/2.) KAUSCH.

Georges Baume, Pierre Robert Chambige und **Denis Yves Boutier**, Frankreich, *Emulsionen oder Emulsionen*. Man mischt dem zu emulgierenden Stoffe eine kleine Menge eines Hilfsstoffes (Öle, Fette, Rückstände der Öl- u. Fettdest., Stearinpech usw.) (**F. P. 596 144** vom 3/7. 1924, ausg. 16/10. 1925.) KAUSCH.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: **Hans Schuckert**, Charlottenburg), *Schüttelvorrichtung für elektrische Gasreinigungsanlagen*. Die Vorrichtung durch die Anordnung von ein- u. ausrückbaren Kupplungen zwischen dem Schüttelgestänge u. den Elektroden. — 2. dad. gek., daß als Kuppelungselemente Keilverb. angeordnet sind. (**D. R. P. 427 537** Kl. 12e vom 7/12. 1924, ausg. 10/4. 1926.) KAUSCH.

Samuel Ruben, New York, *Förderung von Reaktionen zwischen Flüssigkeiten und Gasen*. Man hält die Fl. in einem magnet. Felde, wechselt die dielektr. Stromkapazität durch die Gase mit der Fl. in dem elektr. Feld in Berührung. (**Can. P. 253 234** vom 11/11. 1924, ausg. 1/9. 1925.) KAUSCH.

International Precipitation Co., Los Angeles, übert. von: **George H. Horne**, Los Angeles, Californ., *Elektrische Gasreinigung*. Man läßt die zu reinigenden Gase zwischen den Elektroden hindurchströmen, die auf hoher Potentialdifferenz gehalten werden. Die Elektroden bestehen dabei aus genügend widerstandsfähigem Material, um das elektr. Feld zu verteilen u. die Fällung der suspendierten Stoffe in loser, nicht bestimmter Weise zu bewirken. (**Can. P. 253 528** vom 24/10. 1924, ausg. 8/9. 1925.) KAUSCH.

Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator, Schweden, *Poröse Massen zum Aufnehmen von Gas*, wie C_2H_2 , bestehend aus einem oder mehreren organ. Stoffen (Cellulose, Holzmehl usw.), die mit Zn- oder Cu-Salzen u. einer Harzseife oder $CaCl_2$ u. Wasser oder mit BaS oder $FeSO_4$ behandelt worden sind. (**F. P. 601 383** vom 29/7. 1925, ausg. 1/3. 1926. D. Prior. 1/11. 1924.) KAUSCH.

Fritz Sieghelm, Berlin, *Doppelwandiges Glasgefäß nach Dewar-Weinhold*, dad. daß das eigentlich doppelwandige Glasgefäß von einem starkwandigen Glasgefäß umgeben ist, welches in keiner unmittelbaren Verb. mit dem eigentlichen doppelwandigen Glasgefäß steht, sondern das letztere durch nachgiebige, an sich bekannte Teile mit dem doppelwandigen Glasgefäß verbunden ist. (**D. R. P. 427 981** Kl. 341 vom 26/8. 1924, ausg. 20/4. 1926.) KAUSCH.

Büttner-Werke A.-G., Ürdingen a. Rh., *Vorrichtung zum Stauen von Trockengut in Trockentrommeln mit gleichzeitigem Austritt für das Heizgas*, dad. gek., daß die Innenfläche des Trommelmantels im Bereiche des Heizgasauslasses Klappen aufweist, die gemäß der Drehung der Trommel sich selbst durch ihre Schwere öffnen, wo das Trockengut den Trommelmantel nicht mehr berührt u. sich ebenso selbst schließen, bevor sie in das geböschte Material eintreten, wobei das Ende der Trockentrommel durch eine bekannte Lochscheibe abgeschlossen ist zum Festhalten des Trockengutes während der Stauung. (**D. R. P. 425 258** Kl. 82a vom 15/2. 1923, ausg. 15/2. 1926.) OELKER.

Ludwig Rosenstein, San Francisco, *Entfernung von Spuren von Chlor aus Luft*. Man leitet die Cl_2 in Spuren enthaltende Luft durch mit $FeCl_2$ -Lsg. feucht gehaltene Säure. (**A. P. 1 578 850** vom 19/4. 1923, ausg. 30/3. 1926.) KAUSCH.

III. Elektrotechnik.

E. T. Wherry, *Radiodetektormineralien*. Es werden etwa 75 Mineralien unter- sucht, welche mehr oder minder gute Detektoren sind. Im allgemeinen wirken Sulfide besser als Oxyde. Ersatz des S durch Se wirkt meist verbessernd auf die Eignung.

der Krystalle. Es besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen der Eignung u. Leitfähigkeit der Mineralien bei niederen Spannungen. Meistens sind solche Mineralien, welche keine Detektorwirkung zeigen, Nichtleiter. Es wird angenommen, daß die stofflich einheitlichen Ebenen der Struktur eine einseitige Anziehung Elektronen veranlassen u. so die Detektorwirkung zustande bringen. (Amer. Mineralogist **10**. 28—31. 1925; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 108—09. F. W. EITEL.)

ENSZLIN

J. Cayrel, *Die Detektoreigenschaften des Bleidioxids*. Der angeregte Strom geht von PbO₂ nach der Spitze. Als Spitzen eignen sich Al, Mg, Ca, Zn u. Sn, während Pt, Au, Ag, Ni, Cu u. Fe dazu ungeeignet sind. Setzt man Spitzen von den zuletzt genannten Metallen sehr leicht auf, so erhält man ebenfalls einen Strom. Beim Gleiten derselben auf dem PbO₂ spricht dieses mit allen Metallen sehr stark an. Sind Elektroden, welche das PbO₂ berühren, gleichartig, so ist der leichteste Kontakt der mit kleinster Oberfläche der vorherrschende; sind sie verschiedener Art, so wird der Sinn des Stroms durch die Natur der Elektroden bestimmt. Auch spielt Stromdichte bei der Detektorwirkung eine Rolle. (C. r. d. l'Acad. des sciences **1926**. 1127—28. 1925.)

ENSZLIN

International Western Electric Co., Inc., New York, übert. von: **A. Mc Le Nicolson**, Hillsdale, N. J., *Piezoelektrische Krystalle*. (Can. P. **252 615** vom 6/1921, ausg. 11/8. 1925. — C. **1922**. IV. 121.)

KAUSCH

François Richard, Cleveland, *Isolatoren*. Ein etwa 56% SiO₂, 20% Al₂O₃, 10% Fe₂O₃, 4% Alkali u. MgO, CaO, MnO, sowie Schwefel, enthaltender Ton wird mit W. zu einer plast. M. angerührt, geformt u. zunächst bei etwa 475°, dann bei etwa 900° erhitzt, bis die M. völlig durchgeschmolzen u. glasig geworden ist. (A. P. **1 579 000** vom 4/12. 1920, ausg. 30/3. 1926.)

KÜHLING

Süddeutsche Telephon-Apparate, Kabel- und Drahtwerke A.-G., Deutschland, *Thermoionische Kathoden*. Man mischt Erdalkalioxyde mit hochmolekularen KW-stoffen (Paraffin, Kolophonium), schmilzt das Gemisch u. zieht es zu Fäden aus. (F. P. **601 055** vom 21/7. 1925, ausg. 22/2. 1926. D. Prior. 24/7. 1924.)

KAUSCH

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Erfinder: **Antonius Graaff**, Eindhoven), *Wolframdrähte*. (Holl. P. **14 371** vom 29/7. 1921, ausg. 1/1926. — C. **1924**. II. 1727.)

KAUSCH

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

A. Lee Bennett, *Die Verwendung von Überglasuren für mehrfarbige Terrakotten*. Die Biegsamkeit u. Wirtschaftlichkeit von einmal gebrannten Überglasuren wird im Vergleich zu anderen Farbglasuren dargelegt. Unlösliche Farbkörper sind vorgezogen. (Journ. Amer. Ceram. Soc. **9**. 185—89. Gladding, Mc Bean & Co., Auburn, Wash.)

SALMANG

Sandford S. Cole, *Eigenschaften von Silicasteinen aus Koksöfenwänden*. Silicasteine aus verschiedenen Quarziten haben nach längerem Gebrauch im Koksöfen gleiche Eigenschaften. Die chem. Zus. hatte sich nicht geändert, die Porosität ist nur wenig. Quarz war völlig in Tridymit u. Christobalit umgewandelt worden, an der Heizkammerseite vorwiegend in Tridymit, an der Koksseite mehr in Christobalit. Trotz 12-jährigen Gebrauchs war der Stein noch in gutem Zustande. Die Heizkammerseite war verglast. (Journ. Amer. Ceram. Soc. **9**. 197. Koppers Co. Laborat. Melrose, Mass.)

SALMANG

A. Ernest Mac Gee, *Der Wärmebedarf für den Brand keramischer Massen*. Die spezif. Wärmen wurden durch Vergleich der Temp. des zu untersuchenden Materials mit (Kaolin, feuerfeste Ziegel, bildsamer Ton, Diasporon, engl. China Clay., Feldspat)

(esiaspinell usw.) u. einer bekannten Menge von Rosenquarz ermittelt, nachdem Stoffe derselben Wärmebehandlung unterworfen worden waren. Der Wirkungseines Ofens beträgt hiernach etwa 35%, nicht wie man bisher annahm, etwa (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 206—47. U. S. Bureau of Mines.) SALMANG.

Edwin P. Arthur, *Chemische Zusammensetzung von Fensterglas*. Angabe der von Fenstergläsern, die nach verschiedenen Methoden hergestellt wurden. Behandlung der Neigung des Glases zur Entglasung u. der Mittel zu deren Verhütung. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 203—05. Columbus Univ.) SALMANG.

E. W. Scripture, jr. und **Edward Schramm**, *Die Solbildung von Tonbrei und seine Eigenschaften*. Vff. teilten (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 243; C. 1925. I. Analyse u. Eigenschaften einer Reihe engl. Kaoline u. Tone mit. Hier folgen Daten für dieselben Kaoline u. Tone: Der Kohlenstoffgehalt (0,24—1,40%) ist ein Maßstab des Gehaltes an organ. Stoffen, ferner Angaben über den Zerteilungsgrad die Viscosität u. Alkaliabsorption. Die bildsamen Tone enthalten besonders organ. Stoffe u. absorbieren viel Alkali. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9 175—85. Wadsworth & Co., Pottery Co. Syracuse (N. Y.)) SALMANG.

Fred Brand, *Entlüftung als Hilfsmittel beim Brennen*. In der bildsamen Tonerde ist jedes Tonteilchen von einem W.-Film umgeben u. die Porenräume mit W. gefüllt. Der Trocknungsvorgang besteht in der Diffusion des W. durch die von Tonteilchen gebildeten Capillaren bis an die Oberfläche des Tonstücks. Durch das Vorhandensein von Luftbläschen wird das im Inneren der Tonmasse befindliche W. nicht so leicht oder weniger von der unmittelbaren Verbindung mit der Außenhaut des Tons getrennt. Es kann dann nicht in ununterbrochenem Capillarstrom entweichen. Bei Steigerung der Trockentemp. kann dann durch örtliche Dampfbildung oder durch die Wärmedehnung der eingeschlossenen Luft das ganze Formstück reißen. Deswegen ist Abwesenheit der Luftbläschen im Tonteig erforderlich. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 189—96. Roseville Ohio, Hydraulic Press Brick Co.) SALMANG.

Wylezol, *Neuerungen beim Ausbau von Gefrierschächten in Beton und praktische Erfahrungen bei Anwendung derselben*. Vf. empfiehlt an Stelle der gußeisernen Tübbings die Verwendung von Beton, der bei gleicher Sicherheit geringere Kosten verursacht, ein prakt. Beispiel gezeigt wird. (Braunkohle 24. 973—78. Calbe a. S.) BIEL.

J. Langbein, Hamburg, *Kaltglasur*, bestehend aus polymerisiertem Leim, Öl o. dgl., Kalk- oder Ammoniakwasser, Infusorienerde oder Asbest oder „Molarerde“. Molarerde findet sich in Dänemark u. besteht aus Infusorienerde, Ton, u. Eisen. Die Mischung kann auch BaO, SrO oder Chromate enthalten. Sie wird Zement zugesetzt, gegebenenfalls unter Zusatz von gel. Kunstharz. (E. P. 247 947 vom 11/2. 1925. Auszug veröff. 21/4. 1926. Prior. 18/2. 1925.) KÜHLING.

John Axel Eriksson, Schweden, *Porige Kunststeine*. CaO u. Schieferasche, fein gemahltes Zn oder Al u. gegebenenfalls eine kleine Menge Portlandzement werden zugesetzt, mit W. versetzt u. der Einw. von Druckdampf ausgesetzt. (F. P. 602 291 vom 19/8. 1925, ausg. 16/3. 1926. Schwed. Prior. 22/8. 1924.) KÜHLING.

Metal & Thermit Corp., Chrome, übert. von: **Simon J. Lubowsky**, Jersey, N. J., *Porige Gegenstände aus Rutil*. Gemahlener Rutil wird mit W., feuchtem Zement oder einem anderen geeigneten Bindemittel gemischt u. (vorzugsweise) bis zum Erhitzen erhitzt. (A. P. 1 578 900 vom 10/10. 1923, ausg. 30/3. 1926.) KÜHLING.

A. Trippensee, Karlsruhe, *Feuerfeste Gegenstände*. Gemahlene Schamotte, Quarz, Ton, Stein oder Sand oder Mischungen dieser Stoffe werden mit Zement gemischt u. in Mischungen entweder unmittelbar zum Ofenbau verwendet oder zunächst zu Platten oder Blöcken geformt, welche nicht gebrannt zu werden brauchen. (E. P. 609 994 vom 20/2. 1926, Auszug veröff. 21/4. 1926. Prior. 23/2. 1925.) KÜHLING.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Ercole Cerasoli, *Die Verwendung von Rübenmelassen als Stickstoff-Kali-Dümmittel*. Bislang wurden die italien. Rübenmelassen verascht u. die Asche als K-Dünger verwandt. Hierbei gehen die nicht unbeträchtlichen N-Mengen der Melassen ungenützt verloren. Rübenmelassen enthalten 1,45—2,10% N u. 4,10—4,45% K. Dies macht für die Gesamtprod. eine Menge von 17 000—25 000 Doppelzentner u. 49 200—53 400 Doppelzentner K₂O aus. Um diese der Verwendung als Dümmittel zugänglich zu machen, schlägt Vf. vor, die Melassen durch Zusatz von Leucit in streubare Form zu bringen. Das Fertigprod., *Kalinzo* genannt, enthält 1,1% 0,35% P₂O₅ u. 4,42% K₂O u. eignet sich gut als Rübedünger. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. **8**. 61—62. Arpino.) GRIMME

Ernesto Möller-Arnold, *Ein Versuch zur Frage der Zuckerrübedüngung schwach sauren Böden*. An Feldverss. wird die günstige Wrkg. der Kalkung zu Zuckerrüben auf schwach sauren Böden (p_H 5,7—6,2) nachgewiesen. Ohne Kalk blieb K₂O-Wrkg. aus; mit Kalk erübrigte sich die Düngung mit P₂O₅. (Fortschr. d. Landwirtschaft **1**. 240—42.) TRÉNEL

Otto Wilson, *Entwicklung des Düngemittelhandels*. Bericht über Ausfuhr u. Einfuhr von N-Düngemitteln, K₂O-Salzen u. Phosphaten in U. S. A. (Ind. and Eng. Chem. **18**. 401—04. Washington [DC.].) GRIMME

Hans Walter Schmidt, *Die neuesten Ergebnisse der Harnstoffdüngung auf Weiden und Weiden und über den Einfluß einer solchen auf die Milchsteigerung*. Kurze Zusammenstellung der wichtigsten Gesichtspunkte über den Zusammenhang zwischen N-Düngung, Grünlandbewirtschaftung, Viehzucht u. Meiereibetrieb u. Erörterung der hohen Wirtschaftlichkeit der Harnstoffdüngung bei der Grünlandkultur. (Milchwirtsch. Zentralblatt **55**. 33—36. Erlangen.) RÜHL

Ernest Vanstone, *Die Rolle des Phosphors in der Landwirtschaft*. Saure Böden geben einen kleineren Teil ihrer Phosphate ab als Kalkböden. Je kleiner die vorhandene Phosphatmenge, um so kleiner ist deren l. Anteil (vgl. S. 1022). Von sauren Böden wird stets ein konstanter Teil des Gesamtphosphates, auch beim Schütteln wechselnder Bodenmengen mit der Säure gel., anders bei Kalkböden. In 2% Citronensäure sind Di- u. Tri-Ca-Phosphat sowie Fe (II)-Phosphat l., unl. Fe (III)-Phosphat u. Apatit. Mineralphosphate lösen sich besser in Oxalsäure (vgl. S. 1022) die deswegen zur Unters. statt Citronensäure geeigneter ist. (Journ. Soc. Chem. **1**. 45. T 78—80. Newton Abbot, Devon, Seale Hayne Agricultural College.) GROSZFE

F. Merckenschlager, *Methoden zur physiologischen Diagnostik der Kulturpflanzen dargestellt am Buchweizen*. I.—IV. Mitt. Als Ergänzung des Vegetationsverf. von Vf. eine große Reihe von Methoden zur physiol. Kennzeichnung von Buchweizen. 1. Experimentell-morpholog. Proben. 2. Die Agarprobe zeigt die „hohen osmot. Saugkräfte“ des Buchweizensamens. 3. Hinsichtlich der Rk. des Bodens ist die „Vegetationsbreite“ von Buchweizen besonders zu bemerken mit Optimum bei pH 4. In 0,2%ig. Citronensäure gehen Buchweizenpflanzen viel langsamer zugrunde als z. B. Senf. 5. Die Anthocyanfarbe ist völlig unabhängig von der Rk. des Nährbodens (innerhalb p_H 4,1—7,15), ein Beweis, wie schwer die [H⁺] der inneren Säfte von außen her zu beeinflussen ist. 6. Die günstigste Nährlsg. ist die von CRONE. 7. In hohen Salzkonz. beginnt das krit. Stadium mit Entfaltung der Keimblätter; das Optimum liegt bei 5‰, selbst in 20‰ tritt der Tod nur langsam ein. 8. Die Chininprobe verläuft negativ. 9. In den Zellen findet eine starke Ablagerung von oxalsaurem Kalk, die durch Nitratgaben gesteigert wird. 10. In allen Organen sind Nitrate nachweisbar, im Gegensatz zur Lupine. 11. Alle Säfte sind stark sauer. 12. In Übereinstimmung mit Punkt 2 zeigen die Keimblätter eine starke Ausscheidung trockenen W. Die Guttationsgeschwindigkeit ist erheblich u. wird durch höhere St

verlangsamt. 13. Die „Durstprobe“ bei Koedukation mit *Vicia faba* u. *Sinapis* beweist die Überlegenheit in der Wasserversorgung des Buchweizens. 14. Die gewisser Quellfl. wird durch Buchweizensamen stark verändert u. zwar stärker von Senf u. Weizen; auch in höheren CaCl_2 -Konz. büßt Buchweizen die Keimzeit nicht ein. 15. Die Red. von AgNO_3 -Lsg. verläuft langsamer als beim Senf; Eisensulfatprobe fällt negativ aus. 16. In Permanganatlsg. findet starke Braunschcheidung an den Wurzeln statt. 17. Farbstoffproben ergaben keine eindeutigen Resultate. 18. Die Wurzelpreßsäfte sind sehr sauer. 19. Gegen die phot. Wrgk. von Eosin sind die keimenden Samen unempfindlich. 20. Mischproben. 21. *Spargula arvensis* u. *Polygonum persicaria* sind keine eindeutigen Pflanzen für Buchweizen. 22. Anatomie der Organe. — In den folgenden Abt. wird der Wert der beschriebenen Einzelproben für die Diagnostik des Buchweizens diskutiert; *Fagopyrum* ist nicht „kalkempfindlich“, sondern empfindlich für zweiwertige Kationen schlechthin. Eine spezielle „Chlorbedürftigkeit“ des Buchweizens wird verneint; Literaturangaben mit Diskussion. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 137—41. 174—80. 212—18. 242—48.) TRÉNEL.

J. A. Braun, *Über den Wert der Kartoffelbeizung, insbesondere über die Möglichkeit der Hypochneusbekämpfung mit Hilfe der Beizung*. Übersicht über den derzeitigen Stand der Frage. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 201—06.) TRÉNEL.

W. A. Roach und **Wm. B. Brierley**, *Die Behandlung des Kartoffelkrebses mit Formalin*. Die Verss. fielen negativ aus. (Science 63. 307—08. Rothamsted, Exp. Trénel.)

J. A. Fischer, *Erfahrungen bei Diametanvergasungen*. Ergebnisse einiger Verss., festgestellt wurden, um bei Diametanvergasungen die Abhängigkeit der SO_2 -Konz. von der Dichtung des Raumes, den Einw. der äußeren Atmosphäre u. der Verteilung der Dämpfe analyt. zu prüfen. (Der prakt. Desinfektor 18. 63—66.) HÜCKEL.

L. Lössl, *Untersuchungen über die Verdaulichkeit des Proteins und der Rohfaser verschiedener Futtermittel beim Haushuhn*. Nächste Sojabohnenkuchenmehl wurde Protein des Winterweizens (26,7%) am besten verwertet, doch sind Fisch- u. Leinölmehl bei weitem überlegen (82—91%). Die Rohfaser hat prakt. keinen Wert. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 249—52.) TRÉNEL.

Arthur Zaitschek, *Verwertung von Kalksteinmehl und Schlammkreide durch wachsende englische Schweine*. Die Fütterungsverss. ergeben, daß beide Kalkarten gleichwertig sind. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 238—40.) TRÉNEL.

J. A. Frazier Co., San Francisco, und **Frederick Anson Frazier**, Berkeley, Kalifornien, *Spritzflüssigkeit*. Man mischt 60 Teile käufliches Na_2S , 75 Teile Na_2CO_3 , 10 Teile Rohschwefel u. erhitzt das Gemisch in einem geschlossenen Gefäß bis 80°. Das erhaltene Prod. ist l. in W. Die mit einem Klebemittel (Dextrin, Leim, Caseinat, Mehl) versetzte Lsg. der Prodd. dient als Fungicid u. Insektizid. (Z. PP. 19 574 vom 11/9. 1924, ausg. 15/10. 1925 und 19 575 vom 11/9. 1924, ausg. 9/4. 1925.) KAUSCH.

III. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

E. H. Schulz, *Tätigkeitsbericht der Versuchsanstalt für die Jahre 1923 und 1924*. Jährlicher Bericht über die Tätigkeit der Versuchsanstalt u. deren einzelnen Laboratorien. Statist. Angaben über laufende Unterss., Aufzählung der Forschungsergebnisse aus den Gebieten der analyt. Chemie, der Metallchemie, der Kohlechemie, der Chemie der feuerfesten Steine, der Kohäsions- und Härteprüfung. (Mitt. Versuchs-Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmunder Union 1. 179 bis 1925.) KANGRO.

Galen H. Clevenger und **Martinus H. Caron**, *Behandlung von manganhaltigen Silbererzen*. Manganhaltige Silbererze bilden beim Rösten Verb. des Ag mit (wahrscheinlich Manganide), welche bei der Cyanidlaugerei nicht angegriffen werden. Ebenso wurde nachgewiesen, daß die Silbererze mit SiO_2 beim Rösten Silbersilber bilden, welche gegen Cyanid sehr widerstandsfähig sind. Die Verluste lassen im ersten Falle vermeiden, wenn man das Erz in einer reduzierenden Atmosphäre erhitzt, wodurch die Manganide zu MnO reduziert werden. (Journ. Franklin Inst. 200. 261—62. U. S. Bureau of Mines.)

ENSZLIN

B. Bogitch, *Die Rolle des Natriumsulfats beim Raffinieren der Metallsteine*. (S. 1025.) Die Metallsteine (Cu-, Ni-, Co-Steine) stellen nur ein Zwischenerzeugnis dar zwecks Konz. der gewünschten Metalle in Form von Sulfiden. Die Cu-Steine enthalten stets mehr als 20% S, die Ni-Steine 14—17% S. Der Fe-Gehalt hängt nicht allein vom Erz, sondern auch vom angewandten Verf. ab. In der Regel erfolgt die Schmelzung im Flammofen ein an Fe ärmeres Erzeugnis als im Schacht. In den meisten Fällen erfolgt bei der Raffination die Verschlackung von Eisen mit Hilfe von Kieselsäure. Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß die reine Kieselsäure allein (Sand oder Quarz) nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt. Dagegen bewirkt das Natriumsulfat ein wirksameres Mittel. Bei den vom Vf. vorgenommenen Vers. wurde das Gemisch Metall, Sand u. Natriumsulfat in einem Gasofen, der eine Temp. von 1500° in 20—25 Min. erreichte, geschmolzen. Das Gewichtsverhältnis von S zu Natriumsulfat war 3:1. Es ergab sich, daß das Natriumsulfat ein sehr wirksames Oxyd ist. Wenn der S-Gehalt der Steine unterhalb der Grenzen ist, die der Raffinationstemp. entsprechen, reichert der Zusatz des Sulfates die Steine mit S u. umgekehrt. Dann macht das Natriumsulfat die Schlacke dünnflüssiger u. vermindert dadurch Verluste an Metall in der Schlacke. (Rev. de Métallurgie 23. 193—98.) KANGRO

Erich Will, *Versuche zur Gewinnung des Schwefels aus dem Abgas metallurgischer Öfen*. Im Anschluß an seine früheren Arbeiten über die Entschwefelung von Koks- u. Gasen (Mitt. Versuchsanst. Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund. Union 1. 92; C. 1923. IV. 895) stellt Vf. Verss. zur Gewinnung von S aus Gasen metallurg. u. sonst mit schwefelhaltigen Gasen beheizter Öfen an. Die katalytische Oxydation des SO_2 an verschiedenen Kontaktmassen ($\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al}_2\text{O}_3$; Fe_2O_3 ; CuCrO_4) bei 450—800° erweist sich als undurchführbar, da die Kontaktmassen durch Ggw. von Feuchtigkeit, die stets in den Abgasen vorhanden ist, in Sulfate umgewandelt werden. Hingegen läßt sich das SO_2 bei genügender Kühlung der Abgase mit Wasser als Nebel reichlich abscheidenden W. weitgehend kondensieren. Bei Herabkühlen der Abgase auf 10° wurden auf diesem Wege 50% des S gewonnen. (Mitt. Versuchsanst. Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund. Union 1. 237—42. 1925.)

KANGRO

Paul Ophüls, *Stand der augenblicklichen Bländeröstung unter Berücksichtigung der bekannteren mechanischen Bländeröstöfen*. Es werden verschiedene Röstofentypen beschrieben u. ihre Vor- u. Nachteile angegeben. (Metall u. Erz 23. 177—79. H. v. Born, Rh.)

ENSZLIN

H. Bückner, *Eine Beobachtung bei Benutzung des elektrisch geheizten Salzbadofens*. Es wird auf einen Fehler in der Anordnung zum Härten von Versuchsstäben im elektrisch geheizten Salzbadofen aufmerksam gemacht, der darin besteht, daß die frei im Strom durchflossenen Salzbad hängenden Stäbe mit Drähten an einer gemeinsamen Eisenstange befestigt werden, dadurch einen besser als das Bad leitenden Mittelleiter bilden u. durch die Stromwärme eine höhere Temp. als das Bad annehmen, wodurch empfindlicheren Stählen erhebliche Unregelmäßigkeiten in den magnet. Eigenschaften entstehen können. Statt der Eisenstange soll daher ein Porzellanstab als Träger verwandt werden. (Mitt. Versuchsanst. Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund. Union 1. 257—58. 1925.)

KANGRO

J. H. Schulz und R. Frerich, *Über die Stickstoffaufnahme des Eisens im Thomasverfahren*. Die Abhängigkeit des Stickstoffgehalts im Fe von dem Verlauf u. den Bedingungen des Frischprozesses wird an 33 Thomasschmelzen untersucht. Ergebnisse: 1. Je höher der Gesamt-Temp.-Verlauf der Schmelze liegt, um so höher der N-Gehalt. Die Temp. der Entphosphorungsperiode ist hierbei von besonderer Bedeutung. 2. Mit der Zunahme der Blasezeit steigt der N-Gehalt. 3. Die Länge der Blasezeit in der Entphosphorungsperiode ist von besonderer Bedeutung für die des N-Gehalts, ihr Einfluß kann den der Temp. u. der Windmenge überdecken. Mit zunehmender Windmenge steigt der N-Gehalt, der Einfluß der Windmenge doch gegenüber dem der Temp. u. der Zeit von untergeordneter Bedeutung. Versuchsanst. Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund (1. 251—57. 1925.) KANGRO.

Hr. Gilles, *Die Erzeugung von Gußeisen hoher Festigkeit*. Vf. betrachtet die mechanischen Eigenschaften von Gußeisen, das in der üblichen Weise hergestellt worden ist u. bewertet die Bestrebungen zu ihrer Verbesserung. Der übliche Kupolofen arbeitet intermittenzmäßig unzuverlässig. Es werden Ölfeuerung u. Elektroöfen erörtert u. auf Grund neuerer Erfahrungen Vorschläge gemacht, die Festigkeitswerte des Kupolofenprozesses auf $K_z = 35\text{--}40 \text{ kg/qmm}$ bzw. $K_b = 50\text{--}60 \text{ kg/qmm}$ zu erhöhen, ohne eine Nachbehandlung erforderlich ist. (Gießereiztg. 23. 203—12. Berlin.) LÜDER.

—, *Die Eigenschaften hochsiliciumhaltigen Baustahls*. Festigkeitsverss. an Walzstahl mit niedrig gekohltem Stahl von 1% Si ergaben eine Erhöhung der Zugfestigkeitsgrenze gegenüber Stählen mit n. Si-Gehalten, ohne gleichzeitiges Sinken der Bruchdehnung. (Stahl u. Eisen 46. 493—503. Berlin.) LÜDER.

J. Cazaud, *Versuche über die Selbstmagnetisierung von Stählen bei Torsionsbeanspruchung*. Innerhalb eines magnet. Feldes wurden Stähle von 0,3—1% C auf Torsion beansprucht u. die Änderung der Feldstärke beobachtet. Ein Feld von 50 Gauß erwies sich als am geeignetsten. Vf. hofft, hierauf eine Methode zur schnellen Feststellung der Zugfestigkeit gefahren Zus. u. der therm. Vorbehandlung von Stählen gründen zu können. (Bull. l'Acad. des sciences 182. 467—68. Paris.) LÜDER.

J. Roux, *Die Ausbesserung von Eisenbahngleisanlagen aus Manganstahl durch die autogene Schweißung*. Der Stahl mit 13% Mn findet heute vielfach Anwendung als Gleisbauwerkstoff für Gleisanlagen (Übergangs- u. Kreuzungsstücke) mit starkem Durchgangsverkehr. Wenn dieser Stahl auch sehr widerstandsfähig ist, so erfährt er im Laufe der Zeit infolge der schweren Belastungen doch gewisse Verformungen. Die Ausbesserung der Beschädigungen durch die autogene Schweißung kann dieser ein weiteres Anwendungsfeld eröffnen. Die vom Vf. durchgeführten Schweißungen fanden nicht mit dem Schweißbrenner statt, sondern mit dem elektr. Schweißapp. Mechan. Verss. zeigen, daß das aufgeschweißte Metall (12,84% Mn, 1,034% C) nicht spröde ist u. sich an dem Stück fest anhaftet. Die Härte der Schweißstelle betrug 196, die des Grundmetalls 207 Brinelleinheiten. (Rev. de Métallurgie 23. 243—50.) KALPERS.

J. Bogitch, *Die Zusammensetzung von Kupfersteinen*. Die Verss. des Vf. beziehen sich auf das System Cu-Fe-S. Das Gebiet der Zweischichtenbildung wurde eingehend untersucht u. seine Grenzen festgelegt. Die Gleichgewichts-Bindungsgeraden zeigen, in welcher Weise die Vorgänge beim Hüttenprozeß des Steinschmelzens vor sich gehen müssen (soweit nicht Fremdkörper störend wirken). (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 468—70. Paris.) LÜDER.

V. Köster, *Beobachtungen an Kupfer zum gesetzmäßigen Gefügeaufbau nach der Rekristallisation*. Vf. beobachtete bei der Rekristallisation stark gewalzter Cu-Bleche den gesetzmäßigen Gefügeaufbau. Durch Tiefätzung wurde die Gleichorientierung der Rekristallite eines Schnittes festgestellt. Die mechan. Eigenschaften zeigen ebenfalls Abhängigkeit von der Walzrichtung. Dabei ist der Grad der Gleichrichtung der

Krystalle unabhängig von Glühtemp. u. Glühdauer. (Ztschr. f. Metallkunde **18**. bis 16. Thun [Schweiz].) LÜDER

R. Irrmann, *Das Verhalten von Aluminium bei höheren Temperaturen gegenüber Eisen*. Fl. Al löst bereits unterhalb 800° Fe mit geringem C-Gehalt auf, ebenso wei Roheisen ohne Gußhaut bei 800—900°. Grauguß mit Gußhaut wird erst zwischen 900 u. 1000° angegriffen. Das C-arme Fe kann man durch Überzüge von Fe_3O_4 Al_2O_3 wirksam schützen. Vf. hat die Ergebnisse seiner Verss. in Kurven zusammengestellt. (Ztschr. f. Metallkunde **18**. 121—22. Breslau.) LÜDER

H. A. Burk, *Fällung und Umschmelzen bei der Tonopah Extension Mill.* Fällung der mit Ag gesätt. Cyanidlauge geschieht in besonderen App. mit Zinkstaub. Das so gefällte Metall enthält 92,55% Ag u. 0,8113% Au neben etwas Zn, Se, Pb, Cd, Fe u. CaO. Nach der Fällung u. dem Waschen u. Filtrieren wird das Metall umgeschmolzen. (Eng. Mining Journ.-Press **121**. 569—70.) ENSZLIN

Jean Valentin, *Beitrag zur Studie der ternären Legierungen*. Im ersten Teil werden behandelt: die binären Systeme, techn. Verss., Forschungsarbeiten über die Mg-Legierungen, das ternäre System Al-Mg-Cd u. mechan. Verss., im zweiten Teil das System $\text{MgCl}_2\text{-KCl-BaCl}_2$. Bei den binären Legierungen handelt es sich um Legierungen Al-Cd , Mg-Cd , Al-Mg . Die von BRONIEWSKI gefundene Verb. Al_2Mg ist von HANSON u. GAYLER bestätigt worden. Die techn. Verss. erstrecken sich auf die therm. Analyse, die Zubereitung der Legierungen, die Kleingefügeunters. u. therm.-dilatometr. Analyse, während die Forschungsarbeiten über Mg-Cd vom Vf. selbst angestellt wurden u. sich mit dem Kleingefüge u. dem Diagramm dieser Legierungen befassen. Eine konstante Schmelztemp. u. die Gleichmäßigkeit des Gusss sind zwei wichtige Umstände für das Vorhandensein einer bestimmten Verb. Mg-Al (Rev. de Métallurgie **23**. 209—18.) KALPER

Samuel Daniels, *Eigenschaften einiger gießbarer Aluminiumlegierungen, welche Silicium und Magnesium enthalten*. Vf. hat Legierungen aus Al, welches 0,5% Si enthält, unter Zusatz von 5% Si hergestellt u. deren Eigenschaften studiert. Diese Legierungen haben keine besonders hervortretenden mechan. Eigenschaften außer bei erhöhten Temp. infolge der Löslichkeit von Si u. Mg_2Si . Beigegeben sind zahlreiche mikr. Bilder. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 393—98. Dayton [Ohio].) GRUBER

G. Welter, *Statische Dauerfestigkeit von Metallen und Legierungen*. Eine Reihe von Metallen u. Legierungen wurden einer stat. überelast. Dauerbeanspruchung unter Zug, die teilweise bis zu 9 Monaten ausgedehnt wurde. Es zeigte sich, daß die meisten Metalle gegen solche Belastung wenig widerstandsfähig sind, u. daß teilweise unterhalb der Zerreißfestigkeit Brüche auftreten, ohne daß eine äußere Ursache zu erkennen ist. Die Verss. erstreckten sich auf reines Cu, Al, 2 Messinge, Duralumin, Skleron u. St. (Ztschr. f. Metallkunde **18**. 75—80. 117—20. Frankfurt a. M.) LÜDER

Edmund R. Thews, *Das Aluminiumschmelzen erfordert Sorgfalt*. Vf. behandelt diejenigen Umstände, welche beim Schmelzen von Al zu beachten sind, insbesondere die Gefahr der Verunreinigung durch Fe, B. von Nitrid, Carbid u. viel Al_2O_3 . Hierin sind die verschiedenen Öfen zu wählen. (Foundry **54**. 268—71. Berlin.) LÜDER

J. Cournot, *Die metallischen Zementationen und das Überziehen der Eisenlegierungen mit Aluminium*. Die industriellen Verff. für die Zementation von Fe durch Al sind das Eintauchverf., der elektrolyt. Überzug, das Schoopverf., die amerikan. Kalasation, das Martinverf. (gasige Zementation durch AlCl_3) u. das Mekerverf. (Zementation in Fe-Al-Pulver). Zweck der Unterss. war, die Güte dieser Verff. an Versuchsstücken aus weichem Stahl zu prüfen, wobei die Art der Zementation selbst, Einfluß der Zeit u. Temp., die entsprechenden Gesetze, die Schwankungen in der Zementationsschicht, das Verh. in der Wärme, der Einfluß mechan. Umformung u. Schläge berücksichtigt wurden. (Rev. de Métallurgie **23**. 219—32.) KALPER

—, *Wirtschaftliche Verzinkung*. Die Vorzüge der Verzinkung des Fe gegenüber Verzinnung, das Abbeizen des Eisenblechs vor der Verzinkung, die Behandlung schmiedeisernen Schmelzkessels u. das Zinkbad selbst werden besprochen, anekdote der Prozeß der *Sherardisierung* u. die Verwertung von verzinktem Eisenschrott; die bisherige Verarbeitung des letzteren wird als unrationell bezeichnet u. Verkopplung mit dem Sherardverf. empfohlen, d. h. direkte Übertragung von Alt- auf billigem Eisenschrott auf Neueisen in einem Wärmeprozess. (Apparate-**38**. 80—82.) ASCHER.

John R. Baylis, *Faktoren, welche außer gelöstem Sauerstoff das Rosten von Eisen beeinflussen*. Wird blankes Eisen in W. gelegt, so greift zunächst gel. O₂ unter Bildung an, darauf wirken andere Faktoren rostverstärkend. Der Sättigungswert für Fe(OH)₂ in Abwesenheit von O₂ ist in W. oberhalb pH 8 sehr gering. Fe(CO₃)₂ sehr schlecht l. beim Sättigungspunkte von CaCO₃, die Löslichkeit steigt jedoch ab, wenn pH durch das CaCO₃-Gleichgewicht herabgesetzt wird. H₂-Blasen wirken korrodierend in dest. W., Ggw. von (OH)-Ionen, entstanden durch B. von H₂ an titrl. W., führt zur B. l. Fe-Salze. Ggw. von Sulfaten u. Chloriden setzen pH bis 6,0 herab unter Angriff auf das Eisen. Fe-Oxyde u. Hydroxyde sind oftmals netisch u. setzen sich deshalb auf dem Fe als poröser Nd. ab. Der Nd. kann durch O₂-Einw. u. Sulfate bzw. Chloride vergrößert werden. (Ind. and Engin. Chem. **37**—80. Baltimore [Md.].) GRIMME.

Leland E. Wemple, Cleveland, V. St. A., *Gewinnung von Metalloxyden aus Erz*. Die Erze werden sehr fein zerkleinert, mit einem ebenfalls sehr fein zerkleinerten Brennstoff gemischt u. mittels eines Gebläsebrenners einer auf getemp. vorerhitzten Kammer zugeführt, welche durch Querwände so unterteilt ist, daß die vom Gebläsebrenner zerstäubte M. die Kammer im Zickzack durchläuft. Hierbei sinken die nicht metall. Bestandteile zu Boden, während die Metalle verdunstet werden u. die gebildeten Metalloxyde in Dampfform entweichen. Sie werden in Filtersäcken gesammelt. Das Verf. ist besonders für Zink-, Antimon- u. Bleierz geeignet. (A. P. **1 578 694** vom 16/11. 1923, ausg. 30/3. 1926.) KÜHLING.

H. Hilbert, Neuß a. Rh., *Thomasschlacke*. Roheisen wird unter Zusatz von element. Phosphat u. CaO oder Dolomit im Konverter verblasen. (E. P. **247 946** vom 11/2. 1926, Auszug veröff. 21/4. 1926. Prior. 19/2. 1925.) KÜHLING.

General Electric Co., Schenectady, V. St. A., und **British Thomson-Houston Ltd.**, London, *Behandeln von Siliciumstahlblechen*. Die Bleche werden mittels 20%ig. H₂SO₄ gebeizt u. dann unter desoxydierenden oder reduzierenden Bedingungen geglüht, z. B. im Vakuum oder in Wasserstoffgas bei 800—850°. Die Behandlung verstärkt die magnet. Eigenschaften des Stahls. (E. P. **248 140** vom 6/1. 1926, ausg. 25/3. 1926.) KÜHLING.

Léonce Blanchet, Frankreich, *Gewinnung von Metallen, besonders Eisen und Mangan*. Eisenerz oder Alteisen wird vorerhitzt u. dann bei einer Temp. von 400—1200°, teilweise 600—1200° der Einw. der Dämpfe von KW-Stoffen ausgesetzt, welche dem Erz oder Alteisen fein verteilte Kohle abscheiden u. selbst in leichter sd. Ergebnisse übergehen, von denen die nicht kondensierbaren Gase zur Heizung der vorerhitzten Öfen dienen. Das mit Kohle bedeckte Erz oder Alteisen gelangt in einen vorerhitzten Ofen, in dem es niedergeschmolzen wird. (F. P. **602 703** vom 10/12. 1924, ausg. 25/3. 1926.) KÜHLING.

Félix Thuaud, Frankreich, *Werkzeugstahl* enthaltend außer Fe, C, Mn, Cr, Mo, Si, U, Si, P u. Schwefel. (F. P. **602 435** vom 1/12. 1924, ausg. 18/3. 1926.) KÜHLING.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Heinrich Specketer**, Chemnitz a. M. und **Georg Bartels**, Bitterfeld), *Gewinnung von Metallen durch Destillation*. Destillationsapparat, bestehend aus einem elektr. Ofen, gek. durch die Anwendung der an sich bekannten doppelwandigen

Auskleidung eines metall. Ofenmantels, die aus einer geformten u. einer ungeformten Schicht zusammengesetzt ist, von welcher die erste (innere) aus feuerfestem Material besteht, während die zweite (äußere) aus einer Schüttung von körnig-pulverförmigen Stoffen gebildet ist. (**D. R. P. 426 544** Kl. 40c vom 29/11. 1924, ausg. 12/3. 1926.) KÜHLIN

Electrolytic Zinc Co. of Australasia, Ltd., Melbourne, übert. von: **Herbert William Gepp, Harry Hey, Gilbert Rigg**, Melbourne, **Royale Hillman Steel and Rolans Thomas Dryll Williams**, Hobart, Tasmanien, Australien, *Behandlung von Zinkerzen*. (**Can. P. 251 511** vom 1/8. 1923, ausg. 7/7. 1925. — **C. 1924. I. 594.**) KÜHLIN

Soc. Générale Métallurgique de Hoboken, Belgien, *Aufarbeiten von Zinkerzen*. Die Erze werden bei hoher Temp. im Drehrohrofen erhitzt, um Zn u. Pb-Oxyde zu verflüchtigen, welche mittels wss. Lsgg. von $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ getrennt werden. Enthält das Erz Schwefel, so wird Cu zugesetzt, um den Schwefel in der entstehenden Speise zurückzuhalten. Ist im Erz neben Schwefel Cu vorhanden, so ist der Gehalt an Schwefel so zu regeln, daß der gesamte Schwefel an Cu gebunden im Rückstand bleibt u. es ist zu diesem Zweck das Erz abzurösten oder Cu oder auch Schwefel zuzusetzen. (**F. P. 602 385** vom 24/11. 1924, ausg. 17/3. 1926.) KÜHLIN

Ellenberger & Schrecker, Frankfurt a. M., *Verfahren zur Chromgewinnung aus entleimten, Cr-haltigen Lederabfällen*, dad. gek., daß man das in den Lederabfällen enthaltene Cr durch Einw. von Cl_2 in der Hitze in W. l. CrCl_3 überführt. (**D. P. 427 807** Kl. 12m vom 29/3. 1924, ausg. 15/4. 1926.) KAUSCH

Siemens & Halske A.-G., Siemensstadt bei Berlin, *Behandeln von Quecksilbererzen*. Eine diskontinuierliche Entladung wird zwischen einer aus Hg bestehenden oder enthaltenden Elektrode u. einer anderen Elektrode erzeugt. In den Stromkreis wird eine Selbstinduktion geschaltet werden. Ein diskontinuierlicher Quecksilberstrom kann gegen einen aus Hg oder einem anderen Metall, z. B. Ca bestehenden Kontrastelektrode gerichtet werden. Die Anordnung erfolgt in der Form der Quecksilberunterbrecher oder indem eine mit Zähnen besetzte Welle in Hg rotiert. Die Entladung erfolgt in Luft, Quecksilberdampf, Leuchtgas, H_2 , CO_2 o. dgl. bei gewöhnlichem oder verstärktem Druck. (**E. P. 247 508** vom 13/6. 1925, Auszug veröff. 14/4. 1926. Prior. 14/2. 1925. **Zus. zu E. P. 243 670; C. 1926. I. 3101.**) KÜHLIN

Canadian Westinghouse Co. Ltd., Hamilton, übert. von: **John Wesley Marshall**, East Orange, V. St. A., *Herstellung seltener Metalle*. (**Can. P. 252 166** vom 2/11. 1922, ausg. 28/7. 1925. — **C. 1922. II. 1078** [E. P. 173 236].) KÜHLIN

Sociedad Minera Cuprum, Valparaiso, und **Carl Hennes**, Berlin-Karlshagen, *Metalle aus Erzen u. dgl.* Um kostbare Metalle (z. B. Ag) aus daran armen Erzen u. Erzen zu gewinnen, werden die Erze in einem oxydierenden Bade mit dem verflüssigenden Chlorid oder dem Lösungsm. in Berührung gebracht, so daß die Verflüssigung u. die Reduktion in einem Arbeitsgange erfolgt. Das freigewordene oder gel. Metall kann aus dem Bade entfernt werden. (**Aust. P. 19 551** vom 10/9. 1924, ausg. 3/12. 1925.) KÜHLIN

General Electric Co., New York, übert. von: **Truman S. Fuller** und **D. Basch**, Schenectady, V. St. A., *Legierungen*, bestehend aus Al, 3—8% Zn u. bis 1,5% Mg. (**A. P. 1 578 979** vom 13/12. 1923, ausg. 30/3. 1926.) KÜHLIN

R. W. Stimson, New York, und **W. Borchers**, Aachen, *Legierungen*. Zur Herstellung von Legierungen, welche neben Si, Ti oder Zr ein oder mehrere Metalle, wie Co, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Ta, Th, W, U oder V enthalten, werden diese Elemente enthaltenen Erze oder andere Ausgangsstoffe mit Kohle u. Flußmitteln gemischt, brikettiert u. geglüht. Die entstehende Schlacke soll weder stark sauer noch stark bas. sein u. Hauptbestandteil Al_2O_3 enthalten. Die Schlacke kann bei einem anderen Prozedere gleicher Art als metallliefernder Ausgangsstoff u. die hierbei erhaltene Legierung als Reduktionsmittel gebraucht werden. Der Vorgang kann über einem Bade aus geschmolzenem Metall ausgeführt werden. (**E. P. 247 634** vom 6/11. 1924, ausg. 18/3. 1926.) KÜHLIN

R. W. Stimson, New York, *Legierungen*. Erze, Konzentrate o. dgl., welche in Fe, C, P u. Si noch Co, Cu, Cr, Mn, Mo, Ni, Ti, W, U, V u. Zr enthalten, werden ebenfalls unter Zusatz von höchstens 10% Eisenerz oder Fe_2O_3 mittels eines freien Reduktionsmittels bei Ggw. eines bas. Flußmittels reduziert u. das Erz mittels einer CaC_2 enthaltenden Schlacke gereinigt, deren C-Gehalt nicht mehr als 2% beträgt. Auch kann das reduzierte Erzeugnis in ein Bad von geschmolzenem Stahl eingetragen werden. Die zur Reinigung dienende Schlacke wird aus Kohle, Flußspat u. gegebenenfalls Borax u. CaC_2 hergestellt. Das Stahlbad mittels Ferromangan, Calciumsilicid, Ferrosilicium, Ferrotitan u. Al desoxydiert. (Z. 247 876 vom 6/11. 1924, ausg. 25/3. 1926.) KÜHLING.

Serge Heuland, Spanien, *Herstellung von Metallen und Legierungen*. Zur Herst. Metallen, wie Fe, Mn u. Cr oder ihren Legierungen werden geeignete Erze im r. Ofen geschmolzen u. es wird zunächst ein kleiner Teil der in ihnen enthaltenen Siloxyde reduziert u. nach Entfernung der Reduktionserzeugnisse der Rest der Siloxyde in Metall verwandelt. Als Reduktionsmittel dient Si_2Ca . Das zunächst erhaltene Metall bindet die unerwünschten Beimengungen, Fe, P, C usw., das in der letzten Phase des Verf. erhaltene Metall ist frei von diesen. (F. P. 602 448 vom 11/3. 1925, ausg. 18/3. 1926.) KÜHLING.

Compagnie des Lampes, Frankreich, *Herstellung von Zirkoniumlegierungen*. Metalldraht, vorzugsweise ein Wolframdraht, wird bei Ggw. eines reduzierenden Gas, besonders H_2 , im Dampf einer Halogenverb. des Zr, vorzugsweise ZrCl_4 , im geschlossenen Gefäße auf etwa 1500° erhitzt. Dabei bildet sich auf dem Metalldraht ein Belag von metall. Zr, den man durch kurzes Erhitzen des Drahtes in einem inerten Gas, wie H_2 oder Ar, auf 2600° mit dem Drahtmetall legiert. Die Ergebnisse dienen zur Herstellung von Glühlampen. (F. P. 602 627 vom 25/8. 1925, ausg. 23/3. 1926. A. Prior. 30/8. 1924.) KÜHLING.

George J. Nikolas, Chicago, V. St. A., *Emaillähnliche Überzüge auf Metallen*. Sorgfältig gereinigten Metalle werden mit 3 Lackschichten überzogen, von denen die mittlere Bronzepulver u. Bestandteile enthält, welche die erste Schicht teilweise durchdringt u. die dritte als Deckschicht dient. (A. P. 1 578 464 vom 11/3. 1920, ausg. 11/3. 1926.) KÜHLING.

American Rolling Mill Co., übert. von: **Wesley J. Beck** und **James A. Aupperle**, Middletown, V. St. A., *Metall für Emaillierzwecke*. Das zu emaillierende Metall wird so weit gereinigt, daß es weniger als 0,04% Mn, aber noch so viel O_2 enthält, daß unter dem Mikroskop Eisenoxyd erkennbar ist. (A. P. 1 578 706 vom 16/11. 1924, ausg. 30/3. 1926.) KÜHLING.

General Electric Co. Ltd., London, übert. von: **Patent Treuhand-Ges. für elektrische Glühlampen**, Berlin, *Walzen von Wolfram, Tantal, Molybdän usw.* Ein Blech von W o. dgl. wird zwischen 2 Eisenblechen gewalzt, deren Oberflächen mit Asbestpapier o. dgl. belegt sind. (E. P. 247 507 vom 27/5. 1925, ausg. 14/4. 1926. Prior. 11/2. 1925.) KÜHLING.

Herbert Gloomtz, Dresden, *Herstellung von Metallpapier in Bahnen- oder Rollenform*. Durch Aufstreuen von Metallpulver auf mit Klebstoff versehene Papierbahnen, wird erreicht, daß die so vorbereiteten Papierbahnen Metallseite auf Metallseite zu einer Rolle gewickelt werden u. in dieser Rolle das Metallpulver durch Schlagen zu gleichmäßigen Metalldecken bearbeitet wird. — Das so erhaltene Metallpapier steht den Anforderungen mit Blattmetall belegten Papieren an Aussehen nicht nach u. übertrifft sie an Haltbarkeit. (Oe. P. 102 564 vom 3/1. 1925, ausg. 25/2. 1926. D. Prior. 12/1. 1924.) OELKER.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, *Isolieren von Gehäusen und anderen Teilen von Flüssigkeitsmessern zur Vermeidung von Korrosionen*, dad. gek., die Gegenstände im angewärmten Zustande einem Bad, bestehend aus einer

Metallseifenlsg. zugeführt werden, wobei die Lsg. in an sich bekannter Weise u. dem Einfluß eines Vakuums oder unter Hochdruck in eine innige Verb. mit dem M tritt u. sie hiernach unter dem Einfluß steigender Wärme u. Entziehung des Lösungsmittels so getrocknet werden, daß ein fest anhaftender u. durchsichtiger Überzug entsteht zum Zwecke, einen isolierenden Schutz gegen Anfressungen, insbesondere elektr. Zers. des Metalls durch vagabundierende elektr. Ströme zu erhalten. (D. R. P. 426 Kl. 12e vom 31/1. 1925, ausg. 10/3. 1926.) KAUSCH

XI. Harze; Lacke; Firnis.

L. Clément und **C. Rivière**, *Die neuzeitlichen Anwendungen der Cellulosefirnissen, deren Verwendung in der Automobilfabrikation*. Besprochen werden Nitrocellulose, Acetylcellulose, Oxycelluloseester, Zus. von Cellulosefirnissen, deren Lösungsmittel, Zusätze, Fabrikation, Anwendungsgebiete, Vorzüge, besonders ihr bleibender Glanz u. ihre Undurchlässigkeit für W. (Bull. soc. encour. industrie nationale 1926. bis 115.) GROSZFE

J. Mc E. Sanderson, *Ein Trockenzeitmesser für Firnisse und ähnliche Materialien*. Runde Scheiben werden in Umdrehung versetzt und dabei mit Firnis gleichmäßig gestrichen. Man läßt dann auf die mit bestimmter Geschwindigkeit gedrehten Scheiben Sand in Spirallinien auflaufen u. ermittelt, wann der Sand abgeklöpft oder nur durch die Bürsten entfernt werden kann. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Teil Papers. 407—15. 1925.) SÜVER

A. H. Pfund, *Prüfungen von Firnissen auf Härte, Glanz, Farbe und Trocknungsfähigkeit (leveling)*. Zur Best. der Härte wird die Prüfung nach BRINELL dahin geändert, daß die durch eine eingedrückte Kugel erzeugte Vertiefung mkr. gemessen wird, solange Kugel u. Firnis miteinander in Berührung sind. Ein App. ist beschrieben. Weiter ist ein App. zur Glanzmessung beschrieben. Die Farbe wird durch gefärbte Glaskeile ermittelt, auch der dazu dienende App. ist beschrieben. Eine Vorr., bei der ein Metallkamm über eine gefirnißte Fläche in verschiedenen Stellungen gezogen wird, dient zur Beurteilung der Zeit, die zwischen Auftragen eines Firnisses u. dem Verschwinden eingeritzter Marken vergeht. (Proc. Amer. Soc. Testings Materials 25. II. Techn. Papers 392—402. 1925.) SÜVER



Otto Ehrlich, Wien, *Darstellung von hellfarbigen, licht- und luftbeständigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd*, dad. gek., daß man die l. Zwischenprodd. (Resole) mit entquellend wirkenden Mitteln oder Lsgg. solcher behandelt, dann das überschüssige Phenol mit W. ausschüttelt. — Als entquellend wirkende Mittel eignen sich Säuren mit niedriger *K*, wie Milchsäure, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, Weinsäure, H_3BO_3 , sowie deren l. Salze. Es gelingt so, das nicht in Rk. getretene Phenol vollständig zu entfernen, während bei der Behandlung der Zwischenprodd. mit Alkalien das adsorbierte Phenol der Harz-Phenol-Emulsoide hartnäckig zurückgehalten wird u. so in das unl. Endprod. gelangt. Z. B. wird das durch Erwärmen von Phenol mit 40%ig. CH_2O u. Na_2CO_3 unter Rückfluß erhaltene harzartige Kondensationsprod. bis zur Dickflüssigkeit mit h. W. gewaschen u. dann drei- bis viermal mit wss. 4%ig. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ -Lsg. von 25—30° je 5 Minuten ausgeschüttelt. Die nun wässrige, dünnfl. M. wird nochmals mit W. gewaschen u. im Vakuum nach Zusatz von 1% NH_3 entwässert u. dann gehärtet. Das je nach der Härtungstemp. farblose bis gelbe, durchsichtige Endprod. ist infolge der Abwesenheit von freiem Phenol im Vergleich zum Verhältnis zur geringen Menge des Katalysators (Na_2CO_3) sehr hart, unl. in Säuren, Alkalien, lichtbeständig u. läßt sich gut mechan. bearbeiten. (D. R. P. 423 Kl. 12q vom 10/5. 1922, ausg. 18/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER

Harry Wood, South Fork, Pa., V. St. A., *Bindemittel*, insbesondere für Gipswände u. dgl., welches aus Leim (12%), W. (38%), Seife (23%), Leinöl (6%),

tin (5%), Weinessig (3%), Bleiweiß (7%) u. einem Sikkativ (6%) zusammen-
setzt ist. (A. P. 1576 394 vom 6/8. 1925, ausg. 9/3. 1926.) OELKER.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

Herman A. Bruson und **Hermann Staudinger**, *Cyclopentadienkautschuk*. Ein *cyclisches synthetisches Polymerisationsprodukt*. Zu einer 25%ig. Lsg. von *lopentadien* in Chlf. gibt man bei 0° eine 15%ig. Lsg. von SnCl₄ in Chlf. Die . färbt sich über Gelb tieforange u. wird unter Entw. von Wärme viscos. Nach inuten zugeben von überschüssigem absol. A., wodurch eine weiße, kautschuk-
liche M. ausfällt, welche durch Lsg. in Bzl. u. abermalige Fällung durch A. ge-
igt werden kann. Das Prod. ist l. in den üblichen Kautschuklösungsmitteln, unl.
Aceton, Ä. u. A. Bei 50° im hohen Vakuum getrocknet, bildet sie eine schwam-
e, bröcklige, pulverisierbare weiße M. der empirischen Zus. (C₅H₆)_x. Ihr Mol.-Gew.
nimmt in Bzl., liegt zwischen 1260 u. 6670, entsprechend den Formeln (C₅H₆)₂₀
C₅H₆)₁₀₀. Oberhalb 160° beginnt sie unter Ausstoßen gelblicher Dämpfe zu ver-
len, oberhalb 220° Zers. in gasförmige Prodd. Die Gase enthalten ungesätt. KW-
fe, Acetylenderivv. sind nicht vorhanden. Beim Stehen an der Luft nimmt die
b. O₂ auf u. wird unl. unter B. der Verb. (C₅H₆O)_x. Der reine Cyclopentadien-
tschuk ist ungesätt. u. enthält je C₅H₆-Gruppe eine Doppelbindung. Die Ähn-
keit mit echtem Kautschuk ergibt der Vergleich der Formeln:



Der neue Kautschuk kann mit Chlorschwefel in Chlf. vulkanisiert werden, liefert Ozonid, ein Nitrosit u. gibt mit HCl- oder HBr-Gas in Chlf.-Lsg. eine prächtig ue, später tiefviolette Farbrk. Empfindlichkeit 1 mg in 10 ccm Chlf. Zusatz 1 W. oder A. läßt die Farbe in schmutziggrün umschlagen.

Der Mechanismus der Polymerisation ist so zu denken, daß auf Zusatz von SnCl₄ dem KW-stoffe zunächst ein unbeständiges Additionsprod. entsteht, welches Zusatz von A. in das Polymerisationsprod. u. SnCl₄ zerfällt. Es wurden eine ze Reihe von Salzen auf ihre katalyt. Eigenschaften erprobt. Als sehr brauchbar riesen sich HgCl₂, BCl₃, AlJ₃, SiF₄, SiCl₄, SiBr₄, BiCl₃, FeCl₃, FeBr₃, organ. Säure-
ide waren unwirksam. Außer Cyclopentadien ließen sich nach obiger Methode
tol, Styrol u. Phenylbutadien zu hochmolekularen Verb. polymerisieren, weiße
orphe Pulver unl. in A. Isopren u. Butadien lieferten hochmolekulare KW-stoffe,
schieden von denen durch Erhitzen oder durch die Na-Methode. — Cyclopentadien-
tschuk eignet sich vor allem zur Lackfabrikation. (Ind. and Engin. Chem. 18.
—83.) GRIMME.

C. J. Enklaar, *Über eine einfache chemische Analyse von Kautschuk*. Vf. unter-
ht 2 Sorten Kautschuk aus Java, crêpe u. sheet. Bei der trockenen Dest. erhält
aus der ersten Sorte bis zu 3% Isopren, aus der zweiten im wesentlichen höher sd.
odd. Vf. meint, daß sich durch Best. der Dispersion diese KW-stoffe erkennen
sen u. damit auch die Kautschuksorten, aus denen die KW-stoffe entstehen. (Chem.
ekblad 23. 209—210.) EVERS.

R. Riehl, *Ein einfaches und praktisches Räucherhaus für Sheet*. (Vgl. S. 1301.)
schreibung u. Zeichnungen. (Archief Rubbertcultuur Nederland-Indie 10. 109
118. Buitenzorg.) GROSZFELD.

S. E. Sheppard und **L. W. Eberlin**, *Die Erzeugung von Kautschukniederschlägen auf galvanischem Wege*. Kurze Beschreibung eines Verf. zur Erzeugung galvan. Kautschuküberzüge auf verschiedenen Gegenständen. Die im natürlichen Milchsafft in einer künstlichen Aufschwemmung von Kautschuk in W. befindlichen Kautschukpartikel sind negativ geladen u. wandern bei der Kataphorese zur Anode, auf der sie homogene Schichten von beträchtlicher Dicke bilden. Man kann so zusammenhängende Überzüge auf Blechen, Drähten u. Geweben erzielen u. durch gleichzeitige Beigabe von S, S-Verbb. u. anderen Stoffen eine Vulkanisierung der gebildeten Kautschukschichten bewirken. Als Anodenmetalle eignet sich Cu nicht, hingegen Pb, Cd, Zn, Sn, S u. unter bestimmten Bedingungen auch Fe u. Stahl. Mit Spannungen von etwa 10 u. Stromdichten von 15,4 Amp./qdm lassen sich Kautschukschichten von 0,25—3,81 mm Dicke erzielen. Auch auf Nichtmetallen, die mit Elektrolytsgg. durchtränkt sind, lassen sich die Niederschläge erzeugen. (Umschau **30**. 254—56.) **FRANKENBURG**

Francis B. Leech, *Organische Kautschukbeschleuniger*. Aufzählung aller organ. Vulkanisationsbeschleuniger von 1874—1925. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 317.) **EVERETT**

G. S. Whitby und **H. E. Simmons**, *Vulkanisationsbeschleuniger*. I. Zum Ref. S. 511 ist nachzutragen, daß die Arbeit eine Erweiterung früherer Forschungen (WHITBY, Ind. and Engin. Chem. **15**. 1005; C. **1924**. I. 2828) ist über die Frage, wie weit die Konst. der Ultrabeschleuniger der allgemeinen Formel $R_2N \cdot CS_2$ abgewandelt werden kann, u. sich hauptsächlich mit dem *pentamethylenedithiocarbaminsauren Piperidin* beschäftigt. — An dem Beschleuniger *Di- α -thionaphthyl disulfid* wird die Erscheinung der „vorübergehenden“ Beschleunigung gezeigt (Kurven im Original), die darin besteht, daß nach einer bestimmten Erhitzungsdauer der Beschleuniger seine Wirksamkeit verliert, so daß die Werte für Dehnung u. Zugfestigkeit nicht mehr zunehmen. (Ind. and Engin. Chem. **17**. 931—34. 1925. Mc Gill Univ. Montreal, Canada, Univ. of Akron, Ohio.) **ACKERMANN**

R. P. Dinsmore und **A. O. Zimmerman**, *Die Wirkung von Beschleunigern auf die Vulkanisation und Qualität von verschiedenen Gummisorten*. Die Beziehungen zwischen Vulkanisation u. Qualität von Gummimischungen werden durch verschiedene Beschleuniger nicht sehr beeinflusst. Variiert man die anderen Zusätze wie S u. C, ändert man die Vulkanisation, so sind die Differenzen größer als diejenigen, die durch verschiedene Beschleuniger hervorgebracht werden. Vf. gibt eine neue Qualitätsindexkurve an, die besser die Qualität u. Eigenschaften von Vulkanisaten angibt als das Zähigkeitsprod. (tensile-product). (Ind. and Engin. Chem. **18**. 144—57.) **ACKERMANN**

A. van Rossem und **H. van der Meijden**, *Untersuchungen über die physikalischen Eigenschaften von Kautschuk*. I. Einfluß hoher Temperatur auf die Ziehkurve von vulkanisiertem Kautschuk. (Journ. Soc. Chem. Ind. **45**. T 67—72. Delft, Techn. Hochschule. — C. **1926**. I. 2977.) **GROSZFELD**

C. R. Boggs und **J. T. Blake**, *Die Adsorption von Wasser durch Kautschuk*. I. Adsorption von W. durch Kautschuk ist bedingt durch den Proteingehalt. Unterschiede in der Zus. der Mischungen sind von geringem Einfluß. Alle Faktoren, die eine Verminderung des Proteingehalts bei der Koagulation von Latex bewirken, vermindern die W.-Aufnahmefähigkeit des Kautschuks. Daher muß der künstliche Kautschuk deutlich weniger W. aufnehmen als der natürliche. Die Aufnahme von W. durch Kautschuk ist der Quellung in organ. Lösungsmitt. ähnlich. Das W. wird von der Oberfläche aufgenommen u. diffundiert dann allmählich ins Innere. Mathematisch läßt sich die Adsorption nicht berechnen. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 224—232.) **HARRIS**

W. E. Glancy, **D. D. Wright** und **K. H. Oon**, *Betrag an gebundenem Schwefel in Hartgummi*. Vf. untersuchen den Einfluß von verschiedenen Beschleunigern auf das Festigkeitsprod. u. den gebundenen S. Sie finden, daß eine starke Änderung der Eigenschaften des Kautschuks eintritt, sobald für jede Gruppe $C_{10}H_{16}$ ein Atom

nden ist. Der Beschleuniger beschleunigt die Rk. zwischen S u. Kautschuk, ert aber an den physikal. Eigenschaften nur wenig. Der Einfluß verschiedener chleuniger ist verschieden. Das Vol. des Endprod. ist kleiner als das Vol. der Kom- enten. (Ind. and Engin. Chem. 18. 73—75.) EVERS.

Fisk Rubber Co., Chicopee Falls, Mass., übert. von: **Everett W. Fuller**, Spring- l, Mass., *Konservierung von Kautschuk*. Man setzt geringe Mengen eines Alkali- Erdalkalisalzes des α -Nitroso- β -naphthols zu dem zu vulkanisierenden Kautschuk ulkanisiert das Gemisch. (A. P. 1 573 928 vom 27/4. 1925, ausg. 23/2. 1926.) KAU.

The Norwalk Tire and Rubber Company, übert. von: **William Fraser Russel**, walk, Connecticut, V. St. A., *Vulkanisieren von Kautschuk*. (Can. P. 244 612 vom 1. 1923, ausg. 18/11. 1924. — C. 1923. IV. 607.) FRANZ.

I. D. Eastman, Indianapolis, Ind., übert. von: **William H. Buschell**, *Reparieren Kautschukartikeln*. Auf die zu reparierende Stelle des Kautschukkörpers bringt eine chem. Verb. (Terpentin u. S u. dgl.) auf, die den Kautschuk zu erweichen u. vulkanisieren vermag, erhitzt u. preßt den Gegenstand. (A. P. 1 573 039 vom 21/11. 4, ausg. 16/2. 1926.) KAUSCH.

The Vultex Limited, St. Helier, Jersey, Channel Islands, übert. von: **Philip idrowitz**, London, *Kautschukmassen*. (Can. P. 248 915 vom 21/3. 1923, ausg. 1. 1925. — C. 1924. I. 2210.) FRANZ.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

Heinz Pütter, *Reinigung und Desinfektion in der Zuckerfabrik*. Vf. empfiehlt, den Zuckerfabriken auf peinlichste Sauberkeit u. einwandfreie Desinfektion zu en u. hierbei nicht zu sparen, da sich die Ausgaben dafür bei sonst richtiger Arbeits- se durch Verminderung der Zuckerverluste bezahlt machen. (Zentralblatt f. ukerind. 34. 276—78. Güstrow.) RÜHLE.

A. Linsbauer und J. Fißer, *Über die Entfärbung des Dick- und Mittelsaftes mit boraffin, Superior-Norit und Supranorit*. (Vgl. S. 1062.) Die Bedeutung der akt. hlen als Spodiumersatz in den Zuckerraffinerien zur Entfärbung der Kläre ist estritten, fraglich ist nur noch die beste Art ihrer Verwendung. Deshalb haben h Vf. zur Anstellung der vorgenannten Verss. entschlossen, die nach Ausführung Ergebnissen eingehend beschrieben werden. Danach folgt, daß die akt. Kohlen die Herst. von Sandzucker aus Dicksaft von geringer Bedeutung sind, da die Ent- bung u. die Erhöhung der Saftreinheit nur geringfügig sind; der einzige Wert dieser hlen liegt hier nur in der mechan. Filtration. Bei der Zuckerraffination haben akt. Kohlen dagegen eine große Bedeutung, da sie die Kosten der Spodiumstation vermindern vermögen; es empfiehlt sich die Verb. der mechan. Filtration über t. Kohle mit den Spodiumfiltern als zweckmäßig u. zuverlässig im Hinblick auf e Beschaffenheit der Weißware. (Listy Cukrovarnické 43. 399; Ztschr. f. Zucker- l. d. čechoslovak. Rep. 50. 225—32. 233—39. 241—47. 249—56.) RÜHLE.

Harold C. Weber und Robert L. Hershey, *Praktische Anwendungen der Lewis- en Filtrationsgleichung*. Prakt. Verss. ergaben, daß die Lewissche Filtrations- ichtung sich mit Vorteil zur Best. der Wirksamkeit der Filterapp. in der Zucker- rikation verwenden läßt. (Ind. and Engin. Chem. 18. 341—44. Cambridge ass.) GRIMME.

K. Schiebl, *Neuartige Verdampfanlagen*. Betriebstechn. Erörterung über die upassung der Druckverdampfung an die schwankende Brüdenabnahme, unter Um- nden durch Zuschalten eines Nachverdampfers bei gemischten Betrieben, wo also e Brüdendämpfe der Verdampfung auch die Raffinerie zu versorgen haben. (Dtsch. ukerind. 51. 383—84. Magdeburg.) RÜHLE.

A. Herzfeld, *Die Prüfung des elektrischen Kochverfahrens nach Gräntzdörffler der Zuckerfabrik Klützwow durch das Institut für Zuckerindustrie.* Die Ausgestaltung der Prüfung u. die Ergebnisse werden eingehend besprochen. Danach tritt bei dem prüften Verf. eine Verkürzung der Kochdauer, eine Ersparnis an Kochdampf sowie eine Erhöhung der Ausbeute in prakt. nennenswertem Umfange nicht ein; dagegen war die Ausbildung des Kornes nach Gleichmäßigkeit u. Form bei dem geprüften mit u. ohne Elektrizität wesentlich besser als beim gewöhnlichen Verf. In der Gesamtheit stellt das Gräntzdörfflersche Kombinationsverf. einen techn. Fortschritt dar. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 135—52. Dtsch. Zuckerind. 51. 289—95.)

F. Stolle, *Weißzuckerarbeit.* Allgemeine Betrachtung über techn. u. Handfragen hierzu. (Dtsch. Zuckerind. 51. 408—09.) RÜHL

Shuichiro Ochi, *Die Verwendung von Chlor beim Raffinieren von Zucker.* wird vorgeschlagen, zum Raffinieren von Rohrzucker Cl zu verwenden in Verbindung mit der Behandlung durch aktivierte Holzkohle. Der Koeffizient der Reaktionsgeschwindigkeit der Inversion des Zuckers ist zu Beginn der Rk. nahezu gleich dem Koeffizienten für HCl von halber Konz.; er nimmt mit dem Fortschreiten der Rk. schnell zu u. nähert sich dem Koeffizienten für HCl gleicher Konz. Eine wahrnehmbare Inversion tritt nicht ein, wenn die Chlorierung innerhalb $\frac{1}{2}$ Stde. beendet ist u. das verwendete Cl-Wasser nicht stärker als 0,02-n. ist. Cl bewirkt Fällung der im Saft aufgeschwemmten Stoffe bei einem pH-Werte von 3,5 bis 4,0 des chlorierten Zuckerrohrsaftes; gleichzeitig werden Gummis u. Pektine ausgeschieden. Die bleichende Wrkg. des Cl-Sirup von Rohrzucker beträgt 80—90% der ursprünglichen Farbtiefe. Der Sirup enthält auch nach dem Neutralisieren freies Cl, wird alkal. u. färbt sich beim Eindampfen wieder dunkel. Verwendet man dagegen nach dem Chlorieren aktivierte Holzkohle (bis 2% des Rohzuckers), so spart man nicht nur Cl, sondern erreicht auch vollständige Bleichen u. völlige Neutralisation. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 10 Seiten. Sep.) RÜHL

J. Kwantes, *Rübenzuckerherstellung. Neuzeitliche technische Verfahren.* Zusammenfassende kurze Darst. der Gewinnung des Zuckers aus Rüben. (Chem. Tr. Journ. 78. 463—65.) RÜHL

L. J. Lasalle und J. J. Munson, *Herstellung von Sirup aus Zuckerrohr.* Vff. sprechen an Hand von Skizzen die hierzu gebrauchte maschinelle Einrichtung der Herst. von Zuckerrohrsirup im großen, die Arbeitsweise u. die Gesteungskosten (Sugar 28. 63—64. 114—15.) RÜHL

Th. Sabalitschka und E. Böhm, *Über die Konservierung von Zuckersäften.* Vff. finden, daß Zuckersäfte u. pharmazeut. Sirupe durch Zusatz von 0,05% Thymol oder Nipagin, dem *p*-Oxybenzoesäuremethylester (Nährmittelfabrik I. PENNER, Berlin) gegen Schimmelbefall während einer Versuchsdauer von ca. 200 Tagen geschützt wird, während die anderen gebräuchlichen Konservierungsmittel erst in 2—3-mal stärkerer Konz. dieselbe Wrkg. ausüben. Da Thymol wegen seines Geruchs u. Geschmacks nicht für Nahrungsmittel in Frage kommt, empfehlen Vff. das Nipagin als geschmacklosen unschädlichen Zusatz. (Pharm. Ztg. 71. 496—98.) ROJAHN

H. A. Schlosser, *Feststellung der Verfärbung im Ersterzeugnisverkocher bis zum Sirupzuzug.* Es werden Verss. nach Anstellung u. Ergebnissen beschrieben zur Feststellung der Verfärbung des saturierten Dicksaftes bis zu seiner Umwandlung in Füllmasse u. zur Feststellung der Verfärbung in der Verdampfstation. Es wurde gefunden, daß sich die Farbe des Dünnsaftes zu der des unsaturierten Dicksaftes wie 1,00 zu 1,11 verhielt; die entsprechenden Polarisationen verhielten sich wie 1,00 zu 3,11. Im Verkocher war das Verhältnis der Dicksaft-Farbkonz. zu der der Füllmasse vom Sirupzuzug wie 1,00 zu 1,34 u. das der entsprechenden Polarisationen wie 1,00 zu 1,42. Es erfolgt also das Verdampfen unter bedeutend geringerer Farbzunahme im Vergleich zum Fortschreiten der Einengung als das Verkochen. (Zentralblatt Zuckerind. 34. 404—07. Ottmachau.) RÜHL

Vl. Staněk und J. Vondrák, *Eine schnelle Methode zur Bestimmung der zerrigen Polarisation bei Rübenanalysen*. Da heute die in den Betrieb eingeführte ermene aus dem Zuckergehalt der Rüben oder der nicht ausgelauten Schnittechnet wird, ist es vorteilhaft, die zerstörbare rechtsdrehende Polarisation imtionssaft zu bestimmen. Da dafür noch kein Verf. — ausgenommen das schwie-Clergetverf. — vorhanden ist, haben Vff. ein solches ausgearbeitet, das den bei CaO-Scheidung verschwindenden Polarisationsanteil aufs genaueste bestimmen. Danach wird der nach dem Institutsverf. (4-n. Breimenge + 308 ccm verd. Pb-Acetat) oder nach dem Herlesschen Verf. (4-n. Breimenge + 402,4 ccm) beete Digestionssaft durch Na-Oxalat (2—3 g für etwa 200 ccm Saft) vom Pb befreittriert. Vom Filtrate mißt man genau 75—80 ccm ab in einen 100 ccm-Kolben, 5 ccm 20%ig. Lsg. von NaOH zu, mischt u. erhitzt 15 Minuten im sd. Wasser. Nach dem Abkühlen gibt man einen Tropfen Phenolphthaleinslg. zu, macht 50%ig. Essigsäure eben schwach sauer, wobei sich die Farbe aufhellt u. der Nd. füllt zur Marke auf, filtriert wenn nötig u. polarisiert. Bei veränderten Rüben (angefroren, angefault) ist es nötig, 10 bis 20 mg Na-Hydrosulfit (Blankit) zurhellung der Färbung zuzugeben. In einem zweiten 100 ccm-Kolben mißt man dieMenge entbleiten Saftes ab, gibt dazu 10 ccm einer Lsg. von Na-Acetat (500 ccm ig. NaOH neutralisiert man mit Essigsäure, füllt zu 1000 ccm auf u. filtriertnötig), erwärmt in gleicher Weise, wie oben angegeben, füllt auf u. polarisiert. vorstehend genannte Verf. ist eingehend auf seine Brauchbarkeit geprüft worden. durch Einw. von NaOH in der Wärme ermittelten Abnahmen der Polarisationa bei 0,05 bis 0,35%, d. h. es ergaben sich für Rübe von 20,0 Digestion Unterde von 0,01—0,07%. Es ergab sich, daß durch das $\frac{1}{4}$ -std. Erwärmen bei etwa die Saccharose nicht angegriffen wird, sondern daß nur die Polarisation der rechtsenden, bei der techn. Scheidung zerstörbaren Nichtzuckerstoffe zerstört wird. wurde ferner nachgewiesen, daß diese Stoffe im Dicksaft u. im Rohzucker nichtvorkommen u. daß im Rübenkopfe eine größere Menge rechtsdrehender Nichter als in der eigentliche Wurzel vorhanden ist, was wahrscheinlich mit dem N-Gezusammenhängt. Die Menge der zerstörbaren Nichtzuckerstoffe wurde in einern Zahl von Rübenmustern bestimmt. u. dabei gefunden, daß diese Menge nichtine bestimmte Sorte gebunden ist, sondern eher durch Vegetationsverhältnissegt ist. (Listy Cukrovarnické 44. 1; Ztschr. f. Zuckerind. d. čechoslovak. Rep. 257—66.)

RÜHLE.

Ferdinand Kryž, *Über die Härteschwankungen der Saturationsschlämme*. Vf. ein zur Best. der Härte von Zuckerrüben ausgearbeitetes Verf. (Ztschr. f. Zuckerl. čechoslovak. Rep. 49. 93; C. 1925. I. 776) mit den erforderlichen Abänderungen Saturationsschlämme angewandt u. gibt die erhaltenen Werte an. (Ztschr. f. erind. d. čechoslovak. Rep. 50. 266—68.)

RÜHLE.

American Electro-Osmosis Corp., New York, übert. von: **Kuno Wolf**, Berlin, **Egon Langstein**, Bad Oldesloe b. Hamburg, *Reinigen von Zuckersäften durch osmose*. Die Säfte werden der Einw. eines elektr. Stromes ausgesetzt, wobei fl. von den Elektroden durch halbdurchlässige Diaphragmen getrennt wird, von n das anod. aus mit Chinon imprägniertem Leder, das kathod. aus Segeltuchht. (A. P. 1 577 669 vom 29/3. 1924, ausg. 23/3. 1926.)

OELKER.

Colin Graham Munro, Home Hill State Experimental Farm, Queensland, *italien, Krystallisation von Zucker*. Man zieht eine bestimmte Menge eines konz. ersaftes in das Vakuum ein u. kocht, bis eine Probe, gegen das Licht gehalten, e Krystalle erkennen läßt. Diese kleinen Krystalle werden dann durch regeliges Einziehen von konz. Saft zum Wachsen gebracht, bis sie so groß u. zahl sind, daß die Füllmasse 8—10% W. enthält. Die Vakuumpfanne wird dann

entleert, die Krystallmasse von dem Sirup getrennt, letzterer in die Vakuumpf zurückgeführt u. dort mit einem Saft von höherer Reinheit verkocht. (Aus 19812 vom 29/9. 1924, ausg. 22/10. 1925.)

Rafael Vachier, Batan Rouge, Louisiana, V. St. A., *Erhöhung der Zausbeute bei der Rohrzuckerfabrikation*. Der bei der Reinigung der Rohrzucker erhaltene, schon teilweise entzuckerte Schlamm wird mit frischem W. u. Ka. handelt u. die dabei erhaltene zuckerhaltige Flüssigkeit in die Zuckerrohr zurückgeführt. (A. P. 1578 220 vom 12/5. 1925, ausg. 23/3. 1926.)

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

James William McBain und **William Joseph Elford**, *Die Gleichgewichte dem Prozeß des Seifensiedens zugrunde liegen. Das System Kaliumoleat—Kalchlorid—Wasser*. (Vgl. MC BAIN u. LANGDON, Journ. Chem. Soc. London 127. C. 1925. II. 363.) Vff. bestimmen die Existenzgebiete der verschiedenen Formen der Seifenlsg. in den Systemen *K-Oleat—W.* u. *K-Oleat-KCl-W.* bis zu 300° bis 210°. Das Auftreten der einzelnen Formen wird durch makroskop. u. mkr. Beobachtung im polarisierten Licht verfolgt; der Übergang isotroper in anisotrope gibt sich ferner durch plötzliche Änderung der Viskosität zu erkennen. Übersättigungserscheinungen in bezug auf die B. der anisotropen Fll. beim Abkühlen der isotropen Lsgg. wurden nie gefunden, dagegen ist Übersättigung in bezug auf die Abscheidung der Krystallblättchen oder des krystallinen Gerinnsels von *K-Oleat* häufig. — Vers. wss. Lsgg. von *K-Oleat* sind homogen u. isotrop u. können oberhalb 300° ohne Verderb der Homogenität u. Isotropie bis auf 100% konzentriert werden; bei Temp. unter 300° ist *K-Oleat* mit W. nicht vollständig mischbar. Bei 20° ist die obere Grenze der Konz. bei der isotrope Fll. entstehen, 0,70-n. Gew. (0,70 g-Mol in 1000 g W.), bei höherer Konz. scheidet sich eine obere konzentriertere, von den Vff. als „Mittelseife“ (middle soap) bezeichnete Schicht aus. Mittelseife ist eine homogene, kon. anisotrope Fll., die isotropen Lsgg. ein kolloider Elektrolyt u. von diesen in bezug auf die elektr. Leitfähigkeit wenig verschieden; sie zeigt bis zu Konz. von 1,25-n. Gew. im Ultramikroskop keine Struktur. Oberhalb einer gewissen Konz. erscheint eine Phase von noch konzentrierterer Seifenlsg., die Vff. „reine“ Seife (neat soap) nennen, ebenfalls eine homogene anisotrope, plast. Fll., aber heller als Mittelseife u. etwas trüb. Die Existenzgebiete homogener Mittelseife u. „reiner“ Seife liegen etwa zwischen 0,9—3,4 bzw. 7,5—10-n. Gew. *K-Oleat*, ihre heterogene Mischung ist fest u. trüb mit einem Maximum Trübung bei 5—6-n. Gew. Bei Temp. zwischen 240 u. 300° kann „reine“ Seife bis zu 100% fl. *K-Oleat* konzentriert werden, bei tieferen Temp. scheidet sich bei bestimmten Konz. schwach hydrat. krystallines *K-Oleat*, gewöhnlich in Form dünner hexagonaler Schuppen, ab. Bei etwa 180° zeigt sich die Eigentümlichkeit, daß isotrope Lsgg. sowohl oberhalb, als unterhalb des Konzentrationsbereiches der Mittelseife existieren. — In den klaren Fll. bilden sich häufig sternförmige Krystalle, die wahrscheinlich aus durch Hydrolyse gebildeter saurer Seife bestehen.

Zusatz von *KCl* oder *KCNS* zu wss. *K-Oleat*lsgg. erhöht zunächst die Viskosität, dann erstarren in einem gewissen Bereich der Salzkonz. (ca. 0,4—0,8-n. Gew.) die Lsgg. zu klaren elast. Gallerten, danach entsteht wieder eine homogene Fll., schließlich trennt sich bei einer von der *K-Oleat*konz. abhängigen Salzkonz. die Lsg. in 2 Schichten. In den verdünnteren Lsgg. (unterhalb 0,6-n. Gew. *Oleat*) sind beide Schichten isotrop, die obere „schwärzliche“ (nigre) enthält die Hauptmenge des *K-Oleats*, die untere „Lauge“ wenig Seife u. etwas höhere Salzkonz. als die obere Schicht. In konzentrierteren Seifenlsgg. (ca. 0,75—3-n. Gew. *K-Oleat*) sind die beiden Phasen „schwärzliche“ Fll.“ u. „reine“ Seife. Ggw. von *KCl* erhöht demnach die *K-Oleat*konz., bis zu der Konz. tropen Lsgg. möglich sind, beträchtlich (bis 3-n. Gew. *K-Oleat*). Das Gleichgewichtsdiagramm für *K-Oleat-KCl-W.* bei 20° ist demjenigen von *Na-Palmitat* sehr ähnlich.

feld der Mittelseife wiegt aber mehr vor, u. die Salzkonz., bei der die Lsgg. in-
gen werden, ist merklich größer. In einem engen Bereich scheinen auch hier
sen „reine“ Seife, schwärzliche Fl. u. Lauge koexistieren zu können. (Journ.
i. Soc. London 1926. 421—38. Bristol, Univ.) KRÜGER.

J. Marcusson, *Die Polymerisation fetter Öle*. 5. Mitt. (4. vgl. S. 264.) Nachdem
polymerisation fetter Öle durch Erhitzen nachgewiesen war, wird nun Polymeri-
auch beim Auftrocknen bei gewöhnlicher Temp. festgestellt. Ein Leinölfilm
ich durch sd. Aceton in 45% unl. feste u. 55% l. dickfl. Anteile zerlegen, die
durch Best. des Mol.-Gew. als intramolekular polymerisiert, teilweise unter
gerung von O, erweislich waren. Da auch freie Linolensäure nach zweiwöchiger
von Luft u. Licht Mol.-Gew. 766 aufwies, so ist solches nicht durch chem.
zien sekundär bedingt. Ähnlich wie bei *Leinöl* liegen die Verhältnisse bei
öl. Ein *Holzölfilm* bestand aus 83% acetonunl. Gel u. 17% Löslichem. Nach
des Gels in sd. Furfurol, Ausfällen aus der Lsg. mit W. u. Ausäthern erwies es sich
monomolekular. — Entgegen EIBNER (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Öle,
se, Harze 31. 77; C. 1924. II. 406) wird nachgewiesen, daß im Anfang der
trocknung β -*Eläostearin* auftritt, aber schon nach wenigen Tagen verschwindet.
unklen trocknet Holzöl nicht. Es tritt also beim Trocknen zunächst Licht-
risation, dann Polymerisation ein. Geringe Mengen von J oder S veranlassen
on β -*Eläostearinsäure*, größere Mengen bzgl. höhere Temp. rufen starke Poly-
ation hervor. — Anhangsweise wird ein auf die Polymerisation gegründeter
weis des Holzöles in Ölgemischen mitgeteilt, der schärfer als die bisherigen, ins-
dere der mittels des Brechungsindex, ist: 5 g Öl werden im Porzellantiegel
Erlenmeyer mit 5 cem kalt gesätt. Lsg. von J in Chlf. verrieben. Während alle
en Öle fl. bleiben, erstarrt Holzöl u. Mischungen damit; diese um so rascher,
hr Holzöl vorhanden ist. Bleibt die Mischung über Nacht fl., so wird 1/4 Stde.
im Wasserbad erwärmt u. erkalten gelassen. Noch 15% Holzöl lassen sich
nachweisen. Das Verf. ist in erster Annäherung quantitativ, wenn man das
ionsprod. im Gräfeschen App. mit Chlf. extrahiert, das J mit Thiosulfat entfernt,
et u. wägt. Beleganalysen zeigen Differenzen bis zu 16%. Bei Lackunterss.
das Erwärmen am Rückflußkühler erfolgen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 476
'9. Berlin-Dahlem. Staatl. Materialprüfungsamt.) HELLER.

H. Thomson, *Die Wirkung des Blasens auf die Zusammensetzung gewisser
Öle*. Untersucht wurden *Baumwollsamöl*, *Walöl*, *Spermöl* u. *Haiöl*. Das Blasen
e in größerem Maßstabe von etwa 4 Tonnen bei etwa 115°. Proben des Öles
n in gewissen Zeiten entnommen u. auf D., Viscosität bei 93° u. die üblichen
zahlen usw. geprüft. Bei *Haiöl* zeigte es sich, daß im Vergleiche mit dem unge-
en Öle die Jodzahl u. der Betrag der unverseifbaren Stoffe fiel, daß dagegen VZ.,
leichert-Meißsche u. Polenskesche Zahl, die Refraktion, Viscosität u. a. stiegen,
ohne daß sich in diesen Veränderungen eine Gesetzmäßigkeit mit der Zunahme
eit des Blasens erkennen ließe. Ähnlich dem *Haiöl* verhielten sich auch die
eren geprüften Öle. Die Ergebnisse der Unterss. sind in Tabellen zusammen-
f. (Analyst 51. 177—80.) RÜHLE.

Eibner und Jos. Schwaiger, *Zur Kenntnis der chinesischen Holzöle*. II.
EIBNER MERZ u. MUNZERT, Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Öle, Wachse,
31. 69; C. 1924. II. 406.) Vorwiegend Diskussion der neuesten Arbeiten anderer
en auf dem Gebiet. Eigene Verss. der Vff. bestätigen die Umwandlung von
ostearinsäureglycerid in das β -Glycerid unter Lichteinfluß. Bromierung der
re geschah vorteilhaft in Ä. u. lieferte ein festes Tetrabromid vom F. 114°, das
Entbromung wahrscheinlich α -Linolensäure lieferte. Das fl. bleibende Bromid
dagegen nach Entbromung β -*Eläostearinsäure* in guter Ausbeute. Die Iso-
tion der α -Säure durch Br verläuft also in zwei Richtungen, jedoch immer so,

daß geometr. Isomerie verursacht wird, denn wenn die aus festem Bromid isolierte Säure nicht dest. wurde, so war sie fest u. erwies sich gleichfalls als β -Eläostearinsäure. Bei Trocknung im Dunklen tritt keine Eisblumenbildung ein u. β -Säure konnte nachgewiesen werden, wohl aber α -Säure. Das trübe Auftrocknen ist aber nicht Lichtwrkg. allein zurückzuführen. Es ist eine Funktion der Schichtdicke u. Trockengeschwindigkeit. Je dünner die Schicht, je langsamer das Trocknen, so klarer der Film. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Öle, Wachse, Harze 77—85. München Techn. Hochschule.)

H. P. Trevithick und **M. F. Lauro**, *Sulfuroilivenöl*. Kurze Beschreibung u. Gewinnung. Je nach der Jahreszeit u. dem Zustand des Rohmaterials wechselnde Farbe von Grün bis Braun. Um ihren Einfluß in der Seife rasch kennen zu lernen, verseift man 10 g Öl in einer Abdampfschale mit 8 ccm NaOH 20° Bé in der unter Rühren. Nach einstd. Stehen auf dem Wasserbad ist die Verseifung ständig. Weitere Bemerkungen zur Kennzeichnung des Öles. (Journ. Oil Fat Ind. 3. 77—79. Produce Exchange, New York.)

George S. Jamieson und **Walter F. Baughman**, *Die Haltbarkeit von Baumwollsaatöl*. Laboratoriumsverss. lieferten kein eindeutiges Bild, inwiefern die Haltbarkeit rohen Cottonöles (ausgedrückt durch den Anstieg der SZ.) beim L. durch den „Satz“ beeinflußt wird. Jedoch empfehlen die Vff., das gepreßte Öl vor dem Satz abzuziehen, sobald dieser sich abgesetzt hat. (Journ. Oil Fat Ind. 3. 78—80. Bureau of Chemistry.)

Arthur A. Weir, *Grenzzahlen für reines Bienenwachs*. (Vgl. S. 533.) Sie werden angegeben für D. zu 0,976—0,941, F. 60,5—66,5°, Ablesung des Butterrefraktometers 43,2—45,7, Jodzahl 5,42—17,1, VZ. 87—106, SZ. 16,7—23,6, EZ. 65,9—85,9, Verseifbares 48—53%. (Analyst 51. 181.)

G. Knigge, *Untersuchung einer modernen Feinseife*. Eingehende Beschreibung der Analyse einer Lavendelseife, deren Zus. wie folgt ermittelt wurde: 82,28% Glycerin, 8,17% gebundenes Alkali, also 90,45% Reinseife, ferner 7,50% 0,20% NaCl, 0,50% ZnO, 0,04% freies Alkali. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 195—97. 210—11. Berlin-Lichterfelde.)

—, *Normen für Degras und Lederöle*. Die vom Verband der Degras- u. Lederölfabrikanten aufgestellten Normen bestimmen insbesondere, daß Ha- u. Degras niemals enthalten sein darf. In Lederölen muß ein etwaiger Gehalt an H. Naphthensäuren oder Sulfatharzen stets angegeben sein. Mineralölsatz, Glycerin, flüchtige Bestandteile, Unverseifbares u. Oxyfettsäuren sind zahlenmäßig normiert. Degras darf nicht mehr als 1% Asche enthalten. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 198; Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Öle, Wachse, Harze 33. 72.)

H. Herbst, *Wasserbestimmungsapparat für Öle, Fette, Nahrungsmittel u. dgl.* App. zur Best. nach MARCUSSON. Siedekölbchen mit gewinkelt aufgesetztem Wasserflußkühler, durch Glasschliff verbunden. Am unteren Ende des Kühlers gradu. Verlängerungsstück mit Hahn. Das überflüssige Lösungsmittel fließt in den K. zurück. Herst.: HERMANN FAHRENHOLZ, Glasbläserei, Jena. (Seifensieder 53. 259. Jena.)

Arthur W. Thomas und **Morris Mattikow**, *Eine Methode zur direkten Erkennung von Rapsöl durch Isolierung von Erucasäure*. Vff. bestimmen Rapsöl durch Fällen u. Isolieren der Erucasäure als Mg-Salz. In Vorarbeiten stellen sie die Löslichkeit von Erucasäuren u. ihren Salzen in verschiedenen Lösungsm. besonders des *erucasäure* in einem Gemisch von W. u. A. fest. Die vollständige Fällung des Mg-Salzes ist abhängig von der Zeit des Stehenlassens nach dem Fällen mit Mg-Acetat, von der Menge des in der Lsg. vorhandenen Mg-Acetes u. von der Menge des Wasch-A. — des zu untersuchenden Öles werden mit 50 ccm alkoh. KOH u. 50 ccm 95% alkohol. verseift, mit 25 ccm einer 10%ig. Mg-Acetat enthaltenden 75%ig. alkoh. Lsg. zu-

er Nacht bei 10° aufbewahrt, dann wird abfiltriert, mit 50 ccm 90%ig. A. gegen u. der Rückstand mit 5 Moll. HCl durch 10 Min. Kochen zers. Die nach dem ten erstarrte Fettsäure wird abfiltriert u. mit W. gewaschen. Diese wird dann ccm h. 90%ig. A. gel., über Nacht bei 10° aufbewahrt, die auskristallisierten . Fettsäuren abfiltriert, erst mit 50 ccm 90%ig., dann mit 50 ccm 70%ig. A. chen u. das Filtrat samt den Waschfl. in ein gewogenes Becherglas gegeben. dem Verdampfen der Lsg. wird der Rückstand gewogen, Jodzahl u. Mol.-Gew. mt. Durch Hydrierung nach SKITA zu *Behenolsäure* kann die Best. geprüft n. Vff. haben dann noch Rapsöl in Mischung mit anderen Ölen bestimmt. Bei wart von *Senfsamenöl* versagt die Methode, da dieses auch Erucasäure gibt. 1. Americ. Chem. Soc. 48. 968—81. Columbia, Univ.)

BRAUNS.

I. O. Halvarson, *Beobachtungen über die Messung des p_H von Seifenlösungen*. roden, die mit Pufferlsgg. gut übereinstimmende Werte ergaben, versagten auch neuer Platinierung bei der p_H-Best. einer 5%ig. *Ricinoleatlsg.* Die divergierenden traten auch in den elektrometr. ermittelten Neutralisationskurven auf. Übernmmende Werte wurden erst mit einer gesätt. Seife (5% Na-Pelargonat) erhalten. Meinung des Vfs. sind die ungleichen Ergebnisse auf den Umstand zurückren, daß die Pt-Elektrode auf Ricinoleat wie ein reduzierender Katalysator u. die Oberfläche hierbei eine Rolle spiele. Da 2 Elektroden mit gleicher Obernicht hergestellt werden können, können sie auch nicht gleiche Werte ergeben. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 358—61. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 486 . Minneapolis, Dep. of bacteriol. a. immun. Univ. of Minnesota. Ref. MISLO-ER.)

OPPENHEIMER.

The Allbright-Neill Company, Chicago, übert. von: William Laabs, Milwaukee, nsin, V. St. A., *Ausschmelzen von Fetten und Ölen aus tierischen Geweben*. Man irt das fetthaltige Material unter Dampfdruck u. Rühren einer Erhitzung ine oberhalb 212° F. liegende Temp., wodurch eine Verdampfung eines Teiles n dem Material enthaltenen W. eintritt, die ein Zerreißen des Gewebes u. den itt des Fettes zur Folge hat, während der Feuchtigkeitsgehalt genügend hoch , um in dem Rückstand die Leimsubstanzen zu erhalten, dagegen nicht so hoch, ich Emulsionen bilden können. (A. P. 1578 245 vom 22/6. 1925, ausg. 23/3.)

OELKER.

Harburger Eisen- und Bronzwerke Akt.-Ges., Harburg, Elbe, *Gewinnung len und Fetten aus trockenen, feuchten, feinkörnigen, staubförmigen oder kolloiden d fetthaltigen Produkten*, z. B. aus öl- oder fetthaltigen Entfärbungsmitteln, gek., daß das zu entöhlende Material in einem mit Rührwerk ausgestatteten Druckzunächst der Einw. schwacher ätzender Alkalien bei Temp. von etwa 100° worfen wird, wodurch die Oberflächenspannungen zwischen den Neutralöl- u. rbungsmittelteilchen nahezu aufgehoben werden, und daß hierauf unter Temp.ruckerhöhung der Mischung unter dauerndem Rühren schwache Salzlsgg. zut werden, wobei die Ölteilchen, ohne verseift zu werden, von den Entfärbungsteilchen vollkommen getrennt werden u. sich nach erfolgter Abkühlung in der als Öl- oder Fettschicht an der Oberfläche abscheiden, während die spezif. reren Entfärbungsmittelteilchen evtl. unter Vereinigung zu größeren Komn zu Boden sinken. Die Öle u. Fette werden in unveränderter Form aus der rde o. dgl. wiedergewonnen. (D. R. P. 426 712 Kl. 23a vom 7/7. 1921, ausg. 1926.)

OELKER.

Kleer Chemical Corporation, Chicago, übert. von: Frank E. Vickery, John hl und Summer O. Nolte, Iowa, V. St. A., *Flüssiges Reinigungsmittel*, beid aus 109 Pfund W. u. 2 Unzen eines Gemisches von 19 Teilen Na₃PO₄ u. 1 Teil . (Can. P. 253 529 vom 16/6. 1924, ausg. 8/9. 1925.)

KAUSCH.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

W. Gothan, *Die Begrenzung der Begriffe Steinkohle, Braunkohle und Torf*. Vf. macht den Vorschlag, die Einteilung auf Grund petrograph., chem. u. physikal. Eigenschaften, ohne Berücksichtigung des geolog. Alters vorzunehmen, u. gibt entsprechende Richtlinien. (Braunkohle **24**. 1128—35. Berlin.) BIELEMBERG

Frank Butler Jones und **A. Mowbray Jones**, *Eine Schaumflotation der Koks*. Es werden die Vorteile der Schaumflotation gegenüber der Schwimmaufbereitung geschildert u. die theoret. u. prakt. Grundlagen der Schaumflotation besprochen (Journ. Chem. Metallurg. Mining Soc. South Africa **26**. 125—38. 1925.) BIELEMBERG

K. Deimler, *Zeichnerische Hilfsmittel für den praktischen Betrieb zur übersichtlichen Beantwortung der Hauptfragen in einer Brikettfabrik*. (Braunkohle **24**. 978—Halle a. S.) BIELEMBERG

M. J. Burgess und **R. V. Wheeler**, *Beginn der Zersetzung von Kohle beim Erhitzen*. Es wurde eine Koks-kohle von Lancashire untersucht. Im Vakuum entwichen 200° Gase, im wesentlichen die ersten Glieder der Methanreihe; Vf. nehmen an, daß es sich hierbei um occludierte Gase handelt. Zwischen 270 u. 300° wurden hauptsächlich CO u. CO₂ entwickelt, die Vff. als Prodd. beginnender Zers. ansprechen. Gleichzeitig (bei etwa 280°) gingen Spuren eines rotbraunen Öls über. Diese Temp. betrachten Vff. als Beginn der Zers. dieser Kohle. (Fuel **5**. 65—68. Dep. of Fuel Technology, Sheffield Univ.) BIELEMBERG

G. Weißenberger, *Aufgaben der Wärmewirtschaft in der Schwelerei*. Die Probleme liegen in der Verwertung der Abwärmen der anfallenden Gase, Teer u. Koks, in der Ofenkonstruktion usw. (Sparwirtschaft **1925**. 6 Seiten. Sep.) BIELEMBERG

Wilbert J. Huff, *Der Ursprung von Schwefelkohlenstoff bei der Verkokung von Kohle*. (Vgl. S. 2418.) Orientierende Verss. ergaben, daß sich merkl. Mengen CS₂ aus hoch S-haltiger Kohle bilden, wenn die Verkokung so schnell vorgenommen wurde, daß sich ein dichter, zusammenhängender Koks bildet. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 357—61. Baltimore [Md.].) GRIMME

H. Schmidt, *Eine neue Gewinnungsmöglichkeit von Äthylalkohol*. Vf. berichtet über ein französ. Verf., das in den Koksofengasen enthaltene Äthylen durch Verwandlung in A. nutzbar zu machen. Man läßt H₂SO₄ unter geeigneten Bedingungen bei Ggw. von Katalysatoren auf das durch fraktionierte Abkühlung aus den Koksofengasen gewonnene C₂H₄ wirken u. erhält Äthylschwefelsäure, die man leicht mit NaOH oder NH₃ verseifen kann. (Ledertechn. Rdsch. **17**. 197—98. 1925.) LOEWEN

Clarence A. Seyler, *Die Nomenklatur der Kohlebestandteile*. Vf. legt die Beziehungen klar, die zwischen Anthraxylon u. Attritus einerseits u. Vitrain, Clarain, Durain u. Fusain andererseits bestehen. Anthraxylon ist homogenen botan. Ursprungs aus Stämmen u. Wurzeln, Attritus ist heterogenen botan. Ursprungs aus Pflanzenteilen. Vitrain hat glasartigen Glanz u. conchoidalen Bruch. Clarain zerstreut Licht, hat seidigen Glanz, keinen conchoidalen Bruch. Fusain ist matt u. zerbröcklich. Durain ist matt u. kompakt. Anthraxylon kann Vitrain, Fusain u. Clarain sein, Attritus ist entweder Clarain oder Durain. (Nature **117**. 486. Swansea.) JOSEPHY

Ernst László, *Berginbenzin und Berginöl*. Vf. beschreibt die Verss., die er zwecks Herst. von Berginbenzin u. Berginöl in kontinuierlichem Betrieb durchgeführt hat. Angabe von Analysen- u. Untersuchungsdaten. (Petroleum **22**. 421—24. Budapest.) REINER

F. Schick, *Über die Entwicklung der Kohleveredlung*. (Braunkohle **24**. 1065—Berlin.) BIELEMBERG

Hubert Hermanns, *Der relative Wert von Kohlenoxyd und Wasserstoff als Bestandteil von Generatorgas*. CO ist dem H₂ als Ofenbrennstoff überlegen infolge seines größeren Wärmewertes, der stärkeren Strahlung u. der höheren Temp. der Flamme. Ein G

tor muß daher auf Erzielung des höchst erreichbaren CO-Gehaltes u. des er-
 niedrigsten H₂-Gehaltes im Gase betrieben werden. Der Dampfzusatz soll
 höher sein, als zur Verhinderung der Schlackenbildung erforderlich ist; je mehr
 dem Gebläsewind beigemischt wird, um so niedriger stellt sich die Temp. u.
)-Gehalt, um so höher der CO₂- u. H₂-Gehalt. (Die Wärme 49. 299—301.

SPLITTGERBER.

Gothan, *Die „Siegelackhölzer“ aus der Braunkohle von Volpriehausen bei*
en. Die Hölzer enthalten anscheinend zwei Harz- bzw. Wachsharzen; das
 ölbräunliche in den Harzparenchymzellen u. ein gelbes, das alle Holzzellen
 ; u. dessen Herkunft u. Menge nicht erklärt werden kann. (Braunkohle 24.
 005. Berlin.)

BIELENBERG.

fred Faber, *Die Zusammensetzung von Braunkohlenaschen und ihr Verhalten*
erbetrieb. Es wird eine größere Zahl von Aschenanalysen verschiedener Braun-
 gegeben u. der Einfluß der Zus. der Aschen auf den F. u. das Verh. beim Gaser-
 besprochen. (Braunkohle 24. 1051—55. Leipzig.)

BIELENBERG.

Dolch, *Zur Kenntnis der amerikanischen Lignite.* Vf. hat zwei Muster unter-
 Es handelt sich um Braunkohle wenig ausgesprochenen lignit. Gefüges, die
 ecknung u. Verkokung starken Schwund zeigt, was zu starker Staubentw. bei
 Auswertung führen dürfte. Es handelt sich um Kohlen von höherem Heizwert,
 der deutschen Weichbraunkohlen ist; der Inkohlungsprozeß ist weiter fort-
 ten als bei letzteren. Die Aussichten für eine wirtschaftliche Verwertung
 in der Brikettierung liegen u. eventuell in der Urverkokung; der hier anfallende
 ks dürfte jedoch wesentlich als Brennstaub geeignet sein. (Braunkohle 24.
 t. Wien, Klosterneuburg.)

BIELENBERG.

Deimler, *Verbrauch an Wärme, an Dampf und an Kesselkohlen, sowie Fest-*
der Kosten für die Trocknung der Braunkohle. (Braunkohle 24. 933—41.
 S.)

BIELENBERG.

rt Loebinger, *Die Auswertung der Braunkohle insbesondere durch das Schwel-*
n der Kohlenveredlung-G. m. b. H. Das Verf. ist dadurch gekennzeichnet, daß
 le in einem drehbaren, vertikalen Mantel mit Schneckengängen herabrieselt,
 äußere Wand sich gegen die innere bewegt. Die Beheizung erfolgt von innen
 Gasfeuerung; dabei wird ein Strahlkörper beheizt. Die Erhitzung des Schwel-
 folgt durch die strahlende Wärme dieses Körpers u. durch die zwischen innerer
 and u. Strahlkörper abziehenden Verbrennungsgase. Vorteile des Verf. sind:
 ung hoher Ausbeuten an staub- u. eventuell wasserfreien Teeres, großer Durch-
 ringe Platzbeanspruchung. (Braunkohle 24. 993—1002. Berlin.)

BIELENB.

Vigener, *Braunkohlenbrikettfabrik und Überschußenergie.* (Die Wärme 49.
 Halle a. S.)

BIELENBERG.

Seidenschnur, *Verwertung bzw. Verwertungsmöglichkeiten von Braunkohlen-*
esprechung der Gewinnung u. Eigenschaften des Braunkohlenkoks, der Ver-
gsmöglichkeiten für Hausbrand, Industriefeuerung, der Verwendung von Braun-
albkoks in Brikettform, der Eignung von Braunkohlenkoks für Staubfeuerungen,
Generatorbetrieb, als Motorkoks; es wird ferner hingewiesen auf die Ver-
gsmöglichkeit an Stelle akt. Kohle, bei der Ölgewinnung durch Hydrierung
eduktionsmittel bei metallurg. Prozessen. (Braunkohle 24. 1033—50. Frei-
 sa.)

BIELENBERG.

ygode, *Fortschritte zur Braunkohlenverwertung.* Zusammenfassende Betracht-
 über die Entw. der Staubfeuerung, Schwelanlagen u. Generatoren u. der Ver-
 g der Kohle. (Die Wärme 49. 141—44. 170—72. Berlin.)

BIELENBERG.

Deimler, *Änderung der spezifischen Wärme eines feuchten Körpers bei ver-*
dem Wassergehalt unter besonderer Berücksichtigung der Braunkohle. Die spezif.
 der Kohle bei verschiedenem W.-Gehalt wird formelmäßig abgeleitet; es wird

weiter eine graph. Darst. gegeben, die die Ablesung der spezif. Wärme für Kohle verschiedenen W.-Gehalts gestattet. (Braunkohle **24**. 1125—28. Halle a. S.) BIELENBERG

R. R. Sayers, N. A. C. Smith etc., *Giftige Gase aus stark schwefelhaltigem Petroleum*. In den Gasen des mexikan. Petroleums kommen beträchtliche Mengen H_2S vor, welche durch ihre dauernde Einw. sehr giftig wirken. Es wurden Methoden ausgearbeitet, um das Entweichen aus den App. zu verhindern. Arsine, Stibine, Phosgen, Blausäure u. andere giftige Gase wurden nicht gefunden. (Journ. Franklin Inst. **200**. 262—63. Bureau of Mines.) ENSZLIN

George W. H. Reid, *Die Anwendung des Rohöles als Kühlflüssigkeit*. Beschreibung der verschiedenen techn. Anwendungen. (Oil Journ. Gas **24**. Nr. 45. 154—56.) REINECKE

H. Herbst, *Über die Adsorption von Asphalt aus Mineralölen oder deren Rückständen durch hydrosilicathaltige Bleicherden*. Während die Reinigung der Mineralöle durch d. h. die Entfernung relativ geringer Mengen färbender Bestandteile ein einfacher Prozeß ist, ist das Filtrieren der Asphaltbestandteile, die in großen Mengen anwesend sind (3—20%) bedeutend schwieriger. Es wird ein Filtrationsverf. beschrieben, dem eine hydrosilicathaltige Bleicherde *Silit* angewandt wurde. Mitteilung von Analysendaten. (Petroleum **22**. 424—25. Jena.) REINECKE

Arthur E. Wells, *Nicht klopfende Betriebsstoffe*. Mitt. von Untersuch. mit verschiedenen Motorenbetriebsstoffen. Eine Anzahl Kurvenabbildungen. (Oil Gas Journal **24**. Nr. 43. 138—39. New York.) REINECKE

Herbert Klinger, *Getrockneter Lignit im Kesselbetrieb*. Hinweis auf die wirtschaftlichen Vorteile der Verwendung von Trockenkohle. (Montan. Rundschau **18**. bis 206. Wien.) BIELENBERG

D. J. W. Kreulen, *Übersicht über die bisher vorgeschlagenen Methoden zur Bestimmung der flüchtigen Stoffe in den Brennstoffen*. Kurze Beschreibungen mit Abbildungen u. Zeichnungen der Geräte (vgl. Chem. Weekblad **21**. 396. **22**. 90; C. II. 1875. **1925**. II. 1909). (Bull. Fédération Industr. Chim. de Belgique **4**. 183—255—73. 1925. Rotterdam, Lab. v. Brandstof- en Olieonderzoek.) GROSZFELE

G. Baum, *Erfahrungen betr. Untersuchungsmethoden von Transformatoren-, Schalter- und Turbinenölen*. Vortrag nebst Diskussion. Die meisten Methoden liefern zuverlässige oder widerspruchsvolle Ergebnisse. Die Best. der Verteerungsgeschichte zweckmäßig mittels Na_2O_2 nach dem A. E. G.-Verf. Titrierung des N ist aber nötig. Bei Turbinen, Transformatoren u. Schaltern sollten nur solche „finate“ Verwendung finden, die nach HEYD höchstens 5% ungesätt. KW-stoffe halten. Schaffung eines Schmiermittelforschungsinstit. wird erwogen. (Ztschr. angew. Ch. **39**. 473—75. Wattenscheid.) HELLE

N. E. Rambush, *Vorschlag einer Methode zur Berechnung der für die trockene Destillation der Kohle erforderlichen Wärmemenge*. Für prakt. Zwecke läßt sich die erforderliche Wärmemenge genügend genau berechnen aus der von den Dest.-Proz. verbrauchten Wärmemenge, der fühlbaren Wärme von Koks + Asche u. Gas. Es fehlt lediglich die Wärmemenge, die bei der Zers. entsteht oder verbraucht wird. Ist für Kokskohlen im allgemeinen nicht groß; doch wären wissenschaftliche Untersuch. hierüber erwünscht. Ebenso wünschenswert wären Unters. über einen eventuellen Zusammenhang zwischen Menge des Zers.-W., seiner B.-Temp. u. der Zers.-W. (Fuel **5**. 12—16.) BIELENBERG

Harold J. Rose, *Untersuchung der Makrostruktur des Kokes*. Vf. beschreibt eine Methode, die geeignet ist, die makroskop. Struktur sichtbar zu machen. Sie ist wesentliches dad. gek., daß die Hohlräume mit einer weißen Masse ausgefüllt werden (MgO u. ein in der Zahnheilkunde benutzter „Pariser Zement“). Die Masse schließt die Zellen vor Eindringen von Staub des Kokes u. der Schleif- u. Poliermittel u. die Zellwände vor Einbröckeln beim Schleifen u. Polieren. Die Masse kann in den Zellen belassen werden u. bei photograph. Aufnahmen entstehen so gute Bilder ohne

auftretenden störenden Reflexe. Nach Herauslösen der Masse mit H₂O oder HCl kann der Anschliff als Matrize für sehr schöne Abdrucke benutzt werden. 5. 57—64. Pittsburgh, The Koppers Co. Labor.) BIELENBERG.

6. **Lessing**, *Kohlenasche und Reinkohle* I. Die anorgan. Bestandteile der Kohle entstehen teils aus dem pflanzlichen Material, teils sind sie nachträglich durch Injektion usw. hinzugekommen. Die Bestandteile einer Kohle (Fusain, Durain, usw.) unterscheiden sich bezüglich ihres Aschegehaltes erheblich. Vf. glaubt als Durchschlagswerte auf Grund zahlreicher Unterss. annehmen zu können: Clarain u. n 1,1—1,3% Asche, größtenteils l. in W.; Durain 6—7%, hauptsächlich aus Silica bestehend, Fusain 4—30%, viel in Säuren l. Salze enthaltend. — Vf. macht auf die chem. Veränderungen der mineral. Bestandteile bei der Veraschung aufmerksam; die Best. der Reinkohle aus der Differenz Trockenkohle—Asche ist nicht befriedigend. — Ferner wird besprochen, die Unters. der Asche u. Mk. u. der Kohle mit Röntgenstrahlen. (Fuel 5. 17—24. London.) BIELENBERG.

7. **G. King** und **D. Mac Dougall**, *Die Bestimmung des Kohlenstoffs in der Kohle*. Sie haben die möglichen Verluste bei der C-Best. u. ihre Ursachen festgestellt. Sie kommen zu dem Schluß, daß eine Dauer der Verbrennung von mindestens 40 Min. bei einer Temp. von 800° in der Mitte der CuO-Schicht ausreichende Garantie gegen Verluste geben. (Fuel 5. 33—35. H. M. Fuel Research Station.) BIELENBERG.

8. **A. C. Fieldner** und **W. A. Selvig**, *Die Schmelzbarkeit der Kohlenasche*. Das Verhalten der Asche vollzieht sich in einem Temp.-Intervall, dessen Größe von der Art der Asche abhängt. Die Schmelztemp. kann aus der chem. Zus. nur sehr roh angesetzt werden, zweckmäßiger ist die Best. durch Schmelzvers. Dabei ist die Art der Atmosphäre von Einfluß; es wurden Unterschiede bis zu 400° beobachtet, besonders bei Fe-haltigen Aschen. Verss. wurden in H₂-, H₂ + H₂O- u. CO + CO₂-Atmosphäre ausgeführt. Die tiefsten Tempp. wurden erreicht mit einer Atmosphäre von 10—40% reduzierenden u. 60—70% oxydierenden Anteilen. Daraus ergibt sich als einfachste Methode die Anwendung eines Gasmuffelofens mit ungenügender Luftzufuhr. App. u. Geschwindigkeit des Anheizens sind eingehend beschrieben. Die Methode wird mit 10% Dextrin in Konusform gebracht u. deren Deformation wie bei der Kugelprobe verfolgt. Die Methode soll recht genaue u. mit den prakt. Erfahrungen übereinstimmende Werte liefern. (Fuel 5. 24—33. Pittsburgh, Bureau of Mines.) BIELENBERG.

9. **L. B. Etherton**, *Feuerungskontrolle*. I. Allgemeine Betrachtungen über die Verbrennungsvorgänge. (Fuel 5. 36—39. Dep. of Fuel Technology, Sheffield.) BIELENBERG.

William Tyrrell, Seattle, Washington, *Brikettherstellung*. Man mischt Kieselgur, I. W. u. Brennstoff zu einer plast. M. u. preßt diese zu Briketts. (Can. P. 253 876 31/12. 1924, ausg. 22/9. 1925.) KAUSCH.

Stettiner Chamotte-Fabrik A.-G., vorm. Didier, Stettin, *Schwelverfahren für bituminöse Schiefer u. dgl.* Die Erfindung bezweckt das unmittelbare Schwelen unter möglichst großer Ausbeute an primären Schwelprodd. u. nachfolgendem Ausbrennen bituminöser Schiefer u. anderer Stoffe mit überwiegendem Gehalt an anorgan. Bestandteilen durch unmittelbar hindurchgeleitete Gase u. besteht darin, daß ein unter ersterer rostloser Schachtofen mit unterer Zufuhr von Luft durch die h. Rückstände reich u. allseitiger Luft- oder Gaszufuhr in die Verbrennungszone hinein in folgender Anordnung sowie Art u. Weise benutzt wird: Um einerseits die Verbrennungszone abzufachen u. in einem bestimmten Ofenquerschnitt festzulegen, andererseits die genaue Abstimmung der Temp. der Verbrennungszone zu ermöglichen, werden die jeweils erforderlichen Mittel (Dampf, feuchte oder trockene Luft usw.) in dem Schachtquerschnitt, in dem die Verbrennungszone festgelegt werden soll,

durch einen verstellbaren u. doppelseitig kühlbaren Spalt im Schachtmantel egeführt. (D. R. P. 424 192 Kl. 10a vom 8/11. 1917, ausg. 18/1. 1926.) OELKER

Siegener Maschinenbau-Akt.-Ges. und Alfred Menzel, Siegen, *Gaserzeuger zum Verschwelen und Vergasen feinkörniger oder mulmiger Brennstoffe*, in dem Verschwelen durch die fühlbare Wärme der Klargase bewirkt wird, dad. gek., die durch schräg in den Schacht vorspringenden Heizflächen begrenzten, unten offenen Heizräume durch in der Schachtwand liegende Kanäle zu einem zusammenhängenden Kanalsystem verbunden sind, welches die Klargase bis zum Gasabzug durchstreifen können, ohne Brennstoffschichten zu durchqueren. (D. R. P. 427 038 Kl. 24e vom 15/2. 1924, ausg. 22/3. 1926.) OELKER

Koppers Co., übert. von: **Eugene H. Bird**, Pittsburgh, V. St. A., *Behandlung ammoniakhaltiger Gase*. (Can. P. 250 760 vom 11/6. 1924, ausg. 16/6. 1925.) C. 1924. I. 604.) KÜHLING

Humphreys & Glasgow, Ltd., Westminster, und **John Morrell Rusby**, Philadelphia, *Verkohlung bituminöser Kohle*. (E. P. 218 512 vom 2/8. 1923, ausg. 3/1. 1924. — C. 1925. I. 2202. (F. P. 574183).) KAUSCH

Mathias Fränkl, Augsburg, *Wassergaserzeuger* mit beiderseits in der Schachtwand liegenden, von den Blasegasen u. dem Wassergas wechselweise durchzogenen wärmespeichernden Kammern, dad. gek., daß in den Kammern unten offene Wasserdampfglieder angeordnet sind, welche von den Blasegasen während des Blasegasens von außen bestrichen u. während des Gasens von dem h. Wassergas innen durchzogen werden, während auf der anderen Seite die h. Glieder aus dem in sie eingespritzten W. den zum Gasen erforderlichen Dampf erzeugen. — Die Wärme der abziehenden verbrannten Blasegase wird in wirtschaftlicher Weise ausgenutzt. (D. R. P. 427 233 Kl. 24e vom 27/9. 1924, ausg. 10/4. 1926.) OELKER

Fritz Seidenschnur, Berlin-Grunewald, *Verarbeitung von Braunkohle und Nutzbarmachung des in ihr enthaltenen flüchtigen Schwefels*. Bei der Verschwelung der Braunkohle unter Hindurchleitung überhitzten Wasserdampfes durch den unterbrochen arbeitenden Schweler, wobei der Wasserdampf bei der Teerverdichtung nicht mit verdichtet, zum Teil in einen Überhitzer abgezogen u. aus diesem durch den Schweler wieder zugeführt wird, verdichtet man von dem nicht in den Kreislauf zurückgeführten Teil des Gemisches aus Wasserdampf u. entstandenen Gasen den Wasserdampf u. verarbeitet das Gasmisch auf S oder SO₂. Unter Anpassung an die jeweilige Beschaffenheit des aufgegebenen Schwelgutes wird der Wasserdampf dauernd so h. u. in so reichlicher Menge auf die Braunkohle zur Einw. gebracht, daß einerseits ständig hochstockender, an unzersetztem Bitumen reicher Teer anfällt, ein für die wirtschaftliche Verarbeitung auf Schwefelerzeugnisse genügend schwaches wasserstoffreiches Gasmisch entsteht, andererseits aber doch unbeschadet der Teer dem angegebenen Schwelbetrieb erforderlichen Wasserdampfmenge dauernd genügend viel Wasserdampf u. Gasmisch für die Nutzbarmachung des gesamten S-Gehaltes der Gase aus dem Kreislauf herausgezogen werden kann. (D. R. P. 427 323 Kl. 10a vom 31/8. 1920, ausg. 29/3. 1926.) OELKER

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: **Günter Schimmelpfennig**, Hennigsdorf), *Trocknen von Kohle auf übereinanderliegenden Heizflächen*, über welche die Kohle durch endlose Kratzerbänder gefördert wird, dad. gek., daß die Kohle in mittelbarer Erhitzung zunächst über mit Dampf gespeiste Heizflächen u. dann über mit Rauchgasen geheizte Flächen geleitet wird, wobei die Rauchgase in der letzten Trocknungsstufe aus dem Rauchkanal, in welchem sie mittelbar auf die Kohle einwirken, unmittelbar in den sowohl mit Dampf als auch mit Rauchgasen mittelbar geheizten Trockenraum geleitet werden. — Die in großen Mengen anfallenden Rauchgase werden durch dieses Verfahren im Rahmen eines wirtschaftlichen A

en Trocknungsvorgang nutzbar gemacht. (D. R. P. 427 584 Kl. 82a vom 23/1. 1926, ausg. 13/4. 1926.) OELKER.

Wilhelm Hartmann, Offenbach a. M., und **Adolf Dasbach**, Hermühlheim, *Verfahren zur ununterbrochenen Ausscheidung des Staubes und zur weiteren Bearbeitung der getrockneten Rohbraunkohle bis zur Brikettierung* nach D. R. P. 424 932, dad. gek., daß durch Einteilung der Siebtrommel in drei oder noch mehr mit zunehmender Maschengröße nach Sichtung der feineren genügend trockenen Anteile das in der Trommel weiterlaufende Gut weiterhin in zwei oder mehr Größen oder Körnungen geschieden wird, von denen nur die ganz großen Knorpel zum Nachwalzwerk u. zur Nachtrocknung geführt werden, während die feineren Größen oder die Zwischengrößen unmittelbar zum Trockner bzw. zur Brikettierung abgeführt wird bzw. werden. (D. R. P. 424 932 Kl. 10b vom 15/4. 1924, ausg. 8/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 419 809; C. 1926. I. 1084.) OELKER.

Heinrich Preller, Berlin-Friedenau, *Trennung und Gewinnung von Erdöl aus Sanden, Bitumen aus Ölkreide, Ölschiefer, Kohlen usw.*, dad. gek., daß die zu trennenden Stoffe vermittelt einer selbsttätig wirkenden Speisevorr. einem System von Trommeln in verschiedener Richtung langsam umlaufenden Trommeln zugeführt bei der Wrkg. von entgegen der Umlaufrichtung der Trommeln strömendem Dampf, unter Zusatz von Extraktionsmitteln ausgesetzt wird, so daß die spezif. schwereren Stoffe ausgewaschen werden u. nach oben steigen, während die schwereren zu Boden sinken u. durch Becherwerk u. dgl. abgeführt werden. (D. R. P. 418 209 Kl. 1a vom 14/7. 1920, ausg. 27/3. 1926.) OELKER.

Heinrich Preller, Berlin-Friedenau, *Trennung und Gewinnung von Erdöl aus Sanden, Bitumen aus Ölkreide, Ölschiefer, Kohlen usw.* gemäß D. R. P. 400 122, dad. gek., daß das vermöge seiner Schwere abfallende Gebirgsmaterial dem im Kreislauf befindlichen Waschkammer u. die angebaute oder getrennt angeordnete Klärkammer zugeführt u. h. Waschwasser ausgesetzt wird, das durch entsprechende Pumpen- oder Vorrichtungen in regulierbarer Bewegung gehalten wird. — Dem h. Waschwasser Extraktionsmittel zugesetzt werden, die spezif. schwerer als W. sind. — Verluste werden vermieden. (D. R. P. 418 209 Kl. 1a vom 24/2. 1921, ausg. 27/3. 1926. Zus. zu D. R. P. 400 122; vorst. Ref.) OELKER.

McLair Refining Company, Chicago, Ill., übert. von: **John E. Bell**, Brooklyn, *Spalten von Ölen durch Cracken unter Druck*. Die beim Erhitzen auf Cracken entstehenden Dämpfe werden unter Druck einer Kondensation unterworfen, durch Steigerung oder Verminderung des Druckes in bestimmter Weise reguliert. (A. P. 1575 031 vom 1/4. 1924, ausg. 2/3. 1926.) OELKER.

Almer Mc Duffie Mc Afee Refining Company, Pittsburgh, Pa., übert. von: **Almer Mc Duffie Mc Afee**, Port Arthur, Texas, *Destillation von Ölen unter Mitverwendung flüchtiger Katalysatoren*. Aus der Herst. von niedrig sdd. KW-Stoffen aus höher sdd. dest. man letztere in Ggw. von flüchtigen Chloride, z. B. AlCl_3 , u. bringt die entwickelten Dämpfe zur Kondensation, indem man sie zwecks Entfernung des Katalysators mit dem Ausgangsöl gewaschen. Dieses Waschöl wird dann in die Destillationskolonne zurückgeführt. (A. P. 1578 050 vom 20/1. 1922, ausg. 23/3. 1926.) OELKER.

Almer Mc Duffie Mc Afee Refining Company, Pittsburgh, Pa., übert. von: **Almer Mc Duffie Mc Afee**, Port Arthur, Texas, V. St. A., *Destillation von Petroleumölen*. Zwecks Fraktionierung des Kp. der Öle unterwirft man sie einer Dest. in Ggw. von AlCl_3 , trennt die fraktionierte Kondensation das niedrig sd. Öl von dem AlCl_3 u. dem Kerosen, und führt das AlCl_3 nach Abscheidung des Kerosens in den Destillationskessel zurück. (A. P. 1578 050 vom 20/1. 1922, ausg. 23/3. 1926.) OELKER.

Stuart Parmelee Miller, New York, übert. von: **Stuart Parmelee Miller**, Oak Lane, Philadelphia, *Polymerisation von harzbildenden Bestand-*

teilen von Naphtha. (E. P. 225 216 vom 18/11. 1924, ausg. 21/1. 1925. A. 23/11. 1923. — C. 1925. II. 1239.) OELK

The Burmah Oil Company Ltd., Glasgow, Großbritannien, *Vorrichtung Krystallisieren und Ausschwitzten von Paraffin*, welche aus einer oder beliebig v ständig unter Luftabschluß stehenden, wagerechten Kammern besteht, die u. oben durch hohle Heiz- bezw. Kühlzellen abgeschlossen sind u. seitlich mit Füll- bezw. Ablaßrohr u. gegenüberliegender Entlüftungsöffnung versehen sind. Die Vorr. hat den Vorzug, daß das Paraffin niemals mit W. in Berührung k u. von der Außenluft während des Schwitzvorganges abgeschlossen ist. (D. 426 880 Kl. 23b vom 5/7. 1923, ausg. 20/3. 1926. E. Prior. 15/8. 1922.) OE

Exnerwerk A.-G., Königstein a. d. E., *Ölreinigungsapparat*, insbesondere dickflüssige Zylinder- und Motoröle, bei welchem diese in dünner Schicht über be Flächen geleitet werden, gek. durch einen mit Schwimmer versehenen u. durch e Widerstände beheizten Behälter, in welchem das zu reinigende Öl durch eine Durchlaßregler versehene Rohrleitung gelangt, u. eine an der Rohrleitung angeschlo Brause über einer Mehrzahl von übereinander angeordneten je für sich durch e Widerstände beheizte u. einzeln aus dem Gehäuse des App. herausnehmbaren Flä die abwechselnd aus kegelförmigen Körpern, welche ihre Spitzen nach der leitung zukehren, u. aus trichterförmigen, nach der Rohrleitung zu offenen körnern bestehen, deren gegenseitige Abmessungen so getroffen sind, daß das a Kegelflächen gelangende Öl von dem darunter befindlichen Trichter aufgef u. durch eine Bodenfläche der Hohltrichter an die nächste Kegelfläche abge wird, wobei der Schwimmer in dem beheizten Behälter auf einen elektr. Sc derart einwirkt, daß bei der Erreichung der tiefsten Schwimmerstellung eine Ko unterbrechung stattfindet u. dadurch die Stromleitung nach sämtlichen Heiz ständen des App. unterbrochen wird. Die Öle werden in vollkommen reinem Zu wiedergewonnen. (D. R. P. 426 304 Kl. 23a vom 6/8. 1924, ausg. 6/3. 1926.)

Universal Oil Products Company, Chicago, Ill., übert. von: **Gustav E** Independence, Kansas, V. St. A., *Behandeln leichter Kohlenwasserstoffe*. Man mischt leichte, gasolinartige KW-stoffe mit etwas schwereren Ölen, wie Nap u. unterwirft dann das Gemisch einem Reinigungsprozeß, indem man es durch erhitzte, ein Metalloxyd enthaltende Lsg. einer Base leitet. (A. P. 1 575 905 31/12. 1920, ausg. 9/3. 1926.) OELK

Sharples Specialty Co., Philadelphia, übert. von: **L. H. Clark**, Rosen Pennsylvan., *Ölreinigung*. Freie Fettsäuren u. kolloidal suspendierte Stoffe haltende Öle werden verwendet zum Eintauchen elektr. Vorr. oder als Schmier für Verbrennungskraftmaschinen oder Dampfturbinen, nachdem sie mit einer von Na₂SiO₃; NaOH, Na₂CO₃, Na₃PO₄ oder anderer alkal. Stoffe erhitzt worden (E. P. 243 666 vom 21/4. 1925, Auszug veröff. 20/1. 1926. Prior. 29/11. 1924.)

Ida M. Custer, Rahway, New Jersey, *Schmiermittel*, welches aus 1 Teil flocktem Graphit, 16 Teilen Kohlenteeröl, 4 Teilen Schmalz, 12 Teilen Petr u. 8 Teilen sogen. rotem Maschinenöl zusammengesetzt ist. (A. P. 1 574 642 28/1. 1921, ausg. 23/2. 1926.) OELK

Aktiebolaget Separator, Schweden, *Reinigung von gebrauchten Schmi* Die Schmieröle werden im h. Zustande zunächst von den schwereren festen Be teilen durch Dekantation oder Zentrifugieren befreit u. dann mit einem „Anti-Ko z. B. Trinatriumphosphat, versetzt, um den im kolloidalen Zustande in dem Öl t lichen C auszufällen; Der Nd. mitsamt dem Fällungsmittel u. W. wird durch Z fugieren abgeschieden u. das Öl schließlich durch Verdampfung von den flüch Verunreinigungen befreit. (F. P. 602 304 vom 20/8. 1925, ausg. 17/3. 1926.) OE

Chemisches Zentralblatt.

926 Band I.

Nr. 24.

16. Juni.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.


Moritz von Rohr, *Pierre Louis Guinand*, geb. den 20. April 1748, gest. den Februar 1824. Schilderung des Lebensganges des Glasschmelzers P. L. GUINAND, r Beziehungen zu UTZSCHNEIDER u. FRAUNHOFER u. seiner Verdienste um die t. opt. Gläser nebst ausführlicher Inhaltsangabe seiner Denkschrift über die Herst. Glas, insonderheit solchem von hoher Brechung zur Verfertigung von farbenfreien rohren. (Ztschr. f. Instrumentenkunde **46**. 121—37. 189—97. Jena.) BÖTTGER.

P. Rischbieth, *Mikrochemische Reaktionen im Unterricht*. Zusammenstellung Reihe von Fällungsrrk., bei denen die Ndd. aus charakterist., mkr. leicht erbaren Krystallen bestehen. (Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. **39**. 67—71. Ham-.) BÖTTGER.

W. Flörke, *Ammoniaksynthese*. Als Katalysator dient der Glühdraht, den man 12 Volt-Osramlampe entnimmt u. samt der Fassung der Lampe auf ein Glasrohr Siegellack aufkittet. Im Rohr verlaufen die Stromzuführungsdrähte, die an seinem Ende ebenfalls mit Siegellack eingekittet sind. Statt des Glühdrahtes kann Blumendraht verwendet werden. Man führt das Glasrohr durch den Pfropfen, eine 2,5 cm weite, oben zu einer Kugel von 5 cm Durchmesser aufgeblasene Glas- unten verschließt. Durch eine zweite den Pfropfen durchsetzende Bohrung ist Zuleitungsröhre für das Reaktionsgemisch (~ 1 Vol. N u. 3 Voll. H) geführt. len die Drähte elektr. zum schwachen Glühen erhitzt, so wird nach wenigen Min. in der oberen Mündung der Röhre befindlicher Streifen roten Lackmuspapieres gefärbt, während derartiges Papier an der Mündung des Zuführungsrohres für Gasmisch unverändert bleibt. (Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. **39**. 80—81. en.) BÖTTGER.

Ernst Hils, *Reaktionsgeschwindigkeit und Massenwirkungsgesetz im chemischen rricht*. Es wird gezeigt, wie man die Formel für die Abhängigkeit der Reaktions- wwindigkeit von der Konz. der Reaktionsteilnehmer mittels des mathemat. Bed- der Wahrscheinlichkeit veranschaulichen kann. Im Anschluß daran werden Verss. rieben, aus denen die Richtigkeit der abgeleiteten Formel hervorgeht. Ihnen n die Rk. $\text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Fe}^{3+}$ u. die Red. des JO_3^- -Ions durch HSO_3^- zu- de. Ebenso wird die Formel für die Konstante des Massenwirkungsgesetzes ab- et u. die Beschreibung von Verss. zu seiner Veranschaulichung gegeben. (Ztschr. ysik.-chem. Unterr. **39**. 62—67. Berlin-Grünwald.) BÖTTGER.

Harry Essex und Otto Gelormini, *Temperaturkoeffizient der Reaktionsgeschwindig- in flüssigen Medien*. Vff. bestimmen die Reaktionsgeschwindigkeiten u. deren peraturkoeffizienten zwischen 10 u. 50° der folgenden Rkk.:



Nitrobenzol, Acetylentetrachlorid u. Benzylalkohol; $\text{C}_6\text{H}_5\text{N} + \text{CH}_3\text{J} = \text{C}_6\text{H}_5\text{NCH}_3\text{J}$ cetylentetrachlorid u. die Zers. von Triäthylsulfoniumbromid in Nitrobenzol u. ylentetrachlorid (zwischen 20 u. 60°). Bei der Rk. zwischen Dimethylanilin u. yljodid in Nitrobenzol verläuft auch die Rk. im entgegengesetzten Sinne mit rkenswerter Geschwindigkeit, so daß in diesem Falle die Gleichgewichtskonstante mmt u. mit in Rechnung gesetzt wurde. Zum Vergleich sind die bei den ver- denen Temp. gemessenen Geschwindigkeiten sämtlicher Rkk. in Tabellen neben-

einander gestellt, andererseits sind die im gleichen Lösungsm. vor sich gegangene Rkk. nebeneinander gestellt. Aus den Beobachtungen wurde nach der Arrhenius'schen Gleichung $d \ln k/dT = E/RT^2$ $E_{\text{beob.}}$ berechnet. Es ergab sich, daß in Nitrobenzol sowohl die Rk. zwischen Dimethylanilin u. Methyljodid als auch die $(C_2H_5)_3SBr = (C_2H_5)_2S + C_2H_5Br$ für $E_{\text{beob.}}$ ein Maximum bei 35° besitzt. In Benzylalkohol wird $E_{\text{beob.}}$ für die Rk. zwischen Dimethylanilin u. Methyljodid als unabhängig von der Temp. gefunden. In Acetylentetrachlorid ergab sich $E_{\text{beob.}}$ für jede der untersuchten Rkk. innerhalb des Temp.-Intervalls von 25—45° als prakt. unabhängig von der Temp. Ein abnorm hoher Wert für $E_{\text{beob.}}$ wurde bei der Zers. des Triäthylsulfoniumbromids bei 55° gefunden. In einem theoret. Teil zeigen Vff., daß die Ergebnisse darauf hindeuten, daß die Aktivierungsenergie (krit. Inkrement) isolierter Rkk. in Lsg. unabhängig von der Temp. ist, u. daß Abweichungen von der Konstanz von $E_{\text{beob.}}$ von dem anormalen Verh. des Lösungsm. herrühren. (Journ. Am. Chem. Soc. **48**. 882—94. Syracuse [N. Y.], Univ.)

JOSEPH

W. G. Whitman, Louis Long jr. und H. Y. Wang, *Absorption von Gasen durch einen Flüssigkeitstropfen*. Vff. haben die Absorption von Gasen im fallenden Wassertropfen von 0,1 g Gewicht u. 52 cm Fallhöhe bestimmt. CO₂ ergab hierbei die mittleren Absorptionskoeffizienten von 260 g CO₂ pro 1 qcm Oberfläche pro Sek. berechnet in g CO₂ pro cbm Lsg. Die Absorption von NH₃ war unter gleichen Bedingungen 22 g. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 363—67. Cambridge [Mass.], Engin. Expt. Sta.)

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

Albert C. Crehore, *Die Kräfte der chemischen Affinität. Eine Studie über Kristallstruktur im Lichte der neuen Atommodelle*. (Vgl. Philos. Magazine **49**. 839; C. **1925**. II. 448.) Vf. findet in Fortsetzung seiner früheren Unterss. Anschluß an das experimentelle Material der Röntgenanalyse. An Hand seiner früher diskutierten Atommodelle für die einfachsten Gittertypen erhält Vf. Auskunft über die relative Größe der Atomachsen. Diese Lage hängt von dem Kraftfeld ab, das durch die Rotation der Ladungen gegeben ist. Für die zwischen den Ladungen wirkenden Kräfte werden die Gleichungen benutzt, die an anderer Stelle abgeleitet werden sollen. Die Ergebnisse zu denen eine Diskussion des *Diamantgitters* führt, stehen in Übereinstimmung mit der Erfahrung. Für die Kristallstruktur des festen H kommt, wie vorausgesehen werden kann, keine der einfachen kubischen Gitterformen in Frage. Unter Berücksichtigung der D. des fl. H hält Vf. eine Anordnung für möglich, bei der an den Ecken eines Würfels von $4,36 \cdot 10^{-8}$ cm Kantenlänge sich je 4 H-Atome in Form eines Tetraeders von $0,58 \cdot 10^{-8}$ cm Kantenlänge befinden. (Philos. Magazine [7] **1**. 827 bis 827.)

LESZYNSKI

R. H. Fowler, *Statistische Mechanik von ionisierten Atomen und Elektronen*. (Vgl. Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**. 861; C. **1925**. I. 196.) Zur Anwendung der statistischen Methoden auf astronom. Fragen baut Vf. seine früheren Arbeiten weiter aus unter Berücksichtigung der Theorie von DEBYE u. HÜCKEL u. unter Benutzung der Arbeit von PLANCK (Ann der. Physik **75**. 673; C. **1925**. I. 607). Mathematisch. (Philos. Magazine [7] **1**. 845—75.)

LESZYNSKI

G. E. M. Jauncey und O. K. De Foe, *Trennung von verändertem und unverändertem Streukoeffizient der X-Strahlen*. (Vgl. S. 585.) Das Verf. beruht auf der Berücksichtigung der verschiedenen Absorptionskoeffizienten vor u. nach der Streuung. Vff. arbeiten nach zwei Methoden, die im Prinzip der von CROWTHER (Proc.) Royal Soc. London **86**. 478; C. **1912**. II. 226) benutzten ähnlich sind. Sie geben die experimentelle Anordnung u. die Ableitung der zum Teil schon früher gegebenen Formeln. Die experimentellen Resultate sollen in nächster Zeit veröffentlicht werden. (Philos. Magazine [7] **1**. 711—21. St. Louis, Washington Univ.)

LESZYNSKI

John K. Robertson, *Eine Methode, Spektre gewisser Metalle zu erzeugen*. Bei tollverrs. für eine andere Arbeit über stille Entladungen waren in den Entladungsspektren des Sn erhalten worden, obwohl unter den Vers.-Bedingungen der Partialdruck des Sn nur etwa 10^{-20} mm betragen sollte. Außerdem waren auf den Aufnahmen trotz sorgfältiger Trocknung H₂O-Banden vorhanden. Dieser letztere wurde durch Verss. der General Electric Company geklärt, die ergaben, daß letzter Quarz H₂O abgibt. Auf den Aufnahmen waren scharfe Linien des Funkenspektrums, obwohl höhere Glieder des Bogenspektrums mit kleinerer Anregungsstärke fehlten. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, daß Metallatome durch benötigte Gasmoleküle ionisiert werden. Es besteht jedoch noch die Möglichkeit chem. Rk. zwischen angeregtem Gas u. Metalloxyden. Hierüber sollen weitere Verss. mit inaktiven Gasen entscheiden. Verss. mit Cd u. Zn ergaben ähnliche Resultate; allerdings waren hier unter den gleichen Vers.-Bedingungen die Partialdrucke geringer. Die Resultate bei Ag u. Au waren negativ. (Philos. Magazine [7] **1**. 752—61. Newtown, Queen's University.)

LESZYNSKI.

John G. Frayne und **Alpheus W. Smith**, *Die Absorptionsspektre der Dämpfe von Zn, Cd, Pb, Sn, Bi und Sb*. (Vgl. S. 2295.) Die Apparatur ist ähnlich der von BURT (Physical Review [2] **24**. 129; C. **1924**. II. 2009) benutzten. Bei Zn wurde 700° die 1 S—2 p₂-Linie absorbiert, dagegen fehlte auf allen 80 Aufnahmen die andere Autoren gefundene 1 S—2 P-Linie ($\lambda = 2139$). Die 1 S—2 P-Linie (2288) des Cd war als einzige der Cd-Linien auf allen Zn-Aufnahmen vorhanden. Es ist nicht unmöglich, daß 2288 auch eine Resonanzlinie des Zn ist. Die Ergebnisse von Cd stehen in Einklang mit früheren Messungen, ebenso bei Sn, wo die Linien weniger ausgeprägt waren als bei den beiden ersten Elementen. Vff. erhalten 14 Pb-Linien, darunter auch die beiden von ZUMSTEIN nicht gefundenen 2 p₁-Linien. Bei Sb sind im Ultraviolett 4 scharfe Linien (3 d₂— α , 3 d₂— δ , 3 d₂— ϵ u. 3 d₂— ζ) u. eine Serie von Banden von $\lambda = 2880$ bis 2670, die bei 1000° in eine kontinuierliche Linie übergegangen sind. Auf den Bi-Aufnahmen befinden sich außerdem 2 Linien, die den Sb-Linien 2293 u. 2475 entsprechen. Sie sind aber beide als zweifelhaft anzunehmen, da sich im Sb-Dampf keine einzige Linie zeigen ließ. (Philos. Magazine [7] **12**—37.)

LESZYNSKI.

R. A. Morton und **R. W. Riding**, *Brechung, Ionisationspotential und Absorptionsspektre*. (Vgl. Journ. Physical Chem. **28**. 659; C. **1924**. II. 1562.) Eine Anwendung der von BALY vorgeschlagenen Dispersionsformel auf Cl führt unter Benutzung einer mit gemessenen Absorptionsbanden im nahen Ultraviolett zu einer Frequenz im nahen Ultraviolett, die mit dem Wert des Ionisationspotentials in besserem Einklang steht als die nach der einfachen Dispersionsformel erhaltene Frequenz. (Philos. Magazine [7] **1**. 726—31.)

LESZYNSKI.

Ronald Fraser, *Der Brechungsindex von Gasen und Dämpfen im Magnetfeld*. Da bei den Verss. von GERLACH u. STERN (Ann. der Physik **74**. 673; C. **1925**. I. 1281) und GLASER (Ann. der Physik **75**. 459; C. **1925**. I. 626) eine Orientierung im Magnetfeld anzunehmen ist, war eine Änderung des Brechungsindex bei Anlegung eines Magnetfelds zu erwarten. Vff. arbeiten mit einem Jamin-Interferometer u. benutzen die grüne Linie. Das angelegte Feld beträgt 184 Gauss. Da die Periode der Larmorpräzession derselben ist wie die Zeit zwischen zwei Zusammenstößen der Teilchen, mußte, wurden Drucke größer als 1 cm vermieden. Bei H₂, O₂, N₂ u. CO₂ war eine Änderung des Brechungsindex feststellbar. In diesen Fällen ist das Ergebnis eindeutig, da hier mehrere Orientierungsmöglichkeiten gegeben sind. Diese Einschränkung fällt beim Na-Dampf fort, u. da auch hier das Resultat negativ ist, ist dieses opt.-isotrope Verhalten auf eine Anomalie in der Theorie der Richtungsstreuung hin. Auf den Zusammenhang mit der Abwesenheit der totalen Polari-

sation im Zeeman-Multiplett hat HEISENBERG (Ztschr. f. Physik **31**. 617; C. 1 I. 2537) hingewiesen. (Philos. Magazine [7] **1**. 885—90.)

LESZYNSKI

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

J. J. van Laar und **Richard Lorenz**, *Theorie der galvanischen Stromerzeugender kondensierter Systeme*. Unter Verwendung der für das chem. Potential von den aufgestellten Ausdrücke werden Formeln für die EMK. einer einfachen kondensierten Elektrode erster Art u. für kondensierte Daniellketten unter Vernachlässigung Kontaktpotentials der Schmelzen angegeben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **331**—37.)

CASSE

C. P. McNally, *Die Ionisationskonstanten des Kreatinins*. Vf. bestimmt die Ionisationskonstanten des Kreatininchlorhydrats, 1. nach der pH-Best.-Methode u. Verwendung eines Potentiometers nach LEEDS u. NORTHRUP (Type K) u. f. bei 25° $K = 6,73 \times 10^{-10}$, bei 40° $K = 9,81 \times 10^{-10}$; 2. nach der Überführungszahlmethode bei 25° $K = 7,05 \times 10^{-10}$, bei 40° $K = 10,5 \times 10^{-10}$, während H. u. BARKAN (Ztschr. f. Biologie **72**. 25; C. **1921**. I. 240) für $K = 1,85 \times 10^{-10}$ für was aber an der Unreinheit ihres Untersuchungsmaterials gelegen haben. 3. Nach der Verteilungsmethode im System Kreatininacetat-W.-Ä. u. findet für $7,0 \times 10^{-10}$ bei 25°. Alle diese Werte unterscheiden sich sehr von dem von W. (Journ. Chem. Soc. London **83**. 568; C. **1903**. I. 909), der durch Messen des kat. Hydrolyseneffektes an Methylacetat für $K = 0,357 \times 10^{-10}$ fand. (Journ. Am. Chem. Soc. **48**. 1003—09. Virginia, Univ.)

BRAUN

L. C. Jackson, *Das magnetische Moment der Bahn des Valenzelektrons der Alkalimetalle*. Aus den Werten der atomaren magnet. Suszeptibilitäten der Alkalimetalle von CROW (S. 2300) berechnet Vf. den Beitrag der Valenzelektronen zu diesen Größen. Diese Beiträge sind positiv u. von der Größenordnung, die man dem Restmoment fast vollständig kompensierter, zwischen Nachbaratomen geteilten Bahnen der Valenzelektronen bei nicht-polaren Bindungen erwartet. Die Suszeptibilitäten der diamagnet. festen Alkalimetalle sind wahrscheinlich auch unabhängig von der Temp. (Nature **117**. 449. London, Davy-Faraday Lab.)

JOSEPH

Sherman S. Shaffer und **Nelson W. Taylor**, *Die Wirkung von Komplexbildung auf die magnetische Suszeptibilität paramagnetischer Salze in wässriger Lösung*. Die paramagnet. Suszeptibilitäten wss. Lsgg. von NiCl_2 , NiBr_2 , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ u. C. wurden nach der Zylindermethode von GOUY (C. r. d. l'Acad. des sciences **109** [1889]) bei Zimmertemp. bestimmt. Es wurden z. B. gefunden für 2,907-mol. $\chi^{20} \times 10^6 = 4553$, für 0,5385-mol. NiBr_2 $\chi^{20} \times 10^6 = 4393$, für 4,063-mol. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ $\chi^{20} \times 10^6 = 1584$ u. für 2,91-mol. CuBr_2 $\chi^{20} \times 10^6 = 1516$. Dann wurde der Effekt des Zusatzes diamagnet. Substanzen, deren Suszeptibilität in konz. Lsg. ebenfalls gemessen wurde, auf die mol. Suszeptibilität der paramagnet. Salzlsgg. untersucht. Die Ergebnisse sind zum Vergleich alle nach dem Curieschen Gesetz auf 20° umgerechnet. Zu NiCl_2 -Lsgg. wurden verschieden konz. Lsgg. von $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$, NH_4OH , CH_3NH_2 , KCN zugegeben, zu NiBr_2 Lsgg. von HBr , zu $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ HNO_3 verschiedener Konzentration u. zu CuBr_2 HBr , KCl , KBr u. CaBr_2 . In allen Fällen, wo stabile Komplexe gebildet wurden, wurde der Paramagnetismus der Lsg. beträchtlich verringert. Dies machte die Lsg. von NiCl_2 sogar diamagnet. Vff. schließen aus den Ergebnissen tabellar. zusammengestellt sind, daß die an der Komplexbildung beteiligten Ionen Bindungen zum mindesten teilweise magnet. Charakter besitzen. — Für die Suszeptibilitäten der diamagnet. Substanzen, deren Suszeptibilität in konz. Lsg. ebenfalls gemessen wurde, wurden folgende Werte gefunden: $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ $-0,415 \times 10^{-6}$, NH_3 $-0,948 \times 10^{-6}$, CH_3NH_2 $-0,754 \times 10^{-6}$, KCl $-0,466 \times 10^{-6}$, KCN $-0,500 \times 10^{-6}$, HBr $-0,383 \times 10^{-6}$, HNO_3 $-0,306 \times 10^{-6}$, KBr $-0,343 \times 10^{-6}$, CaBr_2 $-0,370 \times 10^{-6}$. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48** bis 53. Berkeley [Cal.], Univ.)

JOSEPH

Nelson W. Taylor, *Die magnetischen Eigenschaften ungerader Moleküle.* (Vgl. it. Ref.) (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 854—59. — C. **1925**. II. 2047.) JOSEPHY.

J. H. J. Poole, *Verstärkung des metallischen Bildes in den magnetischen Versuchen Gerlach und Stern.* Bei Unters. des magnet. Moments des Cd-Atoms mit der etwas modifizierten Versuchsanordnung von GERLACH u. STERN fanden Vff. eine einfache Methode, die Cd-Abscheidung auf der Glasoberfläche zu verstärken. Die Methode beruht darauf, daß sich Cd-Dampf bei niedrigen Drucken schon bei gewöhnlicher Temp. auf der Glasoberfläche kondensiert, wenn nur Spuren von Cd schon auf der Glasoberfläche vorhanden sind, während auf reinem Glas die Kondensation des Cd-Dampfes erst bei der Temp. der fl. Luft eintritt. Die Methode kann auch bei flüchtigeren Metallen als Cd, z. B. bei Zn u. Mg angewandt werden, indirekt vielleicht auch bei Cu. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh **46**. 451. Dublin, Trinity Coll.) JOSEPHY.

William Cooper, *Bemerkung über kupfergefärbte Flammenspitzen.* Je nach der Zusammensetzung des Gases weist die durch Cu gefärbte Flamme verschiedene Färbungen auf. Diese Veränderung wurde spektroskop. verfolgt u. die Anwendung solcher Flammen zur Untersuchung der Sicherheitslampen zur Erkennung von Methan besprochen. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh **46**. 86—89. Dundee Techn. College.) ENSZLIN.

Fred J. Symon, *Die Diffusion von Salzdämpfen in einer Bunsenflamme.* Die Methode zur Messung der Diffusion beruht auf der Erhöhung der Leitfähigkeit durch die in der Flamme befindlichen Salzdämpfe. Es findet ein bedeutender Potentialunterschied in der Nähe der Kathode, welche sich unten in der Flamme befindet, statt. Der Diffusionskoeffizient wurde nach einer angegebenen Formel berechnet. Er beträgt für die Verwendung der Phosphate für K = 5,8 u. für Na = 13. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh **46**. 15—19. Glasgow, Univ.) ENSZLIN.

Yuzaburo Shibata, *Ablenkung einer Flamme in dem elektrischen Felde.* Eine Flamme, welche in ein starkes elektr. Feld gebracht wird, wird derart abgelenkt, daß der leuchtende Teil derselben vom negativen Pol angezogen wird, während die übrige Flamme der Wirkung der Wärme an beiden Polen gleichmäßig ist. Es wurden nun die Verhältnisse der Verunreinigungsgase an beiden Seiten des elektr. Feldes analysiert u. für das Verhältnis H_2O am positiven Pol durchweg etwas niedrigere Werte gefunden als am negativen (1,42 gegen 1,49). In die Flamme in Form von Salzen gebrachte positive Ionen (H^+ , Cu^{++}) wandern nach dem negativen Pol, die negativen nach der positiven Elektrode. (Bull. Chem. Soc. Japan **1**. 23—25. Tokyo, Univ.) ENSZLIN.

Elliot Q. Adams, *Eine einfache Beziehung zwischen Zusammensetzung und Siedetemperatur.* Zwischen Zus. einer Verb. u. ihrem Kp. gilt folgende einfache Beziehung: $\log T = \sqrt{20000 m}$; T = absol. Kp. bei 1 at., m ist für alle KW-stoffe die Anzahl der Atome im Mol., für alle anderen Verbb. ist für jedes in der Verb. vorkommende Element die Anzahl seiner Atome zu multiplizieren mit der um 1 verminderten Horizontalreihe, in der es im period. System steht, dabei ist das period. System so gegeben, daß die Edelgase das letzte Glied jeder Reihe bilden, so daß in der 0. Horizontalreihe H u. He stehen, in der 1. die Elemente bis zur Ordnungszahl 10, in der 2. 18, in der 3. bis 36, in der 4. bis 54, in der 5. bis 86. Für einen anderen Druck p at berechnet sich der Kp. nach $T = T_p (1 - 0,2 \log_{10} p)$. Eine tabellar. Übersicht erkennen, daß die Beziehung für zahlreiche n. organ. Fll. u. viele anorgan. Nicht-electrolyte innerhalb eines Bruchteils einer Einheit von m gilt. Bei assoziierten oder polymeren Fll. treten Abweichungen von mehreren Einheiten von m auf. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 870—72. Cleveland [O.], NELA Res. Lab.) JOSEPHY.

Shinroku Mitsukuri, *Die Schmelzwärmen einiger organischer Lösungsmittel, deren Schmelzpunkte verhältnismäßig niedrig sind.* Es werden aus der Gefrierpunktserniedrigung durch verschiedene Stoffe die Schmelzwärmen einiger Lösungsm. nach der thermodynam. Formel berechnet. Ist Q die Schmelzwärme u. T u. T_1 die FF.

der Lösungsmm. der Konz. N u. N_1 , so ist $\ln \frac{N}{N_1} = \frac{Q}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T} \right)$. Es berechnet sich so die Schmelzwärmen von *Chlf.* zu 2080 cal., *Aceton* zu 1300 cal., für CS_2 660 cal., für *A.* zu 1400 cal., für *Methylalkohol* zu 600 cal. u. für *A.* zu 650 cal. (Chem. Soc. Japan 1. 30—34. Sendai, Tohoku Univ.) ENSZLIN

R. H. Fowler, *Behandlung nicht-idealer Gase nach der Methode der Verteilungsfunktionen*. Der Terminus Verteilungsfunktion entspricht dem Begriff des Gaseigenen Phasenraumes. Entwicklung einer allgemeinen Theorie der Gemische ungesättigter Gase, Diskussion des Dissoziationsgleichgewichtes zwischen ihnen, Schluss über den Geltungsbereich der Debye-Hückelschen Theorie der starken Elektrolyte; gilt nur für schwache Konz. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 861—85. 1926. Trinity Coll.) CASSE

Johannes Geißler, *Bemerkung zu dem Aufsatz „Über die Gültigkeitsgrenzen Gasgleichungen“ von W. Herz*. (Vgl. HERZ, S. 1948.) Bemerkung bzgl. des Verlaufs der Kurven bei Anwendung der Berthelotschen oder der Wohlschen Formel auf gesättigte Dämpfe. Die Genauigkeit beider Formeln läßt sich auch durch Anwendung auf ungesätt. Dämpfe bzw. komprimierte Gase prüfen. (Ztschr. f. Elektrochem. 32. 217.) JOSEPH


F. Russell Bichowsky, *Die Daten der Thermochemie*. Vf. macht auf Unstimmigkeiten in den deutschen Tabellen im Vergleich zu den Angaben der International Critical Tables aufmerksam u. fordert experimentelle Nachprüfung. (Ind. an Eng. Chem. 18. 417—18. Baltimore [Md.].) GRIMM

N. R. Campbell, *Das Evacuieren von Kohlendioxyd und Wasser*. Wird Hg-Dampf durch Ausfrieren entfernt, so werden CO_2 (bei Verwendung von fl. O unter Atmosphärendruck) u. H_2O (bei Verwendung von festem CO_2) derart mitkondensiert, daß ihr Partialdruck von der Größenordnung 10^{-5} ist, also das Evakuieren stark erschwert wird. Vf. gibt die Tempp. an, bei denen diese Schwierigkeit vermieden werden kann. (Philos. Magazine [7] 1. 762—68. Wembley, General Electric Company.) LESZYNSKI

B. Anorganische Chemie.


Chanoz und A. Chevallier, *Chemische Reaktion (p_H) der wässrigen Lösungen einiger Alkali- und Erdalkalisalze*. Bei CO_2 -Durchperlung bleiben alkal. die wss. Lsgg. von K_2CO_3 , Na_2CO_3 , $NaHCO_3$, HNa_2PO_4 , K-Acetat, neutralisiert oder sauer werden. Lsgg. von KBr, $BaCl_2$, Na_2SO_4 , $K_4(CN)_6Fe$, Na-Citrat, K-Tartrat, stets, auch ohne CO_2 -Behandlung, sind sauer die Lsgg. von KCl, NaCl, $MgCl_2$, KNO_3 u. werden bei Kochen u. Abkühlen im CO_2 -freien Raum neutral. (C. r. soc. de biologie 94. 860—61. Lyon. Lab. de physique biolog. radiol. et physiother.) OPPENHEIMER

Joseph B. Quig und John A. Wilkinson, *Darstellung von Disiliciumhexachlorid*. Vff. untersuchen zuerst, ob bei der Methode von MARTIN (Journ. Chem. Soc. London 1915. 2836; C. 1915. I. 422) zur Darst. von Disiliciumhexachlorid aus Ferrosilicium Cl_2 das gebildete $FeCl_3$ als Katalysator wirke, oder einen günstigen Einfluß auf die Erniedrigung der Chlorierungstemp. des Si ausübe. Beide Fragen sind im negativen Sinne zu beantworten. Eine Erhöhung der Ausbeute an Si_2Cl_6 erzielen Vff. durch Beimischung von $SiCl_4$, einer bei der Rk. ebenfalls entstehenden Komponente, zu $SiCl_4$. Das Gasgemisch wurde über auf 200° erhitztes Ferrosilicium geleitet. Die gebildeten Siliciumchloride wurden von der großen Menge $SiCl_4$ durch fraktionierte Dest. getrennt, Si_2Cl_6 geht zwischen 144° u. 145° u. die geringe Menge Si_3Cl_8 bei 210° über. Die Erhöhung der Ausbeute beruht auf der Verzögerung der weiteren Chlorierung des gebildeten Si_2Cl_6 zu $SiCl_4$ u. nicht auf der Red. des letzteren zu Si. Die Analyse des Si_2Cl_6 erfolgte nach der Gleichung:



Best. nach VOLHARD. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 902—06. Ames [Iowa], JOSEPHY.
Francesco Giordani, *Über die Kinetik der Zersetzung von Natriumhypochlorit-
 en*. (Rendiconto Accad. Scienze Fisiche e Mat. [Napoli] [3] **30**. 107—14. 1924. —
 925. I. 825.) GRIMME.

Arthur A. Blanchard und William L. Gilliland, *Die Konstitution von Nickel-
 onyl und die Natur der sekundären Valenz*. Um Aufschluß über die Konst. des
 elcarbons zu erlangen, untersuchen die Vff. die Rkk. von $\text{Ni}(\text{CO})_4$ mit Br_2 , S,
 dem Grignardschen Reagens. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ u. Br_2 wurden getrennt in CCl_4 gel. u.
 Bromlsg. allmählich zur Carbonyllsg. zugegeben. Die Rk :



läuft quantitativ. Reines fl. Br_2 u. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ reagieren mit explosiver Heftigkeit,
 rend die verd. Dämpfe wie die Lsgg. in CCl_4 ruhig u. vollständig reagieren. —
 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ reagiert mit einer Lsg. von S in organ. Lösungsmmm. langsam. Die Hauptrk.
 $2 \text{Ni}(\text{CO})_4 + 3 \text{S} \rightarrow \text{Ni}_2\text{S}_3 + 8 \text{CO}$; die Rk. ist auch nach 2 Jahren nicht voll-
 dig; ob noch Nebenrkk. stattfinden, läßt sich aus den Verss. nicht erkennen. —
 Gemisch von reinem O_2 u. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ -Dampf explodiert heftig. Bei langsamer Oxy-
 on des reinen Carbonyls oder seiner Lsg. bildet sich ein allmählich grün werdendes
 ktionsprod., das sich als Gemisch von bas. Carbonat u. *Ni-Formiat* erwies. Die
 des Nickelcarbonyls mit O_2 besteht in der Abspaltung von CO u. Oxydation des
 Scheinbar unabhängig von der Oxydation reagiert ein kleiner Teil des CO mit
 unter B. von *Ameisensäure*. Danach reagiert $\text{Ni}(\text{CO})_4$ mit den genannten Nicht-
 allen u. zweifellos mit allen Nichtmetallen ebenso, wie das Ni allein reagieren
 de. Die Carbonylgruppen werden als freies CO abgespalten. — Bzgl. der Rk.
 Grignardschem Reagens vgl. S. 2689. — Aus dem Beschriebenen geht hervor,
 im Nickelcarbonyl Ni u. CO nur lose verknüpft sind, was nur durch die sekundäre
 enz geschieht. Für die sehr flüchtigen Carbonyle $\text{Ni}(\text{CO})_4$, $\text{Co}_2(\text{CO})_8$, $\text{Mo}(\text{CO})_6$,
 $\text{Cr}(\text{CO})_6$ schlagen Vff. Strukturen vor, in denen die Elektronenkonfiguration für alle
 wesentlichen dieselbe ist, u. die der hohen Flüchtigkeit dieser Verbb. Rechnung
 gen. In jedem Falle enthält die äußerste Schale des Metallatoms 18 Elektronen,
 rend sie bei Verbb., die durch primäre Valenzen verknüpft sind, meistens nur
 lektronen enthält. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 872—82. Cambridge [Mass.],
 of Technology.) JOSEPHY.

C. M. Carson, *Basisches Stannosulfat*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **41**. 1969;
 1920. I. 728.) Vf. untersucht die Ndd., die bei der Fällung von SnSO_4 mit NaOH
 ildet werden. SnSO_4 wurde aus CuSO_4 u. Sn-Folie in schwefelsaurer Lsg. dar-
 stellt, nur rein weiße Prodd. wurden zur Rk. mit NaOH verwandt. Bei der Analyse
 getrockneten Ndd. wurde Sn als SnS gefällt u. als SnO_2 gewogen, SO_4^{--} wurde
 Filtrat des Sulfids bestimmt. Die Ndd. haben ziemlich konstante Zus., die wahr-
 einlich durch die Formel $\text{SnSO}_4 \cdot \text{SnO}$ oder $\text{SnSO}_4 \cdot 2 \text{SnO}$ mit unbekanntem W-
 halt wiedergegeben wird, je nach der Konz. des NaOH. Die Analysen der noch
 terlange enthaltenden Ndd., die schwer daraus zu entfernen ist, sind entsprechend
 rigiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 906—11. Houghton [Mich.], Coll. of
 ies.) JOSEPHY.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

M. Henglein, *Über orientierte Färbungen und Kieseinlagerungen im Fluorit und
 halten bei Bestrahlung*. Es werden die Färbungen der *Fluorite* vom oberen Wiesen-
 (südl. Schwarzwald) u. ihr Verh. bei der Bestrahlung mit verschiedenen Strahlen
 ersucht. Die Färbung ist häufig durch ineinander gestellte Würfel, deren Kanten
 itlich zu erkennen sind, verändert. Mit harten Röntgenstrahlen färben sich einige

Varietäten tief dunkelblau, andere seegrün (gelbe Eigenfarbe u. blaue „angeregt“). Außerdem enthalten sie in ihrem Innern Einschlüsse von Pyrit u. Kupferkies. Fluoreszenz anderer Herkunft zeigten bei der Röntgenbestrahlung dasselbe Verhalten. Die Blaufärbung (labile Färbung) hält sich im Dunklen, geht aber im Licht wieder zurück. *Steinsalz* wurde weingelb, *Topas* u. *Phenakit* schwach gelb, *Mondstein* gelblich braun, während *Kryolith*, *Apatit* u. *Baryt* sich nicht veränderten. Die Ursache der Färbung dürfte in den Veränderungen des Lösungszustandes zu suchen sein. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1926. 54—63. Karlsruhe.)

ENZSLIN

J. F. Schairer und **C. C. Lawson**, *Copiapit von den Santa Maria Mts., östlich Riverside Co., California*. Der gelblichbraune Copiapit ist krystallin, hat die Lichtbrechung $\beta = 1,53$ u. $\gamma = 1,57$. Aus der Analyse ergibt sich die Formel $2\text{Fe}_2\text{Si}_2\text{O}_7 \cdot 5\text{SO}_3 \cdot 19\text{H}_2\text{O}$. (Am. Mineral. 9. 242—44. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1925. I. 132—33. Ref. W. EITEL.)

ENZSLIN

L. F. Audrieth und **J. H. C. Martens**, *Antlerit von Chuquicamata, Chile*. In den Kupfererzen von Chuquicamata kommt *Antlerit* ($3\text{CuO} \cdot \text{SO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) in dünnen Adern in sereizisiertem Granit vor. Derselbe enthält zahlreiche Einschlüsse. Härte 3. Spektrographisch wurden außerdem noch etwas Si, Ti, Al, Ca, Fe u. nachgewiesen. (Amer. Mineral. 10. 161—63. 1925; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 131—32. Ref. W. EITEL.)

ENZSLIN

G. Tschernik, *Bemerkung über die chemische Zusammensetzung des Wöhlerit von Monte Chibines*. Der Wöhlerit bildet kleine, tafelförmige, citronengelbe, oft in Spalten verwachsene Krystalle. Er ist spröde, hat die Härte 6, die D. 3,48, u. ist negativ. Seine Zus. entspricht der Formel $\{12\text{R}(\text{Si}, \text{Ti}, \text{Zr})\text{O}_3 \cdot \text{R}(\text{Nb}, \text{Ta})_2\text{O}_7\} \cdot 0,05[(\text{Ce}), \text{Fe}]\text{F}_6 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, worin $\text{R} = \text{Ca}, \text{Fe}^{\text{II}}, \text{Na}_2$, u. K_2Mg sein kann. (Cr. Rend. 1923. 37—39; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 126. Ref. PETER TSCHERNIK u. WINSKY.)

ENZSLIN

G. Aminoff, *Über ein neues oxydisches Mineral aus Langban (Magnetoplumbum)*. Das neue Mineral ist stark mit kleinen Manganophyllblättchen imprägniert. Die Krystalle sind hexagonal, haben die Härte 6, die D. 5,517, sind metall. glänzend, schwarz u. werden vom Magneten stark angezogen. Ihre Zus. ist $\text{PbO } 20,02\%$, $\text{MnO } 17,58\%$, $\text{CaO } 0,36\%$, $\text{MgO } 0,48\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \ 55,43\%$, $\text{Cr}_2\text{O}_3 \ 0,05\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 \ 0,89\%$, $\text{TiO}_2 \ 4,89\%$, $\text{K}_2\text{O } 0\%$, $\text{Na}_2\text{O } 0,16\%$. (Geol. För. Förh. 47. 283—89. 1925; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 101—02. Ref. J. LEONHARDT.)

ENZSLIN

Frank L. Hess und **E. P. Henderson**, *Polykras von Brasilien*. Die Euxenitpolykrasminerale kommen in einem stark zersetzten Pegmatit in den Ausläufern der Itatiaya Assu Mts. vor u. werden in Stücken bis zu 16 kg schwer abgebaut. Die Polykras wird von Rauchquarz, Muskovit, Fuchsit u. gut krystallisiertem Euxenit begleitet. Die Zus. ist $20,31\%$ $(\text{Nb}, \text{Ta})_2\text{O}_5$, $34,41\%$ TiO_2 , seltene Erden $29,28\%$, $\text{ThO}_2 \ 5,22\%$, $\text{U}_3\text{O}_8 \ 6,48\%$, $\text{PbO } 0,64\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \ 0,78\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 \ 0,44\%$, $\text{H}_2\text{O } 2,04\%$. Die Lichtbrechung 2,248 (?). Spektroskopisch wurde außerdem noch Sn nachgewiesen, während Ge, Sc u. Zr vollkommen fehlen. Das Alter des Minerals berechnet sich auf $66 \cdot 10^8$ Jahre, was etwa devonischer Entstehung entsprechen würde. (Journ. Frank. Inst. 200. 235—38.)

ENZSLIN

T. L. Walker und **A. L. Parsons**, *Hatchettolit und vergesellschaftete Minerale von Hybla, Ontario*. (Vgl. S. 1788.) Das Mineral kommt zusammen mit Mikroklinoit, Plagioklas, Cyrtolith, Columbit u. Granat in einem Pegmatit vor. Es ist schwarz u. bildet dichte MM. Lichtbrechung $> 1,74$, beinahe isotrop. Die Zus. entspricht der Formel $\text{RO} \cdot (\text{Nb}, \text{Ta})_2\text{O}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$, worin RO hauptsächlich CaO ist. (Contrib. Canad. Miner. 1923. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. No. 16. 21—24. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. 1926. I. 128—29. Ref. W. EITEL.)

ENZSLIN

- E. Dittler**, *Neue Mineralanalysen*. Es werden neue Vollanalysen von *Talk*, *ourit*, *Mikroklinperthit* u. *Albit* angegeben. (Tschermin. u. petrogr. Mitt. **36**. -16. 1923; N. Jahrb. f. Mineral. Abt. A. **1926**. I. 123. Ref. R. BRAUNS.) ENSZ.
- A. F. Hallimond**, *Die Konstitution von Glaukonit*. (Vgl. Mineral. Magazine **19**. C. **1923**. III. 111.) Vf. wendet sich gegen die von FERMOR (Rev. Geol. Surv. **58**. 330 [1925]) vorgeschlagene Formel für *Glaukonit*, da die einzelnen Analysen stark von diesem Mittelwert abweichen. (Nature **117**. 453.) JOSEPHY.
- A. N. Winchell**, *Chlorit als ein mehrkomponentiges System*. Der *Chlorit* ist ein 6 oder 7 Komponenten zusammengesetztes System, von denen meistens aber 4 anwesend sind. Als Bausteine können auftreten *Antigorit* ($H_4Mg_3Si_2O_9$), *Amesit* ($lg_2Al_2SiO_9$), sowie *Ferroantigorit* ($H_4Fe_3^{II}Si_2O_9$), *Daphnit* ($H_4Fe_2^{II}AlSiO_9$), *Cronit* ($H_4Fe_2^{II}Fe_2^{III}SiO_9$), *Magnesia-Cronstedtit* ($H_4Mg_2Fe_2^{III}SiO_9$) u. *Kämmererit* ($lg_2Cr_2SiO_9$). Es werden die Analysen von Chloriten von diesen Gesichtspunkten geordnet. Dadurch ergeben sich Beziehungen zu den opt. Eigenschaften der *rite*, außerdem ergibt sich eine Neuordnung dieser Klasse. (Amer. Journ. Science, IMAN [5] **11**. 283—300. Madison, Wisconsin, Univ.) ENSZLIN.
- J. F. Schairer** und **C. C. Lawson**, *Über den Pickeringit von Portland, Connecticut*. Der *Pickeringit* wurde in einem Steinbruch bei Portland in sehr reiner Form weiße Nadeln gefunden. Seine Doppelbrechung ist sehr gering. Sie schwankt wenig um 1,485. Seine Zus. ist. $MgSO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 22 H_2O$. Der Wassergehalt stimmt auch gut mit dem des künstlichen $MnSO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 22 H_2O$ überein, welches falls in diese Klasse der *Halotrichite* gehört. (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [1. 301—04. New Haven, Conn. Yale Univ.) ENSZLIN.
- Arthur Holmes**, *Blei in Gesteinen, Blei in Erzen und das Alter der Erde*. Vf. röhnet, daß, wenn alles Blei in feurigen Gesteinen radioakt. Ursprungs wäre, wie SELL annimmt, das Alter der Erde 3200 Millionen Jahre betragen müßte. Da bei der Unters. radioakt. Mineralien das Alter der Erde zu höchstens 1600 Millionen en bestimmt wurde, kann nur die Hälfte des Bleis der feurigen Gesteine radioakt. rungs sein. Dann kann auch das Erzblei nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, Konz. des Bleis der feurigen Gesteine sein. Wenigstens der größere Teil des Pb Erzablagerungen müßte schon bestanden haben, als U u. Th Pb zu erzeugen been. (Nature **117**. 482. Durham, Univ.) JOSEPHY.
- B. Stöckes**, *Über das Goldvorkommen von Bytitz*. Beschreibung der geolog. u-graph. Beschaffenheit des Granits u. seiner Spaltungsprodd., welche die Träger Goldgehalts sind. (Rozprawy. C. Ak. **26**. No. 44. Sep.; N. Jahrb. f. Mineral. A. **1926**. I. 147. Ref. F. ULRICH.) ENSZLIN.
- J. Kuntz**, *Die Kupfergrube von Potrerillos der Andes Copper Mining Co*. Beschreibung der Kupferkieslagerstätte, ihrer Lagerung, ihrer Vorräte u. ihres Abbaus. all u. Erz **23**. 173—76. Santiago, Chile.) ENSZLIN.
- A. Roccati**, *Der Kaolin von Bettola an der Westseite des M. Fenera (Sesiat)*. S. 2787.) (Boll. soc. geol. It. **41**. Fasc. 3. 180—89. 1922; N. Jahrb. f. Mineral. A. **1926**. I. 188—90. Ref. K. WILLMANN.) ENSZLIN.
- Horace Freeman**, *Entstehung der sulfidischen Erze*. Erwiderung auf die Kritiken HIXON, PLATTS, CARPENTER u. DRAPER (vgl. S. 2562.) (Eng. Mining Journ.-**121**. 571—72.) ENSZLIN.
- W. O. George**, *Die Beziehung der physikalischen Eigenschaften natürlicher Gläser zur chemischen Zusammensetzung*. Es werden die physikal. Eigenschaften von natürl. Gläsern bekannter Zus. beschrieben. Mit Abnahme des Gehalts an SiO_2 die D. von 2,15 auf 3 ziemlich geradlinig an, ähnlich verhält sich die Kurve ten Gehalt an K_2O u. die D. Die Kurven für Fe u. Ca u. die D. sind schwach mig gekrümmt. Entsprechend ist der Verlauf der Kurve der chem. Zus. u. der brechung. Es lassen sich so aus der D. u. der Lichtbrechung Schlüsse auf die

u. *Triphenylcarbinol* mit Erfolg reduziert. — *Benzalacetophenon* gibt bei der mit VSO_4 zwei stereoisomere Verbb. von F. 266° u. 194°, die *Dibromverbb.* geben. α,δ -*Dibenzoyl- β,γ -diphenylbutan*, $\text{C}_{30}\text{H}_{26}\text{O}_2$, F. 194°. Mit Br_2 in Eg. bei 80–90° HBr-Entw. entsteht ein Dibromderiv., $\text{C}_{30}\text{H}_{22}\text{OBr}_2$, F. 171°. — *2,4,5-Triphenylzoylcyclopenten-(1,2)*, $\text{C}_{30}\text{H}_{24}\text{O}$. Aus der Verb. vom F. 194° durch Erhitzen mit Na, F. 123°. Durch Red. mit Zn u. Essigsäure entsteht das *2,4,5-Triphenylzoylcyclopentan*, $\text{C}_{30}\text{H}_{26}\text{O}$, F. 148–151°. — Red. von *Anisaldehyd* mit CrCl_2 gab *droanisoin*, F. 101°. — *Benzaldehyd* wurde mit VSO_4 zu 90% reduziert zu *Hydrovin*, *i-Hydrobenzoin* u. *Benzil*. — *Acrolein* gab mit VSO_4 bei Ggw. von ZnSO_4 (9%) *Divinylglykol* u. ein Öl vom Kp. 166–167° unbekannter Konstitution der Zus. $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_3$. — Red. von *Crotonaldehyd* mit VSO_4 gab neben *Dipropionl* (18%) ein Öl mit Kp. 140–165°, in dem keine monomolekularen Red.-Prodd. gewiesen werden konnten. — *Zimtaldehyd* gab neben viel unverändertem Aldehyd *enylvinylglykol* vom F. 154°. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1016–30. Cambridge, Mass. Univ.)

BRAUNS.

H. Shipley Fry und **Else L. Schulze**, *Die Abspaltung von Wasserstoff aus Kohlenverbindungen. II. Die Umsetzung von Äthylalkohol, Acetaldehyd und Aceton mit molzenen kaustischen Alkalien.* (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2268; **44**. II. 2828.) In Fortsetzung ihrer Verss. über die Abspaltung von H_2 aus Kohlenverbb. lassen Vff. *Äthylalkohol*, *Acetaldehyd* u. *Aceton* auf geschmolzenes KOH + H bei 250–358° einwirken u. finden, daß *Äthylalkohol* hauptsächlich nach


1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{NaOH} = \text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na} + 2 \text{H}_2$
2. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na} + \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CH}_4$
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 6 \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Na}_4\text{CO}_4 + 6 \text{H}_2$
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} = \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$
5. $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{NaOH} = \text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na} + \text{H}_2$
6. $\text{CH}_3\text{CHO} + 2 \text{NaOH} = \text{H}_2 + \text{CH}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$
7. $\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{NaOH} = \text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na} + \text{CH}_4$
8. $\text{CH}_3\text{COCH}_3 + 2 \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2 \text{CH}_4$

hung 1.–4. reagiert. — *Acetaldehyd* wurde bei 250° vollständig nach 5 zersetzt. Rk.-Prodd. konnten in Ausbeute von 90% erhalten werden. Bei 300–350° entl. CH_4 nach 6. — Die *Aceton*zers. war der des Aldehyds analog. Bei 250° wurde u. 70% Acetat u. CH_4 (7.) gebildet, bei 350° verlief sie zu 90% nach 8. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 958–68. Cincinnati, Univ.)

BRAUNS.

Ad. Grün und **Richard Limpächer**, *Über den Verlauf der Substitutionsreaktionen halogenhydrinen.* (I. Mitteilung.) Vff. untersuchen die Rk. zwischen *Glycerinhalogenhydrin* u. *fettsauren Salzen*. *Glycerin- α -monoiodhydrin* u. *Kaliumstearat* reagieren bei 100° innerhalb 2 Stdn. zu über 80%. Aus den Rk.-Prodd. konnten fast reines Monostearin isoliert werden, das mit dem von FISCHER, BERGMANN u. VIND (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. 1589; C. **1920**. III. 825) aus Stearylacetonrin erhaltenen α -Monostearin ident. ist. Zur Konstitutionsbest. wurde die Verb. Aceton kondensiert u. das gebundene Aceton quantitativ bestimmt (vgl. folgendes). Da sich die aus Stearylacetonglycerin dargestellten Monostearinpräparate zu acetonieren ließen, so kann die untersuchte Verb. als reines α -Monostearin annehmen u. auch alle übrigen, nach der Methode von KRAFFT (vgl. Ber. Dtsch. Chem. **36**. 4339; C. **1904**. I. 433) u. von GUTH (vgl. Ztschr. f. Biol. **44**. [N. F.] **26**. I. 78; **103**. I. 133) dargestellten Monoglyceride als α -Isomere aufgefaßt werden. Dieser schluß trifft jedoch nur zu, wenn nur ein α -Monoglycerid als 1,2-Glykol mit Aceton ert. — Neben α -Monostearin wurden bei obenerwähnter Rk. freie *Stearinsäure* u. neutrale Verb. $\text{C}_{42}\text{H}_{82}\text{O}_7$ isoliert, die entweder Distearylidglycerin (I) ist oder eine mol. Mischung bezw. eine Additionsverb. aus *Stearylglycid* (II) u. *Monostearin*. die B. von Glycid (15%) wurde nachgewiesen. Aus Verss. mit Silberstearat

geht hervor, daß das primär entstandene Glycid nur zum geringeren Teil in Monostearin übergeht. Diese Verb. scheint durch direkten Austausch von J gegen die Acyloxygr gebildet zu werden.



Versuche. Geschmolzenes Glycerin- α -monoiodhydrin wird in Anteile auf 100° vorgewärmtes Kaliumstearat eingetragen u. 2 Stdn. bei 100° gehalten. Ä. *Monostearin* beim raschen Abkühlen glänzende Blättchen vom F. 73,4—73,9°. Krystallform u. die FF. variieren mit der Art des Lösungsm. u. der Geschwindigkeit der Ausscheidung. Aus den Mutterlaugen krystallisiert ein Gemisch von *Stearinsäure* u. *Distearinsäureester des Diglycerins*. Letztere Verb. krystallisiert aus Ä.-PAe. F. 70,5—71,3°. — Geschmolzenes Glycerin- α -iodhydrin u. vorgewärmtes Silberstearat ergaben nach kurzer Zeit bei der Extraktion mit CH_3OH bei —20° *Stearinsäure*. der Mutterlauge wurde Glycid vom Kp.₁₅ 61,2—61,4° abdestilliert. Bei längerer Dauer findet nur geringe B. von Monostearin statt. Für die präparative Darstellung von Monoglyceride kommt folglich die Verwendung von Ag-Salzen der Fettsäuren an der Alkalisalze nicht in Betracht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 690—95. Auss. d. Elbe.)

BEREN

Ad. Grün und Richard Limpächer, *Quantitative Bestimmung der Acetonierung und der Acetonierung mehrwertiger Alkohole. I. Glycerinderivate.* (Vgl. vorst. Aus Acetonglycerin u. seinen Derivv. kann bei bestimmten Rk.-Bedingungen Aceton quantitativ abgespalten u. jodometr. bestimmt werden. (Vgl. MESSING, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 21. 3366 [1888].) Auch bei Ggw. anderer Glyceride ist quantitative Acetonierung der α -Monoglyceride sowie vollständige Entfernung überschüssigen freien Acetons möglich, so daß nach Spaltung der Acetonverb. freie Aceton titriert werden kann. Der prakt. konstante Fehlbetrag von 3% kann durch einen Korrekturfaktor ausgeglichen werden. — Von 4 nach verschiedenen Methoden dargestellten *Monostearin*-Präparaten reagierte nur die aus Glycerin- α -iodhydrin mit Kaliumstearat dargestellte Verb. quantitativ; die anderen besaßen einen Acetonierungsgrad von ca. 90%. — Vff. schließen aus ihren Beobachtungen, daß die β -Monoglyceride zum mindesten weniger leicht in Rk. treten als die α -Isomeren.




Versuche. Die Analysen von *Acetonglycerin*, *Carbäthoxyacetonglycerin*, *Stearacetonglycerin* u. *Laurylacetonglycerin* ergaben die quantitative Abspaltbarkeit der gebundenen Acetons. Als günstigste Rk.-Bedingungen bei der Acetonierung wurden folgende ermittelt: Vermehrung des Überschusses an aceton. HCl auf das 2 $\frac{1}{2}$ -fache des bisher angewendeten, Erniedrigung der Rk.-Dauer auf 2 Stdn. u. Erhöhung Temp. auf 30—33° bei Monostearin, bei Monolaurin 20—23°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 695—704. Aussig a. d. E.)

BEREN



D. Holde und N. N. Godbole, *Zur Kenntnis der höchstmolekularen gesättigten Säuren des Erdnußöles.* (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 46. 129—30. 145—46. bis 165. 179—80. Berlin, Techn. Hochschule. — C. 1926. I. 1795.)

HELLER

E. P. Kohler und F. R. Butler, *Die relative Leichtigkeit von 1,4- und 1,6-Addition.* In Wiederholung der Verss. von VORLÄNDER (LIEBIGS Ann. 345. 219; C. 190. 1494) lassen Vff. Na-Malonmethylester auf *Vinylacrylsäuremethylester* u. *Sorbinsäuremethylester* einwirken u. finden, daß die Rk. reversibel ist (I.). Sie führt zur B. von 1,6-Additionsprodd.:





Bei der Einw. von Phenyl-MgBr auf diese Ester bilden sich in erster Stufe die prechenden Ketone (II.), wahrscheinlich als Ergebnis einer 1,2-Addition, die mit weiterem Phenyl-MgBr unter B. von 1,4-Additionsprodd. reagieren (III.).



β -Phenylcinnamylidenessigsäure, welche der B. von 1,4- u. 1,6-Additionsverb. fähig ist, reagiert nicht mit Na-Malonester u. bildet mit Phenyl-MgBr einen ären Alkohol. Das Ausbleiben von 1,6-Additionsprodd. bei der irreversiblen Phenyl-MgBr-Addition in dem für sie so günstigen Fall u. der leichten B. von 1,2- u. 1,4-Additionsverb. bringen Vff. zu dem Schluß, daß in von Natur aus langen ungetrigerten Systemen 1,4-Additionen leichter stattfinden als 1,6-Addition. — *Acrylsäure*, $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$, F. 72°. *Methylester*, $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$. Aus dem Ag-Salz. Kp. 25°. Einw. von Na-Malonester gab *Penten-3-tricarbonsäuremethylester-1,1,5,5* (vgl. I.). Kp. 147—150°. Liefert bei Einw. von O_3 u. Zers. der Ozonide *Aldehyd* u. ein Gemisch von Aldehydsäuren u. Estern, die nach Oxydation u. Ver. *Malonsäuremethylester* (aus β -Oxoäthan- α -carbonsäure) u. *Äthantricarbonsäuremethylester* (aus γ -Oxopropan- α,α -dicarbonsäure) geben. 1,4-Addition hätte *Formylid* u. Tricarbaldehydsäure geben müssen. — *Sorbinsäuremethylester*, $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_2$. Kp. 85°. Gibt mit Na-Malonsäuremethylester *2-Methylpentan-1,1,5,5-tricarbonsäuremethylester*, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_8$, Kp. 155°, Kp. 23 185°. Gibt mit O_3 u. Zers. der Ozonide *Acetylid*, *Malonsäuremethylester* u. *Propan-1,1,2-tricarbonsäuremethylester*, $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}_6$. Kp. 131°. *Hydrazidderiv.*, $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_6$, F. 208° (unter Zers.). — *Hydrazid der Triallylsäure*, $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_6$, F. 183—186°. Hydrolyse des Propan- α,α,β -tricarbonsäuremethylesters gab *Methylbernsteinsäure*, diese ein Monoanilid vom F. 144° u. ein *p-toluidid* vom F. 160°. Der Tricarbonsäureester kann nur durch 1,6-Addition entstanden sein. Als Nebenprod. wurde in sehr geringer Menge eine Verb. vom Kp. 167° isoliert, deren Analyse auf $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_7$ stimmt u. ein γ -Oxopropan- α,α,β -tricarbonsäuremethylester sein kann, der aus einem 1,4-Additionsprodd. entstanden sein te. — Einw. von Phenyl-MgBr auf Vinylacrylester gab β -Phenyl- β -vinylphenon, $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}$, Kp. 190°. Oxydation gab α -Phenyl- β -benzoylpropionsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_3$, F. 151°. — β -Phenylcinnamylidenessigsäuremethylester, $\text{C}_{13}\text{H}_{16}\text{O}_2$, F. 49°, 2 Moll. Phenyl-MgBr u. gibt nach der Zers. *1,3,5,5-Tetraphenylpentadien-(1,3)-ol-5*, $\text{C}_{24}\text{H}_{20}$, F. 121°. Gibt beim Sättigen seiner methylalkoh. Lsg. mit HCl-Gas *Triphenylallen*, $\text{C}_{20}\text{H}_{12}$, F. 158°, das von O_3 in Benzoesäure u. Benzophenon gespalten wird. (Amer. Chem. Soc. 48. 1036—48. Cambridge, Mass.)

BRAUNS.


C. R. Noller und Roger Adams, *Darstellung und Verwendung von Aldehydestern*, durch Ozonisierung der Methylester verschiedener ungesättigter Säuren entstehen. Andere Forscher haben Aldehydestern aus ungesätt. Säureestern mit O_3 nur in geringen Mengen u. meistens nicht rein erhalten. Vff. stellten die *Methylester der θ -Oxo- α -carbonsäure I* aus dem Ölsäuremethylester, der *ν -Oxononan- α -carbonsäure II* aus dem Undecylensäuremethylester u. der *μ -Oxododecan- α -carbonsäure III* aus dem Tridecylensäuremethylester dar.



Bei der Zers. der Ozonide mit Zn-Staub u. W. erhalten sie eine Ausbeute von 55—60%. Aldehydestern, besonders III, oxydieren sich leicht an der Luft. I polymerisiert leicht zu einem trimeren Prod. Einw. von *n-Butyl-MgBr* auf I gibt *θ -Oxytridecan-1-ol* IV, die mit PBr_3 die *θ -Bromtridecansäure* gibt. Diese spaltet mit alkoh. HBr ab unter B. eines Gemisches von Olefinsäuren, das mit H_2 u. Pt zu *Tri-*

decan-säure hydriert wird. Diese gleiche Reaktionsfolge wurde zur Darst. einer *anderer Oxy- u. unsubstituierter Säuren* verwandt. *ϑ-Oxo-octan-α-carbonsäuremethylester*, $C_9H_{18}O_3$, I, Kp.₃ 111—112° (korr.), $n_D^{20} = 1,4384$, $D_4^{20} 0,9704$. *Semicarbazon*, $C_{10}H_{21}O_3N_3$, F. 104—105° (korr.). — *ι-Oxononan-α-carbonsäuremethylester*, $C_{11}H_{20}O_3$ (II), Kp.₃ 120—121° (korr.), $n_D^{20} = 1,4410$, $D_4^{20} 0,9663$. *Semicarbazon*, $C_{12}H_{23}O_3N_3$, F. 98—100° (korr.). (HARDING, WALSH u. WEIZMANN, Journ. Chem. Soc. London **99**, 448; C. **1911**, I, 1348, fanden 94—96°). — *μ-Oxododecan-α-carbonsäuremethylester*, $C_{14}H_{26}O_3$ (III), F. 19—20°, Kp.₃ 152—153, $n_D^{20} = 1,4469$, $D_4^{20} 0,9316$. *Semicarbazonverb.* $C_{26}H_{29}O_3N_3$, F. 116,5—117,5° (korr.). *Trimerer ϑ-Oxo-octan-α-carbonsäuremethylester*, $C_{30}H_{54}O_9$. Aus dem Dest.-Rückstand von I. Krystalle aus F. 34—36° (korr.). — *Trimere ϑ-Oxo-octan-α-carbonsäure*, $C_{27}H_{48}O_9$. Krystalle aus Aceton, F. 112—113° (korr.). — *Azelainsäuremonomethylester*, $C_{10}H_{18}O_4$. Aus I d. Oxydation an der Luft, F. 22—24° (korr.), Kp.₃ 158,5—159,5° (korr.), $n_D^{25} = 1,4410$, $D_4^{25} 1,0348$. Verseifung gibt Azelainsäure vom F. 106—106,5°. — *Sebacinsäuremethylester*, $C_{11}H_{20}O_4$. Aus II, F. 40—41° (korr.). Gibt *Sebacinsäure* vom F. 133—134° (korr.). — *Brassylsäuremonomethylester*, $C_{14}H_{26}O_4$, F. 57—57,5°. Gibt *Brassylsäure* vom F. 112—113° (korr.). — *ϑ-Oxydodecan-α-carbonsäuremethylester*, $C_{14}H_{26}O_4$. Aus n-Butyl-MgBr u. I, Kp.₃ 154—155° (korr.), $n_D^{20} = 1,4490$, $D_4^{20} 0,9316$. D. Verseifung entsteht die *ϑ-Oxydodecan-α-carbonsäure*, $C_{13}H_{26}O_3$, F. 49—51°. *decan-α-carbonsäure*, $C_{13}H_{26}O_2$, F. 42—42,5° (korr.). (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**, 1074—80. Urbana [Ill.].) BRAUN

C. R. Noller und Roger Adams, *Synthese der Dihydrochaulmoograsäure und der Dihydrohydnocarpsäure*. II. (Vgl. vorst. Ref.) In einer früheren Arbeit haben SHRIFF u. ADAMS (vgl. S. 892) gezeigt, daß die *Chaulmoograsäure* u. die *Hydnocarpsäure* tautomere Verbb. sind. Durch Hydrierung beider Säuren fanden sie, daß der *Chaulmoograsäure* die Formel I, der *Hydnocarpsäure* II zukommt. Durch Synthese der beiden Hydrosäuren wurden diese sichergestellt. Durch Einw. von Cyclopentyl-MgBr auf *μ-dodecan-α-carbonsäuremethylester* erhaltene *μ-Cyclopentyl-μ-hydroxytridecan-carbonsäuremethylester* III wird mit PBr₃ in den Bromester übergeführt, dieser mit alkoh. KOH die *μ-Cyclopentyltridecylensäure* IV u. diese mit H₂ u. Pt in die *Dihydrochaulmoograsäure* übergeführt. Die Synthese der *Dihydrohydnocarpsäure* gelang auf folgende Weise. Das durch Einw. von *Cyclopentyl-MgBr* auf *Formaldehyd* erhaltene *Cyclopentylcarbinol* wird in das Bromid, dieses in die MgBr-Verb. übergeführt u. diese mit *ι-Oxononan-α-carbonsäuremethylester* in Rk. gebracht. Der entstandene *κ-Cyclopentyl-ι-dodecan-α-carbonsäuremethylester* V wird wie vorher in die *Dihydrohydnocarpsäure*



wandelt. Die Ausbeute an V beträgt nur 10%. Als Nebenprod. wurden *μ-dodecan-α-carbonsäuremethylester* u. das *Pinakolin* des *μ-Oxododecan-α-carbonsäuremethylesters* VI, der nach dem Verseifen die entsprechende Säure gab, gewonnen. Zum weit. Vergleich der synthetisierten Säuren wurden noch ihre *Amide* dargestellt, die mit *Amiden* aus den Naturprodd. keine F.-Erniedrigung gaben. *Cyclopentanon*, C_5H_8O , Kp. 129° (korr.), $n_D^{20} = 1,4370$, $D_4^{20} 0,9502$. — *Cyclopentanol*, $C_5H_{10}O$, Kp. 139—140° (korr.), $n_D^{20} = 1,4530$, $D_4^{20} 0,9488$. — *Cyclopentylbromid*, C_5H_9Br , Kp. 135—136° (korr.), $n_D^{20} = 1,4882$, $D_4^{20} 1,3900$. — *Cyclopentylcarbinol*, $C_6H_{12}O$, Kp. 162—163° (korr.), $n_D^{20} = 1,4882$, $D_4^{20} 1,3900$.

), $n_D^{20} = 1,4579$, $D_4^{20} 0,9313$. — *Cyclopentylmethylbromid*, $C_6H_{11}Br$, Kp.₁₇ 56°.
 70. — *Cyclopentylpropanol*, $C_8H_{16}O$, Kp.₆ 85–86° (korr.), $n_D^{20} = 1,4590$; D_4^{20} 0,9313.
 7. *Phenylurethanverb.*, $C_{15}H_{21}O_2N$, F. 55–55,4° (korr.). — μ -*Cyclopentyltridecansäuremethylester*, $C_{19}H_{36}O_3$ (III), Kp.₄ 205–210°, F. 29–29,5° (korr.). — *Cyclopentyl- μ -oxytridecansäure*, $C_{18}H_{34}O_3$, F. 70,5–71° (korr.). — *Oxytridecansäuremethylester*, $C_{13}H_{26}O_3$, F. 38–40° (korr.). — *Phenylurethanverb.*, $C_{21}H_{32}O_4N$, F. 55–74° (korr.). — μ -*Oxytridecansäure*, $C_{13}H_{26}O_3$, F. 77–77,5° (korr.). — *Pinalinderiv. des λ -Aldehydododecansäuremethylesters*, $C_{26}H_{54}O_6$ (VI), F. 58–59,5° (korr.). — *Polinderiv. der Aldehydododecansäure*, $C_{26}H_{50}O_6$, F. 59–65°. — κ -*Cyclopentyltridecansäuremethylester*, $C_{17}H_{32}O_3$ (V), Kp.₃ 175–180°. — κ -*Cyclopentyltridecansäure*, $C_{16}H_{30}O_3$, F. 60–60,5° (korr.). — μ -*Cyclopentyltridecansäure*, $C_{16}H_{30}O_3$, F. 70–71° (korr.). — μ -*Cyclopentylundecansäure*, $C_{16}H_{30}O_2$, F. 63–63,5° (korr.). — μ -*Cyclopentyltridecansäureamid* (*Dihydrochaulmoograsäureamid*), $C_{18}H_{35}ON$, F. 55–106° (korr.). — *Cyclopentyltridecansäureamid* (*Dihydrohydnocarpsäureamid*), $C_{18}H_{35}ON$, F. 114–115° (korr.). (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1080–89. Urbana, Ill.)

BRAUNS.

J. S. Hiers und Roger Adams, *Synthese von Homologen der Dihydrochaulmoograsäure*, die an Stelle der Cyclopentyl- eine Cyclohexylgruppe enthalten. III. (Vgl. vorst. Ref.) DEAN u. WRENSHALL u. SCHÖBL (Philippine Journ. Science **25**. 123. 135; C. **1924**. IV. 2762) fanden, daß *Dihydrochaulmoograsäure* wirksam gegen Lepra Bakterien ist. Vf. stellten auf gleiche Weise wie die *Dihydrochaulmoograsäure* die *Cyclohexylundecansäure* u. die *Cyclohexyltridecansäure* dar, um sie auf die Wirkung gegen Lepra zu untersuchen. Das zur *Cyclohexylundecansäure* nötige *Cyclohexyläthanol* wurde durch Einw. von *Cyclohexyl-MgBr* auf Äthylenoxyd erhalten. — *Cyclohexyläthanol*, $C_8H_{16}O$, Kp.₅ 86–89°, Kp.₁₀ 98–101°, $n_D^{25} = 1,4698$; $D_4^{25} 0,9165$. — *Cyclohexyläthylbromid*, $C_8H_{15}Br$, Kp.₆ 70–71°, $n_D^{25} = 1,4888$, $D_4^{25} 1,2069$. — *Cyclohexyl- β -hydroxyundecansäure*, $C_{17}H_{32}O_3$, F. 76–77°. — κ -*Cyclohexylundecansäure*, $C_{17}H_{32}O_2$, F. 58–59°. — μ -*Cyclohexyl- μ -hydroxytridecansäure*, $C_{19}H_{36}O_3$, F. 72–73°. — μ -*Cyclohexyltridecansäure*, $C_{19}H_{36}O_2$, F. 63–64°. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1089–93. Urbana, Illinois.)

BRAUNS.

Hans Heinrich Schlubach, *Über die isomere linksdrehende Acetochlorglucose*. W. KÖNIGS u. E. KNORR (vgl. Sitzungsber. Bayr. Akad. d. Wissensch. **30**. 105; C. **1900**. II. 179) setzt sich die gewöhnliche rechtsdrehende *Acetobromglucose* mit $AgCl$ in wässriger Lösung unter passenden Rk.-Bedingungen in es Vf. gelungen, die sich hierbei aus der *linksdrehenden Acetochlorglucose* zu isolieren. In Lsg. wandelt sie sich äußerst leicht in die rechtsdrehende Verb. um. Diese ungewöhnliche Unbeständigkeit veranlaßte die Beobachtung aller notwendigen Vorsichtsmaßregeln bei der präparativen Darst. Aus besonders vorbehandeltem Ä. krystallisiert sie in harten Nadeln vom Schmp. –100°. In CCl_4 , Bzl. u. Ä. ist die Verb. recht stabil, in $CHCl_3$ dagegen steigt die Löslichkeit innerhalb 24 Stdn. von –13,0 auf +80°. Vf. vermutet, daß die Substanz Spuren des rechtsdrehenden Isomeren (+165,8°) enthält u. deshalb die ermittelten Drehungen noch etwas zu hoch sein dürften. $[\alpha]_D^{17} = -24^\circ$ (CCl_4 ; $c = 1,000$) reicht mit dem Wert von C. S. HUDSON (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 475; C. **1924**. II. 2100) fast genau heran. — Vf. bezeichnet die neue Verb. als β -*Acetochlorglucose*. Für den Vorgang der Waldenschen Umkehrung ergeben sich aus dem Verlauf, der zu dieser Verb. führt, neue Gesichtspunkte. Die hierbei stattfindende Umlagerung paßt in das von B. HOLMBERG (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 125; C. **1926**. I. 2327) auf Grund seiner Einführung des Begriffes „Rk.-Distanzen“ gegebene Schema. Die Distanz der heteropolaren Bindung $Cl \leftrightarrow Ag$ ist demnach größer als diejenige der weniger heteropolaren Bindung $C \leftrightarrow Br$ anzunehmen; daher findet die Umlagerung statt. — Die Unters. der weniger empfindlichen β -*Acetochlorfructose* ergeben, daß die Rk. von KÖNIGS u. KNORR zu reinen Derivv. der α -Reihe führt.

Versuche. Die Einw. von PCl_5 u. AlCl_3 auf Tetracetylglucose ergibt ein Sirup von $[\alpha]_D^{20} = +63,3^\circ$ (Chlf.), dessen Gehalt an β -Acetochlorglucose durch die von KÖNIGS u. KNORR bestimmt wird. Wenn diese Verb. hierbei α -Methylglucose gibt, so folgt aus den opt. Bestst., daß im Ausgangsmaterial 9,6% α -Methylglucose also mindestens die gleiche Menge β -Acetochlorglucose enthalten ist. — Die n. FISCHER (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **49**. 584; C. **1916**. I. 738) hergestellte *Acetobromglucose* wurde mehrfach aus Ä. umkrystallisiert, zum Schluß aus besonders gereinigtem Ä. u. 24 Stdn. im Hochvakuum unter Lichtabschluß getrocknet. Die Darst. des Ä. u. Reinigung des Ä. erfolgt ebenfalls unter besonderen Vorsichtsmaßregeln. 9 g Acetobromglucose wurden mit dem aus 20 g AgNO_3 erhaltenen AgCl in ca. 50 ccm Ä. 5 Stdn. bei Feuchtigkeitsausschluß unter Rückfluß gekocht. Nach ca. $\frac{1}{2}$ Stde. begann B. von AgBr . Filtriert, 2-mal mit Ä. gewaschen, Auszüge im Vakuum stark eingeev. u. über Nacht bei -10° stehen gelassen. Es schieden sich 2,5 g harte Krystalle v. F. $94-95^\circ$ ab. $[\alpha]_D = +8,6^\circ$ (Chlf.). Durch mehrmaliges Umlösen aus reinem Ä. Erhöhung des F. auf $99-100^\circ$.

$[\alpha]_D^{17} = -13,0^\circ \rightarrow +81,2^\circ$ nach 24 Stdn. (Chlf.)

$[\alpha]_D^{17} = -24,0^\circ \rightarrow -10,0^\circ$ nach 6 Tagen (CCl_4).

(Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 840—44. München, Akademie d. Wissensch.) BERENSON



Hans Heinrich Schlubach und Heinz von Bomhard, *Zur Konstitution der h-Glucose*. (Vgl. vorst. Ref.) *2,3,6-Trimethylglucose* (vgl. IRVINE u. HIRST, Journ. Chem. Soc. London **121**. 1221; C. **1922**. III. 1331) u. kalte, 0,25%ig. methylalk. HCl gibt ein *Trimethylmethylglucosid*-Gemisch von -36° , ein Wert, der noch unterhalb des von SCHLUBACH u. MOOG für reines *2,3,6-Trimethyl- β -methylglucosid*, -34° gefundenen liegt. Während des Kondensationsprozesses muß also eine Verschiebung der O-Brücke eingetreten sein, da das neue Methylglucosidgemisch sich von einer anderen niedriger drehenden Form der Glucose ableiten muß. Da eine Methylwanderung bei den milden Rk.-Bedingungen nicht eingetreten ist, so ist bei der *2,3,6-Trimethylglucose* ein Umspringen der O-Brücke vom C-Atom 4 nach 5 anzunehmen. Da die dem *h-Methylglucosid* von E. FISCHER gewonnene *Tetramethyl-h-glucose* mit der aus oben beschriebenen Prod. gewonnenen ident. ist, so folgt auch für das *h-Methylglucosid* die 1,5-Sauerstoffbrücke. Die nachgewiesene leichte Umwandlung der *2,3,6-Trimethylglucose* in ein Deriv. der *h-Glucose* erklärt eine Reihe von Unstimmigkeiten der Chemiker der Stärke. — Die neue, von PRINGSHEIM (vgl. S. 3027) aufgefundenene *h-Glucose* einer 1,6-Sauerstoffbrücke bezeichnet Vf. als Heteroglucose 2 (h_2). Sollte sich die Annahme von HAWORTH (vgl. S. 881), daß die gewöhnliche Glucose eine 1,5-Sauerstoffbrücke besitzt, bestätigen, so folgt für die h_1 -Glucose dann eine 1,4-Sauerstoffbrücke.

Versuche. Das durch Kondensation der *2,3,6-Trimethylglucose* mit CH_3 entstandene *Trimethylmethylglucosid* wurde methyliert u. ergab dann bei der Hydrolyse mit HCl *Tetramethyl-h-glucose* von $[\alpha]_D^{17} = -23,6^\circ$ (Chlf.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 845—48. München, Akademie d. Wissensch.) BERENSON

Alfred Georg und Amé Pictet, *Synthese der Gentiobiose*. Vff. acetylieren nach FISCHER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **23**. 3687) bei der Darst. der Isomaltose erhaltenen Sirup u. trennen das Acetylierungsprod. durch fraktioniertes Lösen in H_2O in das *Acetat* der *Isomaltose* vom F. $72-77^\circ$ u. in ein *Acetat* vom F. 195° , das der *β -Octacetylgentiobiose* ident. ist. Das Verseifungsprod. gibt eine *Phenyllosazon* v. F. $163-164^\circ$ (ZEMPLÉN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **48**. 233; C. **1915**. I. 528, fand bis 170° , HAWORTH u. WYLAM, Journ. Chem. Soc. London **123**. 3120; C. **1924**. 1508, fand $162-167^\circ$), das mit einem aus Gentiobiose bereiteten Osazon keine Färbungsniedrigung gibt. (Helv. chim. Acta **9**. 444—445. Genf, Univ.) BRAUN

Amandus Hahn, W. Laves und L. Schäfer, *Über synthetische Glykoside Pyrimidinderivaten*. II. Mitt. *Synthese des i-Cytosin-d-glykosids*. (I. vgl. S. 21) *i-Cytosin-d-glykosid* (I) wurde aus *i-Cytosin* genau wie die Methylverb. erhalten.

β -Glykosid, da es von Emulsin u. auch von Takadiastase, dagegen nicht von Maltase gespalten wird. Ihm kommen am wahrscheinlichsten die Konst. II III zu.




Versuche. Ag-Salz von *i*-Cytosin, $\text{C}_4\text{H}_4\text{ON}_3 \cdot \text{Ag}$. — Pikrat des Tetraacetylglykosids von *i*-Cytosin, $\text{C}_{24}\text{H}_{26}\text{O}_{17}\text{N}_6$, aus A. Nadeln, sintert bei 165° , Zers. bei 190° . — Tetraacetyl-d-glykosid von *i*-Cytosin, $\text{C}_{18}\text{H}_{23}\text{N}_3\text{O}_{10}$, aus PAe. Nadeln, sintert 129° , F. $131-132^\circ$, ll. in Methylalkohol u. A., swl. in W., $[\alpha]_{\text{D}}^{13} = -17.7^\circ$; reißt nicht Fehlingsche Lsg., Aufspaltung durch kurzes Kochen mit n. HCl. — $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_6\text{N}_3$. Krystalle aus 85% ig. A., F. 166° (leichte Zers.); ll. in W., swl. in Methylalkohol u. A.; $[\alpha]_{\text{D}}^{24} = -72.60^\circ$; reduziert nicht Fehlingsche Lsg., Aufspaltung schon mit kalte n. HCl oder Kochen der wss. Lsg. (Ztschr. f. Biologie **84**. 411—16. München, biol. Inst.) LOHMANN.

H. Staudinger und H. A. Bruson, Hochpolymere Verbindungen. VII. Über Di-cyclo-pentadien und weitere polymere cyclo-Pentadiene. (VI. vgl. STAUDINGER, Chim. Acta **8**. 306; C. **1925**. II. 154.) (Vgl. STAUDINGER u. RHEINER, Helv. Chim. Acta **7**. 23; C. **1924**. I. 1780.) Von den drei möglichen Formeln für das Di-cyclo-pentadien (Anlagerung beider Moll. in 1,2, je eines Mol. in 1,2 u. 1,4 oder beider Moll. in 1,4) halten Vff. die erste (I.) für richtig, da nur sie die gleichartige Anlagerung mehrerer Di-cyclo-Pentadienmoll. zu höheren Polymeren u. den leichten Zerfall dieser u. von diesen zu den labilen Vierringen zu erklären vermag. Obwohl I. Struktur- u. Stereoisomerie zuläßt, wurde eine solche Isomerie nie beobachtet. Die l. c. beschriebene, wieder aufgefundene β -Form (F. 19.5°) dürfte ein unreines Prod. gewesen sein (vgl. auch WIELAND u. BERGEL, S. 1142). — Um die Konst. von I. weiter zu klären, wurde die Oxydation, speziell die Einw. von Ozon auf Dihydro-cyclo-pentadien untersucht (vgl. STAUDINGER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1094; C. **1925**. II. 154). Die Spaltung dieses Ozonids hat inzwischen krystallisierte Prodd. ergeben. Bei Oxydation mit HNO_3 wurde nur Oxalsäure gefaßt, außerdem entsteht reichlich Oxaldehyd. — Bei höherem Erhitzen des cyclo-Pentadiens bzw. von I. tritt weitere Polymerisation ein, u. zwar bilden sich auch hier nicht Gemische von Isomeren, sondern es erhält bei richtigem Aufarbeiten sofort einheitliche, scharf schm. Polymerisate (vgl. auch die Versuche von STAUDINGER u. RHEINER kurz beschrieben). Die weitere Anlagerung von cyclo-Pentadienmoll. an I. verläuft also — wie die B. von I. selbst — in einer Richtung. Dies wird durch den Nachweis von zwei Doppelbindungen in Tri- u. Tetrameren mittels Red. bestätigt. Man kann den Polymeren daher die allgemeine Formel II. erteilen, in der natürlich die Lage der Doppelbindungen u. die räumliche Anordnung ungewiß sind. Bisher wurden die Polymeren bis $x = 3$ mit Sicherheit erkannt. Ein außerdem erhaltenes, noch höher polymeres, unl. Prod. ist dem Oxymethylen (vgl. STAUDINGER u. LÜTHY, 3. Mitt.) vergleichbar, doch ist sein Polymerisationsgrad nicht so hoch. Wenn man nämlich die FF. der Polymeren als Funktion des Mol.-Gew. in ein Koordinatensystem einträgt, so erhält man eine fast gerade Linie, u. das bei ca. 370° schm. unl. Prod. erweist sich als 6-, höchstens 7-fach polymer. — Die röntgenspektrograph. (von S. Ott ausgeführte) Unters. hat ergeben, daß auch das unl. Polymere krystallisiert ist. Dieses sowie das Tetra- u. Pentamere zeigen auffallenderweise das gleiche Spektrum. Danach wäre dies Verf. für die Festlegung chem. Moll. nicht brauchbar, sondern gäbe nur einen Einblick in die Gitteranordnung.


Versuche. (Vgl. STAUDINGER u. RHEINER.) Di-cyclo-pentadien (I.). Nimmt man schnell, das zweite Mol. langsam auf. Gibt mit Br in Eg. Verb. $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{CH}_2\text{COBr}$, VIII. 1.

tiefblau, unl., zers. sich bei höherer Temp. unter HBr-Abspaltung, wahrscheinlich hochmolekular. Ähnliche Prodd. entstehen in Ggw. von HCO_2H , Propionsäure, fe aus cyclo-Pentadien u. konz. H_2SO_4 bei -80° . — *Dihydroderiv.* Zu berichtigen Kp_{-13} $78-80^\circ$. [Die von WIELAND u. BERGEL angegebenen Konstanten weichen



Ist leicht durch Tetrahydroderiv. verunreinigt, das beim Kochen mit konz. H ungel. zurückbleibt. — *Dibromid.* In Eg. Aus CH_3OH , F. 65° . — Die Verb. II. wird durch Erhitzen von I. im Rohr dargestellt. Je länger u. höher man erhitzt, um so höhere Polymere bilden sich. Aufarbeitung der festen M.: I. u. Trimeres im Hochvakuum abdest. (bis ca. 100°); diese beiden Prodd. lassen sich dann durch Dest. u. 10 mm leicht trennen. Aus dem Rückstand das Tetramere mit Ä., das Pentamere sd. Bzl. u. Xylol herauslösen. — *Poly-cyclo-pentadien.* Durch 90-std. Erhitzen 200° , Prod. mit PAe., Ä., Bzl., Chlf. extrahieren. Weißes oder schwachgraues Pulv. F. ca. 373° (Zers.), unl. Wird von sd. konz. HNO_3 sehr langsam angegriffen, reagiert nicht mit Br. Gibt beim Erhitzen auf 500° cyclo-Pentadien. — *Penta-cyclo-pentadien* (C_5H_6)₅. Durch 22-std. Erhitzen auf $170-180^\circ$. Weißes Pulver aus Bzl., F. 270° , in k., l. in h. Bzl., Toluol, Xylol, Chlf., CS_2 , Pyridin, Nitrobenzol, unl. in A., CH_3OH , Ä., PAe. Scheidet sich aus sehr verd. Lsgg. gallertig aus. Wird von sd. HNO_3 oxydiert, entfärbt Br. Zerfällt beim Erhitzen wie das vorige, sublimiert unzersetzt im Hochvakuum. — *Tetra-cyclo-pentadien*, (C_5H_6)₄. Darst. wie beim vorigen. Reinigung durch I. (Kp_{-1} $160-165^\circ$), besser durch Behandeln mit CH_3OH . Mikrokrystallin aus Essigester. ll. in k. Ä., Bzl., Chlf., h. PAe., Essigester, unl. in A., CH_3OH . Wird von HNO_3 lebhaft oxydiert. — *Tetrahydroderiv.*, $\text{C}_{20}\text{H}_{28}$. In Ä. (+ Pt). Löslichkeit wie beim vorigen. Wird von HNO_3 nicht angegriffen. — *Tri-cyclo-pentadien*, (C_5H_6)₃. Durch 14-std. Erhitzen auf $150-160^\circ$. Kp_{-3} 105° , ll. in Ä., PAe., wl. in A., CH_3OH , swl. in Eg. Scheidet sich nicht mehr gallertig, sondern in Nadelchen aus. Wird von HNO_3 lebhaft oxydiert. Dest. auch unter at.-Druck teilweise unzersetzt, ist also beständiger als I. — *Tetrahydroderiv.* $\text{C}_{16}\text{H}_{22}$. In Ä. (+ PAe.). Aus CH_3OH , F. 43° , unzersetzt destillierbar, Löslichkeit wie beim vorigen. Wird von HNO_3 u. Br nicht angegriffen. (LIEBIGS ANN., 447. 97. 110.)

H. Staudinger und **H. A. Bruson**, *Hochpolymere Verbindungen*. VIII. Die Polymerisation des cyclo-Pentadiens. (VII. vgl. vorst. Ref.) cyclo-Pentadien liefert mit gewissen Katalysatoren, besonders SnCl_4 , ein von dem im vorst. Ref. beschriebenes völlig verschiedenes *Poly-cyclo-pentadien*, das dem Kautschuk ähnlich ist. Es besitzt wie dieser pro Mol. cyclo-Pentadien eine Doppelbindung u. kann daher durch die beiden nachsteh. Formeln ausgedrückt werden, je nachdem man Anlagerung



1,4 oder 1,2 annimmt. Die erste würde dem Kautschuk entsprechen, die zweite dem Polyisopren. Sowohl Isopren als Inden, auch Phenylbutadien werden von SnCl_4 polymerisiert. Das neue Polymer nimmt äußerst leicht



schon aus der Luft, 1 O pro Mol. cyclo-Pentadien unter B. eines Oxyds auf. Es reagiert auch mit Ozon, N_2O_3 u. S_2Cl_2 , aber sämtliche Prodd. sind durch Oxyd verunreinigt. Katalyt. Red. gelang bisher nicht. Trockene Dest. liefert ein Gemisch von Spaltprodukten, darunter cyclo-Pentadien. Mit trockenem Halogenwasserstoff entstehen tiefblau, noch unaufgeklärte Rk.-Prodd., ähnlich dem Prod. aus Di-cyclo-pentadien u. Br (v)

). — Vff. haben eine große Anzahl von anorgan. Stoffen aus allen Gruppen des od. Systems, besonders Halogenide, auf eine etwaige polymerisierende Wrkg. nüber dem cyclo-Pentadien untersucht. Es hat sich gezeigt, daß hauptsächlich 2e Halogenide wirksam sind, welche die Tendenz zur B. von Molekülverbb. haben, SnCl_4 , TiCl_4 , SbCl_5 u. BCl_3 . Ausgesprochene Säurechloride (SiCl_4 , PCl_3 , Acetylrid) sind unwirksam. Der Unterschied zwischen SnCl_4 u. SiCl_4 ist bemerkenswert. annte Verbb. polymerisieren auch Inden, Cumaron, Styrol, Isopren u. chines. öl, nicht aber Acryl- u. Zimtsäureester wegen Komplexbildung mit der CO-Gruppe, 1 nicht Vinylbromid. Bei der Polymerisation entstehen immer hochmolekulare ld. Die auftretenden Färbungen lassen auf B. von Molekülverbb. schließen, die W., A., Aceton zers. werden. Diese Polymeren sind sämtlich nicht ident. mit den Katalysatoren erhältlich; auch das Poly-cyclo-pentadien gleicht insofern nicht Kautschuk, als es nicht kolloid ist.

Versuche. *Poly-cyclo-pentadien*, $(\text{C}_5\text{H}_6)_x$. Zu 13,5 g cyclo-Pentadien in 45 cem tropft man bei -5 bis -10° Lsg. von 0,2 cem SnCl_4 in 5 cem Chlf., gießt die orangef. Lsg. nach 10 Min. in 100 cem A., wäscht den Nd. mit A. u. Ä., fällt ihn aus Bzl. + im u. trocknet im Vakuum bei 50° . Weißes, amorphes Pulver, l. in Bzl., Chlf., CS_2 , wl. in A., Ä., Aceton. Die Lsgg. sind dünnviscos. Kryoskop. Mol.-Gew.-Best. bzgl. ergab Werte zwischen ca. 1300 u. 6700. Verbraucht 1Br_2 in Chlf. — *Oxyd*, $(\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3)_x$. Aus dem vorigen: 1. an der Luft oder in O in ca. 1 Monat; 2. durch Turren der CCl_4 -Lsg. mit KMnO_4 u. H_2SO_4 , verdampfen, MnO_2 durch SO_2 entfernen. gelbes, orangegelbes oder bräunliches, amorphes Pulver, unl., färbt sich über 160° zel u. zers. sich über 300° . Gibt mit HCl keine Blaufärbung. — *Ozonid*, $(\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3)_x$. Chlf. Gallerte, nach Trocknen gelbliches Pulver, stark oxydhaltig, verpufft beim tzen. Mit sd. W. bleibt ein großer Teil ungel.; Lsg. hinterläßt braunen Sirup mit hydrkk. — *Nitrosit*. Mit nitrosen Gasen in Bzl. Gallerte, nach Waschen mit ol u. Trocknen im Hochvakuum gelbliches Pulver, unl., Zers. über 280° , stark oxydg. — *Vulkanisation*. Mit S_2Cl_2 in viel Chlf. unter Kühlung. Gelbe, kautschukiche M., nach Trocknen im Vakuum gelbes Pulver, unl., Zers. bei 150° , oxydhaltig. konz. Lsg. erhält man eine feste, hartgummiähnliche M. (LIEBIGS Ann. 447. —22. Zürich, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

W. A. Schulze und H. L. Lochte, *Symmetrisches Dimethylphenylmethylhydrazin verwandte Verbindungen*. Vff. stellen Acetophenonketazin aus Acetophenon u. razinchlorhydrat mit 90% Ausbeute dar, das sich nicht durch NaHg , sondern katalyt. zu *s*. Dimethylphenylmethylhydrazin reduzieren läßt. Bei Oxydation des eren erhalten sie ein Prod. vom F. 74° , das bei der Hydrolyse primäres Methylmethylhydrazin gibt. Die Darst. eines Hydrazons aus diesem Hydrazin u. Aceton mißlang; infolgedessen war es auch nicht möglich, die Konst. der Verb. vom $^\circ$ aufzuklären. Sie scheint eine Azoverb. zu sein, denn Red. gibt wieder das Hydr- beim Erhitzen gibt sie 2,3-Diphenylbutan, eine Rk., wie sie schon bei anderen verb. beobachtet wurde. — Bismethylphenylazimethylen (Acetophenonketazin), $_{16}\text{N}_2$, F. 121° . Red. mit Pt u. H_2 gibt *s*-Dimethylphenylmethylhydrazin, C_6H_5 , $(\text{CH})\text{NH}\cdot\text{NHCH}(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_5$. Chlorhydrat, $\text{C}_{16}\text{H}_{21}\text{N}_2\text{Cl}$, F. 188° . — Nitrosoverb., $_{19}\text{ON}_3$. Das Oxalat wurde nicht rein erhalten. — 1,2-Bismethylphenylmethyl-4-ylsemicarbazid, $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{ON}_3$, F. 108° . — 1,2-Bismethylphenylmethyl-4-phenylurazol, $_{23}\text{O}_2\text{N}_3$. Aus den Vorhergehenden durch Erhitzen mit Harnstoff auf 155° , F. $105,5^\circ$. lationsprod. des *s*-Dimethylphenylmethylhydrazins $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_2$. Mit H_2O_2 F. 74° . — iphenylbutan $\text{C}_{16}\text{H}_{18}$ Kp. $_{40}$ $205\text{—}215^\circ$ F. $123,5^\circ$ (ENGLER u. BETHGE fanden $^\circ$). — Oxalat des prim. Methylphenylmethylhydrazins $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_2$ F. 172° . — ozoylverb. des prim. Hydrazins $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$ F. 193° . (Journ. Americ. Chem. Soc. 1030—35. Texas, Univ.) BRAUNS.

W. Lee Lewis und H. E. Bent, *Eine Untersuchung über 3,4-Diaminophenylarsinsäure und einige ihrer Derivate*. Vff. finden daß Phenylarsinsäure u. ihre Deriv. 100—140° u. 10 mm leicht W. abgeben. Ferner prüfen sie die Rk.-Fähigkeit der Aminogruppen in der 3,4-Diaminophenylarsinsäure u. zeigen, daß allgemein Säurechlorid mit Ausnahme von Acetyl- u. Propionylchlorid mit beiden Aminogruppen reagiert. Oxalylchlorid gibt 2,3-Dihydroxy-6-arsenochinoxalin, während Malonsäureäthylester eine Verb. $\text{H}_2\text{O}_3\text{AsC}_6\text{H}_3 < (\text{NHCO})_2 > \text{CH}_2$ mit einem Ring von 7 Gliedern bildet. CH_3OH u. Mineralsäure entsteht 2,3-Di-(dimethylamino)-phenylarsinsäure. Halbsäureamide reagieren nach folgenden Gleichungen:



Das nach I entstehende Aminotryparsamid gibt beim Kochen mit Formaldehyd-Na-bisulfit das Formaldehydschwefligsäure-Na-Deriv. des 3,3'-Diamino-4,4'-di-N-glycidamidarsenobenzols IV. Aminophenylarsinsäure verliert 1 Mol W. u. gibt Phenylaminoarsenoxyd $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2\text{NAs}$. — Das Mg-Salz verliert kein W. u. 3,4-Diaminophenylarsinsäure zeigt nach 24 Std. über CaCl_2 u. 20° konstantes Gewicht entsprechend $\text{C}_6\text{H}_3\text{N}_2\text{As} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$, nach dem Trocknen über P_2O_5 bei 140° u. 10 mm die Zus. $\text{C}_6\text{H}_3\text{ON}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$, dem Vff. die Formel III zuschreiben. — 4-Chloracetylaminophenylarsinsäure $\text{H}_2\text{O}_3\text{AsC}_6\text{H}_4\text{NHCOC}_2\text{H}_4\text{Cl}$ F. 290°. — 4-Propionylaminophenylarsinsäure $\text{H}_2\text{O}_3\text{AsC}_6\text{H}_4\text{NHCOC}_2\text{H}_5$ ($\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_4\text{NAs}$). Schm. nicht unter 260°. — 4-Valerylaminophenylarsinsäure $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_4\text{NAs}$. — 4-Phenylacetylaminophenylarsinsäure $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{NAs}$. — 3-Amino-4-acetylaminophenylarsinsäure $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_2\text{As}$ F. 265—267°. — 3-Amino-4-propionylaminophenylarsinsäure $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_2\text{As}$ F. 230—235°. — 3,4-Divalerylaminophenylarsinsäure $\text{C}_{16}\text{H}_{25}\text{O}_5\text{N}_2\text{As}$. — 3,4-Dichloracetylaminophenylarsinsäure, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_5\text{N}_2\text{Cl}_2\text{As}$. — 3,4-phenylacetylaminophenylarsinsäure, $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{O}_5\text{N}_2\text{As}$. — 3,4-Dibenzoylaminophenylarsinsäure, $\text{C}_{20}\text{H}_{17}\text{O}_5\text{N}_2\text{As}$. — 3,4-Phthalylaminophenylarsinsäure, $\text{C}_{22}\text{H}_{17}\text{O}_9\text{N}_2\text{As}$. — 4-Carpropyloxyaminophenylarsinsäure, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{NAs}$. — 4-Carbobutyloxyaminophenylarsinsäure, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_5\text{NAs}$. — 3,4-Dicarbäthoxyaminophenylarsinsäure, $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{O}_7\text{N}_2\text{As}$, F. 192—192°. — 3,4-Dicarbobutyloxyaminophenylarsinsäure, $\text{C}_{16}\text{H}_{25}\text{O}_7\text{N}_2\text{As}$, Zers. bei 185—187°. — N-(Phenyl-1-amino-4-arsinsäure)-glycinamid, $\text{H}_2\text{O}_3\text{AsC}_6\text{H}_3(\text{NH}_2)\text{NHCH}_2\text{CONH}_2$, F. 234—234° unter Zers. — 2,3-Dihydro-6-arsenochinoxalin, $\text{C}_8\text{H}_7\text{O}_5\text{N}_2\text{As}$. — 1,2-Dihydro-3-amino-6-arsenochinoxalin, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_5\text{N}_3\text{As}$, F. 226°. — 1,2-Dihydro-3-amino-6-ammoniumarsenochinoxalin, $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_4\text{As}$, Zers. bei 200°. — 1,2-Dihydro-3-benzoylamino-6-arsenochinoxalin, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}_3\text{As}$, F. 234°. — 1,2-Dihydro-3-oxyäthylamino-6-arsenochinoxalin, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_3\text{As}$. — 1,2-Dihydro-2-formamid-3-amino-6-arsenochinoxalin, $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_4\text{As}$. — Na-Salz Formaldehydschwefligsäurederiv. des 3,3'-Diamino-4,4'-di-N-glycidamidarsenobenzols $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O}_6\text{N}_6\text{S}_2\text{As}_2\text{Na}_2$ (IV). Dabei entsteht als Zwischenprod. eine Verb. von der Z. $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{O}_4\text{N}_6\text{SAs}_2\text{Na}$, wo also nur eine Formaldehydschwefligsäuregruppe eingetreten ist N-(4-Arsenophenyl)-aminomalonamid, $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_3\text{As}$. — Malonylaminoarseniloxyd, $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_2\text{As}$. — 4-Phthalylamino-3-aminophenylarsinsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_6\text{N}_2\text{As}$. Sintert bei 207°, bläht sich bei 240—245° auf. — 1,2-Di-(N,N-dimethylamino)-4-arsenobenzol, $\text{H}_2\text{O}_3\text{AsC}_6\text{H}_3[\text{N}(\text{CH}_3)_2]_2$. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 949—57. Evanston [Ill. Univ.])

BRAUNS

Henry Gilman und **Clarence C. Vernon**, *Die Reaktion zwischen Organomagnesiumniden und den Arylestern der Bor-, Kohlen-, Kiesel- und Phosphorsäure*. (Vgl. i. Americ. Chem. Soc. **47**. 2047; C. **1925**. II. 1674.) *Triphenylborat* gibt mit l. *n-Butyl-MgBr* eine geringe Menge *Boralkyl* u. 80% *Phenol* mit 0,1 Mol. *propyl-MgBr* 7% *n-Propylbor* u. 56% *Phenol*; 0,1 Mol. *Triphenylborat* mit l. *Phenyl-MgBr* gibt 40% *Phenol* u. 16% *Phenylborsäure*. — *Phenyl-MgBr* mit 0,25 Mol. *Trimethylborsäureester* 86% *Phenylborsäure*, mit 0,64 Mol. 58% *ylborsäure* u. 30% *Bzl.* In beiden Fällen wurde CH_3OH nachgewiesen. — ol. *Diphenylkohlsäureester* u. 0,25 Mol. *Phenyl-MgBr* gaben *Triphenylcarbinol* 70% u. *Benzoessäurephenylester* (6—20%) u. *Phenol* (45—60%). Kein *Di- l. Äthyl-MgBr* mit *Kohlensäureester* gab kein *Äthylbenzol*. — *Tetra-p-kresylsäureester* (0,5 Mol.) u. *Phenyl-MgBr* gaben neben 17% unverändertem Ester o *p-Kresol* u. 7,5% einer komplexen Si-Verb. — 0,1 Mol. *Triphenylphosphorster* u. 4 Moll. *Phenyl-MgBr* geben 17% *Triphenylphosphinoxid* u. 49% *Phenol*. ol. Ester u. 0,4 Mol. *n-Propyl-MgBr* in Ä.-Toluollsg. 12 Std. gekocht gibt *Phenol* u. 5 g einer Verb. von Kp. 280—282° u. F. 36°, vielleicht *Tripropylhinoxid* (F. 38°). 0,1 Mol. *Tri-p-kresylphosphorsäureester* u. 0,4 Mol. *Benzylbei* 95° geben 28% *p-Kresol* u. eine Verb. von F. 148°. — *Triphenylphosphit* $(\text{O})_3\text{P}$. (0,1 Mol.) u. *Phenyl-MgBr* (0,4 Mol.) geben 60% *Triphenylphosphin* o *Phenol*. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1063—66. Chem. Lab. Staats. Coll. Arnes.)




BRAUNS.

Robert F. Chambers und **Philip C. Scherer**, *Phenylzinnverbindungen*. Nach s, SESSIONS u. GREER (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 2361. 2568; C. **1926**. I. 72) besitzen die *Di-* u. *Trimethylzinnverb.* amphotere Eigenschaften, ihre *Na-* sind sehr reaktionsfähig gegenüber negativen Elementen oder solche enthaltende . Vf. vergleichen damit die entsprechenden *Phenylverb.*, wobei sie sich der smethoden von KRAUS bedienen. — *Tetraphenylzinn*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_4\text{Sn}$ (I). Aus *Phenyl-* u. 14%ig. *NaSn-Legierung* oder aus *Phenyl-MgBr* u. ZnCl_2 u. Einw. des ent- enen *Diphenylzinks* auf SnCl_4 , F. 225—226°. — *Triphenylzinnbromid*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SnBr}$ Durch Einw. von J auf eine CHCl_3 -Lsg. von I wird zunächst $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SnJ}$ her- t, daraus mit 30%ig. NaOH das *Triphenylzinnhydroxyd*, aus diesem mit konz. as *Triphenylzinnbromid* hergestellt. Krystalle aus Ä., F. 120—121°. — *Diphenylbromid*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{SnBr}_2$ aus I mit Br, Kp.₂₋₃ 184—185°, F. 36—38°. — *Tri-* zinnnatrium, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SnNa}$ (III) aus II mit Na in fl. NH_3 . Gelbes Pulver, l. in fl. Gibt bei der Oxydation mit trockenem O_2 in fl. NH_3 *Triphenylzinnhydroxyd*, *Tetra-* zinn u. *Diphenylzinnnoxid*. In *Bzl.-Lsg.* nur *Triphenylzinnhydroxyd*. Letzteres sich beim Erhitzen in I u. *Diphenylzinnnoxid*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{SnO}$. — Rk. mit Halogen- vie *p-Chloranilin*, *o-Chlorphenol-Na* u. a. wirken auf III in fl. NH_3 nicht oder B. von *Triphenylzinn* ein. — Mit *Phenol-HgJ* gibt III in fl. NH_3 *Phenylqueck-* min, $\text{C}_6\text{H}_5\text{HgNH}_2$, F. 123,5—124°. Dieselbe Verb. bildet sich auch aus $\text{C}_6\text{H}_5\text{HgJ}$ Na in fl. NH_3 . — *Triphenylzinnessigsäure*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SnCH}_2\text{CO}_2\text{H}$, F. 122—122,5°. — nylzinnhydrid, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SnH}$. Aus III mit NH_4Br , Kp.₆ 173—174°. Gibt mit O_2 nylzinn, mit Na wieder III. — *Diphenylzinn*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Sn}$. Aus *Diphenylzinndi-* mit Na. Zers. sich bei 206° (KRAUSE fand 205°). *Diphenylzinndihydrid*, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{SnH}_2$. Aus der Na-Verb. u. NH_4Br . — Bei der Einw. von Na auf I in fl. NH_3 it $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{SnNa}$ u. $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{SnNa}_2$. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1054—62. ence, Rhode Island, Univ.)

BRAUNS.

R. Orndorff und **Ralph T. K. Cornwell**, *Thymolsulfophthalein*, das enprodukt, die *4'-Oxy-3'-i-propyl-6'-methylbenzoylbenzol-2-sulfosäure* und einige Derivate. Vf. untersuchen den Rk.-Verlauf der *Thymolsulfophthaleinbildung* llen einige neue charakterist. Derivv. desselben her. Sie finden, daß die ber eine Zwischensäure, der *4'-Oxy-3'-i-propyl-6'-methylbenzoylbenzol-2-sulfo-*

säure verläuft, die in der Keto- (I) u. der Lactonform (II) reagieren kann. beiden wurden Derivv. dargestellt. Die Muttersubstanz des Thymolsulfophthals das Thymolbenzein, hat bas. Eigenschaften, infolgedessen bildet die Sulfosäureanhydrid, das in zwei tautomeren Formen, einer farblosen Lactonform (III) u. einer farbigen chinoiden (Oxoniumsalz) Form (IV) reagiert. Von beiden wurden I erhalten. In stark sauren Lsgg. (pH 1,2—2,8) ist sie, wahrscheinlich infolge des Salzes rot, bei pH 2,8—8,0 gelb, bei pH 8,0—9,6 blau. Mit 1 Mol. Anilin bildet ein Salz, mit 2 Moll. eine grüne Dianilinoverb., das Dimethyldi-*i*-propylderiv. des von




DORFF u. SHERWOOD dargestellten Diphenylsulfophthaleins. Das farblose Lacton des Dithymolsulfophthaleins gibt ein farbiges chinoides Hydrat, das durch Erhitzen W. verliert u. in das farblose Verb. übergeht. Durch Red. des Dithymolsulfophthaleins entsteht das farblose Thymolsulfophthalin.

o-Sulfobenzoesäuredithymylester, $C_{27}H_{30}O_5S$. Nebenprod. bei der Rk. von Thymol mit dem Chlorid der *o*-Sulfobenzoesäure, F. 102—103°. — 4'-Oxy-3'-*i*-6'-methylbenzoylbenzol-2-sulfosäure, $C_{17}H_{18}O_5S + 2 H_2O$ (I u. II). Gibt mit W. eine Lsg. blaue Lsg. Spaltet sich beim Erhitzen auf 150° in Thymolsulfophthalein, *o*-Sulfobenzoesäureanhydrid u. W. Gibt mit Thymol u. $ZnCl_2$ Thymolsulfophthalein. — Salz, $C_{17}H_{18}O_5S \cdot NH_3$. — Ba-Salz $(C_{17}H_{17}O_5S)_2Ba + 6 H_2O$. — Dibenzoylverb. $C_{31}H_{28}O_5S$, F. 119—120°. Thymolsulfophthalein, $C_{27}H_{30}O_5S + H_2O$. Fängt bei 59° an, zu zerfallen u. bei 195° sich zu zersetzen. — NH_4 -Salz, $C_{27}H_{30}O_5S \cdot NH_3$. Wss. I. gelb. — Zn-Salz, $(C_{27}H_{29}O_5S)_2Zn + 5 H_2O$. — Mono-Na-Salz, $C_{27}H_{29}O_5SNa$. Kristallisiert mit 1 Mol. $CH_3COC_2H_5$. — Di-Na-Salz, $C_{27}H_{28}O_5SNa_2 + 2 A$. — Dithymylverb., $C_{27}H_{28}O_5S(OCH_3)_2$, F. 171—172°. — Dibenzoylverb., $C_{27}H_{28}O_5S(COC_6H_5)_2$, bis 195°. — Dimethyläther (farblose Form) von III, durch Kochen mit 3% HCl-haltigem CH_3OH . Färbt sich bei 195° rot u. schmilzt scharf bei 201—202°. Farbige Form tritt ein. Durch Erhitzen der farblosen auf 180°. Purpurrotes Pulver, das beim Umkrystallisieren oder in Berührung mit CH_3OH sich in die farblose Form zurückverwandelt. — Anilinsalz, $C_{27}H_{30}O_5S \cdot C_6H_5NH_2$. — Dianilinverb., $C_{39}H_{40}O_5N_2S$. Dunkle Nadeln. Ohne F. — Dibromthymolsulfophthalein, $C_{27}H_{28}O_5SBr_2$. Farblose Krystalle. F. 130—135° unter Zers. — Hydrat, $C_{27}H_{28}O_5SBr_2 \cdot H_2O$. Purpurrote bis schwarze Krystalle. — Diacetylverb., $C_{27}H_{26}O_5SBr_2(COCH_3)_2$, F. 222—223°. — Thymolsulfophthalin, $C_{27}H_{32}O_5S + 3,5 H_2O$, F. 134—135°. — Zn-Salz, $(C_{27}H_{31}O_5S)_2Zn + 5 H_2O$ (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 981—993. New York, Cornell Univ.) BRATTON.

K. v. Auwers, H. Bundesmann und F. Wieners, Über Wanderungen von Methyl bei der Friesschen Verschiebung. Vff. haben bei der Friesschen Verschiebung (Umlagerung von Phenolestern in *o*- u. *p*-Oxyketone), die man bisher für n. verhalten gehalten, in einer Reihe von Fällen molekulare Umlagerung festgestellt. Die Phenol- u. Kresolester ist nichts zu bemerken. Auch die meisten Xylenylester verhalten sich n. *as. o*-Xylenylacetat u. *as. m*-Xylenylacetat liefern *s. o*-Aceto-*as. o*-Xylenol (I.) bzw. *o*-Aceto-*as. m*-xylenol (II.). (II. vgl. v. AUWERS, LECHNER u. BUNDES- BER. Dtsch. Chem. Ges. 58. 45; C. 1925. I. 1188.) Konst.-Beweis für I. u. II. durch Red. zu 3,4- bzw. 2,4-Dimethyl-6-äthylphenol u. Identifizierung letzterer mit synthetisch dargestellten Prodd., für II. außerdem durch Überführung in 3,5-Dimethyl-2-oxy-

e (Oxymesitylsäure). Daß *s. m*-Xylenylacetat ohne weitere Umlagerung aus-
 eßlich *o*-Aceto-*s. m*-xylenol liefert, haben schon v. AUWERS u. BORSCHKE (Ber.
 h. Chem. Ges. **48**. 1698; C. **1915**. II. 1181) gezeigt. — Anders verhält sich *p*-Xylenyl-
 t. Hauptrk.-Prod. ist allerdings *p*-Aceto-*p*-xylenol. Daneben entsteht jedoch nicht
 zu erwartende *o*-Aceto-*p*-xylenol (III.), sondern II. Es findet also Wanderung des
 statt. Analog liefert das homologe 3-Methyl-6-äthylphenylacetat unter CH₃-Wan-
 derung das 2-Aceto-4-methyl-6-äthylphenol. Konst.-Beweis für letzteres: Durch Eli-
 erung der Acetylgruppe erhält man 4-Methyl-6-äthylphenol u. aus dessen Acetat
 h Friessche Verschiebung dasselbe Oxyketon. — Verwickelter verläuft die Rk. beim
 umenylacetat. Man erhält in wechselnden Mengenverhältnissen (je nach den Ver-
 sbedingungen) 4 Verbb.: 1. Sehr wenig Durenol (IV.). 2. Etwas mehr I. 3. Mäßige
 gen des n. zu erwartenden *o*-Aceto-*ps*-cumenols (V.). Konst.-Beweis durch Um-
 rung des Oxims, wobei gleich die Anhydrobase VI. entsteht. Letztere wurde auch
 nderem Wege dargestellt. 4. Als Hauptprod. ein mit V. isomeres, also unter CH₃-
 derung entstandenes Oxyketon, welches entweder *o*-Aceto-*v. hemellitenol* (VII.)
o-Aceto-*s. hemellitenol* (VIII.) sein konnte. Da das Oxim nicht umgelagert, sondern
 hydrolyt. gespalten wird, war nach den von v. AUWERS, LECHNER u. BUNDES-
 N aufgefundenen Gesetzmäßigkeiten VII. wahrscheinlicher. Dies hat sich als
 ig erwiesen, denn von den beiden durch Friessche Verschiebung des *v. u. s. Hemel-*
ylacetats (v. AUWERS u. WIENERS, S. 1532) dargestellten Oxyketonen ist das aus
 v. Deriv. erhaltene mit dem fraglichen Oxyketon ident. Daß bei beiden Acetaten
 Friessche Verschiebung n. verläuft, folgt daraus, daß beide Oxyketone durch Eli-
 erung der Acetylgruppe in die Ausgangsphenole zurückverwandelt werden. —
 bemerken bei dieser Gelegenheit, daß der von KLAGES aufgefundene Abbau fett-
 iat. Ketone mittels H₃PO₄ ein gutes Mittel zur Ermittlung der Konst. ist, da Um-
 rungen dabei nicht eintreten. Die Ggw. von CH₃-Gruppen erleichtert die Ab-
 ung der Ketoseitenkette wesentlich. — Am auffallendsten bei der Friesschen
 chiebung des *ps*-Cumenylacetats ist die B. von IV., Eintritt eines CH₃ u. Um-
 pierung. I. ist möglicherweise erst bei der Aufarbeitung entstanden. Diese Ver-
 isse sind noch ungeklärt. — VII. bildet sich auch unter CH₃-Wanderung bei der
 ischen Verschiebung des *i-ps*-Cumenylacetats u. des *Mesitylacetats*, aus ersterem
 t glatt, aus letzterem trotz der gewaltsamen Rk. mit einer Ausbeute von ca. 43%.
 Die Verss. lassen erkennen, daß nur solche Phenolacetate abnorme Rk.-Prodd.
 n, bei denen sich gleichzeitig in 2 u. 5 (bezw. 3 u. 6) Alkyle befinden, allgemein also
 ylenylacetat u. seine Homologen. Der Fall des Mesitylacetats (unmittelbare CH₃-
 irängung) steht bis jetzt vereinzelt da. Bemerkenswert ist, daß CH₃-Wanderung
 dann eintritt, wenn der Säurerest nach o, nicht dagegen, wenn er nach p ver-
 ben wird. Die Ortsveränderung des CH₃ kann scheinbar verschieden sein, da es
 Fällen an das o-, in je einem Falle an das m- u. p-C-Atom tritt. Doch kann man
 i *ps*-Cumenylacetat auch die Wanderung von 2 Methylen annehmen. Oxyketone
 Methylen in m oder v. zueinander sind begünstigte Gebilde. — Die Stellung der
 yle beeinflußt das Mengenverhältnis, in dem o- u. p-Oxyketon nebeneinander
 ehen. CH₃ in m begünstigt die B. von o-Oxyketon; *s. m*-Xylenylacetat mit 2 Me-
 en in m liefert nur o-Verb. Niedere Versuchstemp. begünstigt die B. von p-, höhere
 von o-Verbb. — Über den Mechanismus der Friesschen Verschiebung weiß man
 nichts Sicheres. SKRAUP u. POLLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 2033; C. **1925**.
 66) sind zu der Überzeugung gelangt, daß die Rk. nicht auf molekularer Um-
 rung, sondern auf Verseifung u. Resubstitution beruht. Hiernach würde die zweite
 se jodo eine FRIEDEL-CRAFTS-Rk. darstellen, u. man sollte bei freier o- u. p-Stellung
 it nur p-Derivv. erhalten, was den Tatsachen nicht entspricht. Auch folgendes
 ht gegen jene Auffassung: Erhitzt man Phenole mit AlCl₃ kurz auf ca. 120°, so
 lt man Doppelverbb., die mit CH₃COCl nur wenig Oxyketone liefern. Verreibt

man aber die Phenole nur mit AlCl_3 u. läßt dann CH_3COCl einwirken, so erhält man reichlich Oxyketone. Im letzteren Fall bilden sich offenbar zuerst Phenolester. Im Verlaufe der Arbeit wurden die von v. AUWERS, LECHNER u. BUNDESMANN aufgefundenen Regeln bzgl. der Umlagerungsfähigkeit von o-substituierten Ketoximen in allen Fällen bestätigt gefunden.



Versuche. *as. o-Xylenylacetat*, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$. Aus o-Xylenol u. $1\frac{1}{4}$ Mol. CH_3CO (Wasserbad), Chlorid verjagen, sofort dest. Kp. 235° , Rhomboeder, nach Waschen mit PAe. F. $22-22,5^\circ$. — *s. o-Aceto-as. o-xylenol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$ (I.). Man gibt das vor zur 1,5-fachen Menge AlCl_3 (Eiskühlung), erhitzt 4 Stdn. auf 130° , zerlegt u. dest. mit Dampf. Blättchen aus Schwebzbn., F. 71° , ll. außer in W. NaOH-Lsg. gelb. FeCl_3 Rk. blaviolett. — *Semicarbazon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}_3$, Nadelchen, F. $292-295^\circ$. — *Oxim*, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$, Nadeln aus A., F. $136-137^\circ$, ll. in A., Ä., zl. in Bzl. Wird von sd. HCl (1:1) nur verseift. — *Methyläther*, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$, Nadeln aus PAe., F. $55-56^\circ$. — *Semicarbazon*, $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_3$, F. $204-205^\circ$. — *3,4-Dimethyl-6-äthylphenol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}$. Aus I. nach CLEMMENSEN, mit Dampf dest. Nadelchen aus PAe., F. $51-52^\circ$, ll. FeCl_3 färbt nicht. — *Phenylurethan*, $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}$, Nadelchen aus verd. A., F. 113° . — Zur Synthese dieses Phenols wurde *as. o-Aceto-m-kresol* (v. AUWERS, LECHNER u. BUNDESMANN) reduziert zu *3-Methyl-6-äthylphenol*, $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}$, aus PAe., F. $43-44^\circ$, sl. FeCl_3 färbt nicht. — *Phenylurethan*, $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$, Nadeln aus verd. A., F. $127-128^\circ$. — *2-Methyl-5-äthyl-4-oxybenzaldehyd*, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$. Mit HCN u. AlCl_3 in Bzl. (40° , 5 Stdn.). Nadeln aus W., F. 110° , ll. außer in Bzn. FeCl_3 färbt nicht. — *Semicarbazon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}_3$, Nadelchen aus verd. CH_3OH , F. $204-206^\circ$, ll. in A., wl. in Ä., Bzl. — Red. des Aldehyds nach CLEMMENSEN ergab obiges 3,4-Dimethyl-6-äthylphenol. — *p-Xylenylacetat*, Kp. $741-742^\circ$. — *o-Aceto-as. m-xylenol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$ (II.). Vgl. I. c. Mit Dampf flüchtig. Das Oxim wird von HCl glatt verseift. — *Semicarbazon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}_3$, F. 257° , meist wl. — *Methyläther*, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$, Öl, Kp. 120° . — *2,4-Dimethyl-6-äthylphenol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}$. Durch Red. von I. Öl, Kp. $227-228^\circ$. FeCl_3 färbt nicht. — *Phenylurethan*, $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}$, Blättchen aus verd. A., F. $113,5^\circ$. — Zur Synthese dieses Phenols wurde *o-Aceto-o-kresol* (I. c.; *Semicarbazon*, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}_3$, F. 242°) reduziert zu *2-Methyl-6-äthylphenol*, $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}$, Öl, Kp. 212 bis 214° . FeCl_3 färbt nicht. — *Phenylurethan*, $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$, Nadeln aus Ä., F. $150-151^\circ$. — *3-Methyl-5-äthyl-4-oxybenzaldehyd*, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$, Nadeln aus Bzl., F. $94-95^\circ$, ll. außer in Bzn. Gab bei der Red. obiges 2,4-Dimethyl-6-äthylphenol. — *3,5-Dimethyl-2-oxybenzoesäure*, F. 179° . 1. Aus II. mit NaOH + KOH bei $220-230^\circ$ (20 Min.). 2. Aus II., Essigester u. Na; Kondensation des m-Diketons zum Chromon; Spaltung desselben mit sd. NaOH (vgl. WITTIG, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**, 88; C. **1924**, I. 776). 3. Zur Vergleichung aus *as. m-Xylenolnatrium* nach KOLBE. — *p-Aceto-p-xylenol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$, Nadeln aus W. oder Bzl., F. $130-131^\circ$, mit Dampf nicht flüchtig. — *Oxim*, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$, Blättchen aus verd. A., F. $155-156^\circ$, ll. in A., wl. in Bzl. Gibt mit sd. HCl (1:1) quantitativ *p-Amino-p-xylenolhydrochlorid*, dieses mit Sulfid die freie Base, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{ON}$, Nadeln aus A., F. 240° ; *N-Benzozat*, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$, aus A., F. 249° . Die Lsg. des Hydrochlorids gibt mit FeCl_3 Phloron, F. $123,5^\circ$. — *p-Aceto-p-xylenolmethyläther*, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$. Aus obige

















ol oder aus p-Xylenolmethyläther nach FRIEDEL-CRAFTS. Nach Dampfdest. n aus Leichtbnz., F. 79—80°. Wird von AlCl_3 bei 130° nicht verseift. — *Semizon*, $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_3$, aus A., F. 206°. — *s-Cumenylacetat*, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$, Kp. 245—246°, Nadelchen aus PAe., F. 34—34,5°. — von AlCl_3 bei 130—140° (4 Stdn.). Rohprod. in Ä. aufnehmen, im Vakuum Das ölige Destillat scheidet wenig *Durenol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}$ (IV.), Schuppen aus CH_3OH , 7—118°, aus; FeCl_3 färbt nicht. *Bromderiv.*, F. 115—117°. Zur Darst. eines Reineispräparates wurde i-ps-Cumenol der Gattermannschen Aldehydsynthese unterworfen. Neben hauptsächlich p-Oxyaldehyd entsteht etwas mit Dampf flüchtig *2,4,5-Trimethyl-6-oxybenzaldehyd*, aus verd. A., F. 74°; NaOH-Lsg. gelb, FeCl_3 -rötlich. Daraus durch Red. nach CLEMMENSEN IV. (F. roh 113—115°). — Zerlegung obigen Öls durch fraktionierte Dest. unmöglich. Daher alkoh. Lsg. mit Natron u. Semicarbazidhydrochlorid in wenig W. versetzen. Ein Teil der Semicarbazone fällt schnell aus, Rest bei gelindem Erwärmen in ca. 6 Tagen. Gesamtmenge in alkoh. NaOH lösen, mit viel W. verdünnen. Hauptmenge fällt aus (A), Rest gibt mit HCl einen weiteren Anteil (B), Rest bleibt in der Mutterlauge (C). — in ein in sd. A. unl. (F. über 300°) u. l. (F. 195—197°) Prod. zerlegbar. Beide Anteile mit sd. Eg.- H_2SO_4 I. (F. 70—71°). Die Natur dieser „Semicarbazone“ ist unbekannt, da I. nur ein in Semicarbazone vom F. 292° gibt. — Aus C wird der A. abdest., dann mit Dampf behandelt. Destillat liefert ps-Cumenol. Rückstand (Semicarbazone) wird nach Umfällen aus Alkali mit sd. 30%ig. H_2SO_4 zerlegt u. liefert Fraktionierung u. Reinigung über das wl. Na-Salz *o-Aceto-ps-cumenol*, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$ dickes, gelbes Öl, Kp.₁₁ 145—146°, D.^{17,4}₄ 1,0873, n^{17,4}_{He} = 1,56189, E Σ für $\beta - \alpha = +96\%$, nach längerer Zeit teilweise erstarrend. NaOH-intensiv gelb. FeCl_3 -Rk. violett. — *Semicarbazone*, $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_3$, F. 232°, wl. in alkoh. Lauge gelb, durch W. nicht fällbar. — *Oxim*, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$, Nadeln aus A., F. 163—164°, ll. in A., CH_3OH , Ä., zl. in Bzl. Wird von sd. HCl (1:1) zum größten Teil zu V. zurückverseift, zum größten Teil übergeführt in *2,4,5,7-Tetrahydrobenzoxazol*, $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{ON}$ (VI.), nach Dampfdest. Krystalle, F. 64°, sll., l. in starker Lsg. durch W. fällbar. Darst. eines Vergleichspräparates: o-Benzolazo-ps-cumenol mit SnCl_2 u. HCl in Eg. reduziert zu o-Amino-ps-cumenol, dieses mit Acetylchlorid übergeführt in das *N-Acetylderiv.*, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$, schwach bräunliche Nadeln aus A., F. 162—163°; daraus VI. durch Erhitzen auf 200°. — *2,4,5-Trimethylphenol*, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$. Durch Red. von V. Nach Dest. F. 65—66°, ll. in A., Ä., Laugen, zl. in Bzn. FeCl_3 färbt nicht. — A gibt nach Spaltung mit sd. Eg.- $\frac{1}{4}$ *o-Aceto-v. hemellitenol*, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$ (VII.), Nadelchen, bei Verdunsten Rhomboide aus PAe., F. 42—43°, Kp. 275—276°, Kp.₁₁ 142—144°, D.^{99,5}₄ 1,0259, n^{99,5}_{He} = 1,68, E Σ für $\alpha = +1,49$, für $\beta - \alpha = +109\%$, meist ll., unl. in verd. NaOH. — Rk. tiefblau. Zur bequemeren Gewinnung von VII. wird das Rohprod. der Semicarbazone Verschiebung im Vakuum dest. u. das Öl mit passend konz. wss. NaOH versetzen, wobei die Hauptmenge erstarrt. — *Semicarbazone*, $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_3$, F. ca. 290°. — *Oxim*, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$, Nadelchen aus A., F. 160,5—161°, ll. in A., Eg., zl. in Bzl. von HCl nur verseift. — *2,3,4-Trimethyl-6-äthylphenol*, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$. Durch Red. von VII. Kp. 250—252°, seidige Nadelchen, F. 47—49°, ll. außer in W., mit Dampf flüchtig. FeCl_3 färbt nicht. — *Phenylurethan*, $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{O}_2\text{N}$, aus A., dann Bzl., F. 136—138°. — VII. wird von sd. 84%ig. H_3PO_4 in v. *Hemellitenol* (v. AUWERS u. AUWERS) übergeführt. — *ps-Cumenylchloracetat*, $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{Cl}$. Aus ps-Cumenol u. Acetylchlorid (130°, 2 Stdn.). Kp.₁₂ 149—152°, Prismen aus PAe., F. 56—57°. — *Trimethylcumaranon-(3)*, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_2$. Aus dem vorigen mit AlCl_3 (140°, 3 Stdn.). Gelbe Nadelchen aus CH_3OH , F. 115—117°, meist ll. Rotfärbung mit Alkali. — *o-Aceto-s. hemellitenol*, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$ (VIII.). Aus s. Hemellitenylacetat u. AlCl_3 (130°, $\frac{1}{2}$ Stde.). Nach Vakuumdest. liefert der erstarrte Anteil Prismen aus Lg.,

F. 83—84°, Kp.₁₃ 163—166°, meist ll., auch in verd. NaOH. FeCl₃-Rk. blaugrün. *Semicarbazon*, C₁₂H₁₇O₂N₃, Platten aus verd. CH₃OH, F. 210°. — *Oxim*, C₁₁H₁₅O Nadeln aus verd. A., F. 143°. Gibt mit sd. HCl (1:1) glatt *o*-Amino-*s. hemelliten hydrochlorid*; aus diesem *Dibenzoyl-o-amino-s. hemellitenol*, C₂₃H₂₁O₃N, Kryställchen aus A., F. 171—172°. Vergleichspräparat aus *o*-Benzolazo-*s. hemellitenol*. v. Hemellitenylacetat liefert mit AlCl₃ glatt VII. — *i-ps-Cumenol*. Darst. n. v. AUWERS u. SAURWEIN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 2388; C. **1922**. III. 1). Reinigung des Oxyaldehyds am besten über das Oxim, Spaltung mit HCl (1:1). *i-ps-Cumenylacetat*, C₁₁H₁₄O₂, Kp. 241°. — *Mesitylacetat*, C₁₁H₁₄O₂, Kp. 236°. Gibt mit AlCl₃ außer VII. sehr wenig einer Verb. vom F. 150°, den Eigenschaften nahestehend ein *p*-Oxyketon. — *3-Methyl-6-äthylphenylacetat*, C₁₁H₁₄O₂, Kp. 232°. — *2-Acetyl-4-methyl-6-äthylphenol*. C₁₁H₁₄O₂, nach Dampfdest. u. Reinigung über das *Semicarbazon* Kp.₃₀ 153°, unl. in verd. NaOH. FeCl₃-Rk. dunkelblau. — *Semicarbazon* C₁₂H₁₇O₂N₃, nach Auskochen mit A. F. 238—239°. — *p-Nitrophenylhydrazon* C₁₇H₁₉O₃N₃, gelbrote Nadeln aus verd. A., F. 176°, ll. — *4-Aceto-3-methyl-6-äthylphenol*, C₁₁H₁₄O₂, seidige Nadelchen aus Bzl., F. 117—118°. Gibt mit sd. H₂SO₄ *3-Methyl-6-äthylphenol* zurück. — *4-Methyl-6-äthylphenylacetat*, C₁₁H₁₄O₂, Kp. 233° bis 233°. — Zu Identifizierungszwecken wurden noch folgende Verbb. dargestellt: *s. o-Amino-as. o-xylol* oder *3,4-Dimethyl-6-aminophenol*. Durch Red. der entsprechenden Benzolazoverb. F. 173—175°. — *O,N-Dibenzoat*, C₂₂H₁₉O₃N, Nadelchen aus A., F. 152—153°, zwl. in A., ll. in Bzl. — *N-Benzooat*, C₁₅H₁₅O₂N. Aus dem vorigen mit alkoh. Lauge. Schwach bräunliche Schuppen aus Eg., F. 195—196°. — *2-Phenyl-5,6-dimethylbenzoxazol*, C₁₅H₁₃ON. Durch Dest. des vorigen. Seidige Nadelchen aus A., F. 164—165°, meist ll. — *o-Amino-as. m-xylol*, F. 134°. — *O,N-Dibenzoat*, C₂₂H₁₉O₃N, Nadeln aus verd. A., F. 154—155°, ll. außer in Bzn. — *N-Benzooat*, C₁₅H₁₅O₂N, Nadelchen aus A., F. 187—188°. — *2-Phenyl-5,7-dimethylbenzoxazol*, C₁₅H₁₃ON, Nadeln aus verd. CH₃OH, F. 99—100°, ll. außer in Bzn. — *2-Phenyl-4,6-dimethylbenzoxazol*, C₁₅H₁₃ON. Aus *o*-Benzamino-*s. m-xylol* (v. AUWERS u. BORSCHKE). Seidige Nadelchen aus CH₃OH, F. 133—134°. — *2-Phenyl-4,7-dimethylbenzoxazol*. Vgl. v. AUWERS u. SCHORNSTEIN (Fortschr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. **18**. Heft 2. 41; C. **1919**. II. 2268). (LIEBIGS Ann. **447**. 162—96. Marburg, Univ.) LINDENBAUM

C. J. Enklaar, Über die aliphatischen Terpene und ihre Abkömmlinge. 5. Mittheilung (4. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas **36**. 215; C. **1917**. I. 573.) Die mikrochem. Oxydation des *Ocimens* mit KMnO₄ u. die mikrokrystallograph. Unters. der Oxydationsprodukte haben ergeben, daß das Terpen sehr wahrscheinlich als *2,6-Dimethyloctatrien*-(1,3) zu formulieren ist. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **45**. 337—41.) LINDENBAUM

Frederick Maurice Rowe, Esther Levin, Alan Chamley Burns, John Stanley Herbert Davies und Wolfe Tepper, Eine neue Reaktion einiger von *β*-Naphthol-1-sulfonsäure abgeleiteten Diazosulfonate. I. Herstellung von *Phthalazon*- und *Phthalimid*derivaten aus *4'*-Nitrobenzol-2-naphthol-1-diazosulfonate WAHL u. LANTZ (Bull. Soc. Chim. de France [4] **33**. 97; C. **1923**. III. 1361) haben die Einw. von Alkali auf *4'*-Nitrobenzol-2-naphthol-1-diazosulfonate untersucht u. für *β*-Naphthol-1-diazosulfonate B. von Pararot das Diazooxyd I als Zwischenform angenommen, obwohl sie die analogen Verbb. aus 1-Brom(Chlor)-*β*-naphthol nicht fassen konnten. Vff. finden, daß *4'*-Nitrobenzol-2-naphthol-1-diazosulfonat (II) mit Na₂CO₃ leicht *Na-4'-Nitrobenzol-1-α-naphthylthochinon-1-sulfonat* (III) liefert u. dieses mit Alkali über IV als Zwischenprodukt unter Ringöffnung u. nachfolgender Umlagerung mit Ringschluß *3-(4'-Nitrophenyl)-1,3-dihydrophthalazin-4-essigsäure-1-sulfonsäure* (V). Hieraus mit Mineralsäuren *1-Oxy-3-(4'-nitrophenyl)-1,3-dihydrophthalazin-4-essigsäure* (VI) u. durch Red. *1-Oxy-3-(4'-amino-phenyl)-tetrahydrophthalazin-4-essigsäure* (VII). VII gibt mit Mineralsäuren verknüpft *4'-Amino-3-phenylphthalaz-4-on* (VIII). Die Red. von VIII mit Zn u. HCl führt zu *4'-Amino-N-phenylphthalimidin* (IX), analog wie RACINE (LIEBIGS Ann. **239**. 78 [188

3-Phenylphthalaz-4-on N-Phenylphthalimidin (XI) erhalten hat. Um die Konst. VI zu stützen, synthetisieren Vff. eine, der zweiten möglichen Formel (VIa), ähnlich baute Verb., indem sie β -Naphthochinon mit Ca-Hypochlorit zum δ -Lacton der α -hydroxyphenylglycerinsäure (XII) oxydieren u. hieraus mit HCl *i*-Cumarin-3-carbonsäure (XIII) herstellen. XIII kondensiert sich mit p-Nitrophenylhydrazin zu dem Azid XIV u. dieses liefert schließlich unter H_2O -Verlust N,4'-Nitrophenyliminobenzyl-3-carbonsäure (XV). XV weicht in seinen Eigenschaften stark von VI ab.






Versuche. Na- β -Naphthol-1-sulfonat gibt mit diazotiertem p-Nitranilin itrobenzol-2-naphthol-1-diazosulfonat (II) u. dieses mit Na_2CO_3 , Na-4'-benzol-1-azo- β -naphthochinon-1-sulfonat (III). III gibt mit NaOH neben wenig

Pararot eine Verb. $C_{16}H_{12}O_7N_3SNa$, aus A. rotgelbe Nadeln, ll. in W., wl. in A. Die Verb. kann als *Na-3-(4'-Nitrophenyl)-1,3-dihydrophthalazin-4-essigsäure-1-sulfat* (V) angesprochen werden. V gibt mit Mineralsäuren erhitzt unter SO_2 -Verlust *1-Oxy-3-(4'-nitrophenyl)-1,3-dihydrophthalazin-4-essigsäure*, $C_{16}H_{13}O_5N_3$ (VI), aus Essigester, F. 241°, ll. in A., Aceton u. Eg., wl. in Bzl. u. Ä., Ag- u. Ba-Salze. Über den F. erh. entsteht Nitrobenzol. Als Nebenprod. obiger Rk. wird eine Verb. vom F. 331° bildet. Derivv. von VI: *Methylester*, $C_{17}H_{15}O_5N_3$, aus Methylalkohol, F. 153°, *Acetylderivat*, $C_{18}H_{17}O_5N_3$, aus A., F. 180° (krystallograph. untersucht). *Acetylderiv.*, $C_{18}H_{15}O_5N_3$, aus A., F. 212°, *Anilid*, $C_{22}H_{13}O_4N_4$, aus Essigester, F. 190—192° (Zers.). Die Oxydation von VI mit $K_2Cr_2O_7$ liefert eine Verb. vom F. 247°. Na-Hydrosulfit reduziert VI zu *1-Oxy-3-(4'-aminophenyl)-tetrahydrophthalazin-4-essigsäure*, $C_{16}H_{17}O_3N_3$ (VII) aus verd. Eg., F. 239°, l. in A., unl. in Bzl., mit $FeCl_3$ eine vorübergehende weinrote Färbung. *Acetylderivat*, $C_{18}H_{19}O_4N_3$, aus verd. Eg., F. 266°, Sintern bei 145—165°. Die Oxydation von VII mit $Na_2Cr_2O_7$ liefert eine Verb. vom F. 276°. Die Lsg. von VII in konz. HCl gibt bei Kochen (18 Stdn.) *4'-Amino-3-phenylphthalaz-4-on*, $C_{14}H_{11}ON_3$ (VIII), aus A., F. 212°, l. in h.W., unl. in Alkalien, *Hydrochlorid*, *Acetylderivat*, $C_{16}H_{13}O_2N_3$, aus verd. Eg., F. 348°. Die Oxydation von VIII mit $Na_2Cr_2O_7$ liefert Benzochinon, F. 115° u. Phthalinsäure, F. 197°. VIII bildet mit Zn u. HCl reduziert *4'-Amino-N-phenylphthalimid*, $C_{14}H_{12}ON_2$ (IX), aus A., F. 198°, *Hydrochlorid*, *ZnCl₂-Doppelsalz*, *Acetylderivat*, $C_{16}H_{13}O_2N_3$, aus verd. Eg., F. 196°. Die Oxydation von IX, wie oben ausgeführt, gibt Benzochinon u. Phthalimid, F. 234°. Das Sulfat von IX liefert diazotiert u. mit A. verköchlicht *N-Phenylphthalimidin* (XI) vom F. 160°. Das Hydrochlorid von IX gibt diazotiert die überschüssige HNO_2 mit Carbamid zerstört u. die Lsg. 2 Stdn. mit H_2SO_4 (gekocht) *4'-Oxy-N-phenylphthalimidin*, $C_{14}H_{11}O_2N$ (X), aus A., F. 228°, *Methyläther*, $C_{15}H_{13}O_2N$, aus Methylalkohol, F. 134°, *Äthyläther*, $C_{16}H_{15}O_2N$, aus A., F. 148°. β -Naphthochinon gibt mit Ca-Hypochlorit oxydiert das δ -Lacton der *o*-Carboxyphenylpyruvinsäure (XII) vom F. 202—203° u. dieses mit konz. HCl erhitzt *i*-Cumarin-3-carboxysäure (XIII), F. 238—239°. XIII liefert in A. mit *p*-Nitrophenylhydrazin $\frac{1}{2}$ Stdn. erhitzt *o*-Carboxy- α -hydrozimtsäure-*p*-nitrophenylhydrazid, $C_{16}H_{13}O_6N_3$ (XIV), aus A., F. 189—190° (Zers.). Durch Verseifen mit verd. Mineralsäuren hieraus die Komponenten. Durch rückfließendes Erhitzen mit Toluol u. PCl_2 wird XIV H_2O entzogen es entsteht *N,4'-Nitrophenylimino-i-carbostyryl-3-carbonsäure*, $C_{16}H_{11}O_5N_3$ (XV), Essigester, F. 287° (Zers.), ll. in Aceton u. Eg., wl. in A. u. Ä. Die Red. mit Hydrosulfit gibt eine Aminosäure vom F. 265°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 690—706. Manchester. Städt. Coll. für Techn.) TAUBER

Louis F. Fieser, *Ein Vergleich des heterocyclischen Systems mit dem Benzolsystem*. I. *6,7-Indazolchinon-4-sulfosäure*. Das Red.-Potential des α -Naphthochinons 224 Millivolt kleiner als das des *p*-Benzochinons, das des β -Naphthochinons 220 Millivolt kleiner als das des *o*-Benzochinons. Um das heterocycl. System mit dem Benzolsystem vergleichen zu können, bestimmte Vf. das Reduktionspotential der *6,7-Indazolchinon-4-sulfosäure* (I) bei 25° gleich 0,620 V u. das der *1,2-Naphthochinonsulfosäure* (II) bei 25° gleich 0,630 V. Dieses nahe Zusammenliegen der beiden Potentiale könnte dafür sprechen, daß die Äthylenbindung im Pyrazolring einer Benzoldoppelbindung gleich wäre, was aber unsicher ist, da die beiden verglichenen Systeme nicht gleich sind. Vielleicht üben auch die N-Atome gegenseitig einen Einfluß aus, ähnlich dem Einfluß substituierter NH_2 - oder OH-Gruppen u. unabhängig von der Stabilität des Ringsystems. — Ausgehend vom *6-Oxyindazol* aus *6-Aminoindazol*, st. Vf. durch Kuppeln mit *Diazobenzolchlorid* das *6-Hydroxy-7-benzolazoindazol* dar, das wird mit $Na_2S_2O_4$ zu *6-Oxy-7-aminoindazol* reduziert, letzteres mit $K_2Cr_2O_7$ u. H_2SO_4 zu dem *6,7-Indazolchinon*, das schon von FRIES u. ROTH (LIEBIGS Ann. 41, 81; C. 1914. I. 1663) beschrieben ist. Dieses wird durch $NaHSO_3$ in das *6,7-Indazolhydrochinon-4-sulfosaure Na* übergeführt, das durch $NaNO_2$ zu dem *Na-Salz* der *6,7-Indazol-*

Chinonsulfosäure I oxydiert wird. Den Beweis dafür, daß die Verb. ein 6,7-Chinon ist, brachte Vf. dadurch, daß er 6-Aminoindazol mit *p*-Diazobenzolsulfosäure kuppelte, entstandene 6-Amino-7-(*p*-azobenzolsulfosäure)-indazol zu 6,7-Diaminoindazol reduzierte. Die Fähigkeit, mit Ameisensäure das 6,7-Imidazoindazol (III) u. mit Phenanthren-1,10-diamin das 6,7-Phenanthrazinoindazol (1,2,3,12-Indazophenanthrazin) zu bilden, beweist, daß beide NH₂-Gruppen in *o*-Stellung zu einander stehen. Durch Einw. von Natrium auf I wird die Sulfogruppe durch den Anilinrest ersetzt unter B. des 4-Anilino-6,7-Indazolchinons, eine für β -Naphthochinonsulfosäure charakterist. Rk., woraus hervorgeht, daß die zweite NH₂-Gruppe in 7-Stellung eingetreten ist.



6-Hydroxy-7-benzolazoindazol, C₁₃H₁₀ON₄, F. 238°. — 6-Hydroxy-7-aminoindazol, C₇H₇ON₃. Färbt sich gegen 190° dunkel u. zersetzt sich gegen 260°. — Monohydrat, C₇H₈ON₃Cl · H₂O. — Dichlorhydrat, C₇H₈ON₃Cl₂. Wird leicht zum 6,7-Indolchinon oxydiert. — 6,7-Indazolhydrochinon-4-sulfosäure, C₇H₆O₅N₂S. Zers. gegen 40°. — 6,7-Indazolchinon-4-sulfosaures Na, C₇H₅O₅N₂SN_a (I). — 4-Anilino-6,7-indolchinon, C₁₃H₉O₂N₃, F. 360° unter Zers. — 6-Amino-7-(*p*-azobenzolsulfosäure)-indazol, C₁₁O₃N₅S. — 6,7-Diaminoindazolhydrochlorid, C₇H₈N₄Cl. — 6,7-Imidazoindazol, C₇H₆N₄ (III). Nadeln, F. 293°. — 6,7-Phenanthrazinoindazol, C₂₁H₁₂N₄. Gelbe Nadeln. 40°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1097—1107. Bryn Mawr, Pennsylvania.) BR.

Wilhelm Eller und Armin Schöppach, Die Zersetzung der Huminsäuren bei 100°. Vff. haben die Zers., welche Huminsäuren bei einer Temp. von 100° erleiden, quantitativ festgelegt. Zur Unters. kamen: Eine natürliche Huminsäure aus Braunkohle, eine Huminsäure aus Rohrzucker (durch Einw. von konz. HCl in der Wärme erhalten) u. eine künstliche aus Hydrochinon (durch Einw. von Kaliumpersulfat). Die Präparate wurden bei Temp. < 65° im Vakuum über P₂O₅ getrocknet. Bei einer Temp. von 100° hatte bei allen Präparaten eine unerwartet große Zers. zur Folge. Nach 2 Stdn. spalteten ab: die Hydrochinon-Huminsäure 11,5% W., 1,4% CO₂, die Rohrzucker-Huminsäure 7% W., 1,6% CO₂ u. die Braunkohlen-Huminsäure 8,5% W. Die Größe der abgespaltenen Mengen H₂O u. CO₂ in den einzelnen Zeiteinheiten u. die Änderung der chem. Zus. sind in Tabellen angeführt. Vff. schließen aus ihren Verss., daß alle Analysen von Huminsäuren, die Temp. über 80° ausgesetzt sind, unbrauchbare Werte liefern. (Brennstoffchemie 7. 17—20. Jena, organ. Abt. chem. Lab. d. Univ.)

BIELENBERG.

E. Biochemie.

Robert Chambers und Paul Reznikoff, Das Verhalten des Protoplasmas lebender Amöben zu injizierten Salzen. NaCl- u. KCl-Lsg. in den Amöbenkörper injiziert, u. in Mengen, die dem Kernvol. oder dem Gewicht der ganzen Amöbe entsprechen, bewirken Verflüssigung u. reversiblen Stillstand der Bewegungen. CaCl₂ bewirkt lokal bleibende irreversible Koagulation u. Erstarrung. MgCl₂ breitet sich rasch durch das ganze Plasma aus u. ist am giftigsten. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 20—22. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 144. New York, Dep. of anat. Cornell Univ. coll. Ref. SPEK.)

OPPENHEIMER.

E₁. Enzymchemie.

Olga Lakela, Hydrolytische Enzyme von Phormidium lamosum. Die chem. Analyse des Algenmaterials ergab einen Aschengehalt von 53% der Trockensubstanz.

Eiweiß, Amino-N u. Glykogen nachweisbar. Zucker, Stärke u. Pentosane fehlen ebenso Diastase, Invertase u. Casein spaltende Enzyme. Dagegen war *Lipase* u. Glykogen hydrolysierendes Ferment vorhanden. (Botan. gaz. **80**. 102—06. Ber. ges. Physiol. **34**. 173. Ref. WALTER.) OPPENHEIM

A. Mougéot und **V. Aubertot**, *Oxydasen und Mineralwässer*. Vf. zeigen, eine größere Anzahl, dem Namen nach aufgeführte Mineralwässer die Spontanoxydation von Pyrogallol oder Hydrochinon hemmen. Andere Mineralwässer begünstigen die Oxydation von nicht spontan oxydierenden Phenolderivv. durch Oxydasen. (C. R. de biologie **94**. 818—19.) OPPENHEIM

Jay Frank Schamberg und **Herman Brown**, *Wirkung verschiedener Agentien auf die Enzyme des Blutes und der Haut*. Nach Bestrahlung sinkt der lipolyt. Index während der proteolyt. steigt. Terpentinölemulsioninjektion bewirkt Steigen beider Fermente, ebenso Staphylokokkenvaccine u. Eigenblut. Neosalvarsan- oder dest. W.-Injektionen schwächen beide Fermente im Blut. Kaninchen- u. Menschenverss. (Arch. of internat. med. **35**. 537—48. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 257. Ref. HULDSCHINSKY.) OPPENHEIM

Camillo Ninni, *Die Anwesenheit von Lactasen und Invertasen in Organen, Stellung bakteriell erhaltener Monosaccharide in vitro*. Typhus-, Paratyphus-, Tetanus- u. Cholera Bazillen, die Milch nicht zum Gerinnen bringen, rufen nach Zusatz eines sterilen Organstücks Gerinnung hervor. Die Organfermente zerlegen den Milchzucker in Monosaccharide, die bakteriell zu Säuren aufgespalten werden. Es kann auf diese Weise auch die Ggw. bzw. das Fehlen von *Lactasen* in verschiedenen Organgewebe des Körper-Fll. festgestellt werden. (Pathologica **17**. 73—78. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 256. Neapel, Laborat. bacteriol. Ref. LAQUER.) OPPENHEIM

Heinrich Lüers und **Albert Diem**, *Über die Adsorptionsreinigung des Labors und eine neue Methode zur Ermittlung der Labkonzentration*. Viscometr. Methode der Labwrkg. unter Einfluß verschiedener Tempp., pH u. Ca-Salzkonz. Chytrid wird von Bleicherde (saures Silicat) u. von bas. Tonerde adsorbiert. Die Elution des Tonerdeadsorbats gelingt nicht mit NH_3 oder CO_2 , aber mit Phosphatpuffer (pH = 6,98). Mehrfache Adsorption u. Elution steigert den Labwirkungsgrad 1:200000 auf 1:5,6 bis $7,6 \cdot 10^6$, während der N-Gehalt auf den 10. Teil herabgedrückt wird. Lab- u. Pepsinadsorption gehen nicht parallel. (Milchwirtschaftl. Forsch. **405**—31. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 257. München, Lab. f. angew. Chem. t. Hochschule. Ref. JACOBY.) OPPENHEIM

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

E. G. Pringsheim, *Über Stärkewanderung und Wanderstärke*. Die in den Stielen u. Blattstielen auftretende Stärke wird im allgemeinen als „Wanderstärke“ bezeichnet. Der aus den Blättern auswandernde, durch Abbau der zunächst entstehenden Stärke gebildete Zucker soll in den Zellen der Leitbahnen wieder in Stärke umgebildet werden, wodurch das Diffusionsgefälle erhöht u. die Wanderung beschleunigt werden soll. Vf. vergleicht die wechselseitige B. von Stärke u. Zucker auf einander mit dem Verhalten zwischen einem festen Stoff u. dessen Lsg. u. zeigt, daß auf physikal.-chem. Grundlage obige Vorstellung nicht aufrecht erhalten werden kann. Auch wenn man annimmt, daß die lebende Zelle nach Belieben Stärke auf- oder abbauen kann, stößt man auf obiger Theorie auf Widersprüche. Vf. lehnt die „Wanderstärke“ vollständig ab, da die Fähigkeit des Zuckers zu wandern, vorläufig unbewiesen ist. Das Auftreten von Stärke hat mit der Leitung der Assimilate nichts zu tun. Die Stärke ist da, wo sie auftritt, immer ein Reservestoff, der einmal für längere, einmal für kürzere Zeit in fester Form niedergeschlagen wird. (Naturwissenschaften **14**. 305—07. Prag.) JACOBY

- L. A. Herrera**, *Nachahmung von Zellen in Teilung und der Sporenkeimung mit amfluosilicat*. Beschreibung u. Abb. der mit verbesserter Methodik (vgl. Atti acad. dei Lincei, Roma [6] 1. 639; C. 1925. II. 1530) erhaltenen Bilder. (Atti acad. dei Lincei, Roma [6] 2. 387—92. 1925. Mexico, Lab. degli Studi biol.) Sp.
- E. Esenbeck** und **K. Suessenguth**, *Über die aseptische Kultur pflanzlicher Mykopen, zugleich ein Beitrag zum Nachweis der Enzymausscheidung*. Entnahme der Mykopen aus Maiskörnern gelingt mit vollkommener Bakterienfreiheit, wenn die Körner 5—20 Min. 1% Bromwasser ausgesetzt sind u. entsprechend asept. gearbeitet. Die Embryonen enthalten u. produzieren *Diastase*, was andern Autoren infolge Sterilisation durch andere Desinfektion entgangen ist. (Arch. f. exp. Zellforsch. 1. 86. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 175—76. Ref. SCHMUCKER.) OPPENHEIMER.
- Wl. Butkewitsch**, *Die Säuren als Zwischenglied der oxydativen Umwandlung von Zuckern durch die Pilze*. (Vgl. Biochem. Ztschr. 154. 177; C. 1925. I. 1215.) Auch Citronensäure konnte neben Oxalsäure als Stoffwechselprod. bei *Aspergillus* wie Citronensäure nachgewiesen werden. Citronensäure ist ein Umwandlungsprod. des Zuckers. Annahme der proteolyt. Herkunft ist unberechtigt. (Jhb. f. wiss. Botanik 64. 150. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 622—23. Ref. WÄCHTER.) OPPENHEIMER.
- F. G. Novy jr.**, *Bakterienatmung. IV. Das sogenannte aerobe Wachstum von Anaerobien: Kartoffelatmung*. Das Unvermögen der Anaerobien, bei Ggw. von Luft zu wachsen, ist nicht der hypothet. B. von Peroxyd oder der Abwesenheit von Katalase zuzuschreiben. Bei Aerobien u. Anaerobien ist die Natur der Atmungsenzyme (s. u. Anaerose benannt) wesensverschieden. (Journ. of infect. dis. 36. 343—82. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 623. Ann Arbor, Hyg. Labor. Univ. of Michigan. Ref. OPPENHEIMER.)
- Heinrich Walter**, *Die Verdunstung von Wasser in bewegter Luft und ihre Abhängigkeit von der Größe der Oberfläche. Zur Kritik der Transpirationsversuche*. Die Bestimmung der Transpirationsgröße nach der Pflanzenoberfläche ist nicht richtig. Man wird man, da die einflussnehmenden Faktoren bei der Berechnung nach Flächeninhalt nicht berücksichtigt werden können, die Oberfläche besser durch das Frischgewicht ersetzen (vgl. S. 1876). (Zeitschr. f. Botan. 18. 1—47. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 73. Heidelberg, Botan. Inst. Ref. WALTER.) OPPENHEIMER.
- Moris Powell**, *Entwicklung und Verteilung des Chlorophylls in im Licht gewachsenen und in Blüthenpflanzen*. Die B. von Chlorophyll hängt von den Assimilationsbedingungen ab, ist bei verschiedenen Spezies verschieden u. wird von Nährstoffgehalt beeinflusst. (Ann. of botan. 39. 503—23. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 538—39. 1925; SCHRATZ.) OPPENHEIMER.
- Asimir Rouppert**, *Über das Benzidin als Reagenz in lebenden Pflanzen*. Kultiviert *Phaseolus vulgaris* in verd. Lsgg. von Benzidin, so geben die Cellulosemembranen der Hülln. von MANGIN-RAICBORSKI. Farbrkk. lassen auf die Ggw. einer Oxydase schließen. Hüllen der gerbsäurehaltigen Zellen schließen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 533—35.) OPPENHEIMER.
- M. Nadson** und **A. Zolkevič**, *Über die kombinierte Wirkung des Radiums und anderer Agenzien auf die Pflanze. — Über die kombinierte Wirkung des Lichtes und der Radiumstrahlung auf die Pflanze*. Die Radiumwrkg. ist keine sogenannte Sekundärstrahlenwrkg. Verss. an Pflanzensamen (*Sinapis alba*), die Radiumstrahlung allein oder unter zeitiger Einw. von J, KJ, CuSO_4 , Chloralhydrat u. Eosin ausgesetzt wurden, zeigten, daß die stärkere Keimschädigung bei kombinierter Einw. der Faktoren additive Wrkg. der Einzelfaktoren ist. KJ desensibilisiert die Radiumstrahlung. (Antagonismus K-Ra.) Eosin zeigt bei Ra-Strahlen dieselbe photodynam. Wrkg. wie bei Einw. sichtbarer Strahlen. — II. Daß für diese Eosinwrkg. die Fluoreszenz der Pflanze ein spezif. Faktor ist, wird daraus gefolgert, daß auch das wenig fluoreszierende Eosin u. das gar nicht fluoreszierende Fuchsin einen photodynam. u. wachstums-

hemmenden Effekt besitzen. (Vertnik rentgenologii i. radiologii **3**. 85—106. 1924; Ber. ges. Physiol. **34**. 176—77. Ref. WALTER.) OPPENHEIM

William N. Berg, *Ein 12-prozentiger Dextrosenährboden für langdauerndes Anärobenwachstum*. Empfehlung eines Nährbodens aus Schweinsleber 2500, De 1000, CaCO_3 350, Pepton 80, Ringersalz 400, W. 7000 für Gasbrandkulturen. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 91—92. 1924; Ber. ges. Physiol. **34**. 260. Bro Berg. biol. laborat. Ref. BREGMANN.) OPPENHEIM

Gregory Schwartzman, *Akzessorische Nährstoffe und Bakterienwachstum. Einfluß der Anfangs-H-Ionenkonzentration des Nährbodens auf die wachstumsfördernde Kraft von Tomatenextrakt*. (Vgl. S. 2210.) Das beste Wachstum bei Zusatz von Tomatenextrakt fand sich bei $\text{pH} = 8,2$ — $8,6$. Wirksame Substanz des Tomatenextrakts wird durch Tierkohle absorbiert werden. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 1924; Ber. ges. Physiol. **34**. 100. New York, Lab. of bacteriol. New York hospital pathic med. coll. a. flower hosp. Ref. SELIGMANN.) OPPENHEIM

Albert Berthelot und **G. Amoureux**, *Über die antiseptischen Eigenschaften von Crotonaldehyd*. Crotonaldehyd ist ein schwächeres Antiseptikum als Acrolein, 50 g pro l hemmen die Weiterentw. von Staphylococcus aureus nur unvollkommen. (Bull. Soc. Chim. Biol. **8**. 209—10.) OPPENHEIM

W. W. Coblentz und **H. R. Fulton**, *Radiometrische Untersuchung über die tödende Wirkung der ultravioletten Strahlen*. Stärkste keimtötende Kraft einer Dampflampe geht von Strahlen der Wellenlänge 170 — 280μ aus. (Americ. J. of electrotherapeut. a. radiol. **43**. 251—63. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 14. Washington Bureau of plant industry. Ref. LÜDIN.) OPPENHEIM

J. W. Cornwall, *Über den wechselnden Gehalt an löslichen Proteinen in Bouillonkulturen von B. typhosus*. Der Eiweißgehalt der Kulturen steigt bis zur 12. Woche. Er stammt von den zerfallenden toten Bacillen. Abnahme des Eiweißgehalts tritt ein, wenn die Hydrolyse rascher erfolgt als der Zugang durch die lebenden Bacillen. Hinweis auf die Abhängigkeit des Bacillenwachstums von der Nährstoffkonzentration. (Indian Journ. Medical Research **13**. 483—90. Coonor, Pasteur Inst. for South India.) OPPENHEIM

Paul Courmont, **A. Morel** und **I. Bay**, *Über die Veränderungen der Reaktionskraft und des Ammoniakstickstoffs in homogenen Kulturen von Bacillus tuberculosis humanus in durch Ammoniak charakterisiertem Milieu*. In einem Kulturmedium (KH_2PO_4 2,5, MgSO_4 2,5, Mannit 6,0, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 2,0, Glycerin 15,0 g, W. ad 1000 ccm) sind die Veränderungen während des Bazillenwachstums geringer, als in Pepton-Glycerinkulturen. (C. r. soc. de biologie **94**. 864—65. Lyon, Inst. bacteriol.) OPPENHEIM

E. Tierchemie.

Robert E. Lutz, *Das normale Vorkommen von Zink in biologischem Material. Eine Übersicht über die Literatur und eine Untersuchung der normalen Verteilung von Zink in der Ratte, der Katze und im Menschen*. Die Literaturübersicht läßt erkennen, daß Zn ein n. Bestandteil biolog. Materialien ist. Dies wird durch eigenen Unterss. an Ratten, Katzen u. Menschen bestätigt u. dahin erweitert, daß allem Anschein nach die Konz. des Zn in jeder Gewebsart in der Norm innerhalb gewisser Grenzen konstant ist. Der Gehalt schwankt in mg pro g bei der Ratte von (Blut) bis 0,1784 (Knochen), durchschnittlich im ganzen Körper 0,0294, bei der Katze von 0,0046 (Blut) bis 0,2241 (Haar), durchschnittlich im ganzen Körper 0,0332, bei Menschen von 0,0052 (Blut) bis 0,1630 (Haar). (Journ. Ind. Hygiene **8**. 177—180. Boston [Mass.], Harvard School of Public Health.) SPIEGEL

Henriette Gorodissky, *Studien über die chemische Topographie des Gehirns. Die Lipoide und der Gesamtstickstoff der Großhirnrinde des Menschen*. (Vgl. Biochem. Ztschr. **159**. 379; C. **1925**. II. 1546.) Funktionell verschiedene Abschnitte der

rinde des Menschen sind bezgl. ihrer chem. Zus. verschieden. Besonders deutlich die topograph. Verteilung des *Cholesterins*, der durch A. extrahierbaren *Lipoide* *ebroside* u. gesätt. *Phosphatide*, des Gesamt-N u. des P der ungesätt. *Phosphatide*. dem Altern (bei ca. 50 Jahren) vermehrt sich das Cholesterin, Gesamt-N u. P ungesätt. *Phosphatide* vermindern sich etwas. (Biochem. Ztschr. **164** 446—80. Charkow, Med. Inst.)

WOLFF.

M. Loeper, A. Lesure und J. Tonnet, *Schwefel und Nebennierenpigment*. (Vgl. 336.) In dem aus getrockneter Nebennierensubstanz isolierten Pigment, einer räumlichen fetthaltigen M., wurde festgestellt 0,35% Gesamt-N, 0,11% Fe, 0,028% Asäure-N u. 0,1% S. Nach der Entfettung lauten die Zahlen: (in der gleichen Folge) 10,08%, 0,056%, 0,53%, 0,19%. (C. r. soc. de biologie **94**. 740—41.) OPP.

Ashutosh Roy, *Die Biochemie der Schilddrüse*. Zusammenstellung von Analysen Aschen-, J- u. Eiweißbestandteile der Drüse. (Indian. med. record. **45**. 133—39. Ber. ges. Physiol. **34**. 219. Ref. SCHULZ.)

OPPENHEIMER.

E₅. Tierphysiologie.

Ernst Mangold, *Schilddrüse und prämortale Stickstoffsteigerung beim Hungertier*. Verss. an n. u. schilddrüsenlosen Hunden beeinflusst die Schilddrüse nicht den auf der N-Ausscheidung beim Hungertier; es trat stets eine typ. prämortale N-erung im Harn auf. Die Verss. sprechen im Sinne von F. N. SCHULZ für das treten einer Autointoxikation als Ursache der prämortalen N-Steigerung u. für Eintritt des Hungertodes. Hunde können durch ein wenige Stdn. vor dem Hunger- verabreichtes Futter geeigneter Zus. am Leben erhalten werden. (Biochem. Ztschr. 178—86. Berlin, Landw. Hochsch.)

WOLFF.

W. Klein, *Respirationsversuche an Hungerhunden mit und ohne Schilddrüse*. trat geringer, stetiger Abfall der Stoffwechselintensität bis zum letzten Tage auf. mit dem mächtigen Absinken der Körpertemp. (bis 35°) stürzt dann auch die eubildung. Ein Einfluß der beginnenden prämortalen Eiweißschmelzung läßt an der O₂-Aufnahme im Sinne einer Steigerung mit Sicherheit nicht nachweisen. hem. Ztschr. **168**. 187—91. Berlin, Landw. Hochsch.)

WOLFF.

Lermstein, *Untersuchungen über den Lipoidgehalt des Corpus luteum*. Vgl. ersen von Corpora lutea in verschiedenen Stadien. Wassergehalt ist in keinem icklungsmoment konstant. Auch der Lipoidgehalt unterliegt starken individuellen anken. Im Blütestadium ist er am größten, vorwiegend finden sich Cholesterin, sterinester u. *Phosphatide*. Nach den Menses werden die komplexen Lipide Fettsäuren, Neutralfette u. Seifen mehr u. mehr verdrängt. (Arch. f. Gynäk. 739—70. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 610. Breslau, Univ. Frauenklin. Ref. E.)

OPPENHEIMER.

J. Posner, *Sexualhormone, Lipide und Organpräparate*. Behandlung organ- peut. Präparate mit „lipoidophilen“ Farbstoffen ergab die Ggw. von Lipiden, doch gegenüber Nucleinen zurücktraten. (Arch. f. Frauenkunde u. Konstitutions- u. **11**. 233—37. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 224. Ref. RUNGE.)

OPPENHEIMER.

J. Nothmann, *Über insulinartige Substanzen*. Übersichtsreferat. (Klin. Wechr. 7—99. Breslau, Univ.)

FRANK.

J. F. Mc Clendon, *Das Vorkommen des einfachen Kropfes und sein Zusammenhang mit dem Jodgehalt des Wassers und der Nahrungsmittel*. 1 Teil J in 200 Millionen W. genügt zur Verhinderung von Kropf. Aufnahme von jodhaltigen Nahrungs- in, insbesondere von Butter, Blattgemüse, Früchten u. Seefischen, verhindert bldung auch bei notgedrungener Verwendung eines kropferzeugenden W. (Journ. Water Works Assoc. **15**. 222—23. Minneapolis in Minnesota, Physiolog.-chem. E.)

SPLITTGERBER.

P. Astanin, *Zur Frage der experimentellen Calcämie*. Chron. Calcämie läßt unter n. Verhältnissen durch Verfütterung von Ca-Verbb. nicht hervorrufen. Ca-Salze treten jedoch aus dem Darmkanal ins Blut über u. rufen nach Einführung in den Magen eine vorübergehende Hypercalcämie für 2—4 Stdn. hervor (mit *Calcium glycerophosphoricum* u. *Calcium phosphoricum colloidal*, ähnlich mit *Calcium stercorale colloidal*). Ausschaltung der Exkretionsorgane beeinflußt relativ wenig die Ausscheidung des Ca aus dem Blute. Geringere Blutentnahmen üben keinen merklichen Einfluß auf den Ca-Gehalt des Blutes aus. (Biochem. Ztschr. **168**. 231—38. Lenin. Mil.-med. Akad.) WOLFF

Alfred Neumann, *Die eosinophile Granulasubstanz des Blutes und ihre Darstellung. Untersuchungen über ihre Beschaffenheit und Eigenschaften*. III. Mitt. *Zur Kenntnis des oxydativen Prinzips der eosinophilen Granula*. Die eosinophile Substanz eines Eosinophils stellt einen mit schwach saurem, wasserarmem A. abspaltbaren Lipoidkörper, (wenigstens beim Pferde) den eigentlichen formgebenden Kern dar. Die Intensität der Peroxydaserk. hängt direkt vom N-Gehalt des Granulapräparates ab. Die *phenolblausynthese* der eosinophilen Granula ist eine Rk. auf eine echte Oxyphenol. (Folia Haematologica **32**. 10 Seiten. Sep. Wien.) WOLFF

Hertha Schumacher, *Untersuchungen über den Milchsäuregehalt des Blutes bei Karzinomkranken*. Bei Karzinomkranken, die eine ernsthafte Leberschädigung (Lebertumoren, Metastasen) aufwiesen, war der Milchsäurespiegel im Blute erhöht. Im Durchschnitt wurden gefunden: Im Blute n. Menschen = 11,3 mg-%, im Blute Karzinomkranker ohne nachweisbare Leberbeteiligung = 11,9 mg-%, im Blute Karzinomatöser mit ernstlicher Beteiligung der Leber = 28 mg-% Milchsäure. (Klin. Wochenschr. **5**. 499. Frankfurt a. M., Univ.) FRANKE

E. Sluiter, *Einfluß der Magnesiumsalze auf die Gerinnung des Citrat- oder Phosphatblutes*. „Citratblut“ wie „Citratplasma“, d. h. Blut oder Plasma, dem zur Gerinnungshemmung Na-Citrat zugesetzt ist, gewinnt das Gerinnungsvermögen durch Fructosezusatz wieder. Von folgenden Kombinationen 1. Fibrinogenlsg. in W. + Fructose, 2. Lsg. in Ringer + Citrate + Fructose, 3. Lsg. in Ringer allein, 3. Lsg. in Ringer + Citrat, 4. Lsg. in Ca-freiem Ringer allein u. 5. in Ca-freiem Ringer + Fructose erhielten Thrombinogen in Gestalt von Oxalatplasma) kamen nur 2. u. 3. zur Gerinnung. Aus diesen Tatsachen u. der bekannten Annahme, daß das Ca-Citrat eine besondere Art der Bindung besitzt, kam Vf. zur Überzeugung, daß Fructose das Ca aus der Citratbindung löst u. ein Fructosat nach der Formel $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_5\text{O} \begin{smallmatrix} \text{Ca} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{C} \end{smallmatrix} \text{OCH}_2\text{OH}$ sich bilde. Unterstützt wird diese Anschauung durch den Befund, daß nur Ketose die Citratgerinnungshemmung aufheben. Merkwürdigerweise ließen sich die Beobachtungen aber nur mit Handelsfructose bestätigen, nicht mit selbst gereinigter Aschenanalyse stellten im Handelsprod. 0,64 g-% MgCl_2 fest, so daß die begründete Vorstellung der Vorgänge, die auch durch Verss. mit MgCl_2 erhärtet wird, die Annahme dürfte, daß das Mg das Ca-Ion aus der Citratbindung frei macht u. damit die Gerinnung ermöglicht. (Archives néerland. d. Physiol. de l'homme et des animaux **10**. 461. Amsterdam, Lab. de physiol.) OPPENHEIM

Amedeo Dalla Volta, *Vergleichende Untersuchung der hauptsächlichsten Reduktionsmittel für Oxyhämoglobin*. Unterss. über die im Handel befindlichen organ. Reduktionsmittel mit Angaben über die Reaktionszeiten, B. von Methämoglobin, Haltbarkeit von Lsgg. usw. (Arch. di antropol. crim., psychiatr. e med. leg. **45**. 263—86. Ber. ges. Physiol. **33**. 503. Padua, Ist. di med. leg. Ref. ROSENTHAL.) OPPENHEIM

Upendra Nath Brahmachari, *Einige Beobachtungen über den Mechanismus der Chininhämoglobinurie beim Menschen*. Nr. 2. Bericht über einen Fall mit Kala-Aszites, der einer Malaria wegen Chinin erhält u. mit Hämoglobinurie reagiert, die sp.

ingt zu einer Zeit, als das Leberblut hämolyt. ist. (Indian Journ. Medical Research 695—96. Calcutta, Med. Coll. hosp.)

OPPENHEIMER.

Béla Purjesz und István Weiss, *Untersuchungen über das Antitrypsin und die diagnostische Verwertung*. Änderungen des antitrypt. Titers im Serum kann Carcinom nicht spezif. sein, weil bei verschiedenen Erkrankungen Änderungen kommen. (Magyar orvosi arch. 25. 326—37. 1924; Ber. ges. Physiol. 33. 622. Ref. 88.)

OPPENHEIMER.

V. Kollert und H. Grill, *Über die Einwirkung von Injektionen des Saponins der Primula elatior auf den Cholesteringehalt des Kaninchenserums*. Die in den Verss. von LERT, KOFLER u. SUSANI (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 45. 682; C. 1925. II. 940) endeten Präparate waren im allgemeinen von KOFLER selbst aus Primula veris herstellt u. enthielten Primulasäure. Nur eine Lsg., in der zitierten Arbeit als „Ampullen-säure“ hervorgehoben, war von einer Firma geliefert u. stammte, wie weitere Verss. ergab, von Primula elatior, deren Saponin von Primulasäure abweichende Eigenschaften, besonders nur etwa $\frac{1}{2}$ so große Giftigkeit (intravenös) hat. Die nach der intravenösen Zufuhr des Elatiorsaponins eintretende Hypercholesterinämie hält durchschnittlich 3—12 Tage an, wonach eine Periode verminderten Serumcholesteringehaltes folgt. Bewegungen des Cholesterinspiegels sind Schwankungen des Körpergewichtes oben Umrissen entgegengesetzt proportional. — Nach Verss. von **S. N. Kohno** ist die Zeit der Hypercholesterinämie (durch Primulasäure) auch die Ausschwemmung Cholesterin durch die Galle vermehrt, zur Zeit minimalen Cholesterintransportes im Serum vermindert. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 49. 522—24. Wien, Univ.) **Dr. J. Cluzet und A. Chevalier**, *Über die Viscosität und die optischen Eigenschaften alkalisierten Blutserums*. Die ursprüngliche Serumviscosität bleibt bei Alkalizusatz lange erhalten, steigt dann plötzlich an, um bei weiterer Alkalinisation scharf u. langsamer abzufallen. Die Lichtabsorption verhält sich ähnlich. Heterogene Systeme zeigen also das gleiche Verh. wie einfache, die von LOEB untersucht wurden. (Bull. soc. de biologie 94. 862—64. Lyon.)

OPPENHEIMER.

P. Cristol und M. Lang, *Zur Darstellung des Kreatinins nach der Methode von Benedict*. Die zur Methode erforderliche alkoh. 40%ig. Pikrinsäurelsg. darf nur aus reinen Präparaten hergestellt werden. Ausbeute ist aus altem mit Hg(CN) behandeltem Urin schlechter als aus frischem. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. Montpellier et du Languedoc méditerranéen 6. 413—15. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 622. Ref. HEYMANN.)

OPPENHEIMER.

Anton Stockreiter, *Der Chlorgehalt der Ziegenmilch am Anfang und am Ende der Laktationsperiode*. Cl-Gehalt steigt mit der Dauer der Lactation. (Milchwirtschaftl. Zeitschr. 2. 450—56. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 142. Wien, Tierärztl. Hochschule. PESCHEK.)

OPPENHEIMER.

V. Lojander, *Untersuchungen über den Einfluß der verschiedenartigen Behandlung der Milch auf das Resultat der Reduktase- und Aldehydreduktaseproben*. Schütteln, Erhitzen, Bestrahlen (Hg-Lampe) der Milch, Salicylsäurezusatz verlängern die Reduktasezeit. Sonnenlicht wirkt verkürzend sowohl auf die Red.-Zeit wie auf die Zeit für die Aldehydreduktaseprobe. Weitere Prüfung des Einflusses obiger Maßnahmen u. anderer Faktoren. (Acta societatis medicorum Fennicae „Duodecim“ 6. 1—142. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 142. Helsinki, Hyg. Inst. Ref. PESCHEK.)

OPPENHEIMER.

Ernst Lickint, *Der Calciumgehalt des Liquor cerebrospinalis*. Bei Gehirnhautentzündung war der Ca-Spiegel des Liquors meist erhöht, wahrscheinlich als eine Stabilitätserscheinung. Doch lassen sich sichere diagnost. Schlüsse aus dem Ca-Gehalt nicht ziehen. (Klin. Wochenschr. 5. 556—58. Zwickau, Staatl. Krankenstift.) **Dr. F. Groll**, *Die Sauerstoffatmung des überlebenden Nierengewebes*. Mit der Methode von BURGERS wird festgestellt, daß die Nieren HgCl₂-vergifteter Tiere in den Anfangs-

stadien der Vergiftung keine, nach schweren Veränderungen aber eine deutliche Verminderung der O₂-Zehrung oder des Quotienten $\frac{\text{mm verbr. O}_2}{\text{mg Gewebe-Stdn.}}$ erkennen lassen.

Ähnliche Ergebnisse bei direkter HgCl₂-Einw. auf die Nierenschnitte (Zusatz Atmungsfl.). Verss. mit Na-Salicylat ergaben eine anfängliche Steigerung, später starke Herabsetzung der Werte, u. zwar — was wichtig ist —, ohne daß morphologischen Veränderungen nachweisbar waren. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 424—26. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 195. Würzburg, Tag. d. dtsch. pathol. Ges. 1925. Ref. KRAUSPE.) OPPENHEIMER

Amy L. Daniels und **Genevieve Stearns**, *Der Stickstoff- und der Mineralstoffwechsel bei Säuglingen welche Kuhmilch und Ziegenmilch erhalten*. Bei Ziegenmilchernährung geringerer N-Ansatz u. schlechtere Mineralausnutzung als bei Kuhmilchernährung. (Americ. journ. of dis. of childr. **30**. 359—66. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 180. Ref. ARON.) OPPENHEIMER

Morris Gleich, *Milchsäuremilch bei der Ernährung frühgeborener Kinder*. Erfolge der mit Milchsäure angesäuerten Vollmilch mit Fruchtsaft- u. event. Lebertranzzusatz als Frühgeburtsernährung. (Arch. of pediatr. **42**. 432—39. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 49. New York, Pediatr. serv. Harlem hosp. Ref. ARON.) OPPENHEIMER

Vilém Hons, *N-Ausscheidung nach Gliadin*. Ratten, die mit einer calor. reichenden u. vitaminhaltigen Nahrung, die aber nur Weizenproteine als Eiweißquelle enthält, gefüttert werden, scheiden mehr N aus als die Tiere, die noch Casein u. Eiweißalbumin bekommen. Verss. mit ähnlichen Resultaten auch beim Menschen. (Časopis pro lékařskou vědu **11**. 282—83. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 191. Prag, Physiol. Inst. I. Univ. Ref. BABAK.) OPPENHEIMER

Fritz Ludwig und **Hermann Hopf**, *Experimentelle Studien über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Nahrung*. Ratten- u. Mäuseernährungsverss. aus denen hervorgeht, daß Röntgenbestrahlung der Nahrung (Rüben u. Brot) den Nahrungsbedarf beeinträchtigt, lebenswichtige Stoffe zerstört oder toxisch bildet. (Strahlentherapie **34**. 342—53. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 181. Bern, Pharmakol. Inst. u. Privat-Röntgeninst. von Dr. HOPF. Ref. CASPARI.) OPPENHEIMER

Alfred F. Hess, **Mildred Weinstock** und **Dorothy Helman**, *Öl durch Röntgenstrahlung aktiviert*. II. Trennung in eine antirachitische und inaktive Fraktion. Befund, daß das antirachit. Prinzip des Lebertrans im Unverseifbaren liegt, was durch Bestrahlung, durch Bestrahlung aktiviertes Pflanzenöl (vgl. S. 1837) in Fraktionen zerlegen, wobei festgestellt wurde, daß das unverseifbare Destillat aktivierten Leinöls antirachit. wirkt, während das Destillat unbehandelten Baumwollsaatöls unfähig ist, diese Wrkg. hervorzurufen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **76**—77. 1924; Ber. ges. Physiol. **34**. 182. New York, Dep. of pathol., coll. of phys. a. surg. Columbia univ. Ref. HARTMANN.) OPPENHEIMER

Alfred F. Hess, *Die Aktivierung von Cholesterin und Nahrungsmitteln mit ultravioletten Strahlen*. (Vgl. S. 1837.) Die akt. Substanz des Dorschleberöls oder von bestrahlten pflanzlichen Ölen (Baumwollsaatöl, Leinöl etc.) ist mit seinen nicht verseifbaren Anteil gebunden; die anderen Bestandteile sind ebenso wirksam wie gewöhnliches, nicht bestrahltes Öl. Durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht von *Phytosterin* oder *gereinigtem Cholesterin* werden Substanzen aktiviert, die einer Rachitis vorbeugen können. Eine Änderung des F. wird bei dem bestrahlten Cholesterin nur in geringem Maße beobachtet, auch tritt kein Farbenwechsel ein. Erst nach längerer Bestrahlung (6—8 Stdn.) fällt der F. u. eine gelbliche Verfärbung der Substanz ist wahrzunehmen. Durch diese verlängerte Bestrahlung wird das aktive Cholesterin in ein inakt. Stadium übergeführt, aus dem es durch abermalige Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen nicht mehr aktiviert werden kann. Die ges. Reduktionsprodd. von *Cholesterin* u. *Phytosterin-Dihydrocholesterin* u. *Dihydrocholesterin*.

rin können durch Bestrahlung nicht aktiviert werden u. wirken nicht antirachit. Cholesterin aus Eidotter oder Knochenmark gewonnen hat keine antirachit. Wrkg. Zur Bekämpfung der Rachitis eignet sich am besten bestrahlte *Trockenmilch* in dünner Schicht $\frac{1}{2}$ Stde. lang im Lampenabstand von 1 Fuß). Ob antirachit. Faktor des bestrahlten Cholesterins dem des ultravioletten Lichtes er dem des Lebertrans vergleichbar ist, ist noch unentschieden. (Dtsch. med. Wchrschr. 52. 577—79.)

HIRSCH-KAUFFMANN.

H. Haxthausen, *Eine eigentümliche Ausstrahlung von Lebertran und verschiedenen anderen Stoffen und ihre mögliche Beziehung zur antirachitischen Wirkung*. Lebertran verläßt auf der photograph. Platte einen entwickelbaren Effekt. Die Annahme, es sich um eine Lichtwrkg. handle, mußte fallen gelassen werden; vermutlich handelt es sich um den sogenannten Russeffekt (Moserstrahlen), bei dem durch Diffusion chem. wirksame Stoffe (Superoxyde) den photochem. Effekt oder J-Abspaltung KJ-Lsg. besorgen. Erhitzen des Lebertrans (1 Stde. 100°) hebt die photograph. Wrkg. auf. Pflanzenöle weisen nach Bestrahlung eine fast dem Lebertran gleichwertige photograph. Wrkg. auf. Paraffinöl zeigte auch nach Bestrahlung keinen Effekt. Weitere Verss. mit Bestandteilen der Tierkäfige (Eisenteile, Holzspäne) ferner mit menschlichem Hautfett, das ebenfalls nach Bestrahlung photograph. Einw. zeigte. Gesamtergebnisse sprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, daß zwischen photograph. u. antirachit. Wrkg. ein Zusammenhang besteht. (Hospitalstidende 68. —94. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 126—27. Kopenhagen, Univ. dermatol. Klin. Shosp. Ref. EITEL.)

OPPENHEIMER.

M. Knorr, *Die Entwicklung des Vitamingedankens in der Bakteriologie*. Ergebn.-sundlung. (Ergebn. d. Hyg. Bacteriol. Immunitätsforsch. u. exp. Therapie 7. 641 706. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 100. Ref. KIRCHNER.)

OPPENHEIMER.

Hans Aron, *Die Bedeutung des Vitamingehaltes der Nahrung für Wachstum und Entwicklung des Säuglings und Kleinkindes*. Vf. betont die Wichtigkeit des fettlöslichen *Vitamins A* für das Gedeihen der Säuglinge u. der jungen Kinder. Der Säugling erhält einen Bedarf an fettlöslichen Vitaminen hauptsächlich in der Milch, später auch in pflanzlichen Beikost resp. in Form von Eigelb u. Lebertran. Auch das antirachit. Vitamin, das den kalkansatzfördernden Faktor enthält, gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Das antiskorbut. Vitamin oder das C-Vitamin wird den Kindern in Form frischen Gemüses u. Früchten, besonders Citronen, Apfelsinen u. Tomaten zugeführt. Das B-Vitamin ist fast in allen Nahrungsmitteln vorhanden, aber gerade die der Säuglings- u. Kinderernährung angewandten feinen Auszugsmehle, Maispräparate, Mondamin, die Dextrin-Maltoseprodd. wie Nährzucker u. auch die Milch sind an diesem Vitamin. So beruht der „Milchnährschaden der älteren Kinder“ (CZERNY-ALER): mangelnde Gewichtszunahme, Obstipation, Muskelschlaffheit, Blässe u. zunehmende Anämie auf einem Fehlen des wasserlöslichen, wachstumsfördernden ansatzfördernden Faktors des Vitamins-B (-D). (Dtsch. med. Wchrschr. 52. —74.)

HIRSCH-KAUFFMANN.

E. Edelstein, *Die Bedeutung des Vitamingehaltes der Säuglingsmilch*. Der Vitamingehalt der Milch ist großen Schwankungen unterworfen u. hängt in hohem Maße von der Art der Ernährung der Milchtiere ab. Am reichlichsten ist das gegen Hitzeangriffen beständigste Vitamin A, am wenigsten das sehr empfindliche Vitamin C vorhanden, in der Mitte steht das ziemlich beständige Vitamin B. Durch Kochen der Milch u. das lange Lagern im Winter wird besonders das Vitamin C verloren, daher wird der Skorbut am besten durch frische Milch bekämpft. Und sollen 340 g Frauenmilch resp. 500 g Kuhmilch, die $750\text{ g } \frac{2}{3}$ Milch u. 1000 g Milch entsprechen, die Skorbutsymptome erheblich mildern. Die antirachitische Wrkg. der Milch ist gering u. etwa zwanzigmal schwächer im Vergleich zum antirachit. Prinzip im Lebertran. Butter verschlimmert die Rachitis, Überfütterung

mit Milch begünstigt sie. Hingegen ist die antixerophthalm. Wrkg. des an das Milchlipoide oder das Milchserum gebundenen Vitamins A erwiesen. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 574—77.)

HIRSCH-KAUFFMANN.

M. Heincke, *Über den Gehalt verschiedener Hefepräparate an Vitamin*. Verschiedene Hefepräparate besitzen einen sehr verschiedenen, häufig recht geringen Gehalt an Vitamin B. Das Hefepräparat „Hevitan“ zeichnet sich durch einen relativ großen Vitamin Gehalt aus. (Dtsch. med. Wchschr. 52. 662—63. Hamburg, Pharmakol. Inst.)

HÜCKEL.

F. Karásek, *Vitamin-B-Nachweis mittels Amphibienlarven*. Methode beruht auf Wachstumskontrolle bei Serienfütterung. (Biologické listy 11. 283—86. 1925. Ber. ges. Physiol. 34. 182. Prag, Physiol. Inst. Ref. BABAK.)

OPPENHEIMER.

Backiang Liang und Leonhard Wacker, *Studien über den Fett-, Cholesterin- und Steroidstoffwechsel im Organismus wachsender Ratten bei An- und Abwesenheit von Vitamin A*. Bei Abwesenheit von Vitamin A in der Nahrung wachsender Ratten wird der Organismus auch bei reichlicher Kohlenhydratzufuhr nicht in der Lage, Fett aus Kohlenhydraten zu setzen. Die Fettmast bei Kohlenhydratfütterung ist mit der B. reichlicher Mengen endogenen Sauerstoffs verbunden. Es ist nicht sicher, inwieweit Vitamin A u. Lipochrome hierbei als Überträger des Kohlenhydratsauerstoffs auf andere Körpersubstanzen wirken könnten. Reine Triglyceride vermögen als Nahrungszusatz bei Mangel an Vitamin A nicht lebenserhaltend zu wirken. Auch die B. von Fett aus Fettsäure und Glycerin ist an die Ggw. von Vitamin A gebunden. Cholesterin wird im wachsenden Organismus synthet. aufgebaut; die Synthese ist umfangreicher bei fett-, cholesterin- u. vitaminarmer Ernährungsweise als bei Ggw. dieser Substanzen. Fett-, cholesterin- u. vitaminarm genährte Ratten enthalten nach einem fünfwöchigen Vers. mehr Cholesterin im Gesamtorganismus als bei reichlicher Zufuhr von Cholesterin in fetthaltiger Kost. Bei jeder Ernährungsweise findet sich ein Überschuß an Steroid (= Gesamtlipoide minus Cholesterin), das nicht aus der Nahrung stammen kann. (Biochem. Ztschr. 164. 371—93. 1925. München, Pathol. Inst.)

WOLFF.

Chester J. Farmer und Herman E. Redenbaugh, *Der Mangel an verdauungsfördernden Substanzen bei den Beri-beri-Tauben*. Glycerinextrakte wurden hergestellt aus dem Pankreas u. den ersten sechs Zoll des Darmes n. Tauben u. von Tauben, die infolge Vitamin B-Mangels an einer Beri-beri erkrankt waren. Ebenso wurden Extrakte aus dem Magen der Tiere gewonnen. Mit diesen Extrakten stellten die Verf. Verdauungsexperimente an, u. zwar untersuchten sie ihre Wrkg. auf Stärke, buttersaures Äthyl u. Casein. Während die Extrakte der n. Tiere eine gute Verdauung zeigten, wurden durch die Extrakte der an Polyneuritis erkrankten Tauben Stärke u. buttersaures Äthyl überhaupt nicht angegriffen u. das Casein wurde nur in 60% der Fälle verdaut. Durch den Magenextrakt der Beri-beri-Tiere wird die Labgewinnung stark herabgesetzt. Infolge der fehlenden Verdauung von Stärke u. Fett wird vermutet, daß das Pankreas keine amylolyt. oder lipolyt. Enzyme mehr bilden kann, resp. daß ihr Aktivator fehlt, der im Darm gebildet wird. (Amer. Journ. Physiol. 75. 45—51. 1925. Chicago, Northwestern Univ. School of Medicine.)

HIRSCH-K.

Chester J. Farmer und Herman E. Redenbaugh, *Eine Studie über die Wärmeproduktion bei Tauben mit Vitamin B-freier Ernährung*. Ernährung von Tauben mit verschiedenen Vitamin B-freien Nahrungsgemischen (im Autoklaven behandelte Kornfrüchte, Sugiura — Benediktsche Butterdiät, Sugiura — Benediktsche Schmalzdiät). Die Kontrolltiere erhielten Kornfrüchte unter Beigabe von Backpulver. Eine Gruppe wurde auf Hungerdiät unter Zuführung von reichlich Wasser gesetzt. In allen Tieren wurde das Körpergewicht, Temp., der respirator. Quotient u. die Wärmeprod. bestimmt. Bei vitaminfreier Ernährung sank die Temp. durchschnittlich auf 60° F., nach einer heilenden Dosis von 0,5 g Hefeaufschwemmung stieg sie in einigen Stdn. deutlich an u. war, wenn dazu Nahrung gegeben wurde, in 18 Stdn. wieder normal.

ngerte eine Taube 11 Tage lang, so war ihre Temp. etwa dieselbe wie bei einer überitaube im Krampfstadium. Nach Fütterung des Hungertieres wurde dieselbe ap. erreicht, die bei der Beriberitaube nach Darreichung von 0,5 g Hefeaufschwemmung innerhalb 18 Stdn. beobachtet wurde. — Das Sinken des Körpergewichts ging den an Beriberi erkrankten Tieren dem Vitaminaufbrauch parallel; noch größer der durchschnittliche Gewichtssturz pro die beim Hungertier. — Der respiratorische Quotient war bei den Vitamin B-frei ernährten Tieren auffallend niedrig, stieg nach Fütterung von 0,5 g Hefeaufschwemmung über die Norm an. — Die Wärmeproduktion betrug bei den Kontrolltieren 921 Kal. pro qm in 24 Stdn., im Krampfstadium der an Beriberi erkrankten Tauben nur 633 Kal., also 68,7% der Norm. Nach einer 11-tägigen Hungerperiode wurden pro qm in 24 Stdn. nur 430 Kal. produziert. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 27—44. 1925.)

HIRSCH-KAUFFMANN.

Vittorio Ferrero, *Versuche über die Autolyse in der Schilddrüse*. Unterss. an Mäuseschilddrüsen, die verschieden lange u. unter verschiedenen Bedingungen aufbewahrt werden, ergaben, daß ein Ferment vorhanden sein muß, das das Kolloid versetzt u. für wss. Fl. l. macht. In der Kälte ist das Ferment unwirksam. (Arch. per scienze med. **47**. 294—301. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 220. Turin, Istit. di patol. Ref. HARTMANN.)

OPPENHEIMER.

Biagio Alajmo, *Oxydierende und reduzierende Eigenschaften der Flüssigkeiten im Gewebe des Auges, besonders des Sehnerven und der Netzhaut, unter verschiedenen Versuchsbedingungen*. Oxydationsfähigkeit der Augengewebe u. -Fl. ist nicht durch Sauerstoff bedingt (Hitzebeständigkeit u. Unbeeinflussbarkeit durch Aceton), sondern durch kleine Fe-Mengen, die an Eiweiß gebunden katalysatorartig wirken. Kammerwasser verliert oxydierende Wrkg. nach Eiweißentzug, die wie auch die reduzierende Wrkg. des Kammerwassers, Glaskörpers u. der Linse mit der Temp. steigt u. fällt. Die Wrkg. hängt mit dem an Serumglobulin u. -albumin gebundenen S zusammen. In anderen Augengeweben wird die reduzierende Wrkg. durch Kochen aufgehoben, spielt also ein thermolabiles Organ. Ferment mit. Linsenkern u. -rinde verhalten sich verschieden. Oxydierende Fähigkeit der Retina wird durch Licht, Elektrizität, Strychnin gesteigert, durch Dunkelheit u. Cocain vermindert. (Arch. di ottalmol. **27**—48. 1924; Ber. ges. Physiol. **34**. 232—34. Palermo, Istit. di clin. oculist. Ref. HER.)

OPPENHEIMER.

Domenico Foschini, *Die Wirkung von Chinadekokt auf die pankreatische Stärkeverdauung*. Gesäuberte Chinarinde mit W. macerisiert, $\frac{1}{2}$ Stde. gekocht, enthält 0% Verdünnung in 1 cem 0,3 cem $\frac{1}{10}$ -n. Säure. Derartige Säfte fördern die pankreat. Stärkeverdauung. Vf. macht in erster Linie Chinin u. Chinasäure für diese Wirkung verantwortlich, denkt aber auch an andere Säuren, wie Chinovinsäure, u. d. scienze med. Bologna **3**. 235—49. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 95. Bologna. Ref. di materia med. Ref. SCHMITZ.)

OPPENHEIMER.

Ryozo Ohno, *Studien über die Verdauungskraft des Pankreassaftes, mit besonderer Berücksichtigung der Verdauungskraft der Profermente im Pankreassaft*. Die Pankreasenzyme wirken auch ohne Aktivierung, wie z. B. durch Enterokinase u. Galle. (Mitt. med. Fak. d. Kais. Univ. Kyushu Fukuoka **7**. 117—136. 1923; Ber. ges. Physiol. **34**. 257. Ref. JACOBY.)

OPPENHEIMER.

A. Rabbeno, *Untersuchungen über den Gasstoffwechsel der Gewebe*. Method. aben. (Arch. ital. de biol. **75**. 30—43. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 194—95. Turin, de physiol. Ref. KNIPPING.)

OPPENHEIMER.

Heinelt, *Phosphorverteilung im Blut und Phosphorbilanzen bei Muskelarbeit*. (Ztschr. f. d. ges. exp. Med. **45**. 616; C. 1925. II. 740.) In Säure l. Serum-P kommt in Form des o-Phosphats während Muskelarbeit zu. Rest-P bleibt unverändert. Stärkerer Arbeitsleistung nimmt auch Lipoid-P zu. Befunde ändern sich bei verschiedenen Kostformen wenig. Betrachtungen über den Zusammenhang der Erschei-

nungen mit den neueren Vorstellungen über den Muskelstoffwechsel. (Verhandl. dtsh. Ges. f. inn. Med. 396—97. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 209. Wiesbaden 37. Kongr. 1925. Ref. ROSENBERG.) OPPENHEIMER.

Salvatore Mantero, *Untersuchungen über den Stoffwechsel des Nervensystems*. I. *Eisen und Oxydasen*. Übersichtsref. (Riv. di patol. nerv. e. ment. **30**. 224—1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 83. Ancona, Manicomio prov. Ref. GAMPER.) OPPENHEIMER.

J. ten Cate, *Der Einfluß des Calciums auf den Sympathicuseffekt am Froschherz*. Mit dem Einstellen der Herzaktion nach Durchströmung mit Ca-freier Ringerlösung hört auch die Sympathikuserregbarkeit auf, die auch mit dem Auftreten der Kontraktionen nach Ca-, Sr- oder Ba-Zusatz wieder nachweisbar wird. Aber die Unwirksamkeit der Sympathikusreizung bei Ca-Mangel ist in der Hauptsache auf die Ableitung der Kontraktilität zurückzuführen, da die Sympathikuserregbarkeit, so lange das Herz noch schlägt, viel weniger vermindert ist als z. B. die Kontraktionsamplitude. (Archives néerland. d. Physiol. de l'homme et des animaux **10**. 498—508. Amsterdam, Lab. de physiol.) OPPENHEIMER.

J. Colle, *Der Einfluß des Calciums auf die Erregbarkeit des Froschherzens*. (C. soc. de biologie **94**. 786—89. Louvain, Lab. de physiol.) OPPENHEIMER.

I. Remesow, *Chemische Untersuchungen über den Prozeß der dystrophischen Nierenverkalkung beim Kaninchen*. Künstlich nekrot. gemachtes u. gequollenes Nierengewebe besitzt noch keine stark ausgeprägte Fähigkeit zur Adsorption u. Bindung von Kalksalzen, der erst in späteren Stadien (nach Verschwinden der Quellung) stark gehäuft wird. Bei alleiniger Unterbindung der Nierenvene tritt erhöhte Ca-Adsorption in den Nieren ein. Auch bei der vikariierenden Nierenhypertrophie ist der Ca-Gehalt des Nierengewebes gesteigert. (Biochem. Ztschr. **168**. 239—50. Leningrad, Mil.-med. Akad.) WOLFF.

Hirozo Natori, *Experimentelle Studien über den Einfluß von Kochsalz auf die Fluoresceinkaliumresorption aus der Subcutis, Bauch- und Gelenkhöhle*. (Acta dermatologica **6**. 70—72. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 108. Kyoto, Gerichtl. med. Inst. F. KAISER.) OPPENHEIMER.

St. J. Przylecki, *Der Abbau der Harnsäure bei den Wirbeltieren*. II. *Die Verteilung der Uricase und des Harnsäure synthetisierenden Fermentes bei den verschiedenen Klassen*. (Vgl. S. 2481.) Bei allen Wirbeltieren, die Harnsäure abbauen (Fische, Amphibien, Säugetiere) geht der Abbau über Allantoin. Der Weg über Alloxan oder Dialursäure (Umkehr der Harnsäuresynthese bei den Vögeln) kommt nicht vor. Vögel u. Reptilien synthetisieren dagegen nie über Allantoin, sondern immer aus einem Pyrimidinring u. Harnstoff. Aufbau u. Abbau werden durch verschiedene Fermente bewirkt. Schlüsse phylogenet. Art aus der Tatsache, daß Mensch, Affe u. Dalmatiner Hund die Fähigkeit des Harnsäureabbaus verloren haben. (Arch. intern. de physiol. **24**. 317—55. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 618—19. Pognan, Lab. de physiol. F. BARKEN.) OPPENHEIMER.

Carl F. Cori, I. *Eine Methode zum Studium der quantitativen Darmresorption*. II. *Über die Absorption der Hexosen und Pentosen*. Zufuhr von Substanzen per Schlundsonde, Tötung des Tieres nach 1 Stde. Best. der noch im Magen-Darmkanal vorhandenen Menge. Die pro 100 g Tier in 1 Stde. resorbierte Menge = Absorptionskoeffizient. Bei *d-Galaktose* 0,196, *d-Glucose* 0,178, *d-Fructose* 0,077, *d-Mannose* 0,034, *l-Xylose* 0,028 u. *l-Arabinose* 0,016 beträgt. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 495—497—99; Ber. ges. Physiol. **33**. 110—11. 1925. Buffalo, States inst. f. the study of malign. dis. Ref. KRZYWANIEK.) OPPENHEIMER.

C. I. Parhon und I. Ornstein, *Über das Cholesterin im Gehirn, Nebennieren und der Leber bei parathyreopriven Tieren*. Nach Parathyreoidentfernung nimmt das Cholesterin in den Nebennieren ab (innerhalb n. Variationsbreite), in der Leber

bleibt im Gehirn unverändert. (C. r. soc. de biologie **94**. 891—92. Jassy, Lab. de la n. des malad. nerv. et mental.) OPPENHEIMER.

Alessandro Esposito, *Der Cholesteringehalt der blutbildenden Organe bei experimentellen Anämien*. Der Cholesteringehalt von Milz u. Knochenmark ist bei einer ch Pb-Acetat, Benzol, Toluyldiamin oder Saponin erzeugten Anämie (nach leichter minderung im Krankheitsbeginn) vermehrt. (Hunde-, Meerschweinchen- u. Kaninchenverss.) (Boll. d. soc. med.-chir. Pavia **37**. 635—74. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. Pavia, Istit. di clin. med. gen. Ref. WASTL.) OPPENHEIMER.

Alessandro Verciani, *Das Eisen im Zentralnervensystem unter normalen und pathologischen Bedingungen*. Bestätigung der Angaben SPATZ', mit dem Vf. aber in Theorie der Fe-Ablagerung im Gehirn nicht übereinstimmt. (Rass. di studi biatr. **14**. 141—66. 1925; Ber. ges. Physiol. **33**. 586—87. Lucca, Osp. psichiatri. Ref. WALLENBERG.) OPPENHEIMER.

Hugo Meyer und **E. Rominger**, *Über Aminbildung im Säuglingsdarm und die Rolle des Amins bei der Säuglingstoxikose*. Die MOROSche Hypothese von der Aminbildung als Ursache der alimentären Intoxikation wird abgelehnt. Aminbildung im Säuglingsdarm (Nachweis am isolierten überlebenden Meerschweinchendarm) ist bei Milchaufnahme die Regel, bei Frauenmilch seltene Ausnahme. Weder im Blut, noch im Harn ernährungsgestörter Säuglinge sind Amine nachweisbar. (Im Gegensatz zur Nachweisbarkeit bei der experimentellen Aminvergiftung beim Tier.) (Jahrb. Kinderheilk. **108**. 3. Folge. **58**. 40—54. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 54—55. Freiburg, Universitätsklinik. Ref. ARON.) OPPENHEIMER.

E. Melchior, **F. Rosenthal** und **H. Licht**, *Der Ort der Gallenfarbstoffbildung*. Verss. ergaben, daß auch beim Säugetier die Leber die Hauptbildungsstelle des Gallenfarbstoffes darstellt. Wahrscheinlich fällt der Parenchymzelle der Leber die Hauptaufgabe der Gallenfarbstoffbildung zu. (Klin. Wchschr. **5**. 537—41. Breslau, Universitätsklinik. Ref. FRANK.)

Paul Reznikoff und **Robert Chambers**, *Die Wirkung eines Einsetzens von Toxinen in Salzlösungen und eines Anstechens in denselben*. Die Reihenfolge der Toxizität von Salzlgg., die bei Einw. von außen bei den Amöben $MgCl_2 < CaCl_2 < NaCl$ lautet, ändert sich, wenn die Tiere angestochen u. die Salze in das Innere eindringen, folgt: $KCl, NaCl < CaCl_2, MgCl_2$. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. **22**. 386—89. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 27—28. New York, Dep. of anat. Cornell univ. Ref. K.) OPPENHEIMER.

A. Ozorio de Almeida, *Untersuchungen über die Wirkung von CO_2 auf die biochemischen Oxydationen*. Verss. mit Fröschen. Bei n. Tieren oder nach Rückenmarkstrennung wird durch Steigerung des CO_2 -Gehaltes der Inspirationsluft der O_2 -verbrauch vermehrt, durch vollkommener Zerstörung des Zentralnervensystems vermindert. CO_2 hemmt die Gewebsoxydation. Bei intaktem Nervensystem interferiert nicht der erregende Einfluß von CO_2 auf nervöses Gewebe. Gleichgewichtszustände bestehen in der Norm zwischen den beiden Vorgängen, die physiol. eine wichtige Rolle spielen. (Ann. de physiol. et de pathol. gén. **23**. 524—31. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 155. GOTTSCHALK.) OPPENHEIMER.

A. H. Roffo, *Einfluß der K- und Ca-Ionen auf das Tumorwachstum*. Menge des K nimmt mit der Wachstumsintensität zu. Ca variiert kaum. (Bol. del. inst. exp. **1**. 493—99. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 165. Ref. KOLMER.) OPPENH.

J. Maisin und **A. Baivy**, *Einfluß wiederholter Installationen einer verdünnten Lösung von Ioniumnitrat auf die Entwicklung der weißen Hornhautflecken*. Besser als Hydragrym oxydatum flavum hellen sich Hornhautnarben durch Ioniumnitratbehandlung auf. (C. r. soc. de biologie **94**. 766—67. Louvain, Inst. d'anat. pathol.) OPP.

H. Cristiani und **P. Chausse**, *Dosen und Zeitwerte für die durch Fluorsilicatum bedingte Fluorkachexie*. (Vgl. CRISTIANI u. GAUTIN, S. 1838.) Tägliche Gaben

von $\frac{1}{10}$ der akut tödlichen Dosis töten die Mäuse nach 17—19, von $\frac{1}{30}$ nach 44 Tagen. (C. r. soc. de biologie 94. 821—23. Genf, Inst. d'hyg. de l'univ.)

Adolf Liechti, *Zur Frage der Sekundärstrahlensensibilisierung durch Metalle*. blanken Metallen von der Ordnungszahl 30-Zn an aufwärts läßt sich, an makroskopischen Veränderungen beurteilt, eine verstärkende Sekundärstrahlenwrkg. auf die Kaninchenhaut (Ohr) deutlich nachweisen. Dabei steigt die Wrkg. proportional mit der Ordnungszahl Z der verwendeten Metalle. Bei subcutaner Lagerung von blanken Metallen bleibt jede makroskop. sichtbare Wrkg. auf die Hautoberfläche aus. Durch Einbringen von kolloidalen Metallen, wie Ag (Elektrargol), Au (Goldpurpur), kann am Kaninchenhoden keine Dosiserhöhung durch Sekundärstrahlen erreicht werden. Kolloidales Zinn eignet sich für derartige Verss. nicht. Diese Verss. an der Kaninchenhaut stimmen mit denen über die Wrkg. gefilterter Sekundärstrahlen am Prodigiosus überein. (Klin. Wehschr. 5. 545—48. Bern.)

L. Sabbatani, *Pharmakologische Wirkung des Eisens in den Doppel- und komplexen Salzen*. (Vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 223; C. 1925. I. 7) Untersucht wurden Mischungen von Lsgg. von Ferro- u. Ferrisulfaten mit Lösungen von Na-Oxalat, -Citrat u. -Tartrat. Zwischen den Fe-Salzen auf der einen Seite, organ. Salzen auf der anderen ergab sich ein wechselseitiger Antagonismus. Die Giftigkeit der organ. Salze wird durch die Fe-Salze nur wenig vermindert, am meisten noch beim Tartrat, u. jene wirken auch nur schwach gegen das Fe^{II}, aber sehr stark gegen das Fe^{III}-Salz. Werden jene vor den Fe-Salzen injiziert, so schwächen deren Wrkg. weit weniger als bei gleichzeitiger Injektion. Das Auftreten neuer Komplexe Ionen, das bei einer gewissen Konz. der organ. Salze beginnt, macht sich in den Kurven, welche die Wrkgg. der verschiedenen Gemische wiedergeben, durch einen Sprung geltend. Die Fe^{III}-Salze haben starke unmittelbare Giftwrkg., dagegen infolge der schnellen Umwandlung in kolloidales Eisenoxydhydrat, das nur eine leichte örtliche Wrkgg. ausübt, sehr geringe oder keine Nachwrkg. Der Einfluß der organ. Salze zeigt sich daher hier wesentlich in bezug auf die minimale tödliche Dosis nur unbedeutend auf die Symptomatologie. Das Umgekehrte ist bei den unmittelbar nur schwach wirkenden, aber eine starke Nachwrkg. hervorrufenden Fe^{II}-Salzen der Fall. Nach reinem FeSO₄ findet man Durchfall, Hämoglobinämie, Hämoglobinurie, Depression, Lähmung, allgemeine Thrombose, bei Zugabe von Citrat oder Tartrat nur Depression u. Lähmung; das Blut bleibt fl., gerinnt schwer, zuweilen gar nicht. (Memorie della R. Accademia nazionale dei Lincei [6] 1. 20 Seiten. Sep.)

J. T. Mc Clintock und **H. M. Hines**, *Physiologische Wirkung von Carnosin*. Natürliches u. synthet. (aus Histidin u. β -Alanin) Carnosin rufen hervor: Erbrechen, Durchfall u. schwere Schockwrkg., die stark an Histaminwrkg. erinnert, vielleicht mit ihr ident. ist, obwohl von Carnosin wesentlich größere Dosen erforderlich sind als von Histamin. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 515—16. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 639. Iowa, Dep. of physiol. coll. of med. Ref. WASTL.)

H. de Waele, *Die Wirkung hoher Dosen von Barbitursäurederivaten auf den Vagus*. Unterss. über zentrale u. periphere Vaguswrkg. nach Somnifen an Hunden u. *Lumi-Veronal*, Dial u. *Veronal-Na* am Froschherzen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 269—70. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 272. New Brunswick, Research lab. of E. R. Squibb & sons. Ref. SCHÜBEL.)

Torsten Stake, *Wirkung einiger Chinarindenalkaloide auf die sympathische motorische Innervation des Uterus*. Chinin, Chinidin, Cinchonin, Chinolin (als H₂SO₄- oder weinsaure Salze) heben die Adrenalinwrkg. des Uterus auf, lähmen also die sympath. Innervation. Eukupin, Vucin, Atophan haben diese Wrkg. nicht. (C. r. soc. de biologie 94. 954—56. Upsala, Institut. de pharmac.)

Frederick R. Miller, *Die Wirkung von Strychnin auf die Kleinhirnrinde*. (Science 54. 413 [1920].) Strychnin, auf die Rinde des vorderen Gehirnlappens

andt, bewirkt eine Tonusverminderung. (Nature 117. 486—87. London [Can.], v. of Western Ontario.)

JOSEPHY.

Harry Beckman, *Der angebliche Synergismus von Magnesiumsulfat und Morphin*. Angaben über Morphin-Mg-Synergismus beruhen auf der bisherigen unwissenschaftlichen u. unexakten Methodik. (Journ. of the Am. med. an. 85. 332—36. 1925; Ber. Physiol. 33. 639. Milwaukee, Dep. of pharmacol. Marquette univ. school of med. BAUMECKER.)

OPPENHEIMER.

L. Salazar, *Versuche über die Anaphylaxie bei Hunden*. II. u. III. Mitt. Mit Eiweiß vorbehandelte Tiere reagieren auf Apomorphin seltener u. schwächer als Kontrollen. — *Morphin* u. *Apomorphin* in bestimmter Dosis konnten die Tiere vor Folgen der Reinjektion einer Eiereiweißlg. schützen, wenn vor oder kurz nach Reinjektion mit den Alkaloiden behandelt wurde. Nach Ausbruch der Anaphylaxie-symptome bleibt die Wrkg. aus. (Pathologica 17. 21—23. 45—47. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 633. Cagliari, Ist. di materia med. e farmacol. sperim. Ref. FRIEDGER.)

OPPENHEIMER.

Stig E. Björkman, I. *Wirkung des Lobelins auf die parasympathische Innervation des Darms*. II. *Wirkung des Lobelins auf die parasympathischen Bronchialkontraktionen*. Lobelin lähmt die parasympath. Nervenenden des Darms u. Bronchialmuskeln. Schwächere Alkaloidkonz. führen beim Darm ausgesprochenere bei den Bronchien zu Erregungen. (Vgl. dagegen die Herzwirkg. CLAESON, C. r. de biologie 92. 640; C. 1925. II. 210.) (C. r. soc. de biologie 94. 945—46. 947—48. Upsala, Instit. de pharmac.)

OPPENHEIMER.

E. Alexejew, *Über die Wirkung der Gifte auf die Gefäße des isolierten Auges*. *Malin*, *Coffein*, *Cocain*, *Pilocarpin*, *Atropin*, *Eserin*, *Nicotin* u. *Strychnin* wurden dem nach KRAWKOW präparierten Pferdeauge geprüft. Die Ergebnisse sind in g auf qualitative Wrkg. nicht anders als die bekannten. (Russkij oftalmologičeskij žurnal 4. 185—86. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 230. Ref. ELEONSKAYA.)

OPP.

J. Planelles, *Die pharmakologischen Reaktionen der Endigungen der vegetativen Nerven des Herzens. Antagonismen und Synergismen*. Sammelreferat über Wrkkg. *Adrenalin*, *Acetylcholin*, *Atropin*, *Ergotamin* u. *Ca*. (Arch. de cardiologie u. hematologie 5. 88. 1924; Ber. ges. Physiol. 34. 272. Ref. FLURY.)

OPPENHEIMER.

E. Louis Backman, **E. Grahs**, **G. Hultgren** und **H. Price**, I. *Die Wirkung von Sapotoxinen auf die Thrombocyten, Leukocyten und die Erythrocyten des Kaninchens*. II. *Einfluß des Senegins auf die korpuskulären Elemente des Blutes*. III. *Einfluß des Saponins auf die Blutelemente des Kaninchens*. Sapotoxininjektionen führen zu Thrombopenie, Leukocytose u. Anämie von ganz bestimmtem Entwicklungsgrad. — Auch Senegin, intravenös injiziert, verursacht eine starke Thrombopenie u. Leukocytose, hat aber kaum einen Einfluß auf die roten Blutkörperchen. — Intravenöse Saponinapplikation führt je nach Menge zu Thrombopenie u. Leukocytose von verschiedenen Graden, zu Poikilocytose, Polichromasie u. anderen Veränderungen des Blutbild. (C. r. soc. de biologie 94. 933—35. 936—38. 939—41. Upsala, Instit. de pharmac.)

OPPENHEIMER.

Giuseppe Halfer, *Über die Einwirkung von Cholesterin auf das erythropoetische Vermögen*. Chron. Fütterung von 0,2 g Cholesterin an Kindern verringerte anfangs die Erythrocytenzahl, dann folgte aber eine lang anhaltende Vermehrung. Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. (Clin. pediatri. 7. 425—28. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 112. Padua, Clin. pediatri. Ref. KAISER.)

OPPENHEIMER.

J. Vincent, *Vergleich der Wirkung von Knoblauch und Schwefel*. Betrachtung der Literatur, wobei Vf. zum Schluß kommt, daß die Wrkg. von S u. Knoblauch ident. sei u. letzterer seine Wrkg. dem Gehalt an Diallylsulfiden, die im Organismus zu H₂S abgebaut werden, verdanke. (Lyon, Journ. de méd. de Lyon 6. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 108—09. Ref. BAUMECKER.)

OPPENHEIMER.

Rudolf Allers, Edith Freund und Lili Prager, *Zur Kenntnis der Beeinflussung der Sinnesschärfe durch Kaffee*. Studium der Beeinflussung des peripheren Sehsinnes an 3 Versuchspersonen. Die Reaktionstypen auf Kaffee sind verschieden. Bei einem Typ nimmt die Überschätzung von Bewegungen zu, gleichzeitig wird Euphorie, Pulsbeschleunigung u. Erweiterung des Gesichtsfeldes beobachtet. Beim andern Typ nimmt umgekehrt die Bewegungsüberschätzung ab, er zeigt dysphor. Rk., Pulsverlangsamung u. Einengung des Gesichtsfeldes. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 183—86. Wien, Physiol. Inst.) OPPENHEIMER

A. V. Marx und E. Adler, *Über die blutzuckerherabsetzende Wirkung von *Hieracium dioicae**. I. Mitt. Im Dekokt von Brennesselblättern konnte ein blutzuckerniedrigendes u. -steigerndes Prinzip erkannt werden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. 112. 29—38. Frankfurt a. M., Med. Poliklin.) OPPENHEIMER

H. Molitor und E. Pick, *Über zentrale Regulation des Wasserwechsels*. III. Mitt. *Über den zentralen Angriffspunkt der Diuresehemmung durch Hypophysenextrakt*. (II. vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. 107. 185 [1925].) Die elektiv auf Großhirn beschränkte Narkose mit Chloralose schaltet die Wrkg. von Hypophysenextrakt auf die W.-Diurese aus. Intralumbal eingeführte Hypophysenextrakte führen bereits zur Diuresehemmung in Dosen, die subkutan unwirksam sind (Verss. an Hunden). (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. 112. 113—21. Wien, pharmak. Inst.) OPPENHEIMER

Elliott C. Prentiss, *Physiologische Wirkung und therapeutische Indikationen von Sekretins*. (Southern med. journ. 18. 563—66. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. C. 1925. Ref. BÜTTNER.) OPPENHEIMER

Marcel Labbé, P. L. Violle und E. Azérad, I. *Wirkung des Hypophysenhinterlappens auf die Diurese des normalen Menschen*. II. *Wirkung des Hypophysenhinterlappens auf die Diurese des schlafenden Menschen*. I. Die Diuresehemmung läßt sich am Menschen deutlich nachweisen. Bei 24-Stdn.-Harnkontrolle zeigt sich aber eine mitunter überschießende Kompensation. II. Im Schlaf kommt die Hemmung nicht zum Vorschein. (C. r. soc. de biologie 94. 845—47. 848—49.) OPPENHEIMER

C. R. Schlayer, *Die Praxis der Anwendung von Diureticis bei Nierenkrankheiten*. Klin. Bericht. (Therapie d. Gegenwart 67. 103—07. Berlin, Augusta-Hospital.) OPPENHEIMER

E. Herrmann, *Kupfer zur Behandlung schmierig belegter Wunden*. Bericht über günstige klin. Erfolge mit Kupferdermasan, einem salicylsaurem Cu-Seifenester (Herrmann, Rheumasanfabrik Dr. REISS, Berlin) bei tuberkulösen Ulcera. (Therapie d. Gegenwart 67. 138—39. Freiburg i. B., Univ.) FRANK

Georg Katz und Gotthard Schiller, *Erfahrungen über die Introcidbehandlung der Sepsis*. Bei 3 unter 17 Fällen von sept. Erkrankungen wurde durch Introcid eine starke Beeinflussung in günstigem Sinne herbeigeführt. (Therapie d. Gegenwart 67. 110—13. Berlin, Städt. Krankenh. Moabit.) FRANK

Fr. Keysser und O. Ornstein, *Das Optimum der Wasserstoffionenkonzentration als wichtigster desinfektorischer Faktor bei örtlichen und allgemeinen Infektionen*. Seine Bedeutung für die Behandlung eitriger Bauchfellentzündungen. Experimentell u. prakt. Verss. ergaben, daß die richtige Wahl des Optimums der $[H^+]$ von größter Bedeutung für das Auftreten, den Verlauf u. die Behandlung örtlicher u. allgemeiner Infektionen ist. Ein in vitro hochwirksames Desinfektionsmittel muß unter physiologischen Bedingungen bei der prakt. Verwendung unwirksam sein, wenn es dem pH -Optimum nicht angepaßt ist u. andererseits erfahren die Desinfektionsmittel bei der richtigen Wahl des pH -Optimums eine enorme Wirkungssteigerung. Es ist anzunehmen, daß die Baktericide des n. Blutserums wahrscheinlich zu einem wesentlichen Teil von der eigenartigen Verteilung der anorgan. Elektrolyte u. der Serumkolloide abhängen, die einer im Grundorganismus stets regulierten geringen $[H^+]$ besteht. (Klin. Wchschr. 5. 404.) FRANK

Raymond Hamet, *Pharmakodynamische Studie über die Yohimbinsäure*. Yohimbinsäure ist weniger tox. als Yohimbin. 0,1 g in 10 ccm physiolog. NaCl-Lsg. an bei einem 12 kg schweren Hund Blutdrucksenkung hervor u. sind in stande, Adrenalinwrkg. im paradoxen Sinn zu beeinträchtigen (vgl. S. 1597). (C. r. soc. de biologie **94**. 843—45. Paris, Lab. de pharmacol. de la Fac. de méd.) **OPP.**

Walter Syring, *Isacen als Abführmittel*. *Isacen*, ein Diacetyl-bis-oxyphenylisatin (erst. **HOFFMANN-LA ROCHE**, Basel), bewährte sich bei der Behandlung habitueller Obstipationen, während es bei der spast. Form nicht von gleich guter Wrkg. (Therapie d. Gegenwart **67**. 140—41. Berlin, Friedrich-Wilhelm-Hosp.) **FRANK.**
Ernst Friedrich Müller, *Ursache der Nitroidkrisen nach intravenöser Injektion Arsenikalien*. Vf. lehnt an Hand seines umfangreichen Materials Lebererkrankungen als Ursache der vasomotor. Rk. u. des Leukocytensturzes nach *Salvarsan-Silbersalvarsaninjektion* ab. (Arch. of dermatol. a. syphilol. **12**. 349—55. 1925; ges. Physiol. **34**. 109—10. New York, Dep. of dermatol. a. syphilol. coll. of physicurg. Columbia univ. Ref. **RENNER**.) **OPPENHEIMER.**

S. F. Gomes da Costa, *Einfluß des Calciums und Kaliums auf die Herzwirkung Pituitrin*. K-Mangel ändert die Pituitrinwrkg. nicht, während Ca-Mangel Pituitrinungslos macht. (C. r. soc. de biologie **94**. 899—902. Lissabon, Institut. de pharmac. aerapeut.) **OPPENHEIMER.**

M. Großmann und **K. Lušicky**, *Zur klinischen Pharmakologie des Coffeins*. Die Natriumsalze des Coffeins zeigen in den üblichen, aber auch in höheren Dosen keine merkliche Wrkg. auf das Zentralnervensystem u. den Kreislaufapparat, gleichg., in welcher Form sie appliziert werden. Vff. lehnen daher ihre Verwendung in Analeptica bei Kollapszuständen ab. Coffeinwrkg. läßt sich nur mit reinem Coffein erzielen. (Wien. klin. Wchschr. **39**. 442—44. Zagreb, Medizin. Universitätsk.) **HÜCKEL.**

L. J. Mercier und **A. Cherbuliez**, *Wirkung des Sparteins auf die Herzkammer, atrioventrikuläre Bündel und rasche wie langsame Skelettmuskeln*. Spartein erhöht die muskuläre Chronaxie ganz allgemein. Je langsamer der Muskel ist, desto deutlicher der Sparteineffekt. Die Chronaxieerhöhung nimmt in der Reihe Hissches Muskel, Kammer, Gastrocnemius ab. Im Endzustand einer schweren Vergiftung mit Spartein sind dann die raschen Muskeln, die stärker befallen sind. (C. r. soc. de biologie **730**—32. Paris, Labor. de physiol. gén. de la Sorbonne.) **OPPENHEIMER.**

Hirotschi Hashimoto, *Vorübergehende Änderungen der a-v-Reizleitung nach Injektion von Histamin*. Analyse der Histaminherzwirkg. Die Reizleitung wird verlangsamt, wobei es noch unentschieden bleibt, ob Histamin direkt auf das Hische Muskel einwirkt. (Arch. of internal med. **35**. 609—25. 1925; Ber. ges. Physiol. **338**. Ref. **ROTHBERGER**.) **OPPENHEIMER.**

St. Weiß und **G. Baitz**, *Zur Frage der Wirkung des stomachal verabreichten Adrenalins*. Es konnte in keinem Falle, auch wenn der Magen keine freie HCl enthielt, eine innerliche Verabreichung von Adrenalin eine Steigerung des Blutdrucks festgestellt werden. Anscheinend verhindert es durch die örtliche Gefäßverengung (in der Blässe der Mundschleimhaut) seine eigene Resorption. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 543—46. Budapest, K. Ung. PÁZMÁNY PÉTER-Univ.) **SPIEGEL.**

Rudolf Allers und **Edith Freund**, *Zur Kenntnis der Wirkung von Kolapräparaten*. Kolapräparate verkürzen sowohl bei opt. als bei akust. Reizgebung die Reaktionszeit, was unter Berücksichtigung des Verh. bei motor. u. sensor. Einstellung auf eine allgemeine Wrkg. bezogen wird. Einfluß auf den Ablauf der Dissoziationen, wie er bei der Kolapräparat eindeutig besteht, wird vermißt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **49**. 644—48. Berlin, Univ.) **SPIEGEL.**

G. Covell, *Ankylostomiasis unter den Truppen in Dehra Dun*. Zur Massenbehandlung der sehr verbreiteten Ankylostomiasis wird β -Naphthol empfohlen (50 grains

ohne Abführmittel, oder gemischt mit 25 grains $MgCO_3$). (Indian Journ. Med. Research 13. 539—46. Dehra Dun, Indian stat. hosp.)

OPPENHEIMER

H. Mießner und **R. Berge**, *Die trypanozide Kraft des Arsenobenzolpräparates „Albert 102“*. Dem Präparate „Albert 102“, kommt zweifellos eine trypanozide Wirkung zu, die besonders nach perkutaner Anwendung bei künstlich mit Trypanosomen infizierten Mäusen beobachtet wurde. (Dtsch. tierärztl. Wchschr. 34. 285—89. Hannover, Hygien. Inst. d. Tierärztl. Hochschule.)

HÜCKEL

Vaeth, *Aulin als Räudemittel*. Aulin ist ein Schwefelpräparat aus der Gruppe der Xanthogenate, welches in einer 10%ig. Lsg. in Vaselineöl mit geringem Zusatz von Tetralin in den Verkehr gelangt (C. F. BOEHRINGER u. Söhne). Vf. erzielte mit Aulin gute Erfolge bei der Akarusräude des Hundes. (Dtsch. tierärztl. Wchschr. 34. 273.)

HÜCKEL

Lopo de Carvalho und **Ferreira de Mira fils**, *Einfluß der subkutanen Sanocrysininjektionen auf die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit des Meerschweinchen*. Beim Meerschweinchen ändern Sanocrysininjektionen die Senkungsgeschwindigkeit nicht. (C. r. soc. de biologie 94. 910—11. Lissabon, Instit. Rocha Cabral.)

Adolf Feldt, *Chemotherapeutische Versuche mit Gold*. Bericht über Tierversuche mit neuen Au-Präparaten (Herst. SCHERING, Berlin), von denen das Sulfoxylat ein wirksames therapeut. Index von 1:10 besitzt, so hoch wie der von Salvarsan bei Kaninchensyphilis. Die Au-Präparate üben eine spezif. heilende Wrkg. auf die künstliche Syphilisinfektion der Maus mit den Spirochäten des Febris recurrens aus. Klin. Vers. an kranken Menschen sind noch im allerersten Stadium. (Klin. Wchschr. 5. 299—301. Berlin, Institut Robert Koch.)

FRANK

Léon Jaloustre, *Cerium und Thorium in der Therapie*. Empfehlung von „Céthocal“, einer Mischung von Ce-, Th- u. Ca-Salzen bei Impetigo, Ekzemen u. Lupus erythemat. (Clinique 20. 223—25. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 109. Ref. BEHRENS.)

A. R. Koontz, *Wann zeigen Lungen nach Einwirkung von Kampfgasen wieder normale Beschaffenheit?* Hunde, die Phosgen, Senfgas, Lewisit, Cl_2 , Chlorpikrin, Methylchlorarsin ausgesetzt waren, zeigten 2 Monate nach Erholung von der Vergiftung keine Lungenveränderungen, die auf funktionelle Störungen hinweisen könnten. (Arch. of. internal med. 36. 204—19. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 271. Edgewood Arsenal, Pathol. sect. med. research. div. Edgewood arsenal. Ref. FLURY.)

OPPENHEIMER

G. Pennetti, *Experimentelle Untersuchungen über die Bleivergiftung*. Bei akuter Pb-Vergiftung zeigen alle Organe schwere degenerative u. hämorrhag. Veränderungen, besonders Leber u. Niere. Bei chron. Vergiftung junger Tiere fällt vor allem ein Rückbleiben im Wachstum auf. Adrenalin u. Lipide sind in der Nebenniere vermehrt (Schutzmaßnahme?) (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie 30. 255—61. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 109. Neapel, Istit. di patol. gen. Ref. WEXBERG.)

Joachim Granzow, *Pathologische Anatomie der endokrinen Drüsen bei der Sublimatvergiftung*. Unterss. an Hypophyse, Thyroidea, Nebenniere (Rinde u. Mark), Pankreas, Ovarien. Nur bei Hypophyse u. Nebenniere treten nach tödlicher $HgCl_2$ -Vergiftung Veränderungen auf, die als Ausdruck hochgradiger Funktionsstörungen anzusehen sind. Am Ovarium betrachtet man gesteigerte Follikelatresie, beim Kaninchen in einzelnen Fällen auch Degenerationsprozesse der interstitiellen Eierstockdrüse. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin. 49. 487—99. Breslau, Univ.)

SPIEGEL

A. Esser, *Tödliche Vergiftung mit Oleum Chenopodii*. Bericht über den anatom. patholog. Befund bei der Sektion eines 8-jährigen Knaben, der nach u. nach im ganzen 8 g *Oleum chenopodii*, in Dosen von täglich 2—3-mal 5—10 Tropfen, eingenommen hatte. (Klin. Wchschr. 5. 511—13. Köln, Univ.)

FRANK

Torben Geill, *Ein Fall tödlicher Vergiftung durch Pyramidon*. In etwa 4 kg Leichenteilen eines 22-jährigen Mädchens wurden 3 g *Pyramidon* nachgewiesen, obwohl

gen noch vor dem Tode ausgespült worden war, so daß angenommen werden muß, die Gesamtmenge an Pyramidon im Körper das Vielfache des gefundenen, etwa 10 g, betragen hat. Die kleinste tödliche Dosis für den Menschen scheint bei 8–10 g zu liegen. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin **7**. 344–49. Wien, Inst. gerichtl. Medizin.)

FRANK.

P. Rondoni, *Über den Einfluß der Glucoseverabreichung auf Teercarcinomwachstum*. Vers. an Kaninchen. Parenterale Glucosezufuhr zeigte eine fördernde Wrkg. auf die cancerösen, durch Teer hervorgerufenen Epithelwucherungen der Kaninchen. (n. Wehschr. **5**. 465–66. Mailand, Univ.)

FRANK.

G. Tizzoni, E. Centanni und G. de Angelis, *Über die durch Radium hervorgerufenen Veränderungen auf den Adeno-Carcinombrei der Maus und seine Umwandlung in Heilvaccine*. Bei Anwendung eines Präparates von 0,10 g RaBr_2 500 000 U. R. pro cg war eine Bestrahlung des Carcinombreis während wenigstens 10 tdn. erforderlich, um die pathogene Wirksamkeit völlig zu beseitigen. Mit so veränderten Brei läßt sich ein Tumor gleicher Art bis zum völligen Verschwinden bringen. Diese Wrkg. ist nicht der induzierten Radioaktivität zuzuschreiben, sondern im Brei vorhandenen Krebssubstanzen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 193–99. 1925. Bologna u. Modena, Univv.)

SPIEGEL.

G. Analyse. Laboratorium.

H. Wales, *Die Auswahl von Indicatoren für Alkaloidtitrationen*. Vf. macht darauf aufmerksam, daß die Auswahl der Indicatoren für Alkaloidtitrationen Rücksicht nehmen muß auf die pH der Alkaloidlsg. Auf Grund seiner Verss. gibt er folgende Auswahl:

Alkaloid	pH	pH Bereich des Indicators	Indicator
Atropin	5,04	4,2–5,8	Methylrot
Colin	4,81	3,8–5,8	"
Epin	5,56	3,8–7,2	Bromkresolpurpur
Epin	4,85	3,9–6,0	Methylrot
Epin	6,02	5,5–6,5	Bromkresolpurpur
Epinidin	5,90	5,4–6,4	"
Epin	5,20	4,0–6,5	Methylrot
Epin	4,86	3,6–6,3	"
Ethylmorphin	4,89	4,2–5,7	"
Epin	4,90	4,2–5,6	"
Epimorphin	4,99	4,2–5,8	"
Epipropin	5,74	3,9–7,6	Propylrot
Epipropin	4,45	3,8–5,0	Kein Endpunkt mit Methylrot
Epin	4,83	3,6–5,6	Bromphenolblau
Epin	4,68	4,0–5,2	Methylrot
Epin	5,26	4,4–6,1	"
Epistigmin	4,85	3,8–6,0	"
Epipropin	4,31	3,6–5,0	Bromphenolblau
Epin	6,12	5,5–6,5	Bromkresolpurpur
Epipropin	4,81	3,8–6,0	Methylrot
Epipropin	4,72	4,0–5,3	"

and Engin. Chem. **18**. 390–92. Washington [De.])

GRIMME.

V. S. Babasinian und R. D. Billinger, *Ein verbesserter Schmelztiegel*. Vff. beschreiben einen mit mechan. Rührwerk versehenen Schmelztiegel für Alkalischmelzen. (Verbb. Näheres sagen die Figg. des Originals. (Ind. and Engin. Chem. **18**. Bethlehem [PA.]

GRIMME.

W. Francis, *Laboratoriumspumpe für die Zirkulation von Gasen.* (Fuel 5. 39—Dep. of Fuel Technology, Sheffield Univ.) BIELENER


H. Earnest Williams, *Ein Schaummesser.* Vf. beschreibt an der Hand von Fig. einen prakt. App. zur Best. der Schaummenge, bestimmt zur Messung der schäummindernden Kraft von Antischaummitteln wie A., Glycerin, CCl_4 , Ä. usw. Näher zeigt die Fig. des Originals. (Ind. and Engin. Chem. 18. 361—62. Morser [N. J.]) GRIMM

Sukehiko Matsuura, *Über die Färbung mit Kongorot. Eine neue Färbemethode der elastischen Elemente, welche auch andere Fasern und Zellen in verschiedenen Nuancen abhebt.* (Fol. anat. japan. 3. 107—10. 1925. Ber. ges. Physiol. 33. 511. (Yama, anat. Inst. Ref. RÖTHIG.) OPPENHEIMER

Elemente und anorganische Verbindungen.

Quirino Sestini, *Die Messung von Sauerstoff bei hohen Drucken.* Vf. bringt Tabellen Faktoren zur Berechnung von O_2 -Mengen bei Drucken zwischen 25 u. 200 (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8. 117—19.) GRIMM

A. Brukl und W. Maxymowicz, *Die Fällung des Tellurs aus sulfalkalischen Lösungen und seine Trennung von den Schwermetallen und vom Selen.* Te wird sulfalkal. Lsgg. quantitativ gefällt, wenn der Polysulfid-S u. der S der H_2TeS_4 entfernt wird. Dies geschieht durch Einw. von Na_2SO_3 gemäß der Gleichung:



Die saure Lsg. wird schwach ammoniakal. gemacht u. tropfenweise mit gelbem (NH₄)₂S versetzt, bis der auftretende Nd. vollständig gel. ist. Dann fügt man 20—25 ccm gesätt. Lsg. von Na_2SO_3 hinzu u. erhält 10—20 Min. im Sieden. Die gelbe Lsg. färbt sich, dann fällt schwarzes Te aus, das sich beim Kochen zu groben, leicht filterbaren Flocken zusammenballt. Man verd. hierauf auf 200—300 ccm, setzt noch ein ccm der Sulfitlsg. hinzu, kocht nochmals u. überzeugt sich, daß die Fällung quantitativ ist. Nach dem Filtrieren im Goochtiiegel wird mit h. W. gut ausgewaschen u. der Niederschlag entweder im N-Strom, oder nach Verdrängung des W. durch A. u. Ä. bei 100° im Trockenschrank getrocknet. Im Trockenschrank nimmt das Te durch Oxydation häufig bis zu 20% an Gewicht zu. Auf Grund der beschriebenen Fällung werden die Verff. zur Trennung des Te vom Pb, Bi, Hg, Cu, Au u. Se angegeben, wegen der Einzelheiten auf die Abhandlung verwiesen werden muß. Die Se-Te-Trennung liegt nur für das Te genaue Werte. (Ztschr. f. anal. Ch. 68. 14—22. Wien, Techn. Hochschule.) BÖTTGER

Karl Kürschner und Karl Scharrer, *Über Verwendung von Kupferpulver in der analytischen Chemie.* 0,1 g der zu untersuchenden Substanz mischt man in ein 200 ccm fassenden Kjeldahlkolben sorgfältig mit etwa 1 g Cu-Pulver (durch Erhitzen von möglichst wenig $\text{CH}_3(\text{OH})$ auf fein gemahlenes, glühendes CuO in einer Porzellschale erhalten), worauf 10 ccm konz. H_2SO_4 u. 10 g K_2SO_4 hinzugefügt werden. Die Mischung wird etwa $\frac{1}{4}$ Stde. bei ganz kleiner, leuchtender Flamme schwach erhitzt, sodann allmählich mit voller nicht leuchtender Flamme weiter behandelt. Nach Beendigung der Kjeldahlisation (an dem Auftreten einer smaragdgrünen Färbung der H_2SO_4 erkennbar) läßt man kurze Zeit abkühlen, füllt mit W. auf 70 ccm auf, saugt mittels einer Luftpumpe einen raschen Luftstrom durch die Fl. u. läßt dann ~ 30 ccm 40%ig. NaOH-Lsg. hinzuffießen (Abbildung des App. im Original), worauf man das NH_3 in ein gemessenes Vol. 0,1-n. HCl abdestilliert. — Über das Verf. zur Best. des N im Kalkstickstoff wird bereits berichtet (SCHARRER, Chem.-Ztg. 49. 243; C. 1925. I. 2111). (Ztschr. f. anal. Ch. 68. 1—14. Brünn, Deutsche Techn. Hochschule u. München, Hochschule f. Landwirtschaft.) BÖTTGER

Rudolf Fridli, *Über die quantitative Bestimmung des Arsens als metallisches Arsen und als Ammoniummagnesiumarsenathexahydrat.* Vf. gibt 2 Methoden zur qua-

ven Best. kleiner As-Mengen (1—10 mg) an. 1. Best. als metall. As in Hg, Au, u. Te-freien Lsgg.: 15 ccm kochendes Bettendorffsches Reagens wird unter die 5 ccm betragende in einem 150 ccm-Becherglase befindliche As-Lsg. gemischt. h $\frac{1}{4}$ Stde. Stehen Fl. 10 Minuten zum Sieden erhitzen. Tags darauf 80 ccm W. geben u. im Winklerschen Kelchtrichter sammeln (Ztschr. f. angew. Ch. **30**. 251.; C. **1917**. II. 829). In den 5 ccm fassenden Kelchtrichter stopft man etwas Watte, cht der Reihe nach mit heißem W., 25 ccm 5%ig. HCl, 25 ccm h. W., 2—3-mal 96%ig. A., 2—3-mal mit Ä. u. trocknet 10 Minuten im trocknen Luftstrom. Eine ht im Exsiccator lassen, Nd. abfiltrieren, mit 50 ccm h. 5%ig. HCl, 25 ccm h. W., 3-mal mit 96%ig. A. u. 2—3-mal mit Ä. waschen. Wie oben trocknen. Über- eitet As-Gehalt 10 mg, sind die Zahlen zu hoch u. durch angegebene Faktoren rrigieren.

2. Best. als Magnes. ammon. arseniat. Die Winklersche Vorschrift (Ztschr. f. w. Ch. **32**. 122; C. **1919**. IV. 249) wurde so abgeändert, daß die Rk.-Fl. 10 ccm ägt; der Kelchtrichter faßte 1,5 ccm. As^{III}-Lsg. mit HCl ansäuern u. in 50 ccm berglas mittels Bromwasser oxydieren, auf 5 ccm eindampfen, mit 0,25 g NH₄Cl . ccm W. versetzen, zum Sieden erhitzen, 2 ccm 20%ig. NH₄OH, dann 1 ccm nesiamixtur zufließen lassen u. bedeckt. 24 Stdn. beiseitestellen. Nd. mit Mischung 1 ccm 1%ig. NH₄OH u. 1 ccm A. auf getrockneten Kelchtrichter (mit Watte- sch) spülen u. 10-mal mit je 1 ccm 1%ig. NH₄OH, dann 3-mal mit A. waschen. Luftstrome trocknen. Sb stört die Best. nicht. (Pharm. Zentralhalle **67**. 241—44. n. Inst. der Univ. Budapest.)

ROJAHN.

H. Ter Meulen, *Über die Bestimmung des Arsens in organischen Verbindungen*. et man ein Gemisch von As₂O₃ oder Arsensulfiden u. H durch ein glühendes rrohr, so erfolgt quantitative Red. zu As. In ein durchsichtiges Rohr von m Länge wird von links H eingeleitet. An diesem Ende befindet sich ein Por- nschiffchen mit der Substanz. Dann folgt eine auf Rotglut erhitzte Asbest- ht. An dieses Rohr ist ein zweites, kürzeres Quarzrohr mit einer Kugel an- hliffen, in dessen rechtem Ende sich eine kurze, auf Rotglut erhitzte Platin- le befindet. Letztere ist nötig, um jede Spur As zurückzuhalten. Erhitzt man die Substanz, von links beginnend, so sammelt sich das As zunächst hinter der tschicht u. wird durch Erhitzen in das angeschliffene, vorher gewogene Rohr getrieben, nachdem man eine Asbestplatte vor der Kugel angebracht hat. Vor Wiegen wird durch das Kugelrohr trockene Luft geleitet. — Für die Best. des n organ. Substanzen verfährt man ebenso. Da sich bei arom. Verbb. leicht KW-stoffe bilden, muß man das angeschliffene Rohr mit PAe. ausspülen. Damit Spirale nicht herausfällt, hat man vorher einen Asbestpfropf eingeführt. Der . wird durch einen trockenen Luftstrom entfernt. — Bei gleichzeitiger Ggw. eines ills werden anorgan. As-Verbb. mit KHSO₄ vermischt, organ. As-Verbb. mit . H₂SO₄ angefeuchtet. Ein Überschuß letzterer wird im Verlaufe der Best. zu reduziert. — Nach beendiger Analyse wird das As entweder durch Erhitzen E-Strom oder mit Königswasser entfernt. Die Platinspirale wird im Luftstrom eglüht. — Das Verf. läßt sich, etwas modifiziert, auch zum qualitativen Nach- des As in größeren Substanzmengen benutzen, ohne daß man — wie bei dem . von MARSH — organ. Materialien erst zerstören müßte. (Rec. trav. chim. Pays- **45**. 364—67.)

LINDENBAUM.

H. Ter Meulen, *Über die Bestimmung des Quecksilbers als Metall in organischen anorganischen Verbindungen*. Flüchtige Quecksilberverbb. werden von H bei ge- nd hoher Temp. quantitativ zu Hg reduziert. Vf. bedient sich der im vorst. beschriebenen Apparatur, nur daß das angeschliffene Rohr hier U-förmig ist einem Wasserbad gekühlt wird. Die Platinspirale fällt fort. HgS wird besonders t u. glatt reduziert. Auch HgCl₂ liefert bei einiger Vorsicht gute Resultate.

HgJ_2 muß vorher mit dem gleichen Gewicht Na_2S u. etwas W. vermischt u. auf dem Wasserbad getrocknet werden. Auf diese Weise kann das Hg in allen anorgan. Verbindungen bestimmt werden. — Das Verf. eignet sich ebenso gut für organ. Hg-Verbb. Erhalten diese Halogen, so behandelt man sie wie oben mit Na_2S . Nach der Analyse muß das Rohr, wie im vorst. Ref. angegeben, mit PAe. ausgespült werden. (Revue chim. Pays-Bas 45. 368—70. Delft, Techn. Hochschule.) LINDENBAUM.

Maurice Delaville und **Paul Carlier**, *Bestimmung kleiner Mengen von Kalium*. In einem Zentrifugiergefäß wird die zu untersuchende Lsg. mit einer frisch hergestellten Lsg. aus 4 ccm von $25 \text{ Co}(\text{NO}_3)_2$ in 25 ccm Eg. u. 100 ccm A. u. 20 ccm von 120 g NaNO_2 in 180 ccm W. gefällt, zentrifugiert, mit W. gewaschen, in 2 ccm HCl gel., mit NH_4OH neutralisiert u. das Co mit einer 4%ig. Lsg. von Nitroso- β -naphthol gefällt, abfiltriert u. verglüht. Das Co kann auch mit H_2 reduziert werden u. nach dem Erkalten mit Phosphormolybdat behandelt werden, wobei das MoO_3 zu dem stahlblauen MoO_2 reduziert wird. Dieses wird nun mit KMnO_4 wieder titriert. Die Best. des K wird so auf eine Best. des Co zurückgeführt. Beleganalysen sind angegeben. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 701—03.) ENSLIN.

Aldo Chiappero, *Bestimmung von Gips in Goldschwefel*. 1 g Goldschwefel wird im 500-ccm-Becherglase $\frac{1}{2}$ Stde. lang mit 450 ccm W. verrührt, der ungel. Rückstand im Goochtiiegel Ca-frei gewaschen (Prüfung mit Ammonoxalat), bei 100° getrocknet u. gewogen. Differenz CaSO_4 . Vorbedingung zum richtigen Resultate ist die Abwesenheit von anderen in W. l. Substanzen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8. 12.) Turin.) GRIMME.

A. C. Rice, **H. C. Fogg** und **C. James**, *Phenylarsinsäure als Reagens zur Bestimmung von Zirkonium und Thorium*. Das Zirkonylsalz der Phenylarsinsäure $\text{C}_6\text{H}_5\text{AsO}(\text{OH})_2$, ist außerordentlich schwer l. u. daher sehr geeignet zur Trennung des Zr von allen Elementen außer Hf. Phenylarsinsäure ist leicht nach der Methode von PALMER u. ADAMS (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 1361; C. 1923. I. 50) darzustellen. 25 ccm Zirkonylchloridlsg. wurden auf 200 ccm verd. u. 10 ccm 10% Phenylarsinsäurelsgg. zugegeben, dann zum Sieden erhitzt. Nach 1 Min. langem Kochen wird das h. Gemisch filtriert, der Nd. mit 1%ig. HCl gewaschen, getrocknet, vorsichtig geglüht, bis aller C verbrannt ist, dann im H_2 -Strom erhitzt u. schließlich auf dem Gebläse erhitzt u. das ZrO_2 gewogen. Die Salzsäurekonz. der Zirkonylchloridlsg. spielt keine Rolle, denn das Zirkonylsalz der Phenylarsinsäure ist auch in hoher Konz. unl. Bei Ggw. von Fe^{III} muß Nd. u. Filter noch mit 1:1 HCl digeriert werden, nach Verd. auf 500 ccm wird nochmals mit 15 ccm Phenylarsinsäure gefällt u. wie oben behandelt. Bei Ggw. von sehr viel Fe werden Nd. u. Filter mit 15 ccm 1:1 H_2SO_4 behandelt, erwärmt bis alles Zr gel., 50 ccm konz. HCl zugegeben, auf 500 ccm verd., gekocht u. mit 30 ccm Phenylarsinsäure gefällt. Bei Ggw. von Fe u. Al, den Elementen der Ce-Gruppe, Mn, Co, Ni, Zn, Be, Bi u. Cu, gelingt die Trennung leicht in Ggw. 10%ig. HCl . Bei Ggw. von Th muß wie bei großen Mengen verfahren werden. Auch in 10 Vol.-%ig. H_2SO_4 ist die Fällung des Zr quantitativ, höhere H_2SO_4 -Konz. wirken ungünstig. Die Trennung des Zr von H_3PO_4 gelingt in schwefelsaurer Lsg. durch doppelte Fällung mit Phenylarsinsäure. Bei Ggw. von U wird in schwefelsaurer analog wie beim Fe vorgegangen. — Das Th-Salz der Phenylarsinsäure unterscheidet sich von den Phenylarsinsäuresalzen der seltenen Erden durch seine Unlöslichkeit in Lsgg., die viel Essigsäure enthalten. 25 ccm Th-Chloridlsg. wurden auf 500 ccm verd., bis eben unter den Kp. erhitzt, 30 ccm 10%ig. Phenylarsinsäure, 75 ccm Eg. u. 5 ccm konz. NH_4 -Acetatlsg. zugegeben, filtriert, abgewaschen, in 10 ccm HCl gel., auf 400 ccm verd., zum Sieden erhitzt u. mit Oxalsäure gefällt, nach dem Stehen über Nacht filtriert, gewaschen, geglüht u. gewogen. Die Fällung als Oxalat war notwendig, weil beim Glühen des Phenylarsinsäuresalzes nicht alles As entfernt wurde. Bei Ggw. der seltenen Erden muß zweimal mit Phenylarsinsäure gefällt werden.

nsäure gefällt werden. Auf diese Methode gründet sich das von den Vff. beschriebene f. zur Best. von Th in *Monazitsand*. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 895—902. ham [N. Hampsh.], Univ.)

JOSEPHY.

Oscar Cantoni, *Beobachtungen über die Analyse von Silicaten*. Die *Abscheidung unl. SiO_2* in den Aufschlüssen gelingt sehr gut, wenn man in Ggw. von NaCl abpft. NaCl läßt sich aus der abfiltrierten SiO_2 leicht wieder auswaschen. — Bei *Fällung der Sesquioxyde* gibt man mit Vorteil 1 g gewaschenes Kaolin hinzu, durch der Nd. sich schnell zusammenballt u. leicht filtrieren u. auswaschen läßt. Gewichte des geglühten Nd. zieht man das Gewicht des Kaolins, verringert um vorher bestimmten Glühverlust, ab. — Bei der *Trennung von Fe_2O_3 u. Al_2O_3* nutzt man den Aufschluß durch Schmelzen mit der zehnfachen Menge KHSO_4 . 10 Verss. ergaben, daß diese Menge nicht zur Löslichmachung ausreicht. Auf Glührückstand muß man mindestens 6 g KHSO_4 nehmen. — Wegen der *Trennung Alkalien* vgl. Ztschr. f. anal. Ch. **67**. 33; C. **1925**. II. 2284. (Annali Chim. Appl. **92**—95. Mailand.)

GRIMME.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

C. Ainsworth Mitchell, *Eine Farbenreaktion des Saponins mit Nitraten*. Reines *Saponin* des Handels (B. D. H.) kann Brucin oder Strychnin beim Nachweise von Nitraten ersetzen. Gibt man einen Tropfen konz. H_2SO_4 zu einem Gemische kleinster Mengen Saponin u. eines Nitrates, so erhält man die bekannte blutrote Färbung. Es ist noch unbekannt, ob diese Rk. für alle Saponine oder nur für einige wesentlich ist. (Ztschr. f. anal. Ch. **51**. 181.)

RÜHLE.

Paul Cristol, *Die pH -Bestimmung mittels der Indikatorenmethode in blutigem Urin, besonders bei der Prüfung des durch Ureterenkatheterismus getrennten Urins beider Nieren*. Blutiger Urin kann durch Tierkohlenentfärbung für die Michaelissche pH -Bestimmung brauchbar gemacht werden. Wenn Carbonate u. Alkalisulfide aus der Tierkohle durch Waschen mit reiner HCl entfernt wurden, ändert sie die pH -Werte um 0,2—0,3. (Bull. de la soc. des sciences méd. et biol. de Montpellier et du midi de la France **6**. 107—09. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 216. Ref. **1925**.)

OPPENHEIMER.

V. Mestrezat und R. Morel, *Der titrierbare Harnstickstoff nach den Methoden von J. A. Foerster, Kjedahl-Denigès und Kjeldahl-Grigaut*. Vergleichende Unterss. Die Mestrezatsche Modifikation (nach Angaben von MESTREZAT, Journ. Pharm. und Exp. Med. **21**. 185. [1920]) gibt die zuverlässigsten Werte. (Bull. Soc. Chim. Biol. **6**—08.)

OPPENHEIMER.

F. Fairhall (Chromat)-Methode für Spuren von Blei in Faecesproben. Die Proben werden in verschließbaren Flintglasgefäßen gesammelt u. durch Zugabe von 5 ccm Pb-freiem Formalin konserviert. Die Untersuchungsprobe wird in einer 300-ccm-Porzellanschale 10—12 Stdn. bei 120—150° getrocknet, bei 550° in einer Muffel verascht. Abgekühlte Asche mit W. durchfeuchten, mit 10—20 ccm 1:1 erwärmt, Lsg. filtrieren u. Rückstand mit 10%ig. HCl, dann mit h. W. waschen. Filter u. Rückstand veraschen, mit 10 ccm W. anfeuchten, erwärmen u. mit 10%ig. Weinsäurelsg. in HCl (1:1), Filtrat mit erstem Filtrat versetzen, Mischung auf 500 ccm verd. u. neutralisieren mit 25%ig. NaOH bis zum Umschlag von Methylorange. Lsg. während 1/2 Stde. öfters umschütteln, 1 Stde. stehen lassen, Nd. abfiltrieren u. mit frischem H_2S -W., welches 0,1% HCl enthält, waschen. Filter u. Nd. im Fällungskolben mit h. W., 15 ccm HCl (1:1) u. verdünnen auf 300 ccm konz. HNO_3 durcharbeiten, auf 3 ccm einengen, auf 400 ccm verd., mit 10%ig. NaOH bis zum Gelbumschlag von Methylorange neutralisieren u. mit HCl bis zum beginnenden Rötung versetzen. 1 ccm HCl (1:2) zugeben u. abermals mit


H₂S fällen. Wie vor behandeln u. abermals mit H₂S fällen bei einer pH entsprechende Rotumschlag von Thymolblau. Lsg. (ca. 250 ccm) abfiltrieren u. Nd. mit H₂S auswaschen. Nd. lösen in 10 ccm HNO₃ (1:1), Filter durchstoßen u. Schwefel den Kolben waschen. Eindampfen auf 2—3 ccm, Schwefel abfiltrieren u. auf 50 ccm auswaschen. Neutralisieren mit 25%ig. NaOH gegen Thymolblau, Farbe zerstören mit 5%ig. Essigsäure u. 3 ccm Überschuß zugeben. Zum Sieden erhitzen u. 1%ig. Kaliumchromatls. versetzen, 1 Stde. w. stehen lassen, dann bedeckt 1 Nacht. Bleichromat abfiltrieren, h. auswaschen, vom Filter mit 10 ccm k. HCl (1:1) lösen u. mit 50 ccm W. nachwaschen. Zugeben von 2—3 ccm 1%ig. KJ-Lsg. 0,5 ccm Stärkelsg. u. Jod mit 0,005 n. Thiosulfatlsg. titrieren. Verbrauchte ccm 0,3452 = Milligramme Pb. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 431—32.) GRIMME

A. Schultz, *Über Cholesterinesterverfettung*. (Vgl. Zbl. allg. Path. u. path. An. **35**. 314; C. **1925**. II. 1080.) Mit der angegebenen Eg-H₂SO₄-Rk. werden im Knorngewebe älterer Individuen blaue Ringe beobachtet, die Vf. als Cholesterinester anspricht. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. **36**. 120—23. 1925; Ber. Physiol. **34**. 138. Ref. ARNDT.) OPPENHEIMER

Hans-Joachim Arndt, *Zur Kritik neuerer Methoden des histochemischen Lipidnachweises*. Die Cholesterinrk. von SCHULTZ (vgl. vorst. Ref.) wird nicht als spezifisch angesprochen. Zu ihrem Zustandekommen sprechen auch andere Lipide (ungesättigte Fettsäuren) mit. Die Methode von STÜLER zum Phosphatidnachweis gibt auch keine eindeutigen Ergebnisse. Zum schnellen Nachweis kleiner Mengen anisotroper Lipide ist die Methode von VERSÉ mit Ä.-A.-H₂SO₄ geeignet. Über den Lipidnachweis des Vfs. vgl. Ztschr. f. wiss. Mikroskopie **41**. 481; C. **1925**. II. 73. (Zentralbl. f. Pathol. u. pathol. Anat. **36**. 143—49. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 138—39. 1925.) ARNDT.) OPPENHEIMER

Klaus Hansen, *Ein exakteres Maß für den Alkoholisierungsgrad des Organismus bei psychischen und psycho-physiologischen Alkoholversuchen*. Das Ergebnis der gleichenden Unterss. durch chem. Nachweis von A. im Blut u. durch eine psychologische Methode ist, daß die lähmende Wrkg. sehr wesentlich von der A.-Konz. im Blut abhängig ist u. daß die Gewöhnung an A. eine große Rolle spielt. (Vgl. Biochem. Ztschr. **160**. 291; C. **1925**. II. 1696.) (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapeut. **355**—84. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 110—11. Oslo, Physiol. Inst. Ref. FLURY.)

Humphrey Paget, *Die Bestimmung des Ascaridols in Wurmsamenöl*. Ascaridol setzt sich leicht schon unter der Einw. von trockener Hitze u. von Dampf um, so schon bei seiner Gewinnung durch Dampfdest. solche Umsetzungen eintreten müssen. Da Ascaridol der einzig wirksame Bestandteil des Wurmsamenöles ist, so ist ein Versehen mit dem Ascaridol als solches bestimmt werden kann, wünschenswert. Die Reindarstellung



des Ascaridols gelingt durch Dest. u. bei vermindertem Drucke, sie ist aber sehr gefährlich, da Ascaridol als Peroxyd (neben Formel) leicht explodiert. Dagegen ge-

der Nachweis durch Red. des Ascaridols mit Titanochlorid nach KNECHT u. HIBBELD die quantitativ u. meßbar erfolgt. 1 g Ascaridol wird reduziert von 1,2770 g Titanochlorid; es ist dies noch ein empirisches Verhältnis. Das Verf. gestattet zwar keinen hohen Grad von Genauigkeit, ist aber einfach mit sehr kleinen Mengen Öles auszuführen u. gibt das wirklich als solches vorhandene Ascaridol auch bei verfälschten Ölen. Die bis jetzt gebräuchlichen Verff. zur Best. des Öles geben bei echten, reinen Ölen ganz nützliche Werte, sind aber bei verfälschten Ölen ganz wertlos. Wegen dieser Einzelheiten ist das Original einzusehen. (Analyst **51**. 170—76.) RÜHMANN

H. Angewandte Chemie.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Georg Renegew, *Über Entstaubung und Entnebelung in der Textilindustrie*. Seine Angaben über die Einrichtung geeigneter Anlagen, deren Notwendigkeit getan wird. (Melliands Textilber. **7**. 391—92.) SÜVERN.

Carey P. McCord und **Alfred Friedländer**, *Eine berufliche Krankheitserscheinung bei Zinkarbeitern*. In einer Verzinkungsanstalt zeigten 12 Arbeiter gleichartige Magenerkrankungen (ulcusähnliche Symptome u. Entzündungen), in anderen Werken keine gefunden. Als Ursache der als chron. Vergiftung mit Zn gedeuteten Krankheiten werden die räumlichen Verhältnisse u. der Betrieb angesprochen, in dem die Arbeiter enthaltenden Dämpfen direkt ausgesetzt sind. (Amer. Journ. Publ. Health **16**. —80. Cincinnati, Industrial Health Conservancy Labor.) MEIER.

I. Vernon Brumbaugh, *Die Ursache einiger Unfälle mit Gas*. Vf. bespricht 19 Fälle Vergiftungen mit CO durch fehlerhafte Gasherde, -öfen oder schlechte Installationen in geschlossenen, ventilationsfreien Räumen. Die Bestimmung erfolgte mit J₂O₅ (vgl. Bureau of Standards Technologic Paper Nr. 222). Tabellen u. Diagramme über die Verteilung des CO im Raum, über die Zusammensetzung der Atmosphäre beim Brennen bis zum Ausgehen der Flamme durch Luftmangel u. Abhängigkeit der CO-Konzentration vom Gasdruck im Original. Vf. macht Vorschläge zur Verbesserung der Gasherde. (Department of Commerce. Technologic Papers of the Bureau of Standards **1**. No. 303. 77 Seiten. Sep.) JUNG.

L. Schwarz, *Ärztlich-hygienische Bemerkungen zur Vorbeugung der Berufskrankheiten insbesondere der Bleivergiftung*. Vf. erörtert an der Bleierkrankung als Beispiel die praktische Durchführung der Vorbeugungsmaßnahmen gegen Berufskrankheiten. (Ztschr. angew. Ch. **39**. 504—07. Hamburg.) JUNG.

R. S. Quinby, *Gesundheitsschädigungen in der Glättfilzerei*. Aufzählung der Chemikalien, welche in genanntem Gewerbe gesundheitsschädigend wirken können. (Journ. Hygiene **8**. 103—12.) HÜCKEL.

C. Gentsch, *Nochmals die Rolle des Bicarbonats in Trockenlöschern*. Antwort an J. H. ALSKI (S. 2822). Ein Laboratoriumsversuch zeigt, daß 2 g NaHCO₃ im Tiegel in 3 Min. zur Zersetzung erforderten. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 450—51. Berlin.) JUNG.

IV. Wasser; Abwasser.

F. Bordas und **F. Touplain**, *Betrachtung über reines und neutrales (p_H = 7,07) destilliertes Wasser. Seine Anwendung zu biologischen Flüssigkeiten*. Bei der gewöhnlichen Herstellung wird der Wasserdampf mehr oder weniger überhitzt, besonders auf dem Feuer u. in metall. Destillationsgeräten; hierdurch entstehen negative Elektroden, die den p_H des W. herabdrücken (Thermoelektronisation). In Glasgefäßen aus Pyrexglas tritt die Erscheinung weniger auf. Beim Stehen darin nimmt die Leitfähigkeit solchen W. langsam ab, schneller, wenn man den Druck schrittweise fallen läßt, bis der Dampf langsam erkalten läßt. Eine mehrmalige Dest. von reinem W. führt, besonders in metall. Geräten, nicht zu größerer Reinheit oder verringerter Leitfähigkeit. (Ann. des falsifications **19**. 134—52. Station Agronomique de la Somme.) GD.

E. Kuhn, *Die Beschaffenheit des Kesselwassers unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsdrücke und von Korrosionen*. Vf. bringt aus den amerikanischen Veröffentlichungen der letzten Jahre einen zusammenfassenden Bericht, der inhaltlich mit der Arbeit von HALL, FISCHER u. SMITH (S. 1686) übereinstimmt. (Die Wärme **49**. —65. Berlin.) SPLITTGERBER.

Louis B. Harrison, *Chlorphenolgeschmack im Wasser der Filteranlage von Bayreuth*. Bei gleichzeitigem Zusammentreffen von Cl-haltigen Abwässern (z. B. aus Chlor-

benzolfabriken) u. von phenolhaltigen Abwässern, z. B. aus Gasfabriken, tritt unter Umständen ein sehr unangenehmer Geschmack nach Chlorphenol auf. Dieser Geschmack macht sich im Sommer bei starkem Bakterienwachstum im Flußlauf nicht bemerkbar, weil in diesem Falle die Bakterien das Phenol bezw. Chlorphenol aufzehren. Nach Eintritt der kühleren Jahreszeit dagegen, hauptsächlich dann, wenn durch Fällung von Zuckerfabriksabwässern die O₂-Zehrung des Flußwassers sehr stark vermindert wird, nimmt die chlorphenolzerstörende Kraft der Bakterien ab, so daß dann unangenehme Geschmacksbeeinflussungen nicht selten sind. (Journ. Amer. Water Works Assoc. **15**. 292—97. Bay-City in Michigan.)

SPLITTGERBER

Paul C. Laux, *Die Ursache der Rotfärbung von Wasser und Gegenmaßnahmen*. Unter rotem W. versteht der Vf. ein W., das auf irgendeine Weise Eisen aufgenommen hat. Das gel. Fe kann durch Alkali- oder Kalkzusatz ausgefällt werden. Die schädlich freie u. gebundene CO₂ wird durch Zugabe von Al-Sulfat ausgetrieben. (Journ. Amer. Water Works Assoc. **15**. 271—78. Chicago III, Nationaler Kalkverband.)

H. Serger, *Chloriertes Trinkwasser und seine Verwendbarkeit bei der Herstellung von Dosenkonserven*. Aus Verss. mit Spargeln, Bohnen u. gewürfelten Karotten ergaben sich, daß Cl₂ ohne hygien. u. techn. Bedenken zur Reinigung des W. für Konservenherst. benutzt werden kann. Je nach den Mengen, die die Reinigung fordert, kann bis zu 1 g Cl₂/cbm verwendet werden. Eine geschmackliche Einw. ist nicht wahrzunehmen. Der Nachweis von freiem Cl₂ in W. läßt sich dadurch verschärfen, daß man das W. gefrieren läßt, den Eisblock der Länge nach spaltet u. dem mittleren inneren Teil des Eises die Jodrk. anstellt, noch Nachweis von 0,0005 m Cl₂ so möglich. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel **51**. 125—32. Braunschweig.)

W. S. Mahlie, *Untersuchung von Filtersand*. Der unter dem Namen Goliathsand bekannte u. in Texas fast ausschließlich benutzte Filtersand zeigt eine sehr gleichmäßige Zus. u. läßt sich durch Messung der Korngröße leicht identifizieren. (Journ. Amer. Water Works Assoc. **15**. 256—57. Fort Worth, Texas.)

SPLITTGERBER

F. B. Beech, *Geschmolzene Zeolithe der Ohiotal-Wasserwerksgesellschaft*. Beschreibung der Vorteile der Wasserenthärtung durch Permutierung im Verhältnis zur Kalksodaenthärtung. (Journ. Amer. Water Works Assoc. **15**. 227—33. Mc Kees Rocks [Pa.].)

SPLITTGERBER

W. J. Risley, jr., *Entfernen gelösten Sauerstoffs aus Wasser*. Es erfolgt jetzt allgemein durch Kochen des W. unter vermindertem Druck bei Temp. bis hinunter zu 60°. Bei noch niederen Temp. würde das Verf. nicht mehr wirtschaftlich sein. Auf ganz anderer Grundlage beruht das Verf. des Ausrostens, bei dem man das O-haltige W. über leicht rostende Stoffe, wie Eisenspäne, von großer Oberfläche leitet; es verläßt sie völlig frei von O₂. (Chem. Metallurg. Engineering **33**. 163—64. North Glenside [Pa.].)

RÜHLE

R. Browenlie, *Die modernen englischen Verfahren der Wasserreinigung*. (Monatsscient. [5] **16**. 42—46.)

LASCH

R. Schwarzbach, *Chlorgassterilisation von Trinkwasser und seine besondere Bedeutung bei Hochwasser*. Übersicht über die Methoden zur Entkeimung des Trinkwassers mit Ozon, Hypochloritlauge, Chlorkalk u. Chlorgas. Beschreibung der Chlorkalkanlagen des städt. Wasserwerks Erfurt u. der 1924 statt derselben eingeführten Sterilisation mit Chlorgas nach dem indirekten Verf. mittels der App. der „Chloran“-Gesellschaft m. b. H., Berlin W. 35. Ergebnisse der unter verschiedenen Bedingungen vorgenommenen Dauerunterss. in den W.-Gewinnungsanlagen Wechmar u. Wandl. leben. (Gas- u. Wasserfach **69**. 272—75. Erfurt.)

WOLFFRAM

A. M. Buswell und **S. I. Strickhouser**, *Einige Beobachtungen über Klärgasgase*. Die Gase von schäumenden Imhofftanks enthalten mehr CO₂, weniger N₂. Praktisch die gleiche Menge CH₄ als die von nichtschäumenden Tanks. Das Verhältnis von Gaszus. zum Schäumen ist bedingt durch die Oberflächenspannung,

der biolog. Einw. u. den Verlauf der Gasentw. Menge u. Heizwert der Gase von Kofftanks lassen eine techn. Ausnutzung zu. (Ind. and. Engin. Chem. **18**. 407 409. Urbana [Ill.]) GRIMME.

Mario Cambon, *Die Sterilisierung von Klärgrubenwässern mit Chlorgas*. Beschreibung der Anlage des Triester Krankenhauses, bei welcher das W. mit einer wss. Cl₂-Lsg. versetzt wird. Angaben über Nutzbarmachung des bei der Schlammgärung stehenden CH₄-Gases. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. **8**. 63—67. Triest.) GRI.

von Morgenstern, *Einfluß der Industrieabwässer auf die Flußläufe unter besonderer Rücksichtigung der Schunter*. (Zentralblatt f. Zuckerind. **34**. 278—79. Braun-sweig.) RÜHLE.

E. Rolants, *Aktivierter Schlamm und die Reinigung von städtischen Abwässern*. Nach eingehender geschichtlicher Darst. der Entw. folgt eine Beschreibung des Verf. Theorie u. Praxis unter Beigabe von 3 Abbildungen u. 4 Skizzen. (La Nature **1926**. 1—31. Lille, Pasteur-Inst.) SPLITTGERBER.

V. Anorganische Industrie.

N. Juschkewitsch, *Fabrikation der Schwefelsäure in Deutschland*. Übersicht. (Zentralblatt f. chem. Ind. [russ.] **2**. 342—50.) BIKERMAN.

W. Stahl, *Zur Selengewinnung aus Bleikammerschlamm*. Die Extraktion des Se Bleikammerschlamm mit rauchender H₂SO₄ u. Ausfällen mit SO₂ liefert ein sehr reines Prod. (Chem.-Ztg. **50**. 280.) JUNG.

Annibale Moreschi, *Verfahren zur Extraktion von Brom aus Salinenwässern*. Auf 20—34° Bé konz. WW. werden mit Cl₂ versetzt, das ausgeschiedene Br₂ wird mit CCl₄ extrahiert, die Br₂-Lsg. wiederum mit Kalkmilch behandelt, wodurch „Bromkalk“ entsprechend dem Chlorkalk der Zus. $\text{CaO} \cdot \text{Ca} \begin{smallmatrix} \text{Br} \\ \text{OBr} \end{smallmatrix} \cdot \text{H}_2\text{O}$ bzw. $\text{Ca} \begin{smallmatrix} \text{Br} \\ \text{OBr} \end{smallmatrix}$ entsteht. Aus Bromkalk läßt sich Br₂ durch Ansäuern mit verd. Säure gewinnen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. **8**. 115—16.) GRIMME.

Carl R. De Long, *Zukunftsfragen für Brom*. Sammelbericht über Weltproduktion von Br₂ u. Br-Salzen, Ausgangsmaterialien, Preise u. Verwendungszwecke. (Ind. and. Engin. Chem. **18**. 425—28. Washington [Dc.]) GRIMME.

Harry N. Holmes, R. W. Sullivan und N. W. Metcalf, *Vergrößerung des inneren Raumes von Silicagelen durch feuchte Hitzebehandlung*. Eingehende Verss. ergaben, daß man praktisch die erste Trocknung nur bis 60% W. führt, diese M. in geschlossenen Gefäßen 1—2 Wochen „schwitzen“ läßt u. dann 5 Stdn. in verd. Säure kocht, auswascht u. trocknet. Diese allgemein anwendbare Methode hat sich vor allem bei Katalysatoren, welche durch Fällen von Wasserglaslsgg. mit FeCl₃ hergestellt wurden, bewährt. Die sd. Säure löst alles Fe₂O₃, so daß rein weißes hochporöses Silicagel hinterbleibt. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 386—88. Oberlin [Ohio]) GRIMME.

L. M., *Herstellung und Anwendung der aktiven Kohlen*. Zusammenfassende Darstellung an Hand zweier Abbildungen, der Gewinnung der aktiven Kohlen u. ihrer industriellen Verwertung. (Ind. chimique **13**. 106—09.) RÜHLE.

Karl Pfisterer, *Zuffenhausen, Wttbg., Einrichtung zum kontinuierlichen Behandeln von Stoffen mit Flüssigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von Schwefel aus elementaren, Schwefel enthaltenden Massen*. Mit Hilfe einer Flüssigkeitsstrahlpumpe nach D. R. P. 829 (C. **1922**. II. 183) u. 398640 (C. **1924**. II. 1493) dad. gek., daß die Mündung der Strahlpumpe in eine Vormischdüse hineinreicht, in deren breite Endmündung der feste Stoff, z. B. mit S angereicherte Gasreinigungsmasse, durch eine Zuführungsröhre aufgegeben u. im Gemenge mit der Fl. durch den Mantel, Vormischdüse, Misch-Auffangdüse zu intensiver Vermischung gebracht wird. (D. R. P. **426 385** Kl. 12i u. 17/1. 1925, ausg. 11/3. 1926.) KAUSCH.

Heinrich Vogel, Premnitz, Westhavelland, *Herstellung hochkonzentrierter, hochdisperser, wässriger kolloidaler Schwefellösungen.* (D. R. P. 427 585 Kl. 12i vom 17/8. 1922, ausg. 10/4. 1926. — C. 1924. I. 2623.) KAUSCH.

Metallbank und Metallurgische Ges., A.-G., Frankfurt a. M., *Herstellung von Schwefelsäure.* Abänderung des Verf. nach D. R. P. 370853, 1. dad. gek., daß eine mit Doppelring betriebenen Anlage ein weiterer Säurering, der in sich geschlossen kreist, vorgeschaltet wird. — 2. dad. gek., daß vor den Berieselungsraum eine mechan. Denitriervorr. vorgeschaltet wird, die nur die Tageserzeugung vollständig zu denitrieren hat, während der Berieselungsraum eine zwar nicht vollständig, aber doch weitgehend denitrierte Säure nach dem anderen Berieselungsraum abgibt. (D. R. P. 427 541 Kl. 12i vom 4/4. 1925, ausg. 14/4. 1926. Zus. zu D. R. P. 370369; C. 1923. II. 1144.) KAUSCH.

Friedrich Kraus, Siegen i. W., *Rückgewinnung der Salzsäure aus Eisenchlorurlösungen.* dad. gek., daß zwei im Kreislauf arbeitende, nebeneinanderliegende Muffelöfen (Doppelöfen) oder auch einer oder mehrere hintereinanderliegende Muffelöfen mit Schale oder durchgehendem Arbeitsherd verwendet werden, auf die bezw. den ein Teil des h. Fe_2O_3 aufgebracht wird, dem vorgewärmte FeCl_2 -Lauge zufließt, worauf das Gemisch im Arbeitsgang über den Herd gedrückt wird, während das überschüssige Fe_2O_3 aber am Herdende eines jeden Ofens entfernt wird. (D. R. P. 427 538 Kl. 12i vom 8/7. 1925, ausg. 9/4. 1926.) KAUSCH.

Bernhard Neumann, Wilhelm Steuer und Richard Domke, Berlin, *Herstellung von Salzsäure aus Chlor und Wasserdampf* in Ggw. von Kohle in der Hitze, dad. gek., daß man den zu verwendenden kohlenstoffhaltigen Substanzen Katalysatoren, nämlich Oxyde des Fe oder Stoffe, die Fe-Verbb. enthalten, beimengt oder einverleibt bzw. C-haltige Substanzen verwendet, die beim Verbrennen Fe-haltige Rückstände liefern. (D. R. P. 427 539 Kl. 12i vom 4/4. 1925, ausg. 10/4. 1926.) KAUSCH.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaestofaktieselskab, übert. von: **Birgar Fjell Halvorsen**, Oslo, Norwegen, *Ammoniak aus Cyanid und Wasserstoff enthaltenden Gasen.* (Can. P. 251 537 vom 19/2. 1925, ausg. 7/7. 1925. — C. 1924. I. 1250 [F. P. 563 844].) KAUSCH.

Electro Chemical Co., Ltd., übert. von: **James S. Island**, Merriton, Canada, *Stickoxyde auf elektrischem Wege.* Man verwendet hierbei einen App. mit kreisförmigen Elektroden, die einen Lichtbogen erzeugen, verzweigt die Stromleitung u. wählt einen Hochfrequenzstrom in der Abzweigung. (Can. P. 253 518 vom 21/8. 1924, ausg. 8/9. 1925.) KAUSCH.

Azogeno Soc. an. per la Fabbricazione dell'Ammoniaca Sintetica e Prodotti Derivati und **C. Toniolo**, Mailand, *Ammoniumnitrat.* Gasförmiges NH_3 wird mit Luft oder einem anderen nicht kondensierenden Gasgemisch, gegebenenfalls erhitzt u. durch mit einer Lsg. von NH_4NO_3 verd. HNO_3 geleitet oder dieser in einen Absorptionsturm entgegengeleitet oder durch eine Kammer geleitet, in der diese versprüht wird. (E. P. 247 227 vom 8/2. 1926, Auszug veröff. 8/4. 1926. Prior. 7/2. 1925.) KÜHLING.

Azogeno Soc. an. per la Fabbricazione dell' Ammoniaca Sintetica e Prodotti Derivati und **C. Toniolo**, Mailand, *Ammoniumnitrat.* Geschmolzenes wasserhaltiges NH_4NO_3 wird über einer Schicht h. oder k. gepulvertem NH_4NO_3 in einen starken Strom von h. oder k. Luft oder Gas ausgegossen oder versprüht. (E. P. 247 228 vom 8/2. 1926, Auszug veröff. 8/4. 1926. Prior. 7/2. 1925.) KÜHLING.

Azogeno Soc. an. per la Fabbricazione dell'Ammoniaca Sintetica e Prodotti Derivati und **C. Toniolo**, Mailand, *Ammoniumnitrat.* Geschmolzenes NH_4NO_3 wird in eine konz. Lsg. des Salzes eingetragen u. bis zum Schmelzen erhitzt. Die geschmolzene M. wird in einen Strom h. Luft versprüht oder mit gepulverten Stoffen gemischt. (E. P. 247 229 vom 8/2. 1926, Auszug veröff. 8/4. 1926. Prior. 7/2. 1925.) KÜHLING.

L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés
Jorges Claude, Paris, *Ausscheidung des Kryptons und des Xenons aus der Luft.*
R. P. 427 725 Kl. 12i vom 10/1. 1925, ausg. 14/4. 1926. F. Prior. 25/6. 1924. —
 1925. I. 2330.) KAUSCH.

K. Hepke, Teutschenthal b. Halle a. S., *Aufschließen von Tonerdesilicaten*, dad., daß diese mit derart bemessenen Mengen von Kieserit u. Steinsalz vermischt werden, daß bei der Erhitzung des Gemisches auf Tempp. von 400 bis 600° ein Reaktionsgut entsteht, das neben Na_2SO_4 u. Magnesiumsilicaten freies Al_2O_3 enthält.
R. P. 427 806 Kl. 12m vom 26/3. 1924, ausg. 19/4. 1926.) KAUSCH.

Johan Nicolaas Adolf Sauer, Amsterdam, *Verfahren und Vorrichtung zur Ernung aktiver Kohle durch Hitze u. aktivierende Gase in stehenden (senkrechten oder ägen) Retorten*, 1. dad. gek., daß die aktivierenden Gase u. gegebenenfalls auch Heizgase quer durch das zu aktivierende Material hindurchgeleitet werden. — 2. dad. gek., daß die Gase auf der ganzen Höhe der Aktivierungszone zugeleitet u. durchqueren des Materials aus der Retortenkammer abgeleitet werden. — 3. dad., daß Spülgas durch das Material, u. zwar quer durch die Ladungssäule während Dest. hindurchgeführt wird. — 4. dad. gek., daß das aktivierende Gas oder ein desselben innerhalb der Ladung verbrannt wird. — 5. dad. gek., daß in Verb. mit aktivierenden Gas ein brennbares Gas benutzt wird, das innerhalb der Ladung verbrannt wird. — 6. dad. gek., daß ein Teil der Ladung mittels Luft verbrannt wird, seitlich in die Materialsäule hineingeführt wird. — 7. dad. gek., daß träges Gas durch die Ladung mit dem aktivierenden Gas hindurchgeführt wird. — 8. Stehende Retorte oder Schachtofen, gek. durch einen in der Längsrichtung u. im Innern der Retorte verlaufenden Kanal, einen die Retortenkammer (Schacht) umgebenden Mantel u. Öffnungen über die ganze Höhe der Aktivierungszone in den Innen- u. Außenwänden der Retorte, die den Retortenraum mit dem Kanal u. mit dem Mantelraum verbinden. — 9. dad. gek., daß oberhalb der Aktivierungszone ein Trocknungs- u. Heizungs- bzw. Trockendestillationsraum angeordnet ist, der mit einem Mantelraum verbunden ist, gegebenenfalls mit einem inneren Kanal versehen ist, wobei Öffnungen in den Wänden eine Verb. mit dem Mantelraum u. gegebenenfalls mit dem inneren Kanal herstellt. — Weitere 6 Ansprüche betreffen Ausführungsformen des Verf. u. der Vorrichtung.
R. P. 427 526 Kl. 12i vom 11/5. 1924, ausg. 9/4. 1926. E. Prior. 5/4. 1924.) KAUSCH.
L. Gurwitsch, Moskau, *Regeneration von Entfärbungspulvern mittels Extraktion*, dad. gek., daß die verunreinigten Adsorber, wie Fullererde, Kohle, Ton, SiO_2 -Gel u. dgl., hartig wirkende Stoffe, nicht direkt mit Lösungsm., wie Bzl. oder Bzn. behandelt werden, sondern mit einem Gemisch dieser Lösungsm. mit Alkoholen oder Ketonen.
R. P. 427 805 Kl. 12i vom 14/10. 1924, ausg. 20/4. 1926.) KAUSCH.

Gewerkschaft Wallram, Abteilung Metallwerke, Deutschland, *Schwermetalldestillation*. Man erhitzt die Ausgangsstoffe (z. B. W u. C) in einem elektr. Rohrofen aus Graphit oder Kohle mit Stromzuführungen aus Kohle oder Graphit. (**F. P. 427 924** vom 24/7. 1925, ausg. 26/4. 1926. D. Prior. 8/9. 1924.) KAUSCH.

Eugène Albert Prudhomme, Frankreich, *Wasserstoff für die Hydrierung von Nitrilen usw.* Wassergas u. dgl. läßt man über $\text{Ca}(\text{OH})_2$ strömen. (**F. P. 603 639** vom 19/12. 1924, ausg. 20/4. 1926.) KAUSCH.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Paul Imhoff**, Leverkusen), *Herstellung von Alkalihydrosulfid aus Alkalibisulfiden u. Alkali amalgam*, dad., daß man einen Teil der Mutterlauge aus dem Prozeß period. oder kontinuierlich abtrennt u. durch W. oder eine Salzlsg., wie z. B. KCl-Lsg., ersetzt. (**D. R. P. 427 657** vom 14/2. 1925, ausg. 13/4. 1926.) KAUSCH.

Albert Wittig, Berlin, *Gewinnung von Salz aus Laugen durch Abkühlung*, dad. gek., daß die Lauge durch Druckerniedrigung u. dadurch bewirkte Verdampfung eines Teiles der Lauge enthaltenen W. abgekühlt wird u. daß der entwickelte Dampf mittels

mechan. Mittel, Kompressoren usw. verdichtet u. zur Wiedererwärmung der Lau verwendet wird. (D. R. P. 427 782 Kl. 121 vom 23/1. 1923, ausg. 16/4. 1926.) KA

Rumford Chemical Works, V. St. A., *Gips*. Säurehaltiges CaSO₄ wird neutralisiert, von wasserl. Salzen befreit u. gegläht. (F. P. 602 590 vom 3/8. 1925, aus 22/3. 1926.) KÜHLING.

Dorr Co., übert. von: **Harold Norman Spicer**, New York, *Aluminiumsulfid*. Feste Al-haltige Stoffe werden mit H₂SO₄ digeriert, das feste Material wird von der durch Sedimentierung bei gleichmäßiger Temp. u. unter Bedingungen, die gestatte daß die Fl. eine kurze Zeit zurückgehalten wird, getrennt. (Can. P. 253 301 vom 5. 1925, ausg. 1/9. 1925.) KAUSCH.

Charles Ernest Marie Joseph de Brisson de Laroche, Frankreich, *Metallsulfidlösungen oder -suspensionen*. Man verwendet zum Lösen oder Suspendieren von Sulfid (Na₂S) W., dem ein Schwermetallsulfid (HgS) zugesetzt ist. (F. P. 601 586 vom 15. 1925, ausg. 4/3. 1926.) KAUSCH.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Alan A. Claflin, *Die Erzielung weißer Seideneffekte auf Wollwaren*. Einzelheiten über die zweckmäßigste Färbeweise. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 23—24.) S

Carlo Sandoz und Giulio Tocco, *Die Herstellung von künstlichen Faserstoff nach dem Viscoseverfahren*. Sammelbericht über die Entw. der Herst. künstl. Faserstoffe, die Bedeutung dieser Industrien für die wichtigsten Kulturländer u. für Italien insbesondere, Produktion u. Export, sowie eine systemat. Wiedergabe der Verff. z. Herst. von Nitrocelluloseseide, Cuprammonseide, Viscoseseide u. Acetylcelluloseseide (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8. 69—76.) GRIMME.

Caroline Takamine und Jokichi Takamine jr., Clifton, New Jersey, V. St. *Entfernen von Stärke usw. aus Geweben*. (Can. P. 249 691 vom 3/7. 1923, ausg. 19. 1925 — C. 1922. IV. 1087.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., übert. von **Hermann Wagner und Otto Sohst**, Höchst a. M., *Monoazofarbstoffe*. (Can. 246 918 vom 7/1. 1924, ausg. 17/2. 1925. — C. 1924. I. 2307.) FRANZ.

Hans Pereira, Wien, übert. von: **Alois Zinke und Hermann Schoepfer**, Graz, Österreich, *Küpfenfarbstoffe der Perylenreihe*. (Can. P. 252 230 vom 22/12. 1923, aus 28/7. 1925. — C. 1924. II. 2426.) FRANZ.

Charles Henri Marschalk, Paris, Frankreich, *Schwarze Küpfenfarbstoffe*. (Can. 249 003 vom 11/3. 1924, ausg. 28/4. 1925. — C. 1924. II. 2427.) FRANZ.

Flakes A./S., Kopenhagen (Erfinder: **E. V. Schou**), *Anstrichmittel*. (Schwe P. 56 674 vom 27/7. 1918. Dän. Prior. 3/4. 1918. — C. 1922. II. 1221. [E. 175 764].) OELKER.

XIII. Ätherische Öle; Riechstoffe.

Valentino Morani, *Italienisches ätherisches Öl aus Laurus nobilis*. Das gel Öl wurde aus den Blättern in 1,28% Ausbeute erhalten u. hatte D.₁₅¹⁵ 0,92073 u. [α]_D²⁴ —18° 35'. Die aus 114,7 g bei fraktionierter Dest. erhaltenen 4 Fraktionen u. Rückstand (4,90; 63,45; 29,65; 4,40; 10,05 g) hatten folgende Kennziffern: Kp. 1 bis 170°; 170—190°; 190—215°; 215—238°; über 238°; D.₁₅¹⁵ 0,88974; 0,90270; 0,9220; 0,94404; 0,9730; [α]_D²³ = —20° 38'; —18° 4'; —24° 15'; —28° 56'; —; n_D²⁴ = 1,461; 1,4596; 1,4664; 1,4834; 1,5160; SZ.: —; 3,1; 55,9; 63,5; 20,2; EZ.: —; 11,0; 31,7; 22,10,1; EZ. nach Actlg.: —; 42,1; 82,9; 100,8; —; Ester als C₁₀H₁₁O·CO·CH₃: —; 3,11,10; 7,70; 3,53; Alkohole (gesamt) als C₁₀H₁₈O: —; 8,76; 14,64; 23,03; —; Fr Alkohole als C₁₀H₁₈O: —; 11,79; 23,36; 29,08; —. — Folgende Bestandteile wurden nachgewiesen: Cineol (45%), 18% freie Alkohole (Terpineol, Geraniol), 12% K

Pinen, Phellandren); 0,53% freies *Eugenol*; *Acetyl-* u. *Methyleugenol* (etwa 3%); Sesquiterpen (3–4%). (Riv. It. delle essenze e profumi 8. 40–42. Rom, Chem.-rar. Versuchsstation.)

HESSE.

G. H. Ogston und Moore, *Ätherische Öle aus Sizilien und Calabrien der Saison 1925–1926*. Während Zus. u. Kennzahlen von Orangen- u. Mandarinenoilen dieselben in früheren Jahren waren, wies Bergamottöl durchweg den niedrigen Durchschnittsgehalt von 34–35% *Linalylacetat* auf. Löslichkeit u. α_D waren n. Als Versuchungsmittel wurde ein dem Petitgrainöl von Paraguay ähnlicher, charakteristisch starker Stoff beobachtet. — Lemongrasöl wies im allgemeinen geringeren Citralgehalt, erhöhte D. u. vermehrte nichtflüchtige Rückstände auf. Mehrere Tabellen. *Perfumery Essent. Oil Rekord* 17. 86–87.)

HELLER.

Kinzô Kafuku und Kiyosi Kawaguti, *Über die Eigenschaften von aus verschiedenen Teilen der Pflanze gewonnenen Campherölen*. Aus verschiedenen Teilen dieser Campherpflanzen, eines 90-jährigen echten Baumes u. eines 60-jährigen sogen. shô-Baumes, wurden 27 Muster von *Campherölen* dargestellt u. verglichen bzgl. n, $[\alpha]$, Viscosität, EZ. nach Acetylierung, Camphergehalt, Trübungszahl (= cem, welche in einer Lsg. von 10 cem Öl in 50 cem absol. A. bei 30° eine bleibende Trübung hervorrufen). Es hat sich folgendes ergeben: 1. *Echte Pflanze*. Die Öle aus den oberen Teilen des Stammes sind campherärmer als die aus den unteren. Die Öle aus den inneren Teilen sind dichter als die aus den äußeren. Die Öle aus den oberen u. äußeren Teilen enthalten mehr alkoh. Bestandteile als die aus den oberen inneren. — 2. *Hôshô-Pflanze*. Die Öle von der Südseite sind campherreicher als die von der Nordseite. Die Öle aus den äußeren u. unteren Teilen drehen stärker rechts als die aus den inneren u. höheren. Für Gehalt an alkoh. Bestandteilen gilt das Umgekehrte. Das Öl der Blätter enthält nur Spuren Campher, ist stark links u. enthält die meisten alkoh. Bestandteile (über 28%, berechnet $C_{10}H_{18}O$). (Journ. Pharm. Soc. Japan 1926. No. 528. 13–14. Government Research Inst. of Formosa.)

LINDENBAUM.

Peppino Liotta, *Über das Öl aus Menta Puleggio*. Das bei Wasserdampfdest. in einer Ausbeute von 350–500 g aus 100 kg Pflanzen erhaltene Öl von schmutziggelber Farbe u. durchdringendem Geruch hatte folgende Kennzahlen: $D_{20}^{25} = +26^{\circ} 30'$; SZ. 0,31, l. in 70%ig. A. 1:2; enthält 0,85% Ester u. 62% *Pulegon Piperiton*. (Riv. It. delle essenze e profumi 8. 44–45.)

HESSE.

Alfred Wagner, *Die Darstellung von synthetischem Moschus*. Übersicht über die verschiedenartig duftenden Stoffe. Ausführlicher beschrieben sind nach der Literatur fabrikatorische Darst. von Moschus Baur, Xylol- u. Ambrettemoschus. Mehrere Analysenwerte für selbst hergestellte Ölharze u. stellen sie in Vergleich mit Handelsprodd. (Ind. and Engin. Chem. 18. 283–85. Washington [D. C.].)

HELLER.

J. B. Wilson und J. W. Sale, *Wertbestimmung von Handelsvanilleölharzen*. Bei der Vanilleroharzen versteht man eingedickte alkoh. Auszüge von Vanilleschoten, die einen wertvollen Handelsartikel zur Herst. von Riechstoffen bilden. Vff. geben Analysenwerte für selbst hergestellte Ölharze u. stellen sie in Vergleich mit Handelsprodd. (Ind. and Engin. Chem. 18. 283–85. Washington [D. C.].)

GRIMME.

XV. Gärungsgewerbe.

Wr., *Abnormale Gärungserscheinungen als Folge heftiger Bewegung der Kaltwürze*. Nach einer zu stark wirkenden, viel Luft mitsaugenden Zentrifugalpumpe zwischen Zirkulationskühler u. Gärbottich wurden die zahlreich vorhandenen Bierkolloide (Stärke, Eiweiß) auf das Feinste verteilt, so daß die Hefe verschleimt, ihre Gärtätigkeit vermindert u. insbesondere die Kolloide in Form starker brauner Decken in zu weit dem Maße ausgeschieden wurden. (Wechschr. f. Brauerei 43. 94.)

HAHN.

Martin Vogel, *Die Methode der Spirituserzeugung und ihre Bedeutung für die nahrungswirtschaft*. Zusammenhängende Darst. Die Fütterung mit Schlempe einer Pflanzenfütterung nicht gleichwertig u. liefert insbesondere Milch mit geringem Vitamingehalt. (Die Volksernährung 1. 92—93. 102—05. Hellerau bei Dresden.)

Michele Giua und Lino Thumiger, *Über die pyrogene Deshydratation von Fuselölen*. Das durch Gärung gewonnene Fernbachsche Fuselöl enthält ca. 65% n. Bu. alkohol, während das gewöhnliche Fuselöl ca. 24% i-Butylalkohol, 68% A. alkohol u. 7% Propylalkohol neben kleinen Mengen von Estern, Furfurol usw. enthält. Die Fuselöle lassen sich leicht in die entsprechenden Äthylester überführen, wenn man sie zugleich mit A. in Dampfform über einen erwärmten Katalysator leitet. Man erhält so Estergemische mit erhöhtem Kp., welche als Denaturierungsm. A.-Bzn.-Mischungen dienen können. Leitet man die Dämpfe der Fuselöle über erhitzte Katalysatoren aus $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Cr}_2\text{O}_3$, so entstehen Olefin-KW-stoffe von erhöhtem Kp. (Atti reale Accad. Scie. die Torino 61. 199—208. Turin.) GRIMME

P. Kolbach, *Über die Puffer in Würze und Bier*. Vf. erörtert zunächst allgemein theoret. das Wesen des „Pufferns“ u. weiterhin die Stoffe, die in Würze u. in Bier zu puffern vermögen. Solche Puffersysteme sind in der Würze das System Primäres Phosphat- sekundäres Phosphat u. CO_2 -Dicarbonat, ferner in Würze u. Bier die organ. Säuren u. Salze; in der gehopften Würze sind wahrscheinlich Milchsäure, Oxalsäure, Apfelsäure u. Bittersäure (Humulon) enthalten, im Bier kommen hinzu Essigsäure u. Bernsteinsäure. Zur Erklärung der puffernden Wrkg. der Würze im pH-Bereiche 6 bis 4 genügen die bisher genannten Puffersysteme der Menge nicht, es müssen noch amphotere Elektrolyte hinzutreten, wie Polypeptide u. Aminosäuren; auch Eiweißstoffe u. ihre höheren Abbauprodukte (Albumine, Albumosen) puffern gegen NaOH u. HCl, allerdings schwächer als gleiche Mengen jener beiden. (Wechsungen f. Brauerei 43. 123—29. 135—40.) RÜHL

H. Wüstenfeld, *Jahresbericht der Versuchsanstalt der Essigfabrikanten im Institut für Gärungsgewerbe, Berlin N 65, Seestr. 13*. (Dtsch. Essigind. 30. 77—79. 89—90.)

Ch. Lagneau, *Die flüchtige Säure der Weine*. Die Best. der flüchtigen Säuren nach DUCLAUX liefert relativ konstante Werte. Das freie SO_2 geht dabei vollständig in das Destillat, das gebundene teilweise; bestimmt werden beide am besten durch eine besondere Dest. Die Duclauxsche Berechnungsformel ist, entsprechend den Versuchswerten, wie folgt zu ändern: $(0,00245 \times n \times 50 \times 100): 85$. (Ann. Chim. 19. 152—59.) GROSZFEELD

A. Kickton und Fr. Mayer, *Verhalten von Gelatine gegen Farbstoffe in Wein*. Nachprüfung der Angabe von VAN ECK (Pharm. Weekblad 62. 365; C. 1925. II. 1) daß auf Filtrierpapier gegossene Gelatine, nach dem Erstarren durch rote Weine gezogen, künstliche Farbstoffe speichern soll, natürliche aber nicht. Gefunden wurde, daß die Probe im allgemeinen nicht einmal als verdachtergebende Vorprobe angesehen werden kann. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 132—37. Hamburg, Hygien. Staatsinstitut.) GROSZFEELD

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

A. Scheunert, *Über den Vitamingehalt der Nahrungsmittel*. Übersichtsreferat (Ztschr. f. med. Chem. 4. 10—12. 18—19.) OPPENHEIMER

Hanns Eckart, *Einiges über Pektine*. Übersicht über Entdeckung, Eigenschaften und Verwendung u. chem. Kenntnisse der Pektine. (Ztschr. f. med. Chem. 4. 19—21.) OPPENHEIMER

E. Parow, *Die Prüfung der Walzenapparate System Förster in den Kartoffelflockfabriken in Waren i. Mecklbg. und Wittstock*. Die gemeinsam mit Schirmer geprüften App.-Typen 5 u. 6 leisteten mehr bzw. weit mehr als garantiert war. (Ztschr. Spiritusindustrie 49. 41—43. Berlin N 65, Forschungsinstit. f. Stärkefabr. u. Kartoffelverarb. trocken.) HAHN

John A. Dawson, *Die chemische Zusammensetzung von Loganbeerensaft*. Bearbeitungen u. Analysenergebnisse. Die Beeren enthalten 9,9—12,6 g nichtflüchtige Stoffe, 5,6—7,9 g Zucker, 4,2—5,0 g Nichtzucker, 2,1—2,3 g Citronensäure u. 0,31—0,51 g Asche in 100 cem. Bei der Reifung nimmt der Gehalt an Säure ab, an Zucker zu. (Canadian Chemistry Metallurgy 10. 81—84.) GROSZFELD.

J. Pritzker und **Rob. Jungkunz**, *Beiträge zur Kenntnis des natürlichen und coffeinfreien Kaffees*. An Röstverss. lieferten sämtliche Kaffeesorten mit steigendem Röstgrade bezw. steigendem Röstverluste eine Zunahme des Extraktgehaltes; dieser betrug bei Rohkaffee 20,1—22,6, bei sehr leicht geröstetem mindestens 22,6, bei stark geröstetem bis zu 28,4% des Kaffees. Bei Kaffee „Hag“ ist der Extraktgehalt n., bei „Rival“-Kaffee bis zu 16,1% herabgehend, was auf unsachgemäße Entcoffeinierung hindeutet. An Verss. mit einer besonderen, den techn. Verhältnissen nachgebildeten Vorr. wird gezeigt, daß bei der Vorbehandlung des Kaffees vor der Extraktion mit Bzl. leicht Extraktstoffe ausgelaugt werden, wenn sie nicht mit trockenem erhitztem Wasserdampf nach den Patenten der Kaffee-Hag-Gesellschaft erfolgt. In gewöhnlicher Vordampfung ist die Aufschließung eine ungenügende u. die Entcoffeinierung unvollständig. So enthielt der Rival-Kaffee noch 0,19—0,23% Coffein. Untersuchungsergebnisse von sogenannten natürlichen „coffeinfreien“ u. „coffeinlosen“ Kaffeesorten, bei denen der Coffeingehalt zu 0,72—2,43% gefunden wurde. Coffearin kommt in jedem Kaffee vor u. ist ident. mit Trigonellin, nicht giftig. Als Mindestwassergehalt für gerösteten Kaffee wird 8%, als Mindestextraktgehalt auch für coffeinfreien Kaffee 20% vorgeschlagen. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 113—114. Basel.) GROSZFELD.

A. Gronover und **E. Wohnlich**, *Wird der Wasserzusatz bei sterilisierten Brühwürsten in Dosen durch die Salzlösung beeinflusst?* Nach angestellten Verss. nehmen NaCl-Lsg. sterilisierte Fleischwürste durch Diffusion W. auf, bis nach etwa 3 Wochen Gleichgewicht eingetreten ist. Im Höchstfalle war eine Vermehrung an Fremdwasser um 20% festzustellen. Die Aufnahme von W. läßt sich nicht verhindern; sie wird verkleinert durch Anwendung einer stärkeren NaCl-Lsg., was aber wegen des dadurch bedingten zu stark salzigen Geschmackes sich für die Praxis verbietet. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 137—45. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) GROSZFELD.

H. F. Zoller, *Von der Kondensmilchindustrie gestellte physikalische und chemische Anforderungen an Fette*. „Filled Milk“ oder „Milk compound“ ist eingedickte Magermilch mit einem Fettzusatz. Sie wird hergestellt durch Eindampfen im Vakuum nachherige Sterilisation. Nicht alle Fette eignen sich für diese Fabrikation in gleichem Maße. Am besten eignen sich Cocos- u. Palmkernfett, worauf schon die nahe Verwandtschaft ihrer Kennzahlen zu denen des Butterfettes hindeutet. Dagegen sind beispielsweise unbrauchbar Cotton- u. Sojaöl, da sie beim Eindampfen Ranzigkeit verursachen. Sie lassen sich jedoch anstandslos verwenden, wenn sie bis auf Jodzahl 30 u. F. nicht über 50° gehärtet wurden. Der „Härtungsduft“ verschwindet bei der Vakuumverdampfung. (Journ. Oil Fat. Ind. 3. 98—101. Detroit, Michigan, Harper F. Zoller.) HELLER.

M. Seelemann, *Vergleichende Untersuchungen über die Abtötung von Tuberkelbazillen in der Milch mit Hilfe neuzeitlicher Dauer- und Hoherhitzungsanlagen*. An Verss. mit größerem Material mit z. T. stark tuberkulöser Milch im prakt. Betriebe ergab sich, daß die Tuberkelbazillen bei 63° in 30 Min., nicht aber in 20 Min., sicher getötet wurden. Wichtig ist die scharfe Überwachung der Dauererhitzer auf ständiges Arbeiten (Selbstschreibethermometer). Eine geeignete chem. Rk. als Kontrollprobe ist nicht bekannt. Die Hochpasteurisierung in ihrer heutigen Form gewährleistet keine sichere Abtötung der pathogenen Keime. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchg. 36. 118—20. 129—35. 146—52.) GROSZFELD.

H. Jephcott und **A.-L. Bacharach**, *Die Wirkung des Trocknens auf die Vitamine der Milch*. Sie wird an Hand des Schrifttums u. eigener Verss. erörtert. Da fehlt es der *Trockenmilch* nicht notwendig an den wesentlichen Nebenbestandteilen. Ist die ursprüngliche Milch einwandfrei u. von gesunden gut ernährten Kühen sauer vermolken u. ist die Herst. der Trockenmilch daraus u. ihre weitere Handhabung einwandfrei u. nach wissenschaftlichen Grundsätzen erfolgt, so ist diese für die Ernährung des Kindes als Quelle der *Vitamine* gegenüber der Frischmilch keineswegs sehr viel weniger wert, in gewisser Beziehung ist sie der Frischmilch sogar überlegen. Wenn ein solches Milchpulver den Hauptteil einer Nahrung für Säuglinge oder kleine Kinder ausmacht, so ist die Zugabe eines die Vitamine ergänzenden Stoffes nur eine Vorsichtsmaßnahme. In Anbetracht des niedrigen Gehaltes selbst der besten Frischmilchen an Antiskorbutvitamin, Vitamin C, ist die Beigabe einer kleinen Menge Fruchtsaft (am besten von Orangen) täglich zu jeder Nahrung angezeigt, dies gilt sowohl für Frischmilch als auch für Trockenmilch. Keine zusätzliche Gabe an Vitamin A oder B ist nötig, wenn es sich um eine Trockenmilch handelt, die nach dem Trommsdorff-Verf. unter von den Vff. angegebenen Bedingungen gewonnen wurde. Nach demselben Verf. gewonnene Trockenmilch vermag einer Nahrung auch genügend Antiskorbutvitamin C zu verschaffen, nicht aber eine Trockenmilch, die nach dem Verfahren der Zerstäubung hergestellt worden ist. Ihre Verss. haben Vff. mit einem Milchpulver, das nach dem Verf. „Glaxo“ in Neuseeland hergestellt worden ist, u. bei dem man die oxydierende Wrkg. der Luft (Vernichtung des Antiskorbutvitamins C) durch jede bakterielle Infektion vermeidet. Zu etwa gleichen Schlüssen wie die Vff. sind neuerdings auch LESNÉ u. VAGLIANO (S. 1897) gelangt. (Le Lait 6. 249—59.) RÜHLER

—, *Die ausgedehnte Verwendung von Milch als Nahrungsmittel infolge weiterer technischer Verarbeitung*. Es wird an Hand von Abbildungen das Verf. von GRAY-JENSEN für die Verarbeitung von Magermilch zu *Trockenmilch* besprochen. Das Verf. beruht im wesentlichen auf feiner Zerstäubung pasteurisierter w. Magermilch u. gleichmäßiger Entzunge des W. ohne vorherige Konz. durch erhitzte Luft im Gegenzuge bei sehr hohem Drucke. (Chem. Metallurg. Engineering 33. 157—59.) RÜHLER

W. Grimmer und **M. Krüger**, *Beiträge zur Kenntnis der Labwirkung*. I. Produkt von Labmenge u. Gerinnungszeit, das nach dem Gesetz von STORCH u. SEGELCKE unter sonst gleichen Bedingungen konstant sein soll, steigt mit zunehmender Labkonz. an. Produktzahlen sind eine Exponentialfunktion der Labmengen u. folgen einer logarithm. Kurve, die sich asymptot. dem Maximalwert nähert, dieser ist vom Säuregrad abhängig. Je höher dieser, um so niedriger der Maximalwert für die Produktzahlen. Die Gerinnungszeit nimmt bei sonst gleichen Verhältnissen mit zunehmender Säuerung ab. (Logarithm. Kurve.) Die bisherige Art der Labstärkebest. muß ganz unbrauchbare Resultate ergeben. (Milchwirtsch. Forsch. 2. 457—81. 1925; Ber. ges. Physiol. 34. 256—57. Königsberg, Milchwirtsch. Inst. Ref. PESCHEK.) OPPENHEIM

Stéphane Karpinsky, *Butterfaß zur fortlaufenden Butterbereitung (Butterfaß „Butyro“) und Waschknetter für Butter*. Beschreibung u. Abbildung einer Vorrichtung, bei der der Rahm mittels Pumpe in kleinen Mengen durch eine kurzdauernde unbrochene Pressung durch enge Öffnungen getrieben wird u. dabei ausbuttert. Normaler Rahm mit > 30% Fett wird hierbei direkt verbuttert; fettärmerer muß mehr dergleichen Öffnungen passieren. Leistung 150—1000 l in 1 Stde. — Der Knetter besteht aus einem cylind. Gefäß mit drehbarer, gefensterter u. gebogener Schaufel. (Bull. scient. encour. industrie nationale 1926. 95—100.) GROSZFELD

E. Haglund, **Chr. Barthel** und **E. Waller**, *Der Einfluß des Buttergefäßes auf die Beschaffenheit und Haltbarkeit der Butter*. Durch Einleiten von Dampf in das Butterfaß wurde dasselbe völlig sterilisiert u. eine von Hefen u. Schimmelpilzen völlig freie Butter erhalten; nach 3—4-tägigem Stehen des Gefäßes wurde es aber wieder stark keimhaltig. Die Unters. von 14 Butterproben, in einem desinfizierten u. nicht

andelten Gefäße bereitet u. nach 10 u. 20 Tagen geprüft, ergaben nur geringe erschiede. Es genügt also die gewöhnliche Reinigung des Butterfasses; darüber ausgehende Reinigungsmaßnahmen liefern keine bessere Butterbeschaffenheit. deland No. 297 fran Centralanstalten för försöksväsendet pa jordbruksomradet. eriförsök No. 29. Bakteriologiska avdelningen No. 39. 21 Seiten. Sep.) GD.

S. Orla-Jensen, A.-D. Orla-Jensen und Bernhard Spur, *Die Geruchsbakterien Butter*. Vff. besprechen die Gewinnung dieser Bakterien, wobei stets eine vorhergehende Anreicherung nötig war, ihre Züchtung in reinen Hefeauszügen u. in Gehen solcher mit Milch, u. ihre Lebensäußerungen. (Le Lait 6. 161—69.) RÜHLE.
G. Guittouneau, unter Mitarbeit von **J. Keilling** und **A. Barret**, *Das Lab Handels in der Herstellung von Molkenkäse (fromage à pâte cuite)*. Die Verwendung Labs des Handels (Kunstlab) hat in der gesamten Käseerei weiteste Verbreitung und mit Ausnahme der Käseerei aus Molken. Vff. erörtert zunächst die biolog. ret. Grundlagen der Molkenkäseerei, auch unter Verwendung von Lab, ferner die t. Ausgestaltung der Molkenkäseerei u. die Verss. zur Ausarbeitung eines Verf. r Verwendung von Lab u. dieses Verf. selbst. Es beruht auf der vereinigten g. von Lab u. von Milchsäurehefen u. führt in den meisten Fällen zu ausgezeichneten Käse. Wo das Verf. anscheinend versagt hat, sollte man nach dem Grunde r forschen u. nicht dem ganzen Verf. von vornherein die Schuld zuschreiben. Lait 6. 170—80. 259—68. Poligny.) RÜHLE.

W. Wedemann, *Verhalten von Tuberkelbacillen in Molken bei der Käseherstellung tuberkelbazillenhaltiger Milch*. Bei 3 von 4 Verss. waren Molken, die bei der Hartherst. anfallen, durch den Käseeriprozess von für Meerschweinchen infektiösen Tuberkelbazillen nicht befreit worden; die verbreitete gegenteilige Annahme Molkereiinteressenten ist daher unrichtig. Die Frage der Infektionsfähigkeit Molken hängt auf das engste mit der Menge der im Ausgangsmaterial enthaltenen rkelbazillen zusammen. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 36. 212—17. Reichs- dheitsamt.) GROSZFELD.

H. Kalning, *Zur Bestimmung des Ausmahlungsgrades des Mehles im Brot*. Da beim hnlichen Veraschen, auch mit Mg-Acetat, erhebliche Mengen NaCl verloren i können, andererseits aber die Mehlasche konstant 48—49% P₂O₅ enthält, iehlt sich die Best. der P₂O₅ nach LORENZ in 5 g des mit HNO₃ + H₂SO₄ naß chten Brotpulvers. Bei Zusatz von Phosphaten bei der Brotbereitung (Back- r!) ist das Verf. nicht anwendbar. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 145 47. Berlin, Preuß. Versuchs- u. Forschungsanstalt f. Getreideverarbeitung u. rveredelung.) GROSZFELD.

R. Biazzo, *Schnellmethode zur Bestimmung von Kupfer in gegrüntem Gemüse- rven*. (Vgl. S. 2945.) 5 g der M. werden in einer Pt-Schale mit einem Filter kt, zunächst über kleiner Flamme getrocknet, dann verascht u. in der Muffel ht. Die Asche wird in wenigen cem HCl (1:1) aufgenommen, die Lsg. zur Trockne mpft, der Rückstand in W. gel. u. in einen Schütteltrichter gespült. Gesamt- 20 cem. Gegen Phenolphthalein alkalisieren, mit Essigsäure schwach ansäuern, inigen Tropfen Pyridin u. genügend konz. KCNS-Lsg. versetzen u. mit 5 cem ausschütteln. Bei Ggw. von Cu entsteht eine Verb. der Zus. Cu(Py)₂(CNS)₂, e sich je nach Cu-Konz. mit mehr oder minder tiefer Grünfärbung in Chlf. löst. imetr. Vergleich mit Cu-Lsgg. bekannten Gehaltes. Hierzu nimmt man am a eine Lsg. von 0,1964 g CuSO₄·5 H₂O in 1 l, welche im cem 0,00005 g Cu ent- a. wie oben behandelt wurde. (Annali Chim. Appl. 16. 96—98. Neapel.) GRI.

F. F. Ahmann und H. D. Hooker, *Die Bestimmung von Pektin. Titrations- de*. Die Lsg. von 0,25—1 g Pektin in 200 cem W. wird aus einer Bürette mit I bekannter Konz. versetzt, bis daß die Mischung ca. 0,1-n. ist. Auffüllen auf am u. 12 Std. bei 55° stehen lassen unter geeignetem Verschuß. Aliquoten

Teil abpipettieren u. mit HCl titrieren. Die NaOH muß viermal so stark sein die HCl. Berechnung: $\text{NaOH} : \text{Pektin} = \text{Menge des gebundenen Alkali} :$
 $\frac{40}{203,9}$

Die gefundenen Werte zeigen gute Übereinstimmung mit den gewichtsanalyt. stimmten. (Ind. and Engin. Chem. **18**. 412—14. Columbia [Mo.].) GRIMME

L. Colombier, *Untersuchung über die Bestimmung des Allylsenföles im Senfm*. In den meisten Senfmehlen wurden Senfölgelhalte über 0,70%, selbst über 1% gefunden, in rumän. aber bis herab zu 0,40%. Die amtliche französ. Methode (AgNO₃) liefert ebenso wie die von JÖRGENSEN genaue Werte. Letztere ist als als einfacher, vorzuziehen u. bietet noch den Vorteil, daß man das Thiosinamin Substanz erhält u. aus dem N-Gehalt desselben (18—24%) auf die vorliegende Brass art schließen kann. Die Schwierigkeit, daß sich bei der Kjeldahlbest. eine unl. zu Stoßen Veranlassung gebende Hg-Verb. abscheidet, läßt sich dadurch vermeiden, daß man das Hg erst nach $\frac{1}{2}$ Stde. zusetzt. (Ann. des Falsifications **19**. 160—Saint-Etienne, Lab. Municipal.) GROSZFELE

A. F. Lerrigo, *Schneller Nachweis kleiner Mengen Weinsäure in Backpul*. 4 g Pulver werden mit 20 ccm k. W. geschüttelt u. nach 2 Minuten Ruhe filtriert. Zu etwa 10 ccm des Filtrats gibt man einige Tropfen verd. NH₃ u. etwa 0,05 g pulvertes AgNO₃, erwärmt auf etwa 70° u. schüttelt noch 2 Minuten. Ist keine Weinsäure vorhanden, so erhält man eine gelbe trübe Fl., bei Ggw. von Weinsäure erhält man je nach der davon vorhandenen Menge infolge Red. des AgNO₃ eine graue schwarze Fl. Das Verf. läßt noch Mengen von weniger als 0,1% erkennen. (Anal. **51**. 180—81. Birmingham.) RÜHL

Hans Popp, *Über Eierölbestimmung*. (Allg. Öl- u. Fett-Ztg. **23**. 171—72. bis 184. — C. 1926. I. 526.) HELLE

J. Birger Platon, *Die Verwendbarkeit der Methode von Thomé zu Fettbestimmung in Milch*. Die Abänderung des RÖSE-GOTTLIEBSchen Verf. von THOMÉ, bei der nur mit A. u. Ä. statt mit A. u. Ä. + PAe. gearbeitet wird, lieferte bei Magermilch um 0,006—0,011, bei Vollmilch um 0,008—0,101, bei Buttermilch um 0,011—0,012 höhere Fettgehalte. Eine Konservierung der Milch mit K₂Cr₂O₇ änderte für 2 Monate das Ergebnis nicht, nach 3 Monaten wurden nach THOMÉ um 0,04%, nach RÖSE-GOTTLIEB um 0,15% niedrigere Ergebnisse erhalten. Die Zusatzmenge von A. u. Ä. auf letzteres Verf. von geringerem Einfluß als auf ersteres. (Ztschr. f. Unters. Lebensmittel **51**. 120—25. Alnarp, Schweden, Molkereilab.) GROSZFELE

Chavastelon und Elouard, *Die Bestimmung des Fettgehaltes der Milch nach der Adamschen Methode*. Die Ablesung der Schichten wird durch Rotfärbung der milchhaltigen Schicht mit Sudan III bedeutend verbessert. Ohne solche Färbung wurden Abweichungen von 0,30—1,10 g/l nach unten hin beobachtet. (Ann. des Falsifications **19**. 159—60.) GROSZFELE

Ahmed Rustom, *Über die Genauigkeit der prozentischen Ermittlung eines Wasserzusatzes zur Milch und der dabei in Erscheinung tretenden Fettquellen*. Erörterung der Verhältnisse. Der Wasserzusatz zu 100 Teilen reiner Milch läßt sich genau aus dem Fettgehalt f nach der Formel des Vf. $x = (f - f_1) \cdot 100$ berechnen, wobei f den Fettgehalt der ursprünglichen, f_1 den der verdächtigen Milch bedeutet; f muß auf 3 Dezimalen genau bestimmt sein. Für fettarme Milch hat die Formel keine Gültigkeit, denn bei der Best. des geringen Fettgehaltes können leicht sehr ins Gewicht fallende Fehler vorkommen. Bei Zentrifugenmagermilch empfiehlt sich die Best. aus der D. (s) nach der Formel $x = (s - s_1) \cdot 100 / (s_1 - 1)$. (Mitt. wirtsch. Zentr. **55**. 36—39. Halle a. S.) RÜHL

S. Schwarz, *Zur Frage des Caseingehaltes der dänischen Milch*. Die Fleischmengen Formeln sind unter Ausschaltung des Rest-N berechnet, die Werte von H. BERG (S. 525) aus dem Gesamt-N, woraus sich dessen Abweichungen in der

n. u. deutscher Milch erklären. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. **36**. 116—18. Hagensberg, Milchwirtschaftl. Inst. d. Univ.) GROSZFELD.

F. Reiß, Zur Bestimmung des Caseingehaltes der Milch. Die Feststellung von REYBERG (vgl. S. 525) scheint sich durch fehlerhafte Best. des Caseins zu erklären. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. **36**. 118. Kalkberge, Mark.) GROSZFELD.

H. M. Høyberg, Vom Caseingehalt der dänischen Milch. Bemerkungen zu den Ausurungen von REISS u. SCHWARZ (vgl. vorst. Reff.). (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. **36**. 217—18. Kopenhagen-Frederiksberg.) GROSZFELD.

J. T. Keister, Die Ruppssche Methode zum Nachweis von Chlor in Milch. Die die Jodstärkerk. aufgebaute Methode von RUPP zum Nachweis von Cl in der Milch nach Desinfektionsmaßnahmen, wie sie in der Milchwirtschaft gebräuchlich ist, ist mit Vorsicht zu bewerten, da Cu, das normalerweise in kleinsten Mengen in der Milch vorfindet, die gleiche Rk. gibt. (American Journ. of public health **15**. —84. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 141—42. Washington, Bureau of chem. U. S. Dep. of agricult. Ref. SPITTA.) OPPENHEIMER.

Ch. Brioux, Der getrocknete Preßrückstand der Äpfel; sein Nachweis in Futterteln und Melassefutter. Die Rückstände enthalten nach Analyse von 3 Proben: 11,00—12,50, (N $\times$ 6,25) 4,45—5,67, Fett 3,75—4,65, N-freie Extraktstoffe 54,77—60,23, Rohfaser 15,35—20,55, Asche 2,11—3,50% u. bilden daher ein beliebtes Nahrungsmittel, besonders als Grundlage für Melasse. Beschreibung u. Abbildung der Zellelemente. (Ann. des falsifications **19**. 142—44. Station agronomique de la Seine-Inferieure.) GROSZFELD.

Maison Breton, Jean Fichot & Cie., Successeurs und Société de Recherches de Perfectionnements Industriels, Frankreich, Gefärbte Stoffe zum Färben von Nahrungsmitteln, bestehend aus einer inerten mineral. Substanz (Al_2O_3 , CaSO_4 , CaCO_3), der Farbstoffe fixiert sind. (F. P. 596 800 vom 28/7. 1924, ausg. 31/10. 1925.) KAU.

Richard Schilde, Hersfeld, H.-N., Stufenweise Trocknung von Getreide u. dgl. Rieselschachteltrocknern mit luftdurchlässigen Wänden, dad. gek., daß in jeder Trockene mittels eingebauten Gebläses ein in bezug auf Feuchtigkeitsgehalt, Temp. u. Luftstärke beliebig regelbarer Kreisluftstrom entsprechend der fortschreitenden Trocknung erzeugt wird. (D. R. P. 426 729 Kl. 82a vom 2/12. 1923, ausg. 16/3. 1926.) OELKER.

Homer W. Smith, Indianapolis, Indiana, Entnicotinisieren von Tabak. Man andelt den Tabak unter Druck mit Dampf bei Temp. über 100°, unterwirft ihn auf der Einw. von NH_3 -Dämpfen u. extrahiert ihn schließlich mit organ. Lösungsmitteln. (A. P. 1 577 768 vom 7/6. 1922, ausg. 23/3. 1926.) OELKER.

August Falk, Wien, Vorrichtung zum Entnicotinisieren gebrauchsfertiger Tabakprodukte, welche aus einem dicht abschließenden, zur Aufnahme eines Behälters für zu behandelnde Gut bestimmten Gefäß besteht, das mit einer Heiz- u. Kondensationseinrichtung versehen ist u. zwar in der Weise, daß die Heizeinrichtung unterhalb des Behälters u. von diesem durch Siebböden getrennt ist, während die Kondensationseinrichtung sich seitlich vom Behälter befindet. (Oe. P. 102 643 vom 1/12. 1924, ausg. 25/2. 1926.) OELKER.

Edward James Clark und Arthur Lane, London, Konservieren von Fleisch. Das Arterien- u. Venensystem des geschlachteten Viehes wird eine für den menschlichen Organismus unschädliche Konservierungsflüssigkeit, z. B. Essigsäure oder Salzsäure in verd. Lsg. mit oder ohne Zusatz von NaCl eingespritzt. (Aust. P. 12 12 vom 1/2. 1924, ausg. 4/2. 1926. Prior. 24/2. 1923.) OELKER.

Clarence S. Stevens, Sheboygan, und **Carl A. Baumann**, Jefferson (Wisconsin, V. St. A.), Herstellung eines Präparates aus entsahnter Milch und säurefreiem Wasser. Der auf eine Temp. unter der Gerinnungswärme ihres Eiweißes erwärmten,

entsahten Milch wird das Fett, z. B. säurefreies Kokosfett, zugesetzt. Durch die Mischung wird dann ein regelmäßiger Strom fein zerteilten Wasserdampfes bis Emulgierung in solcher Menge hindurchgeleitet, daß er die Mischung nach und nach bis auf, aber nicht höher als bis auf 96—100° erhitzt. Die Emulsion wird dann Vakuum eingedickt, homogenisiert u. abgekühlt. (Oe. P. 102 547 vom 27/10. 19 ausg. 10/2. 1926.) OELKER

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Everett H. Hinckley, *Ölen von Baumwolle vor dem Spinnen*. Ölen erwies sich vom Kardieren an als vorteilhaft, es entsteht weniger Staub durch abgebrochene Fäden auch das Verziehen u. Zwirnen geht besser. Übelstände beim Färben sind nicht aufzutreten. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 13—16.) SÜVERN

Bohumil Vlček, *Die Schraubenwindung und das Perlenscheitern bei Behandlung der Baumwolle mit Kupferoxydammoniaklösung*. In vielen Fällen wurde eine auffällige Übereinstimmung zwischen der Zahl der Windungen u. der Zahl der auftretenden Perlchen gefunden. Oft erscheinen aber auch Abweichungen, die durch größere oder geringere Steilheit der Windungen hervorgerufen werden können. Bei Fasern mit einer kleineren Anzahl von Windungen u. starker Cuticula bilden sich die Perlen leichter, durch, daß die Cuticula quer ringsherum aufspringt. Eine allgemeine Regel darüber läßt sich aber vorläufig nicht aufstellen. (Melliands Textilber. 7. 361—65.) SÜVERN

S., *Bleiche, Vorbedingungen und Studien an einem Großbleichholländer*. Es wird empfohlen, den Stoff vor Zuteilung in den Holländer durch eine Entwässerungsmaschine gehen zu lassen. Der Stoff ist möglichst rasch von ausgeblasener Lauge zu trennen, ausgewaschen muß mit h. W. werden. In einem Großbleichholländer konnte mit höchstens 8% Stoffkonz. gearbeitet werden, mit 7,5% ging die Arbeit anstandslos vor sich. Temp., Kraftbedarf-, Stoffgeschwindigkeitskurven, sowie Druckabfall und Dampfspeicher vom Augenblick des Fertigfüllens des Holländers bis zur Fertigbleiche sind dargestellt. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. 354—57.) SÜVERN

Theod. Reifegerste, *Tori-Kusa-Papier*. Die Herst. des Papieres, welches aus dem Mark einer Strauchart, Fatsia papyrifera geschnitten wird, ist beschrieben. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. 359—60. Tokyo.) SÜVERN

St., *Die Lederpappenfabrikation*. Einzelheiten über alle Stufen der Herst. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. 370—75.) SÜVERN

A. Gerhards, *Versuchsergebnisse von Sandfängern in der Zellstoffindustrie*. Angaben über die Leistungsfähigkeit verschiedener Sandfänger. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. 357—59. Bad Warmbrunn.) SÜVERN

Paul Weyrich, *Das Färben der Kunstseide in Apparaten*. Von dem Färbeapparat „Tingor W“ der Firma SCHLUMPF & Co., Winterthur, wird hervorgehoben, daß mit ihm die Kunstseide so gefärbt werden kann, daß die Spulfähigkeit nicht leidet. (Melliands Textilber. 7. 356—57.) SÜVERN

Rud. Bernhardt, *Beitrag zur Kenntnis der Viskositätsverhältnisse der Viskose*. (Vgl. S. 2415.) Bzgl. der Dickfl. in Abhängigkeit von der Konz. ergaben sich bei Gelatine- u. Viscoselsgg. übereinstimmende Verhältnisse. Die Alterungserscheinungen gehen insofern auseinander, als die verd. Viscoselsgg. eine frühzeitigere Gelatinierung oder Ausscheidung aufweisen als dickere Lsgg. Bei Gelatine hängen die Gelatinierungszeiten von der Konz. derart ab, daß eine dickere Lsg. eher gelatinisiert. Auch die Viscoselsgg. anfänglich einsetzende Viskositätsabnahme, die in einer gewissen Ionenhydratation Begründung finden soll, ist für diese spezif. Gegenüber mechan. Verbehandlung zeigte sich konz. Viscose ziemlich indifferent, während verd. ähnlich hydratisierte Kolloide reagieren. Bei Verdünnungen 600 u. 400 g Viscose auf 1000 c

haben sich insofern Sondererscheinungen, als infolge des Luftdurchleitens eine teilweise Entmischung zwischen dem Harz- u. Xanthogenatkolloid statthatte. Wärme wirkte auf Viscoselsgg. insofern anders, als der Alterungsprozeß mit seinen chem. Umwandlungen schon nach kurzer Dauer des Erhitzens vorherrscht. Die Ergebnisse der Viskositätsunterss. bei verschiedenen Tempp. von Gelatine- u. Viscoselsgg. zeigen eine positive Übereinstimmung. Verss. mit Zusätzen verschiedener Salze zu Viscosen ergeben ähnliche Verhältnisse wie bei Gelatine. Die bedeutende Abhängigkeit der Viskosität von der OH- oder NaOH-Konz. ist bei Viscose besonders bemerkenswert, wie sich besonders bei Verss. zeigte, bei denen Säure u. Lauge in Rk. mit Viscose traten. Allgemein tritt der Einfluß der Salzsgg. bzgl. Dehydratation stärker als bei Gelatine hervor, was aus der Depression, die durch Zusatz von Na_2SO_4 hervorgerufen zu schließen ist. Der verschiedene Einfluß, den verd. Na_2SO_4 - H_2SO_4 -Gegenübermischung in äquivalenter Menge verwendeten NaCl-HCl-Fällbad auf die Viskosität der Viscose aufweist, wird zur Erklärung der ungünstigen Wrkg. des NaCl-HCl-Fällbades auf die Herst. von Kunstseide herangezogen. (Melliands Textilber. 7. 52—55. 318—19. 1925.)

SÜVERN.

Bayer, *Viscosespinnbäder*. Krit. Besprechung der Patentreliteratur der letzten Jahre. (Melliands Textilber. 7. 326—29.)

SÜVERN.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, *Chloraminlichtfarben auf Viscosatin*. Färbeschriften u. Proben gefärbter Stoffe. (Melliands Textilber. 7. 332.)

SÜVERN.

A. Schneevoigt, *Das Bedrucken von Acetatseide*. Geeignete Farbstoffe werden angegeben, Druckvorschrift. (Melliands Textilber. 7. 354.)

SÜVERN.

E. Schülke, *Zur Fällbadfrage in der Viscose-Kunstseide-Industrie*. Eine Reihe von Verss. über die Patentreliteratur bekannt gewordener Verff. wird krit. besprochen. (Melliands Textilber. 7. 320—23.)

SÜVERN.

Earle H. Morse, *Herstellung von Viscose im Laboratorium*. 890 g Sulfittcellulose in ca. 10% W. werden in Stücke von ca. 15 cm im Quadrat geschnitten u. in einem Draht aus Eisendraht bei 20—24° in 8 l 20—21%ig. NaOH bis zur Gleichmäßigkeit eingetaucht. Nach dem Ablauen wird in der Presse abgepreßt. Das Preßgut enthält ca. 13,9% NaOH u. wird in Flocken zerzaust u. über Nacht bei 18—23° getrocknet. Schnell durcharbeiten mit 288 g CS_2 in 4 Portionen unter sehr vorsichtigem Zusatz. Trockentemp. 20°. Das gebildete tieforangefarbige Xanthogenat wird in ca. 8700 g 1% NaOH gel. unter beständigem Rühren, 48 Stdn. stehen lassen bei 18—23° u. durch Gaze filtrieren. Die Viskosität des Filtrats kann durch Zusatz von klarer NaOH (bis 15%) erhöht werden. (Ind. and Engin. Chem. 18. 398—400. 1925.)

GRIMME.

J. B. Haven, *Plan für ein Untersuchungslaboratorium einer Textilfabrik*. Angaben über Anlage u. Einrichtung. (Proc. Amer. Soc. Testing Materials 25. II. Techn. 1925. 416—24. 1925.)

SÜVERN.

Wilhelm Weltzien, *Die Quellung von Kunstseiden und ihre Bedeutung für deren Unterscheidung und Charakterisierung*. Quellungerscheinungen in W. u. NaOH-Lsg. untersucht. Für die mechan. Verarbeitung ist die Erkenntnis wichtig, daß die Eigenschaften in trockener u. Längung in feuchter Atmosphäre eng verknüpft sind. Es ergibt sich daher, Material verschiedener Herkunft in demselben Stück zu verwenden, weil dadurch Faltenwerfen (Baldern) begünstigt wird. Die eigentümliche Quellung der Fäden beim Quellen mit NaOH-Lsg. geeigneter Konz. erinnert an die Mercerisation. Nichts widerspricht der Annahme, daß auch die hier unter bedeutender Kraftwrkgg. eintretende Schrumpfung auf einer Auflösung innerer Spannungen beruht. Wird ein in NaOH-Lsg. gequollener Kunstseidefaden in Wasser getaucht, so färbt er sich nach dem Auswaschen substantiv heller als ein nicht gedehnter, was nur in W. gequollenen Fadens ruft dagegen keinen merkbaren Effekt.

hervor. Wurde ein trocken gedehnter Faden zusammen mit einem unbehandelt in NaOH-Lsg. unter Ausschluß der Verkürzung gequollen u. wurden dann beide gefärbt, so ergaben sich verschiedene Färbungen. Durch das Quellen ist die zunächst unsichtbare Verschiedenheit der Materialien erst entwickelt, der vorher gedehnte Faden war natürlich in NaOH-Lsg. einer stärkeren Spannung ausgesetzt als der vorher ungedehnte. Etwas ähnliches ist bei der Mercerisation denkbar u. nachweisbar. (Melliands Textber. 7. 338—43. Krefeld.)

SÜVERN.

The Amid Duron Co., New York, V. St. A., übert. von: **Paul Moritz Spies** Bremen, Deutschland, *Einfetten von Fasern*. (Can. P. 250 733 vom 24/8. 1923, aus 16/6. 1925. — C. 1924. I. 1602.)

FRANZ.

Gillet & Fils, Lyon, *Verbesserung vegetabilischer Fasern*. (Oe. P. 96 347 vom 2/12. 1919, ausg. 10/3. 1924. D. Prior. 13/12. 1918 und 12/6. 1919. — C. 1924. 2757.)

FRANZ.

Bernhard Kremler, Borgoprund, Rumänien, *Vorrichtung zum Leimen, Färben und Tränken von Papierbahnen in und außerhalb der Papiermaschine*, bei der das Papier mit oder ohne Filz- oder Siebtücher zwischen zwei mit Tränkungsvorr. versehene schräg übereinanderliegenden Tränkwalzen durchgeführt wird, dad. gek., daß die an den Tränkwalzen anliegenden Tränkrinnen mittels hohler Drehzapfen u. Heb- u. ausschaltbar, sowie mit einer Umlaufvorr. (Hebewerk) für die Tränkungsverbunden sind. Es wird bei großer Gleichmäßigkeit u. Sauberkeit der Leimung ein sparsamer Verbrauch an Tränkungsmedium erzielt. (D. R. P. 427 531 Kl. 5 vom 8/11. 1923, ausg. 9/4. 1926.)

OELKER.

Zellstofffabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof, **Adolf Schneider**, Kelheim a. d. Donau, und **Carl Hangleiter**, Fockendorf, Thür., *Vorrichtung zum Entgasen von Sulfatzellstoffkochern unter Wiedergewinnung der schwefligen Säure und der Abwärme* nach D. R. P. 350 471, 1. dad. gek., daß die Abgas- u. Laugeleitungen injektorartig zusammengeführt sind. — 2. dad. gek., daß zwischen Laugespeicher u. die Laugeleitung jeweils mindestens eine Pumpe so geschaltet ist, daß die Laugeleitungen an die Saugseite der Pumpen angeschlossen sind u. letztere zweckmäßig über Rückschlagglied in den Laugespeicher drücken. (D. R. P. 425 195 Kl. 55b vom 27/8. 1924, aus 12/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 350 471; C. 1922. IV. 771.)

OELKER.

Kimberley Clark Co., Neenah, übert. von: **Ernst Mahler**, Neenah, und **Henry A. Rothchild**, Appleton, Wisconsin, *Herstellung von Papierstoff*. Ein Al-Silicat wird mit H₂SO₄ in Ggw. von W. behandelt u. das entstandene Gemisch der Papiermasse zugesetzt. (Can. P. 253 959 vom 9/11. 1923, ausg. 22/9. 1925.)

KAUSCH.

Henry Dreyfus, London, übert. von: **George Holland Ellis**, Spondon b. Derby, England, *Färben von Celluloseacetatseide*. (Can. P. 248 935 vom 26/9. 1923, aus 21/4. 1925. — C. 1924. II. 2703.)

FRANZ.

Henry Dreyfus, London, übert. von: **George Holland Ellis**, Spondon b. Derby, England, *Färben von Celluloseacetatseide*. (Can. P. 248 936 vom 26/9. 1923, aus 21/4. 1925. — C. 1925. I. 1653.)

FRANZ.

Henry Dreyfus, London, *Kunstfäden*. Bei der Herst. von Kunstfäden aus Celluloseacetat oder dgl., Celluloseäthern u. Derivv. dieser, wird der erhaltene Faden mit einem klebenden Stoff (Bindemittel) behandelt. (Can. P. 253 168 vom 23/2. 1924, ausg. 1/9. 1925.)

KAUSCH.

Société La Cellophane, Paris, übert. von: **Jaques Edwin Brandenberg**, Neuilly-sur-Seine, Frankreich, *Filme*. (Can. P. 244 623 vom 18/11. 1924, ausg. 18/1. 1924. — C. 1923. IV. 370.)

FRANZ.

Chemisches Zentralblatt.

926 Band I.

Nr. 25.

23. Juni.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Th. Steche, *Nachtrag zu dem Aufsatz: Über die Fachausdrücke in der Wernerschen Theorie der anorganischen Komplexsalze.* (Vgl. S. 1753.) Gegen das Wort -zählig von N (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **144**. 117; C. **1925**. II. 2601) an Stelle von -ortig. den Begriff „koordinativ x-wertig“ hat Vf. nichts einzuwenden. — Die Ansicht **RICHTER** (S. 2096) über die Bezeichnung N-Methylchininiumbromid ist zutreffend. **hr. f. angew. Ch.** **39**. 503. Göttingen) **BUSCH.**

William D. Harkins und **S. B. Stone**, *Isotopenzusammensetzung und Atomgewicht von Chlor aus Meteoriten und aus Mineralien nichtmarinen Ursprungs. (Abhandlung über Atomstabilität.)* (Vg. S. 2447.) Vff. führen At.-Gew.-Bestst. von Chlor in einem Meteoriten u. aus den Mineralien Apatit, Wernerit u. Sodalit aus. Die Methode, in Original eingehend beschrieben ist, bestand in der Best. der aus einer bekannten Menge Ag gebildeten AgCl-Menge u. war sehr genau. Das At.-Gew. des Cl aus dem Meteoriten ergab sich als dasselbe wie das des ird. Cl. Als Mittelwert wurde für das At.-Gew. des Cl aus den Mineralien der Wert $35,457_{55} \pm 0,000_2$ erhalten, während der Mittelwert für meteor. Cl zu $35,458_0 \pm 0,000_5$ gefunden wurde. Das Mittel der besten Resultate mit ird. Cl ist $35,457_4$, welches ident. ist mit den genauesten Ergebnissen von **RICHTER**. Das At.-Gew. des ird. Cl nicht marinen Ursprungs ist dasselbe wie das des Meeres. Die Identität der At.-Geww. von meteor., marinem u. ird. aber nicht marinem Chlor ist ein weiterer Beweis zugunsten der Theorie von **HARKINS** und **STONE**. **Journ. Amer. Chem. Soc.** **39**. 856. **Philos. Magazine** [6] **42**. 332; C. **1918**. I. 59. III. 313), daß die relative Menge der Isotopen stark bedingt ist durch die relative Stabilität der Isotopen, d. i. ihre Stabilität hinsichtlich B. als auch Zerfall, u. durch die Menge der Atomarten, aus denen sie gebildet wird. (**Journ. Amer. Chem. Soc.** **38**—**49**. Chicago [Ill.], Univ.) **JOSEPHY.**

W. Herz, *Die Temperaturen gleicher Oberflächenspannungen.* (Vgl. S. 5.) Zusammenstellung der Tempp. von 46 Stoffen, bei welchen die Oberflächenspannungen einen gleichen Wert annehmen. Es zeigt sich, daß die Reihenfolge der Tempp. der Oberflächenspannung im allgemeinen der der krit. Tempp. folgt, daß aber einzelnen deutliche Individualitäten hervortreten. Die Quotienten der Tempp. der Oberflächenspannung liegen ziemlich nahe um einen Mittelwert u. ebenso die Quotienten aus diesen einzelnen Tempp. u. den kritischen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **52**. 160—62. Breslau, Univ.) **ULMANN.**

Albert Jaeger und **Heinz Winkelmann**, *Über die Reduktion des Kohlenoxyds unter gewöhnlichem Druck.* (Vgl. S. 3393.) An einem Ni-Bimsstein-Katalysator nach **TIER** (C. r. d. l'Acad. des sciences **134**. 154) wurden aus dem 26% CO, 67% H₂ bestehenden Ausgangsgase bei 220° 12% CH₄ u. 12% CO + CO₂, bei 245° 54% CH₄ u. 46% CO + CO₂, bei 250° 66% CH₄ u. 34% CO + CO₂ erhalten. Das Optimum der Bildung lag in engen Grenzen bei 250°. Ein gemischter Cu-Ni-Katalysator gab nur H₂. C₂H₄-B. aus CO u. H₂ am Pd-Kontakt konnte nicht festgestellt werden. Überleiten eines Gemisches von CO, HCl u. H₂ über einen auf 200—300° erhitzten Katalysator aus Cu₂Cl₂, Cu, Fe oder Ni wurde im Gegensatz zu **CHURCH** (F. P. 519649; **21**. IV. 653) kein CH₂O erhalten. Beim Leiten von mit HCOOH-Dämpfen befeuchtem H₂ über Metalle bei niedriger Temp., über indifferentes Material bei höherer Temp. **III**. 1.

Temp. u. durch ein leeres Glasrohr bei 700—750° entstand CH₂O in erheblichen Mengen. Da sich aus CO u. H₂O-Dampf bei 320° an Kieselsäurehydrat deutliche Mengen HCOOH bildeten, war die Möglichkeit der Reduktion von CO zu CH₂O über die HCOOH bei Ggw. von H₂O gegeben. Bei 450° im Quarzrohr konnten auch bis 1,5% CO zu CH₂O umgesetzt werden. Bei höherer Temp. u. größerer Strömungsgeschwindigkeit des Gases (100 ccm/Min.) war die Ausbeute geringer. Über Cu-, Ni- u. Bimssteinkontakten, oder wenn der H₂O-Dampf durch N₂ oder H₂ ersetzt wurde, entstand kein CH₂O. — Der CH₂O wurde durch Jodtitration bestimmt. — Der für die Messung des zugesetzten H₂O-Dampfes benutzte Strömungsmesser war mit Paraffin gefüllt u. befand sich auf ca. 120°. — Der aus H₂S durch Cu oder Ni frei gemachte oder der Dehydrierung von Tetralin freiwerdende H₂ reduzierte CO bis 400° nicht zu CH₄. Auch gelang es nicht, CH₂O durch Red. des im K₃FeCy₅CO gebundenen CO mit H₂ zu erhalten. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 55—62. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.) v. V.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

J. de Smedt, *Die Struktur des festen Ammoniak mit Hilfe der Röntgenanalyse*. Vf. bestätigt im wesentlichen die Befunde von MARK u. POHLAND (Ztschr. f. Kristalllogr. 61. 532; C. 1925. II. 1250), jedoch weist er auf einige Unstimmigkeiten hin; z. B. haben die genannten Forscher bei ihren Aufnahmen nicht die Cu-K β -Linie der Absorption, wie es der Vf. getan hat, fortgeschafft, so daß sie nicht das deutliche Zusammenfallen der 110 α - u. der 111 β -Linie beobachten konnten. Ferner werden einige Abweichungen in der D. diskutiert, die nach Ansicht des Vf.s nicht den bei der Messung vorhandenen Temp. zugeschrieben werden kann, da nach anderen Unterss. die D. sich nur ganz unwesentlich mit abnehmender Temp. verändert. Vf. hat auch die Linie 421 gefunden, welche auf den Aufnahmen von MARK u. POHLAND nicht vorhanden war. Die Eigenschaft des festen Ammoniak, die Ebene des polarisierten Lichtes zu drehen, wird von dem Vf. bestätigt. (Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 11. 655—60. 1925.) HAASE

Werner Kolhörster, *Zur Bestimmung der Absorptionskoeffizienten der Höhenstrahlung*. Vf. stellt in einer Tabelle die Befunde über die Absorptionskoeffizienten der Höhenstrahlung zusammen, darunter seine eigenen Ergebnisse, sowie die letzten von MILLIKAN (vgl. S. 2430) u. von MYSSOWSKY u. TUWIM (vgl. S. 2168). Die Befunde stimmen sämtlich gut überein. Die Ergebnisse der genannten Forscher werden kurz diskutiert u. einige Folgerungen daraus gezogen. (Ztschr. f. Physik 36. 147—160. 1925.) HAASE

J. S. Lattès und Georges Fournier, *Über die Absorption der β -Strahlen durch Materie*. (Vgl. S. 3119.) Vff. konnten die Gültigkeit der linearen Beziehung $\mu/\rho = a + bN$ auf eine weitere sehr durchdringende β -Strahlung ausdehnen, indem sie die Konstanten die Werte $a = 3,66$ u. $b = 0,0348$ besitzen. Für die bisher untersuchten 4 Gruppen von β -Strahlen der verschiedensten Durchdringungsfähigkeit ist das Verhältnis a/b konstant gleich 105. Vff. schreiben daher jetzt das lineare Gesetz für den Massenabsorptionskoeffizienten von β -Strahlen ganz allgemein in der Form $\mu/\rho = b \cdot (105 + N)$. (C. r. d. l'Acad. des sciences 181. 1135—36. 1925.) PHILIPPE

M. v. Laue und H. Mark, *Die Zerstreuung inhomogener Röntgenstrahlen an mikroskopisch kristallinen Körpern*. Durch Verss. an Aluminium- u. Diamantpulver wird gezeigt, daß die Intensitätsverteilung des an diesen Stoffen gestreuten, weißen Röntgenlichtes ohne besondere Annahmen über die Atomstruktur erklärt u. berechnet werden kann. Die Verss. wurden an einem Al-Stäbchen von 0,8 mm Durchmesser, das polykristallin war u. keine Anisotropieerscheinungen zeigte, mit Hilfe weißen Röntgenlichtes (Öffnungskegel etwa 2—3°) ausgeführt u. der erhaltene Film ausphotometriert. Die Übereinstimmung mit den theoret. berechneten Werten ist bei kleinen Winkeln am größten, die Abweichung bei den großen Winkeln wird von den Vff. auf folgende, bisher nicht

ig berücksichtigte Faktoren zurückgeführt. Als solche Faktoren sei die Berücksichtigung der Intensität zwischen den Interferenzmaximis, des Fluoreszenzvorganges, Comptonschen Streuprozesses u. der Absorption der Strahlung in dem beleuchteten Präparat anzusehen u. bei der Beurteilung der räumlichen Verteilung der Streuintensität zu beachten. Die Verss. an dem Diamantpulver brachten eine wesentlichere Übereinstimmung mit den theoret. berechneten Werten, zumal durch Weglassen der höheren Frequenzen eine Störung durch die Comptonstrahlung nur in geringerem Maße zu befürchten war als bei dem Al. Der Intensitätsabfall zwischen 0° ist hier weniger steil als bei dem Al, ebenso ist der Wiederanstieg bis 180° viel leichter zu erkennen. Im Falle des Diamantes ist die Übereinstimmung mit dem theoret. Errechneten unter Berücksichtigung der Fehlermöglichkeiten der Verss. gut. (Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin 1926. Physikal.-mathem. Kl. 72.)

HAASE.

S. J. M. Allen, *Die Röntgenstrahlenabsorption von Wellenlängen bis herab zu 0,08 Å.* Vff. setzte seine frühere Arbeit (Physical Review [2] 24. 1) fort, bis herab zu Wellenlängen von 0,08 Å. Als Strahlungsquelle diente auch hier die Coolidgeöhre u. einem Potential von 200000 Volt. An Stelle der üblichen Schlitzmethode wurde von SOLLER angegebene Mehrfachschlitzmethode angewendet, wodurch eine zehnmal größere Intensität u. eine bessere Festlegung des Nullpunktes erzielt wurde. Die Absorptionsmessungen wurden in der üblichen Weise ausgeführt, daß die absorbierenden Substanzen so angeordnet wurden, daß keine Streustrahlung in die Ionisationskammer gelangen konnte. In Tabellen sind die Massenabsorptionskoeffizienten für C, Paraffin, Al, Fe, Ni, Cu, Zn, Pd, Ag, Sn, Ba, W, Pt, Au, Pb, Bi, Th, U, zusammengestellt, aus welchen man ersehen kann, daß die früheren Angaben (die Sprünge in den Absorptionswerten von den L- zu den K-Serien nehmen ständig ab mit zunehmender Ordnungszahl), bestätigt u. erweitert worden sind. Das abweichende Verh. des Paraffins gegenüber der Kohle u. des Al wesentl. größer ist, wird durch den vielen Wasserstoff im Paraffinmol. erklärt. — Es wurden Verss. angestellt mit „End“-filtrierten Röntgenstrahlen von hoher Spannung. Die Collimatoren wurden entfernt, die Ionisationskammer in die Nullage gebracht u. die Strahlen durch eine 1 cm dicke Zinnplatte u. eine 2 cm dicke Al-Platte filtriert. Der Strahlengang kam ein Kohleblock oder andere Elemente, u. es ergab sich eine Abnahme der Ionisation an Stelle einer Zunahme. Daraus wird gefolgert, daß die Strahlen in Richtung der auffallenden Strahlen gestreut werden u. nur wenige durchdringen. Werden dagegen die Collimatoren so angeordnet, daß ihre Ebenen recht zueinander stehen, so findet man wieder das n. Verh. Die Ergebnisse dieser Verss. sind in einer Tabelle zusammengestellt, aus der das Gesagte hervorgeht. (Physical Review [2] 27. 266—76. Cincinnati, Univ.)

HAASE.

V. H. Mc Curdy und **A. Bramley**, *Änderungen im Brechungsindex von Helium, hervorgerufen durch Glimmentladung*. Da nach der Lorentzschen Theorie der Brechungsindex angeregter Atome in einem Gase den Brechungsindex desselben ändern soll, suchten Vff. diese Änderung mit Hilfe eines Interferometers zu messen u. daraus auch die Konz. der sich im angeregten Zustande befindlichen Atome zu ermitteln. Die Verss. wurden an He durchgeführt u. erwiesen die Brauchbarkeit der Methode, wenn auch die Genauigkeit noch nicht sehr hoch war. (Physical Review [2] 314—17. Princeton, N. J. Palmer, Phys. Lab.)

HAASE.

Erich Krause und **Willy Fromm**, *Die Atomrefraktion des Zinks in seinen Dialkylverbindungen und die Reindarstellung gemischter Zinkdialkyle*. Vff. verglichen die Refraktionen s. u. gemischter Zinkdialkyle u. finden, daß die Werte für die Atomrefraktion des Zinks mit der Größe der Alkylgruppen ansteigt, u. zwar von Diäthylzink bis zu 9,663 für H α im Di-*i*-amylzink. Gleichzeitig geben Vff. eine Methode zur Reindarst. gemischter Zinkdialkyle aus Alkylzinkjodid u. Alkyl-

magnesiumhaloiden. Die erhaltenen Verbb. sind unbeständig u. sehr empfindlich gegen erhöhte Temp., Luft usw. Im Laufe einiger Tage lagern sie sich zum Teil in die s. Zinkdialkyle um. — *Diäthylzink* $(C_2H_5)_2Zn$, aus Äthylzinkjodid u. Phenylmagnesiumbromid, $Kp_{9,5}$ 16°, D_4 1,245. — *Äthyl-n-propylzink*, $(C_2H_5)Zn(nC_3H_7)$, Kp_{10} 27°, D_4 1,1558, M_D 34,293. — *Dipropylzink*, $(nC_3H_7)_2Zn$, Kp_{10} 48°, M_D 39, D_4 1,1034. — *Äthyl-i-butylzink*, $(C_2H_5)Zn(C_4H_9)$, Kp_{11} 48°, D_4 1,0861, M 39,272. — *n-Propyl-i-butylzink*, $(C_3H_7)Zn(C_4H_9)$, Kp_9 52°, D_4 1,0465, M 44,053. — *Di-i-butylzink*, $(C_4H_9)_2Zn$, Kp_{10} 55°, D_4 1,0080, M 48,782. — *i-Butyl-i-amylzink*, $(C_4H_9)(C_5H_{11})Zn$, Kp_{11} 84°, D_4 1,0058, M 53,517. — *Di-i-amylzink*, $(C_5H_{11})_2Zn$, Kp_{10} 101°, D_4 0,9939, M 58,303. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 931—34. Berlin, Techn. Hochschule.)

RAECKE

Erich Krause, *Die Atomrefraktion und Atomdispersion des Quecksilbers im Quecksilberdimethyl und Quecksilberdiäthyl*. Vf. findet, daß die Atomrefraktion u. die Atomdispersion des Quecksilbers ähnlich der des Zn (vgl. vorst. Ref.) in den Quecksilberdialkylen mit der Größe der Alkylgruppen ansteigt, u. zwar von $AR_{H\alpha} = 12$ im Dimethylquecksilber bis $AR_{H\alpha} = 12,442$ im Diäthylquecksilber. Eine ähnliche Gesetzmäßigkeit gilt auch für die Dialkylverbb. des Cadmiums u. die Tetraalkylverbb. des Zinns u. Bleis. — *Dimethylquecksilber*, $(CH_3)_2Hg$, aus $HgBr_2$ u. CH_3MgI , Kp_{761} 92° (unkorr.), D_4 (Vak.) 3,0836, M_D 23,717. — *Diäthylquecksilber*, $(C_2H_5)_2Hg$, aus $HgBr_2$ u. C_2H_5MgBr , Kp_{16} 57°, D_4 (Vak.) 2,4660, M_D 33,262. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 935—36. Berlin, Techn. Hochschule.)

RAECKE

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

K. C. Sen, *Elektrische Erscheinungen an Grenzflächen*. Anführung einiger Daten über die Potentialdifferenz zwischen zwei Phasen bei verschiedenen kataphoretischen elektroosmot. Verss., welche die in einer früheren Mitt. (S. 1122) behandelte Erscheinung des *Ionenantagonismus* näher beleuchten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **152**. 221—224. Allahabad [Indien], Univ.)

ULMAN

A. Gutbier, *Thermische Kolloidsynthesen*. (Experimentelle Mitarbeit **Richard Köhler**.) Mit Hilfe einer aus Quarzglas gefertigten App., welche es gestattet, überhitzten S-Dampf in ein Dispersionsmittel einzuleiten, gelingt es Vf., aus besond. gereinigtem S in W. weiße, milchig trübe u. undurchsichtige Präparate von kolloidaler Konsistenz darzustellen. Die ausgesprochen hydrophoben Sole zeigen das Tyndallphänomen u. erweisen sich ihrem ganzen Verh. nach als polydispers. Die Haltbarkeit der Präparate schwankt zwischen 2—6 Wochen u. ist abhängig vom Gehalt an kolloid-disperser Phase; die S-reichsten Systeme enthielten 0,082% S. Unters. der D., Oberflächenspannung u. Zähigkeit ergaben Werte, die von denen des Dispersionsmittels nur geringfügig abwichen. Im Coehnschen App. tritt Wanderung nach der Anode während der Temp. wirkt nicht ohne weiteres zerstörend. Ionen koagulieren nur bei geringer Geschwindigkeit, außer OH' , welches chem. wirkt. Verss. mit Schutzkolloiden führten zu keinem Ergebnis. — In frischen S-Solen läßt sich H_2S in geringen Mengen nachweisen, ist aber nicht mehr festzustellen in der nach erfolgter Koagulation durch $\frac{1}{10}$ -n. $LaCl_3$ -Lsg. (vgl. E. HEINZE, Journ. f. prakt. Ch. [2] **99**. 109; C. **1919**. III. 109). Dieselbe wurde von Vf. nach der Vorschrift von F. FOERSTER u. Mitarbeitern näher untersucht. (Vgl. FOERSTER u. HORNIG, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **125**. 86; C. **1923**. I. 571; FOERSTER, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 246; **141**. 109; C. **1925**. I. 209; FOERSTER u. KUBEL, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 261; C. **1925**. II. 2640; NOACK, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **146**. 239; C. **1925**. II. 2134.) N. hat nachgewiesen, daß H_2SO_4 u. *Polythionsäuren*, von diesen sicher *Pentathionsäure*; N_2S_5 u. H_2SO_3 wird von Vf. vermutet. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **152**. 163—79. J. Allahabad [Indien], Univ.)

ULMAN

Heinrich Kraut, *Zur Chemie der Tonerdehydrogele*. Im Anschluß an die Arbeiten WILLSTÄTTER u. KRAUT (S. 1374 ff. u. früher) gibt Vf. einen Überblick über Chemie der Tonerde-Hydrogele, die Untersuchungsmethoden der *Hydroxydgele* erst. u. Eigenschaften chem. einheitlicher *Tonerdehydrogele*. — In nachstehender Tabelle wird eine vergleichende Übersicht der Tonerdesorten u. eine Zusammenstellung Versuchsergebnisse gegeben:

	Wasser- gehalt in %	Formel	Aussehen	Salzsäure		Natronlauge		vermögen	
				kalt	warm	kalt	warm	Größen- ordnung	Selektion ²⁾
<i>Orthohydroxyd</i>	53	Al(OH)_3	weiß, flockig etwas plastisch	0,1%	0,1%	0,4%	0,1%	sehr groß	wenig selektiv
		$4\text{Al(OH)}_3 - 3\text{H}_2\text{O} + \text{xH}_2\text{O}$	gelb- stichig plastisch, kompakt	10%	0,1%	0,4%	0,1%	etwas kleiner als α	sehr selektiv
	43–51		weiß, flockig etwas plastisch	37%	1%	— ³⁾	0,1%	wie α	noch weniger selektiv als α
γ	53	Al(OH)_3	weiß, flockig etwas plastisch	—	5%	—	4%	sehr klein	? ³⁾
Mineralisiert aus Aluminat	53	Al(OH)_3	weiß, pulvrig weiß, pulvrig	15%	?	—	30% ⁴⁾	sehr klein	?
<i>Polyhydroxyd</i>	39–43	$[4\text{Al(OH)}_3 - 3\text{H}_2\text{O}] + 2\text{H}_2\text{O}$ bis $8\text{Al(OH)}_3 - 7\text{H}_2\text{O} + 4\text{H}_2\text{O}$	gelb- stichig sehr plastisch	—	5–10%	—	0,1%	wie γ	?
		$4\text{Al(OH)}_3 - 3\text{H}_2\text{O}$ bis $8\text{Al(OH)}_3 - 7\text{H}_2\text{O}$	rötlich- gelb sehr plastisch	—	37%	—	30% ⁴⁾	etwas kleiner als B	?
<i>Metahydroxyd</i>	18	AlOOH	grau- stichig, mehr plastisch als flockig	—	—	—	?	klein	noch selektiver als β

Ber. auf Al_2O_3 . — ²⁾ Gegenüber dem Gemisch von Invertin u. Maltase. — bedeutet nicht merklich l., ? nicht geprüft. — ⁴⁾ Nächstniedere Konzz. nicht

K. Nishikawa, *Zur Kolloidchemie der Tone und Kaoline*. Unterss. über Viscosität verschiedener Tone zeigte, daß das Hagen-Poiseuillesche Gesetz in gemeinen annähernd gilt, u. zwar um so genauer, je größer die Fließgeschwindigkeit u. je verdünnter die Suspension angewandt wird. Unterschiede in den Viscositäten verschiedener Tone treten erst hervor, wenn man zu kleinen Drucken u. damit kleinen Geschwindigkeiten übergeht, wenn man in das Gebiet der „Strukturviscosität“ kommt. Hier liegt nicht nur ein gutes Kennzeichen des Abbindens, sondern es ergibt sich auch eine gute analyt. Unterscheidungsmethode für Tone verschiedener Herkunft. Vf. bestimmt empir. eine Kennzahl für die Strukturviscosität. — Ein Vergleich verschiedener Materialien ergab, daß die Gewichtsverluste beim Trocknen bzw. beim Brennen annähernd die gleichen sind, während die Volumenabnahme große Unterschiede aufwies. (Kolloid-Ztschr. **38**. 328—33. Keijo [Japan], Leipzig, Univ.) **ULMANN**

Tsuruji Kuroda, *Die Oberflächenwirkung der Silbersalze, als Kolloidphänomen mikroskopisch dargestellt*. Mkr. Demonstration der Ag-Wrkg. auf die Mundschleimhaut (Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. **41**. 96—110. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 270. R. BEHRENS.) **OPPENHEIMER**

S. Mokruschin und O. Essin, *Über die elektrische Adsorption*. (Vgl. S. 60.) Vf. versuchen die elektr. Adsorption vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeitstheorie zu erklären, wobei die adsorbierten Moll. als „Dipole“ angesehen werden u. das Adsorbendum als eine Fläche die eine Ladung trägt. Die von Vf. abgeleitete Gleichung $a = S/N \cdot (1 - 1/2\beta)$ (a = Zahl der adsorbierten Moll., N = Avogadrozahl, S = Zahl der „Elementarflächen“ S_0 , die die gegebene reale Fläche des Adsorbendum bilden, β = ein durch die Konz. der Lsg. bestimmter Wert der Molekelzahl) erwies sich in voller Übereinstimmung mit den Verss. von S. GHOSH u. N. R. DHAR. (Kolloid-Ztschr. **35**. 144; C. 1924. II. 2517.) (Kolloid-Ztschr. **38**. 307—10. Swerdlowsk, Univ. Polytechn. Inst.) **ULMANN**

Heinrich Herbst, *Über einige physikalische Eigenschaften von aktiven Kohlen und über die Wärmetönung beim Benetzen der aktiven Kohlen mit Flüssigkeiten*. (V. Biochem. Ztschr. **115**. 204; C. 1921. III. 390.) Nach Vf. beruht die Erscheinung Adsorption bei aktiver Kohle nicht auf einer Oberflächenwrkg., sondern sie hängt von der Anzahl der vorhandenen aktiven, frei zugänglich gelagerten u. nicht gesättigten C-Moll. Die Adsorption wird im allgemeinen von einer Wärmetönung begleitet, so auch bei Benetzung einer Kohle mit einer Fl. Die vom Vf. gemessene Benetzungswärme ist um so größer, je größer die Aktivität der Kohlensorte ist. Sie betr. bei Benetzung mit W. bei einer Kohle von 100% Aktivität 50 cal pro 1 g. Bzl. auf noch um einiges höhere Werte. (Kolloid-Ztschr. **38**. 314—21. Jena.) **ULMANN**

V. R. Main, *Die Viscosität wässriger Natriumsilicatlösungen*. Zur Best. der Viscosität von verschieden konz. Natriumsilicatlsgg. bediente sich der Vf. des Ostwaldschen u. des Ubbelohdeschen App. Der letztere lieferte stets höhere Werte. Eichung erfolgte mit reinem W. Die Viscosität-Konzentrationskurven weisen gleichen Eigenschaften wie die der lyophilen Sole auf, das Abbiegen der Kurve von dem Verhältnis $\text{Na}_2\text{O} : \text{SiO}_2$ abhängig, u. zwar stärker bei viel SiO_2 enthaltenen Lsgg. Aus Viscositätsmessungen ist ferner auch der Einfluß zu erkennen, den die Gabe von SiO_2 zu NaOH -Lsgg. bewirkt; anfänglich nimmt die Viscosität nur langsam zu, aber sobald das Verhältnis von $\text{Na}_2\text{O} : \text{SiO}_2 = 1 : 2$ überschritten ist, sehr rasch. Der Temp.-Einfluß wird durch eine lineare Beziehung dargestellt. Aus allem geschlossen, daß Natriumsilicatlsgg. unterhalb des Verhältnisses $1 : 2 = \text{Na}_2\text{O} : \text{SiO}_2$ nicht kolloidal sind, darüber dagegen werden kolloidale Aggregate gebildet, deren Größe u. Natur von der Konz. der Lsg. abhängig ist. (Journ. Physical Chem. **30**. 535—540. London, Univ. Coll.) **HAAS**

B. Anorganische Chemie.

M. L. Nichols und **I. A. Derbrigny**, *Die Reduktion von Stickoxydul*. Die Red. *Stickoxyduls* erfolgte durch das Hindurchperlen des Gases durch wss. Lsgg. der Reduktionsmm. Als solche dienten *Titanochlorid*, *Zinnchlorür* u. *Natriumsulfid*. Die Umtheilung des Stickoxyduls wurde durch langsame Verbrennung an einem erhitzten Draht im Gemisch mit H_2 vorgenommen. Die Abhängigkeit der Reduktionsmm. der Temp. u. der Acidität wurde untersucht u. gefunden, daß das Stickoxydul mit B. von Ammoniak, Hydroxylamin, u. Stickstoff zers. wird u. zwar in abnehmendem Maße mit steigender Temp. u. zunehmender Acidität. Die Reduktionsg. läuft parallel mit zunehmender Konz. des reduzierenden Agens. Platiniertes Pt reduziert in $TiCl_3$ -Lsgg. die Red. Einige Verss. wurden auch mit *schwefliger Säure* ausführt, doch wurde dieses Reduktionsmittel verlassen, weil dessen Konz. zu inkonstant — Der Verlauf der Rk. wird von dem Vf. als ein Hydratisierungsprozeß aufgef. nach folgendem Schema: $N_2O + H_2O = (NOH)_2$; $(NOH)_2$ wird dann sekundär zersetzt. (Journ. Physical Chem. **30**. 491—506. Cornell Univ., Baker Lab. of Chemistry.)

HAASE.

Wilhelm Moldenhauer, *Über die Vereinigung von Phosphor und Stickstoff unter Einfluß elektrischer Entladungen*. Unter Mitarbeit von **H. Dörsam**. Vf. beschreibt eine Methode u. einen App., um P u. N unter der Wrkg. der Entladungen eines Induktors miteinander zu vereinigen. Unter den Versuchsbedingungen reagiert P nicht mit N, sondern nur weißer. Die Trennung des Gemisches von weißem entstandenen roten Phosphor u. Phosphornitrid erfolgt durch Lösen des weißen P in S_2 u. Sublimieren des roten P bei 500—550° unter einem Druck von ca. 12 mm. entstandene *Phosphornitrid* PN ist ein leichtes, gelbbraunes Pulver, unl. in allen Lösungsm.; es ist nur durch Kochen mit konz. H_2SO_4 oder durch Schmelzen mit Natriumsuperoxyd aufzuschließen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 926—31. Darmstadt, Techn. Hochschule.)

RAECKE.

Hans Tropsch und **Walter Krönig**, *Beobachtungen über die Einwirkung von Kohlenoxyd auf Eisenoxyd*. Der bei 720° durch Fe_2O_3 aus CO abgeschiedene C ist nicht freier C u. nur zum kleinen Teil als Carbid gebunden: Durch Salzsäure lassen sich nur geringe Mengen KW-stoffe erhalten, der übrige C bleibt unverändert. Die Abscheidung des C steigt allmählich von 0—9% u. darüber hinaus. Ein Gebiet der früheren Abscheidung konnte im Gegensatz zu HILPERT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **1281**; C. **1915**. II. 387) nicht festgestellt werden. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle **7**. 48. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.)

V. WANGENHEIM.

G. Tammann und **G. Siebel**, *Die spektrometrische Messung der Dickenzunahme der Anlaufschichten*. (Vgl. S. 608.) Vermittelt einer näher beschriebenen Versuchsanordnung messen Vff. auf spektrometr. Wege die Dickenzunahme der Anlaufschicht von Ni in Luft u. Cu in O_2 , N_2 - O_2 -Gemischen u. Luft, bei verschiedenen Temp. Das experimentelle Anlaufgesetz bei Ni u. das abweichende Verh., welches man bei Cu beobachtet, wird versucht zu deuten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **152**. 149—59. Göttingen, Univ.)

ULMANN.

K. Jabłczyński und **W. Wiechowski**, *Über Stannophosphate*. Tertiäres *Stannophosphat*, $Sn_3(PO_4)_2$, gelang es Vff. nicht nach den Angaben von LENSEN (LIEBIGS **114**. 113) zu erhalten, wohl aber fällt es aus beim Eingießen einer 10%ig. Lsg. von Na_2HPO_4 in eine mit wenig H_2SO_4 angesäuerte Lsg. von $SnSO_4$. Weiße, amorphe Substanz, an der Luft beständig, in W. unl., ll. in verd. Mineralsäuren u. in Alkalien; $D_{17,4} = 3,823$. — *Sekundäres Stannophosphat*, $SnHPO_4$. Durch Lösen von Sn in überschüssiger H_3PO_4 (D. 1,23) in der Wärme, wobei langsam W. zugegeben wird, erhält man die Lsg. nicht zu dick wird. Beim Erkalten bilden sich große, stark lichtbrechende,

sechsstellige Tafeln. Eine zweite Modifikation wird erhalten, indem man nach Lös des Sn in H_3PO_4 (D. 1,7) in die konz. Lsg. schnell h. W. einrührt; feiner seidenglänzend Nd., u. Mk. Schiffchenform. Das SnHPO_4 ist an der Luft beständig, ll. in verd. Mineralsäuren, in Alkalilaugen erst bei Überschuß, in NH_3 unl., D.^{15,5}₄ 3,476. — *Primä. Stannophosphat*, $\text{Sn}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$. SnHPO_4 wird mit H_3PO_4 (D. 1,7) so lange bei 14 erwärmt, bis die Wasserdampfentw. fast aufhört. Beim Abkühlen im Exsiccator mit P_2O_5 bilden sich große, stark lichtbrechende Rhomben. In Berührung mit W. tritt momentan Hydrolyse ein, an der Luft werden die Krystalle sofort matt, indem Umwandlung in SnHPO_4 eintritt. D.^{22,8}₄ 3,167. — *Stannopyrophosphat*, $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{O}_7$, wird erhalten durch längeres Erhitzen (6 Stdn. in einer CO_2 -Atmosphäre) von SnHPO_4 bei 350—400°. Amorph, an Luft beständig, in W. unl., langsam l. in verd. Mineralsäure schnell in konz., Alkalilaugen lösen erst bei Überschuß. D.^{16,4}₄ 4,009. — *Stannomelphosphat*, $\text{Sn}(\text{PO}_3)_2$ wird aus $\text{Sn}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ erhalten durch Erhitzen (5 Stdn.) bis zu 390°. Glasige, amorphe, sehr hygroskop. Substanz, unl. in W. u. verd. Säuren, langsam konz. D.^{22,8}₄ 3,380. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **152**. 207—12. Warschau, Univ.) U


D. Organische Chemie.

A. Steopoe, *Beitrag zur Kenntnis der Oxydation organischer Substanzen mittels Kupferoxyd*. Im Gegensatz zum gewöhnlichen schweren Kupferoxyd, wie es durch Veraschen von Cu-Salzen oder Oxydation von Cu erhalten wird, ist das aus $\text{Cu}(\text{OH})_2$ in sd. W. entstehende CuO , welches Vf. „leichtes CuO “ nennt, ein viel energischeres Oxydationsmittel. Z. B. wird ersteres erst von 180° ab, letzteres schon von 130° ab von H reduziert. Wegen seiner feinen Verteilung u. geringen D. ist das leichte CuO besonders für die Oxydation organ. Substanzen geeignet, da es in der Schmelze nicht zu Boden sinkt u. infolgedessen eine große Oberfläche darbietet, so daß die Substanz schnell u. vollständig oxydiert wird. Es ist bedeutend wirksamer als z. B. MnO_2 , PbO oder PbO . Zu seiner Darst. wird eine sd. CuSO_4 -Lsg. nach u. nach mit NaOH gefällt, der Nd. gewaschen u. bei höchstens 120° getrocknet. Erhitzt man solches CuO mit einer organ. Substanz schnell auf hohe Temp., so tritt explosive Oxydation unter Reduktion des CuO zu Cu ein, während bei tieferen Temp. das CuO nur bis zu Cu_2O reduziert wird. Man ermittelt daher in einem Vorvers. für jede Substanz die Explosionstemperatur u. bleibt bei den Oxydationsverss. ca. 50° unter derselben. Man kann die zu heftige Oxydation auch durch Zusatz inerte Substanzen, z. B. BaSO_4 , vermeiden. Man fällt aus der CuSO_4 -Lsg. erst das SO_4^{2-} mit BaCl_2 aus u. schlägt auf dem BaSO_4 gleich darauf das CuO nieder, wodurch ein sehr fein verteiltes u. oxydativ wirksames, keine Explosionen verursachendes Reagens erhalten wird. Nach beendeter Oxydation muß die M. vollständig abkühlen, bevor sie der Luft ausgesetzt wird, da sich sonst das Cu_2O heftig, oft bis zur Entzündung der M. oxydiert. — Oxydation von *Paraffin*. Entflammung mit CuO bei 280°. Ohne geeigneten Zusatz ist die Wrkg. sehr schwach, da das CuO zusammenklebt. Als Zusätze wurden BaSO_4 , Na_2CO_3 u. NaOH benutzt. Günstigste Temp. 230—240°. Es treten 3 Rkk. ein: völlige Verbrennung, B. von Fettsäuren u. B. eines niederen Paraffins. BaSO_4 u. besonders Na_2CO_3 begünstigen die erste Rk., NaOH verhindert diese u. begünstigt die beiden anderen Rkk., so daß sich das niedere Paraffin wahrscheinlich durch Abspaltung von CO_2 aus den Fettsäuren bildet. — Oxydation von *α -Naphthylamin*. Entflammung mit CuO oberhalb 300°. Die Oxydation mit schwerem CuO besitzt folgende Nachteile: Da die Rk. erst bei ca. 300° einsetzt, bilden sich reichlich sekundäre Zers.-Prodd.; die Berührungsfläche zwischen Substanz u. Agens ist klein, so daß viel Substanz unangegriffen bleibt. Mit leichtem CuO beginnt die Rk. schon bei 125°; das Agens bleibt während der ganzen Rk. fein verteilt, so daß diese schon in ca. 5 Min. vollendet ist. Man nimmt am besten nicht mehr als die berechnete Menge CuO (Red. zu Cu_2O vorausgesetzt). Als Rk.-Prodd.


lt man außer CO_2 , NH_3 u. H_2O ein Gemisch von *Indulinen*, *as. Naphthazin* u. ren Kondensationsprodd. Das Mengenverhältnis dieser Prodd. hängt nicht von Dauer des Erhitzens, sondern allein von der Höhe der Temp. ab. Bei $140\text{--}145^\circ$ gehen hauptsächlich Induline, deren Menge bei höherer Temp. stark abnimmt, und die des Naphthazins (bis zu 10%) u. besonders der höheren Prodd. zunimmt. Gewinnung des Naphthazins arbeitet man am besten bei $220\text{--}225^\circ$ (5 Min.), phiert mit A. u. unterwirft den Extrakt der Sublimation. — Ein zum Vergleich PbO ausgeführter Vers. zeigt die Nachteile dieses Agens gegenüber CuO . — Im ret. Teil gibt Vf. an Hand neuerer Anschauungen eine Erklärung für die leichte B. *as. Naphthazin* sowohl aus α - wie aus β -Naphthylamin. — *as. Naphthazin*, $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{N}_2$, Krystalle aus Nitrobenzol, F. 281° . — *Nitroderiv.*, $\text{C}_{20}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_3$. Mit der berech- a Menge KNO_3 in konz. H_2SO_4 unter Kühlung. Nach Umkrystallisieren aus Nitro- ol u. Auskochen mit Eg. mikrokristallines Pulver, F. $304\text{--}308^\circ$. — *Dinitroderiv.*, $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{N}_4$. Darst. analog. Mkr. gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, F. $330\text{--}332^\circ$, also . mit der bekannten Verb. (Bulet. Societ. de Ştiinţe din Bucureşti 27. 11—40. Bukarest, Univ.)

LINDENBAUM.

Stefan Goldschmidt und Walter Schön, *Über den Mechanismus der Wurtz- schen Synthese*. Um zu dem II. entsprechenden *o,o'*-Dikresol zu gelangen, haben nach Mißerfolgen in anderer Richtung schließlich auf den *Jodkresoläthyläther* I. ur Einw. gebracht. Die Umsetzung verläuft kompliziert, u. zwar verschieden, chdem man in PAe. oder Ä. arbeitet. In PAe. werden außer ca. 35% *o-Kresol- äther* drei Verb. $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O}_2$ (Verkettung zweier Moll. I. unter Herausnahme des J) ne Verb. $\text{C}_{27}\text{H}_{32}\text{O}_3$ (Verkettung dreier Moll.) erhalten. Die Verb. $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O}_2$ ent- hen nach Eigenschaften u. OC_2H_5 -Bestst. wahrscheinlich den Formeln II., III. ., während sich für die Verb. $\text{C}_{27}\text{H}_{32}\text{O}_3$ vorläufig keine Formel aufstellen läßt. entstehen ca. 65% *o-Kresoläthyläther*, etwas II. u. ein Prod., in dem nach der yse 5 Kerne verkettet sein könnten, während die Mol.-Gew.-Best. dafür spricht, otz einheitlichem Kp. ein Gemisch einer Verb. $\text{C}_{27}\text{H}_{32}\text{O}_3$ u. einer J-haltigen Verb. V. gt. Es ist bemerkenswert, daß diese J-Verb. nicht in PAe. entsteht. — Nach ntress. von SCHLUBACH u. GOES (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2889; C. 1923. 9) bilden sich bei der WURTZ-FITIG-Synthese zweifellos in erster Phase Na-Alkyle -Aryle (A). Die weitere Umsetzung soll nach genannten Autoren über die freien kale (B), kann aber auch ohne letztere erfolgen (C). Die B. der unerwarteten rodd. — z. B. aus $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ oder I. — läßt sich mittels der von SCHORIGIN (Ber. . Chem. Ges. 41. 2723 [1908]) aufgefundenen Rk. erklären, nach der sich Na- e u. aromat. KW-stoffe zu Na-Arylen u. aliphat. KW-stoffen umsetzen. Ihre einste Fassung erhält diese Rk. in der Gleichung D. Sie wird bei beweglichem




öllig zurücktreten (Halogenalkyle), sich aber bei reaktionsträgem Hal mehr oder er stark bemerkbar machen ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$, I.). Im vorliegenden Falle entsteht zu- T. Dann treten folgende Rkk. ein: VI. + I. $\rightarrow$ II. — VI. + I. $\rightarrow$ *o-Kresol- äther* + VII. — VII. + I. $\rightarrow$ V. — VI. + *o-Kresoläthyläther* $\rightarrow$ VIII. u. — VIII. + I. $\rightarrow$ III. — IX. + I. $\rightarrow$ IV. — Die reichliche B. des *o-Kresol- äthers* in Ä. erklärt sich wie folgt (SCHORIGIN):




nnahme von Radikalen hat man mit dem Auftreten scheinbarer Disproportionie- prodd. im Sinne der Gleichung $\text{R} + \text{R}' = (\text{R} - \text{H}) + (\text{R}' + \text{H})$ begründet. ber oben gezeigt, läßt sich die B. des *o-Kresoläthyläthers* auch ohne Annahme Radikals gut erklären. Auch andere Erscheinungen, z. B. die wenig glatte Syn-

these des Diphenyls, die recht glatte des Propylbenzols, sprechen gegen die Radikalhypothese. Der Verlauf der WURTZ-FITTIG-Synthese läßt sich durch die Rkk. A, C u. D lückenlos zum Ausdruck bringen.



Versuche. 3-Jod-2-äthoxy-1-methylbenzol, $C_9H_{11}OJ$ (I.). Man diazotiert 3-Amino-2-kresoläthyläther als fein verteiltes Sulfat, gibt NaJ zu u. trägt Cu-Paste ein. Nach Dampfdest. Kp.₁₃ 127—128°. — Die Rk. von I. mit Na in Ä. wird durch einen Tropfen C_2H_5Br aktiviert u. durch Kochen vollendet, das Prod. im Vakuum, dann Hochvakuum fraktioniert. Erhalten: 1. o-Kresoläthyläther, $C_9H_{12}O$. — 2. II. (vgl. unten). — 3. Gemisch von 50% $C_{27}H_{32}O_3$ + 50% $C_{18}H_{21}O_2J$ (V.), Öl, Kp.₁ 230—235°. — Die Umsetzung in PAe. verläuft zu Anfang heftiger. Erhalten: 1. o-Kresoläthyläther. — 2. Dikresoläthyläther, $C_{18}H_{22}O_2$ (III.), Nadeln aus A., F. 53°. — 2,4'-Dioxy-3,3'-dimethyldiphenyl, $C_{14}H_{14}O_2$. Aus III. mit HJ (D. 1,78) in sd. Eg. Krystalle aus PAe., F. 110°, ll. in A. Bzl., Chlf., NaOH, wl. in PAe., CCl_4 . Die äth. Lsg. färbt sich mit PbO_2 braunrot. — 3. Dikresoläthyläther, $C_{18}H_{22}O_2$ (II.), Blättchen aus A., F. 85°, durch HJ schwer verseifbar. — 2,2'-Dioxy-3,3'-dimethyldiphenyl, $C_{14}H_{14}O_2$, Nadeln aus PAe., F. 108°, nach Sublimation 113°, ll. in A., Ä., Bzl., h. NaOH, wl. in PAe., k. NaOH. Die äth. Lsg. gibt bei -78° mit PbO_2 schnell verschwindende Violett-färbung. — 4. Verb. $C_{18}H_{22}O_2$ (IV.), Öl, Kp.₁₂ 205—207°. Gibt mit HJ in sd. Eg. o-Kresol. — 5. Verb. $C_{27}H_{32}O_3$ (V.), Öl, Kp.₁₂ 240—245°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 948—55. Würzburg, Univ. u. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) LINDENBAUM.

C. F. van Duin, Die Einwirkung von anorganischen Jodiden auf α,β -Dibromverbindungen. II. Über den allgemeinen Charakter der Reaktion und den Einfluß von Substituenten. (I. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 341; C. 1924. II. 185, ferner Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 585; C. 1925. I. 1859.) Vf. hat übersehen, daß BILLMANN (Rec. trav. chim. Pays-Bas 36. 319; C. 1918. I. 1148) sich mit demselben Thema beschäftigt u. aus seinen Verss. den Schluß gezogen hat, daß es sich um eine bimolekulare Rk. handelt. Vf. hält jedoch das von BILLMANN angewandte Verf. nicht für einwandfrei u. ist nach wie vor der Ansicht, daß die Rk. als trimolekulare anzusehen ist. — An einem großen Versuchsmaterial wird gezeigt, daß die Rk.:



allgemeinen Charakter besitzt. Man läßt die α,β -Dibromverb. u. 4 Moll. KJ in 90%ig. A. oder Essigsäure bei Zimmertemp. aufeinander wirken, bis die J-Abscheidung beendet ist, u. entfernt das J mit konz. Thiosulfatlsg. Für die präparative Darst. von Äthylen derivv. wird man zwar das Verf. von v. BRAUN (Einw. von Mg auf die Dibromide in absol. Ä.) meist vorziehen. Wenn aber dies Verf. — z. B. wegen B. einer Organomagnesiumverb. — versagt, so wird man das Verf. des Vf. mit gutem Erfolge benutzen können, besonders wenn man schon zu Anfang Thiosulfat zugibt, um jede Nebenwrkg. durch das J auszuschalten. Zur Darst. u. Reinigung der Dibromide sind möglichst OH-freie Lösungsm. zu benutzen, besonders wenn aktivierende Gruppen zugegen sind. — Um den Einfluß von Substituenten auf die Rk.-Geschwindigkeit kennen zu lernen, war es zur Erlangung vergleichbarer Werte nötig, Messungen b

verschiedenen Konz. auszuführen, sowohl wegen der verschiedenen Wrkg. von J' nicht dissoziiertem Jodid als auch wegen des katalyt. Einflusses des Kations. Es ist unmöglich, beide Einflüsse getrennt zu bestimmen. Wenn jedoch das Verhältnis r bei verschiedenen Konz. erhaltenen Rk.-Konstanten für sämtliche Verb. das gleiche ist, so sind auch die Konstanten selbst miteinander vergleichbar. Die Messungen wurden in wss.-alkoh. Lsg. mit n. u. $1/2$ -n. KJ bei 25° ausgeführt u. haben folgendes ergeben: 1. Das Verhältnis der Rk.-Konstanten verändert sich — von einigen Ausnahmen abgesehen — nur in engen Grenzen. 2. C_6H_5 , CO_2H , CO_2R u. $COCH_3$ wirken beschleunigend, Br verzögernd, u. zwar nach folgender Ordnung: $COCH_3 > C_6H_5$, $CO_2CH_3 > CO_2C_2H_5$, $CO_2H > H > Br$. 3. Die Konfiguration spielt eine wesentliche Rolle; die Konstante der meso-Dibrombernsteinsäure ist viel höher als die der rac. Isomere. [Für sämtliche anderen Dibromverb. wurde gleiche Konfiguration angenommen, alle durch Addition von Br an die trans-Äthylenverb. dargestellt wurden.] 4. Zwei CO_2H -Gruppen (Dibrombernsteinsäuren) beschleunigen nicht entsprechend mehr als 10, sondern neutralisieren sich mehr oder weniger, je nach der Konfiguration. Dies ist mittels der Theorie von der induzierten abwechselnden Polarität wohl zu verstehen, der Einfluß der O-Atome des CO_2H auf das α -ständige Br dem auf das β -ständige entgegengesetzt ist.

Präparativ ist folgendes mitzuteilen: *Zimtsäureäthylester*, E. $7,5^{\circ}$. — *p-Methoxybromhydrozimtsäureäthylester*, $C_{12}H_{14}O_3Br_2$, F. 115° (korr.). — *3,4-Methylendioxybromhydrozimtsäure*, F. 151 — 152° (korr.). — *Äthylester*, F. 89 — 90° (korr.). — *Dimethylkaffeesäure*. Aus Veratrumaldehyd, Essigester u. Na. Ausbeute 80% . — *Dimid*, $C_{11}H_{12}O_4Br_2$, Krystalle aus Ä. + PAe., F. 149° (korr.). — α -Cyan- β -[3,4-dimethoxyphenyl]-acrylsäureäthylester, $C_6H_3(OCH_3)_2 \cdot CH : C(CN) \cdot CO_2C_2H_5$. Aus Veratrumaldehyd u. Cyanessigester (+ Piperidin) bei 100° . Blau fluorescierende Nadeln aus Ä., F. 155° (korr.). — *Freie Säure*, $C_{12}H_{11}O_4N$. Mit sd. Gemisch von Eg. u. konz. HCl an Stelle der erwarteten Dimethylkaffeesäure. Hellgelbe Nadeln aus 80% ig. Essigsäure, F. 202 — 203° (korr.). — *Piperonylidenacetondibromid*, $C_{11}H_{10}O_3Br_2$, Krystalle aus Chlf. + PAe., F. 125° (korr.). — *Veratrylidenacetone*, $C_{12}H_{14}O_3$. Aus Veratrumaldehyd, Aceton u. 10% ig. NaOH (Zimmertemp., 15 Min.), mit W. fällen. Hellgelbe Nadeln aus PAe., F. 84 — 85° (korr.). — *Dibromid*, $C_{12}H_{14}O_3Br_2$. Darst. im Dunkeln. Krystalle aus Chlf. + PAe., F. 98° (korr.). — *p-Methoxystilben*. Aus Anisaldehyd Benzyl-MgCl entsteht zunächst wesentlich das zu erwartende Carbinol, das unter Druck erhitzt werden muß. — *i-Eugenoläthyläther*. Aus i-Eugenol, p-Toluolsulfonäthylester u. Alkali bei 100° . Aus Ä., F. 63 — 64° . — *Di-i-eugenoläthyläther*, $C_{12}H_{16}O_2$. Aus dem Dibromid des vorigen u. KJ an Stelle des erwarteten Monomeren. Nadeln aus 70% ig. A., F. $127,5$ — 128° (korr.). (Rec. trav. chim. Pays-Bas **45**. 345—62. Andrews, Univ.)

LINDENBAUM.

Jean-Marc Dumoulin, Über die katalytische Dehydratisierung der Vinylalkylcarbinole. Hat sich mit demselben Thema beschäftigt wie PRÉVOST (S. 3216). Dehydratisierungsverss. mit $KHSO_4$ u. $Al_2(SO_4)_3$ gaben nur ca. 25 bzw. 35% Ausbeute. Bessere Resultate lieferte Al_2O_3 bei 250 — 280° mit je 15—20 g Carbinol. Die Zus. der entstandenen KW-stoffgemische wurde durch $KMnO_4$ -Oxydation, Trennung u. Identifizierung der gebildeten Säuren, ferner durch die Bromadditionsprodd. ermittelt. — *Vinyläthylcarbinol*: *Pentadiene*, C_5H_8 . Ausbeute 50% . Kp. 38 — 43° , Hauptfraktion 42 — 43° , D_4^{20} 0,6944, D_4^{19} 0,6812, $n_D^{16} = 1,4303$ (Exaltation 1,15). Oxydation lieferte Essigsäure u. Spuren Propionsäure; Ameisensäure wird verbrannt. Es liegt also die 1,3-Verb., verunreinigt durch Spuren 1,2-Isomeres, vor. Mit Br in Chlf. oder CS_2 bei -15° : *Dibromid*, Kp.₂₀ 75 — 80° ; ohne Lösungsm.: *Tetrabromid*, F. 114° . — *Vinylpropylcarbinol*: *Hexadiene*, C_6H_{10} . Ausbeute 60% . Kp. 70 — 80° . Oxydation lieferte Essigsäure u. Propionsäure. Es liegt also ein Gemisch der 1,3- u. 1,4-Isomeren vor. Mit Br in Chlf. bei -15° : *Dibromid*, Kp.₂₅ 111 — 112° ; ohne Lösungsm.:

dasselbe Dibromid, ferner zwei *Tetrabromide*, F.F. 179,5 u. 88,5°. Letzteres scheint *1,2,3,4-Tetrabromhexan* (F. 91°) zu sein. — Aus *Vinylbutylcarbinol*: *Heptadiene*, C₇H₁₂, Ausbeute 65%. Kp. 95—105°. Oxydation lieferte Essigsäure, Propionsäure Buttersäure. Es liegt also ein Gemisch der *1,3-* u. *2,4-Isomeren* vor. Das letztere herrscht vor u. konnte herausfraktioniert werden; Konstanten: Kp. 103—104°. D.₄⁰ 0,7436, D.₄¹⁴ 0,734, n_D¹⁶ = 1,4524 (Exaltation 1,82). (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 974—76.)

LINDENBAUM

S. Lebedew und M. Platonow, *Über Monothio- und Dithiotriacetaldehyd*. Vff. polymerisierten Acetaldehyd in Ggw. von H₂S u. kamen zu einem anderen Resultat als MARCKWALD (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 19. 1831 [1886]), der ein Dimer erhalten zu haben glaubt. Sie stellten die B. eines *Monothiotriacetaldehyds* als erste Polymerisationsprod. fest, einen *Dithiotriacetaldehyd* als Zwischenprod. u. als Endprod. des Prozesses *Trithiotriacetaldehyd*.

Versuche. *Monothiotriacetaldehyd*, C₆H₁₂O₂S. Reinigung durch Sublimation. F. 53,5—54°. Mol.-Gew. 139,5, 139. Kp. oberhalb 160° (bedeutende Zers.). Unlöslich in W., ll. in den gewöhnlichen organ. Lösungsm. Leicht flüchtig. Scharfer spezifischer Geruch. Oxydation mit rauchender HNO₃ unter Aufflammen u. S-Abscheidung mit feuchtem Ag₂O B. von AgS, essigsauerm u. Ameisensäurem Ag. Reagiert nicht mit C₆H₅NH·NH₂ u. Semicarbazid. Nach langem Zusammenstehen mit fuchsig-schwefliger Säure blaue Farbe. — *Sulfon aus Monothiotriacetaldehyd*, C₆H₁₂O₂SO₂. Mittels saurer KMnO₄-Lsg. in Bzl. Aus Bzl. F. 150—152°. Wl. in h. W., Ä. u. Acet. ll. in w. Bzl. — *Dithiotriacetaldehyd*, C₆H₁₂OS₂. Nebenprod. bei der Darst. der Monothio-Verb. oder durch längere Einw. von H₂S auf saure Acetaldehydlsg. neben Monothio- u. Trithiotriacetaldehyd. Reinigung durch Vakuumdest. u. fraktionierte Sublimation. F. 70—72°. — *Disulfon aus Dithiotriacetaldehyd*, C₆H₁₂O₅S₂. Oxydation in Toluol. Beginn der Zers. bei 215°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 762—67. Lenig, grad, Militärmedizin. Akademie.)


SCHUSTER.

Robert Walter, *Über krystallinisch-flüssige Thallosalze organischer Säuren*. I. von HOLDE u. a. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 523. 1788; C. 1925. I. 1974. II. 23.) beschriebenen Thallosalze erwiesen sich als krystallin-flüssig (im folgenden kr.-fl. abgekürzt). Die meisten Thallosalze erwiesen sich unter dem Polarisations-Heizmikroskop als enantiotrop (im folgenden en. abgekürzt) kr.-fl.; bei diesen stimmt dann die beim Schmelzen im Röhrchen beobachteten Vorgänge mit der Beschreibung von HOLDE u. SELIM (l. c.) gut überein. Die weißliche Krystallmasse wird bei der F. der festen Phase (F. II) durchscheinend u. sintert stark zusammen usw.; die zähe M. selbst erscheint dabei nicht allzu stark getrübt. Das Zusammenlaufen erfolgt dann ruckartig bei einer bestimmten Temp., die sich bei erneuter Darst. immer wieder einstellt; sie ist als F. der kr.-fl. Phase (F. I) anzusehen, da der Übergang kr.-fl. in amorph-fl. von einem starken Sprung in der Zähigkeit begleitet ist. Beim Abkühlen der amorphen Schmelze ist der Übergang zur krystallinen Fl. nur an einer geringen Kontraktion der M. u. am Rauhwerden der Meniskusoberfläche wahrzunehmen, dann wird das Eintreten der festen Phase sehr deutlich u. ebenso ihr Schmelzen bei Wiederanwärmen, so daß F. II beim zweiten Aufschmelzen sicherer als beim ersten zu bestimmen ist, während F. I dann kaum sichtbar ist. — Dagegen schmelzen auch Salze, die am Heizmikroskop nicht oder monotrop (im folgenden mo. abgekürzt) kr.-fl. erschienen, im Röhrchen unter Meniscus-B. sofort klar auf. — Bei den Thallosalzen der n. Fettsäuren geben die so bestimmten FF., in Beziehung zur Kettenlänge gebracht, für die festen u. kr.-fl. Phasen je eine zusammenhängende Kurve, in der das sonst für homologe aliphatische Reihen charakteristische abwechselnde Auf- u. Absteigen der FF. fehlt. — Abbildung u. Diskussion der Kurven u. Resultate vgl. Original. Das in steilem Ansteigen erreichte Maximum der FF. I beim heptylsauren Tl kann darauf hindeuten, daß die Säurereste in den kr.-fl. Phasen sich ringförmig anordnen.

führung kurzer Seitenketten in das Fettsäure-Mol. hat auf die kr.-fl. Eigenschaften geringen Einfluß. Die spezielle Einw. der Salzbildung auf den kr.-fl. Zustand, „Salzfaktor“ VORLÄNDERS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **43**. 3120; C. **1910**. II. 1803), überwiegt den strukturellen Einfluß. F. II wird dagegen durch die Seitenketten merklich herabgedrückt; bei verhältnismäßig starker Verzweigung verschwinden die kr.-fl. Phasen vollständig. Doppelbindungen im Säurenmol. erniedrigen beide FF. des Tl-Salzes; einen Schluß auf die Konfiguration der Stereoisomeren erlauben die Ergebnisse nicht. — In manchen Fällen mögen die Thallosalze zur Strukturbestimmung aliphatischer Säuren herangezogen werden können (vgl. Säuren aus Montanwachs). — Die Erscheinungsformen der kr.-fl. Phasen von Thallosalzen sind von denen nicht zartiger kr.-fl. Körper nicht grundsätzlich verschieden, doch bewirkt die viel schwächere Doppelbrechung u. die große Zähigkeit der Phasen einige Abweichungen vom mikroskop. Bilde. Die sog. Schlierenphasen fehlen bei den kr.-fl. Salzen vollständig. Die Salze mit niedrigem Mol.-Gew. der Säure (bis ca. C₈) zeigen in ihren kr.-fl. Phasen ähnliche Erscheinungen wie die kr.-fl. Zimtsäureester: Pocken, die im Gegensatz zu diesen Interferenzringe zeigen; bei höher molekularen Salzen (bis C₁₄) treten die Pocken zurück zugunsten einer eigentümlichen Schichtstruktur. Auch diese Schichtung ist schon bei Zimtsäurederiv., z. B. bei *Estern der p-Azomethansäure*, vorhanden. — Die höchstmolekularen Salze (vom Stearat ab) haben in der kr.-fl. Phase keine charakterist. Struktur.

Versuche. Die Thallosalze wurden aus der Säure in A. + $\frac{1}{10}$ -n. Tl(OH)-Lsg. hergestellt (l. c.). Die Salze der niederen Fettsäuren sind, von den beiden niedrigsten abgesehen, in A., CH₃OH, Chlf. sll., lassen sich aus Toluol, Xylol, Aceton umkristallisieren. Mit steigendem Mol.-Gew. nimmt die Löslichkeit in allen Lösungsmitteln ab. Die Salze, die in A. u. Chlf. ll. sind, konnten mit Aceton gefällt werden. — Die angegebenen FF. sind korrigiert. — *Ameisensaures Tl*, aus A., F. 104°, stark hygroskop.; Mikr. Befund (im folgenden Mikr. abgekürzt): doppelbrechende Nadeln, schm. amorph; aus der amorphen Schmelze eine monotrope, nicht doppelbrechende, feste Phase in rechtwinkligen Krystalskeletten, die sich in die stabile doppelbrechende Phase umlagert; nicht kr.-fl. — *Essigsäures Tl*, aus W. u. Aceton oder aus A., F. 130°; Mikr.: doppelbrechende Blättchen, schm. amorph auf; monotrope, feste Phase (stark doppelbrechende Strahlen), lagert sich schnell in die dunklere stabile Phase um; nicht kr.-fl. — *Propionsäures Tl*, aus A., sintert stark bei 90°, F. 188°; Mikr.: doppelbrechende Blättchen; Doppelbrechung verschwindet beim Erhitzen plötzlich fast vollständig, es erst schm. es; aus der Schmelze entsteht zunächst eine flächige Phase mit geringer Doppelbrechung u. eingestreuten, etwas stärker doppelbrechenden Nadeln, bei weiteren Abkühlen Umlagerung in eine feste Phase, parallele, doppelbrechende Nadeln; die Umwandlung ist en.; nicht kr.-fl. — *n-Buttersäures Tl*, aus A. + Aceton, f. + Aceton oder Toluol, F. 182°; Mikr.: sehr schwach doppelbrechende Blättchen, Doppelbrechung wird gegen den F. noch geringer; aus der amorphen Schmelze entsteht eine flächige, fast nicht doppelbrechende, feste Phase; nicht kr.-fl.; durch Mischbest. ist eine latente kr.-fl. Phase, F. > 164°, ca. 175°, wahrscheinlich gemacht. — *Valeriansäures Tl*, aus A. + Aceton; FF.: fest II $\xrightleftharpoons{78^\circ}$ fest I $\xrightleftharpoons{175^\circ}$ kr.-fl. $\xrightleftharpoons{212^\circ}$ amorph. Mikr.: doppelbrechende Blättchen, lagert sich beim Anwärmen in eine schwach doppelbrechende Phase um (fest I), dann zur stark doppelbrechenden kr.-fl. Phase u. schließlich zur amorphen Schmelze; Näheres über Pocken-B. etc. vgl. Original. — *Pentansäures Tl*, aus A. + Aceton; F. I 223—224°; F. II 152°; Mikr.: doppelbrechende Blättchen, en. kr.-fl. Phase. — *Önanthensäures Tl*, aus Aceton; F. I 227°; F. II 143°; Mikr.: doppelbrechende Blättchen; en. kr.-fl. — *Caprylsäures Tl*, aus A.; F. I 220°; F. II 135—136°; Mikr.: doppelbrechende Blättchen; en. kr.-fl. — *Pelargonsäures Tl*, aus A. oder Aceton; F. I 215°; F. II 130°; Mikr.: vor dem Übergang zu en. kr.-fl. Phase

en. Umwandlung in eine zweite feste Phase. Die kr.-fl. Phase ist nur an einigen Stellen schwach doppelbrechend. — *Caprinsaures Tl*, aus Aceton + CH_3OH ; F. I 207°, F. II 127°; Mikr.: doppelbrechende Blättchen; gehen über eine zweite en. feste Phase in eine schwach doppelbrechende kr.-fl. Phase über. — *Undecylsaurer Tl*, aus Aceton + CH_3OH ; F. I 200—201°, F. II 126°; Mikr.: beim Anheizen tritt zuerst eine en. feste Phase, dann die en. kr.-fl. Phase auf. — *Laurinsaures Tl*, aus A. + Aceton; F. I 197°, F. II 123°; Mikr.: zwei feste Phasen (Enantiotropie). — *Myristinsaures Tl*, aus A.; F. I 181,5°, F. II 119,5°; Mikr.: zwei feste Phasen (Enantiotropie). — *Palmitinsaures Tl*, aus A.; F. I 172°, F. II 114—116°; Mikr.: zwei feste Phasen, en.; die höher schmelzende Phase ist sehr kurzem Existenzgebiet; die kr.-fl. Phase zeigt weißliche Stäbchen. — *Stearinsaures Tl*, aus A.; F. I 163°, F. II 118°; Mikr.: eine feste Phase; die en. kr.-fl. Phase besteht aus weißen Stäbchen in nicht doppelbrechender Grundmasse. — *Cerotinsaures Tl*, aus absol. A.; F. I 125°, F. II 113—114°; Mikr.: doppelbrechendes Pulver; die en. kr.-fl. Phase ist schwach doppelbrechend. — *Säuren aus Montanwachs* (vgl. Diss. KERNER u. Diss. EGGERT, Halle 1925): $\text{C}_{26}\text{H}_{51}\text{O}_2\text{Tl}$, aus Xylol, F. 116°; ganz schwach doppelbrechend. — $\text{C}_{27}\text{H}_{53}\text{O}_2\text{Tl}$, aus Xylol, F. 116°; ganz schwach mo. kr.-fl. — $\text{C}_{28}\text{H}_{57}\text{O}_2\text{Tl}$, aus Xylol, F. 116—117°; ganz schwach mo. kr.-fl. — Danach hätten diese 3 Säuren ein gemeinsames verzweigtes C-Skelett (s. o.). — *i-Buttersaures Tl*, aus CH_3OH + Aceton, F. II 122°; Mikr.: zwei feste Phasen (Enantiotropie); eine mo. kr.-fl. Phase (weiße Stäbchen); F. II nicht bestimmbar. — *Diäthylsaurer Tl*, Nadeln, aus Aceton, F. 112°; nicht kr.-fl. — *Dipropylsaurer Tl*, Nadeln, aus Aceton, F. 122—123°, nicht kr.-fl. — *i-Propylsaurer Tl*, Blättchen, aus Aceton, F. I 174°, F. II 156,5°; Mikr.: en. kr.-fl. bei marmorierte Phase mit undeutlichen Pocken u. Stäbchen. — *i-Amylsaurer Tl*, Blättchen, aus Aceton, F. I 218°, F. II 118,5°; Mikr.: en. kr.-fl. Phase. — *Hexahydrobenzoesaures Tl*, Nadeln, aus A.; F. I 238°, F. II 218°; Mikr.: en. kr.-fl. — α -*Crotonsaurer Tl*, aus CH_3OH + Aceton; F. 122°, starkes Sintern (Umlagerung) bei 122°; Mikr.: Nadeln, schm. über eine zweite en. feste Phase amorph auf. Aus der Schmelze




krystallisiert eine stark doppelbrechende feste Phase (I) (vgl. nebenst. Schema). Aus dieser Phase (I) kann man durch Abkühlen eine schwach doppelbrechende (II), die sofort in eine höher schmelzende nadelige Phase (III) übergeht. III schm. wieder zu I auf; an kleinen Tropfen wird eine mo. kr.-fl. Phase (Stäbchen) sichtbar. — *i-Crotonsaurer Tl*, Blättchen, aus Aceton, sehr hygroskop.; F. 102°; Mikr.: schm. über eine en. feste Phase amorph auf; an kleinen Tropfen mo. kr.-fl. (Stäbchen). — *Ölsaurer Tl*, Blättchen, aus Aceton; F. I 131—132°, F. II 81°; Mikr.: kr.-fl.; die Phase ist schwach doppelbrechend. — *Elaidinsaures Tl*, Blättchen, aus Aceton, F. I 144°; F. II 90°. — *Erucasaurer Tl*, aus CH_3OH ; F. I 125°; F. II 78°; Mikr.: en. kr.-fl. — *Brassidinsaures Tl*, aus CH_3OH ; F. I 122°; F. II 96°; Mikr.: kr.-fl. — *Benzoesaurer Tl*, Blättchen, aus W. oder A.; F. 340—345°; nicht kr.-fl. — *o-Toluylsaurer Tl*, aus W. oder A.; F. 115—118°; nicht kr.-fl. — *m-Toluylsaurer Tl*, aus W. oder A.; F. I 193—195°; F. II 180°; Mikr.: en. kr.-fl. — *p-Toluylsaurer Tl*, Blättchen, aus W. oder A.; F. 317°; nicht kr.-fl. — *Phenylsaurer Tl*, Tafeln, aus A.; F. 157—158°; nicht kr.-fl.; die amorphe Schmelze unterkühlt; krystallisiert erst beim Impfen. — *Hydrozimsaurer Tl*, Blättchen, aus A.; F. 193—194°; Mikr.: schm. über eine sehr kurzlebige, sehr schwach doppelbrechende, zweite feste Phase amorph auf; beim Abkühlen krystallisiert die höher schmelzende Phase tafelig, tieferschmelzende in parallelen Nadeln; nicht kr.-fl. — Die Hoffnung, die FF. mo. oder latenter kr.-fl. Phasen bei den Thallosalzen ebenso wie bei rein organ. kr.-fl. Körpern (vgl. S. 1355) durch Mischen mit Salzen von bekanntem F. I bestimmen zu können, erfüllte sich nicht. — Die mit *n-Butyrat* ausgeführten Mischungen beweisen immerhin, daß dieses Salz eine latente kr.-fl. Phase besitzt, deren F. über 164,2° liegen muß.

wurden die *Brechungsindices* von TI-Salzen der *Stearin-, Caprin-, Öl- u. Erucasäure* bestimmt. Die Doppelbrechung in den kr.-fl. Phasen ist überall klein, höchstens ca. 0,02; die festen Phasen sind stärker, aber doch recht schwach doppelbrechend. (Ber. sch. Chem. Ges. **59**. 962—72. Halle, Univ.)

BUSCH.

Wm. L. Nelson und **Carl J. Engelder**, *Die thermische Zersetzung von Ameisensäure*. Die Unterss. über die therm. Zers. von wasserfreier Ameisensäure wurden bei Temp. von 250—550° in Pyrexglas-, unglasierten Porzellan-, ungeätzten u. geätzten Porzellan- u. Kupferröhren ausgeführt. Die Analysen der gasförmigen Zerfallsprodd. haben in der Hauptsache H_2 u. CO_2 u. in fast allen Fällen mehr oder weniger CO . Wesentlichen verläuft demnach die Rk. wie folgt: $HCOOH = CO_2 + H_2$; ein kleiner Teil zers. sich auch nach der Gleichung: $2HCOOH = CO_2 + H_2O + HCHO$; die sich mehr hieraus ergebenden Rkk. erklären das Auftreten von CO ;



Bei 450° ist die Rk. zu 90% vollständig, u. zwar im Pyrexglas geht sie am langsamsten im Cu-Rohr am schnellsten vor sich. Durch Anätzung wird auch das Quarzrohr besser. Quantitative Unterss. konnten nicht gemacht werden, da der katalyt. Einfluß ein zu wechselnder u. zu unbestimmter war. (Journ. Physical Chem. **30**. —75. Pittsburgh, Univ.)

HAASE.

B. B. Wescott und **Carl J. Engelder**, *Die katalytische Zersetzung von Ameisensäure*. Vff. untersuchen den katalyt. Einfluß kleiner Mengen reinsten TiO_2 , Al_2O_3 feinest verteiltem, metall. Ni auf die therm. Zers. von gasförmiger, wasserfreier Ameisensäure. Wie im vorst. Ref., so zeigt sich auch hier, daß die Zers. der Ameisensäure in H_2 u. CO_2 bevorzugt wird bei niedrigen Temp., bei höheren dagegen u. zwar besonders bei Anwesenheit von Ni als Katalysator tritt eine stärkere CO -Bildung ein; die Zers.bedingungen hierfür werden gegeben. Der Einfluß des Rohres wird erst oberhalb von 350° deutlich erkennbar. (Journ. Physical Chem. **30**. 476—79. Pittsburgh, Univ.)

HAASE.


Hans Pringsheim und **Arnold Steingroever**, *Zur Kenntnis der Amylobiose*. (Vorträge zur Chemie der Stärke. XVII.) (XVI. vgl. S. 3403.) Früher ist schon festgestellt worden, daß Amylobiose sowohl aus α -Polyamylosen als auch aus β -Hexamethylose entsteht. Bei den neuen Verss. zur Gewinnung aus α -Tetraamylose zeigte sich, daß intermediäre B. von β -Polyamylosen erfolgt, wobei unentschieden ist, ob die Umlagerung eine notwendige Zwischenrk. ist, oder ob ein Teil der α -Tetraamylose direkt zu Amylobiose aufgespalten wird. — Zur Prüfung der für Amylobiose vorgeschlagenen Konst. einer 4-Glucosido-(1,4)-glucose-(1,6) (vgl. PRINGSHEIM, Ber. sch. Chem. Ges. **57**. 1581; C. **1924**. II. 2243) wurde die Methylierung herangezogen. $(CH_3)_2SO_4$ u. $NaOH$ u. Nachmethylierung mit CH_3J u. Ag_2O gelang Einführung von 6 CH_3 -Gruppen, weitere aber auch bei Wiederholung dieser Prozesse u. auf dem Wege über das acetylierte Methylprod. nicht, das übrigens nur eine der beiden n. OH-Gruppen acetyliert enthielt. Als Vorvers. wurde die Methylierung von α -Tetra Methyl- α -tetraamylose versucht, die zur Dimethylstufe, aber nicht weiter zu Amylobiose. Nach Spaltung der Hexamethylamylobiose mit 5%ig. H_2SO_4 oder 1%ig. HCl ließ sich die n. Tetramethylglucose als Anilid bzw. als Methylglucosid nachweisen, wodurch die n. Struktur des Glucosidteils entsprechend der vorgeschlagenen Formel bewiesen ist. Der Glucoseteil wurde nach Einw. der methylierten HCl als Dimethylzucker, Monomethylmethylglucosid, sehr ähnlich dem von NEUBERG aus Diacetylglucose dargestellten 3-Methylmethylglucosid, isoliert. Es kann aus höchstens gefordert werden, daß das 3. OH weder an der Verknüpfung der n. Zuckerreste noch am Lactolring beteiligt ist. Die γ -Struktur des Glucose-Teils wird noch dadurch bestätigt, daß die Fehlingsche Lsg. nicht mehr reduzierende Amylobiose die Farbe von verd. alkal. $KMnO_4$ -Lsg. momentan umschlagen. — Im Anschluß hieran wurde auch die Methylierung des Trihexosans versucht.

Die Dimethylstufe ließ sich glatt in einem Arbeitsgang erreichen, weitere Methylierung durch mehrfache Wiederholung der Operation nur sehr langsam u. allmählich.

Hexamethylamylobiose, $C_{12}H_{16}O_5(OCH_3)_6$, gelblich weißes Pulver, bei 0,04 m bis 350° Badtemp. nicht übergehend, l. in k. W., Chlf., CH_4O , A. u. Bzl., wl. in unl. in h. W. u. PAe. — *Acetylhexamethylamylobiose*, $C_{12}H_{15}O_4(OCH_3)_6(C_2H_3O_2)$, in W. — *Tetramethylglucoseanilid*, F. 133—134° (unkorr.), $[\alpha]_D = +233,5^\circ$ (in Acet.) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1001—06. Berlin, Univ.) SPIEGEL

E. W. Guernsey, J. Y. Yee, J. M. Braham und M. S. Sherman, *Einige Faktoren, welche die Bindung von Stickstoff als Natriumcyanid beeinflussen*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1925; C. 1925. II. 1786 u. S. 2894 u. 2903.) Vff. untersuchen den Einfluß der Änderung der Zus. der Charge, den Einfluß der Temp., der CO-Konz. im N_2 u. des N_2 -Überschusses auf die Geschwindigkeit u. das Maximum der Umwandlung von Na_2CO_3 in $NaCN$ durch Erhitzen einer Charge Na_2CO_3 , Kohle u. Fe N_2 -Strom. SiO_2 verringert die $NaCN$ -Ausbeute, da ein Teil des Na_2CO_3 durch B. v. Na-Silicat der Cyanidbildung entzogen wird. Bei Ggw. von 30% CO im N_2 betrug bei 950° die maximale Umwandlung von Na_2CO_3 in $NaCN$ nur 64%, bei Ggw. v. 50% CO 67% bei 1000°. Diese Werte stimmen mit den Messungen von INGOLD und WILSON (Journ. Chem. Soc. London 121. 2278; C. 1923. III. 817) überein. Die Cyanidbildung verläuft schnell, wenn der N_2 -Überschuß groß genug ist, um die CO-Konz. niedrig zu halten. So können z. B. 71% des Na_2CO_3 in 15 Min. in $NaCN$ umgewandelt werden. Die Temp. muß für eine günstige Ausbeute mindestens 100° betragen. — Bei höherer Temp. kann die Menge des Fe-Katalysators verringert werden bei 1050° reichen 1 bis 2% Fe aus. — $NaCN$ kann wegen seiner therm. Zers. (Vgl. S. 2903) aus einer rohen Charge nicht durch Dest. erhalten werden. (Ind. and Eng. Chem. 18. 243—48. Washington [D. C.], Fixed Nitrogen Research Labor.) J.

Helmuth Scheibler, *Zur Kenntnis der Verbindungen des zweiwertigen Kohlenstoffs*. I. *Über Kohlenoxyddiäthylacetal, seine Darstellung aus Diäthoxyessigsäureäthylester, sowie aus Ameisensäureäthylester*. Entsprechend dem Reaktionsverlauf der Acetessigestersynthese (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 36. 6; C. 1923. I. 740) war nun untenstehendem Reaktionsschema, ausgehend vom Diäthoxyessigsäureäthylester B. von Diäthoxyketendiäthylacetal zu erwarten.



Dieser Körper, das *Tetraäthoxyäthylen*, zerfällt aber nach seinen physikal. Eigenschaften zu einer Verb. mit dem halben Mol.-Gew., dem *Kohlenoxyddiäthylacetal* oder *Diäthoxymethylen* $C \equiv (OC_2H_5)_2$ mit zweiwertigem C. — Derselbe Körper entsteht auch ausgehend vom *Ameisensäureäthylester*, nach den Gleichungen:

- I. $H \cdot CO \cdot OC_2H_5 + NaOC_2H_5 = C \equiv (OC_2H_5)(ONa) + HO \cdot C_2H_5$
- II. $2 C \equiv (OC_2H_5)(ONa) + POCl_3 = 2 C \equiv (OC_2H_5)(Cl) + NaPO_3 + NaCl$
- III. $C \equiv (OC_2H_5) \cdot Cl + Na \cdot OC_2H_5 = 2 C \equiv (OC_2H_5)_2 + NaCl$
- IV. $C \equiv (OC_2H_5)(ONa) + H_2O = NaOH + CO + C_2H_5OH$
- V. $C \equiv (OC_2H_5)_2 \longrightarrow C \equiv O + (C_2H_5)_2O$

Ameisensäureester entwickelt mit Natriumamid in Ä. bereits in der Kälte Natriumameisensäureester (vgl. Gleichung I.) enthält ein 2-wertiges C-Atom. Um eine übersichtliche Nomenklatur dieser neuen Körperklasse zu ermöglichen, schlägt man sie zweckmäßig als Derivv. des *Methylens* CH_2 auf; der *Natriumameisensäureester* ist demnach als *Natriumoxyäthoxymethylen* zu bezeichnen. Bei der hydrolytischen Spaltung mit W. erfolgt Lsg. u. nach Gleichung IV. B. von genau 1 Mol. NaOH u.

gegen nicht B. von Ameisensäureester bzw. Natriumformiat. Durch dieses Verh. scheidet es sich von den Esterenolaten, die als hydrolyt. Spaltprodd. stets die ter u. die Salze der betreffenden Säuren liefern. Es ist daher nicht angebracht, die Salze des Oxyalkyloxymethylens als Enolate der Ameisensäureester zu bezeichnen, da sie nicht in diese zurückverwandelt werden können; die freien Oxyalkyloxymethylene zerfallen vielmehr bei ihrer B. entsprechend Gleichung IV. — Natriumoxyäthoxymethylen entsteht auch aus $\text{CO} + \text{Na-Äthylat}$ im Hochdruckautoklaven. Die Isolierung des nach II. gebildeten *Chloräthoxymethylens* $\text{CII}(\text{OC}_2\text{H}_5)\cdot\text{Cl}$ wurde nicht versucht. — Das Kohlenoxydacetal erleidet schon beim Abdampfen des Lösungsm. einen Zerfall nach Gleichung V. — Das CO enthaltende Präparat hat die eig. Wrkg., das reine scheint weniger giftig zu sein. — Im Kohlenoxyddiäthylacetal liegt das erste Beispiel einer Verb. vor, in der ein zweiwertiges C-Atom mit einwertigen Radikalen verbunden ist.


Versuche: *Kohlenoxyddiäthylacetal*, $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$, aus 2 Moll. Na-Äthylat in Ä. + 1 Moll. Diäthoxyessigester; Kp.₇₆₀ 77°; $n_D^{23} = 1,41295$; $n_D^{25} = 1,41420$; $n_D^{23} = 1,42008$; $d_4^{20} 0,7503$; enthält wahrscheinlich CO. — *Natriumoxyäthoxymethylen*, $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2\text{Na}$, aus Ameisensäureäthylester u. Na-Äthylat in Ä. bei gewöhnlicher Temp. oder mit Natriumamid bei Siedetemp.; in letzterem Fall entstehen auch N-haltige Verbb. (Natriumformamid?); farblose Prismen; unl. in w. A., Ameisensäureäthylester, Ä., Ac.; ist trocken einige Zeit haltbar, in feuchter Luft erfolgt Zers. — Gibt in PAe. + Cl_3 u. Einw. von Na-Äthylat *Kohlenoxyddiäthylacetal*; Kp.₃₆₅ 56—57°; $D_4^{20} 0,7879$; $d_4^{20} 0,7899$; $D_4^{14} 0,7902$; bei 14° $n_D = 1,37834$; $n_D = 1,38023$; $n_D = 1,38504$; $n_D = 1,38896$; bei der refraktometr. Unters. ergab sich eine so erhebliche Exaltation gegenüber den aus der Summenformel berechneten Werten, daß man am besten die bisher bekannte *At.-Refraktion des zweiwertigen C* aus den beobachteten Daten u. dem berechneten Werte für die beiden $\text{H}_5\text{C}_2\text{O}$ -Gruppen bestimmt; so ergibt sich für die H-Linie $\text{CII} = 5,95$ (M_α); $M_D = 5,98$; $M_\beta = 6,08$; $M_\gamma = 6,14$. — Es hat einen ätherischen, dumpfen Geruch; ll. in den üblichen organ. Lösungsm., auch in W.; völlig unempfindlich gegenüber Na; muß über Na oder in zugeschmolzenen Glasröhren aufbewahrt werden; die Hydrolyse erfolgt schnell mit verd. Säuren unter B. von CO u. A.; k. W. u. wss. Alkalien wirken nur langsam ein; das bei der Hydrolyse ausgesparte CO wurde mittels PdCl_2 nachgewiesen. Mit Br in CHCl_3 erfolgt auch im Dunkeln keine Entfärbung; dagegen erfolgt mit sodaalkal. KMnO_4 -Lsg. deutliche Oxidationswrkg., die allerdings langsamer als beim Ketenacetal eintritt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1022—32. Berlin, Techn. Hochsch.)

BUSCH.

Theodor Curtius und Wilfrid Klavehn, Über die Einwirkung von *p*-Toluolazid auf Malonester und alkylierte Malonester. Durch Erhitzen von *p*-Toluolazid mit überschüssigem Malonester u. Verseifung des Rk.-Prod. wurde *1-Toluol-2-m-4-carbonsäure-5-triazolon* (II) (*Toluolsulfaminodiazomalonsäure* [III]) gewonnen. Die erstentstandene *Oxytriazolcarbonsäure* (I) lagerte sich so rasch in die Sulfaminodiazomalonsäure um, daß es nicht möglich war, sie zu isolieren. Verkochen der freien Säure ergab kein freies Triazolon, sondern unter CO_2 - u. N_2 -Abspaltung *p-Toluolaminoglykolsäure* (IV). In wasserfreien Medien entstand eine Verb. $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}$ (?), deren Konst. noch nicht geklärt ist. Der Ester der *Oxytriazolcarbonsäure* ist beständiger als die freie Säure. Er entsteht durch Kondensation des Sulfazids mit Malonester u. Na-Äthylat. Erst nach einigen Stunden lagert er sich in den *Toluolsulfaminodiazomalonester* um, der auch durch Einw. von alkoh. HCl auf die Sulfaminodiazomalonsäure erhalten wird. Die *Toluolsulfaminodiazomalonester* sind im Gegensatz zu Diazofettsäureestern beständig gegen Säuren u. Kochen mit Toluol. Erst bei Einw. von Cu-Pulver zersetzen sie sich langsam. Als Diazoverbb. erweisen sich die Ester am deutlichsten bei Einw. von NH_3 oder $\text{NH}_2\cdot\text{NH}_2$. Aus NH_3 u. *Toluolsulfaminodiazomalonester* erhält man das NH_4 -Salz des *1-Toluolsulfon-4-carbonamid*.

VIII. 1.

5-oxytriazols, aus diesem das freie Oxytriazol, das sich in 4-Toluolsulfaminocarbonsäure-5-oxytriazol (V) umlagert. Die Rk. mit $\text{NH}_2 \cdot \text{NH}_2$ ist analog: Es entsteht ein Bisdiammoniumsalz des 1-Amino-4-toluolsulfaminocarbonsäure-5-oxytriazols (VI). Das freie Oxytriazol kondensiert sich mit aromat. Aldehyden. Mit Anilin dagegen tritt keine Rk. ein. Beim Vers., p-Toluolsulfonazid auf monoalkylierte Malonsäureester einwirken zu lassen, konnte kein Rk.-Prod. gefaßt werden, nur p-Toluolsulfamid, eine flüchtige Verb. von i-nitrilartigem Geruch.



Versuche. I. Kondensation von p-Toluolsulfonazid mit Malonsäureester. 1-p-Toluolsulfon-4-carbonsäuremethylester-5-oxytriazol. In der Wärme (100°) unter vermindertem Druck (20 mm) mit nachherigem Zusatz von Na-Methylester. Schweres gelbliches Öl. Gibt Enolrk. mit FeCl_3 , zeigt ausgesprochen sauren Charakter (l. in verd. Alkali, Rötung von Lakmus). Gibt eine Reihe gut charakterisierbarer Salze (vgl. unten). Lagert sich nach mehreren Stunden um in das 1-p-Toluolsulfon-4-carbonsäuremethylester-5-triazolon bzw. in den Toluolsulfaminodiazomalonsäuremethylester, $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{O}_5\text{N}_3\text{S}$. Gelbe Prismen aus CH_3OH . F. 83°. Sll. in Ä., Chlf., Bzl., in w. A. oder Lg., unl. in W. u. verd. Alkali, etwas l. in konz. HCl. — Na-Salz, $(\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{O}_5\text{N}_3\text{S})_2\text{Ba}$. Hellgelbes amorphes Pulver. — NH_4 -Salz, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{N}_4\text{S}$. Aus dem Diazoester u. wss. NH_3 . Prismat. Tafeln. Zers.-Punkt 154°. Ll. in W., l. in Ä., wl. in starkem NH_3 . Auslöschung zur Längsachse etwa 10°. — Piperidinsalz, $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{O}_5\text{N}_4\text{S}$. F. 146° (Zers.). Ll. in A. oder Chlf., l. in w. W., in w. Bzl., unl. in Ä. u. Lg. — 1-Toluolsulfon-4-carbonsäureäthylester-5-oxytriazol. Durch Kondensation von Azid u. Malonester bei Ggw. von Na-Äthylat. Gelbes Öl. Zeigt nur undeutliche FeCl_3 -Rk. Lagert sich rascher wie der Methylester um in 1-Toluolsulfon-4-carbonsäureäthylester-5-triazolon oder Toluolsulfaminodiazomalonsäureäthylester, $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_3\text{S}$. Aus heißem A. F. 85°. Anisotrop. Max. Auslöschungsschiefe 42—44°. — Na-Salz des Enoläthylesters, $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{O}_5\text{N}_3\text{SNa}$. Prismat., gelbe Nadeln. Max. Auslöschungsschiefe etwa 58°. — Pb-Salz, $(\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{O}_5\text{N}_3\text{S})_2\text{Pb}$. Amorphes weißes, kaum l. Pulver. — NH_4 -Salz, $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_5\text{N}_4\text{S}$. Gelbe monokline Prismen. F. 154° (Zers.). Max. Auslöschung etwa 47°. — Piperidinsalz, $\text{C}_{17}\text{H}_{24}\text{O}_5\text{N}_4\text{S}$. Gelbe Rhomboeder. F. 151° (Zers.). Max. Auslöschungsschiefe etwa 50°. — 1-p-Toluolsulfon-4-carbonsäure-5-oxytriazol (I). Durch Verseifen des Esters. Zähes Öl, das alsbald erstarrt zur p-Toluolsulfaminodiazomalonsäure (III), $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_5\text{N}_3\text{S}$. Schwach anisotrope, gelbe Krystalle. F. 124° (nach mehrtägigem Stehen F. 144°). Ll. in A., Ä. oder Chlf., wl. in Lg. oder Bzl., in h. W. l. unter Zers. Bildet unter Rückbildung der Oxytriazolform saure n. wenig beständige Salze. — Ba-Salz, $(\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O}_5\text{N}_3\text{S})_2\text{Ba}_2$. — p-Toluolsulfaminoglykolsäure (IV), $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_4\text{NS}$. Durch Hydrolyse der p-Toluolsulfaminodiazomalonsäure. Spießige Nadeln aus W. F. 153°. Max. Auslöschung etwa 35°. Ll. in h. W., in Ä. oder Bzl., fast unl. in Chlf., Lg. oder Bzl. L. in verd. Alkali. Wird beim Erwärmen mit konz. HCl gespalten in Glykolsäure u. p-Toluolsulfonamid, $\text{C}_7\text{H}_9\text{O}_2\text{NS}$. Blättchen aus h. W. F. 138°. Ll. in A. u. Ä. — Verb. $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}$ oder $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_8\text{N}_4\text{S}_2$. Durch

rhitzen der Toluolsulfaminodiazomalonsäure in Toluol. Gelbe anisotrope Nadeln (h. A. F. 192° (Zers.). Max. Auslöschung 43°. Reagiert neutral gegen Lackmus, in Alkalien u. NH_3 ; unl. in W., Ä. oder Lg., wl. in Bzl., l. in Chlf. u. A. — Spaltung mit 20%ig. HCl bei 160—170° ergibt *p*-Toluolsulfonsäure, ein wasserdampfvolatiles, unl. in W., Säure u. Ä., u. weißes, wl. Salz. F. 230° ($\text{N} = 15,54\%$). — NH_4 -Salz, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_3\text{S}$. Hygroskop. — *1-p*-Toluolsulfon-4-carbonsäureamid-5-oxytriazol. Aus dem Toluolsulfaminodiazomalonsäureäthylester u. NH_3 . Klebriges gelbes Öl. Lagert sich durch Aufkochen mit A. um in *4-p*-Toluolsulfaminocarbonsäure-5-oxytriazol (V), $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_3\text{S}$. Anisotrope Prismen. Zers.-Punkt 140°. L. in W., A., Ä., wl. in Chlf., Bzl., unl. in Lg. — *Bisdiammoniumsalz* des *1-Amino-4-p*-toluolsulfaminocarbonsäure-oxytriazols (VI), $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_5\text{S}$. Aus Toluolsulfaminodiazomalonsäureäthylester u. Hydrazinhydrat. Prismen. F. 212,5°. 44° max. Auslöschung. Wl. in k. W., A., Chlf., leichter in h. W., unl. in Ä., Lg., Bzl. Durch Ansäuern entsteht *1-Amino-4-p*-toluolsulfaminocarbonsäure-5-oxytriazol, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_3\text{S}$. Anisotrope Prismen. F. 164° (Zers.). L. in h. A., in anderen Lösungsmm. wl. bzw. unl. — *Benzalverb.*, $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}_3\text{S}$. Anisotrope Prismen. F. 212°. L. in h. W., wl. in organ. Lösungsmm. — *m*-Nitrobenzalverb., $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_6\text{N}_3\text{S}$. Anisotrope gelbe Nadeln. F. 210° (Zers.). — *o*-Oxybenzalverb., $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{N}_3\text{S}$. Schwachgelbe Schüppchen. F. 190° (Zers.). — II. Einw. von Toluolsulfonazid auf alkylierte Malonsäureäthylester. Beim Vers., der Rk. unter vermindertem Druck unterhalb der N_2 -Abspaltungstemp. des Azids nachzuführen, wird aus Azid u. Alkylmalonester nur *p*-Toluolsulfonamid-*i*-bernsteinsäure (F. 129°) bzw. Äthylmalonester (F. 111°) gefaßt, oberhalb dieser Temp. entsteht starker i-Nitrilgeruch u. Sulfonamid, das auch beim Vers. mit trockenem Äthylat als Kondensationsmittel entsteht. Auch aus dem Na-Salz des *p*-Toluolsulfon-4-carbonsäureäthylester-5-oxytriazols u. Dimethylsulfat, $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$, Chlorkohlensäureäthylester oder Benzoylchlorid wurden keine Substitutionsprodd. erhalten. (Journ. f. prakt. Ch. 112. 65—87. Heidelberg, Univ.)


SCHUSTER.

Theodor Curtius und Bruno Jeremias, *Die Einwirkung von Benzylsulfonazid auf Malonester*. (Vgl. vorst. Ref.) Aus Benzylsulfonazid u. Malonester wird außer der *1*-Benzylsulfon-4-carbonsäureester-5-oxytriazol der Benzylsulfonmalonester erhalten; Na-Äthylat als Kondensationsmittel bilden sich beide gleichzeitig, mittels wss. NaOH je nach den Versuchsbedingungen der eine oder andere Körper. Die Untersuchungen ergeben, daß die Anlagerung des Benzylsulfonazids an Malonester unter Einw. von Lauge oder Äthylat, niemals spontan erfolgt. Der Oxytriazolester (aus dem primär entstandenen Na-Salz durch Ansäuern erhalten) lagert sich unter dem Einfluß der negativen Benzylgruppe rasch in einen Diazomalonaminosäureester um, wobei die B. eines Triazolonesters als Zwischenprod. angenommen wird. Der Benzylaminodiazomalonester zeigt als Abkömmling des Diazomalonesters dessen Beständigkeit. Die Diazosäure ist dagegen sehr unbeständig, ändert fortwährend ihren S.-Punkt u. bildet beim Verkochen Benzylsulfaminykolsäure. Durch Einw. von NH_3 u. $\text{NH}_2\cdot\text{NH}_2$ auf den Ester wurden Verbb. erhalten analog der im vorigen Ref. erhaltenen Tolylderbb.

Der Benzylsulfaminomalonester aus Sulfazid u. Malonester ist ident. mit dem α -Prod. aus Benzylsulfochlorid u. Na-Malonester. Hydrazin wirkt auf ihn ein, er B. von Benzylsulfonessigsäurehydrazid, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CH}_2\cdot\text{SO}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}\cdot\text{NH}\cdot\text{NH}_2$, als Hauptprod. u. einer kleinen Menge des Diammoniumsalzes des cycl. sekundären Benzylmalonhydrazids (I). Die Diammoniumgruppe wird durch Benzaldehyd abgebaut, auf die B. des sekundären Hydrazids, das selbst nicht analysiert werden konnte, wird aus Analogien geschlossen. Das Benzylessigsäurehydrazid bildet eine *o*-Benzalverb., geht durch Diazotieren in das Azid über, das sich mit Anilin u. Toluidin zu Benzylsulfonessigsäureanilid bzw. -*p*-toluidid umsetzen läßt.

Versuche. Die Kondensation von Sulfazid u. Malonester unter ver-

mindertem Druck in der Wärme verlief resultatlos, durch NaOH in der Kälte entstand das Na-Salz des *Benzylsulfon-4-carbonsäureester-5-oxotriazols*, in der Wärme das *Na-Salz des Benzylsulfonmalonesters*, durch Na-Äthylat bildeten sich die



Na-Salze der beiden Ester. Durch Ansäuern wird zunächst der durch Umlagerung entstandene *Benzylsulfaminodiazomalonester* erhalten, aus der Mutterlauge das Ge-

misch von 1 Mol. *Benzylsulfaminodiazomalonester* mit 2 Moll. *Benzylsulfonmalonester* vom konstanten F. 73°. Seine Lösungsverhältnisse gleichen völlig denen des *Benzylsulfaminodiazomalonesters*. Durch Behandlung mit NaOH kann das Gemisch getrennt werden. — *1-Benzylsulfon-4-carbonsäureäthylester-5-oxotriazol*. Durch Ansäuern des Na-Salzes. Öl. Wandelt sich schnell um in den festen *Benzylsulfaminodiazomalonestersäureäthylester*, $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_3\text{S}$. Hellgelbe, zweiachsige Prismen von schiefer Auslöschung F. 123°. Ll. in h. A., Ä., Bzl., Chlf., wl. in W., k. A., PAe. — *Na-Salz des 1-Benzylsulfon-4-carbonsäureäthylesters*, $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{O}_5\text{N}_3\text{SNa}$. Aus *Benzylsulfonazid* u. *Malonester* oder aus *Benzylsulfaminodiazomalonester* u. Na-Äthylat. Gelbe Rosetten mit gerader Auslöschung aus A. F. 184° (Zers. u. Braunfärbung). L. in W., wl. in A. — NH_4 -Salz des *1-Benzylsulfon-4-carbonsäureäthylesters*, $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_5\text{N}_4\text{S}$. Aus dem Diazomalonester u. alkoh. NH_3 . Anisotrope Prismen. F. 140° (Zers.). L. in W. u. A. — *Ba-Salz* $\text{C}_{24}\text{H}_{24}\text{O}_{10}\text{N}_6\text{S}_2\text{Ba}$, krystallin. — *1-Benzylsulfon-4-carbonsäure-5-oxo-1,2,3-triazol*. Durch Verseifen des Diazomalonesters mit NaOH u. Ansäuern. Zäh, schmierig, farblos. M. Erstarrt beim Streichen auf Ton zur *Benzylsulfaminodiazomalonestersäure*, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_5\text{N}_3\text{S}$. Sehr unbeständig. Ll. in A., Ä., Chlf., wl. in Bzl. u. Lg. — *Benzylsulfaminoglykolsäure* $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_4\text{NS}$. Durch Kochen der Diazosäure mit W. Nadeln von gerader Auslöschung aus A. F. 120°. Ll. in h. W., A., Eg., Chlf., wl. in Ä. u. Lg., l. in Bzl. — *Benzylsulfamid*, $\text{C}_7\text{H}_9\text{O}_2\text{NS}$. Spaltprod. der vorigen Verb. (neben *Glykolsäure*) mittels HCl . Prismen aus W. F. 105°. — *1-Benzylsulfon-4-carbonamid-5-oxo-1,2,3-triazol*. Aus dem *Benzylsulfondiazomalonester* u. NH_3 u. Ansäuern. Rotgelbes klebriges Öl. Lagert sich um in *4-Benzylsulfaminocarbonsäure-5-oxotriazol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_4\text{S}$. Gelbe anisotrope Prismen von gerader Auslöschung aus A. F. 148° (Zers.). Wl. in W., Ä., Bzl., Chlf., Lg., l. in h. A. — NH_4 -Salz, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_5\text{S}$. Aus dem Diazomalonester u. überschüssigem NH_3 . Schwefelgelbe zweiachsige Krystalle. F. 155° (Zers.). — *Bisdiammoniumsalz des 1-Amino-4-benzylsulfaminocarbonsäure-5-oxo-1,2,3-triazols* $\text{C}_{10}\text{H}_{19}\text{O}_4\text{N}_6\text{S}$. Aus dem Diazomalonester u. Hydrazinhydrat. Anisotrope Krusten aus W. Zers.-Punkt 179°. Wl. in k. W. u. Ä. — *1-Amino-4-benzylsulfaminocarbonsäure-5-oxo-1,2,3-triazol*, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_5\text{S}$. Durch Ansäuern des Bisdiammoniumsalzes. Anisotrope Prismen. Zers.-Punkt 155°. Wl. in k. W., Ä., Bzl., Chlf., PAe., leichter l. in A. u. h. W. — *Benzalverb.* $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}_5\text{S}$. Schwach gelbe anisotrope Prismen. Zers. bei 190°. Wl. in W., Ä., Lg., l. in h. A., h. Bzl., Chlf. — *Acetonverb.* $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}_5\text{S}$. Gelbe anisotrope Nadelchen. Zers.-Punkt 178°. — *o-Oxybenzalverb.* $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_5\text{N}_5\text{S}$. Gelbe anisotrope Krystalle. Zers.-Punkt 187°. — *Na-Salz des Benzylsulfonmalonesters* (vgl. oben), $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{O}_6\text{SNa}$. F. 193°. Ll. in W., wl. in NaOH. Wss. Lsg. reagiert alkal. — *Benzylsulfonmalonester*, $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_6\text{S}$. Aus dem Na-Salz. Anisotrope Nadeln aus A. F. 83°. Löst sich wie *Benzylsulfonaminodiazomalonester*. — *Benzylsulfonessigsäurehydrazid*, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N}_2\text{S}$. Anisotrope Blätter aus absol. A. F. 148°. Wl. in W., Ä., leichter l. in Bzl., Chlf., Lg., ll. in h. A. — *Diammoniumsalz des cycl. sekundären Benzylsulfonmalonhydrazids*, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_4\text{S}$. Nebenprod. bei der Darst. der vorigen Verb. Anisotrope Nadeln aus verd. A. F. 232°. Sll. in W., unl. in absol. A., Ä., Bzl., Chlf., Lg. Wss. Lsg. reduziert ammoniakal. AgNO_3 -Lsg. Mittels Benzaldehyd wird die Diammoniumgruppe als unl. *Benzalazin* abgespalten. Im Filtrat *cycl. sekundäres Benzylsulfonmalonhydrazid*; zweiachsige Tafeln aus W. F. 253° (Zers.). ziemlich l. in W. u. A., wl. in Ä., Bzl., Lg., Chlf. Wss. Lsg. reagiert stark sauer, gibt

weißen Nd. mit AgNO_3 . — *Benzalverb. des Benzylsulfonessigsäurehydrazids*, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}_2\text{S}$. weiaehsige rhomb. Krystalle aus A. F. 179°. Wl. in W., Ä., Bzl., Lg., Chlf., leichter in h. A. — *Benzylsulfonessigsäureazid*, $\text{C}_9\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_3\text{S}$. Anisotrope Krystalle aus trockenem Ä. Zers. bei 81°. Verpuffen in der Flamme. Wl. in W., Lg., l. in Ä. u. zl., ll. in A. u. Chlf. — *Benzylsulfonessigsäureanilid*, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{NS}$. Farblose anisotrope Prismen aus A. oder Bzl. F. 170°. (LESSER u. MEHRLÄNDER, Ber. Dtsch. chem. Ges. 56, 1647; C. 1923. III. 779, erhielten gelbe Krystalle F. 171°.) Wl. in W., Ä., Lg., ll. in h. A., h. Bzl., Chlf. — *Benzylsulfonessigsäure-p-toluidid*, $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{NS}$. hemimorphe, anisotrope Prismen aus A. F. 151°. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 3—116. Heidelberg, Univ.) SCHUSTER.

Theodor Curtius und Wilhelm Stoll, *Über das Hydrazid und Azid der Acetylsulfanilsäure und der Sulfanilsäure*. (Vgl. vorst. Reff.) Das Hydrazid der Acetylsulfanilsäure wurde aus Acetylsulfanilsäurechlorid u. Hydrazinhydrat dargestellt, daraus wurden ein *Na-Salz*, eine AgNO_3 -Additionsverb., Kondensationsprodd. mit Aldehyden u. Ketonen, mittels NaNO_2 oder NaN_3 das Acetylsulfanilsäureazid gewonnen, das mit Malonester in Ggw. von Na-Äthylat das *Na-Salz des Acetylsulfanilsäuretriazolesters* ergab, nach dem Ansäuern den Acetylsulfanilsäureaminodiazomalonester.

Durch Verseifung des Acetylsulfanilsäurehydrazids mit konz. HCl u. Behandlung mit Na_2CO_3 wurde das Hydrazid der Sulfanilsäure erhalten, das auf dem üblichen Wege über das Säurechlorid nicht dargestellt werden konnte. Diazotierung bewirkte B. in salzsaurem *p-Diazobenzolsulfazid*, das mit Dimethylanilin kuppelte. Das Sulfanilsäureazid (*p-Amidobenzolsulfazid*) wurde ebenfalls durch Verseifung der entsprechenden Acetylverb. gewonnen. Wenn diazotiert, bildet es eine Diazoamidoverb. in schwach saurer Lsg., es kuppelt mit Aminen u. Phenolen; gegen Malonester verhält es sich analog der acetylierten Verb.

Versuche. *Acetylsulfanilsäurehydrazid*, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}_3\text{S}$. Aus Acetylsulfanilsäurechlorid (F. 149°) u. Hydrazinhydrat. Nadelchen aus A. F. 177—178° (starke Gesentw.). Unl. in k. W. u. A., Ä., Bzl., Toluol, Chlf., ll. in h. W., swl. in h. absol. A. gehen mit absol. A. verändert die Verb. nicht; Zers. beim Kochen mit W. oder verd. — *Acetylsulfanilsäurehydrazidchlorhydrat*, $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N}_3\text{ClS}$. Durch Lösen des Hydrazids in verd. HCl , Ausfällen mit konz. HCl . F. 163—165° (Gasentw.). Blättchen, flach zweiaehsig (negativ); ll. in verd. A., spaltet beim Erhitzen HCl ab, dissoziiert in W. — *Na-Salz des Acetylsulfanilsäurehydrazids*, $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_3\text{N}_3\text{NaS}$. Mittels Na-Äthylat. krystall., nicht hygroskop. Beim Erhitzen Zers. unter Gasentw. l. in W. Beim Ansäuern u. Verdünnen fällt das Hydrazid aus. — AgNO_3 -Salz des Acetylsulfanilsäurehydrazids, $(\text{COCH}_3 \cdot \text{NH} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{NH} \cdot \text{NH}_2)_2\text{AgNO}_3$. In W. oder absol. A., daraus Krystalle, die sich am Licht langsam dunkel färben. — *Benzalacetylsulfanilsäuretriazid*, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}_3\text{S}$. Nadelchen aus verd. A. F. 182°. Ll. in verd. Alkali, wird auch verd. Mineralsäuren unverändert wieder ausgefällt. — *Acetonylacetylsulfanilsäurehydrazid*, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}_3\text{S}$. Hexagonale Blättchen aus verd. A. F. 174°. — *Acetylsulfanilsäureazid*, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{N}_3\text{S}$. Aus dem Hydrazid mit HNO_2 oder aus Acetylsulfanilsäurechlorid u. NaN_3 . Aus Bzl. opt. zweiaehsige Krystalle. F. 107°. Ll. in A. u. in h. Bzl. Unl. in k. W. Schmilzt beim Kochen mit W. zu einer zähen, öligen M. in verd. u. konz. HCl , die selbst bei kurzem Kochen das Azid nicht verändert. Verseifung beim Kochen mit verd. Alkali. — *Na-Salz des Acetylsulfanilsäure-4-carbonäthylester-5-oxy-1,2,3-triazols*, $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{O}_6\text{N}_4\text{NaS}$. Durch Kondensation von Acetylsulfanilsäureazid mit Malonester bei Ggw. von Na-Äthylat oder aus Acetylsulfanilsäureaminodiazomalonester u. Na-Äthylat. Krystalle aus A. Uneinheitliche Ausbeute. Beim Erhitzen Zers. unter Dunkelfärben, kein Schmelzen; ll. in W., wl. in A. Säuren fallen aus seiner Lsg. in W. Acetylsulfanilsäure-4-carbonsäureäthylester-5-oxytriazol. Gelbes Öl, das rasch erstarrt zu Acetylsulfanilsäureaminodiazomalonester.

säureäthylester, $C_{13}H_{14}O_6N_4S$. Hellgelbe Nadelchen mit grünlichem Schimmer aus A. F. 146°. Ll. in h. A., Bzl., Chlf., wl. in W., Ä. u. k. A. — *Sulfanilsäurehydrazid*, $C_6H_9N_3O_2S$. Aus Acetylsulfanilsäurehydrazid durch Erwärmen mit konz. HCl während 5 Min. u. Versetzen mit Na_2CO_3 . F. 131°. L. in h. W. u. verd. A. Aus letzterem rhomb. Krystalle von guter Spaltbarkeit. Reduziert Fehlingsche Lsg. u. ammoniak. Ag-Salz-Lsg. Ll. in Alkalien u. Säuren. Auf dem Spatel erhitzt, schmilzt es un- Gasentw. u. Aufblähen; bei höherer Temp. Verpuffung, Rußflocken. — *Sulfanilsäurehydraziddichlorhydrat*, $C_6H_{11}O_2N_3Cl_2S$. Opt. einachsige trigonale Blättchen. — *Benzolsulfanilsäurehydrazid*, $C_{13}H_{13}O_2N_3S$. Nadelchen aus verd. A. F. 172°. Opt. zweiachsig, rhomb.; ll. in verd. Mineralsäuren. — *Acetonylsulfanilsäurehydrazid*, $C_9H_{13}O_2N_3S$. Prismen aus verd. A. F. 136°. — *Salzsaures p-Diazobenzolsulfazid*. Durch Einwirkung von HNO_2 auf Sulfanilsäurehydrazid. Durch Kuppeln mit Dimethylanilin entsteht *p-Benzolsulfazidazodimethylanilin*, $C_{14}H_{14}O_2N_6S$. Rubinrote Prismen aus h. A. F. 158°. Zeigt violettrot-gelben Pleochroismus. Unl. in W. Ll. in h. HCl (blaurote Farbe des salzsauren Salzes). — *Sulfanilsäureazid*, $C_6H_6O_2N_4S$. Durch Verseifen der Acetylverbindung mit konz. HCl u. Versetzen mit Soda. Reinigung über das salzsaure Salz. Gelbliche prismat. opt. positive Blättchen. F. 36°; ll. in A. u. Ä., wl. in Bzl. u. Chlf., woraus sich als gelbes Öl abscheidet. Verpufft beim Erhitzen auf dem Spatel. Verhältnismäßig beständig gegen Säuren, wird von Alkalien, besonders in der Hitze, leicht verseift. — *Salzsaures Salz*, $C_6H_6O_2N_4S$. Gelbliche monokline Nadeln mit Verzwägungen u. guter Spaltbarkeit nach der Längsrichtung. Dissoziiert in W. — *Diazamidobenzolsulfazid*, $C_{12}H_9O_4N_9S_2$. Gelbe Nadeln aus A. F. kann wegen Neigung zu explodieren nicht festgestellt werden. — *p-Benzolsulfazidazo-β-naphthol*, $C_{16}H_{11}O_3N_3$. Rotgelbe Nadelchen aus A. F. 161°. Opt. zweiachsig, unvollständige Auslöschung. Pleochroismus (violett getöntes Rotgelb, getöntes Rot). — *Na-Salz des Sulfanilsäure-4-carbonsäureäthylester-5-oxy-1,2,3-triazols*, $C_{11}H_{11}O_5N_4NaS$. Durch Kondensation von Sulfanilsäureazid mit Malonester in Ggw. von Na-Äthylat. Durch Ansäuern scheidet sich sofort der *Sulfanilsäureaminodiazomalonester*, $C_{11}H_{12}O_5N_4S$, aus. Opt. zweiachsig, monokline gelbe Blättchen aus A. Ll. in h. A. u. Bzl., wl. in W., unl. in Ä. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 117—37. Heidelberg, Univ.) SCHUSTER.


Shozo Yamaguchi, Über die katalytische Wirkung von reduziertem Kupfer auf Oxime. XV. Mitt. über die Beckmannsche Umlagerung. (Vgl. S. 1397.) Das l. c. angegebene Verf. wurde bei einigen Aldoximen u. Ketoximen zur Anwendung gebracht. Furfuraldoxim (F. 89°). 20 g gaben: 1,2 g Brenzschleimsäureamid, F. 141—143°; ferner Furfurol u. wenig einer sauren u. bas. Substanz. — Benzonylamidoxim (F. bis 77°). 4,5 g gaben: 1,2 g Benzamid; 0,4 g Benzoesäure; sehr wenig einer bas. Substanz; ca. 0,6 g Benzonitril. — Zimtaldoxim (F. 126°) gab kein definiertes Prod. Dibenzylketoxim (F. 119—120°). 8 g gaben: 0,2 g Phenylacetamid, F. 155°; Spuren Phenyllessigsäure, F. 76—77°; ziemlich reichlich Dibenzylketon; etwas Benzylcyanid. Benzophenonoxim. 14 g gaben: 0,2 g Tetraphenyläthan, F. 202—205°; Benzophenon, 4 g Diphenylmethan; Spuren saure u. bas. Substanzen. Bei einem anderen Versuch wurden außerdem Diphenylketimin, NH_3 u. ein Amin nachgewiesen. — Acetoxim. 20 g gaben: Aceton (in Form von 3 g Bisulfitverb.); i-Propylamin (in Form von 1, Hydrochlorid); NH_3 . (Bull. Chem. Soc. Japan 1. 35—40.) LINDENBAUM.

Shozo Yamaguchi, Über die katalytische Wirkung von reduziertem Kupfer auf Oxime. XVI. Mitt. über die Beckmannsche Umlagerung. (XV. vgl. vorst. Ref.) Nach ihrem Verh. gegen Cu in H-Atm. bei 200° können die Oxime in drei Gruppen eingeteilt werden: 1. Oxime, welche die zugrundeliegenden Carbonylverb. u. bas. Substanzen als Hauptprodd. liefern. Die Carbonylverb. können weiter zu KW-stoffen reduziert werden. Beispiele: Benzophenonoxim, Acetoxim. — 2. Oxime, welche hauptsächlich Säureamide liefern. Letztere werden weiter in Nitrile u. Säuren umgewandelt. Beispiele: Benzaldoxim, Benzonylamidoxim. — 3. Oxime, welche zwischen beiden Gruppen

ehen u. sowohl Carbonylverb. u. bas. Substanzen als auch Säureamide liefern, je nach der Natur der Radikale. Beispiele: *Furfuraldoxim*, *Zimtaldoxim*, *Dibenzylketoxim*, *ampheroxim*, *Acetophenonoxim*. — Vf. nimmt an, daß die katalyt. Wrkg. des Cu auf der B. von Cu-Verb. wie $RR'C:N\cdot O\text{Cu}$ oder $RR'C:N\cdot O(\text{Cu})\cdot H$ beruht. Vielleicht entsteht auch CuH_2 , da ja auch H frei wird. Mittels dieser hypothet. Cu-Verb. erklärt f. die verschiedenen Umwandlungen der Oxime. (Bull. Chem. Soc. Japan 1. 54—58. Kyoto, Univ.)

LINDENBAUM.

W. Dilthey und **C. Berres**, *Die Halochromie acylierter Aminochalkone und verwandter Verbindungen*. II. Mitt. über heteropolare Kohlenstoffverbindungen. (I. vgl. DILTHEY, Journ. f. prakt. Ch. [2] 109. 273; C. 1925. I. 2687.) *p*-Acetaminochalkone (gl. S. 1652) liefern *Perchlorate*, die weit beständiger sind als die der unsubstituierten Chalkone. Auch die Salze der *m*-Acetaminochalkone sind weniger beständig. Während andere Addukte (mit SnCl_4 , ZnCl_2 , SbCl_5) von wechselnder Zus. sind, zeigen die Perchlorate durchweg die Maximalzus. 1 Acetaminoketon + 1 HClO_4 . Als säurebindende Zelle konnte die Acetaminogruppe bei der auffallenden Beständigkeit der Salze a priori nicht ausgeschlossen werden, da sie der starken HClO_4 gegenüber zweifellos ein Bindungsvermögen besitzt. Die Frage ließ sich jedoch leicht zugunsten der CO-Gruppe entscheiden. Einmal besitzt das *Di*-[*p*-acetaminobenzal]-cyclo-hexanonperchlorat mit zwei Acetaminogruppen ebenfalls die Zus. 1:1. Sodann sind sämtliche Perchlorate tiefer farbig als die Ketone selbst. Da nun nach PFEIFFER (LIEBIGS Ann. 11. 228; C. 1925. I. 1400) Salzbildung am CO bathochrom, am NH_2 hypsochrom wirkt u. letzteres wohl auch für die Acetaminogruppe gelten wird, so müssen die vorgehenden Perchlorate Oxoniumsalze sein. Diejenigen der Acetaminochalkone können so folgt formuliert werden: $[\text{R}\cdot\text{CO}\cdot\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{CH}:\text{CH}\cdot\text{C}(\text{OH})\cdot\text{R}']\text{ClO}_4$. — Vom Di-acetaminobenzal]-cyclo-hexanon wurde ein gelbes u. ein violettes Perchlorat erhalten. Letzteres ist wasserfrei, ersteres enthält 1 H_2O . Von einem ähnlichen Fall berichtet PFEIFFER (l. c.); allerdings war hier das gelbe Salz wasserfrei u. das blaue wasserhaltig. Man könnte das H_2O für unwesentlich halten u. das gelbe Salz als Ammonium-, das violette als Oxoniumsalz auffassen. Nun war in der 1. Mitt. ausgeführt worden, daß die Färbung bei organ. Farbsalzen erstens auf dem Übergang eines unilaren in ein heteropolares Mol., zweitens auf der Ggw. koordinativer Lücken im homogenen Ion beruht. In diesem Sinne müßte man dem violetten Salz Formel I., im gelben Formel II. zuschreiben. In I. wäre das maximal vierortige (vgl. STECHE, 1753) zentrale C-Atom koordinativ ungesätt., während in II. die Lücke durch das O ausgefüllt wäre. — Die Perchlorate von *Formamino*- u. *Benzaminochalkonen* sind ebenfalls beständig. — Die Acylierung des NH_2 ist zwar mit einer hypsochromen Wrkg. verbunden, aber die Benzoylderivv. sind stets farbiger als die Acetyl- u. Formylderivv., daraus folgt, daß in diesen Gruppen noch die Farbe beeinflussende Kräfte enthalten sind.



Versuche. (Mit **A. Lachs** u. **P. Schier**.) Die meist bekannten Ketone wurden nach Vffn. (S. 1652), PFEIFFER (l. c.) u. KAUFFMANN u. BURCKHARDT (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46. 3813 [1913]), die Perchlorate u. Doppelverb. durchweg in Eg. dargestellt. — *p*-Acetaminobenzalacetophenon. *Perchlorat*, $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}\cdot\text{HClO}_4$. Mit 70%ig. HClO_4 . Orangegelbe Nadeln, Zers. bei 206—210°, in einem Falle 221°. Läßt sich aus Eg. (+ etwas HClO_4) unzers. umkrystallisieren. — *Perchlorat*, $3\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}\cdot 2\text{HClO}_4$. Durch Lösen des vorigen in sd. Eg. ohne HClO_4 . Dunkelorangefarbige Krystalle. — *Cl₄-Verb.* Orangegelbe Krystalle mit mehr SnCl_4 , als der n. Formel $2\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}\cdot\text{H}_2\cdot\text{Cl}_6$ entspricht. Nähert sich dieser Zus. beim Auskochen mit Eg. unter gleichzeitiger

Reingelbfärbung. — Verb. $3C_{17}H_{15}O_2N, HCl, ZnCl_2$, gelb, feinkörnig, F. 227° . — *p*-Benzaminobenzalacetophenon. Perchlorat, $C_{22}H_{17}O_2N, HClO_4$, orangefarbige Nadeln. — Verb. $C_{22}H_{17}O_2N, HSeCl_6$, orangefarbige Krystalle, F. $196-199^{\circ}$ (Zers.). — *p*-Formaminobenzalacetophenon, $C_{16}H_{13}O_2N$. Aus *p*-Aminochalkon u. sd. HCO_2H . Gelbe Prismen aus A., F. $171-172^{\circ}$. — Verb. $3C_{16}H_{13}O_2N, 2ZnCl_2$, sandfarbig gelbe Krystalle. — Perchlorat, $C_{16}H_{13}O_2N, HClO_4$, orangefarbige Nadeln aus Eg. (+ $HClO_4$), Zers. gegen $190-193^{\circ}$. Das Formyl wird leicht abgespalten. — *p*-Acetaminobenzal-*p'*-methoxyacetophenon. Verb. $2C_{18}H_{17}O_3N, H_2SnCl_6$, erst rot, nach Reinigung mit Eg. u. Ä. orangefarbig, bei 100° starker Gewichtsverlust, dann F. ca. $200-210^{\circ}$. — Perchlorat, $C_{18}H_{17}O_3N, HClO_4$, orangefarbige Nadeln, F. $195-198^{\circ}$ (Zers.). — Perchlorat, $3C_{18}H_{17}O_3N, 2HClO_4$, orangefarbige Prismen aus k. Lsgg., F. gegen 210° (Zers.). — Verb. $C_{18}H_{17}O_3N, ZnCl_2$, citronengelb, F. 250° (Zers.). — *p*-Benzaminobenzal-*p'*-methoxyacetophenon. Perchlorat, $C_{23}H_{19}O_3N, HClO_4$, violettrote Nadeln, F. $175-176^{\circ}$ (Zers.). — *p*-Formaminobenzal-*p'*-methoxyacetophenon, $C_{17}H_{15}O_3N$. Darst. wie oben. Gelbe Nadelbüschel, F. $163-164^{\circ}$. — Perchlorat, $C_{17}H_{15}O_3N, HClO_4$, braune, violettglänzende Nadeln, F. gegen 190° (Zers.). — *m*-Acetaminobenzalacetophenon. Perchlorat, $C_{17}H_{15}O_2N, HClO_4$, gelbe Krystalle, nur kurze Zeit haltbar. — $SnCl_4$ -Verb. sehr unbeständig. — *m*-Acetaminodibenzalacetophenon. Perchlorat, $C_{19}H_{17}O_2N, HClO_4$, rote Schuppen. — $SnCl_4$ -Verb. sehr zersetzlich. — *m*-Acetaminobenzalanisalacetophenon, $C_{20}H_{19}O_3N$. Aus dem Aminoketon (PFEIFFER, Journ. f. prakt. Ch. [2] 109. 41; C. 1925. I. 1733) mit h. Acetanhydrid. Hellgelbe Nadeln aus A., F. 177° . — Perchlorat, $C_{20}H_{19}O_3N, HClO_4$, dunkelrotviolett. — $SnCl_4$ -Verb. sehr unbeständig. — *p*-Acetaminodibenzalacetophenon, $C_{19}H_{17}O_2N$, gelbe Nadeln aus A., F. $178-179^{\circ}$. — Perchlorat, $C_{19}H_{17}O_2N, HClO_4$, gelbrot. — $SnCl_4$ -Verb. sehr unbeständig. — *p*-Acetaminobenzalanisalacetophenon, $C_{20}H_{19}O_3N$, gelbe Prismen aus A., F. $164-165^{\circ}$. — Perchlorat, $C_{20}H_{19}O_3N, HClO_4$, violette, grünlich glänzende Nadeln. — Di-[*p*-acetaminobenzal]-cyclo-hexanon. Gelbes Perchlorat, $C_{24}H_{24}O_3N_2, HClO_4 + H_2O$, Nadeln aus k. Lsgg., Zers. gegen 239° , recht beständig. — Violette Perchlorat, $C_{24}H_{24}O_3N_2, HClO_4$, Krystalle aus h. Lsgg., F. 239° (Zers.). Kann aus Eg. umkrystallisiert werden. — Das gelbe Salz geht über H_2SO_4 in das violette über. Letzteres nimmt in feuchter Luft zunächst mehr als 1 H_2O auf, jedoch wird der Überschuss über Na_2SO_4 abgegeben, so daß das gelbe Salz zurückbleibt. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 299-313. Bonn Univ.)






LINDENBAUM.

Jul. Bredt und Hans Ahrens, Über den Manasseschen α - und β -Oxycampher. In vorliegender Arbeit wird gezeigt, daß der von MANASSE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 3811 [1902]) entdeckte u. für einheitlich gehaltene α -Oxycampher (F. $203-205^{\circ}$) ein Gemisch zweier Isomeren ist. — Bei der Methylierung mit methylalkoh. HCl nach MANASSE entstehen nur ca. 50% β -Oxycamphermethylläther (F. $149-150^{\circ}$). Die Mutterlauge liefert, je länger sie steht u. je mehr HCl sie enthält, um so mehr eines Öles, welches MANASSE ohne weitere Unters. ebenfalls als einen Methylläther angesprochen hat. Wenn man die Konz. der HCl unter Vermeidung einer Temp.-Erhöhung im Verlaufe einiger Tage nur ganz allmählich steigert, so beginnt bei einer bestimmten Konz. die Abscheidung des festen Methylläthers. Beträgt dessen Menge ca. 50% (nach ca. 8 Tagen), so läßt sich eine weitere Abscheidung weder durch mehr HCl, noch durch mehr CH_3OH erzielen. Die Mutterlauge liefert nach Neutralisieren mit Soda, Entfernung des CH_3OH u. Ausäthern außer Spuren Öl ein festes Prod., das nach Umkrystallisieren aus Pentan bei $168-169^{\circ}$ schm. u. durchaus den Charakter eines Oxycamphers besitzt. Es gibt ein Na-Salz, Acetat, Chlorid (fl.), einen Methylläther (fl.), ferner das von MANASSE als Deriv. des α -Oxycamphers beschriebene *Semicarbazon* vom F. $182-183^{\circ}$ u. schm., aus diesem mit sd. Oxalsäurelsg. u. Dampfdest. regeneriert, bei $196-197.5^{\circ}$ (aus Lg.). Der niedrige F. des Rohprod. erklärt sich durch die große Zersetzlichkeit der Verb. An der Luft sinkt der F. in einigen Tagen auf 140 bis 142° , dann geht die krystalline Struktur verloren, u. aus der M. läßt sich Campher-

re isolieren. Daher ist auch der F. 196—197,5° vielleicht noch nicht als definitiv ansehen. Für diese Verb. behalten Vff. bis auf weiteres die Bezeichnung α -Oxy-campher bei. — Dem β -Oxycampher-methyläther hat MANASSE die monomolekulare Formel I. zugeschrieben. Dem widerspricht schon der Umstand, daß die Verb. weder Semicarbazon bildet noch grignardiert werden kann. Die kryoskop. Mol.-Gew.-best. in Bzl. u. die Best. der DD. nach BLEIER u. COHN unter vermindertem Druck Anilin u. Naphthalin als Heizfl. haben ergeben, daß sowohl der akt. wie auch der inact. feste β -Oxycampher-methyläther dimere Struktur besitzen. Auch KARRER u. TAKASHIMA (Helv. chim. Acta 8. 242; C. 1925. II. 177) sind zu diesem Ergebnis gekommen, aber die Auffassung dieser Autoren, daß eine lockere Assoziation von zwei Molek. eines monomeren cyclo-Acetals vorliege, kann nicht richtig sein. Vielmehr hat man es bei der großen Widerstandsfähigkeit des Äthers gegen hohe Temp. mit einer stabilen Verb. zu tun, die sich wahrscheinlich aus 2 Moll. β -Oxycampher (II.) durch Zusammenschluß zu dem labilen Diol III. u. stufenweisen Austausch der OH-Gruppen gegen Cl u. OCH_3 gebildet hat. Der umgekehrte Vorgang spielt sich bei der Verseifung des Äthers zu II. durch HCl ab. Der dimere Äther läßt sich zwar in den monomeren Äther zerlegen (vgl. unten), aber letzterer ist kein cyclo-Acetal u. dimerisiert sich nicht wieder. — α - u. β -Oxycampher sind zwei dem Borneol u. i-Borneol vergleichbare Stereoisomere. Auffallend ist ihr grundverschiedenes Verh. bei der Ätherifizierung. β -Oxycampher liefert mit reinstem SOCl_2 glatt ein Chlorid, das sich ebenfalls als solches erwiesen hat, beim Erwärmen mit NaOCH_3 -Lsg. in den dimeren Methyläther übergeht u. also der Formel III. (Cl für OH) entspricht. Es ist viel weniger beständig als der Methyläther, läßt sich auch im Vakuum nicht unzersetzt dest. u. zersetzt sich allmählich selbst im zugeschmolzenen Rohr u. in indifferenten Lösungsmitteln. Es entsteht aus dem Oxycamphergemisch von MANASSE, aber nur mit 40—50% Ausbeute. Aus der Mutterlauge kann man ein dunkelgelbes öliges Chlorid isolieren, welches im Gegensatz zum beständigen Chlorcampher auch im Hochvakuum nicht unzersetzt dest. u. sehr reaktionsfähig ist. Dasselbe Prod. entsteht aus dem rohen α -Oxycampher (F. 168—169°) u. SOCl_2 u. liefert nach Zerlegung mit Soda u. Dampfdest. reinen α -Oxycampher (F. 196—197,5°). — Kocht man das aus Oxycamphergemisch dargestellte Chloridgemisch nach Entfernung des SOCl_2 mit CH_3OH , so krystallisiert aus der Lsg. der dimere Methyläther aus, während die Mutterlauge nach mehrfachem Fraktionieren β -Oxycampher-methyläther von der monomolekularen Konst. I. liefert. Prodd. mit übereinstimmenden Eigenschaften erhält man, wenn man in die sd. methylalkoh. Lsg. von Oxycamphergemisch oder dimerem Methyläther einige Stdn. HCl einleitet, oder wenn man die Na-Verb. der Oxycampher (aus Oxycamphergemisch oder reinem α -Oxycampher mit Na in Ä.) mit CH_3J umsetzt. Es ist anzunehmen, daß sicher teilweise Gemische der Stereoisomeren α - u. β -Äther vorliegen, die sich durch Dest. nicht trennen lassen. I. wird im Gegensatz zum dimeren Äther von konz. HCl nicht verseift. — Die reaktionsfähigen fl. Chlorid des α -Oxycamphers (vgl. oben) erteilen Vff. Formel IV. und nehmen an, daß bei dessen Zerlegung mit W. oder CH_3OH der Dreiring wieder gebildet wird. — Daß der Manassesche Oxycampher nicht einheitlich ist, zeigt auch sein Verh. gegen Semicarbazid in methylalkoh. Lsg. Das β -Semicarbazon scheidet sich allmählich, obwohl nicht ganz rein, freiwillig ab; aus der Mutterlauge erhält man nach Entfernung des CH_3OH das α -Semicarbazon. Aus beiden Derivv. wurden die Oxycampher regeneriert. Diese Trennung ist der durch Ätherifizierung überlegen, da keine vielleicht umlagernd wirkende Säure verwendet wird. — Durch diese Befunde wird auch die Annahme von KARRER u. TAKASHIMA (l. c.) widerlegt, daß die B. des β -Oxycamphers erst durch Konfigurationsänderung bei der Methylierung des α -Oxycamphers oder bei der Verseifung des Methyläthers erfolge.


Versuche. Rac. α - + β -Oxycampher. Aus rac. Campherchinon nach MANASSE, das Filtrat vom Zn nicht alkalisieren, sondern mit NaCl sättigen, ausäthern, über

Na_2SO_4 trocknen. Aus Lg. oder Octan, F. 203—205°. — *Rac. fester β -Oxycampher methyläther*, $\text{C}_{22}\text{H}_{36}\text{O}_4$. Aus dem vorigen mit 5—9%ig. methylalkoh. HCl (Zimmertemp.) ca. 2 Tage). Prismen aus CH_3OH , F. 133—134°, Kp. 344° fast unzersetzt, Kp. 160°. — *Akt. fester β -Oxycampher methyläther*, $\text{C}_{22}\text{H}_{36}\text{O}_4$. Darst. nach MANASSE. F. 149—150°. — $[\alpha]_{\text{D}}^{18} = +174,2^\circ$, sonst wie das vorige. — *Akt. β -Oxycampher*, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$ (II.). Aus dem vorigen mit konz. HCl bei Zimmertemp., W. zusetzen, mit Soda alkalisieren, A.



äthern. Aus Lg., F. 211—212°. Kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in Bzl. stimmte zur monomolekularen Formel. — *Semicarbazon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}_3$, aus verd. A., F. 223—224°. Gibt bei Zerlegung mit Oxalsäure annähernd reinen β -Oxycampher, mit HCl dagegen ein sehr unbeständiges Prod. vom F. 192—193° (aus Lg.). — *Acetat*, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_3$. Mit SOCl_2 gereinigtem SOCl_2 gibt man nach u. nach in Ä. gel. β -Oxycampher (Eiskühlung, dann Zimmertemp.). Aus Ä., F. 207—208° (geringe Zers.), wl. in Lg., ll. in Bzl. — *Fl. α -Oxycampher methyläther*, $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_2$ (I.), Kp. 70—72°. — Der aus Manasseschem Oxycampher gewonnene *fl. Oxycampher methyläther*, $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_2$, besaß Kp. 72—73°, D.^{12,2}₄ 1,017, $n_{\text{D}}^{12,2} = 1,47406$, nach den übrigen Verff. dargestellte Präparate Kp. 68°, Kp. 70°, bis 79°, Kp. 81—82°. — *o*-[Phenyloxy]-*epi*-borneolmethyläther, $\text{C}_{17}\text{H}_{24}\text{O}_2$ (V.). Aus dem vorigen mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Sirupartiges Öl, Kp. 143—144°, D.^{11,2}₄ 1,0894, $n_{\text{D}}^{11,2} = 1,54493$. — *α -Oxycampher semicarbazon*, $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}_3$, aus verd. A., F. 183—184° (Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 273—98. Aachen, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

Julius v. Braun und Otto Bayer, Die Zinkstaubreduktion α -methylierter Anthrachinone und die Nicht-Existenz der sog. Anthracylene. Bei der Übertragung der bei Anthrachinon durchgeführten katalyt. Red.-Vers. (vgl. S. 1553) auf α -methylierter Anthrachinone traten nicht Anthracylene mit der Gruppierung I (vgl. ELBS, Journ. f. prakt. Ch. [2] 41. 121) auf, sondern die H-Zufuhr schlägt den Weg II $\rightarrow$ VI ein.




wobei zwischen II u. III als Zwischenglied noch die sehr unbeständigen Anthrachinone oder Oxyanthrone VII einzuschalten wären. — Gegenüber dem gewöhnlichen

hydroanthranol spalten die methylierten Verbb., besonders das Deriv. des α -Methylrachinons, weniger die zwei Dimethyldihydroanthranole weniger leicht intramolekular W. ab; die entsprechenden Anthrone zeigen geringere Alkalilöslichkeit u. Zersetzbarkeit; Vff. bevorzugen deshalb für alle drei Reihen gleichmäßig die Formulierungen VIII bzw. IX vor den isomeren X bzw. XI.

Versuche. α -Methylanthrachinon gibt mit der 20-fachen Menge wss. NH_3 + 5-fachen Menge Zn-Staub auf dem Wasserbad (5 Stdn.) ein Öl, das bei der Analyse nahe auf Methyldihydroanthranol stimmende Zahlen liefert u. bei der Dest. unter Reduktion von W. α -Methylanthrachen, $\text{C}_{15}\text{H}_{12}$, gibt; aus A., F. 86° . — Beschränkt man Dauer der Red. auf $1\frac{1}{2}$ Stdn., entsteht das oben formulierte Pinakon $\text{C}_{30}\text{H}_{26}\text{O}_2$, lose Nadeln, aus A. oder Lg., F. 147° ; unl. in Alkali, verbindet sich nicht mit Pikrin-ä., beim Erwärmen beständig; verschwindet bei weiterer Red. unter B. von Dihydroanthranol. Daneben entsteht in geringer Menge α -Methylanthron, $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{O}$; B. aus α -Methylanthrachinon in Dekalin bei 150 — 170° mit H_2 u. Ni; blaßgelbe Nadeln, aus A., F. 26 — 127° ; wl. in k., ll. in h. A., wl. in Lg., Ä.; unl. in k. Alkali, in w. weniger leicht als methyldihydroanthranol; läßt sich nicht acetylieren; Red. mit Zn-Staub u. NH_3 führt zum Methyldihydroanthranol. — 1,3-Dimethylanthrachinon gibt bei der Red. das 1-Methylverb. nach 2 Stdn. 1,3-Dimethylanthron, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}$, weiße Nadeln, aus A., F. $119,5^\circ$; kaum l. in k. Ä., A., swl. in w. NaOH. Außerdem das Pinakon $\text{C}_{32}\text{H}_{30}\text{O}_2$, lose Krystalle, aus Lg., F. 147° ; in A. leichter l. als das Anthron. Drittens entsteht beim Red. des Dimethyldihydroanthranol, das über das Pikrat in 1,3-Dimethylanthrachen, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}$, übergeführt wurde; schwach blau fluoreszierende Blättchen, aus Ä., F. 83° ; unl. in Eg. mit Chromsäure zum 1,3-Dimethylanthrachinon zurückoxydieren. — 1,4-Dimethylanthrachinon wird durch Zn-Staub u. NH_3 etwas weniger leicht angegriffen. Es entsteht nach $\frac{3}{4}$ -std. Reaktionsdauer Dimethyldihydroanthranol; dem Filtrat etwas Dimethylanthrachinon, der Dihydroanthranolkörper u. Dimethylanthron u. beim Eindampfen 1,4-Dimethylanthrachen. — Dimethyldihydroanthranol, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_2$, farblose Krystalle, F. 134 — 136° ; unl. in Alkali; spaltet beim Erhitzen W. unter B. von 1,4-Dimethylanthrachen u. scheint auch beim wiederholten Umkristallisieren aus Bzl. diesen Übergang zu erleiden. — 1,4-Dimethylanthrachen, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}$, t. über das Pikrat; farblose Nadeln, aus A., F. 74° ; wl. in k. A.; Pikrat, purpurne Nadeln, F. 140° ; ll. in h., wl. in k. A. — Gibt mit Chromsäure in Eg. das 1,4-Dimethylanthrachinon. — 1,4-Dimethylanthron, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}$, B., wenn man die NH_3 -Zn-Staub-, des Chinons etwas länger ($1\frac{1}{2}$ Std.) verlaufen läßt; farblose Krystalle, aus A., F. 30° ; rötet sich etwas am Licht; wird mit Chromsäure zum 1,4-Dimethylanthrachinon zurückoxydiert; swl. in w. NaOH mit gelber Farbe; läßt sich nicht acetylieren. (Dtsch. Chem. Ges. 59. 914—19. Frankfurt a. M. Univ.) BUSCH.

Julius v. Braun und Otto Bayer, Katalytische Hydrierungen unter Druck bei Gegenwart von Nickelsalzen. X. Acenaphthenchinon. (IX. vgl. S. 1553.) Bei der Hydrierung des Acenaphthenchinons I nach SKITA entsteht u. a. vermutlich über II u. III Verb. IV; bei Anwendung der Arbeitsbedingungen der Vff. erfolgt sie über II, V—X.


Versuche. Acenaphthenchinon (I), nicht über die Bisulfitverb. gereinigt, erhitzt mit w. Sodalsg. u. Tetralin, gibt bei der Druckhydrierung in Dekalin bei Ggw. Ni mit H unterhalb von 180° (z. T. bereits wenig oberhalb 120°) unter Aufnahme 4 At. H Acenaphthen (IX), Tetrahydroacenaphthen (X) u. Acenaphthenon (VI), — X ca. 20% , VI ca. 40% des Ausgangsmaterials; letzteres, aus Bzl.-PAe., F. 120° ; Bzl.-Lsg., F. 175° ; Phenylhydrazon, F. 90° ; VI kondensiert sich in alkal. Lsg. mit Isatin zum Chinolinderiv., sondern erleidet lediglich eine Selbstkondensation zum Acenaphthylidenon. — Hat I unterhalb 200° 4 At. H aufgenommen, so findet eine weitere Aufnahme erst um 240° statt. Führt man im ganzen 6 At. H zu, so erhält man in der Fraktion 100 — 150° (14 mm) in etwas mehr als 50% Ausbeute durch Ace-



naphthylen (VIII) gelblich gefärbtes IX u. X. Über 150° folgt bis 200° eine Fraktion die im wesentlichen aus IX, VI u. etwas *Acenaphthenol*, $C_{12}H_{10}O$, besteht; Krystalle aus Bzl., F. 146°; in Bzl. schwerer l. als das Keton VI; wl. in Ä., ll. in h. A.; gibt m. konz. H_2SO_4 grüne Halochromie-Farberscheinung; gibt mit Phenyl-i-cyanat bei 70° ein *Phenylurethan*, F. 137°; gibt mit w. $KHSO_4$ Gelbfärbung unter Wasserabspaltung. — Läßt man zu VI H hinzutreten (bei ca. 230°), ist es schwer, die Aufnahme auf 2 At. z. beschränken; es ergab sich das oben beschriebene Bild, nur daß die bei 100—150° schmelzende KW-stofffraktion bei weitem überwog. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 920—23. Frankfurt a. M., Univ.)

BUSCH.

Edward de Barry Barnett und Marcus Aurelius Matthews, Über 9-Methylen-9-Methyl- und 9,9-Dimethylanthon. Die Unters. über 9-Methylen-, 9-Methyl- und 9,9-Dimethylanthon gilt hauptsächlich deren Reduktionsprodd. — 9-Methylenanthron $C_{15}H_{10}O$, durch Enolisieren von Anthon mittels Piperidin u. Kondensation mit $HCHO$, F. 147—149°. — 9,10-Dihydro-[α,β -di(anthracyl-9)-äthan], $C_{30}H_{24}$ (I). Durch Red. von 9-Methylenanthron mit Zn-Staub u. NH_3 . Gelbe Nadeln aus Pyridin, dann aus Xylol. F. 308°. Violette Fluorescens der Lsgg. Das Methylenanthron verhält sich bei der Red. ähnlich wie ein α,β -ungesätt. Keton. Quer über das Ringsystem hinweg ist eine „Transannularkonjugation“ vorhanden. — 9-Methylanthon $C_{15}H_{12}O$. Durch Verseifen von 9-Methylanthracyl-10-methyläther. Gelbe Nadeln aus wasserhaltigem CH_3OH . F. 65°. — 9-Methylanthracylacetat, gelbliche Nadeln, F. 167°. — 9,9'-Dimethyl-9,10-dihydrodianthracyl, $C_{30}H_{24}$ (II). Durch Red. von



9-Methylanthon mit Zn-Staub u. konz. HCl. Gelbes krystallin. Pulver aus Bzl. schmilzt bei 300° noch nicht. — 9-Methylanthracenpikrat durch Behandeln des nicht krystallisierbaren Mutterlaugenprodd. der vorigen Verb. mit Pikrinsäure. F. 138°. — 9-Methylanthracen, $C_{15}H_{12}$. Durch Red. von 9-Methylanthon mit Zn-Staub u. NH_3 u. späteren Zusatz von NaOH. — Tetramethyltetrahydrodianthracyl, $C_{32}H_{24}$. Durch Red. von 9,9-Dimethylanthon mit Zn-Staub u. HCl. Aus Toluol, dann aus HCl-haltigem Amylalkohol. F. 315°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 767—70. London Sir John Cass Techn. Inst.)

SCHUSTER.

Gustav Heller, Neue Übergänge aus der Indol- in die Chinolinreihe. II. Nach Versuchen von **Rudolf Fuchs, Paul Jacobsohn, Martin Raschig und Elsbeth Schütze.** Bei der Einw. von Diazomethan auf Isatin wurde neben dem früher beschriebenen (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 741; C. 1919. I. 1028) 2,3-Dioxychinolin noch ein Isomeres aufgefunden, das 3,4-Dioxy-i-chinolin (I) oder ein Desmotropes

Umsetzung substituierter Isatine mit Diazomethan ergab ebenfalls Chinolinverb., denen die Derivate des 5-Chlor-, 5-Brom- u. 5,7-Dibromisatins in der Ketoform reiten, die Derivv. des 4-Chlor-5-bromisatins u. das 7-Methylisatins in der Enol-; bei der aus 4,5,7-Trimethylisatin entstandenen Verb. bildet sich ein Gleichgewicht der beiden Formen. N-methylierte Isatine reagierten ebenfalls mit Diazomethan unter B. von Chinolinderivv. Sie ergaben Enolformen, mit Ausnahme von Methylisatin.

Versuche. *3,4-Dioxy-i-chinolin* (I), $C_9H_7O_2N$. Durch Auflösen des rohen Dioxychinolins in NaOH u. Ansäuern des ausgeschiedenen krystallisierten Nates. F. 189—190°. Gibt keine Rk. mit $FeCl_3$. — *6-Chlor-2,3-diketotetrahydrochinolin*, $C_9H_6O_2NCl$. Aus 5-Chlorisatin. Schwach gelbe Nadeln aus A. F. 281—282°. In h. Aceton, im übrigen wl. Gibt keine Rk. mit $FeCl_3$. Schwach bas. — *6-Brom-2,3-diketotetrahydrochinolin*, $C_9H_6O_2NBr$. Schwach gelbe Nadeln aus A. F. 268°. — $C_9H_6O_2NBr$ (Isomeres der vorigen?). Aus dem Filtrat der vorigen Verb. Hellgelbe Nadeln aus A. F. 220° (Zers.); Dunkelfärben gegen 190°. Grüne Färbung mit $FeCl_3$. — *6,8-Dibrom-2,3-diketotetrahydrochinolin*, $C_9H_5O_2NBr_2$. Aus Eg. F. 242—243° (nach Verfärben). Ll. in Aceton, Chlf., A., wl. in Bzl. u. Lg. Gibt weder Rk. noch Acetylverb. — *6,8-Dichlor-2,3-diketotetrahydrochinolin*. Nur qualitativ nach. — *5-Chlor-6-brom-2,3-dioxychinolin*, $C_9H_5O_2NClBr$. Aus *4-Chlor-5-bromisatin* (aus A. + Aceton, F. 265—266°). Nadeln aus Eg. F. 259—260° (nach Dunklerwerden mit tieferer Farbe). Grüne $FeCl_3$ -Rk. — *Monoacetylverb.* $C_{11}H_7O_3NClBr$. F. 70°. Gibt keine Rk. mit $FeCl_3$. — *8-Methyl-2,3-dioxychinolin*. Aus 7-Methylisatin. Langsame Rk. Aus A. F. 253°. Bildet krystallisiertes Na-Salz. Grüne Rk. in A. — *5,6,8-Trimethyl-2,3-dioxychinolin*, $C_{12}H_{13}O_2N$. Nadeln aus Eg. F. 199°. Wl. in A., zeigt dann grüne $FeCl_3$ -Rk. — *N-Methyl-2-keto-3-oxychinolin* (II), $C_9H_7O_2N$. Aus Essigester Täfelchen. F. 185—186°. Ll. in Lösungsmm. bis auf 1. in w. verd. NaOH, beim Erkalten Salzabscheidung. Schwach bas.; grüne Rk. in A.; keine Rk. mit o-Phenylendiamin u. Phenylhydrazin. — *5-Chlor-2-methylisatin*, $C_9H_6O_2NCl$. Gereinigt über das isatinsaure Salz. Aus Essigester Nadeln. F. 173—174°. Ll. in Lösungsmm. bis auf Lg. — *6-Chlor-N-methyl-2,3-diketotetrahydrochinolin*, $C_{10}H_8O_2NCl$. Bläulichgrüne Krystalle aus Essigester. F. 196—197°. Wl. in NaOH; gibt keine Rk. mit $FeCl_3$. — *N,7-Dimethylisatin*, $C_{10}H_9O_2N$. Aus 7-Methylisatin. Gereinigt über das isatinsaure Salz. Dunkelrote Säulen aus A. F. 171—172°. — *N,8-Dimethyl-2,3-diketotetrahydrochinolin*, $C_{11}H_{11}O_2N$. Spieße aus Essigester. F. 168—168,5°. Unl. in Alkali, schwach bas., ll. in h. Solvenzien bis auf 6. — *6,8-Dibrom-N-methyl-2,3-diketotetrahydrochinolin*, $C_{10}H_7O_2NBr_2$. Aus N-Methylisatin (F. 175—177°). Nadeln aus Essigester. F. 194—195°. Keine Rk. — *N,4,5,7-Tetramethylisatin*, $C_{12}H_{13}O_2N$. Aus 4,5,7-Trimethylisatinkalium. Nadeln aus Eg. + W. F. 199—200°. Diazomethan wirkt sehr träge unter B. geringer Mengen eines weißen Körpers auf die Verb. ein. — β -Naphthisatin u. Diazomethan: langsame Einw. Farblose Nadeln aus Bzl. u. Lg. F. 254—256°. — *N-Methyl-2-naphthisatin*, $C_{14}H_9O_2N$. Rote Stäbchen aus Essigester. F. 216—218°. Ll., ausgenommen in Lg. Diazomethan wirkt sehr träge ein. — *4,6-Dimethylisatin* bildet Ag-Salz, kein tieffarbiges Salz mit Na-Äthylat. — *Acetylverb.*, $C_{12}H_{11}O_3N$. Aus Lg. gelbe Nadeln. F. 151°. Ll. außer in W., gelbe Lsg. in NaOH. — *4,6-Dimethyl-3-isatoxim*, $C_{10}H_{10}O_2N_2$. Gelbe Krystalle. F. 220—221°. Ll. in A., Aceton, CO_2 scheidet die Verb. aus der alkal. Lsg. wieder ab. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1904—10. Leipzig, Univ.)

SCHUSTER.

K. v. Auwers und **H. Stuhlmann**, *Über die Isomerieverhältnisse in der Pyrazolreihe*. VIII. *Über das 3(5)-Methyl-5(3)-phenylpyrazol*. (VII. vgl. v. AUWERS u. MAUSZ, 32.) Vff. haben die Isomerieverhältnisse bei der Alkylierung eines in 3 u. 5 mit Alkylgruppen von verschiedener Valenzbeanspruchung besetzten Pyrazols untersucht.

Das 3,5-Methylphenylpyrazol (I) liefert bei der Methylierung II. u. III. im ungefähren Mengenverhältnis 1:3 nebeneinander, die sich durch die Pikrate glatt trennen lassen. Die Verteilung der Formeln erfolgte zunächst nach spektrochem. Beobachtungen an Phenylpyrazolen. Die Struktur der Verb. konnte jedoch auch auf chem. Wege bewiesen werden. Erfolglos waren Kondensationen des Benzoylacetons bzw. seines A-Äthyläthers (vgl. CLAISEN, S. 2336) u. des Acetylphenylacetylen mit Methylhydrazin, weil dabei immer II. u. III., letzteres wieder vorherrschend, entstanden. Als auch das nach ANDRÉ (Ann. Chim. et Phys. [8] 29. 576 [1913]) dargestellte Additionsprod. von Dipropylamin an Acetylphenylacetylen (F. 46°, Kp.₁₂ 193°; Pikrat, F. 12 bis 121°) mit alkoh. Methylhydrazinlg. im Rohr auf 100° erhitzt wurde, erhielt man nur das eine Isomere. Da Acetylphenylacetylen selbst II. u. III. liefert, konnte die Rk. nur unter B. von II. verlaufen sein:



Bei der Äthylierung von I entstehen IV. u. V. im ungefähren Mengenverhältnis 1:9. — Wenn man das aus II. oder III. erhältliche quartäre Salz VI. durch Erhitzen im Vakuum über den F. spaltet, so bildet sich doppelt so viel III. als II. Das C₆H₅ beeinträchtigt also die Haftfestigkeit des benachbarten CH₃ am N, obwohl nicht so stark wie Cl, welches restlose Abspaltung des benachbarten CH₃ bewirkt (v. AUWERS u. NIEMEYER, 3. Mitt.). Umgekehrt übt CH₃ eine schwächere Wrkg. aus als C₆H₅, da 1,2,3-Trimethylpyrazoliumjodid gleiche Mengen 1,3- u. 1,5-Dimethylpyrazol liefert. Über die quartären Salze aus IV. u. V. kann vorläufig nur mitgeteilt werden, daß man aus dem Jodmethylat von V. glatt V. zurückerhält. C₂H₅ haftet also auch hier fester am N als CH₃. — Aus den bisherigen Verss. geht klar hervor, daß 1,5-Dialkyl-3-phenylpyrazole begünstigtere Gebilde sind als 1,3-Dialkyl-5-phenylpyrazole. — Auch die N-Carbonsäureester von I liefern bei der therm. Zers. unter CO₂-Abspaltung die beiden isomeren Pyrazole in den obigen Mengenverhältnissen. — Ein N-Carbonamid von I hat bereits POSNER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 3983 [1901]) beschrieben. V. haben dasselbe auf anderem Wege dargestellt. Es hat sich nicht feststellen lassen, ob die Gruppe CONH₂ die Nachbarschaft des CH₃ oder C₆H₅ vorzieht, da ein Isomeres auf keine Weise erhalten werden konnte. Kondensiert man statt des Benzoylacetons selbst (POSNER) seinen A-Äthyläther mit Semicarbazid, so erhält man mit guter Ausbeute dasselbe Carbonamid. Acetylphenylacetylen gibt nur ein Semicarbazid (aus Bzn., F. 127—128°), das sich — analog den Semicarbazonen des Phenylpropionaldehyds (v. AUWERS u. OTTENS, S. 637) — nicht in ein Pyrazolcarbonamid umlagern läßt. — Aus Benzoylacetone oder seinem A-Äthyläther u. Phenylhydrazin bildet sich zunächst — offenbar über das Additionsprod. VII. — eine Verb., die das Phenylhydrazon VIII. oder das Oxypyrazolin IX. sein kann. Denn daß sie kein Oxim liefert, beweist nichts gegen VIII., da diese Rk. auch bei X. (vgl. unten) versagt. Ihren Eigenschaften Vff. übereinstimmend mit CLAISEN (l. c., Anm.). Sie ist in Berührung mit etwas Alkali ganz haltbar, wird aber von Spuren Säure (Laboratoriumsluft) schnell zum 3-Methyl-1,5-diphenylpyrazol vom F. 63° (7. Mitt.) kondensiert. Ein isomeres Pyrazol war nicht nachweisbar. — Bei der Einw. von C₆H₅COCl in Pyridin auf VII. (IX.) entstand kein Benzoylderiv., sondern zum ersten Male die in der 7. Mitt. erwähnte stabile Form des 3-Methyl-1,5-diphenylpyrazols (Krystalle aus Bzn., F. 63 bis 73°). — Zum Vergleich mit VIII. (IX.) wurde das Hydrazon X. dargestellt, das in zwei Formen aufzutreten scheint. Es reagiert nicht mit einem zweiten Mol. Keto reagens, vielmehr verdrängen p-Nitrophenylhydrazin u. NH₂OH den Hydrazinrest. Das zweite CO des Benzoylacetons ist demnach wenig reaktionsfähig; daß es aber in Tätigkeit treten kann, zeigt die B. von III. u. des Dioxims (CLAISEN, l. c.).

Versuche. 3,5-Methylphenylpyrazol (I). Darst. nach SJOLLEMA (LIEBIG)

n. 279. 248 [1894]). Kp.₁₄ 191—193°, Prismen aus Bzn., F. 127°. *Pikrat*, dunkle Prismen aus CH₃OH, F. 159°. — *N-Acetylderiv.*, F. 41°. — *N-Benzoylderiv.*, H₄ON₂. Mit C₆H₅COCl bei 180°. Prismen aus A., F. 83—84°, ll. in Ä., Aceton, in A., Bzn. — *4-Chlorderiv.*, C₁₀H₉N₂Cl. Mit SO₂Cl₂ in Ä. (Kühlung) über das Hydroxid (F. 196°). Warzenförmige Nadelchen aus Bzn., F. 108—110°, ll. in A., Ä. — *Formderiv.*, F. 96°. Hydrobromid ident. mit dem „Methylphenylpyrazoldibromid“

$$\begin{array}{lll} \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{C}\cdot\text{CH}\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 & \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{C}\cdot\text{CH}\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 & \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{C}\cdot\text{CH}\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 \\ \text{CH}_3\cdot\text{N}\text{---}\text{N} \text{ II.} & \text{N}\text{---}\text{N}\cdot\text{CH}_3 & \text{C}_4\text{H}_5\cdot\text{N}\text{---}\text{N} \text{ IV.} \\ \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{C}\cdot\text{CH}\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 & \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{C}\cdot\text{CH}\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 & \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{C}(\text{OR})\cdot\text{CH}_3 \\ \text{N}\text{---}\text{N}\cdot\text{C}_2\text{H}_5 & \text{VI.} \left[\begin{array}{l} \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{C}\cdot\text{CH}\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 \\ \text{CH}_3\cdot\text{N}\text{---}\text{N}\cdot\text{CH}_3 \end{array} \right] \text{J} & \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{NH}\cdot\text{NH} \text{ VII.} \\ \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 & \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{C}(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 & \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{C}\cdot\text{CH}_3 \\ \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{NH}\cdot\text{N} \text{ VIII.} & \text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{N}\text{---}\text{N} \text{ IX.} & (\text{C}_6\text{H}_5)(\text{CH}_3)\text{N}\cdot\text{N} \text{ X.} \end{array}$$

SJOLLEMA. — Methylierung von I mit CH₃J (100°, 7 Stdn.). Rohprod. mit Acetylid kochen, im Vakuum bis 100° abdest., Rückstand in Ä. mit eisk. verd. HCl zersetzen, Basen mit Lauge abscheiden. Kp.₁₈ 150—170°. Äth. Lsg. mit Pikrinsäure zersetzen. Das sofort ausfallende Salz liefert *1,5-Dimethyl-3-phenylpyrazol*, C₁₁H₁₂N₂, Kp.₁₂ 162°, Prismen aus PAe., F. 35—37°, D.₂₀⁴ 1,074, n_{He}²⁰ = 1,594, E Σ für D = +0,96, für β-α = +35%. *Pikrat*, gelbe Blättchen aus CH₃OH, F. 184°. — Äth. Mutterlauge dieses Pikrats liefert ein zweites Salz. Daraus *1,3-Dimethylphenylpyrazol*, C₁₁H₁₂N₂ (II.), Kp.₁₂ 146°, Krystalle, F. 21—22°, D.₂₀⁴ 1,061, n_{He}²⁰ = 1,583, E Σ für D = +0,63, für β-α = +23%. *Pikrat*, gelbe Nadeln aus CH₃OH, F. 128°, leichter l. als das Isomere. — Methylierung in Ggw. von Alkali gibt etwas geringere Gesamtausbeute. — *1,2,5-Trimethyl-3-phenylpyrazoliumjodid* (VI.). Aus I oder III. mit CH₃J (100°, 8 Stdn.). Aus A. oder Chlf., F. 187°. — Äthylierung I mit C₂H₅Br (100°, 1 Tag). Weiter wie oben. — *1-Äthyl-5-methyl-3-phenylpyrazol*, C₁₂H₁₄N₂ (V.), blumenartig riechendes Öl, Kp.₁₄ 170°, D.₂₀⁴ 1,048, n_{He}²⁰ = 1,582, für D = +1,04, für β-α = +35%. *Pikrat*, gelbe Prismen aus A., F. 196—197°, — *1-Äthyl-3-methyl-5-phenylpyrazol*, C₁₂H₁₄N₂ (IV.), blumenartig riechendes Öl, Kp.₁₄ 145°, D.₂₀⁴ 1,034, n_{He}²⁰ = 1,562, E Σ für D = +0,61, für β-α = +19%. *Pikrat*, gelbe Nadeln aus CH₃OH, F. 116—117°, ll. in A., Ä. — *1-Äthyl-2,5-dimethyl-3-phenylpyrazoliumjodid*, C₁₃H₁₇N₂J. Aus V. u. CH₃J (100°, 8 Stdn.). Prismen aus A. + Ä., F. 10—121°, meist ll. — *3,5-Methylphenylpyrazol-N-carbonsäuremethylester*, C₁₂H₁₂O₂N₂. Aus I u. Cl·CO₂CH₃ (Wasserbad, 10 Stdn.). Prismen aus Bzn., F. 61,5—62°, zll. in Ä. ll. in A., Bzn. — *Äthylester*, C₁₃H₁₄O₂N₂, Rhomboeder aus Bzn., F. 73,5—74,5°. — Spaltung werden die Ester unter 200 mm auf 180—200° erhitzt. — Leitet man in Äth. Lsg. von I bei —12° COCl₂ ein, filtriert das Hydrochlorid von I ab, dunstet es ab, kocht den Rückstand mit Bzn. aus, so bleibt ungel. *Kohlensäuredi-[methylphenylpyrazolid]*, C₂₁H₁₈ON₄, Prismen aus A., F. 136°. — Aus der Bzn.-Lsg. erhält man *3,5-Methylphenylpyrazol-N-carbonsäurechlorid*, C₁₁H₉ON₂Cl, Nadeln aus Leichtfl., F. 94°, ll. — *N-Carbonamid*, C₁₁H₁₁ON₃. Aus dem vorigen mit NH₃ in Bzl. Nadeln, F. 7—158°. Erstarrt etwas über dem F. u. schm. dann noch nicht bei 300° (vergl. B. von Cyanursäure.). — *Acetylphenylacetylen*. Darst. nach ANDRÉ (l. c.), Verhütung von CH₃COBr vermeiden, äth. Lsg. des Rohprod. mindestens 10-mal mit Wasser schütteln. Liefert mit Phenylhydrazinacetat in k. A. 3-Methyl-1,5-dimethylpyrazol (F. 63°). — *A-Benzoylacetonäthyläther*, C₁₂H₁₄O₂. Darst. nach CLAISEN (Dtsch. Chem. Ges. 40. 3909 [1907]). Kp.₁₃ 162—164°, D.₂₀⁴ 1,056, n_{He}²⁰ = 1,583, E Σ für D = +1,73, für β-α = +90% (Mittelwerte). — *Verb.* C₁₆H₁₆O₂N₂ (oder IX.). Aus Benzoylaceton oder dem vorigen u. Phenylhydrazin in Ä. (Kühltemp.). Krystalle aus absol. CH₃OH, F. 150—153°, ll. in Ä., weniger in A., Bzn. — *N-[p-Nitrophenyl]-3,5-methylphenylpyrazol*, C₁₆H₁₃O₂N₃. Aus Benzoylaceton u. p-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid in sd. verd. A. Nadeln aus CH₃OH,














F. 100—101°. — *Benzoylacetone-methylphenylhydrazon*, $C_{17}H_{18}ON_2$ (X.). 1. Form. Aus Benzoylacetone oder dem A-Äthyläther u. as. Methylphenylhydrazin in Ä. tagelangem Stehen u. gelindem Erwärmen. Schwach bräunliche Prismen aus Bzl. F. 78—79°. 2. Form: Ebenso auf dem Wasserbad (3 Std.). Schwach grünlich gelbe Krystalle aus CH_3OH , F. 107°, ll. in Ä. Gibt keine $FeCl_3$ -Rk., wird durch Lauge nicht gespalten. Liefert mit p-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid in k. A. ob. Pyrazol $C_{16}H_{13}O_2N_3$, mit NH_2OH , HCl in sd. A. 3-Methyl-5-phenylisoxazol (aus F. 67°). — *Benzoylderiv.*, $C_{24}H_{22}O_2N_2$. Mit C_6H_5COCl in Pyridin. Bräunliche Kryst. aus Bzl., F. 185—186°, wl. in A., Ä., schwer verseifbar. Vielleicht liegt ein C-Der. vor. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1043—55. Marburg, Univ.) LINDENBAUM

Heinrich Biltz und Günther Schiemann, *Darstellung von Parabansäure*. *R. Harnsäure* wird durch Aufnahme in w. konz. H_2SO_4 u. Fällen mit W. gereinigt, u. der reinen Harnsäure durch Oxydation mit H_2O_2 in Ggw. von HCl Parabansäure gewonnen. Aus W. unter Zusatz einiger Tropfen HNO_3 . Zers.-Punkt 243° (P. Dtsch. Chem. Ges. 59. 721—22. Breslau, Univ.) SCHUSTER

G. Schroeter, *Über die Isomerie zwischen dimeren Ketenen und Cyclobutandion*. III. Mitt. (II. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49. 2697. 52. 2227; C. 1917. I. 11. 1920. I. 161.) I. *Über die Synthese von Acetontetracarbonsäureester* (bearbeitet von **Emil Finck**). Die Rk. zwischen Phosgen u. Na-Malonsäuremethylester unter von Acetontetracarbonsäureester (III) verläuft neben einer Reihe Ablenkungsweiterer Umsetzungsrrk. (vgl. den experimentellen Teil). — III gibt nicht analog d. symm. Dialkylacetondicarbonsäureester (I. c.) mit H_2SO_4 den cyclo-Butan-1,3-dicarbonsäureester, sondern ein Kondensationsprod., das sich als ein ausgezeichnete Mittel zur *Methylierung für tertiäre Amine* erwies u. der Formel XIII entspricht, un. der Annahme, daß III in H_2SO_4 -Lsg. besonders geneigt ist, in einer Di-enol-Form zu reagieren, aus der durch Abspaltung von CH_3OH dann *Methoxyoxypyrondicarbonsäureester XII* oder desmotrop *Methoxypyronondicarbonsäureester XIII* entsteht. Die aus XII bzw. XIII mittels Pyridin oder Chinolin u. Zers. mit HCl erhaltene Sä. bildet Salze mit 1 oder 2 Äquivalenten der Basen u. bildet wohl mehrere Desmotropformen, die zu betrachten sind als *Acetontetracarbondiesterdisäureanhydrid* (XVII), α' -Oxy- α , γ -pyronondicarbonsäureester (XVIII), als α , α' -Dioxypyrondicarbonsäureester (XIX), als γ -Oxy- α , α' -pyronondicarbonsäureester (XX) u. schließlich als γ , α' -Dioxypyrondicarbonsäureester (XXI). — Verss., diese Kondensationsprodd. zur Abspaltung von CO_2 unter Erhaltung des Ringes zu bringen, ergaben Auflösung des Molek. verbandes.

II. *Struktur der synthetischen Cyclobutan-1,3-dionderivate*. Eine Nachprüfung, die Formel der *Dialkyl-cyclo-butan-1,3-dioncarbonsäureester* richtig aufgestellt ist, nicht diesen Körpern auch Alkoxy-pyrononformeln zuzuerteilen sind, führte zur Ablehnung dieser; es besteht aber doch zwischen den Alkoxy-pyrononen u. cyclo-Butandioncarbonsäureestern eine Art Desmotropie, die bei manchen Rk., z. B. der Alkylierung der Salze der Dialkyl-cyclo-butandioncarbonsäureester, in Erscheinung tritt (vgl. Original). — Die Carboxyalkylierung der Dialkyl-cyclo-butandioncarbonsäureester wird im Gegensatz zu den Auffassungen von STAUDINGER (Helv. chim. Acta 7. C. 1924. I. 1778), DIECKMANN u. WITTMANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 33. C. 1923. I. 409) u. der früheren der Vff. jetzt folgendermaßen erklärt: Ebenso wie bei der Alkylierung der Dialkyl-cyclo-butandioncarbonsäureester werden bei der Carboxyalkylierung zwar momentan die C-substituierten Körper XXVI gebildet, diese gehen aber schon bei ihrem Entstehen in die Pyrononform XXVII hinüber; wird aber die eingeführte Carboxyalkylgruppe mittels Na-Alkoholats abgespalten, so gleitet die Pyrononform XXVIII sofort in die cyclo-Butandionform zurück, u. es entsteht wieder das Na-Salz des Dialkyl-cyclo-butandioncarbonsäureesters (XXIX) (Übergang eines C-acylierten in ein C-acyliertes β -Diketoderiv.). — Diese Erklärung steht mit allen bis

kannt gewordenen Eigenschaften dieser Körper in Übereinstimmung. — Damit
 ert sich auch die Isomerie zwischen dem dimeren *Methylketencarbonsäureester*,
 $I_3 \cdot C(CO_2CH_3) : CO)_2$, u. dem vermeintlichen *Dimethyl-cyclo-butanondicarbonsäure*,
 anders auf, als früher angenommen wurde: letzterer lagert sich in XXVII um. —
 von den Vff. früher angestellten Erwägungen über die Isomerie zwischen *dimeren*
enen u. *cyclo-Butan-1,3-dionen* sind damit keineswegs entkräftet.




Versuche. 2 Moll. Natriummalonsäuremethylester gibt mit 1 Mol. $COCl_2$ in
 form oder in Bzl. *i-Butylenhexacarbonsäuremethylester*, $C_{16}H_{20}O_{12}$ (VII); farblose
 stalle, aus A., F. 114—115°; wl. in W., ll. in organ. Lösungsmm.; gibt mit NaOH
 gelbes, in W. ll. Na-Salz, titriert sich mit NaOH u. Phenolphthalein einbas., entfärbt
 alkal. Lsg. sofort Permanganat, nimmt Br nur langsam auf. Daneben entsteht V
 II. — Um die B. von VII zu vermeiden, wurde ein großer Überschuß von $COCl_2$
 angewendet. Dabei entsteht *Methantricarbondiestersäurechlorid*, $Cl \cdot CO \cdot CH(COOCH_3)_2$
 ; das Rk.-Prod. gibt in CH_3OH mit Na-Methylatlg. das wl. Na-Salz des *Methan*
tricarbonsäuretrimethylesters, $C_7H_9O_6Na$ (V). Bei dem im Rohöl vorhandenen Säure
 rid handelt es sich um IV oder das *Methantricarbonestersäuredichlorid*, $(COCl)_2CH \cdot$
 CH_3 (VI), die beim Zers. mit W. in HCl, Malonsäure u. CO_2 zerfallen. — Außerdem
 steht der *Acetontetracarbonsäuremethylester*, $C_{11}H_{14}O_9 = CO[CH(CO_2CH_3)_2]_2$ (III);
 stalle, aus 80%ig. A., F. 59—60°; auch im Hochvakuum nicht ohne Zers. destillier
 wl. in W., ll. in Soda, Dicarbonat; titriert sich mit NaOH u. Phenolphthalein
 rf einbas. Die neutralen Salzsgg. geben mit Metallsalzen wl. Fällungen: Cu-Salz
 n, Ni blau, Co rosa, Pb, Hg, Ca, Sr, Ba weiß, Fe^{++} gelb, Fe^{+++} blutrot (l. in A.); das
 Salz $C_{22}H_{26}O_{18}Cu + 3H_2O = Cu \left[O \cdot C \begin{array}{c} C(CO_2CH_3)_2 \\ >O \\ CH(CO_2CH_3)_2 \end{array} \right] + 3H_2O$, blaue Nadeln,
 Bzl., wird mit A. wieder grün, eignet sich zur Reindarst. von III. — *Acetontetra*
tricarbonsäuremethylesteranil, $C_{17}H_{19}O_8N$, aus 1 Mol III mit 1 Mol w. Anilin; weiße Nadeln,
 A., F. 102°. — Als Nebenprodd. bei der Darst. von III wurden noch erhalten:
 rückgebildete *Malonsäuremethylester*, Kp.₁₃ 78°, *Methantricarbonsäuretrimethylester*,
 $C_{10}O_6 = CH(CO_2CH_3)_3$ (V), Kp.₁₃ 120—130°, aus A., F. 46° u. zuweilen, bei Ver
 dung von sehr viel $COCl_2$ das Na-Salz von XIII. — α' -*Methoxy- α , γ -pyronon- β , β'*
tricarbonsäuremethylester, $C_7H_9O_5(OCH_3)_3$ (XIII), aus III in H_2SO_4 , die 10% freies SO_3
 hält, bei 18°; Krystalldrüsen, aus Bzl. oder CCl_4 , F. 122—123°; bei längerer Einw.

von H_2SO_4 + mehr SO_3 entsteht als Nebenprod. sein Entmethylierungsprod. **XII** wl. in W., l. in A., Soda, Dicarbonat; titriert sich mit Phenolphthalein u. NaOH einbas. Na-Salz, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_5\text{Na}$, wl. in k. W., überschüssiger Soda- oder Dicarbonatlsg. u. A. $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_5\text{K}$. — Die meisten Metallsalze von **XIII** sind wl. in W. — Bei den Ringspaltung von **XIII** ergaben sich: Mit CH_3OH beim Eindampfen Verb. **III**. — Mit Phenylhydraz das *Acetontetracarbontrimethylestersäurehydrazid*, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_5\text{N}_2(\text{OCH}_3)_3 = (\text{COOCH}_3)_2\text{CH}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}(\text{COOCH}_3)\cdot\text{CO}\cdot\text{NH}\cdot\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$, Nadeln, aus A., F. 90—91°. — Mit Anilin Verdünnung mit Bzl. *Acetontetracarbontrimethylestersäureanilid*, $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_5\text{N}$, farblos Krystalle, aus A., F. 114—115°; gibt ein ll. Na-Salz, titriert sich mit Phenolphthalein u. NaOH einbas., die Lsg. des Na-Salzes gibt mit Cu-Acetat ein moosgrünes, wl. C-Salz, aus A. — Mit Anilinüberschuß ohne Verdünnung unter Erwärmen, Abspaltung von 1 Mol. CO_2 u. B. der Verb. $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}_5\text{N}_2$, Krystalle, aus Essigester u. CCl_4 , F. 133 bis 133° (Zers.); ll. in den meisten organ. Lösungsm., wl. in Ä., unl. in W.; l. in Lauge titriert sich mit NaOH u. Phenolphthalein einbas.; hat Formel $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{NH}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}(\text{CO}_2\text{CH}_3)\cdot\text{CO}\cdot\text{N}(\text{CH}_3)\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ oder $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{CH}_2\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}(\text{CO}\cdot\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_5)\cdot\text{CO}\cdot\text{N}(\text{CH}_3)\cdot\text{C}_6\text{H}_5$. — Mit sd. W. entsteht unter Abspaltung von CO_2 vermutlich *Acetontetracarbonsäuremethylester*, der bei der Dest. unter B. von Malonsäuremethylester zers. wird. Das Na-Salz von **XIII** gibt mit sd. W. unter Abspaltung von CO_2 Malonester u. Malonsäures Salz. — *Dioxyppyridincarbonsäuremethylester* (**XIX**), aus **XIII** in w. Pyridin, wobei das *N-Methylpyridiniumsalz*, $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{O}_5\text{N}$, entsteht; gelbliche Krystalle, aus h. (6:10), F. 128—129° (Zers.); gibt mit $\frac{2}{1}$ -n. HCl *N-Methylpyridiniumchlorid*, Nadeln *N-Methylpyridiniumplatinchlorid*, $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{PtCl}_6$, gelbe Tafeln, aus W. (in h. l. 1:10), F. 188—190°, nach Trocknen bei 100° 205—206°. — *N-Methylpyridiniumgoldchlorid*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NAuCl}_4$, citronengelbe Nadeln, in h. W. l. 1:50; F. 252—254°. — Gibt mit 25% salzsaurer Chlorjodlsg. *Methylpyridiniumdichlorjod*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NCl}_2\text{J}$, gelbe Tafeln, aus H. F. 90°. — **XIII** gibt mit Chinolin dieselbe Säure **XIX**, ohne Salzausscheidung. Bei d. Einw. von Pyridin oder Chinolin auf **XIII** entwickelt sich zuerst CO_2 , infolge ein schnell verlöschenden Nebenrk., die vermutlich in einer Umwandlung des Methoxy-pyrononkörpers in ein cyclo-Butanderiv. besteht. — *Methylchinoliniumgoldchlorid*, $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{NAuCl}_4$, aus W., F. 202—205°. — *N-Methylchinoliniumplatinchlorid*, $(\text{C}_9\text{H}_7\text{NCH}_3)_2\text{PtCl}_6$, F. 230° (Zers.). — α,α' -*Dioxyppyridincarbonsäuremethylester*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_8$ $3\text{H}_2\text{O}$ (Desmotropieformeln **XVII**—**XXI**), B. am besten mittels Pyridin aus **XIII**; weiße Nadelchen, enthält 3 Moll. Krystallwasser, verwittert schon im Vakuumexsiccator, F. (wasserfrei) 183—185° (Zers.); unl. oder wl. in organ. Lösungsm.; zers. sich m. sd. A.; sll. in W.; aus verd. HCl umzukrystallisieren; titriert sich gegenüber Methylorange mit NaOH als einbas. Säure, gegenüber Phenolphthalein braucht er nahezu 2 Äquivalente Base, titriert sich aber unscharf; mit Soda oder Dicarbonat entwickelt sich CO_2 . — $\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_5\text{Na}$, aus wasserfreiem Ester beim Neutralisieren mit $\frac{1}{1}$ -n. NaOH Methylorange; weiße Schuppen, zwl. in k. W. — $\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_8\text{Na}_2$, aus dem Ester + NaOH in wenig W. — Das Mononatriumsalz ist gegen sd. W. vollkommen beständig; d. Dinatriumsalz wird damit weitgehend zers. unter B. von CO_2 u. Malonester. — $(\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_8)_2\text{Ba} + 2\text{H}_2\text{O}$, Nadeln, aus dem Ester in wenig W. + BaCl_2 , wl. in k., l. in h. W. — $\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_8\text{Ba} + \text{H}_2\text{O}$, aus dem Ester in wenig W. + Krystallbaryt; gibt d. Krystallwasser noch nicht bei 140° ab. — Anilinsalz, $\text{C}_9\text{H}_5\text{O}_8\cdot\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{NH}_2$, farblos Krystalle, aus A., F. 144—145° (Zers.); wird durch HCl wieder zerlegt. — Pyridinsalz, $\text{C}_9\text{H}_5\text{O}_8\cdot\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$, Nadeln, aus A., sll. in W., durch HCl zerlegbar. — *Acetondicarbonsäure*, F. 135—136° (Zers.), gibt bei genauer Neutralisation mit Barytlsg. das *neutrale Barytsalz*, $\text{C}_5\text{H}_4\text{O}_5\text{Ba} = \text{CO}(\text{CH}_2\text{CO}_2)_2\text{Ba}$, weißes, ll. Krystallpulver; zers. sich allmählich unter Abspaltung von BaCO_3 . — 10 Moll. Acetondicarbonsäure geben mit 15 Moll. Krystallbaryt in W. das *bas. Ba-Salz der Acetondicarbonsäure*, $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_{10}\text{Ba}_3$ (**XXI**), wl. in k. W. (1:85); regeneriert mit HCl wieder die Säure. Wird in w. W. zers. nach der Gleichung $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_{10}\text{Ba}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = 2(\text{CH}_3\cdot\text{CO}_2)_2\text{Ba} + \text{BaCO}_3 + \text{CO}_2$. — 20 Mo

etondicarbonsäure geben in w. W. mit 40 Moll. Krystallbaryt Essigsäure u. CO_2 . — *nm.* Diäthylacetondicarbonsäure, F. 112—113°, aus dem Diäthylester mit alkoh. KOH , t in sd. W. mit Krystallbaryt *Di-n-propylketon* u. *n-Buttersäure*. — α, α' -Diäthoxy-*p'*-diäthylpyron (IX), durch Kondens. von Diäthylacetondicarbonsäureäthylester u. sschütteln der schwefelsauren Lsg. nach Absaugen des Diäthyl-cyclo-butandion-bonsäureäthylesters mit Chlf. ; aus Lg., F. 49—50°; die alkoh. Lsg. gibt mit AuCl_3 en gelben Nd., $\text{C}_{26}\text{H}_{40}\text{O}_8$, HAuCl_4 , aus 50%ig., HCl -haltigem A., F. 117°. (Ber. sch. Chem. Ges. 59. 973—91. Berlin, Tierärztl. Hochschule.)

BUSCH.

Ch. Courtot und C. Pomonis, *Über Diphenylensulfid*. (Vgl. S. 3233.) Es ist verständlich, weshalb FRIEDLÄNDER dem von DAHL entdeckten Thiobenzidin



die Formel eines 2,2'-Diaminodiphenylsulfids (nebenst.) erteilt hat, obwohl nach den Analysen von DAHL die Verb. durch Vereinigung von 2 Moll. Benzidin u. 1 Atom S entstanden ist. Die Konst. des Thiobenzidins ist noch unbekannt. Dagegen ist die chem. Natur des von Vff.

) beschriebenen Diaminodiphenylsulfids bis auf die Stellung der NH_2 -Gruppen zweifelhaft. Da nach KRUBER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1566; C. 1920. IV.) Diphenylsulfon durch Alkalischemelze zu o-Oxydiphenyl aufgespalten wird, en Vff. ihr Diacetaminodiphenylsulfid zum Sulfon oxydiert u. dieses der Alkalinelze unterworfen. Dabei entstand das von JACOBSON u. HÖNIGSBERGER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 4113 [1903]) beschriebene o-Oxy-*p, p'*-diaminodiphenyl, 226—227°; *Di-p-anisylidenderiv.*, F. 201—202°. Daraus folgt, daß die von Vff. gestellte Verb. das echte 2,2'-Diaminodiphenylsulfid ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 931—32.)

LINDENBAUM.

Th. Curtius und A. Bertho, *Die Einwirkung von Carbonylazid, CON_6 , auf aromatische Kohlenwasserstoffe*. Der Inhalt der Arbeit deckt sich im wesentlichen mit S. 1995 u. 1996 referierten Arbeiten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 565—89. Heidelberg, Univ.)

ZANDER.









Alfred Bertho, *Verhalten der Stickstoffwasserstoffsäure und des Stickstoffammoniums Benzol und p-Xylol unter Druck*. Der Inhalt deckt sich im wesentlichen mit der 1996 referierten Arbeit. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 589—95. Heidelberg, Univ.)

O. Dafert und Z. A. Melinski, *Über einige Verbindungen der Arsenhalogenide Pyridin*. Es gelang den Vff., die Additionsverbb. *Arsenrichlorid-Pyridin*, *Arsenomid-Dipyridin* u. *Arsentrijodid-Tripyridin* darzustellen. — *Arsenrichlorid-Pyridin*, $\text{C}_5\text{H}_5\text{NCl}_3\text{As}$. In PAe. dargestellt. F. 145,5°. Stark hygroskop. Sll. in doch nicht in jedem Verhältnis, ll. in Chlf. , absol. A., CH_3OH , Essigester, AsCl_3 pyridin, unl. in PAe. Wss. Lsg. reagiert sauer. Die Substanz erzeugt Brennen der Haut u. hinterläßt einen eigentümlichen Geruch. — *Arsentribromid-Dipyridin*, $10\text{N}_2\text{Br}_3\text{As}$. Gelbe Nadeln aus Chlf. F. 195° (in der geschlossenen Kapillare; gewöhnlichem Druck schon früher Zers.). Äußerst hygroskop. Ll. in W., schwerer Chlf. u. Pyridin, unl. in CS_2 , Bzl., Xylol, PAe. — *Arsentrijodid-Tripyridin*, $15\text{N}_3\text{J}_3\text{As}$. Darst. in CS_2 . Fleischfarben. Beim Erhitzen Zers. unter Schwarzung. Löslichkeit in W. geringer als der vorigen Verbb. Wss. Lsg. zeigt nach dem Stehen Geruch nach angebranntem Kautschuk u. Pyridin. L. in Chlf. , Pyridin, unl. in CS_2 , PAe., Bzl., Xylol. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 788—90. Heidelberg, Univ.)

SCHUSTER.

Julius v. Braun, Otto Goll und Friedrich Zobel, *Die relative Festigkeit cyclischer n. X. Der Piperazin-Ring*. (IX. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1570; C. 1923. 142.) Bei der Wiederholung früherer Verss. (S. 1180) wurde festgestellt, daß aus dem Amid I mit NH_3 neben dem β -Aminoäthylpiperidin das gleichfalls durch Piperazinring-entstehende α, β -Dipiperidinoäthan (II), vermutlich neben Äthylendiamin gebildet daneben Piperidin u. Piperazin u. kompliziertere bas. Stoffe, aber nicht III u. IV

als Prodd. der beiderseitigen Piperidinringöffnung u. der gemischten Ringspaltung **III** konnte synthet. dargestellt werden u. die Abwesenheit von **IV** konnte unter Berücksichtigung der Kpp. des Aminoäthylpiperidins u. der 2 Triamine **V** u. **VI** gefolg. werden, da **IV** danach so hoch siedend muß, daß es unter den niedriger sd. Prodd. d. NH_3 -Einw. auf **I** nicht enthalten sein kann. — In Übereinstimmung mit KNORHÖRLEIN u. ROTH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **38**. 3136; C. **1905**. II. 1356) steht d. der Piperazinring dem Piperidinring in seiner Festigkeit nach. — Weitere Vers. üb. das Verh. des N,N'-Dimethylpiperazins gegen BrCN , über Spaltung von **VII**, die **VIII** u. über Spaltung der Verb. **IX**, die zu **X**, **XI** u. Tetrahydro-i-chinolin führ. zeigten, daß der Piperazinring ein außerordentlich lockeres Gefüge besitzt u. in d. Festigkeit seines Baues hinter allen bisher untersuchten Ringsystemen (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **52**. 2000; C. **1920**. I. 78) zurückbleibt: der Ersatz des zu NH p-ständig CH_2 -Gliedes im Piperidin durch ein zweites NH schwächt den Zusammenhang d. Ringkette noch mehr, als der Ersatz durch O.



Versuche. N,N'-Di-ε-aminoamylpiperazin (**III**), aus der Dibenzoylverb. konz. HCl bei 120° ; Kp.₁₁ $210\text{--}212^\circ$; E. $36\text{--}37^\circ$; ll. in Ä., A., l. in W.; zieht aus Luft rapide CO_2 u. W. an. — Chlorhydrat, $\text{C}_{14}\text{H}_{36}\text{N}_4\text{Cl}_4$, ll. in W., wl. in A., zers. 262° . Pikrat, wl. in A., ll. in h. W., daraus Blättchen, F. 157° . — **III** ist sehr beständig, auch mit W., verd. oder konz. NH_3 im Rohr bei $120\text{--}130^\circ$. — Dibenzoylverb., $\text{C}_{28}\text{H}_{40}\text{O}_2$ aus ihrem Chlorhydrat + NH_3 ; aus wss. A., F. 150° . — Chlorhydrat der Dibenzoylverb. $\text{C}_{28}\text{H}_{42}\text{O}_2\text{N}_4\text{Cl}_2$, aus Piperazin + N-ε-Chloramylbenzamid (1 Mol.: 2 Moll.) auf d. Wasserbade; ll. in h. W., swl. in k. W.; enthält 4 Moll. Krystallwasser, die es bei 100° abgibt; F. trocken 239° . — N-β-β'-Aminoäthylaminoäthylpiperidin, $\text{C}_9\text{H}_{21}\text{N}_3$ (**V**), N-β-Aminoäthylpiperidin (2 Moll.) + 1 Mol. Bromäthylphthalimid auf dem Wasserbade u. Verseifung der Phthalimidoverb. bei 140° im Rohr mit HCl ; farbloses Öl, riecht ammoniakal., ll. in W., zieht an der Luft CO_2 an, D.₄ $0,940$. — Pikrat, $\text{C}_{21}\text{H}_{27}\text{O}_{14}$, gelbe Prismen, aus A., F. 165° . — Chlorhydrat, sll. in W., l. in A., F. 202° . — N-β-Aminoäthylpiperidin, aus Piperidinoacetonitril durch Na-A.-Red. — N-β-ε'-Aminoaminoäthylpiperidin, $\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{N}_3$ (**VI**), aus N-ε-Chloramylbenzamid u. N-β-Aminoäthylpiperidin (Pikrat des Umsetzungsprod., wl. in A., F. 197°) u. Verseifung; Kp.₁₁ bis 170° ; farblos, fast geruchlos; ll. in W.; leicht CO_2 anziehend. — Chlorhydrat, ll. in W., l. in A., F. 215° . — Diphenylsulfoharnstoff, wl. in Ä., aus A., F. 122° . — **V** u. **VI** sind gegen NH_3 ebenso resistent wie **III**. — Piperazindipiperidiniumbromid (**I**) reagiert mit NH_3 bei 120° (12 Stdn.) in oben beschriebener Weise. — α,β-Dipiperidinoäthan (Pikrat, swl. in sd. W., F. 223° ; die freie Base hat Kp.₁₁ 128° u. gibt ein Pt.-Salz, F. 223°).

ers.), Au-Salz, F. 205° (Zers.), *Jodmethylat*, wl. in A., F. 269°. — Der in h. W. l. il des Pikratgemenges, enthält eine bei der Einw. von NH_3 auf I auch entstandene se $\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{N}_3$, Kp.₁₁ 140°, F. 32—34°; *Pikrat*, gelbe Spieße, aus W., F. 182°. — Die nahme, daß in der Base $\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{N}_3$ das N- β -Piperidinoäthylpiperazin vorliegt, konnte ch entsprechende Darstellungsverss. nicht bestätigt werden. — *Piperazinbis- ydro-i-indoliumbromid*, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{Br}_2$ (VII), aus 2 Moll. o-Xylylenbromid in Chlf. + 2 Moll. Piperazin in h. A.; wl. in W.; schm. nicht bis 300°, swl. in A. Setzt man mit Ag_2O um u. versucht, die eingedampfte Hydroxydlsg. zu dest., so treten auch guten Vakuum störende, komplizierte Zersetzungserscheinungen unter Verharzung t. Gibt bei starker Konz. auf dem Wasserbade bei Siedetemp. α,β -Bisdihydro- dyläthan, $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{N}_2$ (VIII), F. 122°. — *Piperazinbistetrahydro-i-chinoliniumbromid*, $\text{H}_{28}\text{N}_2\text{Br}_2$ (IX), aus 4 Moll. Tetrahydro-i-chinolin u. 1 Mol. Äthylbromid, Lösen w. verd. HCl, u. Weiterbehandlung des Ditetrahydro-i-chinolyäthans mit Äthyl- mid auf dem Wasserbade; zwl. in W. — *Ditetrahydro-i-chinolyäthan*, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2$ (X), freie Base schm. bei 97°; ll. in A., zwl. in Ä.; HCl-Salz: wl., HBr-Salz: noch schwerer n W. — Die Spaltung des dem Bromid IX entsprechenden Hydroxyds führte zum trahydro-i-chinolinäthanderiv. X u. neben Acetaldehyd zum N- β -Oxyäthyltetrahydro- hinolin, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{ON}$ (XI); F. 25—30°. — Genau entsprechend verläuft die Einw. von I_2 (im Rohr bei 120—130°) auf IX, wobei das Äthanderiv. X u. ein Gemisch von trahydro-i-chinolin u. N- β -Aminoäthyltetrahydro-i-chinolin entsteht. — N,N'-Di- thylpiperazin gibt mit CNBr unter Kühlung, nachher auf dem Wasserbade ein An- erungsprod. von Bromäthylmethylcyanamid an das Dimethylpiperazin $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2 + \text{H}_3\cdot\text{N}(\text{CN})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{Br} = \text{C}_{14}\text{H}_{28}\text{N}_6\text{Br}_2$ u. Methylvinylcyanamid, $\text{C}_4\text{H}_6\text{N}_2 = \text{CH}_3\cdot\text{CN}\cdot\text{CH}:\text{CH}_2$; verflüssigt sich unter 13 mm restlos bei 77—80° als farblose Fl., tarzt zu einer bei 28—29° schm. Krystallmasse; entfärbt momentan KMnO_4 , ver- luekt in CS_2 2 At. Br, hat zur Polymerisation keine Neigung. (Ber. Dtsch. Chem. s. 59. 936—45. Frankfurt a. M., Univ.)

BUSCH.

E. Machiguchi, Beiträge zur Kenntnis des japanischen Opiums. Vf. hat ein antitatives Trennungsverf. der gesamten Opiumalkaloide ausgearbeitet u. das japan. ium mit ausländ. Prodd. verglichen, u. zwar die einzelnen Alkaloide nicht nur durch e physikal. Eigenschaften, sondern auch durch die Analyse der Pt-Salze charakte- ert. — Japan. Opium enthält sehr wenig Asche u. 65—72% in W. l. Bestandteile. gl. der fünf Hauptalkaloide unterscheidet es sich nicht wesentlich von ausländ. odd. Von seltenen Alkaloiden scheint es mehr *Laudanin*, *Laudanosin* u. *Lanthopin*, egen weniger *Kryptopin* zu enthalten als ausländ. Prodd. Das gesamte Zahlen- terial (auch der Gehalt der Mohnkapseln) ist im Original tabellar. zusammengestellt. *Lanthopin*, F. 145° (in der Literatur ist 200° angegeben). — Vf. hat ferner aus japan. ium u. aus Mohnkapseln ein bzgl. F. u. anderer Eigenschaften scheinbar mit *Por- yroxin* ident. Prod. extrahiert, welches sich aber als ein Gemisch von *Kodamin*, *hlaudanin* u. *Mekonidin* erwiesen hat. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1926. No. 529. —21.)

LINDENBAUM.

E. Biochemie.

E₂. Pflanzenchemie.

S. Takagi, Borsäure als natürlicher Bestandteil der Bohnen. Da Vf. bei der ters. von Bohnenkonserven auf Konservierungsmittel so wenig Borsäure fand, 3 diese kaum aus absichtlichem Zusatz herrühren konnte, hat er rohe Bohnen ver- edener Herkunft untersucht u. festgestellt, daß B_2O_3 in mehreren Bohnensorten natürlicher Bestandteil vorkommt (ca. 0,005 g in 100 g). (Journ. Pharm. Soc. pan 1926. No. 529. 27.)

LINDENBAUM.

E. Heuser, Bemerkungen zur Arbeit von E. Schmidt, W. Haag und L. Sperling: r Kenntnis pflanzlicher Inkrusten. VI. Entgegnung an SCHMIDT, HAAG u. SPER-

LING (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1394; C. **1925**. II. 1765) bezüglich der Definition des Begriffs „Skelettsubstanz“. Vf. wendet sich gegen die Einführung des neuen Begriffs „Skelettsubstanz“ u. die Wiedereinführung u. Interpretation des Begriffs „Inkrusten“ in die Analyse der pflanzlichen Rohstoffe, weil sie nur Verwirrung u. Unklarheit schaffen. Weiterhin führt Vf. aus, daß von einer Überlegenheit der Chlodioxymethode zur präparativen Gewinnung von Pentosanen u. Hexosanen gegenüber den anderen Methoden, z. B. der Extraktionsmethode mit Natronlauge, nicht die Rede sein kann. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 598—600.) ZANDER.

Eiji Takahashi und **Tadao Itagaki**, *Über die Proteine der Adzukibohne*. D. Adzukibohne, genannt Maruba, enthält 25,69% Eiweiß, von denen sich 24% mit HCl von W. u. 10% NaCl-Lsg. extrahieren ließen. Von diesen 24% konnten wiederum 15% als Albumin u. als Globulin bestimmt werden. Durch fraktionierte Verdünnung der 10%ig. NaCl-Lsg. mit W. konnten die Vff. zwei Globuline isolieren, welche beide der β -Globulin, das aus *phaseolus angularis* isoliert wurde, gleichen; diese beiden Globuline unterschieden sich sehr stark in ihrer Stickstoffverteilung, die nach der Methode von VAN SLYKE bestimmt wurde. (Journ. Biochemistry **5**. 311—319. 1925. Sapporo Imper. Univ. Inst. of Agricult. Chem.) HAASE.


Wilder D. Bancroft, *Blauholz*. Eine Besprechung einer Reihe früherer Arbeiten u. einiger eigener Unterss. zum Zwecke der Feststellung, ob die blaue Farbe, die durch den Angriff von schwarzen Käfern (*Dendroctonus ponderosae*) auf gelbe Fichten entsteht, pigmentartig oder strukturell ist. Vf. kommt zum Schluß, daß die Farbe der Holzteile über der Erde struktureller Natur ist, die der Wurzeln dagegen pigmentartig. (Journ. Physical Chem. **30**. 521—24. Cornell Univ.) HAASE.

Julius Schmidt, *Über Anthocyane. Blüten-, Beeren- und Wurzelsfarbstoffe*. Zusammenfassender Bericht über Arbeiten der letzten Jahre auf dem Gebiete der Analyse u. Synthese obiger Farbstoffe. (Schweiz. Apoth.-Ztg. **64**. 189—94. Stuttgart.) RO.


F. R. Morrison, *Chemische Untersuchung der Samen der „Bunya Bunya“ (Araucaria Bidwilli Hooker)*. I. Die Samen sind feigenförmig, ca. 5 cm lang, 3 cm breit u. wiegen durchschnittlich 16 g. Sie bestehen aus 23% Schale u. 77% Kern, letztere enthält 45% W. Nach Zerkleinerung, Entfernung der Schale u. Oberhaut u. mechanischer Zerquetschung wurde der nasse Brei an der Sonne getrocknet, dann gemahlen. Das so gewonnene Mehl enthält 13,82% hygroskop. Feuchtigkeit, 2,60% Fett (hellbraun, offenbar aus dem Keim), 7,72% in W. l. Substanz (wesentlich Dextrin), 65,8% bzw. 66,49% Stärke (erstere Zahl auf mechan., letztere auf chem. Wege gefunden), 7,93% Rohfaser u. ähnliche Substanzen, 2,12% Asche. Die lufttrockene Stärke enthält 82,7% reine Stärkesubstanz, 16,1% W. u. 1,16% Asche u. ist von guter Beschaffenheit, so daß die Samen vielleicht für eine techn. Gewinnung von Stärke in Betracht kommen können. (Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales **58**. 234—39. 1924. Sydney, Technol. Museum.) LINDENBAUM.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Hans v. Euler, *Enzymchemische Beiträge zur Kenntnis des gekoppelten Fett- und Kohlehydratstoffwechsels*. I. Vf. hat früher (Pflanzenchemie III, 214, Braunschweig 1909) für die Fettveratmung folgendes Schema gegeben:



Dies ist aber nicht der einzige Weg des Fettabbaues im tier. oder pflanzlichen Organismus. Es kann auch etwa folgende Abbaufolge stattfinden:



Die *Phosphatase* scheint am Fettabbau bzw. -veratmung nicht beteiligt zu sein; CO₂-Entw. wird demgemäß durch zugesetzte Cozymase nicht beschleunigt. Es werden dann noch Ergebnisse einer früheren Arbeit (Ztschr. f. physiol. Ch. **51**. 244 [1907]) mitgeteilt. (Biochem. Ztschr. **164**. 18—22. 1925. Stockholm, Hochschule.) HE.

C. Hornemann, *Über den Einfluß der Phosphatdüngung auf die Bildung von Vitamin B in der Pflanze*. (Bied. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. **55**. 152—53. — C. **1926**. 472.) TRÉNEL.

A. Maige, *Änderungen der Stärkekondensationsschwelle in verschiedenen Zellen der Pflanze*. (Vgl. S. 412.) Vf. wendet die zuvor beschriebenen Versuchsanordnungen an. Best. der Stärkekondensation in verschiedenen Zellen der Pflanzen an. Er kommt zum Ergebnis, daß in allen von ihm untersuchten Fällen der spezif. stärkebildende Charakter der Zellen in Beziehung zu einem weniger erhöhten Stand der Kondensationsschwelle steht. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 588—90.) HAASE.

W. Windisch, *Assimilation, Atmung, Gärung*. Literaturübersicht. (Wechschr. Brauerei **43**. 159—62. 170—73. 188—91. Berlin, Vers. u. Lehranst. f. Brauerei.) HE.

Schoeller, *Die Hemmung der Glykolyse an lebenden Hefezellen (nach Versuchen von Schoeller und Gehrke)*. Bericht über einen Vortrag. Die Verss. bezweckten, die Konz. zugesetzter chem. Stoffe zu ermitteln, die erforderlich ist, um innerhalb einer Zeite. die CO₂-Entw. bei der Zuckervergärung auf die Hälfte herabzusetzen. Diese Konz. als Logarithmus entspricht einem Numerus, der als *Wirkungszahl* bezeichnet wird. Sie dient zum Vergleich der *Wirkungsstärke*. Geprüft werden folgende Klassen: oberflächenaktive Säuren, organ. Hg-Verbb., Alkaloide, Farbstoffe u. einige physiolog. Substanzen. Einige Wrkg.-Zahlen seien angeführt: *Atophan* 25 000, *Afridol* 33 700, *Cl₂* 63 000, *Vuzin* 63 000, *Peronin* 14 500; saure Farbstoffe haben geringe Wrkg., d. h. eine um so stärkere, je mehr die vorhandenen Substituenten die „lipolyt.“ Momente des Mol. steigern. Manche mehrfach halogensubstituierte Triphenylmethanfarbstoffe erreichen die Zahl 1 Million, von den Acridinen hat *Rivanol* 631 000.

Die Eignung einer chem. Substanz zur Hemmung der Glykolyse im Sinne der Kurburgschen Narkosetheorie wird demnach bedingt durch das Verhältnis der lipolytischen zu den hydratisierenden Momenten im Mol. Diese Beziehung entscheidet über die Oberflächenaktivität. Der elektr. Charakter der einzelnen Substanzen bestimmt den gesamtelekt. Charakter des Mol., aber erst mit dem Kationencharakter wird die Wrkg. optimal. Dipolmomente werden sowohl die Adsorbierbarkeit als auch die Fähigkeit zur molekularen Assoziation fördern u. die Wrkg. steigern. (Apoth.-Ztg. **41**. 435—36.) ROJAHN.

Alfred Gottschalk, *Über Hefeamylase und die Vergärung von Polysacchariden. Beitrag zur Kenntnis der Selbstgärung*. Untersucht wurde die Vergärbarkeit von Glykogen, Hefegummi, Erythrocellulose, l. Stärke u. Inulin durch Acetonpräparate von untergärrigen Hefen u. Macerationssaft aus Trockenpräparaten von Unterhefen. Im Vergleich wurde ein Gärvers. mit d-Glucose u. einer ohne Kohlenhydrat angesetzt. — Es ergab sich, daß als Substrate der Selbstgärung der Hefe vornehmlich Glykogen, weit weniger Erythrocellulose u. nur in geringem Maße Hefegummi in Betracht kommen. — In Ggw. von Acetonhefe wird die aus Glykogen entstehende labile Phosphorylierung der Glucose mit anwesendem Phosphat verestert. Hierzu ist Co-Zymase notwendig. — Amylase läßt sich mit W. nur wenig extrahieren. Sie ist in den Ex-

traktionsrückständen, sowie in Macerationssaft nachweisbar. *Maltase* ist zwar mit extrahierbar, es bleibt aber soviel Enzym in den Rückständen, daß auf diese Weise eine Trennung der beiden Fermente nicht erreichbar ist. Die Wrkg. der *Maltase* *Amylase* ist von der *Co-Zymase* unabhängig. (Ztschr. f. physiol. Ch. **153**. 215—24.) I

E₅. Tierphysiologie,

F. Wadehn, *Über Sexualhormone*. Zusammenfassende Darst. des über Sexu. hormone Bekannten mit Literaturangabe. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 468—73. Danz. Langfuhr.) MEIER.

Karl Glaessner, *Physiologie und Pathologie des Gallensekretes*. Übersichtsrefer. (Wien. med. Wchschr. **76**. 249—53.) FRANK.

Bernhard Stuber, *Untersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung*. XIV. **W. helm Ehrich**, *Einfluß der Plasmaeiweißkörper auf die Gerinnungszeit*. (XIII. vgl. Bioche. Ztschr. **157**. 156; C. **1925**. II. 735.) Die Blutgerinnungszeit zeigt eine Parallelität zu dem Gehalt des Plasma an Globulinen (Serumglobulin + Fibrinogen). (Bioche. Ztschr. **170**. 355—76. Freiburg i. Br., Med. Klinik.) MEIER.

Helgi Tómasson, *Chemische Veränderungen im Blut durch Narkose*. Ruft *Äthernarkose* eine *Alkalose* hervor? Zugleich ein Beitrag zur *Anisoeionie* des Blutes. Bei zwei Patienten (Geistesranke mit n. körperlichem Befund) war während *Äthernarkose* leichte *Alkalose* u. Erhöhung des Ca-Gehaltes des Serums vorhanden. (Biochem. Ztschr. **170**. 330—36. Vordingborg, Dänemark, Staatsirrenanstalt.) MEIER.

Di-Foutsin, *Untersuchungen über den Calciumgehalt des menschlichen Serums*. Bei an verschiedenen Krankheiten leidenden Patienten, die sich mehr oder mind. kurze Zeit in Bettruhe befanden, war der Ca-Gehalt des Serums im Durchschnitt 14,3 mg-% gegenüber 11,7 mg-% des n. (Biochem. Ztschr. **170**. 321—325. Würzburg, Mediz. Klinik.) MEIER.

Torao Kanamori, *Über das Verhalten des Harnquotienten C:N beim Phlorrhizindiabetes des Hundes*. Das Verhältnis Rest-C:N im Harn des phlorrhizindiabet. Hundes ist meist in n. Grenzen. Der Quotient ist nicht abhängig von der Herkunft des Harns (Harnstoff, NH₃, Rest-N), wird also nicht durch den an N-haltige Verb. gebundene C bestimmt, sondern muß zum Teil aus N-freien Verb. stammen. (Biochem. Ztschr. **170**. 410—31. Berlin, Experimentell-biolog. Abt. des Pathol. Instituts.) MEIER.

Makoto Watanabe, *Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung des Harnquotienten C:N durch die perorale Gabe von Säuren, Alkalien und dem alkalischen Mineralwasser von Neuenahr*. Das Verhältnis C:N im Harn des n. Kaninchens wird durch perorale Zufuhr von täglich 3—6 ccm 1/10-n. HCl trotz vermehrter N-Ausscheidung erhöht, durch Alkalizufuhr 0,011 g NaHCO₃, 0,008 g NaOH, 0,0068 Ca(OH)₂ u. Neuenahrer Sprudel bzw. seine Salze erniedrigt; dasselbe zeigte sich bei einem leichten menschlichen Diabetesfall. (Biochem. Ztschr. **170**. 432—58. Berlin, Experimentell-biolog. Abt. des pathol. Instituts.) MEIER.

Bryant Fullerton und **Frederick W. Heyl**, *Hydrolyse des Rohproteins aus der Follikulärflüssigkeit*. Vff. erhalten durch A.-Fällung aus dem Liquor folliculi 6,34% Rohprotein. Bei der Hydrolyse dieses Proteins konnten festgestellt werden: Arginin 5,7%, Histidin Spuren, Lysin 11%, Tryptophan 2,5, Tyrosin 7,1%. Alle diese Werte gleichen denen des Albumins vom Ovarienrückstand, nur enthält letzteres schätzungsweise mehr S (1,5%), während bei dem untersuchten Protein nur 1,1% gefunden wurden. (Journ. Amer. Pharm. Soc. **15**. 16—18.) ROJAHN.

Ralph Hoagland und **George G. Snider**, *Vitamin A in Oleöl und Oleostearin*. Versuchstier: Albino-Ratten. *Oleöl* ist reich an Vitamin A u. steht in dieser Beziehung zwischen Butter u. Schmalz. *Oleostearin* ist arm daran. (Journ. Agricultural Research **32**. 397—416. Un. St. Dep. of Agric.) TRÉNEL.

G. v. Wendt, *Mineralstoffe und Vitamine*. Vf. diskutiert die Bedeutung der Mineralnahrung für die Viehweiden u. die leichtere Aufnahme von Vitamin A mit Hilfe der ultravioletten Strahlen des freien Sonnenlichts. (Bied. Zentralblatt f. Agrik.-Med. 55. 170—73.)

TRÉNEL.

W. Nonnenbruch, *Über die Wirkung des Anhydrozuckers beim Normalen und Diabetiker*. (Vgl. S. 716.) Bericht über Stoffwechselverss. an Normalen u. Diabetikern mit den Zuckeranhydriden *Glucosan*, *Lävoglucosan* u. *Saccharosan*. (Ztschr. f. d. ges. Medizin 48. 233—44. 1925. Würzburg, Univ.)

FRANK.

Stillfried Litzner, *Über den Einfluß des Diuretins auf den Wasserversuch bei Mäusen*. *Diuretin* hat keine hemmende Wrkg. auf den W.-Vers. (Zentralblatt f. Med. 47. 313—19. Halle, Univ.)

FRANK.

Georg Popoviciu, *Über Bedingungen der autolytischen Ammoniakbildung in den Geweben*. Die autolyt. NH_3 -B. wird durch Phosphat mit steigender $[\text{H}^+]$ erhöht, durch Lactatpuffer mit steigender $[\text{H}^+]$ u. durch Dextrose gehemmt. Die Hemmung durch Dextrose u. Lactat beruht wahrscheinlich auf der Verhinderung von Phosphatregulation. (Biochem. Ztschr. 170. 395—409. Heidelberg, Kinderklinik.)

MEIER.

Julius Schmidt, *Aus dem Gebiet des Zusammenhanges zwischen chemischem Bau und physiologischer Wirkung*. Zusammenfassender Bericht über Beziehungen zwischen Struktur, physiolog. Wrkg., Geschmack u. Konservierungsvermögen. (Süddtsch. Pharm.-Ztg. 66. 231—33. Stuttgart.)

ROJAHN.

A. Buschke, F. Jacobsohn und Erich Klopstock, *Die biologische Bedeutung der oligodynamischen Metallwirkung und ihre Beziehung zur Homöopathie*. Metalle u. Metallsalze lassen sich in ihrer oligodynam. Wrkg. auf der dicht besäten Bakterienkultur gut demonstrieren. Sie bilden dort in mehr oder minder großem Umkreis einen keimfreien Hof. Es besteht ein Parallelismus zwischen dem Eingehen der Metalle u. der Abtötung der Bakterien auf der Platte mit dem Eingehen der Metalle in den Körperdepots u. ihrer Wrkg. auf die Körperzellen. Es ist nicht ein „ähnlicher“, sondern ein entsprechender Vorgang. Es findet keine oligodynam. Wrkg. von Metallen ohne Ionisation u. keine Ionisation von Metallen ohne Zutritt statt. Die Größe des keimfreien Hofes einer oligodynam. wirksamen Substanz ist abhängig von der Menge der zur Lsg. gelangenden Ionen. In einem weissen Medium nicht ionisierte Metallsalze geben keinen keimfreien Hof, ihre Wirksamkeit kann nur eine Lipoidlöslichkeit sein, bzw. kann eine Desinfektionswrkg. kolloidalen Substanzen hauptsächlich nur eine Adsorptionswrkg. sein. Der Grad der oligodynam. Wrkg. einer Reihe therapeut. verwendeter Metallsalze wird aufgeführt. Hg- u. Cd-Salze bilden deutlich keimfreie Höfe, also Inlösungen ionisierter Stoffe, Bi-Präparate nicht. Entsprechend den klin. Beobachtungen besteht hier eine Analogie in der pharmakodynam. Qualität, die Bi-Wrkg. geht prinzipiell ganz anders ab, als die ihr klin. ähnliche Hg-Wrkg. Durch Feststellung einer „ähnlichen“ Wrkg. wird nichts geklärt. (Münch. med. Wchschr. 73. 437—38. Berlin, Rudolf Virchow-Krankenhaus.)

FRANK.

I. L. Gilchrist, *Entwicklung und Möglichkeiten der Behandlung von Erkrankungen der Verdauungsorgane mit Chlorgas*. Zusammenfassende Abhandlung über die Geschichte und Anwendung von Cl-Gas zu Heilzwecken (schon 1824 von WALLACE empfohlen), Verss. in geschlossener, Cl-erfüllter Kammer, Heilerfolge, Bedeutung als Vorbeugungsmittel gegen Ansteckung u. Verwendung in der Tiermedizin. (Trans. Amer. Soc. 49. 14 Seiten. Sep.)

JUNG.

H. Krehl, *Ärztliche Erfahrungen mit Dilaudid*. Hustenreiz wird beim Menschen mit 0,0025 g Dilaudid ohne Nebenwrkg. gut beeinflusst. Nur bei schon vorliegender Beteiligung des Atemzentrums schwere Störungen von Seiten desselben. (Münch. Wchschr. 73. 596—97. Heidelberg, Med. Klinik.)

MEIER.

H. Hemmerling, *Über ein neues Morphinderivat, Dilaudid.* Für das gleiche Anwendungsbereich, in dem Morphin in Dosen von 0,01—0,02 g gebraucht wird, ist Dilaudid 0,005 von gleicher Wirksamkeit ohne Nebenwirkung u. bei geringerer Gewöhnungsgefahr. Störungen von seiten des Atemzentrums nur bei pulmonaler Dyspnoe. (Münch. med. Wchschr. **73**. 597. Düsseldorf, Mediz. Klinik.) MEIER.

R. Gottlieb, *Vergleichende Messungen über die Gewöhnung des Atemzentrums Morphin, Dicodid und Dilaudid.* Die beruhigende Wirkung täglicher Injektionen von 1 Morphin pro kg auf das Atemzentrum des Kaninchens verschwindet nach 4—5 Wochen vollständig. Dicodid u. besonders Dilaudid (im ersteren die alkoh. Hydroxylgruppe des Codeins, im letzteren die des Morphins durch Ketongruppe ersetzt) behalten in Dosen von 0,5 mg bzw. 0,3 mg pro kg ihre Wirkung unverändert über 7 Wochen (Münch. med. Wchschr. **73**. 595—96. Heidelberg, Pharmakol. Institut.) MEIER.

H. Husserl, *Über ein neues Morphinum sparendes Analgetikum „Cibalgin“.* Cibalgin eine Kombination von Amidopyrin mit Dial, bewährte sich in manchen Fällen als Ersatz für Morphin. (Wien. med. Wchschr. **76**. 446—47. Sanatorium Burkersdorf, Wien.) FRANK.

Max Weißbart, *Erfahrungen mit Abasin.* Abasin bewährte sich als Sedativum ohne hypnot. Wirkung zu zeigen. (Ärztliche Rundschau **1926**. 2 Seiten. Sep. München.) FRANK.

Georg Stiefler, *Die Behandlung der Migräne mit Luminal „Luminaletten“.* Klin. Bericht über günstige Wirkung von Luminal bei Migräne. (Wien. med. Wchschr. **7**. 429—30. Linz.) FRANK.

E. Pfau, *Chemische Untersuchung des Arzneimittels „Placedin“.* Placedin, ein Mittel gegen bösartige Katarrhalfieber, besteht nach Unterss. des Vf.s zu etwa 50% aus Acetanilid. Daneben enthält es milchsaures Ca- u. Pb. Der Pb-Gehalt beträgt 6% (Dtsch. tierärztl. Wchschr. **34**. 214—15. Hannover, Tierärztl. Hochschule.) FRANK.

F. Zernik, *Über neuere Wismutpräparate.* Vf. bespricht 10 Gruppen mit insgesamt 80 der in den letzten Jahren, meistens zur Syphilisbehandlung, in den Verkehr gebrachten Wismutpräparate. (Süddtsch. Apoth.-Ztg. **66**. 159—62.) ROJAHN.

Emil Kauf, *Über die Einwirkung von Atropin und Adrenalin auf das Herz Sporttreibender.* Subcutane Injektion von 1 mg Atropin, die in der Regel bei Nichtsporttreibenden deutliche Frequenzsteigerung erzeugt, bewirkt bei gut trainierten Sportler keine Änderung der Pulsfrequenz. Das Vagus-Akzeleransgleichgewicht ist bei Sportler deutlich gegen die Vagusseite zu verschoben. 1 mg Adrenalin erzeugte bei Sport-Nichtsporttreibenden in gleichem Maße Pulsfrequenzsteigerung, die Ansprechbarkeit des Akzelerans ist demnach für erregende Gifte n. (Wien. klin. Wchschr. **39**. 212—13. Wien, Herzstation.) FRANK.

Eugen Rácz, *Über Subtonin, ein neues, blutdrucksenkendes Mittel.* Klin. Bericht über gute Erfolge bei essentieller Hypertension mit Subtonin. Subtonin A enthält als wesentlichen Bestandteil Digitalisblätter, Subtonin B besteht aus Calcium chloraceticum, Atropin. sulfur., Theobromin. natr. salicyl. u. Hypophysen- u. Thymiusextrakte (Münch. med. Wchschr. **73**. 445—46. Wien, Allgem. Poliklinik.) FRANK.

Alfred Brunner, *Summascil, ein neues Scilla-Cardiacum.* Summascil (Herzchem. Fabrik Norgine) enthält alle wirksamen Glykoside der Meerzwiebel in alkal. Lsg. Es bewährte sich als Cardiacum, besonders bei Klappenfehlern. Unangenehme Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. (Wien. klin. Wchschr. **39**. 214—15. Wien, Allgem. Krankenh.) FRANK.

B. Busson, *Die Präparate der Tuberkulosebehandlung.* Anführung der meist benutzten therapeut. Präparate zur Behandlung der Tuberkulose. (Wien. med. Wchschr. **76**. 268—71.) FRANK.

Georg Padel, *Über Versuche der Tuberkulosebehandlung durch künstliche Anreicherung der Harnsäure im Blut.* Zur Anreicherung der Harnsäure im Blut wurde ein Präparat Acurogen (Herst. Organo-therapeut. Laborat. Dr. JACOBSON, Chem.

enburg) benutzt. Dasselbe soll bestehen aus Extrakten von tier. Organen mit der Immunität gegen Tuberkulose mit Zusätzen von Allylsulfid, Thiosinamin u. anderen Substanzen. Durch Schaffung einer Neigung zur gicht. Diathese soll ein edriger, bezw. gedämpfter Stoffwechsel angestrebt werden, der bei der Tuberkulose Gegensatz zur Gicht erhöht ist. Die Verss. an schweren Tuberkulosefällen fielen durchaus ermutigend aus. (Münch. med. Wchschr. **73**. 444—45. Beelitz, Lungenkranke.)

FRANK.

Otto Lichtwitz, *Schädigung durch Lipojodol als Kontrastmittel bei Lungentuberkulose*. Ein zu Zwecken der Bronchographie intratracheal verwendetes J-Präparat, Lipojodol, verursachte eine akute Verschlechterung des Krankheitszustandes. Vf. ist vor der Anwendung der sonst ungefährlichen Bronchographie bei akt. phthis. zu warnen. (Wien. klin. Wchschr. **39**. 133—34. Heilanstalt Grimmerstein, N.-O.) FR.

L. Kofler, *Über Präparate mit verschleiertem Jodgehalt*. Vf. berichtet über einige wertvolle Arzneimittel, die im freien Verkehr erhältlich sind. Als unschädliches Entgiftungsmittel angebotene Fucabohnen sollen aus Extract. cascar. sagrad., frangul. u. persic. bestehen. Jede Bohne enthielt ungefähr 400 γ J, das auf den J-Gehalt Meeresalge zurückzuführen ist. Ein anderes Präparat, *Oligohal*, ein „Kräuterseidpulver“ enthielt in 1 g etwa 300 γ J. Erwähnt wird dann noch die Schwammbohne, welche vielfach gegen Kropf verwendet wird u. welche 2—3% J-Salze enthalten soll. (Wien. klin. Wchschr. **39**. 386—87. Innsbruck.)

FRANK.

Desider Bayor, *Ein mächtiges Entfettungsmittel*. Vf. erzielte mit intraglutealen Injektionen von *Novasurol* starke Abmagerung bei Fettsüchtigen. (Wien. klin. Wchschr. **39**. 333—34. Budapest.)

FRANK.

Ferdinand Flury, *Zur Beurteilung von Gasvergiftungen*. Beschreibung der häufigsten vorkommenden Gasvergiftungen, ihre Entstehung u. Erkennung. (Dtsch. Ztschr. f. gerichtl. Medizin **7**. 157—67. Würzburg, Univ.)

FRANK.

N. Heubner, *Die gewerbliche Kohlenoxydvergiftung*. Die unmittelbar auftretenden, mit dem Gehirn zusammenhängenden Funktionsstörungen werden eingehend besprochen, ebenso die bei längerer Einw. zu erwartenden, durch mehr oder weniger Gewebsveränderungen bedingten Krankheitserscheinungen, die nicht wie die akuten nach Ausscheidung des Giftes alsbald wieder verschwinden, sondern langsam zurückgehen, aber auch von Dauer sein können, so daß eine Vergiftung mit CO stets als ernst anzusehen ist. Die ersten Symptome treten in der Regel auf, wenn fast ein Drittel des O₂ im Hämoglobin durch CO verdrängt ist, bei vier Fünftel derselben der Tod ein (0,03 bzw. 0,3 Vol.-% in n. Luft). Eine chron. Vergiftung wie bei CO ist nicht bekannt, Aufnahme kleiner Mengen wirkt sogar wie jeder vorübergehende Entzug von O₂ günstig auf die Blutbildung. Die verschiedenen, mehr oder weniger eindeutigen Methoden zum Nachweis des Giftes im Blut u. die bei den Organen zu beobachtenden Veränderungen werden geschildert, Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von schweren Vergiftungen mit CH₃OH sowie durch Nitrit, Kombinationen mit Gehirnerschütterung, H₂S, PH₃ usw. (Gas- u. Wasserfach **52**—24. Göttingen.)

WOLFFRAM.

Ritz Schwarz, *Vergiftungsfälle und Tierversuche mit Methylchlorid*. Bericht über Vergiftungen mit *Methylchlorid*, darunter ein Fall mit tödlichem Ausgang. Die Vergiftungen ereigneten sich bei der Montierung einer Kältemaschine in einem fensterlos, nicht ventilierten Keller. Als kälteerzeugende Substanz diente CH₃Cl. Die Symptome der Erkrankung u. Schutzmaßnahmen für die Arbeiter werden angeführt. Erwähnt werden ferner Tierverss. mit CH₃Cl an. Noch nach Std. konnte in den Organen, durch die ein Strom von H geleitet u. angezündet wurde, das CH₃Cl als aufsteigend nachgewiesen werden, indem sich die Flamme bei Einbringen eines feinen Drahtnetzes bläulichgrün färbte. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin **7**. 18. Zürich, Univ.)

FRANK.

Hans Molitoris, *Ein Fall von tödlicher Bromoformvergiftung nebst Bemerkung über den forensischen Nachweis*. Noch nach fast 2 Jahren nach dem infolge Vergiftung mit Bromoform eingetretenen Tode konnte in den faulenden Leichenteilen das Bromoform einwandfrei nachgewiesen werden. Angabe der Unters.-Methode. (Dtsch. Ztsch. f. d. ges. gerichtl. Medizin **7**. 223—41. Erlangen, Univ.)

FRANK.

James Fitton Couch, *Relative Giftigkeit der Lupinenalkaloide*. (Vgl. S. 9.) Am giftigsten ist *d*-Lupanin, weniger — in der Reihe abnehmend — Spartein, Lupin, Spathulatin, Oxylupanin. Subcutan erwiesen sich die genannten Alkaloide gleichwertig. Versuchstiere: Meerschweinchen. (Journ. Agricult. Research **32**. 51—60. Unit. Stat. Dep. of Agric.)

TRÉNEL.

E. A. Ruddiman und C. F. Lanwermyer, *Giftigkeitsprüfung von Chinin-Aspirin-Mischungen an warmblütigen Tieren*. Vff. prüfen die Toxizität von frischen u. 1½ Jahr alten, zu einer rotbraunen M. zusammengesinterten Mischungen von Chinin u. Aspirin an niederen Warmblütern u. finden keine Erhöhung der Giftigkeit. (Journ. Am. Pharm. Assoc. **15**. 11—16.)

ROJAHN.

E. Maliwa, *Die chemischen Grundlagen der Schwefelbäderwirkung*. Den Hauptwert bei der S.-Bäderbehandlung legt Vf. auf die Wrkg. des H₂S in statu nascenti. Die Schwefelbäderbehandlung ist nur ein Teil der Reizkörpertherapie, verbunden mit einer noch nicht geklärten Summation an sich unterwertiger Reizetablirungen. (Wiener med. Wehschr. **76**. 161—63. Baden.)

FRANK.

G. Analyse. Laboratorium.

Ernst Pfau, *Die Kunst des Filtrierens*. Vf. bespricht die beim Filtrieren u. Klären von Fll. anzuwendenden Kunstgriffe, Wahl der Filtrierpapiersorte, Entfärbung mit Tierkohle, Reinigung durch Dialyse, Anfertigung der hierzu notwendigen Kolloidiumsäckchen u. die zum Filtrieren dienenden App. (Apoth.-Ztg. **41**. 462—63.)

Willy Wobbe, *Neue Apparate. Neue Porzellanapparate für das Laboratorium* (Porzellanfabrik PH. ROSENTHAL u. Co. A.-G., Marktrechwitz): Porzellan-Goochflasche mit poröser Bodenplatte (Fabrikant auch Staatliche Porzellanmanufaktur Berlin) Fassen 22 g, ohne Asbesteinlage benutzbar, können über freier Flamme geglüht werden. Krystallisier- und Abdampfschale nach Dr. THOMANN-Bern. Flachbodige Schalen von 50—480 g Inhalt mit nach oben verjüngter mit Ausguß versehenen Wandung. Hinausklettern der ausgeschiedenen Krystalle wird durch diese Form verhindert. Kleinschälchen aus Hartporzellan. Gewicht 12 bzw. 15 g, sehr widerstandsfähig, auch als Wägeschälchen benutzbar. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **263**. 51—52. 1925.)

ROJAHN.

—, *Haldenwanger Filter*. Beschreibung der Filtertiegel, Filterkonusse u. Büchnertrichter mit Einsatz aus temperaturbeständigem, porösem Material. (Chem.-Ztg. **305**—06.)

JUNG.

E. Moness und P. M. Giesy, *Ein einfaches Viscosimeter für absolute Messungen*. Vff. beschreiben einen leicht herstellbaren Apparat. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **39**—40.)

ROJAHN.

Ernst László, *Viscosimeter mit Radiatorenerwärmung*. Bei dem Viscosimeter (Hersteller: EMIL DITTMAR & VIERTH, Hamburg, Spaldingstr. 160) ist das Ölgefäß zur besseren Wärmeübertragung mit Radiatoren versehen. Zur wagerechten Einstellung dienen: Flüssigkeitseinstellung nach den Oberkanten der Radiatoren, Lotwaage u. eine doppelte Wasserwaage. Durch das Wegfallen der Niveauspitzen das Reinigen erleichtert. Der Brennerkranz hat einen Schlitz, so daß das Unterste des Kolbens bei wagerechter Stellung des Viscosimeters erfolgen kann. (Chem.-Ztg. **307**. Budapest.)

JUNG.

G. V. Anrep und A. C. Downing, *Verfahren zur Messung schneller Veränderungen Ausflußgeschwindigkeit von Flüssigkeiten*. Die Fl. fließt durch eine dreifach tubuläre Woulf'sche Flasche, in deren beiden seitlichen Tuben die den Ein- u. Ausfluß mittelnden ungleichschenkligen Heber mit je einem Schenkel befestigt sind, während im mittleren Tubus in einem Röhrenstück eine Spirale aus $12\ \mu$ dickem Pt-Draht endet, welcher in den einen Arm einer Wheatstoneschen Brücke eingeschaltet ist und durch eine Batterie auf Dunkelrotglut erhitzt wird. Bei Änderung der Strömungsgeschwindigkeit strömt Luft an der Spirale vorbei, kühlt sie ab u. ändert dadurch den Widerstand. Wegen des Verf. beim Kalibrieren wird auf die Abhandlung verwiesen. (Journ. Scient. Instruments **3**. 221—24.) **BÖTTGER.**

G. C. van Walsem, *Praktische Notizen aus dem mikroskopischen Laboratorium*. I. *Zur Hygiene des Mikroskopikers*. (XVI. vgl. S. 2388.) Anweisung zum Aufstellen des Mikroskops, um Augenschädigungen zu vermeiden. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie **43**. 112—15.) **TRÉNEL.**

J. Kisser, *Über Kernschwarz und seine Anwendungsmöglichkeit für botanische Zwecke*. Vf. empfiehlt das „Kernschwarz“ von G. GRÜBLER u. Co., Leipzig zum Anstrichen der Zellkerne u. Cellulosewände. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie **43**. 116—19.) **TR.**

E. Berl und H. Burkhardt, *Über eine Schnellmethode zur Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff auf trockenem Wege*. Das Prinzip der beschriebenen Halbmikromethode besteht darin, die organ. Substanz, enthaltend ungefähr 10—15 mg C, innigst trocken, von organ. Substanz u. Carbonaten freiem Bleichromat (E. MERCK, Darmstadt) zu mischen u. dieses Gemisch in einem Röhrchen aus schwer schmelzbarem Glas oder Quarzglas bis zur dunklen Rotglut zu erhitzen. Die Verbrennungsgase, die neben Luftbestandteilen Wasserdampf u. CO_2 enthalten, werden unmittelbar nach dem Verlassen des kleinen H_2SO_4 -Gefäßchens ihres Wasserdampfes beraubt u. das getrocknete Gas auf seinen CO_2 -Gehalt entweder gasvolumetr. oder gewichtsanalyt. geprüft. — Diese Methode ist in vielen Fällen anwendbar, u. gibt nach einer großen Zahl mitliter. Beleganalysen gute Ergebnisse. Stoffe, welche schwer verbrennliche Zers.-produkte ergeben, wie z. B. Sulfonal, weisen zu geringe Zahlen für C auf; Fll. mit nicht flüchtigen Kpp. (über 120°) lassen sich nach dieser Schnellmethode (Erhitzungsdauer nur 10 Min.) anstandslos verbrennen. — Bei der vorgeschriebenen innigen Durchmischung von N-haltigen Substanzen mit Pb-Chromat konnte eine B. von nitrosen Gasen in dem Auffanggefäß auch bei Anwendung der Diphenylaminrk. auf die Sperrlsg. nicht beobachtet werden. — Da das Pb-Chromat bei Rotglut Halogene nicht zurückhalten vermag, ist bei halogenhaltigen Substanzen eine Änderung nötig, um ein zu hohes CO_2 -Vol. oder -Gewicht zu vermeiden: Gute Werte werden erhalten, wenn man die Pb-Chromatschicht auf der Gasaustrittsseite nur durch die von der Bleichromat abgeleitete Wärme auf ca. 170 — 180° erhitzt; hierbei werden die Halogene sehr zurückgehalten. Die Gesamtdauer einer Analyse beträgt einschließlich Wägung und Berechnung nur etwas mehr als $\frac{1}{2}$ Stde. — Apparatur, Berechnung u. Beleganalysen aus dem Original zu ersehen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 890—96.) **BUSCH.**

E. Berl und H. Burkhardt, *Über eine rasch auszuführende halbmikrochemische Methode zur Bestimmung von Stickstoff*. Im Anschluß an vorst. Ref. wird eine Modifikation der Dumas'schen N-Bestimmungsmethode beschrieben; N-haltige Substanzen mit einem N-Gehalt von 3—6 mg, entsprechend 3—6 ccm unreduziertem N, werden durch eine Verbrennung im Vakuum rasch u. mit geringem Gasaufwand auf ihren N-Gehalt untersucht. Leichtflüchtige Substanzen müssen bei Normaldruck verdunstet werden, wodurch eine Verlängerung der Analysendauer eintritt. Apparatur, Berechnung ist aus dem Original zu ersehen. — Im Durchschnitt bedarf man für eine N-Best. einschließlich Einwiegen, Herrichtung des Rohres, Ablesen u. Rechnen nur 15 Min. bei einem Gasverbrauch von ca. 100—150 l je Analyse. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 897—900. Darmstadt, Techn. Hochschule.) **BUSCH.**

C. F. van Duin, *Notiz über die Bestimmung von Halogen in organischen Verbindungen nach dem Verfahren von Stepanow*. Nach diesem Verf. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **39**. 4056 [1906]) werden 0,2 g Substanz in 20—40 ccm sd. absol. A. mit der 8fachen berechneten Menge Na reduziert. Vf. erhielt bei substituierten Dibromhydrazimsäuren u. ihren Estern (vgl. S. 3526) zu niedrige Werte, infolge B. von schwer reduzierbaren ω -Bromstyrolen. Die Werte wurden aber richtig, als er doppelt so Na benutzte. Um alles Na zu lösen, muß schließlich auf freier Flamme erhitzt werden. Der hierbei erzielten höheren Temp. dürfte eine wesentliche Wrkg. zukommen. (R. trav. chim. Pays-Bas **45**. 363. St. Andrews, Univ.) LINDENBAUM.

Albert Griffiths, *Bemerkung über das Verhindern des Flackerns der Flamme, durch die die Temperatur in einem Thermostaten reguliert wird*. Die Leuchtgaszufuhr wird durch Hg betriebenen Kontrollvorrichtung erfolgt statt durch eine 1 cm we. Röhre durch eine Batterie dünnwandiger Röhren von etwa 0,75 mm lichter We. u. 30 cm Länge, die in einer Glasröhre von etwa 1 cm Durchmesser eingeschlossen sind u. deren unteres, mit dem Hg in Berührung befindliches Ende schräg abgeschliffen ist. (Journ. Scient. Instruments **3**. 230.) BÖTTGER.

Elemente und anorganische Verbindungen.

E. Schulek, *Entfernen des gelösten Sauerstoffs aus Flüssigkeiten*. Nachweis geringer Mengen Sauerstoff in Gasgemischen. Ein etwa 50 ccm fassendes Glasrohr unten durch einen Hahn, oben durch einen eingeschlifften, ebenfalls mit einem Hahn versehenen Glasstopfen verschlossen. Unmittelbar oberhalb des unteren Hahns ist ein Sinterglasfilter (Schottische Bezeichnung 1 g $\frac{3}{5}$ —7) eingeschmolzen, auf welcher die zu untersuchende Wasserschicht ruht. Nach dem Öffnen beider Hähne läßt man einen mäßig starken N- oder H-Strom durch das Filter treten, aus dem er in sehr feiner Verteilung das W. ($\sim$ 50 ccm) durchperlt u. aus ihm den O in sehr kurzer Zeit „abwäscht“. Zur Prüfung auf O versetzt man das W. (50 ccm) mit 1 ccm konz. MnCl₂-Lsg., fügt, ohne den Gasstrom zu unterbrechen, durch den oberen Hahn mittels einer Pipette 1 ccm KJ-haltige konz. NaOH hinzu, löst den weißen Nd. in 3—4 ccm konz. HCl (D. 1,19) u. gibt zur Lsg. 1 ccm Stärkelsg., die sich noch bei Ggw. sehr geringen Mengen O blau färbt. Der App. kann durch Verb. mit einer Gasbürette auch zum Nachweis des O in einem Gasgemisch dienen (vgl. Abbildung im Original). (Ztschr. f. anal. Ch. **68**. 22—24. Budapest, Königl. ungar. Pázmány Péter Univ.) BÖTTGER.

O. Loebich, *Über ein neues Verfahren zur Bestimmung der Perchlorsäure*. HCl wird durch Nitron bequem u. genau abgeschieden. Man löst von der Substanz eine Menge, die etwa 100 mg ClO₄' entspricht, in 60 ccm W., versetzt mit 1 ccm 2-n. H₂S und erhitzt bis zum beginnenden Sieden u. setzt nach Wegnahme der Flamme abermals für 100 mg ClO₄' 10 ccm Nitronacetatlsg. (10 g Nitron, 5 g Eisessig, 85 g W.) hinzu, wobei sich sogleich einige flimmernde Krystalle von Nitronperchlorat abscheiden, deren Menge rasch zunimmt. Nach 2—3-stdg. Stehen im Eisschrank wird durch ein Glasfiltertiegel (G 5—7 von SCHOTT & Gen. in Jena) abgesaugt u. unter ganz schwachem Druck mit 10 ccm Eiswasser in 6—7 Portionen nachgewaschen. Die einzelne Portion soll in 5 Sek. durchgesaugt werden, weil bei nur wenig längerer Berührung des Wassers mit dem Nd. bereits beträchtliche Verluste eintreten. Nach dem Trocknen bei 110° wird gewogen. (Ztschr. f. anal. Ch. **68**. 34—36. Würzburg, Lab. f. angew. Chemie.) BÖTTGER.

J. H. de Boer und J. Basart, *Eine schnelle maßanalytische Bestimmung des Fluors auch in komplexen und unlöslichen Fluoriden*. (Vgl. W. D. TREADWELL u. A. KÖHLER S. 733.) Vff. arbeiten eine Methode zur Best. von F₂ aus, welche auch bei komplexen Fluoriden anwendbar ist, indem sie ein Metallion oder einen Komplexbildner zu verwenden suchen, an denen das F₂ stärker gebunden wird, als in den Komplexen, welchen es bestimmt werden soll. Titration mit Th(NO₃)₄-Lsg., wobei als Endpunkt


die B. des violetten Farbstoffes von Th mit Purpurin in essigsaurer Lsg. benutzt ist, ist keiner allgemeinen Anwendbarkeit fähig, da auch viele andere Metalle mit purin Farblacke bilden. — Bei geeigneter Versuchsanordnung hat aber die Titration unl. oder komplexen Fluoriden mit $ZrOCl_2$ -Lsg. Erfolg. Reine Alkalifluoride sind irlich besser nach der empfindlicheren Methode von TREADWELL u. KÖHL zu immen. Die zu untersuchende Substanz wird mit einem Überschuß von Zr-Lsg. ($ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$ in 100 cem W.) versetzt, das doppelte Vol. konz. HCl u. ebensoviel zugegeben u. das Fluorid auf dem Wasserbade gel. Auf gleiche Weise wird eine gleichslg. ohne Fluorid vorbehandelt. Nach dem Erkalten wird 1 cem einer Lsg. alizarinsulfosaurem Na (0,3 g in 1 l W.) zugegeben u. nach 5 Min. die violettrote mit KF-Lsg. (25,05 g in 1 l) auf eine leichtorange Farbe titriert. Nach Titration Vergleichslsg. auf gleiche Farbe ergibt der Unterschied in den zugegebenen Mengen ridslg. den F-Gehalt der unbekannten Lsg. Analysenresultate von NaF, CaF_2 , MnF_2 , CeF_3 , K_2BeF_4 , KBF_4 , Na_3AlF_6 , Na_2SiF_6 u. K_2TiF_6 werden gebracht. Mn^{IV} u. besonders Th stören; auch bei Ggw. gefärbter Metallionen ist die Analyse gut durchführbar. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 213—20. Eindhoven, Lab. V. Philips' Glühlampenfabriken.)

ULMANN.



E. C. Roper und **E. B. R. Prideaux**, Die Untersuchung von Difluoriden des ls. 1. *K-Difluorid*. Große, nicht hygroskop. Krystalle. Die übliche Titration carbonatfreiem Alkali u. Phenolphthalein war ungenau infolge Ggw. von Silico- id; es wurde deshalb frisch bereitetes, silicatifreies Alkali verwendet, wodurch ndpunkt scharf zu erkennen war u. der Umschlag dauerte. Damit gaben 2 Proben, rt mit 0,1-n. Lauge, entsprechende Werte von 26,8 u. 27,2% HF. Zur Best. lüchtigen HF diente ein besonderer App., der beschrieben wird. Der Gewichts- st beim Erhitzen war 23,84%. — 2. *Na-Difluorid*. Feines, weißes, kaum hygro- Pulver. Da auch NaF nicht hygroskop. ist, so kann die Säure leicht durch zen bis zum konstanten Gewichte erhalten werden; es wurden dabei gefunden u. 31,0%. Durch Titration wurden an HF gefunden im Mittel 29,9%, theoret. %. Es wird deshalb angenommen, daß das Difluorid nicht die theoret. Menge nthalts. — NaF. 1,0082 g gaben, mit H_2SO_4 eingedampft, 1,1596 g Na_2SO_4 , is sich 37,32% Na (theoret. für $NaF \cdot HF$ 37,11%) u. an HF 29,9% berechnen; wurden danach 59,3% berechnet. F wurde bestimmt als CaF_2 ; im Mittel mehrerer . wurden 57,75% gefunden gegen 59,3% berechnet; es ist das die Genauigkeit, ei diesem Verf. gewöhnlich zu erreichen ist. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T 109 10. Nottingham.)

RÜHLE.

Rudolf Lang, Über die Katalyse der Reaktion zwischen arseniger Säure und Über- msäure und deren analytische Anwendung. Die Titration von arseniger Säure mit O_4 u. umgekehrt in saurer Lsg. verläuft wegen der langsamen Rk. zwischen ger Säure u. Mn^{III} - u. Mn^{IV} -Salz bei höherer Temp. u. in Ggw. von starken Säuren glatt. Doch läßt sich, wie Ö. LANG (Sitzungsber. d. K. Böhm. Ges. d. Wiss. mat.-Naturwiss. Klasse 1904. XX) gezeigt hat, ein glatter Reduktionsverlauf Hilfe geeigneter Katalysatoren erzwingen. Eine Nachprüfung dieser Resultate , daß Chlorid allein kein analyt. brauchbarer Katalysator ist, Bromid erwies sich ater gewissen Bedingungen als geeignet, während Jodid, aber auch jede beliebige tionsstufe des J_2 , den brauchbarsten Katalysator darstellt. Bei der vom Vf. urbeiteten *Jodkatalyse* ist als einleitender Vorgang die Rk.



ehen. Die Brauchbarkeit der Methode hängt von dem schnellen Ablauf der Rkk.



as bei Anwesenheit von Cl^- oder durch mäßiges Erwärmen erreicht wird. Auch *Hydrogenid* wirkt katalyt., jedoch sind die analyt. Ergebnisse nicht ganz befriedigend.

Verss. mit AgCl zeigten, daß für seine Wirksamkeit nicht nur feine Verteilung, sondern auch Vorhandensein von überschüssigem Cl' erforderlich ist. — Zur Best. von arseniger Säure wird die $\frac{1}{2}$ -n. bis 2-n. salzsaure, oder wenigstens $\frac{1}{2}$ -n. schwefelsaure auf 100 cc ca. 1 g NaCl enthaltende As^{III}-Salzlsg. mit 1 Tropfen einer ca. $\frac{1}{400}$ -mol. KJ- oder KJO₃-Lsg. versetzt u. mit KMnO₄ auf Rosa titriert. Chloridfreie Lsgg. werden a. 40—50° erwärmt. Stark salzsaure, über 2-n. Lsgg. titriert man am besten potentiometrisch. — Ebenso läßt sich Chromsäure bestimmen, indem die ca. n. salz- oder schwefelsaure chloridhaltige Chromatlsg. mit überschüssiger arseniger Säure versetzt u. mit KMnO₄ unter Zusatz von KJ oder KJO₃ zurücktitriert wird. — Zur Best. von Vanadylsäure in salzsaurer Lsg. gibt man MnSO₄ u. KMnO₄ im Überschuß zu u. titriert potentiometrisch mit arseniger Säure nach Zusatz des Katalysators zurück. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **152**. 197—208. Brünn, Dtsch. Techn. Hochsch.)

ULMANN.

*see
mata
1981
3544*

Friedrich L. Hahn, *Die Erkennung und Bestimmung kleiner Mengen von Perchlorat im Chilesalpeter und im Chlorat*. Nach Verss. von **W. Völkel**, **H. Déguis** und **O. Hofmann**. Das Verf. von LEIMBACH (S. 3170) ist unbedingt zuverlässig für genaue Best. in Zweifelsfällen geeignet. Als Schnellverf. wurde das Verf. von MONNIER (Ann. Chim. analyt. appl. **22**. 1; Arch. Sc. phys. et nat. Genève [4] 4 210; **C. 1916. I. 816**) abgeändert. Es handelt sich darum, festzustellen, ob ein Salpeter mehr oder weniger als 0,5% Perchlorat enthält. Die Lsg. der Probe wird in einer Lsg. von Methylenblau u. Zinksulfat versetzt u. der Farbton mit einer Probe bekannten Gehaltes verglichen. Manche Unterschiede werden besonders deutlich beim Vorschalten eines Gelbfilters (Agfa, für photograph. Zwecke). Die Lsgg. können fertig von E. MERCK, Darmstadt, bezogen werden. — Perchlorathaltige Chloratlsgg. geben in Ggw. von Nitrat dieselbe Färbung wie chloratfreie Nitratlsgg. In chloridhaltigen Lsgg. bleicht die Färbung allmählich aus. (Ztschr. f. angew. Chem. **39**. 4 bis 454. Frankfurt a. M.)

JUNG.

F. Mach und **W. Lepper**, *Über die Bestimmung des Thalliums in Mäusepräparaten*. Tl-Salze werden zum Vergiften von Getreide u. Pasten benutzt, die unter dem Namen Zeliokörner oder -pasten zum Vergiften von Mäusen usw. in den Handel gebracht werden. Vff. haben die bisher üblichen Methoden zur Best. des einwertigen Tl geprüft, u. die folgenden Ergebnisse erhalten. Die Chromatmethode liefert, wenn in der durch NH₃ alkal. gemachten Lsg. das Tl durch K₂CrO₄ gefällt u. mit 1% Lsg. von K₂CrO₄ u. dann mit 80%ig. Aceton ausgewaschen wird, hinreichend genaue Resultate. Die Jodidmethode gibt jedoch beim Fällen in essigsaurer oder ammoniakalischer Lsg. bei größeren Mengen Nd. zu niedrige Werte. Die besten Werte gibt die Fällung des Tl durch K₃Fe(CN)₆ u. KOH als Tl(OH)₃ u. Wägen als Tl₂O₃ nach einstünd. Trocknen bei 200°. Mittels desselben Verf. kann man auch das Tl bei Ggw. von organ. Substanz bestimmen, wenn man diese zuvor durch das Gemisch von HNO₃ u. H₂SO₄ zerstört (genauere Vorschrift im Original). Zur Trennung des Tl vom As ist die Abscheidung des letzteren nicht erforderlich, wenn es als H₃AsO₄ vorliegt u. das Tl als Chromat gefällt werden kann. In einem Gemisch von Pb- u. Tl-Salzen kann man nach dem Ausfällen eds Pb als Sulfat das Tl nach der Chromatmethode bestimmen. Die folgende Arbeitsweise wird vorgeschlagen. 10 g der gemahlenden Zeliokörner werden mit H₂SO₄ und HNO₃ aufgeschlossen, die mit W. verd. Lsg. wird mit H₂SO₃ bis zum Verschwinden des SO₂ gekocht. Nach dem Neutralisieren fällt man mit 25 ccm Eisencitratlsg. 25 ccm Magnesialsg. die H₃PO₄ rührt eine Stde. aus, füllt auf 400 ccm auf, gibt 100 ccm des Filtrats 25 ccm 4%ig. K₂CrO₄-Lsg., läßt 12—18 Stdn. stehen, filtriert durch einen Goochtiiegel, wäscht zuerst mit 1%ig. Lsg. von K₂CrO₄ u. dann mit we. 80%ig. Aceton, worauf man 1 Stde. bei 120—130° trocknet. 1 mg Tl₂CrO₄ = 0,962 Tl₂SO₄ oder 0,779 mg Tl. (Ztschr. f. anal. Chem. **68**. 36—45. Staatl. landwirtsch. Anst. Augustenberg in Baden.)

BÖTTGER

L. Dede und Th. Becker, *Über die Beeinflussung der Sulfidfällung durch den Zusatz Neutralsalzen*. (Vgl. DEDE u. BONIN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 2327; C. **1923**. 123.) Zwecks quantitativer Best. des Einflusses, den Neutralsalze auf die Sulfidfällung ausüben, untersuchen Vff. Lsgg., die im Liter 1 Milligrammatom eines Metalles halten u. denen 4-n. Neutralsalzlsg. u. 5-n. Säurelsg. zugegeben wurde. Die Dauer langsamen Durchleitens von H_2S durch 100 ccm der in einem Thermostaten auf gehaltenen Lsg. betrug 15 Min. Die Ergebnisse werden tabellar. u. graph. gebracht. — Im System $PbCl_2$ - $MgCl_2$ - HCl ist die Sulfidfällung, wie nach der früheren Arbeit (l. c.) erwartet war, unvollständig. — $Pb(ClO_4)_2$ - $NaClO_4$ - $HClO_4$ zeigt, daß der Einfluß Perchlorat wohl recht stark ist, doch geringer als der der Chloride. — $CdCl_2$ - KCl - HCl zeigt, daß der Einfluß der Neutralsalze beim $CdCl_2$ trotz der großen Neigung des $CdCl_2$, d. Halogenkomplexe zu bilden, geringer ist als beim $PbCl_2$. Dagegen verhalten Cd u. Pb , wie Unters. von $Cd(ClO_4)_2$ - $NaClO_4$ - $HClO_4$ zeigte, im Chloratsystem gleich. $CdSO_4$ - Na_2SO_4 - H_2SO_4 zeigt, daß hier im Vergleich zu den beiden anderen Sulfidfällungen bei Cd die größte Säurekonz. zur Verhinderung der Fällung erforderlich ist. — Im System $SnCl_2$ - KCl - HCl wird die Sulfidfällung durch Ggw. größerer Mengen Neutralsalze stark beeinflusst. Die erhaltenen Werte sind außerdem stark vom Alter benutzten $SnCl_4$ -Lsg. abhängig, da durch Hydrolyse B. bas. Salze eintritt, welche mit H_2S leichter fällbar sind. — Unters. von $(NH_4)_6Mo_7O_{24}$ - $4H_2O$ - $CaCl_2$ - HCl ergab ebenfalls einen starken Einfluß des Neutralsalzzusatzes. — Anschließende Unterss. über den Einfluß der Temp. auf die Sulfidfällung zeigen, daß derselbe bei Lsgg. mit Neutralsalzzusatz weit geringer ist als bei Lsgg. ohne Zusatz. — Die beobachtete Abnahme der Löslichkeit von H_2S in W. bei Zusatz eines Neutralsalzes ($CaCl_2$, $NaClO_4$ u. SO_4) erwies sich von der Natur des Elektrolyten deutlich erkennbar abhängig. (Z. f. anorg. u. allg. Ch. **152**. 185—96. Bad-Nauheim, Hess. Inst. f. Quellenforsch.)

ULMANN.

Organische Substanzen.

James C. Munch, *Die refraktometrische Bestimmung von Alkohol und Estern in ätherigen und Baumwollsaamenöllösungen*. Vff. bestimmt die Zunahme des Brechungsindex von aliphatischen Alkoholen u. Alkylestern in wss. u. Baumwollsaamenöl-Lsgg. Die Zunahme benutzt er zur quantitativen Best. der Alkohole u. Ester in solchen Lsgg. (Tabellen im Original.) Er findet eine gewisse Beziehung zwischen der Zunahme des Brechungsindex u. Öl-Lsgg. ($r = -0,78 \pm 0,04$), so daß man die Zunahme für die eine Lsg. berechnen kann, wenn man den Wert für die andere kennt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 994—1003. Washington, Univ.)

BRAUNS.

L. Freedman und A. E. Sherndal, *Über eine neue Farbenreaktion, um Neosalvarsan von Sulfosalvarsan zu unterscheiden*. Neosalvarsan, saure Lsgg. von Formaldehydsulfoxylat, starke Lsgg. von alkal. Salvarsan reduzieren Methylenblau zur farblosen Form, dagegen wird der Farbstoff von Sulfosalvarsan, neutralen u. alkal. Lsgg. von Formaldehydsulfoxylat, sauren oder schwach alkal. Lsgg. von Salvarsan, sauren, u. neutralen Formaldehydbisulfid-Lsgg. nicht entfärbt. Die Prüfung mit Methylenblau ist besser als mit Indigokarmin. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. **22**. 287—289. 1925; Ber. ges. Physiol. **34**. 270—71. Brooklyn, H. A. Metz laborat. Ref. **1**.)

OPPENHEIMER.

Edward Parkhurst Phelps und Allan Winter Rowe, *Ätheruntersuchungen*. III. Quantitative Bestimmung von Aldehyd als Verunreinigung. (II. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2078; C. **1925**. I. 554.) Vff. empfehlen zur Best. von Aldehyd in Äther die Methode: In einem Duboseq'schen Colorimeter werden beide Gefäße mit Äther (wie l. c. gereinigt) beschickt, dann in das eine 4 ccm besonders gereinigten Aldehyd (wie l. c. Standardlsg. von Aldehyd in Ä., die durch Lösen einer gewogenen Menge Acetaldehyd in einer bestimmten Menge Ä. erhalten wird, in das andere

5 ccm des zu untersuchenden Ä. zugefügt. In beide Gefäße werden dann je 5 ccm SCHIFFS Reagenslsg. gegeben, die folgendermaßen bereitet wird: 30 ccm einer 0,1%ig. wss. Fuchsinlsg. werden mit 200 ccm gesätt. SO_2 -Lsg. gemischt, 3 ccm konz. H_2SO_4 zugefügt u. nach 24 Stdn. wenn nötig filtriert. Nach 15 Min. werden die Färbtöne im Colorimeter verglichen. Der Aldehydgehalt der Standardlsg. zeigt dann den Aldehydgehalt in 5 ccm des zu untersuchenden Ä. an. Da die Farbintensitäten mit Aldehydgehalt proportional sind, muß, falls sie sehr verschieden sind, der Versuch mit mehr oder weniger Standardlsg. wiederholt werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 1049—53. Boston [Mass.], Evans Memorial.)

BRAUNS

Kurt Täufel und Carl Wagner, *Über die alkalimetrische Bestimmung des Formaldehyds mittels Natriumsulfits*. Aus der von KOLTHOFF (Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **109**. 69; C. **1920**. III. 30) aufgenommenen Titrationskurve der H_2SO_3 geht hervor, daß den besten Umschlag beim Titrieren mit NaOH ein Indicator mit dem Titrations-exponenten $\text{pH} \sim 10$ gibt. Ein solcher ist das Thymolphthalein. Vf. haben vergleichende Verss. über die Titration von Formaldehydslsgg. angestellt, die mit demselben Indicator der Lsg. von Na_2SO_3 versetzt waren, u. bei denen in einem Fall Thymolphthalein in den anderen Phenolphthalein entweder ohne weiteren Zusatz, oder unter Zusatz wechselnder Mengen NaCl verwendet wurde. Der Mittelwert der bei den 5 Versuchsreihen verbrauchten ccm 0,1-n. HCl ist nahezu gleich der bei Anwendung von Thymolphthalein als Indicator (3 Tropfen der 0,1%ig. Lsg. bei 50 ccm $\sim m$ - Na_2SO_3 -Lsg. u. 10 ccm Formaldehydstammlsg., die durch Verd. von 74,65 g käuflicher Formaldehyd-lsg. auf 250 ccm hergestellt war) verbrauchten Anzahl von ccm. (Ztschr. f. anal. Chem. **68**. 25—33. München, Laborat. f. angew. Chemie.)

BÖTTGER

K. R. Dietrich, *Nachweis und colorimetrische Bestimmung des Aldehyds im Alkohol*. Vf. benutzt die Farbvertiefung, die beim Schütteln von 3 ccm techn. Bzl. mit 5 ccm konz. H_2SO_4 u. 2 ccm des zu prüfenden Alkohols gegenüber einem alkoholfreien anal. Vergleichsvers. eintritt zum qualitativen bzw. quantitativen colorimetr. Nachweis von Acetaldehyd. Schon durch 0,001% Aldehyd tritt Farbvertiefung ein, 0,1% Aldehyd zeugt dunkelbraune Flocken. Fuselöl stört die Best. nicht. Formaldehyd gibt dieselbe Färbung. Das Bzl. ist brauchbar, wenn bei 5 Minuten langem Schütteln mit gleichem Vol. H_2SO_4 (D. 1,84) u. 2 Minuten langem darauffolgendem Stehen eine Gelbfärbung hervortritt, die dem Farbton einer 0,05%ig., bis höchstens 0,3%ig. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -Lsg. in 50%ig. H_2SO_4 entspricht. (Apoth.-Ztg. **41**. 249. Berlin, Wettiner Apotheke.)

A. H. Clark, *Die Bestimmung von Salicylarten und Benzoaten*. Vf. prüfte die verschiedenen Methoden nach u. fand, daß die besten Resultate erzielt werden entweder bei der Best. des Metalls als Chlorid, oder durch Wägen der durch HCl freigemachten u. mittels Chlf. extrahierten organ. Säuren. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **15**. 10 bis 11.)

ROJAHN

Mykola Wikul, *Über die oxydimetrische Bestimmung der Weinsäure nach der Methode K. Täufel und C. Wagner bei der Anwesenheit von Nitrit (NO_2)*. Vf. war in einem besonderen Fall genötigt, die Vorbereitung einer Substanz zu der Best. der Weinsäure nach TÄUFEL u. WAGNER (Ztschr. f. anal. Chem. **67**. 16; C. **1919**. II. 2284) abzuändern u. teilt diese Abänderung mit, da man sich ihrer vielleicht in allen Fällen bedienen kann, in denen, wie dem seinigen, die Weinsäure in Gegenwart anderer wirkender Stoffe zu bestimmen ist. Die in W. verteilte Substanz wird mit überschüssigem Na_2SO_3 u. darauf mit verd. H_2SO_4 versetzt, alsdann erwärmt, bis das SO_2 vertrieben ist, abgekühlt u. verdünnt. Die Lsg. enthält dann die gesamte Weinsäure unverändert. (Ztschr. f. anal. Chem. **68**. 45—47. Pödebrady bei Prag.)

BÖTTGER

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Willy Schmitt, *Eine neue Wasserstoffelektrode zur Messung kohlensäurehaltiger Körperflüssigkeiten, insbesondere des Liquors*. Elektrode mit stehender Gasblase.

ein weites Rohr, das oben einen Schliff trägt, in den der Stopfen mit Pt-Elektrode ist, seitlicher Capillarrhahn zur Einleitung von H_2 , unten Capillarrhahn, der mit zu ersuchender Fl. gefüllt die Verb. mit KCl-Lsg. darstellt. (Biochem. Ztschr. **170**. —94. Leipzig, Med. Poliklinik.)

MEIER.

George W. Hargreaves, *Eine Studie über die Thalleiochinreaktion und eine neue Identifikation derselben*. Vff. sehen die obige Rk. als einen Oxydationsvorgang an, bei dem in der Benzolhälfte des Chinolinkernes ein o-Chinon gebildet wird. Vff. verändern die Rk. durch Zugabe einer cem einer 2%ig. alkoh. Lsg. von Phenylhydrazinhydrat zu der durch Bromwasser oxydierten Chininprobe u. nachfolgendes Verreiben mit überschüssigem verd. NH_3 . Es tritt bei Mengen von 0,5—5 mg eine tiefviolette Färbung auf. Morphin u. Codein verhindern die Rk., wenn das Beimengungsverhältnis größer als 1:1 ist. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **15**. 100—105. Univ. of Arkansas, College of Pharmazie.)

ROJAHN.

G. C. van Walsem, *Beitrag zu der Praxis der Romanowsky-Giemsafärbung des Blutes*. Arbeitsvorschrift u. Handgriffe. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie **43**. 100—109.) TR.

Vasterling, *Kleine Mitteilungen aus der pharmazeutisch-analytischen Praxis*. Vff. beschreibt vorteilhafte Darst. von H_2S , Chlorwasser u. $SnCl_2$ -Lsg., empfiehlt an Stelle des Gebläses den Méker-Brenner, als Saugpumpe die Wetzelsche, an Stelle der Nappe bei der Polarisation eine mit seidnem Gelblichtbeutel oder gelbem Papier umhüllte Petroleum- oder elektr. Lampe. Zur Gehaltsbest. von *Liq. Cresoli sapon.* empfiehlt Vff. das Verf. von SCHMATOLLA: Abscheidung des Kresols u. der Fettsäuren als HCl u. Ablesung des Volumens der Ausscheidung im Meßzylinder, als hinreichend u. — *Sal Carolinum factitium crystall.* muß einen geringen Gehalt an Na_2CO_3 u. $NaCl$ besitzen. — *Tinctura Jodi*. Nach der Thiosulfattitration (Indicator frische Stärkelösung) sollte nach Zusatz von Phenolphthalein mittels $\frac{1}{10}$ -n. Lauge der Gehalt an freier Jod festgestellt werden. — *Jodzählbest. nach Hübl* wird verworfen u. die Einführung der VINKLERSchen Methode vorgeschlagen. *Formalin*. Zur Best. des $HCHO$ benutzte O_3 -Lsg. muß frisch bereitet sein. Ebenso einfach ist die jodometr. Methode von KJELDAHL. *Maßanalytisches*: Als Urtitersubstanz wird $KHCO_3$, Campher-, Bernstein- oder oxal-krystallisierte Oxalsäure vorgeschlagen. Carbonatfreie $\frac{1}{1}$ -n. NaOH kann leicht durch Verdünnen einer 50%ig. NaOH, in der Carbonat unl. ist, erhalten werden. $\frac{1}{10}$ -n. wird pilzfrei durch Zusatz einiger Tropfen Hg gehalten. *Zuckernachweis im Harn*: empfehlen ist HEINES Reagens (2 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ in $15H_2O$ lösen, ebensoviel Glycerin u. 10 cem 5%ig. KOH zufügen). — *Konservierung des Harns* durch einige Tropfen Formalin (auch anwendbar zur Konservierung von wss. Pflanzenauszügen). *Eiweißbest.*: LEBACHS Albuminimeter sehr ungenau. Eichung durch vergleichende gewichtsanalyt. Best. wird empfohlen. (Pharm. Ztg. **70**. 1558—59. 1925. Gotha.) ROJAHN.

Madeleine Magnette, *Über die Veränderungen, die die Alkaloide der Tropingruppe bei verschiedenen Stoffen erleiden*. Vff. macht auf Widersprüche in der bzgl. Literatur aufmerksam. Sie stellt durch zahlreiche Verss. fest, daß die Alkaloide der Tropingruppe, wie direkt vom Tropin ableiten, wie Atropin, Hyoscyamin u. Tropacocain in faulender Umgebung sehr widerstandsfähig sind u. daß Atropin u. Hyoscyamin noch nach langer Zeit aus Leichen isoliert werden können. Die Alkaloide, bei deren Spaltung Ecgonin entsteht, wie Benzoyllecgonin, Cocain u. Ecgonin selbst fallen bald der Zers. anheim. Nachweis ihrer Spaltstücke kann nicht eindeutig auf die Alkaloide geschlossen werden. Niedrige Temp., trockner Boden, Berührung mit Luft u. im besonderen saure Umgebung verzögern die Zers. Nur positiver Ausfall mehrerer spezif. Rkks. beweist das Vorhandensein eines der obigen Alkaloide. (Journ. Pharm. de Belgique **7**. 757—67. 781—83. 805. 821—23. 1925. Lüttich, Univ.-Lab.)

ROJAHN.

Julius Schneller, *Das Luminal und sein gerichtsarztlicher Nachweis*. Nachweis von Luminal in Leichenteilen noch nach 2 Monaten möglich. Das angesäuerte Material wird mehrfach mit h. W. ausgezogen, die eingeeengten Filtrate mit A. gefällt, filtriert,

der A. verjagt, mit W. verd. u. mit CHCl_3 ausgeschüttelt. Der gereinigte Rückstand wird identifiziert durch den F., durch B. eines weißen Nd. mit Millons Reagens andere Rkk. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin **7**. 259—77. Erlangen, Univ.)

H. Golaz und K. Siegfried, *Einige Vorschläge für galenische Präparate der Pharmacopoea Helvetica V.* (Schweiz. Apoth.-Ztg. **63**. 593—96. 605—07. 625—29. 641—45. 657—59. 1925.) ROJAR

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

R. Seeliger, *Die physikalischen Grundlagen der elektrischen Gasreinigung.* Zusammenfassende Darst. der Theorie der Elektrofilterung u. Literaturverzeichnis (Ztschr. f. techn. Physik **7**. 49—71.) JUNC

Rudolf Mewes, *Theoretisch und praktisch wichtige Fragen der Gasverflüssigung und Gastrennung.* II. u. III. (I. vgl. Ztschr. f. Sauerst.- u. Stickst.-Ind. **17**. 60—62. C. 1925. II. 2180.) (Ztschr. f. Sauerst.- u. Stickst.-Ind. **18**. 2—3. 11—13. Berlin.) JUNC

Deutsche Gasglühlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Deutschland, *Gegen Fäulnis und Säuren widerstandsfähige Massen* aus einer oder mehreren Hf-Verbb. gegebenem im Gemisch mit anderen feuerfesten MM. (SiO_2 , MgO). (F. P. **602 134** vom 1/10. 1925, ausg. 12/3. 1926. D. Prior. 13/8. 1924.) KAUSCH

Säureschutz Gesellschaft m. b. H., Deutschland, *Säurefeste Behälter u. Apparate.* Man überzieht die aufgerauhte Oberfläche mit fl. geschmolzenen oder gel. Harz- oder Lackkondensationsprodd. u. härtet den Überzug durch Erwärmen. Als Harz wird z. B. ein Gemisch von Phenol-Aldehydkondensationsprod. mit Füllmitteln, Geweben usw. verwendet. (F. P. **602 974** vom 7/9. 1925, ausg. 6/4. 1926. D. Prior. 11/4. 1925.) KAUSCH

Gesellschaft für Lindes Eismaschinen Akt.-Ges., Hoellriegelskreuth b. München, *Trennung von Gasgemischen.* Man stellt z. B. ein Gemisch von H_2 u. N_2 aus dem die H_2 enthaltenden Gasen durch teilweise Kondensation unter Druck u. Kühlen des komprimierten Gases in Gegenstromwärmeaustauschern mit den abgetrennten Bestandteilen her. Die weniger leicht flüchtigen Stoffe als N_2 werden dabei zum Teil fl. u. wird der H_2 -Gehalt auf die gewünschte Höhe gebracht. Das zurückbleibende Gas wird unter Druck mit fl. N_2 gewaschen, in einem Motor zur Expansion gebracht, nach dem es vorher auf über -192° erwärmt hat. (E. P. **248 377** vom 24/2. 1926, Ausg. veröff. 28/4. 1926.) KAUSCH

N. V. Algemeene chemische Productenhandel, Haag, Holland, *Abscheidung organischer Dämpfe aus Gasen* in einem Absorptionsapp., der eine Reihe von Rohstoffen enthält, die das Absorptionsmaterial (Kohle) in dünne Schichten verteilen. (F. P. **245 856** vom 21/9. 1925, ausg. 11/2. 1926.) KAUSCH

Humphreys & Glasgow, Ltd., Westminster, übert. von: **W. H. Fulwider**, Wallingford, Pennsylvan., *Gasreinigung.* Bei der Reinigung von Gas vom H_2S wird dieses mit einer verd. alkal. Lsg., die durch Belüften unter Druck regeneriert wird, behandelt. Wenn die Konz. des $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 20 g pro l gehalten wird, fällt elementares S. vollkommen aus u. wird die Adsorption des H_2S beschränkt. (E. P. **248 355** vom 24/2. 1926, Auszug veröff. 28/4. 1926. Prior. 27/2. 1925.) KAUSCH

Siemens-Schuckert Werke, G. m. b. H., Deutschland, *Rostelektrode für elektrolytische Gasreiniger* aus gezogenem Metall. (F. P. **600 796** vom 15/7. 1925, ausg. 12/3. 1926. D. Prior. 16/7. und 22/9. 1924.) KAUSCH

Société l'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des
cédés George Claude, Paris, übert. von: **Eugène Jordan**, Paris, *Trennung von*
gemischen durch Verflüssigung und Rektifikation. (A. P. 1 574 425 vom 24/4.

KAUSCH.

Grasselli Chemical Co., V. St. A., Krystallisation. Der dazu verwendete App.
 eht aus einem ringförmigen kon. Behälter. Ferner sind Vorr. vorgesehen, um ein
 imittel über die innere Fläche zu führen, ferner solche, die ein Kühlmittel außen
 ie Wandung gelangen lassen. (F. P. 603 324 vom 20/8. 1925, ausg. 13/4. 1926.) KA.

Compagnie Générale d'Exploitation des Brevets et Procédés de Récupé-
on Brégeat, Soc. an., Paris, Wiedergewinnung von flüchtigen Lösungsmitteln.
 a. P. 33 862 vom 16/7. 1923, ausg. 10/11. 1924. F. Prior. 21/7. 1922. — C. 1923.

OELKER.

Louis Granger, Charles Mariller und Charles Prache, Paris, *Destillation flüch-*
Produkte. (A. P. 1 574 622 vom 9/1. 1920, ausg. 23/2. 1926. — C. 1921. II.

KAUSCH.

V. Anorganische Industrie.

—, *Wasserstoffanlagen der Francke-Werke K. a. A. in Bremen.* Beschreibung
 H₂-Herst. nach dem Francke-Messerschmittverf. (Ztschr. f. Sauerst.- u. Stickst.
 17. 57—60. 65—67. 84—85. 90—91. 18. 3—4. 13—14.) JUNG.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutschland, Elektrolytische Herstellung von Wasser-
superoxyd aus Perschwefelsäure u. ihren Salzen mit Kathoden, deren mit dem
trolyten in Berührung kommender Teil aus Au oder Pb, Al oder Legierungen mit
n Überzug von Au bestehen. (F. P. 603 043 vom 10/9. 1925, ausg. 7/4. 1926.
 rior. 26/9. 1924.) KAUSCH.

Anton Jahl, Deutschland, Überführung von löslichen Sulfiden in Chloride und
efel. Feste l. Sulfide werden mit HCl unter gleichzeitiger Zufügung von SO₂ in
 er Menge, daß sie immer in der Lsg. vorwiegt, behandelt; letztere führt den ent-
 enden H₂S in S über. (F. P. 603 141 vom 14/9. 1925, ausg. 9/4. 1926. D. Prior.
 1925.) KAUSCH.

Canadian Press-Air Ltd., übert. von: Henry Wyatt Johnston und Eric Julian
, Montreal, Canada, Kohlendioxyd und Stickstoffverbindungen. Man läßt atmosphär.
 über glühende Kohle strömen, trennt das gebildete CO₂ von dem N₂, bringt H₂
 durch Elektrolyse von W. hervor u. bringt den H₂ mit N₂ zur Verb. (Can. P.
 186 vom 15/4. 1925, ausg. 6/10. 1925.) KAUSCH.

Ivar Walfrid Cederberg, Deutschland, Salpetersäure. Bei der katalyt. Oxydation
 NH₃ wird die Menge des O₂ so bemessen, daß der Überschuß zur theoret. not-
 igen so gering als möglich ist. Die Reaktionsgase strömen in eine Absorptions-
 u. das Kondensat bewegt sich in gleicher Richtung wie die Gase. Zufuhr von W.
 außen findet nicht statt. (F. P. 603 226 vom 18/9. 1925, ausg. 12/4. 1926. D. Prior.
 1924.) KAUSCH.

N. Kyber, Berlin-Steglitz, Phosphorsäure. Man verwendet CO₂ oder ein dieses
 stendes Gas an Stelle von Luft zum Oxydieren des von der Behandlung der Phos-
 te mit Silicaten u. Kohle im Schachtofen erhaltenen P in einem Recuperator bei
 —1300°. (E. P. 248 332 vom 14/12. 1925, Auszug veröff. 28/4. 1926. Prior.
 1925. Zus. zu E. P. 242 650; C. 1926. I. 1690.) KAUSCH.

Norman Eankin Wilson, Belleville, N. J., Fällung unlöslicher Sulfosalze. Festes
 antimoniat wird mit einer Mineralsäure, die ersteres zersetzen kann, versetzt, es
 Sb₂S₃. (Can. P. 252 563 vom 11/6. 1924, ausg. 11/8. 1925.) KAUSCH.

hemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin, Kieselsäuregel.
 Gel wird gewaschen u. bei über 600° (650°) unter Luftzuführung getrocknet.

(F. P. 600 944 vom 20/7. 1925, ausg. 18/2. 1926. D. Priorr. 4/8. und 3/11. 1924 und 5/6. 1925.) KAUSCH.

Elektro-Osmose Akt.-Ges., Wien, *Kieselsäure*. Alkalisilicatlsgg. werden mit so viel HCl versetzt, daß nur die Hälfte des an die H_2SiO_3 gebundenen Alkalis abgesättigt wird, wobei eine Wasserglaslsg. von der D. 1,3 verwendet u. das Vol. der zur Anwendung gelangenden Säure u. des zur Verdünnung der Silicatlsg. u. der Säure dienenden W. zusammen halb so groß bis gleichgroß wie das Vol. des verwendeten Wasserglases bemessen wird. Schließlich läßt man das durch Vermischen der Reaktionsstoffe erhaltene Gemisch 15—20 Stdn. stehen. (Oe. P. 102 961 vom 14/8. 1924, ausg. 10/12. 1926.) KAUSCH.

Gesellschaft für Chemische Produktion m. b. H., Mannheim-Waldhof, **Heinrich muth Müller-Clemm**, Mannheim, und **Erwin Schmidt**, Mannheim-Waldhof, *Hochaktive Kohle*. (Schwz. P. 113 730 vom 13/10. 1924, ausg. 1/2. 1926. D. Prior. 5/11. 1923. — C. 1924. II. 1501.) KAUSCH.

Wilhelm Glud und **Bernhard Lopmann**, Dortmund-Eving, *Natriumdicarbonat und Ammoniumchlorid*. (Can. P. 252 455 vom 5/1. 1925, ausg. 11/8. 1925. — C. 1925. I. 2648 (Ges. für Kohlentechnik.) KAUSCH.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., übert. von: **Gustav Pistor**, Griesheim a. M., *Trocknen von Calciumhypochloritverbindungen*. (A. 1 572 952 vom 26/3. 1925, ausg. 16/2. 1926. — C. 1925. II. 1208.) KAUSCH.

Renato Monterumici, Frankreich, *Magnesiumhydrat*. Ein Mg-Salz wird in Lösung mit überschüssigem NH_3 bei möglichst niedriger Temp. u. unter Rühren behandelt. Analog wird festes Mg-Salz der Einw. von NH_3 ausgesetzt. (F. P. 600 396 vom 7/12. 1925, ausg. 5/2. 1926. It. Prior. 19/7. 1924.) KAUSCH.

Anton Jahl, Deutschland, *Bariumhydroxyd*. Festes BaS wird mit in W. l. PbSO_4 sulfiden gemischt u. mit h. W. ausgelaugt. (F. P. 603 159 vom 15/9. 1925, ausg. 10/12. 1926. D. Prior. 18/4. 1925.) KAUSCH.

Albert F. Meyerhofer, Zürich, Schweiz, *Herstellung von Bariumsuperoxyd und Bariumphosphaten beliebiger Zusammensetzung*, dad. gek., daß man $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ mit H_2SiF_6 umsetzt, das gefällte BaSiF_6 von der H_3PO_4 trennt durch Wärme in BaF_2 und SiF_4 zerlegt, das SiF_4 zur Rückgewinnung der H_2SiF_6 benutzt, das BaF_2 andererseits mit Nitraten solcher Metalle, welche swl. Fluoride bilden, zu den Fluoriden der Metalle u. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ umsetzt, letzteres durch Erhitzen in BaO überführt u. das erhaltene BaO in bekannter Weise in BaO_2 verwandelt. (D. R. P. 426 735 Kl. 1 vom 6/11. 1923, ausg. 16/3. 1926. Zus. zu D. R. P. 426034; C. 1926. I. 2827.) KAUSCH.

D. Tyrer, Stockton-on-Tees, *Bariumnitrat*. Man löst Ba-Verbb. (Witherit) in h. W. u. setzt zur erhaltenen BaCl_2 -Lsg. HNO_3 zu. Es fällt $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ aus, das gewaschen wird. (E. P. 248 593 vom 6/5. 1925, ausg. 14/4. 1926.) KAUSCH.

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, übert. von: **B. T. Horsfield**, Bala-Cynwyd (Nord-Carolina), *Oxyde*. Man führt Al_2O_3 oder MgO oder Gemische von Al_2O_3 , MgO u. CaO in hohle Kugeln über u. reinigt sie durch Einblasen eines Gases mit hoher Geschwindigkeit in einen Strom des geschmolzenen Oxyds. (E. P. 248 360 vom 10/12. 1926, Auszug veröff. 28/4. 1926. Prior. 2/3. 1925.) KAUSCH.

Rudolf Jacobsson, Schweden, *Zersetzen von Metallsulfaten*. Man erhitzt $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ o. dgl. im Vakuum auf 630°. (F. P. 603 274 vom 15/7. 1925, ausg. 12/4. 1926. Schw. Prior. 16/7. 1924.) KAUSCH.

Deutsche Gasglühlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, *Trennung der Cers von Lanthan, Didym, Eisen usw.* Man oxydiert hochkonz. (übersätt.) Lsgg. der Ce-Salze elektrolyt. auf. Es scheidet sich nach Einbringen der erhaltenen Lsgg. in ein saures Ce-Salz ab, wodurch es von dem Fe, Di, La usw. getrennt ist. (Oe. P. 102 961 vom 27/12. 1924, ausg. 25/3. 1926. D. Prior. 18/1. 1924.) KAUSCH.

D. Tyrer, Stockton-on-Tees, *Ferrichlorid*. FeCl_2 -Krystalle werden mit Cl_2 behandelt u. aus der h. Lsg. wird durch Kühlung FeCl_3 zur Abscheidung gebracht. Will man FeCl_3 , $6\text{H}_2\text{O}$ oder eine FeCl_3 -Lsg. erhalten, so setzt man entsprechende Mengen W. (E. P. 248 214 vom 6/5. 1925, ausg. 7/4. 1926.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

J. Dautrebande, *Die feuerfesten Stoffe, ihre Arten und Herstellungsweisen und chemische Zusammensetzung*. (Vgl. S. 2417.) Zusammenfassende Darst. der verschiedenen, zur Herst. feuerfester Stoffe benutzten Rohstoffe u. der Eigenschaften, die feuerfesten Stoffe besitzen müssen. Im vorliegenden Teile wird dann im einzelnen der Besprechung der aus Tonen, deren reinstes das Kaolin ist, hergestellten feuerfesten Stoffe, der Art ihrer Herst. u. Verwendungsart u. ihrer Eigenschaften ben. (Rev. chimie ind. 35. 113—16.) RÜHLE.

L'Oxyhydrique Française, Frankreich, *Polierpulver*. Man läßt in der Hitze einander Reduktions- u. Oxydationsmittel auf natürl. Fe_2O_3 einwirken. (F. P. 487 vom 4/10. 1924, ausg. 8/2. 1926.) KAUSCH.

Musag Gesellschaft für den Bau von Müll- und Schlackenverwertungsgesellschaften A.-G. und Adolf Grote, Deutschland, *Verwertung von Haus- und gewerblichem Müll*. Die kieselssäurereichen, durch Sieben des Mülls erhaltenen Teile u. die Trennungsprodd. der Siebrückstände werden, gegebenenfalls unter Zusatz von Na_2O , Co_2O_3 , Fe_2O_3 , CuO , Cr_2O_3 , UO_2 , Cu_2O , Knochenmehl o. dgl. zu Glas verschmolzen. (P. 600 945 vom 20/7. 1925, ausg. 18/2. 1926. D. Prior. 19/1. 1925.) KÜHLING.

Erdwerke München O. Lietzenmayer, München, *Reinigen von Ton*. Man führt Ton mit genügender Menge Säure in eine Paste über, trocknet letztere durch einen Strom, Erhitzen oder durch Vakuum u. wäscht sie mit w. oder k. W. aus. Dann die M. wieder getrocknet u. gemahlen. (E. P. 248 639 vom 17/8. 1925, ausg. 1926. Prior. vom 25/3. 1925.) KAUSCH.

U. B. Voisin, Herault, Frankreich, *Aluminiumzement*. Mischungen von CaO , u. Al_2O_3 in einem Verhältnis, daß der Ausdruck $\text{CaO} - (2\text{SiO}_2 + \frac{1}{2}\text{Al}_2\text{O}_3) =$ bis —15 u. zweckmäßig Null ist, werden 9—12 Std. auf 900—1100° erhitzt, wobei f. nicht schmelzen darf. (E. P. 243 876 vom 30/10. 1924, ausg. 31/12. 1923.) KÜH.

G. B. Batten, London, *Bitumenhaltige Mischung*. Die Mischung besteht aus Teilen Portlandzement o. dgl., 0,5—2 Teilen CaO , 0,5—1% Kohlengries, 0,65—1,7 Teil Bitumen, 0,1—0,3 Teilen Asbest, 0,1—0,25 Teilen Soda u. gegebenenfalls Farbstoff. Sie wird verflüssigtem Asphalt, Pech o. dgl. zugesetzt. (E. P. 243 831 vom 12/9. 1924, ausg. 31/12. 1925.) KÜHLING.

Pfälzische Chamotte- und Thonwerke (Schiffer & Kircher), A.-G., Grünstadt, Rheinpfalz, übert. von: **G. Wagapoff**, Berlin, *Herstellung von Ziegeln*. Feuert. Ton, gegebenenfalls mit Lehm gemischt, wird bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt nicht mehr als 20% getrocknet u. bis zu einer Korngröße zerkleinert, welche zwischen 0,075 mm Feinheit u. 10 mm Durchmesser schwankt. Dann werden Teile von verschiedener Korngröße gemischt, die Mischungen geformt u. gepreßt u. in der üblichen Weise gebrannt. (P. 248 369 vom 22/2. 1926, Auszug veröff. 28/4. 1926. Prior. 25/2. 1925.) KÜHL.

Babcock & Wilcox Comp., übert. von: **Isaac Harter und Anthony Maurice**, New York, *Feuerfeste Gegenstände*. (Can. PP. 250 285 u. 250 286 vom 26/6. 1925, ausg. 2/6. 1925. — C. 1925. I. 2184.) KÜHLING.

J. Radcliffe, London, *Masse für Straßenbelag*. Ein feinkörniger, mineral. oder organ. Stoff, vorzugsweise Sand, wird mit Brennöl genetzt u. mit gepulvertem Ölpech ungefähren F. 230° gemischt. Die Mischung wird aufgewalzt. (E. P. 248 619 vom 30/8. 1924, ausg. 14/4. 1926.) KÜHLING.

John K. Shaw, Minneapolis, Minn., *Holzersatz*. Man kocht Rohrzuckerrückstände mit ihrem natürlichen Mark in Ggw. von Chemikalien u. bei einer Temp., daß das inkrustierende Material gel. wird von den Fasern, die entfernt werden u. einen Holzersatz darstellen. (**A. P. 1 572 565** vom 23/10. 1920, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung

W. H. Hatfield, *Vergleich der Stähle für permanente Magnete*. Zur Herst. permanenter Magnete dienen Kohle-, Kohle-Cr-, W- oder W-Cr- u. Co-Stähle. Die je nach der Verwendung der Magnete sehr verschiedenen Anforderungen an die Eigenschaften der Stähle werden aufgezählt u. vergleichende Angaben über die Koerzitivkraft, Remanenz, magnet. Energie pro g u. den relativen Preis für die Gewichtseinheit der Einheit der magnet. Energie gemacht. (*Journ. Scient. Instruments* **3**, 234—35.) B.

Joseph Laissus, *Beitrag zur Studie der metallischen Zementationen. Zementation der Eisenlegierungen durch das Wolfram*. Ausführliche Wiedergabe der bereits nach C. r. d. l'Acad. des sciences (vgl. S. 3176) referierten Arbeit. (*Rev. de Métallurgie* **23**, 233—42.) KALPERS.

Verein für Chemische und Metallurgische Production, Aussig, *Behandlung von Sulfiderzen*. Sulfiderze, vorzugsweise von niedrigem Gehalt an Pb u. Zn werden in feinkörnigem Zustande bei verhältnismäßig niedriger Temp. u. mit abgemessenen Luftmengen geröstet. Das Röstprod. wird magnet. geschieden. Der nichtmagnet. Teil wird ausgelaugt, der magnet. Teil für sich oder in Mischung mit frischem Erz von neuem geröstet. (**E. P. 248 349** vom 11/2. 1926. Auszug veröff. 28/4. 1926. Prior. 26/2. 1925.) KÜHLING.

Ohio Brass Company, übert. von: **Leslie H. Marshall**, Mansfield, V. St. *Ametallurgisches Verfahren*. (**A. PP. 1 553 907** u. **1 553 908** vom 21/4. 1923, aus 15/9. 1925. — C. 1925. II. 2031.) KÜHLING.

H. G. Flodin, Roslags, und **E. G. T. Gustafsson**, Stockholm, *Reduktion von Erzen*. Von fein zerteiltem u. getrocknetem Erz wird ein Teil mit mehr, der andere Teil mit weniger Kohle, einem Bindemittel u., wenn es sich um Sulfiderze handelt, mit CaO gemischt, die Mischungen brikettiert u. geschmolzen. Die Schmelze wird vorzugsweise mittels Mn, desoxydiert. Wird im elektr. Ofen gearbeitet, so wird die Beschickung um die Elektroden herum angeordnet, um Zerstörung der letzteren durch die Schlacke zu vermeiden. (**E. P. 243 353** vom 18/11. 1925, Auszug veröff. 20/1. 1926. Prior. 19/11. 1924.) KÜHLING.

Hamilton-Evans Process Inc., Norfolk, Virginia, übert. von: **Walter Biskamp**, **Hamilton**, Lancaster, Engl. und **Fergus Reid**, Norfolk, Virginia, *Reduktion von Metallen*. (**Can. P. 252 607** vom 13/6. 1924, ausg. 11/8. 1925. — C. 1925. I. 1798.) K.

Max Heinrich von Seubert, **August Rochling** und **Wilhelm Kleinherm**, Mannheim, *Graues Gußeisen*. (**Aust. P. 18 315** vom 20/6. 1924, ausg. 13/8. 1924. D. Prior. 1/12. 1923. — C. 1925. I. 2467 [H. LANZ].) KAUSCH.

Poldihütte, Praha-Vinohrady, übert. von: **Erich Becker**, Kladno, Tschechoslowakei, *Unmagnetischer Stahl*. (**A. P. 1 574 782** vom 25/5. 1925, ausg. 2/3. 1925. — C. 1925. I. 2044 [Aciéries (Poldihütte)].) KAUSCH.

H. G. Flodin, Roslags, Schweden, und **E. G. T. Gustafsson**, Stockholm, *Herstellung von Eisen und anderen kohlenstoffbindenden Metallen*. In einem elektr. Ofen wird ein Schlackenbad bereitet u. in dieses die gegebenenfalls brikettierte innere Mischung von fein gepulvertem Oxyd u. Kohle, welche zum Teil durch Ferrosilicium, Ferromangan oder Al ersetzt sein kann, eingetragen. Zwecks Red. werden zwischen beweglichen Elektroden u. der Oberfläche des Bades Lichtbogen erzeugt. Gegen Ende des Vorganges werden die Elektroden mehr oder minder tief in das Bad eingesenkt. Nach Entfernung der Schlacke wird mittels CaO, C oder CaF₂ entschweifelt u. ein

sphort. (E. P. 243 743 vom 26/11. 1925, Auszug veröff. 27/1. 1926. Prior. 27/11. 1924.) KÜHLING.

Jacques Johannes Hissink, Holland, *Gewinnen von Nickel aus Erzen*. Die zernerten Erze werden mit Gaswasser ausgelaugt u. während des Auslaugens Luft zugeleitet. Sind die Erze reduzierend erhitzt worden, so hat das Abkühlen unter Zutritt zu erfolgen, um das entstandene metall. Ni in die zur Lsg. im Gaswasser erforderliche Oxydform zu verwandeln. Enthalten die Nickelerze das Ni bereits in d. Form, so erübrigt sich die Red. (F. P. 595 275 vom 18/3. 1925, ausg. 30/9. 1925. Prior. 31/3. 1924.) KÜHLING.

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemensstadt, *Behandlung von Quecksilber*. der Umwandlung von Hg in andere Elemente (wie Gold) wird eine diskontinuierende Entladung von hoher Frequenz zwischen 2 Elektroden erzeugt, von denen die eine aus Hg besteht oder Hg enthält. Es kann Gleich- oder Wechselstrom verwendet werden, die hohe Frequenz mittels Unterbrecher, Induktoren oder oszillierender Ströme hergebracht werden. (E. P. 248 314 vom 13/6. 1925, Auszug veröff. 28/4. 1926. Prior. 24/2. 1925.) KÜHLING.

August Stolte, Hamburg, *Hilfsmittel zum Reinigen von Silbergegenständen* durch Einbringen dieser mit einem elektropositiven Metall in einer alkal. Lsg., gekühlt in einen ganz oder teilweise aus dem elektropositiven Metall bestehenden Behälter, in dem die zur Herst. der alkal. Lsg. dienenden alkal. Salze untergebracht sind u. der Behälter an einer oder mehreren Öffnungen versehen ist, durch die, sobald der Behälter in eine Flüssigkeit eingetaucht wird, letztere in ihn eindringen kann. — Geeignete Metalle sind Zn, Cu u. dgl. (D. R. P. 419 983 Kl. 48d vom 22/3. 1924, ausg. 13/10. 1925.) KÜHLING.

Torsten Georg Stig und Josef Einar Leonard Stig, Odda, Norwegen, *Legierungen*. (E. P. 1 571 382 vom 21/3. 1924, ausg. 2/2. 1926. — C. 1924. II. 756.) KÜHLING.
Canadian General Electric Comp. Ltd., Toronto, Kanada, übert. von: **Aladar J. Cleveland**, V. St. A., *Eisenlegierung*. (Can. P. 249 853 vom 6/9. 1923, ausg. 1925. — C. 1926. I. 1706 (A. P. 1562043).) KÜHLING.

H. G. Flodin, Roslags, Schweden, und **E. G. T. Gustafsson**, Stockholm, *Nicht-eisen Legierungen*. Die Legierungen bestehen aus Fe u. ein oder mehreren nicht-eisernen Metallen, wie Cu, Ni oder, vorzugsweise Cr. Z. B. wird Fe, das nicht mehr als 50% C enthalten soll, mit 0,25—8,99% Cr legiert. (E. P. 243 761 vom 28/11. 1925. Auszug veröff. 27/1. 1926. Prior. 29/11. 1924.) KÜHLING.

R. W. Stimson, New York, *Legierungen*. Zur Herst. von Legierungen, welche aus 50% Fe, Fe u. Ni, Fe u. Co, oder Fe, Ni u. Co, sowie mehr als 3% Cu, Cr, Mn, Ti, W, U, V oder Zr oder mehrere dieser Metalle enthalten, wird ein Bad von geschmolzenem Stahl auf einen geringeren als den im Enderzeugnis zulässigen Gehalt an P u. einen größeren Gesamtgehalt an Si, Mn u. C gebracht, als im Enderzeugnis vorkommt. Auf dieses Bad wird einzeln oder gemischt Eisenerz, Abfalleisen o. dgl., Flußmittel, ein als Reduktionsmittel dienendes Ferrosilicium, welches noch ein oder mehrere der oben genannten Metalle enthält, u. gegebenenfalls ein eins oder mehrere dieser Metalle enthaltendes Erz o. dgl. gebracht u. die Red. durch Erhitzen der Schmelzen bewirkt. Die Schmelze wird gegebenenfalls entgast u. mit einer Schlackenschmelze behandelt, welche gebundenen C, z. B. CaC₂ enthält. (E. P. 243 835 vom 6/11. 1924, ausg. 18/3. 1926.) KÜHLING.

International Nickel Co., New York, *Legierungen*. Gebessemerte zerkleinerte Kupferspeise wird in einem mechan. Ofen geröstet, das Erzeugnis noch h. mit Luft o. dgl. gemischt u. in einem vorzugsweise elektr. Ofen mit bas. Futter unter Einwirkung von Flußmitteln zu Metall reduziert. (E. P. 243 892 vom 21/11. 1924, ausg. 1925.) KÜHLING.

Western Electric Co., Ltd., London, übert. von: **Western Electric Co., Inc.**, New York, *Legierungen*. Mischungen von Metallen, z. B. von Pb u. Sb, Pb u. Sn,

Al u. Zn oder Pb, Sb u. etwas Cu werden einer solchen Behandlung unterworfen, d. eine übersätt. feste Lsg. entsteht. Es geschieht das z. B. in der Weise, daß eine Mischung von 97,5 Teilen Pb u. 2,5 Teilen Sb 72 Stdn. lang auf etwa 240° erhitzt u. dann W. auf 100° oder gewöhnliche Temp. abgeschreckt wird. (E. P. 248 458 vom 3/1924, ausg. 14/4. 1926.) KÜHLING

Compagnie des Produits Chimiques et Électrometallurgiques Alais, France et Camargue, Frankreich, *Masse, insbesondere für die Herstellung von Metallgießform* enthaltend Si als Element oder in Verb. mit Metallen wie Fe u. Al u. ein Bindemittel (wie Ton). (F. P. 601 345 vom 27/7. 1925, ausg. 27/2. 1926. A. Prior. 2/10. 1924.) KÜHLING

H. Todd, Linthorpe, England, *Gußformen*. 40—85% Sillimanit, 5—8% CaS, 2—7% eines faserigen Stoffes, wie Kuhhaar oder Asbest, werden, gegebenenfalls unter Zusatz von Monazitsand, Kokspulver u. Ton, gemischt, die Mischung mit ein wenig Wasserglaslg. befeuchtet u. gebacken. Die Mischung dient zum Ausbessern von Gußformen. (E. P. 248 289 vom 9/11. 1925, ausg. 7/4. 1926.) KÜHLING

Foord von Bichowsky, Glendale, Calif., V. St. A., *Mittel zum Verhindern des Festbrennens der Gußstücke in den Formen*. Die inneren Wände der Formen werden mit Nitriden, z. B. denen des Si, Ti, Al, B usw., überzogen. (A. P. 1 570 802 vom 22/4. 1924, ausg. 26/1. 1926.) OELKER

O. Junker, Stolberg, Rhld., *Schmelzen von Metallen*. Zwecks Verhütung von Oxydationen werden gegen C indifferente Metalle u. Legierungen unter Zusatz von Ruß o. dgl. geschmolzen. (E. P. 243 998 vom 8/6. 1925, ausg. 31/12. 1925.) F.

P. Kühn, Sieg, *Reinigen von Metallen*. Gasförmige, fl. oder gepulverte feine Brennstoffe werden mit einem Strom h. Luft verbrannt, das zu reinigende Metall mittels der entstandenen Flamme geschmolzen u. in bekannter Weise gereinigt. Die Abgase werden in Regeneratoren geleitet, deren Hitze zum Vorwärmen der Verbrennungsluft dient. (E. P. 248 012 vom 23/2. 1926. Auszug veröff. 21/4. 1926. Prior. 23/2. 1925.) KÜHLING

James Harry Gravel, V. St. A., *Reinigungsmittel für anzustreichendes Metall* bestehend aus einer das Metall angreifenden Säure (H₃PO₄), einem Kolloid (Gelatin) u. einem Öllösungsmittel (A.). (F. P. 602 055 vom 11/8. 1925, ausg. 12/3. 1926.) K.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Arthur Foulon, *Der Zusammenhang zwischen Farbe, Absorption und Zusammensetzung eines Farbstoffes*. Angaben über Absorption, Spektren, Chromophore, Chromogene, batho- u. hypsochrome Gruppen, Auxochrome, Valenzelektronen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 149—51.) SÜVERN

—, *Eine moderne britische Farbenfabrik*. Die Anlagen der Morton's Sundy & Fabrics Ltd. u. der Scottish Dyes werden geschildert. Die hergestellten Caledon- u. Solwayfarbstoffe werden besprochen, näher beschrieben ist die Herst. von Solwaygrün durch Kondensieren von Leukochinizarin mit p-Toluidin u. von Caledonbrillantpurpur RR durch Chlorieren von i-Dibenzanthron. (Chemist and Ind. 44. 1218—25. 1925.) SÜVERN

C. R. Ephland, *Probleme der Kettenfärberei mit Küpenfarbstoffen*. Besprechung verschiedener Schwierigkeiten. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 165—66.) SÜVERN

M. T. Johnson, *Das Färben von Rayon mit Küpenfarbstoffen*. Vorschrift für den Großbetrieb mit umlaufender Färbeflotte. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 162.) SÜVERN

Hans Wagner und Eberhard Keidel, *Beiträge zur Lösung des Chromatographieproblems*. Die Dispersität des Chromatind. hängt weitgehend ab von dessen Löslichkeit in der Fällungsfl., da erhöhte Löslichkeit erhöhte Krystallisierfähigkeit zur Folge hat. Die Löslichkeit des Nd. wird beeinflusst einerseits durch die bei der chem. Umsetzung entstehenden Stoffe u. ist damit abhängig von den zur Fällung angewendeten

zen. Langes u. starkes Auswaschen, Verdünnung der Fällungsfl., Erhöhung der np. u. starkes Rühren vergrößern die Niederschlagslöslichkeit u. wirken damit ch Erhöhung der Krystallisierfähigkeit strukturvergrößernd. Mit wachsender dünnung wächst nicht nur die Krystallisierfähigkeit, sondern mit ihr auch die t, die der Nd. zur völligen Ausbildung der bei der jeweiligen Konz. möglichen besten Struktur braucht. Bei kurzem Auswaschen, starkem Rühren, Temperatur- hnung, also bei jeder Krystallisationsunterbrechung, können auch bei stärkster dünnung hochdisperse Ndd. erhalten werden. Bei der durch langes Auswaschen igten Verdünnung der Fällungsfl. tritt im Gegensatz hierzu je nach der zur Ver- ung stehenden Zeit mehr u. mehr die gröbere Krystallform auf. Ist die für eine ichtige Konz. größtmögliche Struktur erreicht, so ändert sie sich auch nach wochen- gem Verbleiben des Nd. in der Fällungsfl. nicht mehr. Auch sehr langsames Trocknen Strukturvergrößerung zur Folge, während scharfes Trocknen sehr dichte Lagerung Einzelteilen bedingt, wodurch die Farbe hart wird. Diese allgemeinen Sätze en auch für die gemischte Chromat-Sulfatfällung Gültigkeit, doch sind hier die nzgebiete weitgehend bestimmt durch das äquivalente Mengenverhältnis von omat zu Sulfat. Weiter wird erörtert, ob Mischkrystalle oder Krystallmischungen uziehen sind. Für reinen citronengelben Ton wird die B. von Krystallmischungen lie von zu großen Mischkrystallen zu vermeiden sein. Nachdunkeln kam ebenso Gebiet der Mischungen wie der Mischkrystalle, bei feinen u. groben Dispersionen (Farben-Ztg. 31. 1567—73. Stuttgart.)

SÜVERN.

F. M. Rowe, A. H. Burr und S. G. Corbishley, *Die Konstitution von Hansa-G (MLB) und anderen gelben Pigmentfarben*. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 82—83. Manchester.)

SÜVERN.

F. M. Rowe und Esther Levin, *Die Zusammensetzung einiger für die Herstellung slicher Azofarbstoffe gebrauchter Produkte*. (Vgl. S. 3278.) (Journ. Soc. Dyers urists 42. 82—83. Manchester.)

SÜVERN.

Charles A. Seibert, *Küpenfarbstoffe für Wolle*. Verschiedene Färbeweisen werden rochen. Als Vorteile der Küpenfarben werden hervorgehoben: Egalisiervermögen, e Dampfbedarf, kurze Färbedauer, Shoddyfärberei. (Amer. Dyestuff Reporter 556—58.)

SÜVERN.

Jean Kern, *Ätzen von Küpenfarbstoffen durch Reduktion*. Angaben über die chiedene Ätzbarkheit der Küpen- u. S-Farbstoffe. Bisher kann man die absolut en Farbstoffe nicht vollkommen ätzen u. auch nicht die billigeren S-Farbstoffe. (er. Dyestuff Reporter 15. 52—56.)

SÜVERN.

H. H. Hodgson, *Die Einwirkung von Schwefel auf die Monochloraniline. Ein erer Beitrag zur Aufklärung des Mechanismus aromatischer Schwefelung und der ktur von Schwefelfarbstoffen*. Die Rk. zwischen o-, m- u. p-Chloranilin u. S be- rt um 170°, geht dann aber so schnell weiter, daß bei über 6 Stdn. ausgedehntem rtzen ein nicht zu behandelnder Komplex entsteht. Zunächst findet Konden- n zu Diphenylaminderivv. statt, das ergibt sich aus dem Auftreten von Subli- en der sehr beständigen Chlorhydrate der Chloraniline, wobei das des o-Chlor- ns vorherrscht. Weitere Rkk. beim o- u. m-Chloranilin sind zu schließen aus e Auftreten von 3,3'-Dichlor-4,4'-diaminodiphenylmono- u. -disulfid u. 4,4'-Dichlor- 4,4'-diaminodiphenylmono- u. -disulfid, die Monosulfide sind zweifellos aus den Di- den entstanden (HODGSON, Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 330; C. 1925. 398). Die Ausbeute an 4,4'-Dichlor-2,2'-diaminodiphenyldisulfid aus m-Chlor- n war verhältnismäßig viel größer als die der entsprechenden Verb. aus o-Chlor- n, seine geringe Löslichkeit in h. verd. HCl, in der es viel weniger l. ist als 2,2'-Di- odiphenyldisulfid führte zu seiner Feststellung bei den Extraktionen. Die Zus. 4,4'-Dichlor-2,2'-diaminodiphenyldisulfids wurde durch Vergleich mit dem durch e von 4,4'-Dichlor-2,2'-dinitrodiphenyldisulfid aus 2,5-Dichlornitrobenzol erhaltenen

Präparat bestätigt. Keine ähnlichen einfachen geschwefelten Verbb. wurden bei der Rk. zwischen S u. p-Chloranilin ermittelt. Bei o- u. p-Chloranilin wurden geringen Mengen von Körpern isoliert, welche anscheinend die entsprechenden Chloraminthiodiphenylamine sind. Es folgt also auf die anfängliche Diphenylaminbildung eine Schwefelung, Verändern der Erhitzungsdauer zeigte aber nur die große Geschwindigkeit der nachfolgenden Kondensation. Die größten Mengen der Verb. wurden bei p-Chloranilin erhalten, nur Spuren beim m-Chloranilin, hier war die Ausbeute an dem einfachen Disulfid größer. Die als Endprodd. erhaltenen grünen Körper hatten im allgemeinen die Eigenschaften von S-Farbstoffen, lösten sich aber nicht in NaOH. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 76—80. Huddersfield.) SÜVERN.

Canadian Salt Co., Ltd., übert. von: **David A. Pritchard**, Windsor, Ontario, *Bleichlösungen*. Man erhitzt eine bestimmte Menge fl. Cl_2 u. drückt mit Hilfe von dem entstandenen Cl_2 -Gas ausgeübten Druckes das fl. Cl_2 in eine Alkalilösung. (Can. P. 254 155 vom 12/6. 1924, ausg. 29/9. 1925.) KAUSCH.

Hugh Campbell Ross, Liverpool, **Hubert Clifton Marris** und **William Walker & Sons Ltd.**, Bolton, England, *Verfahren zum Enthaaren von Fellen*. Man behandelt die Felle mit einer CaS u. NH_3 enthaltenden wss. Äscherfl. — Zur Herst. der letzteren erhitzt man gepulverten S mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 1 Stde. zum Kochen u. stellt die dunkel orangefarbige Lsg. auf eine D. 1,120 in der Kälte ein. Die zu enthaarenden Felle werden in die mit W. verd. Lsg. eingehängt u. alsdann wss. NH_3 D. 0,9 zugegeben. Bei der Enthaarung wird die Temp. auf 45—100° gehalten. Je nach dem Gehalt der Häute an *Thrombase* ist die Enthaarung in 6 Stdn. bzw. 2—3 Tagen beendet. Die Verf. ermöglicht eine Enthaarung unter weitgehender Schonung des Narbens u. der Wolle. (E. P. 241 666 vom 1/9. 1924, ausg. 19/11. 1925. F. P. 603 228 vom 18/11. 1925, ausg. 12/4. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Henry Dreyfus, London, übert. von: **George Holland Ellis**, Spondon b. Derby, England, *Färben von Celluloseacetat*. (Can. P. 248 937 vom 26/9. 1923, ausg. 21/11. 1925. — C. 1925. I. 1016.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., übert. von: **Karl Thiess**, Sindlingen b. Höchst a. M., *Disazofarbstoffe*. (A. P. 1 546 328 vom 29/1. 1925, ausg. 14/7. 1925. — C. 1926. I. 243 (F. P. 592 138).) FRANZ.

Felice Bensa, Genua, Italien, übert. von: **Alois Zinke** und **Alfred Pongraz**, Graz, Steiermark, *Perylenfarbstoffe*. Zu dem Ref. nach E. P. 232 266; C. 1926. 246 (PEREIRA) ist folgendes nachzutragen: *Dibromperylen* aus Nitrobenzol gelbbraune Blättchen, F. 222—224°, in konz. H_2SO_4 mit rötlich violetter Farbe l., unl. in k. W. u. den üblichen niedrig sd. organ. Lösungsmm. unl., wl. in k. hochsd. Lösungsmm. in h. Xylol, Anilin u. Nitrobenzol l. — *O₂-haltiges Bromperylen*, gelbes, in Ätzalkali teilweise l. Pulver, gibt mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ eine rötlich violette Küpe. — *Tetrachlorperylen* aus Anilin, Nitrobenzol, Eg. oder Toluol, gelbe Nadeln, F. 242°, in konz. H_2SO_4 mit rötlich violetter Farbe l. — *Pentachlorperylen*, F. 325°. — *Dichlorperylen*, F. 130°. *O₂-haltiges Chlorperylen* bildet eine rote Küpe. (A. P. 1 580 708 vom 7/4. 1925, ausg. 13/4. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies, **Etablissements Kuhlmann** und **Hans Pereira**, Seixtous, Frankreich, *Perylenfarbstoffe*. (F. P. 591 269 vom 31/12. 1924, ausg. 1/7. 1925. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. I. 245.) FRANZ.

Felice Bensa, Genua, Italien, übert. von: **Alois Zinke** und **Hermann Schoepf**, Graz, Österreich, *Perylenküpfarbstoffe*. (A. P. 1 569 111 vom 17/10. 1923, ausg. 12/1. 1926. — C. 1924. II. 2426.) FRANZ.

Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies, **Etablissements Kuhlmann** und **Hans Pereira**, Seixtous, Frankreich, *Perylenküpfarbstoffe*. (A. P. 1 569 111 vom 17/10. 1923, ausg. 12/1. 1926. — C. 1924. II. 2426.) FRANZ.

anreich, Küpenfarbstoffe der Perylenreihe. (F. P. 591 270 vom 31/12. 1924, ausg. 1925. Oe. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. I. 245.) FRANZ.

Frank Cotton, Hornsby b. Sydney, Neu-Süd-wales, Austr., *Anstrich*, bestehend einer Lsg. von Harz in einem oxydablen vegetabil. Öl u. feinem SiO₂-Material (Sesgelur u. (oder) Portlandzement), Farbstoff u. Ca(OH)₂. (Aust. P. 16 913 vom 3. 1924, ausg. 16/12. 1924.) KAUSCH.

Craftex Co., Boston, übert. von: **Walter Beckwith Allen**, Worcester, Mass., *Strichmittel* aus Casein, mineral. Füllstoffen u. Faserstoffen. (Can. P. 254 390 vom 3. 1924, ausg. 6/10. 1925.) KAUSCH.

Charles de Paul de Barchifontaine, Belgien, *Metallanstrich* bestehend aus einem KW-stoff (D. 670—770), wenig Firnis u. einem Metallfarbstoff. (F. P. 600 931 vom 20/7. 1925, ausg. 18/2. 1926. Belg. Prior. 22/7. 1924.) KAUSCH.

XI. Harze; Lacke; Firnis.

Erich Stock, *Über den Sambas-Kopal*. Das mkr. Bild, die chem. u. physikal. Konstanten werden beschrieben. (Farben-Ztg. 31. 1578. Krefeld.) SÜVERN.

P. Epple, *Über das Kienöl und seine Autoxydationsprodukte*. (Braunkohle 47—52. — C. 1926. I. 2109.) LINDENBAUM.

Hans Wolff, *Über Harzester und die chemischen Vorgänge bei der Herstellung von Resinatfirnissen*. Aus einer Lsg. von käuflichem Esterharz in Amylacetat hatte man einen Bodensatz abgeschieden, der als Glycerintriabietinat erkannt wurde. Dieselbe Ester konnte durch Erhitzen von Pb-Abietinat mit Leinöl erhalten werden. Ansicht von WOLFF u. DORN (Farben-Ztg. 27. 26; C. 1921. IV. 1177) über die Zusammensetzung von Fettsäureglycerid u. Pb-Resinat wurde hierdurch bestätigt. Außer dem Ester bildete sich Abietinsäureanhydrid, dessen Entstehung erklärt wird. (Farben-Ztg. 31. 1573—74. Berlin.) SÜVERN.

A. Eibner und H. Tittel, *Zum diagnostischen und forensischen Wert der Storchenprobe*. Die Storchesche Rk. auf Abietinsäure u. deren Abkömmlinge ist diagnost. u. auch forens. unbehelflich, wenn sie rasch vergehende Violettanfärbung liefert. Es wird empfohlen, diese Rk. nicht mehr „Harzrk.“ zu nennen, sondern sie durch Violettanfärbung von den Harzen nur frische Abietinsäure anzeigt, also nicht stark anoxydierte alte Abietinsäure. Diese liefert nach STORCH nur Braunfärbung. (Korrosion u. Metallschutz 2. 43—45. München.) SÜVERN.

Ellis-Foster Company, New Jersey, übert. von: **Carleton Ellis**, Montclair, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd*. Phenole werden mit Mg(OH)₂ u. CH₂O kondensiert u. die entstehenden Lsgg. nach Zugabe von Füllmitteln auf plast. Massen verarbeitet. — Man erhält z. B. *Phenol* oder *Kresole* mit Mg(OH)₂ u. wss. 37—40%ig. CH₂O-Lsg. unter Rückfluß auf 90—95° ca. 3 Stdn., wobei das Mg(OH)₂ gel. wird. Die Lsg. hinterläßt nach Verdampfen auf einer h. Platte ein zähes, in W. unl. Harz. Dieses kann nach Zugabe der üblichen Füllmittel geformt u. in h. Formpressen unter Druck gehärtet werden. — Man kann auch die wss. Lsg. des *Mg-haltigen Kondensationsprod.* mit einem Füllmittel, wie Sägemehl, h. vermischen u. das Gemisch im Vakuum trocknen, damit es sich in Stücke brechen u. vermahlen läßt. Um ein Anbacken des Pulvers bei der weiteren Verarbeitung zu verhindern, gibt man 1% Al-Palmitat hinzu u. trocknet es in einer h. Presse auf 160—170°, wobei eine hellbraune plast. M. entsteht. (PP. 1 580 424 vom 11/6. 1923, ausg. 13/4. 1926 u. 1 580 425 vom 25/6. 1923, ausg. 13/4. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

The Canadian Electric Products Company, Ltd., übert. von: **Howard Matheson**, Montreal, Quebec, Canada, und **Julius A. Nieuwland**, Notre Dame, Ontario, V. St. A., *Harzartige Kondensationsprodukte aus Phenolen und Aldehyden*.

(Can. P. 250 295 vom 29/7. 1922, ausg. 2/6. 1925. — C. 1923. IV. 951 (E. P. 183 830).) SCHOTTLÄNDER.

Léon Mery, Frankreich, *Lackbehandlungsmittel* bestehend aus H_2SO_4 von 66° B. A., reinem Leinöl, Amylacetat, Brillant Buhler u. dest. W. (F. P. 603 219 vom 18/9 1925, ausg. 12/4. 1926.) KAUSCH.

Alphonse Pire, Belgien, *Mittel zur Beseitigung von Lack und Renovierung* stehend aus NaOH, Kokosbutter, Leinöl, W. Boraxpulver, Kalkpulver u. Na_2CO_3 . Das Renoviermittel besteht aus k. W., CH_3COOH , Oxalsäure u. A. (F. P. 603 360 vom 4/9. 1925, ausg. 14/4. 1926.) KAUSCH.

XV. Gärungsgewerbe.

W. Windisch, *Über die Methoden zur Entcarbonisierung des Brauwassers, zugleich eine wiederholte Warnung vor der automatischen Entcarbonisierung*. Vf. berichtet über die Schwierigkeiten, welche seiner Zeit durch die Steuerbehörde gegen die Entcarbonisierung des Brauwassers durch Kalkzusatz gemacht wurden. — Nachdem das Verbot des Entcarbonisierens aufgehoben ist, sind viele maschinelle Einrichtungen zur „automat. Entcarbonisierung“ angepriesen worden. Vf. hält diese Anlagen für unzureichend, da weder eine genaue (vor Übermaß an Kalk bewahrende) Dosierung des Kalkwassers noch längeres Stehen (zur Ausscheidung sämtlicher ausscheidbaren Carbonate) gewährleistet ist. — Das verwendete Kalkwasser muß auf seinen Gehalt untersucht werden. — „Automatisch“ entcarbonisierte Wasser zeigten einen sehr wechselnden ziemlich hohen Gehalt an Carbonaten (6,5 u. 17 g im hl). — Es wird über Erfahrungen mit der „automat.“ Entcarbonisierung berichtet u. dringend vor dieser Verf. in der bestehenden Form gewarnt. — In einer Nachschrift wendet der Vf. sich gegen die Ausführungen von BAMBERG (Tageszeitung f. Brauerei 1926. Heft 17 (Wehschr. f. Brauerei 43. 169—70. 181—85. Berlin, Vers.- u. Lehranst. Brauerei.) HESSE.

Chr. Jetter, *Trübung pasteurisierter Biere*. Vf. bespricht die Schwierigkeiten, die Trübungen pasteurisierter Biere beim Export, besonders nach den Tropen, verursachen können, u. die Maßnahmen, dem Eintreten solcher Trübungen, meist handelt es sich um Eiweißtrübungen, vorzubeugen. (Allg. Brauer- u. Hopfentztg. 66. 559—60 Balingen.) RÜHLE.

Wilh. Adolphi, *Wilde Hefe und Edelhefe bei Herstellung von Beerenweinen in Haushalt*. Vf. stellte, nachdem Verss. mit „Vierka“-Hefe (von F. SAUER, Gotha) gescheitert waren, durch Vergärung des gezuckerten Saftes von weißen u. roten Johannisbeeren u. roten Kirschen mittels wilder Hefen weinartige Getränke her. Aus den angeführten Analysen ist ersichtlich, daß wilde Hefen Fruchtweine bilden können, die bis 14% A. enthalten, mithin diese Eigenschaft durchaus nicht der „Edel- oder Reinzuchthefe“ allein zukommt. Vf. empfiehlt Fruchtsäfte mit wilden Hefen zu vergären. (Pharm. Ztg. 71. 343—45.) ROJAHN.

H. Wüstenfeld, *Die Verwendung des Steinzeugs in Essigfabriken*. Vf. verweist auf die unbestrittenen Vorzüge der Steinzeugbildner gegenüber den Bildnern aus Holz hin. (Dtsch. Essigind. 30. 137—38.) RÜHLE.

Commercial Solvents Corporation, Baltimore, Maryland, V. St. A., über von: **Firmin Boinot**, Melle, Deux-Sèvres, Frankreich, *n-Butylalkohol durch Vergären kohlenhydrathaltiger Stoffe*. (A. P. 1 565 543 vom 14/4. 1924, ausg. 15/11. 1925. — C. 1925. II. 761 (F. P. 568 796 u. E. P. 218 615).) SCHOTTLÄNDER.

The People of the United States, übert. von: **William L. Owen**, New Orleans, Louisiana, *Konservieren von Zucker*. Man impft den Zucker mit Torulahefe, wodurch die in dem Zucker vorhandene Lävulose durch Gärung entfernt wird. (A. P. 1 579 38 vom 14/9. 1925, ausg. 6/4. 1926.) OELKER.

Reinhold Kusserow, Oakland, Calif., *Nährlösung für die Herstellung von Milchbakterien enthaltender Preßhefe*. Man verd. Melasse mit k. W. bis auf 20° Balling, versetzt die Fl. mittels einer anorgan. oder organ. Säure an, setzt Na₂S₂O₃ u. Hefenährmittel (NH₃-Verbb., Phosphate usw.) hinzu u. vergärt die M. mit Hefe nach dem Gärungsverf. (**A. P. 1580 500** vom 8/5. 1924, ausg. 13/4. 1926.) OELKER.

Liberty Yeast Corporation, Maryland, übert. von: **John F. Wroten**, Baltimore, Maryland, *Hefe*. Der Würze wird vor oder während der Vergärung Knochenmehl als Hefenährmittel zugesetzt. (**A. P. 1580 550** vom 20/8. 1924, ausg. 13/4. 1926.) OELKER.


XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Edward F. Kohman, *Vitamine in Büchsenpfirsichen (canned peaches)*. Bei Unterss. Äpfeln zeigte sich, daß das Vitamin C eher durch Oxydation als Hitze zerstört wird, u. daß jene beim Einmachen in Büchsen vermieden werden kann; ferner waren in Büchsen eingemachte Äpfel nach ein paar Monaten reicher an Vitamin C als k. bewahrte rohe Äpfel. Es wurden deshalb entsprechende Verss. mit Pfirsichen angestellt; dazu wurden Pfirsiche 1. in üblicher Weise in Büchsen eingemacht, 2. desgleichen, aber erst nach Entfernung des O₂ u. 3. vor völligem Reifen gepflückt u. erst nach dem Reifen beim Lagern eingemacht. Es ergab sich, daß das Entfernen des O₂ etwas vermehrten Schutz für das Vitamin C gewährte, daß aber auch ohne dies kein Verlust an Vitamin C durch das Einmachen in Büchsen nicht groß war. Die in üblicher Weise in Büchsen eingemachten Pfirsiche entsprechen im Gehalte an Vitamin C den Rohpfirsichen u. waren mitunter reicher daran als diese, nachdem sie im Wasser gekocht worden waren. Nachreifen beim Lagern hat auf den Gehalt an Vitamin C der in Büchsen eingemachten Pfirsiche anscheinend keine Einw. Auf Trocknung bezogen enthalten Pfirsiche etwa 1/3 der Menge an Vitamin A, die in Butter vorhanden ist. Die reiferen Pfirsiche sind gehaltreicher an Vitamin A als die unreiferen. Die Reife gepflückten Pfirsiche. Die Pfirsiche enthalten, wie die meisten anderen Früchte, auch Vitamin B, sind aber nicht besonders reich daran. Weder Vitamin A noch Vitamin B werden durch das Einmachen in Büchsen beeinträchtigt. (Fruit Products Journ. and Amer. Vinegar Ind. 5. No. 8. 20.) RÜHLE.

H. J. Jacobi, *Neues Verfahren zur Herstellung getrockneter Apfelschnitte*. Nach dem bisherigen Verf., nach dem die Schnitte zunächst mehr oder weniger lange gequert u. dann mit Dampf getrocknet werden, verlieren die Schnitte viel von ihrem Geschmack u. Geruch, sowie an Form u. Festigkeit. Nach einem neuen Verf. (**P. 1557 358**), das an einer Stelle bereits mit Erfolg versucht worden ist, werden die Mängel des zurzeit üblichen Verf. vermieden. Die Schnitte werden in verbletze Körbe verpackt u. diese dann in eine senkrecht stehende zylindrische Retorte gegeben, wo sie nach Erzeugung eines Vakuums 1—2 Min. mit gespanntem Dampf gedunstet werden. Die so bereiteten Apfelschnitte haben festes Fleisch u. den ursprünglichen Geruch u. Geschmack des frischen Obstes. (Fruit Products Journ. and Amer. Vinegar Ind. 5. No. 8. 5—6.) RÜHLE.

A. B. Lorges, *Künstliche Süßstoffe (Saccharin, Dulcin und Glucin)*. Angaben über ihre Herst. (Rev. chimie ind. 35. 109—13.) RÜHLE.

L. Rosenthaler, *Über einen künstlichen Pfeffer*. Während des Weltkrieges wurde in Deutschland als Ersatz für Naturpfeffer ein „Pfefferpulver“ dargestellt (Rheinische



Campherfabrik in Düsseldorf-Oberkassel u. Chem. Fabrik Dr. HÖHN u. (Neuß a. Rh.), das im Gemisch mit Kleiepulver u. etwas äth. Öl (Phellandren) als kausenden Geschmacksstoff das *Piperidid* der δ -Phenyl- α,β -pentensäure (I.), oder *Piperid* der isomeren δ -Phenyl- β,γ -pentensäure (II.), enthielt. (Pharm. Zentralhalle 67. 164. Bern.) ROJAHN

Artur Fornet, *Wasserbestimmungen nach der Schnellmethode*. Bei der W. in Getreidemehlen durch Trocknen zur Gewichtskonstanz erhält man für verschiedene Trocknungstemp. verschieden hohe Werte. Zur Ermittlung des wahren Wasserwertes hat Vf. 5 g Substanz im U-Rohr in einem Salzbad auf 105° erhitzt unter Durchleiten eines Luftstroms. Die Trocknung bei 135° in dem im Original abgebildeten Schnellwasserbestimmer (Bezugsquelle: ARMIN KÜHN, Charlottenburg 5) führt zu Resultaten, die denen der Vakuummethode entsprechen. Eine Präzisionswaage stattet das Ablesen direkt in % W. (Chem.-Ztg. 50. 306—07. Berlin.) JUNG

H. Lührig, *Beiträge zur Beurteilung von Kakao*. Vf. gibt an, daß bei Beurteilung von Kakaopulvern aus der Best. der Rohfaser, der Asche, des Phosphatrestes usw. k. einwandfreier Schluß auf Verfälschung mit Schalenbestandteilen gezogen werden kann, daß vielmehr ausschlaggebend sein muß: das mkr. Bild, die Menge des Sandes (normalerweise unter 0,1%, auf fettfreie Substanz bezogen), das Fe_2O_3 (7—11 mg in 100 g Substanz) u. des MnO (3—5 mg in 100 g). Schalenbestandteile erhöhen diese Zahlen. (Pharm. Zentralhalle 67. 129—35. Breslau.) ROJAHN

Alwin Joseph Foyer, Haag, übert. von: **Hermanus van Haselen**, Rotterdam, Holland, *Nährmittel*. (Can. P. 246 459 vom 22/8. 1923, ausg. 27/1. 1925. — C. 18 I. 262. — Schwz. P. 111 115.) OELKE

Jesse H. Leftwich, Chicago, *Nahrungsmittel*. Wasserhyazinthen werden durch Pressen vom W. möglichst befreit, dann wird das übrige W. verdampft u. schließlich werden die Prodd. zerkleinert. (A. P. 1 568 339 vom 31/10. 1923, ausg. 5/1. 1926.)

Gustav Günther und **Wilhelm Spech**, Wien, Österreich, *Herstellung eines Tabaksrauch verbessernden Mittels*. Eine Lsg. von Menthol in absol. A. wird mit Benzoessäure innig vermischt, Tannin u. W. dazugesetzt u. die viscose M. mit Tabakpulver oder gemahlenem Kaffee gemengt. Das Ganze wird zu kleinen Scheibchen oder Stiften geformt. Die genügend festen Prodd. setzt man zu Cigaretten, Zigarren oder Rauchtobak, u. zwar führt man sie in das Brennende der Tabakprodukte ein. Beim Rauchen entwickeln sich arom., unschädliche Dämpfe, die zunächst den Tabak gleichmäßig imprägnieren, dann dem Rauch einen angenehmeren Geschmack verleihen, besonders bei schlechteren Tabaksorten, u. den Gaumen der Raucher nicht angreifen. (E. P. 222 123 vom 16/9. 1924, ausg. 12/11. 1924. Oe. P. 17/9. 1923.) SCHOTTLÄNDE

Herman Heuser, Chicago, Ill., V. St. A., *Verwertung von Maiskolben für Futtermittelzwecke*. Man vermischt das Material mit Malz, gibt h. W. hinzu, so daß eine 40° warme Maische erhalten wird, u. unterwirft die M. nach der Verzuckerung einer Milchsäuregärung, bis ein Milchsäuregehalt von 0,5—1,5% erreicht ist. (A. P. 1 570 891 vom 22/3. 1923, ausg. 26/1. 1926.) OELKE

Theodor Schweizer, Zürich, *Halbarmachung von saftigen Futtermitteln pflanzlicher Art mittels des elektrischen Stromes*. Bei der bekannten Konservierung pflanzlichen Futtermitteln mittels des elektr. Stromes, welcher durch die als Elektrolyt wirkende Futtermasse, die durch Verletzen der Epidermis leitend gemacht ist, hindurch geleitet wird, arbeitet man während der ganzen Behandlungsdauer mit einer innerhalb der Grenzen von 2—4 Amperes pro qm der die Futtermasse bedeckenden Elektrodenfläche konstant gehaltenen Stromdichte. — Die bei dem bisher üblichen stattfindenden Zersetzungsprozesse u. Brennwirkungen werden vermieden. (

P. 96 803; C. 1925. I. 279.) (Schwz. P. 106 942 vom 10/1. 1924, ausg. 16/4. 25.) OELKER.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Carl Kullgren, *Die Absorption von Natriumhydroxyd in Natronlauge und Schwarze durch Sulfatzellstoff*. (Vgl. S. 2754.) Die direkte Methode zur Best. des von Faser absorbierten NaOH hat Nachteile vor der indirekten Methode, die betrieben wird. Der von LEIGHTON befürchteten Entstellung der NaOH-Absorptionsste durch gleichzeitige Wasserabsorption wird widersprochen. Der Einfluß von ap. u. Laugenkonz. auf die Absorption wird besprochen, Temperaturerhöhung ist die Absorption. Daraus erklärt sich der Nutzen der Verwendung w. Waschers in den Diffuseuren. Die Absorption ist reversibel, Absorption wie Herausgehen rasch vor sich. Die Best. der Absorption in Schwarzlauge durch das str. Leitvermögen wird beschrieben. Ggw. von NaCl u. Na₂S steigert die Absorption von NaOH. In Schwarzlauge, verglichen mit reiner NaOH-Lsg., ist die Absorption von NaOH bedeutend gesteigert. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff-Papier-Chemiker u. -Ingenieure 153—55. 186—89. 206—08.) SÜVERN.

P. Kraus, *Über einige Beobachtungen betreffend die Festigkeit und Bruchdehnung Kunstseide*. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 196. — C. 1926. I. 2062.) SÜVERN.

G. J. Esselen jr., *Cellulose: Eine kurze Betrachtung ihrer Chemie, mit besonderer Beziehung zu der Herstellung von Rayon*. Die Anwesenheit von 3 OH-Gruppen, die des Moleküls aus 3 Kernen, das Vorhandensein kleinster Krystalle ist kurz behandelt. Die Herst. von Acetat-, Nitro-, Cu- u. Viscoseseide ist kurz besprochen. (Dyestuff Reporter 15. 166—68.) SÜVERN.

L. G. Lawrie, *Einige Angaben über den Gebrauch des Mikroskops im Textillaboratorium*. Die Herst. von Querschnitten, das Aufzeichnen der Bilder, das Messen der Objekte, verschiedene Verwendungen des Mikroskops, die Anwendung des Hämatometers u. des Ultramikroskops ist beschrieben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 73—76.) SÜVERN.

E. Ristenpart und **K. Petzold**, *Ein einfaches Verfahren zur Ermittlung der Netzzeit von Gespinsten und der Netzfähigkeit von Textilölen*. In einem Becherglas wird ein durch eine Klemmbacke beschwerter Faden in W. versenkt. Zunächst wird der Faden genau aufrecht, in dem Maße, wie er sich netzt, wird er schwerer gesenkt unter. Die Zeit vom Eintauchen bis zum Aufstoßen des Fadens auf den Boden steht im umgekehrten Verhältnis zur Netzbarkeit u. kann als deren Maßstab dienen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 176—77. Chemnitz.) SÜVERN.

Auguste Joseph Marins Rivat, Frankreich, *Behandeln vegetabilischer in der Industrie verwendeter Fasern* in einem sd. Bade von W., KOH, ZnSO₄ u. CuSO₄, dann in einem k. Bade von W., CH₃COOH u. HCl. (F. P. 600 476 vom 3/10. 1926, ausg. 8/2. 1926.) KAUSCH.

William D. Gregor, **Wesley M. Osborne** und **Alex J. Kemzura**, Newton N. Y., V. St. A., *Behandlung von Papierstoff*. Man unterwirft den Cellulose bei n. Temp. der Einw. von Mitteln, z. B. KCO₃, NaOH, KOH o. dgl., welche wirken sind, die in der Cellulose vorhandenen Verunreinigungen in l. Verb. umzuwandeln. (A. P. 1 579 525 vom 14/7. 1924, ausg. 6/4. 1926.) OELKER.

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken, A.-G., Elberfeld, *Viscosefäden von willkürlicher Dichte aus Rohviscose*. Man läßt die Rohviscose durch Spinn Düsen, deren Durchmesser größer als 0,10 mm ist, in konz. saures Fällbad eintreten oder in geringer konz.

Fällbäder durch die gebräuchlichen Spinndüsen von 0,10 mm. (Holl. P. 14 478 v. 8/10. 1921, ausg. 15/4. 1926.) KAUSCH

Erste Böhmisches Kunstseidefabrik, A.-G., Tschechoslowakei, *Viscosekulturfäden*. Man verwendet Fällbäder, denen man capillar-aktive Stoffe wie Gummi, Schleimstoffe, Eiweißstoffe, Pektine, Betaine, Urethane, Alkohole, Fettsäuren oder solche enthaltende Stoffe zugesetzt hat. (F. P. 600 309 vom 3/7. 1925, ausg. 1926.) KAUSCH

Charles Sandoz, Mailand, *Verbindungsrohr für dickflüssige Flüssigkeiten, besondere Viscose*. Ein Rohr aus elast. Material (z. B. Kautschuk) ist derart durch ein Glasrohr hindurchgezogen u. mit diesem verbunden, daß zwischen beiden Rohren eine abgeschlossene Luftkammer entsteht. (Oe. P. 102 148 vom 26/8. 1924, ausg. 28/12. 1925.) KAUSCH

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

H. Kerr, *Koks und Koksstruktur*. Um das Gebiet des Hausbrandes für den Koks zu gewinnen, fordert Vf. folgende Eigenschaften: Geringer Feuchtigkeits- u. Aschengehalt, mittlere D., hohen Brennwert, große Bruchfestigkeit, 4—5% flüchtige Stoffe, niedrige Verbrennungstemp., leichte Entzündbarkeit, Reinheit, Gleichmäßigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Verwitterung. Von größtem Einfluß auf die Koksbeschaffenheit ist die Zus. der Originalkohle. Das Wesen der Verkokung, die dabei auftretenden Vorgänge, der Einfluß der Zus. der Kohle, der Temp. usw. auf die Beschaffenheit des Koks, besonders auf seine Porosität, Härte u. Brennbarkeit, werden eingehend erörtert. (Gas Journ. 174. 99—100. Leeds.) WOLFFRAHM

Frank B. Small, *Destillation von Kohlenteer*. Übersicht über die neuzeitliche Verarbeitung von Kohlenteer unter Berücksichtigung seiner Herkunft u. Beschaffenheit, der Gewinnung u. Reinigung der einzelnen Fraktionen u. der Art ihrer Verwertung. (Gas Journ. 174. 39—40. Liverpool.) WOLFFRAHM

Klapproth, *Kontinuierliche Vertikalkammerofenanlage System „Dresden“*. Betriebsweise, Abmessungen u. Leistung, Beheizung, Vorwärmung der Verbrennungsinbetriebsetzung, Ergebnisse der Abnahmeverss. des Gasinstituts Karlsruhe, Vergleich mit anderen kontinuierlichen Öfen u. Koksbeschaffenheit bei der von der „Kaolin-Chamottewerke A.-G.“, Krosta-Adolfshütte auf dem Gaswerk der Farbenfabrik vorm. FRIEDR. BAYER & Co. in Leverkusen erbauten Vertikalkammerofenanlage mit wandernder Ladung, Bauart „Dresden“. (Gas- u. Wasserfach 69. 320—321. Adolfshütte.) WOLFFRAHM

F. Firth, *Ein Gasmesserproblem*. Nach kurzer Übersicht über die Entw. des Gasmessers u. besonders des trocknen Gasmessers hebt Vf. die große Wichtigkeit sorgfältiger Präzisionsarbeit u. der Verwendung geeigneter Baustoffe bester Beschaffenheit hervor. Die Korrosionserscheinungen verschiedenster Art, welche infolge der im Gas oder unter Umständen enthaltenen Verunreinigungen, durch Kondensate, die der verwendeten Baustoffe usw. entstehen können, meist durch das Auftreten elektr. Potentialdifferenzen bedingt werden, teilweise auf Grund eigens angestellter genau beschriebener Verss., eingehend erörtert. (Gas Journ. 174. 41—45. Leeds County Gas Departm.) WOLFFRAHM

Ragnar Blomquist, *Behandlung der Kohlen und des Koks auf amerikanischen Gaswerken*. Die amerikan. Kohlen, die bekanntlich viel weicher u. leichter zerreibbar sind als deutsche u. engl., werden nicht in Brechern, sondern in der sogenannten Brautrommel zerkleinert u. gleichzeitig von größeren Schieferstücken getrennt, dann in einer Hammermühle so fein gemahlen, daß etwa 85% durch 3 mm-Löcher passieren, da bekanntlich Koks aus fein gemahlener Kohle fester u. härter ist. Verss. auf dem Gaswerk Stockholm mit gebrochener u. mit fein gemahlener engl. Durham-Kohle, „Consett“ ergaben im letzteren Falle eine äußerst hohe Wertsteigerung des erzeu-

oks. Zum Kokstransport dienen in den Vereinigten Staaten meist Gummibänder, e sehr geringe Unterhalts- u. Bedienungskosten erfordern. Die in Amerika bereits kannte Wichtigkeit sorgfältiger Sortierung des Koks in verschiedene, für die in rage kommende Verwendungsart besonders geeignete Größen wurde auch durch erss. in Stockholm bestätigt; wesentlich ist auch die Entfernung des beim Brechen Absieben entstehenden Staubes, wofür mehrere Vorr. beschrieben werden. (Gas-Wasserfach 69. 298—301. Höganäs, früher Stockholm.) WOLFFRAM.

Hans Stäger, *Über Isolieröle*. Die elektr. Festigkeit u. die Oxydations- bzw. zersetzungserscheinungen von Mineralölen werden besprochen. An Hand der neuesten xperimentalunterss. werden die jetzigen Ansichten über das Wesen des elektr. archschlages in Öl erläutert u. zur Prüfung dieser Eigenschaft eine Dauerprobe rgeschlagen. Die Zers. der Mineralöle ist ein Oxydationsvorgang. Einige neue rgeschlagene Prüfmethoden werden kritisiert u. eine Dauerprüfmethode zur Berück- chtigung aller Reaktionsprodd. zur Diskussion gestellt. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 8—16. Mittlg. Org. Lab. A. G. BROWN, BOVERI u. Cie., Baden.) REINER.

Hans Tropsch, *Über die Zersetzung von Synthol bei gewöhnlichem Druck*. Die rs. des Synthols bei 400—480° u. gewöhnlichem Druck verläuft anders als ter erhöhtem Druck im Autoklaven (Brennstoffchemie 4. 281; C. 1924. I. 1297). n 5,8 g zers. Synthol wurden 3,9 g abgeschiedener C, 0,3 g CO₂, 0,7 g CO, 0,5 g H₂, 1 g CH₄ u. 0,1 g KW-stoffe wiedergefunden. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 49 u. 50. 1925. Sep. Mülheim-Ruhr.) V. WANGENHEIM.

G. Grote, *Gasin, ein neuer Betriebsstoff für Explosionsmotore*. Vf. berichtet ne Angabe des Prinzips über eine Erfindung von TERN u. HLOCH, durch die bei n Betriebsstoff „Gasin“ die Isolationsfähigkeit, damit die Selbstentzündlichkeit das „Klopfen“ beseitigt wird. Bei der Herst. wird eine Raffination des Brennstoffs ielt. (Chem.-Ztg. 50. 289—90.) JUNG.

N. Dănilă und **E. Melinescu**, *Über die volumetrische Bestimmung der un- ättigten, eine Doppelbindung enthaltenden, aromatischen und gesättigten Kohlen- sserstoffe der Petroleum- und Teerdestillate*. II. (I. vgl. DĂNILĂ, ANDREI u. ELINESCU, Bulet. Societ. de Științe din București 26. 3; C. 1924. II. 1759.) (Bulet. iet. de Științe din București 27. 3—10. 1924. — C. 1925. II. 1002.) LINDENBAUM.

N. Dănilă und **N. Popa**, *Über die Verwertung der aromatischen Kohlenwasser- tfe der Erdölfractionen*. I. Gewinnung von α -Trinitrotoluol. (Bulet. Societ. de iințe din București 27. 45—80. 1924. — C. 1925. II. 252.) LINDENBAUM.

Oscar Cantoni, *Bestimmung des Heizwertes von Benzin*. Vf. gibt die zur Heiz- rtbest. nötige Menge Bzn. oder einer anderen brennbaren Fl. in eine Gelatine kapsel a bekanntem Heizwerte. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8. 119. Mailand.) GRI.

Leroy F. Pike und **A. B. Flickinger**, Reno, Nevada, übert. von: **Hall H. Hol- way**, Los Angeles, Calif., V. St. A., *Brikettieren von fein verteiltem Holz*. Man eknet das Ausgangsmaterial, z. B. Sägespäne, erhitzt es auf etwa 300° F., setzt dabei der Einw. eines Gases aus, welches Carbolsäure, Formaldehyd, A. u. W. hält, u. preßt es dann auf etwa 1/6 seines Vol. zusammen. (A. P. 1 580 299 vom 1. 1925, ausg. 13/4. 1926.) OELKER.

Moe J. Weisburd, New York, *Brennstoff*, welcher durch Vermischen von fein iebter Kohlenasche u. gebrauchtem Schmieröl hergestellt wird. (A. P. 1 580 547 n 23/6. 1925, ausg. 13/4. 1926.) OELKER.

Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage, übert. von: **Henri Macaux**, ris, *Verschwelen von Kohle und ähnlichen Brennstoffen*. (A. P. 1 567 967 vom 0. 1922, ausg. 29/12. 1925. — C. 1925. I. 2745.) OELKER.

Minerals Separation North American Corporation, New York, übert. von: **William Warwick Stenning** und **Walter Henry Beasley**, London, *Behandlung*

fein verteilter Kohle. (A. P. 1560 116 vom 15/2. 1922, ausg. 3/11. 1925. — C. 1925. II. 1541.) OELKER.

Trent Process Corp., Wilmington, Del., übert. von: **Walter E. Trent**, New York, *Behandlung von Kohleprodukten*. Kohle wird in feinverteiltem Zustande mit einem Flußmittel (Öl) in eine Heizzone eingeführt, um die flüchtigen Nebenprodukte wegzuführen u. eine Vereinigung der aschebildenden Stoffe u. des Flußmittels herbeizuführen, worauf die Kohle frei von flüchtigen Bestandteilen erhalten wird. (A. P. 1570 103 vom 23/9. 1919, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., übert. von: **Christiane Schneider**, Neurossen b. Merseburg, *Behandlung von Teerwasser*. Man versetzt das h. Teerwasser mit einem Alkalicarbonat u. Kalk, setzt die Fl. der Einw. von Luft aus, entfernt das CaCO_3 u. benutzt sie dann wieder zum Kühlen von teerhaltigen Gasen. (A. P. 1579 957 vom 7/11. 1925, ausg. 6/4. 1926.) OELKER.

Carlo Longhi, Italien, *Gewinnung gasförmiger Erzeugnisse aus flüssigen und leicht schmelzbaren organischen Stoffen*. Die fl. oder geschmolzenen Stoffe, z. B. f. KW-stoffe, Teeröle o. dgl. werden der Einw. des elektr. Lichtbogens ausgesetzt, da man im Innern der möglichst k. gehaltenen Ausgangsstoffe erzeugt. Neben Grenzkohlenwasserstoffen entsteht vorzugsweise C_2H_2 . Vorhandener Schwefel soll in SO_2 (? d. Ref.), N_2 in CNH übergehen, die in bekannter Weise gewonnen werden. (F. P. 590 295 vom 10/12. 1924, ausg. 13/6. 1925.) KÜHLING.

Nicolas Metta, Bukarest, *Vorrichtung zur ununterbrochenen Trennung und Destillation von Teer- und Ölemulsionen*. Die Vorr. besteht aus einem Druckbehälter, welcher zum Teil mit einer Metallschmelze gefüllt ist. In dieser ist ein von wechselläufig durchbohrten Blechen gebildetes System von Kammern angeordnet, das den aufsteigenden Öl einen durch die Bauart des Systems bedingten Weg vorschreibt. (Oe. P. 102 957 vom 21/5. 1924, ausg. 10/4. 1926.) OELKER.

Benzonaphtene, übert. von: **Domenico Romoli-Venturi**, Mailand, *Herstellung von Brenngas und flüssigen, petroleum- und naphthaähnlichen Produkten*. (Can. P. 252 579 vom 3/3. 1925, ausg. 11/8. 1925. — C. 1925. II. 2334.) OELKER.

John Harris, Cleveland, Ohio, *Brenngas*, bestehend aus einem Gemisch von KW-stoffgas (95—97½ Volumenteile) u. Ätherdampf (2½—5 Volumenteile). (Can. P. 254 297 vom 5/12. 1924, ausg. 6/10. 1925.) KAUSCH.

John Harris, Cleveland, Ohio, *Brenngas*, bestehend aus künstlich erzeugtem Leuchtgas (90—97½ Volumenteile) u. Benzoldämpfen (2½—10 Volumenteile). (Can. P. 254 298 vom 5/12. 1924, ausg. 6/10. 1925.) KAUSCH.

John Harris, Cleveland, Ohio, *Brenngas*, bestehend aus einem Gemisch von KW-stoffgas (97½ Volumenteile) u. Benzoldämpfen (2½ Volumenteile). (Can. P. 254 299 vom 5/12. 1924, ausg. 6/10. 1925.) KAUSCH.

John Harris, Cleveland, Ohio, *Brenngas*, bestehend aus einem Gemisch von künstlich hergestelltem Leuchtgas (97½ Volumenteile) mit Ätherdämpfen (2½ bis 5 Volumenteile). (Can. P. 254 300 vom 5/12. 1924, ausg. 6/10. 1925.) KAUSCH.

Zeche Mathias Stinnes, Essen-Ruhr, übert. von: **Anton Weindel**, Essen-Ruhr, *Reinigung roher ammoniakalischer Flüssigkeiten*. (A. P. 1571 986 vom 23/12. 1924, ausg. 9/2. 1926. — C. 1925. II. 1115.) KAUSCH.

Société des Etablissements Barbet, Frankreich, *Trennung und Reinigung von Wassergas, Kokereigas u. dgl. sowie Luftgas*. Das Gas wird chem. von der darin enthaltenen CO_2 mittels Kalkmilch, die 10% NaOH enthält, befreit, durch CaCl_2 getrocknet u. sodann in besonderer Weise rektifiziert. (F. P. 600 731 vom 11/12. 1924, ausg. 13/2. 1926.) KAUSCH.

Chemisches Zentralblatt.

1926 Band I.

Nr. 26.

30. Juni.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Carl W. Correns, *Über die Erklärung der sogenannten Krystallisationskraft*. Der genannte Wachstumsdruck der Krystalle läßt sich durch Volumvermehrung bei Erzeugung des Aggregatzustandes oder durch chem. Rk. oder durch Grenzflächenkräfte erklären. Es wurden Alaunkrystalle in gesätt. Alaunlsgg. ohne Belastung u. Belastung zwischen Glas u. zwischen Muskovitblättchen zum Wachsen gebracht. Im zweiten Fall wird das Glas mit dem Gewicht gehoben, während in letztem Fall Oberflächenkräfte derart verändert werden, daß kein Wachstum unter Heben Gewichts stattfindet. (Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin 1926. Physikal.-math. Kl. 81—88 Berlin.)

ENSZLIN.

J. S. Owens, *Die Kondensation von Wasser aus der Luft auf hygroskopischen Stoffen*. Die Unters., welche sich zur Best. sehr geringer u. feiner Stoffmengen anfeuchten soll, geht davon aus, daß die Krystalle dann W. an ihre Oberfläche kondensieren lassen, wenn der Partialdruck des W. mindestens dem einer gesätt. Lsg. entspricht größer ist. Es lassen sich dadurch bei bekannter Temp. u. bekanntem Feuchtigkeitsgrad der Luft einige Stoffe identifizieren. Auch Salzgemische u. Mischkrystalle lassen sich so bestimmen lassen. Es wurden Unterss. mit Seesalz verschiedener Herkunft gemacht, welche gut gelangen. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 110. 738—742.)

ENSZLIN.

Arthur E. Hill und William M. Malisoff, *Die gegenseitige Löslichkeit von Flüssigkeiten*. III. Die gegenseitige Löslichkeit von Phenol und Wasser. IV. Die gegenseitige Löslichkeit von *n*-Butylalkohol und Wasser. (II. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1923. III. 708.) Vff. gehen auf die Kritik ein, die KABLUKOW u. MALISCHEWA (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1553; C. 1925. II. 1247) an der Methode der Vff. zur Bestimmung der gegenseitigen Löslichkeit von Fl. üben. Vff. zeigen diesbezüglich, daß bei der indirekten volumetrischen Methode das optimale Vol.-Verhältnis zur Best. einer gegebenen Komponente ihr nach dem Gewicht gemessenes Verteilungsverhältnis zwischen den beiden Phasen ist. — Die wechselseitige Löslichkeit von Phenol (F. 40,92° ± 0,01°) wird zwischen 20° u. dem „consoluten“ Punkt 65,85° ± 0,15 bestimmt, an diesem Punkt sind 34% Phenol gelöst. Die Messungen bei den höheren Temp. sind in der in diesem System eintretenden Emulgierung nicht sehr genau. — Die Messungen der gegenseitigen Löslichkeit von *n*-Butylalkohol (Kp. 117,7—117,8°) u. W. zwischen —2,95° u. der krit. Lösungstemp. 125,15° ausgeführt. An diesem Punkt beträgt die Konz. des gel. Butylalkohols 32,5%. Zum Vergleich sind auch die von anderen Forschern nach verschiedenen Methoden bestimmten Löslichkeitskurven für *n*-Butylalkohol in W. gezeichnet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 918—927. New York [N. Y.], Univ.)

JOSEPHY.

E. Hall, J. A. Robb und C. E. Coleman, *Die Löslichkeit von Calciumsulfat in Kesselwassertemperaturen*. Vff. haben direkte Löslichkeitsbest. von Anhydrit bei für Kesselwasser charakterist. Temp. vorgenommen. Für l. Anhydrit stimmen die Werte mit denen von BOYER-GUILLON (Ann. Conserv. Arts et Metiers [3] 2. 189 [1900]) u. MELCHER (Journ. Americ. Chem. Soc. 32. 50 [1910]) überein. Für Anhydrit wird mit den Werten von MELCHER bei höheren Temp. gute Übereinstimmung gefunden, bei niederen Temp. nicht so gute. Die Ergebnisse sind in der Tabelle III. 1.

in Kurven u. Tabellen zusammengestellt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**. 927—Pittsburgh [Penns.], Bureau of Mines.) JOSEPHY

C. H. Kunsman, *Die thermionen Eigenschaften einiger Mischungen, die Katalysatoren bei der Ammoniaksynthese dienen.* Zum Zwecke der genaueren Untersuchung der Vorgänge, die sich an der Oberfläche eines Katalysators abspielen, wurde Ammoniakkatalysator, bestehend aus einer geschmolzenen u. später reduzierten Mischung von Eisenoxyd u. wenig Oxyd eines Alkali- oder eines alkal. Erdmetall unter auch Aluminiumoxyd enthaltend, benutzt. Der von diesem Katalysator bei dem Erhitzen ausgehende Strom positiver Elektronen wurde gemessen. Die Emission negativer Elektronen betrug nur $\frac{1}{100}$ der positiven. Die Wirksamkeit des Katalysators beruht nur auf der Verdampfung des Alkalis, das in Form positiver Ionen entweicht u. welche nur bei einer bestimmten Temp. einen günstigen Wert erreicht. (Journ. Physical Chem. **30**. 525—34. Washington, D. C. U. S. Dept. of Agric. Fixed Nitro. Research Lab.) HAAS

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

J. Koenigsberger, *Über Krystallgitterporen.* Die Erscheinung der Zusatzfähigkeit bei Krystallen u. der Einfluß von fremden Beimengungen wird besprochen u. gefunden, daß die erstere durch Störungen im Krystallbau hervorgerufen wird, stark von der Richtung abhängig sein muß, welche durch die Symmetrie des Krystallgitters gegeben ist. (Physikal. Ztschr. **27**. 215—17. Freiburg, Univ.) ENSZL

Wilhelm Hartwig, *Die Krystallstruktur einiger Mineralien der regulären hexagonalen Reihe.* Nach der Debye-Scherrer-Methode wurden Mineralien der HgS-Reihe untersucht. Sie gehören alle der Raumgruppe T_d^2 an, sind also isomorph mit der Zinkblende. Die Kantenlängen betragen für *Metacinnabarit*, (HgS), $5,822 \pm 0,012$ Å, *Guadalcazarit*, ((Hg,Zn)(S,Se)), $5,781 \pm 0,006$ Å, für *Onofrit*, (Hg(S,Se)), $5,900 \pm 0,007$ Å, für *Tiemannit*, (HgSe), $6,069 \pm 0,006$ Å u. für *Coloradoit*, (HgTe), $6,440 \pm 0,006$ Å. Onofrit ist als isomorphe Mischung von HgS u. HgSe, Guadalcazarit eine solche von HgS mit ZnS u. etwas HgSe zu betrachten. Aus der Bragg'schen Methode der konstanten Atomradien berechnet sich der Radius des Hg-Atoms zu bis $1,50$ Å. Es werden auch die aus den Gitterkonstanten berechneten theoret. angegeben. (Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin **1926**. Physikal.-math. Kl. 79—Berlin, Mineralog. Inst. d. Univ.) ENSZL

N. L. Bowen und R. W. G. Wyckoff, *Eine petrographische und röntgenographische Untersuchung der thermischen Dissoziation des Dumortierits.* Die Dissoziation des Dumortierits, $(8Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot B_2O_3 \cdot H_2O)$ wurde bei hohen Temp. untersucht u. gefunden, daß bei 950° bereits eine Zers. stattfindet. Die Zersetzungsprodd. wurden u. M. röntgenograph. (Pulvermethode) untersucht. Bei 1500° ist das gesamte W. u. ausgetrieben u. es hat sich Mullit, $(4Al_2O_3 \cdot 3SiO_2)$, u. etwas SiO_2 gebildet. Bei 1600° tritt etwas Fl. auf, welche von dem eutekt. Schmelzen von Mullit u. Quarz herkommt. (Journ. Washington Acad. of Sciences **16**. 178—89.) ENSZL

H. Goldschmidt und H. Dember, *Der Adsorptionskoeffizient des Lichtes und Photoelektronen für kathodisch zerstäubtes Platin.* Durch Kathodenzerstäubung niedergeschlagene Platinschichten werden durch spektral zerlegtes ultraviolette Licht untersucht. Ihre opt. u. lichtelektr. Eigenschaften untersucht u. der Adsorptionskoeffizient des Lichts u. der Photoelektronen errechnet. (Ztschr. f. techn. Physik **7**. 137—46.) ENSZL

R. Fleischer und H. Dember, *Über die lichtelektrische Elektronenemission des optischen Reflexionsvermögens des Kaliums in Abhängigkeit vom Gasgehalt des Metalls.* Die zunehmende Entgasung des K bringt eine Verschiebung des selektiven Maximums nach den kürzeren Wellenlängen mit sich. Ebenso verschiebt sich das Maximum des opt. Absorptionsvermögens. (Ztschr. f. techn. Physik **7**. 133—37.) ENSZL

A. A. Guntz, *Untersuchung über die phosphoreszierenden Zinksulfide*. Die Phosphoreszenz des ZnS wird in der Hauptsache durch Beimengungen von Cu- u. Mn hervorgerufen. Vf. stellte vollständig reines ZnS her, welches keine Phosphoreszenz zeigte u. fügte demselben steigende Mengen Cu zu. Bei $\frac{1}{200000}$ Cu tritt bereits eine Wrkg. auf. Mit zunehmendem Cu-Gehalt steigt die Stärke der Fluoreszenz zuerst rasch, dann langsamer. Bei einer Konz. von $\frac{1}{2000}$ tritt eine Graufärbung auf, die wahrscheinlich auf plötzlich gefälltes CuS zurückzuführen ist. Die Erscheinung tritt dann an Stärke rasch ab, während die Phosphoreszenz langsamer abnimmt. tritt bei spektroskop. Unters. eine schöne grüne u. eine violette Bande auf. Mn zeigt eine orange, eine blaue u. eine rote Bande hervor. Das Verh. ist analog dem beim ZnO, wobei die Konz. höher anzunehmen sind. Es wird noch der Einfluß der Konz. des ZnO, der Alkalien u. alkal. Erden, der Glühtemp. u. -Dauer u. der äußeren Verhältnisse auf die Phosphoreszenz besprochen. (Ann. de Chemie [10] 5. 157—98.) ENSZ.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

P. K. Frölich, George L. Clark und Robert H. Aborn, *Elektrochemische und Röntgenstrahluntersuchungen an Bleiabscheidungen*. Elektrolyt. Bleiniederschläge aus einer Lösung von Nitrat, Perchlorat, Fluoborat u. Fluosilicat in Ggw. u. Abwesenheit freier Säure (mit einem Gelatinezusatzes werden durch Aufnahme des Potentials u. Laue-Diagramme (mit Mo-K α -Strahlung) miteinander verglichen. Ohne Leim- oder Gelatinezusatz zeigt eine Tendenz zur Dendritbildung, in folgender Reihenfolge steigend: Acetat — Nitrat — Fluosilicat — Fluoborat — Perchlorat. Die von Vf. schon früher entworfenen Auffassungen über den Einfluß der verschiedenen Variablen auf die Struktur der Elektrolyt. Metallabscheidungen werden mit der Ausnahme bestätigt, daß bei Pb eine Neigung zu bevorzugter Orientierung (Faserstruktur) mit wachsender Stromdichte ansteigt, im Gegensatz zu den Beobachtungen bei Fe, Ni usw. Im Sinne einer Verfeinerung der Korngröße wirken: Zusatz von Gelatine, steigende Acidität, zunehmende Stromdichte. Mit wachsender Dicke des Nd. nimmt die Korngröße zu, die bevorzugte Orientierung ab. Der Einfluß des Kathodenmaterials ist vergleichsweise gering. Hervorzuheben ist bei Pt-Kathode ohne Wachsüberzug das Eindringen von Pb in das Krystallgitter des Pt. Vom prakt. Standpunkt aus liefert die Elektrolyse in Perchloratlsg. bei Säureüberschuß u. Ggw. von Gelatine die besten Ergebnisse, d. h. höchste kathod. Polarisation, feinste Korngröße, Ausbleiben von Dendritbildung u. bevorzugte Orientierung der Krystallkörner. (Trans. Amer. Electr. Soc. 48 Seiten. Sep. Cambridge i. Massachusetts, Inst. f. Technologie.) HEIMANN.

P. K. Frölich, *Die elektrolytische Abscheidung von Zink in Gegenwart von Gelatine*. *Aluminiumsulfat*. Vf. studiert die elektrolyt. Abscheidung von Zn aus verschiedenen Elektrolyten in Abwesenheit u. Ggw. von Gelatine bzw. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ bei wechselndem pH. Die für Stromausbeute u. Abscheidungspotential erzielten Werte führen zur Abwesenheit einer Adsorptionsschicht des Elektrolyten an der Kathode, in der pH einen bestimmten Wert besitzt als in der Lsg. u. zwar zwischen 5—6. Bei dem amphoteren Charakter der Gelatine hat dies zur Folge: Bei Elektrolyten, deren $\text{pH} < 4,7$ (= isoelektr. Punkt der Gelatine) ist, wandert diese als Kation, in der Grenzflächenschicht an $\text{pH} = 5—6$ wird sie zum Anion umgeladen u. somit von der Kathode wieder abgeschieden. Vf. fand daher im Gegensatz zum Cu im abgeschiedenen Zn niemals organische Substanz. Das Bestehen einer Adsorptionsschicht mit einem von der Acidität der Lsg. weitgehend unabhängigen $\text{pH} = 5—6$ erweist die Annahme früherer Autoren als unrichtig, daß nämlich die der Gelatine ähnliche Wrkg. eines Zusatzes von $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ bei der Zn-Abscheidung auf B. kolloidalen $\text{Al}(\text{OH})_3$ zurückzuführen sei. Die beobachteten Verhältnisse unterscheiden sich wesentlich von denen bei der Cu-Elektrolyse, weil dort die adsorbierte Elektrolytschicht viel höhere Acidität ($\text{pH} < 4,7$) besitzt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 18 Seiten. Sep.) HEIMANN.

S. Schlivitch, *Über die photovoltaischen Säulen mit unveränderlichen Elektroden*. Zur Herst. unveränderlicher Elektroden müssen Pt-Elektroden in photochem. wandfreien Elektrolytlsgg. verwendet werden. Es wurden Verss. mit $K_2Cr_2O_7$, $(NH_4)_2Cr_2O_7$ u. $NaNO_3$ angestellt u. gefunden, daß die EKK. mit der Dauer der Belichtung steigen u. beim Aufhören wieder zurückgehen. Zahlenangaben stehen im Origin. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 891—93.) ENSZLIN

O. Lohaus, *Nachweis einer Polarisationserscheinung bei der Elektrizitätsleitung in dem elektrisch doppelbrechenden Nitrobenzol*. Die Polarisationserscheinung in dem elektr. doppelbrechenden Nitrobenzol macht sich beim Anlegen einer Wechselspannung von 1000 V mit 500 Perioden an der Kathode durch eine stärkere Lichtintensität, welche rasch u. stetig nach der Mitte hin abfällt, bemerkbar. Die obere Grenze der Schichtdicke des Helligkeitsabfalls ist 0,01 mm. (Physikal. Ztschr. **27**. 217—218. Berlin-Schöneberg, A. G. MIX u. GENEST.) ENSZLIN

Otto Blüh, *Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Dielektrizitätskonstanten*. Zusammenfassender Bericht über die neueren theoret. u. prakt. Ergebnisse über die Dielektrizitätskonstanten u. deren Meßmethoden bei Gasen, Fl. u. Lsgg. (Physikal. Ztschr. **27**. 226—230. Prag.) ENSZLIN

C. T. Zahn, *Assoziation, Adsorption und Dielektrizitätskonstante*. Vf. untersucht die Anomalien der DE. des Wasserdampfes bei Drucken von 3—20 mm Hg. Die Veränderungen der DE. werden nach früher beschriebenen Methoden ausgeführt, u. zwar in Beziehung zu Druck u. Temp. Bei Zimmertemp. stellt die Verbindungslinie der DE. Punkte, die dem Werte $(\epsilon - 1)$ der Debyeschen Formel $(\epsilon - 1) = N(a + b/T)$ entsprechen, zwei gerade Kurvenstücke dar, die einen stumpfen Winkel einschließen. Mit wachsender Temp. wächst dieser Winkel, um bei 47° gleich zwei Rechten zu werden. Untersucht wurden Temp. von 23,3° bis 165°; bei höheren Temp. weisen die Kurven nur auf ein n. Verh. des Wasserdampfes hin. Das abnorme Verh. unterhalb von 47° sei nach Ansicht des Vf. nicht durch Assoziation, wie es JONA vorschlägt, zu erklären, sondern vielmehr durch die Annahme der B. von Absorptionsschichten auf der Oberfläche der Kondensatorplatten. In dem Maße, wie die Zahl der absorbierten Moll. zunimmt, nimmt auch der Dampfdruck zu, u. zwar bis er den gewöhnlichen Dampfdruck erreicht. Die Dicke der Absorptionsschicht bei Sättigungsdruck soll von der Größenordnung des Radius der Molekularattraktion sein, d. h. von einigen μ Dicke, was etwa 200 Mol.-Schichten entsprechen würde. Die experimentellen Daten stimmen mit der Theorie gut überein. Was die Erklärung der früheren Verss. an SO_2 usw. betrifft, nimmt Vf. eine spezif. Wrkg. der Kondensatorplatten an. (Physical Review [2] **27**. 329—40. Princeton, Univ., Nat. Research Fellowship.) HAAS

Eugene Peterson, *Komplexmagnetisierung*. Unters. über das Verh. von Siliciumstahl unter dem gleichzeitigen Einfluß zweier sinusoider, magnetisierender Kräfte unter besonderer Berücksichtigung der Stromverteilung u. des Energieverlustes zwischen den beiden überlagerten Frequenzen. Eine Beschreibung einer Nullmethode u. die Vorteile wird gegeben. Die benutzten Frequenzen betrugen 400, 821 u. 1582, magnetisierenden Kräfte lagen zwischen 0,5 u. 15 Gilbert/cm. Die Überlagerung beider Kräfte wird graph. dargestellt. (Physical Review [2] **27**. 318—28. Bell Telephone Lab.) HAAS

Pierre Weiss und **R. Forrer**, *Magnetisierung und magnetokalorische Erscheinung des Nickels*. Die experimentelle Unters. erstreckt sich eingehend auf die Magnetisierung des Ni als Funktion des Feldes u. der Temp. Die Ergebnisse sind in Form der Magnetisierungsisothermen wiedergegeben u. zwar abgestuft von der gewöhnlichen Temp. bis zu 630°. Weiter wurde gemessen die umkehrbare Veränderung der Temp., die die Magnetisierung oder die magnetocalor. Erscheinung begleitet. Magnetisierung, magnetocalor. Erscheinung, spezif. Wärme kontrollieren sich gegenseitig.

magnetocalor. Erscheinung gestattet die sofortige Bestimmung der Magnetisierung u. ergibt Isothermen der wirklichen Magnetisierung von denen der scheinbaren Magnetisierung ab. Schließlich wurde aus den Eigenschaften der Linien gleicher Magnetisierung die Unmöglichkeit einer Zustandsgleichung des Ferromagnetismus abgeleitet, die auf dem klass. Gesetz des Paramagnetismus u. auf dem des molekularen beruht. (Ann. de Physique [10] 5. 153—213.) KALPERS.

W. P. Jorissen und **B. L. Ongkiehong**, *Explosionsgrenzen*. VII. *Der Einfluß Äthylens auf die Explosionsgrenzen von Knallgas*. (VI. vgl. S. 1371.) Es werden Explosionsgebiete von Gemischen von $C_2H_4-O_2$ u. $C_2H_4-O_2-H_2$ untersucht u. gefunden, daß im ersten Fall die obere Grenze 60,2% C_2H_4 , die untere 4,1% C_2H_4 darstellt. Im zweiten Fall ist die untere Grenze mit 2% C_2H_4 bei 3,5% H_2 , mit 3% C_2H_4 bei 1,9% H_2 , mit 10% C_2H_4 ist die obere Grenze bei 68,9% H_2 , mit 25% C_2H_4 bei 7% H_2 , mit 34% C_2H_4 bei 36,1% H_2 , mit 50% C_2H_4 bei 16,1% H_2 . Die obere Grenze ist gegenüber den Unterss. von WHITE (Journ. Chem. Soc. London 127. 48; 1925. I. 2211) über das System $C_2H_4-H_2$ -Luft stark verschoben, stimmt aber mit den von MOUREU u. DUFRASSE gefundenen Werten gut überein. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 162—65. Leyden, Univ.) ENSZLIN.

W. P. Jorissen und **B. L. Ongkiehong**, *Explosionsgebiete*. VIII. *Die Explosionsgebiete von Wasserstoff-Ammoniak-Luft und Wasserstoff-Ammoniak-Sauerstoffgemischen*. (VII. vgl. vorst. Ref.) Mischungen von Luft u. H_2 entzündeten sich bei einem Gehalt von 6,1—66,9% H_2 . Explosion in Gemischen von H_2-NH_3 -Luft treten ein bei 3% NH_3 u. 5,2—53,7% H_2 , mit 6% NH_3 u. 4,2—40,9% H_2 , mit 14% NH_3 u. 1,6—6,9% H_2 . Bei 14,9% NH_3 u. 3,5% H_2 ist das Maximum der Kurve. H_2 - u. O_2 -Gemische können zwischen 6,2 u. 92,3% H_2 zur Explosion gebracht werden. Zur Entzündung gebracht werden konnten in dem System $H_2-NH_3-O_2$ -Gemische mit 3% NH_3 u. 1,1—83,3% NH_3 , mit 8% NH_3 u. 4,5—80,5% H_2 , mit 12% NH_3 u. 3,1—76,3% NH_3 , mit 48% NH_3 u. 28,1% H_2 u. mit 60% NH_3 u. 13,1% H_2 . In einem Gemisch von 5% O_2 u. 5% N_2 entzündeten sich 18,9—69,5% NH_3 , in einem solchen von 80% O_2 u. 0% N_2 18,9—61,1% NH_3 . In einem Gemisch von 60% O_2 u. 40% N_2 ist die obere Grenze 51,5% NH_3 . Das Maximum der Kurve der Entzündbarkeit, d. h. die Zus., bei der eben noch Explosion mit NH_3 erfolgt, ist 32% O_2 u. 68% N_2 . (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45. 224—31. Leiden, Univ.) ENSZLIN.

John H. Shaxby, *Formeln, welche die Dichte einer Flüssigkeit und den Molekulardurchmesser angeben*. Es werden Formeln für die DD. von Fl. u. die Moleküldurchmesser aus der kinet. Gastheorie abgeleitet. Die Formel für den Durchmesser eines Moleküls lautet: $\sigma = e^{1/2} (M/NQ_c)^{1/3}$, worin M das Mol.-Gew., N die Avogadro'sche Zahl u. e die krit. D. bedeuten. Die nach dieser Formel berechneten Durchmesser stimmen mit denen für Ar, N_2 , O_2 , N_2O , CO u. CO_2 gut mit den gefundenen überein, während sich für He u. H_2 höhere Durchmesser berechnen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 847—49.) ENSZ.

R. A. Morgen und **J. H. Hildebrand**, *Die freie Energie von Fluorwasserstoff*. SIMONS u. HILDEBRAND, Journ. Amer. Chem. Soc. 46. 2223; C. 1925. I. 17.) Sie messen die EK. in inerter polarisierter Elektroden in geschmolzenen KF·HF zwischen 223 u. 272°. Bei der Elektrolyse entsteht an der Kathode H_2 , an der Anode F_2 u. wenn die Elektroden reversibel sind, findet die Rk. $H_2 (1 \text{ at}) + F_2 (1 \text{ at}) = 2 HF (p \text{ at})$ statt, worin p der Druck des mit dem geschmolzenen Bifluorid im Gleichgewicht befindlichen HF ist. Außer den EKK.-Messungen mußten also auch Dampfdruckmessungen ausgeführt werden. Als Kathode diente der Pt-Tiegel, in dem sich geschmolzenes Bifluorid befand, als Anode diente eine Ir-Platte, an der nicht wie bei Graphit Überspannung auftrat. Die gefundenen Dampfdruckdaten gehorchen der Gleichung: $\log p = (-2150/T) + 5,94$. Im Elektrolyten bildeten sich 2 Phasen: ein starker Zus., die obere, in welche die Elektroden tauchten, bestand aus KF·HF mit einem geringen Überschuß an KF; die untere, viscosere Phase hatte die Zus.

(KF)₂HF. Wegen der höheren Viscosität lieferte die Elektrolyse mit den Elektroden in der unteren Schicht unbefriedigende Resultate. Aus den Dampfdruckmessungen wurde die freie Energie der B. von HF bei 1 at für das genannte Temp.-Intervall berechnet. Nach der Gleichung von LATIMER (Journ. Americ. Chem. Soc. **43**, 824 C. **1921**. III. 269) wird die Entropie S für Fluor zu 47,02, für Wasserstoff zu 32,30 u. für HF zu 42,07 berechnet. ΔS der Rk. $\frac{1}{2} \text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{F}_2 = \text{HF}$ wird dann 2,41. Daraus nach ergibt sich die Änderung der freien Energie ΔF_{298} dieser Rk. zu $-31\,800$ cal. Zur Prüfung wurde ΔF_{298} nach der Gleichung $\Delta F = \Delta H - T \Delta S$ berechnet, worin ΔH die Rk.-Wärme ist. Für ΔH wurde der Wert $-32\,900$ eingesetzt, der durch eine der Polymerisation des HF entsprechende Korrektur des Wertes von BERTHELOT u. MOISSAN (Ann. Chim. et Phys. [6] **23**, 571 [1891]) erhalten worden ist. ΔF bei 25° ergibt sich auf diese Weise zu $-33\,600$ cal. Die freie Energie der B. von $\frac{1}{6}$ (HF)₂ wird zu $35\,000$ cal bei 25° berechnet. Der Rechnung liegt der Wert $-31\,800$ cal für monomolekularen HF zugrunde. (Journ. Americ. Chem. Soc. **48**, 911—18. Berkeley [Cal.], Univ.) JOSEPHY.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

L. Hugounenq und **J. Loiseleur**, *Über die Anwendung von Glykogen zur Herstellung kolloider Metalle*. Einige Schutzkolloide haben die Eigenschaft, neben ihrer Schutzwirkg. die Oxydsole beim Erhitzen in die Metallsöle zu verwandeln. Zu dieser gehört das Glykogen. Mit ihm ist es möglich, in der Kälte Sole von den Oxyden von Pb, Rh, Au, Ag, Hg, Bi, Fe, Ni, Mn, Zn, Cu, Co u. Mg zu erhalten. Durch Erwärmung werden die Oxyde des Au, Pt, Pd, Hg, Ag u. Rh zu den Metallsölen reduziert. Die erhaltenen Sole können dialysiert, mit A. u. Ä. gefällt u. wieder in W. gel. werden. Das Ag flockt mit HCl aus u. zers. H₂O₂ in schwach alkal. Lsg. Das Hg-Sol ist ein braune Fl. Ein Gummi-arabicum-Bi-Sol ist sehr beständig. Es wird durch Fällg. mit A. u. Wiederauflösen in W. gereinigt. Sein Höchstgehalt ist 7% Bi. Die Verwendung gegen Syphilis zeigt keine nennenswerten Vorteile gegenüber anderen Präparaten. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**, 851—52.) ENSZLIN.

S. Liepatow, *Über chemische Sorption I*. (Vgl. S. 324.) Es wurden Sorptionen verss. mit verschiedenen Salzen an Gele von NO₂-Alizarin, Stärke u. MnO₂ angestellt. MnO₂ sorbiert freie Basen u. solche mit anorgan. u. organ. Anionen. NO₂-Alizarin sorbiert nur Basen aus Salzen mit organ. Anion. Die freien Basen bilden damit Verbindungen mit konstanter Zus. (Alizarate). Die Stärke sorbiert nur Laugen. Das Anion spielt bei der Sorption eine große Rolle, so wird von CuCl₂ weniger sorbiert als von Cu-Acetat. Der Sorptionsgrad wird durch die Verteilung der Kationen zwischen den beiden Säuren (z. B. NO₂-Alizarin oder MnO₂ einerseits u. HCl andererseits) bedingt. Daraus geht hervor, daß die Basensorption ein rein chem. Vorgang ist u. die Oberflächenkräfte nur eine Hilfsrolle spielen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **152**, 73—9. Moskau, Chem. Lab. vorm. E. ZÜNDEL.) ENSZLIN.

J. Syrkin und **L. Bernstein**, *Zur Frage der Sorptionskinetik*. Die Sorptionsgeschwindigkeit von J₂ aus n., $\frac{1}{2}$ -n., $\frac{1}{4}$ -n. u. $\frac{1}{8}$ -n. Lsgg. von Methylalkohol, Äthylacetat u. Bzl. durch akt., vorher gereinigte Kohle bestimmter Korngröße wurde untersucht. Die Temp. betrug 22,5°. Die in gleichen Zeitabschnitten adsorbierten Mengen sind in verd. Lsgg. im Anfang relativ größer als in konz. Absol. genommen wird aus verd. konz. Lsg. mehr J₂ adsorbiert als aus der verd. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **15**, 105—12. Iwanowo-Wosnessensk, Polytechn. Inst.) ENSZLIN.

B. Anorganische Chemie.

J. Böeseken, *Bemerkungen zur Entdeckung von Verbindungen mit einem für wertigen Boratom und ihrer optischen Aktivität*. (Vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas **44**, 73

1925. II. 1137.) Es wird der Befund von HERMANS, daß das B in organ. Verbb. 5-wertiger Form oder besser koordinativ vierwertig auftreten kann, besprochen u. die anorgan. Borsäureverbb. ausgedehnt. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **45**. 151—52. 1925.)


ENSZLIN.

Rud. Suhrmann und **Klaus Clusius**, *Über die Reindarstellung der Alkalimetalle*. ist sehr schwierig, ganz reine, entgaste, insbesondere H_2 -freie Alkalimetalle darstellen. Die beste Methode ist die Darst. aus den Chloriden, welche spektralanalyt. sind, über die Nitrate u. Azide. Das Nitrat wird in das Oxalat übergeführt, letzteres zum Carbonat verglüht, in dessen wss. Lsg. N_3H aus NaN_3 u. H_2SO_4 eingeblasen wird, bis alles Carbonat zerstört ist. Durch Krystallisation erhält man die reinen Azide, welche spektralrein u. frei von $CO_3^{''}$, $SO_4^{''}$ u. Cl sind. In einem anebenen App. werden die Azide im Hochvakuum therm. zers. Dabei tritt leicht eine Überschreitung der Zersetzungstemp. ein (bis 100°), welche bei der Auslösung des App. zertrümmert. Die FF. der Azide sind KN_3 343° , RbN_3 321° u. CsN_3 326° , Zersetzungstemp. für NaN_3 275° , für KN_3 355° , für RbN_3 395° u. für CsN_3 390° . F. des NaN_3 konnte nicht bestimmt werden, da derselbe oberhalb der Zersetzungstemp. liegt. Die Zers. verläuft nicht bei allen Aziden quantitativ, so bleibt bei der Zers. des Rb ein Rückstand von $\sim 40\%$, welcher zum größten Teil aus Rb_3N besteht. Die genauen Unterss. der Rückstände, welche von Na zum Rb zu- u. bei Cs wieder abnehmen, sowie die des entstandenen Gases (N in irgendeiner Form) sind in Aussicht gestellt. Li wurde nicht dargestellt, da es unterhalb des F. Glas angreift. (Ztschr. anorg. u. allg. Ch. **152**. 52—58. Breslau, Techn. Hochschule.)

ENSZLIN.

B. K. Paul und **P. V. Sarkar**, *Über einige Molybdate der Cobaltiammine und der Molybdatocobaltiammine*. Die dargestellten Salze sind: Das Dimolybdatotetrammincobaltitrimolybdat, $[Co(Mo_2O_7)(NH_3)_4][Mo_3O_{10} \cdot 6H_2O]$. Zu 1 g $[Co(NH_3)_4CO_3] \cdot 1/3$ (a) in 50 ccm k. W. wird in der Kälte eine konz. Lsg. von $(NH_4)_2MoO_4$ tropfenweise zugegeben, bis eine Trübung entsteht, welche abfiltriert wird. Die Lsg. wird verdunstet, bis eben CO_2 entweicht u. stark geschüttelt, wobei ein rosenroter Nd. entsteht. Bei 100° entweichen 5 Moll. W. Ein Doppelsalz des Dihydrotetrammincobaltitrimolybdat, $[Co(NH_3)_4(H_2O)_2]_2(MoO_4)_3$, mit dem Dihydrotetrammincobaltidimolybdat, $[Co(NH_3)_4(H_2O)_2](Mo_2O_7)_3$, mit 3 Moll. H_2O erhält man durch Lösen von 2 g (a) in 40 ccm W. tropfenweises Zugabe von 2 g $(NH_4)_2MoO_4$ in 20 ccm W. als blaßrotes, in W. unl. Pulver. Die Molybdatreste werden von Pb-Acetat vollkommen gefällt, stehen also außerhalb des Komplexes. Molybdatotetrammincobaltitrimolybdat, $[Co(NH_3)_4MoO_4]_2MoO_4 \cdot 1/2 H_2O$, wurde aus $[Co(NH_3)_4(H_2O)_2](NO_3)_3$ (b) (4 g in 25 ccm W.) mit einer Lsg. von Na_2MoO_4 in 20 ccm W. beim Stehen in rotvioletten Krystallen, welche bei 100° voll. W. verlieren, erhalten. Fast unl. in W. Das Doppelsalz von Dihydrotetrammincobaltidimolybdat, $[Co(NH_3)_4(H_2O)_2]_2(Mo_2O_7)_3$, mit 5 Moll. Dihydrotetrammincobaltitrimolybdat, $[Co(NH_3)_4(H_2O)_2]_2(MoO_4)_3$, erhält man durch direkte Fällung von (a) mit MoO_4 . Es ist rosa u. in W. unl. Aus einer Lsg. von 10 g $(NH_4)NO_3$ u. 3 g von (a) in 5 g W. mit 1 g Na_2MoO_4 in 5 ccm W. erhält man beim Stehen purpurrote Krystalle. Nitratotetrammincobaltitrimolybdat, $[Co(NH_3)_4(NO_3)]-O-MoO_4 \cdot 1/2 H_2O$. Dies ist in

W. unl., reagiert neutral u. gibt mit Pb-Acetat erst bei längerem Stehen einen Nd. (Überf. von $[Co(NH_3)_4MoO_4]NO_3 \cdot 1/2 H_2O$ in obenstehende Form). Es verliert bei 100° voll. W. Durch Fällen einer k. Lsg. von 2 g (b) in 40 ccm W. mit 4 g $NaHMoO_4$ wurde zuerst beschriebene Salz erhalten. Aus (b) wurde durch Fällen von 2,3 g in wss. Lsg. mit 4 g $NaHMoO_4$ in 40 ccm W. das Molybdatotetrammincobaltitrimolybdat, $[Co(NH_3)_4MoO_4]_2Mo_3O_{10} \cdot 4H_2O$ als blaßrosa, voluminöser Nd. erhalten. Bei 100° geht ganzes W. weg. Der Körper reagiert sauer. Bei der Fällung von 4 g (b) in 30 ccm W. mit 10,5 g Na_2MoO_4 in 20 ccm W. bilden sich beim Stehen schwarzbraune glänzende



einen rotorangen Nd. von *Hydropentamminocobaltitrimolybdat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}]_2(\text{Mo}_3\text{O}_{10})_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, welcher schwach sauer reagiert u. in W. unl. ist. Bei 100° gehen $7\text{H}_2\text{O}$ weg. Beim Versetzen einer gesätt. Lsg. von $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}](\text{NO}_3)_3$ mit einer Lsg. von $8\text{Na}_2\text{MoO}_4$ in 15 ccm W. scheiden sich beim Stehen rosenrote Krystalle von *Hydropentamminocobaltimolybdat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}](\text{MoO}_4)_3$ ab, welche in W. unl. sind u. leicht sauer reagieren. Durch Fällen einer Lsg. von $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}](\text{NO}_3)_3$ mit NaHMoO_4 erhält man das rosarote *Hydropentamminocobaltiheptamolybdat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}][\text{Mo}(\text{MoO}_4)_6] \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. (Ann. de Chimie [10] 5. 199—217. Calcutta, Univ.) ENSZLIN.

Werner Keil, *Germanium und Gallium aus Germanit*. Zur Gewinnung von Ge u. Ga wurde fein gepulverter Germanit mit einem $\text{HNO}_3\text{-H}_2\text{SO}_4$ -Gemisch aufgeschlossen u. bis zum Auftreten von SO_3 -Dämpfen abgeraucht. Es entsteht eine Lsg. mit einem blauweißen Nd. (GeO_2 u. PbSO_4). Dieser wird in W. suspendiert, die wss. Lsg. mit HCl versetzt u. im Cl_2 -Strom dest., wobei das mit Wasserdämpfen u. HCl flüchtige GeCl_4 übergeht u. sich entweder am Boden als ölige Fl. absetzt oder in der wss. Lsg. zu GeO_2 hydrolysiert. Das Destillat kann auch je nach der Konz. der HCl homogen sein. Die Lsg. wurde nun mit H_2S in 6-n. HCl gefällt, das entstandene GeS_2 mit H_2S -haltigem H_2SO_4 gewaschen u. getrocknet. Zur Oxydation zu GeO_2 wird es in der Pt-Schale in kleinen Portionen mit konz. HNO_3 versetzt, wobei eine stürm. Gasentw. einsetzt. Zuletzt wird die überschüssige HNO_3 u. die gebildete H_2SO_4 abgeraucht, nach dem Abkühlen mit NH_4OH versetzt, zur Trockne verdampft u. die Ammonsalze verjagt. Zur Gewinnung des Ga wurden aus den Dest.-Rückständen des Ge mit H_2S Cu, Fe u. As gefällt, die H_2SO_4 mit BaCl_2 beseitigt, die HCl mit BaCO_3 abgestumpft u. die Lsg. mehrere Tage mit BaCO_3 behandelt. Der Nd. enthält neben BaCO_3 das gesamte Ge u. etwas $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Er wird in HCl gel., mit NH_4OH neutralisiert, das ausgeschiedene $\text{Ga}(\text{OH})_3$ erneut in HCl gel. u. als Ferrocyanid gefällt u. durch Dialyse gereinigt u. nach dem Trocknen mit NaOH geschmolzen. Das entstandene Kaliumgallat löst sich in W. Wird es durch Einleiten von H_2S von Zn befreit, so erhält man beim Fällen mit NH_4OH aus salzsaurer Lsg. reines $\text{Ga}(\text{OH})_3$. Die Darst. des metall. Ge erfolgt am besten durch Schmelzen des Sulfids mit KCN. Man erhält so große Reguli oder Krystallflitter. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 101—04. Würzburg, Univ.) ENSZLIN.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

V. M. Goldschmidt, *Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente*. VI. Über die Krystallstrukturen vom Rutiltypus. Mit Bemerkungen zur Geochemie zweiwertiger und vierwertiger Elemente. Nach Unterss. mit **T. Barth**, **D. Holmsen**, **G. Lunde** u. **W. Zachariasen**. (V. vgl. C. 1925. II. 1127.) Die Verbb. des Rutiltyps sind sehr weit verbreitet. Zu diesem gehören sehr viele Difluoride u. Dioxyde u. wahrscheinlich auch US_2 . Der Rutiltyp (Raumgruppe D_{4h}^{10}) enthält 2 Moll. RX_2 in einer tetragonalen Zelle, deren Ecken u. Mitte durch die Atome R besetzt sind, während die Atome X die Parameter u u. $\bar{u}$ u. $\bar{u}$ u. $\frac{1}{2} - u$; $u + \frac{1}{2}$; $\frac{1}{2} - u$ u. $\frac{1}{2}$ besitzen. Das Achsenverhältnis ist ($c:a$) zwischen 0,57 u. 0,79. Die einfachsten Typen heißen *Monorutile*, die komplizierteren *Polyrutile*. Bei letzteren werden mehrere Rutilzellen durch eine Gruppe besetzt. Zu den Monorutilen gehören MgF_2 ($c/a = 0,663$), MnF_2 (0,68

F_2 (0,69), CoF_2 (0,676), NiF_2 (0,661) u. ZnF_2 (0,665). Diese Verwandtschaft der Salze untereinander (Ausnahme ist das Zn) findet in der isomorphen Vertretbarkeit von Mg durch Mn, Fe^{II} , Ni u. Co in den natürlichen Silicaten ihren Ausdruck. Dioxyde vom Rutiltyp sind TiO_2 (c/a 0,6447), VO_2 (0,633), MnO_2 (0,6525), außerdem NbO_2 (0,620), MoO_2 (0,573), RuO_2 (0,689), SnO_2 (0,673), TeO_2 (0,788). Eine weitere Gruppe bilden WO_2 (0,571), AsO_2 (0,707), IrO_2 (0,700) u. PbO_2 (0,6825). Die ionisierten Verbb. R_2X_2 krystallisieren im *Fluorittyp*, wenn R im Verhältniß zu X ein großes Volum einnimmt. Die Grenzen dieses Verhältnisses zwischen Fluorit- u. Rutiltypus scheinen zwischen 0,74 u. 0,66, bei den Fluoriden u. bei den Oxyden zwischen 0,77 u. 0,64, wahrscheinlich nahe 0,67 zu liegen. Es lassen sich die Verhältnisse auch für andere Stoffe berechnen (Chloride, Legierungen usw.), wobei sich gute Übereinstimmung mit dem gegebenen Verh. zeigt. Schichtengitter entstehen, wenn in den Verbb. RX_2 das R sehr stark polarisierbar ist oder wenn der Quotient der Ionenradien unter 0,4 bis 0,5 sinkt. Zu diesen gehören MoS_2 , ClJ_2 , ZrS_2 , $ZrSe_2$, $Mg(OH)_2$, $Cu(OH)_2$, $Mn(OH)_2$, $Fe(OH)_2$, $Cd(OH)_2$, SnS_2 , $CoCl_2$, $NiCl_2$, $NiBr_2$, $CuBr_2$, ZnJ_2 , $CdCl_2$, $CdBr_2$, PbJ_2 , $RuCl_2$, $IrCl_2$, $PdCl_2$, $ZrCl_2$ u. $PtCl_2$. Sie sind meist an ihrem Habitus u. ihrer guten Spaltbarkeit nach der Basis zu erkennen. Zu den Polyrutilen gehören die Trirutile *Mossit*, $[Nb,Ta)_2O_6]$, u. *Tapiolith*, $(FeTa_2O_6)$. Ihre Elementarzelle entspricht drei übereinander gestellten Rutilzellen. Diese Erscheinung heißt *polymere Isomerie*. Die Struktur des ersteren entspricht der Raumgruppe D_{4h}^{14} . Das Verhältniß c/a ist $< 0,6453$ u. für Tapiolith $3 \times 0,6471$. *Zirkon* ist ein Oktorutil, während weder ZrO_2 noch SiO_2 zur Rutilgruppe gehören. Bei dem einen ist das Achsenverhältniß zu groß, beim andern zu klein. Erst durch das gleichzeitige Eintreten in ein Gitter kompensieren sich die Unterschiede gegenseitig. Es werden noch einige Bemerkungen zur Kristallstruktur u. Polymorphie des Rutils selbst angegeben. (Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, I. Matem.-Naturvid. Klasse 1926. 17 S. Sep.) ENSZ.

Cecil S. Garnett, *Die Dissoziation des Dolomits*. II. (I. vgl. Mineral. Magazine 54. 1923; C. 1924. I. 1907.) Erwiderung auf die anderen Befunde verschiedener Autoren. Zum Beweis, daß der Dolomit stufenweise dissoziiert, d. h. daß das $MgCO_3$ erst sein CO_2 abgibt, dient folgender Vers. Ein Gemisch von MgO u. $CaCO_3$ in wässriger Suspension zeigt keinerlei Verfestigung, während ein solches von CaO u. $MgCO_3$ rasch absetzt u. fest wird. Halb zersetzter Dolomit verhält sich aber wie ein Gemisch von MgO u. $CaCO_3$. (Mineral. Magazine 21. 21—24.) ENSZLIN.

T. E. Phipps und **Wallace R. Brode**, *Eine vergleichende Untersuchung zweier Arten von gefärbtem Steinsalz*. Zur Unters. diente dem Vf. natürliches, blaues Staßfurter Steinsalz u. solches, das durch Erhitzen in einem geschlossenen Gefäß zusammen mit Na-Dampf blau gefärbt worden war. Wenn die blaue Farbe von feinst dispersem Natrium herrühren sollte, so müßte eine Lsg. des Salzes alkal. Rk. aufweisen. Durch Titration der $[H^+]$ wurde gefunden, daß nur der künstlich gefärbte Krystall bei der Aufg. in alkal. reagierte entsprechend einer Normalität von freiem Na im Krystall von 10^{-4} bis $2,3 \times 10^{-3}$. Farbloses, wie blaues Staßfurter Steinsalz ergab die gleichen Werte, die sämtlich auf der sauren Seite lagen. Spektrophotometr. Unterss. bei verschiedenen Temp. ergaben ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen dem natürlichen u. dem künstlichen Steinsalz. Vf. nimmt an, daß das Staßfurter Blau durch eine Abwesenheit des Elektronengitters bedingt ist, während bei dem künstlichen Salz ein fremder Körper färbend wirkt, der aus Na besteht u. unter Umständen zu kolloidalen Teilchen zusammentritt. Aus dem Verh. des künstlichen wie des natürlichen Steinsalzes beim Erhitzen werden Schlüsse abgeleitet, die die Hypothese für die Elektronenfarbe des Steinsalzes stützen sollen. (Journ. Physical Chem. 30. 507—20. 1926, Univ.) HAASE.

A. Hasebrink, *Das Eisenerzvorkommen von Wabana (Neufundland)*. Besprechung der geograph. u. geolog. Lage der Roteisensteinlager von Wabana, ihrer Entstehung

u. des Abbaus der Erze mit einem Gehalt von durchschnittlich 52% Fe. (Glückauf 62. 553—61. Duisburg.)

A. Brammall, *Gold und Silber im Dartmoor Granit*. (Vgl. Mineral. Magazine 20. 319; C. 1925. II. 1023.) In dem gewöhnlichen Biotitgranit wurde Au u. Ag in kleinen Flitterchen, u. zwar meist in Quarz oder auch Feldspat eingebettet gefunden. Der Gehalt beträgt pro t 0,00004 g Au u. 0,00024 g Ag. (Mineral. Magazine 21. 14—20.)

A. Sachanen und **M. Bestuschew**, *Über den Zustand der Protoparaffine in Erdölen*. Vff. besprechen die Ergebnisse der Unters. der Löslichkeitsverhältnisse von Protoparaffinen, die aus Erdölen ohne Dest. erhalten werden, sowie die endgültige Lösung dieser Frage. (Petroleum 22. 484—86. Grosny.)

G. B. M. Dobson und **D. N. Harrison**, *Messungen des Ozongehalts der Erdatmosphäre und seine Beziehung zu anderen geophysikalischen Zuständen*. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 110. 660—93. — C. 1926. I. 1790.)

C. Chree, *Atmosphärisches Ozon und terrestrischer Magnetismus*. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 110. 693—99.)

d'Arsonval und **F. Bordas**, *Bestimmung des Grads der Verunreinigung der Atmosphäre*. Nach der Methode von OWEN wurde der Grad der Verunreinigung der Luft während des Februar 1925 bestimmt. Der Gesamtstaub beträgt 12,871 g pro qm während die durch die Verbrennung von Kohle hervorgerufenen Verunreinigungen pro qm an C 2,659 g, an KW-stoffen 1,824 g, an SO_3 2,432 g, an Cl 0,253 g u. an NH_3 0,021 g ausmachen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 823—25.)


M. Brillouin, *Ist der Mond radioaktiv?* Vf. ist der Ansicht, daß der Mond wahrscheinlich radioakt. ist u. auf die obere Erdatmosphäre eine bestimmte Wrkg. ausübt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 822—23.)

D. Organische Chemie.

M. Gomberg, *Elemente mit anomalen Valenzen*. Zusammenfassender Vortrag über die Änderungen der Wertigkeit verschiedener Elemente, unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse beim C u. der freien Radikale. Neu sind nur einige Mitteilungen über die Reaktionsfähigkeit des Mg gegenüber dem Benzophenon. Entgegen den Angaben der Literatur reagieren gewöhnliches u. amalgamiertes Mg in äth. oder benzol. Lsg. nicht mit Benzophenon. Rk. erfolgt erst nach Aktivierung durch Brom oder Jod. MgJ_2 verbindet sich mit Benzophenon in äth. oder benzol. Lsg. zu $\text{MgJ}_2 \cdot 3(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{CO}$; es entsteht kein Benzpinakon, auch nicht bei längerem Kochen. Benzpinakon bildet sich jedoch sofort bei Zusatz von gepulvertem Mg zu der Suspension der Doppelverb. in Ä. oder Bzl. Vf. leitet aus diesen Verss. die Existenz von MgJ , welches die reaktionsfähige Form darstellt, her. (Chem. Rev. 2. 301—1925. Ann Arbor [Mich].)

M. Ishio, *Über die Konstitution der Eläostearinsäure*. Für die Eläostearinsäure haben MAJIMA (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 674 [1909]) Formel I., FOKIN (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 45. 283) Formel II., BÖESEKEN u. RAVENSWAAY (Rec. trav. chim. Pay-Bas 44. 241; C. 1925. II. 106) Formel III. aufgestellt. III. läßt sich jedoch mit der Jodzahl nicht in Einklang bringen. — Vf. hat eine Dihydroeläostearinsäure dargestellt, die nach der Jodzahl noch eine Doppelbindung enthält. Dadurch wird unwahrscheinlich, während II. deshalb wegfällt, weil bei der Oxydation niemals Undecandisäure aufgefunden worden ist. Das Ozonid der Dihydrosäure (klebrige Masse) liefert mit sd. W. Capronsäure, Sebacinsäure, CO_2 u. HCO_2H , die Dihydrosäure selbst mit wenig KMnO_4 eine Tetraoxystearinsäure, mit viel KMnO_4 Capronsäure, Sebacinsäure u. Oxalsäure. — Bei der Spaltung des Ozonids des Eläostearinsäuredichlorids entstehen α -Chlorcapronsäure bezw. -aldehyd u. ein untrennbares Gemisch von α -Chlor-

acinsäure mit ihrem Halbaldehyd, ferner HCO_2H u. CO_2 . — Auf Grund dieser Befunde ist Vf. für die Eläostearinsäure Formel IV. auf. Der Dihydrosäure würde Formel V. oder VI., dem Dichlorid Formel VII. zukommen. Opt. Eigenschaften u. Jodzahlen stimmen mit diesen Formeln gut überein. Bei der B. von Stearinsäure durch Hydrierung IV. (MAJIMA, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **45**. 2730 [1912]) u. Tetraoxystearinsäure (l. oben) wird der Vierring zwischen C_{10} u. C_{13} gesprengt. Formel VI. ist wahrscheinlicher als V., da sie die B. der Tetraoxystearinsäure besser verstehen läßt.



Versuche. Dihydroeläostearinsäure, $\text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_2$ (V. oder VI.). Aus IV. mit Na. sd. Amylalkohol. Blättchen aus Essigester, F. 60° , ll. in A., Ä., Bzl., wl. in PAe.. in W. Jodzahl 90,32. — Äthylester, Kp.₅ 193—195 $^\circ$, D.₁₇⁴ 0,88153, n_D¹⁷ = 1,4696. nmt glatt 2H₂ auf unter B. von Stearinsäureester. — 10,11,12,13-Tetraoxystearinsäure, $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_6$. Blättchen aus Eg., F. 185 $^\circ$, unl. in W., A., Ä. — Eläostearinsäurediimid, $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_2\text{Cl}_2$ (VII.). Aus IV. mit Cl in CCl_4 bei -15° . Krystalle aus PAe., 88 $^\circ$, schwärzt sich allmählich. Gibt mit A. oder CH_3OH die entsprechenden Dioxyderivv. (Sirupe). — Ozonid, $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_8\text{Cl}_2$, durchsichtige, klebrige M. — α -Chloronsäure, $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_2\text{Cl}$, Kp.₃ 104 $^\circ$. — α -Oxycapronsäure, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$. Aus dem vorigen CaCO_3 in sd. W. F. 61 $^\circ$. — α -Chlorcapronaldehyd, $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OCl}$, Kp.₂₂ 60,5 $^\circ$. (Journ. arm. Soc. Japan **1926**. Nr. 529. 21—25.) LINDENBAUM.


Shigeru Toda, Über die Oxydation der Oxalsäure durch Jodsäure in wässrigerung. (Vgl. WARBURG, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1001; C. **1925**. II. 726.) Die $2\text{H}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 6\text{H}_2\text{O} + 10\text{CO}_2 + \text{J}_2$, die nach MILLON durch sehr geringe Mengen HCN verhindert wird, beruht nach den Verss. auf der katalyt. Wrkg. Eisen. Der Verlauf der Rk. wurde manometr. gemessen. Die Rk. zwischen reinsten Hilbaumschen Präparaten, von denen die Jodsäure pro 1 g 10^{-3} mg Fe enthielt, wird durch 10^{-4} n. HCN zu etwa 65%, durch 10^{-3} n. HCN fast völlig gehemmt. Die Wrkg. HCN ist nach kräftiger Durchlüftung völlig reversibel. Metallsalze, am besten u. Co, in einer Konz. von 10^{-4} , weniger gut Mn u. Cu, beschleunigen die Rk. Nach häufigem Umkrystallisieren der Oxalsäure aus eisenfreiem W. u. Darst. der Jodsäure durch sorgfältige Dest. gereinigtem J₂ u. HNO_3 , die nach der Rhodanrk. eisenfrei, in 1 g also weniger als 10^{-4} mg Fe enthielt, sank die Reaktionsgeschwindigkeit $1/10$. Zusatz von 10^{-4} mg Fe zu 4 cem Reaktionsgemisch beschleunigte die Wrkg., 3 mg bewirkte die Rk.-Geschwindigkeit ungereinigter Lsgg., die durch HCN der Null wurde. — Vf. nimmt an, daß das katalyt. wirksame Fe eine komplexe Enverb. ist, an deren Aufbau sich neben der Jodsäure vielleicht auch die Oxalsäure beteiligt. Eine Wrkg. freier Eisenionen kommt nicht in Frage. (Biochem. Zhr. **171**. 231—39. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biologie.) LOHMANN.

W. Ismailsky und W. Kolpensky, Über die Erscheinungen der reduktiven Aktivität von Zinkstaub bei der alkalischen Reduktion von Nitroverbindungen. Untersuchungen aus dem Gebiete des Benzidins. I. Vff. haben die Ursachen anormaler, selbst Explosiven führender Red. von Nitrobenzol mit Zn-Staub zu Benzidin untersucht, Mittel zu deren Vermeidung zu finden. — Die Ursache der Reaktionsstöße liegt nicht in der schwachen Aktivität von Zn-Staub, in dem Zn-Gehalt oder in der v. von ZnO zu suchen, sondern in den Veränderungen, die der Zn-Staub während Rk. erfährt. — Zur vergleichenden Unters. der verschiedenen Sorten von Zn-Staub

wurde eine Standard-Reduktionsmethode, Red. von Nitrobenzol zu Azoxybenzol ausgearbeitet; eine solche Prüfung zeigt ihren prakt. Wert für den Betrieb, in bezug auf Gleichmäßigkeit des Rk.-Verlaufes, auf Ausbeute an Benzidin u. Verluste durch Anilinbildung. — Die Beobachtungen bei der Durchführung solcher Standardredd., ähnlich wie bei der Ausführung des Vers. nach der Methode der Regulierung des Rk.-Vorganges durch Alkalizusatz sind, zeigen, daß der Zn-Staub die Fähigkeit besitzt, während des Rk.-Vorganges eine vorübergehende reduktive Passivität zu erhalten, die auch bei der Einw. von Zn-Staub bei Ggw. von Alkali auf Salpeter beobachtet wurde. Die Passivitätserscheinungen können vermieden werden, wenn man den Zn-Staub einer Vorbehandlung unterzieht, die in der Einw. von Alkalilsg. oder W. bei bestimmten Bedingungen besteht u. jedesmal der betreffenden Zn-Sorte angepaßt werden muß. Bei solcher Vorbehandlung können die Temp., die Konz. von Alkali, die Folge der Rk.-Zusätze, die Zeit der Einw. usw. geändert werden. Je aktiver der Zn-Staub ist, um so vorsichtiger muß die Vorbehandlung ausgeführt werden, da bei zu energ. Behandlung die Änderung des Zustandes wieder verschwinden kann. — Die Ursache der Passivitätserscheinungen liegt offenbar in oberflächlichen Veränderungen von Zn-Stäubchen durch den Einfluß des Alkalis, möglicherweise handelt es sich um die Oxyklusion von einer Gashülle, vielleicht unter B. von *Zinkhydriir* ZnH_2 . — Durch den Unterss. der Vff. ist gezeigt worden, daß nach D. R. P. 336841; C. 1921. IV. 4 vorbehandelter Zn-Staub besondere Vorteile bei der Ausführung der Red. von Nitroverb. in alkal. Lsg. bieten kann. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 507—09. Moskau, Zentral-labor. des Anil-Trusts.)


BUSCH.

A. Pieroni, Über die tautomeren Formen des Oxyphenylazocarbonamids. Über die Konst. der Oxyazoverbb. sind in der Literatur sehr verschiedene Meinungen geäußert worden. In der Hauptsache handelt es sich dabei um die Frage, ob den Oxyazoverbb. die Formel von Oxyphenylazoverbb. oder die von Chinonhydrazonen zuzuschreiben ist, ferner ob für die o- u. p-Reihe die gleichen oder verschiedene der genannten Konstitutionsmöglichkeiten Geltung haben. Für die Acyloxyazoverbb. wären somit der p-Reihe folgende beide Isomere möglich:



in der o-Reihe ist eine solche Isomerie nicht mit Sicherheit festgestellt. Während man nach den chem.-physikal. Eigenschaften der o-Verbb. geneigt ist, ihnen eher die Chinon- als die Oxyazoformel zuzuschreiben, weist doch ihr allgemeines Verhalten darauf hin, daß ein solcher Unterschied in der Konst. zwischen o- u. p-Verb. nicht besteht.


Im Anschluß an frühere Arbeiten (Gazz. chim. ital. 54. III. 157. 162 [1924] C. 1924. II. 469) hat der Vf. sich dem Studium des Phenolazocarbonamids zugewandt u. konnte für das Oxyphenylazocarbonamid die beiden tautomeren Formen herstellen:



u. zwar III aus *p*-Aminophenol über das Diazochlorid, Diazocyanid zum Carbonsäureamid, IV aus Chinon mit Semicarbazidhydrochlorid. Aus der Löslichkeit beider Formen in alkoh. KOH u. Fällbarkeit durch CO_2 ist auf die Existenz von K-Salzen, $\text{K}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{N}=\text{N}\cdot\text{CONH}_2$ u. $\text{O}=\text{C}_6\text{H}_4=\text{N}-\text{NK}\cdot\text{CONH}_2$, zu schließen. Durch Erhitzen mit wenig W. kann die gelbe chinoidale Form in die rote phenolische umgewandelt werden. Beide Isomeren gehen mit Eg. u. konz. H_2O_2 in die Azoxyverb. $\text{HO}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{N}(\text{N}=\text{NCONH}_2)$ über, die sowohl selbst wie auch in Form ihrer Br-Substitutionsprodukte mit Pyrrol Bisazoverbb. von guten Indicatoreigenschaften gibt.


Mit **G. Buzzi**. *p*-Oxydiazobenzolcyanid, $\text{HO}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{N}=\text{N}\cdot\text{CN}$, durch Diazotieren von (mit Sn u. HCl gereinigtem) salzsaurem *p*-Aminophenol in H_2SO_4 -Lsg. mit Äthylnitrit u. Zugabe von KCN-Lsg. zur fertigen Diazoverb. bei 0°, gelbbraune Nadelchen vom F. 117° unter Zers., ll. in Ä. u. A. — *p*-Oxyphenylazocarbonamid, $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$, ll. aus obigem Diazocyanid in trocken-äth. Lsg. mit HCl-Gas, aus W. bei 80° oder a

u. KOH durch Fällung mit CO_2 , rote Nadeln, F. 172° unter Gasentw. — *p*-Chinon-carbazon, **IV**, aus Chinon u. Semicarbazidhydrochlorid, aus A. u. alkoh. KOH u. Ä. mit H_2 oder aus sehr verd. NH_4OH durch Fällen mit Essigsäure, gelbe Nadeln, die sich bei 120° rot färben u. sich bei 172° zers.; die Umwandlung der gelben Nadeln in die roten zeigt den Übergang von **IV** in die tautomere Form **III** an. Diese Umwandlung gelingt ebenfalls durch mehrmaliges Lösen der chinoiden Form **IV** in der gerade ausstehenden Menge verd. Alkali, Erwärmen auf $80\text{--}90^\circ$ u. schwaches Ansäuern mit Essigsäure; bei nur einmaligem Lösen u. Fällen wird nur wenig **IV** in **III** umgewandelt. **III** ist in A. u. Eg. leichter l. als die isomere Form **III**. — Phenolazoxycarbonamid, $\text{H}_7\text{O}_3\text{N}_3$, aus Lsg. von Oxyphenylazocarbonamid in Eg. mit H_2O_2 konz., ebenso aus Lsg. von Chinonsemicarbazon in Eg. mit H_2O_2 , aus viel W., das vorher bis nahe zum



erhitzt ist, hellgelbe Nadeln, F. unter Gasentw. 153° . — *p*-Oxybenzolato- β -naphthol, $\text{C}_6\text{H}_4\text{N}=\text{N}\cdot\text{C}_{10}\text{H}_6\cdot\text{OH}$, aus vorst. Verb. mit β -Naphthol. F. 194° . — *p*-Oxyromphenylazoxycarbonamid, $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_3\text{N}_3\text{Br}_2$, mit Br_2 in Eg. aus lauwarmem A., gelbe Nadeln, F. 212° , l. in W. — *p*-Oxydibrombenzolato- β -naphthol, $\text{OHBr}_2\text{C}_6\text{H}_2\text{N}=\text{N}\cdot\text{C}_{10}\text{H}_6\cdot\text{OH}$, aus vorst. Verb. in wss. alkal. Lsg. mit β -Naphthol rote Nadeln mit einem Reflex, F. 232° . — Phenolazoxycarbonamid sowie sein Dibromderiv. geben mit Pyrrol in alkal. Lsg. die Bisdiazoverbb. **V** u. **VI**; **V** konnte auch direkt aus Diazomolchlorid u. Pyrrol in wss.-alkoh.-alkal. Lsg. mit kleiner Ausbeute neben einer größeren Menge von Nebenprodd. gewonnen werden. Die Verbb. **V** u. **VI** lösen sich ohne Unterschied von anderen Bisazoverbb. in schwach ammoniakal. W. mit azurblauer Farbe, von konz. H_2SO_4 werden sie wie andere Bisazoverbb. mit azurblauer Farbe gelöst. (Gazz. chim. ital. **55**. 793—804. 1925. Florenz, Univ.) LEHMANN.

Fritz Kögl und Alexander Lang, Über den Mechanismus der Fichterschen Synthese von Dialkyldioxychinonen. Die Dioxychinonsynthese von FICHTER (LIEBIGS Ann. **395**. 1; C. **1913**. I. 913) verläuft anders als bisher diskutiert wurde. Aus den betreffenden Fettsäureestern entstehen als Primärprodd. die entsprechenden symmetr. Diketone, die dann nach dem Schema:



sekundär mit Oxalester kondensieren u. dabei ohne weiteres die Dialkyldioxychinone geben. — Die Verwendung von K für die Fichtersche Synthese hat sich bisher bewährt, obgleich die Diketondarst. nach SCHEIBLER (LIEBIGS Ann. **434**. 265; C. **1924**. I. 308) mit K erheblich besser verläuft. —

Versuche. Di-*n*-butyryl, gelbliches Öl, Kp_{11} $70\text{--}72^\circ$; Dioxim, $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_2$, F. 180° . — Diäthylidioxychinon, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_4$, aus 3 Moll. A.-freiem Na-Äthylat in Ä. mit Ä. Oxalester u. 1 Mol. Di-*n*-butyryl; aus Eg., F. $221\text{--}221,5^\circ$. — Di-*i*-propyldioxychinon, $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_4$, B. ebenso aus Di-*i*-valeryl; F. 154° . — Synthese der Dialkyldioxychinone ohne Isolierung der Diketone: Dimethyldioxychinon, aus Propionsäure-äthylester + Na-Pulver in Ä., Durchleiten von O u. Zufügen von Oxalester (1 Mol. 2 Moll. Fettsäureester) u. Zers. mit W.; orangefarbene Blättchen, aus Eg., F. 245° . — Propionsäuremethylester gibt analog Diäthylidioxychinon. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 13. München, Techn. Hochsch.) BUSCH.

Vincenzo Paolini (mit C. Ravasini), Über die isomeren Terpeneole und über die Bildung des α -Terpineols in seine optischen Antipoden. Je nach der Stellung der Methylgruppe u. der Äthylendoppelbindung lassen sich vom Terpen 4 isomere Terpeneole

ableiten, α -, β -, γ - u. ein unbekanntes Terpeneol. Dem α -Terpeneol kommt die v. WAGNER vorgeschlagene Formel zu, in der das OH an dem tertiären C-Atom d. Isopropylseitenkette hängt. In chem. Hinsicht verhalten sich die verschieden opt. akt. u. inakt. Isomeren des Terpeneols vollkommen gleich. Verschieden sind d. FF., nämlich für *d*- u. *l*- α -Terpeneol, F. 37—38°, für inakt. α -Terpeneol, F. 35°. Die Drehungswerte schwanken für *l*- α -Terpeneol zwischen einem Minimum von $[\alpha]_D = -2^\circ 55'$ (aus Citrus limonum) u. einem Maximum von $[\alpha]_D = -117^\circ 5'$ (aus Pin mit Eg. u. ZnCl_2), für *d*- α -Terpeneol zwischen min. $[\alpha]_D = +30^\circ 56'$ bis max. $[\alpha]_D = +95^\circ 9'$. Die Verschiedenheit der Drehungswerte ist auf Verunreinigungen durch ebenfalls opt. akt. Isomere von kleinerer oder entgegengesetzter Drehung zurückzuführen. Über diese verschiedenen Terpeneole wird an anderer Stelle berichtet. Das aus fl. Terpeneol durch Abkühlen isolierte inakt. α -Terpeneol (F. 35°) ist racemisch zur Trennung in seine beiden opt. akt. Komponenten wendet Vf. ein von ihm früher für die Isolierung opt. akt. Terpenalkohole benutztes Verf. an: Bei der Herst. d. Strychninsalzes eines sauren Phthalsäureterpeneolesters in der Kälte scheidet sich die *l*-Form als unl. Salz ab, während das *d*-Salz in Lsg. bleibt u. auf dem Wege über das unl. Ag-Salz in reiner Form abgeschieden werden kann; durch Verseifung d. *d*- u. *l*-Ester werden die Terpeneole in reiner Form gewonnen. — Saurer Phthalsäureterpeneolester, $(\text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{COOC}_{10}\text{H}_{17})_2$, aus *K*-Terpeneolat u. Phthalsäureanhydrid in Toluol lsg. nach Ansäuern mit verd. H_2SO_4 . — *l*-Terpeneolstrychninphthalat, $\text{C}_6\text{H}_4 \cdot (\text{COOC}_{10}\text{H}_{17})_2$ ($\text{COOH} \cdot \text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2$), aus abs. alkoh. Lsg. von vorst. Verb. mit chl. Lsg. von Strychnin, glänzende Blättchen aus Butylalkohol, F. 207°, $[\alpha]_D = -40,8^\circ$. — Saurer Phthalsäure- α -*l*-terpeneolester, aus dem Strychninsalz mit verd. NH_4OH u. H_2SO_4 . — α -Terpeneol, $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$, aus dem sauren Phthalat mit alkoh. K_2CO_3 , Öl, Kp. 218° (korrig.). F. 37—38°, $D_{15} 0,935$, $[\alpha]_D = -98,2^\circ$. — Ag-Salz des Phthalsäure-*d*-terpeneolesters aus dem alkoh.-chl. Filtrat des *l*-Terpeneolstrychninphthalats, nach Abtrennung d. Strychnins, mit AgNO_3 , Krystalle aus Alkohol. — Saurer Phthalsäure-*d*-terpeneolester, aus dem Ag-Salz mit NaCl u. verd. H_2SO_4 , aus Eg. F. 116°. $[\alpha]_D = +40,5^\circ$. — α -*d*-Terpeneol, durch Verseifen des sauren Phthalats mit alkoh. K_2CO_3 u. Dest. m. Wasserdampf, $[\alpha]_D = +98,5^\circ$. (Gazz. chim. ital. 55. 804—11. 1925.) LEHMANN.

Vincenzo Paolini, Über die isomeren α -Terpeneole. Aktive Terpeneole aus aktiven Pinenen. Die in vorst. Ref. beschriebene Methode zur Isolierung der opt. akt. Isomere des α -Terpeneols kann auch auf die Unters. der nach dem Verf. von FLAWITZKY u. ERTSCHIKOWSKY aus Pinen hergest. Terpeneole angewandt werden, die ebenso wie die natürlichen Terpeneole aus äth. Ölen Gemische von Isomeren darstellen, je nach der Stärke der angewandten Reagenzien sehr verschiedene Drehwerte zeigen u. den nach in ihrem Gehalt an den einzelnen Isomeren schwanken. So erhielt FLAWITZKY aus einem Pinen mit $[\alpha]_D = -33,0^\circ$ ein Terpeneol mit $[\alpha]_D = -56,2^\circ$; das gleiche Pinen liefert bei Einw. von stärkerer alkoh. H_2SO_4 ein Terpeneol von schwächerer $[\alpha]_D = -13,0^\circ$. Durch Abkürzung der Rk.-Geschwindigkeit erhielt GODLEWSKY ein *l*-Terpeneol mit $[\alpha]_D = -98,28^\circ$. Mittels der genannten Veresterungsmethode konnte Vf. sowohl nach dem Flawitzkyschen als auch nach dem Ertschikowskyschen Verf. aus *l*-Pinen mit $[\alpha]_D = -33,5^\circ$ ein α -*l*-Terpeneol mit $[\alpha]_D = -98,32^\circ$ u. aus *d*-Pinen mit $[\alpha]_D = +29,5^\circ$ ein *d*- α -Terpeneol mit $[\alpha]_D = +95,0^\circ$ isolieren. Die F. 207° des Strychninsalzes des sauren Phthalsäureesters kann als Bestätigung für die Richtigkeit der für die reinen Isomeren gefundenen Drehwerte gelten. — Ausgangsmaterial: Aus Handelsterpentinöl wurde durch mehrfache fraktionierte Dest. ein bei 157—158° sd. Teil mit $D_{15} 0,80$ u. $[\alpha]_D = -35^\circ 5'$ isoliert. Nach der Methode FLAWITZKY wurde aus Pinen, 90%ig. A. u. 70% H_2SO_4 in 10 Stdn. ein Öl erhalten, aus dem auf dem Wege über das *K*-Salz in toluol. Lsg. mit Phthalsäureanhydrid der saure Phthalsäureester mit $[\alpha]_D = -57^\circ$ abgeschieden wurde; darauf wurde das Strychninsalz des sauren *l*- α -Terpeneolphthalats gefällt. F. 207° (au

aylalkohol). $[\alpha]_D = -41,25^\circ$. Das daraus hergestellte *l*- α -Terpineol zeigte folgende Daten: F. $37-38^\circ$, D_{15} 0,935, $[\alpha]_D = -98,32^\circ$. Aus den Mutterlaugen wurde *l*- α -Terpineol mit $[\alpha]_D = -27,0^\circ$ gewonnen. Nach ERTSCHIKOWSKY: Aus Pinen mit $[\alpha]_D = -33,5^\circ$ wurde mit Eg. u. $ZnCl_2$ über das Terpenylacetat u. den sauren Phthalsäureester ein α -Terpineol mit $[\alpha]_D = -57,0^\circ$ erhalten. Das Strychninsalz des sauren Esters zeigte einen F. von 207° u. eine $[\alpha]_D$ von $-40,0^\circ$ u. ergab bei Verflüchtung ein *l*- α -Terpineol mit $[\alpha]_D = -98,1^\circ$. Aus der Mutterlauge resultierte *l*-Terpineol mit $[\alpha]_D = -27,0^\circ$. Die mit d-Pinen erhaltenen Werte weichen von den eben genannten wenig ab; nur der $[\alpha]_D$ -Wert fällt etwas kleiner aus, wahrscheinlich nach SAWITZKY verursacht durch eine teilweise Zers. des Prod. (Gazz. chim. ital. 55. 1925.)

LEHMANN.

Vincenzo Paolini, *Isomere Carvomenthole aus Carvacrol*. (Vgl. vorst. Ref.) Wie früheren Arbeiten gezeigt wurde, sind die von verschiedenen Bearbeitern nach verschiedenen Methoden u. aus verschiedenen Ausgangsmaterialien hergestellten Carvomenthole als unbest. Gemische der durch die Anwesenheit von 3 a. C-Atomen im Mol. des Carvomenthols bedingten 8 opt. akt. Isomeren anzusehen. Die Trennung u. Isolierung einzelner Isomere gelang dem Vf. mittels der in vorangehenden Arbeiten beschriebenen Phthalsäureveresterungsmethode. Auf gleiche Weise konnte der Vf. auch das Gemisch der beiden von BRUNEL nach SABATIER gewonnenen α - u. β -Carvomenthole zerlegen, u. zwar zunächst in die beiden isomeren racem. α - u. β -Verbb., welche dieser beiden dann weiter in ihre opt. antipod. Komponenten. α - u. β -Carvomenthol wurden in Form ihrer sauren Phthalate durch verschiedene Löslichkeit in Wasser getrennt, die α -Verb. über das Ag-Salz, die β -Verb. durch Umkrystallisieren aus Eg., gereinigt u. von beiden die Strychninsalze hergestellt; das β -Strychninsalz wurde mit CCl_4 u. PAe. in die d- u. l-Form zerlegt, während das α -Strychninsalz sich in Bzl. u. Ä. in seine d- u. l-Komponenten trennen ließ. — Inakt. α - + β -Carvomenthol, aus Carvacrol durch katalyt. Red. bei $180-190^\circ$ u. Behandlung des Rk.-Prod. mit 5%ig. NaOH, um das unveränderte Carvacrol in Lsg. zu bringen, Kp. 235° , D_{15} 0,9856. — Saurer Phthalsäureester des α - und β -Carvomenthols, in Lsg. von Toluol u. K., Phthalsäureanhydrid durch Zugabe von verd. H_2SO_4 , ölige, später unter W. werdende klebrige M. — Saurer Phthalsäureester des β -Carvomenthols, aus vorst. Gemisch mit PAe., wobei die β -Verb. als feste krystallin. M. ungel. zurückbleibt aus F. 125° , opt. inakt. — Strychninsalz, aus vorst. Verb., ll. in organ. Lösungsmmm. — Form des β -Strychninsalzes, aus vorst. rac. Verb. durch CCl_4 u. PAe., wobei die d-Form in Lsg. bleibt, F. 148° , $[\alpha]_D = -14,72^\circ$. — Saurer Phthalsäureester des β -Carvomenthols, aus dem *l*- β -Strychninsalz mit HCl in alkoh. Lsg., F. 125° , $[\alpha]_D = -1,70^\circ$. — *l*- β -Carvomenthol, aus dem sauren Phthalat mit alkoh. K_2CO_3 u. Wasserdampfdest., Kp. 218° , D_{15} 0,9082, $n_D^{15} = 1,4610$, $[\alpha]_D = -1,81^\circ$. — Saurer Phthalsäureester des d- β -Carvomenthols, aus dem Filtrat des *l*-Strychninsalzes mit HCl in alkoh. Lsg., aus Essigsäure, F. 125° , $[\alpha]_D = +3,77^\circ$. — d- β -Carvomenthol, aus dem sauren Phthalat mit K_2CO_3 u. Wasserdampfdest., Kp. 218° , D_{15} 0,9081, $n_D^{10} = 1,461$, $[\alpha]_D = +1,79^\circ$. — Ag-Salz des sauren α -Carvomentholphthalsäureesters, aus dem äth. Filtrat der entsprechenden β -Verb. in NH_4OH mit $AgNO_3$ aus Chlf. mit Ä., weiße Kryst., F. 225° . — Strychninsalz des sauren α -Carvomentholphthalsäureesters, aus vorst. Verb. über das saure Phthalat wie oben, ll. in den meisten Lösungsmmm. — Form des Strychninsalzes, aus Lsg. des rac. Salzes in Bzl. u. PAe., F. ungefähr 110° . — d- α -Carvomenthol, aus dem sauren Phthalat mit HCl in alkoh. Lsg., F. 125° , $[\alpha]_D = -2,70^\circ$. — d- α -Carvomenthol, aus dem Filtrat der *l*-Form des Strychninsalzes, $[\alpha]_D = +2,20^\circ$. Die Abweichung der Drehwerte bei den entsprechenden d- u. l-Formen ist sicher auf kleine noch vorhandene Verunreinigungen zurückzuführen. In einer Tabelle werden die übrigen in anderen Arbeiten vom Vf. isolierten u. untersuchten opt. akt. Isomeren des Carvomenthols zusammengestellt; in der Reihe der 8 möglichen Isomeren fehlt nur die d-Form des

Carvomenthols mit $[\alpha]_D = -20,30^\circ$. (Gazz. chim. ital. **55**. 818—24. 1925. Gen Pharmaz. Inst. der Univ.)

LEHMANN

V. Paolini, *Physikochemische Untersuchungen über einige saure Phthalsäureester von Terpenalkoholen*. Die sauren Phthalsäureester von Terpenalkoholen sind schwache Säuren. Da die Best. ihrer Dissoziationskonstante aus der elektrolyt. Leitfähigkeit nach OSTWALD wegen der Unlöslichkeit der Phthalate in W. unmöglich war, wandte Vf. eine ihm privat von BETTI u. BONINO mitgeteilte indirekte Methode durch Best. des Hydrolysegrades von Salzlsgg. an: Es zeigte sich nämlich bei dem Verreiben einer reinen, von NaOH freien Na-Salzlsgg. durch Schütteln verd. titrierter NaOH mit Überschuß des sauren Phthalats u. Filtrieren des ungel. Überschusses herzustellen, daß die in W. prakt. unl. Phthalsäureester sich in den Lsgg. ihrer Na-Salze in beträchtlicher Menge lösten. Auf die somit vorliegende Lsg. einer schwachen Säure und ihres Salzes mit einer starken Base läßt sich die Approximativgleichung von CLARK anwenden:

$$\log \frac{1}{[H^+]} = \log \frac{1}{K_a} + \log \frac{[S]}{[A]},$$

in der $[H^+]$ die H-Ionenkonz., K_a die Assoziationskonstante, $[S]$ die Konz. des Salzes u. $[A]$ die Konz. der freien Säure in der Lsg. bedeuten. Die Messungen wurden in Thermostaten bei 25° ausgeführt, $[A]$ u. $[S]$ durch Titrieren, $[H^+]$ elektrometr. in Anwendung einer Chinochinhydronelektrode an Stelle der H_2 -Elektrode bestimmt u. aus den gefundenen Werten K_a als einzige Unbekannte in der Gleichung berechnet. Für jedes der untersuchten Phthalate wurden zwei Messungen bei zwei verschiedenen Konz. vorgenommen, deren Mittelwerte folgende Daten ergaben: saurer *l*- β -Carmentholphthalsäureester ($[\alpha]_D = -3,70^\circ$), $K_a = 3,02 \cdot 10^{-6}$; saurer β -Thujylphthalsäureester ($[\alpha]_D = +91,27^\circ$), $K_a = 7,5 \cdot 10^{-6}$; saurer *l*- α -Terpineolphthalsäureester ($[\alpha]_D = -40,5^\circ$), $K_a = 1,42 \cdot 10^{-5}$. (Annali Chim. Appl. **15**. 411—13. 1925. Genua, Univ.)

LEHMANN

V. Paolini, *Isomere Thujone (Tanacetone) = d- α -Thujon*. Unter Abänderung der von WALLACH (LIEBIGS Ann. **272**. 99 [1893]) angegebenen Methode zur Herstellung von Thujon aus Thujaöl derart, daß das entsprechende Semicarbazon mit Phthalsäureanhydrid an Stelle von Mineralsäuren hydrolysiert wurde, erhielt Vf. ein *d*- α -Thujon mit $[\alpha]_D = +10^\circ 23'$, während WALLACH ein solches mit $[\alpha]_D = -10^\circ 23'$ hergestellt hat. Letzteres hat gegenüber Säuren u. Basen ein sehr wenig stabiles Drehvermögen. Schon WALLACH hatte beobachtet, daß beim Freimachen von Thujon aus dem Semicarbazon mit verd. H_2SO_4 ein Thujon mit $[\alpha]_D = -5^\circ 13'$ entsteht. Da die übrigen Konstanten der Verb. unverändert blieben, konnte es sich nur um eine Stereoisomerie handeln. Vf. stellte fest, daß, wenn man aus der Mischung von Semicarbazon u. Phthalsäureanhydrid das Thujon gleichzeitig mit seiner B. im Wasserdampfstrom entfernt, man immer ein *l*-Thujon mit $[\alpha]_D = -10^\circ 23'$ erhält; wenn man dagegen das Gemisch von Semicarbazon u. Phthalsäureanhydrid eine halbe Stunde auf sd. Wasserbade erhitzt, war das Rk.-Prod. ein *d*- α -Thujon mit $[\alpha]_D = +10^\circ 23'$. Beide Thujone in gleichen Mengen gemischt ergaben ein inakt. rac. Prod. Die Temperatur beeinflusst demnach sowohl die Geschwindigkeit der Umwandlung der *l*- in die *d*-Form als auch das Endgleichgewicht beider Formen; diese Tatsache erklärt es gleichfalls, weshalb WALLACH unter bestimmten Bedingungen ein Prod. mit kleinerem Drehvermögen ($-5^\circ 13'$) erhielt. (Annali Chim. Appl. **15**. 414—16. 1925. Genua, Univ.)

Erhard Glaser und **A. Ch. Thaler**, *Über den Einfluß des Säurecharakters von Polynitrophenolen und des Nitronaphthols auf ihre Fähigkeit, Glucoside zu bilden*. In der Darst. von Nitrophenolglucosiden (vgl. GLASER u. WULWEK, Biochem. Ztsch. **145**. 514; C. **1924**. II. 62) hat sich ergeben, daß die drei Isomeren derselben sich sowohl bei der Herstellung verschieden verhalten, als auch in ihren biolog. Eigenschaften beträchtliche Unterschiede aufweisen. Vff. untersuchen nun die Glucosidbildung, wenn die negativen Gruppen vermehrt werden, wie es bei den Dinitro- u. Trinitro-

phenolen der Fall ist. Durch Einw. von Acetobromglucose in Acetonlsg. auf alkal. Dinitrophenollsg. lassen sich die Tetracetate in guter Ausbeute darstellen. Auf diese Weise wurden die Glucotetracetate des 1,2,4- (F. 168—169°) u. des 1,2,5-Dinitrophenols (F. 148—149°), ferner des 1,4-Nitronaphthols (F. 150—151°) u. das 1,4-Nitronaphtholglucosid (F. 213—214°) erhalten. Die Tetracetate unterscheiden sich in bezug auf ihre Löslichkeit nur wenig voneinander; sie sind in W. u. Bzl. unl. Die Glucotetracetate des 1,2,4- u. des 1,2,5-Dinitrophenols drehen rechts; das Tetracetat u. das Glucosid des 1,4-Nitronaphthols drehen links. In Übereinstimmung mit früher bei der Darst. von Nitrophenolglucosiden gemachten Erfahrungen hat sich gezeigt, daß die verschiedene Stellung der NO_2 -Gruppen bei der Tetracetatbildung des 1,2,4- u. 1,2,5-Dinitrophenols sich in der Weise äußert, daß sich bei letzterem dieselbe rascher vollzieht. — Entsprechend dem stärkeren acylartigen Charakter der Dinitrophenole kam bei der versuchten Abspaltung der Acetylgruppen zu einer Abspaltung des Zuckers zur Zurückgewinnung des Ausgangsmaterials. Wird der elektronegative Charakter durch Einführung einer dritten Nitrogruppe noch verstärkt, so findet überhaupt keine Tetracetatbildung statt. — Mit einigen Tropfen Jod-Jodkaliumlsg. u. NaOH versetzt, gibt 1,2,5-Dinitrophenol eine Purpurfärbung, das 1,2,4-Dinitrophenol dagegen nicht. Dieselben Rkk. zeigten auch die Tetracetate derselben. Das α -Nitronaphthol (1—4) erhält sich bei der Glucosidbildung wie die entsprechenden Nitrophenole.

Versuche. 1,2,4-Dinitrophenolglucotetracetat, $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_{14}\text{N}_2$, aus h. A. Nadeln vom F. 166°. $[\alpha]_{\text{D}}^{19} = +36,8^\circ$ (Chlf.). Geringe Spuren von Säuren oder Alkalien zersetzen die Substanz auch in trockenem Zustande. — 1,2,5-Dinitrophenolglucotetracetat, $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_{14}\text{N}_2$. F. 149°. $[\alpha]_{\text{D}}^{19} = +36,7^\circ$ (Chlf.). — Bei der Synthetisierung von alkal. Pikrinlsg. mit Acetobromglucose in Aceton entsteht kein in W. unl. Tetracetat. — Nitronaphtholglucotetracetat, $\text{C}_{24}\text{H}_{25}\text{O}_{12}\text{N}$, aus h. A. Nadeln. F. 150—151°. $[\alpha]_{\text{D}}^{19} = +66^\circ$ (Chlf.). Die Verseifung führte zum Nitronaphtholglucosid, $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_8\text{N} + \text{H}_2\text{O}$, schiebliche Nadeln vom F. 214—215° (Zers.). Die Verb. krystallisiert mit 1 Mol. H_2O . $[\alpha]_{\text{D}}^{18} = -73^\circ$ (A.). Trotz der Widerstandsfähigkeit gegen Emulsin halten Vff. die Verb. für ein β -Glucosid. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. **264**. 228—37. Wien, Pharmakognost. Inst.)


BEREND.

Y. Murayama und C. Arihara, Untersuchungen in der Camphergruppe. III. Über die Bildung eines neuen Chlorcamphers aus Pinenhydrochlorid. (I. vgl. MURAYAMA, 1160.) Bei der Oxydation von Pinenhydrochlorid mit CrO_3 wird eine Ketogruppe gebildet. Vff. nehmen an, daß diese sich in p zum Cl befindet (nebenst. Formel) u. nennen die neue Verb. p -Chlor-*epi*-campher. — Zu 120 g CrO_3 in 200 cem Eg. gibt man bei unter 30° allmählich 50 g Pinenhydrochlorid, rührt je 3 Stdn. bei Zimmertemp. u. 40 — 45° , dann 2 Stdn. bei 90° u. gießt in W. Das Rohprod. wird in k. essigsaurer Lsg. (24 Stdn.) übergeführt in p -Chlor-*epi*-camphersemibazon, $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{ON}_3\text{Cl}$, Nadeln aus A., F. 240 — 241° . — Oxim, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{ONCl}$, F. 192 — 193° . — p -Chlor-*epi*-campher, $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{OCl}$. Aus dem Semicarbazon mit h. gesätt. wässr. Salzsäurelsg. Nach Dampfdest. krystallin. M. aus A., F. 159 — 160° . (Journ. Pharm. Soc. Japan **1926**. Nr. 528. 14—16. Tokio, Department of Home Affairs.) LINDENE.

C. Finzi, Arsenhaltige Thiophenderivate. III. Mitt. (II. Mitt. vgl. Gazz. chim. **45**. II. 280. 290; C. **1916**. I. 474.) Halogenthienylarsinsäuren. Zur Herst. dieser Säuren verfährt man nach der gleichen Methode wie zur Gewinnung der früher beschriebenen Thiophenarsenverbb.: 2-Brom- oder 2-Jodthiophen reagieren mit HgCl_2 oder B. der entsprechenden HgCl -Halogenthiofenverbb., aus denen der Vf. mit I_2 über ein nicht isoliertes Zwischenprod. durch Oxydation die entsprechenden Arseninsäuren erhielt. Die Menge der als Nebenprodd. gebildeten sekundären Arsin-

VIII. 1.

chloride war unter den angegebenen Vers.-Bedingungen sehr klein, da sich im Oxydationsprod. keine Dihalogenthienylarsinsäuren, $(C_4H_2SX)_2AsO_2H$ ($X = \text{Halogen}$), vorfinden. Verss., zu den Halogenthienylarsinsäuren auf anderem Wege, nämlich aus der durch Nitrieren von 2-Thienylarsinsäure erhaltenen Nitrosäure durch Red. mit Na-Amalgam zur Aminosäure u. daraus durch Diazotieren u. Sandmeyersche Rk. zu den Halogenthienylarsinsäuren zu gelangen, mißlingen, es wurden nur geringe Mengen einer N- u. halogenfreien, nicht analysierten org. Säure gewonnen; die Verss. bestätigen aber die bisher für die Nitrothienylarsinsäure angenommene Formel: $C_4H_2S \cdot (AsO_3H_2)^2 \cdot (NO_2)^5$. Die Halogenthienylarsinsäuren geben mit Magnesiamischung nur beim Kochen einen Nd. Die Jodthienylarsinsäure läßt sich leicht zu $C_4H_2S \cdot (AsO_3H_2)^2 \cdot (J)^5(NO_2)^3$ od. ⁴ nitrieren, die entsprechende Br-Säure wird beim Behandeln mit $H_2SO_4 + HNO_3$ nicht nitriert, sondern nur teilweise zers. — *Arsenothiophenderivv.* Zur Herst. dieser Verbb., die im Mol. zwei untereinander doppelt gebundene As-Atome enthalten, auf dem üblichen Wege durch Red. primärer Arylarsinsäuren wandte Vf. entsprechend den Angaben von BART (LIEBIGS Ann. 429. 115; C. 1923. I. 240) als Reduktionsmittel unterphosphorige oder phosphorige Säure an u. stellte folgende Verbb. her:



Die Arsenoderivv. des Thiophens sind gelbe bis ziegelrote, amorphe Substanzen ohne F., die sich in der Wärme zers. u. in den gewöhnlichen organ. Lösungsmm. unl. sind. Zur Herst. analysenreiner Präparate mußte daher von sehr reinen Ausgangsprod. ausgegangen werden. In Säuren u. Basen sind die Verbb. unl., eignen sich daher nicht für pharmazeut. Anwendung.




5-Bromthienyl-2-arsinsäure, $C_4H_4O_3BrSAs$, aus 5-Bromthiophen-2-mercurichlorid, $AsCl_3$ mit NaOH u. H_2O_2 , glänzende Blättchen, zers. sich nicht bis 300° , l. in sd. W., unl. in A. — 5-Jodthienyl-2-arsinsäure, $C_4H_4O_3JSAs$, aus 5-Jodthiophen-2-mercurichlorid in gleicher Weise wie vorst. Verb., zur Entfernung ausgeschiedenen J wird mit wss. SO_2 -Lsg. gewaschen, glänzende Blättchen aus sd. W., unl. in A., zers. sich nicht bis 300° . — 3- oder 4-Nitro-5-jodthienyl-2-arsinsäure, $C_4H_3O_3NJSAs$, aus vorst. Verb. mit HNO_3 u. H_2SO_4 , gelbe, glänzende Blättchen aus sd. W., F. 202° , l. in A. in der Kälte, l. in sd. Eg., aus Eg. in kleinen Prismen, l. in Alkalihydroxyden mit dunkelroter Farbe, beim Erhitzen dieser Lsg. Zers. — Trithienyl-2-arsin, $C_{12}H_6S_3As$, VI, aus äth. Lsg. von 2-Bromthiophen u. $AsCl_3$ mit Na, gelbbraunes, stark hautreizendes Öl, unl. in W., wl. in h. A., l. in Ä., die alkoh. Lsg. gibt mit alkoh. Lsg. von $HgCl_2$ ein Doppelsalz, krystallin. Pulver, das an der Luft schwarz wird. — 2,2'-Arsenothiophen, $C_8H_6S_2As_2$, I, aus 2-Thienylarsinsäure mit H_3PO_3 , besser mit 50%ig. H_3PO_2 , kanariengelbe, amorphe Substanz, beginnende Erweichung u. Zers. bei 100° , bildet mit Oxydationsmitteln Thienylarsinsäure, unl. in organ. Lösungsmm. — 5,5'-Dinitro-2,2'-arsenothiophen, II, $C_8H_4O_4N_2S_2As_2$, aus Nitrothienylarsinsäure in gleicher Weise wie vorst. Verb., grünlichgelbe amorphe Substanz, unl. in organ. Lösungsmm. bei 150° Braunfärbung, bei 170 – 180° explosive Zers. — 5,5'-Dibrom-2,2'-arsenothiophen, III, $C_8H_4Br_2S_2As_2$, aus 5-Bromthienyl-2-arsinsäure mit H_3PO_2 (D. 1,27), gelbe, zähe Substanz, die beim Erkalten fest wird, gegen 130° beginnendes Weichwerden, F. gegen 170° unter Schäumen, gibt mit H_2O_2 in alkal. Lsg. Bromthienylarsinsäure. — 5,5'-Di-

d-2,2'-arsenothiophen, IV, $C_8H_4J_2S_2As_2$, aus 5-Jodthienylarsinsäure mit H_3PO_3 oder Wasser mit H_3PO_2 , gelbe, amorphe Substanz, F. zwischen 135° u. 175° . — Dinitro-5,5'-dijod-2'-arsenothiophen, V, $C_8H_2O_4N_2J_2S_2As_2$, aus Nitro-5-jodthienyl-2-arsinsäure wie bei erst. Verb., orangegelbe Subst., Erweichung 120° , Zers. 140° unter C-Abscheidung, rot mit alkal. H_2O_2 Jodthienylarsinsäure. (Gazz. chim. ital. **55**. 824—34. 1925. Parma, Univ.)

LEHMANN.

G. Plancher und E. Ghigi, Über die Konstitution des Phenylpyrrols von O. Fischer und E. Hepp. In einer früheren Mitteilung (Gazz. chim. ital. **55**. 49; C. **1925**. I. 2075) haben die Vff. für das aus N-Phenylpyrrol hergestellte Benzolazo-N-phenylpyrrol den Smp. $49-50^\circ$, für das Benzolazo- α -phenylpyrrol den F. 116° u. glauben daher, daß es sich mit dem von O. FISCHER u. E. HEPP (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **19**. 2251 [1886]) als Brombenzol u. K-Pyrrolat hergestellte u. als eine N-Pyrrolverb. beschriebenen Verb. ident. ist, folglich auch das Fischersche Präparat ebenfalls ein α -Phenylpyrrol sein muß. Durch Herst. des *p*-Anisolazoderiv. wird die Annahme bestätigt. Auch bei der genannten Rk. tritt die bei den Alkylhalogenderiv. beobachtete Erscheinung auf, nämlich daß Phenyl wie die Alkyle aus der N-Stellung nach α wandert. — Phenylpyrrol (nach FISCHER u. HEPP) aus K-Pyrrolat im Bombenrohr mit Brombenzol 100° , 7 Std.), aus PAE., F. 115° . — Benzolazo- α -phenylpyrrol, $C_{16}H_{13}N_3$, aus 0,2 g Phenylpyrrol, 0,46 g Na-Acetat u. einer 0,126 g Anilin entsprechenden Menge Phenylazoniumchlorid, aus wenig A. u. W. Rosetten, F. 116° . — *p*-Anisylazo- α -phenylpyrrol, $C_{17}H_{15}N_3O$, aus 0,35 g Phenylpyrrol, 0,8 g Na-Acetat u. 0,3 g diazotiertes Anisidin, F. $140-141^\circ$. (Gazz. chim. ital. **55**. 757—59. 1925. Bologna, Univ.) LEHM.


F. Reindel und F. Rosendahl, Über das 3,3-Dibrompyrimidazol-(2)[2-Oxo-2,3-dihydropyrimidazol] und Versuche zur Darstellung des 2,3-Dioxo-2,3-dihydropyrimidazols. (Vgl. REINDEL u. RAUCH, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 393; C. **1925**. I. 1735.) Um zu einem 2,3-Dioxo-2,3-dihydropyrimidazol (nach I., O für H_2) zu gelangen, wurde in das Pyrimidazol-(2) (I.) Br eingeführt. — 3-Brompyrimidazol-(2)-hydrobromid, $C_7H_5ON_2Br$, HBr. Aus dem Hydrochlorid von I. in sd. Eg. mit 2 Br_2 . Krystalle aus viel Eg. + Ä. — 3,3-Dibrompyrimidazol-(2)-perbromidhydrobromid, $C_7H_4ON_2Br_4$, HBr (nach II.). Ebenso mit 10 Br_2 oder aus 3-Nitrosoimidazol-(2) (I. c.) u. Br in k. Eg. Krystalle, Zers. bei $150-152^\circ$. — 3,3-Dibromimidazol-(2), $C_7H_4ON_2Br_2$. Man verfährt wie für das vorige, ohne dasselbe zu isolieren, gießt die h. Lsg. in 7,5%ig. Sodalslg., löst das Prod. in konz. HCl, verd. mit W., gibt Na-Acetatlg. zu. Citronengelbe Blättchen, Zers. bei 135° , unl. in k., Zers. in W. Lösungsm. Mit Laugen Rotfärbung u. Carbylamingeruch. Gibt bei ca. 180° ein Dioxoverb. oder in Nitrobenzol, ferner mit Ag oder Cu unter Br-Abspaltung ein rotbraunes Dioxoverb. Vers., durch alkal. Hydrolyse zur Dioxoverb. zu gelangen, lieferten braune Lsgg. u. beim Ansäuern ein amorphes braunes Prod. — Verb. $C_{14}H_8O_2N_5Br$ (III.).



dem vorigen mit k. konz. NH_4OH . Nach Digerieren mit W. braune Blättchen, unl., auch in Säuren u. Laugen. — 3,3-Dianilinopyrimidazol-(2), $C_{19}H_{16}ON_4$, aus dem Dibromverb. u. Anilin in sd. A. Nadeln aus A., F. $167-168^\circ$. Ließ sich nicht in die Dioxoverb. überführen. — 3-*p*-Dimethylaminoanil des 2,3-Dioxo-2,3-dihydropyrimidazols (?), $C_{15}H_{14}ON_4$. Aus dem Hydrochlorid von I. u. *p*-Nitrosodimethylanilin in sd. A. Mit Ä. fällt das amorphe Hydrochlorid aus, nach Umfällen aus A. + Ä. in W., A. Daraus mit Na-Acetat das freie Anil, aus A. + Lg., amorph, schwarz, wl. Mit sd. HCl wird Wurstersche Base abgespalten. — Die Dioxoverb. werden sodann auf Ringsynthesen untersucht. — Aus α -Aminopyridin


u. Oxalylchlorid wurde nur das bekannte *Di*-[2-pyridyl]-oxamid, F. 160°, erhalten — 2-Pyridyloxamidsäureäthylester, $C_5H_4N \cdot NH \cdot CO \cdot CO_2C_2H_5$. Aus je 1 Mol. α -Aminopyridin, Äthylloxalsäurechlorid u. Pyridin (Temp. erst unter 0°, dann bis 10°), mit eiskalter 5%ig. Essigsäure fällen. Perlmutterglänzende Blättchen aus A., F. 77° ll. in A., Bzl., Pyridin, unl. in W., verd. Essigsäure. Ringschluß zur Dioxoverb. gelangt nicht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1064—68. München, Techn. Hochsch.) LINDEN

T. Shimidzu, Über die Einwirkung von Bromcyan auf Chinolin. Nach v. BRAU (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 1438 [1900]) soll sich aus Chinolin u. Bromcyan über I (nicht isolierbar) α -Bromchinolinincyanid (II.) bilden, jedoch hat jener Autor die Verbirgends beschrieben. Läßt man eine äth. Lsg. von molekularen Mengen der Komponenten wochenlang im Eisschrank stehen, so scheidet sich ein krystallin. Prod (A) aus, u. auch die Mutterlauge hinterläßt einen krystallin. Rückstand. Letztere ist α -Oxychinolinincyanid, $C_{10}H_8ON_2$ (III.), Nadeln aus Bzl. oder W., F. 117°, u. liefert



mit h. konz. HCl Chinolinhydrochlorid. A wird von W. zerlegt in Chinolinhydrochlorid u. Verb. $C_{20}H_{14}ON_4$ (IV.), Prismen aus Aceton, F. 150°, wl. in A., Ä., Bzl. welche mit h. konz. HCl ebenfalls Chinolinhydrochlorid, mit h. W. III. liefert. — V ist der Ansicht, daß das primär gebildete II. gegen W. sehr empfindlich ist u. schon durch die Feuchtigkeit des Lösungsm. zu III. hydrolysiert wird. IV. entsteht aus III. u. noch unverändertem II. unter HBr-Abspaltung. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1926 Nr. 529. 25—26.) LINDENBAUM.

William Küster und Emil Erfle, Über Derivate der Acetylbrenztraubensäure und des Äthoxalyllessigsäure-[N-methylanilids]. (Vgl. KÜSTER u. SCHLACK, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 409; C. 1924. I. 2256.) Da die l. c. beschriebene Nitrosoverbindung des Acetylbrenztraubensäureanilids (I., l. c. als Acetonyloxalsäureanilid bezeichnet) nach dem Knorr'schen Verf. kein Pyrrolderiv. gab, war die Stellung des NO fraglich. Vff. haben daher das Acetylbrenztraubensäure-[N-methylanilid] oder β -Acetyl- α -oxalacrylsäure-[N-methylanilid], $C_{12}H_{13}O_3N$ (II.), aus Acetylbrenztraubensäure u. Methylanilin in Ä. dargestellt. Prismen aus Ä., F. 85°, ll. in A., Bzl., Chlf., unl. in W. FeCl₃ Rk. rot. Lagert sich in alkoh. Lsg. in III. um. — β -Acetyl- α -[N-methylanilino]-acrylsäure, $C_{12}H_{13}O_3N$ (III.). Aus denselben Komponenten in A. + Bzl., mit Ä. fällen Nadeln, Sintern bei 58°, dann Zers., in wss. Lsg. sauer. Gibt keine FeCl₃-Rk. — Äthylester, $C_{14}H_{17}O_3N$. Aus III. mit HCl-Gas in A. oder direkt aus Äthoxalylaceton u. Methylanilin in A., mit Ä. fällen. Gelbliche Prismen, F. ungenau, ll. in A., Bzl., Chlf., wl. in Ä. Gibt keine FeCl₃-Rk. — Die positiven u. negativen FeCl₃-Rk. zeigen, daß Formel bezw. die tautomere Enolformel richtig ist u. das NO wahrscheinlich an den N tritt. — Nitrosoäthoxalylacet-[N-methylanilid], $C_{13}H_{14}O_5N_2$. Aus der l. c. als Oxalylacet-[N-methylanilid] beschriebenen Verb. mit Amylnitrit in NaOC₂H₅-Lsg. (Kühlung) über das krystallin. Na-Salz. Nadeln aus A., F. 143°, l. in A., Ä., Bzl., Chlf., Alkali, unl. in W. Gibt in 50%ig. A. mit Mohrschem Salz hellrote Färbung, dann mit W. das komplexe Ferrosalz, $C_{26}H_{26}O_{10}N_4Fe$ (IV.), hellrot, amorph, l. in A., Ä., Bzl., Chlf. Formel IV (Koordinationszahl des Fe = 6) folgt daraus, daß Ferrosalze von anderen den Äthoxalyl




anilin in A., mit Ä. fällen. Gelbliche Prismen, F. ungenau, ll. in A., Bzl., Chlf., wl. in Ä. Gibt keine FeCl₃-Rk. — Die positiven u. negativen FeCl₃-Rk. zeigen, daß Formel bezw. die tautomere Enolformel richtig ist u. das NO wahrscheinlich an den N tritt. — Nitrosoäthoxalylacet-[N-methylanilid], $C_{13}H_{14}O_5N_2$. Aus der l. c. als Oxalylacet-[N-methylanilid] beschriebenen Verb. mit Amylnitrit in NaOC₂H₅-Lsg. (Kühlung) über das krystallin. Na-Salz. Nadeln aus A., F. 143°, l. in A., Ä., Bzl., Chlf., Alkali, unl. in W. Gibt in 50%ig. A. mit Mohrschem Salz hellrote Färbung, dann mit W. das komplexe Ferrosalz, $C_{26}H_{26}O_{10}N_4Fe$ (IV.), hellrot, amorph, l. in A., Ä., Bzl., Chlf. Formel IV (Koordinationszahl des Fe = 6) folgt daraus, daß Ferrosalze von anderen den Äthoxalyl

st enthaltenden Nitroso- β -diketonen analog zusammengesetzt sind. Gewöhnliche Nitroso- β -diketone geben dagegen blaue Ferroate mit Säurenatur, welche auf 3 Moll. organ. Restes 1 Fe enthalten; letzteres befindet sich im Anion, während 1 H verdrängt wird u. als Kation auftritt (z. B. V.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **59**. 1015 bis 1017.)

LINDENBAUM.

William Küster, Hermann Maurer und Albert Palm, Über Derivate des Methyl- α' -acetylbernsteinsäureesters, ein Beitrag zur Aufklärung der Konstitution des Hämatoporphyrins. Für die Auffassung des von KÜSTER u. MAURER (Ztschr. f. physiol. Chem. **133**. 132; C. **1924**. I. 2269) als Abbauprod. des Hämatoporphyrindimethyläthers gehaltenen *Imids* $C_8H_{11}O_3N$ (F. 59°) als eines [α -Oxyäthyl]-maleinsäurederiv. (I.) haben sich weitere Anhaltspunkte ergeben. Für das Verseifungsprod. $C_7H_8O_4$ (F. 175°) von I. nach Formel II. oder III. in Erwägung gezogen worden. Eine isomere Verb. IV. (F. 202°), die aber der [β -Oxyäthyl]-maleinsäurereihe angehört, hat inzwischen KÜSTER (Ztschr. physiol. Ch. **145**. 63; C. **1925**. II. 1518) dargestellt. Diese Verb. wird bei der Verseifung von I. nicht erhalten. Wohl aber entstehen dabei neben der Verb. $C_7H_8O_4$ in kleinen Mengen zwei mit Dampf flüchtige Prodd. Das eine erweist sich durch seinen Geruch als zur disubstituierten Maleinsäurereihe gehörig, das andere schm. bei 152°. Obwohl die Natur dieser Prodd. noch nicht ermittelt werden konnte, kann der Verlauf der Verseifung von I. nun wie folgt gedeutet werden: B. der Methylmethoxyäthylmaleinsäure, Umlagerung zur maleinoiden Itaconsäure u. CH_3 -Abspaltung (Anhydrid I.), Umlagerung dieser zur fumaroiden Itaconsäure (Lacton V.) u. Fumarsäure (Lacton VI.). Der Verb. $C_7H_8O_4$ käme also nicht Formel II. oder III., sondern V. oder VI. zu. Nun ist V. als Verseifungsprod. des α -Methyl- α' -acetylbernsteinsäureesters (II., Enolform) schon lange bekannt. Es schm. ebenfalls bei 175°, gibt aber mit dem Verseifungsprod. von I. starke F.-Depression, addiert nur 1 NH_3 zu einem übrigens auch bei 160° schm. Prod. u. läßt sich nur schwer aufspalten (tertiäres C-Atom). Für das Verseifungsprod. von I. bleibt also nur Formel VI. eines [α -Oxyäthyl]-methylfumarsäurelactons übrig. — VII. liefert mit PCl_5 die Säure VIII., in der das Cl sehr fest sitzt. Sie geht bei der Vakuumdest. in das Anhydrid über, wird aber bei der Dest. unter Atmosph.-Druck teilweise offenbar zur Maleinsäure umgelagert. Denn diese ist mit Dampf flüchtig, weist den bekannten Geruch auf u. gibt an h. $Ba(OH)_2$ -Lsg. das Cl leicht ab unter B. einer sehr wahrscheinlich mit VI. ident. Verb.




Versuche. Lactonsäure $C_7H_8O_4$ (V.). Durch 10-std. Kochen von VII. in dem von ARNDT u. NACHTWEY (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1489; C. **1924**. II. 2020) angegebenen App. u. Verseifen des Rückstands mit sd. verd. HCl. Aus W., F. 175°, ll. A., Ä., Eg., h. W. Wird erst von 2-n. Lauge aufgespalten. — *Methylester*, $C_8H_{10}O_4$. Mit CH_2N_2 . Angenehm riechendes Öl, Kp. 210°. — *Verb.* $C_7H_{11}O_4N$. Mit NH_3 -Gas in $NaOH$, mit Ä. fällen. Nadeln, F. 160°. — α -Methyl- α' -acetylbernsteinsäuremonoäthylester, $C_9H_{14}O_5$. Durch 3-tägiges Schütteln von VII. mit 10%ig. Sodalsg. Nadeln aus W., F. 66—67°. — *Freie Säure*. Durch 10-tägiges Schütteln des vorigen mit 25%ig. $NaOH$. Nadeln aus W., F. 105—108° (wahrscheinlich Isomerengemisch). Gibt keine $FeCl_3$ -Rk. (reine Ketoform). — Man behandelt VII. in Chlf. mit PCl_5 (Zimmertemp., 2–3 h, 50°), dest. im Vakuum bis 70° ab, zerlegt den Rückstand mit W., nimmt in Ä. auf, fraktioniert u. dest. mit Dampf. Der flüchtige Teil ist Säure $C_6H_9O_2Cl$ (vielleicht

α -Methyl- γ -chlor- β , γ -pentensäure), F. 154°, ll. in Ä., swl. in h. W. — Im Rückstand bleibt α , γ -Dimethyl- γ -chloritaconsäure, $C_7H_9O_4Cl$ (VIII.), F. 128°, ll. in h. W., Ä., Ä. Chlf. — Diäthylester, $C_{11}H_{17}O_4Cl$, Kp. 216°, angenehm riechend. — Anhydrid, Kp. 120 bis 125°, Blättchen aus Ä., F. 145°. Geht schon an der Luft wieder in VIII. über. — Verb. $C_7H_{15}O_4N_2Cl$. Mit NH_3 . Nadeln, F. 157°. Spaltet leicht NH_3 ab. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1018—21. Stuttgart, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

E. Biochemie.

Hans Leontjew, Über das spezifische Gewicht des Protoplasmas. I. Aus der Fallgeschwindigkeit der Amöbe Naegleria sp. wurde nach der Stokes'schen Formel ihr spezif. Gewicht zu 1,043 bestimmt. (Biochem. Ztschr. 170. 326—29. Moskau, Institut für Infektionskrankheiten ELIAS METSCHNIKOW.) MEIER.

N. Tarugi, Die Sulfocyanate und die Atmung der Zellen. Nach einer früheren Mitt. des Vf. (Gazz. chim. ital. 32. II. 505; C. 1903. I. 790) über die Van Deensche Rk. bilden die Sulfocyanate mit Oxydationsmitteln Persäuren, die durch Guajakhar- oder Benzidin erkennbar sind, wodurch mit Rücksicht auf die große Diffusion des HSCN in biol. Fl. der forens. Nachweis des Blutes mit dieser Rk. unsicher wird. Aus dem O-Verbrauch der HSCN bei Einw. saurer $KMnO_4$ -Lsg. leitet Vf. die Ansicht ab, daß die Oxydation entsprechend der Gleichung:



verläuft. H_2O_2 bildet, wie bekannt, mit Sulfocyanaten keine Persäuren des S, sondern eine Verb. $(\text{HSCNO})_3$. Dieser Persäure muß die bekannte rote Färbung zugeschrieben werden, die durch Einw. von Oxydationsmitteln u. auch von Ferrisalzen auf Sulfocyanate entsteht, eine Ansicht, die vielfach angezweifelt wurde. Als Beweis für diese Ansicht wird angeführt, daß Fe^{+++} -Salze, die ebenso wie Sulfocyanate für sich mit Benzidin keine Blaufärbung geben, mit diesen gemischt sich gegenüber Benzidin wie H_2O_2 verhalten. Die rote äth. Lsg. der Ferrosulfocyanatverb. gibt entgegen der Ansicht von BONGIOVANNI, der wahrscheinlich unreine Präparate vor sich hatte, mit Ferricyanid nur eine grünliche, dagegen mit Ferricyanid eine blaue Färbung. Die Ferrosulfocyanatverb., $\text{FeHC}_3\text{N}_3\text{S}_3\text{O}_3$, wurde aus im Vakuum dest. HSCN mit sehr reinem frisch gefälltem $\text{Fe}(\text{OH})_3$ durch Extraktion mit Ä. hergestellt; bei längerem Aufbewahren im Vakuum in Ggw. von H_2SO_4 erleidet sie eine teilweise Zers. zu $\text{FeHC}_3\text{N}_3\text{S}_3\text{O}_2$. Beim Kochen der wss. Lsg. von $\text{FeHC}_3\text{N}_3\text{S}_3\text{O}_3$ mit BaCl_2 wird $1/2$ des im Mol. enthaltenen S zu H_2SO_4 oxydiert:



Bei der Rk. zwischen $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$ u. HSCN bildet sich also zunächst die Persäure, dann ihr saures Fe-Salz. Die äth. Lsg. dieser Verb. oder der mit W. aufgenommene Rückstand geben mit Ferrocyanid keine Rk., woraus gleichzeitig hervorgeht, daß die Oxydationsgeschwindigkeit [des in der Verb. enthaltenen freien O sehr gering ist u. ih Fe zweiwertig vorliegt; denn mit Ferrisalzen entsteht eine blaue Färbung, während allerdings das Alloxantinreagens die Rk. der Ferrisalze gibt. Auch mit HNO_3 oder HNO_2 entsteht bei vollkommener Abwesenheit von Fe-Salzen die rote Verb.: Herst. aus KSCN mit Ä. u. konz. HNO_3 unter sorgfältigster Kühlung, da anderenfalls leicht eine Zers. unter B. von gelbem ps-Sulfocyanogen eintritt. Nach Abfiltrieren der gebildeten ps-Verb. erhält man für wenige Min. die äth. Lsg. in gleicher Farbtönung wie die mit Fe-Salzen hergestellte Lsg. Absorptionsspektren, breiter Streifen von D bis F, sind bei den Lsgg. beider Verbb. sowohl der aus Fe als auch der aus HNO_2 vollkommen identisch. Daß andere Elemente der Eisengruppe diese Verb. nicht geben, ist in der Sonderstellung des Fe gegenüber Ni u. Co begründet. Die Persäure ist so zersetzlich, daß sie mit anderen stärkeren Oxydationsmitteln nicht entstehen kann. Die Rk. zwischen Sulfocyanaten u. MoO_3 bei Ggw. von SnCl_2 ist so zu erklären

laß durch SnCl_2 eine Oxydationsstufe des Mo entsteht, die die B. der roten Verb. veranlaßt. V-Salze geben ebenfalls mit Sulfocyanaten eine rote Färbung, ebenso Rhodaninsäure mit Oxydationsmitteln. Ein weiteres Beispiel solcher instabiler Persäuren sind die Fe-Salze von *Thioglykolsäure* u. *Thiomilchsäure*; auch die Blaufärbung von Cystein mit Fe_2Cl_6 ist auf die intermediäre B. von Persäuren zurückzuführen. — Bei der prakt. Ausführung der Van-Deen- u. der Benzidinrk. muß H_2O_2 zuletzt zugegeben werden, da bei umgekehrter Ausführung die Rkk. sehr schwach ausfallen u. schließlich ganz ausbleiben, wenn zwischen der Zugabe der einzelnen Reagentien mehr als 5 Min. vergehen. Eine Beschleunigung der Zers. des *Hämoglobinkomplexes* tritt bei Anwendung von H_2O_2 mit Zusatz von 1% BaCl_2 ein. Das Spektrum des *Oxyhämoglobins* geht dabei sehr schnell in das des *Hämatins* über u. verschwindet ganz bei vollkommener Zers. der Farbstoffgruppen, während gleichzeitig infolge Oxydation des im Globin organ. gebundenen S H_2SO_4 abgeschieden wird. In Erwiderung auf einen Einwand gegen die Konst. des roten Fe-Salzes der Persäure wird in einer Reihe von Beispielen gezeigt, daß in einem Mol. sehr gut nebeneinander in Fe^{++} u. eine oxydierend wirkende Atomgruppe existieren können. — Die Anwendung der Vers.-Ergebnisse gewährt einen Einblick in den Einfluß, den organ. S-Verbb. ermöge ihrer Tendenz zur B. instabiler intermediärer Persäuren auf den Atmungsorgan der Zellen haben. HCN u. ihre Salze wirken hindernd bei bestimmten Oxyationsvorgängen u. ebenso bei der Zellatmung. Diese Wrkg. ist aber nicht auf die B. von HSCN aus HCN mit dem organ. gebundenen S oder durch Zerstörung der SH-Gruppen nach der Gleichung: $\text{HCN} + \text{RSH} + \text{O} = \text{RCNS} + \text{H}_2\text{O}$ zurückzuführen; denn Sulfocyanate üben auch in großen Mengen keine hindernde Einw. bei Oxydationsprozessen aus. Die Bedeutung der HSCN für den Atmungsprozeß liegt in der die Oxydationsvorgänge beschleunigenden Wrkg. der intermediären Persäuren, die sich auch bei Abwesenheit von Eisen bilden können. (Annali Chim. appl. 15. 416—26. 1925. Pisa, Chem. Pharmaz. Inst.) LEHMANN.

W. W. Lepeschkin, *Über die chemische Zusammensetzung der lebenden Materie*. Als lebende Materie werden nur das Protoplasma, Zellkerne u. die Chromatophoren bezeichnet. Untersucht wurden die Plasmodien von *Fuligo varians*. Die Plasmodien enthielten 80—90% W.; die in W. l. Stoffe betrugen ca. 35% des Trockengewichts; der unl. Anteil bestand aus Plastin (nach REINKE) u. 7—14% Lipoiden. Mit W. extrahierte Plasmodien werden in 14 Tagen durch Pepsin-HCl zum großen Teil veraut. Nach den Verss. ist anzunehmen, daß der in W. unl. Anteil des Plasmodiums aus der der Leucocyten hauptsächlich aus Nucleoproteiden (80% des Plastins) besteht, in die sich Lipoide, Lipoproteide, anorgan. Salze u. manchmal auch Polysaccharide anschließen. Der in W. l. Teil setzt sich aus einfacheren organ. Verbb., den Abbauprodukten der Nucleoproteide u. Proteine zusammen. In W. l. Eiweißkörper kommen nur in geringen Mengen vor. Bei dreimaliger, je 48-std. Hydrolyse des Plastins mit 0,1% H_2SO_4 wurde als Hauptprod. *Thymin*, F. 318—322° (Zers.) gefunden, dann *Uracil*, *Xanthin*, *Hypoxanthin*, *Cytosin*, *Arginin*, *Histidin*, *Lysin*, geschlossen wurde auf *Asparagin*- oder *Glutaminsäure*. — Es wird erörtert, daß die Eiweißkörper u. Lipoide, unter denen Proteide oder Proteine bzw. Fette, Phosphatide u. Sterine verstanden werden, im lebenden Protoplasma, in lebenden Kernen u. den pflanzlichen Chromatophoren chem. miteinander verbunden sind. Diese lockeren Verbb. zerfallen schon durch schwache chem. Reagenzien u. mechan. Einw., wodurch das Absterben der Zelle bedingt wird. (Biochem. Ztschr. 171. 126—45. Prag, Pflanzenphysiol. Inst. d. Univ.) LOHMANN.

E₁. Enzymchemie.

Hans Pringsheim, Alexander Genin und Rahel Perewosky, *Über die Trennung der Fermente des Gerstenmalzes*. (Vgl. S. 130.) Die Verss. bezweckten die Darst. von

Lichenase u. *Mannanase*, welche frei von den sie begleitenden Disaccharasen (*Cellobiase*, *Mannobiase*) sind. — Der Vers., diese Trennung durch Altern bei verschiedenen Aciditäten zu erreichen, mißlang; nach 18 Tagen bei $p_H = 3$ u. 4 waren *Mannanase* u. *Cellobiase* unwirksam, während die *Amylase* noch schwach wirksam war; bei $p_H = 6$ u. 7 waren alle Fermente widerstandsfähiger. — Dagegen erwiesen sich Adsorptionsmethoden als brauchbar. Kaolin oder Aluminiumhydroxyd adsorbierte bei $p_H = 8$ aus wss. oder besser aus 20%ig. (oder höher %ig.) alkoh. Lsg. die *Mannobiase* u. einen Teil der *Cellobiase*, während die entsprechenden Polyasen in wirksamer Form in der alkoh. Lsg. blieben. Die von *Mannobiase* befreite *Mannanase* spaltete *Mannan* zur *Mannobiose*, was durch Herst. des entsprechenden Phenylhydrazons nachgewiesen werden konnte. Adsorption der Polyasen bei $p_H = 3$ u. Elution mit Phosphatpuffer ($p_H = 8$) führte nicht zum Ziel. — Die Angaben von EULER (Chemie der Enzyme I. 88, München 1920), daß *Amylase* aus saurer, nicht aber aus neutraler oder alkal. Lsg. an Kaolin adsorbiert wird, konnten im Gegensatz zu den Befunden von LÜERS u. SELLNER (Wchschr. f. Brauerei 42. 97; C. 1925. II. 402) bestätigt werden. Elution gelingt mit Phosphat bei $p_H = 8$; in der Elution findet sich auch *Maltase*. Eine Trennung von *Amylase* u. *Maltase* (Malz der Byk-Guldenwerke) gelingt, wenn man Malzauszug mit Alkohol u. wenig Kaolin behandelt; in der Elution war die *Amylase* frei von *Maltase*. — Da die Lsgg. stets auf $p_H = 5$ gebracht werden müssen, wird eine Tabelle gegeben, aus der die zur „Umstellung“ des Puffers auf dieses p_H nötigen Mengen von anderen Puffern ersichtlich sind. (Biochem. Ztschr. 164. 117—25. 1925. Berlin, Univ.)

HESSE.

A. Samysslow, Über das Schicksal der Invertase im normalen und immunen Organismus. Die neuen Unterss. beruhen auf der früheren Beobachtung (vgl. BART, ENGELHARDT u. SAMYSSLOW, Ztschr. f. physiol. Ch. 160. 261; C. 1925. II. 1876), daß die *Saccharase* nach Adsorption der Proteine an Kaolin oder phosphormolybdän saures NH_4 von diesen Adsorbaten ebenfalls adsorbiert wird, ohne dabei gehemmt zu werden. *Saccharase*, welche n. oder mit Hefeautolysat vorbehandelten Kaninchen injiziert wird, verschwindet aus der Blutbahn. Die Abnahme erfolgt allmählich; die hierfür gefundenen Kurven scheinen darauf hinzuweisen, daß das Ferment dabei adsorbiert wird. Es handelt sich nicht um Adsorption des Fermentes an die Blutkörperchen. Auch kommt eine Zerstörung des Fermentes nicht in Frage, da das Enzym beim Aufbewahren mit Blut keine Einbuße seiner Wirksamkeit erleidet. — Man findet beim n. Tiere 20—30%, beim mit Hefe behandelten Tier 50—60% der eingespritzten *Saccharase* in der Leber. Es scheint im Organismus eine selektive Adsorption des Antigens stattzufinden. (Biochem. Ztschr. 164. 110—16. 1925. Moskau, Staatl. Inst. f. Veterinäre.)

HESSE.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

L. Elion, Über die Bildung von Acetaldehyd und Acetylmethylcarbinol bei der Gärung und der Atmung der Hefe. (Vgl. S. 3245.) Es wird bestätigt, daß bei kräftiger Durchlüftung einer Preßhefessuspension in wss. 10%ig. A. schon nach einer Stunde *Acetaldehyd* (I) nachgewiesen werden kann. Diese B. von I wird durch Zugabe von $FeCl_3$ stark gefördert. — Die von NEUBERG bei der Gärung von Hefe gefundene B. von *Acetylmethylcarbinol* (Acetoin) (II) aus 2 Moll. I hat auch bei ausschließlicher Atmung der Hefe bei Abwesenheit von Zucker in wss. Lsgg. von A. oder I statt. Die Carboligase ist demnach nicht an Acetaldehydmoll. in statu nascendi gebunden. Eine B. von II z. B. aus dem aus A. zunächst synthetisierten Zucker ist wenig wahrscheinlich. Der Nachweis von II erfolgte durch Überführung in Nickeldimethylglyoxim. (Biochem. Ztschr. 171. 40—44. Utrecht, Univ.)

LOHMANN.

Heinrich Zeller, Wirkung von Arzneimitteln und Strahlen auf Hefe. I. Mitt. Versuche über die Grundlage des Arndt-Schulz'schen Gesetzes. Vf. lehnt die Verss. von

ULZ über die Wrkg. verschiedener Gifte auf die Gärtätigkeit der Hefe, die experimentelle Grundlage des Arndt-Schulz'schen Gesetzes, nach dem schwache Reize hemmen, mittlere steigern u. starke hemmen, als fehlerhaft ab. Nach einer Kritik Schulz'schen Methode wird die eigene Methodik, Genauigkeitsgrad $\pm 2\%$, gegeben, die auf der Verdrängung gesätt. NaCl-Lsg. durch die bei der Gärung der gebildete CO_2 beruht. Es wurde Preßhefe u. Rübenzucker verwendet. Unterz. wurden in verschiedenen Konz.-Breiten HgCl_2 , CuSO_4 , As_2O_3 , P (in A.), Jodur, Methylviolett, NaCl, KJ, MgSO_4 , KCl, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, FeCl_3 , BaCl₂, KMnO_4 , KClO_3 , Nalicylat, Na-Formiat, Thyreoidin. Die Temp. variierte z. T. zwischen $20-42^\circ$. In den Verss. des Vf. bewirken im allgemeinen die von SCHULZ verwandten Gifte eine Verminderung der CO_2 -Bildung, die nach einiger Zeit auf u. bei bestimmten Temp. über die Höhe der Kontrollwerte ansteigt. Durch vorangehende Zuckergärung mit Glykogen angereicherte Hefe vergärt zunächst das in der Zelle vorhandene Kohlenhydrat; dadurch wird die Hemmung schneller überwunden, u. es tritt stärkere Erhöhung der CO_2 -Werte auf, die in der Schulz'schen Gruppe jedoch meistens 20% , meist nur 10% beträgt. Abweichend verhalten sich NaCl, KJ, Nalicylat u. P, die besonders bei glykogenreicher Hefe stark steigern, die drei anderen nach anfänglicher Hemmung; ferner Na-Formiat u. Thyreoidin, die z. T. steigern, besonders bei niedrigerer Temp., wo die Hefe noch nicht optimal vergäret. Jod weist eine sofortige Steigerung auf u. bleibt dann unwirksam, BaCl₂ wirkt ausschließlich. — Die mit Röntgenstrahlen bestrahlten Hefesuspensionen zeigen zunächst Hemmung, dann ein über der Norm liegendes, später wieder zurückfallendes Optimum (bei 10 Min. langer Bestrahlung 17%). Die Bestrahlung mit Sonnenlicht ergab bei der bis 20 Min. bestrahlten Hefe eine später ebenfalls zurückfallende Steigerung. Die Schädigung länger bestrahlter Hefe (bis 60 Min.) nimmt mit der Zeit zu. Die zunächst zu erwartende Hemmung kann versuchstechnisch nicht verwertet werden. (Biochem. Ztschr. 171. 45—75. Königsberg, Med. Univ. Klinik.) Lo.

Carl Neuberg und Ernst Simon, Über das Verhalten des p-Xylochinons zu Hefe. Xylochinon (I) wird in gärender Zuckerlsg. (Unterhefe) innerhalb 2 Tagen bei 37° zu Xylohydrochinon (II) red., das zu 90% aus dem Gärprodukt isoliert wurde. Als Oxydationsäquivalent tritt stark vermehrte B. von Acetaldehyd auf. In der Kontrolle durch Kochen abgetöteter Hefe konnte II nur in Spuren nachgewiesen werden. $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2$, aus W. Nadeln, F. 212° , Rückoxydation mit FeCl_3 zu I, F. 125° . — In der Natur wurde nicht gefunden. Eine Aufspaltung des cycl. I bezw. II zu Körpern der Xylochinonreihe, aus denen sie mit chem. Mitteln leicht zu erhalten sind, findet also nicht statt. (Biochem. Ztschr. 171. 256—60. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochem.)

LOHMANN.

E₆. Tierphysiologie.

B. Newham, H. G. Wiltshire und J. W. Scharff, Die Hämoglobinbestimmung. 100 gesetzte Hb-Wert n. gesunder Individuen entspricht 13,77 g Hb in 100 ccm Blut. (Journ. of the roy. army med. corps. 43. 359—65. 1924; Ber. ges. Physiol. 33. 1925. London, Dep. of trop. pathol. Ref. KÜRTEH.) OPPENHEIMER.

A. Mc Ginty und Robert Gesell, Über die chemische Regelung der Atmung. Quantitative Untersuchung über die Anhäufung von Milchsäure im isolierten Hirn bei Anaerobiose und die Rolle der Milchsäure als dauernder Atmungsregler. Die Bedeutung der $[\text{H}^+]$ für die chem. Kontrolle der Atmung durch das Atmungszentrum ist wahrscheinlich. Doch scheint die $[\text{H}^+]$ des arteriellen Blutes nicht der primäre Faktor zu sein, da in vielen Fällen Atmungsintensität u. Säuregrad des arteriellen Blutes nicht parallel gehen. U. a. entsteht z. B. Hyperpnoe bei Anoxämie, während Apnoe bei alkal. als in der Norm ist u. Apnoe bei folgender O_2 -Zufuhr trotz steigender Atmungsintensität des arteriellen Blutes. Vf. nimmt deshalb an, daß die Atmungsregulierung in

dem Säurestoffwechsel des Atmungszentrums selbst zu suchen ist. Als Säure kor hauptsächlich Milchsäure in Betracht. Für die Verss. wurden kleine, nicht betäubte Hunde mit einem T-förmigen Fallbeil getötet, so daß gleichzeitig der Kopf abgetrennt u. in der Mitte geteilt wurde. Eine Hälfte fiel sofort in fl. Luft, die andere wurde nach verschiedenen lange dauernder Anaerobiose bei Körpertemp. u. nach derselben Behandlung auf Milchsäure untersucht. Der Milchsäureruhewert des Hirns betrug im Mittel 0,072%; die Zubildung ist in der Anaerobiose in den ersten 4 Min. pro etwa 0,02% Milchsäure, um dann sehr schnell abzusinken, der maximale Endgehalt ist nach 20 Min. 0,18%; der Gehalt des Blutes im Augenblick der Tötung 0,02%. Bei mit CO vergifteten Tieren (1 Stde. in Luft mit 0,2% CO) war der Milchsäuregehalt sofort nach der Tötung 0,121%; der Endgehalt nach 20 Min. 0,25%. Die Kübelsäure der Milchsäurezubildung hatte etwa denselben Verlauf wie bei den nicht vergifteten Tieren; Milchsäuregehalt des Blutes 0,075%. — Eine Überschlagsrechnung zeigt, daß die Milchsäurezubildung in vitro auch bei mäßigem O₂-Mangel genügt, die Milchsäure so weit zu ändern, daß bei der hohen Empfindlichkeit des Atmungszentrums geringe Änderungen der [H⁺] eine Reaktion des Zentrums hervorgerufen wird. Mit dieser Theorie kann der oben erwähnte Fall zwanglos erklärt werden. (Amer. Journ. Physiol. **75**. 70—83. 1925. Michigan, Dep. of Physiol., Univ.) LOHMANN

Artturi I. Virtanen, *Der Mechanismus der Insulinwirkung*. Hinweis auf frühere Arbeiten u. kurze Zusammenfassung (vgl. VIRTANEN u. KARSTRÖM, S. 1662.) Insulin fördert danach den Zuckerabbau im Organismus, indem es die Synthese von Hexosediphosphat aus Hexose bewirkt. Demgegenüber ist nach BRUGSCH u. HORST (vgl. S. 2376) Insulin zwar auch ein Aktivator der Phosphatase, die Wrkg. soll aber bei der Synthese des Hexosediphosphats aus Milchsäure bei der Resynthese des Glykogens eingreifen. (Biochem. Ztschr. **171**. 76—78. Helsinki, Valio m. b. H.) LOHMANN

T. Kuroda, *Vergleichende Untersuchungen über die Wirkungen des o-, m- u. p-Chlorphenols*. Die antisept. Wrkg. von *m*-Chlorphenol (I) auf das Wachstum von Bakterien ist stärker als die von *p*-Chlorphenol (II) (sterile Konz. etwa 1:2000), schwächer wirkt *o*-Chlorphenol (III). Abtötungsverss. hatten dasselbe Ergebnis. Die letale Dosis ist für Frösche bei Injektion von 1%ig. wss. Lsgg. in den Brustlymphsack bezw. für Kaninchen bei intravenöser Injektion für I 25 bezw. 6,5 mg pro 1 kg Tier, für II 15 bezw. 6,5 mg, für III 40 bezw. 12,0 mg. Die 3 Isomeren lösen sich zu 2% in W. Es wird empfohlen, in der Praxis der Zahnheilkunde nicht das bisher übliche Gemisch von II u. III, sondern, da I schwieriger zu erhalten ist, nur II als Desinfizans zu verwenden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **112**. 60—64. Berlin, Pharm. Inst. d. Univ.) LOHMANN

F. Pharmazie. Desinfektion.

Ernst Iselin, *Emulsionen und ihre Herstellung. Eine kolloidchemische Studie* (Vgl. S. 2935.) Vf. bespricht die für B. von Emulsionen maßgebenden Theorien u. Methoden. Er gibt eine Vorschrift für eine haltbare 50%ig. *Lebertranemulsion* aus palmitinsäurem K, Gummi arabicum u. Gelatine als Emulgatoren an u. tritt dabei ein, daß der Emulsion als Arzneiform wieder mehr Geltung verschafft wird. (Pharm. Acta Helvetica **1**. 81—88. Pharmakolog. Institut. Univ. Basel.) ROJAH

F. Wratschko, *Methoden der technischen Arzneimittelerstellung*. (Fortsetzung von S. 3253.) Vf. bespricht weiterhin die Darst. von reiner Cocainbase, Cocain. hydrochloric., Ekgonin, die Synthese des Cocains aus Ekgonin, Aufarbeitung der ätherunlöslichen Bestandteile des Rohcocains u. gibt Kalkulation. (Pharm. Presse **31**. bis 15.) ROJAH

Ludwig Kroeber, *Studienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakten aus heimischen Arzneipflanzen*. (Vgl. S. 166.) *Extractum florum Lamii albi fluidum* (Taubne)

tenfluidextrakt). Verdrängungsfl. 3 Teile A., 7 Teile W., D.¹⁸ 1,135, Trockenstand 34,10%, Asche 4,7%, sehr hygroskop., in verd. HCl restlos l. Dickfl., dunkelbraun, Geruch leicht arom., an Amine (Secale) erinnernd, Geschmack schwach mat., bitterlich, süßsalzig, später etwas kratzend. Mit W. klare Mischung, mit A. okoladebrauner Nd., der ölig schmierig wird u. sich in W. klar dunkelrotbraun löst. FeCl₃ dunkelolivgrün, mit Gerbsäurelsg. nach einigen Minuten Trübung, dann länger Nd. mit Lugolscher Lsg. zunächst keine Änderung, später leichte Trübung. Mit YERS Reagenz keine Rk. Mit Fehlingscher Lsg. Rk. Mit Bleiacetatlsg. Nd., im Filtrat ruht Bleiessig aufs neue Fällung von hellgelber Farbe. Fluidextrakt aus Blüten enthält kein Saponin, wohl wss. Abkochung (1:100) des ganzen blühenden Krautes. Titer nach ROBERT-BRANDT bestimmt 1:476. Enthält Pflanzenschleim, Stoff, eine invertierbare Zuckerart, ein durch Emulsin spaltbares Glucosid u. onine. Von letzteren enthalten Wurzel, Stengel u. Blätter mehr als die Blüten. trockenem Kraut erhielt H. HENSEL 0,537% dunkel gefärbtes, in der Kälte krystall. Teilchen absonderndes äth. Öl. (Pharm. Zentralhalle 67. 244—46. München, wabing.)

ROJAHN.

M. W. Tapley und **P. M. Giesy**, *Über die Lichtempfindlichkeit von Wismutsub-
onat*. Vff. finden, daß die durch Sonnenlichtbestrahlung eintretende Braunfärbung
t auf Ggw. von Verunreinigungen beruht, sondern für das Subcarbonat charakterist.
(Journ. Amer. Pharm. Assoc. 15. 46—47. Brooklyn, N. Y.)

ROJAHN.

E. Merck, *Phenolphthaleinverbindungen für diagnostische Zwecke (Tetragnoste)*.
Firma E. MERCK, Darmstadt, bringt als Kontrastmittel für Röntgendurchleuch-
ten neben den Na-Salzen des Tetrabrom- u. Tetrajodphenolphthaleins neuerdings
violtetrachlormorphthalein für eine neue Leberfunktionsprüfung in den Handel. Es
leitet sich um ein Deriv. einer chlorierten Phthalsäure, bei dem sich das Halogen
t, wie bei den Tetrahalogenphenolphthaleinen in den Phenolresten befindet. Verbb.
t Art erhalten den Gruppennamen Tetragnoste. Im Handel sind Brom-Jod- u.
f-Tetragnost. (Apoth.-Ztg. 41. 249.)

ROJAHN.

C. A. Rojahn und **F. Struffmann**, *Flüssige Haut*. Erwies sich als offizinelles
odium, dem einige Tropfen Arnikatinktur zugesetzt war. (Apoth.-Ztg. 41. 248—49.
nschweig, Techn. Hochschule.)

ROJAHN.

P. W. Danckwortt, *Chemische Untersuchung des Arzneimittels „heiße Brunst“*.
Präparat „heiße Brunst“ (Herst. Pharmazium, G. m. b. H., Berlin) soll bestehen
Fung. cerv., Cort. Muir., Cort. Yohimb., Pulv. herb. arom. ää. 10,0, Testoval 1,0.
nters. ergab, daß das Mittel nur Spuren Yohimbin enthält, das Mittel entspricht
lb nicht den Angaben der Herst. (Dtsch. tierärztl. Wchschr. 34. 214. Hannover,
rztl. Hochschule.)

FRANK.

—, *Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften*. *Adrenochrom* (Apotheke
aboratorium für Organopräparate in Eidelstedt-Hamburg), *Lipochrom*
lebenniere. Bei Gicht, Asthma, Ekzem u. Akne. — *Calcophan-Dragees* (R. ZANDER,
mazeut. Produkte, Dresden-Neustadt 6), für Erwachsene, angeblich eine
iologisch abgestimmte Vereinigung von Calc. glycerinophosph., Calc. lactic., u.
citric. mit 0,5 g Ca. Zur perlingualen Kalk- u. Phosphorthherapie, bei Rachitis
rofulose. — *Dormalgine* (J. D. RIEDEL A.-G., Berlin-Britz), Butylbrompropenyl-
ureiddimethylamidophenyl dimethylpyrazolon. Bei Erkrankungen des Nerven-
ms (Neuralgien, Migräne usw.), chirurgischen Erkrankungen, in der Gynäkologie
neren Medizin (Muskel- u. Gelenkrheumatismus, Magen-Darmkrämpfen, Nieren-
toliken usw.). Tabletten, Zäpfchen, Ampullen. — *Exopon* (G. RICHTER, Buda-
Gemeenge sämtlicher Opiumalkaloide mit angeblich 50% Morphin. — *Ferrotyl*
rileg. Berg-Apotheke, Fabrik pharmazeut. Präparate, Königsberg i. Pr.,
Markt), ist eine Fe u. As enthaltende Fl. Im Handel ist ferner Lecithin-Ferrotyl.

Gegen Chlorose u. Anämie. — *Incalven*, Helfenberg's Calciuminjektion (Chemische Fabrik Helfenberg A.-G., Helfenberg b. Dresden), besteht aus ein 20%ig. Lsg. von mannitschwefelsaurem Kal. Ampullen zu 10 ccm. Zur intravenösen Calciumtherapie, als Antalgetikum, fernwirkendes Adstringens, Antiphlogistikum, Antispasmodikum. — *Iriphan* (Dr. ERNST LAVES, Hannover), Sr-Verder Phenyleinchoninsäure in Tablettenform. Schmerzstillend u. antiphlogistisch wirkend. In der Gichttherapie, gegen Ischias u. Ikterus. — *Jecokoniol* (Chemosani FRITZ-PETZOLDT-Union, Wien III, Köblgasse 10), Lebertranemulsion, deren Teilchengröße kleiner als 1μ ist. Unempfindlich gegen Säuren, Salze u. Hitze, sterilisierbar, leicht resorbierbar. — *Leucagin* (Laboratoires TORAUDE, Paris), 1. Stäbchen mit 1—10 Mikrogr. RaBr_2 , 2. Leucaginovolis mit je 1,5 g Extr. fol. Jugland ana 0,001 organ. Ag-Verb. u. Harnsäure, sowie 0,5 Mikrogr. RaBr_2 . — *Lysasthmin* (G. RICHTER, Budapest), enthält je Ampulle 0,1 g Hypophysis pars post. u. 0,0005 g Adrenalin. — *Otti-Wurmtabletten* für Erwachsene (Chemische Fabrik JOH. FRITZ NEUHAUS A.-G., Ottweiler [Saar]), Mischung von je 10% Naphthalinsulfodimethylbenzol Phenolphthalein, 20% Arekanuß, Kakao u. Zucker ana ad 100 g. Tabletten zu 0,5 g. Gegen Spul- u. Madenwürmer. — *Rethargin* (Laboratoires TORAUDE, Paris), 1. Urethralstäbchen für Männer, 15 cm lang, mit 0,3 g organ. Ag-Verb. (20% A) u. 0,1 g Harnsäure neben RaBr_2 , 2. Stäbchen für Frauen, 6 cm lang mit den gleichen Stoffen 0,1:0,05 g. — *Rheumatophin-Tabletten* (Pharmazeut. Fabrik v/h. BRUNNEN & CADES u. STHEEMANN, Meppel, Amsterdam, Dordrecht), enthalten je 0,5 g Phenylchinolincarbonsäure. — *Scharlach-Heilserum* „Behringwerke“ (Behringwerke, Marburg a. d. Lahn), ein mit Dick- u. Dochezstämmen hergestelltes antitoxisches baktericides Heilserum. — *Securitramidampullen* (G. RICHTER, Budapest), in 1 ccm die Bestandteile von 1 g Secale cornut. u. 0,1 g Hypophysis pars post. enthaltend. — *Silacid* (Dr. ERNST LAVES, Hannover), 0,2%ig. kolloidale Lsg. von SiO_2 . Soll sich dispergieren u. jahrelang haltbar sein. Zur intramuskulären Einspritzung bei Gelenkerkrankungen, Furunkulose, Ekzemen, lokaler Tuberkulose usw. in der unspezifischen Reiztherapie. — *Triapan* (G. RICHTER, Budapest), Ampullen mit je 0,002 g Methylarsen-Strychnin u. 0,01 g Monomethylarsen-Yohimbin. — *Uvajun* (Hochschul-Apotheke, Berlin NW 6), laut Angabe ein aromatisiertes Fluidextrakt a. Fol. Uvae ursi u. Fruct. Juniperi. Bei Blasenleiden. — *Adenagon* (Chupha G. b. H., Chemisch-pharmazeut. Laborat., München 23), neue Bezeichnung für Alys Chupha. — *Biosalin* (Luzernawerk, Fabrik chemisch-pharmazeut. Präparate Kronach [Oberfr.]), laut Angabe: Natr. silicic. puriss. sub. plv. u. Calc. biphosphoricum in getrennt hergestellten Granulaten, außerdem Zusätze von Calc. lactic., Ferr. glycerinophosphoric., Kakao u. Zucker. Tabletten zu 0,25 g. Als unterstützendes Mittel bei Tuberkulose, gegen Störungen des Mineralstoffwechsels, bei Neurasthenie, Hysterie usw. — *Caroval-Tabletten* (Apotheker WILH. BÖHMER, Duisburg, Königsstraße 52), enthalten Castoreum u. Baldrianextrakt. Beruhigungsmittel bei Neurasthenie, Hysterie usw. — *Endermina* ist ein Ichthyolpräparat in Tuben. Gegen Frorenen u. Hautkrankheiten. — *Eudolith* (Apotheker WILH. BÖHMER, Duisburg, Königsstr. 52), nach Angabe Menthol, Chlf., Acetyläthyläther, A. Analgetikum gegen neuralgischen Schmerzen. — *Givasan-Zahnpasta* (J. D. RIEDEL A.-G., Chem. Fabrik Berlin-Britz), enthält Hexamethylentetramin. Kosmetikum bei Stomatiden, gegen gerötetes u. geschwollenes Zahnfleisch. — *Insulin* „Degewop“ („Degewop“, Deutsche Gesellschaft wissenschaftlicher Organpräparate A.-G., Berlin S. 59, Cantharusstr. 26), neuer Name für das früher Insulin „Tetewop“ genannte Präparat. — *Remediol*, ichthyolsulfosaures Ammonium für medicin. Zwecke. — *Remediolflynn*, nach Unters. wss. Lsg. von ichthyolsulfosaurem Ammonium. Gegen Räude u. Stalldesinfektion. — *Remediol-Scheidenzäpfchen*, aus Fett mit ichthyolsulfosaurem Ammon. Gegen Scheidenkatarrh der Rinder. — *Semori*, Tabletten, enthalten

abe in 100 g Masse: 0,5 g Orthooxybenzopyridinsulfat, 1 g Borsäure u. CO₂-Schaumende Basis. Zur Desinfektion des Vaginalraumes, Antikonzipiens. (Pharm. Zentralbl. 67. 264—65. 281—83.)

ROJAHN.

C. Griebel, *Ergebnisse der Untersuchung von Heilmitteln und Geheimmitteln, koschen und ähnlichen Mitteln*. 14. Fortsetzung von S. 2122. Besprochen werden: *tin-Wundsalbe* (ZnO, Wollfett, Vaseline, Lebertran), *Wokhi* (Emulsion aus Terinöl, Ei, Essigsäure u. W. mit etwas Campher u. Wintergrünöl) gegen Gliedererzen, auch als Massagemittel, *Persia-Salbe* gegen Flechten (Birkenteer, S u. ZnO), *R. Schiffmanns Asthmador-Cigaretten* (Stechapfelblätter mit HNO₃ neben wenig adonna), *Althaus Hustentropfen* (Fl. aus A., Anisöl, NH₃ mit 2,75% NH₄Cl), eine re Probe war ein Destillat verschiedener Drogen mit 4,78% NH₄Cl, *American Restorer* (jetzt nur parfümierte, ammoniakal. Ag-Lsg. mit 1,2—2,97% AgNO₃), *ensteinmittel „Bonowella“* (Abkochung verschiedener Pflanzen mit Salicylsäure ar gemacht, dazu Flasche mit Ricinusöl), *Tulsa Lichtschutz- u. Sommersprossenre* (wachsartige Stoffe, Wollfett, Paraffinöl, Chininsulfat, ZnO, Borsäure), *Groessers uktionspillen „Hegro“* (verschiedene Abführmittel), *Apotheker Noldens Stomanol* . nach Angabe), *Nervanol* (dgl.), *Hico-Tee* (Gemisch von Pflanzenteilen), *Plum Rheuma-Seife* (Kaliseife mit 20% Paraffin, 9% Salicylsäure, äther. Ölen), *mersprossenmittel von Frau Brandenburg Loessin* (15% Salicylsäure in A.), *Pin märkisches Kiefern wurzelöl* (Kienöl), *Bioson*, *Eiweiß-Eisen-Lecithin* (Casein, 10 1,88% Lecithin, NaHCO₃, organ. Fe-Verb., Kartoffelstärke), *Epilepsiemittel Frau F. Dicke-Mahler* (Fett, Naphthalin, Pflanzenpulver aus Stengeln einer misiaart), *Radwehjo* zur Erleichterung des Geburtsaktes (homöopath. Verreibungen), *ypin Migräneäther* (Lsg. von Menthol in einer der Eau de Cologne ähnlichen Fl.), *wil*, *Apotheker Wagners Nerventropfen* (Destillat aus Baldrianwurzel mit wenig *Waldflora III gegen Blasenleiden* (Heublumen), *Po-Ho-Fluid* (fl. Anteil des japan. erminzöles), *Trecisin I gegen Gonorrhöe* (Gallotannid, Gallussäure, vielleicht atrindenauszug, Suprarenin u. vielleicht β-Eucain), *Apotheker Max Wagners tungsstur* (Tamarindenmus), *„Nessib“ Kamillen-Extrakt zur Blonderhaltung des es*, *Sanhelios gegen Gallensteine* (homöopath. Verdünnungen), *Eusteril-Tabletten* sthesin, phenolsulfonsaures Na, Weinsäure, Borsäure, NaHCO₃, Bolus), *Askaril- etten* (phenolsulfosaures Na, Anästhesin, NaHCO₃, weinsaures Salz, KH-Tartrat, s), *Anti-Luesan* (Tabletten je 0,006 g K₂Cr₂O₇, daneben NaHCO₃, Weinsäure, m), *Ruilos Tabletten Alli sativi* (Knoblauchsaff, Milhzucker, Kartoffelstärke, m), *Prosanit* (Knoblauchsaff mit Glycerin), *Ruhrheil gegen Kälberruhr* (geröstetes mahlenes Getreide, besonders Roggen), *Baldrianwein* (Süßwein mit Baldrianur), *L'Oréal Henné* (neuerdings frei von Cu), *Heilerde Luvos* (frei von radioakt. en!), *Räudiol* gegen Räude (CuSO₄, ZnSO₄, Holzessig), *Embrocation* (anscheinend NH₄)₂CO₃, CaCl₂, NaCl, W., NH₃ u. denaturiertem Spiritus hergestellt, *Okas- etten*, Sexualkräftigungsmittel (gemäß Angabe), *Erdheil* (Bolos), *Geos sex* (Bolos, o, Zucker), *Erdheilsalz Geosal* (konz. Lsg. verschiedener Chloride, auch Bor-), *Dr. A. Bachmanns Humidon* gegen Hämorrhoiden (Vaselin, Anästhesin, Der- l, ZnO, Menthol), *Lungenheil* (guajakolsulfosaures K u. Zimtsäure), *Sanoxygen* Uranin gefärbte dünne Lsg. von CaSO₄ u. NaCl), der *medizinische Brunnen ovit*“ (mit Fluorescein gefärbte Lsg. von CaCl₂ u. NaCl). *Nervosin* u. *Salvito* n heute gemäß Angaben hergestellt. (Ztschr. f. Unters. d. Lebensmittel 51. 147 53. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Untersuchungsanstalt.)

GROSZFIELD.

V. P. H. van den Driessen Mareeuw, *Einige kurze Mitteilungen*. Angabe von l. Herstellungsvorschriften von *Ichthyol-Resorcin-Salbe* u. *salzsaurer Pepsinlsg.* — *Aussatzung von Alkaloidsalzen* durch Alkalihalogenide wird durch Zusatz der gg. bei > 10° vermieden. — *Einfache Sterilisierungen* durch Erhitzen in wasser-

freiem Glycerin werden beschrieben. — Der *Zuckernachweis* nach FISCHER mit Phenylhydrazin ist noch bei 0,003% positiv u. daher für *Urin* zu empfindlich. — *Kalmyrin* von GEDEON RICHTER, Budapest, aus Acetylsalicylsäure u. CaCO_3 dargestellt $(\text{CH}_3\text{CO}\cdot\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{COO})_2\cdot\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O}$, war ll. in W. u. trotz einigen Alters (vgl. SCHÖÖR) Pharm. Weekblad 62. 1166; C. 1926. I. 723) noch nicht zers. (Pharm. Weekblad 63. 526—31.)

GROSZFELD

A. Ulbrich, *Linimenta*. (*Wünsche zum Deutschen Arzneibuch*.) Vf. schlägt für das neue Arzneibuch für die Linimente folgende Vorschriften vor: *Linimentum ammoniacum*. Erdnußöl 800 g, gereinigte Ölsäure 40 g, Ammoniakfl. 200 g. *Linimentum camphoratum*. Campher 60 g, Ölsäure 40 g, Erdnußöl 740 g, Ammoniakfl. 200 g. *Linimentum Calcariae*. Adeps Lanae anhydr. 10 g, Oleum Lini 100 g, Aqua Calcariae 100 g. Schütteln bis zur Erkaltung, oder: Cera flav. 1,5 g, Ol. Lini 100 g, Aq. Calcar. 100 g. Schmelzen u. schütteln bis zur Erkaltung. (Pharm. Ztg. 70. 1559—60. 1925. Ascherleben.)

ROJAHN.

E. Merck (Erfinder: **Karl Roth**), Darmstadt, *Darstellung komplexer Silbersalze*. dad. gek., daß man die wl. oder teilweise unl. gallensauren Ag-Salze mit Alkalisalzen der HCN in Lsg. bringt u. diese Lsgg. entweder mit A. oder ähnlichen Fällungsmitteln ausfällt oder auf dem Wasserbade zur Trockne bringt. — Die in W. farblos l., weiß bis gelblichweißen Prodd. erzeugen auf Wäsche keine Flecke, besitzen gegenüber anderen Alkali-Ag-Cyaniden ein stärkeres Desinfektionsvermögen, wirken außerdem zellöser u. sind weniger schmerzhaft, als die bisher bekannten Ag-Verbb. Man behandelt z. l. wss. Suspensionen von *cholalsäurem Ag*, bzw. *cholsäurem Ag*, bzw. *glykocholsäurem Ag*, bzw. *taurocholsäurem Ag*, bzw. *choleinsäurem Ag*, bzw. *desoxycholsäurem Ag* b. zur vollständigen Lsg. mit KCN, NaCN oder NH_4CN , filtriert u. dampft die Lsg. auf dem Wasserbade oder im Vakuum zur Trockne ein oder fällt sie mit A. aus. (D. R. 1 423 231 Kl. 12o vom 17/6. 1923, ausg. 22/12. 1925.)

SCHÖTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. **E. Schering**), Berlin (Erfinder: **Walter Schoeller**, Berlin-Westend, und **Ralph Dirksen**, Charlottenburg), *Darstellung von kombinierten Metallgelatosen*, dad. gek., daß man Gelatosen mit Ag-Verbb. u. Verbb. anderer chemotherapeut. wirksamer Metalle behandelt. — Z. B. wird eine wss., mit NaOH schwach alkal. gemachte *Gelatoselsg.* mit konz. wss. Lsgg. von AgNO_3 u. ZnSO_4 versetzt u. das Reaktionsgemisch im Vakuum zur Trockne eingedampft. Die *Ag-Zn-Gelatose*, gelblich weißes, in W. mit neutraler Rk. l. Pulver, enthält 5% Ag u. 5% Zn. Analog lassen sich aus *Gelatose*, AgNO_3 u. CuSO_4 eine *Ag-Cu-Gelatose*, grünes Pulver — aus *Gelatose*, AgNO_3 u. $\text{Cd(NO}_3)_2$ eine *Ag-Cd-Gelatose*, hellgelbes Pulver —, aus *Gelatose*, AgNO_3 u. Hg-Acetat eine *Ag-Hg-Gelatose*, hellgelbes Pulver —, u. aus *Gelatose*, AgNO_3 u. NiSO_4 eine *Ag-Ni-Gelatose* gewinnen, die sämtlich in W. mit neutraler Rk. l. sind u. neben 5% Ag 5% des bzgl. anderen Schwermetalles enthalten. Das Ag u. d. anderen Metalle sind an denselben Gelatosekern gebunden. Gegenüber einer einfachen Metallgelatose haben die kombinierten Metallgelatosen nicht nur eine erhöhte therapeut. Wrkg., sondern lösen auch geringere Nebenerscheinungen aus. So ist z. B. in einer *Ag-Zn-Gelatose* die dem Ag eigentümliche Reizwrkg. wesentlich gemildert. (D. R. 1 423 080 Kl. 12p vom 2/4. 1924, ausg. 21/12. 1925.)

SCHÖTLÄNDER.

Domenic Percival Contieni, Gobarralong, Neu Süd-Wales, Australien, *Linimentum* bestand aus CH_3OH , J-Tinktur, Cantharidentinktur, Eucalyptusöl u. Bayrum. Das Mittel findet zu Einreibungen bei Rheumatismus, Ischias, Entzündungen u. ähnlichen Krankheiten Verwendung. (Aust. P. 20 443 vom 7/11. 1924, ausg. 19/11. 1925.)

SCHÖTLÄNDER.

The Oakland Chemical Co., übert. von: **George Mc Graw**, New York, V. St. A. *Kosmetisches Mittel*, bestehend aus einem Gemisch von H_2O_2 u. Pflanzenmehl. — M.

hrt z. B. eine wss. Lsg. von reinem H_2O_2 mit Gerstenmehl zu einer Paste. Diese zur Reinigung u. Bleichung der Haut auf diese aufgetragen, wobei O_2 frei wird. dem Trocknen wird das Mehl durch w. W. entfernt. (A. P. 1 576 774 vom 20/8. ausg. 16/3. 1926.)

SCHOTTLÄNDER.

Wilfred Ernest Billingham, Lee, Kent, England, *Herstellung eines Emulgiermittels*. Reines Protein oder Handelsprotein mit einem Gehalt von wenigstens an reinem Protein wird mit der mehrfachen Gewichtsmenge W. vermischt, worauf auf diese Mischung KOH oder NaOH bei etwa 140° einwirken läßt, derart, daß eine Spaltung des Proteins eintritt, aber keine wesentliche Verseifung der enthaltenen Amidfettsäuren stattfindet. (Austr. P. 20 327 vom 31/10. 1924, ausg. 1925.)

OELKER.

Ernest Richard Knight, Brisbane, Australien, *Mittel gegen Schweißfuß*, besteht aus Tannin, H_3BO_3 u. gepulvertem Talk. — Die Anwendung des Pulvers ist bliche. (Aust. P. 20 211 vom 29/9. 1924, ausg. 23/7. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Iaco-Gesellschaft A.-G. Bern, Gümlingen b. Bern, Schweiz, *Darstellung von Eiweißverbindungen*. Zu dem Ref. nach Schwz. P. 108 161; C. 1925. II. ist nachzutragen, daß außer *Morphin* auch andere Alkaloide mit *Eiweißstoffen*, *Lactasein*, *Hefe-eiweiß*, *Blutalbumin*, sowie mit *Nucleinen*, wie *Hefe*, oder *Nuclein* beständige, in W. unl., therapeut. verwendbare Verbb. liefern. Die Herst. hierbei ebenfalls durch kurzes Erwärmen des betreffenden Alkaloidsalzes mit Eiweißstoff in wss. Suspension auf $60-80^\circ$ u. Auskoagulieren der bzgl. Verbb. Einleiten von Dampf. Beispiele sind angegeben für die Herst. der Verbb. aus: *Morphin* u. *Hefe*, kräftig gelbes Pulver von angenehm bitterem Geschmack, — *Coffein* u. *Blutalbumin*, gelbbraunes Pulver, — sowie *Chinin* u. *entbitterter Hefe*, weißgraues Pulver. (E. P. 245 838 vom 14/10. 1924, ausg. 11/2. 1926. F. P. 595 407 vom 18/10. 1924, ausg. 2/10. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Hahnel, Leipzig, *Desinfektions- und Entwesungsmittel*. Schwefel, Paroform, Salp. u. HNO_3 werden, unter Zusatz nicht brennbarer Körper gemischt u. geformt. Gebrauch wird die M. entzündet. (E. P. 247 618 vom 23/9. 1924, ausg. 18/3. 1925.)

KÜHLING.

G. Analyse. Laboratorium.

Alexander Soós, *Über eine neue Methode zur Bestimmung der Teilchengröße in Kolloid-Lösungen*. Für den Halbmesser r eines kugelförmigen Kolloidteilchens leitet man den Ausdruck $r = 3ch/4s$ ab, worin c die Konz., s die D. u. h die „elementare Schichtdicke“ bedeuten. Unter letzterer wird die Dicke verstanden, bei welcher die Kolloidteilchen eine Ebene vollständig, aber überall nur einmal bedecken. Um sie zu bestimmen, leitet Vf. das „Gesetz der gemischten Wirkungen“ ab, worauf dann die elementare Best. von h gegründet wird. (Kolloid-Ztschr. 38. 300—06. Budapest 1924.)

ULMANN.

H. Humphry, *Eine Methode zur schnellen Bestimmung der Kataphorese*. Der beschriebene App. besteht aus einem Glasgefäß mit einer farblosen, nicht leitenden Fl., z. B. Paraffin, Toluol, Bzl. usw., die bei einigen Verss. das Dispersionsmittel ist. In dieselbe tauchen zwei Al-Elektroden von je $\frac{1}{2}$ qcm Fläche. Aus einer Elektrode fließt die zu untersuchende kolloide Lsg. in den Raum zwischen den Elektroden; nach Einschaltung des Stromes (200 V) ist ein deutliches Absinken des Stromes zu beobachten. — Unters. von *Ni-Sol* ergab sowohl positiv wie negativ geladene Teilchen, in diesem Fall teilt sich der Strahl fächerförmig; *Ag-Sol* zeigte negative Ladung. (Kolloid-Ztschr. 38. 306—07. London, Sir John Cass Inst. f. Techn.)

ULM.

D. Haigh, *Apparat zur Bestimmung der Extinktionskoeffizienten optischer Strahlen des sichtbaren Spektrums*. Die Messung erfolgt mittels Verwendung

einer photoelektr. Zelle u. von verstellbaren Absorptionskeilen. (Journ. Scient. Instruments **3**. 211—14.) BÖTTGER.

G. Bruhat und **M. Pauthenier**, *Apparat zur genauen Bestimmung der Orientierung einer geradlinigen Schwingung im Ultraviolett.* (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 888—90.) ENSZLIN.

H. Bienfait, *Ein Deflexionspotentiometer.* Es werden einige Verbesserungen dem von GOODE (vgl. S. 731) angegebenen Potentiometer beschrieben, durch welche es gelingt, das Arbeiten mit Teleskop u. Skala zu vermeiden. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **45**. 166—68. Amsterdam, Univ.) ENSZLIN.

E. Zintl, *Potentiometrische Einstellung von Titantrichloridlösungen.* Bemerkung zur Arbeit von Kolthoff, Tomicek und Robinson. Erwiderung an KOLTHOFF u. Mitarbeiter (S. 1857) u. Aufrechterhaltung des Standpunkts, daß sich CuSO_4 zur potentiometrischen Einstellung von TiCl_3 -Lsgg. sowohl wegen der raschen Einstellung des Endpotentials als auch wegen der Genauigkeit der erhaltenen Werte besonders eignet, wenn nur auf die absol. Fernhaltung von O_2 gesehen wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **152**. 35—38. München, Bayr. Akad. d. Wissensch.) ENSZLIN.

E. Ott, *Neue gasanalytische Apparate.* Genaue Beschreibung der vom Vf. zusammengestellten u. benutzten geschlossenen Apparaturen für exakte u. techn. Gasanalyse, bestehend aus der Bürette nebst Kompensationsrohr nach DREHSCHMIDT, HABER-ALLNER, der Doppelpipette des Vf.s, der Czako-Orsatform mit Ablaufhähnen u. Göckelaufsatz zur Fernhaltung der Luftfeuchtigkeit, Quarzröhrchen bzw. Quarzcapillare nebst Heizvorr. nach UBBELOHDE-CZAKO, der Verbrennungsvorr. nach HOFESÄSZ, der Czakopipette u. den Karlsruher Dreiweghähnen als Umschaltstücke. Ergebnisse der Verss. mit Gemischen von Luft mit O_2 , mit N_2 , mit H_2 , mit CO , mit CH_4 u. mit O_2 u. N_2 u. mit H_2 , CO , CH_4 . Arbeitsweise nach DERINGER, Rechenbeispiele für Steinkohlen- u. Wassergas, Analyse von synthet. Leuchtgas u. von natürlichen Gasgemischen. Vergleich der exakten u. techn. Methoden an Hand der damit erhaltenen Ergebnisse. Lieferer der Gesamtapparaturen u. von Einzelteilen: Dr. HEINRICH GÖCKEL, Berlin NW. 6, Luisenstr. 21. (Gas- u. Wasserfach **69**. 289—95. Zürich.) WEINSTEIN.

Ralph W. Wilton, Washington, *Schützer für Laboratoriumsbrenner*, bestehend aus einem das Brennerrohr umschließenden Behälter, der eine das Rohr umfassende Nabe aufweist. (A. P. 1 569 903 vom 24/10. 1922, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

Hanns Stammreich, Charlottenburg, und **Leo Baum**, Efringen b. Lörrach i. Bad., *Selbsttätige Registrierung der Senkgeschwindigkeit suspendierter oder emulgierter Teilchen*, dad. gek., daß der Trennungsstrich zwischen klarer u. trüber Flüssigkeit auf bewegtes, lichtempfindliches Material kopiert wird u. sich dort als Kurve bestehend aus Punkten oder kurze Stücke der Senkungskurve abbildet. (D. R. P. 426 073 Kl. 21 vom 2/7. 1925, ausg. 4/3. 1926.) KAUSCH.

Ados G. m. b. H. und **Karl Hensen**, Aachen, *Einrichtung zum selbsttätigen Öffnen und Schließen einer Gas-, Dampf- oder Luftleitung nach Maßgabe der in einer zweiten Leitung auftretenden Druckschwankungen.* Das Neue besteht darin, daß die erste Leitung ein eine zweischenklige Sperrflüssigkeitssäule enthaltendes Gefäß eingeschaltet ist, das von einem eine zweischenklige Flüssigkeitssäule enthaltenden Gefäß an die zweite Leitung angeschlossen u. infolge Steigens oder Fallens der Flüssigkeitssäule in einem der Schenkel sich drehenden Stellgefäß gedreht wird, so daß der Durchfluß des Gases freigegeben oder gesperrt wird. Die Einrichtung soll insbesondere bei Gasuntersuchungsapp. Verwendung finden. (D. R. P. 426 072 Kl. 421 vom 5/8. 1924, ausg. 1/3. 1926.) KAUSCH.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

Salt Production Syndicate Ltd., Sydney, Neu-Südwalles, übert. von: **Demetrius George Zalocostas**, *Extraktion von Salzen aus wässerigen Lösungen*. (Aust. P. 17 266 vom 10/4. 1924, ausg. 23/7. 1925. — C. 1926. I. 1245.) KAUSCH.

G. Hay, London, *Bituminöse Emulsionen*. Zur Herst. der Emulsionen nach den E. PP. 202021 u. 202235 beschriebenen Verff. (C. 1924. I. 261) wird eine Kolloid-hle verwendet. — Die Menge des zur Verwendung kommenden Emulgierungsmittels in infolgedessen verringert werden. (E. P. 238 967 vom 31/5. 1924, ausg. 18/9. 1925.) OELKER.

Aktieselskapet Krystal, Oslo, *Suspensionsgefäß*. Das Gefäß ist derartig ge-tet, daß eine Materialschiicht über einem durchlochtem Boden in einer Fl. in Sus-sion gehalten wird, die durch Öffnungen dieses Bodens strömt. Es muß durch den len mindestens ein Vertikalschnitt gelegt werden können, der mehr als zwei Öff-nungen aufweist u. das Querschnittsverhältnis S/F ist kleiner als

$$\frac{1}{5 - \frac{\beta}{\gamma} + \frac{\alpha - 3}{7}}.$$

= Querschnitt einer Öffnung mit kreisförmigem Querschnitt u. gut abgerundeten ten, die denselben Durchströmungswiderstand hat wie die Öffnungen des Bodens, = der größte Querschnitt des Suspensionsraumes senkrecht zur Strömungsrichtung, = durchschnittliche Breite, γ = durchschnittliche Länge der Öffnungsquerschnitte, = Querschnitt, wo die Öffnungen den kleinsten Querschnitt haben u. α = mittlerer Ab-stand zwischen den Öffnungen von Längsachse zu Längsachse, gemessen in Zenti-ern. (Oe. P. 102 937 vom 5/7. 1924, ausg. 25/3. 1926. N. Prior. 17/7. 1923.) KA.

E. Merck, Darmstadt, *Trennung von Flüssigkeitsgemischen*. Man dest. die ssigkeitsgemische (z. B. wss. A.) unter Zusatz einer weiteren Fl. (z. B. Bzl.), die dem ursprünglichen Gemisch ein azeotrop. System bildet, u. unter Überdruck. (W. P. 113 728 vom 23/3. 1925, ausg. 1/2. 1926. D. Prior. 8/12. 1924.) KAUSCH.

Pacific R. & H. Chemical Corporation, El Monte, Californien, übert. von: **Arthur Jay Brown**, Niagara Falls, N. Y., *Gewinnung von Reaktionsgasen*. Man wendet einen App. (Behälter) mit Vorr. zur kontinuierlichen Zuführung von ktionslsg. u. zum Sammeln der entwickelten Gase. In dem App. können kon-terlich die Reaktionsgeschwindigkeiten u. die Temp. beim Aufeinanderwirken fl., festen oder gasförmigen Stoffe kontrolliert werden. (A. P. 1 569 171 vom . 1925, ausg. 12/1. 1926.) KAUSCH.

Société Anonyme le Carbone, Levallois-Perret, Frankreich, übert. von: **René enheim**, Levallois-Perret, *Schützen von Gasabsorptionsstoffen vor dem Durchdringen-en durch Flüssigkeit*. (A. P. 1 574 844 vom 26/4. 1923, ausg. 2/3. 1926. — C. 1924. 95.) KAUSCH.

Research Corporation, übert. von: **Harry A. Wintermute**, New York, *Ab-dung leichter in Gasen suspendierter Stoffe*. Die Gase werden in Form eines Stromes h einen Kanal geleitet u. dabei einem elektr. Felde ausgesetzt. Die Geschwindigkeit Gasstromes wird so gewählt, daß die abgeschiedenen Stoffe sich zu MM. zusammen-n. (A. P. 1 579 462 vom 11/2. 1925, ausg. 6/4. 1925.) KAUSCH.

Charles Collard, Saint-Denis des Murs (Haute-Vienne, Frankreich), *Konzentrations-rat*. Der App. enthält eine in mehrere miteinander durch ein Thermosiphon undene Abteile geteilte Kammer. (Schwz. P. 113 727 vom 14/1. 1925, ausg. 1926. F. Prior. 14/1. 1924. E. P. 227 843 vom 14/1. 1925, Auszug veröff. 18/3. . Prior. 14/1. 1924.) KAUSCH.

George G. Oberfell, Tulsa, Oklahoma, *Kontrollierung der Arbeit von Lösungsmittelwiedergewinnungsanlagen*. Man bestimmt den Dampfdruck fl. Mischungen dad., daß man ein bestimmtes Vol. Luft mit der fl. Mischung in Berührung bringt u. die volumetr. Vermehrung der Luftvoll. entsprechend ihrer Sättigung mit Dampf des Flüssigkeitsgemisches bestimmt. (A. P. 1 580 157 vom 18/4. 1925, ausg. 13/4. 1926.) KAUSCH.

Power Specialty Company, New York, V. St. A., *Öldestillieröfen, Überhitzer und sonstige Flüssigkeitserwärmer* mit von den heißen Ofengasen umspülten Heizröhren, 1. dad. gek., daß ein Röhrensatz vorgesehen ist, der durch Absorption der Wärme nachteilige Wärmestrahlungen auf einen zweiten Röhrensatz verhindert. — 2. dad. gek., daß der erste u. zweite Röhrensatz mit Bezug zur Feuerkammer hinter der Feuerbrücke angeordnet sind. (D. R. P. 423384 Kl. 12a vom 14/4. 1923, ausg. 4/1. 1926.) KAUSCH.

Leonie Guignard und Claude André Guignard, Melun, *Destillation von Rückständen*. (Oe. P. 102 540 vom 7/11. 1924, ausg. 10/2. 1926. F. Prior. 9/11. 1923. — C. 1926. I. 1683 [D. R. P. 421787].) KÜHLING.

Roscoe R. Stitt, Marquette, Michigan, *Gefriermittel*, bestehend aus einem Gemisch von CH₃OH u. CH₃Cl. (A. P. 1 570 080 vom 2/2. 1925, ausg. 19/1. 1926.) KAU.

Philipp Ellinger, Heidelberg, *Durchführung katalytischer Reaktionen*, dad. gek., daß man als Katalysatoren unedle Metalle oder deren Verbb. verwendet, welche der Einw. von Hochfrequenzstrahlen, Röntgen- bzw. Radiumstrahlen, ausgesetzt werden. Das Verf. kann z. B. für die Cl₂-Erzeugung nach DEACON-HURTER Textilienbleichen, zur Herst. von CH₃COOH aus Luft u. Acetaldehyd Verwendung finden. (D. R. P. 423 542 Kl. 12g vom 8/12. 1922, ausg. 8/1. 1926.) KAUSCH.

Commercial Solvents Corporation, Terre Haute, Ind., übert. von: **David A. Legg und Clarence W. Hancock**, Terre Haute, Ind., *Katalysierapparat*. Dieser App. besitzt eine äußere Wärmeaustauschkammer u. einen cylindr. hohlen Körper aus katalyt. Material, das auf entfernbare Unterlage ruht u. es gegen die innere Wandung dieser Kammer drückt. Ferner ist Fürsorge getroffen, daß die zu katalysierenden Dämpfe durch die Wärmeaustauschkammer abwärts u. aufwärts durch das katalyt. Material geleitet werden. (A. P. 1 580 740 vom 20/2. 1923, ausg. 13/4. 1926.) KAU.

IV. Wasser; Abwasser.

F. E. Hobley, *Behandlung von Kesselspeisewasser*. Die im W. vorhandenen, in Suspension, kolloidaler u. wahrer Lsg. enthaltenen festen Stoffe, die gel. Öle u. Fette sowie die absorbierten Gase, vorübergehende u. bleibende Härte, die Kesselsteinbildner u. -Entferner werden eingehend besprochen, dann die verschiedenen Reinigungsverfahren, u. a. der Kalk-Sodaprozeß, die Methoden der „United Water Softeners“ nach dem „Lassen-Hjort“-Prinzip, von „WM. BOBY & Co., Ltd.“, der „Kennicot Water Softening Company“, der „Permutit“-Gesellschaft u. das „Neckar“-System sowie der Schutz durch Kolloide beschrieben u. krit. erörtert, endlich die Reinigungskosten für das Wasser in Kent von 23⁰ Härte festgestellt. (Gas Journ. 174. 35—39. Woolwich, Engin. Depart., Rôyal Arsenal.) WOLFFRAM.

R. P. Russell, *Natriumsilicat zur Verhütung von Korrosionen*. Durch Zusatz festen oder gelösten Na₂SiO₃ zu Kesselspeisewasser wird auf den angreifbaren Flächen ein Schutzfilm erzeugt. Verschiedene Anlagen zur Ausführung des Verf. sind beschrieben. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 61—65.) SÜVERN.

E. R. Trotman, *Eine Bemerkung über die Bestimmung gelösten Sauerstoffs in Abwässern*. Vf. beschreibt einen App., der in etwas einfacherer Art u. Weise als der App. von FRIEND (Chem. News 130. 163; C. 1925. I. 2323) die Schwierigkeiten des Winklerschen App. umgeht. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T 110.) RÜHLE.

Washington P. Peck, Painesville, Ohio, *Kesselsteinmittel*, welches aus einer Mischung von 40 Pfund Schierlingsextrakt, 60 Pfund calc. Soda, 10 Pfund braunem Zucker u. 30 Gallonen W. zusammengesetzt ist. (A. P. 1579 949 vom 30/10. 1924, ausg. 6/4. 1926.) OELKER.

Herman Reinbold und Hugo Reinbold, Omaha, Nebraska, *Herstellung von Wasser weichmachenden Mitteln aus Aluminiumsilicaten*. Man behandelt gemahlenen, geformten u. calcinierten Bentonit u. dgl. bei der Sinterungstemp. mit $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ u. NaOH u. trocknet das Prod. (A. P. 1570 006 vom 21/1. 1924, ausg. 19/1. 1926.) KAU.

Arthur Law Grant, Plainfield, N. J., V. St. A., *Wasserreinigung*. Zwecks Enthärtung des W. setzt man diesem im h. Zustande Bariumsilicat zu. (A. P. 1574 477 vom 13/12. 1923, ausg. 23/2. 1926.) OELKER.

Constant Peeters, Jean Manderbach und Rudolphe Goossens, Belgien, *Halbarmachen eisenhaltiger Wässer*. Um die Ausscheidung von Fe u. kolloidalen Substanzen in eisenhaltigen Trinkwässern zu verhindern, setzt man ihnen mehrwertige Alkohole, wie Glycerin, Salze mehrbas. Säuren, wie Tartrate, Citrate, Lactate etc., u. Glucose, Glyoxal o. dgl. zu. (F. P. 603 122 vom 7/9. 1925, ausg. 9/4. 1926. D. Priorr. 9. u. 24/9. 1924.) OELKER.

Alexandre Victor Auguste Girard, Frankreich, *Reinigung stickstoffhaltiger industrieller Abwässer*. Man führt in die Abwässer Fll. ein, die durch Behandeln von Fäkalien oder Kloakenwasser in der Faulgrube erhalten worden sind. (F. P. 597515 vom 1/5. 1925, ausg. 23/11. 1925. Belg. Prior. 10/5. 1924.) KAUSCH.

V. Anorganische Industrie.

Friedrich Noll, Unterschwarzach, Baden, *Lagerbeständige Persalze*. Man setzt Alkalisilicat oder ein ähnlich wirkendes Fällmittel, das die eine katalyt. Wrkg. zeigenden Körper in leicht zu entfernende Verb. überführt, der Lsg. des Ausgangsmaterials bereits längere Zeit vor Beginn der Umsetzung mit H_2O_2 zu. (Schwz. P. 113 733 vom 30/10. 1924, ausg. 1/2. 1926.) KAUSCH.

V. G. R. Allienne, Rouen, *Schwefelbrenner*. Der Brenner besteht aus einer vagerecht angeordneten, drehbaren, rohrartigen Vorr., in die die Luft durch eine Öffnung eintritt u. zum Teil in, zum Teil um ein konzentrisch angeordnetes Rohr herumströmt. (E. P. 245 138 vom 22/12. 1925, Auszug veröff. 17/2. 1926. Prior. 14/12. 1924.) KAUSCH.

Tadeuz Chmura, Polen, *Gewinnung von Nebenprodukten und Wärme aus verrennendem Schwefel, Pyriten, Schwefelwasserstoff, schwefliger Säure und anderen nicht ölig oxydierten Schwefelverbindungen*. Man trennt die Oxydationsprodd. aus den verschiedenen Etagen unter erhöhtem Druck erhaltenen S-Verbrennungsprodd., B. von dem N_2 unter Kompression unter einem Druck bis zu 1000 at. (F. P. 03 989 vom 15/7. 1925, ausg. 27/4. 1926. D. Prior. 15/7. 1924.) KAUSCH.

Pittsburgh Plate Glass Co., Pennsylvanien, übert. von: **Hugh A. Galt**, Akron, Ohio, *Salzsäure*. Eine konz. CaCl_2 -Lsg. wird mit H_2SO_4 solcher Konz. behandelt, daß gefälltes CaSO_4 u. käufliche konz. HCl entsteht. Man läßt das Gemisch stehen u. filtriert die Säure ab. (A. P. 1581 436 vom 23/3. 1923, ausg. 20/4. 1924.) KAUSCH.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., *Kondensation von Salzsäuregasen*. Die HCl-Gase werden mit H_2SO_4 berieselt u. damit eine die Kondensation einer nur untergeordneten Menge Wasserdampf bewirkende emp. abgekühlt u. durch ein elektr. Hochspannungsfeld geschickt. (Schwz. P. 13 731 vom 12/8. 1924, ausg. 1/2. 1926. D. Prior. 13/8. 1923.) KAUSCH.

Wilhelm Siegel, Berlin-Charlottenburg, *Natriumfluorid*. Man behandelt K_2SiF_6 mit einer K-Verb., trennt das KF ab von der SiO_2 u. läßt eine Na-Verb. darauf einwirken u. scheidet das NaF von der gleichzeitig gebildeten K-Verb. (A. P. 1581 819 vom 9/5. 1925, ausg. 20/4. 1926.) KAUSCH.

A. F. Meyerhofer, Zürich, *Metallverbindungen*. Man läßt eine komplexe HF-Säure oder Stoffe, die solche bilden (HF u. ein Oxyd, Fluorid o. dgl.), auf ein Metall-oxyd, -carbonat oder -salz einwirken u. behandelt das erhaltene komplexe Fluorid mit einem Salz, um ein weiteres sekundäres komplexes Fluorid zu erhalten. (**E. P. 245 719** vom 8/5. 1925, Auszug veröff. 3/3. 1926. Prior. 10/1. 1925.) KAUSCH.

Albert T. Otto & Sons, New York, übert. von: **Hans Harter**, Würzburg *Ammoniaksynthese*. (**A. P. 1 570 485** vom 11/2. 1925, ausg. 19/1. 1926. — C. 1926. I. 2132.) KÜHLING.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Ammoniumbicarbonat*. (**E. P. 244 645** vom 21/5. 1925, ausg. 14/1. 1926. — C. 1926. I. 2139.) KÜHLING.

Robert Roger Bottoms, Lakewood, N. J., *Helium aus solches enthaltenden Gasgemischen*. Man leitet die komprimierten Gasgemische durch eine Reihe von Rohren in einem Gegenstromwärmeaustauscher u. von da in einen Kondensator, in den die Bestandteile dieses Gasgemisches, die den größten Teil des vorhandenen He enthalten, durch Entspannung fl. werden. Die so erhaltenen Fl. werden in einen Kondensator geleitet, worin sie verdampft werden, worauf die erhaltenen gasigen Prodd. durch eine zweite Reihe von Rohren in dem Gegenstromwärmeaustauscher unter verringertem Druck geleitet werden. (**A. P. 1 569 943** vom 27/12. 1924, ausg. 19/1. 1926.) KAU.

Radium and Rare Earths Treatment Co. No Liability, Melbourne, Austral., übert. von: **William Ternent Cooke**, Adelaide, Südastral., *Gewinnung von Vanadin aus Ilmenit*. Zum Aufschließen des Ilmenits verwendet man ein Schmelzgemisch von Na_2CO_3 u. NaCl . Von diesem schmilzt man 1 Gewichtsteil mit 1 Gewichtsteil Erz bei 800° eine Stde. lang. (**Aust. P. 20 300** vom 30/10. 1924, ausg. 11/2. 1926.) KAU.

H. Lohmann, Berlin-Johannisthal, *Wolframcarbide*. Man schmilzt rohes W mit 5—10% ThC_2 u. 3—5% Mo in Ggw. von Kohle in elektr. Öfen. (**E. P. 248 336** vom 22/1. 1926, Auszug veröff. 28/4. 1926. Prior. 24/2. 1925. Zus. zu **E. P. 246 487**; C. 1926. I. 3095.) KAUSCH.

Edouard Urbain, Frankreich, *Aktive Kohle*. Vegetabilische Stoffe werden zuerst extrahiert, mittels einer salzsauren ZnCl_2 -Lsg. in der Hitze behandelt u. dann calciniert, mit HCl gewaschen u. dann bei mindestens 800° nochmals gegläht. (**F. P. 603 806** vom 24/12. 1924, ausg. 23/4. 1926.) KAUSCH.

Holly Sugar Corporation, Colorado Springs, Colorado, übert. von: **George M. Drummond**, Colorado Springs, *Calciumhydroxyd* wird aus k. Saccharat, das bei Entzuckerung von Melasse aus Zuckerrüben erhalten wird, dad. zurückgewonnen, daß man dieses kontinuierlich in positive Trocken- oder Vakuumindampfer einführt, aus denen kontinuierlich klare Fl. abfließt u. den Nd. vom Boden entfernt. Hierauf wird der Nd. abfiltriert. (**A. P. 1 580 024** vom 23/9. 1924, ausg. 6/4. 1926.) KAUSCH.

Rumford Chemical Works, V. St. A., *Gips*. (**F. P. 602 091** vom 13/8. 1925, ausg. 12/3. 1926. — C. 1926. I. 2732.) KAUSCH.

K. Ebers, Ahrensburg, Holstein, *Bariumsulfat*. Gemahlener Schwerspat wird nach seiner Röstung mit Cl_2 , am besten naszierendem Cl_2 , entfärbt. (**E. P. 245 155** vom 24/12. 1925, Auszug veröff. 17/2. 1926. Prior. 24/12. 1924.) KAUSCH.

Maurice Barnett, Bayonne, N. J., und **Louis Burgess**, *Aluminiumchlorid*. Al_2S_3 enthaltendes Material wird mit trockenem HCl-Gas behandelt. (**A. P. 1 566 269** vom 27/7. 1921, ausg. 22/12. 1925.) KAUSCH.

Gulf Refining Co., Pittsburgh, Pennsylvan., übert. von: **Almer Mc. Duffie Mc Afee**, Port Arthur, Texas, *Aluminiumchlorid*. (**A. P. 1 568 171** vom 25/1. 1922, ausg. 5/1. 1926. — C. 1923. II. 622.) KAUSCH.

Ture Robert Haglund, Schweden, *Behandlung von Bauxit u. dgl.* Man schmilzt Bauxit mit einer S-Verb. u. reduzierenden Stoffen in einem elektr. Ofen, in dem die Charge die Elektroden umhüllt, u. erhält den Lichtbogen möglichst konstant, um Verluste an S durch Verdampfung zu vermeiden. Man erhält schließlich durch W

zersetzliche Sulfide wie Al_2S_3 , BaS u. MgS in der geschmolzenen M. (F. P. 599 559 vom 9/4. 1925, ausg. 15/1. 1926. Oest. Prior. 17/4. 1924.) KAUSCH.

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, *Überführung eines Gemisches von Zirkonium und Hafniumphosphat in ein Gemisch von Zirkonium- und Hafniumhydroxyd*. Das Phosphatgemisch wird in einem freie HF enthaltenden Mittel in ein Gemisch l. Hf- u. Zr-Verbb. übergeführt u. aus der Lsg. dieser mittels wenigstens eines bas. reagierenden Stoffes genügend hoher Hydroxylionenkonz. ein Gemisch von Zr- u. Hf-Hydroxyd gefällt. (Schwz. P. 113 737 vom 15/11. 1924, ausg. 1/2. 1926. Holl. Prior. 15/11. 1923.) KAUSCH.

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, übert. von: Jan Hendrick de Boer, Eindhoven, Holl., *Umwandlung von Hafnium- und Zirkoniumsalzen*. (Aust. P. 20 596 vom 18/11. 1924, ausg. 16/4. 1925. — Vgl. vorst. Ref.) KAUSCH.

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, *Trennung von Hafnium und Zirkon*. Ein Gemisch von Hf- u. Zr-Verbb. wird mit Oxalsäure behandelt u. die entstehenden Verbb. fraktioniert krystallisiert. (Schwz. P. 113 736 vom 14/7. 1924, ausg. 1/2. 1926. Dän. Prior. 25/8. 1923.) KAUSCH.

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, übert. von: Dirk Coster und Georg von Hevesy, Eindhoven, Holl., *Trennung von Hafnium und Zirkonium*. (Aust. P. 19 186 vom 15/8. 1924, ausg. 3/9. 1925. Dän. Prior. 25/8. 1923. — Vorst. Ref.) KAUSCH.

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, übert. von: Dirk Coster und Georg von Hevesy, *Trennung von Hafnium und Zirkonium*. (Aust. P. 16 172 vom 29/1. 1924, ausg. 10/2. 1925. Holl. Prior. 28/4. 1923. — C. 1924. II. 541 [F. P. 568978].) KAUSCH.

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holl., übert. von: Dirk Coster und Georg von Hevesy, *Trennung von Zirkonium und Hafnium*. (Aust. P. 16 173 vom 29/1. 1924, ausg. 10/2. 1925. Holl. Prior. 26/4. 1923. — C. 1924. II. 541 [F. P. 569016].) KAUSCH.

Chance and Hunt, Ltd., Oldbury, übert. von: William Thomas Gidden, Smethwick, und William Gilbert Ragg, Birmingham, *Behandlung von rohem Zinkoxyd und -carbonat*. Man stellt eine das Rohmaterial u. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ enthaltende Lsg. her, verd. diese plötzlich mit W. u. dest. das NH_3 ab. (A. P. 1 579 302 vom 28/11. 1923, ausg. 5/4. 1926.) KAUSCH.

Stanley Cochran Smith, London, *Bleisulfat*. In Pb-Erzen wird das Pb in PbCl_2 übergeführt, dann dieses abgeschieden u. in einer eine bas. Verb. eines Metalls, das ein l. Sulfit bildet, u. ein Metallchlorid enthaltenden Lsg. suspendiert, die Suspension umgerührt u. SO_2 hindurch geleitet. (A. P. 1 581 030 vom 3/9. 1925, ausg. 13/4. 1926.) KAUSCH.

Stanley Cochran Smith, London, und **Frank Edward Elmore**, Three Fields, Engl., *Bleisulfat*. (A. P. 1 581 031 vom 12/10. 1925, ausg. 13/4. 1926. — C. 1926. I. 1013.) KAUSCH.

Radium and Rare Earths Treatment Co. No Liability, Melbourne, Austral., übert. von: William Ternent Cooke, Adelaide, Südastral., *Behandlung von Lösungen, die Eisensulfate, Titansulfat und freie Schwefelsäure enthalten*. Man setzt zu der Mutterlsg. BaS , BaCO_3 , NaOH oder eine andere Säure abstumpfende Base, ferner Stoffe, die H_2S u. auch Na_2S bilden. (Aust. P. 20 299 vom 30/10. 1924, ausg. 18/2. 1926.) KAUSCH.

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Stockton-on-Tees, Engl., übert. von: Joseph G. Dely, Syracuse, N. Y., *Reinigung von ammoniakalischen Kupferoxydulsungen*. (Aust. P. 20 350 vom 3/11. 1924, ausg. 11/6. 1925. — C. 1926. I. 1873 D. R. P. 423 543.] KAUSCH.

R. W. Grohmann, G. H. Jaeger und R. Nacken, Frankfurt a. M., *Edelsteine*. Isomogene Edelsteine, wie Rubinen oder Sapphire, erhält man durch Einführen von

Al u. Cr in Form ihrer dispergierten kolloidalen Oxyde oder in Form ihrer Halogenid- oder Cyanidslgg. in eine Flamme. (E. P. 245 132 vom 22/12. 1925, Auszug veröff. 17/2. 1926. Prior. 27/12. 1924.) KAUSCH.

Cochrane Corporation, Philadelphia, übert. von: **S. Dahl-Rode**, Philadelphia, *Basenaustauscher*. Man behandelt ein Erdalkalialuminiumsilicat oder Schlacke (Hochofenschlacke), die solche Silicate enthält, mit einer Alkalislsg. (E. P. 245 092 vom 11/12. 1925, Auszug veröff. 17/2. 1926. Prior. 23/12. 1924.) KAUSCH.



VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Rice Williams, *Einwirkung der Düngung mit basischen Schlacken auf den Kalkzustand der Böden*. Unter Laboratoriumsbedingungen werden in ungesätt. Böden Sättigungsgrad, austauschbares Ca, in CO₂-haltigem W. l. Ca u. die p_H durch Düngung mit bas. Schlacken erhöht; in dieser Beziehung sind Schlacken dem CaCO₃ u. CaO anscheinend gleichwertig. Noch nach 8 Jahren war die Einw. bas. Schlacken auf dem Felde nachweisbar; sie stellen ein gutes Mittel dar, um den Kalkverlust der Böden durch Auswaschen u. Ernte zu ersetzen. (Journ. Agricult. Science 16. 196—204. Univ. Bangor.) TRÉNEL.

Koji Miyake und **Masashi Adachi**, *Einfluß der Düngemittel auf die H⁺-Ionenkonzentration der Säfte der Reispflanze*. (Vgl. Journ. Biochemistry 4. 317, C. 1925. II. 1305.) Die Verss. wurden ähnlich wie die früheren ausgeführt, nur hier an zwei Reissarten. Zugabe von Stickstoff, ganz gleich in welcher Form, ob mit Phosphorsäure u. Kali zusammen oder nicht, setzte die [H⁺] in den Pflanzensäften herab. Die Zugabe der anderen Düngemittel schien den Einfluß des Stickstoffes noch zu vergrößern. Die Phosphorsäure andererseits erhöhte die [H⁺], Kali u. Stickstoff schwächten diese Wrkg. ab. Kalk wirkt genau so wie Stickstoff, nur nicht so ausgeprägt, Kali dagegen verhält sich schwankend, so daß man keine bestimmte Tendenz feststellen kann (Journ. Biochemistry 5. 321—26. 1925. Sapporo, Imp. Univ. Inst. of Agricult. Chem.) HA.

—, *Die Zusammensetzung moderner Mittel zur Schädlingsbekämpfung*. Mitteilungen über 116 der in den letzten Jahren in den Handel gelangten Stoffe zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten oder zur Vernichtung von tier. bzw. sonstigen Schädlingen von Kulturgewächsen. (Pharm. Ztg. 71. 526—29.) ROJAHN.

F. L. Campbell, *Über die Rolle von Calciumhydroxyd in Mischungen aus Ätzkalk und saurem Bleiarseniat*. Folgende Rkk. treten bei den Spritzmitteln genannter Zus. ein:



Das freiwerdende saure Ca-Arseniat kann in feuchtwarmen Klimaten ernste Blattschäden hervorrufen. (Journ. Agricult. Research 32. 77—82. New Jersey, Agric. Exp. Stat.) TRÉNEL.

W. Goodwin, **H. Martin** und **E. S. Salmon**, *Die fungiziden Eigenschaften gewisser Spritzmittel*. IV. (III. vgl. S. 1021.) Folgende Lsgg. erwiesen sich gegen Sphaerotheca Humuli wirksam: Schwefelleberlsg. mit 0,092% Polysulfid-S. Die Na-Salze sind gleichwertig. Bleiarseniat ist weniger wirksam als Bleithioarseniat oder Dicalcium- bzw. Dinatriumarseniat. Ca-Sulfid u. Bleiarseniat erwiesen sich wirksam, sobald sie gemischt angewendet wurden. (Journ. Agricult. Science 16. 302—17.) TRÉNEL.

Herbert Ernest Woodman, **Denzil Layton Blunt** und **James Stewart**, *Der Nährwert von Weidegras*. I. Jahreszeitliche Schwankungen der Erzeugung; botanische und chemische Zusammensetzung, Nährwert mittlerer Weiden auf leichtem, sandigen Boden. Angabe der Flora, die während der Jahreszeiten überwiegt. Einfluß der Witterung auf den jahreszeitlichen Ertrag. Die Schnitte zeichneten sich durch hohen Eiweißgehalt u. niedrigen Fasergehalt aus, der während der Trockenzeit etwas zurückging u. im Spätsommer wieder die frühere Höhe erreichte. Der Nährwert kam Leinsamenkuchen gleich u. war bestem Wiesenheu bei weitem überlegen. Die Rohfaser

wurde zu 80% verdaut. Der Kalkgehalt der Gräser war in der Trockenzeit am größten, der Phosphatgehalt am kleinsten. (Journ. Agricult. Science 16. 205—74. Cambridge, Univ.) TRÉNEL.

Carl Koellreutter und **Ernst Schenker**, Gurtellen, Schweiz, *Lagern und Versand von an der Luft unter Entwicklung gefährlicher Gase zerfallenden festen Stoffen*. Die Stoffe (z. B. CaC_2) werden nach der Zerkleinerung in großen, mit einem unter Druck stehenden, inerten Schutzgas gefüllten, mit Lade- u. Entladeeinrichtung versehenen Behältern aufbewahrt u. auch transportiert. (Schwz. P. 112 122 vom 5/1. 1925, ausg. 1/2. 1926.) KAUSCH.

Elektrochemische Gesellschaft m. b. H., Hirschfelde i. Sa., *Körnen von Kalkstickstoff*, dad. gek., daß man die Kalkstickstoffblöcke in Hammermühlen mit kleiner Schaltweite des Rostes zerkleinert u. während der Zerkleinerung einen kräftigen Luftstrom in den Einwurf eintreten u. durch den Rost hindurchtreten läßt. — Das Erzeugnis fällt in Form von Gries oder Schrot an; es weist nicht die Belästigung durch Stäuben auf wie pulverförmiger Kalkstickstoff. (D. R. P. 427 658 Kl. 12k vom 6/5. 1925, ausg. 13/4. 1926.) KÜHLING.

Ignaz Kreidl, Wien, *Verfahren zum Beizen von Saatgut*. (Oe. P. 101 662 vom 5/4. 1921, ausg. 25/11. 1925. — C. 1924. II. 1396 [D. R. P. 398 555].) SCHOTTL.

The People of the United States, übert. von: **Loren B. Smith, Edward Avery Richmond**, Riverton, und **Peter A. van der Meulen**, New Brunswick, New Jersey, V. St. A., *Lockmittel für Insekten*, bestehend aus *Geraniol* oder dieses enthaltenden äth. Ölen. — Das Geraniol kann entweder in wss. Emulsion mit Seife zum Bespritzen von Pflanzen verwendet werden oder man läßt es durch feingepulverte Holzkohle oder Kieselgur absorbieren u. bestäubt die Pflanzen mit dem Pulver. Will man ein zu schnelles Verdunsten des Geraniols verhindern, so bringt man es in besondere kleine Behälter, die an geeigneten Örtlichkeiten aufgehängt werden. Ferner kann man es einem Gemisch von Kleie u. Melasse einverleiben. Diese Köder lassen sich auch mit insekticiden Mitteln, wie Pb-Acetat oder Parisergrün, vermischen. Die mit dem Lockmittel bespritzten oder bestäubten Pflanzen werden gleichzeitig mit insekticiden Mitteln behandelt. Es erfolgt so eine wesentliche stärkere Abtötung der Insekten als ohne das Lockmittel. (A. P. 1 572 568 vom 12/8. 1925, ausg. 9/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

The Rubber Service Laboratories Co., Akron, Ohio, übert. von: **Carl Nelson Hand**, Nitro, West Virginia, V. St. A., *Insektenvertilgungsmittel*, bestehend aus *Diphenylthioharnstoff* u. gepulvertem S. — Man kann das Mittel auch mit inerten Stoffen, wie Stärke, Mehl, MgO , Ton oder CaSO_4 versetzen, wodurch die Haftfähigkeit auf den Pflanzenteilen, die mit ihm bestäubt werden, erhöht wird. Ebenso kann es mit anderen insekticiden Mitteln vermischt werden, wie NaF , CaO , Tabakpulver, Pyrethrumblüten, Naphthalin, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, oder CuSO_4 , ZnO , sowie Nießwurz. Es lassen sich mit ihm sowohl auf Pflanzen, als auch an Geflügel oder in Häusern befindliche tier. Schädlinge, wie Baumwollwürmer, Kartoffelkäfer, Kellersasseln, Ameisen, Wanzen, vernichten. (A. P. 1 573 490 vom 25/3. 1925, ausg. 16/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

California Spray-Chemical Company (Erfinder: **William Hunter Volck**), Watsonville, California, V. St. A., *Insekticides Mittel*. (Aust. P. 19 546 vom 10/9. 1924, ausg. 11/8. 1925. — C. 1926. I. 2505.) SCHOTTLÄNDER.

Max Trénel, Berlin-Dahlem, *Elektrometrische Bestimmung der Acidität bzw. Alkalinität von Böden, Kohlearten, Wässern, Abwässern, chemischen Lösungen u. dgl.* unter Verwendung der Einrichtung nach Patent 399 410, dad. gek., daß eine die Vergleichslsg. u. die eine Elektrode enthaltende, möglichst diffusionsfreie Zelle, die zweckmäßig aus sehr feinporigem Porzellan oder ähnlichem Stoff besteht, u. die andere Elektrode unmittelbar in einen Hohlraum des zu untersuchenden Stoffes eingeführt werden, der der Einw. von Chinhydrin oder einem ähnlich wirkenden Stoff ausgesetzt

ist. — Die Zelle wird vorzugsweise zylindr. ausgeführt u. besteht entweder völlig aus dem feinporigen Porzellan oder es wird nur der untere Teil oder die Bodenfläche aus diesem Stoff hergestellt. (D. R. P. 413 043 Kl. 421 vom 16/7. 1924, ausg. 29/4. 1925. Zus. zu D. R. P. 399 410; C. 1926. I. 746.) KÜHLING.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Henry Le Chatelier, *Über die Theorie des Schachtofens*. Die Theorie des Schachtofens hat zum wesentlichen Zweck die Best. der Temp. mit der die erarbeiteten Stoffe den Ofen im Gestell u. die verbrannten Gase die Gicht verlassen. Bei den vorliegenden Verss. wurde das Grundgesetz der Betriebsweise an sich von den durch die passiven Widerstände verursachten Störungen, die sich dem Wärmeaustausch widersetzen, getrennt, ein Umstand, der bisher offenbar nicht beachtet worden ist. Aus den energet. Gesetzen lassen sich eindeutig die verschiedenen Folgen ziehen, die die gänzliche Lösung der gestellten Aufgaben ergeben. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 735 bis 739.) KALPERS.

F. Weber, *Der Hochfrequenz-Induktionsofen*. Vf. beschreibt eine im Kaiser-Wilhelms-Institut für Eisenforschung aufgestellte Hochfrequenz-Schmelzanlage mit Maschinensätzen von 8 u. 30 k VA u. erörtert die Vorzüge des Hochfrequenzofens gegenüber den bisher gebräuchlichen Induktionsöfen. (Stahl u. Eisen 46. 533—36. Düsseldorf.) LÜDER.

Dudley Willcox, *Das Schmelzen von Metallen in Hochfrequenz-Induktionsöfen*. Vf. gibt ein Bild der Entw. der Hochfrequenz-Induktionsöfen, eine Beschreibung ihrer Arbeitsweise u. ihre Vorzüge unter besonderer Berücksichtigung der Herstellung von Ferronickel. (Foundry 54. 320—22. Trenton [N. J.].) LÜDER.

F. Leitner, *Primärkrystallite in Chrom-Nickelstählen, ihre Beeinflussbarkeit und ihre Bedeutung für Fehlstellen*. Vf. erläutert die Bedeutung der Primärkrystallitbildung im Cr-Ni-Stahl, die durch Gießtemp. u. Flüssigkeitsgrad beeinflusst wird. Das Ätzen geschah mit Hilfe von 5% HNO_3 , auch $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$. Grobe Primärkrystalle sind nachteilig, da sie eine stärkere örtliche Anhäufung der Verunreinigungen u. die B. von Lückenstellen fördert. Schließlich wurde der Einfluß der Wärmebehandlung auf die Festigkeitseigenschaften untersucht u. der Weg angegeben, diese zu verbessern. (Stahl u. Eisen 46. 525—32. Kapfenberg.) LÜDER.

G. Tammann und W. Riedelsberger, *Über Klangfiguren auf Walzblechen*. Es wurden auf verschiedenen kalt gewalzten Materialien Chladnische Klangfiguren erzeugt u. die Umorientierung des Gefüges durch Glühen beobachtet. Untersucht wurden Cu, Al, Zn u. unterperlit. Stahl. Die Gleitrichtung der Krystallite wird durch die Klangfiguren festgestellt. (Ztschr. f. Metallkunde 18. 105—11. 149—54. Göttingen u. Hamburg.) LÜDER.

H. Tiedemann, *Die Haarkupferbildung im Kupferstein. Ein Beitrag zum System Cu-Fe-S*. Vf. führte an Mineralien u. Schmelzprodd. mkr., therm. u. Leitfähigkeitsunterss. aus, um die Frage der Haarkupferbildung im Cu-Stein zu klären. Zunächst wurde die Grenze festgestellt, bis zu der sich dem Cu-Stein entsprechende Verb. mit höherem S-Gehalt als dem Schnitt $\text{Cu}_2\text{S-FeS}$ entspricht, durch Schmelzen herstellen zu lassen, ferner das Konz.-Gebiet der Haarkupferausscheidung festgelegt, wobei bestätigt wurde, daß diese bei 62% Cu, $(\text{Cu}_2\text{S})_2\text{FeS}$, ihr Maximum erreicht. Durch Ätzen zeigte sich, daß die Verb. $(\text{Cu}_2\text{S})_2\text{FeS}$ in Buntkupferkies $(\text{Cu}_2\text{S})_3\cdot\text{Fe}_2\text{S}_3$ u. Haarkupfer zerfällt. Die Cu-Steine liegen, wenigstens im Cu-reichen Teil des Diagramms, nicht auf dem Schnitt $\text{Cu}_2\text{S-FeS}$, sondern auf $\text{Cu}_2\text{S-Fe}_2\text{S}_3$, ebenso wie die Mineralien Buntkupferkies, Bernhardtit, Homichlin, Kupferkies u. Cuban. — Das V. von gediegenem Cu auf Lagerstätten von Buntkupferkies u. Kupferkies wird durch obige Verss. ebenfalls zwanglos erklärt. — Die Haarkupferausscheidung beginnt bei 548° u. ist bei 180° zu Ende, wie durch Messung des elektr. Widerstandes gezeigt wurde.

— Der Arbeit ist eine Reihe von Diagrammen u. Schliffbildern beigelegt. (Metall u. Erz **23**. 200—210. Berlin.) LÜDER.

J. Kuntz, *Die Kupfergrube Chuquicamata*. (Metall u. Erz **23**. 193—99. Santiago [Chile].) LÜDER.

Thomas Halstead und **Donald P. Smith**, *Die Konstitution der Aluminium-Magnesiumlegierungen von 32—48% Magnesium*. Es wurden Al-Mg-Legierungen von 32—48% Mg hergestellt u. ihre thermoelektr. Kraft u. ihr Temp.-Widerstandskoeffizient bestimmt. Es ergab sich, daß das von HANSON u. SAYLER gefundene Feld der Existenz der β -Krystalle in 2 Teile zu zerlegen ist: die β_1 -Krystalle (Al_3Mg_5) sind beständig zwischen 36,8 u. 38,8 Atomprozenten Mg, die β_2 -Krystalle von 39,4 bis 43,0 Atomprozenten Mg. (Trans. Amer. Electr. Soc. **49**. 23 Seiten. Sep. Chicago.) LÜDER.

Pierre Henry, *Über die Verformungsgeschwindigkeit der Metalle bei hohen Temperaturen*. Studien über die Verdrehung metall. Zylinder haben den Vf. veranlaßt, die Vers.-Ergebnisse, die sich auf den Einfluß der Kraft u. Temp. auf die Verdrehungsgeschwindigkeit beziehen, in eine einfache, diese drei Größen verbindende Beziehung zu bringen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 761—62.) KALPERS.

Albert Portevin, *Verformungs- oder Korrosionsstreifen*. Der Angriff polierter metall. Flächen durch chem. Stoffe läßt Spuren von Strahlen, die vor dem Polieren bestanden, wiedererscheinen. Der krystalline Charakter nach der Verformung ist durch den Wechsel im Aussehen gekennzeichnet, den man beim Übergang von einem Korn zum andern feststellt. Die durch das Ätzen zum Vorschein gebrachten Linien sind von OSMOND Verformungsstreifen genannt worden; da sie aber infolge korrolierender Einflüsse entstehen, kann man sie auch Korrosionsstreifen nennen. Man kann dabei 2 Arten von Streifungen unterscheiden: abwechselnde oder voneinander getrennte Streifen u. Veränderung im Aussehen der Korrosionsbilder, die im α -Fe beobachtet wurden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 523—25.) KALPERS.

Thadée Pecsalski, *Sublimation und Krystallisation der Metalle*. Bei der Erwärmung von in einer Eisenröhre eingeschlossenem Nickelchlorid bei 800° hat die hierdurch hervorgerufene Zementation eine Trennung von Eisenschichten in einer Dicke von einigen Zehnteln Millimeter verursacht. Ähnliche Verss. mit einem an seinem unteren Ende von Chromchlorid umgebenen Cu-Stab in einer Eisenröhre ergaben nach 24-std. Erhitzung auf 800°: 1. die Zementation des Stabes auf seiner ganzen Länge; diese Erscheinung ist an den Berührungsstellen mit dem Salz mehr ausgeprägt als an dem nur durch die Dämpfe getroffenen Teil. 2. einen Niederschlag von metall. Cr an den Teilen des Cu-Stabes, die mit dem Salz nicht in Berührung gekommen sind, 3. die b. von Cu-Krystallen rhomboedr. Form. Es besteht demnach eine Sublimation der Metalle bei der Berührung mit Salzen. Diese Metaldämpfe entstehen durch die Red. der Chloride. Schließlich scheint die Zementation der Metalle durch die Salze von der Dampfabsorption der Salze herzurühren. (C. r. d. l'Acad. des sciences **182**. 516 bis 17.) KALPERS.

Siemens & Halske A.-G. (Erfinder: **Emil Duhme**), Berlin-Siemensstadt, *Herstellung von Metallen auf elektrolytischem Wege*, bei der außer der Anode u. der Kathode eine räumlich davon getrennte Hilfskathode angeordnet ist, 1. dad. gek., daß zwischen der u. Hilfskathode ein verlagertes Wechselstrom fließt. — 2. dad. gek., daß die Anode mit der Hauptkathode durch eine Gleichstromquelle, mit der Hilfskathode dagegen durch eine Wechselstromquelle verbunden ist. — Die Hilfskathode kann mit der Gleichstromquelle über einen Widerstand verbunden sein, da auf ihr nur soviel Metall niedergeschlagen zu werden braucht, wie nötig ist, um die Unreinigkeiten zu entfernen. (D. R. P. **427 670** Kl. 40c vom 28/10. 1923, ausg. 12/4. 1926.) KÜHLING.

Heinrich Lanz, Mannheim, *Graues Roheisen*. (E. P. 210 091 vom 22/1. 1924, ausg. 12/3. 1924. D. Prior. 22/1. 1923. — C. 1925. II. 1310.) KAUSCH.

Heinrich Lanz, Mannheim, *Raffiniertes Gußeisen*. Man stellt Perlitgußeisen nach den E. PP. 147 933 (C. 1922. II. 440) u. 210 091 (vorst. Ref.) mit feinem u. gleichmäßig niedergeschlagenem Graphit her, das Ni, Cr u. dgl. enthält. (E. P. 217 885 vom 16/4. 1924, ausg. 13/8. 1924. D. Prior. 23/6. 1923.) KAUSCH.

F. Caspari, Corbach, *Vorrichtung zur Kondensation von leichtflüchtigen Metallen wie Zink usw.*, welche während des Kondensationsvorganges in Bewegung erhalten werden, dad. gek., daß die an beliebiger Stelle hinter dem die Metaldämpfe entwickelnden Ofen angeordnete Kondensationsvorr. aus einem feststehenden, von den Zinkdampf enthaltenden Gasen durchströmten Gehäuse besteht, in dem ein solcher sich bewegend Körper, wie eine rotierende Trommel sich befindet, durch deren Bewegung das Gas u. das staubförmige, sowie das bereits fl. Metall gleichzeitig miteinander durchgerührt werden. — Im Abscheidungsraum wird eine Temp. zwischen 400 u. 600° eingehalten. (D. R. P. 427 326 Kl. 40a vom 4/12. 1921, ausg. 8/4. 1926.) KÜHLING.

Urbasch & Co., Großenbaum b. Duisburg, *Verhinderung des Festbrennens zinkischer Krusten in Zinkvorlagen*, dad. gek., daß die Innenwände der Vorlagen mit einem Anstrich versehen werden, welcher aus einer Mischung bas. selbstbindender (Zement) u. nicht selbstbindender Erdalkaliverbb., einschließlich Magnesiumverb. unter sich oder mit fettem Lehm besteht. — Der Gehalt der Mischung an CaO muß eine gewisse Höhe haben, sonst wird der Anstrich wirkungslos. (D. R. P. 427 827 Kl. 40a vom 5/12. 1924, ausg. 20/4. 1926.) KÜHLING.

Gesellschaft für hüttenmännische Verfahren m. b. H., Berlin-Tempelhof, *Reinigung von Kupfer*, 1. dad. gek., daß man Kupferkathoden, Schwarzkupfer, Altkupfer, Kupferlegierungen u. dgl., gegebenenfalls nach vorhergehendem oxydierendem Schmelzen unter Zuschlag von Zn oder zinkhaltigen Legierungen, wie Messing o. dgl., im Schmelzflusse im Vakuum behandelt. — 2. dad. gek., daß Zn u. Pb dem Cu zugesetzt werden. — Die Mengen des zuzusetzenden Zn richten sich nach dem Gehalt des Cu an O₂, zweckmäßig wird ein Überschuß von Zn gewonnen. (D. R. P. 427 915 Kl. 40a vom 24/5. 1924, ausg. 21/4. 1926.) KÜHLING.

Otto Nielsen, Ilsenburg a. Harz, *Einführung von Zusätzen beim Polen von Kupfer* u. anderer metallurg. Verf., dad. gek., daß durch ein Zuführungsrohr in das Bad zunächst ein inerte Gasstrom eingeführt wird, der die Luft aus der Apparatur verdrängt u. die Kühlung des Zuführungsrohres bewirkt, worauf die Zuführung des Reduktionsmaterials in fl., stückiger oder auch gasförmiger Form durch das Rohr erfolgt. (D. R. P. 428 024 Kl. 40a vom 5/12. 1923, ausg. 21/4. 1926.) KÜHLING.

Inspiration Consolidated Copper Co., New York, übert. von: **George D. var Arsdale**, Los Angeles, **Harold W. Aldrich** und **Walter Scott**, Inspiration, Arizona *Gewinnung von gelösten wertvollen Produkten*. Man wäscht zurückgebliebene, feil zerteilte feste Stoffe (Cu-Erzrückstände) im Gegenstrom u. gibt die erhaltene Lsg. zu einer reichen Lsg. u. läßt eine Fl. hindurchzirkulieren, die die wertvollen Stoffe zur Fällung bringt. (A. P. 1 581 479 vom 7/9. 1923, ausg. 20/4. 1926.) KAUSCH.

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemensstadt, *Reinigen von Quecksilber* durch Verdampfung, 1. dad. gek., daß das zu reinigende Hg in einem Gefäße erwärmt wird das durch eine poröse Wand von einem Raum niedrigeren Druckes getrennt ist, deren Durchlässigkeit so gewählt ist, daß das Hg nur in Dampfform durchtreten kann. — 2. dad. gek., daß das Gefäß, in dem das Hg erwärmt wird, unter höheren Druck gesetzt wird. Das Erzeugnis soll ganz frei von Verunreinigungen sein. (D. R. P. 428 02 Kl. 40a vom 2/8. 1924, ausg. 21/4. 1926.) KÜHLING.

American Magnesium Corporation, Niagara Falls, N. Y., übert. von: **Richard L. Templin**, Parnassus, Pennsylvan., *Verarbeitung von Magnesium*. Mg oder Mg-Legierungen, die ähnliche Eigenschaften wie das Mg haben, lassen sich in Strang

pressen am besten bei etwa 750° F. u. unter günstiger Beeinflussung ihrer Eigenschaften verarbeiten. (**A. P. 1570 868** vom 4/8. 1920, ausg. 26/1. 1926.) KAUSCH.

E. Weintraub und Soc. Alsacienne de Constructions Mécaniques, Frankreich, *Gegen oxydierende Einflüsse schützender, elektrisch isolierender Überzug auf Metallen*, besonders Stählen. Die zu schützenden bzw. isolierenden Metalle werden mit einfachen oder komplexen Wolframaten, Molybdaten, Antimonaten, Arsenaten u. Stannaten des Fe, Ni, Cu usw. erhitzt. (**F. P. 600 774** vom 17/10. 1924, ausg. 15/2. 1926.)

KÜHLING.

N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, *Überziehen von Körpern mit Wolfram*. Mindestens ein geschmolzenes Wolframatom wird mit einer solchen Stromdichte elektrolysiert, daß W als zusammenhängende Schicht auf dem als Kathode geschalteten Körper abgeschieden wird. (**Schwz. P. 113 550** vom 25/11. 1924, ausg. 16/1. 1926. Holl. Prior. 28/6. 1924.)

KAUSCH.

Langbein-Pfanhauser-Werke A.-G. (Erfinder: **Wilhelm Pfanhauser**), Leipzig, *Elektrolytisches Überziehen von Metallgegenständen mit anderen Metallen* unter gleichzeitiger Regelung der Gewichtsmenge an niedergeschlagenem Metall, dad. gek., daß die zu veredelnden Gegenstände durch ein galvan. Bad mit gleichmäßiger Geschwindigkeit hindurchgeführt werden, wobei gleichzeitig der Antrieb der Durchzugsvorrichtung mit Hilfe des das Bad durchfließenden Arbeitsstromes derart gesteuert wird, daß die Durchzugsgeschwindigkeit im umgekehrten Verhältnis zur Veränderung der Arbeitsstromstärke während der Niederschlagsarbeit selbsttätig geregelt wird. — Der das Bad durchfließende Strom geht über ein Solenoid, dessen Eisenkern einen Hebel betätigt, welcher mit verstellbaren Kontaktstiften verschiedener Länge versehen ist. (**D. R. P. 27 436** Kl. 48a vom 22/3. 1925, ausg. 13/4. 1926.)

KÜHLING.

Edgar Ford Morris, Manchester, Grafsch. Lancaster, Engl. und **James Anderson Torrice**, Glasgow, Grafsch. Lanark, Schottl., *Herstellung eines Rostschutzmittels auf Eisen*. (**D. R. P. 426 841** Kl. 22g vom 4/10. 1924, ausg. 18/3. 1926. E. Prior. 26/10. 1923. — C. 1926. I. 782.)

SCHALL.

Antiscale Corporation, Philadelphia, Pa., übert. von: **George C. Freeman**, Philadelphia, *Schutz von Metallflächen gegen Inkrustationen*. Man verbindet die Pole einer elektr. Stromquelle mit verschiedenen Punkten der zu schützenden Metallfläche. (**A. P. 1 568 728** vom 13/4. 1925, ausg. 5/1. 1926.)

OELKER.

IX. Organische Präparate.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., übert. von: **Hans Meerwein**, Königsberg i. Pr., *Herstellung von Alkoholen*. In primären Alkoholen gel. *halogenierte Aldehyde* werden mit Al-Alkoholaten behandelt. — (Hierzu s. auch MEERWEIN, SCHMIDT, MIGGE, VON BOCK u. LENZ, LIEBIGS Ann. **444**: 221; 1925. II. 2314.) (**A. P. 1 572 742** vom 28/5. 1925, ausg. 9/2. 1926.) SCHOTTL.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., übert. von: **Georg Ränzlein**, Sindlingen b. Höchst a. M., und **Martin Corell**, Höchst a. M., *Thiodiäthylenglykol und Thiopropylenäthylenglykol*. (**A. P. 1 570 262** vom 7/8. 1922, ausg. 1/1. 1926. — C. 1923. II. 684.)

SCHOTTLÄNDER.

Augustin Amédée Louis Joseph Damiens, Arcueil-Cachan, **Marie Charles Joseph Elisée de Loisy**, Paris, Frankreich, und **Olivier Joseph Gislain Piette**, Brüssel, Belgien, *Äthylschwefelsäure und Diäthylsulfat aus Äthylen enthaltenden Industriegasen*. (**A. P. 1 574 796** vom 13/4. 1922, ausg. 2/3. 1926. — C. 1921. II. 265. 1923. 1088. 1925. I. 574. 1925. II. 1093.)

SCHOTTLÄNDER.

Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh., und **Karl Friedrich Schmidt**, Heidelberg, *Abkömmlinge des hypothetischen Imins einschließlich der Amine und ihrer Substitutionsprodukte*. (**D. R. P. 427 858** Kl. 12o vom 20/7. 1923, ausg. 20/4. 1926. — C. 1926. I. 2511 [A. P. 1 564 631].)

SCHOTTLÄNDER.

Canadian Electro Products Company, Ltd., Montreal, Canada, übert. von: **Melville J. Marshall** und **George S. Shaw**, Shawinigan Falls, Quebec, Canada, *Essigsäureanhydrid und Acetaldehyd aus Äthylidendiacetat*. (A. P. 1 578 454 vom 26/1. 1920, ausg. 30/3. 1926. — C. 1924. I. 2203 [Schwz. P. 100 178].) SCHOTTL.

The Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, V. St. A., übert. von: **Erich Krause**, Konstanz i. B., *Acetaldehyd aus Äthylalkohol*. (A. P. 1 581 641 vom 4/6. 1924, ausg. 20/4. 1926. — C. 1926. I. 2839 [D. R. P. 422 729].) SCHOTTLÄNDER.

Commercial Solvents Corporation, übert. von: **Charles Bogin**, Terre Haute, Indiana, V. St. A., *Herstellung von Parabutrylaldehyd*. Man vermischt n. Butyraldehyd mit einem sauren Katalysator u. hält die Temp. des Gemisches bis zur Beendigung der Rk. auf 15—50°. — Nach Beendigung der Polymerisation muß der Katalysator restlos entfernt werden, da der Parabutrylaldehyd, in Ggw. von Spuren einer Säure dest., sich zers. Z. B. wird n. Butyraldehyd bei 15° mit geringen Mengen konz. H₂SO₄, D. 1,84, versetzt u. die Temp. durch äußere Kühlung während 5 Stdn. auf 30° gehalten. Nach 2-maligem Ausschütteln mit W. wird das Reaktionsgemisch zur Entfernung von W. u. unverändertem n. Butyraldehyd der fraktionierten Dest. unterworfen. Der in einer Ausbeute von 88% erhaltene reine Parabutrylaldehyd ist eine farb- u. geruchlose Fl., D.²¹ 0,917, Kp.₃₅ 129—130°, Kp.₇₆₀ 210—220° unter teilweiser Zers. zum monomeren Aldehyd. — Verwendet man als Katalysator wasserfreies ZnCl₂, läßt 4 Tage stehen u. verfährt dann wie oben, so beträgt die Ausbeute an Parabutrylaldehyd 85%. (A. P. 1 576 503 vom 4/6. 1924, ausg. 16/3. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Commercial Solvents Corporation, übert. von: **Clarence E. Pigg**, Terre Haute, Indiana, V. St. A., *Herstellung von n-Butyraldehyd*. Man leitet ein dampfförmiges Gemisch von n-Butylalkohol u. 2—18% W. bei 200—350° über einen Cu-haltigen Katalysator u. kondensiert die austretenden Dämpfe. — Durch die Ggw. des Wasserdampfs werden die Ausbeuten an reinem n. Butyraldehyd von sonst ca. 70% auf 90% gesteigert, da das W. die B. von Buttersäure u. anderen Nebenprodd. fast ganz verhindert. Demgemäß läßt sich auch das Reaktionsprod. wesentlich leichter vom beigemischten Ausgangsstoff trennen. (A. P. 1 576 544 vom 25/7. 1924, ausg. 16/3. 1926.) SCHOTTL.

Rudolph Koepf & Co., Chemische Fabrik, übert. von: **Max Enderli**, Östreich, Rheingau, *Natriumformiat aus Kohlenoxyd*. (A. P. 1 574 875 vom 24/2. 1921, ausg. 2/3. 1926. — C. 1922. II. 1134.) SCHOTTLÄNDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, übert. von: **Rudolf Wietzel**, Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung von Ameisensäurealkylestern*. Man läßt CO auf fl. Alkohole in Ggw. von Metallalkoholaten unter erhöhtem Druck bei 30—150°, zweckmäßig zwischen 60 u. 100°, einwirken. — Z. B. wird ein zylindr. stählerner, druckfester Kessel mit CH₃OH in dem etwas metall. Na gel. ist, gefüllt, alsdann auf 80° erhitzt u. CO eingedrückt, bis der Druck 200 at. beträgt. Nach wenigen Stdn. ist die Rk. beendet. Erhöht man den Druck auf 1000 at., so ist die Umsetzung nach wenigen Minuten nahezu quantitativ. Das nahezu reine Methylformiat wird entweder am Boden des Kessels abgelassen oder durch ein am Deckel befindliches Ventil abdest. Das NaOCH₃ bleibt fest im Kessel zurück u. kann zu einem neuen Ansatz verwendet werden. Das CO muß frei von Fe(CO)₅, S-Verbb. u. Feuchtigkeit sein, der App. aus gegen CO widerstandsfähigem Material bestehen. — In ähnlicher Weise erhält man aus reinem oder mit Toluol denaturiertem u. durch Dest. über CaO entwässertem A. u. CO in Ggw. von NaOC₂H₅ bei 70° u. unter 120 at Druck Ameisensäureäthylester, der als Lösungsm. wertvoll ist. (A. P. 1 572 698 vom 20/5. 1925, ausg. 9/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Hans Hahl** und **Walter Kropp**, Elberfeld), *Darstellung von leichtlöslichen Schwermetallverbindungen der Iminodi- und der Nitrilotriessigsäure*, dad. gek., daß man auf diese Säuren bei Ggw. von Alkali- oder Erdalkalihydroxyden oder -carbonaten Schwermetallverbb. einwirken läßt. (Hierzu vgl. auch A. P. 1 536 711; C. 1925. II

580.) Die in W. mit neutraler bzw. schwach alkal. Rk. II., baktericid wirkenden Prodd. finden therapeut. Verwendung. Man löst z. B. *Iminodiessigsäure* (Diglykolamidsäure) w. in n. NaOH u. gibt frisch gefälltes HgO solange zu, als sich dieses noch löst, filtriert, konz. die Lsg. u. fällt mit A. Die in W. mit alkal. Rk. II. *Na-Hg-Verb.* der *Iminodiessigsäure* zers. sich beim Erhitzen über 120° u. enthält ca. 38% Hg. — Die aus *BiO(OH)*, wss. *Ca(OH)₂*-Suspension u. *Nitrilotriessigsäure* erhaltliche *Bi-Ca-Komplexverb.* der *Nitrilotriessigsäure*, in W. mit neutraler Rk. II. Pulver, gleicht in ihren Eigenschaften der *Na-Bi-Verb.* (D. R. P. 423 030 Kl. 12q vom 21/5. 1922, ausg. 18/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H., übert. von: **Rudolf Meingast** und **Martin Mugdan**, München, *Essigsäureanhydrid*. (A. P. 1 570 514 vom 6/3. 1923, ausg. 19/1. 1926. — C. 1924. I. 1590 [Schwz. P. 101 168 usw.]. 1925. 2186.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., übert. von: **Arthur Zitscher** und **Robert Schmitt**, Offenbach a. M., *Diacylessigsäurearylide*. (A. P. 1 580 709 vom 15/5. 1923, ausg. 13/4. 1926. — C. 1925. I. 1531.) SCHOTTL.

Société Chimique des Usines du Rhône, Paris, *Darstellung von Malonsäureestern*. Zu dem Ref. nach A. P. 1 524 962; C. 1925. I. 2186, ist nachzutragen, daß bei der Kondensation von *Oxalsäureäthylester* mit *Benzylacetat* erhaltliche *Oxalssäureäthylbenzylester* beim Durchleiten durch ein mit Bimsstein gefülltes u. auf 00—310° erhitztes Rohr unter 5 mm Druck in *Malonsäureäthylbenzylester*, Öl, ρ_4 145°, übergeführt wird. (D. R. P. 427 856 Kl. 12o vom 4/11. 1924, ausg. 20/4. 1926. F. Prior. 7/2. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Otto Liebknecht, Frankfurt a. M., *Blausäure aus Gasen*. (Can. P. 247 475 vom 24/7. 1924, ausg. 10/3. 1925. — C. 1925. II. 93 [F. P. 584153. Deutsche Gold- u. Silber-Scheideanstalt vorm. ROESSLER.]) KÜHLING.

Roessler & Hasslacher Chemical Co., V. St. A., *Synthesen von Gasen, besonders gasförmiger Blausäure*. Zur Ausführung der Reaktionen dienen elektr. Widerstandsöfen, die so eingerichtet sind, daß durch Nachfüllen von Widerstandsstoff der elektr. u. der Widerstand, den dieser Stoff den reagierenden Gasen bietet, in bestimmten Grenzen gehalten wird. Zur Darstellung von CNH dient ein teilweise mit Graphit gefüllter evakuierter Behälter, dessen Boden von einer massiven u. dessen Decke von einer in der Längsrichtung gelochten Elektrode durchsetzt ist, welche letztere zum Nachfüllen von Graphit (Widerstandsstoff) u. zur Zuleitung von H₂ u. N₂ dient. (F. P. 602 906 vom 3/9. 1925, ausg. 3/4. 1926.) KÜHLING.

Merrill Co., San Francisco, **Luis David Mills** und **Thomas Bennett Crowe**, also Alto, Californ., *Cyanidlösungen*. Cyanide enthaltende Lsgg. läßt man in fein verteilter Form durch einen Säure enthaltenden Gasstrom u. dann durch ein großes Luftvolumen hindurchgehen. Die HCN enthaltende Luft wird sodann durch eine alkal. Lsg. geleitet. (Aust. P. 19 666 vom 18/9. 1924, ausg. 19/3. 1925.) KAUSCH.

Les Établissements Poulenc Frères, **Ernest Fourneau** und **Jacques Trénel**, Paris, *Herstellung eines symmetrisch substituierten Harnstoffderivates*. (D. R. P. 77 857 Kl. 12o vom 9/1. 1924, ausg. 20/4. 1926. F. Prior. 14/11. 1923. — C. 1925. I. 772.) SCHOTTLÄNDER.

Société d'Études Chimiques pour l'Industrie, übert. von: **Joseph Breslauer** und **Charles Goudet**, Genf, Schweiz, *Harnstoffsalze aus Cyanamid*. (A. P. 1 572 638 vom 2/5. 1922, ausg. 9/2. 1926. — C. 1922. IV. 491.) SCHOTTLÄNDER.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Herstellung von N-aralkylierten aromatischen Aminen*, 1. dad. gek., daß man die durch Kondensation von aromat. Aldehyden, wie H₂CHO oder dessen gesätt. oder ungesätt. Seitenkettenhomologen, mit aromat. Mono- oder Polyaminen oder deren Substitutionsprodd. erhaltlichen Arylidenamine (Schiff-Basen) in Ggw. von Katalysatoren der Fe-Gruppe, welche gegebenenfalls Metalle,

Oxyde oder Salze aus der Klasse der Schwermetalle enthalten können, mit H₂ oder H₂-haltigen Gasen reduziert. — 2. dad. gek., daß man als Katalysatoren solche Gemische verwendet, welche neben zwei Metallen oder Metalloxyden oder Salzen der Fe-Gruppe noch solche Schwermetalle, Schwermetalloxyde oder Salze enthalten, die nicht der Fe-Gruppe angehören. — Die Hydrierung verläuft so glatt mit nahezu quantitativer Ausbeute ohne reduktive Spaltung der N:C-Bindung bei unterhalb 180° liegender Temp. Beispiele sind angegeben für die Red. von: *N-Benzal-p-phenetidin* in Dekahydronaphthalin gel. in Ggw. eines Cu- u. Co-haltigen Ni-Katalysators bei 90—100° unter H₂-Druck von 5 at zu *N-Benzyl-p-phenetidin*, aus A. Blättchen, F. 48°, — von: *Dibenzal-p-phenylendiamin* mit H₂ in Ggw. desselben Katalysators unter Druck bei 100° zu s. *N-Dibenzyl-p-phenylendiamin*, aus A. schwach gelbe Blättchen, F. 102°, ll. in der üblichen organ. Lösungsmm. in der Wärme, bildet mit HCl u. H₂SO₄ in k. W. wl. Salze — sowie von: *Cinnamyliden-p-phenetidin* in Hexahydrotoluol gel., in Ggw. eines Ni-Cu-Katalysators mit H₂ unter Druck bei ca. 100° zu *N,γ-Phenylpropyl-p-phenetidin*, aus eiskaltem CH₃OH Nadelchen, F. 34°, Kp.₁₄ 230—235°, ll. in den gewöhnlichen organ. Lösungsmm.; *Chlorhydrat* u. *Sulfat* in k. W. wl. (D. R. P. 423 132 Kl. 12q vom 4/3. 1924, ausg. 19/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., (Erfinder: **Ludwig Lautenschläger**, **Karl Streitwolf**, Frankfurt a. M., und **Alfred Fehrle**, Bad Soden a. Taunus), *Darstellung von Derivaten aromatischer Arsenverbindungen und deren Metallkomplexverbindungen*, 1. dad. gek., daß man in die NH₂-Gruppen von 3,3'-Bismethyl- bzw. -äthylamino-4,4'-dioxyarsenobenzolen saure Reste einführt u. gegebenenfalls die so erhaltenen Verbb. mit Metallsalzen oder Metalloxyden behandelt. — 2. darin bestehend, daß man 3,3'-Bismethyl- bzw. -äthylamino-4,4'-dioxyarsenobenzole mit Metallsalzen oder Metalloxyden behandelt u. hierauf gegebenenfalls in bekannter Weise in die NH₂-Gruppen der erhaltenen Verbb. saure Reste einführt. — 3. darin bestehend, daß man Bisalkylaminodioxyarsenobenzole, die nur mit sauren Resten beladen sind auf solche, die nur mit Metallen oder sowohl mit Metallen als auch sauren Resten beladen sind, einwirken läßt. — Z. B. wird *Bismethylaminodioxyarsenobenzolchlorhydrat* in wss. NaOH gel. u. *Formaldehydsulfoxylat* zugegeben. Man erwärmt 1/2 Stde. auf 55° filtriert u. leitet CO₂ bis zur neutralen Rk. auf Phenolphthalein ein, gießt in A. u. fällt mit Ä. das gelbe in W. u. physiol. NaCl-Lsg. gut l. *Sulfoxylat*. Die wss. Lsg. gibt mit HC einen gelblichen Nd. der *freien Säure*, die durch Na₂CO₃- oder NaHCO₃-Lsg. wieder gel. wird; Indigosulfosäurelsg. wird von der wss. Lsg. des Sulfoxylats entfärbt. — Durch Einw. von H₂SO₃ u. CH₂O auf *Bismethylaminodioxyarsenobenzolchlorhydrat*, Lösen des blaßgelben Nd. in wss. Na₂CO₃-Lsg. u. Fällung mit A. u. Ä. erhält man die *Monoformaldehyddisulfitverb.* des 3,3'-Bismethylamino-4,4'-dioxyarsenobenzols, blaßgelbliches in W. l., in A. u. Ä. unl. Pulver. — Durch Behandeln der *Monoformaldehyddisulfitverb.* mit weiteren Mengen CH₂O u. H₂SO₃, sowie Fällung der Na₂CO₃-Lsg. mit A. u. Ä. entsteht die *Diformaldehyddisulfitverb.* Die verd. wss. Lsg. wird durch HCl nicht gefällt. — *Komplexe Ag-Verb.* des 3,3'-Bismethylamino-4,4'-dioxyarsenobenzolnatriums, braunes, in W. mit brauner Farbe l., in A. u. Ä. unl. Pulver, aus der wss. Lsg. fällt CO₂ das freie *Phenol*, das durch NaOH oder Na₂CO₃ wieder gel. wird, gewinnt man durch Einw. von AgNO₃ auf salzsaures *Bismethylaminodioxyarsenobenzol*, Behandeln der braunen Lsg. mit 2-n. H₂SO₄ u. Lösen des gelben *Sulfats* in NaOH. — Durch Einw. von *Formaldehyddisulfitnatrium* auf die wss. Lsg. der *komplexen Ag-Verb.*, Einleiten von CO₂ in die Lsg. u. Fällung mit A. entsteht die *N-Methylschwefligsäure* der *komplexen Ag-Verb.* des 4,4'-Dioxy-3,3'-bismethylaminoarsenobenzolnatriums, braunes Pulver, l. in W. — Dies vereinigt sich mit dem *Bismethylaminodioxyarsenobenzolformaldehydsulfoxylat* zu einem *Komplexverb.*, braunes, in W. l. Pulver. — Eine ebenfalls in W. ll., braune *Komplexverb.* entsteht aus der *komplexen Ag-Verb.* des 3,3'-Bismethylamino-4,4'-dioxyarsenobenzolnatriums u. dem *Bismethylaminodioxyarsenobenzolformaldehydsulfoxylat*. — B.

handelt man eine Lsg. des *Bismethylaminodioxarsenobenzols* in wss. NaOH mit $\text{Cl}\cdot\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$ u. KJ 6 Stdn. unter N_2 bei 60—65°, läßt 12 Stdn. stehen u. fällt mit $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ lie mit CO_2 gesätt. braungelbe Lsg., so erhält man die *N-Essigsäure* des *3,3'-Bismethylamino-4,4'-dioxarsenobenzols*, in NaHCO_3 u. verd. HCl l., braungelbes Pulver. — Das durch Red. der sich bei 270° zers. *3-Äthylamino-4-oxybenzol-1-arsinsäure* erhaltliche *3,3'-Bisäthylamino-4,4'-dioxarsenobenzol* gibt mit *formaldehydsulfoxylsaurem Na* in analoger Weise wie oben eine *Formaldehydsulfoxylatverb.* u. mit CH_2O u. H_2SO_3 (je 1 bzw. 2 Moll.) eine *Mono-* bzw. *Diformaldehyddisulfitverb.* von ähnlichen Eigenschaften wie die Bismethylaminoderivv. Die Prodd. finden therapeut. Verwendung. (D. R. P. 23 036 Kl. 12q vom 17/4. 1923, ausg. 22/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Verein für Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig a. E., Tschechoslowakei, *Herstellung von Nitrophenolalkyläthern.* Man erhitzt Nitrochlorsubstitutionsprodd. der aromat. Reihe unter gewöhnlichem oder erhöhtem Druck mit Alkoholen. Alkalihydroxyden in Ggw. von Komplexverb. des CuO mit mehrfach hydroxyerten Verb. — Durch diesen Zusatz wird der Ersatz des Halogenatoms durch die Alkylgruppe zur Hauptrk., während die B. von Dihalogenazo- u. -azoxyverb. fast gänzlich vermieden wird. Z. B. gibt man zu einer Lsg. von Cu_2Cl_2 , Glycerin u. NaOH in CH_3OH *1,4-Dichlor-2-nitrobenzol* u. erhitzt bis zur Beendigung der Rk. unter Rückfluß, verd. hierauf mit wenig W., dest. den überschüssigen CH_3OH ab, reinigt den festen Rückstand durch Auskochen mit W. u. reinigt das in fast quantitativer Ausbeute entstandene *1-Chlor-2-nitro-4-methoxybenzol* durch Umkrystallisieren. — Durch Erhitzen von *p-Nitrochlorbenzol* mit einer Lsg. von Cu_2Cl_2 oder H_2SO_4 , Glycerin u. NaOH in A. im eisernen Autoklaven auf 100° erhält man fast quantitativ *p-Nitrophenetol*, E. 56—57°, neben geringen Mengen *p-Nitrophenol*. (A. P. 602 977 vom 7/9. 1925, ausg. 6/4. 1926.)

SCHOTTLÄNDER.

Seydel Chemical Co., New York, übert. von: **Paul Seydel**, Jersey City, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von Benzoessäure aus Toluol.* Man behandelt Toluol in Ggw. von Oxyden des Mn als Katalysator mit HNO_3 unter Druck bei 70—110°. — Z. B. gibt man zu 35%ig. HNO_3 Toluol u. etwas MnO_2 , erhitzt allmählich im Autoklaven auf 1—90°, wobei der Druck ansteigt u. hält hierbei unter zeitweisem Einleiten von O_2 Abblasen der Abgase 6—7 Stdn. Gegebenenfalls wird letzteres innerhalb 24 Stdn. 4—mal wiederholt, wobei der Druck ansteigt u. die Temp. sich auf 110° erhöht. Man läßt erkalten, entfernt aus der M. die Abfallsäure, neutralisiert mit NaOH oder Na_2CO_3 , wäscht die *Benzoessäure* mit einer Mineralsäure aus, wäscht auf einem säurefesten Filter, zentrifugiert den Filterkuchen, trocknet u. sublimiert das Prod. Die Ausbeute beträgt 70—80% der Theorie. (A. P. 1 576 999 vom 16/7. 1921, ausg. 16/3. 1926.)

SCH. **Vladimir Isájev**, Tschechoslowakei, *Herstellung von Estern des Borneols aus Toluol oder dieses enthaltenden Gemischen.* Man löst den bzgl. Ausgangsstoff in Alkyläthern derjenigen Säuren, mit denen die Veresterung erfolgen soll, u. gibt dann die entsprechende freie Säure u. gegebenenfalls einen Katalysator hinzu, worauf mehrere Stdn. auf höhere Temp. erhitzt wird. — Als Katalysatoren eignen sich Floridin oder Metallchloride, wie ZnCl_2 oder AlCl_3 . Bei Anwendung der letzteren muß man vor der Fraktionierung des Reaktionsprod. geringe Mengen von Alkalisalzen der zur Veresterung verwendeten Säuren zugeben, um eine schädliche Einw. der Metallchloride auf die Ester des Borneols zu verhindern. Die Alkylester der Benzoessäure, Salicylsäure oder mehrbas. Säuren, wie Oxalsäure, Phthalsäure, Tetrachlorphthalsäure, u. gute Lösungsm. für die entsprechenden Säuren u. mischen sich vollständig mit dem Pinen oder Gemischen aus Pinen u. Camphen. Die unter gewöhnlichem Druck erfolgende Veresterung verläuft wesentlich schneller als bei Verwendung der üblichen organ. Lösungsm. u. liefert höhere Ausbeuten. Außerdem erfolgt die Trennung des Reaktionsprod. vom Alkylester leichter u. vollständiger. Man erhitzt B. ein Gemisch von reinem *Terpentinöl* u. Benzoessäuremethyl- oder -äthylester

auf 100—110°, gibt unter Rühren *Benzoessäure* bis zur vollständigen Lsg. u. geringe Mengen *Floridin* hinzu, steigert die Temp. allmählich auf 150°, hält hierbei 2 Stdn. gibt weitere Mengen *Benzoessäure* u. Katalysator hinzu u. erhitzt 2 Stdn. auf 170° bis 180°. Nach dem Erkalten wird der Katalysator u. überschüssige *Benzoessäure* abfiltriert u. das Filtrat im Vakuum fraktioniert. Der entstandene *Benzoessäurebornylester* kann in üblicher Weise verseift u. das *Borneol* mit guter Ausbeute zu *Campher* oxydiert werden. — Analog lassen sich aus *Terpentinöl* u. *Salicylsäure* in Ggw. von *Floridin* u. einem Alkylester der Säure bei 125—130° der *Salicylsäurebornylester* u. aus *Pinen* oder einem Gemisch von *Pinen* u. *Camphen* u. *Phthalsäure* in Ggw. von *Floridin* u. einer Phthalalkylestersäure bei 130° die entsprechenden *Borneolester* gewinnen. (F. P. 603 281 vom 21/7. 1925, ausg. 12/4. 1926. Tschechoslowak. Prior. 22/7. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Wilhelm Eichholz und **Otto Dalmer**, Darmstadt, In Öl lösliche Wismutverbindung (A. P. 1 580 592 vom 26/11. 1924, ausg. 13/4. 1926. — C. 1926. I. 2841 [Schw. P. 113456].) SCHOTTLÄNDER.

Earl B. Putt, New York, V. St. A., Gewinnung von amorphem Phenolphthalein aus krystallinischem. Man löst reines krystallin. Phenolphthalein in verd. wss. NaOH bei 15°, verd. mit W. u. gibt nacheinander verd. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ u. verd. HCl oder eine andere Mineralsäure allmählich, unter starkem Rühren hinzu, bis das Phenolphthalein vollständig ausgefällt ist. Die Temp. soll hierbei unterhalb 40° gehalten werden. Nach 1-stdg. Stehen wird filtriert u. das Phenolphthalein 8 Stdn. bei 100° getrocknet. Das amorphe, rein weiße Prod. schm. oberhalb 258°, ist in Alkali u. A. leichter l. als das krystallin. Phenolphthalein, wird leichter resorbiert u. hat demgemäß eine stärkere purgierende Wrkg. (A. P. 1 574 934 vom 10/7. 1925, ausg. 2/3. 1926.) SCHOTTL.

The Newport Co., Carrollville, Wisconsin, übert. von: **Ivan Gubelmann** und **John M. Tinker**, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Herstellung von 1-Amino-8-oxynaphthalinsulfosäuren. Das bekannte Verf. der Alkalischemelze von 1-Aminonaphthalindi- u. -trisulfosäuren, mit mindestens einer SO_3H -Gruppe in 8-Stellung unter Druck wird in Ggw. von wss. NH_3 ausgeführt. — Hierdurch wird eine Abspaltung der NH_2 -Gruppe u. deren Ersatz durch OH fast ganz vermieden. Beispiele sind angegeben für die Herst. der 1-Amino-8-oxynaphthalin-4-sulfosäure aus der 1-Aminonaphthalin-4,8-disulfosäure, — der 1-Amino-8-oxynaphthalin-2,4-disulfosäure aus der 1-Aminonaphthalin-2,4,8-trisulfosäure, — sowie der 1-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosäure aus der 1-Aminonaphthalin-3,6,8-trisulfosäure. (A. P. 1 573 056 vom 9/5. 1925, ausg. 16/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies Établissements Kuhlmann, Paris, Perylen. (E. P. 226 492 vom 2/9. 1924, ausg. 11/2. 1925. Prior. 20/12. 1923. — C. 1926. I. 428 [F. P. 28 528].) SCHOTTLÄNDER.

Hans Pereira, Wien, übert. von: **Alois Zinke** und **Hermann Schöpfer**, Graz, Herstellung von Perylen. (Can. P. 250 414 vom 29/6. 1923, ausg. 2/6. 1925. — C. 1926. I. 1869 [E. P. 199401].) SCHOTTLÄNDER.

Joseph Michelman, Boston, Massachusetts, V. St. A., Verfahren zur Gewinnung von Pyrrol, dessen Derivaten und Pyrokoll aus tierischen Abfallstoffen. Man unterwirft Kollagen enthaltendes tier. Gewebe, wie Häute, Lederfellschäpe, Fleischfaser die frei von Glycerin u. Fetten sein müssen, der trockenen Dest. unter Luftausschluss kondensiert das Destillat, trennt die ölige, teerhaltige Schicht von der wss. u. b. handelt erstere mit einem organ. Lösungsm. — Z. B. werden die kollagenhaltigen Stoffe, nach Vorbehandlung mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$, gebündelt u. unter Luftabschluss bis zu beginnenden Verkohlungen trocken dest. Das Destillat scheidet sich nach einigem Stehen in 2 Schichten. Die wss., NH_3 -Deriv. enthaltende Schicht wird abgetrennt u. die teerartige Schicht mit Toluol, Xylol oder Naphtha versetzt. Hierbei scheidet sich

das *Pyrokoll* in schwach bräunlichen Krystallen aus u. wird abfiltriert. Das Filtrat wird der fraktionierten Dest. unterworfen. Die bis zu 200° sd. Fraktion, enthaltend Toluol u. *Pyrrrol*, wird mit festem KOH versetzt u. gelinde erwärmt, wobei sich die K-Verbb. des *Pyrrrols* u. substituierter *Pyrrrole* unl. abscheiden. Nach Zers. der K-Verbb. mit W. erhält man die *Pyrrrole* als ölige, auf der KOH-Lsg. schwimmende Schicht. Die letztere dient zur Umwandlung des *Pyrokolls* in *Pyrrrol-2-carbonsäure*, aus der unter CO₂-Entw. reines *Pyrrrol* erhalten wird. Das *Pyrrrol* u. seine Substitutionsprodd. können nach Polymerisation durch H₂SO₄ u. Dampfdest. über KOH in *Indol* u. substituierte *Indole* übergeführt werden. Die bis zu 300° sd. Fraktion enthält in der Hauptsache ebenfalls *Pyrrrol*deriv., neben *KW-stoffen*. Beim Stehenlassen der Fraktion erfolgt Schichtenbildung. Die untere Schicht enthält die *KW-stoffe* u. wird abgezogen (hierzu vgl. auch Ind. and Engin. Chem. 17. 247; C. 1925. I. 2598). (A. P. 1 572 552 vom 11/11. 1924, ausg. 9/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. St. A., übert, von: **Jürgen Callsen**, Elberfeld, Deutschland, *Herstellung von basischen Äthern der Chinolinreihe*. Man behandelt Halogenalkylchinoline mit Aminoalkoholen. — Z. B. wird in Xylol gel. *Dimethylaminoäthylalkohol* mit metall. Na versetzt u. nach dem Abkühlen *2-Chlor-4-methylchinolin* dazugegeben. Beim Erhitzen auf 100° scheidet sich NaCl ab. Nach mehrstd. Erhitzen wird mit W. u. verd. HCl versetzt, wobei das Chlorhydrat des bas. Äthers gel. wird. Man macht alkal. u. dest. im Vakuum. Der *2-Oxy-4-methylchinolindimethylaminoäthyläther*, nahezu farblose Fl., Kp.₁₀ 175—178°, ist in A., Ä., Aceton l., unl. in W.; *Dichlorhydrat*, Krystalle, F. 162—164°, u. *Monochlorhydrat*, Krystalle, F. 190—191°, ind in W. l. — Der aus *2-Chlor-4-methylchinolin* u. *Piperidinoäthylalkohol* erhältliche *2-Oxy-4-methylchinolinpiperidinoäthyläther* ist ein gelbliches Öl, Kp.₁₇ 232—234°, l. in A., Ä., Bzl., Aceton, nahezu unl. in W.; *Dichlorhydrat*, Krystalle, F. 186—187°. — *Methyl-4-oxychinolindimethylaminoäthyläther*, aus *4-Chlor-2-methylchinolin* u. *Diethylaminoäthylalkohol* gewonnen, Öl, Kp.₁₀ 190°, l. in Ä., Aceton u. Bzl. Die wss. Lsgg. der Chlorhydrate finden in Form von subcutanen Injektionen gegen Herzkrankheiten therapeut. Verwendung. (A. P. 1 572 768 vom 26/6. 1925, ausg. 9/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

The Lambert Thorp Co., übert, von: **Lambert Thorp**, Cincinnati, Ohio, V. St. A., *Herstellung von C,C-i-Propyläthylbarbitursäure*. *i-Propyläthylmalonsäureester* wird mit Ammoniakstoff unter gewöhnlichem Druck in absol. alkoh. Lsg. in Ggw. von NaOC₂H₅ als Katalysator, ohne Rückflußkühlung auf ca. 107° erhitzt. — Man vermischt z. B. *Harnstoff* mit einer auf 30—40° erwärmten Lsg. von metall. Na in absol. A., gibt dann *Propyläthylmalonsäurediäthylester* hinzu u. erhitzt das Ganze im CaCl₂-Bade auf ca. 107°. Hierauf dest. man den A. ab, wobei auch etwas NH₃ übergeht, u. löst den letzten Rückstand in W., filtriert gegebenenfalls u. versetzt die Lsg. bis zur kongosauren k. mit HCl. Der Nd. wird abfiltriert u. mit k. W. mineralsäurefrei gewaschen. Die wss. Lsg. h. W. umkrystallisierte *i-Propyläthylbarbitursäure* schm. unkor. bei 197°, korr. bei 200—201°. Das Verf. liefert sehr hohe Ausbeuten, da Zers. fast ganz vermieden werden. (A. P. 1 576 014 vom 20/3. 1925, ausg. 9/3. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *Allylbarbitursäure*. Zu dem Ref. nach A. P. 1511919; C. 1925. I. 904 ist nachzutragen, daß man den *Crotylallylmalonsäurediäthylester*, angenehm riechende Fl., Kp.₁₅ 132°, durch Kondensation von *Monoallylmalonsäurediäthylester* mit *Crotylbromid* in Ggw. von NaOC₂H₅ erhalten kann. (Schwz. P. 113 051 vom 14/7. 1924, ausg. 16/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Georg Reichelt, Berlin, *Herstellung huminsaurer Salze*, gek. dad., daß beim Auswaschen der nach der Auflösung der huminsäurehaltigen Mineralien verbleibenden Rückstände auf einem Filter diesem zur Förderung der Filtration zeitweise Fl. von Wasser zugesetzt wird. — Es gelingt auf diese Weise, die in den Rückständen enthaltenen

l. huminsäuren Salze bis auf einen Bruchteil zu gewinnen. Als Filter dient ein solches aus Kies, zum Auswaschen W. (D. R. P. 424 729 Kl. 12o vom 19/11. 1924, ausg. 1/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

XIII. Ätherische Öle; Riechstoffe.

A. R. Penfold, *Über das ätherische Öl von Backhousia sciadophora* (n. o. myrtaceae) (F. v. M.). Die Blätter u. Endzweige dieses an der Nordküste von Neu-Süd-Wales u. Queensland weit verbreiteten Baumes lieferten bei der Dampfdest. nur ca. 0,3% eines dunkelbraunen äth. Öls mit folgenden Eigenschaften (zwei verschiedene Sorten): D.₁₅¹⁵ 0,8802 u. 0,8799, $n_D^{20} = 1,4717$ u. 1,4704, $[\alpha]_D = +34,2^\circ$ u. $+33,7^\circ$, EZ. 14,64 u. 27,52, nach Acetylierung 54,24 u. 44,45, unl. in 10 Voll. 80%ig. A. Das Öl besteht zu 80—85% aus *d*- α -Pinen. Aus dem Rest wurden isoliert: 1. Ein Sesquiterpen von Kp.₁₀ 130—135°, D.₁₅¹⁵ 0,9322, $n_D^{20} = 1,4960$, $[\alpha]_D = +9^\circ$; gibt mit Br in Eg. u. mit H₂SO₄ in Acetanhydrid die Farbrkk. der Myrtaceensesquiterpene u. ähnelt sehr dem Aromadendren. 2. Ein Sesquiterpenalkohol. 3. Caprylsäure (im äth. Öl als Ester enthalten). 4. Ein Phenol; wird dem rohen äth. Öl mit 5%ig. NaOH in einer Menge von 1,3% entzogen, zeigt $n_D^{20} = 1,5034$ u. gibt eine dunkelbraune FeCl₃-Rk. (Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales 58. 113—16. 1924.) LINDENBAUM.

A. R. Penfold und R. Grant, *Über den keimtötenden Wert der reinen Bestandteile von australischen ätherischen Ölen sowie einiger anderer Ölbestandteile und synthetischer Substanzen*. II. Vff. haben für eine Anzahl genannter Substanzen die RIDEAL-WALKER-Koeffizienten festgestellt (Tabelle im Original). Der Koeffizient wächst mit dem Dispersitätsgrad der Substanz. Die in der 1. Mitt. aufgestellte Behauptung, daß für Ester der Koeffizient nur von dem Säureradikal abhängt, ist nur teilweise richtig. (Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales 58. 117—23. 1924.) LB.

A. R. Penfold und F. R. Morrison, *Notiz über Eucalyptus piperita und seine ätherischen Öle, besonders über seinen Gehalt an Piperiton*. I. (Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales 58. 124—27. 1924. — C. 1925. II. 1714.) LINDENBAUM.

A. R. Penfold, *Über die ätherischen Öle von Melaleuca erubescens* (Otto) und *M. hypericifolia* (Smith). Kurzes Ref. vgl. C. 1925. II. 1715. Nachzutragen ist: Die äth. Öle von *M. erubescens* besitzen $n_D^{20} = 1,4656$ —1,4676. — Äth. Öle von *M. hypericifolia*. Ausbeute 0,16—1,66%; Gehalt an Cineol 64—86%. (Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales 58. 182—88. 1924.) LINDENBAUM.

A. R. Penfold, *Über das ätherische Öl von Boronia saffrolifera* (Cheel). Gesamtausbeute an rohem, gelb gefärbtem äth. Öl 1,45%. Während der Dampfdest. schwimmt ein geringer Anteil (0,26%) auf dem W., während der Rest (1,19%) zu Boden sinkt. Leichter Anteil: D.₁₅¹⁵ 0,9805, $n_D^{20} = 1,5016$, $[\alpha]_D = +5,42^\circ$. Schwerer Anteil D.₁₅¹⁵ 1,045, $n_D^{20} = 1,5216$, $[\alpha]_D = +3,42^\circ$. Gesamtöl: D.₁₅¹⁵ 1,034, $n_D^{20} = 1,5180$, $[\alpha]_D = +3,79^\circ$. Die Hauptbestandteile sind *d*- α -Pinen, Saffrol (70—75%) u. Eugenol-methyläther. Außerdem wurden isoliert ein Phenol (0,42%) u. ein Paraffin (sehr wenig vom F. 64—65°). (Journ. and Proc. Roy. Soc. New South Wales 58. 230—33. 1924. Sydney, Technol. Museum.) LINDENBAUM.




I. Bischoff, *Ein Beitrag zur Frage des deutschen Terpentins*. Ein untersuchtes deutsches Terpentinsöl ergab bei der Analyse weitgehende Übereinstimmung mit den für Auslandsterpentinsöle gewöhnlichen Werten. Auch bei der prakt. Prüfung ergab sich Eignung für die Herst. verseifter u. unverseifter Schuhcreme u. Bohnermassen, für Lack- u. Anstrichfarben u. zur Walzenreinigung in Buchdruckereien. Die Forderung, daß 80% des Öles bis 160° überdestillieren sollen, ist nicht mehr zeitgemäß. (Farben-Ztg. 31. 1517. Berlin-Wilmersdorf.) SÜVERN.

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Deutschland, *Verbesserung der bei der Herstellung von synthetischem Campher entstehenden Terpentinsöle und seine*

Fractionen. Man behandelt die Ausgangsprodd. mit oxydierenden Mitteln oder mit Säuren oder Alkalien oder mit Halogenen in der Kälte oder Wärme u. gegebenenfalls unter Anwendung von Druck u. in Ggw. eines Katalysators. (**F. P. 603 375** vom 10/9. 1925, ausg. 14/4. 1926. D. Priorr. vom 12/9. 1924 u. 25/7. 1925.) OELKER.

Emile Bindschedler, Philadelphia, Pa., V. St. A., übert. von: **Friedrich Bräunlich**, Aussig, Tschechoslovakei, *Wasserlösliche ätherische Öle und Parfüme.* (**A. P. 1 580 952** vom 17/12. 1921, ausg. 13/4. 1926. — C. 1924. I. 2642.) OELKER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Ludwig Taub**, **August Wingler**, Elberfeld, und **Werner Schulemann**, Vohwinkel-Hammerstein), *Darstellung von Rhodinol* (3,7-Dimethylokten-6-ol-1), dad. gek., daß man Mg-Methylheptenylhalogenid u. Derivv. des Äthylenglykols, wie Äthylenoxyd oder Äthylenhalogenhydrine, aufeinander einwirken läßt u. die so erhältlichen Organomagnesiumverb. in üblicher Weise zers. — Die Rk. verläuft im Sinne nachstehender Gleichungen:



Z. B. läßt man zu *Methylheptenol* unter Kühlung PBr₂ fließen, gießt nach 24 Stdn. auf Eis, wäscht mit W. u. verd. Na₂CO₃-Lsg. neutral u. dest. das über CaCl₂ getrocknete *Methylheptenylbromid*, klare, farblose Fl. von aromat. Geruch, Kp.₂₀ 89°, unter vermindertem Druck. Hierauf läßt man zu Mg-Spänen unter Kühlung ein Gemisch des *Bromids* u. trockenen Ä. fließen u. tropft nach beendeter Einw. unter guter Kühlung *Äthylenoxyd* ein, rührt nach 2 Stdn., gießt auf mit CH₃CO₂H versetztes Eiswasser, hebt die äth. Lsg. ab, wäscht sie neutral, verdampft den Ä. u. dest. den Rückstand im Vakuum. Das *Rhodinol* wird so ohne Nebenprodd. als farblose Fl., Kp.₁₄ 113—115°, von angenehmem, feinem Rosengeruch erhalten. (**D. R. P. 423 544** Kl. 12o vom 10/1. 1924, ausg. 9/1. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

G. L. Alexander, *Angaben über die Verwendung von Monocalciumphosphat als Mittel zur Verbesserung von Biskuitmehl aus weichem Weizen.* Das Monocalciumphosphat ist ein feines, weiches, weißes Pulver, ll. in W., p_H-Wert 4,0. Es wird wegen seiner stark sauren Rk. gewöhnlich als saurer Anteil von Backpulvern verwendet. Das Salz, das Vf. zu seinen Verss. gebrauchte, enthielt (%): freie Phosphorsäure 1,00, Monocalciumphosphat 98,65, CaSO₄ 0,58, Fe- u. Al-Phosphat 0,50, Feuchtigkeit 0,27, Gesamt-P₂O₅ 55,10. Der Neutralisationswert in Einheiten NaHCO₃ bezogen auf 100 Teile des Phosphats war: k. Probe 75,9, Siedeprobe 82,0 u. nach ihm den natürlichen Bedingungen der Verwendung nahe kommenden Verf. 80,1. Von Bedeutung ist eine große Feinheit des Salzes, seine Farbe ist von geringerer Bedeutung. Es ist allgemein anerkannt, daß das Salz auf Hefe anregend wirkt u. die Backfähigkeit schwacher Mehle verbessert. Die Unterss. über das Lagern von Mehlen, die mit dem Salze versetzt sind, ergaben, daß sich gesunde Mehle beim Lagern über eine übliche Zeit u. unter n. Bedingungen nicht verschlechtern, wenn

sie mit nicht mehr als 1% Monocalciumphosphat behandelt worden sind. Zu den Backverss. hat Vf. nur Mehle, die 1% oder weniger des Salzes enthielten, verwendet. Die Zus. des Teiges war (g): Mehl 227,00, Phosphat 4,65, Soda 3,50, NaCl 4,00, Schweinefett 1½ Tafellöffel u. Magermilch soviel als zur Erzielung eines Teiges von geeigneter Zähigkeit erforderlich war. Die sorgfältig ausgeführten Backverss. zeigten gegenüber unbehandelten Mehlen eine beträchtliche Verbesserung der Backfähigkeit der Mehle, die einen Zusatz von 0,5% Phosphat erhalten hatten. Die Güte des Teiges, das Biskuitvol., die Beschaffenheit der Krume u. die Farbe waren sämtlich verbessert; weitere Verbesserung zeigten Mehle mit 1% Phosphat. Wurde anstelle des Phosphats 1 ccm 93%ig. Milchsäure (Sauermilchbiskuits) verwendet, so wurden noch bessere Biskuits als mit Phosphat erhalten, indes bedingte die Milchsäure nicht wie das Phosphat eine Zunahme der Absorptionsfähigkeit des Teiges, sodaß die phosphatierten Teige zäher u. leichter zu bearbeiten waren. Aus den mit Phosphat u. mit Milchsäure versetzten Mehlen war das Gluten nur schwierig abzuschneiden. Weitere Verss. ergaben, daß Monocalciumphosphat in Teigen zu einer Vermehrung der [H] u. der Werte für die Pufferstoffe führt, u., wie zu erwarten war, auch der Menge der l. Proteine; weiter wurde eine Abnahme der Viscosität bemerkt, vielleicht infolge unvollkommenen Entfernens der Elektrolyte in den phosphatierten Mehlen. Weitere Bemerkungen betreffen die Einw. der Backpulverreste, die sich in Richtung einer Verminderung der [H] des Teiges u. der Zwiebacke erstreckt. Nach Vf. wirkt selbst ein nur geringer Überschuß an Alkali schädigend, während 1% saures Phosphat ohne Schaden gebraucht werden kann. Es empfiehlt sich deshalb, stark saure Backpulver zu verwenden. (Cereal Chemistry 2. 370—79. 1925. St. Louis [Mo.].) RÜHLE.

A. Beythien und H. Hempel, *Über die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes der Stadt Dresden im Jahre 1925*. Bericht über die Unterss. von Fleisch, Würsten, Eikonserven, Milch u. Molkereiprodukten, Käse, Margarine, Speisefetten usw. (Pharm. Zentralhalle 67. 257—61. 276—79. Dresden.) ROJAHN.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt, *Konservierung von grünen Pflanzenstoffen*, dad. gek., daß sie gleichzeitig oder abwechselnd mit Dampf oder erhitzten Gasen u. mit dem elektr. Strom behandelt werden. — Es wird ein sehr rasches Anwärmen des Futters auf die erforderliche Temp. von 50° in billiger Weise erzielt. (D. R. P. 415 169 Kl. 53g vom 25/11. 1921, ausg. 14/7. 1925.) OELKER.

O. Meyer-Keller & Co., Luzern (Schweiz), *Halbarmachen von pflanzlichen Stoffen, insbesondere safthaltigem Grünfutter mittels des elektrischen Stromes*. Die Futtermasse wird mittels in diese eingebetteter, unisolierter, an die Klemmen einer Gleichstromquelle niedriger Spannung leicht lösbar angeschlossener Heizkörper erwärmt. — Der Anschluß der Heizkörper an die Niederspannungswicklung eines Transformators wie beim Verf. des Hauptpat., erübrigt sich. (Schwz. P. 111 267 vom 26/8. 1924, ausg. 1/8. 1925. Zus. zu Schwz. P. 106 487; C. 1926. I. 1323.) OELKER.

E. Merck, Deutschland, *Konservieren von Eiern*. Man behandelt die Eier mit Lsgg. von primären Metall-, Erdalkaliphosphaten oder Magnesiumphosphat oder mit Lsgg. von sekundären Phosphaten in Phosphorsäure oder auch mit freier Phosphorsäure. Die Eier können vorher einer Behandlung im luftverd. Raum unterworfen werden. (F. P. 603 312 vom 13/8. 1925, ausg. 13/4. 1926. D. Prior. 19/8. 1924.) OELKER.

Xavier Simon, Buenos Aires, *Konservieren von Fleisch, Früchten und Fische u. dgl.* Die zu konservierenden Nahrungsmittel etc. werden in geeigneten, eventuell evakuierten Räumen der Einw. von geschmolzenem CaCl₂ unterworfen. (Austr. P. 20 226 vom 24/10. 1924, ausg. 11/2. 1926.) OELKER.

Georges van den Abeele, Belgien, *Sterilisieren von Fischkonserven*. Die Konserven werden der Einw. ultravioletter Strahlen ausgesetzt. (F. P. 603 400 vom 17/9. 1925, ausg. 14/4. 1926.)

OELKER.

Fleischmann Co., New York, übert. von: **Charles Hoffman**, Tuckahoe, New York, *Herstellung von gesäuertem Brot*. Man setzt den üblichen Teigbestandteilen vasserlösliche Vitamine B in Form von pasteurisierter, inakt. u. getrockneter Hefe nit unversehrten Zellwandungen zu. (A. P. 1 579 447 vom 15/9. 1923, ausg. 6/4. 1926.)

OELKER.

Jacob Samuel, Wilhelm Deiss, Carl Henn und Carl Borower, Deutschland, *Herstellung künstlicher Wursthüllen*. Tier. Abfälle, insbesondere Hautabfälle, Sehnen u. dgl. werden in möglichst feiner Verteilung mit W. oder einer anderen geeigneten Fl. u. einer Emulsion verarbeitet, in welche man einen Zylinder oder dgl. eintaucht u. uf diesem nach dem Herausziehen aus der Emulsion die von ihm aufgenommene dünne Schicht trocknen läßt. Man kann die Emulsion auch auf rotierende Zylinder ießen u. auf diesen trocknen lassen. (F. P. 603 039 vom 10/9. 1925, ausg. 7/4. 1926.)

OELKER.

Soc. Française des Produits Alimentaires Azotés, Paris, *Gewinnung von Nährmitteln und Fetten*. Stickstoffhaltige Extrakte u. Öle werden aus eiweißhaltigen Substanzen, z. B. Fischen, dadurch gewonnen, daß man das Ausgangsprod. im Autoklav bei 100—120° unter Rühren kocht, das Fett von der M. trennt u. diese dann der Autolyse unterwirft. (E. P. 246 779 vom 15/4. 1925, Ausz. veröff. 31/3. 1926. Prior. 29/1. 1925.)

OELKER.

Mellemeuropaeisk Patent-Financieringsselskab, Aktieselskab, Copenhagen, übert. von: **Hugo Liebers**, Prag (Wien), *Käse mit erhöhtem Vitamingehalt*. (Can. P. 54 196 vom 4/12. 1924, ausg. 29/9. 1925. — C. 1925. I. 2420.)

KAUSCH.

IX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

S. I. Lavroff, *Das Machoninverfahren*. Besprechung des Machonin-Verf. laut P. Nr. 584 288. Verf. zum Betrieb von Verbrennungsmotoren mit schweren Ölen, getabil. Ölen, Brennöl u. anderen KW-stoffen u. spezieller Verbrennungsmotor r dieses Verf. Man kann das Patent nach der Art der Verwendung des Treiböles drei Hauptgruppen kennzeichnen: a) Treiböl wird verdampft u. im Zustande des ampfes dem Motor zugeführt; b) Treiböl wird verdampft, dann kondensiert u. im stande der Flüssigkeit dem Motor zugeführt; c) Treiböl wird verdampft u. konnsiert; die produzierte Fl. kommt nicht sofort zum Verbrauch. (Petroleum 22. 8—81. Berlin.)

REINER.

v. d. Heyden und Typke, *Einige Beobachtungen bei der Bestimmung der Verungszahl*. (Vgl. S. 1340.) Vff. schlagen vor, Transformatorenöle, die nach handlung mit Kisslingscher Lauge im Scheidetrichter teerige Ausscheidungen bilden, ht zu kaufen, u. in den Vorschriften über die Best. der Verteuerungszahl zu sagen, 8 das Niveau des Ölbadess 0,5 cm höher sein soll, als das des im Kolben befind- en Öles. (Petroleum 21. 2123. 1925. Berlin-Oberschöneweide.) BÖRNSTEIN.

Gustav Hilger, Gleiwitz, *Stückigmachen von Feinkohle* nach Pat. 423 800, dad. z., daß der Brikettierung eine an sich bekannte Mischung von Brennstoffen, ins- ondere von Braunkohle u. Steinkohle, unterzogen wird, deren bituminöse Bestand- e bei verschiedenen Temp. frei werden. — Die Stückigmachung der Feinkohle ordert nur einen geringen Verdichtungsdruck. (D. R. P. 427 855 Kl. 10b vom 11. 1924, ausg. 20/4. 1926. Zus. zu D. R. P. 423 800; C. 1926. I. 2862.)

OELKER.

James R. Rose, Edgeworth, Pa., übert. von: **John Harris**, Cleveland, Ohio, St. A., *Gasförmiger Brennstoff*, welcher aus einer Mischung von C₂H₂ u. gewöhnlichem lmgas zusammengesetzt ist u. zwar in einem solchen Mengenverhältnis, daß der

Gehalt des Gasgemisches an C_2H_2 nicht weniger als 10 u. nicht mehr als 50 Vol.-% beträgt. Der Brennstoff soll für autogene Schweiß- u. Schneidzwecke Verwendung finden. (A. P. 1 581 441 vom 2/6. 1923, ausg. 20/4. 1926.) OELKER.

Harald Nielsen, London, und **Bryan Laing**, Hatfield, Herts, Engl., *Herstellung von Generator- oder Wassergas*. (D. R. P. 427 286 Kl. 24e vom 12/4. 1924, ausg. 30/3. 1926. E. Prior. 17/8. 1923. — C. 1925. II. 119.) OELKER.

Hakol Ltd. und **John Edward Hackford**, London, *Bereitung von Ölgas*. (Aust. P. 18 853 vom 28/7. 1924, ausg. 8/1. 1925. — C. 1925. I. 2524.) OELKER.

Fred Gerald Niece, Cleveland, V. St. A., *Umwandlung schwerer Kohlenwasserstoffe in leichte*. (D. R. P. 426 881 Kl. 23b vom 15/7. 1924, ausg. 20/3. 1926. — C. 1925. II. 1647.) OELKER.

Alfred Oberle, Oak Park, Illinois, und **Thomas E. Scofield**, Kansas City, *Vanadin aus Petroleumkohlenwasserstoffen*. Man laugt die KW-stoffe mit einem Lösungsm für Vd aus u. entfernt alsdann das Lösungsm. (A. P. 1 570 170 vom 25/6. 1924, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

Naamlooze Vennootschap Bataafsche Maatschappij, Haag, Holland, übert. von **Jan Heinrich Christoph de Brey**, Haag, *Trennen der Phasen von Emulsionen, insbesondere Petroleum mit Hilfe des elektrischen Stromes*. Man verwendet einen pulsierenden Wechselstrom, der eine solche (Spitzen-)Spannung besitzt, die ein Vielfaches der wirklichen Spannung darstellt. (A. P. 1 570 209 vom 11/4. 1924, ausg. 19/1. 1926.) KAUSCH.

Standard Oil Co., San Francisco, übert. von: **Ralph A. Halloran**, Berkeley, **William N. Davis**, Oakland, und **George A. Davidson**, San Francisco, *Aufarbeitung der Abfallsäure von der Petroleumreinigung*. Die Abfallsäure wird in einer geschlossenen Retorte bei einem Druck von über 50 Pfund auf den Quadratzoll bis zur Hydrolyse temp. erhitzt, wobei sich eine verhältnismäßig verd. klare H_2SO_4 u. ein fl. Brennstoff bildet, die von einander getrennt werden. (A. P. 1 579 607 vom 6/9. 1923, ausg. 6/4. 1926.) KAUSCH.

Producers and Refiners Corporation, Wyoming, übert. von: **Harold L. Kaufman**, Parco, Wyoming, *Mittel zum Reinigen und Entfärben von Ölen*, welches dadurch erhalten wird, daß man ein Hydroaluminiumsilicat fein vermahlt, das Pulver mit verd. Säure (H_2SO_4) kocht u. dann auswäscht. (A. P. 1 579 326 vom 27/5. 1924, ausg. 6/4. 1926.) OELKER.

Carl Alfred Braun, *Herstellung stabiler wässriger Emulsionen von hochmolekularen Kohlenwasserstoffen, wie Asphalt, Ozokerit, Wachsen, Ceresin u. dgl.* Man bereitet aus einem kleinen Teil der Substanz, welche mit W. emulgiert werden soll, mit Hilfe von alkal. W. eine Emulsion u. gibt zu dieser dann die Hauptmenge der zu emulgierenden Substanz u. alkal. W. unter Rühren hinzu. (F. P. 603 136 vom 14/9. 1925, ausg. 9/1. 1926. D. Prior. 21/3. 1925.) OELKER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Carlos Thode** und **Adolf Benischek**, Offenbach a. M.), *Transformator- und Schalteröle*, bestehend aus fl. *Triarylphosphaten*. — Gegenüber den bisher für den gleichen Zweck verwendeten Mineralölen zeichnen sie sich außer durch ihre große Isolierfähigkeit durch chem. Inertheit, Differenz u. Reinheit, durch das Fehlen von Teer u. S, hohen Flamm- u. niedrigen Gefrierpunkt, sowie durch hohes spezif. Gew. aus. (D. R. P. 427 744 Kl. 23c vom 12/4. 1925, ausg. 16/4. 1926.) OELKER.

James W. Weir, Fillmore, Calif., V. St. A., *Reinigen von Schmieröl*. Man behandelt das Öl mit H_2SO_4 , entfernt den sich ausscheidenden Schlamm, vermischt das Öl mit einem Adsorptionsmittel (Fullererde, Kieselgur u. dgl.) bei einer Temp., welche unterhalb der Zersetzungstemp. der Reaktionsprodd. des Öles mit der Säure liegt, scheidet das Adsorptionsmittel mit den von ihm aufgenommenen Verunreinigungen ab, setzt nochmals Adsorptionsmittel hinzu u. erhitzt nunmehr auf eine Temp., welche hoch genug ist, um die noch im Öl vorhandenen Verunreinigungen zu zers., gibt das

PbO hinzu, läßt absitzen u. trennt das Öl von dem Nd. (A. P. 1 581 369 vom 14/5. 1925, ausg. 20/4. 1926.) OELKER.

Jess D. Kimmel und **Ralph J. Mc Mahon**, Dayton, Ohio, *Schmiermittel*, welches aus einer Mischung von schwerem Schmieröl mit Holzfaserstoff o. dgl. besteht u. zwar in einem Mengenverhältnis von etwa 10:1. (A. P. 1 581 804 vom 8/8. 1923, ausg. 20/4. 1926.) OELKER.

Orange & Fils, Saint-Denis, Frankr., *Konsistentes Schmiermittel*, welches dadurch erhalten wird, daß man eine neutrale, wasserfreie Seife (Metall- oder Kalkseife) in einem Mineralöl löst. (Schwz. P. 113 923 vom 12/3. 1925, ausg. 16/2. 1926. F. Prior. 17/9. 1924.) OELKER.

Westinghouse Electric & Manufacturing Company, Pennsylvania, übert. von: **Otho V. Stewart**, Wilkinsburg, Pennsylvania, V. St. A., *Imprägnieren von Holz*. Das in geeignete Größe zugeschnittene Holz wird in einem Ofen so lange getrocknet, bis der Feuchtigkeitsgehalt 10—12% beträgt, dann in ein Bad von geschmolzenem Paraffin während 5—6 Stdn. getaucht, wobei die Temp. 130° nicht übersteigen soll, u. hierauf bei einer Temp. von 150° 3—4 Stdn. in einem zweiten Bad von geschmolzenem Asphalt belassen. — Das so behandelte Holz ist völlig wasserdicht u. eignet sich besonders zur Herst. elektr. Hochspannungsisolatoren. (A. P. 1 572 905 vom 16/12. 1920, ausg. 16/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

The Western Union Telegraph Co., New York, übert. von: **Randolph Leedom**, Clifton, New Jersey, V. St. A., *Holzkonservierung*. Man unterwirft zunächst das rohe, feuchte Holz einer oberflächlichen Verkohlung u. trägt dann ein h. Konservierungsmittel auf die noch h. Oberfläche auf. — Die Verkohlung erfolgt mittels Stichflammen, bis die Feuchtigkeit aus dem Holz ausgetrieben ist. Hierauf wird das noch h. Holz mit erhitztem Steinkohlenteercreosot durch Bürsten oder Bespritzen behandelt. Das Konservierungsmittel dringt durch die dünne, poröse, kohlige Oberschicht wesentlich tiefer in die Holzporen ein als bei den üblichen Verff. Das Verf. eignet sich besonders zur Konservierung von Telegraphenstangen. (A. P. 1 574 662 vom 4/6. 1923, ausg. 23/2. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Edward R. Brodton, Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., *Flüssigkeit für technische Zwecke*, bestehend aus reinem *Methylenchlorid*. — Das reine CH₂Cl₂ sd. oberhalb 38°, ist nicht entzündbar u. übt keine korrodierende Wrkg. auf Messing, Cu, Al u. Fe aus. Es läßt sich leicht vergasen u. findet als *Motortreibmittel*, *Feuerlöschmittel* u. *Füllmittel für Thermostaten* Verwendung. (A. P. 1 575 967 vom 20/2. 1925, ausg. 9/3. 1926.) SCHOTTLÄNDER.

Benjamin Howell Morgan, London, und **The Natalite Motor Spirit Co. of Australia, Ltd.**, Sidney, New South Wales, *Motortreibmittel*. (Aust. PP. 18 892 u. 18 893 vom 30/7. 1924, ausg. 7/5. bzw. 15/1. 1925. — C. 1925. I. 2347.) OELKER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Eisencarbonyl*. Man leitet CO bei über 50 at über reduziertes Fe in solcher Menge, daß die erhaltenen gasigen Prodd. nur 2—8% (Vol.) Eisencarbonyl aufweisen. (E. P. 244 895 vom 26/11. 1924, ausg. 21/1. 1926.) KAUSCH.

General Motors Corporation, V. St. A., *Flüssige Brennstoffe*. Man läßt gewöhnliche Brennstoffe wie Gasolin verbrennen in Ggw. einer Antichokverb. wie Pb(C₂H₅)₄ u. eines Schmiermittels, u. zwar mehr als im Motor angewendet wird. (F. P. 592 383 vom 28/1. 1925, ausg. 1/8. 1925.) KAUSCH.

XX. Schieß- und Sprengstoffe; Zündwaren.

Kurt Lehmstedt, *Die Bestimmung des Tetryls in Sprengstoffgemischen*. Anwendung der früher von LEHMSTEDT u. ZUMSTEIN (S. 182) angegebenen Methode zur Best. des Nitraminstickstoffs auf Tetranitromethylanilin u. dessen Best. in Gemischen im Nitrometer oder nach SCHULZE-TIEMANN. Die letztere Methode ist

jedoch bei einem Gehalt an Tetranitroanilin wegen der Labilität der in m-Stellung befindlichen Nitrogruppe nicht anwendbar. (Ztschr. f. angew. Ch. **39**. 379—80. Hannover, Techn. Hochschule.) KAST.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., übert. von: **Earle C. Pitman** und **George F. Hunter**, Parlin, N. J., V. St. A., *Entfärben rauchloser Pulver*. Man extrahiert das Pulver mit A., bis fast alles darin als Stabilisator enthaltene Diphenylamin entfernt ist, unterwirft es alsdann der Einw. von verd. HCl u. extrahiert es schließlich nochmals mit A. (**A. P. 1577 075** vom 20/11. 1922, ausg. 16/3. 1926.) OELKER.

James C. Vickery, Evansville, Indiana, und **Merle H. Davis**, Fort Bragg, North Carolina, V. St. A., *Trocknen von rauchlosem Pulver*. Zur Entfernung flüchtiger Lösungsm. aus rauchlosen Pulvern leitet man über diese bei erhöhter Temp. ein gasförmiges Medium, z. B. Luft, welches teilweise mit dem Dampf des zu entfernenden Lösungsm. gesätt. ist. Man scheidet dann eine solche Menge des Lösungsm. aus dem gesätt. Gasgemisch ab, daß es wieder die ursprüngliche Zus. hat u. wiederholt den Prozeß. (**A. P. 1579 262** vom 29/2. 1924, ausg. 6/4. 1926.) OELKER.

Les Petits Fils de François de Wendel & Cie., übert. von: **Wilhelm Weber**, Haingen, Frankreich, *Sprengladungen aus flüssigem Sauerstoff oder Luft*. (**Can. P. 253 936** vom 15/2. 1924, ausg. 22/9. 1925. — C. 1924. I. 2486.) KAUSCH.

Les Petits Fils de François de Wendel & Cie., Hayange (Frankr.), (Erfinder: **W. Weber**), *Sprengladung*. (**Schwed. P. 57327** vom 16/6. 1920. E. Prior. 25/10. 1915. — C. 1924. I. 528.) OELKER.

W. F. Hutchinson und **B. O. Carn, jr.**, Winter Haven, Florida, übert. von: **Henry D. Schmidt**, Lake Alfred, Florida, *Mittel zum Behandeln von Zündhölzern*, welches aus einer Mischung von $\frac{1}{3}$ Pfund Bienenwachs, $\frac{1}{4}$ Pfund Siegelack, $\frac{1}{2}$ Pfund Kautschukkitt u. Gasolin besteht. In diese breiartige M. werden die Zündholzköpfe eingetaucht, wodurch sich ein feiner Überzug auf ihnen bildet, welcher die Zündmasse vor Feuchtigkeit schützt. (**A. P. 1579 401** vom 13/10. 1925, ausg. 6/4. 1926.) OE.

Hans Rathsburg, Fürth, Bayern, *Initialzündsätze*, welche aus bas. Salzen von Tetrazolverbb., z. B. bas. Pb-Salzen des Tetrazols, bestehen. (**A. P. 1580 572** vom 3/8. 1922, ausg. 13/4. 1926.) OELKER.

Trojan Powder Co., New York, übert. von: **Walter O. Snelling**, Allentown, Pa., V. St. A., *Sprengstoff*, welcher im wesentlichen aus Nitrostärke u. einer giftigen oder die Tränendrüsen reizenden Substanz besteht. Beispielsweise wird folgende Mischung empfohlen: 65% Nitrostärke, 14,5% Diphenylcyanarsin, 20% NaCl u. 0,5% KW-stofföl. (**A. P. 1579 964** vom 16/3. 1921, ausg. 6/4. 1926.) OELKER.

XXI. Leder; Gerbstoffe.

Th. Körner, *Beiträge zur Geschichte der Gerberei und Gerbereichemie*. (Vgl. S. 2419.) (Ledertechn. Rdsch. **17**. 191—93. 202—04. 1925.) LOEWE.

K. H. Gustavson, *Kolloidchemie in der Gerberei. Eine Erwiderung*. Polem. Bemerkungen über den gleichlautenden Vortrag BANCROFTS (S. 2642). Vor allem wird die Unters. DAVISONS (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **12**. 258. 1917; C. 1921. IV. 547) abgelehnt, der zufolge die Cr-Aufnahme durch Hautpulver in Form einer Adsorptionsisotherme erfolge, was dieser Vf. als ein Argument gegen eine chem. Verb. zwischen Haut u. Cr-Gerbstoff auffaßte. (Journ. Amer. Leather. Chem. Assoc. **21**. 53—57. Danvers, Mass.) GERNGROSS.

K. H. Gustavson, *Über die dualistische Natur der Chromgerbung*. Vorläufige Mitt. Vf. untersucht am Beispiele des dioxalatodiaquochromisaurigen Na die Prodd. der Vereinigung von Haut mit negativen Cr-Komplexen. Nach seiner Auffassung spielen bei der Gerbung mit konz. Cr-Brühen Verbb. von Haut mit derartigen anod.

Cr-Komplexen neben solchen von Haut mit Cr-Kationen eine Rolle, desgleichen übrigens auch bei der Zweibad-Cr-Gerbung. Das dioxalatodiaquochromisaure Na, das durch Red. von $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ mittels $(\text{COOH})_2$ hergestellt wird, zeigt rein anod. Wanderung u. weist Cis- u. Transisomerie auf, wobei die cis-Form zur B. von Diolverb. befähigt ist. Hautpulver wird mit einer Lsg. der cis-Form bei verschiedener $[\text{H}^+]$, die durch Zugabe von H_2SO_4 bzw. NaOH geregelt wird, gegerbt. Eine ausreichende Gerbung tritt ein, wenn der End- pH der Lsg. zwischen 2,28 u. 5,47 liegt. Verss. an verschiedenen stark gepickelten Blößen zeigen, daß für das Zustandekommen einer befriedigenden Gerbung mit dieser Oxalato-Cr-Verb. die Blöße sich in der Nähe des isoelektr. Zustandes befinden soll. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **20**, 382—89. 1925. Danvers [Mass.].)

LÖWE.

Arthur W. Thomas, Margaret W. Kelly und Stuart B. Foster, *Aldehydgerbung*. Ausführliche Besprechung des Schrifttums über die Einw. von CH_2O auf Gelatine, auf Hautpulver, auf andere Proteine, über den Effekt der Aldehydgerbung auf die Adsorption anderer Substanzen, über die prakt. Aldehydgerbung u. über die Natur der Verb. zwischen CH_2O u. Proteinen. Bzgl. letzterer wird gesagt, daß der CH_2O sich kaum bloß an die freien NH_2 -Gruppen anlagere, da in diesem Falle nur sehr wenig CH_2O gebunden werden könne, etwa in der Größenordnung der HCl , von der nur ca. 0,0012 Mol. von 1 g Gelatine gebunden werden. Man müsse eher an Verb. von der Art der Dimethylol-Diketopiperazine (CHERBULIEZ u. FEER, *Helv. chim. Acta* **5**, 678. 1922; C. **1923**. I. 1034; BERGMANN, *Collegium* **1923**. 210; C. **1924**. I. 296) lenken, in denen an den 2 Iminogruppen je 1 Mol. Aldehyd addiert ist. Mit 20%ig. CH_2O gegerbtes Hautpulver zeigt eine Aufnahme von 13,5% CH_2O . Die Vff. beurteilen den Grad der Gerbung nach der Menge des fixierten CH_2O u. stellen fest, daß das Maximum bei Gelatine bei $\text{pH} = 6$ u. 7, bei Hautpulver zwischen 7 u. 9 liege. Die CH_2O -Bindung steigt mit der CH_2O -Konz. u. wird durch hohe NaCl -Konz. verstärkt. Es zeigt sich bei der Anwendung der Wilson-Kern-Methode zur Best. des irreversibel gebundenen Gerbstoffes, daß CH_2O (26%ig) eine stark lösende Wrkg. auf das Hautpulver ausübt, so daß geschlossen wird, Hautpulver sei für Studien über Formaldehydgerbung überhaupt ungeeignet. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **21**, 57—76. New York, Columbia University.)

GERNGROSS.

A. Küntzel, *Die Umkehrung der Doppelbrechung der kollagenen Faser durch einige vegetabilische Gerbstoffe*. Vorl. Mitt. Auf Grund der Beobachtung v. EBNERs (Sitzber. d. math.-naturw. Kl. d. königl. Akad. d. Wiss., Wien 1894), daß gewisse Phenole, Phenolsäuren u. Aldehyde die positive Doppelbrechung von Kollagenfasern in negative Doppelbrechung verwandeln können, wird der Einfluß von gerbenden Stoffen auf Lagenhautstücke u. Mäuseschwanzsehnen untersucht. Es ergibt sich, daß von vegetabil. Gerbstoffen nur die Behandlung mit Tannin, Sumach, Tee, Divi-Divi, Algarobilla, Lyrobalanen eine Umkehrung der Doppelbrechung des Kollagens bewirkt. Ordoval, Geradol, Gerbstoff F, Sulfitecelluloseablaugen, Formaldehyd, A. sind ohne Einfluß auf das Vorzeichen der Doppelbrechung. Keratin u. die Protoplasmafaser der Epidermis werden in ihrer positiven Doppelbrechung überhaupt nicht geändert. (*Collegium* **1925**. 623—28. Darmstadt, Techn. Hochsch., Inst. f. Gerbereichemie.) GERNGROSS.

Wilhelm Rieck, *Schutzmaßnahmen gegen Milzbrandverbreitung durch Gerbereien*. f. schlägt vor, das in den Häfen eintreffende Häutematerial mittels der Präzipitationsmethode nach ASKOLI, die für Massenunters. auf Milzbrand besonders geeignet ist, zu untersuchen u. die erkrankten Häute nach der Methode SCHATTENFROH zu desinfizieren. Die festen Abgänge aus den Lederfabriken, soweit sie nicht in anderen Fabriken verarbeitet werden, sondern als Düngemittel Verwendung finden, werden zweckmäßigsten zur Desinfektion mit 20% $\text{Ca}(\text{OH})_2$ kompostiert u. 3 Monate lagern lassen. Die fl. Abgänge müssen möglichst auf dem Fabrikhof selbst nach einer mechan. oder chem.-mech. Vorreinigung durch natürliche oder künstliche Oxydationsverf.

unschädlich gemacht werden. Bei künstlichen Oxydationsverf. empfiehlt sich eine Vor-desinfektion mittels H_2SO_4 . (Ledertechn. Rdsch. 17. 173—77. 186—90. 1925.) LOEWE.

Otto Gerngross und **Georg Sándor**, *Die Fluoreszenzprobe. Über die Fluoreszenzerscheinungen natürlicher Gerbstoffextrakte im ultravioletten Licht*. II. Mitt. (I. vgl. S. 1347.) Bei Unters. 60 verschiedener wss. Gerbextrakte, die tabellar. mitgeteilt werden, im Ultraviolettlicht der Analysenquarzlampe zeigen *Quebracho* u. *Tizera* schwach gelbgrüne, *Fichte* u. *Malettorinde* schwach blauviolette, *Donga* rötlichfahle Fluorescenz. Beim Alkalischemachen, bei dem die *Quebracho*- u. *Tizera*fluorescenz verschwindet, wird die von *Fichte* u. *Maletto* grasgrün, die von *Donga* stark orange. Die Rk. ist bei den letztgenannten 3 Extrakten so deutlich, daß sie für ihre Erkennung geeignet ist. Die von MEUNIER u. BONNET, Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 9. 340. 1925; C. 1926. I. 555) gefundene gelbe Fluorescenz, die an Faserstoffen beim Eintauchen in *Quebracho* u. *Tizera* entsteht, tritt, wenngleich schwächer, auch bei *Mimosa* u. *Kastanie* auf. Dahingegen fluorescieren Cellulosefasern, vor allem Watte, prachttvoll violett beim Tränken mit *Fichten*- u. *Malettorinde*, schwach violett mit *Eichenholz*extrakt. Mangrovenrindenextrakte geben schwach weiße Fluorescenz an Watte. Durch Mischen von *Tizera* bzw. *Quebracho* (gelb) mit *Fichte* bzw. *Maletto* (violett) entsteht eine leuchtend weiße Fluorescenz. Der violett fluorescierende Stoff wird nur locker an Hautpulver gebunden, so daß man durch Entgerbung den Gerbstoff von dem Fluorescenzstoff trennen kann. Dieser Fluorescenzstoff wird aus wss. Lsg. irreversibel an Watte gebunden. Auch *Sulfitcelluloseablaugen* zeigen in wss. Lsg. beim Alkalischemachen den scharfen Farbumschlag von blau nach grün wie *Fichte* u. *Maletto*. Eine Unterscheidung gelingt jedoch außer durch die Procter-Hirstsche Rk. dadurch, daß die violette Fluorescenz an Watte bei den Zellstoffablaugen kaum auftritt, überdies sehr leicht abwaschbar ist. (Collegium 1926. 1—10. Berlin, Techn. Hochschule.) GERNGROSS.

Georges Joret und **Etienne Radet**, *Der Nachweis des Leders in zusammengesetzten, löslich gemachten Lederabfällen enthaltenden Düngemitteln*. Um das Tannin als Kennzeichen des Leders auszuziehen, genügt in den meisten Fällen ein Ausziehen mit W. Besser eignet sich eine gesätt. Oxalsäurelsg.; versagt auch diese, so behandelt man 10 g Substanz mit mäßig w., konz. HCl im Überschuß, verd. mit W., filtriert u. kocht den Rückstand mit Oxalsäurelsg., worauf dann mit $FeCl_3$ leicht Rk. erfolgt. Kennzeichnend für Leder (Tannin) ist ferner auch die bei Beginn der N-Best. nach KJELDAHL auftretende, durch *Rufigallussäure* bedingte Purpurrotfärbung. (Ann. des Falsifications 19. 148—52. Station Agronomique de la Somme.) GROSZFELD.

Hugo Stinnes-Riebeck-Montan- und Ölwerke Akt.-Ges., Halle a. S., *Verfahren zum Gerben von tierischen Häuten*, dad. gek., daß man die Hautblößen mit durch Veresterung von *Sulfitcelluloseablauge* mit aromat. Sulfochloriden erhältlichen Prodd. gegebenenfalls in Mischung mit anderen synthet. oder natürlichen Gerbstoffen, behandelt. — Z. B. wird *Sulfitcelluloseablauge*, 30° Bé, mit NaOH u. *p-Toluolsulfochlorid* bei 15° unter Rühren vermischt, wobei Erwärmung eintritt, u. alsdann noch auf 100° weiter erwärmt. Der Ester fällt Leim sehr gut. Mischt man ihn mit den bekannten synthet. Gerbstoffen, so wird deren Gerbwirkg. erheblich verbessert, da die Ester da Leder besser füllen als die übrigen bekannten Gerbstoffe. Ein Auswaschen der Ester aus der Haut durch W. erfolgt nicht. (D. R. P. 423 096 Kl. 28a vom 12/3. 1922; ausg. 18/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Meilach Melamid, Freiburg i. Br., *Verfahren zum Gerben von tierischen Häuten*. Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P. 423096 ist folgendes nachzutragen: Brauchbare Gerbstoffe aus *Sulfitcelluloseablauge* erhält man auch, wenn man die in den *Ligninsulfosäuren* enthaltenen Hydroxylgruppen nur teilweise mit aromat. Sulfosäuren, in übrigen aber mit aliphat. oder aromat. Carbonsäuren verestert. Solche gemischten Ester

erhält man z. B. durch aufeinanderfolgende Behandlung von *Sulfitcelluloseablauge* mit *p-Toluolsulfochlorid* u. *Benzoylchlorid* bezw. *Acetylchlorid* in Ggw. organ. Lösungsm. wie Bzn., bei 100°. — Ferner kann man vergorene Sulfitablauge, sogenannte *Sulfitchlempen*, mit Esterifizierungsmitteln der erwähnten Art behandeln oder auch die durch Aussalzen der Ablauge mit Na₂SO₄ erhältlichen, von Zucker befreiten, festen *Lignin-sulfosäuren*. — Schließlich kann man *Lignin* mit arom. Sulfochloriden verestern u. die Reaktionsprodd. nachträglich sulfonieren. Z. B. wird *Stroh* mit Na₂CO₃ aufgeschlossen u. das hierbei entstandene *Lignin* mit *p-Toluolsulfochlorid* in alkal. Lsg. erstert. Der *Toluolsulfosäureester* des *Lignins* wird alsdann mit 95%ig. H₂SO₄ bis zur vollständigen Löslichkeit in W. behandelt u. die überschüssige H₂SO₄ mit Ca(OH)₂ der NaOH entfernt. Das durch Eindampfen der Lsg. erhältliche feste braune Prod. st. II. in W. u. fällt Leim gut aus. Die Gerbung der Häute erfolgt in üblicher Weise mit den wss. Lsgg. der Prodd. (**E. P. 194 723** vom 12/3. 1923, ausg. 9/5. 1923. D. Prior. 1/3. 1922 u. **E. P. 220 025** [Zus.-Pat.] vom 27/4. 1923, ausg. 4/9. 1924. **F. P. 564 009** vom 17/3. 1923, ausg. 19/12. 1923. D. Prior. 20/3., 7/4., 27/4. u. 2/10. 1922. **Schwz. P. 06 559** vom 10/3. 1923, ausg. 1/9. 1924. D. Priorr. 11/3., 20/3., 7/4., 27/4. u. 2/10. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: **Karl Daimler**), Höchst a. M., *Verfahren zum Aufhellen dunkel ausgefallener Gerbungen*, dad. gek., daß man die Gerbungen mit solchen in W. unl., hellfarbigen, nicht flüchtigen organ. Verbb., insbesondere Oxyarylen, nachbehandelt, die von geringerer Acidität sind als der jeweils angewandte Gerbstoff. — Z. B. wird mit dem aus *Braunkohle* u. HNO₃ hergestellten *raunen Gerbstoff* gegerbtes, dunkelbraunes Leder nach oberflächlichem Abspülen 3 Min. in einer 1—4%ig. wss. β -Naphtholnatriumlsg. bezw. einer wss. Lsg. des *Nalzes* des aus S₂Cl₂ u. *Rohkresol* hergestellten *S-haltigen Harzes* bewegt, hierauf die Leichfl. durch 1/4—1%ig. HCl ersetzt, diese nach 5 Min. durch reines W., worauf noch 1/2 Stde. gespült wird. Die Farbe des Leders gleicht dann der von *Eichengerbungen*, ist also bedeutend heller als die ursprüngliche. — Mit denselben Mitteln läßt sich auch eine zu dunkel ausgefallene *Quebrachogerbung* aufhellen. An Stelle der erwähnten *a-Salze* lassen sich auch Alkalisalze des α -Naphthols, *gechlorter Naphthole*, von *Oxythracenen*, von *Kresol-CH₂O*- oder *Kresolparaldehydkondensationsprodd.* von alkalischen *Naturharzen* oder der *Ligninsäure* verwenden. (**D. R. P. 423 137** Kl. 28a vom 15/2. 1922, ausg. 19/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: **Karl Daimler**), Höchst a. M., *Herstellung von Chromoxydverbindungen* aus CrO₃ oder deren Salzen, dad. durch die Verwendung von *Ligninsäure* als Reduktionsmittel. — Die *Ligninsäure* kann durch alkal. Extraktion von Hölzern oder Stroh gewonnen werden, besonders eignen sich hierzu die Ablaugen des Natronzellstoffverf. Bei der Einw. von CrO₃ entstehen aus der *Ligninsäure* außer unl. Abbauprodd. auch l., die Cr₂O₃-Lsg. gegen Abumpfung mit Alkalien unempfindlicher u. dadurch *gerber. wertvoller* als eine reine Chromalaunlsg. machen. Z. B. wird mit W. verd. *Strohzellstoffablauge* von ca. 40% Gesamtrockengehalt durch 50%ig. H₂SO₄ bei 20° ausgefällt, Hierzu tropft bei 80—90° innerhalb 3—4 Stdn. eine w. Mischung von konz. H₂SO₄, W. u. K₂Cr₂O₇. Nach Abtrieren von dem mit h. W. etwas ausgewaschenen braunen Rückstand vereinigt man mit Trat. u. Washwasser u. erhält eine blaugrüne Lsg., die zur Trockne gedampft werden kann. (**D. R. P. 423 138** Kl. 28a vom 2/4. 1922, ausg. 19/12. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

XXIV. Photographie.

Friedrich Stock, München, *Konservieren und Regenerieren von Celluloid und Gegenständen hieraus*. (**D. R. P. 421 863** Kl. 39b vom 9/2. 1923, ausg. 20/11. 1925. — 1926. I. 1496.)

FRANZ.

Mario Michel, Basel, *Herstellung photographischer Bilder in bunten Farben auf Stoff*, dad. gek., daß man die durch Lichtwrkg. auf Stoff erhaltenen Bildkopien mittels einer Gerbsäurelsg. zum Vorschein bringt u. auf dem so gebildeten gerbsauren Salz in saurer Lsg. mit bas. Farbstoffen färbt. — Blaupausen werden zunächst mittels einer alkal. Fl. ausgebleicht. (D. R. P. 427 505 Kl. 57b vom 3/5. 1925, ausg. 9/4. 1926.) KÜHLING.

Wadsworth Watch Case Co., Dayton, übert. von: **Murray C. Beebe**, Cincinnati, Ohio, *Lichtempfindliches Mittel*, bestehend aus einem Grundstoff (Harz), einem lichtempfindlichen Öl u. einem die selektive Wrkg. des Lichts auf das Gemisch beschleunigenden Stoff (Halogen). (A. P. 1 574 356 vom 8/3. 1922, ausg. 23/2. 1926.) KAUSCH.

Akt.-Ges. für Anilinfabrikation, Berlin-Treptow, *Photographische Emulsionen*. Den Emulsionen oder ihren Komponenten werden in einem beliebigen Zeitpunkt geringe Mengen eines Thiazolderiv., z. B. Thiazolgelb, Thiazolcarbonsäure, die Trimethylammoniumverb. des Dehydrothiotoluidins oder ein Thiazolderiv. der 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosäure zugesetzt. (E. P. 246 800 vom 22/10. 1925, Auszug veröff. 31/3. 1926. Prior. 31/1. 1925.) KÜHLING.

Emil Mayer, Wien, *Bleicher für das photographische Bromöldruckverfahren*, bestehend aus CuSO_4 u. einem Alkalidichromat, vorzugsweise $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, u. aus einem in W. l. Chlorid, wie NaCl, oder statt dessen aus KBr, gek. durch den Zusatz von Betainchlorhydrat. (D. R. P. 426 661 Kl. 57b vom 29/7. 1925, ausg. 13/3. 1926. Oe. Prior. 1/12. 1924.) KAUSCH.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Alfred Miller**, Dessau), *Photographische Nachbildung von Strichzeichnungen, Druckschriften u. dergl. durch Bildumkehrung*, 1. dad. gek., daß man das entwickelte Silberbild in eine Lsg. bringt, welche auf den silberhaltigen Stellen einen Nd. erzeugt, der das Eindringen eines in der betreffenden Lsg. gleichzeitig enthaltenen Härtungsmittels an diesen Stellen verhindert, während die unbelichteten Stellen durch das eindringende Mittel gegerbt werden. — 2. dad. gek., daß der gebildete Nd. an den unbelichteten Stellen haften bleibt. — Zur Unterstützung der härtenden Wrkg. können Zusätze, z. B. von CH_2C oder Chinon benutzt werden. Die ungehärteten Stellen können mittels w. W. weg-gewaschen werden. (D. R. P. 427 062 Kl. 57b vom 22/3. 1925, ausg. 25/3. 1926.) KÜHLING.

Alfred Haigh, Staffordshire, Engl., *Kohle- und andere Überzugspapiere*. Man verwendet zwei Papierblätter, bringt auf je einer ihrer Seiten den Überzug auf u. preßt sie feucht zusammen. (A. P. 1 576 601 vom 7/9. 1922, ausg. 16/3. 1926.) KAUSCH.

E. Lage G. m. b. H., Hamburg, *Farbige Lichtbilder*. (Holl. P. 13 563 vom 6/5. 1921, ausg. 15/10. 1925. — C. 1922. IV. 1120.) KÜHLING.

Emil Leyde, Wien, *Photographische Gelatineemulsionsschichten mit in deren Oberfläche verlegten Lichtfiltern, insbesondere für Mehrfarbenkinematographie*, dad. gek., daß dieselben lediglich in einer Oberflächenschicht, die wesentlich dünner als die durch Lichtwrkg. entwickelbar veränderte Schichtdicke ist, mit einem Lichtfilterfarbstoff in den beabsichtigten Verschlickungsverhältnissen entsprechende Dichte angefärbt ist. (D. R. P. 426 627 Kl. 57b vom 14/10. 1924, ausg. 15/3. 1926.) KAUSCH.

Nr. 26.
3585—3644.

1926. Bd. I.
30. Juni.

Chemisches Zentralblatt

Vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie

Herausgegeben vom
Vorstand der
Deutschen Chemischen Gesellschaft

vertreten durch
Prof. Dr. W. Marckwald

Redaktion:
Dr. M. Pfücke und Dr. E. Behrle
Berlin W. 10, Sigismundstraße 4

Liste der ständigen Mitarbeiter siehe Heft 1

97. Jahrgang · 1926

Jährlich eine Nummer, jährlich zwei Bände. — Jahresbezugspreis Rmk 100.—, Ausland Rmk 105.—

Die Bezieher des Zentralblattes
erhalten kostenlos als Beilage die monatlich erscheinende „Bibliographia chimica“

Klamationen von Heften des Zentralblattes, welche den Beziehern nicht rechtzeitig
gegangen sind, bittet man in allen Fällen zunächst innerhalb 14 Tagen nach dem
erscheinungstermin schriftlich bei dem zuständigen Postamt anzubringen. Sollte
es ohne Erfolg sein, so werden Mitglieder der Deutschen Chemischen Gesellschaft und des
reins Deutscher Chemiker gebeten, sich direkt an die Geschäftsstelle der Deutschen Che-
schen Gesellschaft, Berlin W. 10, Sigismundstraße 4, zu wenden, Nichtmitglieder dagegen
den Verlag Chemie, G. m. b. H., Leipzig, Bosestraße 2. — Kostenlos können Hefte,
solche bei der Expedition verloren gegangen sind, nur nachgeliefert werden, wenn die
klamation innerhalb von 4 Wochen nach dem Erscheinen des betreffenden Heftes erfolgt.

Verlag Chemie, G. m. b. H., Leipzig und Berlin

Inhalt

I. Allgemeine und physikalische Chemie	3585	IV. Wasser; Abwasser	3618
II. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie	3586	V. Anorganische Industrie	3619
III. Elektrochemie. Thermochemie	3587	VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe	—
IV. Kolloidchemie. Capillarchemie	3590	VII. Agrilkulturchemie; Düngemittel; Boden	3622
V. Anorganische Chemie	3590	VIII. Metallurgie; Metallogr.; Metallverarb.	3624
VI. Mineralogische und geologische Chemie	3592	IX. Organische Präparate	3627
VII. Organische Chemie	3594	X. Farben; Färberei; Druckerei	—
VIII. Biochemie	3606	XI. Harze; Lacke; Firnis	—
IX. Enzymchemie	3607	XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata	—
X. Pflanzenchemie	—	XIII. Ätherische Öle; Klebstoffe	3634
XI. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie	3608	XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke	—
XII. Tierchemie	—	XV. Gärungsgewerbe	—
XIII. Tierphysiologie	3609	XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel	3635
XIV. Pharmazie. Desinfektion	3610	XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel	—
XV. Analyse. Laboratorium	3615	XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellu- lose; Kunststoffe	—
1. Elemente und anorganische Verbindungen	—	XIX. Brennst.; Teerdest.; Beleuchtung; Holz	3637
2. Organische Substanzen	—	XX. Schieß- und Sprengstoffe; Zündwaren	3639
3. Bestandteile von Pflanzen und Tieren	—	XXI. Leder; Gerbstoffe	3640
4. Angewandte Chemie	3617	XXII. Leim; Gelatine; Klebstoffe usw.	—
1. Allgemeine chemische Technologie	3617	XXIII. Tinte; Wäse; Bohnermassen usw.	—
2. Gewerbehygiene; Rettungswesen	—	XXIV. Photographie	3643
3. Elektrotechnik	—		

Zuschriften an die Redaktion erbeten an: Die Redaktion des Chemischen
Zentralblattes, Berlin W. 10, Sigismundstr. 4

Vertrieb ab Leipzig

DEUTSCHE CHEMISCHE GESELLSCHAFT

PHOTOKOPIEN

von Original-Arbeiten aus Zeitschriften, die in der Gesellschaftsbibliothek vorhanden sind, werden zu folgenden Preisen geliefert:

Preise pro Blatt in Reichsmark:

Format	Mitglieder d. Deutschen Chem. Gesellschaft ¹⁾		Chemische Hochschul-Institute ²⁾		Nichtmitglieder	
	weiße Schrift	schwarze Schrift	weiße Schrift	schwarze Schrift	weiße Schrift	schwarze Schrift
12 × 18 cm	0.25	0.80	0.15	0.70	0.50	1.60
18 × 24 cm	0.45	1.45	0.30	1.30	0.90	2.90
24 × 32 cm	0.80	2.30	0.55	2.05	1.60	4.60

¹⁾ Der Name des Mitgliedes muß bei der Bestellung angegeben werden, (Fabriken, Institute usw. können satzungsgemäß nicht Mitglieder sein).

²⁾ Die Preise für chemische Hochschul-Institute haben nur Gültigkeit, wenn der Direktor persönlich bescheinigt, daß die Photokopie für die Unterrichts- oder Forschungszwecke des Instituts gebraucht wird.

Bestellungen mit genauen Angaben (Verfasser, Titel, Literaturstelle der Veröffentlichung; Stelle des Referats im Zentralblatt; gewünschte Ausführung und Format) sind an die unterzeichnete **Geschäftsstelle** zu richten.

Falls nähere Angaben fehlen, wird die Ausführung in dem zweckmäßig erscheinenden Format geliefert. Sollte das vom Besteller gewünschte Format eine zu starke Verkleinerung ergeben, durch welche die klare Lesbarkeit der Kopie beeinträchtigt wird, so behalten wir uns vor, das nächst größere Format zu verwenden.

Die Zustellung erfolgt durch die Geschäftsstelle unter Nachnahme zuzüglich Verpackung- und Postgebühren.

Berlin W. 10,
Sigismundstr. 4

**Geschäftsstelle der
Deutschen Chemischen Gesellschaft**

DEUTSCHE CHEMISCHE GESELLSCHAFT

Soeben erschienen:

Alphabetisches Verzeichnis

von

Trivialnamen der organischen Verbindungen

mit den zugehörigen

Bruttoformeln

Herausgegeben von der

Deutschen Chemischen Gesellschaft

bearbeitet von der

Redaktion des Chemischen Zentralblatts

Das Trivialnamen-Verzeichnis soll dem Benutzer das Ausrechnen der **Bruttoformeln** ersparen, bzw. ihre Errechnung erleichtern.

Das im Zentralblatt-Format gedruckte, vier Bogen starke Bändchen wird stets beschriftet geliefert.

Vorzugspreis für Mitglieder: Mk. 2.—.

Die Bestellung geschieht durch Einsendung des Betrages an die **Schatzmeister der Deutschen Chemischen Gesellschaft, Berlin W 10, Sigismundstraße 3, Postkontokonto: Berlin 88 250.** (Ausland: mandat de poste international, Landesmünze oder Scheck auf Berlin). Bei jeder Zahlung muß der **Name des einsendenden Mitgliedes mit genauer Adresse** (Fabriken, Institute usw. können satzungsgemäß nicht Mitglieder sein) sowie der **Verwendungszweck** der Zahlung angegeben werden.

**Geschäftsstelle der
Deutschen Chemischen Gesellschaft**

Bezugsquellen

für die chemische und verwandte Industrie

Abdampfschalen aus Porzellan:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1



Porzellan-fabrik,

Marktredwitz i. Bayern
Staatliche Porzellan-Manufaktur
Meißen, Meißen

Abfüllmaschinen:

Dokama G. m. b. H., Nürnberg, Badstr. 15

Analysen:

Dr. K. Brauer, veröld. Chem., Cassel

Annalen der Chemie:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Antiquariat, chem.-techn.:

Verlag Chemie, Abt. Vermittlungstelle, Leipzig, Boscstr. 2

Archiv der Pharmazie und Berichte der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Aussugbecken:

Paul Schützler, Berlin N. 39, Schönwalderstr. 7

Berichte der Deutschen Chem. Gesellschaft:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Bibliographia Chimica:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Bücher u. Zeitschriften aus allen Wissensgebieten:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Casserollen aus Porzellan:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1



Porzellan-fabrik,

Marktredwitz i. Bayern

Chemische Apparate und Gerätschaften:

Leppin & Masche, Berlin SO. 16, Engelufer 27

Chemische Industrie:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Chemisches Zentralblatt:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Destilliergefäße:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1

Ein- u. mehrfarbig bedruckte Banderole-Strikfen u. Reklame-Prägemarken in Massen-Auflagen.

Wilki Werke G. m. b. H., Urach

Elektrische Kohlegrieswiderstandsöfen.

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1

Farben, keramische.

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, Meißen

Filterpapiere:

Albert von Carnap, Hamburg 8, Mühlenstr. 50 V

Paul Herzberg, Berlin S. 42, Luisen-Ufer 34

Gasreinigung:

E. Theisen, München O. 27

Gaszerlegungsanlagen:

Gesellsch. für Linde's Eismaschinen A.-G., Höllriegelskreuth b. München

Gewerblicher Rechtschutz u. Urheberrecht:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Glühöfen:

Dr. Schmitz & Co. m. b. H., Barmen-Wichl., Kreuzstr. 60

Kessel aus Porzellan:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1

Kohlensäure: flüssige.

Kohlensäurewerk Deutschland A.-G. Hönningen a. Rh.

Kochbecher aus Porzellan:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1



Porzellan-fabrik,

Marktredwitz i. Bayern

Korrosion u. Metallschutz

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Laboratoriumsbedarfartikel aus Porzellan:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1



Porzellan-fabrik,

Marktredwitz i. Bayern

Laboratoriumsmöbel:

Leppin & Masche, Berlin SO. 16, Engelufer 27

Paul Schützler, Berlin N. 39, Schönwalderstr. 7

Literatur, chem.-techn.:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Luftverflüssigungsanlagen:

Gesellsch. für Linde's Eismaschinen A.-G., Höllriegelskreuth b. München

Nitrocellulose:

Deutsche Sprengstoff-Actien-Gesellschaft, Hamburg 1, Europahaus

Patentanwalt:

Patentanwalt Dr. Oskar Arendt, Berlin W. 50, Kurfürstendamm 227

Porzellan, Laboratoriumsgeräte:

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, Meißen

Porzellan für chemische Zwecke:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1



Porzellan-fabrik,

Marktredwitz i. Bayern

Quarz-Geräte:

Deutsche Quarzschmelze G. m. b. H., Gleichmann & Hopf, Berlin-Staaken

Rohre aus Porzellan:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1



Porzellan-fabrik,

Marktredwitz i. Bayern

Sauerstoffanlagen:


Gesellsch. für Linde's Eismaschinen A.-G., Höllriegelskreuth b. München

Schmelzöfen:

Dr. Schmitz & Co. m. b. H., Barmen-Wichl., Kreuzstr. 60

Schmelzriegel aus Porzellan:

Staatliche Porzellan-Manufaktur, Berlin N W. 23, Wegelystr. 1



Porzellan-fabrik,

Marktredwitz i. Bayern

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, Meißen

Stickstoffanlagen:

Gesellsch. für Linde's Eismaschinen A.-G., Höllriegelskreuth b. München

Wasserstoffanlagen:

Gesellsch. für Linde's Eismaschinen A.-G., Höllriegelskreuth b. München

Zeitschrift für angewandte Chemie:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Zeitschrift für Elektrochemie u. angewandte physikalische Chemie

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Zeitschrift für Pflanzenernährung u. Düngung

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Zentralblatt für Gewerbehygiene und Unfallverhütung:

Verlag Chemie G. m. b. H., Leipzig, Boscstr. 2

Zentrifugen:


Gebr. Heine, Viersen i. Rhld.

FILTRIR PAPIER

In unerreichter Vollkommenheit und Vielseitigkeit liefern wir auf Grund 40 jähriger Erfahrung unsere
Filtrirpapier-Sonderheiten
*für die Zwecke der Technik und analytischen Chemie.
 Beim Einkauf achte man auf unsere in allen Kulturstaaen eingetragenen Etiketten und Schutzmarken.*
Carl Schleicher & Schüll, Düren (Rheinland)

Pfeiffer's

Hoch-Vacuum-Pumpen D. R. P.



Rot. Öl-Luftpumpe D. R. P.
 Std. 60 cbm bei 0,02 mm Hg

Std. Saugleistung bis 120 cbm
 Vacua bis 1/1000 000 mm Hg

Öl-Prüfapparate
Schnell-Viskosimeter D.R.P.

Funkeninduktoren
 bis 1000 mm Funkenlänge

Photometer

Arthur Pfeiffer · Wetzlar 58

Fabrik physikalischer und chemischer Apparate

Telegramme: **Vacupfeif**

D. R. P. 343248.

Wargöns A.-B. und Lidholm in Wargön, Schweden, betr.

**Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen
 einer Zyanamidlösung aus Kalkstickstoff**

ist zu verkaufen oder in Lizenz zu geben

Angebote unter

11. 941 an Krieger-Dank, Annoncen-Expedition, Berlin SW11

02-22 STD E00



8 032919 996824

www.colibrisystem.com

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 063579475